

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ– MILK BAR

SÁRGA CUMI: „tanuló cumi”

- Első 5-6 itatáshoz,
- lágyabb az anyaga a kolosztrumhoz,
- könnyebb tejkifolyás,
- több borjú tanításához is használható.
- Nem szabad nagyobb lyukat vágni a cumin a gyorsabb itatáshoz!!!
- Nem helyettesíti az ellés utáni első kolosztrum drenchselést.



FEKETE CUMI: Minden borjú új cumit kell, hogy kapjon!!!

- A 6. itatástól egészen választásig a saját cumi kísérelje végig a borjút
- Az anyaga és a cumi belső membránja a borjú korának megfelelően lágyul. Az első itatásnál nagyon lassú átfolyással rendelkezik, **kb. 1 liter/4 perc**, de ez a **normális működés**.
- A cumi célja a lassú itatás bőséges nyálképződéssel!!!



MILK BAR ITATÓ EDÉNYEK FELSZERELÉSE

FONTOS!!! A felakasztott vályúk esetén az alomtól vagy aljzattól mérve a **cuminak 60-70 cm közötti magasságban** kell lennie! Rossz magasságban nem biztosított a megfelelő nyelőcsővályú izom fejlődés és működés!

CUMI CSERÉJE ÉS BEHELYEZÉSE:

Fordítsuk le a vödröt és térdeljünk rá!



Húzzuk kifelé a cumit billentő mozdulattal!



Ennyi.....



Az új cumit belülről dugjuk ki a furaton, és húzzuk be első kattanásig.

FONTOS!!! A behelyezés után ellenőrizzük le, hogy a **cumi végén a hasíték függőleges pozícióban legyen**. Ellenkező esetben nem biztosított a megfelelő működés. Ha egyes borjaknál nagyon lassú tejivást tapasztalunk (25-30 perc felett), akkor ellenőrizzük le a cumi hasíték megfelelő függőleges pozícióját.

CSOPORTOSÍTÁS, MINT OPCIONÁLIS LEHETŐSÉG

- Max. 2 hét korkülönbséggel csoportosíthatjuk a borjakat 2-3 hetes kortól a kisebb munkaráfordítás miatt.
- A cumi kövesse a borjút az egyedi vödörből a csoportos vályúba.
- A csoportos vályúkat ne keverjük a csoportok között!



ÁLTALÁNOS TÁPLÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Mindig legyen a borjú előtt tiszta víz! Víz nélkül nem indul be a megfelelő abrakfelvétel.

Mindig legyen a borjú előtt abrak! Abrak nélkül nem fejlődik megfelelően a bendő.

Bármit lehet itatni (teljes tej, tejpör, stb.) az alábbi táblázat útmutatása szerint.

1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	6. hét	7. hét	8. hét	9. hét	10. hét
2x 2.5 Lit	2x 3 Lit	2x 3.5 Lit	2x 3.5 Lit	2x 3.5 Lit	2x 3.5 Lit	2x 3 Lit	2x 2.5 Lit	1x 3 Lit	1x 2.5 Lit

Általában a 6-7. héttől csökkenthetjük az itatott tej mennyiségét, amennyiben már tapasztaljuk a min. 20-25 dkg abrak felvételt. Ha nem csökkentjük a tej itatást, akkor hátráltatjuk a gyorsabb kérődzővé válásban, egészséges bendő fejlődésben. Választás történhet egyedi szempontok szerint (súly, kor, stb.).

TAKARÍTÁS, HIGIÉNYIA

- Minden használat után öblítsük el tisztavízzel, és fejjel lefelé akasszuk vissza a vályút ketrecrel.
- Heti 2 alkalommal végezzünk lúgos mosást, majd tisztavizes öblítést!
- Savas mosása a cumiknak TILOS!!! Külön a vályú savas mosása a ciklusok között lehetséges.
- Az öblítésnél és a mosószeres mosásnál nem kell a cumikat kivenni!