

КОЛЛЕКЦИИ

УДК 582.739(477)

© Н. М. Федорончук, М. В. Шевера, Л. И. Крицкая

**КОЛЛЕКЦИЯ ТИПОВ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА *FABACEAE* s. l.
В ГЕРБАРИИ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ ИМ. Н. Г. ХОЛОДНОГО
НАН УКРАИНЫ (KW)**

N. M. FEDORONCHUK, M. V. SHEVERA, L. I. KRYTZKA. COLLECTION OF TYPES OF THE FAMILY *FABACEAE* s. l. SPECIES IN THE HERBARIUM OF N. G. KHOLODNY INSTITUTE OF BOTANY, NAS OF UKRAINE (KW)

Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины
01001 Киев-1, ул. Терещенковская, 2

Тел. (38-044) 235-2038

Факс (38-044) 234-1064

E-mail-1: inst@botan.kiev.ua; E-mail-2: shevera@mail.ru

Поступила 23.08.2001

Окончательный вариант получен 21.05.2003

Проведена типификация и составлен список типовых образцов (голотип, изотип, лектотип, изолектотип, неотип) видов сем. *Fabaceae* s. l., хранящихся в Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW).

Ключевые слова: тип вида, голотип, лектотип, неотип, *Fabaceae*, гербарий KW.

Статья продолжает серию публикаций о типах видов цветковых растений, хранящихся в Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW), включая персональные коллекции В. Г. Бессера и Н. С. Турчанинова. Приводится список видов (125) сем. *Fabaceae* s. l., описанных как с территории Украины, так и других регионов мира (Европа, Австралия и Океания, Азия, Северная Америка).

Для каждого вида указываются номенклатурная цитата, категория типа, фамилия исследователя, выделившего лектотип или неотип, оригинальный текст гербарной этикетки, местонахождение по протологу (кроме голотипов или изотипов для большинства недавно описанных видов) и критические заметки.

Типовые образцы большинства описанных Н. С. Турчаниновым видов выделены австралийским ботаником М. D. Crisp (Australian National Botanical Gardens, Herbarium CBG, Canberra), о чем свидетельствуют цитированные нами его «notae criticae».

Aotus Smith

1. *A. genistoides* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 268.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 61» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 61».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Aotus genistoides* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 25 II 1985. Photo 4420».

Astragalus L.

1. *A. abruptus* Krytzka, 1978, Новости сист. высш. и низш. раст. 1977 : 130.

Holotypes: «RSS Ukr., dit. Nikolajeviensis, distr. Novoodessanus, p. Michajlovka, declivia calcarea ad ripam sinistram fl. Hupanis. 19 V 1973, L. Krytzka» (KW).

2. *A. borysthenicus* Klok., 1946, Бот. журн. АН УРСР, 3, 1—2: 21.
Neotypus (Krytzka, hoc loco): «Азово-Сивашский госзаповедник, о-в Бирючий. Песчано-ракушняковая степь. 20 VII 1953, Парнасский (№ 27)» (KW).

По протологу: «RSS Ucr., insula maecotica Birjuczij. In sabulosis maritimis. 12 VI 1935, leg. T. Czicza, CWU».

Примечание. В Гербариях Института ботаники НАН Украины (KW) и Харьковского университета (CWU) указанный в протологе тип вида отсутствует, вероятно, он утрачен.

3. *A. cretophilus* Klok., 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21 : 238.

Holotypus, isotypi (2): «Ворошиловградская обл., Меловский р-н, Ново-Александровский (N 64) конный завод, меловые обнажения по р. Евсугу. 10 VIII 1949, М. Котов» (KW).

4. *A. hypanicus* Krytzka, 1974, Укр. бот. журн. 31, 4 : 455.

Holotypus: «RSS Ucr., dit. Mycolajivensis, distr. Novoodessanus, prope p. Troitzke, in declivibus calcareis ad Hypanim. 15 V 1972, L. Krytzka» (KW).

5. *A. novoascanicus* Klok., 1946, Бот. журн. АН УРСР, 3, 1—2 : 19.

Lectotypus: (Krytzka, Fedoronchuk, hoc loco): «Чапли. Степь между сараями Тышковым и Орловым. 12 V 1928, leg. М. Шалыт» (KW).

По протологу: «RSS Ucr., Ascania-Nova, steppa reservata. 11 V et 6 VI 1926. Leg. M. Shalyt; CWU».

Примечание. В гербарии KW и CWU цитируемые в протологе образцы отсутствуют (утрачены?). В качестве лектотипа избран один из образцов, собранных М. Шалытом и тестированных М. В. Клоковым; этот образец ранее (Крицька та ін., 1999) ошибочно был указан в качестве голотипа.

6. *A. odessanus* Bess., 1822, Enum. Pl. Volhyn. : 30.

Lectotypus (Krytzka, hoc loco): «prope Odessam legi A. 1816» (KW).

По протологу: «Prope Odessam legi A. 1816 quam hoc anno Andrzejowskianus in Podol. australi detexit».

Примечание. В коллекции В. Г. Бессера (KW) хранятся два типовых образца вида. Протологу в большей мере отвечает экземпляр, на этикетке которого рукой А. Анджейовского написан год сбора (1816) и коллектор (А.), но без указания места сбора. На этикетке другого гербарного листа обозначено, что растение выращено в ботаническом саду г. Кременца из семян, собранных в окрестностях г. Одессы.

7. *A. olgianus* Krytzka, 1974, Укр. бот. журн. 31, 4 : 457.

Holotypus: «RSS Ukr. dit. Voroschilovgradensis, distr. Milovensis, in reservata steppaceo Striletzkij step dicto, steppa virginea plana. 19 V 1959, S. Smolko, G. Romaniczuk et O. Dubovik» (KW).

8. *A. pseudoglaucus* Klok., 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15 : 150.

Holotypus, isotypi (2): «Одеса, район Правий беріг Хаджибеївського лиману, між Алтестовим і Холодною Балкою. Схили з виходом вапняку. 4 VI 1951, М. Клоков» (KW).

9. *A. cinereus* Bieb. ex Bess., 1822, Enum. Pl. Vohl. : 29, nom. illeg., non DG, nec non Willd.

Lectotypus (Krytzka, hoc loco): «Pod. australiori» (KW).

По протологу: «In Podolia australi prope Jaorlik. А.».

10. *A. cinereus* Turcz., 1842, Fl. Baic.-Dahur. 1 : 322, non. illeg., non DC, nec non Willd.

Isolectotypus: «In arenosis insulae Olchon. 1834, Turcz.» (KW).

Lectotypus (Podlech, Sytin, 1996): «In arenosis insulae Olchon. 1834, Turcz.» (LE).

Bossiaea Vent.

1. *B. divaricata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 285.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V, N 83» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 83».
2. *B. gilbertii* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 256.
Holotypus: «Western Australia, 1842 et c., Gilbert coll. N 313 (inexsta cum *B. eriocarpa* Bth. sub hoc numero)».
По протологу: «Gilbert coll. N 313».
3. *B. oxyclada* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 284.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 82» (KW).
По протологу: «Dram. V. N 82».
4. *B. peduncularis* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 287.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. Drummond coll. V. N 80» (KW).
По протологу: «Dram. coll. N 80».
5. *B. rigida* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 285.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 79» (KW).
По протологу: «Drum. coll. N 79».

Callistachys Vent.

1. *C. tetragona* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 249.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. III. N 83» (KW).
По протологу: «Drummand coll. III. N 83».
- Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Callistachys tetragona* Turcz. = *Oxylobium coriaceum* (Sm.) C. Gardner. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

Chamaecytisus Link

1. *C. pineticola* Ivchenko, 1992, Укр. бот. журн., 49, 2 : 86.
Holotypus: «RSS Ucr., in adjacentibus Kioviae, prope Irpenj margines pineti. 25 V 1976, I. Ivchenko» (KW).

Chorizema Fisch.

1. *C. capillipes* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 255.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 27 (ex parte)» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 27».
- Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema capillipes* Turcz. = *C. glycinifolium* (Sm.) Druce. This may in fact be part of Drummond coll. V. N 26. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».
2. *C. cytisoides* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 256.
Holotypus: «Nova Hollandia Swan River. 1849. Drummond, N 77» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 77».
- Примечание. Типовой материал (6 растений) представлен на двух гербарных листах под одним и тем же номером (N 77). Здесь же имеются две notae criticae: «Type (part) of *Chorizema cytisoides* Turcs. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983», «Part of Type of *Chorizema cytisoides* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

3. *C. denticulatum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 252.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 25» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 25».
- Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema denticulatum* Turcz.? = *C. glycinifolium* (Sm.) Druce. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

4. *C. heterophyllum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 255.
?Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 27 (ex parte)» (KW).

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema heterophyllum* Turcz. = *Oxylobium heterophyllum* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983», однако мы не можем категорически утверждать этот статус типового образца, поскольку в протологе не указано место, откуда был описан вид.

5. *C. humile* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 254.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drumm. coll. post. IV. N 36» (KW).
По протологу: «Dram. IV. N 36».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema humile* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

6. *C. parvifolium* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 253.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 23» (KW).
По протологу: «Dram. V. N 23».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema parvifolium* Turcz. = *C. nervosum* T. Moore. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

7. *C. pubescens* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 256.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drummond coll. IV. N 33» (KW).
По протологу: «Dram. IV. N 33».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema pubescens* Turcz. = *Oxylobium carinatum* (Meisn.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 18 VII 1983».

8. «*C. trigonum*» Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 254.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 22» (KW).
По протологу: «Dram. V. N 22».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Chorizema trigonum* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

Cytisus L.

1. *C. kreczetoviczii* Wissjul., 1954, во Фл. УРСР, 6 : 586, 336, рис. 105.
Lectotypus (Shevera, Fedoronchuk, hoc loco) et isolectotypus: «Надзів'я. Маріупільщина, Харцизька балка, що впадає в р. Гр. Єланчик. На відслоненнях сарматського вапняка. 23 V 1926, Ю. Клеопов» (KW).

По протологу: «RSS Ucr., ditio Staliniensis, distr. Zdaniv, prope flum. Gruzkyj Jelanczyk, loco Charcysska balka dicto, in decliviis calcareis sarmacitis».

Примечание. В Гербарии KW других, кроме вышецитированных, образцов, которые можно было бы рассматривать как типовые, нет. Однако в протологе не указана дата сбора. Поэтому мы принимаем их в качестве лектотипа и изолектотипа, хотя ранее (Крицька та ін., 1999) они ошибочно были приняты как голотип и изотип.

Daviesia Smith

1. *D. acanthoclada* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 262.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 90» (KW).
По протологу: «Dram. V. N 90».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia acanthoclada* Turcz. = *Hovea acanthoclada* (Turcz.) F. Muell. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

2. *D. anceps* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 266.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 86» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 86».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia anceps* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

3. *D. calystegia* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 264.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. IV. N 30» (KW).

По протологу: «Drum. IV. N 30».
Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia calystegia* Turcz. = *D. crenulata* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

4. *D. condensata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 265.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 50» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 50».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia condensata* Turcz. = *Dillwynia pungens* (Sweet) Mackay. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

5. *D. crenulata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 265.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coli. V. N 40» (KW).
По протологу: «Drum. V. N.40».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia crenulata* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

6. *D. lancifolia* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 263.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coli. IV post. N 28» (KW).
По протологу: «Drum. IV. N 28».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia lancifolia* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983».

7. *D. mollis* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 263.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 39» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 39».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia mollis* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

8. *D. obovata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 261.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 41» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 41».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia obovata* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

9. *D. pachylima* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 263.
Holotypus: «Nova Hollandia. Dram. coll. V. N 43» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 43».

Примечание. Цитированный образец, неизвестно, на каком основании, обозначен как лектотип, о чем свидетельствует notae criticae: «Lectotypus, Crisp, in herb.: 27 VII 1983».

10. *D. striata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 264.
Holotypus: «Nova Hollandia. Dram. coll. IV post. N 29».
По протологу: «Dram. V. N 29».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Daviesia striata* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VII 1983» и фотографией типа.

Dichosema Benth.

1. *D. microphyllum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 283.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 85» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 85».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Dichosema microphyllum* Turcz. = *Mirbelia microphylla* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photo 4439».

2. *D. multicaule* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 283.

Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. post. IV. N 34» (KW).

По протологу: «Drum. IV. N 34».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Dichosema multicaule* Turcz. = *Mirbelia multicaulis* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985 Photo 4455».

Euchilus R. Br.

1. *E. calycynus* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 276.

Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 75» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 75».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Euchilus calycynus* Turcz. = *Pultenaea calycina* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4433—4».

2. *E. purpureus* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 276.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 70» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 70».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Euchilus purpureus* Turcz. = *Pultenaea purpurea* (Turcz.) Crisp. ms. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4435—6».

3. *E. rotundifolius* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 277.

Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 78» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 78».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Euchilus rotundifolius* Turcz. = *Pultenaea rotundifolia* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4437—8».

4. *E. spinulosus* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 275.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 71» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 71».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Euchilus spinulosus* Turcz. = *Pultenaea spinulosa* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4458—9».

Eutaxia R. Br.

1. *E. densifolia* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 271.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 76» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 76».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Eutaxia densiflora* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 25 II 1985. Photo 4421».

2. *E. divaricata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 270.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. IV post. N 23» (KW).

По протологу: «Drum. IV. N 23».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Eutaxia divaricata* Turcz. = *Dillwynia divaricata* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 7 II 1985. Photo 4426».

3. *E. leptophylla* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 268.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. post. IV. N 35» (KW).
По протологу: «Drum. IV. N 35».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Eutaxia leptophylla* Turcz. = *Eutaxia microphylla* (R. Br.) J. Black. Determinavit M. D. Crisp. 25 II 1985. Photo 4422».

4. *E. obovata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 271.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 46» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 46».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Eutaxia obovata* Turcz. = *Eutaxia parvifolia* Benth. Determinavit M. D. Crisp. 25 II 1985. Photo 4423».

5. *E. punctata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 272.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drummond coll. V. N 69» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 69».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Eutaxia punctata* Turcz. = *Gastrolobium punctatum* (Turcz.) Crisp., comb. nov. ined. Determinavit M. D. Crisp. 18 II 1985. Photo 4424».

6. *E. uncinata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 269.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 49» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 49».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Eutaxia uncinata* Turcz. = *Dillwynia uncinata* (Turcz.) J. Black. Determinavit M. D. Crisp. 8 II 1985. Photo 4425».

Gastrolobium R. Br.

1. *G. corymbosum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 272.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 58» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 58».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium corymbosum* Turcz. = *G. bilobum* R. Br. Determinavit M. D. Crisp. 6 II 1985. Photo 4428».

2. *G. crenulatum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 273.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 55» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 55».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium crenulatum* Turcz. a good species. Determinavit M. D. Crisp. 6 II 1985. Photo 4427».

3. *G. emarginatum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 273.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drummond. coll. V. N 51» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 51».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium emarginatum* Turcz. = *G. velutinum* Lindley et Paxton. Determinavit M. D. Crisp. 6 II 1985. Photo 4429».

4. *G. polycephalum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 274.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 54» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 54».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium polycephalum* Turcz. = *G. pyramidale* T. Moore. Determinavit M. D. Crisp. 6 II 1985. Photo 4430».

5. *G. pulchellum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 274.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond. coll. V. N 57» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 57».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium pulchellum* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 6 II 1985. Photo 4431».

6. *G. stenophyllum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 275.

Holotypus: «Nova Hollandia, Drummond. coll. V. N 52» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 52».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium stenophyllum* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 6 II 1985. Photo 4432».

Genista L.

1. *G. donetzica* Kotov, 1940, Бот. журн. АН УРСР, 1, 2 : 276.

Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco) : «Артемівська (Бахмутська) округа, окол. с. Серебрянка, на глинясто-крейдянних відслоненнях. 15 VIII 1928, P. Oksijuk (KW)».

По протологу: «Ворошиловградська обл., Лисичанський р-н, Серебрянка на р. Дінцю, квітки і плоди. 15 VIII 1928 р. зібрав П. Оксіюк, там же, 12 VI 1936 р. Зібрав Ф. Гринь».

Примечание. Цитированный образец ранее (Крицька та ін., 1999) ошибочно был принят за голотип.

2. *G. marginata* Bess. ex Andrz., 1860, Андриевский, Исчисл. раст. Подол, губ.: 29.

Lectotypus (Shevera, hoc loco): «Pod. austral. Bess.» (KW).

По протологу: «...circa Sawran 1829. ad Borysth.».

3. *G. scythica* Pacz., 1889, Зап. Киев, общ-ва естествоиспыт. 10, 2 : 424, tabl. 7, fig. 8—9, s. restr.

Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco; Dubovik, 1989, in herb. Schmalh., pro «Tyрус») «р. Osokorowka ad Borysthenem gub. Cherson, apr. 1888, Paczoski»; s u n -
typus: «Mielowoje ad Borysthenem gub. Cherson, apr. 1888, J. Paczoski» (KW).

По протологу: «При Днепре (Качкаровка, Меловое, Софиевка, Осокоровка). При Буге (Вознесенск...) и при Ингуле около Николаева».

Примечание. Лектотипом вида Н. Н. Цвелёв (1987) выбрал экземпляр из с. Качкаровка, не заметив, что на этом же гербарном листе есть растения, которые относятся к *G. millii* Heldr. При этом он не указал конкретно образец, принятый им за лектотип *G. scythica*. Поэтому мы считаем целесообразным выбрать другой лектотип.

4. *G. taurica* Dubovik, 1991, Новости сист. высш. раст. 28 : 96.

Isotypus: «Крым, Бахчисарайский р-н, на крутом меловом склоне южной экспозиции в окр. ст. Сирень. 30 VI 1962, И. Крюкова» (KW).

Примечание. В Гербарии LE хранится голотип вида.

5. *G. tetragona* Bess., 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 73.

Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, Krytzka, hoc loco): «ad Jaorlik et Tyram» (KW).

По протологу: «Ad Tyram a Jaorlik ad Raszkow spatio 7 milliarium frequens. А.».

Gompholobium Smith

1. *G. obcordatum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 258.

Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drummond coll. V. N 42» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 42».

Примечание: Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Gastrolobium obcordatum* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 28 VI 1984. Photo 4460».

Hedysarum L.

1. *H. inundatum* Turcz., 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15 : 781.

Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco): «In pratis subalpinus ad torrente Dzemczug. 1830, Turcz.» (KW).

По протологу: «In glareosis subalpinis inundatis ad ripas torrentium e. gr. Dzem-zug, Kudun **etc.**».

Примечание. В Гербарии LE типовые образцы отсутствуют.

2. *H. microphyllum* Turcz., 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15 : 778.

? Isolectotypus: «In campis ad Angaram prope pagum Konovalov, 1830, Turcz.» (KW).

? Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «In campis ad Angaram prope pagum Konovalov, 1830, Turcz.» (LE).

По протологу: «In siccis lapidosis ad fluvium Angaram ultra Balagansk, ubitantum specimina florifera colligere mihi liquit, postea circa urbem Krasnoyarsk, in monte Krasnaja Sopka dicta, tam florentia, quam fructifera magna in copia reperi.»

Примечание. В Гербариях LE и KW, кроме типовых образцов, предварительно выделенных нами как лектотип и изолектотип, других не обнаружено.

3. *H. mongolicum* Turcz., 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15 : 781, in obs.; id. 1842, Fl. Baic.-Dahur. 1 : 337.

Isolectotypus: «In locis subsalsis et arenosis Mongolia Chinensis. 1831» (KW).

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «In locis subsalsis et arenosis Mongolia Chinensis. 1831» (LE).

По протологу: «In locis subsalsis Dahuriae ad limites Chinensis inter Abagaitui et Chailassutui».

4. *H. setigerum* Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey., 1837, Index Sem. Hort. Petropol. 1: 29.

Isolectotypus: «In monte lapidosa ad rivulum Sakir, 1830, Turcz.» (KW).

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «In monte lapidosa ad rivulum Sakir, 1830, Turcz.» (LE).

По протологу: «Hab. in Dahuria».

Примечание. В коллекции Н. Турчанинова (KW) под названием «*Hedysarum segitienan* mihi» имеются типовые образцы, которые можно отнести к синтипам: «Ad Angaram, 1833», «In monte lapidosa ad rivulum Sakir, 1830, Turcz.», «Ad fl. Aldan, legit cl. Kuznetsoff, 1835. Turcz.», «Insula Kurilense». Последние экземпляры (собранные на р. Алдан и Курильских островах) существенно отличаются от первых и на них имеется потае criticae (без указания автора) с определением: «*H. mackenzii* **Rich.**».

Isotropis Benth.

1. *I. juncea* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 251.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. post. N 22» (KW).

По протологу: «Drum. IV. N 22».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Isotropis juncea* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 27 VI 1984. Photo 4468».

Jacksonia R. Br.

1. *J. compressa* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 260.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 36» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 36».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Jacksonia compressa* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4464».

2. *J. foliosa* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 260.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. IV. post. N 25» (KW).

По протологу: «Drum. IV. N 25».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Jacksonia foliosa* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4463».

3. *J. grevilleoides* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 259.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. IV. post. I. N 32» (KW).
По протологу: «Drum. IV. N 32».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Jacksonia grevilleoides* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4462».

4. *J. juncea* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 261.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 33» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 33».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Jacksonia juncea* Turcz. = *J. capitata* Benth. Determinavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4461».

5. *J. umbellata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 261.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 34» (KW).
По протологу: «Dram. V. N 34».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Jacksonia umbellata foliosa* Turcz. = *J. capitata* Benth. Determinavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4470».

Kaleniczzenkia Turcz.

1. *K. daviesioides* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 252.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. post. N 26» (KW).
По протологу: «Dram. coll. IV. N 26».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Kaleniczzenkia daviesioides* Turcz. = *Leptosema daviesioides* (Turcz.) Crisp. Detenninavit M. D. Crisp. 27 VI 1984. Photo 4469».

Leptocytisus Meissn.

1. *L. hirtellus* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 258.
Holotypus: «Nova Hollandia. Dram. coll. V. N 72» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 72».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Leptocytisus hirtellus* Turcz. = *Latrobea hirtella* (Turcz.) Benth. Detenninavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4465».

Lotus L.

1. *L. ambiguus* Bess. ex Spreng., 1826, Syst. Veg. 3 : 282.
Lectotypus (Krytzka, hoc loco): «Cremenetz» (KW).
По протологу: «...Volhynia».

2. *L. elisabethae* Orperman ex Wissjul., 1954, во Фл. УРСР, 6 : 588, 429, рис. 81.
Neotypus (Krytzka, hoc loco): «Distr. Mariupol. Білосарайська коса. Вогкий гуму-
сований пісок по краю піскового гребня. 3 VII 1929, С. Постригань» (KW).
По протологу: «RSS Ucr., ditio Staliniensis, loco Belossaraiskaja Kossa dicto.
15 VII 1933, leg. S. Postryganj».

Примечание. Указанный Е. Висюлиной в протологе тип, хранившийся в Гербарии KW, утрачен. Выбранный в качестве неотипа образец сопровождается notae criticae П. Оппермана: «*Lotus Elisabethae* Orperman species nova, 1931 г.» и, несомненно, был известен Висюлиной при описании вида.

3. *L. olgae* Klok., 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21 : 235.
Isotypus: «Луганская обл., Меловской р-н, заповедник «Стрелецкая степь». Ложбинка. 13 VIII 1958, О. Дубовик» (KW).

Примечание. В Гербарии LE хранится голотип вида.

4. *L. ucrainicus* Klok., 1961, Бот. мат. (Ленинград), 21 : 233.
Isotypi (2): «Prov. Kiev, in pratis siccis pr. urbem Umanj, VI 1899, E. Koliassinsky (Herb. Fl. Ross., N 810)» (KW).

Примечание. В Гербарии LE хранится голотип вида.

Medicago L.

1. *M. dzawakhetica* Bordz., 1907, in Проток, засед. Киев. общ. Естеств.: 2.
Lectotypus (Shevera, Fedoronchuk, hoc loco): «Transcaucasia. Prope Akhalkalaki (prov. Tiflis) — in locis herbosis. 30 VII 1907, Eug. Bordzilovski» (KW).
По протологу: «Planta decripta lecta est Dzhawakhetica (distr. Akhalkalaki, prov. Tiflis) prope Akhalkalaki, ubi crescit sat copiose in locis herbosis, in pasquis, in declivibus atque ad vias...».

2. *M. procumbens* Bess., 1809, Prim. Fl. Galic. 2: 127.
Neotypus (Krytzka, Fedoronchuk, Shevera, hoc loco): «*M. procumbens* (ex herb. Bess.)» (KW).

По протологу: «...Leopoli et Cracoviae».

Примечание. В Гербарии KW (персональная коллекция В. Бессера) нет образцов, которые отвечали бы протологу. Имеется лишь 4 гербарных образца, на этикетках которых рукой Бессера написано: «*M. procumbens*», а неизвестным автором эти же образцы были переопределены как *M. falcata*. На 3 образцах не указано место сбора, а на четвертом написано: «**cult.**» и тоже другим почерком дописано «Curoponia». В Гербарии LE типовые образцы вида также отсутствуют.

Meladenia Turcz. [*Psoralea* L.]

1. *M. densiflora* Turcz., 1848, Bull. Soc. Nat. Moscou, 21, 1 : 576.
Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco): «Cumm. coll. N 1649. *Psoralea* sp. suad. cl. Benthani in litt». (KW).
По протологу: «In insulis Philippinis Luzon (provincia South-Iloco) et Panay cum coll. 1169 et 1649».

Melilotus Mill.

1. *M. pallidus* Bess., 1823, Index Sem. Hort. Cremen.; Ser., 1825, in DC., Prodr. 2:188.
Neotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco): «Pod. Littora» (KW).
По протологу: «...in Volhynia...».

Примечание. В Гербарии KW других типовых образцов, кроме выше указанного, нет. Ранее (Крицька та ін., 1999) мы приняли его за лектотип, однако сейчас, учитывая не совсем точное соответствие протологу, рассматриваем его в качестве неотипа.

2. *M. procumbens* Bess., 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 30.
Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco): «in Podolia austr. **Bessarabia**» (KW).

По протологу: «...in Podolia australi. A. In Bessarabia ipsemet legi».

Примечание. В Гербарии LE хранится изолектотип вида.

Mirbelia Smith

1. *M. aspera* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 281.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 28» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 28».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Mirbelia aspera* Turcz. = *M. ovata* Meissner. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photo 4442».

2. *M. racemosa* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 282.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 59» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 59».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Mirbelia racemosa* Turcz. = *Oxilobium racemosum* (Turcz.) C. Gardner. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photo 4440».

3. *M. subcordata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 282.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 60» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 60».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Mirbelia subcordata* Turcz. ?= *M. ovata* Meissner. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photo 4441».

Onobrychis Mill.

1. *O. gracilis* Bess., 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 74.

Isolectotypus: «in Podolia australis» (KW).

Lectotypus (Fedoronchuk, Krytzka, hoc loco): «in Podolia australis» (LE).

По протологу: «In Pod. australi. A.».

Примечание. В коллекции В. Г. Бессера (KW) в пачке с образцами *O. gracilis* есть пометка О. Дубовик: «...часть автентичного материала вида отослана в Ленинград».

2. *O. tesquicola* Krytzka, 1976, Новости сист. высш. и низш. раст. 1975 : 126.

Holotypus: «RSS Ucr., dit. Chersonensis, distr. Berislavensis, praedium defensium venaticum Gavrilovskoje dictum, in declivibus calcareis. 13 VII 1974, L. Krytzka» (KW).

Oxylobium Andr.

1. *O. atropurpureum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 250.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 53» (KW).

По протологу: «Drum. V. N 53».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Oxylobium atropurpureum* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 19 Jun. 1984. Photo 4466» и «Lectotype (ined.) of *Gastrolobium leakeanum* J. Drumm. Determinavit M. D. Crisp. 19 Jun. 1984. Photo 4467».

Oxytropis DC.

1. *O. ciliata* Turcz., 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 5 : 186.

Isolectotypus: «In locis subarenosis Mongoliae Chinensis. 1831» (KW).

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «In locis subarenosis Mongoliae Chinensis. 1831» (LE).

По протологу: «Hab. in locis subarenosis Mongoliae Chinensis australis prope oppidum Tzagan-Balgassu. Majo m. lecta».

2. *O. mertensiana* Turcz., 1840, Bull. Soc. Nat. Moscou : 68.

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «Ad sinum Sancti Laurentii. D. Mertens» (KW).

По протологу: «Ad sinum Sancti Laurentii, legit Dr. Mertens».

Примечание. В Гербарии LE типовые образцы отсутствуют, а хранящиеся два гербарных образца, собранные И. Эшшольцем (J. F. G. von Eschscholtz) из locus classicus, ошибочно указаны как типовые.

3. *O. ochrantha* Turcz., 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 5 : 188.

Isolectotypus: «In locis subarenosis Mongoliae Chinesis australis. 1831» (KW).

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «In locis subarenosis Mongoliae Chinesis australis. 1831» (LE).

Попротологу: «*Hab. in locis subarenosis Mongoliae Chinesis australis prope Tzagan-Balgassu. Majo floret*».

4. *O. peschkovae* M. Pop., 1957, Бот. мат. (Ленинград), 18 : 6.

Isotypus: «Оз. Байкал. Мыс Крутогубский в Чивыркуйском заливе. Скалы и их карнизы, 12 VI 1954, М. Г. Попов, Г. А. Пешкова, Л. И. Малышев, П. А. Новокшенов» (KW).

Примечание. В Гербарии IRK (Иркутск) находится голотип вида.

5. *O. racemosa* Turcz., 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 5 : 187.

Isolectotypus: «*In arenosis Mongoliae Chinesis. 1831*» (KW).

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «*In arenosis Mongoliae Chinesis. 1831*» (LE).

По протологу: «*Lecta in arenosis Mongoliae Chinesis prope Chadatu, Augusto-mense*».

6. *O. tompudae* M. Pop., 1957, в Списке раст. Герб. фл. СССР, 14 : 22, N 4032.

Isotypus: «Оз. Байкал, сев.-вост. берег, мыс Омагочан близ устья р. Томпуды 55° с. ш. Каменистый крутой обрыв морены. 22 VII 1954, М. Г. Попов» (KW).

Phaca L.

1. *P. brachycarpa* Turcz., 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 5 : 185.

Lectotypus (Fedoronchuk, Shevera, hoc loco): «*In arenosis Mongoliae Chinesis. 1831, legit Kuznetsoff*» (KW).

По протологу: «*In locis subarenosis Mongoliae Chinesis, Julio, m. lecta*».

Примечание. В Гербарии LE хранятся 4 аналогичных выбранному нами в качестве лектотипа образца, которые ошибочно указаны в «Каталоге...» (2000) как изотипы (они не являются изотипами, поскольку в протологе не указана дата сбора).

2. *P. macrostachys* Turcz., 1840, Bull. Soc. Nat. Moscou, 13 : 66.

Isolectotypus: «*In montosis lapidosis Mongoliae Chinesis. 1831, Rennnt.*» (KW).

Lectotypus (Podlech, Sytin, 1996): «*In montosis lapidosis Mongoliae Chinesis. 1831, Rennnt.*» (LE).

По протологу: «*In montosis lapidosis Mongoliae Chinesis*».

Phyllota Benth.

1. *P. gracilis* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 267.

Holotypus: «*Nova Hollandia. Drummond coll. III. N 91*» (KW).

По протологу: «*Drum. III. N 91*».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «*Holotype of Phyllota gracilis Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4473-4*».

2. *P. villosa* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 267.

Holotypus: «*Western Australia. 1842, et c., Gilbert coll. N 255*» (KW).

По протологу: «*Gilbert coll. N 255*».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «*Holotype of Phyllota villosa Turcz. = P. barbala Benth. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4475-6*».

Piptomeris Turcz.

1. *P. aphylla* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 258.

Holotypus: «*Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 32*» (KW).

По протологу: «*Drum. V. N 32*».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «*Holotype of Piptomeris aphylla Turcz. = Jacksonia aphylla (Turcz.) Druce. Determinavit M. D. Crisp. 27 VI 1984. Photo 4481*».

Platylobium Smith

1. *P. spinosum* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 284.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 84» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 84».

Pultenaea Smith

1. *P. adunca* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 279.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 66» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 66».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea adunca* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4456—7».

2. *P. brachyphylla* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 279.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 68» (KW). -
По протологу: «Drum. V. N 68».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea brachyphylla* Turcz. = *P. verrucosa* Turcz. var. *brachyphylla* (Turcz.) Benth. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4451—2».

3. *P. diemenica* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 277.
Holotypus: «Van Diemen land. E coll. Gunniana, obsque numero» (KW).
По протологу: «Terra van Diemen; Gunn coll. (numero ignoto)».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea diemenica* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4453—4».

4. *P. neurocalyx* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 281.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swam River. 1849. Drammond coU. V. N 63» (KW).
По протологу: «Dram. coll. V. N 63».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea neurocalyx* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 5 U 1985. Photos 4447—8».

5. *P. pteronioides* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 280.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drum. coll. V. N 67» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 67».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea pteronioides* Turcz. = *P. strobilifera* Meissner. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4445—6».

6. *P. verruculosa* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 278.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drum. coll. V. N 65» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 65».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea verruculosa* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4449—50».

7. *P. verticillata* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 279.
Holotypus: «Nova Hollandia. Drummond coll. V. N 64» (KW).
По протологу: «Drum. V. N 64».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Pultenaea verticillata* Turcz. = *P. empetrifolia* Meissner. Determinavit M. D. Crisp. 5 II 1985. Photos 4443—4».

Sphaerolobium Smith

1. *S. daviesioides* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 266.
Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drummond coll. V. N 46» (KW).

Попротологу: «*Drum. V. N 46*».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Sphaerolobium daviesioides* Turcz. Determinavit M. D. Crisp. 1 II 1985. Photo 4471».

2. *S. drummondii* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 267.

Holotypus: «Nova Hollandia. Dram. coll. V. N 47» (KW).

По протологу: «*Dram. V. N 47*».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Sphaerolobium drummondii* Turcz. = *S. macranthum* Meissner. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photo 4472».

Toxotropis Turcz.

1. *T. jaegeri* Turcz., 1846, Bull. Soc. Nat. Moscou, 19, 2 : 597.

Holotypus: «Borynella... *Toxotropis jaegeri*. N 102» (KW).

По протологу: «In venit inter plantas Haitenses a cl. Jager sub. n. 102».

Trifolium L.

1. *T. ucrainicum* Opperman ex Wissjul., 1954, во Фл. УРСР, 6 : 588, 417.

Holotypus, isotypus: «УССР. Ізюмщина, Червоний Оскіл, Великі Луки, луг. 15 VI 1927, М. Клоков» (KW).

По протологу: «Ditio Charkoviensis: prope pag. Chervonyi Oskol».

Примечание. Ю. Р. Росков относит *T. ucrainicum* к *T. pratense* L. s. l., о чем свидетельствует написанная им к одному из хранящихся в Гербарии KW типовых образцов «notae criticae». В сводке С. К. Черепанова (1995) *T. ucrainicum* также приводится как синоним *T. pratense*, однако в работе С. Mosyakin, М. Fedoronchuk (1999) — как синоним *T. arvense*.

Urodon Turcz.

1. *U. capitatus* Turcz., 1849, Bull. Soc. Nat. Moscou, 22, 1 : 16.

Holotypus: «Nova Hollandia. Drumm. coll. post. I. N 21» (KW).

По протологу: «*Drum. I. N 21*».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Urodon capitatus* Turcz. = *Pultenaea capitata* (Turcz.) Druce. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4477—8».

2. *U. dasyphyllus* Turcz., 1853, Bull. Soc. Nat. Moscou, 26, 1 : 268.

Holotypus: «Nova Hollandia, Swan River. 1849. Drammond coll. V. N 47» (KW).

По протологу: «*Drum. V. N 47* (sub eodum numero cum *Sphaerolobium drummondii*)».

Примечание. Гербарный образец снабжен notae criticae: «Holotype of *Urodon dasyphyllus* Turcz. = *Pultenaea* sp. Determinavit M. D. Crisp. 4 II 1985. Photos 4479—80».

Благодарности

Авторы благодарны А. К. Сытину и В. В. Бялту (Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН, С.-Петербург) за помощь в получении протологов некоторых видов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Каталог типовых образцов сосудистых растений Центральной Азия, хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE) / Под ред. В. И. Грубова. СПб., 2000. 235 с.

Крицька Л. І, Мосякін С. Л., Новосад В. В., Федорончук М. М., Царенко О. М., ШEVERA М. В. Типіфікація видів судинних рослин, описаних з території України: родина *Fabaceae* Lindl. // Укр. бот. журн. 1999. Т. 56, № 6. С. 606—616.

- Цвелёв Н. Н. Род Дрок — *Genista* L. Флора европейской части СССР. Л., 1987. Т. 6. С. 228—234.
- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб., 1995. 990 с.
- Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev, 1999. 345 p.
- Podlech D., Sytin A. Typification of Russian and some other species of *Astragalus* 1//Sendtnera. 1996. Bd 3. P. 149—176.

SUMMARY

The list of type specimens of the family *Fabaceae* kept in the Herbarium KW (including personal collections of W. Besser and N. Turczaninow) is presented. The following data are cited: original nomenclatural citations, categories of the types (holotype, lectotype, isotype, neotype).