


1446
7
1-6

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
COLLECTANEA
AD
BOTANICAM, CHEMFAM,
ET
HISTORIAM NATURALEM,
SPECTANTIA,
CUM FIGURIS.

VOL» II



VINDOBONAE,
Ex OFFICINA WAPPLERIANA . 1788 .



I.
THADDIEI HAËTFKE
OBSERVATIONS BOTANICJE

IN BOHEMIA, AUSTRIA, STYRIA, CAIUNTHIA, TYROLI,
HUNGARIA FACTÆ.

I
CYNOGLOSSUM SCORTOIDES.

Cynoglossum caule prostrato; foliis lanceolatis, scabris; pedunculis axillaribus, unifloris; feminibus umbilicatis, glabris.

D J7 lanta annua nulli Botanicorum, quod sciam, adhucdum viva, flore suo amabili Myofoti scorpioidi adeo formula, ut minus vix dignoscas; caeterum toto coelo **diversa*** Vire primo floret, locaque nemorosa, umbrosa, subhumida inhabitat: frequens in*horto *Baunigarten* disto Praga Bohemorum metropoli non procul, si colles ad dextram salutaveris: frequentissima vero in nemoribus ad ripas Albispropc trajetum *Stephan Ueberfuhr* 3tque ad Moldavas cum Albi unioicm lupia Melnickregiam urbem: nee usquam alibi viva.

Radix ei fibrosa, exilis: fibrae copiosae, sparsae, capillares, fuscae aut nigricantes, saporis leviter amaricantis. Caulis unicus, procumbens, infra basi leviter incurvatur, indeque statim alternatim in ramos nonnullos ascendentes, debiles, (simplices, rarius in summitate subdivisos, quadri-quinquiales & semipedali subin altitudine majores dividitur; ipse caeterum angulatus, compressifolius, inaequalis, minus, quam asperifoliarum genti proprium, asper, laete viridis, a sui exortu communiter ad tri-qu^{*1}-unciale intervallum nudus, leviter purpurascens, atque geniculis pluribus ab infertione petiolorum conjugatorum reffiduis infusus. Folia radicalia atque caulina inferiora in planta florente vix unquam conspiciuntur, localis humiditate diu antea consumpta: media subopposita petioloque brevi infra conjugataque: superiora caulis atque ramorum alterna, sessilia; lanceolata omnia, acutifolia, erecto-patentia, basin versus attenuata, integerrima, margine atque dorso praecipue scabriuscula, villosula, laete viridia, unciam unam plus minus longa, lines tres aut quatuor lata. Pedunculi teretes, filiformes, erecti, scabri, subulsi, ex axillis foliorum prodeunt, florem unicum apice sustinentes, lines tres quatuorve longi. Flos Myofotis Scorpioidis, gratus, caesii aut vivide caeruleo-coloris, circulo ex albo flavoque vario faucem ambiente: sed hic illo nonnihil minor est, utpote diametro vix lineam aequans. Corollae monopetalae & subinfundibuliformis limbus quinquefidus, planus: segmentis ovatis obtusis, integerrimis; tubo brevissimo, cylindrico, albido, sed faucis rictu prominentibus quinque pupillis, flavescens & apice suo conniventibus occluso. Calycis pentaphylli foliola ex ovato lanceolata, acuta, integerrima, margine praecipue apiceque villosa, aspera, in planta florente lineam dimidiam longa, lines quadriante angustiora, in frutescente turgescentibus

Radix ei fibrofa, exilis; fibrae copiofe, fparfae, capillares, fufcs aut nigricantes, faporis leviter amaricantis, Caulis unicus, procumbens, ima bafi leviter incurvatur, indeque ftatim alternatim in ramos nonnullos adfcendentes, debiles, fimlices, rarius in fummitate fubdivifos, quadri-qinnquunciales &c femipedali fibin altitudine majores dividkur; ipie caeterum angulatus, compreffiafculus, inaequalis, minus, quam aferifoliarum genti proprium, afer, late viridis, a fui exortu cominuniter ad tri-quad-
unciale intervallum nudus, leviter ptirpurafcens, atque geniculis pltiribus ab infertione petiolorum conjugatorum ref"duis infiruttus. Folia radicalia atque caulina inferiora in planta florente vix unquam confpiciuntur, loci natalis humiditate diu antea coniumpta: media iuboppofita petioloque brevi infracla conjugataque: fuprema caulis atque ramomm alterna, fcfTilia; lanceohta omnia, acutiufcula, ereftopotentia, bafm verfus attenuata, inte-

*

gern'ma, margine ai^ue dorfo praepninis fcabriufcula, villofula, lite viridia, unciam unam plus minus longa, linea^res aut quatuor lata*#Pedunculi teretes, filiformes, erecli, fcabri, fflBnrii, ex axillis foliorum prodeunt, florem unicum apice fuftinentes, lineas tres quatuorve longi, Flos Myofotis Scorptoidis, grati, caefii aut vivide caerulefcantis culoris, circulo ex albo flavoque vario faucem ambiente: fed hie illo nonnihil minor eft, ntpote diametro vix lineain xquans. Corollas monopetalas & fubinfundibuliformis limbus quinquefidus, planus: fegmentis ovati^ obtufis, integerrimis; tubo breviflimo, cylindrico, albido, fed faucis riftu prominentiis quinque pufillis, flavefcantibus & spice fuo conniventibus occlufo. Calycis pentaphylli foliola ex ovato lanceolata, acuta, integerrima, margine praepnimit apiceque villofa, afer, in planta florente lineam dimidiam longa, lineas quadriante anguftiora₃ in fru&efcente turgefcentibus
fe-

feminibus duplo & triplo omni dimenfione majora. Stamina quinque: filamenta breviflima, vix ulla; albida, corolla tubo inferta. Antherae flavent. Stylus filiformis, albidus, ftamina longitudine <equat: ftiguate obtufinfculo, emarginato. Semina quatuor, fubrotunda, luperne depreflb-plana, medio excavata, bafi convexa, rotundata, obtufa, latere interiore reftyto adfixa, glaberrima, fufca. Merito huic plantae omnes illi charafteres divifis generibus proprii competunt, quos Linnaeus *Hort. Clifton*, pag. 47. in adfina hujus generis fpecie Cynoglofo Omphalode conjunftos obfervari affert: Ergo hxc planta efrubus Cynoglyffum, efiore Heliotropium, e etude & petiolis Myofotis, 6? jbtis e temporwflorendi Pulmonaria dicipofet.

II

ACROSTICHUM MARANTÆ.

Acroftichum frondibi* fubbip^ktis : pinnis oppofito-coadunatis fubtiis, hirtutiflimis bafi Tubdentatis. *Linn.fyjl** pag. 929. *Jtilion.flor.ped. vol II* pag. & num. 2415.

Acroftichuni **pinnis** fnbtus pinnatis fquamofis obtufis: bafi utrinque appendiculata. *Hall, hijl III. pag. 17. mm** 1715.

Londiitis mollior fohis Ceterach hifpanica. *Barrel ic. 857. 6? 858**

Lonchitis afpera Marantx. *Comer, epic. pag. 666, Book. hijf. HI. pag. 745**

Lonchitis altera Marantha. *Cluf. hijf. pag. CCXII*

Perquam rara in Bohemia filix, ac non nifi rupium abruptarum, fe-reque inacceffarum heic incola. In arce diruta altflitna Tollenftein Lufatis contermina: in monte Kleis, parte **foli** mei'diano obverfa &c praecipite,#

næ oppofitaque, oblique coadunafce, oblongs, obtufse, per oras manifefte ferratae aut crenatae : omnibus quidem, fed extremis in integri fere cum nervo confluentibus. Acervulomm feinalhim in planta juniore, fed jamjam fructifcenne, tria diflincla paria longitudinaliter cujusvis pinnulae dorfum occupant, perferobem ferrugineum difperfa, ut facile incautus ad Polypodia amandaret. In adultiore vero hi acervuli orbiculares atque ferruginei adeo coacervantur, ut in integri averfam frondis paginam tegant Per aetatem tandem planta ti calidis rupibus hofpitans, folis ardore adufta adeo crifpatur, ut cum difficultate agnofcas: & ex fimilibus Ipeciminibus icones Barrelieri 857. & 853. clefumptas, verofimile eft.

III,

CAMPANULA BONONIENSIS,

Campanula foliis^{vatis} lanceolatis fubtus fcabris feffilibus, caule paniculate.

Linn.fyjl, 14. pag^m 207 > *Linn.mantif** 337. *AUion.flor.ped. num.* 40%

Campanula caule erefto ramofifimo: foliis ovato - lanceolatis fubtus tomentofis; petiolis multifloris ereftis. *Hall fiift. vol. 1. num.* 689. pag, 306.

Campanula foliis lanceolatis ferratis alternis: *Boris* thyrfo fpicato, & ad ba-
Gm ramofo. *Seguier. veron. vol. L pag.* 176*

Campanula feu Cervicaria Bononienfis flore parvo. *Bauk hi/L vol. Ill pag.* 806, *Mori/, hi/i, 2. pag.* 461. *feB. 5. tab.* 4-fg. 38.

Edita, aprica faxofaque montium loca amat Campanularum Bohemiae indigenarum non vulgatiffima, & Baldi montis in agro Veronenfi Helve-

næ oppofitaque, oblique coadunatae, oblongs, obtufs, per oras manifeſte ferratis aut crenatae: omnibus quidem, fed extremis in integrum fere cum nervo confluentibus. Acervulorum feminalitum in pianta juniore, fed jamjam *iruttescente*, tria diſtincta longitudinaliter cujuſvis pinnulis dorſum occupant, per ſcrobem ferrugineam diſperſa, ut facile incautus ad Polypodia amandaret. In adultiore vero hi acervuli orbiculares atque ferruginei adeo coacervantur, ut in integrum averſam frondis paginam tegant. Per aetatem tandem pianta in calidis rupibus hoſpitans, folis ardore aduſta adeo criſpatur, ut cum difficultate agnoſcas: & ex ſimilibus ſpeciminibus icones Barrelieri 857. & 853. deſumptas, verofimile eſt.

in.

CAMPANULA BONONIENSIS.

Campanula foliis ovatis lanceolatis ſubtus ſcabris ſeriatilibus, caule paniculato.

Lum. fyft. i. 4. *pa*[^] & 7. *Linn. mantif.* 337, *AUion. flopped.* num. 409.

Campanula caule ereſto ramofiſſimo: foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentofis; petiolis multifloris ereſtis. *Hall, lijl vol. I. num.* 689. *pa*^{*}. 306,

Campanula foliis lanceolatis ferratis alternis: floris thyrfis ſpicato, & ad bifloram ramoſo. *Seguier. veron. vol. I pag.* 176*

Campanula feu Cervicaria Bononienſis flore parvo. *Bauh hi/L vol. HL pag.* 806, *Morif. hijl 2. pag.* 461. *f& 5. tab.* *^fg.* 38.

Edita, aprica faxoſaque montium loca amat Campanularum Bohemias indigenarum non vulgatiſſima, & Baldi montis in agro Veronenſi Helvetiae-

bi femiquifquefidi fegmenta ovato-lanceolata, acutiufcula, linea faturatiore per medium divifa: fauce glabra. Anthers corolla duplo breviores, lineari-oblongae, flavae. Filamenta capillaria, albida, villofa, bafi dilatantur. Stylus cylindricus, albidus, longitudine corollae, fuperne craffefcens, fubvillofus. Stigma bifidum, etiam trifidum, revolutum.

IV.

ANDROSACE OBTUSIFOLIA.

Androface foliis glabris lanceolatis, obtufiufculis integerrimis: calycibus angulatis pubefcentibus corolla minoribus: involucri foliis breviflimis.

Allion. fior. ped. torn. I. pag. 90. num. 3«5. tab. 46. fig. j.

Androface glabra, obtufo folio, umbellifera. *Allion. fpec. botan. pag. 22. tab. 4.*

Aretia foliis ellipticis lanceolatis glabris, fcapis i:mbellatis. *Had. hift. torn. I. num., 621.*

Copiofam alunt herbida, nedum fumma, alpium Judenburgenfium juga cum Androface Wulfenio, senigmatum botanicorum oraculo, Chamaejasme dicta (quam diverfiffimam ab A» villofa Linnsi, perquam ejgidite demondravit, utut plures Botanici antea longo tempore unam eandemque plantam crediderint) fi ex Seethal verfus *das fcharfe Eck* procefferis, cum Primula glutinofa, Gentiana bavarica, Cortufa Matthioli & Saxifraga oppositifolia. Neque a Secavienfibus alpibus & illis, quas in eodera itinere peragravi, *in der GailSc Wafferberg* diftis, exulat planta, perquam rara caeterum alibi. Radice gaudet gracili, attamen perennante, fubhorizontali aut oblique defceodente, pennae cokmbinae crafftie, teretiufcula, iquamulis

foliorum superiorum annorum tabidis fuscis operta, atque in fibras paucas teretes albescentes, & has fibrillosas sensim magis magisque attenuata. Folia communiter plurima ex eadem radice prodeunt, in unum aut plures fasciculos collecta, super se mutuo hincbricata atque undique in orbem dispersa: craf-fiufulahaec sunt, subpulposa, lanceolata aut elliptica, obtusifolia, integerrima, dorsum veluti in petiolum sensim angustata, superne lute viridia, dorso pallidiora: utrinque glabra aut frequentius etiam superne pubescentia, marginum oris subpilose ciliatis, ab uno ad sesquipollicem plus minus longa, lineas duas aut tres lata. Inter ea folia scapus nunc unicus, alias tres, & plures adhuc prorumpunt, recta affurgentes, subflexuosi, ab unciis duabus ad sex alti, teretes, filiformes, aphylli, laete virides, glabri nec non quandoque villis brevibus albidis undique obfusi, umbella foliorum depauperata terminati, florum scilicet a tribus ad quinque, rarissime sex* Involucrum in summo vertice foliola numero totidem quot umbellulas radii, brevia erecta, lanceolata, acuta, sessilia: foliola alia his adhuc dum minorum ad basim florum pedunculis interjecta. Pedunculi erecti sibi que adproximati, altitudine inaequales, pollicem dimidium aut sesquipollicem ultra involucrum folia eminent, ipsi subinde pollicares, vel bipollicares, latere uno compressifolia, villis albidis brevissimis, uti scapus, pubescentes, coloris ex albo virentis aut purpurascens, apice unicum florem sustinentes. Calycis monophylli, ovato-campanulati, semiquinquefidi basi que subquingularis, segmenta lanceolata, acuta, erecta, glabra aut subhirsuta, apice dorsoque profundius virent, basi vero ex viridi flavicant, corolla segmentis ceterum minorum. Corolla* monopetala atque hypocrateriformis tubus ovato-cylindraceus, ex albo flavescens, calycem non superans: limbus plagiis, quinquepartitus; segmentis obovatis, obtusis, integris aut levius subinde emarginatis, albidis, sed versus faucem levissime purpurascens, li-

neam

n^{as} duas longis: fauce ipsa luteola atque squamulis quinque protuberantibus coronata, angustataque. Stamina quinque tubo corollae inserta: filamenta brevissima, vix ulla, capillaria, alba: antheris oblongis flavis. Stylus filiformis tubum corollae aequans, albus. Stigma capitatum obtusum: germinum in calycis fundo* Capsula unilocularis, angulata, quinquevalvis: valvulis ovato-lanceolatis acutis apice dehiscentibus. Semina plura a quinque ad decem, reniformia, compressa-plana, ex fusco nigricantia.

V.

GALIUM BOCCONI.

Galium caulibus prostratis, diffusis, quadrangulis, subulatis, ramosis: foliis fenis, linearibus, mucronatis, subsessilibus: pedunculis subtrichotomis, *Allion. flor. ped. num. 24. pag. 6.*

Galium caule anguloso, foliis fenis subsessilibus aristatis. *Hall. hiji. torn. I. num. 715.*

Rubeola alpina saxatilis tenuifolia. *Scheuchz. it* alp. 2* pag. 140. Boccon, mus. pag. 145. tab. 10x.*

Primis itineribus, quae Florae sacris additus in altiores patrias meae montes suscepit, refero plantam, quae mihi, sexualis systematis affectu, jam tum nova videbatur, dum in Galii Asperulaeque Linnaei cenlu haudquaquam mentionem ejus factam invenirem: nota diu Botanicis alpinis Hallero, Scheuchzeroque, egregieque ab iisdem jam dudum adumbrata, & nuper tandem ab Illustrissimo Allionio in Pedemontanarum itinerum historia publici juris facta, grata inventoris memoria. Rupeilri atque saxoso alpium solo

fere mñice quaerenda, nee nonnifi perquam rara montium altiffimorum ho-
 lpes. Attuli ex Sudetis montibus, qui Bohemiam a Silefia fepearant; & pne-
 primis ex celfiffimo eorum jugo {*die Schneekappe* vulgo ditto) fat copiofa
 ejusdem fpecimina legi: iterum in montis Kleis rupeftri cacumine inter Hey-
 de oppiam & Röhrsdorf: denique eadem abundare vidi Schneeberg Aii-
 Arife inferioris, nee non pleraque alpium Styriacarum juga* Miror tamen
 fummopere ifthic adeo longe praetervifam lynceis Auftriae Botanicis*. Altius
 ejus radix intra anguffas petrarum rimas defcendit, perennis, bi-& tripol-
 licaris, aequabiliter teres, utut gracilis, vixque pennae columbinae craffitu-
 dine, tamen dura, fublinefcens, foris cum rubedine aliqua fufcefcens, in-
 tus alba, fibris hinc inde rariter fparfis concoloribus aufta. Eadem mul-
 ticaulis quam maxime cum fit, denfum cauliculorum cefpitem ad telluris fu-
 perficiem fundit: graciles hi in fuo exortu, filiformes, infima fui parte pe-
 rennantes atque ad unum *fepe duos* a radice pollices una cum foliis fuperio-
 rum annorum aridi, fcariofi, iragiles, fufcefcetes aut ftraminei. Emor-
 tuae horum fummitates quotannis iterum revivifcunt, indeque caules totidem
 herbacei enafcuntur, toti quanti per terram ftrati, atque quaquaverfum
 decumbentes, ipfis radicalibus dtque perennantibus cauliculis multoties craff-
 flores, longioresque, utpote a duobus, tribus pollicibus, ad femipedale
 faepe intervallum in longum extenfi: debiles caeterum iidem, atque rarius
 e procumbentt paululum erefti, glabri, fragiles, laete virides, fubtiliter
 (Iriati, e copiofis articulati geniculis, indeque internodiis alterne quadran-
 guli, alis prominentiufculis: fuperne ramofi: ramis folitaiiis, fuboppofitis-
 que, brachiatis, eretto- patentibus, axillaribus, fubelongatis, diffufis, &
 ipfis fuperne divifis, (ubtrichotomis. V⁷erticilli foliorum pro folito more
 gentis articulorum a fe invicem inaequaliter reniota genicula veftiunt; foliis
 ut plurimum fenis, fed numero a fenis ad novem ufque mire variantibus com-

pofiti: quæ linearia, angufta, ere&o-potentia, apice paulo latiora, mucro-
 neque brevi albido iuftru&a, qua nota feie manifefta a pluribus congne-
 rum diftinguit, glabra vero, aut rarius inferne, praeprimis inferiora, fub-
 afpera, utrinque lsete viridia, fubtiliter ftriata, rigidula, a dimidio ad in-
 tegrum pollicem faepe longa, lineam unam circiter lata: fuprema bina
 aut terna pedunculis florum fubjiciuntur, breviflima, prioribus vero quoad
 caftera runillima. Flores caulem ramosque terminant, albi aut rarius aquo-
 fe rubelli, pedunculis fuffulti fubaequalibus, ereflis, filiforinibus, laevibus,
 fubangulatis fubtiliterque ftriatis, ternis ut plurimum ex fupremi verticilli
 axilla egredientibus: iisdemque nunc funplicibus, trifidis umbellaribus^ alias
 ramofis, repetito dichotomis trichotomisque. Corolla fupera, monopeta-
 la, quadripartita: fegmentis lanceolato-ovatis, acutis, planis, patentibus:
 tubo breviffimo. Filamenta capillaria, albida, fegmentis corolla?, ex^quo-
 rum interftitiis prodeunt, breviora, potentia: antheris luteolis, fubglo-
 bofis. Stylus filifurmis, ereftus, albus, bifidus, longitudine ftaminuni:
 ftigmata duo, revoluta, capitata: germen inferum, ovatum, didymum.
 Semina fubrotunda, nigricantia, glabra#

VI

CENTIANA FRIGIDA.

Gejjiana corollis quincjuefidis, campanulatis, terminalibus, feffilibus; fo-
 liis obtufis, radicalibus lineari-oblongis, caulinis lanceolatis; caule
 lubbifloro^

Horrida abruptaque alpium Secavienfium Styrias fuperioris prseciji-
 tia, & quas inde in diverfas mundi plagas excurrunt, juga incolit, Gentia-

narum alpinarum longe quam editiflima fimulque rariffima. At nuspiam frequentiore facile legeris, quam si ex valle Innering supra Wafferberg, per aquam torrens alpinus ejusdem nominis se cum impetu praecipitat, in Hellthai a(cenderis, indeque anhelolo itinere summa alpium cacumina, casis pafloritiis (*in der fchdnen Ebene*) adfita, petieris, Julio mense ifthic post *nivis* deliquium florentem. Nequaquam ego stirpis perquam rarae primus inventor: & Carpatus mons eandem alit, unde plures ante annos beatus Lipp rei herbaria peritiflimus attulerat. Deinceps & ab Illuftri Jacquinio eodem loco led altum hucusque de ea silentium, nee apud veteres, quantum novi, ejus extat memoria. Radix ei perennans, oblique ascensens, gracilis, bi- & tripollicaris, utcumque teres, sed geniculis nodulisque per intervalla aucta pluribus: e quibus fibras perquam copiofas, longiffimas, teretes, perpendiculares, verticillatim fubinde egredientes, demittit, versus fuperiora a tabidis imbricatisque albido aut flavescenti pellucetibus petiolorum praeteritorum annorum exuviis, crassescens: coloris caeterum ut & fibrae dilute flaventis, sapore vero intense amaro, diu inhaerente. Eadem nunc ut plurimum simplex, caulem solummodo unicum edit, aut multiceps plures, numerosos inter foliorum fasciculos, intricatis duntaxat atque accumulatis plurium caulium radicibus, ut cespites exigui non raro inde exfurgant: erefti 1!! sunt satisque pro pufillo plantae habitu firmi, bi-aut ad summum triunciales, saepe adeo humiles, ut caulem vix ullum, floresque vere acaules, Gentians acaulis in moreni dixeris: glabri ceterum iidem, angulati, subtiliter striati, geniculo uno alterove modice ad foliorum conjugationes incrassati, ex flavo virides, striis hinc inde purpurascetibus picti, in summitate binos ut plurimum flores, rarius unum, rarissime vero tres fulgentes. Folia caulina bina & bina opposita, patentia, basi connato-feffilia, lanceolata aut ex lanceolato linearia, obtusa, margine integerriina

rima aut rarius subundulata crassifolia, subcarnosa, utrinque glabra atque
 faturatius virentia, pollicem unum plus minus longa, lineas duas fere
 tres lata: superiora eorundem paria, sibi approximata, calycibus florum im-
 mediate subiecta. Radicalia vero, atque illa in fasciculis caulem ima basi
 vestientibus colle&a, numero varia, in orbem expanduntur, vereque linea-
 ria sunt, aut ex lineari oblonga, itidem obtusa, in petiolum sensim attenua-
 ta, atque inde in vaginas illas aridas subdiaphanas, imbricatim imo cauli
 incumbentes absunt: caulinis caeterum excepta longitudine familia, polli-
 ces duos etiam tres longa, lineam unam & dimidiam, saepe duas lata. Flo-
 res terminales bini ut plurimum ex fine superiorum foliorum prodeuntes,
 pedunculo omni destituti, masculi, erecti. Calyx tubuloso-cylindraceus,
 erectus, corolla duplo brevior, ore suo in segmenta quinque dividitur **ere***
 gla, lanceolata aut linearia, acutifolia, integerrima, glabra, una cum to-
 to calyce crassifolia. Corolla perfertens, tenuis, papyracea, subdiapha-
 na, Gentians punctatae adinstar, albida, sed punctis rariter sparsis striisque
 ab apice fuscescente ad ipsam basin usque decurrentibus, caeruleis
 coloris variegata, duorum fere pollicum longitudine, diametro vero lineas
 tres, quatuor, circiter aequans: ad formam vero quod attinet ea ex basi
 angustiore tubulosa sensim in ventrem ovato-cylindricum utcumque campa-
 nulatum dilatata, tandem in limbum panditur angulato-plicatum, rugosum
 fculum, quinquefidum: ore patulo, glabro, imberbi: segmentis erectis lan-
 ceolato ovatis, acutis, latere uno rotundatis, dente fingulis minore acutiu-
 fculo alternatim interiecto. Stamina quinque: filamenta subulata, basi dila-
 tata, internoque parieti in corollae fere medio adfixa, aquose caerulea sunt,
 corollaque breviora. Antheras breves, oblongas, erectas, apice subconni-
 ventes, flavas, styli longitudine. Germen ovato-oblongum pedunculo ex
 fundo corollae enato tereti, sensim magisque maturiscentibus femini-
 bus

bus incrassato elongatoque infertit, superne vero in stylium cylindricum brevissimum tandem bifariam dehiscens abit: stigma crassiusculum orbiculato-capitatum, aetate una cum stylo in duas partes fecedit, extrorsum revolutas, ut bicorne denique appareat. Capsula ex ovali oblonga, acuminata, glabra, unilocularis, bivalvis, succrescentibus feminibus ultra corollas faucem exserta, atque ad unam tertiam, saepe & dimidiam longitudinis suae partem, dehiscens, Semina angulato-fulcata aspera fusca.

VII.

LEONTODON CROCEUM.

3Leontodon foliis lineari-lanceolatis, acutis, retrorsum dentatis, superne subhirsutis: scapulaevi; calyce erecto, ovato, hirsuto: flore croceo.

Prima fere gratas inter stirpes fuit quae me salutarent, dum inter anhelitus anteriora alpium Judenburgenfium juga, Valerianas Celticae fedem, & Clusio olim viva, superassem. Et cujus observatoris oculos vel non eminens planta rarissima floris sui elegantia percuteret? Paucula aprica arida alpium amat, media rarissimas inter alpinas stirpes, Rhododendron puto, Veronicam bellidioidem, Avenam Scheuchzeri, Hypochaerim helveticam & complures alias, quas recensere loci angustia vetat; haec locorum facta frequens, at nusquam alibi deinceps in toto itinere obvia. Dubius haerebam diu ad Hieracianae, an Leontodontis inter species referrem, familias a similitudine naturali sibi adeo arcte nexas, ut perquam aegre inter complures utriusque species distinguas. Rebus tamen omnibus rite pensatis, plura iuvare, ut rectius ad alterum ablegaverim. Perenni obliqua aut (ubinde horizontali nititur ra-

dice:

dice, simplici, crassiuscula, subpraemorsa, cortice inaequali faturate fusco extus vestita, albidaintus, quae undique fibras copiosas, teretes, crassiusculas simplices, fatislongas, funiculorum adinstar perpendiculariter in terrain demittit, superne marcidis prioris anni reliquiis foliorum & faporis leviter amaricantis* Scapus, qui ea de radice folitarius Temper, plura inter folia radicalia recta attollitur, teres est, & femipedem nee non novem & ultra pollices subinde aequat, fistulosus caeterum, striatus, glaber, lacte viridis, aphyllus, aut quod rarissimum foliolo uno alterove lineari brevissima vestitus, versus summitatem sub ipso calyce tantillum incrassatus, tumidiusculus, ibidemque molli & nigricante villo hirsutus, uniflorus. Folia radicalia in diversis specimenibus figura mire ludunt: ut plurimum tamen lanceolata sunt aut ex lanceolato linearia > acuta, margine inferiore retrorsum dentata, atque in petiolum icapi basi obvolutum, subamplexicaulem, fimbriatum sensim magis magisque attenuata, lacte viridia, glabra, aut superne nervoque in obversa pagina hirsuta, uncias quatuor circiter longa, lineas totidem fere lata; sed neque raro eadem confpexeris angustissima, verelanceolato-linearia, margine subintegerrima aut perquam obsoe denticulata, glabra superne aut pubescentia, ut sere ejusdem plantae folia crederes. Flos terminalis, speciosus, diametro suo unciam unam & dimidiam, saepe duas aequat: ea tinctus flavedine, quae croci extrinseca, quo grato colore eo esse vel folio a reliquis hujus familiae speciebus distinguas & primo intuitu Calyx ovatus duplici foliolorum laxae imbricatorum sed inaequalium ferie componitur, sub florescentiae tempore insigniter patens: foliola haec lineari-lanceolata, obtusiuscula, integra, parallele sibi incumbunt, atque hirsutae nigricant, margine apiceque albida, scariofa, lineastres, quatuor longa, vix lines dimidium lata. Squamae non raro aliae acessoriae praeter externa calycis foliola, basim illius augent Corollas ligulis copiosissimis in or-

bem patent, atque foliola calycis longitudine multo superant: ipsae lineares, ftriatae, croceo colore utrinque aequabiliter tinctae, apice subconniventi denticulis quinque quam minutiflimis notatae: inferne vero in tubum tenuem filiforme albidum #Hofulum attenuate, una cum tubo pollicem dimidium, lineas septem, & ultra longa?, lineam unam latae. Filamenta capillaria, brevissima ex tubi fauce enata, ligulis corollae pallidiora: antheris in cylindrum connatis, pallide flaventibus. Stylus filiformis, antherarum longitudine: stigma exserto, bifido, revojuto, ejusdem 91m ligulis coloris^ Receptaculum nudum, planum. Semina oblonga, fusca, glabra, fhiata, pappo coronata feffili plumoso^ ipsis feminibus longiore.

VIII

SAXIFRAGA AUTUMNAL!^

Saxifraga foliis caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis.

*Linn. f. pag. 413, •Allion. flor. ped. torn. 1L pag. 70. num. 1525. Scop. pol. flor. cam. & *prg* 293. tab. 1*4 num. 493**

Saxifraga foliis ellipticis ciliatis, caule simplici folioso paucifloro. HalU hist.

torn. Lpcig. 417. nurmyi\<

Saxifraga foliorum margine ciliari, floribus luteis maculosis, Seguier vaon. fippL pag. 200.

Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato, (oHis florum magis acuminatis Breyn. cent. 106, tab. 48.*

Scdum minus, flocculis luteis vel croceis, /plendidis inaculosis pulcherrimis. Gesn. monU fraSl. pag. 64.

Sedula montana "pulchra. Gesn. oper Schmied. cwrrenu mas & femina. tflb. append, fig. IK*

Se-

Sedum alpinum floribus luteis maculosis Caspari Bauhini *Scheuchz. in IF*p. 541**
*Sedum minus alpinum luteum nostras. Raj. hift. ** pag. 1042.*

Nil frequentius hac planta in Styriae superioris, Carinthiae, Tyrolisque conterminis alpinis: ut speciatim alpes enumerare non attineat. Deniffimis vero eadem cespitibus investit fontium scaturigines, aliaque in alpinis humida loca: nec non rivulorum ad latera alpium cum fufuro delabentium sequitur margines, cum quibus & in ipsas glareas alveosque fluminum planities tranfit. Inde praeter plures alias summa ejus frequentia ex delatis a vicinis alpinis (eminibus, in arenoso folae) ravique alved, atque in infulis utriusque longe supra infraque Leontium. Ea quae flavo atque pallido flor^est, ubique vulgatissima, at elegans ejusdem varietatis fature flavo ac aurantiaco flore in editioribus alpium solummodo obvia, nonnihil rarior. Radix ei filum perennans, horizontale, satis longum, lentum, tenue, & cauliculis ipsis, qui copiosissimi inde enascuntur, tenuius angustiusque (implex mine, ramum alias, sed nodulis hinc inde constanter interruptum, squamulisque brunnei aut nigricantis coloris undique opertum. Caulium inde densa confertaque (eges: atque hi ima basi omnes ad pollicis unius aut duorum intervallum modice procumbunt, inde ascendunt simplicissimi, pollices quinque aut sex alti, teretes, cum virore flavescens, toti quanti glabri y. aut quod rarius levissime hirsutuli, foliisque satis dense veititi. Radicialia plantae, dum floret, atque his proximi caulis imi procumbentis folia vel desiderantur penitus, utpote loci natalis humiditate consumpta, aut (i adfint exfucca, arida, icariofa, fuscobrunnea: quae sequuntur sparsa confertaque magis, sed breviora: laxiora reliqua illis superiora atque alterna: filia vero omnia, linearia, aut ek lineari lanceolata, acuta, plana, erecto-
patentia, crassiflucula, subpulpoia, fedorumque foliis aemula, pollicem unum

plus minus longa, lineas duas aut paulo latiora, parte aut ex flavo viridia glabra, integerrimo, nee **Ron** subdenticulato ciliatoque margine. Flores in fummitate caulis flavi, fulvo punctati, aut in editioribus alpium locis toti quanti flavo-aurafitiaci, subpaniculati; in ramulis aut pedunculis potius, alternis, axillaribus, teretibus, erectis, plus minus pollicaribus, glabris aut leviter pubescentibus, subbifloris, uniflorisque, nee non, sed perquam raro, trifloris. Pedunculi hi laterales breviflori lines unius aut duarum longitudine, ad basim brevissima linearis breviflori suffulciuntur: alia huic (imilis, & duae nonnunquam in pedunculi medio, atque paulo infra calycis basim conficiuntur. Calycis ima sui parte cohaerente germi adnati, superi atque quinquepartiti segmenta cum petalis paulo longioribus alternantur: ipsa, ex lanceolato-ovata, acuta, erecto-patentia, ciliolata, glabra, dorso ex atro viridia, lineas duas cum dimidia circiter longa, linea una qua latissima angustiora. Petala quinque aequalia patent: haecque ex ovato-oblonga, obtusa, integra, plana, calycis foliolis paulo longiora, sed iisdem tantillum angustiora. Filamenta decem, erecta > subulata, basi paululum dilatata, aquosissime flava, petala longitudine squant: antheris ovatis aut subrotundis, poliline aurantio adspersis. Styliduo, breviflori, fere nullos dixeris, €€H , glabri, teretes, atque ex flavo virentes. Stigma simplex, obtusifolium. Germen inferum imae calycis parti adnatum ex basili ciliolari continua in capsulam denique abit ex ovato-conicam, rostrato bicornem, ultra calycem sensim sensimque productam, bivalvem, unilocularem, atque feminibus multis foetam

IX.

GNAPHALIUM NORVEGICUM

Gnaphalium caule herbaceo simpliciflora, foliis lanceolatis utrinque acutis trinerviis subtus lanuginosis: spicae florum terminali densa foliosa. *Oeder. flor. dan. tab. 254. Flor. norveg. 841* Flor. island. 9. Retz. prodr. fior. scandinav. num. 902.*

Nequaquam eadem est planta, quod in tanto auctorum consensu longe suspicabar, cum Gnaphalio sylvatico Linnaei; utpote altioris longe fedis incola, nee nonnisi in herbis fummarum alpium obvia, dum illam Linnaei prata montosa sylvatica, in quibus abundat, vix unquam deferuisse atque excelsa illa loca, frigido vento perflata petisse meminerim. Sed & alias non minoris ponderis notae discriminis praeter natales alpinos superant, quae diversae stirpes satis manifeste evincunt. Oederi inventionis gloria debetur, qui primus in flor. dan. tab. 254. eam novam proposuit ex Norvegiae primum, tandem & Islandis alpiibus allatam, & ibi solummodo feveriori alpium climati adfuetam. An Oederi sylvaticum Linnaei Gnaphalium in toto septentrione vulgatissimum incognitum fuisse suspicari licet? Profecto etiam quae etiam dubito, ac proinde non possum non Linnaeo, atque ~~σταυροσταυ~~ Hallero caris mihi & summe venerandis magistris, lites suscitare, quod uterque Oederi iconem ad Gnaphalium sylvaticum retulerit. De Hallero id eo magis mirandum, dum ille Oederi stirpem certo certius ante oculos habuit, quando descriptioni Filaginis suae Nro. 148* in fine addit: *foliis se ad decem lineas latis in M. Gotthardo reperisse, 6 in M. Fouly floribus nigerrimis inspicam congestis vix triunciam.* An dubitationi amplius locus, de Gnaphalio

Oederi norvegico haec dicta fuisse? Quae certe minime. Gnaphalio fylvatico, plants vulgari conveniunt^ Novi perbene, quam Linnaeus & illo suo tempore Scopoli & plures alii recentiores distinguunt alpinam pusillam Gnaphalii fylvatici varietatem: et si & de hac, specie magis, quam varietate differre, mihi potior mens fit, dum in hortum translata habitum suum pusillum mihi me mutaverit. At plantae de qua fermo in fumis iisdemque alpium jugis, quae & pusillam illam varietatem alunt, altitudo pedalis, & pedalem ea non raro superat, ut adeo neque ea, quae de illa varietate dicta sunt, in plantam meam cadere judicaverim. Ego in Sudetis montibus Bohemiam legi: postea multo copiosiore in faxosis alpium Secavien(ium, Judenburgenfium Styriae superioris: neque austriacae alpes, & imprimis Schneeberg, copia elegantiaque alpinarum stirpium insignis > eadem destituitur* Attulit inde ex primis jam itineribus Clarus Jacquinus & Mygind, atque repetito itineris sibi novae vitae Linnaeo communicarunt exemplaria. At hic non raro infoliti rigoris exemplo, hic ceu novam stirpem adoptare noluit, interque varietates (certe memorabiles varietates!) Gnaphalii (ylvatici relegandam sustinuit, dum ex adversa parte laxa nimis conscientia hinc inde ex varietatibus minus notabilibus multiplicaret species* Hac potissimum de causa plantam descriptione illustrandam, peculiarisque speciei honore vindicandum necessarium duxi, Perennis (subhorizontalis praemorsaque. eidem radix duriuscula inaequalis ^ fusca aut flavescens, fibris copiosis concoloribus perpendicularibus teretibus undique sparsis firmata: annosior multiceps, squamisque aridis fuscis aut nigricantibus imbricatis, uti plerumque duriusculae alpium stirpes perenni radice, superne vestita^ Caulis hinc affurgit unicus, ex multicipite plures, plura inter folia radicalia, simplices, erecti, pedales & cubitales, fistulosi, atamen firmi, subangulati, lanugine alba densa undique obfusi. Folia radicalia, quae inflorescente planta defunt plurimum,

Plantaginis lanceolate foliis quoad figuram valde sunt aetnula: lanceolata, acuta, integerrima, apice callosa, trinervia, in fletiolum longe sensim sensimque attenuata, facie viridia pubescentique incana, dorsojperio denso alboque tomento undique obdu&a, attenu&u mollia, pollices quatuor vel quinque longa, a lineis quinque ad novem aut decem fubinde lata* Caulina alterna, laxa, erecta, sessilia basi&ue latiore cauli adpressa, lanceolata, angusta, aruta, duos vel tres pollices longa, lineas tres circiter lata: suprema flonbus interjecta linearia, angustissima, radicalibus quoad caetera similia. Spica florum terminalis, densa, foliosa, ex fusco nigricans, Isepe tota quanta atra, ovato-oblonga, obtusa, bi- & tripollicari nonnunquam longitudine. Flores mine folitarii in axillis foliorum alterni sessiles sunt > mine bini ternique, nec ultia, pedunculo eidem brevissimo tereti infident, alba atque densa lanugine inter se nexi^ Calyces cylindrici erecti, squamis compositi inaequalibus, imbricatis, ovato-lanceolatis, obtusis, basi viridibus, marginibus apiceque nigricantibus fere atris, scariosis, aridis, subpellucetibus: harum interiores longiores sunt, angustioresque, lineas duas circiter longae. Receptaculum nudum. Seinina lineari-oblonga fusca, pappo sessili piloso feminibus ipsis duplo longiore, coronata. Differre hinc a Gnaphalio sylvatico frequentibus notis patet: foliis lanceolatis acutis multo latioribus ad 9, 10 lineas usque, & his trinerviis: caulis item simplicis nec unquam ramosis uti laepe in sylvatico, nec iisdem adeo numerosis confertisque. Spica tandem congesta brevi, atris calycibus, petiolis bitons triflorisque nec ultra: locoque natali solummodo alpino.

CARDAMINE PETRIEA.

•Cardamine fojiis fimpliciffimis oblongis dentatis. *Unn.Jyjl pag. 593. Flor, dan, tab, 33d. Hudf. angU 254,*

Cardamine petraa Cambrica nafturtii facie. *Dillen. hort, Ekham, tab, 61, fig. 71>*

Loca faxofa rupeftria amat planta, rupium in montium ilia catena a Medling & Briihl verfus Baaden & ultra excurrente, non vulgare veris inter primitias ornamentum. Nee montana editiora loca refpuit, & ipfa al- pium faxofa prxcipitia fubinde petens. Alpina tamen notis cotnpluribus a planta> humiliora depreflioraque loca inhabitante differt, quas in fequenti- bus exponere animus eft. Cefpitofe nunquamnon crefcit planta, prxdita ra- dice perenni, fublignelcente, nunc tereti, alias fubfufiformi, ramofa, mul- ticipiti, tri - quadripollicari, albida aut fordide flavente, fetis copiofis imbricatis adultior a veterum foliorum petiolis fuperne coronata. Caules hajc profert annuatim plures, cefpitis in mtfrem colleftos, ereftos, palma- ies, & fpithama plus minus altos, teretes, ftriatos, glaberrimos, bafit le- viter purpurafcentes > fuperne ex glauco virides, fimplices utplurins[^] ^?yi ramulis nonnuUis brevibus ex foliorum alis egredientibus auftos, foliisque alternatim veftitos: verum nee ramofiffima defunt plant?? fpecimina, ut pror- fus aliam ftirpem crederes* Folia radicalia plurima in orbem patent, atque petiolo latefcente fuperne modice canaliculate, bafit fubciliato pollicisunius aut duorum longitudine, caulis imam bafim arfteamplefhintur: ipfalanceo- lata aut ex lanceolato oblonga, obtufufcula[^] margine nunc fimpliciter, alias

pro-

profunde atque repando-denticulata, fereque, uti in Sifymbrio arenoso, runcinato-pinnatifida, utrinque glabra, at per oras prescprimis ad basim fubciliata, fuperne faturatius virentia, dorfo exviridi glauca, verfus petiolum aquofe rubella, pollicem unum absque petiolo circiter longa, lineas duas *ye*\ tres lata. Caulina alterna, laxa, ere&o-potentia, lineari-angufta, obtufmfcula, glabra utrinque atque ex glauco viridia, pollicem longa, lineatn circiter lata: fuprema feffilia, integerrima, bafiin verfus attenuata, inferiora vero petiolata cum fubdenticulato margine. Corymbus florum & in caule, & in ramis, fi qui adfint, terminalis, ex more gentis primo fatis denfus, at poftea ienfim in racemum elongatus. Flores fpeciofi, magni, ampli pro plant<B magnitudine, nivei candoris, pedunculis fuffulti alternis inaequ^libus, longioribus duntaxat inferioribus, teretibus, ereftis, glabris, lsete viridibus, a linea una ad quatuor longis. Calycis tetraphylli, brevi decidui, foliola erefta, lanceolato-ovata, obtufa, integra, concava, unguibus petalorum fubasqualia, ex flavo virent, apice fufcefcente: foliolis duobus alternis majoribus bafi prominentibus gibbis. Petala quatuor, obovata, obtufiffima fereque fubrotunda, integerrima, aut fubin margine leviffime emarginata, plana, potentia, fenfim abeunt in unguem brevem, re&lum ex viridi flavicantem calycis fere longitudine, ipfa lineas duas, aut paulo plus, longa, lineam unam aut feffiquialteram lata. Stamina fex tetra^»«ma. Filamenta fubulata erefta ftyloque adpreffa albida · longiora quatuor flylim longitudine aequant, duo reliqua breviora nonnihil: anthers breves, oblongs,, ereftae, flavas. Stylus re&us, cylindricus, laftevirens, filamentis asqualis: ftigma fimplex, obtufiufculum vel leviffime emarginatum, collo angu ftiori Glandula neftarifera filamenta breviora inter & germen lubglobofa, hyalina. Siliquae lineares, obtufiufculs, glabrae, .ereae, torulofe, ieminibus copiofis farfta:; valvulis bafi dehifcentibus nee revolutis.

Planta in alpebus lefta priori humilior, magis cespitofa, atque ab ima bafi jam multo ramofior: caules profundius ftriati, hirtuti, faepeque hifpidi: folia nee margine aut petiolo folo ciliata, fed tota quanta hirtuta afperiufulcula: flores minores fed copiofiores, atque florum racemus magis elongatus: quoad caetera habitus idem, partium eadem proportio. Minime alienum iudico meminiffe hoc loco, delendam effe ex iuft. plant Arabim hifpidam Linnaei, utpote quæ eadem cum Cardamine petraea mox dekripta* Qua auctoritate id afferere liceat, dicam. Auftriae indigenam ftirpem Arabim hifpidam pronuntiaverat Linnaeus in fyft. vegetab. 13^a edit. pag. 501. & pofttain Supplement plant pag. 298.: at nullus Botanicorum auftriacorum praeter (?lariff, a Mygind plantam unquam vidit, etfi per plures annos eam follicite quaerent. Dubitatum hinc de plantae exiftentia, faltem in terris auftriacis: & id iure merito. Nuper tandem duHium omne folvit idem Clariff. a Mygind, qui refidua pauca in horto fuo ficco plantae ipecimina, per quæ & Linnaeo innotuerat, difceptantibus nobis benevole communicavit Et en! quam Linnaeus novam inde creaverat plantam, vera fuit Cardamine petraea, nee quidquam veri difcriminis inter centena alia plantae nobis fat vulgaris fpecimina & ilia, ex quibus fuam formaverat Arabim hifpidam. Cineres veneror Linnaei, aliorumque fummorum virorum, per quos profeci adeo, nee quidquam de meritiffima eorum laude decedet, quod non praftiterint omnia, quodque in tanta rerum multitudine errores hinc inde lows, alque facile excufabiles commiferint, quos emendare pofteris dubiarum plantarum autoptis refervatum^a

XL

SENECIO INCANUS*

Senecio COTOIHS radiantibus: foliis utrinque tomentofis, femipinnatis: laciniis subdentalis, corymbo subrotundo. *Linn, fyl pag. 757. Scopolfior* carniol edit, a. torn. 11. num. 1071. AUion.ftor. ped. torn* I. pag, socu num. 725.*

Senecio tomentofus: foliis pinnatis, pinnis subrotundis: umbella globosa. *Hall hi ft. torn. L pag. 26. num. 61 •*

Jacobsa pumila Abilnthii umbelliferi foliis incanis, floribus velut in umbella positis. *Pluknet. phytograph. p. 194, tab. 39. fig. 6.*

Jacobaja alpina incana minor. *Barretier icon. *6&. num. |. & Abfinthium pumilum palmatum, crasso tomentofo pallefcente folio. Ejusd. ic. 881.*

Jacobaea pumila alpina comosa incana. *Boccon. mus. 2. p. 20. tab. 8.*

Chryfanthemum alpinum Judenburgenfe. *Bauh. hift. II. pag. 102**

Chryfanthemum alpinum I. *Chf.pann.pag, 566. & hift.pag. 333.*

Alpium editiorum hospita, duris atque faxofis locis, Non Secavien-
 ſis Vicinæque alpes in der Gail & Wafferbergenfes, nee pleraeque Styriae
 fuperioris alpes ea carent: non editis Tyrolenfes, quæ Leontium drum-
 quaque ambiunt, Schleinitzenfes, Leibnitzenfes, Michelbachenfes, Ma-
 renvaldenfes, & plurei alias, etfi rarioreni, pufillo magis habitu, florumque
 corymbo inagis depauperato, & ferius multo florentem in omnibus hifce ob-
 fervaverim. Item redux ex eodem itinere in Taurero Rottenmanneni &
 Admontenfium alpium confragrofis, horrendisque praecipitiis non absque
 vita; difcrimine fatis frequentem obviam habui. At nuspiam copiofio-
 rem

vidi elegantioremq; five caulium altitudine, five divite atque multifloro
 florum specioibrum corymbo superbientem, quam in editioribus alpium Ju-
 denburgenfium jugis, ut jam olim Joh. Bauhinus particularem plantae deno-
 minationem ab iisdem delumere non dubitaverit, ab alpicolis ifthic *Frauen-
 fpeick* dicitur. Et beatus Scopoli plantae vivivi gratae Ipecimina a Reverend.
 P* Biwald habuit, in iisdem alpiibus lefra, quas florum cultoribus fatis com-
 mendare nequeo, quarumque divitiae, & dives quoque rariffimarum planta-
 rum praeda, anhelitus & itineris non adeo molefti fudores eis fupra modum
 compenfabunt Sed ad defcriptionem redeo* Radice nititur perenni, ob-
 liqua, aut iubhorizontali, fatis longa, fublignofa, ut plurimum multicipite,
 ex albo rubella, fibris lateralibus, craffis, longis, teretibus, infar funioilo-
 rum defluentibus, albidis firmata plurimis. Caules inde oriuntur annuatim
 communiter plures, nunc ad perpendiculum erefti, alias bafi modice reclina-
 ti atque afcendentes, a pollicibus 5 ad pollices 9 alti, fubangulati, fa-
 tisque firmi, fimplices, raritas ramo uno alterove laterali aufla, atque hi
 uidiue tomento albo, uti Artemifia Abfinthium obdufti. Folia radicalia
 conferta in orbem expanduntur: haecque fere a fui medio in petiolum la-
 teicentem, fupra paululum canaliculatum, uncias duas, tres & ultra fubin
 longum fenfim fenfimque attenuantur: quoad formam obovato-cuneiformia,
 obtuffiffima, lubpulpofa, craffiffima tomento albido utrinque incana, fundius
 incilo femipinnatoque margine: lobis aut laciniis quatuor aut quinque
 in unolatero, rotundatis, obtuffiffimis, nunc fimplicibus indivifis, alias,
 ut utriusque, leviter incifis fubmarginatisve: uncias caeterum eadem absque
 petiolo tres & quatuor longa, lineas quatuor, quinque vel temiunciam lata,
 Caulina alterna, laxa, remota, erefta, a tribus ad quinque rarius, petioli
 bafi dilatata foliacea fefilia, margine quam radicalia profundius in lacinias
 tenues anguftas lanceolatas acutas & lineares faepe diffetta: fuperiora duo

paulum sub ipso florum corymbo posita foliummodo dentata: ultimis tandem linearibus acutis iritegerrimis patentibus. Corymbus florum terminalis, speciosus, subrotundus, florum a quinque ad 15: nee unquam, uti Halierus meminit, adeo depauperatum vidi, floribus utpote duobus foliummodo aut tribus* Pedunculi utcunque teretes, erecti, simplices, apice unicum florem sustinent, densa albaque lanugine obvoluti, inferioribus longioribus plus minus uncialibus. Calyx cylindricus, simplex, unico squamarum ordine: squamæ erectae, lanceolatae, obtusae, utcunque parallele sibi adcumbunt, dorso in adultioribus floribus ex viridi incanac, in minus proventis tomentoso-albidae, apice margineque superiore constanter ex fusco nigricantes, decem aut duodecim numero: squama accessoria erecta linearis acuta brevissima *C3L\ycis* cujusvis basim auget. Radii ligulae a sex ad 10 in quovis flore, patentes, planae, ea saturatori tinctae flavedine, quae Senecionis abrotanifolii floribus propria: & ipsae obovato-oblongae, integrae, basi angustiores contractae > apice rotundatae, obtusae, bi- & tricrenatae, lineam unam cum dimidia latse, lineas tres & ultra longae, tubo tenui cylindrico inflexo albo villofuto, lineae unius longitudine insertae. Stylus femiflosculorum teres, capillaris, limbo dimidio brevior, ex albo flavicans: stigma bifidum, emarginatum, obtusifolium, ex flavo aurantiacum. Pappus in iisdem sessifoliosus, ieminibus longior. Flosculorum disci flores apice quinquefidi, subventricosi, laciniis brevibus ovato-lanceolatis, acutis, suberectis, una fere cum tubo angustate cylindrico brevissimo & albo intra pappum latitantes* Filamenta quinque ex tubi orificio enata capillaria alba: antheris in cylindrum connatis ultra florum lacinias protrusum itidem ex flavo aurantiacum. Stylus tenuis, cylindricus, ultra antheras exsertus, albus. Stigmata duo, revoluta, obtusifolia, coloris ex flavo aurantiaci.

XII.

RUMEX DIGYNUS.

Rumex foliis hermaphroditis digynis. *Linn* fyl. p. 347* AUion, flor. ped. torn. II. pag. 203. num. 4037. Oed. flor. dan. tab. 14.*

Lapathum digyhum. *Lam. fior. franc, torn, 3. pag. 6.*

Lapathum foliis antice emarginatis. *Hall. hiji. torn. II. pag. 273. num. 1595.*

lapathum acetofum androgynum, folio orbiculari emarginato. *Hall. helv. 770.*

Acetofa repens Weftmorlandica, cochlearis folio, apicibus nonnihil finuat. *Pluknet. pag. 8. tab. «5a»*

Acetofa repens rotundifolia Eboracenſis, folio in medio deliquium patiente* *Morif. hift, vol. II. pag. 583. tab. 36,*

Acetofa rotundifolia alpina. *C. Bauh. prodr. pag. 55. Scheuchz. it. I. p. 29. & it. II. pag. 1 a 8**

Alpium ſupremas rupes amat, atque intra earum fiſſuras umbroſas, nivisque perpetuo ftillididuo irriguas, non rarus latitat, in Ranunculi glacialis, Geique reptantis confortio, heic omnes quaſi ab aëTis alpina intemperie viciffitudinibusque ſubdefenſa;/, laeteque vegetantes. Alunt hunc pleſäi^c edita Tyrolenſium alpium juga: & in Styriacis Secavienſibus, in Zinken, ſupra Hbllthal, & in derſchönenEbene, jam ante annum copioſunva me lettumfuiffe memini. Radix ei perennans, ſubhorizontalis, tres ant quatuor pollices longa, ſiib lignola, utcunque teres aut annularis, nodofa, ſenſim inferiora verſus attenuata, brunnea fibrisque aucta copioſis concoloribus, & his denuo ramofis. Caules haec^communiter plures fundit, plures inter foliorum radicalium ſaſciculos, erëttös, a tribus ad quinque pollices altos & femipede, utut

rarius, altiores, subnudos, angulatos, compressifuculos, glabros, laete virides, sed basi ex viridi purpurafcentes, fiperne in ramos paucos laterales subdivifos. Folia radicalia plura petiolo erefto unciali aut biunciali infruntur: ipfa reniformi-cordata, rotundata, obtusiflima, Integra, glabra utrinque laeteque viridia, latitudine longitudinem fuperante, pollicem unum duntaxat plus minus lata, lineas quinque longa. Braftea ad ramulorum nee non pejunculorum exortum feffilis, ovata, acuta, integra, subfeariofa, ex albo aut flavicante rubella* Florum alterni subdivimati que verticilli racemose caulem terminant: pedunculi quatuor aut quinque aggregatim fimul ex eodem caulis fupremi loco egrediuntur, inaequales, debiles, nutantes, capillares, laete rubellae lineas duas & tres fubinde longi, atque fub ipfo ftatim flore modice intumefcentes. Flores hermaphroditi, attamen, licet rariffimum, in fupremis verticillis hinc inde interjefto mare* Calycis corollaeque divifio, uti & flaminum piftillorumque numerushanc ab omnibus Rumicis fpeciebus quam maxime diftinguunt. Calyci uti corollae foliola duo, nifi uni omnia quatuor tribuas: id (i mavis, calycem tetraphyllum aut corollam tetrapetalam habes: exteriora atque minora duo foliola oppofita, ovato-lanceolata, acutiufcula: interiora illis majora, ovato-fubrotunda, obtufa, integra vero omnia, glabra, laete viridia, aut ex viridi rubella, concava, in planta jamjam fruftefcente fenfim una cum germine elongata atque majora. Stamina ut plurimum quatuor, rarius quinque aut fex: filamenta breviffima, capillaria, erefta, albida, calycis aut corolla foliolis breviora: antheris ovato-oblongis, primo luteolis, atate cairulefcenti-cinereis, tandem nigricantibus* Stylus breviffimus, vix ullus: ftigmata duo, plumoia, ex viridi rubella, erefta aut fubreflexa* Semina obcordata, glabra, initio ex viridi purpurafcunt, state fenfim fufca evadunt.

XIII.

ERIGERON UNIFLORUM,

Erigeron caule unifloro, calyce piloso. *Linn. Jy. It. pag. 4t AUion, flor. ped, vol. I. pag. 199. num. 72 a.*

Erigeron polymorphum. *Scop. flor, earn, edit, 2. num. 1062* variet. i* a«3.*

Erigeron caule unifloro calyce tomentoso! radiis omnibus femiflosculis.
Hall. hijt. torn. Lpag. %6.num. 87.

After caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villoso subrotundo. *Linn. flor. lapp. num. 307. pag, 24a. tab. IX* jig. 3.*

After montanus caeruleus omnium minimus. *Mori/, Herm. Tournef.*

Afteri montano purpureo fimilis vel Globulariae. *Bauh. hiji. p. 1047. Scheuchz. it. IV. pag. 329.*

Conyza caerulea non acris, laevi folio. *Rudb. lapp. 97.,*

Una cum praecedente in editis Schleinizenfibis prope Leohtium jam ad fumma rupestria praecipitia legi: non infrequens tamen & in aliis Tyrolis, confinisque Carinthias alpibus. Vereor tamen profecto, ut fatis constantes alpinum inter, & uniflorum Linnaei Erigeron, intereedant limites, certaeque discriminis notas. Et alpinum caule unifloro subinde variare, certum indubitatumque, ut Scopoliis jam de vera utriusque differentia ambigeret, & indubitet. Sub Erigeronis polymorphi titulo, illud uniflorum Linnaei ob variabilem ejus habitum proposuit, pluresque ejusdem allegavit varietates. At ille squonimis progressus, dum certo certius & Erigeron acre Linnaei sub varietatibus Erigerontis uniflori, quinto, sexto, nec non & quarto numero comprehendit: a quo diffentio. Quas interim inter utrumque certiora

tiora observaverim discrimina, haec sunt: subalpina loca potius, quam ipsas alpes *Erigeron alpinum* incolit, dum *Erigeronti unifloro* altior *Ipogon fedes*. Illi caulis subramosus, hirsuties atque villositas in-caule, foliis, calyceque praecipuis multo minor, dum huic praeter caulem uniflorum simplicissimum folia dense villosa hirsutisque aspera, calyx eidem hemisphaericus, globosus fere, atrorubens, intra densam incomptamque hirsutiem fere absconditus. Hic gaudet perenni, perenni^ Jculari, subpraemorsa, inaequali, fusca, simplicis nunc, alias subramosa, quae fibras copiosas teretes, perpendiculares, simplices, fuscescentes undique spargat. Caulis ex simplici radice unicus^ ex multicipite plures cepitose una affurgunt: erecti hi satisque firmi, a duobus tribus, raro ad quinque pollices alti, teretes, profunde striati, totiquanti hinc densioribus & durioribus hirti, rubentes, atque foliolo uno alterove laxo retnoto lineari influiti. Folia radicalia atque ilia, quae fasciculatim collecta inum caulem ambiunt, plura sunt, obovato-oblonga, integro sed & frequentius retusq emarginatoque apice, crassiuscula, caeterum integerrima, erecta, fature viridia, utrinque sed luperne atque margine praecipuis, qua in petiolum veluti decurrunt, villosa, hispida, una cum petiolo pollices duos plus minus longa, quatuor, quae latissima, lata^ Caulina rara, laxa, remota, ad summum tria aut quatuor, quo superiora eo breviora angustioraque, linearia, sessilia, acutiuscula, undique sed margine in partibus villoso-ciliata, suprema vix lineas quinque longa, lineam unam lata. Flos terminalis, unicus, pro plantae magnitudine satis magnus crassusque. Calyx erectus, subglobosus, diametro lineas quinque squatur, villosus, atque ex atrorubens; squamae calycis plurium ordinum, imbricatae, erectae, lineari-lanceolatae, acuti, villoso-hispidae: exteriores atque inferiores, breviores virescunt, interiores ex atro rubent, lineas tres circiter longae. Radii ligillari, dum plantae flores aperit, primo albidae sunt, ferius vero exvioletaceo-

lacco purpurascunt: indeque floris quoad colorem differentia, purpurei videlicet, cœrulei, nec non albidi, Hallero atque AUonio obferantibus: esdem lineari-oblongis, acutis, erectis-patentes, fere trifidis, apice integerrimis, lineas tres circiter longas, lines dimidium latis; tubo tenui, cylindrico, recto, albo, glabro, infertentes. Stylus filiformis, erectus, albus, ultra tubum productus, bifidus: fimbriatus duo, fere revoluta, alba, simplicia, fere uti ligula violacea aut rubella. Pappus feffilis, fere pappi, pilosus, rubeus, feminibus longior, femineque ultra femiflorescens tubum productus. Flores tubulosi, apice quinquefidi, primo luteoli, tandem purpurascens, laciniis erectis, acutis, tubo cylindrico recto albo aut fere luteolo. Filamenta capillaria ex tubi interiore pariete enata, albida aut luteola: antheris erectis, cinerascens, apice pervis perforatis. Stylus filiformis, albidus, antherarum tubum perforans, bifidus: fimbriatus erecta aut fere revoluta, ejusdem cum florescens coloris. Semina oblonga, fusca, aspera.

XIV-

HIERACIUM STATICIFOLIUM.

Hieracium fcaulo nudo ramofo, foliis lanceolato-linearibus obfoleto-denticulatis obtusis: pedunculis longiffimis unifloris, fuperne squamofis. *Al-Uon.flor.ped.torn. I. pag. 214* num. 782. tab. S**fg. 2. icon optima.*

Hieracium (ftaticifolium) caule nudo, foliis lingulatis, obtusis, fubdentatis, floribus fulphureis. *ViR.profp.pag. 35. tab. XIH.fig. I.*

Hieracium caule nudo brachiato, paucifloro, foliis linearibus rariter dentatis. *Hall, hijl* torn. I. num. 48. Varietas <c, duni varietas & ad H.porrifolium pertineat Vide Cl. la Chenal in A&is Bafil.*

Hieracium cauleramofa, foliis radicalibus linearibus fubdenticulatis, caulinis minimis. *Gerard. prov» pag, 167. num. 5.*

Hieracium alpinum foliis anguftis raro dentatis, flore magno, *Seguier. vero* nenf. fuppl. pag. 270**

Subalpina & montana magis, quam alpina planta, in rupibus calidioribus, locis praeprimis arg[^]fis, ac lapidum inter acervos hofpitans. At titi aliarum plurium, ita & hujus quoque femina per torrentes alpinos in planitiem usque deferuntur, numerumque illarum ftirpium auget, quæ fabulofa, fterilia Ifola? fluvio prope Leontium adjacentia loca, ornant, Botanicoque peregrino, qui excelfarum alpium ftirpes in planitie videre nonconfuevit, gratum exhibent fpectaculum, Hujus fori ftirpes fufius enumerare alio loco mihi animus eft, Et Aurtria inferior hujus planta? patria, dum[^]illam praeterita jam fiftate in collibus apricis, arenofis prope l'hermas Badenfes fatis frequentem una cum Plieracio faxatili *Sacq_t ic. rar. legi.* Attamen diu, quo referrem, dub ins haefi. Ab Hieracio porrifolio, planta in Auftrije rupibus fubalpinis non minus vulgari, diverfam efle, vel primo intuitu dubitare non poteram: uti contra nee inficianduni, magnam inter utramque, quoad notas characterifticas, intercedere fimilitudinem. Halleri hiftoria, uti fere femper, & hie dubia difcuffit Utrumque, & Hieracium porrifolium, & alterum flaticifolium mine diftum, ab Illuftriff. Viro egregie defcriptum vidi, licet fub uno numero comprehenderit, fynonymis tamen utrique convenientibus perquam accurate diftinctis ordinatisque. Separandas fuafit utriusque autoptes, Hiftoriae ftirpium Helveticarum dignus reformator Clariff: la Chenal in Aft. Bafil.: feparavit AUionius nuperrime in ftirpium pedemontanarum hiftoria, & horum ego quoque veftigia fequor. Eft Hieracio noftro radix perennis, Mforrais, teres, tri-aut quadripollicaris, digi-

ti minimi iubinde craffitie, albida aut ex argillaceo flavens, fibris auſta, evulſuque faciliffima, dum in Hieracio porriffilio ferro ad removenda faxa fere Temper opus fit Folia radicalia copiofa, in orbem expanſa terra incumbunt, lanceolato linearia, acuta nunc, alias obtuſa cum acumine, margine obfolete, obtuſe remoteque dentata, faepe denticulate-repanda, craffiufcula; glabra utrinque, hete viridia, fenſim fenſimque, ubliqua non raro direſtione, in petioliim bafi amplexicaulem [^]bidum attenuata, poliiceſtres vel quatuor longa, lineas duas aut tres lata. Caulis, aut ſcapus potius, qui e centro foliorum radicalium prodiſt, reſtus eſt, firmus, a femipede ad pedem unum altus, & altior, utcunque teres, profundius ilriatus, glaber, laete aut ex albido virens, fuperne ramofus, brachiatus, totus quantus nudus, ac folummodo ad exortum ramorum braſtea brevi lineari inſtruſtus, Ramf e caulis medio & fupra paulo duo aut tres numero affurgunt, & hi caulis primarii altitudine, *póllices* quatuor aut quinque alti, ereſtopatente[^], inferne nudi, verſus florem paululum {enſim intuinercentes, fquamisque brevibus alternis obſiti, glabri, teretes, friati, in ipſa fummitate obfolete triquetri, firmi, rigidiufculi, apice unicum florem fuſtinentes. Flores ſpecioſi, dilute flavi, exmajoribus hujus familiae, diametro facile unciam unam cum dimidia aut uncias duas aequant. Calyx ovato-cylindraceutus, ereſtus, fquamis conſtans imbricatis, ereſtis, parallelis, linearibus, acuminatis, intus canaliculatis, dorſo ex atro-viridibus, glabris, nee non fubhirlutis, interioribus majoribus lineas quatuor circiter longis, lines dimidium latis: infimae feu potius accefforias multo breviores, laxx, lineares, acutae, in pediunculos fenſim alternis intervallis decurrunt Ligulae utrinque dilute flavae, patentes, ex lanceolato-oblonga?, apice acuta?, quinquedenticulatje, lubtiliter friatae, lineas oſto longas, lineam unam circiter latae: tubo cylindrico, reſto, albo, villoſulo, linearum trium circiter longitudine[^] **Fi-**

lamenta breviflima, capillaria, alba, ex tubi fauce produ&a: antheris fulphureis, perforatis. Stylus filiformis ultra antherarum cylindrum produ&us, bifidus, ex albo flavescens: ftigmata duo, revoluta, flava. Pappus (implex, feffilis, pilofus, feminibus duplo & triplo longior, Semina oblonga, fufca, profundius ftriata. Varietas plants foliis fubtus (uti in Primula farinofa) albidis farinofis non rara iisdem locis,

XV.

SILENE SAXIFRAGA.

Silerre caulibus fubunifloris , pedupculis longitudine caulis, -floribus hermaphroditis femineisque, petalis bifidis. *Linn. Jyfl.* ^4 a a. *AUion.flor.péd. torn. II. pag. 83 num. 1582.*

Lychnis faxilraga, *Scopoiflor. earn. edit. 2. num. 5*0. pag. 308.* & Lychnis floribus trigynis ereftis, capfulis trilocularibus, foliis linearibus, *Ejusd, flor, earn. edit. I. pag. 503. num. 6»*

Lychnis minor Saxifraga. *Pluk. almag. hot. Seguier. veronenf.p. 431. tab. VI.*

*fig- *•*

Lychnis fruticofa anguftifolia minima montana, flore albo. *Bocc, muf. pag. 81. tab*71.*

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Bauh. hift. Ill p. 338. Ry> *hifl* vol. 1L*

Caryophyllus faxifragus, C. *Bauh. pirn a n .*

Saxifraga magna Matthioli & Italorum. *LoK icon. 4a8. Pon. 176".*

Auftralioris Europe dvem in rupium calcarearum ilia catena, quae ad pedem ardui M. Rauchkofel prope Leontium, ab Anibloch versus Jungbrunn interrupta ferie continuatur, non raram legi, plures gratas inter ftirpes, ex quibus primi ordinis uti Paederotam Bonarotam, Potentiilam caulelcentem, Saxifragam Burferianam cum Rhododendro Chamaecifus folummodo nominafle fufficiat Duro hoc atque fitiente lolo intra anguftiflimas rupium rimas modica humo repletas, radices fuas dimktunt, ac proinde cum difiicultate eruendae. Radix perennis, fublignefcens^ articulato-nodofa, fordide flavens, ramos in omnem ambituni inordinate fpargit plures, cauliumque communiter denium cefpitem annuatim profert: filiformes hi, proftrati quaquaverfum, aut decumbentes, debiles, digitales, femipeda-les, longiores etiam, teretes, glabri nunc, fubpubefcentes & aferiufculi alias, pteprimis in juniori planta, laeteque virides. Folia per inter valla, ad fex aut otto conjugationes oppofita, linearia, acuta, integerrima, glabra, ls-
 \Q viridia utrinque, unciam unam vel unam cum dimidia plus minus longa, vhc lineam lata. Flores terminates utplurimum bini in pedunculis erettis, feretibus, filiformibus, glabris, elongatis, & caulis longitudine, unciarum trium quatuorve: nee tamen rara plantae caule unifloro fpecimina# Calyx inonophyllus, oblongus, fuperiora versus craffe fcens> clavaeformis, quinque-dentatus, ilriatus, glaber, ex flavo virens, lineas quatuor vel quinquelon-gus* Corolla pentapetala, unguiculata; limbo piano, patente, fuperneal-
 I>o, inferne ex albo aut viridi purpurafcente, aut cum virore flavo: petala profunde bifida, (egmentis oblongis, obtufis; patentibus, integris, lineas duas circiter longis, lineae dimidium latis, ungue albo refto calyce longio-
 II\ Auricula duae parvae in quovis petalo ad marginem faucis patentis di-
 latataeque, ex ovali-oblonga, albae. Filamenta decem, fubaequalia, capil-
 laria, alba, unguibus petalorum nonnihil majora: antheris ovatis, flave-
 fcea-

fcntibus. Styli tres, eretti, albi, petalorum unguibus longiores: ftigma-
tarevoluta, divaricata, plumofa. Germen bafi fubhexagonum, glabrum,
laete virens. Capfula trivalvis, apice dehifcens, glabra, flavescens, ultra
calycem fenfum maturefcntibus feminibus product. Seraina plurima, rufa.

XVI.

AQUILEGIA ALPINA,

Aquilegia neaariis rebilis, petalo lanceolato brevioribus. *Linn.fyjl.p. 505.*

*AUion,flor.ped.torn, II. num. 1508.tab. 66**

*Aquilegia foliis trilobatis, Jripartitis linearibus, caule paudfloro. HalLhifL
torn. IIpag. 89. num. 1196**

*Aquilegia montana magno flore. C. Bauh. prodr. p. 75. Bauh. hiji. tom.UL
p. 484. Scheuchz. it. L pa<g>. 31. Tournef. inji. 428.*

Pleraque plants elegantis fpecimina Augufto menfe, feminibus jam
maturefcntibus onufta legi, & rari admodum fupererant flores, ad
quos fequentem concinnare defcriptionem liceret. Non alpinis (trifle ad-
numeranda, qua glareofas rupium calcarearumdeclivitatesad pedes alpium
magis incolit, quam excelfa earundem loca. Alunt hanc rupes alpium Or-
tenburgenfium prope Spital fuperioris Carinthis* Item prsrumpti illi parie-
tes Ortenburg inters Draburg, ad ripas Dravi, qua fcalaris afcenfus, non
periculo carens, in vallem Gilienfem ducit. Eadem una cum prscedente
abundant rupes ad pedem alpium Leontinarum prope Leyfach & CläusI,
qua perquamardusKirchbaumenfes, & vicins Luggavienfes alpes fefeat-
tollunt Montanam Halleri ^quilegiam Nro. 119^ P^{lantam meam effe,}

primo

primo intuitu agnovi, dum contra erronea Linnsi, Aquilegis fœ alpina, definitio aliquantisper dubia moveret. Nevariis etenim illa res prædita dicitur, quæ mes & Hallerianis plantis, perinde uti Aquilegiæ vulgari incurva, ut, monente Illustriff. Viro, a nettariorum figura, nota discriminis petinequeat, quæ sufficiat distinguendis plantis. Icon Allionii loco citato laudabilis, sed ab exemplari æquo majori vel rarissime obvio (si non plantis in horto cultis?) desumpta videtur, ut difficilius adjuvatur, id quod conferenti cum vivis plantis sylvestris specimenibus patebit cuique, Radice est, an non perenni? sub lignosa, obliqua, tereti, ramosa, quinquepollicari, & semipedali, fusca, fibris infra ramosis, concoloribus, capite vero petiolorum præteritorum annorum exuviis fetosis aut squamosis coronata: simplex ut plurimum, sed annosior multiceps. Caulem ita hinc junior proferunt unicum, adultior plures, erectos, a semipedali altitudine cubitalem subinde squantes, teretes, tenues, glabros, rarius subpubescentes, iste aut ex glauco virides, in ramos superne communiter binos, erecto-patentes cauli fimiles, unifloros divisos. Radicalia folia, quorum plura semper in fasciculos collegia caulis immixta undique ambiunt, longis gaudent petiolis, erectis, teretibus, rigidiusculis, glabris, iste viridibus, basi dilatatis fibique imbricatis incumbentibus, pollices tres quatuorve superantibus. Ipsa folia divisione mire ludunt. Nunc, & inter constantiora hinc pertinent, biternata sunt, foliolis omnibus sessilibus, intermedio obovato-cuneiformi, trifido, lateralibus oblique cuneatis, bilobis, Eadem alias simpliciter ternata, foliolis, quæ antea ternata erant, nunc simplicibus, longius petiolatis, omnibus obovato-cuneiformibus, aut ex cuneiformi-subrotundis, trilobis, obtusissimis, lobis basi confluentibus* Nunc, & hinc non rarissima, biternata denuo, at foliolis cuneiformi-angustatis, lanceolato-linearibus, intermedia subpetiolato trifido, lateralibus sessilibus, bifidis, lobis aut laciniis subparallelis;

lis: ut *Sc* folia notas a?que infimas inconstantesque suppeditare non immerito judicem. Foliola vero obtusa in omnibus, crassiuscula; superne laetius viridia, glabra; dorso pallidiora, glauca, subpubescentia, atque reticulo venoso pista: petiolis partialibus teretibus, late vhidibus, glabris, plus minus pollicaribus. Folia caulina, unum aut rarius duo ad ramorum exortum subeffilia, petiolo videlicet infrusta brevissimo, vix ullo, basi dilatato, vaginato, atque unbelliferarum in morem amplexicauli: & haec biternata, foliolis omnibus linearibus acutis irtegerrimis, intermedio longiori nonnihil, majorique. Supremum denique simpliciter ternatum, foliolis prioribus fimbribus» Flores speciosi, pulchre sed profundius caerulei, in caulis atque ramulorum, si qui adsint, summitate folitarii, nutantes: unicus saepe in tota planta, frequentius duo, vix ultra tres. Pediculi sub ipso flore leviter intumescunt, inclinati, hirsutiae nigricante fatis conspicua obdusti, hec non bra^leis superne lanceolatis, alternis, acutis, erectis, lineas tres longis & vix lineam latis obfiti. Petala quinque, aequalia, ovato-lanceolata, acuta, patentia, plana, versus apicem modice reflexum paululum superne canaliculata, lineas quinque longa, tres circiter lata, ungue brevis germinis basi inferto intus aquosissime & ex albo caerulescente, extus caeruleo, Neflaria quinque, tubulosa, corniculata, incurva, cum petalis inferiori paulum loco enatis alterna, iisdemque perpendiculariter infertentia: orificio eorum amplo patulo, ovato, obtusissimo, submarginato, sensim inferiora versus, sed simul interiora, angustato atque in calcar conicum apice obtusum proclusto. Connivent cornua apicibus suis, & tota ne&aria petalis paulo breviora sunt. Filamenta fatis copiosa, supra triginta, inaequalia, erecta, filiformia, subulata, basi dilatata, alba, superne violacea: antheris oblongis, flavis aut ex flavo virentibus. Stylos quinque, nec non quatuor numero. teretes, filiformes, erectos, albidos, filamentis aequales: stigmatâ simplicia, albi-
f da:

da: germina totidem ovato-oblonga, ere&a, fubhifuta. Capfulae quinque, univalves, latere interiore prope bafim unitas, cohaerentes, fuperne liberae: ere&be caeterum, oblongae, introrfum dehiicentes, fufcae, ftriis transverfis notatae , acuminatae aut rofratae potius, apice extrorfum prodotto.

Attentioni examine inftituito, &collatis inter feplantis, nonnulla alia majoris momenti difcrimina, &c conftantiora obfervavi, quibus vacillantem atque mancam Linnaei definitionem firmare non inconfulum foret:

Aquilegia (alpina) neftariis incurvis, petalo lanceolato brevioribus: caule paucifloro: foliis lateralibus feffilibus, lobis linearibus parallelism

Et *Aquilegia* (vulgaris) neftariis incurvis, petalo fubaequalibus : foliis omnibus petiolatis, lobis fubrotundis obtufiffimis divergentibus.

XVIL

LEDUM PALUSTRE. *Linn.fyfi.pag. 404.*

Ledum foliis fparfis linearibus margine revolutis fubtus rubiginofis: floribus decandris. *Deftituitur enim adhuc Jyftema vegetab. Ledo latifolh^j-acqui-niipentandro, brevi prodituro, & Ledo gmnhdico. Flon dan. tab. 567. Retz. prodr. flor.fcand. num. 436. feu Rhododendro daurico Linn, cujus generis ex RetzvL obfervationibus non eft.*

Ledum rofmarini folio. Rupp. 2 edit. p. 126.*

Spiraea odorata Rivin.*

*Rolmarinus paluftris. Till ah 59. ic. 15a**

Ciftus Ledon foliis rofmârini ferrugineis. *Bauh, pin. 467.*

Rofmarinum fylveftre Matthioli. *Cam. epit. p. 545.*

Ledum Silefiacum. *Clu./pann. 69, & hi/}, ejusd, i.p. 82.*

Speciofi atque vilui grati fruticuli natales nonnifi turfofa, paludofa, fepe cum periculo acceflâ loca. Vulgaris ille quidem in toto Septentrione, fed an ullibi quam in Bohemia vulgatiore, dubito, quas immenfam ejus copiam alit. Primaria folummodo & eo feraciffima loca indicaffe fufficiet. *In dem wüflen Teiche* Hirfchberg oppidum inter & Kummern ad pedem montis Befig, & verfus Weiswafser, magno atque amplo illo pifcinarum pnegrandium uliginofa ambitu, ut & ad oras paludum ftagnorumque ifthic valde Trequentium, cum Vacciniis Oxycocco & uliginofa, &c. *Andromeda polifolia.* Item *aufder faiden Wiefe* prope *Bohmifch Kamnitz.* Sed & rupes, utut rarius, fphagni paluftris deniffimis ftratis teftas, perpetuoque aquarum ftillicidio madidas afcendit, ut & ericeta altioja uliginofa. Similibus locis in tota ilia rupium catena, qua d patria urbe *Kreibitz* verfus *Rennersdorf, Vittersbach & Windifch Kamnitz* mlenuytim decurrit vulgatiffimum, Majo, & Aprili menfe jam in finem vergente florentem legi. Radice nitureperenni, longe horizontalifer fub fphagni paluftris ftratis excurrente, inordinate ramofa, & bipedali, tereti, calami majoris craflitiem vix fuperante, attamen lignofa, compafta, dura, albida aut flavicante extus, fibrisque rarioribus defcendentibus, 6[^] his fibrillofis, lixiufcule firmata. Unum, plures hac in fu6 decurfu profert caules, pedales, cubitales, & ultra, undique diffufos, flexuofos, afcendentes, firmulos, ultra lineam craflis, fuperne ramofos; cortice inaequali, fcabro, a foliorum praecedentium annorum infertione tuberculofa, cinereo aut fuicefcente teftos: ramis alternis fuberecliufculis, bafinudis, iufcefcantibus, verfus fu periora tomento denfo

rubiginoso obfritis* Folia recentium atque tenellorum ramulorum extremitates occupant Rorifmarini foliis valde asmula ut certo certius fcriptorum antiquioris <VI denominatio originem inde duxerit: & haec linea*ia , rigidula* fparfa confertaque, obtufiufcula, margine revoluta, breviflimo atque lineari inflm&a petiolo, facie faturatius viridia fubnitida rugofula, fulcoque longitudinali in medio exarata, dorfo vero lanugine ferruginea denfa tefta, nervo albicante prominulo, pollicem unum aut unum cum dimidio longa, lineas duas & ultra lata: fuperiora patent aut paululum eriguntur, inferiora apicibus deorfum ipeftant. Florum corymbus terminalis, ereftus, fimpliffimus, convexiufculus, viginti &c ultra florum: pedunculis ereftis, filifonnibus, inaequalibus, unctalibu5, & biuncialibus, valde tomentofis, flavefcentibus, unicum (ingulis apice florem gerentibus: iidem florentes erefcli, fruftiferi declinati, &per triennium faepe una cum capfulis perfiftentes* Braffefe in fummitate ramorum pedunculos diftinguentes decidua?, ovatae, obtufae, extus convesse, jj^biginofae. Flores albi, aut ex albo luteoli, ut injufte Clufius carpat eum, qui fublutei coloris effe, merito afferere non eft veritus. Calyx planus, fubrotundus, quinquentatus, fed adeo minutus, ut lente vitrea opus fit. Corolla plana, pentapetala, nee quinquepartita: petala erefto-potentia , squalia, ovato-oblonga , obtufa, concaviufcula, ultra lineas tres lohga, lineam unam aut unam cumdimidia lata* Filamenta decem, alba, filiformia, alteme breviora, fubincurvata: omnibus tamen corolla longiora: breviorfPquinque unguibus petalorum infident, dum reliqua prodeant ex petalorum interftitiis. Anthers oblongs, flavefcentes. Germen ovatum, fuperum: ftylus unicus, ereftus, teres, filifomiis, albus, perfiftens, filamentis beviore: ftigma obtufum, capitatum). Capfula primo erefta, tandem una cum pedunculo declinata, quinquevalvis, unilocularis, bafi quinquefariam dehifcens, ore anguftiore pervio quinquentato: val-
 vular

vulae ovato-oblonga?, utrinque obtuse, apice coharentes, glabrae, fuscae. Semina copiosa, tenuissima, pulverulenta, rufa. Id peculiare fummitatibus ramorum hujus fruticuli, quod absoluta fructificatione novos ex latere protrudant ramulos tenellos, duos & tres numero, futuro anno floribus onustos, ut *corymhi* labentis anni reliquia;, & per triennium persistentes, anno frequenti non jam in fummitate, sed in axillis dichotomis trichotomisque ramulorum, sensim ita elongatorum, conspiciantur. Bohemis lingua Germanica utentibus *Zeitheide* dicitur, dum alibi *wilden Rosmarin*, *Heiden Bienkraut*, *Postkraut* &c. appellant. Odor planta;, praeprimis florentis, gravis, penetrans, fortis, caput tentans. Exigui apud nos usus: tineas enecat graevolentia sua, hinc vestimentis adponunt, qua ab iis immunia fervat, *Cimices* quoque odoris vehementia fugari ferunt. Dalekarli humuli loco cervicibus incoquunt, Linnaeo teste, sed ea cito temulentiam cum Cephalalgia inducit. Et in Saxonia perniciosum illum morem invaluisse Ruppium. Nec in Bohemia quibusdam locis nefarium usum exolevisse in integrum, avida nimis & frequens ejus a mulierculis rhizotomis collectio, suspicionem movet. Sueci decocto boves, & fues morbo pediculari liberant, & mures a collegia messe eodem arceri item Linnaeus refert. A Silesiis decoctum ad articulorum contractiones cum felici eventu adhiberi Clusius narrat, & vidi proficuum in arthriticis & rheumaticis doloribus apud eosdem.

XVII

POLYPODIUM MONTANUM,

Polypodium fronde tenera triangulari, triplicate-pinnata: pinnulis pinnatifidis, segmentis ultimis oblongis, obtusis, apice argute bifidis, trifidisque. Allion. fior. ped. torn. II. pag. 257 num. 2410. Lam, fior. franc, torn. I. pag. 23.*

Polypodium Myrrhidifolium. Mygind & Dick

Polypodium triplicato-pinnatum, pinnulis tertiis iemipinnatis, lobulis bifidis. Hall hi/fl. torn. HLpag. 16. num. 1710.

Filix montana ramosa minor argute denticulata Vaillant. pag. 53* Raj. syn-jpfpag. 27.*

Filix alpina Myrrhidis facie Cambrobritannica. Plukn. almag. tab. 89. fig 4-Satis bona, sed a juniore specimen defumpta.*

Filix Rhaetica tenuiflora[^]divisa. Bauh. hi/I. torn. HI p 740. Ex Halleri fide, sed figura pessima**

Et in austriacis alpebus superesse specilegium, elegans hęc non minus quam rara polypodii species, cum plurculis aliis nuperrime detectis stirpibus demonstrat: et si jam Clusius, mine Jacquinius, Crantziusque, & plures alii argutissimi Botanici angulos earum perreptaverint omnes, ut exhaustas omnino credidiffes* Naicitur hęc in opacis umbrosisque fylvarum subalpinarum, editioni jam loco, ut inde breve iter ad nuda alpium dorfa: sic in fylva quę Schneeberg, & monti subalpino Gans interjesta, ad latera Schneebühl, qua via in celebre illud pręcipitium (sic Saugrube) ducit, Campanulam pullam, Juncum maximum, & Corallorhizam inter. Eadeni me posita

flea in ascensu ad alpes Tyrolenses similibus locis multo frequentior invenitur. Tenerje valde atque debili Filici radix est perennans, repens, horizontalis, fatislonga, teres, calamum crassa, ex fusco nigricans, in ramos nonnullos laterales aequae longos sine lege divisa, fibrisque simplicibus & ramosis concoloribus pluribus donata. Stipites hanc in toto longitudinalifuo decursu emittit plures, inaequalibus intervallis a se invicem distantes, basi modice reclinos, latefcentes hinc, utut debiles, ere&iufculos tamen, femipedales, & altiores, subflexuosos, graciles, fere filiformes, latere uno convexos rotundatos, altero paululum complanatos fulcoque in medio longitudinali exaratos, & hos fragiles basi purpurafcentes, squamisque furfuraceis rarioribus obfessos, superne nudos, laete virides, glabros, Frons circumfcriptione triangulari continetur, uti in P, Dryopteride aequae fere longa acuta, quinque videlicet & sex pollicum: planiuscula caeterum, acuta, glabra, laete per omnia viridis, triplicato-pinnata, flaccida, debilis, mollis, quibus ultimis notis a congeneribus fere omnibus nostris distinguitur facillime. Foliolorum primaria paria septem & octo circiter numero, quorum infimum versus anteriora sibi adproximatum reliqua superat magnitudine: quo altiora, eo sensim omni diametro minora fiunt, magis alterna, dum inferiora plerumque e regione sibi opposita fiunt, aut brevissimis intervallis alternatim sibi succedant: stipite ad eorum originem compresso piano: foliola haec ex ovato lanceolata, acuminata, erecto-patentia, utrinque pinnas septem & octo circiter adnascunt, alternas sensim decrefcentes, quarum illa* in exteriori serie posita, illis in adverso ejusdem folioli latere, constantem majores fiunt. Eadem lanceolata, acute, ab uno ad duos pollices longae, nervo subdilatato, foliaceo, iterato pinnate. Pinnule alternas, quinque & sex in eodem latere, basi latiore foliacea sessiles, atque cum nervo confluentes, subparvas, oblongas caeterum, nec non sub lanceolatae, & ipse denuo nunginc

gineincifae, pinnatifidae: fegmentis quatuor & quinque circiter, apice obtufis acute bi- & tridenticulatis. Incifionis tamen gradus in pinnulis ultimis variant, ut in majoribus plantae fpeciminibus, & has non pinnatifidas folummodo, fed vere iterato pinnatas, totamque frondem quadruplicato-pinnatam faepius viderim. Acervuli feminales in averfa frondis pagina inordinate fparfi, fed diftincti taiien omnes, fubrotundi, albi aut ex albo flaventes, a tribus ad quinque, in quovis ultimo pinnularum fegmento,

VERONICA ALPINA.

Veronica corymbo terminali, foliis oppofitis, calycibus hifpidis. Linn, Mi. pag. 59. AUion. flor. ped. torn. 1. pag. 74, num. 269.

Veronica caule fimplici foliis ovatis, glabris, fubferratis: fpica pauciflora. Hall. hijl. torn I pag> 235. num. 544. tab. 15* fig. a.*

Veronica alpina caerulea bellidis folio non ita craffo, vix crenato caule foliofo. Burfer. in afl.fuec. pag. 508.

Veronica quaedam foliis glabris. Scheuchz. it. IV. p. 342,

Teucrium VI. pumilum. Cluf. hifi pag. 350. & Ejusd. pann. p. 616.

Ex vulgatiffimis plantarum alpinarum una, locis duris, atque faxofis nafcens, ut nullum pinetutn alpeftre, pafcum nullum fit, in quo non reperias abunde, & taediofum certe foret eas omnes enumerare alpes, in quibus viderim: alpicolis Styrias fors adverfus incantationes ? *Befchreykr'dutkin* difta. Radix ei perennis, horizontalis, teres, geniculata, albida, pollicem unum vel duos longa, fibris verticillatini e geniculis egredientibus fti-

pata

patapluribus, simplicibus albis. Caulis inde unicus, erectus, a tribus quatuorve pollicibus & femipede, utut rarius, **tiltior**, simpliciflimus, teres, geniculatus, basi ex rubello viridis, pubescens, superne, & id neprimis ad racemi exortum, hirsutus, nigrescens. Folia alterne opposita, sessilia, ovata, olitufa, integerrimo mine, alias obscure minuteque crenato margine, iste viridia, dum juniora superne leviter hirsuta, adultiora utrinque glabra, unciam fere longa, lineas quatuor & quinque lata. Flores parvi, inconspicui in corymbo (*ft corytnhi* nomine dignus ?) aut racemo potius terminali brevi, aetate sensim elongato: illorum circiter octo aut decem: inferiores remoti, alterni ; superiores adproximati congestique magis. Pedunculi breves, linearum duarum, nee ultra, teretes, erecti, toti quanti hirsuti, profundius & e nigro purpurascens j bracteis ovato-lanceolatis, acutis, hirsutis, florum pedunculis longioribus, distincti. Calycis tetraphylli foliola subaequalia, lanceolato-ovata, obtusa, ex atro viridia, dodo & margine imprimis ciliato hispida. Corolla monopetala, quadripartita, aquosa & incleganter cerulea, versus faucem albida: laciniis & lateralibus duabus fere aequalibus, ovatis, acutiusculis, patentibus, lineam circiter longissimisque: superiora reliquis majori, subrotunda, obtusa, crenulata. Tubus brevissimus, cylindricus, obtusus, albus, calyce brevior. Filamenta duo ex tubi orificio enata, corollae segmentis aequalia, erecta, subulata, subconniventia, alba: antheris subrotundis, luteis. Stylus filamentorum longitudine, teres, cylindricus, declinatus, albus: stigma simplici, obtuso, albo. Germinum ovatum, compressiusculum, late virens. Capsula obcordata, emarginata, glabra, superne compressa, bilocularis, polysperma, profundius & ex atro virens.

XX.

EPILOBIUM ROSMARINIFOLIUM.

- Epilobium floribus inaequalibus tam inibus piftilloque declinatis: foliis ere&is, fparfis lineari-anguftiflimis, apice callofis mucronatis. Epilobium Dodonaei *Allion. flor. ped. torn. I. pag. 279. num. 1016.* *Fill, pro/p. p. 45.*
- Epilobium flore difformi foliis linearibus. *Hall. hi/L torn. I. p. 427, num. 1001.*
- Epilobium anguftifolium fpicatum, foliis integerrimis linearibus fafciculatic *Hall emend, pag. 408. num. 2.*
- Epilobium foliis alternis linearibus ftylo declinato. *Scopol flor. cam. ed% 1. p* 25%. num. 3. & edit. 2. p. 271. num. 456.*
- Qiamacnerion alpinum anguftifolium flore purpureo* *Scheuchz. it. I /M£. 33. & it. IV. pag. 332. Tournef. inft> 302**
- Lyfimachia filiquofa fpeciofa anguftifolia. *Bauh. hft. torn. IL p. 907.*
- Lyfimachia Chamaenon dicta alpina. *Bauh. pin. 116.*
- Pieudolyfimachium purpureum minus. *Dodon. pempt. 65.*

Rariorum plantarum Carinthiae Tyroli^que conterminal cataloged nova haec inierenda venit, lefta in arenofis, prope Leontium in Ifolae Dravique ripis fatis frequens, Julio & Augufto menfe florens, femina oeptembri maturans. Hanc ex paucis illis novellis, qua) iuperfunt, plantis, reliquerat Ven. Wulfenius, ut me inventore, qui magni in arte magiftri velligia fecutus eram, publici *juris* fieret: dum caeterum indefeffus ejus labor, atque repetita ad vicinas alpes itinera, agri Leontini divitias, jam pene omnes ipoliaverant. Non fteriles glurea*, & alvei fluviorum fpeciofe plants primi & genuini natales funt, cujus duntaxat femina ab aitori longe fede

per

per torrentum alpinorum ætus frequentes, atque inundationes delata, heic cum plurimis aliis, editiflimarum alpium ftirpibus, adeo feliciter germinare, ut jus civitatis quodammodo annos adeptis viderentur. Et mirandum certo, quanta peregrinis divitis exiguo illo planitie circa Leontium tractu contineantur, quas alias in fumtis alpium jugis unice reperias, fHic legas perotium, & sine anhelofa itinere, in alpium confpelhi, abunde Artemifiam glaciale & fpicatam, Phacoi alpinam & auftralem, Aftragalos campeftrem, Uraleniem, alpinum & Leontinum, Iftiflime vegetantes etfime uno, aut duplici fere floreat citius. Item Saxifragis autumnalis latos cepites, Veronicam faxatilem & fruticulofam, Gypophilam repentem, Achilifam odoratam, Antirrhinum alpinum cum fonnofa ejus varietale, nec in alpiis antea viva, flore toto csruleo, nec, fauce, uti confuevit, cinabarina* Et Hieracia porrifolium, una cum ftaticifolio & glauco Allicnii. Mitto impenetrabilia Hippophaes rhamnoidis dumeta, qua: ftudio fata atque culta ad vitium usque videtur, Betulam montanam Halleri Nro. 1631., & Salicem Nro. 1655. Ejusd. & plures alias, qua mente exciderunt. Denique & Vaferianam fupinam iisdem locis femel legit V^Tenerabilis P. Marcus Mayer, cujus eximia in patriat Floram funt merita. Quidni arenofum folum plantis alpinis in hortis botanicis tam difficulter alendis aptius efflet, quovis alio, & turfofo? Id ex hac obfervatione non absque onini certitudinis gradu concludere licet, experimentis comprobandum. Sed ad plants de-kriptionem redeo. Radice gaudet perenni, craffa, lignofa, ramofa, brachiata, fufca aut ex fufco nigricante, capite quam maxime multicipiti. Caulis ea confertim plures promit ereftos, cubitales tripedales, & altiores, fublinefcetes, teretes, glabros, totos purpurafcentes, fiiperne levi albo tomento obduftos, fimplice* nunc, alias ab ima jam bafi ramofos: *nmis* totidem quot foliorum axill*, alternis, ereais, cauli ^ualibus, eidem-

que fimilibus, apice floriferis. Folia alterna, fparfa, a ramulis brevibus foliofis adeo conferta, ut facile, & cum exculabili errore cum Illuft Halle* ro fafciculata dixeris, quae tauten non funt: & hsc linearia, erefta, rigidiucula, apice callofo purpurafcente brevi inftrufta mucrone, marginibus fubrevolutis, atque perquam obfcure obiterqiiie denticulatis: glabra caeterum utrinque, fuperne laete aut ex flavicante viridia, fubtus pallidiora reticulo venofo pifta, pollicem unum aut fesquipollicem longa, linea una plerumque anguftiora: fuprema laxiora, fed ftrifta magis. Racemi terminales in caule atque ramis frequentibus, fpeciofi, laete rofei, non vulgarem ftirpi gratiam conciliant: florum in quolibet decem aut duodecim, vix plurium. Pedunculi uniflori, erefti, angulati, inferne laxiores, lineas tres quatuorve longi: omnes braftea lineari, caulinis foliis fimili, ad bafim inftrufti# Coroks fupers, inaequalis, & paulo ultra femipollicem diametro aequantis, petala quatuor, utrinque laete rofea, ovata, obtufa, patentia, margine" fiibcrenata aut integerrima, concaviufcula, lineis verfus bafim profundioribus pifta, tres aut quatuor Ifneas longa, duas circiter lata. Calyx quadrifidus: fegmenta corollas petalis paulo breviora, patentia, lanceolato-linearia, acutiucula, ex atro purpurea, ad bafim tomentofo-albida^ Filamenta ofto, inaequalia, alterne breviora, aquofe rubella, verfus inferiora declinata, utrinque apice nempe, & bafi modice dilatata, compreffa, in medio anguftiora, calycis fere longitudine. Antherae ovatae, obtufiufculae, e cinereo purpurafcentes, aetate tandem totae cinerae. Stylus teres filiformis deflexus, verfus apicem fenfim increffatus, clavfeformis, aquofe rubellus, filamentis aequalis: ftigma obtufum, quadrifidum vel quinquefidum, revolutum, purpuralcens. Capfula infera, longiffima, erefta, obtufa, obtufe tetragona, ftriata, quadrilocularis, ex albido tomentofa, ab uno ad duas pollices longa, linea^i circitercrafta, Hoc fubtexendum habeo: iualeScopolius

plantam in Flor. earn. edit. i. pro Epilobio angustifolio Linn, proposuerat. Agnovit errorem postea, & in editione fecunda corrigendum monuit: at nescio quo fato, in alium rursus priori majorem incidit, dum cum Epilobio palustris Linn., planta diversiflora, de novo confunderet: immemor propriae observationis, plants iuae pistillum esse declinatum & petala integra* Qui haec consentiunt?

XXI.

OPHRYS LOESELIF.

Ophrys bulbo subrotundo: scapo nudo triquetro, necarii labello ovato.

Linn. fyl. pag. 813.

Ophrys 9i<pv\Kos bulbosa. Loefel flor, prujl p. 130. tab. 57. icon optima.

Bifolium bulbosum. *Dodon. ic, 242.*

Ophrys bifolia bulbosa. *Bauh. pin, pag, 87**

Uliginosa, spongioaque illa loca inhabitat, quae Jacus Peifons (*Neufiedler-See*) in Hungaria oras notabili saepe intervallo undique cingunt, quaeque hinc inde non sine submersiois periculo adeas. Verum ea non solum Botanicos huc allicit; & alias sunt non minus gratae; desiderataeque f\ v. pes, quae hic proveniunt, Jacquinii operibus celebres: uti *Cyperus Pannonicus*, *Anthoxanthum aculeatum* (novi generis potius quam *Anthoxanthum*, quam *Phleum*) *Orchis palustris*, & non longe inde in collinis *Echium rubrum*, cum *Vicia ferratifolia*. Ophrys nostra radix bulbosa est, a bulbis sua; gntis non nihil diversus: ovatus ille sed compressus, superne angustior contraflus, basi fibris plurimis albis radicatis: extus vero squamis laceris, tabidis, albi-

dis, aut fordide flaventibus iaxe vestitus: his detra&is superficie ex albo virens, ftriisque anaftomifantibus elevatis, Antholyzarurn fere in moreift variegatus. Ex hujus bafi fed anguftiffimo bulbi compreffo latere, icapus refta affurgit, a tribus ad quinque pollices altus, bafi ad bipollicare circiter fpatium vaginis foliorum radicalium, fquamisque aliis accefbriis virentibus imbricatis, vestitus, parte ilia foliofa valde compreffus, anceps fere, nuda vero inferiori parte trtqueter, nee trigonus, planis utpote lateribus, angulis duobus acutis, obtufo tertio, parum infra flores valde complanatus, ut obfcura angulorum veffigia, & idem membranaceus fere appareat, rachi denuo angulata: quoad cetera glaber, & ex flavo virens. Folia bina, radicalia, lanceolata, acuta, integerrima, erecla, fcapo breviora, craffiu-cula, glaberrima . nitida, enervia, duos & tres pollices longa, lineas quinque aut femipollicem lata: rachi eorum acuta triangulari. Flores in fcapi fummitate pauci, quinque, & fex numero, alterni, laxi, remoti, ftrifti oblique, refupinati, finguli ad bafim brafa lineari-lanceolata breviffima inftrucli, coloris flavefcentis, fere ochroleuci. Labellum ovatum, obtufum, horizontal, margine fubcrenatum, medio leviter excavatum, pellucens, roridum: fegmentis duobus lateralibus diflinflis, lineari-oblongis, obtufis, fubcontortis, labello fequalibus. Petala tria, anguftiflina, erefta, reflexa, intermedio latiori lanceolato-oblongo obtufo, lateralibus fetaceis. Germen erei>um, rachi adpreffum, ovaturo, glabrum, ftriatum.

XXII

ASTER TRIPOLIUAi

After foliisjanceolatisintegerrimis, caenofis, glabris: ramis inaequata, **floribus corymbofts.** *Linn. fyl. pag. 761. Gmelin flor. fibin 2. pag. 187. tab. 80. fg. %.*

After mantimus paluftris, caruleus Salicis folio. *Rupp. jen. pag. 179. lournafort. inji. 481.*

Tripolium *Lobel ic. 298** Tripolium majus# *Rauk hijl. 2. pag. 1064.*

Una cum pracedente ad lacus ejusdem oras legi, Junio menfe florentem." Maris littora *OY&* ejus a?mulantur, atque complures in ambitu fuo cl^ptas alunt, quas locis maritiinis, falfi^que Jacobus folummodo fainiliarej effe fcimus, cujus fori Triglochis maritimim, Atriplex laciniata, Scirpus maritimus, & ip(e Alter, de quo lermo, heic valde frequentes. Radix ejus perennis, alba, fibrofa, fa?pe craffa, carnofa, fibrisque au^a concoloribus, & inulticeps caulem raro unum, fed plures communiter, &c cepitofe colleftos fundit, in orbem expanfos bafi procumbentes, mine proftratos in integrum, alias e procumbent! veluti afcendentes, ereftiufculos, fubflexuofos: & hos inferne teretes, in fummitate angulatos, glabros, a quatuor aut quinque pollicibus & pedali nee non cubitali altitudine fubinde majores, ab imo ad fumum foliofos, fuperne ramofos, aquofe virides, fed fans purpurafcentibus hinc inde piftos. Folia craffa, carnofa, plana, **glabra**, acuta, in petiolum dilatatum* fubamplexicaulem margine ciliatum pollicis uoius aut duorum longitudine fenfim decurrunt, ipfa pollices tres & quatuor longa. Radicalia in orbem patentia, conkrta, lanceolato-linearia

aut

aut lanceolata, integerrima, lineas quatuor, quinque lata. Caulina angustiora, linearia, alterna, argute & subciliato-denticulata, linea latiora. Rami a medio caulis ad furam usque, axillares, alterni, erecto-patentes, inaequali, in summitate corymbosa multiflori. Pedunculi florum erecti, inaequales, teretes, sed profundius striati, nudi, nec nonnisi sub ipso statim calyce, bracteae lanceolata acuta brevi sessili suffulti. Calyx erectus, ovato-cylindraceus, squamis imbricatis (fontans: *hx* lanceolato-ovatae, obtusae, crebrae, fibique adpressae, laete virides, apice marginibusque rubella, subseriatae, pellucens: interiores majores, lineas tres fere longae, ultra lineam unam latas. Flos elegans, aquosus c^reruleus, diametro unciam circiter aequat. Ligula patentes, lineari-oblongae, apice (subconniventi bidentatae, lineas quatuor & quinque longae, *linea dimidia angustiores tubo infertentes tenuiflora filiformi albido subvillosula, linearum duarum longitudine. His stylus filiformis, erectus, purpurascens, stigmatibus bifido re^o-luto flavescens. Duae flores tubulosae, quinquefidae, aurei coloris: laciniis linearibus, acutis, erectis: tubo cylindrico, erecto, albo, intra pappum latitante. His filamenta capillaria, brevissima, ex tubi ambitu enata, alba: antheris in tubum connatis, fere flavis aut fuscis. Stylus cylindricus, albus, floculos superans: stigmatibus dilatato, bifido, flavescens. Semina pappo simpliciter sessili piloso coronata.

XXIII.

ARABIS CIEKULZA.

Arabis foliis radicalibus obovato-cuneiformibus, acutis, glabris, margine superiore dentatis: racemo paucifloro nutante* Turritis caerulea *Altion. flor. ped. num. 981. tab. 40, fig. 2. optima.*

Levcojum foliis oblongis dentatis, fpica nutante. *Hall hijl torn, l.pag. 194. num. * 445.* (exclufo fynonymo Clufii, quod ad Arabim alpinam Linnaei pertinet.)

Fuilla planta, & glacialibus unice arnica alpihus. Attuli ex fuprenia valle alpium editiffimarum Kartal & Frosnitz, priocipatus Salisburgenfis iupra *Windifch Matray* oppidum, quam inamentae moles aeterns glaciei replent, ex qua Ifolae fecundarii fontes fcaturiunt, & quae per unius diei & ultra fpatiim horrido mihi que omnino novo afpectu continuatur. Ad horum fcopulorum glacialium pedem quos Salisburgenfes & Tyrolenfes alpicolae (*das Ktis*) vocant, gelidamque inde profilientem aquam avide hauriunt% planta infrequens nafcitur, cum pauculis aliis, nonnifi in ea *Atmosphaerae* regione, quam glacies tenet, quaerendis. Perenni eft radice, fublinefcente, longa, obliqua, quinquepollicari, & femipedali, ex tereti fufiformi, fatis craffa, fordide flavefcente, fuperne in capita plura divifa, fibrillis in fuperficie aufta plurimis. Gaules inde aggregatim plures & cepitofi plurima inter radicalia folia affurgunt, fimpliciffimi, a tribus ad quinquelummum rarius pollices alti, fuberefti aut akedentes, craffiusculi, & pro plants pufillo habitu fatis firmi, teretes, juniores hirfuti, adultiores glabri, fature virides, in fummitate nutantes. Folia radicalia, plura femper veluti in fafciculum collefta, erefta, obovato-cuneiformia, acuta, verfus apicem binis aut tribus dentibus acutis inftrufta: glabra c«terum, late viridia, dorfo pallidiora, firmula, margine fubciliata, in petiolum latefcentem fenfim attenuata, pollicem aut fesquipollicem longa, lineas quatuor aut quinque lata, Caulina pauca, duo aut tria, alterna, remota, ieflilia, fenfim minora, ere&a, caulique adpreffa, fubdenticulata: fupremo rloribus iube&o lineari integerrimo. Flores terminales, aquofe csrulei, nutantes, in

racemo depauperato florum a quinque ad septem fere: pedunculis alterriis, ere&is, ftriftis, glabris, fub ipfo flore increffatis, fesquilineam longis. Calycis tetraphylli foliola ovato-lanceolata; obtufiufcula, erefta, petalis breviora, glabra, bafi gibbofola, dorfo laete, apice vero fubconniventi ex atro viridia, margine fubfcariofa, pelluentia rubella aut violacea: duobus alternis nonnihil majoribus, & quod mirum, unico folummqdo interdum majori. Petala quatuor, aquofe caerulea, ovato-oblonga, obtufa, erefta, integerrima, lineas duas longa: ungue albido refto^ Filamenta tetradynama, capillaria, alba, erefta, petalis breviora: antheris oblongis, flavis, Germen oblongum, ereftim, teretiufculura, glabrum, fenfim ultra petala productum: ftylus breviffimus, cylindricus, albus, perfiftens: ftigmate obtufo, flavicante. Siliqua linearis, oblonga, obtufa, compreffa, torulofa, glabra\ ex atro virens cum admifto viokceo colore, pollicis unius circiter longitudine, fa?pe longior,

Vifa nunc triplici ftirpe Arabi bellidifolia videlicet, Arabi pumila Jacq. (feu fcabra Allion*) & Arabi caerulea, de fpecifica earum differentia dubitationi locus amplius fupereffe non poteft. Habitu omnino diftinguuntur facillime, fed & aliis notis* Arabis bellidifoliae caulis, quam utrique conftanter altior multo, & folia glaberrima nitida pulpofa & fubintegerrima^ Arabis pumilae, ftatura inter utramque mediae, folia radicalia quadruplo niinora, in quavis aetate evidenter fcabra, rigida, caulina laxiora fubhirfuta, flores quoque in minori planta majores. Arabis caeruleae vero, minima ex omnibus, folia quam Arabis pumihe, duplo & triplo majora, obovato-cuneiformia, glabra & apice profundius dentata: nee non flores, quam utrique, pauciores, iidem caerulei, & pedunculi fubincreffati, Denique & locus natalis eis diverfus. Arabis Caerulea glacialium hofpita: Arabis fcabra

bra in dimis atque faxofis, & in editoribus alpium: Arabis bellidifolia vero Temper in humidis, & ad rivulorum latera nascens, faepe in subalpina & montana loca descendens: ut omnine mirer, Illustr. Hallerum de discrimine trium plantarum adeo anxium fuisse. Id cum fummo viro sentio: *Praxiat phntas, cum non plena certitudine veri discriminis inter censum verarum Jilripium confervare: quam inter varietates rekgare difperUuras. Exigua enim curiofitas eji varietatum.*

Definienda vero erit Arabis pumila:

Arabis foliis radicalibus obovatis, subdentatis, obtusis, utrinque scabris: caulinis sessilibus, oblongis, subhirsutis: racemo subnutante.

XXIV.

HIERACIUM TARAXACL

Hieracium foliis lanceolatis, dentatis, glabris: (capo subnudo unifloro, calyce hirsuto. *Linn. Jyjl pag. 716L Altion.flor.ped. torn. 1. tab. 31* fg. 1. bona.*

Picris scapo unifloro hirsuto: foliis glabris femipinnatis, calycibus hirsutiffimis. *Hall hist. torn* Lpag. ia. num. 47.*

Dens Leonis alpinus foliis oblongis, raro dentatis, calyce hispido nigrescente* *Sequier. veron. fuppl pag. 266.*

Herbida fummarum alpium loca, & nivis sensim contabescens filiciduo perpetuo irrigua incolit planta rarior, cum Saxifraga oppositifolia,

Swertia Carinthiaca, Cardamine bellidifolia, Androface villosa, & Aretii. Vidi in plerisque alpibus Salisburgenfibus una cum praecedente, fed humiliori paulum loco: neque vicinae Tyrolenfes in Pregeraten, uti & Schleinitzenfes Leontio ac Uitse ea deftituuntur. Radix perennis, obliqua, fubprsmorfa, fufca, fibris inftru&a perpendicularibus, craffis, teretibus longiffimis & quinquepollicaribus, aquofe flaventibus. Folia radicalia plura in orbem patent, lanceolata, aorta, margine profundefinuatoquedentata, fere pinnatifida, dentibus acutis, inqualibus, remotis & inordinate retrorfum verfis: nunc tota glabra, alias utrinque, aut fuperne folummodo levi hirtutis pubefcentia, in petiolum albidum vaginato planum fenfim attenuata, pollices duos, tres longa, lineas quatuor vel quinque lata* Non defunt tamen & plants fpecimina foliis multo minus, obiterque folium dentatis. Scapus plerumque unicus e centro foliorum radicalium prodit, rarius plures: et hic ereftus, teres, a tribus ad fummum quatuor pollices altus, bafi laete virens, -glaber, prope calycem increffatus tumidus fitulofus, hirtutis nigricans, unicum apice florem fuftinens. Flos magnus, utrinque <equabiliter flavus, diametro pollicem fuperans. Calyx ovato - cylindraceus, ereftus, imbricatus, intra dentem incomptamque hirtutiem totus quantus latens, fere ater: fquamse calycinas plurium ordinum, in^quales, ereftae?, lineari-lanceolatae, acutae, dorfo atrae, hirtutae, apice fcariofae albae: interiores longioribus lineas quatuor, aut paulo ultra longas, lineam latam* Ligulae lineares, oblongae, apice contraftiufculae, atque denticulis quinque minutiffimis inftruftae: tubo recto glabro albo, ultra lineas tres circiter longo. Filamenta breviffima, capillaria, alba: antheris ilavis. Stylus filiformis, ereftus, albus. Stigma bifidum, revolutum flavescens. Pappus (implex, pilofus, leffilis, duplo et triplo feminibus longior. Semina oblonga, globosa, ilriata. Receptaculum planum, nudum.

XXV.

PHYTEUMA HEMISPHERIC[^].

*Phyteuma capitulo Tubrotundo, foliis linearibus fubintegerrimis. Linn, fyjt. pcif**. 2ii_t *Allion.flor.ped. torn. L pag. 115. num. 425,*

Rapunculus foliis linearibus, brafteis ovato-lanceolatis Hall, hift, torn, I. pag* 303.num. 6*19.*

Rapunculus hetnifphasricus. Lam.flor. franc, torn. \$+pag. 331.

Rapunculus montanus gramineus corniculatus Barrel, ic. 523* num. 1.*

Rapunculus folio gramineo. Tournef. infl. pag> 113.

Rapunculus folio gramineo umbellatus Batch, pin* pag. 92. Scheuchz. it% L pag. 47. et it. IV. pag. 340.*

Rapontium alterum anguftifolium alpinum. Column ecph &*pag* &6> Raj. hijt* 745-*

Rapunculus fylveftris umbellatus Carrier, horu ad Thai ic, VIII. num. 3.*

Non rara in altioribus alpium pascuis ficcis, & tenui gramine vestitis. Sic in excelsis supra Judenburg Styris, qua Spitzkogel & Mittagsgogel confcenduntur: ita in Secavienfium & Admontenfium confragro/is L-In altiffimo monte Priel Auftræ (uperioris: neque minus frequens in plerisq; Tyrolenfibus Leantinis, Schleinitzenfibns & Marenwaldenfibus. Radice eftperenni, fublignofa, tereti, fubfufiformi, ramofa & multicipiti faepius, tri-quadripollicari, ex albo fordide flavente, capillitio fuperne fetofa fquamofoque, albido, nitente, a petiolispracedentium annorum coronata. Caulem rarius unicum fedplures fimul plerumque emittit, ereftos, a tribus[^]

quatuor pollicibus & femipede altiores, subangulatos, striatos, glabros, luteo virides, sepe tamen in integrum profundius purpurascens. Folia radicalia conferta, erecta, graminea, linearia, obtusiuscula, alias acuta, integerrima aut perquam raro versus apicem denticulo uno alterove obtuso utrinque notata, superne modice canaliculata, atque in petiolum itidem superne leviter excavatum pollicis unius, aut duorum longitudine sensim angustata: glabra eadem; utrinque lacte viridia, dorso paulo pallidiora, pollices una cum petiolo tres, quatuor longa, caulique in minoribus plantis specimenibus subaequalia, ultra lineas duas circiter lata. Caulina pauca, a duobus ad quatuor, alterna, remota, subcreta aut apice paululum deflexa, basi latiore sessilia, caulemque subamplexantia, ciliataque, quo altiora eo sensim breviora, radicalibus quoque cetera simillima. Capitulum solum terminale, subrotundum, folia plurium ordinum involucri adinstar parte ambiunt & ipsa imbricatim sibi incumbunt: eadem sessilia, ovato-lanceolata, acuminata, glabra nunc aut subhirsuta, margine integra nee non raro subundulata, sed undique-praeprimis versus basin pilis albis dense ciliata, albidam intus concava, lineas quinque & semipollicem longa, lineas quatuor lata. Calyx superus, monophyllus, quinquepartitus, basi angulatus & caeruleus: segmenta linearia, acuminata, erecta, lacte viridia, glabra, corollae segmentis duplo breviora. Basi cujusvis calycis bractea subiacet, linearis aut oblonga, acuta, integra, albida, ciliata, calyce ipso longior. Corolla caerulea monopetala, supera atque quinquepartita: segmentis linearibus longissimis, acutis, basi latioribus ovatis, primo erectis atque superne in tubum incurvum coalitis, tandem distinctis, rotatis, patentibus & subreflexis. Filamenta capillaria, erecta, basi dilatata, alba, ex fundo corollae enata, calyci subaequalia: antheris linearibus, longis, flavis. Stylus crassus, cylindricus, recurvatus, glaber, profunde caeruleus, primo

una

una cum antheris segmentorum tubo inclusus, tandem ultra ejusdem orificium pervodendus, ut fere simili more, ac in Syngenefia, peragatur fructificatio: idem (superne magis crassescens, villosque tenui, purpurascens obfusus, apice trifido* Stigmata revoluta, simplicia. Germen inferum, angulatum* Capitulam & femina non vidi. Floret Julio & Augusto mense. Odor plants nullus.

XXVI.

PHYTEUMA PAUCIFLORA.

Phytelia capitulo subfolioso, foliis omnibus lanceolatis* *Linn, fyft. p. aix**
 Rapunculus foliis obtuse dentatis: bracteis maximis, obtusis. *Rail. hiji. tont. I. pag. 304. num. 680,*

Rapunculus foliis obtusis, spica pauciflora, *Hal'helv. .497.*

Rapunculus alpinus parvus comofus. *Bauh. hiji. torn, II pag. 8''**

Humilis planta, vix triuncialis, praecedente multo infrequentior, ac nonnisi in supremis rupibus summorum alpium hospitans, & in Helvetia Hal-lero teste rarissimarum una. Pauca specimen, ex quibus plantam novi, & ad quae frequentia notavi, inveni in praecipiti dorso alpium Luggavienfium & Kirlichbaumenfium supra Leontium cum Valeriana alpina, Potentilla tJP tida, Anthemide alpina, & aliis summe raris plantis. Est illi radix perennans, obliqua, simplex, sequabiliter teres, sed nodulis hinc inde autta, pennae columbinae crassitie, pollicem unum duos longa, fordide flavens. Caulis, qui folitarius ut plurimum inde prodit, reftus est, aut ascendens, duos ad summum tres pollices altus, satis firmus, iungulatus striatusque,
 pro-

profundius & ex nigro fere purpurascens, inferne glaber, versus superiora subhirsutus, asperiusculus. Folia radicalia plura, petiolata, unciali petiolo, cordato - ovata, obtusa margine quoque obtuse ferrata, aut dentata, rigidiuscula, utrinque leviter hirsuta, subsaepta sesquipollicem aut duos longa, caulemque subaequantia, lineas quatuor vel quinque lata. Caulinum unicum, (rarius duo) sessile, erecto-patens, lanceolato-oblongum, subcordatum, acutiusculum, margine obscure crenatum, unciam unam plus minus longum, tres lineas latum. Variant tamen in diversae aetatis specimenibus, ut nunc perfecte cordata sint, quae alias cordato - ovata aut oblonga: in his acuta, obtusa in aliis, margine nunc manifeste ferrata, alias dentata, & crenata quandoque, ut cum difficultate certi quid statuas. Flores in capitulo terminali, subrotundo, quam in priori laxiores paucioresque profundius caerulei. Bractes capitulum cingentes magnae, acutae, basi lata subrotunda sessiles, floresque arcte amplexantes, margine dentatofinuatae, ciliatae, hirsutae, sive fere longae quam latae: imis duabus suboppositis majoribus, patentibus, flores superantibus. Bractea flores distinguentes, uti calycis quinquepartiti segmenta, linearia sunt, acuminata, ciliato - hirsuta. Stylus corollae segmenta superat, superne pubescens, incrassatus, bi- nec non trifidus, Reliqua fere uti in precedentis affini specie.

XXVII

CERASTIUM STRICTUM.

Cerastium foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris tomentosis, capsulis globosis. *Lim. Jyfl.* pag. 436.

Myofotis foliis linearibus glabris. *Hall. hist. torn. I pag.* 390. *mm* 891. ft* »4. sub titulo Myofotis alpina angustifolia.

-Caryophyllus hololleus alpinus gramineus. *C. Bauk prddr.* pag. 104.

AHine alpina subhirfuta linarias folio. *Schatchg. it. II.* pag. 130.

^ Nil liberius hac P^lanta in omnibus fere alpibus, quas peragravi, *edit* ts aprils, duri[^]axofisque locis. Radix longa est, teres, gracili[^], ramofa, mulfeSiffif, fordide albens atque fibriIIis sparsis a u a frequentibus. Caulium ea integros cespites fundit: ii quaquaverf[^] diffusi, procumbentes fibique vario mudo intertexti, teretes, ad polJicis unius gut duorum circiter intervallum a radice omnes una cum *Mils* exfucci, aridi, fcariofi, fragiles & ftraminei: inde quotannis revivifcentes virent, foliofi atque ramos -sparsim emittunt, fuperne quam ima bafi craffiores, debiles, ascendentes & c procumbent! veluti ereos, quinquepollicares, ferriipedales & ultra, geniculatos, larte virid«, glabros, fuperne pubefcentes & vifcidulos, longe nudes femelque dichotomos. Ramuli breves, fteriles, denfiu₄ iolipfi, tot fere *ex* axillis fol[^]onim prodeunt, quot foliorum ad genicula oppofitiones. Folia oppofits, bafi connato-iefilia, inlegerrima, acuta, utrinque late vinda, glabra aut fubpubcencia, margine leviter ciliata, pollicem unum circiter longa: qu« ramos fteriles obfident, angufto-linearia font, rigidiu- fcula, fibi adproximata, ftria_a acuminata, lineis exarata ultra lineam la-

XXVII.

*

CERASTIUM STRICTUM.

Cerastium foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris tomentosis, capsulis globosis. *Linn. Jyfl. pag. 43d.*

Myofotis foliis linearibus glabris. *Hall, hifl* torn. 1. pag. 390. num. 891. tab. *4, sub titulo Myofotis alpina angustifolia.*

Caryophyllus holofleus alpinus gramineus. *C. Bauh prddr. pag* 104,*

Alpine alpina subhirfuta linariee folio. *Sclieuchz, U. II pag. 130.*

^^*^MiI nberius hac planta in omnibus fere alpibus, quas peragravij editis apris, diu^Iaxofii que locis. Radix longa est, teres, gracilis, ramosa, niulfics^lis, fordide albens atque fibrillis /parfis aufa frequentibus. Caulium ea integros cepites fundit: ii quaquaverfup difFufi, procumbentes fibique vario modo intertexti, teretes, ad pollicis unius aut duorum circiter intervallum a radice omnes una cum foliis exfucci, aridi > fcariofi, birgiles & flaminei: inde quotannis revivifcentes virent, foliofi atque ramosi, fparfim emittunt, (uperne quam ima bafi craffiores, debiles, afcendentes & e procumbenti veluti ereRos, quinquepollicares,, feniipedales & ultra, genicuiatos, lfftevirides, glabros, fuperne pubefcentes & vifcidulos, longe nudes femelque dichotomos, Ramuli breves, fteriles, denfius, foliofi, tot fere ex axillis foworum prodeunt, quot foliorum ad genicua oppofitiones. Folia oppoiit3 , bafi connato Itffilia, integerrima, acuta, utrinque lite viridia , glabra aut fubpubekentia, margine leviter ciliata, poliicem unum circiter longa: quse ramos iteriles obfident, angufto-linearia Junt, rigidiufcula, fibi adproximataj (trifta, acuminata, lineis exarata ultra lineam la-

ta: ilia vero ad tumida cauliculorum aut ramorum florigerorum genicula pollicis unius intervallo a se invicem remota, lanceolata, triplo & quadruple* illis latiora, oppositionum quatuor aut quinque circiter. Flores terminales pro plants habitu satis magni, albi, in pedunculis ex ramorum dichotomia enatis, inaequalibus, erectis, plus minus pollicaribus, pubescentibus, binis plerumque aut ternis (variant enim) in ejusdem rami partialis summitate, iubunifloris* Dichotomis subjacent bracteae duae oppositae, lineari-lanceolatae, erectae, acutae, lineas tres circiter longae: feminae sed minores in pedunculi longioris medio haerent: tres vero sunt adfines pedunculi, duo laterales his gaudent & intermedius plerumque brevior illis destituitur, Rarius unus alterve pedunculorum modice reflectitur* Calycis pentajugae foliola lanceolata, acuta, erecta, ex incano viridia, pubescentia, marginibus albidis, pellucida, fere cinerea, lineas duas longa, lineam angustiora. Petala ampla, alba, patentia, obovata, ad medium fere bifida, calyce duplo majora, unguiculis brevi, flavicante inserta. Filamenta decem, inaequalia, erecta, fimbriata, alba, petalis multo breviora: antheris incumbentibus, ovatis. Si. ex albo luteolis. Styli quinque, filamentis breviores, albi, filiformes, reflexi. Stigmata simplicia. Germen ovatum, obtusum. Capsula ovata, obtusa, erecta, unilocularis, apice dehiscens* Semina plurima, plana, fere rotunda, fusca. Odor nullus.

XXVIII

GENTIANA PROSTRATA. Tab. 17, fig. 2,

Gentiana corollis quinquefidis, caulibus unifloris prostratis: foliis obtusis fimbriatis.

^^

Nul-

Nullam plantula in scriptis veterum reperio mentionem, neque ulli recentiorum ad hunc diem usque innotuisse constat. Rara habitat in jugis nivosis alpium *Kartal & Frosnkz*, principalis Salisburgensis, longe supra glaciales valles cum *Laferpitio simplicis*, *Astragalo campestris*, *Swertia cacinthiaca* & *Cynofuro sphaerocephalo*: nec viva alibi. Annua ei radix, gracilisvalde, fere capillaris, recta, simplicissima, vix pollicans, albida aut aquose flavens & amariflula. Cauliculi ex ejus capite prodeunt plures, a tribus ad decem & duodecim usque, simplicissimi, ima basi coherentes, diffusi in orbem, prostrati, pollicares sesquipollicaresve nec ultra, obscure geniculati terete, crassifluli, molles, subpulposi, foliis dum juniores indique obtusi, glabri, aquose virentes, superne ex atro ceterifcentes & juniori ore terminati: rarius ramulus unus alterve sterilis, foliosus cum prioribus unilateris in minoribus aut junioribus quoque individuis intricatim fibi incumbunt, in adultioribus jamjam frutescentibus cum caule tantillum elongato laxiflula & fibriflota: caeterum alterne opposita, basi articuli & e decubenti veluti subamplexicaulia, ovata, obtusifolia, integerrima, mollia, pulposa, glabra, fature viridia, cauli adpressae, superne carinata, duas tresve lineas longa, lineas duas circiter lata. Flos quoque in cauliculo unicus, terminalis, creruleus, subascendens aut erectiflulus, in axillis pariteris foliorum in foliis, ipsum caulem longitudine subaequans. Calyx monophyllus, tubulosus, pentagono-pyramidalis, apice leviter ad unam sextam circiter partem quinquefidus, glaber, infunde viridis, corolla duplo brevior: segmentis lanceolatis, acutis, tubo corolla adpressis, apice marginibique albidis & pellucidis: prominent manifesti anguli ad latera. Corolla monopetala, tubulosa, infundibuliformis, intaximam partem cava, splendide (ole in limbum expanditur breviflora quinquifida): laciniis brevibus, aequalibus, lanceolatis, acuminatis, ere-

squamis a petiolis praecedentium annorum imbricatis, tabidis, fusco-ferrugineis dense opertam, in deque turn i dam, basi vero fibris longissimis, teretibus, ramosis, concoloribus radicatum. Caules ea confertim plures & cepitose colle&os plura inter radicalia folia fundit, laxos, debiles, adscendentes, a iempede & pedem unum longitudine superantes, valde compressos, fere ancipites, leviter hirsutos, latere uno virides, altero profundius rubentes, foliis rariter obfitos & paucifloros. Folia radicalia longe petiolata, quinata; foliolis sessilibus, obovatis, margine incise-ferratis, obtusis, late viridibus, utrinque led dorso praeprimis hirsutis, pollicem unum, plus minus longius, ultra femipollicem latis: intermedio reliquis majori: petiolo gracili, debili, supra modice canaliculate, quadri- aut quinquepollicari, late viridibus & subhirsuto. Folia caulina duo ad summum tria remota sessilia: supremo sessilibus, inferioribus ternatis: foliolis subaequalibus, cuneiformibus, obtuse profundeque ferratis, caulinis caeterum sessilibus. Stipulae dux, oppositae, erectae, ovatae, acutae, integerrimae, rarius dente uno alterove superne instructae, hirsutae. Flores elegantes, aurantiaco-flavi, pauci ad tres fere, saepe unicus, in pedunculis terminalibus, simplicibus, unifloris, subaequalibus, hirsutis, pediculis unius duorumve longitudine, duobus plerumque in medio bractea tripartita instructis, tertio aut folitario quoque subnudo. Calycis decaphylli foliola alterne majora, patentia, ovato-lanceolata, acutiuscula, subdentata, petalis floris breviora, late viridia & hirsuta. Petala quinque, utrinque aequabiliter ex aurantiaco-flava, subcordata, obtusa, integerrima, patentia, ungue concolore brevi donata, lineas tres longa tantumdemque circiter lata, sed paulo fere latiora. Filamenta plurima, brevissima, inaequalia, capillaria, erecta: antheris ovatis flori concoloribus. Styli itidem plurimi, erecti, fili-

fquamis a petiolis pracedentium annorum imbricatis, tabidis fusco-ferrugineis dense opertam, indeque tumidam, basi vero fibris longissimis, teretibus, ramosis, concoloribus radicatam. Caules ea confertim plures & cepitose colle & plura inter radicalia folia fundit, laxos, debiles, ascendentes, a semipede & pedem unum longitudine superantes, valde compressos, fere ancipites, leviter hirsutos, latere uno virides, altero profundius rubentes, foliis rariter obflos & paucifloros. Folia radicalia longe petiolata, quinata; foliolis sessilibus, obovatis, margine inciso-ferratis, obtusis, laete viridibus, tritricque led dorso prapriinis hirsutis, pollicem unum, plus minus longis, ultra semipollicem la(is: intermedio reliquis majori: petiolo gracili, debili, supra modice canaliculato, quadri- ant quinquepollicari, l&te v^di & subhirsuto. Folia caulina duo ad summum tria remota infertilia: supremo vniul>^rpt:inatifido, inferioribus ternat is: foliolis subaequalibus, cuneiformibus, obtuse profundeque ferratis, caulinis ceterum similibus. Stipulx dus, oppositae, erectae, ovatae, acutae, integerrimae rarius dente uno altero^Te superne infertis, hirsutae, Flores elegantes, aurantiaco-flavi, pauci ad tres fere, saepe unicus, in pediculis terminalibus, simplicibus, unifloris, suberectis (ft subaequalibus) hirsutis; pollicis^A longitudine, duobus plerumque in medio bractea tripartita infertis, tertio aut folitario quoque subnudo. Calycis decaphylli foliola alterne majora, patentia, ovato-lanceolata, acutiuscula, subdentata, petalis fioris breviora, laete viridia & hirsuta. Petala quinque, utrinque aequabiliter ex aurantiaco-flava, *obcordata, obtusa, integerrima, patentia, ungue concolore brevi donata, lineas tres longa tantumdemque circiter lata, sed paulo fere latiora, Filamenta pluriina, brevissima, inaequalia, capillaria, erecta: antheris *ovatis flori concoloribus. Styli itidem plurimi, erecti, fidi-

speciei censuerit. At profecto copiosa, quae in diversa alpium elevatione
 •tfdi plants specimen, edocuerit, omnes tres ejusdem plantae fuisse ico-
 nem, & si quid discriminis inter eas adpareat, id inde solummodo profi-
 cifci, quod ab individuis, pinquiori fertiorive, humiliori aut elevatoma-
 gis natali loco, enatis, fuerint desumptae. Habeo, quae speciosam & opti-
 mam Oederi iconem caelitie & magnitudine partium omnium longe (uperant,
 fed & aKa intercurrunt Linnsi atque Halleri minus bonis iconibus, longe
 humiliora & inconspicua magis. Omnibus tamen caulis imus bulbosus Saty-
 rii Epipogii fere in morem, constans nota & Pediculari flammeae solum pro-
 pria, quamque vel iconibus laudatiffimorum virorum expressam videas, vel
 M descriptionibus veram accurate notatam: corollas denique omnium unus
 ^demque color est & galeae apex nigro-purpureus, ut dubium de plantae
 identitate superesse^offit nullum. Id quoque frequenti observatione constat
 alpinas Pedicularis vix ac ne vix quidem variare coloribus, nisi intensitatis
 gradu coloris ejusdem velis, ut eo solo complures, inter quas similitudo in-
 tercedat, a se invicem probe distinguas. Non alio in Sudetismontibus Bo-
 hemia* quam incarnato colore vidi myriades Pedicularis hirsutae, cujus Il-
 lustratione Linnaeus in flor. lapp. asque malam, ac Pedicularis flammeae dederat
 iconem: non alio videas quam ochroleuco Pedicularis scariosae & triflorae
 purpureae Pedicularis recutitae, ut jam Linnaeus de hac coloris constan-
 tia convittus, singulis speciebus adeo follicite addiderit floris colorem in
 Mantissa altera plantarum pag. 415. magno distinguendis speciebus commo-
 do* At qui facti fuerit, quod Pediculari flammeae, cui ex propriis ver-
 h>s>.cui ex omnibus allatis synonymis flavus aut fubinde, quod ipse vidi,
 leviter in fulvum vergens color, in Mant. loc. cit. atropurpureum tribuerit,
 non conspicio. Is error ex Mantissa in ultimas systematis vegetabilium edi-
 tiones tranfivit, ut qui coloris rationem habeat, eas Pediculari flammeade-
 titu-

speciei censuerit. At profecto copiosa, quae in diversa alpium elevatione
 terti plantae specimina, edocuerit, omnes tres ejusdem plantae fittere ico-
 nem, & si quid discriminis inter eas adpareat, id inde solummodo profi-
 citur, quod ab individuis, pinquiori fortiorive, humiliori aut elevatoma-
 gis natali loco, enatis, fuerint desumptae. Habeo, quae speciosam & opti-
 mam Oederi iconem caelatis & magnitudine partium omnium longe superant,
 sed & alicui intercurrunt Linnaei atque Halleri minus bonis iconibus, longe
 humiliora & inconspicua magis. Omnibus tamen canis imus bulbosus Saty-
 rii Epipogii fere in morem, constans nota & Pediculari flammeae solum pro-
 pna, quamque vel iconibus laudatissimorum virorum expressam videas vel
 in descriptionibus perquam accurate notatam: corollae deique omnium imus
 deorsum color est & galeae apex nigro-purpureus, ut dubium de plantae
 identitate superest. Id quoque frequenti observatione constat, alpinas
 Pedicularum flores vix ac ne vix quidem variare coloribus, nisi intensitatis
 gradu coloris ejusdem velis, ut eo solo complures, inter quas similitudine
 cedat, a se invicem probe distinguas. Non alio in Sudetis montibus Bo-
 hemiae quam incarnato colore vidi myriades Pedicularis hirsutae, cujus U-
 lustriss. Linnaeus in flor. lapp. jeque malam, ac Pedicularis flammea; dederat
 iconem: non alio videas quam ochroleuco Pedicularim sclofam & trite
 purpurascenti Pedicularim recutitam, ut jam Linnaeus de hac coloris constan-
 tia convidus, singulis speciebus adeo follicite addiderit floris colorera in
 Plantarum altera plantarum pag. 415. magno distinguendis speciebus com-
 modo. At qui fastiditi fuerit, quod Pediculari Banimes, cui ex propriis ver-
 biis cui ex omnibus allatis synonymis flavus aut subinde, quod ipse vidi,
 leviter in fulvum vergens color, in Mant. loc. cit. atropurpureum tribuerit,
 non conspicio. Is error ex Mantii in ultimas systematis vegetabilium edi-
 tiones tranfivit, ut qui coloris rationem habeat, eas Pediculari flammeae-

ffitu-

viridibus, fhiisque uti totus calyx jpurpurafcentibus piftis. Corolla ringens, ipeciofa, citrina, flavedine nunc paulo dilutioni aut in planta pygmaea ex flavo leviter in fulvum vergente, a quo flammeae nomen derivatum lupicor: tubus albus, cylindricus, ereftus, longitudine calycis: labium fuperius ere&um, compreffum, apice obtufo, bifido, parum deorfum inclinato & nigro-purpurafcente: vidi tamen & intermiftim flores galeae apice vel leviter folium cmarginato, vel plane integro. Labium inferius trilobum, lobis lateralibus majoribus, fubrotundis, margine crenatis: ad faucis perviae riftum prominently dux laterales fukum intercipiunt a medio & minori labii inferioris fegmento, in faucem usque produ&um. Stamina quatuor: filamenta didynama ex tubi bafi enata, capillaria, alba, inclinata, labii fuperioris longitudine: anthers galeae inclufae, incumbentes, ovatae, ex albo flavicantes, in medio .macula atra fubrotunda notata. Stylus filamentis aequalis, fufcruis, ex albo purpurafcens: ftigma obtufum, inflexum, fxpius ultra galex apicem exfertum. Capfula oblonga, bilocularis, obliqua, apice recurvo dehifcens, ienfim maturefcentibus feminibus ultra calycis tumidi fegmenta produ&a. Semina plurima, ovato-oblonga, glabra, cinerea, afpera. Odor nullus.

XXXL

ANTHEMIS CORYMBOSA.

Anthemis foliis fubbipinnatis linearibus acutis: caule fimplici ere&iufculo villofo: petalis obovatis obtufiffimis tridentatis.

Anthemidi alpinaevalde adfinisj>lanta & earumdem cum Potentilla
 Salisburgenfi alpium hospita, naicitur in fterilibus, fabulofis, humentibus-,
 ad pedem fcopulorum glacialium, atque rivulorum ex iisdem undique pro-
 pullulantium fequitur latera. Medium quaii Achilleas inter & Anthemides
 tenet locum & profe&o facile incautior inter Anthemidis alpinas relegaret va-
 rietates, ui nefas foret & legibus Philolophiae botanicae adverfum, corym-
 bofam plantam cum fimili conftanier uniflora, ad fastidium mihi in vicinis
 alpbus viva, confundere. Radice eft perenni, obliqua, tereti, lignefcen-
 te, pennas columbinse craffitie, quadri- & quinquepollicari^ fordide flaven-
 te aut fufca, fibris lateralibus iparfis & his fibrillofis, perpendiculariter de-
 milfis firmata. Caulis ex eadem radice unicus (qui Anthemidi alpinse multo
 fwquentiores) bafi leviter reclinatus, hinc afcendens, ereftiufculus ^ a^jui-
 tuor ad decem & ultra pollices altus, teres, fubtiliter ftriatus^ villofus,
 aquofe virens, bafi vero & in fummitate rubellus, corymho flcroim Achii-
 laearum in morem terminatus. Folia radicalia plura fafciculatim collefta,
 petiolata: caulina alterna, fubfeffilia: omnia in planta juvene villofula, in
 adultiore villo omni dejefto glabra, pollices duos tresve longa, unum cir-
 citerlata, & fubbipinnata: pinnis alternis, linearibus, anguftis, mucrona-
 tis, ereftis, nunc integris alias repetito-dentatis, bi- trifidisque: nervo
 communi foliaceo, latefcente, & fubamplexicaulū Flores terminates, co-
 rymbofi, magni^ fpeciofi, nivei candoris^ ut eminus feffe prodant, a quin-
 que ad decem usque. Pedunculi fimplices, inaequales, erefti, teretes, ftria-
 ti, lanuginofi, ex incano virides, plus minus pollicares, -uhiflori, rarius bi-
 flori: inferiores intermedio, principe & craffiori, paululum altiores. Calyx
 hemifphxricus, .ex atro virens, fubvilloius, fquamis plurium ordinum in-
 a^qualibus, imbricatis, ereftis, fibique arfte adpreffis, lanceolatis, acu-
 liufculis, medio virentibus, rtargine apiceque fcariofis, atris^ Radii femi-
 nini

niniligula feptem ottove numero patent, obovatae, obtufiffimae, intfcgrse aut obtufe tridentatas, fubtiliter-ftriatae, lineas tres circiter longs, linea latiores. Flores di(coidei tubulofi, albi, quinquefidi, iegmentis lanceolatis, acutis, integris, patentibus: tubore&o, cylindrico, glabro & ex albo vi-rente. Filauienta breviffima, albida, fubcoalita: antheris fulvis* Stylus ftliformis albus, ultra antherarum tubum produ&us: ftigmata duo revoluta, alba: difci area a polline antherarum ex albo fulvoque varia. Receptaculum conicum, paleaceum: paleis lanceolatis, acutis, planis, ereftis, albis, apice margineque fuperiore nigris. Semina absque pappo. Debilis floribus odor. Inter ultimas Augufto in finem vergente floret*

XXXII

GENTIANA BAVARICA.

Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi ferrata: foliis ovatis obtufi*.

Unn.JyJl. pag. a68» Allion.flor. ped. torn. I pag. 98. num. 358. Jacq cbf. bot.fafc. II. tab.?i, ?*

Gentiana foliis ovatis, caule unifloro. *Halt, UJl, torn, I. pag. 287. num. 645, Hall, goett. peg. aoo.*

Gentiana elegantiffima Bavarica. *Cam. harU pag. 6\$. tab. 15. num. s» Barrel is, NI.*

Grata vifui planta copiofe provenit in omnibus fere editioribus alpi-bus Tyrolenfibus & Saluburgenfibus, ad nivis contabefcentis oras: at nus-piam vilauberior, quam in faepe laudatis Judenburgenfibus Styriae, locis udis humeelis & ad featurigines fontium, quas una cum Saxiiraga autumnali

denfia cespitibus ornat Radix gradlis, an annua? subhorizontalis, geniculata, fibrosa, albida aut flavescens & amariufcula, plures in suo decurfo emittit caules ramosque steriles & foliosos. **III** mine profrati & diffusi in orbem, alias procumbenti ascendentes & subere&i, quadri- aut quinquenciales, angulofi, glabri, albidi aut aquose rubelli, foliofi, paribus foliorum septem, octo aut pluribus, fingulis apice unicui florem gerentibus. Folia conjugata, ovata, obtusiflima fereque subrotunda, integerrima, crassiuscula, laevia, subnitida, quatuor circiter lineas longa, ultra duas lata: radicalia confertiora adproximata & in rofulas expanla, caulina laxiora remota, fupremo pari sub ipfo ftatim flore feffili. Flos terminalis unicus amabilis coloris eleganter caerulei coelestis, pluvio aut nimbofo Jove arte claufus. Calyx dimidio corolla tubo xqualis, quinquangularis, apice ad unam circiter tertiam longitudinis partera quinquefidus, glaber, ex atro caerulefcens aut violaceus, fegmentis subplicatis, lanceolat/s, acuminatis & ereftis. Corollae monopetalae infundibuliformis & quinquefidae fegmenta patent, ovata, acuta, integerrima aut emarginata subferratave ("ita variant) concaviufcula, quatuor circiter lineas longa, duabus latiora. Inter duo quaque fegmenta dens triangularis ereftus subbifidus, & ex albi caeruleus interjicitur: tubo longo, cylindrico, fenfim dilatato, subtiliter ftriato, bafialbido, fuperne violaceo. Filamenta quinque tubi fere medio inferta, eoque paululuoj breviora, capillaria, alba, erefta: antheris oblongis flavis. Germen oblongum, subangulatum, ereftum, ex flavo virens, fenfim ultra .tjibMOficium produ&um: ftylus breviffimus compreffilis aquose caeruleus: ftigmate capitato oLtuio. Nullus odor: floret Julio & Augufto.

XXXIIT,

CYNOGLOSSUM SYLVATICUM.

Cynoglossum ftaminibus corolla brevioribus: foliis lanceolatis, asperis, planis, subseffilibus, remotis*

Cynoglossum foliis planis, seffilibus, elliptico-lanceolatis, asperis. *Hall. hist* torn. I. pag. 260. num. 588**

Cynoglossum folio virenti. *\$. Bauh. torn. III. pag. 600. Rup.jen. pag. 12.*

Cynoglossum sylvaticum Hercynicum. *Thai.pag. 31^*

An Cynoglossum sylvaticum rubente caule. *C. Cauh* p. 257. Pluk. almag. pug. 126.?*

Cynoglossa montana media rubro flore. *Column, ecph. pag. 175. tab. 174.*

Nascitur in Auftria inferioris, sylvis montosis editioribus umbrosis atque humentibus non rara, cum Serapia enifolia, Hyperico hirsuto & Stachy sylvatica, facie habituque omnino uti & aliis notis a Cynoglossum officinale diversa; ut cum Hallercj, Ruppio & aliis pluribus viris gravissimis separaverim. Tota lsete viret, aspera atque omni tomento illo albido Cynoglossum officinale destituitur. Radix ei biennis, obliqua, tres quatuorve uncias longa, teres, subnigrescens, extus ex fusco nigricans, albida intus, ex utroque latere petiolorum priorum annorum superne tetra. Caulis folitarius altero tertio anno inde prodit, erectus, cubitalis, bipedalis, & in unum altior, rectior, gracilior, foliisque multo laxius quam in Cynoglossum officinale obitus, teres, profundius striatus, ex rubello virens, inanis, villis albidis hirsutus, asper, in ramos superne plures fecedens, alternis axillares, erectos, subnudos, folio longiores, apice floriferos caulique fim-

XXXm.

CYNOGLOSSUM SYLVATICUM.

Cynoglossum ftaminibus corolla brevioribus: foliis lanceolatis, asperis, plantis, subterribus, remotis.

Cynoglossum foliis planis, fessilibus, elliptico-lanceolatis, asperis. *Hill. hiji> torn. I. pag. 260. num. 588**

Cynoglossum folio virenti. *ff. Beak torn. III. pag. Coö. Rupjen. pag. 12.*

Cynoglossum sylvaticum Hercynicum, *Vmlpag. 31.*

An Cynoglossum sylvaticum rubente caule, *C Cask* p- 257. Pluk. almag, pag. 126.?*

Cynoglossum montana media rubro flore. *Column, eph. pag. 175. tab. 174.*

Nascitur in Aufrix inferioribus, sylvis montosis editioribus umbrosis atque humentibus non rara, cum Serapia ensifolia, Hyperico hirsuto & Stachy sylvatica, facie habituque omnino uti & aliis notis a Cynoglossum officinali diversa; ut cum Hallerq, Ruppio & aliis pluribus viris gravissimis separaverim. Tota laete viret, aspera atque omni tomento illo albido Cynoglossum officinalis destituitur. Radix ei biennis, obliqua, tres quatuorve uncia longa, teres, subterribens, extus ex fusco nigricans, albida intus, exuberans, petiolorum priorum annorum superne testata. **Caulis** foliatus altero setatis anno inde prodit, erectus, cubitalis, bipedalis, & in juvenium altior, rectior, gracilior, foliisque multo laxius quam in Cynoglossum officinali obfusus, teres, profundius fissus, ex rubellovirens, inanis, villis albidis hirsutus, asper, in ramos superne plures fessens, alternos, axillares, erectos, subnudos, folio longiores, apice floriferos caulique fimi-

XXXIV.

CAMPANULA PUSILLA.

Campanula foliis omnibus ferratis: radicalibus cordlato-ovatis, fitaris, niti-
dis: caulinis linearibus, alternis, remotis.

Campanula foliis radicalibus, cordatis, ferratis, caulinis linearibus. *HaR.*
hifl. torn. 1. pag. 699, num. 702.

Campanula alpina rotundifolia minor. *C. Bauh. prodr. p. 34.*

Campanula rotundifolia minima Cafparis Bauhini. *Seguier.fuppl.pag. 105.*

Campanula alpina linifolia caeruleo flore unico, pentagono, grandi in fum-
mo cauliculo. *Scheuchz. it. IV. pag. 454. jig. 4,*

Campanula parva rotundifolia, flore caeruleo pentagono grandi. *Ejusd; it,*
11. pig. 131.

Eadem fere plantulae formofe fata, quae Orcliidibus fufca & variega-
ta Jacquinii & Cercopithecae Sibthorpii, diverfifimis certe fitiribus, quae
nihilominus perquam longo tempore inter Orchidis militaris latuere varietates,
& nuper tandem recentiffimis fummorum virorum obervationibus jure
fuo potitae, ac propriis rTominibus publici juris faftz. Sic quoque Campa-
nulae rotundifolia; titulo a Linnaco non unam fed tres vere diftintas fpecies
(miffis^uribus plantarum polymorpharum 'varietatibus) comprehenfas fuiffe
"fis eviftum 5ft, ut alteram jam beatus Scopolius Campanulas linifoliae no-
mine a Linnaeana fitirpe divulferit, alteram vero ego Hailerii exemplo quo
jure non potuerim non ieparare. Alpium editiorum etfi proprie hofpita fit,
tamen & ad rupes fubalpinas defcendit, & torrentum alpinorum inundatio-
nibus eluta, copiofiffima quoque provenit atque late vegetat in arenofis I(o-

XXXIV.

CAMPANULA PUSIIXA.

Campanula foliis omnibus ferratis: radicalibus cordato-ovatis, firmis, nitidis: catilmis linearibus, alternis, remotis,

Campanula foliis radicalibus, cordatis, ferratis, caulinis linearibus, *Hall. ki/i. torn, I. pag, 6\$y, num. 702.*

• Campanula alpina rotundifolia minor. *C Bauh, prodr. p. 34.*

Campanula rotundifolia minima Caspatis **Bauhini**. *Seguter. fuppL pag. 105,*

Campanula alpina linifolia csruleo ilore unico, pentagono, grandi in fumo cauliculo. *Scheuchz. it. IV.pag. 454.jig. 4.*

Campanula parva rotundifolia, flore caeruleo pentagono grandi. *EjUSD. it* II. pag. 131.*

Eadein fere plantube formofe fata, quæ Orcliidibu.? fufcæ & variegata Jacquini & Cercopithecae Sibthorpii, diverfiTimis certe ftirpibus, quæ nihilominus perquam longo tempore inter Orchidis militaris latuere varietates, & nuper tandem recentitTtmis fumorum viroruin oblervattonibus jure fuo potitE, ac propriis iTominibus publici juris fafff. Sic quoque Campanulas rotundifolis titulo a Linnaeo non imam fed tres vere dUYmfras fpecies (miffis^uribus plantarum polymorpharum varietatibus) comprehends fuiffe ~Tais eviftum &1, ut alteram jam beatus Scopoli Campanulae linifolia; nomine a Linnseana ftirpe divulferit, alteram vero ego Halleri exemplo squo jure non potuerim non (eparare. Alpium editiorum etfi proprie hofpita fit, tamen & ad rupes Tubalpinas defcendit, & torrentum alpinorum inundationibus eluta_f copiofilima quoque provenit atque laete vegetat in areuofis Kola;

Is Dravique adfitis campis, retento tamen ubique pufillo & pygnaeo habitu. Radice p̄jedita eſt perenni, tenui, tereti, fibrofo-ramoſa, fordide albente, & multicipite. Caules inde plures ceſpitoſe colle&i annuatim prodeunt, ere&i, a tribus ad quinque fumum incias alti, teretes, graciles, ftriati, profunde aut ex atro virentes & toti quanti glabri. Folia radicalia in qua-
 vis plants aetate numeroſa adfunt, dum omnibus Campanula linifolia ſubflo-
 reſcentiæ fladio deſtituatur: atque hxc in orbem ſparſa, petiſjloque infru-
 cta ſuperne canaliculato, glabro, laeteviridi, plus minus unciali: quoad
 formam cordato-ovata funt, ſepe rhomboidea, acuta, margine ſuperiore ar-
 gute ferrata, firma, glaberrima, nitida, facie Iſte viridia, dorſo pallidio-
 la, iemiuncism fere longa, ſed eo anguſtiora. Caulina alterna, remota,
 creſco patentia, acuta & conſtanter acute ferrata: inferiora lanceolata ſub-
 petiolata, ſuprema ſeſſilia linearia. Flores aquoſe cſrulei intus pallidiores,
 larius albi, amoeni, pro plantae magnitudine magni, ſed pauci, a duobus
 ad quinque, racemoſi, pedunculis inaequalibus filiformibus, primo ereois,
 dein nutantibus[^] glabris, fature viridibus, unifloris, unciam unam plus mi-
 nus longis, atque brattea una aut duplici ſupra medium fetacea infru&is.
 Nee tamen raro unicus ſolummodo flos ſingulos cauliculos terminat, Caly-
 cis monophylli quinquepartiti laciniae lineari-fetaceae, acutas, ereſta, pro-
 funde, Di totus calyx, virides atque corolla triplo breviores. Corolla mo-
 nopctala, campanulata, ore quinquefida: ſegmentis ovatis, acutii, integer-
 rimis» patentibus. Filamenta brevifllma capillaria: antheris linear! oblon-
 gis ereſtis luteis. Germen inferum quinquangulare: ſtylus filiformis, ere-
 liuſj ſtriatus, glaber, pallide caeruleſcens, trifidus, corollis fere longitu-
 dine; ſtigmata tria, obtuſa, cralHufcula. Confrantiores diſcriminis notas
 attentiori examine erutas hie ſubjungere lubet plantis tribus, habitu omnino
 diverſiffimis, diſtinguendis ſufficientes:

Cam-

Campanula (rotundifolia) foliis glabris: radicalibus reniformibus, ferratis, flaccidis: caulinis spaiſy, lanceolatoUnearibus, integerrimis.

*

Campanula (Hnifolia) foliis fublurfutis: radicalibus obovatis, fubrotundis,, ferratis: caulints confertis, linearibus, integerrimis: dentibus cafycinis fetaceis.

Hæc duris, petrofis & apricis locis vallium alpinarum provenit, illa vulgatiffima in umbrofis fylvarum atque rupium planitiei.

XXXV.

CAKXX ALBA.

Car ex fpica mare terminali, oblonga: femineis duabus linearibus, fiorentibus ereftis, fiu&iferis pendulis: vaginis pedunculorum, fquamisque floralibus tumidis, fcariofis argenteis: culmo fubnudo vaginofe: foliis fubfetaceis, capfulis globofis mucronatis, radice reptante. *Mion.flor.*

Cacex fpicis femineis raris, petiolatis teretibus acutis, marem fequantibus.

Hall hiſt. Lorn. 11. num. 1377. Ball, enum 236. num. 9.*

•Cyperoides polyftachyon minimum, fpicis per niaturitatera albicantibus, *Seguier. vtron.fuppi pag. 82. num. 11.*

Cyperoides foliis tenuilHinis, caule fubtriquetro , fpicis • ex ignis albicantibus pediculis longis infidentibus: capful is tuibinatis rotundo- triquetris lutel'centibus, in apicem tenuiflimum una prſcipue parte opertum coaifiztis, *Mick. noy. gen. pag. 65. num. 79.*

Gramen cyperoides exiguum, feminibus bullatis. *HuL p.* 118. *tab. 9^a fig.* «
Gramen fylvaticum fpicatum anpftifolium, fpica alba. *C Bauh. Scheuc z,*
agrojl pag. 140. *tab. 10 fig.* 4. 5.

Primo vere floret abunde novum gramen in Auftrie inferioris pinetis montofis, ficcis, fuura *Medling. Schubl. & in tafa ill.* ^{m^i u^tu.} apr. n-
tis rariflimisdivite, ifaidemque jam longe antea ab ffloftr. a Mygind & a
clar. Schiverek lefta. Longe per terram ejus ferpit radix horizontal! dire-
aione, perennis, teres, penna columbina craffitie, fquamis undique vagi,
nantibus fufcis aut nigricantibus operta, culmosque florentes folitarios aut
aggregatos, plures inter foliorum falculos, perpendiculariter eidem om-
nes infittentes, producit. Folia & in fafciculis, m.mero varia, & ilia ad
culmorum exortum, bafit vaginis imbricatis, itriatis, aridis & fufcefcentibus
obvoluta, ereaa, anguftiffima fereque fetacea # attamen medio fuperne ca-
naliculata atque in mucioneoi acutiHimum fenfim attenuata: glabra caterum,
utrinque late viridia, fiibtiliter ftriata, marginedigitisdeorfumduftis quam
minutiffime ferrulata, a *trihvs* ad novem & ultra uncias longa: culmo floren-
tecundemfubsquant&latiorafunt, state poftea fenfim elahgata fuperant
eundem, tnultoque anguftiora eyadunt. Culmi inter hzc plures plerumque
fimulprodeunt, tenues, erefti, femipedales, altiores etiam, bafi albidi va-
ginbqut'fuiiormnTcarioTis, ampiexantfbus, adunam tertiam circiter altitu-
dinispartem obfiti: iidem obfcure obtufaque rrigom, glabr^k/tV^M^,
vix vifibiliter ftriati, enodes, nee nonaifi ft.perne ad fpicarum exortum ge-
nicelloduplici, *Ixvi*, tumidulo inftruai. Vagina peculiaris, cylindrica,
culmo arfle obvoluta, unciali aut biunciali intervallo, fuffum continuatur,
apice fuo in ligulam aridam, fcarioftm, albam atque obtufam abeuns: *fnni'*
Us fed laxiores .& tumidiufcula?, ad fpicularwn ftmiiiearum ba& enaiaj, pe-
aj, pe

XXXV!• **DIANTHUS GLACIALIS.**

Dianthus floribus foliatis, subcaulis: squamis calycinis elongatis, acuminatis, tubum superantibus: foliis linearibus flore longioribus.

Nullam omnino apud auctores plantam reperiō mentionem. Summarum alpium Salisburgensium Kartal & Frosnitz hospita, locis fertilibus, fabulosis, in ambitu immensae illius trolis glacialis, qua thoracis adinstar, non ante diem solvendi, superius earum vales uti & culmina rigent. Nulla fitipicio est Dianthus alpinus, prae subalpinis propriis Austria adeo familiarem, florisque inagnitudine & elegantia hunc multoties superantem, ad editissima hac frigidissimaque loca evasit, uti ex frequenti descriptione patebit. Radix ei perennis, subformis, perpendicularis, subramosa subcaulis aut fordide flavens, quatuor, quinque iube uncias longa, fibrillis **lateralibus** concoloribus sparse aucta & multiceps. Latum hac adultior densumque Silenes acaulis in morem, communiter educit cepitem florum foliorumque radicalium. Hae conferta & expansa in orbem, aut (tibi^{re}a, linearia, angusta, integerrima, versus apicem modice latiora, obtusa, aut acutiuscula, medio superne canaliculata, ceterum laete viridia, glaberrima, crassiuscula & subpilosula, ab una ad duas circiter uncias longioribus¹." longitudine multoties superantia, lineam imam fere lata. Flores nunc acaules sunt, alias cauliculo brevissimo aliquot linearum, aetate, albido, glabro, unifloro eoque uno aut duplici foliorum pari instructo suffulciuntur. Squamae calycinum duae, conjugato-oppoſitae, adpressae, ovato-lanceolatae, elongatae, **acuminatae**, tubo calycis longiores, glabrae & rubellae. Calyx

mono-

XXXVI

* DUNTHUS GLACIALIS.

Dianthu[^]floribus folitariis, fubacaulibus: fquami_s calycinis eiongatis acuminatis, tubum foperamibus: **foliis** linearibiis flore longioribus. '

Nullam omnino apud auctores plants reperio mentionem. Summa-
*m alpium Salisburgenfium Kartal & Frosnjtz hofpita, locis fterilibua fa-
bulofis, in ambitu immenf. iUius molis gUcialis, quathoracis adinfiar, non
ante d.em fol[^]endi, fuprem* earum valles uti & culmina rigent. Nulla kt-
ipicio eft Dianthum .Ipiimm, pratis fubalpinis **pneprimis Aaflds** adeo **fanu-**
liarern, florisqt.e magnitudine & elegantia hunc **multoties** fuperantem, ad
editifllma h_{SC} frigidiffimaque loca evafi/Te, uti ex fequenti defcriptione pa-
tebit Radix ei **perennk**, fufiformis, perpendicular[^], fubramoia fufca
aut ford.de flavens, quatuor, quinque iubin uncias longa, fibrillis Jaterali-
bus concoloribus Tparfim aufta & nmlticeps. **Lita** hsc adultior denfum-
queSilenesacaulisinmorem, communiter educit cefpitem **florum**, foliorum-
que radicalium. Hac conferta & expanfa in orbem; aut fubereOa, linea-
r.a, anguita, integerrima, verfus apicem niodice latiora, obtufa, aut acu-
Kufcula, medio fuperne canaliculata, «terum J[^]te viridia, glaberrh[^]a
craflulcula & fubpulpofa, ab una ad duas circiter uncias *l o n ^ r ^ ^ ^*
Jongitudine multoties fepe ruperantia, lineam unam fere lata. Mores nunc
acaulesfunt, alias cauliculo breviffimo aliquot linearum, jereti, albido
glabro, unifloro euque uno aut dupliri foliorum pari inftn,ao **fuffiijciuntur!**
SquamacalyciiMB dux, conjugate.oppofita, adpreflfe,- ovato-lanceolate\
dongatae, **acumlnat**», tubo calycis longiores, glabrs & rfoelUc. Calyx

monophyllus, tubulofus, cylindraceooblongus, ultra femiundam longus, gibber, ftriatus, e fufco purpurafcens, apice breviter quinquefidus: laciniis lictnceolato-ovatis, acutis, ere&is, margine apiceque **fcariofis**, albidis & fubpeliucentibus. Petala purpurea, parva, **tnconfpicna**, inodora, calycis tubo duplo breviora, plana, patentia, verfus faucem albida, **ilrii&que tri**bus profundius purpurafcentibus pifta, extus pallida & ex **dnereo** rubella: unguere^o, albo, glabro, culyci ae^quali. **Filatnenta lubsqualia**, fubulata, alba: antheris incumhentibus, ovatis, e cinereo caerulefcentibus. Germen oblongum, glabrum, ereftum. Styli duo, cylitidrici, ereoi, albi, glabri, calycis tubo piulo longiores. Stigmata r^voluta, fubpluaiofa. alba.

XXXVII.

SILENE RUPESTBIS.

Silene fioribus ereftis, petalis emarginatis, calycibus teretibiis, foliis lanceolatis. *Linn, Jyjl pag. 422, Allion* flor* ped, torn. H. pag. 82. num> 1580.*

Vilcago foliis tanceolatis, caulibus brachiatis, calycibus infundibuliformibus, flonbus laxe umbellate, ereftis. *Hall. hijL torn. L pag. 398. num. 917.*

Lye ^.^lax, .^! : ^alpina glabra puniila. *Tournef b?fi. 338. Sckeuchz. it. P^S-^37-*

Auricula **muds** alpina glabra, five Lychnis glabra uinima aut Cariophylli minima fpecies flu re albo. *Bmh. hijL torn. Hi pag. 360.*

Alfine alpina glabra. *C, Baah. prody. pug. u 3.*

XXXIII.

MELICA UNIFLORA.

Melica panicula rara, erecta, patente: calycibus bifloris, flofculo altero hermaphrodite, altero neutro. *Retz. prodr. flor, fcand. num. 94, Recz, obj\ 4»*

Frequens habitat in folitudinibus, fylvisque denfis, umbrofis, cae-
 duis, nee non ad pedes rupium excelfarum Bohemian, Auftriae, & miran-
 dum fane, ad noftra usque tempora incognitam latuifle. Radix ei repens,
 longiffima, fibrofa, albida aut flavescens, geniculata, internodiis inaequali-
 bus, vaginisque aridis, membranaceis, fucis aut purpurafcentibus undique
 operta. Culmi plures inde feriatim affurgunt, pedales, bipedales & altio-
 res, erefti, tenues, rigidiufculi, fupra dimidium foliofi, inferne teretes,
 fuperne qua nudi & ad genicula angulati, fubtetragoni, glabri, ftriati lae-
 teque virides. Genicula quatuor vel quinque numero inasqualibus interval-
 lis a fe invicem diflant, glabra & purpurafcentia, fuperiora fenfim remotio-
 ra. Folia erecta, plana, mucronata, laete utrinque viridia, ftriata, gla-
 bra, deorfum, praeprimis margine, fcabriufcula, nervo tenui albicante per
 dorfum dufto, ab unciis duabus ad feptem oftove longa» quo fuperiora eo
 iongiora, linea& duas aut paulo ultra longa, • Vaginae fubteretes, ftriatae,
 innmas purpuraicentes, lcabra?, lupremae glaberrimas & lfcte virides. JLi-
 gula ad internam foliorum bafin fubinde praefens, arida, purpurafcens &
 in longum acumen produila: in ejus defectu foliolum adefl: fetaceum, tfluas,
 tres lineas longum. Panicula rara, erefta, patens, fimpliciffi.na, quatuor
 quinque uncias & ultra longa, ramis binis femper conjunftim ex eodem cul-
 mi

mi loco inaequalibus intervallis egredientibus, altero longiore, erectis, filiformibus, rigidulis, deorsum scabris, duas tresve uncias longis. Flores in caulis, ramulorumque extremitate, alterni, pauci, pedicellati: pedicellis brevibus, erectis, subflexuosis, ab una ad tres lineas longis. Calycis biflori & bivalvis glumae lubaequales ovatae, acute, concave, ventricosae, glabrae, basi dorsoque purpurascens, apice & marginibus submembranaceis, diaphanis, duas ad tres longas lineas, lesquilineam lata?, Floeculus inferior in calycis fundo sessilis, hermaphroditus, fertilis: valvulis glabris, inermibus, exteriori majori, oblonga, carinata, ex albo viridique purpurascens, interiori tuberculata, striata atque in exterioris finu latente. Anthem flavae: stigmata alba, plumosa. Folliculus alter imperfectus, floris rudimentum, pedicellatum, truncatum & subincurvatum, Non in millenis specimenibus, quae exanimavi, duos perfectos flores vidi.

Obs. Melicae *nutanti* proxima est, a qua tamen differt flore unico fertile panicula erecta & expansa, ramis longissimis, glumis denique calycis acuminatis florales luperantibus easque subincludentibus*

XXXIX.

GENTIANA ELONGATA Tab. i^afg. 3.

Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi: caule elongato filiformi subnudo unifloro: calyce oblongo aequali: foliis radicalibus aggregatis.

Australioris Europae alpes nequaquam Flora* cultoribus adhuc dum omnes suas aperuisse divitias, & potissimum in inhospitis supra glaciales vales

les earum culminibus, ad quæ vel nullus aut {altem difficilis datur adscen-
fus, passim vegetare incognitas regni vegetabilis cives, omnino persuadeor,
perjris itineribus alpinis edoctus, quanta praemia nunquam non reportarit
 Botanicus, qui spretis difficultatibus audax eam Atmosphaerae regionem pe-
 tat, quousque Florae dominium & mortalibus accessus patet. Id ex nuperis
 aliorum plurimis inventis, id ex pauculis meis novellis firpibus colligo.
 Quanta etenim brevi annorum curriculo Flora alpina fumpfit incrementa?
 Quantus numerus alpinarum firpium, quæ angustis antea limitibus contine-
 bantur, accessit Halleri & reliquorum Helvetiorum indefessa industria? etfi
 magna earum parte adhuc sexuale Linnaei systema careat. Quæ plurima &
 gravissima in hac Botanices parte Jacquinii & Wulfenii inventa? Quantas
 denique symbolas suppeditare Pedemontii alpes Allionii inviclo labore? ut
 nullus dubitem, in tanto editiflimarum alpium numero, quas nedum botanici
 lusstraverunt oculi, amplum supereffe firpium numerum, quæ fors nonnifi po-
 fteriorum affiduo conamine in lucem prodibunt Plantulam quam propono,
 Tyrolensibus alpibus debeo, lectam utpote in supremo & pTaecipiti jugo al-
 pium Schleinitzenfium prope Leontium, qua glaciatos montes *den Glokner*
 respicit, cum Ranunculo glaciali, Gentiana nana, & Pediculari rosea. Peren-
 ni nititur radice, tereti, gracili, subrepente, lenta^ fibrosa, fuka aut fla-
 vente, quac plures in suo decurfu ad terram emittat foliorum radicalium ro-
 fulas, subradicantes. Ex harum centro caulis unicus prodit, ereftus aut
 subaict^iens, bi - vel triuncialis, filiformis, subangulatus, glaber, subnu-
 dus, purpuracehi, unicum apice sustinens florem. Folia radicalia in rofu-
 lam parvam sed densam cungefta, obovata, subrotunda, obtusa aut acutiuf-
 cula, integerrima, enervia, utrinque laete viridia, glabra, duriufcula, **fir-**
 mula, fendunciam fere longa, lineas quatuor aut paulo ultra lata* Unum
 plerumque foliorum obtuorum par infra medium cauli infidet* Flos termi-

[les earum culminibus, ad quæ vel nullus aut (altem difficilis datur adfcen-
 (L ;, paffim vegetare incognitas regni vegetabilis cives, omnino perfuadeor,
 P aribus itineribus alpinis edottus, quanta præmia nunquam non reportarit
 Botanicus, qui fpretis **difficultatibus** audax eam Atmospherse regionem pe-
 tat, quousque Flora dominiim *Si*. mortalibus acceffus patet. Id ex nuperis
 aliorum plurimis inventis, id ex pauculis meis novellis ftirpibus colligo.
 Quanta etenim brevi annorum curriculo Flora alpina fumpfit incrementa?
 Quantus nurnerus alpinanim ftirpium, qua: anguftis antea **Umitibus** contine-
 bantur, acceffit HaJleri & rdiqorum Helvetiorum indefefla **indufcia?** etfi
 magna earum parte adhuc fexuale Linn si fyftema car eat. QUK plurima *Si*
 graviffima in hac Botanices parte Jacquinii & **Wulfenii** inventa? Quantas
denique fymbolas fuppeditare Pedemontii alpes Alii on ii invicto lab ore ? ut
 nullus dubitem, in tanto editiffimarum alpium niimero, quas nedum butanici
 luArarerunt oculi, amplum fuperefle ftirpium numerum, qua furs nonnifi po-
 ilerorum afltduo conamine in lucem prodibunt. Plantilam quam propono,
 Tyrolenfibus alpibus debeo, left am utpote in fupremo & pr^C'piti jugo al-
 pium Schleinitienfium prope Leontium, qua glaciatos montes *den Glokner*
 refpicit, cum Ranunculo glaciali, Gentiana nana, & Pediculari rofea. Peren-
 ni nititur radice, tereti, gracili, fubrepente, lenta, fibrofa fufca aut fla-
 vente, qu<c plures in fuo decurfu ad terram emittat foliorum radicalium ro-
 fulas, fubradicantes. Ex harum centro caulis unicus prodit, ereftus aut
 fubaiceiKkns, bi - vel tritmcialis, filiformis, fubangulatus, glaber, **fubmi-**
dus, purpurafcelti, unicum apice fuilens florem. Folia radicalia in rofu-
 lam **parvara** fed denfam cungefta, obovata, iubrotunda, obtufa aut acuti-
 'kula, integerrima, enervia, utrinque lsete viridia, glabra, duriufcula, fir-
 mula, feniunciam fere longa, lineas quatuor aut paulo ultra lata, Unum
 plerumque foliorum obtuorum par infra medium cauli iafidet, Flos termi-

IX

PHALARIS ALPINA.

Phalaris panicula spicata, cylindrica, hirsuta: glumis calycinis aequalibus, lanceolatis, aristatis, carina ciliato-hirsutis.

*Phleum Michellii. A Uion. flor. ped. torn, lhpag. 233. num. 2138**

Phleum spicis paniculatis, hirsutis, calycibus lanceolatis. Hall hijl torn, ILpag* 246* num. 1532**

Gramen spicatum faxatile, glabrum, perenne, spica cylindracea, flavescente, longa: locustis acutis, ciliis infra pilosis Mich. hort. pif.*

Gramen typhinum junceum perenne. Barrelier. ic. si. num. 2.

Gramen typhoides alpinum, spica graciliori delicata &c villosa. Scheuchz. agrojl. p. 65.

Gramen alopecuroides, cum cauda muris purpurascens. Morif. hifi. oxon. torn. 111. p. 192.

Gramen caudæ muris purpurascens aliquantum simile. Bauh, hifi torn* IL vag. 473.*

Abunde occurrit in plerisque pratis ficcioribus alpinis & subalpinis Styris, Tyrolis, Aulria; mixtim cum Phleo alpino: Ipeiatim vero in prato *die-Bahnwiese* dicto, montis subalpini Gans, Schneberg adfite, nil hoc gramine vixtatius: spicularum fabrica omnino a Phleo diversum, inter quæ retulit Hallerus & nuper Allionius. Radix perennis, horizontalis, nodulosa, humilis, duos longa pollices, fordide flavens, fibrillisque perpendicularibus, ramosissimis & concoloribus firmata, culmum emittit unicum, basi inodice reclinatum, vaginisque foliorum emarcidii obfitum, hinc ere-

ftum, pedalem, cubitalem & altiorem, teretem, glabrum, profundius ftriatum, foliofum, geniculatum, late viridem, aut fuperne non raro pitf-puraicentem. Genucula tria aut quatuor profundius purpurafcentia, glauc/r. Folia plana, erefta, acuminata, glabra, marginibus deorfum afperrima, late viridia, duas ad tres uncias lata, uncias totidem & ultra longa. Vaginae profundius ftriatae, glabra;, laxiufculae, prasprimis (upremis. Paniculaipicata, Poa; criftatae fimilis, cylindrica, ere&a, obtufa, hirsuta, ex albo viridique purpurafcens, duas aut tres faepe uncias longa, lineas quatuor circiter crafta. Rara intercurrunt panicula interrupta fpecimina, quae alias communiter aequalis & continua. Ramuli inaequales, breviffimi, alternatim fafciculati, ftricti, multiflori: floribus fubfeffilibus, congestis, diftichis & antrorfum vergentibus. Calyx bivalvis, uniflorus: valvulae: aequales, minima;, truncate, refta;, corolla longe majores eamque includentes, carinatae, compreffa;, lanceolata?, acuminata?, ariftata*, indivifae, dorfo acuto villis albidis denfe ciliato-hirsutae, caeterum pallide & ex albo virentes, linea faturatori per dorfum decurrente, apice purpurafcentes, marginibus parallelis, albidae, fcariofa? &c diaphane, lineas duas fere tres longa;* Corolla bivalvis, glumis fubaequalibus, carinatis, obtufiufculis, glabris & calyce brevioribus: interiori paulo minori. Antherae oblongae, flavae: filamenta capillaria, alba, breviffima, glumis floralibus breviora. Stigmata alba, villofa. Styli breves, albL

XLI.

FESTUCA HETEROPHYLLA.

Festuca foliis laxis: radicalibus fetaceis, caulinis planis, latioribus: panicularara, fecunda: spiculis subsexfloris, lanceolatis, glabris, aristatis. Festuca foliis radicalibus fetaceis, caulinis latioribus: locusta septiflora* Hall, *hist. torn. II. num. 1438.*

Copiose provenit in celebri precipitio die Saugrube, quod a fummo jugo Schneeberg Auftriae versus meridiem extenditur, locis glareosis & labilium inter ruinas lapidum, cum Papavere & Antirrhino alpino, nec usquam alibi viva. Fibrae radices innumerae, teretes, graciles, flexuosae & fusco nigritantes, satis longae, ramosae & diversimode sibi intertextae. Culmi plurimi, caespitiosi, basi leviter incurvi & vaginis foliorum radicalium aridis, laceris & stramineis obferti: hinc erecti, pedales, saepe bipedales, teretes, glabri, profundius striati, pallide virides, supra dimidium foliosi, geniculis infra & duobus aut tribus, atropurpureis, glabris: infimo prope radicem intra foliorum vaginas latente. Folia radicalia longa sunt, angustata, fetacea, compressa, acuminata, utrinque & marginibus glaberrima, laxa, flaccidiuscula, subtiliter striata, pallide viridia & a quatuor ad septem uncias longa. In culmo duo aut tria adsunt, striata, plana, radicalibus multo latioribus, sed breviora, lineam unam circiter lata. Vaginae laxae, glabrae, notabiliter striatae. Ligula minima, flavescens, & arida, fere nulla. Panicula erecta, subfecunda, rara, lanceolata, acuta, tres ad quatuor uncias longa. Rami longiores, quam in adnatis, inaequales, pauci, infimo loco bini simul, tandem folitarii egredientes, graciles, deorsum

fum asperiusculi & subtriquetri. Rachis uno latere compressa-plana albida, altero rotundata obtusa. Spicule longius pedicellate, lanceolate, acutae, distiche, glaberrime, pallide virides, femiunciam longe, ultra lineas duas late, a quinque ad septemflore. Calycis glume inequales, angustolanceolate, acuminate, triflorae, glumis folliculorum breviores, altera minore. Folliculi alterni, sessiles: gluma exterior oblonga, convoluta, aristata, marginibus & apice albida & ad lentem denticulis minutissimis obsita, duas ad tres lineas, absque arista longa. Arista sesquilinea aut duarum longitudine albida aut viridescens, ex ipso glume apice prodit, itidem aspera & denticulis in glume dorsum usque decurrentibus. Interior plana lanceolata, albida, scariofa. Antherae flavae: filamenta uti in congeneribus capillaria, & ligmata plumosa.

XUL

FESTUCA VARIA,

- Festuca panicula subaequali, striata, pauciflora: spiculis teretibus, quadrifloris, glabris, subaristatis: foliis fetaceis.
- Festuca panicula striata, tomentis teretibus, quadrifloris. *Hall, hijh torn. II. pag. 214. num. 1439.*

Habitat in plerisque alpium granitosarum superciliis, immania inter faxa a lupremis earum culminibus decidua, cum Poa disticha, Valeriana Celtica & Saxifragarum ampla gente: ut supra Judenburg & Secau Styriae: in monte Schoell prope Grecium & in plerisque Tyrolensibus Leontinis. Fibrae radices copiosae, teretes, serpentine, duriuscule, plus minus crassae,
&

& e fusco-nigricantes. Culmorum ima basis a vaginarum congerie tumet, digitum minimum & ultra crassa, latis densisque inde enatis cepitibus. Vaginae dense imbricate, lacerae, aridae, striatae, cinerascens & arte internexae. Culmi ex quovis cepite plures, erecti, duri, striati, teretes, lempedales aut altiores > geniculo unico duorum aut trium a radice pollicum intervallo, atropurpurea, glabro manifeste infra. Folia plurima in radicalibus fasciculis, culmo paulo breviora, erecta aut apice recurva, fetacea, angusta, acuminata, dura, pallide aut ex flavo viridia, glaberrima, superne fusco tenui exarata, dorso rotundata, basi in vaginas illas latas, & complanatas de^urrentia, utrinque ad vaginae exortum subtus genicello glabro & flavescens infra. Folium, in culmo supra geniculum, unicum, striatum, radicalibus angustius, ad duas uncias longum. Vagina cylindrica, superne arcta, biflorior, striata atque glabra. Ligula nulla» Panicula nuda, subaequalis, striata, ab una ad sesquiunciam longa. glabra, pauciflora, florum a decem ad quindecim, Rami erecti, alterni, ut plurimum folitarii, rarius tamen & bini ex eodem culmi loco egredientes, duas, ad summum tres, in summitate spiculas florum gerentes, brevibus pedicellis nixas: saepe tamen panicula adeo depauperata, ut racemum magis, quam paniculam dixeris. Spiculae ex maximis congenerum, primo perfecte teretes & ventricosae, tandem distichae & expansae, glaberrimae, acutae, quadri quinqueflorae, lineas quatuor aut quinque longae. Calyx bivalvis: valvulae inaequales, erectae, ovato-lanceolatae, acutae, mucronatae, glumis folliculorum breviores, iisque concolores, glabrae: exterior paulo majore. Folliculi alterni, fertiles: gluma exterior ovato-lanceolata, acuminata, substriata, glabra, dorso atque basi ex flavo virens, state aurifera, apice profundius purpurea, marginibus pellucidis, icariosis, albis, ultra duas >

lines

lineas longa, lineam lata. Arista brevis, erecta, linearis & fusciflora: gluma interior lanceolata, acuta, inermis, in concavitate exterioris lateris, compressa, ex albo virens, & scariofa. Anthers flavent aut purpurascens. Filamenta capillaria, alba. Stigmata plumosa.

I N D E X

PLANTARUM IN HIS OBSERVATIONIBUS CONTINENTARUM.

A.	Pag.	H.	Pag.
Acrostichum Marantae. - - - -	5	Hieracium ftaticifolium. - - - -	34
Andropogon obtusifolius. - - - -	9	—————taraxaci. - - - -	59
Anthemis corymbosa. - - - -	73	L.	
Aquilegia alpina. - - - -	39	Ledum palustre. - - - -	4a
Arabis caerulea - - - -	58	Leontodon croceum. - - - -	16
Aster Tripolinum, - - - -	55	3VL	
C.		Melica uniflora. - - - -	87
Campanula bonariensis. - - - -	7	O.	
^ — — — — pusilla, - - - -	79	Ophrys Loefelii. - - - -	53
Cardamine petraea* - - - -	24	P.	
Carex alba. - - - -	4	Pedicularis flammea. - - - -	70
Cerastium in fructu, - - - -	3	Phalaris alpina. - - - -	9'
Cynoglossum scorpioides. - - - -	77	Phyteuma hemisphaerica. - - - -	61
— — — — fylvaticum. - - - -	77	—————pauciflora. » - - - -	68
D.		Polypodium montanum. - - - -	46
Dianthus glacialis. - - - -	84	Potentilla falisburgenfis. - - - -	68
E.		R.	
Spilobolus rosmarinifolius* - - - -	50	Rumex digynus* - - - -	3°
Erigeron uniflorus. - - - -	32	S.	
F.		Saxifraga autumnalis. - - - -	18
Festuca ficterophylla. - - - -	93	Senecio italicus. - - - -	27
— — — — varia* - - - -	94	Silene rupestris. - - - -	85
Galium Bocconii - - - -	11	—————faxifraga. - - - -	37
Gentiana bavarica. - - - -	75	V.	
— — — — elongata. - - - -	83	Veronica alpina, - - - -	48
— — — — frigida. - - - -	13		
— — — — prostrata. - - - -	66		
Gnaphalium norvegicum. - - - -	21		

IL
NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
PHALJINA VITISANA.

Quantumvis in Entomologicis valde parum fīm verfatus, nequeo tamen temperare a defiderio defcribendae hujusce Phalsenulſe, tum quod viſa mihi nova fit, tum ut peſſima ejus indoles innotefcat, qua toties dolui, vel hoc quoque iterum anno, pncifam fpem omnem, carpenti propria de vitegratiffimas uvas. Scilicet eo ipſo tempore, quo tenelli vitis raceraī jam prodierunt, una cum pedunculo fuo vixdum biunciales gemmasque futurorum florum adhuc conglomeratas compa[^]lasque continentes, (quod ocuus ferius pro tempeſtatis diverſitate contingere folet) ad vites acfrolant phalaenulſe exiguae, primis mox diebus pauca, proximis plures, brevi numerofiſſima; quae hanc ftationem triginta plus minus dies occupant, abſconditae pleraeque interditi lub foliis, ludibundo & irrequieto volatuleſe, appropinquante veſpera, prodentes, ipſis femper vitibus vicinſe⁷ generationis negotio, opinor, tunc unice intents_f nee cibo veſcentes ullo, quum vitro incluſa? fine ullo nutrimento idem tempus vixerunt >\bhinc autem ni[^]nero fie iterum fuceſſive minuuntur, ut pv/ft elapioſ oſto decemve dies non appareant ultra ullz*

Sed nunc evolutis magis racemis flores vitis pandi incipiunt, quando videmus, plures pandi non posse, nonnunquam folos pandi in toto racemo tres quatuorve, imo etiam in quibusdam racemis nullos. In plures distinctos glomos contractae florum gemmulae, filisque araneosis firmiter connectae, explicari nequeunt, dum interea larvae in globo habitanti eas praebent. Scilicet phalaenulae illae ova sua minutissima racemis imponunt, ex quibus enatae larvae gemmulis telam intexunt, seseque dein in mediis hisce abscondunt, gemmis viventes erofis. Evolvitur interea racemus, augeaturque in omnem ambitum; at evolvi nequeunt ultimorum divisionum pedicelli ob cohaerentes gemmas, unde glomi illi sponte exfurgunt. Minus huic calamitati obnoxiae vites sunt, quae liberae in medio horto sunt; quam maxime vero sunt illae, quae parieti accrescunt; videntur enim phalaenulae a perflantibus ventis de sede turbari, & domicilium petere tranquillius. Sic hoc anno ex vitibus longo tractu domui adjacentibus affixisque, fructuumque uberrimam copiam ex racemorum numero dependentibus, ne vel unicum uvarum racemum habui.

Quando florum germina intactorum jam nunc adolefcunt, adepta volumen feminis inspicios, tunc larvae mutantur in pupas, semper glomis inclusas, ex quibus metamorphosi solita post duodecim dies novae phalaenulae egrediuntur, brevi in vite non ultra obviae. Unde patet, duas quotannis generationes hujusce infesti obtinere. Aut igitur fecundae generationis ova, aut pupae hyemem fecuturam durant. De ovis credibile non est, quod ex illis in prima generatione jam paucos post dies larvae excludebantur. Ad hujus primae generationis normam in altera meridie Julio ova deposita fuerant, larvaeque inde enatae; & sub finem Augusti haec mutatae in pupas; quae post hyemem transactam mense Maio proximi anni phalaenulas dimiferant, viti-

- bus

bos adfuturas. Nee enim opinor, aut ova aut pupas generationis fecund* ab illis primæ natura sua differre posse; ex ovis igitur calidiffimis **Julii** diebus larvas enafci debere; fed, quæ Tub finem Augusti aut ineunte Septembri formantur pupas, posse, calore atmosphaeræ Indies imminuto, perfistere tales, nee evolvi ante proximi anni novam ætatem. Quænam autem planta fit, quæ larvas hæc fecundas nutriat, ignoro, in vitibus certe tunc non reperiuntur, quin excludere phalænenas has protinus deferant. Examinaui accuratissime cum fero autumni tempore primo vere farmenta vitis, parietes aliæque vicina, ne potui ullam in his pupam detegere; & quæfivi tanto studio, quia conjectura aliqua ducebat ad id in farmentis suspicandum; nam dum ante aliquot annos fero gelu vites omnes horti mei fere tædæ fuerant, ut interirent ferine omnia farmenta, nee ullum producerent racemum, frustra expectaveram advolantes folito tempore phalænas. At nee eodem semper numero hæc omni anno conipiciuntur, ut optime vigeant vites; plurimus certam perniciem portendit uvis; quas tamen ferveri multæ possunt, si tempestive glomi aperiuntur, cum primendoque necatur larva. Hoc anno 1788* infesti vitæ hæc fuit

12. Maji Phalænenas advolarunt

10/ Junii numero minuebantur.

15. ejusdem ultra nullæ vivebantur.

25. ad finem ejusdem larvæ in pupas mutabantur.

7. Julii ad 15. ex pupis egrediebantur denuo **phalænenæ**.

In tabula prima exposui racemum in glomos collectum cum inclusis hæc larvis fere adultis. Tunc larvam in magnitudine naturali, eandemque

microfcopio aufam. Sic etiam bis pupam. Dein bis phalaenulam fedentariam, eandemque bis cum alis expands volanteiru

Larva tres qnatorve lineas geometricas longa conftat duodecim articulis cum capite. Pedes anteriores utrinque tres ex articulis tribus anterioribus nigricantes. Pofteriores utrinque quinque ex articulis feptimo, oéta-vo, nono, decimo & duodecimo concolores corpori. Hoc virelcit fordidè cum verruculis albidis, pilofumque eft; in junioribus lætius viret cum capite concolore, quod in adultis magis minusve ex fufco aurantiacum eft cum collo fimili, aut in aliis nigricante.

Pupa fufiformis, tranfverfim fulcata five articulata, glabra, fufca, ¹ongitudine larvæ,

Phatena tortrix, elinguis, tres lineas longa; alis inferioribirs utrinque, luperioribus fubtus uniformiter cinereis, omnibus margine pofteriore ciliatis; fuperioribus fuperne ex teftaceo fufco cinereoque nebulofe fafcia- tis, inferne eodem colore roaculatis; antennis fetaceis, alis duplo brevioribus, ex nigro cinereoque annulatis. Colores omnes modo pallidiores funt, modo intenliores; nee figura macularum conftanter eadem in fingulis.

Ut tabula? pars vacua fifteret aliquid, Tenthredinis fpeciem addidi, cujus larvam in Pruno Pado Linnaei, foliis hujus arboris vefcentem; fpiraliter quiefcentem, irritatam ex papillis lateralibus copiofum humorem glutinofum & excolorem emittentem. Clauftrum fibi texuit, ramo filorum ope affixum, pro exitu tenthredinis iubfequo primo vere horizontaliter iuperne aperiendum. Figura? reprafentant larvam, clauftrum & tenthredinem, quæ forte lucorum Linnsi eLL

III.

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
 PLANTARUM RARIORUM
 DESCRIPTIONES

AD SPECIMINA SICCA FACTJE.

Quantumvis in univ[er]sum mancae sint plantarum descriptiones ad specimina sicca adhibita, tum etiam in pluribus non illa exurgat aut generis aut speciei certitudo, quae convincat, vel ip[s]e ex stirpibus vivis nonnunquam aegre obtinenda; negari tamen nequit, dari ex adverso istiusmodi plantas, quae etiam exsiccatae nullum botanico Observatori super genere & specie dubium relinquunt. Harum cognitio, utut non exactissima, confert nihilominus ad amplificandam scientiam herbariam; quare hoc primum talium descriptionum specimen Botanicis proponere h[ic] audeo

L

ASCLEPIAS ALEXICACA,

Asclepias caule volubili; foliis inferioribus cordatis, superioribus ovatis; umbellis feffilibus.

Nausjera Patfia. *Rheed maU* vol. 9. pag. *u tab, 13*

N 3

No-

Noinen inviale ex ipfo Horto malabarico mutuavi, ubi cum interno tum externo usu tota planta egregium praedicatur alexipharmacum. Rami possideo (expedalem foliis floribusque onustum, ex Ceylona missum, cujus descriptioni addam, quae ex Horto malabarico, nec ex exemplari fisco, innotescunt momenta omnia, ut sic completior exurgat. Radix albicans, debiliter & ingrata odorata, fibrosa, intus filamentis lignosis, an igitur perennis? Caules teretes, plures pedes longi, herbacei, volubiles, glabri, superne ad lentem villosi, dilute viridis. Folia sunt opposita, petiolata, acuta, integerrima, glabra, crassa, succo limbo repleta, viridis diluti & nitentis in prona, in adversa parte clari; inferiora cordata; superiora ovata. Inter petiolos in uno duntaxat latere ex caule tuberculum prominens, ex quo plures egrediuntur pedunculi unilobati, vix unciales, villosi, graciles, simul (sic formantes umbellam feililem. Calycis parvi, villosi & profunde quinquefidi lacini ovati & acutiusculi. Petali dilute virentis & ferique quinquefidi lacini sunt ovati, acutiusculae & ad basin rubentes. Squamulae nectararii incumbentes fligmati (sunt quinque, membranaceae. Has inter fitu alternate (quae describi quidem in Horto malabarico, at non delineari videntur) cornicula locantur quinque, crassa, rigida, dentata, tubera. Folliculi gemelli, acuti, digitum crassi longique. Semina numerosa, plana, pappo indurata argenteo. Differt ab Afclepiade Linnaei volubili umbella non pedunculata; a Nummularia lactea majore Rumphii amb. 5. tab. 175. fig. 1. figura foliorum, tum quod non fit parasitica; ab Afclepiade volubili Lörfteri prodr. pag. si, foliis nullis cordato-(ubrotundis.

II.

ADIANTUM DECURRENS. *Tab. t.fig. i. «.*

Adiantuni fronde bipinnatifida.

Elegans plantula crefcit in Mamnica. Radix filiformis, repens, nigricans, in tutu decurfu tibnllis capilUnbus aufta, ramofa, ad v.uias & inzquales diftantias emittit frondes lulitarias, erefkas & femipedales. Hae pnmo intuitu videntur decompofits; funt autem re vera fimplices; nam uti pinnule onuKS confluunt in pinnam unam, fie pinnae ipia? per (lipitem de* currunt, cumrjue proximis ejimicm lateris **pinnil** utrinque conneftuntur* ut flipei inde evadat vcl ultra infurum usque **pinniOl** alatus. Tota plantula glabra eft. Stipes tercs, **fufcus**. Pinna (**nifi** niavii folii fimplicia & bipinnatifidi diccre !acinia>) unciaks, alterns, & fupiores lupra medium fucceffive bieviores, conflam ex pinnulis late cuneiformibus, alternis, in lobus *ictXis* fublineares a tribus ad quinqtie, integerrimos, oblufos, nonnunquam emarginatos, ad apiceui-tnuuiU-fiuiHiitunte, prinum cinerea» deiu fufca, inrtru^los. Pinnule lobi jue nervummedium lubent, funtque adlencem pellucida *Si* punflaU. Iigura pnnia plantain magnitudine naturali, fclcu **ida** Trundis partem infimam repnefentat auftam.

III.

ASPLENIUM AN'MIIUSCIFOUUM. *Tab. 2.fig. 3. 4-*

Asplenium frondibus pinnatis; pinnis obtufe lobato-ferratis.

Hcniiionit:s pumila pentaphylU & rotundc denUta. *Plum, fit, pag. 116. tab, 66. lu. A,*

II

ADIANTUM DECURRENS. *Tab. «. & i.º.*

Adiantum fronde btpinnatifida.

FJegans plantula credit in Mamnica. Radix filiformis, repens, m-
gricans, in tutu decurfu fibnllis capillanbus au£U, raniofa, ad v;uias 8c
tacqtttla dirtantias emittit frondes lulitarias, ere^as & femipedales. Hz
pnmy intuitu vide:t;r (.lecompofit*; funt autem re vera fimplicis; nam uti
pintmls omnt'5 confluunt in pinnam unam, fie pinna* iplae per Hipitem de-
currunt, riniKjuc **proxtmlf fljusden** lateris pinnis utrinque conneftuntur> ut
flipes inde evadit vel ultra infiuum usque piiium alatus. Tota plantula
glabra eft. Stipes teres, fuicus. Pinnx (nifi mavis folii fimplicis & bipin-
natifidi dicere **lactnias**) uncialcs, alt em*, & fu peri ores lupra medium fuc-
ceffivt; bieviores, conftant ex pinnulis late cuneiformibus» alternis, in lo-
bus *laths* fublinearc a tribns ad quinrjtie, integerrimos, obtufos, nonnun-
qoan emarginatos, ad apicem macula fruffliticante, primum cinerca, dcin
fufca, indru^os. Pinnule lobi jue nervummeditim hjbent, funtque ad!en-
tem pcllucida *Si* punctata. i'tgura priina plantain nugiutudine natural), fe-
cuoda frundis pariem infimam roprxfentat aufani.

III

ASPLENIUM ANTIIR1SC1FOUUM. *Tab. 2t fy. 3. 4.*

Afplenium frondibus pinnatis; pinnis obtufe lobato-ferratij.

Hemior ut .s puniid pemaphylli & rotunde denUta. *Plum.JiLpag. 116. tab.*

66. *In, A.*

Na-

lofolum, in dorfo protuberantem, circa medium flexuofum, ex quo nervuli ^terales ad angulum obtufum egrediuntur, porre&i ad frondis oras, quatuor lineis ab invicem diftantes. Juxta hos utrinque una fere ferie fructificationes locantur, tantisper ab invicem remotae, iubrotundas, minutae, pulverulentae, & rufae. Ipfa frons eft lanceolato-oblonga, bafi acuta, apice anguftata in acumen obtufum, ab 06% ad deceni uncias longa, tres lata, tenuis, ad marginem obfoletiffime repanda, & ad lentem venis numero filiformis reticulata. Differt a citata Plumieri planta defe&u cum fquamarum acutarum, tum areolarum fingularum fructificationes quatuor comprehendentium; tam exterum fimilis, ut vix a fim specie feperare. Siftitur in tabula frons a tergo viva, ejusdemque aucli apex.

V.

ACROSTICHUM LONGIFOLIUM

Acrostichum frondibus lineari-lanceolatis, acutis, integerrimis; fertilibus ereftis; fertilibus fpiraliter revolutis.

Lingua cervina rigida & glabra. *klum.fl peg. 118 tab. 135.*

In fboribus Martinicae parafitica habitat. Radix pollicem craffa, teres, nigra longaque fibrarum emiffarum ope trunco arboris adnafcitur, in caput fquamofum definens, pluresque frondes emittens, fimpliciffimas, lineari-lanceolatas, acutas, integerrimas, alias ereftas & bipedales, alias Vix pedales inque fpiram fuperne revolutas. Ula; fteTiles funt; hae autem tots quanta, folo margine pallente & anguthffimo excepto, fructificationibus teguntur* 1 lumierus credit, fructiferas haecc frondes effe novellas, dem,

deposito fructificationis pulvere, volumine augendas nudasque, Sufpicor, esse diversas, ut alias frondes ex natura steriles, fertiles sint aliae* Nequet aliter forte res se habet in *Lingua cervina villosa minore* Plumieri fil. pag. n o. tab. 327. fig* innominata, quae esse debuisset Lit. D<, iterum nova alia <Acrostichi specie, quam Linnaeus nimia festinatione inter synonyma Hemionitidis lanceolata male citavit, ubi *iff* loco ponenda est *Lingua cervina angustifolia 6 reticulata* Plumieri fil. pag. 111. tab. 127. lit C Caterumstipes nostrae plants in utraque fronde est teres, antice fulcatus & duas tresve uncias longus; in sterili nudus, in fertili paleaceus. Frons utraque rigidula est: glabra, crassiore margine donata, lineisque insignita ex nervo medio lobus protuberante exortis & versus oras perpendiculariter protensis numerosissimis. Harum aliae simplicissimae sunt, paucis exceptis apice furcatis; aliae? aequae multae, vicinae duae, basi confluent; idque sine ordine ullo, quem alternantem figura Plumieri perperam exhibet, caeterum exactissima. Fructificatio densissima, crassa & ad tactum mollis contactat globulis nitentibus & ferrugineis minutissimis.

VI.

ASPLENIUM SORBIFOLIUM. Tab. *. fy. 2.

Asplenium frondibus pinnatis; pinnis longe lanceolatis, acuminatis, crenatis. *Lingua cervina* nigris tuberculis pulverulenta. *Pkim. fil* pag. 9a. tab. n o #

Sponte crefcit in Martinica. Radix fibrosa & nigra plures producit frondes pinnatas & quadripedales. Stipes niger, antice fulcatus, ad pinnas angulatus, fuscus, ad lentem villosus- Pinns plurimae, alterne cum
ter-

terminally breviter petiolatae, ex basi ovata longe lanceolata, acuminatae, arenatae, ad apicem parumper falcatae, facie glabrae subtus ad nervos villosulae, a sex ad novem uncias longae, unam vel fercunciam late. Nervus medius in dorso protuberat, & ad angulum obtusissimum emittit utrinque versus oras numerosos nervos parallelos pariterque protuberantes. Horum proximi quibus colliguntur plurimis v4&riis arcuatis; unde pinnae, ad solem confectae, evadunt areolatae. Nee tamen hisce areolis, uti vult Plumierus, sed ipsis illis venulis arcuatis insident totidem fructificationes arcuato-oblongae, parallelae, nigro-rufae, ex globulis nitentibus minutissimis compositae; nervo medio adjacentes majores; minus in univsum densae, quam in congeneribus obtinere solet, quin imo nonnunquam exhibentes globulos distinctos rariterque fitos. Tabula exhibet pinnam subtus confectam, ejusdemque basin autam.

VII

ARENARIA LINIFLORA. *Tab. tffig. 3.*

Arenaria caulibus erectis, inferne ramosis, suffruticosis; foliis subulatis; floribus geminis* *hinn, fyfi, pag. 425.*

In *Flora austriacae* volumine quinto *Arenariam* ex alpebus nostratibus propofui, quam ex definitione Linnsii ejusdemque descriptione pro Linnsii *Arenaria liniflora* habebam; sed quum nullum adductum synonymum legebam, dubitanter propofui. Ut dubium hoc solveretur, post editam jam plantulam meam, celeberrimus Adolphus Murray petitioni meae benevole satisfecit; & quum ipsum exemplar (iccum non potest, ad hoc in herbario Lin-

nsano adfervatum delineatam figuram mecum communicavit, quam hie exhibeo, ut iudicium ferri pofit.

VIII

EUGENIA PERIPLOCJEFOLIAIP *Tab. 4.*

Eugenia foliis integerrimis, acuminato - lanceolatis; pedunculis paniculatis, axillaribus & terminalibus.

Crefcit in Martinica* Arbufcula elegans, tota glabra, cortice fufcefcente. Folia oppofita, breviter petiolata, lanceolata, in acumen longt anguftata, integerrima, utrinquenitida, finnula, tres, quatuorveuncias longa, unamlata« Paniculs oppofitje, axillares & terrainales, graciles, foliorum plus minus longitudine, multifloras, pedunculis ill omni divifione oppofitis. Flores parvi, petalis albis.

IX.

EUGENIA PANICULATA. *Tab. 5. fig. 1.*

Eugenia foliis integerrimis, ovatis, obtufis; pedunculis paaiculatis, axillaribus &c terminalibus.

Sub hoc ipfo titulo accepi ex Martinica ramum elegantis arbuiculae, cortice fufco-nigricante veftitum, in duos ramulos divaricatos divifum; in quorum altero panicul« florum terminales confpiciuntur ternae, foliis duplo longiores; in altero praeterea etiam una axillaris. Rami funt teretes & glabri

fcri. Folia oppofita, breviflime petiolata, integerrima, ovata, obtufa,)raffa, firma, nitida, duas uncias longa unamque ad minus lata. Pedunculi purpurafcentes, inferiores paniculae ad lentem hirtuli, infimi ad primam 'divifionem brafteolis ovatis, acutis, hirtulisque terminati, Flores diametri femiuncialis, petalis albis. Fruftus pifo major, calyce coronatus.

X.

LAURUS MARTINICENSIS. *Tab. 5. fc 2.*

Laurus foliis oblongis, acuminatis, venofis, planis; racemis paniculatis.

Arbor in Martinicae fylvis crefcit. Folia funt alterna, breviter petiolata, oblonga, in acumen anguftata, glabra, integerrima, coriacea, firma, venis adfcendentibus inftruffa, femipedalia, duas uncias lata, adeoque figura fua a Lauro indica, Borbonia & sftivali iufficienter diitinfta. Ramuli ultra folia ultima elongantur, folis paucis bra6teis, lanceolatis, concavis, acutis vagi&que inftru&i, emittuntque alterno fitu plures racemos ramofos 8L duas tresve uncias longos, fimul cum ramo elongato paniculam conftituentes. Pedicelli ultimi & calyces funt tomentofi. Flores parvi.

XL

VISCUM MACROSTACHYON. *Tab. \$.fig. 5.*

Vifcum foliis lineari-lanceolaris; fpicis axillaribus, filiformibus,

Parafiticum innafcitur arboribus Martinicae. Totum glabrum, Ranpi teretes. Folia oppofita, fubfeffilia, lineari-lanceolata, obtufa, integerii¹, ma, cra(Ta, avenia, unciam longa, tres lineas lata. Spies axillares, fo- litariae, oppofitae, filiformes, a tribus ad quinque uncias longs, articulate articulis bra&ea pelviformi diftin&is, Flores i'effiles, minuti, foli a me vifi feeminei tripetali, petalis (uperisj^ ovati^

XH

CHIONANTHUS CARIBiEA. *Tab. 6. fig. i.*

Chionanthus foliis utrinque glabris, longe acuminatis; calycibus ciliatis.

Arborem hanc quindecimpedalem copiofe crefcentem vidi ad ipfa litfora maritima *au Cul de Sac Frangois* in infula Martinica. Cortex trunci ramorumque fufcocinereus. P'olia oppofita, breviter petiolata, lanceolata, bafi acuta, in apicenrj anguftata longum, acutum & quandoque falcatum, in* tegerrima, craiTula, firma nitida, plus minus femipedalia, fescunciam la- ta* Pedunculus communis terminalis, ad aliquot lineas fupra exortum trifidus, ramis ad duas uncias produftis oppofite iterum ramcfis; ramulis his vix uncialibus ipfis etiam trifidis; pedicellis ultimis plufculos flores feffiles fuftinentibus. Brafteae ad pedunculorum divifiones oppofitce, parvs, angulfe, concavse, acute, ad lentem uti ipfi pedunculi villoiulae, Calycis profunde fefti foliola ovata, acuta, villofula, albis ciliis ad oras munita. Petali nivei tubus vix ullus; laciniae lineares & longiffimae. Stamina brevia. Stylus calyce duplo longior. Fruftum non vidi* -Non placet Chionanthorum fpecifica Linnaei determinatio, a pedunculis petita; nam in omnibus

frus notis speciebus inflorescentia dici paniculata possit. *Virginica* Linnæi a; *caribæa* differt calycibus glabris; ab utraque hac differt *zylanica* foliis subtus villosis.

Xra.

MELASTOMA CINNAMOMIFOLIA. Tab. 6. Fig. 2,

Melastoma foliis subtintegerrimis, triplinerviis*, lanceolatis, acuminatis.

Crescit in Martinica. Arbutula tota glabra, ramosa, cortice d-nereo. Folia sunt opposita, petiolata, lanceolata? in acumen obtusum angustata, crassa, firma, triplinervia cum-venis transversis numerosis, integerrima, quædam superne obsolete denticulata, majora duas uncias lata & quinque longa, alia duplo breviora & angustiora. Racemi terminales, erecti, tres quatuorve uncias longi, compositi ex pedunculis oppositis, inferioribus plures flores pedunculatos gerentibus, superioribus unifloris Si nonnunquam verticillatis. Flores decandri.

I N D E X

PLANTARUM HIC DESCRIPTARUM.

	Pag.		Pag.
Acroftichum longifolium	109	Eugenia paniculata	108
Adiantum decurrens	103	— — periplocaefolia	109
Arenaria liniflora	107	Laurus martini ceasis	109
Azclepias alexicaca *	101	Melastoma cinnamomifolia	in
Azplenium anthriscifolium-	iv*	Polypodium phytagineum	104
———-forbifolium	106	Viscum macrostachyon	109
Chionanthus caribæa	110	*	

IV.

REV. FRANCISCI XAVERII WULFEN

PLANTS RARIÖRES CARINTHIACAE.

Continuation ad pag. 362. Vol* I. Collect auftr.

CXU.

ACONITUM TAURICUM.

Aconitum caule subfimplice; racemo florum brevi, compatto; galea Tiumili, breviter rostrata, antrorfum repando-subfornicata; foliis nitentibus, quinquepartitis; segmentis oblongis, latiusculis laciniatis; laciniis remote inciso-dentatis.

Aconitum Lycoftonum ML Tauricum, *Cluf. hiji. plant, p. XCV.*

Aconitum Napello fimile, fed minus, caruleum, praecocius. *J. Bank, hiji, HI. p. 656.*

Non poffumi non peculiarem Aconiti fpeciem refufcitare; quam, fi *Viafium* fere demas unicum, vix alii adhucduni probe cognitam exiftimo. Cum Aconito Cammaium, perperam plane tam a *Linno*, quam ab Hallero, Allio-

j&llionioque confufam video, qua tamen multo adNapellum propius, quam
 ad Camroarum, accedit Exitiale forfan, quod aconita proinifcne recon-
 dunt virus, effecit, ut ne inanibus curiosius traftata examinarentur. Idem,
 profe&o & cum eo Clufii coma nutante, & cum ejusdem Neomontano fa-
 ftum videmus; quotum iftud cum Napello Jacquinius; utrumque contra cum
 Aconito Cammarum Hallerutf Linnaeusque commifcuerurgt; minus, fi quid
 video, bene. Floret Tauricum inde a Junio in Septembrem ufque aperto
 fub Jove frequentiffimum, nee ulli tattum pecori, in Taureris Malnizenfi f
 Radftadienfi f Raurifienfi (Auftriacis *Heiligerbluter Tauern*) turn & Ma-
 trajenfi. Radicis & illi loco oblonge gibbus eft Napus medio, in orberfi,
 de ventre novos ut plurimum prolificans alios, fibi adamuffim fimiles, flo-
 rigeros, fecuturis, duntaxat daturos annis, caules; Candidas intus fungofe-
 que iubftantie cum prolibus eft mater, extus de more nigra, multisque un-
 dique & longiufculis circumvallata funiculis dicam? an fibris? quaquaver-
 fum fparfis. N^pis ex illis, firmus qui enafcitur caulis, & ipfe fungofa*far-
 flus medulla, paulo ultra cubiti exaltatur altitudinem normalis, craffiufcu-
 lus, laevis, tereti-fubangulatus, viridis, obfcure fanguineis cum tempore
 guttatus maculis, vel infima jam a baif ftipatiflime foliofus, in floriferum
 terminates racemum; brevem quidem refpeftive ilium, at tanto compaftum
 fgagis addenfatis undique magnis uniflororum breviumque pedunculorum
 corollis. Subfimplicein dixi ilium in fpacifico caractere; nam omnino fim-
 pliciffimum ut plurimum in racemum abit, etfi fera tandem in state, bre-
 ves, fimplicesque pauculorum flornm > principe fub racemo, attollat ramu-
 los, ereftos pariter. Folia in inferiore ejusdem parte frequentia, alterna,
 pjtiolata^ nuda, fubcoriacea, nitentia, faturate fupra nigro-viridia, fubtus
 nonnifi aquofe virefcentia, fubpalmato quinquepartita; fegmentis oblongis,
 latiufculis (certe plus, quam in Napello, etfi minus, quam in Neomontano

latefcentibus) planis, bafim verfus cuneato-anguftatis , fupra medium profur -
 de laciniatis* laciniis remote incifo-dentatis, dentibus lanceolatis* Petio-
 lus eorumdem, pro altitudinis ratione, longior, aut brevior , erefto patei
 firmulus, fupra canaliculatus, fubtus longitudinaliter teretiufculus. Ramuli
 fi qui occurrunt, fub principe, ut innui, racemo, brevesque, & fimlices,
 & pauculis, laxequae ordinatis onufti floribus, ere&o &c ipfi patent, cauli
 approximate Racemus terminalis florifer, brevior, quam in ullo alio Aco-
 nito; dimidiam Ipithamam vix excedens; floribus adeo fipate obfitus, ut
 de ejusdem communi axe videas nihil; nullis interfiftentibus foliis, fi brafteo-
 las anguftiffimas, lineares, ipfo, quam iuccolant, pedunculo, breviores,
 excipias virentes^ Flos magnus, pedunculo mediocri, erefto-patenti, axi-
 que fere appreffis, & nudo infiftens; calyce nullo, cujus loco, altera rur-
 fum, priori fimilis, brafteola corollas bafi extus adnexa. Corolla pentape-
 tala, faturatiffime, & nigro fere violacea, euro tantilla bafim verius viri-
 ditite; petalis ftruttura, & magnitudine inaequalibus; omnibus tamen extus
 villo longo, molli, albido, rariter adfperfo, ac denique cadivo, pubenti-
 bus: fupremo reliquis majore in cucullis , five &c caffidis militaris fpeciem
 conformato; galeam antrorfum breviter roftratam, quam in Napello hunrilio-
 rem, & magis oblique adfeendentem > minusque antice curvatani; caeterum
 poftice compreffam, dorfo gibbam, extrorfum fornicato hiantem, referent^
 Lateralibus binis oppofrtis, duplo., quaminfimis, ampliatis magis, obova-
 to-fuborbiculatis, cum exiguo acumine, concavo-feftiiconniventibus. Infi-
 mis itidem binis, oblongo-fubovatis, planis, oblique deorfum porreffis.
 Microfcopio fi petala hxc intueare, fingula extus fubtiliffime papillofo - tu-
 berculata, rugisque oMongis, Sf. oblique incurvis exftantibus percurfa; fi
 contra lucem praeterea teneas, pun&ulis totidem illufrioribus varia, & ve-
 nis Jpngiti4 nalibus faturationibus dichotomice ramofis pifla videbis. Ne-

Stamina duo malleiformia, longe pedunculara, approximata, parallela, sub galea recondita, e viridi, dilute dein caerulea, pone stamir, e receptaculo exfurgentia, eura, antrorfum arcuata, fistulofa; brachiis malleoliinaequalibus, superiore brevior, obtuso, furfum incurvo; inferiore longiore, cernuo, extrorfum concavo, apice integro, subtridenticulato? Stamina plurima, nonnihil deflexa, & versus galeam deinceps incurva; filamentis e viridi tandem caeruleis, subulatis, basin versus compressis, & margine membranaceo albo alatis. Anthers subrotunds didymae, e viridi atro-caerulea polline albo. Germina tria oblonga, subulatum in stylum definita; stigmate simplice. Capsulae tres, labris, subcylindraceae, subulato apice terminate univalves, introrfum dehifcentes, polyspermae. Odor fenilbilis nullus; effluvia tamen transpirantia hand innoxia.

CXLU.

ARABIS THALIANA.

Arabis foliis oblongo-subovatis integris, radicalibus petiolatis subdenticulatis; caulinis ad ramorum exortum sessilibus.

Arabis foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Linn* fp. ph' p* 919* num* 3. Leers flor. Herborn. p. 147. man, 514. Allion. flor. ped. torn. Lpag* 268. ««n^97i. Gerard, flor* gallopr* peg. \$66, num. 2. Gunner flor, norv* torn* 2. p. 42. num. 495.*

, Eurfa pafioria, five Pilofella filiquofa. *Jf. Bauh. hill. II p- 87°«*

Arabis foliis radicalibus petiolatis, ovatis, dentatis; caule subnudo 'ramofo' *Holler hifiJHrp. helv. torn* 1. p. 197. num. 45^a»*

Draba angustifolia. L minima, II. media, & III. major. *Barrettér icdn.* 26*9.
& 270;

Non haec rariorum una; forfan vel idcirco etiam a nuperrimis ne-
gle&a magis, quia non e rariflimis; frequentiffima tamen & Clagenfurti, &
Labaci, & Goritiae ad fabulofos agrorum margines, recentemque inter fege-
tem, paulo pod primum nivium deliqwum; Thlafpi, quod Burfam pafloris
dicimus, promifcuae intermixta* Nihil interea de ea diligentiffimus Scopo-
lius! Nihil & judicioffimus Jacquinius! Sed neque Atrebatum gloria Clu-
fius! Ejus in Elencho meminit Kramerus cof iofiffime in monte Rodaunenfi I
turn & Latifontano. *Sunt & haec, qua? prs ceteris, ut plurimum, amat lo-*
c? ? dubitare fas eft; quando qui veram cunque Thalii defcribunt plantam,
uno eidem omnes ore, non nifi recentis agros fegetis, agrorumque verfuras,
& fabulofos eorundem liinites affignant. Intervenit quidemCranzius, Möd-
linglB, Badenfesque Thalianse -Arabidi rupes, & faxorum fiffuras, omnem-
que montium eorum catenam pro natali attribuens folo! At quaenam ilia fit,
quam defcribit, tam maximis cum corollis, Arabis? fcilipet Helperis Raji
alpina minor &c. (quae eidem, pra Barrelierii & Johannis Bauhini proba-
tur iconibus) quisque ex Halleri num. 453, p 197. torn. 1. hift. ftirp. helv*
intelliget Nemo hie Halleri (ex Opufc. bot. p# 95, num. 8 It. Herein!^*
alperas, qus ea prata finiunt, objiciat rupes; Eruditi Gbttingenfes fidem
facierit, non nifi de hinfuta Unruei Turritide eundem loqui; de Herba,
inquam, fanfri Alberti, five Barbarea murali J, Bauhini, quæ teftè flora
Ruppil Jeaenfi, Gottingae plurima; nee ab Eryfimo fimili hinfuta, non la-
ciniatâ, alba C. B# diverfa. Sane, videri, duntaxat, a Thaliio delcri-
ptam, non & reapfe defcriptam fub PilofeU« filiquatae nomine, inquitloco
citato rLUerus Turritidem fuam minorem, id eft, hinfutam Linnaei; quam
ipfara

isfam dein suspicionem, sua in stirpium helveticarum historia, meliora edo-
this, dereliquit Radix plantulae istius annua, albida, filiformis, peris-
 pe gracillima, re&a, radiculis lateralibus, fibrillofis, quaquaverfum spar-
 fis, nunquamnon, aliquibus faltem, obfita; caulem communiter unicuin,
 rariusduos, tresve noimaliter attollit, jam ad unius, aut paulo amplius,
 plitudinem pithamae, jam minorem; etiam duorum duntaxat, triumvepol-
 licum; estque aut simpliciflimus, atq[^]tum admodum gracilis, aciculnon-
 nifi craffitudine, aphyllus, vel & pauciflimis onuftps foliolis fessilibus; aut
 contra ramofus, fili eniporetici craffitudine, foliis & ad ramorum exortum,
 & per ramos etiam laxe sparfis, obfitus. Color illi, si bafm ex fanguine
 velut rubentem excipias, viridis, plerumque Jamen plus minus ex virore
 glaucescens, & ex glauco denique in apricis, radiisque folis expositis, nj-
 fo L-fescens. Totus quantus est, una%cum foliis, villis primum longiufcu-
 lis, albis, rigidulis /patentiflimis, (in caule quidem simplicifltmis, in fo-
 liis vero bifurcis) hispidualus, fed his denique decidentibus, glaberrii«B.
 Folia caulina fessilia, oblongo-iubovata, aut & obtufe lanceolata, integra.
 Radicalia copiofa, in orbem patentia, petiolata, jam oblongo-fubovata,
 jam lanceolato-ovata; nunc integriufcula, alias per oras crenata, dentata-
 ve: 7offideo etiam exemplaria, in quibus lyrato-pinnatifida; iubtus cum
 ^Sftipore femper rubro-violacea, De eorundem villis jam innui. Racemus
 floralis in caule, & ramis, terminalis, ereftus, laxis; floribus peduncula-
 tis, erefto - patentibus, parvis. Calyx tetraphyllus, foliolis oblongo-ova-
 tis_f concavis, erefto-conniventibus, corolla brevioribus, fubasqualibus[^]
 binis oppositis basi gibbis, & humilioribus, e viridi tandem flavescens,
 villis primum rariter adfperfis_f dein nudis, & deciduis. Corolla crucifor-
 mis, tetrapetala, parva, nivea, ad faucem subflavescens, erefto-patens;
 petalis oblongo-obovatis, ereflo - patentibus; ungue calycis altitudine, lim-

bo integerrimo. Stamina sex, tetradynama, calycis altitudine; binis oppositis paulo brevioribus, basi gibbis. Filamentis fubulatis, albis. Antheris oblongis, cordato-acuminatis, erectis, flavis. Geimen erectum, teres, faepius, admodum praecociter, calyce, corollaque nondum dilapsis, in filiquam jam abiens. Stylus brevissimus; stigma subcapitata. Glandulae netariferae quatuor virides, pene microscopicae; harum binae oppositae* minores, sita inter duo quaevis stamina longiora, & calycem; e binis, rursus oppositis, sed majoribus, inter germen & stamen quod vis minus interjacentibus, a centro in carinalem extrorsum dehiscentibus, stamen minus enascitur. Siliquae, pedunculo, cui infertunt, tandem longiores, laxe erecto patent, teretes, graciles, totulosae, rufo-fuscescentes, laeves, biloculares, l- > it7a1v* » s ? vflivniifi fUanTirflamflti apniin1ihn« - Rl IM rail fill's, alverrnp rpxrniit-
tione deciduis. Semina minuta, multa. Floret inodora jam initio Aprilis.

CXLIII

ARTEMISIA GLACIALIS. Tab. 7, fig. 1. a. 3.

Artemisia fericeo villosa, incano-virescens; foliis radicalibus subbipinnatis; pinnis, foliisque caulinis subpalmato-tri-quinqueve partitis, lon[^] petiolatis.

Altilimarum incola alpium, per frequens videtur in Koralpe in der Bewtenau; item im Fkiflergraben unter 'der Goldzeche. Turn versus auriferum Wafchgang. Denique Leontinis in alpiibus &c. In quinto jam alias Florae austriacae Jacquinii Volumine pag. 45. tab. 35. elegantis istius, rarissimaque stirpis descriptionem, figuramque, qualis ad minus plerumque occur-

cu rere in alpihus adfolet, dedi; certus vel jam turn, difcriminis intercedere nihil inter Apfinthia Halleri num* 125, & num* 126. nifi fyrte ex diverfitate altioris, aut rupeftris magisque inclementis foli natalis; quibus de caufis, quæ fertiliore in loco frequentioribus per caulem abundare poffet floribus, altiusque paulum efferre caput; ultinuis illis nudarum in rupium jugis humilior longe vegetaret planta, colleclis, quotquot demum haberet, floribus, in unam veitut terminaiem umbeiiiani dicam r̄ an corymbum verius? Multa mihi exinde, hac fuper re, cum Clariffimis Mygindo, Jacquinioque per litteras difputandi enata eft occafio. Ab Hallero (cujus ut fatendum eft, maxima pro merito, alpina in botanice femper eft au&oritas) dimoveyi haudquaquam poterant* Sed neque ego uberius altercandum neceffe judicavi, ubi alii arbitri effe poffent. Ut ne tamen, five diverfae denique fint fpecies, five unius, diverfae duntaxat varietates, ut ne, inquam, & earum icon inter auftriacas defideraretur planta¹T, pingi & ipfas ad naturam feci; id unum porro adjiciens: fuipeftum mihi magnopere effe Apfinthium Hal¹ ^ ri num. 126* fi quidem reapfe diverfum ab Apfinthio ejusdem num[#] 125. fit. Quaeritipfe: an Artenjifia foliis pinnatis, caulibus adfcendentibus hir⁷Tutis, floribus globofis cernuis, receptaculo pappofo Linnei, non eadem > fuo cum Abfinthio? At quis Rupeftrem Linnaei Artemifiam, ut earn Linnaeus i⁴iio per Guthlandiam in itinere pag, 285. adumbravit, non illico ab hac noftra diftinguat? Pinnata Artemifiae rupeftris folia, anne unquam vel fubpalmata dici poffunt? Pinnulae ipfae an non fimpliciffimcB? an non lanceolatae? an non a contiguis remotae? quafnam earum, fi extimam forte excipias, tri- aut quinquefida? nonne caulina folia per omncm, quantus[^]eft, axis longitudinem, fimplicia utrinque foliola, aequalibus inter fe remota diftantiis lupendunt feffilia? & quod probe notandum, inferioribus femper nrinoribus? ftirpem, qualis ut plurimum in alpihus invenitur videtis in Vol.

5» Flor. Auftr, .Append. p«4<S. tab. 35. Tres hie ejusdem exhibeo vaue-
tates: 1) Minimam, quatuor cum florum capitulis majufculis, in umbellam
fere terminalem colleftis. a) Mediocre[m] aliam, cum capitulis florum majuf-
culis, paucis, fimplicibus, pedunculatis, terminali lateralibusque fubco-
•rymbosis. 3) Mediocre[m] itidem, ex axillis pedunculiferam, caule, pedun-
(Culisque, umbella florum exiguorum terminatis. Nihil caetera in omnibus
'his quatuor varietatibus diverfitatis reperi, five quoad amcenitatem aroma-
tici odoris; five quoad ftructuram, formam, colorem, villofitatem feri-
ceam foliorum; five denique quoad calyces, corollas> femina, thalami-
que pappum.

CXLIV.

CISTUS SALVIFOLIUS. Tab;«.

Ciftus fubarborefcens, exftipulatus; foliis oppofitis, petiolatis, oblongo-
ovatis, rugofis, fubcrenulatis, utrinque hirsutis; pedunculis florum
longiffimis, ante anthesin nutantibus.

Ciftus arborefcens exftipulatus; foliis ovatis petiolatis utrinque hirsutis. *Linn*,
Jp. plant, p. 738. num. 10, *Scopol. flor. earn.* 2. torn. 1. p. 374.,:««. 643.
Jllion. flor, ped. torn, s. p. 101, num. 1655, *Gerard. fior.gaUopr**
p. 397. num. 13*

Ciftus fruticosus, foliis petiolatis, ovatis, rugofis, ferratis. *HaUer hijl.flirp.*
hefa> torn. 2. p. 2. num. 1031.

Ciftus foemina* *Cluf. hijl. plant*, pag, 70. *Joh. Bauh. 11 pag.* 4. *Lobel. obf.*
pag. 549-

In Carfcho inter Tergeftum & Obzinam, ad dextram viae medii circiter montis crefcit frequens in fylvula, iloretque medio Maji, albam eminus mentiens Rofam. Frutex humilis, cubitum & amplius altus, apud nos tamen procumbens, nee nifi ex decubitu, extimos fuos ramos, florumque pedunculos elevans, quaquaverfum diffuius, ramofiffimusque. Bene vero obfervavit Hallerus: ramos, ut plurimum, pedunculos florum, foliaque, per paria opponi. Sunt illi truncus, ramorumque virgae, fubftantiae lignae, duraeque, quamvis nonnifi calami fcriptorii craffitudine; cortice atro primum rubente, tum fufco, denfe hiriuto, dum decalventur denique. Ut vero cum florum pedunculis, novelli vireant ramuli, ob copiofum tamen, decumbentemque furfum, villum, nonnifi incano-lanuginofos dixeris teneiore in aetate, qui denique & ipfi magis virefcunt magisque, ex virore rubentes, & ex rubentibus fufci demum fiunt. Folia, ut innui, oppofita, craffiufcula, ficca, fubcoriacea, infar* foliorum falviae, rugofa, taftui fubcabriufcula, petiolata, utrinque hiruta, fubtus etiam, praeprimis in^tio, albido-incana; cum lupra faturatius & obfeure vireant. Figuram quod eorumdem attinet, ea profedo in primordialibus, minoribusque circintatae fere, ut Clufius ait^ rotunditatis, brevi in ovatam, tum in oblongo-fubovatum, aut & fere obtufe abilit lanceolatam, orarum niargine integro, nee ferriflo; obiter duntaxat, ut in Salvia, fubcrenulato. Pedunculi communiter oppofiti, longiffimi, uniflori, erefti, apice modo ante corollarum explicationeni nutantes, aphylli dempto duplici foliorum minorum, obtufe lanceolatorum pari; quorum alterum bafin eorumdem ftipat; lub media iis alterum enafcitur altitudine. Flos rofae adinfar magnus; intra calycem adhucdum concludus, five nubilus, cernuus femper, & obtuse trigono-pyramidatus, angulis bafeos recurvatis, caeterum ereftus, patentiffimus* Calyx pentaphyllus, viridis, hirsutus, foliolis tribus exterioribus, paulo majoribus,

bus, cordatis; binis interioribus ovatis. Corolla pentapetala, maxima-patens, celerrime cadiva; pctalis obovatis, repando-emarginatis, apud nos Temper niveis, bad duntaxat macula majufcula citrina notatis; per ex-ficcationem vero citrinis, macula bafeos aurantiaca. Stamina plurima, calycis fere longitudine; filamentis antherisque flavis. Germen globofum, feffile, viride, hirtutum; ftylus vix, aut ne vix ullus; ftigma craffiufculum fungofum, depreffo fubcapitatum. Capfula ovata, quinquelocularis. polyfperma.

CXLV.

CAMPANULA ZOYSH.

Campanula caulibus fubtrifloris; foliis radicalibus ovatis, longe petiolatis; caulinis oblongo-obovatis, feffilibus.

Crefcit e fifTuris rupium alpium Vochinenfium, turn fie in fummitate montis Storchez, pariter e rupibus, menfe Augutto, quum nivibus denique cautes fpoliari folent iffce. Primam rariffima* ftirpis cognitionem Illuftriffimo Domino Carolo de Zoys "debeo; qui, ut Frater ejusdem Sigismundus Munerologis cumprimis, fie Botanies ille, (uo cuin cognato Domino de Weber, meo quondam in Philofophia Labaci difcipulo, totos feffe fuasquecuras pene omnes, & ftudia, otiumque, cum non modicis certe thefauris, confecraffe videntur Intra modicam, qua fummarum fifliirae rupium reple-ri folent, terram, horizontalis feftpitCampanulae iftius radix gracilis, tere-tiufcula, ex albido fubochracea, ad ejusdem fuperficiem cefpitofe ramofa, lauliculos quotannLs efferens plurimos; pure nonnullos fuliofos; plurimos

alios

ilios floriferos, duorum triumve pollicum altitudine, graciles, tereti-fub-angulofos, glabros, foliis per alterna fpatorum intervalla obfitos, plerumque unifloros, rarius bi-aut trifloros, ere&os equidem, apice tamen cum nubilibus campanulis nutantes. Folia copiofa, fat parva, omnia faturate viridia, lubtus pallidiora, craffiufcula, glabra, integerrima; radicalia fubrotundo - ovata, longe petiolata; caulina alterna, oblongo-obovata, in petiolum velut decurrentia, re tamen ipfa feffilia; fummis, fquamarum inftar, lineari-acutis. Flos terminalis, unicus communiter jinterdum & alter, tertiusve, proprio quisqueiuo deramulifquamofi apice nutans. Germen inferum, ovato-turbinatum, angulofum, glabrum, virid[^] Calyx fuperus, quinquepartitus, corolla brevior, erefto-patens, laciniis lineari-lanceolatis, glabris, iubtus carinatis. Corolla faturatius, aut dilute magis coeleftino-cserulea, lineispi-fta quinque faturationibus, rarius alba; monopetala, oblongo campaniformis, bafi impervia, & ventricofior, limbum verfus nonnihil ftrangulata, limbo ipfo quinquefido, ereclo-patente; laciniis ovato-acutis, margine barbato-villofis; villis longis, albis, ante plenam limbi explicationem, in pyramidem pentagonam, fupra corolla faucem conniventibus. Stamina quinque, coxollis breviora; filamentis fubulatis, albis, fuae quo vis valvuhæ neftariforfini ovato-fornicate, & ipfi pariter alb«, infixo, Antherae oblongae, 3[^]uofe flavescentes. Stylus ftaminibus longior, filifonfiis, albus; ftigmate tripartito, craffiufculo, deorfum incurvo, papillofo, aquofe flavente. Capfula angulato-pelviformis, fuperne claufa, latere foraminibus tribus bians, & femina effundens tribus e loculis. Odor is exjpers.

CXLVI.

THLASPI PRJECOX. Tab. 9.

Thlafpi filiculis obcordatis; foliis carnofis, glabris, glauds; fubcrenulatis, in petiolum decurrentibus; caulinis feffilibus, femiamplexicaulibus, obtufe cordato-fagittatis; petalis calyce longioribus.

Thlafpi montanum filiculis emarginatis; foliis radicalibus ovatis ; caulinis amplexicaulibus, *ScopoLflor. cam. a. torn, 2. p. i8» num. 811.*

Thlafpi montanum, Burfae pafitoris^fruftu. *Column, ecphr. p. 275. tab. *i6.*
Lepidium caule eretto; foliis radicalibus petiolatis, ovatis; caulinis amplexicaulibus, fagittatis. *HaUer hifl.jiirp. helv. torn* i,p. 223. num. 518,*

Triginta, & amplius, funt anni, quod plantam hanc perbene novi. Numquam non pro montano Linnaei habui Thlafpi; pro eo, inquam, quod iub eodem, in Ecphraii, Columna jam dudum propofuit nomine; quodque egregius Scopolius, qui in iisdem, quibus ego millies vidi, inventam montium tra&ibus, recensuit. Linnsi, quae maxima eft, perfuafus afferentis auctoritate, nihil etiam dubitaveram, Badenfe Cluffi Thlafpi, ifthuc revocare ; etfi nee figura , quam dederat, maxime probaretur ; &quaE rron nulla objicerem , haberem. At poftea dein quam in Auftriaca Jacquini Flo-ra, Badenfis iilius Cluffi plants, ad naturam vidi piftam figuram, meumintellexi effe diverfum. Mcum jam exeunte Martio, ApriliquecircaGoritiam, Tergeftumque frequens in montanis ubivis; e regione Podigoraj; in monte *Sant\o &c.*; ferius nonnihil, Aprili fcilicet, Majoque in fylveftribus montanis inter Laafe & Prevald, turn omni in Carfcho etiam; in adfcenfu de-jiique praealti Montis Slivinza prope Thurnlag & Zirchniz; jamjam deflo-refcens

r^hfcens initio Junii, inveni, numquam corolatum aliter; numquam alia cum radicis, caulium, foliorum, calycisve &c. fru&ura. Non illi certe longis quaquaverfum ferpens viticulis radix, sed unita verius, simplex, fusiformis, recta in terrain descendens, obfita undique fibris, fibrillisque vage difcurrentibus, ex albo in flavum demum languens, rarius unicum modo, plures imo quotannis novos efferens caules una, pro foli ratione minores, majore^{ve}, numquam non erectos, simpliciffimos, teretes, laeves, foliosos, cespicii five & glauci coloris. Folia carnofa, ejusdem cum caule coloris glauci, glabra, integra, copiofa. Radicalia in orbem undique per terram fparfa, obovata, longiusculum in pctiolum decur^{entia}, obiter quandoque per marginum oras, laxaque fubcrenulata, fubtus cum tempore violaceo purpurafcentia. Caulina alterne per eundem feffilia, obtufe fagittato-cordata^{liberis} eundem auriculis femiamplexantia, ceterum integerrima, erecto-patentia. Racemus floriger terminalis; floribus pedunculatis, primum in umbellam, five verius corymbum compactum colieftis, dum laxe diducantur denique, erecto-patentes. Calyx tetraphyllus, erectus, corollis duplo brevior, nee gibbus; foliolis oblongo-ovatis, jequalibus, integris, concavis, extus dilute rubellis, glabris, margine albefcentibus, demum cadivis. Corolla tetrapetala, cruciformis, petalis obovato-oblongis, in unguem decurrentibus, integerrimis, niveis, calyce duplo longioribus* Stamina fex tetradynama, calyce tantillo longiora, filamentis fubulatis albis, binis oppofitis brevioribus, calycis duntaxat altitudine. Antheras oblongae, flavae. Nectariferae glandule quatuor, virides, globosae, exiguae; binae quaevis bafin ftaminis minoris ftipantia ^{Germen} oblongo - ovale, compreflum, nudum, apice fubtiliffima incifum crena, ad recipiendum praecife ftylum, genuine turn iplo longiorem ^{& filiformem}. Stigma obtufum fubcapitatum. Silicula obcordata, ftulo longo, permanente influfata, perpendiculariter pedunculo.

culo, ad horizontem denique parallelo, infidens, extus gibba, introrsum concava, margine compresso* & velut membrana alata, bilocularis, bivalvis, valvulis navicularibus; diffipimento lanceolato, valvulis contrario* Semina quovis in loculo duo. Odor nullus.

CXLVII.

SILENE PUMILICX Tab. 10.

Silene caulibus unifloris, floribus maximis, calyce subcoriaceo, ventricofa» campanulato, hirsuto.

Et hujus quoque in quinto Flora? austriacae Jacquinii Volumine descriptionem, figuramque jam alias dedi; mancam fane hanc, nee carae& rificas distincte exprimentem notas. At enim, neque huic, cum pingendam feci, destinata fuerat scopo. Malnizenfem cum forte, pi&ore comite, tranfeenderem Tairrerum, obviam & ibi rursus habui, ftatimque meos icilicet in usus, ut aliquam, deperiturs per iter plants, haberem iconem, vivis ut pingeretur coloribus, jussi ; pi&aque ex arena, ut dicimus, {ed nonnisi properante fuerat manu. Jacuit turn aliquo mea inter scrupta tempoTe; Guru opportuna fe , 1 inna?o scribendi, obtulit occasio. Mifi itaque & hanc, ut erat, plures inter alias; sed adhsfit Viennx, tantumque amicissimo placuit Jacquinio, ut aeri me infcio incidendam curaret. Supplevi equidem (quod unum jam turn fieri poterat) ampla, deficientem in icone radicis, ftaminumque &c. frucluram, descriptione; cum nihilominus ab eo inde tempore iniquius ferrem femper, pulcherrimam Noricarum alpium ftirpem, in ele-

el]gantiflitno opere, minus exiftere perfe&e expreflâm, hac demum de cau-
fa, ut pingeretur iterum, fed numeris abfoluta omnibus, procuravi*

CXLVIII.

HIERACIUM INCARNATUM.

Hieracium fcapo multifloro; foliis radicalibus obovato-oblongis, repando-
denticulatis hirsutis.

Hieracium fcapo multifloro, *udo; foliis lanceolatis, denticulatis, hispidis,
dilatatis, obtufis. *Scopolijlor. earn. 2, torn, &. p. 106. num. 968. tab. \$4.*

Noftris in montibus frequentius nullum. Illud ego in apice olim mon-
tis fanfti Jodoci prope Crainburgum, ejusque declivibus inveni pratis exeun-
te Majo. Eodem item tempore alias, in primis Montis Loibl acclivitati-
bus extra Kirfchentheur; tum in Singerberg *nächji der deutſchen Kapl*, dum
ex Ebenaii adfcenditur initio Junii, una cum Agrimonia Agrimonoide &
Orchide Sambucina. Iterum Junio in finem vergente ad fanum iancli
fpiritus, Villacum inter & Bleybergam, dum in Villacenfem *HeiHger
Stein* di&am'alpem adfcenditur. Nee non in Valle Julia (*Geilthal*) *unter der
Windifchen Hbhe*; ac Dravana fub Ortenburgenfibus alpibus, alibi que fe-
pius. Radix non equidem praemorfa; fuffiformis imo, fibrofisque comata ra-
diculis, oblique tantifper in terram demerfa, unum plerumque (tamen &
duos, tresve interdum) ad pedis plus minus altitudinem, complurainter ra-
dicalia. folia, attollit fcapum, laxè apicem verfus paniculato-ramofum. Eft
illefat gracilis, firmus tamen, teres, primum viridis & villofus, tum
una cum pedunculis florum, rufo-fufcus, nudus, & glaber; ioliis obfitus

nullis, si perbreves demas squamas, five foliaceas bracteolas lineari-lanceolatas; quibus ramos extremos, aut & florum succulant pedunculos. Radicalia contra folia complura, per terram in orbem sparsa, dum tantisper suberecta attollant se. Crassifolia haec sunt, fere & subcoriacea, obovato-oblonga, in petiolum etiam velut decurrentia, laxe per marginis oras repandenticulata albidis supra infraque villulis hispida. Flores compositi syn-genesiae aequalis. Calyx cylindraceus, squamis imbricatus linearibus, *Ka-dis*, dorso teretibus, interioribus longioribus, aequalibus, exterioribus brevioribus, duplici in serie alternantibus, non patulis, sed incumbentibus. Corollae sequales, hermaphroditae, ligulatae f. lineares, truncatae, apice quinque-denticulatae, patentes, dilute incarnato-rubella; tubo basi brevissimo, albo, ad faucem pubescente. Stamina quinque, capillaria, brevissima, alba. Antherae longae, in cylindricum subpentagonum connatae, laterius rubentes, postine aurato-flavente. Receptaculum nudum. Germen oblongo-subovatum. Stylus albus antherarum altitudine; (ligulatae duo ex-ferta, recurva, (implicata, rubella. Semen oblongum nudum, coronatum pappo febrili, fimbriato, capillaceo, longo, fericeo-candicante.

CXLIX.

HOTTONIA PALUSTRIS,

Hottonia floribus verticillatis; pedunculis unifloris.

Hottonia pedunculo verticillato-multifloro. Linn.Jp. plant, p. 20 & num. i. Scopolfior. earn 2, torn. 1. p. 137. num. 213. Oeder. flor. dan. tab. 487. Gunner, flor. norv. torn. 2. p. 138, num. 1062, Holler hifl firp. kelv, torn, i.p. 279. num. 632.*

Mille-

Millefolium, five *Myriophyllum aliud.* *Matthiol. p. 507.*

Viola aquatilis. *JDodon. pempt. ?• 584**

Myriophyllum equifetifolium. *Lobel obferv. !?, 460,*

Faeniculum aquaticum fecundum. *Tabernxmont. p. 186.*

Frequens in Lacuftribus Labacenfibus, foflisque, pra?primis verfus Hyperlabacum, tum etiam in aquofiffima, multumque lutofa foffa propter fepem Caftelli Groffenek Domini Pollini. Radix farmentofa, teres, alba, late per terrain paludofam limofam atram dikurrens, & repens; de fe nuda, fafciculis tamen fibrill^um fparfim demiffis-radicata, ftolones hinc inde pure foliofos, & ipfos lub aquis profratos> emittit, altero demum anno apice fcapigeros, natantes, ac ultra fuperficiem aquae emergentes, furreftosque# Folia in verticillos laxè ordinata, quatuoj, quinqueve, aut δc fex in quovis; funtque pinnata, ovatas profundeque' peftinatas referentia frondes, in orben: feffiles; fub aquis reflexas, explanatas contra in, aut paulo fupra earundem fuperficiem* Pinnae, earumque communis axis, admodum tenues, lineares, planae, laeves, ut plurimum fimpliciffimae, acute, faturate virides. Scapus floriger, extra aquam normalis fubpedalis, teres, fiftulofus, e viridi tandem fufcus, primum pubefcens, at demum laevis, nitens, aphyllus. Flores apicem verfus interruptim verticillato - racemofi; verticillo quovis tri • quadri - aut fexfloro. Flore quovis breviter pedunculato, ex axilla bra&eolae lineari - lanceolate, pedunculum fubpubefcentem iubaequantis > affurgente, erefto-patente^ Calyx quinquepartitus, foliolis linearibus, anguftiffimis, laxè ordinatis, ereElis, fubpubefcentibus, corolla tubum aquantibus. Corolla monopetala, hypocrateriformis, magna, nivea; tubo brevi, fub fauce ampullaceo, & flavefcente; limbo patentiffimo, quinquepartito > fegmentis oblongo-obovatis, apice fubemargi-

natis. Faux hians, pentagonis, faturate. flava. Stamina quinque, brevia, interno urceoli ampullacei parieti infixis; filamentis fubulatis, albis. Anth6ris fubcojdato-triquetris, acutis, flavis, altitudine faucis. Germen globofum, feffile, nudum, in capfulam denique abiens itidem globofam, unilocularem, polyfpermam. Stylus ere&us filiformis, duplo altior fauce, albus, ftigmatate coronatus globofo.

CL.

SATUREJA RUPESTRIS.

Satureja pedunculis folitariis, lateralibus, bisdichotomis, fecundis; foliis ovato-lanceolatis, ferrulatis, fubtus foveolato-punftatis.

Satureja thymifolia racemis lateralibus folitariis, foliis ovatis, rariterdentatis. *Scopolflon earn* 2* torn* 1. p, 428. num. 737. tab* 29.*

Thymifoliam hanc Clariffimus Scopoli compellavit, quia eamdem cum Cafpari Bauhini Satureja thymifolia effe cxiftimat; at quo demumjure? mihi ignotum. Certe fi non fortioribus convictos id afferat rationibus, quam quibus induftus fuiffe videtur, ut crederet, eamdem hanc, effe ftirpem illam, quam Matthiolius cap. 38. libr. 3. Saturejam [*five* verius $3^{\wedge}/3^{\wedge}$] Diofcoridis dixit, turn enimvero non parum aberrat. Matthiolius rupeftrem hanc plantam novit profeclo numquam. Loco a CL Scopolio citato, de vera legitimaque Diofcoridis, & Grascorum omnium, ipfiusque Pauli agit Thymbra, quas Linnaeo Satureja Thymbra eft. Cum nec hanc noffet, ejusque deftitueretur genuina icone, Plinii aliorumque (*jntei* Thymbram & Saturejam fativam non dirtinguentiumj fecutus fententiam, Saturejse hortenfis

Lûinaei propofuit figuram. Quid ? fi & Satureja Thymi folio C. Bauh* non alia fit, quam quæ Linnaeo Satureja Græca dicitur, a rupeftri hac diverfifima ? Sed mitto haec, quæ quisque ex Clufio, & Johanne poWimutn Bauhino III. p* 2. cap* 44- & cap. 45, uberius eruet. Crefcit Satureja rupeftris in faxis lateris lasvi Lifoncii haud procul Goritia; turn & copiofe in afpe-?is rupeftribus prope Haidoviam (*Haidenfchaft*, Slavice Kaidufchina) flore-retacipiens verfus finem Julii, & Augufto. Causis novem, decemve pollicum, bafi fublinefcens, deflexus, ac velut ex decubitu affurgens, obtufe tetragOFius, fubteretiufculus, glaber, ex viridi demum rufefcens, ramolusque. Folia per oinnem caulis, ramorumque longitudine», attamen nonnifi per alterna intervalla, oppofita, eaque obtufe ovato-lanceolata, plana, firma, glabra, per oras denticulata, fubtus rariter punftato-fovetf-lata, an inferioribus breviter petiolata, furfum verfus in petiolum ivelut decurrentia. Flores fecundi, unam nempe verfus plagam refpicientes; dkas fpicatos fimul, & conca,tenato-verticillatos; retamenipfa, nee verticillati, nee fpicati funt, verum laterales, ex oppofitis axillis, oppofiti, per majorem caulis., ramorumque fuperioretn partem ea ordinati ratione, ut inferiores, ex fuperioribus proximos, absque interruptione fere attingant; verbo: pedunculi axillares, oppofiti, folio fuccolante breviores, bis-ut plurimum, & ordinario, dichotomi, ac per confequeps, quãdriflori^ floribus ad eandem exaltatis altitudinenu Brafteol^e exiguse, lineari-lanceolatae, ad quamvis dichotomiam oppofitae, pedicellis fuis nihilo minores. Calyx pedicello proprio tantisper longior, reftus, tubulofo-fubturbinatus, ftriis percurfus decem, quinquedenticulatus, denticulis aequalibus, obtufe acutiufculis, nudis* Corolla ringens, alba; tubo calycis longitudine^ fubincurvo; labiis a^qualibus; fuperiore, five galea, oblongo-obovata, obtufe fubfornicata^ mcifa apice crena acuta; dorfb fubcompreffo carinata, lateribus

furfum reflexis, antice concava, apicem versus aquofiffime in coelestinuto einoriens. Labio inferiore patente, profunde trilobo, albo, ad faucem guttis fanguifeis notato; lobis obovatis, intetjnedio majore, oris crenulato; lateralibus paulo minoribus, integerrimis. Stamina quatuor, didynama, fub labio fuperiore, eoque tandem omnia paulo altiora; primum approxi- niata, antheris binis & binis conniventibus, ferius nonnihil diftantia; fila- mentifalbis; antheris aquofe fublatefcentibus, polline itidem albo* Cer- men in calycis fundo feffile, quadripartitum. Stylo ftamina, galeamque fuperante, albo, apice bifido, cxrulefcente; ftigmatibus fimplicibus, fetac- eis. Senijpa quatuor nuda, Odor amaeniffimus congenerum.

XLI.

SATUREJA MONTANA.

Satureja pedunculis folitariis, lateralibus, bi[^]-terque dichotomis; foliisli- neari-lanceolatis, integerrimis, mucronatis, fubciliatis, fubtus carina- tis, punftato foveolatis.

Satureja pedunculis folitariis, lateralibus, floribus fafciculatis, faftigiatis.

Unn. mantiff. II. p. 410. Scopolflor. earn. a. torn. l.p. 428.»"«-738' tab. 30. non bona.

Thymum durius, quo paffira fere fcetet Goritiensis ager. *Matthiol. Ubr.*\$. Diofc. cap. 37. p. 343' ItemUbr. 4. Diofc. cap. 172. p> 550* cum figura non bona, cui Epithymum, feu Cufcuta innafcitur**

Thymi vulgaris Varietas. *Cluf. hift. p. 357.*

Thymi vulgaris Varietas. *Cluf. hift. p. 357.*

Hyflbpum Goritiense, floribus verticillatira ambientibus. *\$oh. Bauh. hift.*

Jll P. 2. p. 276.

Crescit magna in copia in Monte Predil, in averfa a Valle Rablenfi parte, verfus Flitfch. Goritiae item undique in asperis calcareis, Monte Sanfto , verfus Gargano fupra Salcanum; Monte Sanfti Valentini fupra Sylvam Sabbotinam, Tiino ibidem dicta, increfcente eidem paffim Cufcuta europasa. Turn per omnem, qua late patet Carfchiim abundantiffime. Prope Fontem Timavi, & inde verlus Tergeftum &c. In defcenfu Montis Schneerfcvrg Croatici, verfus Flumen Sanfti Viti, Porto Re, Buccari &c# Item varietas ejusdem potiffimum faturate caerulea (de fenumquam rubra, nifi per deficcationem deniqae intra libros) intra Laafe Thurnlag, & Zirchniz ad pedem montis Slivinza; turn horas circiter fpatio ab Urbe Gottfchee, ad pedem montis, quem *Hafenfelderberg* dicunt &c# Radix ficca, fublignefcens, duriufcula, fufca, fuffiformis, brachiata fibris, radiculisque quaqua-verfum fparfis, jam refta, jam pro foli faxofi ratione obliqua, & veltit repens; caulem unum - plures - etiam cefpitulum nonnuimquam caulium at to 11 it perennans. Caules ex viridi tandem obfcure rubri; primum tetragoni, & ex pube humili hifpiduli; turn teretiufculi fubangulofi, & glabri; bafi initio decumbentes, fed erefti denique, & ex oppofitione fere ramofi, firmi femper, & duriufculi. Superiores, florentesque tam caulis, quam ramorum virgae, numquam non ex microfcopicis exftantibus villulis hifpidulae. Folia copiofiffima, femper oppofita, lineari-lanceolata, integerrima, fefilia, craffiufcula^ firma, ficca, longitudinaliter fupra canaliculata, dorfo fufcus carinata, faturate viridia, inferne punftato-foveolata; apice culpidula parva mucronato; ora marginis, ciliis primum rigidulis, obiita; rffuibis decidentibus, deorfum denique reflexa. Flores & in hac quoque, nee fpicati, nee verticillati; fed axillares ex pedunculis lateralibus, oppofitis, folitariis, proprio folio brevioribus, bis-terque dichotomis, & per confequens, multifloris* Involucelia feu brafteolas dichotomiarum oppofi-

tae, foliis cum proportione similia, pedicellis flofculorum longiora. Calyx, x tubulofo-fubturbinarius, ftriatus, aequaliter quinquedentatus, dentibus acutis, villis albidis, rigidulis, una cum margine dentium hiipidulis. Corolla ringens, ere&a, nonnihil pubelcens* Galea ere&a, antrorfum concavo-fubfornicata, apice crenato-emarginata, labio inferiore tantillo brevior. Labium inferius trilobo-tripartitum, lobis lateralibus oblongo-obovatis integris, intermedio majore rotundato fubcrenulato, ad faucem villofulo* Duptt*is invenitur varietatis. Communis, altiorque, flore eft albo, galea duntaxat quandoque apicem verfus dilute iubczrulefcente. Altera rarior^ floribus non rubris (nifi per exficcationem) fed iaturate caeruleis, ut in Thymo alpino. Ha?c plerumque humilior, floribus apicem verfus magis addenfatis, pedunculis quidem lateralibus & ipfa folitariis, led minus multifloris, faepe nonnifi trifloris; caeterum diftin8;io nulla* Stamina in utraque quatuor, alba, didynama, altkribus binis galeam fuperantibus, filamentis ereftis. Anthers a bafi furfum bifariam dehifcentes, corollis concolores* Germen in calycis fundo qtiadripartitum; ilylus albus, galea ftaminibusque altior, apice bifidus fubczrulefcens; fligmatibus fimplicibus acutis. Semina quatuor, nuda, Odor amceniffimus aromaticus.

CLII.

MELISSA GRANDIFLORA,

Meliffa pedunculis axillaribus, folitariis, dichotomis, fecundis; corollif maximis fub fauce gutturofis; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, dentato-ferratis.

Meliffa pedunculata axillaribus dichotomis longitudine florum. Linn fp.phnU p. §27. num. 2. ScopLflor. earn, 2. torn. i» p. 424. num. 732. (sub Thyryo 1) Gerard* gailopr. p. 261. num. 3. Mum. fior. ped* torn, 1. p* 38. num. 137.*

Calamintha montana praestantior. Lobel observ. p. 274.

Calamintha montana, flore magno ex calyce longo. J. B. 111. P. 2 p. 229**

Frequens in fylvis montanis rupestribus versus Schoderfchii, supra Cfuber; sed longe frequentior in prsaltis fylvis, itidem montanis, & rupestribus, dum ex Gerova in excelsas Croatici Schneeberg alpes adscenditur. Florens in fine Julii & Augusto. Denique inter Canal, & Caporetto. Radix fusiformis, sparsis aucta radiculis fibrosis, simplicibus, compositisque. Caulis unius, alteriusve spithams, nunc simplicissimus, alias (plerumque tamen nonnisi basin versus, & ex oppositione) ramosus, herbaceus, viridis, tetragonus, subtriangulus, villis longiusculis, exstantibus, rariter sparsis, hirsutus, luimpiausque; liaem vim OL in ioms, eorunaemque petions, oc calycibus, pedunculisque occurrunt subalbidi, rigiduli, nec cadi .vi. Folia ex oppositione Temper opposita, majuscula, petiolata, ovato-lanceolata, plana, per oras serrato-dentata, faturatius supra, subtus aquose magis viridia, utrinque, ut di&um hirsuta. Flores laterales, exoppositis axillis oppositi, pedunculis scilicet quavis ex axilla lolitariis, femel aut & iterum dichotomis, ac per consequens tri- five & quadrifloris, demptis fummis, bi- aut unifloris. Involucella (nisi bracteas dicere malis) nonnisi basin dichotomiae stipant opposita, florum pedicellis duplo breviora, nec implicata, sed tripartita, segmentis lineari-lanceolatis, angustis, acutissimis, ciliato-hirsutis* Calyx oblongus, tubuloso-subturbinatus, inaequaliter quinque-dentatus, velut subbilabiatus, denticulis lineari-lanceolatis^ angustis, acutissimis;

mis ; tribus superioribus minus profunde incis, fursum nonnihil reclinatis, & patentibus; inferioribus duobus approximatis, porrectis, tantillo longioribus; orofaucis, villis affurgentibus, & conniventibus, ut fere in Thymo, clauso: caeterum idem calyx longitudinaliter ftriatus, exsuccus, aridus, viridis tamen, & villis albidis, rigidis, exstantibus, una cum denticulorum laterali margine, hispídulus. Corolla respe&ive maxima, calyce plus duplo longior, eleganter rubro-violacea, diaphana, lineis pi&a faturatlu* rubris; ringens, bilabiata; tubo nonnihil incurvo, sub fauce labii inferioris ampliato, tumido; gibbo, & velut gutturofo; labiis extus villis, albis, pubescentibus. Superiore, five galea; refta, apice emarginaia, antrofum concavo-subforaicata. Inferiore galeani aliquantum excedente, trilobo, lobis rotundatis, integris, intermedio majore, faucem versus bicarinato, guttulisque faturatoribus adfperfo. Stamina quatuor, didynama, sub galea, binis majoribus, eadem tantillo excedentibus, filamentis albis, antheris aquofissime luteolis bifariam a basi fursum dehifcentibus. Stylus albus, corollis altior ftaminibusque, apice bifidus rubellus; fligmatibus fimplicibus, acutts, subuncinatis. Semina quatuor nuda in calycis fundo. Odor Me-
|iftx amoenus.

CUA

SALIX MYRSINITES.

Salixfoliis petiolatis, ovatis, ferratis, glabris, subtus reticulato-venofis; capfulis nudis, pedunculatis, ex ovata basi in connum attenuatis«

Salix foliis ferratis, glabris, ovatis, venofis» Linn. Jp. pi p. 1445* ^{mm}*

13. turn for. hpp.p. *B\$* num> 353. tab, bfig.f. cJ tab, y.fig. 6. Gun-

ner

tier fior. nerv. torn. 2. p. 63 num. 595* Leers flon herborn*. !?• 294* num. 753. Allion. flor. ped. torn. 2. p. y^num* 19165, Gerard, gattopr. p. \$%%* num. 64*

Salix latifolia non hirsuta? y^ . Batik. L P. i p. 216.*

Salix foliis ovato-lanceolatis, venosis, ferratis, julis tomentosis > i/j&r UjK Jlirp. helv. torn. 2. p> 308. num. 1.645.

Clagenfurti florens versus finem Aprilis & initio Maji *am Fufse des> Schmalzbergeis dem Walde der Ziguln gegenüber*, in iAa fossarum extremae vi<e cavae, partim extra, partim in fossa turfosa aquifosa. Diu suspensis haerebam, an pro Myrtille, Myrtill-oidem potius Linnsei dicerem Salkem, *quæ folia, iis Myrtilli, prima cumprimis in state, quam simillima omnino ha^ bet? Descriptiones Halleri, ponderis numquam non gravissimi, in tan to aliorum laconismo, incertitudinibus fluctuantibus augebant etiam magis, quatenus ut dubia abitergerent lubricantia invito. Sed folia denique, Linnseofemper integra, & si cum Hallero etiam, obscure duntaxat ferrata dicas, ob replicatam tamen oram, reconditosque inferne ferrularum denticulos, pr& integris certe habenda, quomodo cum iis combinarem, quæ& meis in speciminibus manifeste per oras ferrata semper videbam? Et cur a Myrtille recederem, quando & Linnæus in Flora lapponica ejusdem folia, illis Vaccinii, quam simillima, & difertis etiam Scheuchzerus ferrata verbis, dixerunt? Ex alpebus nonnisi forte delata isthuc, locis vegetat praedictis perennis, arbutulae instar, humi procumbentis. Vetulus nempe ejusdem truncus, ad brachii jam roboratus crassitudinem, ne a dimidia quidem spithamæ a terra distans, in brachia fere diffusus / decumbit, novos quotannis ramos, novasque ramorum virgas, obscure primum rubentes, & glabras^ turn atro-rubentes, agit, & ipsas nonnisi ex decubitu ere&as, ad*

unum, fummum duos exaltatas, pedes. Folia adamuflim Myrtilli (in tenera praeprimis aetate) niagflitudine, figura, forma : icilicct ovata, breviculo cum acumine; tempore etiam ex ovata bafi iublanceolata, latiufcnla, firma, utrinque glabra (fugaciflimam eorundem e gemmis modo emergentium pubem, plerisque communem, minime computo) & nitentia, inferne venofo fubreticulata, femper petiolata, ac per oras ferrata, ferraturae dentfculis plus minus callofis. Stipulae pricum nullae, ferioribus tandem in ramiS'i cumprijiis extimis, utrinque ad petioli bafin femper praefentes, jam ovatae, jam femiorbiculatae, etflm ovato-acuminatae, numquam non ferratae* Saturatiore cum ftipulis, folia tinguntur virore fupra; aquofa magis, pallidiora que fubtus, numquam tamen five incana, five fericea, et(i ea in parte rariufculis, ut dixi, primum adfpergantur pubefcentias villulis, brevi cadivis. Amenta fat interdum frequentia, propriis femper e gemmis, & dioeca; primum ovata, demum cylindracea, & plus quam pollicem longa; mafcula femper fubfeffilia, Sc graciliora; foeminea contra, breviter cum temporepe-dunculata. Bafi utraque foliolis aliquot fubovatis fubtiliterque ferrulatis ftipata. Ea cserulefcencia Linnaeus dixit; id tamen *de mafculis duntaxat oblique viC\&i Si turn quid etn precci/e verum efl;* cum nonnihil diducuntur elongata, antheris nondum declaratis, oriturque[^]fufpicor exinde, quod calycins eorum fquam lanceolatas, rubroque de fe violaceae, pills fuis incanis, cum Jam laxius, magisque quam in eiiibryone, rariter adfperiae fint, hunc vehrt ex mifcella plurium, colorem exhibeant. Corolla mafculis foeminisque nulla. Stamina illis duo tantum, glumis calycinis triplo quadruplove tandem longiora, & alba, Anttarae flavae didymae. Neftariuin flaminibus anterius, gracile, tubulofum, cylindraceum, flavens, calyce brevius* Amenta foeminea, mafculis tandem longiora; eorundem calycina fquamula jitra, pilis & ipfa incanis longisque co,piofe obfita, deciduis denique. Nefta-

ftarium idem, cum eo mafculorum. Germen ovato-attenuatum, nudum, in capfulam abit intra calycem pedunculatam_K ex ovata bafi, elongato-coni-
cam,*glabram, flavo-rufeibentem, unilocularem, bivalvem, revuluto-biro-
ftrem; ieminibus pappo copiofo, fimplici, pilofo, niveo, fericeo involute
Stylus capillaris, brevis, bifidus. Stigmatibus bifidis, flavis, demumnigriR

CUV.

SALIX PHYLIGSEFOLIA.

Salix foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, glabris, margine undilato-ferra-
tis, fupra viridibus fplendentibus; fubtus halitu incano - glaucefcente
obdu[^]tis*

Salix foliis ferratis, glabris, lanceolatis, crenis undatis. *Linn. Jp. plant, p.*
i44² num. 4. turn Eor, lapp.p. §83* num. 350* tab. ft.fig.c. 6? num.*
351 tab. 3. fg. d.*

Orefeit in X&)le RaWenfi per acf/cenfum montis Predil;" fed nuspiam
copiofms, quam in monte Loibl *florens initio Maji, Etiam in convallibiis
Taureri Malnixenfis Julio meinyeniffe memiiii* Fruticulus primum unius al-
teriusve fpithama?, quaquaverfunj diffufus; in arbufculam adolefcit *denique*,
exaltatis ramorum fuorum virgis ad juttam usque humana? ftatur« altitudineni,
lentis Temper, &flefi facilibus. Novellorum cortex ramorum, eviridima-
gis rubefcit, magisque, dum e rubro denique lulcefcit glaber (fi pubefcen-
tem denial infantiam) Temper, utut eminentibus hinc inde niveis, laVibus-
que non raro exalperetur pun&is, tuberculisve. Sed & hi denique, ut
Princeps frutlcis truncus, e fufco cinerafcunt cum tempore Icabriufculi. Fo-

liofae cum amentigeris gemmae, promiscue eodem in frutkealternant, nudae, rubentesque; flores tamen nunquam non dicirii. Folia, si qua in specie alia, in hac certe plurimum variare solent, folia pro diversitate aetatis. JBreviter petiolata, suis in ramulis alternant, exstipulata primum, qua magnis in fenestrate ultima stipulis utrinque vallata sunt sessilibus, jam ovato-acutis, jam & semi-circularibus, liberisque rarulum auriculis semper inflexantibus. Nuda glaberrimaque semper, Temper & supra peculiari resplendentia nitore; opaca subtus, habituque oblita incano-glaescente nunquam depereunte; utque tunc, dum tenera adhuc dum sunt, interperata in pagina, e flavo velut virent, latratissime e nigro-viridia futura denique; sic & infera in vetulis fides non unicolor amplius, rufis jam conspicitur adulterata venarum ramificationibus. Figuram quod eorundem attinet, ea ovata primum, etiam subrotunda interdum, vel & rarius obovato-oblonga, brevi in ovato-lanceolatam, ac denique in lato-ovalique-lanceolatam abit, serrato semper margine, atque undulis praeterea intra ampliatas serraturae crenas, in decrepitis crispato. Quod si itaque Phyllis, quam haud novi, folia, margine undulato-ferrata, tum profecto non nisi ab ultima demum foliorum state specificum Salici huic Linnaeus indiditTe videtur nomen. Amentum tam masculina, quam foeminae suas prius intra gemmas sessilia, ovata, villis squamarum calycinarum obduta; sed longiuscule dein pedunculata, erecta ramulis oblonga, obtuse utrinque sufformia; foeminiis linearibus, pro ratione fruticuli longissima; pedunculo foliolis alterne parvis, basique stipulato. Uttaque squamis calycinis, absque corolla, oblongis, lineari-lanceolatis. albido-luteolis, apicem versus dilute rubellis, tandemque fusciscentibus, & dorso villis longis, canis, cadivis obfatis, imbricata. Nestarium itidem, utrisque gracile, cylindraco-tubulosum, apice crassiusculum. truncatum & flavum, cum caetera album, & calyce brevius fit Stamina

mina floribus masculis bina, nec plura observavi; calyce duplo triplove longiora, filamentis albis, a basi ad medium usque longe villosis; antheris didymis flavis, Germen floris feminei ex ovata basi acuminate-rostratum, velut inverse pyriforme, intra calycem brevissime pedicellatum, levissime initio subpubescens, tum glabrum, viride, stylo brevi bifido albo; stigmatibus bifidis, crassiusculis, flavis. Capsula unilocularis bivalvis ex ovata basi elongato-conica, glabra, flavo rufescens, tum nigra, calycibus duplo triplove longior, apicibus valvularum dehiscentium reflexo-incurvis. Pappus femina involvens simplex albus sericeus.

CLV-

RHAMNUS PUMILUS. Tab. n.

Rhamnus inermis, repens, floribus hermaphroditis foliis petiolatis, ovatis, crenatis.

Rhamnus inermis, repens, floribus hermaphroditis, foliis serratis. *Linn* mant. I. p. 49. num. 22. Allion.flor. ped. torn. 2. p. 131. num. 176s.*

Frangula minima rupestris, Pruno sylvestri affinis Americani folio. *Pluk. Almag.p. 157-*

Frangula montana pumila faxatilis, folio subrotundo. *Seguier veron* x.p* 296. num* 2.*

Rhamnus rupestris. Scopolflor. corn. 2. torn 1, p. 164. num. 262. tab. 5.*

Goritia olim ad amiciffitini misij Scopolum, paucis tum (ne Linnaco quidem excepto) notum fruticulum, qui in altera dein Florae carniolicae editione sub *Rhamni rupestris* nomine prodidit. Sed & Linnaeus, resuscitavit

per Seguerium, Turramque ex Rajo, Tournefortioque stirpem, suas inter species recepit denique. Nudas inter rupes calcareas, in easdem decumbentibus reclinatus ramis, aut per exesa earundem foramina trajecit & repens, minime omnino rarus invenitur pygmseus hicce fruticulus ad Tabacarias Salcani molas in finifixa Soncii ripa, initio florens Junii. Ibi eum quondam ego; nee minus frequentem in faxoiiis montis Sancte Catharinae, milliaro a Goritia; tum circa San Servolo, e petris velut natum; nee non in asperissimis undique Japodum montibus, Obzinam inter & Tergestum; ubi & in reftam femel, duos tredecim pedes altam exaltatum arbustulam, vidi, qui caulibus quaquaverlum diffusis, adherere ut plurimum solet (axis. Truncus humilis, perennans, ramofilimus, diffusus, decumbens verius, quam repens, ligno lento, durissimo ex albo subflavicante; cortice ex rubro fusco, glabro, uvuloso, fissili in Cano-cinerascentie obliquo. Kovelli e veteribus rami breves, e viridi tandem rubri, villis copiose decumbentibus obditi, demum cadivis; nullis cetera spinis, aculeisve (uti neque ipse, quantus quantus est frutex) armati. Folia annis duntaxat in rainulis, laxa, alterneque parva, breviter petiolata, ciliolatae primum rotunditatis, demum ovata, plana, supra glabra, & nitentia, faturato virore subtus pallidiora, venis exstantibus, una cum petiolo supra canaliculato, rufis, & villosis, margine non tam ferrata, quam obtuse potius crenata. Stipulae petiolorum basi utrinque adfident, periturae dein, parva?, lanceolatae, villis decumbentibus dorso oblitae. Flores in racemulis axillaribus, folio brevioribus, erectis, tum nutantibus; Pedunculi nempe folitarii florum in a tribus ad sex, breviter pedicellatorum. Bracteola pedicelli cujusque, lineari-fimbriata, faturate & obseure rubra, decidua. Calyx tubuloso-turbinatus, femi-quinquefidus, erecto-patens, coriaceus, nudus, extus obseure ruber, laciniis ovato-acutis subtus marginatis, fimbria albida, medio canaliculata. Cor-

rolls petala (autfi cum Linnseo malis fquamse neftariferse ?) quinque, calycina, cum ejusdem laciniis alternantia, duplo iis breviora, obcordata, introrfum conniventia, alba, bafin verfus in unguem velut decurrentia, & rubra. Stamina itidem quinque, & calycina, fquamulis" an petalis? femite&a, alba, antheris lutescentibus* Germen globofum, ftylus fhminibus tantillo altior, crafliufculus, ftigmate obtufo. Bacca globofa, obfcure rubra, nitens, an tandem nigra ? trilocularis, trifperma.

CLVI.

GERANIUM ARGENTEUM.

Geranium pedunculis bifloris, foliis fubpeltatis feptempartitis, trifidis, tomentofo-fericeis, petalis emafginatis* *Linn. Jp* plant, p. 954. num.* «.

Geranium alpinum longius radicum adoratum. *Pona apud Cluf. hijl. pag. CCCXLII.*

Geraneum argenteum montis Baldi *Joh. Bauh. Ill P. a. p. 474.*

Geranium argenteum alpinum, longius radicum, *Seguier. veron* I. >. 471. tab. 10.*

Vochinenfium indigena alpium, creicit plantarum nitidiffima in vertice Montis Lifez; tum & in ultimo excelſi Cferni Perft dorfo, profus non rariffima. A una ejusdem perenni multicipite & forti radice, plurima inter folia radicalia, fcapi quoque plures, foliis perfafpe parum aut nihil altiores, aphylli (nifi cum geminos forte, utrumquebiflorum, fufpendantpedunculos, & ipſi tum diphylli) biflori, furrefti quotannis emergunt* Niteat vero Geranio in ifto, eodem, fericeo ut dicimus argenti, nitore om-

nia, scapi, calyces, & cum foliis, eorundem quoque petioli. Non tamen entum certe, villusimo, sed densissimus, sed prostratus, imbricatumque appressus, est, qui partibus plantae omnibus praecipue cum oblique cotifpiciuntur, dilutum hunc incani ferici superaddit nitorem, quem vulgo argenteum vocant, Quaecumque caeterum, magna in copia, a radice exeunt folia, longissime ilia petiolata sunt, petiolo gracili; basi vaginantia, & obscure non nihil, velut ex sanguine, rubescentia. Suborbiculata eorundem circumscriptio, profundissime septem in segmenta, oblonga, femitrifido-cuneata, partita est, segmentis eo magnitudine deescentibus inagis, quo inferiore magis sunt loco; eorum vero laciniis linearibus, obtusis, integris, intermedia paulo longiore. Scapi petiolis foliorum . subaequales, & ipsi graciles, teretes, aphylli, apice ex involucre trium, quatuorve, aut & quinque bracteolarum, lineari-lanceolarum, biflori, floribus majuculis longe pedicellatis* Calyx pentaphyllus, subcoriacens, foliolis ovato-lanceolatis, concavis, integris, corolla duplo brevioribus, apice mucrone molli, innocuo, auctis. Corolla pentapetala, magna, patens; petalis oblongo-obovatis, apice obtuse emarginatis, auricularum lebulis sursum conniventibus^ dilute in earn auro-rubellis, tria basin versus saturatioribus. Stamina decem, monadelphia, calycis longitudine corollis breviora, alterius paulo altioribus: filamenta alba, subulata, basi ovata submembranacea fornicato-connivente. Antherae oblongae, versatiles, primum rubrae, polline aurato-flavente, margine tamen bigricante. Germen quinquagulo ovatum, longe prostratum, staminum longitudine, ex villis prostratis, perinde ac calyx, foliaque fericeo-argentum. Stylus subulatus staminibus paulo longior, persistens; stigmata quinque rubra, reflexa. Capsulae quinque ovatae, monospermae, longe prostratae, a basi dehiscentes^ sursumque per arcum elevatae, seu reflexae?

Obferv. Eft, quod htc moneam; non absque incuria factum meam, ut ad Geranium Macrorrhizon Linnaei citati nuper fuerint in primo colle&aneorum Jacquinii Volumine p. 258. cum Pona, Seguierhis; citationes itaquehae, huc pertinentes, ibidem deleantur.

CLVII.

POTENTILLA SUBACALIS.

Potentilla foliis ternatis, fubquinatisve, oblongo-obovatis, dentatis, utrinque tomentofis, {ericeo-incanis; fcapis decumbentibus; petalis emarginatis, flavis*

Potentilla foliis ternatis dentatis, utrinque tomentofis, kapo decumbente. *Linn.jp. plant, p, 71 £• num. 27.* Gerard, *fior. gallopr.p. 469. num. 11,* *Gmelin.flor.fdir, torn. 3./?. 183. num. 34. tab. 36.fig. 2.*

Incana pentaphylli effigie, Leucas Diofcoridis ? *Lobeh adver. p. 307, veriffime** Fragariae affinis fericea incana. *C. B. pin. 327,*

Pentaphylli effigie, Leucas quibusdam. *Joh. Bauh. II. cap. 83. p. 598. qui paginae numerus erroneus, frequenter occurrit.*

Fragaria fterilis, molli lanugine pubefcens. *Aman. ruth, p. 84- num. no,* *Potentilla grandiflora. Scopolfior. earn* 2. torn. 1./?. 363. num. 626. tab. at.*

Præcox plantula, quas Majo jam paffim defloruerit, admodum occurrit frequens, per omnes Japidia (Carfcho) montes, e faxorum erumpens rimis, patricula repletis terra. In rupeftribus primum ad famigeratum fanfti Servuli antrum inveniebam; tum frequentiffimum prope Obsinam, cum jam de monte Tergeftum defcenditur. Et miratus fane fuiſſem, quomodo præ-

clarissimus noster Scopolius stirpi tam graphice a Linnao expressisse, Grandiflora nihilominus specificum imponere potuerit nomen, licet diferte ipse a Grandiflora Linnaei, (ut reapse est) diversam dicat! nisi quidem probe novissem, Nitidam Linnaei Potentillam infeliciter plane ab eodena pro iubauali Linnaei, Albam contra Linnaei pro ejusdem Nitida> etfi modo sub dubio, agnitam fuisse. Perennis ejusdem radix, lentaque, & in lignum denique abiens, brachiolis radiculisque suis intra rupium fissuras undique depasta, adeo firmiter iisdem haeret, ut non nisi operose falvam inde extrices. Multiceps non raro, ubi primum e terra prorumpit, aut cum etiam non multiceps^ copiosum tamen femper radicalium foliorum, scaporumque, foliis vix dum altiorum, ad duos, tresve attollit pollices capitulum; subterlonifera iterdum etiam, dum nempe unum, alterumve ejusdem caput, amplius elongatum, in terram decumbit, radiculisque astitis intra petrarum rimas sese firmat, novam fecuturis annis daturum prolem. Et haec quoque, quanta quanta est, plantula, tota itidem pallido e virore incanescit, non absque omni ferici nitore, ut non argentato: Althaeas fere instar, tactui mollis & byssina. Villus scilicet fericeo-canescens, longiusculus, prostratus, depressoque copiosissime, densissimeque & folia eorumque petiolos stipulasque, & cum calycibus, ipsos florum scapos, pedicellosque inflernit. Folia radicalia multa, crassiuscula, & velut subcoriacea, communiter suo e petiolo ternata, intermissis nonnullis quaternatis, tum & quinatis,* accefforio illo uno, aut binis, longe minoribus; foliola ipsa, obovato-oblonga, margine obtuse ferrato-dentata. Eorum petiolus basi membranaceo-vaginans, in stipulas abit longiusculas, lineari-nuceolatas, integras* Scapi graciles, teretes, foliorum plus minus altitudine, rarius praecise uniflori, rarius etiam penitus aphylli, ut non immerito subcaulem Linnaeus dixerit stirpem#. Plerumque duos, tresve longiusculis in pedicellis ferunt flores, majusculos quidem, non

non tamen, qui admirationem mereantur, ultra modum magnos. Praeterfoliola bra&eaeformia, ovali-lanceolata, unum alterumve, ad pedicellorura exortum, aut in iisdem, feffilia; unum item alterumve, inter fe remotiuscula occurrere item in inferiore fcapulorum parte folent, & ipfa ieffliia, femitrifido - cuneata* Calyx monophyllus plusquam femidecemfidus, lacinu-
lis lanceolatis, integris, alternis, iisque interioribus, paulo minoribus. (Co-
rolla calyce duplo majör, pentapetala, patens; petalis emarginato-obcor-
datis, faturate flavis, ungue exiguo, calyci infertis. Stamina plurima, ca-
lycina; filamentis calycis altitudine, fubulatis, flavis, antheris oblonga-
ovatis, & ipfis quoque flavis. Germina copiofa, ovato-gibba, in capitu-
lum collefta, feffilia, flaventia, albido-villofa, ftylo brevi, filiformi, de
latere interno germinum, fub apicevelut orto, & nudo, inftruftra. *Stigtpz*
fimplex, obtufum. Semina exfucca, decalvata, aquofe fubflavicantia- Odor
nullus.

CLVIII.

BOLETUS SUAVEOLENS.

Boletus acaulis femielliptoidicus niveus; (upra convexus, byffino-villofulus;
fubtus tubulofo - porofus, poris rotundis angulatisque ; Anilum redo-
lens, falicinus*

Boletus acaulis, luperne (cum tempore) lxvis, falicinnus* *Linn. fp. plant.*
p. 1646, num. 7. Gunnerflor. norv. P. 2. p. 137. num. 1052, Enslin.
Bijfert. de Bolet. p. 13 fig* *• a. 3. 4. ophthne.*

Polyporus feffilis, convex© planus albiffimus, fuperwe hirfutus, poris latio-
ribus. *Haller hiji. flirv. helv < torn. 3. p. 140. num. % % 80. ob citatum Bux-*
'bauouum,

Frequens in Carinthia, neque tamen alia in arbore haenus, quam Salice alba, *bey den Mühlen an der Klan* (Clana, olim Glinus, cujus accolæ Glintidones) *ohmveit der Thyfifchen Walkmuhk, dann zu Fefchnig oder Ehrenhaufen. Auch ridchjt der Franzmtihle. Ah* autumnus usque in ver infrequens. Multis ab annis notissimum fungum, ausus tamen non fueram afferanter pronunciare, eundemque omnino cum fuaveolente Linnsii esse. Obstitit summa summi Viri autoritas, qui tevem difertis semper pronunciavit verbis, Attamen ferius didici denique, leviorem hunc nonnisi vetulo demum, & pene effaeto convenire, cum reapfejuvenili vegetaque adhucdum in astate stipate supra fit villosus, & byffino - omnino tomentosus. Quamvis autem fusae Cl Enslie descriptioni addi credam posse nihil, in eorumtasen gratiam, ad quos erudita isthac dissertatio forte haud pervenerit, brevem hanc, veramque Fungi adumbrationem subiungo: substantia parasitici hujus Boleti fungo-coriacea, densissima, lenta, tenax, nivea, Anisum, aut & Scandicem odoratam redolens. Figura, qualis parasiticorum fere omnium, latere altero arboribus incrementum, femielliptoidicam nempe; jam in femicirculum velut contracta, aut & transverse elongata magis, diametro longiore a tribus ad usque septem pollices sese extendente, cum qua longitudinem ejusdem metitur, eaque minor, duas tresve, vixque plures attingat. Altitudo, quam & crassitudinem dicas, quaque arbori adhaerere solet, unius, nee facile duorum, nisi rarius, est pollicum, decrefcitque magis magisque, eximum versus circumferentia marginem. Pileus itaque stipitis expers, dimidiatus, subfemi elliptoidicus, latere altero ialicibus annosis accrescens, horizontalis, niveus, supra plus minus convexus, pulvinatus, initio villo brevi byffino densissimo, ereo, & ipso quoque niveo, obfusus, dum state calvefcit, la vis fadus. Margo nunc integer, alias *lohzus*, cum tempore ex niveo-subflavescens, & ex flavicante aquoie etiam

subfufcens, acutus. Pars infera tubuloso-porosa, itidem nivea, nifidum exficcatione_f aut fenio aquose fufcefcat* Tubuli, arbori matri, proximi, iis qui margini adfiti funt, longiores, cum tempore fere tetragoni. Eorundem ofcula, primum circinatae rotunditatis, acicularia, conferte denfata; diducuntur deinceps magis magisque, angulataque fiunt, ut capitellum jam acicularum iisdem immittere valeas* Iridis florentinae odorem in eo fe obfervaffe alii paffim afferunt; ego vero, omnesque, quibus recentem odorandum exhibui, nonnifi debilem, {uaviffimumque Anifi, five & fcandicis, ut innui, odorafce Linnaei. Occurrit & fastigiatus interdum, ex rautuo fuperimpoftis tophis.

CLIX.

BOLETUS HIRSUTUS.

Boletus acaulis, femicircularis, piano-convexus, albiffimus, fupra hirsutiffimus, lineis concentricis alternis depreffis; fi[^]btus poris rotundato-angulatis.

Vulgatiffimum fungum paffim in fylvis Labaci, ac Clagenfurti, quibusvis fere in arborum truncis, etiam nonnumquam in pomiferis, inveni. Hic multo priore minor, nee tam copiofa unquam carne; odore, qui adnotari mereatur, nullo. Laminae fcilicet funt femicirculares ut plurimum, unum femialterumve pollicem JateB, altae lineas nonnifi quinque aut fex, undique albiffimae in aetate flore. Caro iis non admodum multa, eaque ficca, coriacea, lenta, & ipfa alba. Figura pulvinata, fupra videlicet leniter convexa, fubtus plana. Villus deniffimus, duas altus lineas, femper erectus, fungo concolor, fuperam undique convexitatem occupat, in concen-

tricas cum tempore fascias villofas, per alternatim impreffas lineas femicirculares, & ipsas concentricas, discretus. Tubuli partis inferioris non admodum longi, cum tempore dilute subflavescunt; ostiis acicularibus, demum ampliatis, rotundato-angulatis. Varietates diversis in locis vidi complures: simplicem alias; alias multiplicem; etiam imbricatim sibi mutuo imminentes; plerumque dimidiatos, latere altero, absque stipite arboribus adnatis; non tamen nunquam, verum vicibus iteratis circulares, integros, exstipitatos, centro partis inferius truncis incrementales, superne umbilicatos, subtus convexiusculos. Erant multos inter, & proferri, nunc e disco medio, nunc e peripheria. Villus, utinui, communiter albus, & grossus; ex albo tamen nonnunquam subflavescit senio. Sed singularissime varietatis, quae bis modo Labaci occurrit, non possum non meminisse. Erat ille viridis totus; altero in specimine, versus centrum praecipue dilute vireicens; in tertio denique mater superne viridi-villofa, cum prole ex peripheria enata albo-villofa.

CLX.

.BOLETUS ODORATUS,

Boletus acaulis piano convexus, stipulvatus, aurantiacus; subtus flavus, halitu albido oblitus; poris inaequalibus rotundato-angulatis, odore cariophylli*

Synonyma dubia non adduxero, cum distinguere, quam confundere malim; & quis autores tam amentes oblitos credat odoris, ut ne verbo indicaturifuerint? Abestiarum truncis arborum (Abietis) innascentem Clageiv furti,

furti, in fylvula Ebenthalenfi menfc Ottobri vidi; alias Labaci in lylva, vulgo *Vnterm Thurm*. Suaviflimus, quem diu vel ficcus, in cubili affervatus, retinet aromaticorum caryophyllorum odor, hunc fatiscrididerim acongeneribus aliis diftinguat, iisdem cetera, quibus illi, obnoxium varietatibus» Certe non fimplicem temper, nee dimidiatum etiam Temper, fed integrum quoque interdum, alias multiplicem, cefpitofum etiam, imbricatumque; margine mine indivifo, nuncfinuato- etiam vidi lobato. Supra interim plerumque, etii nonnifi inaequaliter, convexus^ fubpulvinatus; nonequidem tomentoius, minus adhuc hirtutus, tamen neque lsevis otnnino; verbo, ta&ui fere icabriufculus; aurantiaci Temper color is, utut in infera, planaue pororum parte dilutionis tantifper, ob fuperinduclutn nefcio quem? albedinis halitum. Umbilico fupra deprimitur nigro-rufefcente, integer dum forte eft; convexus turn inferne, centroque, absque ftipite tamen, feililis. Communiter, ut dixi, dimidiati inftar pulvilli, latere uno arbori accrefcit horizontalis, in femicircuit]m, ant femielliptoidem conformatus; fed & hoc quoque in ftatu, exlex, centro fupero accrefcentis lateris, in tophum? an ftipitem verius crafflufculum, & nigricantem affurgit Tubuli capillares longiufculi, ftipate primum addenfati, inferam occupant partem, pororum ofculis tandem inasqualiter amjjjatis, rotundato - angulatis, cellularum adinftar, apis mellificae. Caro illi phifcula, tenaciffima, coriacea, brunea, aptaparandofomiti; nifi jam verus fit fomes. Tandem fupra magis, magisque, marginem verfus, nigrefcit, marafmo deperiens denique.

CII XI.

SCABIOSA GRAMINIFOLIA,

Scabiofa corollis quinquefidis, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, fericeo - tomentofis; caule herbaceo. *Linn. fp. plant, p. 145. num. 2t, Scopolflor. cam. 2. torn. /• p. 96. num. 139. Allion. ftor. ped. torn. 1. p. 141, num. 515.*

Scabiofa graminea argentea^ *Joh. Bauk HI. P. i.p. 12. Seguier. veron. IL p. 18i* HMW. 7.*

Succifa foliisgramineistomentofis. *HallerhiJLJtirp.helv.tom.i.p. 88-num.203.*

Alpium earum fauces, per quas niurmurans ad Salcanum erumpit Soncius, numquam adiri, ditior quin.perelegante aliqua redierim ftirpe. Immanes ibi rupium mafia?, furiofum in fluvium japijam prscipitandse^ gratiffimum rariffimis habitacukim prabent plantulis* Ex harum fiffuris rupium haud procul Molendino, & argentea quoque haec paffim enafcitur Scabiofa, vifu amoeniffima. Radix perennis, teres, fublignefcens denique, jam unumquotannis, Jam & interduin plures, fimpliciffimos tamq̃ femper, copiofa inter folia radicalia caules profert ex decubitu velut afcendentes, & ereftos, fpithamae plus minus altitiidine, Herbacei ii funt, graciles, teretes, bafin verfus pluribus e geniculis articulati, ut & ipfa radix, inde ad terminalem usque florem enodes, aphylli. Folia non alia,^uam verfus infimam eorum bafim, eaque ad articulorum genicula, oppofita, & connata. Sunt ea tirfficalibus prorfus funilia, angufta, duos & amplius pollices longa, lata nonnifi unam femialteramve lineam, fupra plana, fubtus dorfo medio longitudinaliter carinataj margine integerrima, verbo lineari - lanceolata, & veniffime

liffime gramineorum awnula. Quod ea, caulesque, & cum caulibus perianthii quoque communis foliola, fpeciofiora reddit; nitor eft fericeo-argentatus, quem copiofo unice debent villo, qui longiufculus, fericeo - incanus, ea undique infernit decunibens, denfoque velufe tomento adeo obvelvit, ut vixdum viror aliquis traluceat. Flos in caulis apice unicus, magnusque, aut verius plurimi in unum velut terminate capituluin collefti. Calyx communis polyphyllus, foliolis lanceolato-linearibus, integerrimis, fericeo-tomentofis, difco, non radio florente longiōribus, duplicis ferieij interioribus paulo anguftioribus. Calyx partialis flofculorum duplex, germini literque inficlens, & fuperus* Eorum inferior monophyllus, campanulatus, patens, membranaceus, transparent, ftriis five plicis multis, fufeefcentibus exaratus, fuperioremfinu fuo recipiens; tenuem ilium, & in lacinias quinque fubulato-fetaceas[#] profundiffime partitum; utroque perfiftente, Corollae cce* leftini coloris, faturationis, aut dilutionis, extus copiofo, longoque obfits villo fericeo-incano, omies monopetalae, tubulofo-femiquinquefidae; ea?difci minores, lacinulis limbi <equalibus, erefto-patentibus, obtufe ovatis; illae contra peripheriae, radiant, duplo majores, fegmentifi tribtis exterioribusmaximis, oblongo obovatis, margine fere crepulatis* Stamina tantum quatuor, corollis difci altiora; filamentis albis, antheris dilute flavefcentibus. Germina in receptaculo, intra ejusdem paleas lanceolatas, canaliculatas, dorfo carinatas, ultra medium fufcas, & pubefcentes, feffilia, involuta membranula, & calyculis coronata. Stylus filiformis, ftaminibus altior, csruleiceos. Stigma flafcens, abtufura, emarginatura.

CLXII

CALLA PALUSTRIS,

Calla foliis petiolatis cordatis; fpatha plana; fpadice undique hermaphro-
dito. *Linn. fp. plant, p. 1373* w&w. 2. Gunner flor. norv. torn. 2. p.*
86 num. 727. Oeder. flox* dan. tab. 422* Gmelin* flor. fibir. torn, i**
p. x# num. 2.

Dracunculus aquatilis Dodon. pempt. p* 331.*

Dracontium palustre. Tabernxmont. p. 1122.

Maximus hujus proventus in limofiffimis ad e]Bluxum lacus Wertens-
fis ad finiftram Caftelli Loretani Coraitum Rofenberg; item in turfosis ad
effluxum lacus Offiacenfis; turn in *Sumpffichten hart am Wald là'ngjl des Wegs*
von Offiach nach Feldhirchen, ohnweit des Prewelnicks. Denique ad influxum
lacus Milleftadienfis* Florens Majo ad medium usque Junii, fruftus matu-
rans Augusto & Septembri. Repens in pinguiffimo lacuum limo, longiufcu-
leexcurrit piperitae iftiu> plants radix articulata, digiti auricularis craffitu-
dine, teres, laevis, nitens, viridis, tubulis intusrcftis, quanta eft, per-
curfa plurimis, in fcapum quoque adfeendentibus, ea omnino, qua in Hip-
puri, ratione; verticillisque fibrarum albarum ad fingula articulorum geni-
cula, faepe fxpius radicata. Scapus fpithamam plus minus altus, teres, la-
vis, nitens, viridis, tubulis, ut innui, p1£inũs intus percurritur redis,
fiftulofisque; aphyllus omnino; apiceque ex fpatha foliacea, feffili, ovviii,
plana, integerrima, laevi, fupraalba, fubtus viridi, terminata in nervum
five cupidem brevem, teretem & mollem, proferens Ipadicem, cylindra-
c&o-QVium, undique hermaphroditum, five germinibus cum intermiftis fta-

mini-

minibus ftipatiflime obfitum. Germina haec, absque calyce, corollisque, nee ordinate, fparia undique, feffilia, oblongo-obovata, convexitate terminali obfeure fubpentagona, nuda, Is via, nitentia, viridia, ftylo in apice inftru&a breviflimo, tandem nigrefcente, fligmateobtufo; abeuntque denique totidem in baccas ruberrimas, laeves, nitentes, uniloculares, fubglobofas, farftas interne pulpa gelatinofa, alba, tenaci, nitente, foeta feminibus undique fparfis, ad o&o usque, cylindraceis, utrinque convexis, glabris, nitidis, ex cinereo fufcefcentibūs, iulco five Aria longitudinali exaratis, atque unam verfus extremitatem poris impreffis undique foveoJatis. Stamina plurima, nulla lege, aut ordine germinibus intermixta, iisdem altitudine fubaequalia. Filamenta plana, alba, apice antheris binis, globofis, feffilibus, albis inftrufta. Anthers bivalves, biloculares diaphragmate intercedente; rumpuntur tandem ab apice bafin verfus; polline faftae albo. Folia tantum radicalia, complura, longe petiolata, plana, cordata, priinum apice acuta, turn obtufa, & fere rotuhdata, integerrima femper, Is via, nitentia, viridia. Eorundem petiolus bafi icapum vaginans, CcEtra femiteretiufculus eft, five fupraplanus, inferne longitudinaliter convexus, lxvis, viridis, nitens*

ECHINOPHORA SPINOSA.

liehinophora caule ramofo diffufo; foliis fubbipinnatis} foliolis triquetris,
fpina fubulaU terminatis.

- Echinophora foliolis fubulato - fpinofis, integerrinis. Linn. Jp. plant, p. 344.
 num. 1. Gerard, fior. gallopr. p> 231. num. i* Allion.flor. ped. torn. 2* p.
 3. num. 1287* Zanichelli hi/L lit. venet. p. 90, tab. 15.*
- Crithmum fpinofunu Dodon. pempt. !?• 705.*
- Paftinaca marina. Lobel obferv.p. 408.*
- Crithmus tertius, Tabernczm. p. 299.*

Minime rara ad Aquas gradatas, fedem tempore aliquo Patriarcharum Aquilejenfium. Radix perennis, longa, fufiformis, radiculis fparfis obfita, alba, fapore fubdulcefcente Daucicarotas, plebeculde edulis. Caulis ereftus, teres, farftus, digitum interdum auricularem craffus, rigidiufculus, cum tempore etiam fublignefcens, primum ftriatus, turn fulcato-multangulus, *hi^pidus^* ex axillis ranaofus, ramis quaquaeverfum diffufis* Folia infima bi- reliqua fimpliciter yinnata, divaricata, patentiffima, etiam nonnumquam infra&a, magis magisque rigefcentia > dutn fere in lignum abeant; axe communi pinnarum, fupra piano, demum canaliculato; fubtus terefe, multiftriato, hifpidulo; foliolis five pinnis conjugatis, laxe ordinatis, triquetris, fupra planis (donee canaliculate fiant) fubtus carinatis, friatis, hifpidulis, fpina fubulata rigida terminals. Earumjuga, fiveconjugationes infimae, plerun^ue bi- aut trifidae, fuperiores fimpliciffimae. Umbells univerfales in caule ramisque terminales, mediocri infiftentes pedunculo communi, erefte, non admodum confer^, radiis inaequalibus, patentibus. Involucrum univerfale penta- aut llCptaphyllum, foliolis radios aequantibus, fimplicibus, lineari - lanceolatis, fubtus ftriatis, convexis,^ hifpidulis; fupra planis, in fpinam fubulatam apice abeuntibus. Umbellulis partiales multiflorae. Involucella pentaphylla, foliolis ovato - acutis, dorfo ftriatis & hifpidulis, apice fubulato fpinofis, corollulas nonnihil ex-

ce-

cedentibus. Germina difci fubfeffilia; exterioribus radii breviter pedicellatis, abortientibus; friata, hifpidulâ, coronata calyce quinquepartito, foliis lineari-fubulatis. Corollae albae, calyce majores, pentapetals; petalis patentibus, inflexo-obcordatis, exterioribus radii paulo majoribus. Stamina quinque, una cum antheris, alba. Styli duo divaricati; ftigmatibus fimplicibus. Semina duo, oblonga, extus fulcata, & hifpida, in cetro umbellae univerfalis fubfeffilia, altero plerumque abortiente, involuta involucello permanente indurato,

CLXIV.

CIRCAEA ALPINA.

Circaea caule ad(cendente fubramofo, foliisque cordatis, ferrato-dentatis, glabervimis, illuftribus.

Circaea caule ad(cendente, racemo unico. *Linn, fp. plant, p. 12. num. **.
*ScopoL flor. earn. 2. p. 9. num! 7. AUion. flor. ped. torn. 1. p. 433. num. 855. Gunner flor. norv. torn. 2. p. 32. num. 436. Gmelin. flor. Jibir. torn. 3. p. 225. num. 43. Oeder. flor. dan. tab. 256. Schrank flor. berchtefg. p. 157. num. 2. Seguier. veron. I. p. \$z6>j&m. a. HaUer hift. /Hrp. helv. tom. i. p. 362. num. 814**

Qua in Septentrione caule, ut videtur, plerumque eft fimpliciflino, ^{^t^gma>o}, unicoque terminato flo.rum racemo, apud nos contra rarius adeo nana, caule imo ell ut plurimum plus quam fpithamali, ramoio, racemis axillaribus, fapius brachiato etiam. Earn ego multis reperi in locis, femper fylveftribus, fubalpinis, humidis, umbrofis viarum cavarum, aut & fe-

n̄yputribus refe&arum arborum truncis innalcentem* *Sic* per adfcenfum montis Kreuzberg, in Fladniz, menfe Julio. *Sic* iterum Augufto ad radices montium Villacenſium umbroſis in fylvis. Nanani etiam Vi&orienſibus in fylvis primo vere. Minime vero perennem eſſe credo. Radix fuſiformis, fetgracilis, albens, radiculis fibrilloſis parcius obſita. Caulis nana in varietale ereftus, in ramoſa vero baſi decumbens, nee niſi ex decubitu adfcendens, teres, glaberrimus, laete viridis, illuſtris, & velut in Impatiente Balfamine transparens; villo nuſpam ullo; apud nos plerumque ex axillis ramoſus. Folia femper oppoſita, petiolata, exaſte cordata, per oras ferrato-dentata, glaberrima, nitentia, nuſpam pubeſcentia, una cum petiolo transparentia; axillis fanguineo-rubris* Racemi, prater terminalem, axillares, erefto-patentes. Plores ex pedicellis brevibus ſimplices; pedicellis teretibus, gracillimis, rubris, in fruſtu pendulis. Germen obovatum, inferum, p^hebefcens. Calyx diphyllus, foliolis o'blongo-ovalibus, concavis, dorſo dilute rubris, fupra ex rubello-albidis, corolla longioribus, in flore patentiflimis, tum reflexis, cadivis denique. Corolla dipetala, petalis obcordatis, albis, alterno cum calyce fitu, eodem brevioribus. Stamina duo, baſi calycum adnata, cum eodem decidua, corollis altiora; filamentis filiformibus albis; antheris ſubrotundis, rubris. Stylus albus, (lamina fere adſequans. Stigma capitatum. fupra incifum aut emarginatum, fuſcum, tandem nigricans. Capſula obovata, hiſpida, villulis albis, patentibus; bilocularis, bivalvis; diaphragmate valvulis parallelo. Semen cujuſque loculium, oblongo-obovatum, glabrum.

CLXV.

ALYSSUM GEMONENSE.

Alyffum caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus. oblongo-obovatis, integris, repando fubdenticulatis, tomentoso - canefcentibus j filiculis inflatis.

Alyffum caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus obovatis, fub-tomentosis, filiculis inflatis. *Linn, mantiff. I. p. 92. num. 17.*

Alyffum petrsum, caulibus fuperne ramosis, ramis divaricatis flexuosis; filiculis fubinflatibus, tetrapermis. *Arduin*fpec. II. p. 30. tab. 14.*

Habitat frequens in montanis calcareis prope Gemonam, aut verius Glemonam (*Gkmauri*) retro*Pontebam, tum in valle Vochinenfi; item prope Neoforum feu *Neu Markt*; denique in valle, quam Kanker fluvius permeat. Nuspiam in magna admodum#ltitudine. Radicem Alyffum hoc habetperennem, fungofam'', dein fublignefcentem, tereti-fubfufiformem albam, extus obfolete fubluteolam, non multicipitem, verum & interdum bipedemvelut, radiculis, non tamen copiofiffime obfitam. Plures ea quotannis herbaceos caules, plus quam fpithamales. inter aridas, jamque lignofas, veterum reliquias, profert, minime procumT5entes, verius ereftos, teretes, graciles quidem, magis tamen temper, magisque rigelcentes, ramofofubpaniculatos. Rami Cpraëprimis inferiores) longiufculi, erefto - paten- .*, demum etiam divaricati. Folia radicalia multa, oblongo-obovata, in petiolum velut decurrentia, integra, ora tamen marginis plus minus repando -denticulata, cofta longitudinal! dorfi parumper exitante. Caulina, ramorumqueminoramulto, anguftioraque, &laxius fparfa, fere lanceolata t
inte-

integra, fefilia. Tarn haec, quam ilia, caulisque, cum ramis, *totus, ex virore incanescunt, obfita undique, non tam tomento, quam brevibus potius, albidoque incanis, & hispidualis villis, apice ftelligeris, ftellulis multiradiatis, patentiflimis, contiguitate mutua tenuiflimam vehit telam canescentem efficientibus. An caratter hie, Alyfli generi proprius? Eundem certe & in montano, & in calycino, turn eampeftri, ac incano ha&enus obfervavi. Racemi florales caulem, ramosque terminant, floribus absque bracteola pedunculatis, initio apicem verlus in corymbum addenfatis, turn racemo longius didu&lo, laxe fparfis, erefto - patentibus. Calyx tetraphyllus, foliolis ovato-oblongis, concavis, primura viridibus, & albido-villofis, tumflavis, denique cadivis. Corolla faturate flava, tetrapetala, calyce duplo major, patens; petalis obcordatis, five emarginato-obovatis in unguem decurrentibus, tandem deciduis. Stamina fex tetradynama*, binis oppofitis paulo minoribus, bail introrfum denticulo brevi appendiculatis. Fil amenta alba calycis altitudine; una cum antheris oblongis, acutis, f&avis, decidua. Germ en fubovatum, nudum, ftylo filiformi longiufculoperinanente inflru&clum, ftigma obtufum. Silicula ovalis, tumide inflata^ margine alata, nuda, ftylo longiufculo inftruffa, bilocularis, btvalvis, valvulis cencavo-elliptoidicis, cadi vis, diiTepimento membranaceo illuftri, jparallelis. Semina quovis in loculo bina, (ubrotunda, margine membranaceo alata. Figura Arduiflli ad plantain in horto Patavino eluxuriatam, fa&ta videtur fuiffe.

CLXVL

SISYMBRIUM LIPPIZENSE.

Sifymbrium (iliquis declinatis brevibus; foliis inferioribus pinnatis, fummis inferiorumque foliolis integerrimis*

Eryfimū verum Dalechampii. *Lugdun. hift. pi p. 653.*

Quadrante circiter hone, antequam Caftellum Lippizenfe ingrediaris, ad dextram vis folo duro rupeftri copiofiffimum, nee haftenus abhi; indubie tamen & per reliquum Carfchum. Credideram equidem primum, me Sifymbrium hoc, cum eo, quod Tub Tenuifolii nomine fp̄cifico Linnzeus propofuerat, conjungere poffe; at folia infima tripinnatifida! & figura Erucae tenuifolii perennis apud Joh. BauhinumJ Malui itaque pro novo proponere, fapientiffimi Temper memor effati: pr̄ftare diftinguere, quam confundere. Et quid metuendum in eo haberem denique? quando vel ante me jam, idem, fic fenferat, Joh. Bauhinus hift. IL p. 561 aLugdunenfibus, inquit, duas uniuⁿ herbas (Erucas tenuifolis perennis) figuras propoiiras videri, priorem ex Matthiolo; alteram (fub nomine Eryfimi veri) qua? nova eft. Sat gracilis illius eft radix, fufca extus, intus alba; attamen & illa quoque perennis, ficca, indurefcens, & in lignum denique abiens, *Vt* vero radiculis fibrillisque obfita eft permultis, in brachia demum quaquaverfum fparfa convalefcantibus, fic & telluris verfus Tuperficiem in ramos, capitaque d^{id}itur non raro complura, plures fingulft e capitibus caults, foliaque, ut ajunt, radicalia emittens. Caules illi, natali in loc >, per terram undique profrati decumbunt primo, fed eriguntur denique, & re&i, firmique confiltunt, utcunque graciles, & ramofi. Villum in iis, pubemve ut in

omni quoque planta, reperias nullum; suntque teretes, ex axillis ramofi, in laxum, versus extrema, una cum ramis, flexuofumque abeuntes florum racemum. Folia radicalia, infimaque caulium laxissime, sed simpliciter simul pinnata; jugis pinnarum tribus, quatuorve ab invicem remotis; in intermediis vero caulium foliis unico. Pinnulae ipsae (uti & summa caulium folia) simplicissimas, fertiles, oblongas, plans, anguste, integerrimae, lineari-obovatae, inferioribus cum proportione minoribus, minoribusque, et forsan vix erraveris, (i Silybrii istius folia lyrato - dixeris pinnata. Saturate cum iisdem caules, ramique virent. Rami axillares, longiusculi, erecto-patentes, aphylli, florum racemo laxo, intra flores flexuoso, terminatum Flores longiuscule pedicellati, erecto-patentes* Calyx tetraphyllus, foliolis oblongo-obovatis concavis patentibus, ex viridi tandem lutescentibus, dum denique decidant. Corolla saturate flava, calyce duplo major, patens, tetrapetala; petalis obovato-oblongis, integerrimis, in unguem decurrentibus, deciduis. Stamina sex tetradynama, binis oppositis, paulo minoribus. Filamenta alba, subulata, calyce tantillo longiora. Antherae flavae. Germen lineare, breve; stylus acicularis, germen in hac specie longitudine. Stigma obtusum crassiusculum. Siliquae longiuscule pedunculatae, declinatae, saepe breviores, lineari-lanceolatae, etiam subovato-acuminatae, & compressae, stylo aciformi longiusculo instructae, saepe etiam abortientes; ceterum nuda, biloculares, bivalves, dissepimento valvulis parallelo; seminibus in loculo cujusvis aliquot.

CLXVIL

SPARGANIUM NATANS*

Sparganium caule simplicissimo, terete, recto ; foliis linearibus, planis, inollibus, tandem decumbentibus, &c intra atfbam natantibus,

Sparganium foliis decumbentibus planis. *Linn. Jp. plant, p. 137s* num. 2. Gunner, flor. norv. torn. 2. p. 43. num. 500. Oeder.flor. dan. tab. 260. cum floribus praecife fcemineis. Allion, fior. ped. torn. 2. p. 273. num. 3351. Holler hifl. Jlipr. helv. torn. 2. p. 163. num. 1304,*

Platanaria altera, *Dodon. pempu p. 601.*

Sparganium alteruin. *Label obferv.p. 41. Joh. Eauh. Up. 541*. Tabern. pag. 560,*

Crefcit floretque Julio perquam copiofum in focietate Nymphasa alb<e, Poa aquaticae, Triglochin paluftris, Teucree Scordii &c. in limofis turfofis ante lacum Wertenfem prope Caftellum Loretanum, praeprimis retro columnam lapideam, & illico adjeftum ponticum; vel vifu diftintiffimum à Sjiarganio erecto. Radix alba, geniculata, repens, capillitio fibrillarum five radicularum copiofiffime undique, praeprimis in vertice, influffa* Caulis erectus, a bipollicari ad fpithamam usque, & ultra aflurgens, prout in limo duntaxat, aut jam intra aquam reperitur, rectiffimus, femper fimplicillimus, minime rigidus, mollis potius, glaber, -la?vigatus, nitens, te>>-es, bafim verfus foliofus, una cum foliis, ex flavo velut viridis, nee ut in Sparganio erecto faturate gramineoviridis^ Folia caulem Tere adaequantia, initio ere^fca, tum inferiora patentiffima, decumbentia, & fiquidem ad-
 £taqua, per eam natantia, funtque aequabiliter latiufula? linearia, obtur-
 fa,

fa, feffilia, caulem bafi femiamplexando vaginantia, fuperne plana, inferne nullatenus carinata, fed obtufiffime longitudinaliter convexa, laevigatiffima, mollia, nitentia, ex flavo - virentia* Flores utriusque fexus^ eadem infirpe, diverfis in thalamis capitatis; capit^a icilicet florum fubglobofa, atri- bus ad oſto , novemque lateralia, feu lateribus caulis alternatim adnata, &c feffilia; fuperioribus (ab uno ad tria) pure mafculis, minoribus, nullaque unquam braftea fuffultis, demum deciduis. Inferioribus contra (a duobus ad quatuor aut quinque) pure foemineis, majoribus, in axilla, aut fupra axillam folii brafteiformis (effilibus, infimo tamen plerumque breviter pedunculato. Sicque caulis hocce in Sparganio, in fpicam velut abit re&iffimam^ floribus in capitula denfe aggregatis, longe interruptam, Brafteola iimplex, nullum iuccolans capitulum, medio fere conftanter loco inter infimum mafculum, & fupremum foemineum invenitur. Flos quisque capitulorum marium calyce triphylo, absque corolla, foliolis oblongis, linearibus, obtufis: ftaminibus tribus, triplo calyce longioribus, albis, polline antherarum. flavo. Capitula foeminea globofo-echinata: f^ofculi eorundem calyce pariter ^ ut in mafculis, triphylo; corolla nulla; germine oblongo, ovato-acuminato3 inferne fubtriquetro, calycem triplo, aut & quadruplo excedente; ftylus eft ipfum acumen germinis pyramidati, a medio ad apicem album, tandem nigrefcens. Stigma bifariam dehifcens. Drupa calyce longior, ovato-acuminata, bafi fubtriquetra, exfucca, nullaque carnofa pulpa farcla ; nukulam fimplicem oblongo-ovatam contineas.

CLXVffl.

GENISTA HISPANICA.

Genista spinis decompositis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus, pilosis. *Linn.Jp.pfont.p. 999, num. 13. Gerard, flor, gallopr, p. 483, num. 4. Allion. flor. ped, torn. i.p. 3 a a. Hm* 1185.*

Genistella montis ventosi spinosa. *Sh. Bauh. 1. Part. a, p> 400.*

Genista sylvestris. *Scopolflor, earn. 2. torn. a. /?. 53, n. 875.*

Frequens in omni Carfcho fupra Tergeftum, indeque in littoralem usque Dalmatiam, Oraculo Linnsano, bis, ut inquit, repetito, cur non acquieverit Scopolius? fatis n(Jh video; pr<efertim fi, ut reapfe omnino eft, eadem Geniila hxc fit, cum spinosa montis ventosi Genistella, quam citato mox loco Johannes propoiuit Bauhinus, & defcriptioni prasterea ^innxanae adamuffim conveniat. Sane diverfitatis nots, quas ex ficco prsftantiffimi Mygindi exemplari adducit, circa plus duntaxat, &c minus mihi verfari videntur, qua? adeo in cara&ere fpecifico turbant nihil. Sed fi Scopolius montis ventosi Geniftellam a vera. ut ait. Viiftflnirfl. fhverfam credidit. quod miratus fum; magis profefto mirari fubit, dum Gerardum, & cum eo Allionium dubitare video, ane a Germanica vere fpecificaque diverfa fit? His decaufis potiffimum hancLinnaei hispanicam ad naturam pingi feci, ut alii judicent denique, me tacente; num revera, quæ anguftiffimis, lineajjbdSque eft foliis, cum ea tot in Provinciis vulgari Germanica* ubi hispanica viva fit numquam, & quæ folia duntaxat obtufe ovato-lanceolata habet, conjungi tamen in unam poffit fpeciem? Radix anferini circiter craffitudine calami, brachiata, multisque inftruffa radiculis fparfis, lentefcit denique

niqve, fublinefcitque perennial De ea vere novo multi ad fpithama plus minus altitudinem eriguntur herbacei, gracilesque quotannis caules, depri-
 rnendi denique turn, cum jam delapfa fumma florum, aut leguminum verius
 fpica, inferiore fua parte deficari, arefcere, & corroboratis in fpinas te-
 nellis axillarum ramufculis in lignum velut abire cceperint, ut afpirante Ven-
 turis annis vere altero, novas & ipfi rurfum virgas fui fimiles, five caules
 attollant, ramofiffimi demuni ipfi. Novelli hi fingulorum annorum caules,
 graciles, firmuli, ere&i, teretes, ftriati, virides, pilis canefcentibus, fur-
 fum decumbentibus obfiti, in fpicam terminalem abeunt jam longiorem, jam
 brevior, plurium aut peuciorum florum; inde ad Joafin usque; alterna per
 intervalla laxe foliofi. Folia dimidium longa pollicem, lineam nonnifi la-
 taunicam, angufta, linearia, integerrima, leffilia, erefto-potentia, fuper-
 ae nuda, (ubtus pilis canefcentibus, furfum[#]decumbentibus obfita; ab iis
 Geniftae germanica longe diverfiffima. Herum ex axillis, qux ramufculo-
 rum infraj enafcuntur, erefto itidem patentes fpinae, decompofite, id eft:
 laxe fimpliciterque funt pinnatae, molles, innocuae, tenellae, virides, jngis
 pinnarum communiter duobus, cum aut & absque impare; axe, pinnulisque
 rpfis, gracilibus, longiufculis tereti-fubulatis, ftriatis, pilis decumbenti-
 bus obfitis, apice ia fpiniilam five cufpidulam flaventem exiguani abeunti-
 bus, dum per anni fpatium in rigidulas indurentur fpinas ligni colore fofce-
 fcente[^] Florum fpica terminalis multi- aut patiflora; floribus in axilla³'bra-
[^]eola? parva, lineari-fubulatse, viridis, pilolas feffilibus. Calyx tubulo-
 fo-titfbinatus, quinquentatus, fubbilabiatus[^] ex viridi dilute demum fla-
 vicans, pil|| decumbentibus adfperfus; demibus lanceolatis, binis fub' v'e-
 xillo fere brevioribus, profundius fejunftis; tribus fub carina fubaequalibte
 Ccrolla dilute flava papilionacea; vexillum caruia dtiplo brevins, obova-
 ten, emarginatunjj, furluui fere totum reflexum[^] dorfo villis prodratis ob-
 fitum.

fitum. Ahe oblongo-obovats, vexillo tantillo breviores incurvo conniventes, ungue calycis longitudine, denticuloque laterali albis, Carina oblique adkendens, obtufiffima, compreffa, apice incifo-emarginata, vexillo duplo longior, extus villis proftralis obfita. Stamina diadelphorum more, fed omnia decem bafi connata, alba, antheris flavis, una dein cum ftylo extra carinam exferta, & verfus vexillum incurva. Gernien gibbo-ovatum villofiffimum. Stylus longus albus filiformis. Stigma (implex, involutum. Legumen nigricans, villofum, fubovatum, turgidum uniloculare, bivalve, monofpermum.

CLXIX.

GENISTA SERICEA*

Genifta foliis lancsolatis, fubtus fericeo-villofis, ramis teretibus[^] ftriatis, eredis; racemis paucifloris fecundis; brafteis calyce longioribus.

Pulcherrimam vifu ftirpem, femper e rupium calcarearum fiffuris enatam, admodum frequentem, initio circiter Junii laeteflorentem, inveniebam in montibus Obzinam inter 5c Tergeftum. Quod tero non aperte etiara Floridam Linnaei G[^]niftam dicam, aliud fateor me retinet nihil, quam Cluffii, Geniftam tinftoriam hifpanicam, duos altitudinis etiam aftequi cubitos, aflerentis autoritas. Indubium eft, notas, quas Florid \$ fus attribuit Linnaeus, Japidics huic apprime convenire ftirpi; at qui tamen pygmaeum Giganti conferre aufim? De eadem equidem, magnitudine duntaxat differente, loqui poffumus planta; attamen forfan etiam de diverfiffima? Hsc inter dubia, tranquillus aliis fuam defuper enunciandi mentem, accafioaern defero;

id folium monitis, frustra eos auxilii quaesituros aliquid apud Lobelium, Dodonaicum, Lugdunenses, Johannem Bauhinum, & Tabernaemontanum, ut qui Clusium praecise exscripserint, una omnes ejus figura usi, ' Firmiter nudas inter rupes depa&a ejusdem radix, perennat lignea jam tota; curta equidem (pro foli certe ratione) & crassa, attamen tanto plura magisque ramosa in rimas fissurasque undique demergens brachia, fuscescens extus, interne alba* Non ea (ut Clusii videtur hispanica) cubitalem & ultra attollit caudicem enodem, superne modo in ramos abeuntem; plurimos imo una effundit brevesque & graciles caules, e decubitu affurgentes, & vel a basi jam ipsa ramiferos. Lignei hi subsequam per aetatem, foliisque spoliari etiam solent denique fuscescentes; altero duntaxat regenerandi anno; cum ex emortuis velut truncellis, novellis reviviscunt, ramulofulisque cauliculis, teretibus, striatis viridibus, fericeo decumbenteque obductis villo. Horum folia (demptis primordialibus infimis subrotundis) alterna per intervalla, sessilia, angusta, lanceolata, longiuscula, integerrima, supra nuda, & amoene viridia, subtus villo prostrato niveo ex fericeo nitente, & velut argentato obdu&a. Flores in racemis terminalibus pauci, unus, duo, tres, summum quatuor, iubeundi, erecti, breviter pedunculati, ex axilla bractee foliaceae lanceolatae pedunculum calycemque excedentis, pro plantulae modo magni. Calyx tubuloso - subbilabiatus, quinquentatus; ex iiidi tandem subrulefcens, villo fericeo-argentato obductus dentibus lanceolatis superioribus binis profunde sub vexillo > profundius a reliquis sejunctis; tribus inferioribus sub carina longioribus, aequalibus, inter se approximatis* Corolla laturate flavo-aurantiaca, papilionacea, petalis fere tubaequalibus. Vexillum apice emarginatum, dorso (uti & carina) villo fericeo - argenteo obductum, retrorsum reflexum, a carina decedens. Alae obovato-oblongae, erecto-conniventes, ungui longiulculo albo infidentes, hamulo brevi ad la-

tus alterum appendiculata. Carina erecta, obtusissima, spice incifo-emar* ginata, compressa, vixdum vexillo longior, deprimenda denique, extus, ut dictum, fericeo-villofa. Stamina decem connata inferne, apicibus demum extra carinam exserta, versus vexillum iursum incurva, alba, Antheras flavas, oblongas, acutae. Germen oblongum, lineare, compressum, villo proftrato fericeo argentato obductum. Stylus ftaminibus longior, albus, versus vexillum, extra carinam, incurvus. Stigma obtusifolium involutum. Legumen oblongum, subcylindraceum, fuscum, villosum, uniloculare, bivalve, feminibus 4- 5- 6.

CLXX.

GENISTA HUMIFUSA.

Genista foliis obtuse lanceolatis, per oras pilosociliatis; ramis in orbem proftratis, ftriatis, pubentibus; floribus erectis, pedunculatis, interrupto fasciculatis j leguminibus glabris.

Genista foliis lanceolatis, ciliatis, ramis profkatis, ftriatis, pilosis. *Linn, Jp. plant, p. 998. ram* 6,*

Medio Maji Tergefti in apricis declivibus graminosis via versus *HuruUberg* raram hanc inveneram Geniftam Isete flarenteni, neque usquam haftenu* alibi; firquamvis Tournefortii defituor operibus, e quibus de orientali minima humifusa mihi lumen affulgeat Genifta subrotundis foliis, ramen haud creor afferere, Tergeftinam hanc Geniftam, eandem plane cum humifusa Linnsi esse cum nihilJum oninino inter utramque (pecificx inveniam diverfitatis. Radice & hsc quoque, ut Genifts omnes, est perenni, brachiata,

ramosa, in lignum demum abeunte. Ex ea multi quotannis caules semipithamales, teretiufculi, striati primum virides & pubescentes, tum fusci, decalvati, & sublignescentes, non eretti, sed in orbem decumbentes, prostratique diffunduntur. Hi per intervalla ramos emittunt pure foliosos, tanto breviores, quo a radice distant magis, & ipsos teretes, striatos, pube cava infratos, foliis laxè alterneque obfitos obtuse lanceolatis, sessilibus, planis, integerrimis, supra infraque viridibus, sed isthuc primum microscopice pubescentibus, demum utrinque nudis[^] per marginum contra oras semper piloso-ciliatis* Flores iisdem in prostratis caulibus versus eorundem extrema, per tres, quatuorve, aut & quinque fasciculos, interruptim r[^]temosi; fasciculo quovis tri-*quadri- aut quinquefloro, ex nido velut foliolorum aliquot[^] oblongo-ovalium, sessilium. Flores singuli majusculi, papilionacei, saturate flavi, longiuscule pedunculati, suberecti; pedunculo terete, viridi, tum obscure rubente, villosulo. Calyx brevis, tubuloso-subbilabiatus, obtusus/nudus & glaber, quinquedenticulatus; denticulis humilibus > parvis, binis sub vexillo; tribus approximatis sub carina. Vexillum magnum latum, sursum reflexum, a carina discedens, apice modice incisemarginatum; undique glabrum. Alae carina tantillo longiores, obovato-oblongae, curvato-conniventes. Carina alis tantillo brevior, gibbo ascendens, obtuse acutiuscula, -extus quoque nuda, glabra; demum a vexillo depresso. Stamina decem unita inferne, filamentorum apicibus[^] antherisque ilavis tandem exfertis, ac versus vexillum arcuatis. Germen oblongum, lineare, nudum, glabrum, (stylus staminibus longior; stigma involutum. Legumen cylindraceo turgidum, nudum, uniloculare, bivalve, semintus ad octo.

CLXXI.

POLYPODLUM ALPINUM.

Polypodium frondibus altissime tripinnatis, pinnulis oblongis, vage incifis, lacinulis obtusis apice brevissime bifidis,

Filiculis crispatis, forte Pteridion foemina cordi? *Cluf.* in descript. Mont. Bald. Pon*. p. CCCXLIV.

Filicula alpina c. rufpa C. Bauh. *Sequier, veron. fupplem. p. 55. num. a. tab. *' & - 3.*

Polypodium pinnis pinnarum pinnatis, laxissime divifis, lobulis obtusis dentatis. *Halkr hijh Jtirp. heb. torn, 3. p. 15. num. 1709. AUion. ped. a. pag. 287. num. 2409.*

In fummitate alpium Lithopolitanarum supra SS. Priwum & Felicianum raram hanc Polypodii legi speciem, & quidem faxa inter, ad latera specus illius, aut fossae ingentis, quam *Stiefel* passim alpicola? illi vocant, rarissimae omni nive carentis. Tenerrimam stirpem, & quae propter teneritudine, illico, ut decerpta, & tantillum deficcata fuerit, crispatur, jure jam Veteres Crispam vocarunt Linnaeus suas inter haud recepit; Aiaferat duntaxat In *i^hec. plant, p. 1553.* ut cum *Osmunda Crispa* conferretur; a qua tamen longe quam diversissima est, ut propter characterem generis, etiam figura 2* tab. 3. *Plukenetii. Phytogr. Adianti scilicet albi floridi, fatis, & plus quam fatis, declarat. Scio, Plukenetii Adiantum illud alternm, & ipsum albidum & nigrum, quod cicutaria? dicit folio, Phytogr. tab.3. fig.4. Virginianam esse stirpem, & hinc verisimillime ab hac nostra distinctam, Filicula tamen alpina crispata Caspari Bauhini, si cum una ex duabus praesentibus, cum hac posteriore certe, ratione habitus, & faciei externae potius, quam cum illa*

priore, comparanda foret. De hoc irtcunque fit, Filicula profe&o noftra nonnifi Polypodii, in averfâ frondium pagina, cara&erem gerit; eftque * & illi de more congenerum radicis loco tuber informe, transvtrfe oblongum, longa fibrillarum nigrarum coma denie capillatum. Plures ex eo fpiraliter evolvendae, fpithamaeque tandem altitudinera affecuturse, eriguntur frondes, circumfcriptione lanceolatae, faturate fupra virides, pallidiores tipper fabtus, longius petiolats. Petiolus ifte, quem & ftipitem, aut communem pinnarum dicas axem, canali fuperne excifus eft, inferne teretiufculus; ba- fin verfus obfcure fanguinefcens, virettum inde, extimum ad usque apic>tn# undique nudus & glaber, primam fi modo excipias aetitem, qua infima ejusdem pars fquamis furfuraceo-paleaceis, fcariofis, brunefcentibus adfpergi folet, demum cadivis. Circumfcriptione frondes lanceolatas dixi, quales reapfefunt; attamen & fimul tenerrims, tenerrimeque excife; ut vix arte naturam fatis exprefleds, dum laxe, alterneque tripinnatas dixeris. Primariae, quas princeps utrinque ftipes fuspendit, pinnae, laxis ab invicem diftant intervallis; non ex adverfo oppofitis unitaE jugis, fed alternantibus altitudine, ab invicem verius fegregatis. Quod de primariis nunc diftum pinnis, idem &c de fecundariis, ideraque etiara de ultimis, five tertiis, verbo pinnularum pinnulis, intelligas velim* Exiguae hje, nee lineam longse integram, aequabiliter undique funt oblongae, vere linearcs, in extimw-itt- tegrae, vage in inferioribus per lateia inc^as; apicibus tamen femper & pin- nularum, & lacinularum obtufis, breviffimeque bifidis. Jamque nihil, quod commemorem, amplius eft, fipauculamodo adjecero, quæ de vera ftirpis frufificatione fileftio minime pratereunda funt. Ea in averfa frondium^pa- gina occurrit femper; eftque non Osmundas, fed oinnino Poh'podii. Vi- deas fub axillis pinnularum ultimarum fingulis non tani pun&um, quam glo- taerulum verius hemifphaericum feffilem j hunc fi microfcpio porro exami- nes ,

priore, comparanda foret. De hoc utcumque fit, Filicula profecto nostra nonnisi Polypodii, in averfa frondium pagina, carafterem gerit; eftque* & illi de more congenerum radice loco tuber informe, transverfe oblongum,

*

longa fibrillarum nigrarum coma dente capiliatum. Plures ex eo fpitraliter evolvendae, fpithamaeque tandem altitudinem affecuturas, eriguntur frondes, circumfcriptione lanceolatae, faturate fupra virides, pallidiores tergifper fubtus, longius petiolatae. Petiohis iile, **quern** & c /lipitein, aut **comniuncm** pinnarum dicas, axem, canali fuperne excifus eft, inferne ~~in~~ ~~versus~~ ~~obscure~~ ~~fangumefcens~~, ~~viriditum~~ ~~lade~~, ~~extratum~~ ~~ad~~, usque apicem, undique nudus & glaber, primam fi modo excipias get-item, qua infimaejusdem pars fqiamis furfuraceo-paleaceis, fcariofis, brunefcentibus adfpergi folet, demum cadivis, Circumfcriptione frondes lanceolatas **dixi**, quales reapfefunt; attamen & fimul tenerrimae, tenerneque excifas; ut vix arte naturam fatis exprefferis, ditm laxae, alterneque tripinnatas dixeris. Primarix, quas princeps utrinque ftipes fufpendit, pinnae, laxi* ab invicem difflant intervallis; non ex adverfo oppofitis utitae jugis, fed alternantibus altitudine, ab invicem verius fegregatis. Quod de primariis nunc diftum pinnis, idem & de fecundariis, idemque etiam de ultimis, five tertiis, verbo pinnularum pinnulis, intelligas velim. Exiguis h», nee lineam longam integram, squabiliter undique funt oblongae, vere linearcs, in extimix in-tegra;, vage **in** inferioribus per latera incite; apicibus tamen femper & pinnularum, & **Iacinularan** obtufis, brevifluneque bifidis. JainqueDiJiiJ, quod coinmemorem, ainplius ell, fi paucula modo adjscero, que de vera ftirpis fructificatione fileatio minime pratereunda funt, Ea in averfa **ffondium*** pagina occurrit femper; eihjue non Oiniundff, fed oinniuo **Polypodii**. Videas fub axillis pinnularum ultirrum fingulis non **faun** puiiftum, quam glomerulum verius hemifphcEricum feftilem; hiinc fi microicopio porro exami-

nes,

undique flavo - rufi, & ex rufo demum brunefcentis. Recens millis fupra fubtusque tuberculis exafperata; laevis imo. Deficcari dum incipit, fupW- ne tuberculato-papillofa fit; donee penitus exficcata, tenuⁿ in membranam coriaceam, fufcam, fragilem contrahatur; per immerfionem in aquam, rurfus in priftinum gelatinofae fubftantiae ftatum revivifieandā. Charts munda? ita fuperimpofita, ut in eandem reelinata, eam tamen minimd^{togat}, turn in locum fole haud illufxatum repofita, ut quieto in aere deficcetur, fubtiliffimo eandem late infternit feminali polline flavo[^] Auftorum, #praeter Hallerum, nullus, exafte eandem defcrib[^]; fed cur Michellii >\garic<jm gelatinofum cefpitolum, infundibulum referens Nov. gen. p. 124, num. 4. ift. hue revocet? ignoro. Michellius certe fuum airtumnali mense Oftobri, non ineunte vere; nee in Junipero, fed in Abieftim caudicibus reperit# Non placet, quod Fucis Gmelinus adjungat; nee, quod Gunnerus lutescenti-viridem dicat

CLXXIIL

TREMELLA CLAVARIIFORMIS[^]

Tremella gelatinofa-pulpofa, gregaria, fimpkx, compreffo - fubulata, lub- pyramidata, bicornutave, aurantiaca*

Elegantem tremells fpeciem, verfus Aprilis finem, altera a largis pluviis die truncum rainosque Juniperi communis undique obfidere intern''; qui exinde, Echini adinfar, meris omni ex parte aculeis obtufe fubulatis, bicornibu^{ve} armati velut crant, plane (*wie ein gefpickter HZas*) ut lepus krdo trajeftus. Idem nature phaenomenon iteratis deinceps faepius vicibus

spe&andum se mihi obtulit, semper in Junipero duntaxat communi; nec *ici*[^]*g*, in societate prioris Tremells juniperinae. Erat & illius quoque substantia gelatinofopulpofa, crassa, frigida, tremula subdiaphana, colonis faturate aurantiaci. Figura oblonga, pollicaris, erecta, compressa, obtuse lineari-fimbriata, & fere ex parallelepipedo, tetragono-pyramidata, apice obtusifoulo, simplice, aut & bifido-bicornive; lateribus quandoque obtuse denticulatis, plerumque tamen integerrimis; exsiccatione in graciles contracta funiculos subcoriaceos, lentos, subrigentes, fragiles, opacos, faturatius ex aurantiaco rubentes; pristinis illico iterum per immersionem in aquam, resistentissimos: naturae, formae subpyramidato-crystallinas, coloris Serenalis, quatenus & ipsa, sub desiccatione, elastice quaquaversum dispergit, pollen, subtilissimus, aurantiacus.

CLXXIV*

BYSSUS COBALTIGINEA. Tab.ia» fig. T.

Byffus capillacea, perennis, rosea; filamentis tenerrimis, arte intertextis, fericeis instar panni.

m Superato jam denique Radstadiensi Taurero, cum de e faucibus quoque illius, quas vulgo *die Klaufe bey Werfen*, vocant, emerissem; ipsam, qua via erat, per sylvam, faxum me forte immane, ingens, & eo planissime colore advertit, quern roseam passim Cobalti ochram dicimus. Pluerit quamvis, accuri tamen, novitate percussus spectaculi. Moles erat calcarei squabilis (Wallerii) albi, impalpabilis, vastissima, inclinato in horizontem femidecumbens (itu; ab injuriis utique aeris? in pulverulentam ex-

fpeftandum fe mihi obtulit, Temper in Junipero duntaxat communi; nec
 ici^{fe} in focietate prioris Teraells juniperini. Erat & illius quoque fub-
 ftantia gelatinofo-pulpofo, craffa, frigida, tremula fubdiaphana, coloris fa-
 turate aurantiaci. Figura oblonga, pollicaris, erefla, compreita, obtufe
 lineari-lubulata, & fere ex parallelepipedo, tetragono-pyramidata, apice
 obtufiusculo, fimplici, aut & bifido-bicornive; lateribus quandoque obtufe
 denticulatis, plerumque tamen integerrimis; exficcatione in graciles contra-
 cta funiculos fubcoriaceos, lentos, fubrigentes, fragiles, opacos, fatu-
 rati^{us} ex aurantiaco ru^{entes}; primum illico iterum per immerfionem in aquam
 reftituendos: naturæ, formæ fubpyramidato-cryftallinæ, coloris. Seminalis,
 quæ & ipfa, fub deficcatione, elaftice quaquiverfuta difpergit, pollen,
 fubtiliffimum, aurantiacus.

CLXXIV.

BYSSUS COBALTIGINEA. Tab. 12. fig. T.

Byffus capitea, perennis, rofea; filamentis tenerriimis, aride intertextis,
 fericeis infar panni.

-* Superato jam denique Radftadienfi Taurero, cum de faucibus quo-
 que illius, quas vulgo *die Klaitze bey Werfen*, vacant, emerfiffem; ipfam,
 qua via erat, per fylvam, faxum me forte immane, ingens, & eo plans
 tintivum colore advertit, quæ rofeam partem Cobalti ochram dicitur. Plu-
 rit quamvis, accurri tamen, novitate perculfus fpeftaculi. Moles erat cal-
 carei squabilis (Wallerii) albi, impalpabilis, vaftiffima, inclinato in ho-
 rizontem femidecumbens fitu; ab injuriis utique aeris? in pulverulentam ex-

tus femifatifcebat arenam homogineam; quam, ne dilaberetur omnis, faxatilis Linnsii Byffus cinerascens, cohibebat. Ejus ad ulnas certo aliquot in longum, ne minus fere in latum, rofeo velut panno, infratam, qua extusjiuda patebat, [iipeiticieni, invent. Lichenis cujusdam leprofo - cruftacei existimavi fpeciei. At nulla uspiam peltifomiia tubercula, fcutella; nulls, curiofe quamvis fcrutanti, fefe obtulerunt oculo! Nuda eras de rupe, fruftula algæ iftius derafi aliquot, quo per iter infruftu? fueram cultro, cartulas intra, reponenda interim, dtim per otium domi examinarem uberius. Microfcopiis hie deficcata primum exploravi plantulam, filamemaque plus quam capillaria, funplicia, decumbentia, imo profrata etiaiii, cimentuo, velut in pannum laxè continuum intertexta vidi, coloris amcenero(ei, & rofeo priterea infperfa pulvere. Intra phialam dein aque plenam limpidiffimse, macerandum repofui vegetabile idem. Color perfiltit irwariatus; filamenta contra etfi obfeurius aliquantum, difcernebantur tamenadhucdum (at manifeftè; fed conferte magis in pannum denfata, qui mollufens velut, & fungofa? boletarum caini aflimilis, fubtili te nonnihil elevari finebat cultello; laceratusque, in villulos diduci* Et hac demum de caufa potiffimum raram omnino plantulam, filamentofis potiws Byffi fpeciebus, quani hichenum generi adfociandam existimavi; fpecificumque cobaltigine^ nomen indidi, tum quod cobaltiginis effetcolore, tum, quod illud rofeo, jam alteri pulverulentarum Byfforum fpeciei a Clariffimo Schrebeio (Spicil, lipf. p. 140. fluni, J150.) datum fcirem.

CLXXV.

LICHEN TAURICUS. Tab. x₂. fig. 2.

Lichen fruticulolus, decumbens, subcentrifugus, vage subramosus, niveus; caulibus et ramulisque herbibus, fistulosis, subulatis*

habitat in elatis montibus Taurorum Nafelcldenſis, & Radſhdienſis, **Bryis hypniſque** irfratis humiles **inter** alpium falices **retuſam**, rotundifollam, **herbaceam** &c. nec alibi viſus **uſpiani**. Credas, ſi **fugaci** oculo, propersnteque intellectu breves Lichenura iubulati, cornutique deſcriptione?, carafteresve perpendas, alpeſrem hunc ab illis, quovis fere in Ericeto obviis, haudquaquam ſpecie differre. Sed quos natura diſjunxit adeo, fruſtra, opinor, ars conjungere adlaborabit. Nil de diverſitate natalis dicam loci. Paſſim hi, ut notum, in humillimis ſylvarum quarumvis Ericetis, macilentis que aliis ſterilibus camporum arvis, aut certe **femiputribus** rereſtarum arborum increſcentes truncis reperiuntur; dum **Tauricus** iſte nonniſi apud **ultimas** altiffimarum alpium exulat rupes; numquam, ut illi, ereous; numquam in icyphum abiens pyxidatimi; ſed neque pilvere viriditate, nec ſi foliolis criſpo-lobatis **adſperſum** unquam aut **baſi innatſum** Toliacete, imbricatis luxuriantibus ſquamulis criſpato-lobatis, laete ſupra

viriditate, niveis **ſubtus**. Haec fere illorum macerrima argilloſi **ſoil** amantiſſima luca, notie. At illic, Taurorum **incola**, atra; duntaxat alpium humo, dum **inſiſſe infrats faxis**, muſcos, repenteque inter telices, absque ſoltacea bad, innatus, cepites ſubularum terſtium, bi- tripullicariumve, mox **in centro erumpentium**, indeque quaerentium divergentium format; non cr-

te ere&arum_f fed in orbem decumbentium, & proftratarura; ut plurimum fimpliciflimarum, aut certe nonnifi ranter, & vage ramulofarum; qua[^]P- que efiam laxe hinc St inde breviflime denticularum; ramulis denticulis- que pariter fimplicibus, fiftulofis, tubulatis.

CLXXVI.

LICHEN MARMOREUS. Tab. 13, fig. x.

Lichen farinaceo-cruftaceus, pallide rofeus; ambitu rivisque ferpentinis, & infulptis cilcareo frobiciilis, nigro fanguineis, pulverulentis.

Lichen crufta tenuiflima infeparabili fubarnea; (cutellis fanguineis, fubhir-
futis. *Halkr hijl. Jirp. hdv. torn. 3. p. 101. num, 2073.*

Lichen crufta impalpabili, aurors colore, cotylis lapideis rubellis. *Sco- pol jlor. cam, a. torn, 2. p. 367. num. 1379.*

Per omnem, qua late patet Japidiam minime rarus, calcareas ibiru- pes, amplis ut plurimum areis inllernens. Reperi inter ilyperlabacum & Longaticuni (vulgo Loitfcb) tum inter Planinam & Prewald; itexura Obzi- nam & San Servolo. Denique in montibus Caporetto adfitis. Lepra-[^] naceo-pulverulenta cohrens, & in cruftatn continuam, irifeparabilem Vmi- nime craflam, immo tenuem, & fere impalpabilem confltiens, late ^{diffufa,} artiflime nudis hserens rupibus; colons rofei; cobaltiginis (eu Ochrs co- balti rofeae adinfar; margine circumfcripta undique faturatius, &: vefut ex nigricante cruoris rubedine, rubro» Eam frequentes ferpentinis, & fere va- ge ramofis gyris pererrafit rivi, ejusdem *asm* limitaneo ambitu colons. Sed neque aliter colorata funt, larga quæ undiquaque manu difleminata cernun-

tur punfla, non ejusdem omnia magnitudinis. Nigris obfitam dicas tuberculis lepram, fcutellisve; eandem fi quidem eminus intueare; at nullas tamen fcutellas, tubercula iiiilla, lentesye invenias ullibt, fi, non microco-
 piis dico armato, fed vsi folium proximo eandem **perfcxuteris** oculo.* Fo-
 raminula funt exigua, ut paffim mt^p in calcareo fo'lent, qua nefcio de-
 , mum *de* caufa, rupi infulpta ipfi Jonge certe, antequam eandem incrutta-
 rit Lichen. Pulveris (Jiirfutiem minus *tet*e, villosve Hsllerus dixit) ea,
 ut & mseandriformes rivi, extimusque marginis limes, pleniffima funt, pau-
 lo quam ille lepri ipfius. GroTioris magis, cumulatiffime aggregati, firmi*
 (ter tainen haerentis, nonrofei, fednigro, utdixi, fangumei colons. Li-
 chenem luinc talem, rofeum dixeram alk^; at cum dein plures alios roteo
 ([Lioque tinffos colore repererim, ab eo longe diverfifTunos, confufionis vi-
 tands gratia, mentem **mutavi**, Scopoliique retinui nomen, minime fane
 malum, ut quod marmoratam cryptogamici irtius vegetabilis faciem, quam
 idonee maxime exprimat Foraminulofas calcarei ipfius foveolas, Cotylas
 Scopolius lapideas, five feffiles icutellas dixit, leprofam crulhm cicatri-
 zantes; id minus refte, Siquidem non Tupra, fed infra lepram exirtunt;
usque pertufus eft, etiam extra areas, quas cmfia occupat, Lapis. Sed
 quod mirabar, Untum ac Scopolius vere omni eftmerito, Virum, Zoophy-
 tologis, Treniblaſi afTeclis, infultare potuifle, quaſi imagination deluſi,
 videre foleant, (\u& »on, aut certe non rite videant. Plurima prEftantiffi-
roi Scopolii funt de hiftoria natural! merita; non tamen 8c de eadem deme-
 riti funt TretDblaam.

CLXXVIII.

LICHEN PERTUSUS. *Tab. i\$.fig. 3.*

Lichen leprofo-cruftaceus, albus, verrucosus, tandem teffellato - rimofus; verrucis laevibus, poro introlabentibus uno, pluribusve, in fcutellos denique nigricantes dehifcentibus, inargine coarctatis fubcrenato.

Lichen leprosus verrucis, fubteffellatis, laevigatis, pertufis, poro uno alterove cylindrico. *Linn, mantiff. 1. p. 231. num. 8*- Leers flor. herb. born.p. 253. num. 926. Oeder.flor* dan. tab. ?66. AUiom flor. ped. torn* 2.p. 2001. num. 2537* **

Lichenoides verrucosum, & rugosum cinereum glabrum* *Dillen. hift. mufc* tab. 18. fig. 9.*

Lichen fcruposus, cruftaceus, cinereus, granosus; fcutellis immerfis atris, margine crenulato. *Schreber Jficil, Kpf.p* *33» ^^^- H33»*

Lichen crufta tenace alba, fcutellis feffilibus atris. *Haller hi/L JHrp. helv. Tom. 3.p. 98. num. 2051. tab. 47. fig. 6.*

Lichen crufta veriucofa, areis polygoniis punctiferis* *Haller hiji. JHrp. helv. torn. %.p. 98. num. 2053.*

Lichen cruftaceus, faxatilis, farinaceus, ex albo fubcinereus, receptaculis florum exiguis, concavis, & nigricantibus, ac in fubftantia plantas veluti infixis. *Michel. N. Gen plant! p. 97. num. 21. Hujus Varietas. j). 97. num. aa. Item altera Varietas. p. 97. num. 43**

Lichen cruftaceus, verrucosus, alpinus, arboribus adnafcens, cinereus, receptaculis florum rufefcentibus. *Michel N. Gen. p. 95. ord. 32. tab, 52. Et hujus Varietas. p. 95. ord. 33. torn. 52.*

CLXXVIII.

LICHEN PERTUSUS. *Tab. i\$.fig. 3.*

Lichenleprofo-cruftaceiis, albus, yerrucofus, tandem teflellato - rimofus; verrucis Isevib us, poro introlabentibus uno , pluribusve, in fcutellos denique nigricantes dehifcentibus , margine coar&atis fubcrenato.

Lichen leprofus verrucis, fubteflellatis, tevigatis, pertufis, poro uno alterove cylindrico. *Linn, mantiff. 1. p. 231. num. 8*- Leers fior. herborn.p. 253. num. 926. Oeder.fior* dan. tab. ?66. AlUon. fior. ped, torn. 2. p. aoor. num. 2537. **

Lichenoides verrucofum, 8c rugofum emereujn glabrum, *Dillen. hift, mufc. tab. 18, fig. 9.*

Lichen fcrupofus, cruftaceus, cinereus, gnnofus; fcutellis immerfis atris, margine crennlato. *Schreber Jpicil, bpf.p* 133. num. 1133.*

Lichen crufta tenace alba, fcutellis feffilibtis atris. *Hatter hift Jlirp. helv. Tom. 3. p. 98- num. 3051. tab. 47. Jig. 6.*

Lichen crufta verrucofa, areis polygoniis punftiferis. *Holler hijt jlirp. helv. torn. 3. p. 98. num. 2053.*

j-idifn cruftaceus^ faxatilis, farinaceus, ex albo fubcinereus, receptaculis Jlarum exiguis, concavis, & nigricantibus, ac in fubrtantia plantasveluti in fix is. *Michel N. Ger. plv.it'. /> 97. num. 21, HLIJUS V^rietas. p. 97, num. sfi. Item altera Varietas. p. 97. num. 23.*

Lichen cruftaceus, verrucofus, alpinus, arboribus adnafcens, cinereus, receptaculis florum rufefcentibus. *Michel. JV. Gen. p. 95. ord. 32. tab, 52, Et hnjus Varietas. p. 95. ord. 33. torn. 52.*

latas rotundato-polygonas, fordidius jam turn ex albo fubcinerafcens; verrucis primum convexis, glabris, poro exiguo uno alterove contiguo, in cylindrulum nigricantem introlabente notatis; led ampliata demum interne cylindrulorum cavitate, in fcutellas cavas hemifphxricas nigras, magis aut minus amplas, profundius tamen femper ipfam in crufbe fubftantiam immerfas, dehifcentibus; margine, non jam pororum, fed fcutellorum intumefcente, atque exinde nonnihil coarftato, integro, aut ex contra&ione inaequaliter crenulato. Varietates ejus vidi, & poflideo plurimas, fed nonnifi ab aetate ftenique petitas. Candidus alias, tener, neque rimofus, fov^olisimmerfis minoribus, & parcius fparfis fubnigricantibus, imaginem referebat inferae alarunipofticarum paginse Papilionis Argioli Linnaei; qualem fere dextima Halleri figura exhibet. Sed obfervavi demum, grofliorem fordidiusque albertem redditum, figurae Dillenii jam melius correpondiffe.

CLXXIX.

LICHEN CINEREUS. *Tab. 14. fig. 5. lit. b.*

Lichen leprodis, verrucofo-cruftaceus, albo-cineraicens, tuberculis fuculliformibus centro, nee peripheria feffilibus atris; margine albo, demum crenulato.

Lichen leprofus, tubertulis nigris, albo marginatis. *Linn, mantiff. L pag. 132[^] num. 87. l*ers. flor* herborn.p* 254* num. 931.***

Perquam copiofus, iisdem cum priore, in faxis locisque. Studiofe Pertufo fubjungo, ne cum eodem confiindatur, ab eo diverfiflimus. Ntidis prsdidis locis rupes crufta leprofa tartarea, jam tenera magis, jam magis grofliu-

latas rotundato-polygonas, iordidius jam tum ex albo fubcinerafcens; verrucis primium convexis, glabris, poro exiguo uno alterove contiguo, in cylindrum nigricantem introlabente notatis; (ed ampliata demura interne cylindrorum cavitate, in scutellas cavas hemisphaericas nigras, magis aut minus amplas, profundius tanien lemper ipsam in crustis substantiam immer-
 (as) dehiscens; margine, non jam pororum, sed (cutellorum intumescente, atque exinde nonnihil coarctato, integro, aut ex contractione inaequaliter crenulato, Varietates ejus vidi, & possideo plurimas, sed non nisi ab state tuncque petitas. Candidus alias, **tenet**, neque rimosus, foveolis immerfis minoribus, & parvis sparsis tuberculosis, imaginem referebat infers akerurt^posticar iini paginae Pap i lion is Argioli **Linnæi**; qualem fere dextima Halleri figura exhibet. *Sic* observavi demum, grossulovem fordidiusque albentem redditum, figuras Dillenii jam melius **correspondente**.

CLXXIX.

LICHEN CINEREUS. *Tab, 14.fg. 5Jit. k*

Lichen leprol^{us}, **vernicifus** crustaceus, albo-cinereus, tuberculis subcutelliformibus centro, nee peripheria fessilibus atris; margine albo, demum crenulato.

Lichen leprosus, tuberculis nigris, albo margioatis. *Linn, mantiff. 1. pctf. 132, num. 87, Leers, flor* herborn. p, 254. num. 931.?*

Perquam copiosus, iisdem cum priore, in faxis locisque. Studiose Pertuso subjungo, ne **cum** eodem confundatur, ab eo diversifimus. Nudas prædidis loci rupes crusta leprosa tartarea, jam teuera magis, jam magis grossulovem
 grossulovem

grofliufcula; in verrucas demum convexas findenda, coloris ex ex albo d-
nerafcentis (poffideo etiam elegantiflimam Varietatem coloris ex albo lste
virentis) infternit, non raro orbicularis. Huic undique (in orbicular! cen-
trum verfus) niagna in copia fat & conferte, in- ant lupra nafcuntur tuber-
cula, primum exigua, magnitudine demum minorum lentium, convexa,
atra, centro fubtus feffilia, peripheriam verfus a lepne cruila libera, peri-
pheriae margine annulari nonnihil elevato, ac demum crenulato, albo; qua
de caufa etiam fcutellas velut mentiuntur, utut vera cfteroquin tubercula
intra niarginalem annulum, convexa. Cum dubio duntaxat Leerfium rece-
pi. Mam Halleri citat Lichenem num. 2059. **qui** a noftro diveifyf gfi.
~~Schrankius in flora Berchtesgadeni exillimat, minus tamen recte, Varieta-~~
tem prsecife, una cum Lich. calcareo, & Lich. fufco-atro efTe, Lichenis
, fui, quem confluent em vocatj & qui forfan nonnifi L. Sanguinarius Linna?i ell?

CLXXX.

LICHEN AIBO-C^iRULESCENS. *Tab. i. fg. x.*

Lichen leprofus, crnfiaceus, continuus. **impalpaliUis**, albus; tuberculis
tandem planatis, cinereo* **GserulfcntibiUK**, margine annulati atro cir-
cuiufcriptis*

A **pu**d 7it:tori:m millumj ne veftigiutn fpecierfl'nu hujtis reperio Li-
chenis ; frequens tamen in faxis lapidibusque fylvamm Zigulnenfium, **præ-**
primis in lapideo aggere fylvam circumdantem, retro Caftelluin , vulgo
Ziguln. Crufta leprofa, **cootina**, **impalpabilis**, gbbra, hand craffa, ne-
que tsmen pracife **fuperfidali'Sj** fcxo arfiifllme **inoata**, **latifSme** per idem

efufa,

CLXXXII

LICHEN ATRO- VIRENS. *Tab. 14. fig. 2.*

Lichen leprofus, farinaceus, ater, tuberculis lentiformibus, confertis, viridibus. *Linn, fp. plant, p. 1607, num. 7.*

Iteratis vicibus in *fylvis* usnbrosis, retro montem Calvaria[^] fuper & xo inveni ex quarzo & fteatite compofito[^] Crufta illi tenerrima, vere farinacea, pene fuperficialis, atra, frequentiffimis undique, confertisque feminata tuberculis feffilibus lentiformibus, exiguis, aquofe e flavo virenjibus, nudis, laevibus, absque margine exftante, aut difcol#e; per exficcationem demum tantisper depreffis* A Lichene geographico longe quam alieniffimus; neque adeo ejusdem Varietal

CLXXXIII

LICHEN VIRIDI- ATER.

Lichen leprofus, cruftaceo - papillofus, pallide e flavo - virefcens*; tuberculis tandem fubfcutellatis, atris*

In Taxis pariter umbrofarum montis Calvarias fyl\rarum; diftinflillimus & ipfe a Lichene Geographico. Nee cum antecedente confundendus. Crulla ei leprofa, admodum humilis, papiliofa, e meris fcilicet glebulis Iphaeroidicis, quam maxime exiguis, pauidiffime flavo-virefcantibus, & conferte aggregatis, confans[^] Sparfa per earn perquam copiofa undique funt tubercula lentiformia aterrima opaca; deficcatione tandem in fcutellas umbilicatas dehifcentia*

CLXXXIV.

CLXXXIV,

LICHEN RIGIDUS. *Tab. 13. 5.*

Lichen imbricatus, foliolis teretibus, compressifolius, ramuloso - multifidis, atris, centrifugis; scutellis hemisphaerico concavis, fertilibus pedunculatisque, concoloribus. Vide Miscellaneorum Auliacorum Jacquinii Volum. II. p. 8^o num. XXXII

Ab aliquot jam annis rarissimi Lichenis completam, ut dicitur, figuram, Miscellaneis debeo Auliacis* Ad manus ejusmodi tum non erat, cum alterum eorum ius praeferebat Volumen, Debitum jam exfolvo demque, lectores ad ea, quas indicato mox loco dixi, relegans; quibus, quod porro addam, vix est, nisi, quod scutellas hemisphaerico - concave omnino sint, margine integerrimo, partim fertiles, partim & breviter pedunculatae, ramulis foliolorum fruticulorum in orbem decumbentium, & imbricatorum superne nulla lege, innatis Corolloideis scyphigeris, quibus cum commune habet nihil, minus recte, aggregavit Billenhis* Hallerus contra, et si filamentosis adfuerit, fruticulorum caetera non differt; tamen & ob scutellas, & ob capitulum in circulum creicendi momentis, ad pulmonarios accedere diferte inquit

CLXXXV,

LICHEN RETICULATUS. *Tab. 13. fig. 6.*

Lichen filamentosus, ramulosus, decumbens; filamentis tenerrimis, reticulatis coadunatis, atris, opacis.

Afperrimas fümmarum alpium cautes, ut nutnquam absque* vifre perreptes periculo, fie nee unquam etiam nifi magno cum faenore aditurus es, {pairs utique rariffimarum ditandus ftirpium. Fidem excedat, poffe dun's, fiiciflimisque e rupibus progerminari aliquid, & tamen inclementiffimae hæ faxorum maffæ, levi duntaxat, atque ventis aliunde adlato male teftae pulvere, quem roris firmet, faecundetque humor, eas plerumque procreant neglectas raritates, quasnulla, principum in hortis, educet artis qjra. Horridas Grofskircheimii dum per mutas, filentesque Zirchnizii valles adirem, & hie quoque rariffimus occurrit Lichen, lichenibus non minus raris immixtusaliis: Rigido, Fahlunenfi, Pubefcenti, Lanato. Et huic quideKL,ultmo teneritudine cedens nihil, lanæ adinfar Sc ipfe, in faxa, aliosque decumbit lichenes ramoffiiuus, filamentis omnino capillaceis, lentis tamen, & dum quidem foJi^ exuritur radiis, etiam rigidulis. Color illi, ut eorum, quorum in focietate vivit, ater, attamen ex rubro velut obfeuro, quem atro-fubrubentem dicas. NitorLs Lichenis pubefcenti, ut Lanatus, & ipfe expers. Verbo, Licheni lanato, quoad omnia fimilis, ut eundem etiam pronunties, nifi filamentis reticulatim coadunatis, & anaftomofantibus differet. Varietatem tamen illius dicet alias! & pace mea; ego tamen, qui diftinguere, quam confundere malim, inter ramorum fila, ob eorundem copiam multitudinemque, invicem implexa, & inter fila ex *mutuo* occurfu in reticulum connata, numquam non diftinguam.

CLXXXVL

LICHEN PUSTULATUS.

Lichen umbilicatus, folio coriaceo fuborbiculato, libero, marginibus lace-ro-lobato; fupra çano-cinerafcente, puftulis inflatis, papillofisque obfito;

fito; fascia marginal! atra ex furculis coralloideo - racemosis; subtus cinereo fufcescente ex lacunis subreticulato.

Lichen pustulatus, foliaceus, umbilicatus, reticulato - lacunofus. *Linn.fp**
*plant, p. 1617. num. 53. Oeder.flor. dan. fasc. 10. tab. 597. fig. *#*

Lichenoides pustulatum cinereum, & veluti ambutunum *DiUen.tab. 30.fig. 131.*

Lichenoides crustae modo facis adhaerens, verrucosus, cinereus, & veluti deustus. *Vaillant. bot. parif. tab. 20. fig. 9.*

Lichen fronde cinerea, inferne lacunata, arbutulis superne nigris. *HaUer hijhlijrp. heiv. torn. 3. p. 87- num. 1996.*

Liccca pulmonarius faxatilis &c, *Michel N. PL Gen. p. 89* tab. 47.*

Nudis adhaeritur rupibus, jam folitarius, jam aggregatus & multiplex, nulli pilchritudine fecundus. Folium illi paulo minus crassum, quam Licheni miniato, per exsiccationem, durum, rigidum, fragile; de se coriaceum, suborbiculare, simplex, peripheriam versus plus minus lacero-lobatum; undique liberum, umbilico duntaxat centrali partis inferis facis, aut certe brevissimo infertens pedunculo tophaceo, adnatum. Vidi pisi haud excedens magnitudinem, margins omni fursum versus contracto* Ampliatur demum ad unum duosve pollices in orbem distentum, fimbria in lobis subrotundis margine, magis minusve profundos, Omnis ejus lupera superficies coloris est albido- five incano - cinerascens, dempta duntaxat marginali, lataque fascia, anthracina^ Innumeris eadem haec superficies obfita est pustuli^ inttatis, protuberantibus, convexis, magnitudine differentibus, promiscue hemisphaericis, aut oblongo-ovalibus, infra cutis anferinse papillis; papillis concoloribus, perquam exiguis, confertissimis, & ipsis convexis, nee concavis* Atrain eam marginisfaciam, spatiosissime addensati efficiunt furculi coralloideo fruticulosi anthracini, adeo ut plurimum parvi, ut

ab aggregatis glomeribus tuberosis feffilibus tartareo-nodulosis vix, nisi per lentem, distinguas, Sunt vero (ut videre est in *üs*, qui folitarii, hinc inde, peripheriam versus,*occurrere solent) stipituli exigui atrii, apice arbutuli inllar, racemoio-ramulosi. Hos Michelius, contra naturam certe, gigantes, uti & folium profundissime undique difciffum, quale *lmhi* nuspiam occurrit, exhibuit Inferioris porro superficie color, ex cinereo fbrfescit, f.ve nigricat. Eilque omnis haec, quanta quanta est, Lichenis istius pars, reticulato lacunosa; iimmunis fcilictt & magnitudme, &c figura differentibus, partim orbicularibus, partim ovalibus^ in corium tamen adeo Temper pro funde impreffis, ut ex altera emineant superficie, confita fc&QIL)bus^ Coriaceum hoc, si forte diffringas, folium, medullarem ejus, inter utranq<ue superficiem^ interceptam carnem nivei coloris eTe invenies*

CLXXXVII

LICHEN POLYPHYLLUS. *Tab. 16.fg. i.lit.a-L*

Lichen umbilicatus, coriaceo-foliaceus, multiplicatus, multifido-lobatus, lobis rotundatis, crispis ^ lubcrenatis, utrinque laevis, supra ex viridi tandem caeruleo-cinereicens, punc^is eminentibus atris, iubtus aquose brunescens^

Lichen foliaceus, polyphyllus^ umbilicatus, utrinque l^vis, crenatus. *him**
fp. plant, p. 1618 num. 56, Gunner* flor. norv. torn. 2.p. 93, num. 767.*
Schraxk. fior. bercht. p. 314. num. 483.?

Lichenoides tenue pullum, foliis utrinque glabris. *JDillen. musc. tab. 30.*
fig. 129.

Lichen lapideus crifpus, utrinque coloris fphiftef. *Holler hijl.jlirp. hefa.tom**
3. p. 88- num. 2001,

Quam alibi rarus, tam hie undique abundantiffimus, nudis in rupibus montis Calvariae; collis *Schmahbergd* & retro caftellum Zigulnenfe &c. Silent, quas defuper confului, plersque Floras; quibusporro intaftus haud reraanfit, vix, quac fufficiant, ut a congeneribus diftinguatur, notas dedere. Plures idcirco, per omnes fere ejusdem states, pingi feci ad naturam icones, ut defiderari deinceps poffit nihil, quin illico dignoicatur, Figuris certe Dilleni nil, nifi lux & umbra^ ut dicimus, deeft; fed vel ex eo jam, imbricati centrifugipotius, quam umbilicati gerunt faciem. Folium ei coriaceum, minus, quam in Lichene Miniato durum & craffum; prima in state, dilute fupra virefcens, maris fere virore. Exalbescit mox vtror ille, magis magisque glaucescens, dura e glauco denique caerulefcenti-cinereus fiat, pallida fqualens fuligine* Nulli eo in *folio fupra fubtusve viiii, nudum undique, glabrumque, pun6lulis modo exiguiffimis (eminentibus tamen) nigris parcius, aut copiofius fuperne obfitum, quos vix interdura oculo, femper microfco pio detegas. Expansio illi, rofae adinfar, rotundata, difco medio tantifper deprefib; undique cetera liberum; umbilico duntaxat paginal inferioris faxis adglutinatum verius, quam proprie radicum. Quoniatti autem admodum luxuriat, expansione admodum late patente, eo fit, ut in frequentes vel per difcum jam affurgat plicas, varle finuofa - lobatas; lobis, lorumque laciniis rotundatis, crenatis, linuofa-crifpatis. Subtus idem' folium dilutius aut faturatius fufcefcit, bruneum tandem, folentque profundiores ejus plicae, (axum proxime contingentes, in callofum tuberculum excreicere, quod faxis longiore appreffum tempore, complanatur, & eo, quo umbilicus ipfe modo, iisdem adglutinatur. De Halleri fynonymo
fub-

fubdubito, maxiine cum & *fpfe* de Dilleniana planta, quæ eadem & mea est, fubdubitet* Ut autem verum fatear, videtur mihi hie duplicem Hal-lerus errorem erraffe, dum verum Linnaei Lichenem polyphyllum, num. 1999, tab. 47. fig# 2. pro Lichene Miniato propofuit, & num. 2001* nefcio quern? pro Polyphylo Linnaei* Apud Schrankium minus placet, quod foliola, imbricum more, mutuo fibi fuperimpofita dicat; cum multilobatus potius fit, quam vere polyphyllus,

CLXXXVIII

LICHEN OCHROLEUCUS. *Tab. 13. fig. 4. & a.*

Lichen foliaceus, centrifugus, iSavo-virefcens, foliolis lobato-multifidis; tuberculis centralibus ochraceo-luteolis, tandem marginato-fubfcutellatis.

Lichen pulmonarius, faxatflis, farinaceus, glauco-virefcens, anguftioribus fegmentis, receptaculis florum grifeis* *Michel. N+ G. plant, p. 94. num> 6. tab. 51. ord. zo.fig. 4. Segnier. veron* torn* j.p. 63. num. 22.; turn JuppL p. 49**

Lichen muralis, imbricates, flavo-virefcens, fcutellis concoloribus, demiiin lutefcantibus, margine pallido. *Schreber. fpicih lipf. p. 130. num.1126.*

Non alius hie (centrifugum Linnaei Lichenem fi demas) majore in copiaubivis.viGtur, quam idem Lichen ifte, quern ab ochraceo-luteolis tuberculis, ochroleucum dixi Saxum Viftoria, & qua late Clagenfurti mons Calvaris patet, vix exiftit ullum, eodem quod careat Pure rupeftrem crederem, nifi, quod ifthic nuspian obtinet, in tettis, parietibus, caaceriis, affleribus^ trabibu^que putridis paffim cbvimri affererent Miche-
lius,

lius, Seguierius, Schreberus! contra quos excipere nee velim, nee aufina. Quamvis autem & Michelius, & qui eundem repetit Seguierius, farinaceum dicant, tamen nihil in eo unquam five fainae, five leprae, aut crufts vidi tartareae, Prima jam ab origine foliaceus est, ut praepimis in x, x, x, videri potest; antea enim quam florentia in confpectu veniant tubercula, in fecundas? demum collapfura fcutellas, tenerrima femper vidi foliolorum pinnato-frondefcantium initia, ab uno velut centro in orbem quaquaverfum fe diffundere. Nefcio, an non & idieo, centrifugi potius, quam imbricati mereantur dici, quotquot hac indole funt Lichenes? in quibus, fi quod reapfe evenit, candide velimus fateri, nulla, aut certe rariffima est fpioruui (ibi mutuo fuperincumbentium imbricatio, confans contra, frondium ab uno in orbem divergentium centro difperfo* Sunt itaque Licheni ochroleuco foliola tenerrima, fubtiliffimaque, fuperne ex diluto virore, pallide demum flavo-virefcencia, glabra, nee absque nitore omni, fubtus fufca, leu ex bruneo velut nigricantia, nullis radicata villulis, arctiffime tamen rupibus adglutinata, ut integra inde cultello haud abrasas, Frondes dicasubpinnato-lobatas, lobis multifidis, lacinulis obtufis rotundatis, quae ab uno in orbem centro quaquaverfum diffugiant A ream earundem centram efflorefcentia cum tempore occupant tubercula convexa lentiformia & feffilia, plurima, conferte accumulata, trifte argillaceo- aut ochraceo-luteola, fungoia, in quibus marginem decolorem videas nullum. Senio, aut deficcatione, non parum eadem haec alterantur tubercula; extimus primum exalbescit in jibem margo, annuli adinfar albidus; collabiti* dein tantiper media difci convexitas, applanataque, & margine quoque ihaequaliter contraflo, non equidem vere concavam, ied piano - velut depreffam refert fcutellam luteolam, margine angulato-crenato albido cinftam. Hie id folium breviter, femel pro femper monuiffe volo, confufionis, quae apud nori-

nullos invenitur autores, vitandae gratia: Numquam me voce *ScuteUa* uti, quam pro exprimendo hemifphaeriolo concavo* Tuberculiim contra dicere, aut lentiformen convexitatem, ubi de hemifphaeriolo convexo fermo est* Sunt enim, qui & hoc quoque in tuberculorum casu, voce ~~5~~ *waZfo* abutuntur, tamquam plurali, diminutivi *Scutellum*: qua de causa fummam perfaepe in iis intelligendis habui difficultatem. Alterum est, ad quod probe itidem attendiè juvat: Lichenes dantur tuberculati alii, alii contra Scutellati. Pro tuberculatis eos habeo, qui tales nati, tales etiam perfeverant Temper, aut certe non nisi per exsiccationem, introlapsum difci, & decolorationem marginis, subscutellati videntur; eo fere modo, quo plures pulvinati agarici, ex humoris abundantia, infundibuliformes denique fiunt. Proprie scutellatos contra, dico, qui quamvis in tuber primum elevati, poro tamen verticali hiant, magis magisque ampliando, dum concavae demum scutellae fiant. Scio & hos quoque cum tempore per humoris abundantiam in scuta elevari convexa, sed id temporis, non natura?, est

CLXXXIX.

LICHEN OLIVACEUS-

Lichen foliaceus centrifugus^ flavo-fufcescens; foliolis lobato-multiindis, nitidis; scutellis centro fefilibus, concoloribus, integris, crenatisve.
Lichen imbricatus, foliolis, lobatis, nitidis, lividis^ . *Linn, fp. pi p. 1610. num. 21. Schreber. fpic. tipf.p. 139,77am. 1128- turn num. ii27%, sub nomine Lich. Fulli. Weijf. crypt, p. 58. Leers, fl. kerb. p. 256. num. 943* Scopd.fi. cam. 2. tab. 2. p. 389* num.1299. AUion.fi. ped. tab. 2. p. 318. num. 2551. Etfub nomine Pulli ^7. 317. num. 2550.*

Lichenoides olivaceum scutellis amplioribus verrucosis. *Dillen. musc. tab**

24. fig. 78* Et

Lichenoides olivaceum scutellis laevibus* *Dillen. musc. tab. 24. fig. 77,*

Lichen pulmonarius faxatilis subtus nigricans, desuper olivae conditae colore, receptaculis florum concoloribus* *Michel. N. G. pi p. 89* tab. 51* ord. 19.*

Lichen crustae modo arboribus adhaerens olivaceus. *VaillanU hot. pari/l tab. 20. fig. 8»*

Lichen fronde femipinnata, rotunde lobata, olivacea, pulla, scutellis erenatis. *Holler. hifLJlirp* helv.tom. ^ . p. 91. num. 2014**

Vulgatissimus in arboribus pomiferis, sylvaticisque, tum & in faxis fylvarum montis calvariae & retro castellum Zigulnenfe in quibus amplissimus ?um scutellis plurimis & maximis. Varietates, quibus *Lichen* hic ex agtatis, locique natalis diversitate, obnoxius, non nullam apud autores induxerunt confusionem* Folium ejusdem non admodum crassum, fere & tenue, subtus nigrum est, faxis, arboribusque absque uilis radiculis aut villis ar&e adglutinatum supra tenera in state ex diluto olivae virore flavens, laeve, nitens; dein ex obsoleta flavedine fuscescens, id est brunescens, obscurius nitens, exiguisque verrucis undique tuberculolum & scabulum, aut iis deficientibus suo cum lasvore & nitore perfertans. Rosaceae in orbem sese expandere solet} ad majorem in faxis, minorem contra in arboribus amplitudinem, Integriusculum interdum (in arboribus, & prima aetate) nec nisi peripheriam versus, in lobos (subpinnato-rotundos divifum; alias jam a centro ipso in frondes centrifugas oblongas, subpinnatifido-lobatas, lobis rotundatis, extrorsum majoribus, diffectum* Scutellae (dura adfunt) copiose, praecipue versus discum medium, folio plane concolores,

centrali duntaxat umbilico inferiore ^nfidentes 9 caeterum liberse , primum parvae, concave, margine integerrimo, introrfum contrafto; demum ampliate, magnae, applanatae, orbiculares, ambitu integerrimo, aut & dery* que crenulato, Diilenius loco citato omnes exhibuit varistates, floriferam, flerilem,. verrucofam. Color, ut innui, variat; tamen nunquam absque omni, faltem verfus extremum ambitum, flavedine obfcura. Hallerus T# 3, p. 91. N. 2013* Lichenem omphaludem defcribit Linnaei, eo non citato, & perperam plane ad eundem, Michellii pulmonarium fupra citatum. Dilleniique olivacei varietateir,, pro fynonymis adducit, qui uterque ad Linnaei olivaceum pertinent Schreberius duplicem olivacei Dilleni varietate, & Halleri autoritate induftus, novam (ub Pulli nomine condidit fpeciem, quem & Allionius fecutus. Weiflius demum, Scopolum indubie fecutus , ad olivaceum Linnaei, ex Hallero pro vero ejusdem fynonymo N. 2014. adducit non pertinentem ifthunc Halleri N. 2013. qui profecto , ut mox videbimus, Lichen Linnaei omphalodes eft.

CXC.

LICHEN OMPHALODES. *Tab. i5.fig. 2. lit. a. b.*

Lichen foliaceus centrifugus, faturate absque nitore viridis, deficcatione fuscus; foliolis fubpinnatifido-ramofis, **iubtus** per oras crinitis; fcutellis atro-rubentibus, margine elevato integerrimo albido cin&is.

Lichen imbricatus, foliolis multifidis, glabris, obtufis, incanis, punctis vagis eminentibus. *Linn. Jp. plant, p. 1609. num. 20. Leers, jlor. herborn. p. 256. num. 94*-*

Xichenoidesfaxatiletinftorium, foliis pilofispurpleis. *Dillen. tab. 24.fig. 8o>*

Lichenoides nigricans omphalodes. *Vaillant. bot. parif. tab. 20. fig. 10.*

Lichen fronde femipinnata, rotunde lobata, olivacea, fcutellis laevibus.

*Hatter, fürp. helv. torn. 3. p. 91, num. 2013**

Lichen gulmoarius minimus, arboribus innafcens, ad margines radicans, fupra cinereo-fufcus, inferne anthradnus, receptaculis florum fufcis*

Michel M G. plant, p. 93. tab. 51. orcU «9.

Tarn in pomiferis, quam fylveftribus arboribus Salice, Fago, Carpino, Fraxino, Quercu; item affulis teftorum, & afferibus fepium femiputrefcentibus vulgatiffimus; utmireris, in Floris recentiorum non recenferi. Rarior circa Clagenfurtuni in faxis, bis enim iis innatum duntaxat invenit. Multa Lichen ifte cum Lichene olivaceo Linnsei habet communia; ab eo quamquam diverfiffimus: fibi ipfi etiam difligillinius prout vel madet, aut humidus eft lit *a.*, vel contra deficcatus, fudo coelo, in arboribus vifitur lit. *b*»; forlan & haec ratio, quod paffim negleftus, aut cum olivaceo perperam confufus fuerit; cum diligentiam tamen Veterum non fefellerit. Deficcatum fiintuearis, tum fcilicet, cum morbidi languent Lichenes, parum ab Olivaceo fenefcente, diverfum credas. Colore tum eft fufco, id eft, dilutius aut faturatius bruneicente, cum nefcio qua? incani halitus mixtura, praepimis ad extimos loborum margines; glaber etiam, fed nitoris tamen femper expers, nee ullam in flavedinem ufpiam emoriens. Scutelke tum etiam folio concolores; margine tamen femper introrfum revoluta, tumido, integerrimof lsvi, jam concolore, jam & plerumque albitio incano, Intra aquam jam tempore repone aliquo macerandum, aut certe pluvio coelo, ex humore madentem, aipice; non fufcus amplius, faturato imo recentis olivis fupra viret colore, nitoris expers; fcutellishemifphaericis, fubpedunculatis velut, fupra atro-rubentibus, vel & obfeure fanguineis, fubtus mar-

gineque exstante, tumidiufculo, furfum revoluto, integerrimo, laevi, incano - albescentibus. Folium illi caetera fat tenue; rosacee in orbem diffusum, quandoque & ipsum integriufculum, ambitum duntaxat versus, multifido-lobatum; communiter tamen pro funde diffesim in foliola frondescentia, centrifuga, subpinnatifido-ramosa, lobataque, lobulis obtusis, rotundatis, subtus anthracinis, & per marginum oras copiose & breviter crinitis, crinibus (aut si vis radiculis marginalibus) simplicibus, atris. Substantia medullari folii alba. Synonymum ex Michelio adductum, huc mihi pertinere videtur, Nee figura abluat citata; etsi radulas marginum non exprimat; quas tamen subintelligo, cum ad margines in descriptione dicat radicum, Linnasus in Flora suecica & lapponica (non tamen in Speciebus & Systemate nature) ad Omphalodem ex Michelio adduxit synonymum p. 90. tab, 49. ord. 22. fig. 2. Sed quantum video, figura haec cum priore, a me citata, eadem est, dempta magnitudine, & descriptio etiam optima; ut mirari subeat, cur bis? & diverso loco? eundem adduxerit lichenem Michelius? Forfan, dum suum in Italia ad Populos crescentem, descripsit, p. 93. tab, 51. ord, 29. oblitus est, se eundem, ex dono Sherardi, 3c Vaillantii obtentum, iam adduxisse p, 90. tab, 49. ord. a. 2 fig. 2, In hac illius descriptione, uti & in Dillenii, Rajique, id solum displicet, quod folia supra purpurea dicat. Melius cum Vaillantio de deficcatis dicturus, nigricantia five fusca.

CXCI.

LICHEN PULCHELLUS *Tab. 16 jg. a.*

Lichen foliaceus, centrifugus, albo-fubcinerafcens, foliolis fubpinnato-lobatis, fubtus per oras crinitis; glomerulis centralibus pulverulentis cinereo#acrulefcntibus obfitus; fcutellis cinereis, albo marginatis*

An Lichen pulmonarius, faxatilis, farinaceus, foliis pulpofis albis, ad extremitatem magis complanatis, receptaculis florum cinereis? *Michel N. G. plant, p. 94, ord. 30. tab. si. fig. 3.* Sed cirrhulorum nurginalium non meminit 1

Maxima in copia faxis innafcitur undique *am Schmalzbergl*, in monte Calvarije, & in fylvis inter Kefslin, & Zigiiln. In arboribus numquam. Folium, ut in hac centrifugorum familia, {at tenue, etfi pulpofim videri poffit, quod frondes fuperne longitudinaliter convexiufculse fint, rofacee de more in orbem diffufum; profundiffime interdum partitum in folia frondefcencia e centro ambitum verfus diffugientia; quandoque ut in *Michelii Tab. 51. ord. 30. fig. 6.* angufta, ar&e Itipata, linearia, longitudifaliter femiteretia, Temper tamen fubpinnato-multifida, & lobata, ambitum verfus latetcentia, lobulis obtufis rotundatis integris. Color illi fupra albus, aut &c ex albo fubrinerafcens, fubtus femper niveus, nee fufcus aut niger unquam. *Oræ* marginales foliolorum lorumque inferne cirrhulis five radiculis fimplicibus exiguis ftipatis atris obfitae, & radicals. Scutella, quæ hac in fpecie rariffime, nee copiofs occurrunt, feffiles hemiiphaerico-concavae, cinereae, margine elevato albo integerrimo cinftae. Frequentius medius circum centrum difcus, copiofilimis obfitus effe folct granulis five tuberculis

he-

hemifpcastrico-convexis pulverulentis {aturate cinereo-caerulefcentibus , absque, aut non nisi perpaucis cum fcutellis intermixes. Frequentiffinie denique, prseprimis ultima in aetate, & icutellffi , & hemifphaerici pulverum acervu li deficiunt.

Apud Autores diftin&e adumbratum haud reperio* Ex Linnaeana Omphalodis defcriptione, hunc, praë illo altero, omphalodenilcredidiflrem efTe. At Linnaeus profecto non alium utique Lichenem , hoc omphalodis nomine donaverit, quani, quern jam ante Vaillantius, nigricantem Omphalodem compellavit, qui a meo hocce quam diverffilimus, in eo praecifecum eodem convenit, quod uterque cirrhulis aiff crinibus repaty five & radice-tur margin álibu5,

CXCII.

SALIX FUSCA-

Salix foliis integerrimis, ovato-lanceolatis , fubfeffilibus, nitidis, fubtus primum villofis; amentis oWongo-oyatis, atro-rubentibus, albo-villofis, pedunculatis.

Salix foliis integerrimis, ovatis, fubtus villofi^, nitidis. *Linn.fp.pl p. 1447. num. 26. Jacquin.fior.cuftr. vol. V,p..4. tab. 409**

Salix pumila, folio utrinque glabro* *Joh. Bauh. L part. 2. p. 217**

Salix foliis ovato-lanceolatis, glabris , obfcure ferratis, venofis. *Haller. hiji. ftirp* heh.torn. 2, p. 308. num. 1646. Sed non praeterea], etiam Myrtilloide3»Linnaei.*

Salix

Salix alpina. *Scopol. for.earn** 2.tern. *•/?• *tL\$\$.*num. *izofy.tab.* 61. Sed non propterea *lanata* L*, neque *Halleri Salix num.* 1650*, quas S* *rotundifolia* Linnaei est.

Non facile hsee alio copiofior loco, quam in Monte Regio Rablenfi, ubi inter numerosos illos Lapidis Calaminaris superiores & inferiores cuniculos passim undique initio Maji floret, una cum Cytho purpureo; Lilio Clialcedonico multifloro; Diantho fylvestri &c* Earn, loco citato, praetantiflinius quidem descripsit Jacquinius, figuraque etiam, qua meliorem adhuc non habueramus, illustravit; cum tamen Carinthiacis ea minus respondeat exakte exemplaribus & partes praeterea fructificationis nonnullas ne attingat quidem, ignoicet Vir amiciflimus, illi fi & meam quoque figurante partim in confirmationem, partim etiam in supplem en turn adjunxero; praepimis, cum & alias quoque Salicum species Carinthiacas, *ft* Numen favorit, cum erudito communicare orbe constituerim interpolatas per vices. Radix ei perennis, digitum auricularem crafiã & amplius, longe sub terra repens, ramofaque copiofis per intervalla fibris radiculisque obfita, caetemm lenla, lignofa, extus fufca, albaintus. Caules ex ea plures, & ipfi perennes, lignefcentesque^ per terram profrati, fibrillisque p^fspe iterum radicati, primum obfcure rubri, turn ex fufco-fubcinerafcetes, midi, glabri, nodulofu- Folia dilutius primum > turn faturate viridia, & firmaj pro parvitate arbutulae lats; utut numquam admodum magna; funtque ovato-lanceolata, breviffime petiolata & fere fubfessilia, (uis in ramulis altera,, marg^ne integerrima, supra fubtusque nitidula, fed inferne praeterea, prima in aetate % ex pilis, tandem cadivis r villofa, Reticulum fubtus venarum in junioribus vix agnofcas, nisi luci obverfa intuearis, estque illufire feulibtranfparens; fed adolefcentibus demum cum folw venis, haudgra-

vate id etiān decalvatis penitus discernas in foliis; eminent enim tū tantillum venulae, mutuo se intercuffantes, dilutiffima rubedinis fuffusae tin&ura. Gemma* tam amentorum, quam foliorum ovatae., faturate fufco-rubentes, glabrae, univalves, apice bifariam dehifcentes, & cadivae. Stipes foliorum communis, primum viridis & villofus, tū glaber & ex rubromagis, magisque fufcens. Amenta diclina. Utriusque fexus pedunculata; pedunculo ex nidulofoliolorum aliquot; tereie, atrorubente, villofiffimo; brevior in masculis; in foeminis nan nihil elongato, & foliolis perpaucis, laxiffime alternantibus obfito. Sunt praeterea tam mafcula, quam foeminea, oblongo-ovata, atro-purpurafcentia, pilisque albis villofiffima* Squamae fciiicet calycinse in utrisque ovato-lanceolatae, concavse, dorfo atro-purpureas, & pilofae?* Nectariam quoque utrisque tubuloso-cylindraceam, gracile, apicem versus perparum latefcens, truncatum, ex albo (ubpurpura) #ns. Stamina masculis duo: filamentis aquofe rubellis, diaphanis, calyce triplo longioribus. Antheris primum rubris, tū ex polline aurato-flavis. Germen foeminis feffile ex ovata bafi, elongato-roibatum^ totum atro-purpureum, albo-villofum; flylus cum germinis roftro confluens, apice bifidus; digmata duo, bifida, obtufiufcula, dilutius rubra, demum nigra. Capfulae (germen immutatum) ex ovata & ampullata bafi elongato-roftrata, uniloculares, bivalves, Valvulis ab apice revoluto-delifcentibus, ac quo maturefcunt magts, magis etiam ex rufo flavefcentibus, fimulque calvefcenābus, Semina pappo copiofo, pilofa, niveo, & fericeo involuta. Gmelini Salicem pumilam folio ovali *fior. fibir. torn. i. p. 160. num. 14. tab. 35. jig. t.* libensreciperem, oHi folia admodum effent magna, obtulaque, & de deniibus baleos loqueretur. Sed & difplicet, quod in fynonymia conjungat cum Joh. Bauhini Salice pumila utrinque glabra, que Linnsi fufca est, Salicem Halleri foliis lsvibiis ovatis, fpica rariffi-

ma feii paucitara; qñise absque omni dubio Salix retufa Linnaei est; plurimum a Fufca, diverfa.

CXCIIIL

FUMARIA ACAULIS.

Fumaria fcapis nudis foliorum longitudine; foliis pinnatis, pinnis trilobis.

Tergefti dum nuper perquirendis vaeam plants, quas pars ea Carni*^e quondam Auftralis profert elegantiffimas; attulit pnceclariffimus Vordoni, Sebenicenfis quondam Phycus, in paucis dilectus, conatumque meorum fautor egregius[^] & hane quoque cum infequente plures inter alias ftirpem, in eo Adriaticae maris Littorali leftaou Annuæ ejus radix, fat gracilis, fibrillis nixa fparfis & albida; copiofiffima uno de capite profert folia, tenera, tres circiter alta pollices, longo[^] gracilique fulta petiolo; apicem prscife verfus pinnata, jugis pinnarum tribus, cum impare. Pinnate (five foliola) fi infimum earum jugum, triphyllum verius, & juam iterato pinnaturr[^] demas, fimpliciffimis, oblongo-obovatae, planae, breviter petiohtte, apicem verfus profundius, aut brevius triloba, lobulis obtufis, rotundatis, integerrimis. Solent tamen foliola iupremi pinnarum jugi effe interdum integerrima[^] nullis incila lobis. Color tam pinnarum[^] quam petiorum, & axis earumdem communis, feaporumque, verbo, plants totius, € viridi glaucescens. Villus nufpam ullus[^] fed nee pubes; omnia glabra, Isviffimaque. Petiolus five axis pinnarum communis, fuperne planus, fubtus teretiufculus, fubtUiffimeque fbriatus[^] bafin verfus membranaceo-vagi-

ma feu pauciflora; qua absque omni dubio Salix retula Lmnsi est; plurimum a Fufca, diverfa.

CXCIII

FUNLARIA ACAULIS,

Funiari3 fcapis nudis foliorum longitudine; foliis pinnatis, pinrris trilobij.

Tergelli dum nuper perquirendis vacarem plantis, quas pars ea Carnice quondam *Auftrahs* profert elegantiffimas; attulit prasclariffimus Vordoni, Sebenicenfis quondam *Phyficus*, in paucis diligētibus, conatuumque meorum fautor egregius, & hanc quoque cum infequente plures inter alias firpem, in eo Adriatici maris Littorali leftam. Annuæ ejus radix, fat gracilis, fibrillis nixa fparfis, Scalbida; copiofilUma uno d? capite protert folia,, tenera, tres circiter alta pollices, longo, gracilique fulta petiolo; apicem præcife verfus pinnata, jugis pinnarum tribus, cum impare. Pinnulæ (five foliola) fi infimum earum jii gom, triphyllum verius, <i)am iterato pinnatumj demas, fimplicilfiKije, oblongo-obovatae, plans, breviter petio- Ltje, apicem verfus profundius, aut brevius trilobs, lobtilis obtufis, FO- tundatis, integerrimis. Solent tamen foiiola iupremi pinnarum jugi effe interdum integerrima, nullis incifa lobis. Color tam pinnarum, quam petio- loni'm, & axis earumdem communis, feaporuinque, verbo, plants totius, c viridi glaucefens. Villus nufpiam ullus, fed nee pubes; omnia glabra^ laeviffimaque. Petiolus five axis pinnarum communis, fuperne planus, fub- tus teretiufculus, fubtiliffimeque fbiatus, bafia verfus membranaceo-vagi-

orbiculato-compressum, flavum, Siliqua linearis, unilocularis* bivalvis, polyperma.

CXCIV.

HYPECOUM UTTORALE.

Hypecoum filiquis articulatis, compressis, arcuatis; petalis integris; exterijmbus longioribus, lineari-fpatulatis.

Habitat in fabulosis aridis, ejusdetn Littoralis. Radix annua, simplex, filiformis, teretiufcula, gracilis, fil vixdum emporetici crassitudine, bipollicaris, albida, fibrillis capillaribus rariter adfperfa. Folia ex eaperquam multa, fcapique florigeri itidem plures, ex decubitu velut erefli, foliis duplo altiores radicalibus. Ea folia, foliorum Umbelliferae cujusdam asmula, etfi bipinnata credi poflint, nequaquam tamen vere ejusmodi sunt; raeliore jure alterne laxeque bipinnata dixeris. Stipula fcilicet fubmemftanacea, friata, virens, oblongo-ovalis, fublanceolata, in axem continuo abit 'bi-& tripollicarem, feiniteretiufculum, friatum, tertiam lines partem crassum, faturate virentem, pube tamen incana pro^:rata,& dejnum cadiva, adfperfum. Huic communi velut petiolo, ad pollicis circiter a bad distantiam, pinnae utrinque appenduntur & ipfae rursus laxe, alterneque pinnat«, foliolls angustis, oblongis, lanceolatis, sub aut vere breviter peiolatis, pinnatifide incisis feu & ferrato-dentatis, faturate viridibus, pube procumbente incana adfperfts. Hac inter radicis folia, erefto-potentia, fcapi florigeri tres, quatuorve ex decubitu eriguntur graciles ad pollicum quinque altitudinem; tertiam non nisi lines partem crassi; teretes, friati, graminei viroris, pube tamen prostrata, demum cadiva adfperfi cahescente; om-

nino aphylli. Flores terminates, umbellati; umbellis pauperrimis; plerumque proliferis* Terminatur videlicet scapus floribus 9, raro simplicibus & unifloris; plerumque tribus > quatuorve eodem ex punto egredientibus, longiuscule pedicellatis, pedicello uno alterove, ut plurimum iterum subumbellifero, feu tamquam ex umbella bifloro* Involucrum umbellan^v ^ ^ ut in Anemonibus fieri alTolet[^] foliaceum 9, foliolis tribus quatuorve velut bad connatis, csteruin pinnatis 7 pinnulis unius, aut duorum jugorum cum impare, simplicibus, lineari-lanceolatis, integris, angustiflomis. Numquam vero involucrum ejusmodi, majus aut minus, abest, ubi demum cunque flores, ctfi unus, alterve tantum, exoriuntur; ac praeterea flos quisque, paulo infra calycem, proprio fuo 9, etfi admodum exiguo, foliaceorum denticulorum aliquot, infruitur involucello. Flores ere[^] i; quisque brevius aut longius pedicellatus* Calyx diphyllus; foliolis oblengo-ovMibus, five & ovato-lanceolatis, ex virore subflavicatibus, subtriatis[^] apice brevissime subtrifid^s 9, deciduis. Corolla tetrapetala, erefto-patens; petalis lineari-fpatulatis integerrimis, binis exterioribus oppofitis[^] longioribus, apice subcochleariformibus, concavis, dorfo proftrato-pubescentibus, flavis: binis interioribus, calycis duntaxat longitudine, & ipfis oppofitis, fed lanceolatis, ftriatis, flavis* Staminia quatuor erefta, calycis longitudine; filamentis albis; antheris oblongis[^] eompreffis, flavis* Germen cylindraceum, nudum; styli duo, breves, luteoli, reflexi. Stigmata simplicia. Siliqua longa, flet[^] leti-[^] ompreffa, arcuata, articulato-polythalamia, loculis tetragonis, diaphragmate tranverso interruptis, monolpermis; feminibus globofo-compreffis* Ab Hypecoo itaque procumbente Linnsei, ftruttura potiffimum petalorum, diver (um.

CXCIV.

SPERGULA LARICINA*

Spargula foliis oppositis, fubulatis, vifcido-villofis , ciliatisque"; axillaribus fasciculatis.

Spargula foliis oppositis fubulatis ciliatis fasciculatis. *Linn. fp. plant, p. 631. num. 4. Gmelin. fiou Jibir* torn. 4, p. 15\$. num. 6u fub nomine* Alfine,

Raram plantam iteratis vicibus inveni copiofiffimam fub **Arce** Eberftein, prope domum Pellionis ad rivulum ? an torrentem ? Wietingerbäch, diftum etiam Grofsbach , ad pedem alpis Saualpe; toto Julio. Eodem item tempore, & {erius quoque prope & fub Ponte Ifohe ad Leontium. Eft vero tota faturate gramineo-viridis, vifcida, & villulis exftantibus, demum cadivis, undique adfperfa^ • Radix fufiformis, gracilis, alba, fasciculis oppofitis brevium radicularum fibrillofarum obfita, ut adeo, fi qua alia, haec certe maxime planta, probet , radicem fub terra effe fpeciem plants fupra terram. Ejus e capite integer caulium plurimorum fascis, aut & cepes emmittitur, bafi procumbentium, inde ad fpitham^e_f 8fc>amplius altitudinem ereftorum, apicem verfus per tres, quatuorve aut quinque dichotomias ramoforum , pedunculo dichotomiarum fimlice lftngo unifloro, primum erefto, turn anthesi perafta deflexo, & pendulo^ Caules ipfi caetera teretes vifcidi & villofi, longiu(culis, & pluribus inferne articulis geniculati, geniculis articulorum nodofis* Folia ad genicula articulorum tantum, non verticillata, fed oppofita* Horum ex axillis fasciculi praeterea foliorum a decem ad quindecim utrinque, longitudine inaequa* lium.

lium, tereti-fubulorum, ftria fubtus longitudinali exaratorum, nitentium, vifcido-villoforum, ciliatorumque, ut ut villuli hi exftantes magna demum parte fe perdant. Flores, utinnui, ex iteratis fuperne dichotomiis, longiufcule pedunculati, pedunculis defloratis cernuis.. Calyx pentaphyllus, foliolis ovato-acutis, concavis, dorfo vifcido-villufulis, patentibus, p«r« fiftentibus. Corolla nivea, peijtapetala; petalis ovatis, integerrimis, patentibus, calyce tantillo majoribus, deciding Stamina decem, alternis brevioribus filamentis fubulatis, alb is, corolla brevioribus. Antherae flavae* Germen globofum. Styli quinque,ftigmatibus fimplicibus, Capfula ovata, unilocularis, quinquevalvis, polyfperma.

CXCVL

AGRIMONIA AGRIMONOIDES.

Agjrimonia foliis caulinis ternatis, floribus fubo&andris; fruflibirs glabris.

Agrimonia foliis catilinis ternatis, fruftibus glabris*. *Linn. Jp. pi. p. 643.*

num. 3, Scopol fior. earn. 2. torn i.p. 331* num. 568.*

Agrimonoides. *Column, ephrafi p. 145, tab. 144^*

Agrimonoides femine glabro. *Barrelier. ic. 6iz.*

Crefcit abtmde, exeunte Majo florens, in fylvofo monte Singerbwg prope Ebenau, *aufder Watzkersdorfer Seite*, loco umbrofo, humente, a4 declives foflās fubftagnantis aquas; turn fecus viam in altioribus; etiam in Carnrolas fylvis fat frequens, flore inodoro, fed foliis Geranium Rober-tianum redolentibus. Radix horizontalis perennis, fat longa, aut etiam pro foli ratione refta, bwchiata femper, radiculisque fibrillata, extus dilute rubella, alba intus, leotum cknique is lignum abien?, Ijus e capite ra-

rius unicus modo, plerumque pligres egrediuntur caules, bafi primum decumbentes, fed ere&i denique, dimidiam circiter alti fpithamam; magnam inter copiam radicalium foliorum, quaaaverfum per terram ftratorum, duplicato-lyrato-pinnatoJtm; jugis pinnarum duobus, tribus, quatuorve cum iBAjYre* Pinnae rotundato-ovatas, feffiles, ferratae, utrinque villofae, y exteriores filceffive majores, extimae tres maximae, nee interflin&ae pinnulis acceffibriis minoribus, uti reliqua juga; eorundem communis petiolus, five axis, bafin verfus fanguineo - rubens, canali fupra excifus, molli undique hirfutus villo.. Caulis teres^ villofus, primum bafi, turn fere totus e viridi plus minus rubens, alternis ex axillis ramofus, gracilis^ debilis, foliis parce, nee fere alibi, quam fub ramorum florumve exortu occurrentibus, onuftus, iisque bsevi villofoque ex petiolo ternatis; radicalium cetera fimilibus* Stipulae petiolorum bafin vallantes, ovato-acuta?^ integra?, villofa?^ Flores in caule, ramisque terminates^ duo, tres, quatuorve, non uti in *Agt. Eupatoria*, fpicati* corymbulum fere verius formantes, finguli pedunculati; pedunculis gracillimis, villofis, una alterave bra&eola, fitu fub flore alterno, -ovato-c»terum acuta, Integra, villofa & feffili inffruftis, apice uni* floris. Calyx duplex, quos inter germen medium feffile; hie periearpium inffar germen recipiens, ille idem coro'nans* Inferior eorum major, tubulolodentatus dentibus a ieptem ad decem profunde & inaequaliter incifus, extus ftriatus, villofusque, de reliquo ereftus, liber, germinealtior, tandem patentiffimus, includens primum tubulofa fua in bafi germen oblongo-ovatum, fericeo - pubefcens, dum decalvetur denique, coronatum apice calyculo mincy^ fupero, quinquepartito, lacinulis corolla brevioribus, ovato-acutis, aequalibus, glabris, patentibus, anthesique finita fuffum de novo conniventibus, & perfiftentibus. Corolla faturate flava, magnitudine floruui *Agr. Eupatoris*, nifi & m&ajor; eaque pentapetala'petalis rotundato-

obovatis, apice emarginatis, basi in exiguum velut unguiculum decurrentibus, calyculo proprio majoribus, patentifloris, caducis. Stamina sex, septem, aut octo, nec plura, corollis paulo breviora; filamentis flavis; antheris didymis, faturatis flavis. Styli duo ex geminis umbilico, faminum altitudine, albi. Stigmata subcapitata, albida. Fructus libere in inferiore calyce sessilis, ex ampullacea basi oblongo-ovatus, collo frangulato, vere lagenarius, glaber, calyculo superiore permanente, & connivente coronatus, bipartibilis. Semina oblongo-ovata, nuda.

CXCIV

VIACA MAJOR*

Vinca caulibus erectis; foliis petiolatis, obtuse subcordato-ovatis, tomentosis, margine piloso-ciliatis; segmentis calycinis elongatis, angustis, per oras ciliatis.

Vinca caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedunculatis* *Linn. fp. p. 304. num. 2+*

Clematis daphnoides major. *Dodon. pemptu p. 406**

Pervinca caulibus erectis, foliis ovato-lanceolatis, ciliatis, petiolis unifloris^ *Haller. hist. helv. torn. x. p. 246. num. 573**

Pervinca major# *Scop. flor. corn. 2. torn. i. p. 170. num. 274. Allion, fl. ped. tom. i. p. 101. num. 370.*

Frequens Goritidis; floretque exeunte Martio, & Aprili, Via Vienne (alle jirade nuove) ad finitram illico extra Urbem sub iepibus in Dumetis, haud procul, ab ingenti arbore, Pruno Laurocrafo JL Turn &c confimi-

fimilibus locis prope Salcanum. Radix viticulis repens fibrosis, caulem unum, (aut plures) educit, non prostratum aut serpente, sed erectum, spithamalem, teretiufculum, nudum, glabrum foliis per intervalla oppositis oblitum, Ea folia longiufculo infident petiolo basi & per ora ciliato-piloso; suntque obtuse, & velut ex subcordata basi, oblongo-ovata, integerrima, mollia, faturate & obscure viridia, absque nitore, ex pube exigua decumbente velut tomentofula, etfi & hac exuantur denique, attamen cistis pilosis stipatiffimis marginalibus, & costis dorsalis mediae, nunquam spolianda, Flores ex alterna petioli axilla folitarii, simpliciter, longe pedunculati; pedunculo terete, glabro, petiolum altitudine bis terque excedente. Calyx profundissime quinquepartitus, erectus; segmentis anguliflis, lineari-lanceolatis, dorso longitudinaliter carinatis longitudine tubi corollae, oris marginum, & carina dorfi, ciliato-villosis. Corolla monopetala, hypocrateriformis, coloris faturate violacei, magna: tubo cylindraceo-turbinato, limbo quinque faturationibus, ex angulis faucis subrotundo-pentagonis, percurfo, & interne albido-villoso. Faux coronata membranula humili exstante subrotundo-pentagona* Limbus patentiffimus, quinquepartitus segmentis oblongo-obovatis, oblique truncatis, repandis* Stamina quinque, breviffima, interno tubi parieti sub fauce, in parte ejusdem media, albo-villofa, adnata, faturate flava, introrsum flexa, rursus retroflexa, basi albo-villofa. Anthers ovatae, compressae, dilute flavicantes, margine utroque polliniferae. Germina reipfa duo contigua, mutuo se contingentia, five folles totidem ovati, nudi, in unum Stylum cylindraceum, staminum longitudine, abeuntia. Stigmata itidem duo, uno alteri infiderrite; inferius, stylum terminans, orbiculatum, planum, superius capitatum concavum, albo-villosum. Nedaria? aut elaftra? verbo: corpora duo subphxroidico-ovata opposita, adfita extus basi uniuicujusque germinis,

& coercentia velut capsulas folliculares, elongatas, uniloculares, polypermas, longitudinaliter dehifcentes*

Frustra Gerardus Fl. gallopr. p. 326. cum Vinca minore L. conjungit, tot notis specificis constantibus, distinctam.

CXCVIII

LYCOPODIUM ALPINUM.

Lycopodium foliis quadrifariam imbricatis, acutis; furculis erectis, teretibus, multiplicato-dichotomis; spicis terminalibus, teretibus, ipsius cum furculis, continuis.

Lycopodium foliis quadrifariam imbricatis, acutis; furculis erectis, dichotomis; spicis feffilibus, teretibus Linn. Jfy.pl p. 1567. num. 15. Gunner, flor. nory* torn* i.p, 89* num. 27 a. Allion. flor. ped. torn. a. p. 291. num. 2425, Weiff* crypt, p. 275. Oeder. flor. dm. tab, 79**

*Lycopodium fabinae facie. DUlen. musc. tab. 58. fig. *.*

Lycopodium spicis feffilibus, foliis lanceolatis, adpressis, utrinque ternatis. Holler, hift.ftirp heh. torn. 3. p. 21. num. 1719,*

Habitat in alpibus Reichenavienfibus supra (anftum Laurentium, aliisque. Caulis farmenti adinfar prostratus, longe rependo protensus, lentisque per intervalla radiculis fibrosis demiffis radicans* furculos, per intervalia itidem viciniora aut laxius fparfa, erigit, ad duos tresve pollices, multiplicato-dichotomos, brevium adinfar fasciculorum ramofiffimura. Ii furculi perinde, ac caulis ipse, teretes, exfucci, lenti, glabri, niten-

nitentesque, coloris sunt viridis > in flavedinem quamdam cum tempore emorientis; quadrifariam imbricati squamulis, five foliis lanceolatoaciformibus adpressis; facie Juniperi fabinae, Ramuli dichotomiarum non ejusdem omnes longitudinis, five verius altitudinis; in brevioribus, squamulae foliaceae stipitate magis addensatae; laxius, quadrifaria tamen semper ferie[^] in longioribus, cauleque ipso, sunt ordinatae. Spicae floriferae terminales, simplicissimae, extremis furculorum dichotomiae (non equidem omnibus, pluribus tamen semper) continuae, adeoque fertiles, nulloque peculiari pedunculo, a reliquo ramulo distincto infidentes; breves, obsoetae, (urculis duplo crassiores) forma clavae oblongo - ovatae; squamis & haec foliaceis, erecto - patentibus imbricatae sunt, at duplo iis furculorum, majoribus, ex ovata basi, longiuscule acuminatis, 5c, ni fallar, fenaria ferie. Quod Weiffius cum Hallero, margine ciliatas adnotarunt; minime observavi; integerimas mihi dum actu florerent, microscopium exhibuit; sed neque ciliatas, denticulatasve pinxerunt. (Linnaeus, Dillenius, Oederus. Earum in axilla, obtuse cordiformis, & flava, confidet anthera dicam? an capsula? bivalvis, pollinis flavi inflammabilis plenissima.

CXCIX.

BUXBAUMIA APHYLLA,

Buxbaumia aphylla, clavato - mucronato₄

*Buxbaumia aphylla** Linn, *fp.pl.* p. 1570. num. 1. Leers, *for. herb.* p. 24\$. num. 837. Gunner, *flor. uerv. torn.* 2. p. 58* num. 571. Allion, *flor.* ped, torn,* 2. p. 292. num. 2452. Oeder, *flor. dan. tab,* 44.

Anthocerus capilteceus aphyllus, capitulo crasso, bivalvi. *Dillen. rnufe. tab. 68* fig* 5-*

Buxbaumia caulefcens aphylla, *Haller. hift. JIirp. helv. torn. 3, p. 25, num. 1728.*

Frequens in fylvis prope Clagenfurtum, in monte Calvariae, prope Kefsin &c. pi erumque fub pino fylveftri, folo umbroio, humido, atro, nmfcos, aciculasque abietum inter; ftipitibus aggregatis, clavis omnibus, totius ftrati, unam conitanter, eandemque plagam refpicientibus. Mirum prorfus vegetabile! cepitofe locis diftis proveniens. Scapus femipollicatis, aut & ofto lineas altus, normaliter ereftus, teres, nudus, fitulofus, diametri vix tertiae lines partis; primum virens; fed mox obfcure ruber, & coriaceus, lentus, denique durus; radicis loco, bulbillo oblongo-ovato, duro, lanugine filofa capillacea fubreticulata, obvoluto, infiflens; apice mucronato-clavatus eft; terminatus fcilicet anl^a ovata, eretta, operculo obtufiukule conico, obtefta; viridi, tranfpacente# Fugaciffimani calyptram, ut ut diligentiffime quafierim, videre mihi contigit nondum; niſi quidem ea fit: corpusculum coriaceum obfcure rubrum, exftinftorii forma, conicum, inane intus, ora marginis bafeos brevillime ciliata? quod in terra, a reliquis avulfum partibus, inveni una modo vice. Suipicionem, ne operculum ipfum id credam, auget, quod operculum pertinaciffime femper inferiori antherae valvulae adhasrere, nee ab eadem unquadi avelli, haftenus viderim; fed hsc, Schmideli, Milleri, Fabriciique deftitutus operibus, ex quibus major mihi lux affulgeat, porro haud perfequar. Interim, quae primum ovata, erefta, & una cum operculo viridis, fubdiaphanaque fuerat anthera, fcapo jam rubro exiftente; inclinari ad fcapum demum incipit obtufo feu fcalaeno fub angulo, formam oblongo-elliptoidicam, fu-

pra, magisque fubtus adhuc, convexam, affumendo; operculi contra conflulus & ipfe turn parumper, fed in contrariam fuperioremque anthera inclinatur partem faturate ruber faftus. Serius adhuc peripherialis anthera margo, fed tamen & ipfe rubefcit tandem totus; poftrema, quae obfcure rubro tingatur colore, "anthera ipfa eft, five verius inferior duntaxat eiusdem valvula; cum /quae fuperne polliniferum obtegit faccum, numquam non vi-reat Haec de diverfo anthera, in diverfa aetate, colore. Ad ftrufturam ejusdem quod attinet, ea oblongo - ovalis, feu elliptoidica, utrinque convexa eft, unilocularis, bivalvis, valvulis fubaequalibus; fuperiore tantillo minore, membranacea, decidua; inferiore magis coriacea, ultra luperiorem tantillo exftante, in fcapo, una cum* operculo, permanente^ Binas has intra valvulas, feminibus foetus occultitur faccus, valvulis pene aequalis, membranaceus, & ipfe quoque elliptoidicus^ virens, extus filamentis, plusquam capillaribus, aquofe e viridi albentibus, & ex interiore operculi annulo ciliato defluentibus, involutus; qui maturo feminali polline dirumpitur, excidit, & deperit Operculum obtufe conicum, inferne (ub apifl annulo elevato & ciliato inftru&ufti, Otula in faccum anthers defcendente^ & fubintrante.

CC

PHASCUM MUTICUM.

Phaidum acaule, bulbiforme, foliis ovatis, muticis, concavo - conniventibus, antheram occultentibus. *Schreber. dephafco.p. 8^ num. 4. tab. i. fg. ii. & iz. Item Jpicil. Hpfp. 72, num. 779,*

Sphag-

Sphagnum acaule bulbiforme minus. *Dillen. musc. tab. 32. fig. 12.* Linnaeus, Weiffius, Leerius, Allionius pro infrequentis *Cuspidatarieta** te habent.

Ad agrorum margines in terra frequens primo vere. Bulbilli acaules, fHpatissime aggregati, ovati, obtusi, unam, aut & femialteram lineatn **alti**, erefti, intra terram fibrillis radicati exiguis albidis, conrtantes foliolis ovatis, muticis, furfum imbricatis, concavo - conniventibus, fubdiaphanis, tenerrime (fi contra lucem afpiciantur) reticulatis, antheram, five capfulam fphaeroidicam, unilocularem, univalvetn, polliniferam, imperviam, ofculi, operculique expertem, breviffime pedunculatam, apice cuspidula cxigua terminatam, primum viridem, turn rufam, poflremo fufcain, eorum in fundo nidulantem, occultentibus. Calyptra membranacea, hyalina, primum *cornea*, turn a bafi furfum verfus, uno latere fiffa, cuspidi capfuls, brevicula fua acu, aliquo hsrens tempore, dum[^]cadiva, denique evanefcat.

CCL

PHASCUM CUSPIDATOM.

Phafcum caule fimplici ereclo, foliis lanceolatis, acuminatis; inferioribus eredo-patentibus, fummis conniventibus, «antheram occultentibus»*

Phafcum acaulon, anthera feffili, foliis ovato - acutis, conniventibus. *tinn.fp. plant, p. 1570. num. 1. Weitf_x crypt, p. 266. Leers, flor. herb., p. 228. num. 807. Allion, flor. ped, torn. 2. p. 292. num. 2430. Oedeu flor. dan. tab. 249. fig. 3.*

Phascum cuspidatum caulefcens, foliis ovatis cuspidatis patulis, fummis erectis conniventibus* *Schreber. de pha/l p. 8- rtum. 3. tab. i.fig. 1. £*
Item *Jpicil. lipf. p. 72. www. 780.*

•*Sphagnum acaule bulbiforme, majus** *DUIen. mufc.tab. 32.fig. 11.*

*Mufcus trichodes • acaulos minor latifolius. Vaillant. hot. parts tab. \$7**
fig⁻²-

Sphagnum acaulon, foliis ovato-lanceolatis, pilo ariftatis. Haller. hijl. Jlipr.helv torn. 3. p. 24. num. 1726. hue pertinet: nam Haller fepius folia in acumen terminata, pilo dicere folet ariftata.*

Minime rarum fub Ziguln, & infra montem Calvariae in aggeribus, argillacea terra obduftis* Cefpites cauliculi fimpliciuni. Cauliculi duas, tresve lineas alti, intra terrain parte aliqua defoll, ut vere acaules credas; foliis obfiti feffilibus, lurfum imbricatis, lanceolatis, in acumen, nee verum pilum, produftis, dilute viridibus, contra lucem velut reticulatis, fubtus longitudinaliter carinatis; inferioribus apertae inftar rofae eiffro-patentibus, fuperne concavi*; fummis aliquantum longioribus, in bulbum oblongo-ovatum conniventibus, antheram, five capfulam terminalem, in eoruni fundo nidulantem occultentibus. Anthera a fubfeffilis breviffime pedicellata, fubglobofa, ovatave cum exiguo acumitie, ex viridi tandem fufca, unilocularis, univalvis, absque ofculi operculive veftigio* Calyptra conica, membranacea, acu brevi terminata, demum ab imo furfum fiffa, & decidens.

CCH.

PHASCUM PILIFERUM.

Phascum caule simplice erecto, foliis lanceolatis, longe piliferis, sursum imbricatis, erecto-patentibus.

Phascum caulescens foliis oblongis apice piliferis *etc&is*. Schreber. de phaf. j>, 8. ram, a. tab, i. fig, 6. 7. 8. 9< 10.

Clagenfurti perquam copiosum illico post nivis deliquium Martio, & Aprili in colliculis montis Calvariae, circa Kefslin, alibi in terra argillosa, una cum Riccia glauca &c> Hutnillimos & hoc quoque format cepitulos, fat late per se patentibus, holoserid adinstar gramineo-virides; cauliculis adeo interdum copiose addensatis, ut in convexos protuberent pulvillos. Cauliculi hi simplices^ duarum triumve linearum, intra terram fere penitus confepulti % apicibus duntaxat exstantes, ut sessiles & acaules diceret rofulas erecto-patentes. Radiculis-haerent fibrillosis, %a-pillaribus, compositis, undique difcurrentibus, albidis; suntque erecti, filiformes, teretes, ex viridi tandem non nihil rubentes, foliis undique obfati lanceolatis, integerrimis, viridibus, subdiaphanis, dorso longitudinaliter carinatis, sessilibus, erectis, sursum imbricatis, atque apice longum in pilum dilute virescentem abeuntibus. Terminantur Anthera subglobosa, brevissime in vertice cuspidata, ceterum integerrima, impervia, absque vestigio aperture ofcularis, nedum operculi ullius; vere imiloculari, univalvi, nuda, primuro viridi, fusca demum &%itente; brevissime pedunculata, seu subfelli, libere spatiosaque nidulante ipso in fundo supremo-
rum cauliculi foliorum, in rofulam tandem explicatam patientiura. Calyp-
tra

tra exigua, hyalina, antheram primum totam involvens, in acum longiufcu^ lam fubtruncatam abiens, tum maturefcence anthera five capful*, longitudinaliter dehifcens; cupidi anthers numquam decidus, diu inhaerens, dum denique decidat, & evanefcat

CCIII

PHASCUM SUBULATUM.

Phafcum caule firmplice erefto, inferne niadiufculo, foliis fuperne fubulato-fetaceis patulis obfito; anthera terminali nuda.

JPhafcum acaule, anthera feffili, foliis fubulato - fetaceis , patulis. *hinru /p. plant, p. 1570. num* 2* Leers, ftor. herb. l?• 228. num. 808. Oeder* flor. dan; tab. 249. fig. i₄ 2. Weijff. crypt, p* 268- AUion.flor. ped.tom^ 2, a. 292. num. 2431#*

Phafcum caulefcens, foliis lanceolate-linearibus, patulis- *Schreber. phaf. p: %..num. 1. Item fpicil hpf. p.yi. num. *ffi**

Sphagnum acaulon trichodes, *Dilldu. mufc. tab* 32* Jig. 10; Holler, hift. JUrps* helv. torn. \$+p. 25. num. 1727.*

Mufcus trichodes minor acaulis, capillaceis foliis* *Vaillant. bot. parif. tab. 29. fig> 4**

In viarum cavarum lateribus argillofis nusquam non , per omnes fylvas montofas Clagenfurto vicinas; tum in aggeribus muralibus lirao infratis, Yittoriae, prope KefsKn., fub monte Calvariae, in *Schmalzbergl* , etiam ad margines declives agrorum, menfe Aprili ubiWs* Hoc reliqua inter , maximum fegetes format ampliffimas cauliculorura quinque, fex> feptemve

linearium, simplicium et plurimum, tamen & non numquam ramorum etiam; sunt in erectis, basi nudiusculi, caeterum undique foliis obferti perquam dense, subulato-fetaceis, laete virentibus, erecto-patentissimis. Anthera subglobosa, viridis, nuda, brevissime pedicellata, & cuspidata in vertice donata perquam exigua, spatiosissime in cauliculi apice nidulatur inter extantia undique, patulaeque folia, nusquam occultat; hasretque apici cuspidatae ejusdem, aliquo Calyptra membranacea subtilissima albido-hyalina tempore, dum tandem evanescat denique. Capsula, eadem quae & anthera, nilnisi colore, & maturis interne mutata feminibus, estque faturate flavoviridis, vix & brunea, nitens; ut congenerum, unilocularis, univalvis, impervia, okulo, percipuloque, detrita. Initio Junii, cum maturae jam capsulae a cauliculis, integras ut sunt, excusculis suis, per terram quaquaversum sparge cernuntur, credas iolum id omne femine Panici italic! (cui capsulae hae demta magnitudine limillims) studiose confutum fuisse. Plurimas earumdem microscopio iterum examinavi iterumque, numquam, qua feminalem effundere possint pollinem, detegere potui aperturam: ut adeo putredine duntaxat corrumpi necesse sit earumdem corticem, ut prolem femina propagare valeant.

CCIV.

BRYUM PHASCOIDES.

Bryum acaule, anthera oblongo-ovata, inter folia ovato-lanceolata, & fetigera, subeffili.

Sphagnum feffile, foliis radicalibus obtusis, centralibus ciliatis. *Hatter hijl Jiirp. helv. torn. 3. p. 24. num. 1725. tab. 4.6. fig. %.* Item in *apusc. p. 373* num. \$?. tab. %.*

Sphag-

^Sphagnum acaulon maximum, foliis hi centro ciliaribus, *Dillen, wife, tab.*

3²* *fig- 13-*

Phafci fubulati varietas! *Oedenflor. dan. tab. 249* fig. fuprema.*

Non habet elegantiffimam plantulam Linnaeus. Primus ejusdem inventor Hallerus, in opufculis fuis, cum eleganti icone vulgavit, fub Spha^{*}gni acaulis maximi, foliis in centro ciliaribus, nomine; neque tam en calyptrae, ofculive meminerat. Dillenio fubinde transmittit, qui inventoris retinuit nomen* Sub generali deinceps Muici Mullerus; Schinidelius contra fub Buxbaumiae; noviffime denique lub Phafci Oederus nomine, propo^{*} iuerunt* Ego jam annis labentis faeculi /ecundo & tertio (upra feptuagefimum, frequentem omnino & in Vi&orienfibus fylvis fub Julii finem, Auguftoque laete florentem, & Clagenfurti iterum, in fylvis folo argillofo, retro montem Calvarije poll: nivis deliquium, inveneram, attamen una cum Calyptra, ofculique marginati ciliis. Quid facerem? cui, praee reliquis, adfociarem generi? Phafci omnino externam videbam faciem; at minime naturanu Xapfula certe ofculo hians! peftinato - ciliata ! operculo caduco inftruffa! nonne fatis a Phafci remonent genere, cui Capiula ofculi expers? Proprio ieminum facco, cum Buxbaumia convenit; at facie, ftrLi&fluraque tota., hiante ofculo &c. plurimum item difconvenit! A Fontinalibus, nati- v itatis removet locus &c. perinde ac cilia aperturas ofcularis, ab imberbi- bus Sphagnis; ut adeo, nifi peculiare, novumque conderipi genus, quod mea vius noiim autoritate, meliore nefciam reponere loco, quam Brya inter, Apocarpo proximum. Cauliculi fiuplices, folitarii, aut aggregati, erefti, trium quatuorve linearum altitudine, terra? ita denierfi, ut plantu- lam acaulon dicas, foliis undique cinfti, radiculis capiulari - fibrillofis albi- dis haerentes. Folia duplicis generis j exteriora, eaque fimul inferiora,

duplo interioribus breviora, laete viridia, lineari - canaliculata, angustata[^] fine obtuso, in rofulam apertam patentia* Interiora feffilia, ovato - lanceolata, apice longe fetigera, dorso carinata, aquose virentia, f emidiaphana[^] erefta, demum eretto - patentia. Anthera terminalis₃ profundissime nido foliorum circumftantium & obvallantium immerfa, breviffimo fuper pedicello fubfeffilis, magna, oblongo - ovata, nuda, primum viridis, tum dilute rufa, opaca, ofculo circulari; coronata margine annulari elevato craffiore, intra quernpeffen membranaceus albidus in conum truncatum lacero-ciliatum attoUitur, facco pollinifero, & ipfo ovato, antherae ineluso. Operculiftn elongato - conicum, acuminatum, fubincurvum, viride. Calyptra rufa, diaphana, conica, ba(i integerrima[^]_x apice in ietam incurvam terminata, dimidium prsciie operculum ambiens, demum una cum operculo decidens Foliorum exteriorum in rofulam patentium_y nonnulla bifida trifidave fimpll - cibus mixta.

CCV,

BRYUM SPHAGNOIDES,

Bryum antheris fubfeffilibus, ovatis, terminalibus, lateralibusque, ofculo imberbibus, calyptra fugaci minima.

Sphagnum nodofem hirtutum & incanum. *Bitten, mu/c. tab. \$s.fg. \$.*

Mucus iaxatilis tortuosus & noctosus. *Vailknt. bot.parif. tab, 2j.fg. 18.*

Hypnum eaulibus teretibus ramosis, foliis ovato - lanceolatis₅ pilo ariftatis;

©perculo coriico, *Hdler. hi/LJtirp. hey: torn, 3. p, 40. num. 179.2.*

Et

Et haec quoque ex *iis* est plantula, quae, *vti* mox di&a, plurimūtn botanicos difcrutiare valeat; dubios, cui aptiffime adgregent generi? aut pro novo proponant? hoc tamen non obftante, Linnaeus, & cum eo Gunnerus, Scopolius, Leerfius, nee non &c Weiffius, mera pro Varietate Bryi Apocarpi, reclamantibus ipia cum natura, Dillenio, Hallero, Vaillantioque, propofuerunt Mihi, ut verum fatear, dubitatum de eo erat numquam, ane ab Apocarpo differret, quocum conjungi numquam poffe videbam# Anxius unice hsrebam, & vel modo adhucdum fum, ad quod potiffimum genus relegem? cum nova, inconfultis aliis Eruditis, condere genera, propria non aufim autoritate; Sphagnam cum Dillenio femper difturus, *d* calyptra (quam femper habet) careret. Hac forfan de cauta, Hypnum effe voluit Hallerus? cujus caractere nihilominus in Linnaei fyftemate perinde, ac Bryi deftituitur^ Et tamen dicendum eft aliquid; Bryum efto igitur; quocum habitu faltem; externaque facie fimilitudinem, quam cum Hypnis, maior«m habet, Plurimum id per omnes, qua ultra terram exftant, rupes vifitur tam Vi&orientibus in fylvis, quam in iis, *qux* Clagenfurto non longe diftant fupra infraque montem Calvarie; ad Kefslin, Zinguln, *Schmalzbergl*. In arboribus etiam ipfis fylveftribus, minore tamen in copia. Caules illi altiores, magisque ramofi, quam vulgo Bryo Apocarpo L, ramis etiam magis plerumque, quam in ifto diffufis. Nodosos cum Dillenck) jure dixit Vaillantius, & funium quoque more (dura ficci fiint) teretes intortosque, qui in Apocarpo recti, aequabilesque nunquam non funt, nodulis lateralibus interftinfti nullis. Sed enim neque capfiMs in Apocarpo, prater terminales, videas ad caulium, ramorumque latera feffiles umquam, qua intra laterales confepultae gemmas, nodulos illos in Bryo efficiunt fphagnoide. Foliis ii caules undique, & ftipate obfti funt non atro-virentibus^ dilute imo, & Iste viridibus, ovato-lanceolatis, concavis, api-

ce pilo elongato & niveo terminatis, in humore furfum imbricatis, & *cxpe-*to - patentibus; per ficcitatem in caulem decumbentibus, eumque & ramos involventibus, ut teretem intortamque *its* concilient faciem aquoie virentibus, niveaque turn undique adfperfis lanugine, ex qua eniinus jam agnofcas illico; cum cefpites contra Apocarpi nigrefcant. Dixi antheras in-Apocarpo terminates prsecife effe, & quidem faturate rubentes, cylindraceas, ora ofculi ciliis paleaceis coronata; fubfphaeroidicae contra *ex* funt, exiguo infiftantes ped[^]pello (nifi fetulam dicere malis) quæ non ad apicem modo caulium ramorumque, fed ad latera quoque in Bryo iphagnoide undique nodoferum inflar gemmarum cbnfpiciuntur. Rubras eas vidi numquam, fed e viridibus, quales primum erant, faturate demum per maturitatem pale[^]ceas; apertura ofculi Orangulata tantifper, integerrima, circilari, laevi, nee ullis coronata ciliis; fed operculo tefta fubhemifphaerico, brevi cum cufpidula in vertice; cui exigua, nee tamen diu, tenerrimaque heret calyptra membranacea, hyalino - fubflavescens. Confepultae veluti funt anthers ha? tales, inter exiftantia undique & erefto-potentia gemmarum folia, non tamen proprie, tamquam innido, feffiles; fuæ quaevis, ut innui, infiftit fetæ admodum breviculae, nee bafi bulbiferas, nee perichaetio, a gemmarum foliis diftincto > involuta?.

CCVL

BRYUM RE[^]URVUM.


Bryum antheris ereftis, lateralibus, furculo brevioribus; foliis fetaceis fecundis falcato - recurvis.

Bryum foliis mollibus iubulatis, letis breviflimis alaribus, capfulis ovatis.

Haller. hijt.jlirp. helv. torn. 3, p. 43. num. 180. tab. 46, fig. 8** Item
*opufc**

*opusc. p. 269- num. 55. tab, 1. sub nomine Bryi capillacei crebris per caulem capitulis**

Singularem muforai, copiosum super everfis femiputrescentibus arboribus, tum faxis fylvarum umbrosissimis inveni in adfensu in alpes Spitalenies retro Hintereggen verlus *böfe Nafe*. Celpites maximi furculorum bipollicarium ramorum late ex flavo virentium, foliis undique & dense vestitorum; ea trium quatuorve sunt linearum, fetacea, bali duntaxat perparum latefcente ad amplexandum velut furculum, unam in partem omnia, una cum furculorum, ejusque ramorum apite recurva, & falcata^ Atitheray femper laterales, plures in quovis furculo, axillares, interdum duæ tresve aut quatuor admodum contiguse, ut in verticillum ordinatas crederes numquam autem terminales; sunt eæ ovate, virides, pedicellatae; pedunculo brevi, linearum duarum triumve, numquam ad altitudinem furculi pertingente, minus eadem excedente; basi bulbillo oblongo, duro, atro - rubente, nudo, absque perichaetio, infructo. Operculum obtuse hemisphaerico - conicum; apertura oculi ciliis rubris coronata. Calyptra parva dilute rufescens, basi planiuscula, dimidiata, membranacea, in acum brevem acicularem apice abiens & decidua, antequam ad mediam capsulae maturitatem perveniat Capsula erecta, oblongo-ovata, truncata, rufescens striata, delapso operculo, ore hians orbiculato dilatato. Addit propria ex observatione Hallerus, pollinem feminalem intra seccum proprium, a capsula distinctum, contineri; nee tamen propterea Buxbaumae specie^ Ex descriptione patet, plurimum Bryum hoc, a proximo B. pomiformi L* differre; cum eodem nihilominus Scopoli conjunxit. Mihi alias Bryum alpinum audiebat: at quoniam ex altera Mantissae Linnaei parte jam video, idem alpini leucicum nomen Bryo Dilienii tab. 50 fig. 64. datum fuisse»

ad evitandam, quæ exinde oriri poffet, confufionein, Recur vum malui  cere, ob folia in alteram partem recurva & omnino falcata.

CCVII.

BRYUM CONTORTUM.

Bryum anthera erefta, cylindræca, oblique intorta; caule ramofo; calyptra exftin&orii forma, laxa, aurea, longe ariftata,

Bryum calyptra exftinftorii forma majus & ramofum. *Dillen. mufc. tab. 4\$.*

fig- 9-

Bryum caule fuliofo, calyptra cylindrica, ciiiata, longe ariftata. *Haller. hift. Jlip. helvet. torn. 3* p. 48* num. 1828. tab. 45. fi*. 3.*

Satis frequens in muris, xarius t[^]men florens. Labaci olim in muro cingente Tempellum pagi Ziska, iterum in muro cingente Caftellum Kaltenbrunn. Turn Clagenfurti ubivisin muro urbem cingente leu maeniis; & florens in fine Oftobris in muro circum tres cruces Montis Calvariae &c. Elegantiffime, inaximeque ad naturam accomode id Hallerus tab. 45* fig. 3* iculpi fecit; jure a Bryo exftinftorio feeparandum, cum Dillenio; etfi Linnaeus, Gunnerus, Leerfius &c. majorem duntaxat ejusdem Varietateip effe exfftimant. Cefpites format majufculos, faturate, & fere ex nigro virides. Caules etiam plusquam pollicares, teretes, purpurei, ramofo, erefti: foliis undique fparsis imbricati, erefto - patentibus, feffllibus, lanceolatis, faturate vlrudibus, fubtus nervo exftante purpureo, longitudinem dorfi per-
cur-

casrente, infignitis. Nervus hie ultra folii apicem exflat, in inferioribus femitabefcentibus & rufis foliis* Setae antheriferae terminates, (implices, non numquam & laterales, aut ex dichotomia caulis; primum furculis fere breviores, fed iis tandem etiam longiores, femi alterius pollicis longitudine, ere&ae, bafi bulbo oblongo, duro, nigricante, nudo, nee perichaetio, infru&l<, tandem rubrae. Capfula cylindracea, longitudinaliter oblique intorta, virens, ex viridi rufefcens, denique fuica. Ofculum ciliatum. Operculum faturatius rufum, acu longa, ariftae inftar, infru&um. Calyptra capfulis longior, latiorque, cylindraceo-companiformis, vere Exftindorii forma, nuda, flavo-aurata, lcevis, nitens, ferici inftar firma, bafi xqualiter truncata, obfolete ciliata, apice in acum longiufculam, triftefubvirentem, ac tandem fuico-rufefcentem terminata.

CCVII

FONTINALIS CAPILLACEA*

Fontinalis foliis lineari-fetaceis; antheris ex gemmis lateralibus, cylindraceis; operculis elongato-fubulatis*

Fontinalis foliis lineari-fetaceis. *Linn, fl or. fuec. 2. p. 379* num. 962.*
Gorter.fior. belg. p. 301. num. 836 Scopol. flor. earn* 2. torn. 2, p. 307, num* 1287**

Fontinalis capillacea^ calycibus ftyli inftar cupidatis. *Dilkn. mufc, ^.* 33.

A-5

Operit iaxa late omnia, fuper quæ prorumpẽis ex inunani ad Haa*-bergani fpecu Unzius diffunditur; turn & frequentiffima in confragofis rupeftribus Cataractaruni fluvii Labaci ad caftellum Kaltenbrunn ; ubi & radicibus truncisque Salicum, ab iisdem humeftis, increicit, quibus ripa coerchetur, ex utraque fuperilru&i pontis parte# Incredibile vero eft, quantum laboris, moleftiarumque, fubaquofae iftius ftirpis mihi facefliverit inquitio^ Capillaceam Dillenii (quamvis figura non maxime probaretur) primum effe credebam, refpondebantque, qua? ad latus adjecerat , fingillatim folia; at Linnaeus haud receperat. -Americana praeterea dicebatur ftirps. Gorterus, ut multi folent, nuda praeter verba, ex aliis repetita_f docebat nihiU Scopolius fulcatis, tortilibusque fetis fere confundeat etiam# Placebat, ut non poffet magis, defcriptio Fontinalis Halleri num. 1796. Sed iquamofam DiJlenii, 1 Jnnaei que afTerebat effe; quacum conjungere meam, nee folia , nee perichaetia , minime vero omnium , operculorum cuppis elongata, acutiflimaue, fmebant. Miferam turn ad amiciffimum Hedwigura, qui per litteras de Sphagno Dillejiii heteroinallo polycephalo, five Arboreo Linnaei fufpicionem fufcitaverat! attamen non repitmea, fed liberis per undas, fluitantibusque fluffiat caulibus! Inutilem denique pertaefus laborem, quando quod peculiariter cara&erifticis fpeciei adverfaretur notis, nihil admodum haberem, Capillaceum Linnaei, Dilleniique, abfcjue metu dicere, anfus fum* Liberia ergo , ut innui, fluitantibusque per undaſ iluiluat caulibus Fontinalis haec capillacea, eo omnino modo , ut id in fquamofa fua Dillenius tabula 33. fig« 3. exhibuit- Confervarum adipftar, nudis bafi, fua hserentes (axis, undarum liberi fequuntur arbitrium liirculi breves., ab uno ad qifttuor, quinqueve pollices longi, ramofiffimi, ex viridi tandem atro - purpurafcentes, ac denique nigri, fetas nonnifi equinz xraffitudiae, celpitofe non raro nafcentes, /oliis nulla certa lege, undique

patius conferte fparfis obfiti furfum fubimbricatis, intra aquam erefto etiara patentibus, fubdiaphanisque , etfie faturato plane virore nigricantibus, imo nigris demum. Sunt ea folia, ut fua Dillenius ad latus, fub *a*>, & &., exhibuit, feffilia, furculos vclut amplettentia, vix tertiam lineae partem lata, tres, quatuorve longa lineas, lineari - lanceolata, inque fetam plerumque ebeuntia capillarem, omnino lineari - letacea, dorfo nervulo exftante carinata, intra aquam fuperne naviculari-canaliculata, & refta, extra eandem deficcata_f fere planiufcula_y oblique longitudinaliter intorta, apicem verfus incurva & crispa* Anthera per caules ramosque interdum creberrime, faepe etiam eo plane modo fecundae[^] ut in Sphagno heteromallo Dilleni tab. 32. fig. 6., femper laterales; non equidem in foliorum axillis feffiles; fed e gemmis, ut ita dicam lateralibus, duas, nifi & amplius quandoque, lineas longis₉ foliis furfum imbricatis, obfitis; intra quorum terminalem velut nindum adinfar perichaetii, breviffimae infittunt fets[^] apicibus capillaceis foliolorum undique obvallat[^] Earum, viridium adhuc, figura, ovato-oblonga eft, mox tamen in cylindaceam abit; operculo tegitur elongate, conico - fubulato, faturate rubre, acutiflimo, bafi margine annulari cralSore, magisque rubro circumfcripto, Calyptra & ipfa rubra plus minus; bafi dimidiata, truncata₉ lacero - ciliata, acu terminata longa₉ fubulata, demum fufceicente. Capfulae cylindraceae, rufae, laeves, ofculo ciliis[^] rubris c'oronato. Halleri Fontinalem num. 1796. ut jam dixi, libens ifthuc referrem, nifi ipfe, eandem cum fquamofa Linnaei diceret

CCIX.

LICHEN FLAVO - VIRESCENS. *Icb. 13. fig. 4. to. b.*

Lichen leprofo-cruflaceus, tener, ex flavo - virefcens; tuberculis lentiformibus, trifle luteis.

Non rarus nudis in rupibus montis Calvariae, *Schmalzlergl &c.* crufla leprofa, glebulofa, tenera, etiam cum tempore groflior, aquofe ex flavo virefcens, numquam figurata, ut ea Lichenis candelaris L., late per faxa diflufa, firmitime iisdem haerens; tuberculis feffilibus, convexe lentiformibus, non marginatis, interdum confertiffime aggregatis, trifle luteis, obfita* Deficcatione, utinhacgente folet, expallefcit decoioraturque interdum, non Temper, extimus tuberculorum ambitus, ut albido-marginata credas, & forfan etiam fcutellatis accenfendum exiflimes Lichenibus, An hue Schreberi, ex Zoega, fulvus, referendus?

CCX,

LICHEN FUSCO - ATER, *Tab. 14. rupeflris/^ 3. arboreus fig. 4.*

Lichen leprofo-cruftaceus, farinaceus, obfeure grifeus; tuberculis lentiformibus, immarginatis, atris.

Lichen leprofus fufcus, tuberculis atris. *Linn.fp. plant, p. 160^ . num. 5.*
Leers, flor. herb. p. £53. num. 929. Schreber. fpic, Upf.p. 136. num. .
1138 fVeiJf. crypt, pi 39.*

De industria vulgaris istius in rupibus, minus tamen frequentis in arboribus, memini Lichenis; nondum enim, quibus adhuc involutes videtur tenebris, discuffe sunt omnes. Floras, qui eundem recensent, confului plurimas; exiguo tamen fateor emolumento; doctior fa&us nihil Ipse infeliciter Linnaeus, ficubi, isthic profecto laconicus maxime* Eo, opinor, res delabitur denique, ut, quæ *vocisjū/cus* significatio fit? scia-
 .ijus* Proprio in sensu colorem denotat ex rubro nigroque niixtum, quem passim extra Latium, bruneum dicimus, magis aut minus saturatum; atque optandum etiam foret, ut ne umquam aliter acciperetur, five acceptus jam stisset saepius. Video tamen; in historia præprimis naturali, colorem fuscum, jam pro nigro, aut nigricante faltem, vel & pro obscure griseo &c. & quod minus adhuc ferendum, pro quovis passim obscuriore, absque discrimine, folere accipi. Quanta hinc confusio! quanta in intelligences autolibus, aut in rite ordinandis eorundem synonymis difficultas! dum demum ne certi quidem fumus, ane omnes, qui eadem de re loqui videntur, eandem omnino præ oculis——aut & in mente solum, habuerint? A Linnaeo in descriptione Lichenis istius, colorem fuscum pro atro-rubente, five bruneo acceptum fuisse, ego quidem mihi persuadere non possum; minus adhuc, pro nigro; ut Weiflius, & indubie Meerfius quoque supponere videntur. Crediderim verius ad iordide & obscure griseum respexisse; atque hoc quidem in sensu a me hæcenus acceptus est semper, quoties in descriptione Lichenis fusco-atrici Linnaei adhibitum legi. Est Licheni huic Lepra? tenera farinacea, in crustam duriusculam confluentem, artissime faxis haerens, coloris fordice, & obscure grisei, in dilutissimam velut umbras (*Schatten*) nigredinem emorientis, latissime perfaxa, rarius arbores, undique diffusa; obfita undique frequentissimis diversae magnitudinis tuberculis convexis, lentiformibus, margine difcolore nullo circumscriptis^ Adjeci vul-

vulgare, ut in faxis reperitur, fpetimen, & minus frequens arboreum aliud. Atque sic omnino optime ex illo distingui posse Lichenem hunc fulco-atrum a proxime agnatis congeneribus sanguinario, petraso, calcario, & carbonario, quibus omnibus tubercula immarginata atra sunt in crusta leprosa diverforum colorum.



I N D E X

PLANTARUM HIC DESCRIPTARUM.

A.	Pag.	G.	Pag#
Aconitum tauricum. - - - -	112	Genista bipanica, - - - -	165
Agrimonia Agrimonioides. - ~ -	208	— — humifusa. - - - -	169
Alyflum gemonenfe, - - - -	159	— — fericea. - - - -	167
Arabis thaliana* - - - -	115	Geranium argenteum* - - - -	143
Artemisia glacialis. - - - -	U 8		
		a	
		fieracium incarnatum* - - - -	127
B.		Hottonia palustris. - - - -	128
Boletus hirsutus. - - - -	149	Hypocoum littorale. - - - -	205
— — odoratus* - - - -	150		
— — luaveolens* - - - -	147	L.	
Bryum contortum. - - - -	225	Lichen alboceruleus. - - - -	184
— — phaeoides. - - - -	220	— — atroalbus. - - - -	185
— — recurvum. - - - -	204	— — atrovirens. - - - -	186
— — phagnoides. - - - -	222	— — cinereus. - - - -	183
Buxbaumia aphylla. - - - -	213	— — coxallinus. - - - -	180
Byflus cobaltiginea. - - - -	178	— — flavovirens. - - - -	230
		— — fusco-ater. - - - -	230
		— — marmoreus. - - - -	178
a		— — ochroleucus. - - - -	192
Calla palustris. - - - -	154	— — tolivaceus. - - - -	194
Campanula Zoyfii. - - - -	122	— — omphalodes. - - - -	196
— — circa alpina. - - - -	157	— — pertusus. - - - -	181
— — Ciftus falvifolius. - - - -	120	— — polyphyllus - - - -	190
		— — pulchellus. * - - - -	199
E.		— — pustulatus. - - - -	188
lichinophora spinosa* - - - -	155	— — reticulatus. - - - -	187
		— — rigidus. - - - -	187
F.		— — tauricus. - - - -	177
Fontinalis capillacea. - - - -	227	— — viridi-aten - - - -	186
Fumaria acaulis. - - - -	203	Lycopodium alpinum, - - - -	212
		G g	M.

				pag.					pag.
	M.				— myrfinites.	-	-	-	136
					— phylicsfoiia*	-	-	-	139
Meliflā grandiflota	"	"	"	*34	Satureja montana.	-	-	-	113 ²
	P.				— -» rupeftris.	-	«	-	131
Phafcum cupidatum.	"	"	"	216	Scabiora graminifolia*	-	-	-	152
mmm — mnticum*	"	"	"	215	Silene pumilio.	»	-	-	126
— — piliferum.	"	"	"	218	Sifymbrium lippizenfe.	-	-	m	161
— — fubulatuiiu	"	"	"	219	Sparganium na+ans.«	-	-	-	163
Polypodium alpinum,	"	"	"	171	Spergula laricina.	•	-	-	207 ⁻
Potentilla fubacaulis.	"	"	"	*45					
	R.				T.				
					Thl?fpi prscox,	-	•	*	fa J %A,
Rhammis p«mlUo#	"	"	"	141	Tremella clavarisforinis.	-	-	-	«74
	S.				^— — juoiperinsu	-	-	-	173
					V.				
Salix fufca.	"	"	"	200	Vinca major.	•	-	i.	210



V.

JOANNIS ANDR^EE SCHERER.

MED. DOCTORIS

ANIMADVERSIONES QU^{ED}AM

CIRCA

EUDIOMETRIAM.

¶

Vix alia aerologias pars ferio'ribus hifce annis Militate fia inclarui[^] magis, quam exoptatiffima Eudiometrije do&rina. Neminem enim latet, qui gra-
 via ilia confiderat, qua; de ialubritate aeris, veterum tempore tantis ob-
 yoluta tenebris, deque conflitutione , compofitione ac influxu atmofphara
 ia corpus humanum, turn de phyfiologia refpirationis agunt, quantis h«c
 nuperis luftris & phyficam & medicam difciplinam ditaverit, & illuftraverif.
 Sedprout omnis magni momenti inventio folet, fie nee hsc vituperatione
 omni caruit; dum vel aerem nitrofum, medium, quo atmofphaerici aeris bo-
 nitas exploratur, non fatis efficacem , vel infrumentum, eudiometrum dic-
 tum , vel iplam examinandi methodum non tutam fatis judicanU Non enar-
 rabo proluxiore fermone difputata & coniroverfa. Unicum eorum argumen-

turn leviffime tantum tangere licet, cui nonnulli Phyfici usque adeo indid-
fere, ut omnem puritatis aeris explorationem pronunciaverint vagam atque
fufpectam. Ajuntenim, mixturam aeris nitrofi & examinandi fixo carere
iminutionis punfto, ideo, quod volumen utriusque aeris in tubo eudio-
metrico contendit in dies, imo de hora in horam, decrefcit fenfibilitate.
Verum experimenta, tum a CL Ingen- Houfzio, tum a me inftituta & pu-
blici juris facta demonftrarunt manifefta, iftam imminutionem locum non ha-
bere, fi modo uterque aer, agitando tubum in momento contactus mutui,
intime miftis eft. Plura taceo noftri levidentia, quam iis refutandis immo-
rari operas pretium fit

Sed majorem attentionem, indaginem majorem merentur obfervata,
nunc iufius pertraftanda, quibus hodierni nonnulli Phyfici contenti! Eudio-
diometrum tanquam Herculis clava jamjam percutere volebant. Hæc ad
bina redeunt, quorum fcilicet alterum certam aeris facti fpeciem, nitrofi
aeris ope abforbendam, alterum ipfam hanc fpeciem animalibus lethali-
tem fperat. Talia a Cl. Achardo facta infinuantur (in libro, cui titulus
Magazin der rituefte aus der Phyfik Tom. II. part. I. pag. 166.) his pau-
cis: Aer ex detonatione anaticarum partium nitri & limaturas ferri, in re-
tortis tubo perlongo & aperto inftitutus, quarum orificia ipfo momento de-
flagrationis finitæ pafte obturabantur argillacea, obtentus, conftat aeris fixi
una parte, & tribus partibus alterius aeris flammam exftinguentis, animali-
busque lethalis. In Eudiometro dum cum aquali menfura nitrofi aeris mif-
cebatur, traminutio totius erat ad $\frac{1}{5}$ (in documentum, Eudiometron aeris
qualitatem animalibus noxiam tuto non indicare). Nee aeris inflammabilis,
iiec nitrofi fuit indolis.

At vero quibusnam animalibus fuit aer iste fastidiosus lethalis? Quo temporis intervallo moriebantur, respe&u habito ad aliud ejusdem speciei animal, aequali volumini aeris communis indutum? Fuitne aer iste ab inquinanti fixo & vaporibus nitroso - acidis depuratus? Tandem quo instrumento, quave methodo instituebatur bonitatis aeris examen •* Haec omnia desiderantur.

Experimentalise, jam animus erat, repetere. Verum, quum processus nee in cucurbita vitrea, longissimo collo instructa, nee in retorta, illa in balneo arenas, haec in igne aperto, expectationi meae nequaquam fecerit fatis, utrumque enim vas fissum est vi ignis, haud incongruum me facturum existimabam, eum alia a praescripta non multum abliidente methodo instituire. En! tentamina^

EXPERIMENTUM I.

Detonare feci cTrachmam circiter dimidiam pulveris subtilissimi ex aequalibus nitri & limaturas ferri portionibus fa&i, sub inversa campana vitrea 64 pollices cubicos capiente, super frustulo carbonis candentis. Momento detonationis finitae femovi carbonem; campanam patinae tantillum aquae caatinente imponens« Iftius aeris certam quantitatem cum aqua calcis recens parata agitavi, donec nulla absorptionis signa apparerent* Obtinui ri-ff p^rtes aeris fixi. Residua portio ab omni inquinamento aeris fixi depurata, & in Eudiometro Cl. Fontana nitrosi aeris ope ex cupro & nitri acido paati explorata, sepe exhibuit resultatum. Una examinandi unaque nitrosi aeris mensura occuparunt finita agitatione in tubo eudiometrico 200 —j 36=64. Flammam ipsi immiffam citifliir^ extinguit

Vifurus effusus in vitain animale, inclusi aviculam (felegi Spinum Lin.) in campanam vitream 32 pollices cubicos aeris facti ab omni aere fixo depurati capientem. Animal mox anhelat, anxie respirat, & elapsis vix quatuordecim secundis asphycticum cadit. Extrattum & aura dephlogisticata refocillatum, tardissime convaluit.

Hic notabo, in omnibus frequentibus experimentis me aeres factios five examinandos, five ad respirationem animalium infervituros, depurasse semper ab inquinante aere fixo, adhibuisseque aquam calcis recens paratam, talemque aerem nitrosum, tandem etiam aviculas ejusdem speciei & magnitudinis.

Repetii idem experimentum, Quantitas aeris fixi erat $T^{\circ} \mid$ qualitas $200 - 128 = 72$. Flammam extinguit.

EXPERIMENTUM II

Detonare feci carbonis & nitri pulverem), squali portione mistum eadem methodo eadem quantitate. Aer campanae, detonationi expofitus, gaudebat Q aeris fixi. Qualitas ejus erat $200 - 134 = 56$, Alendae flammæ infervit; ipse vero inflammabilitatis proprietate destitutus. Animal aeri huic inclusum in spatio triginta fecundorum perit.

Idem tentamen eodem modo iterans deprehendi quantitatem aeris fixi; qualitatem $100 - 145 = 55$ graduum, Flammam alit; animal suffocat.

E X P E R I M E N T U M I I L

Ut experirer qualitatem aeris, in quo nitrum cum minima poffibili quantitate carbonis deflagavit, detonare feci drachmam circiter dimidiam nitri pulverifati fub campana, fruftulum carbonis candentis, fili ferrei ope, fupra nitrum hinc inde ducens. Deflagrata maxima nitri parte, & extrafto fubito carbone aquam affudi patina?, cui infidebat campana, albiffima nunc nebula, quam clyffum nitri vocant, plena. Dum aerem examinarem, comperi \wedge aeris fixi, & qualitatem $200-120=130$. Flammam non extinguit. Animal minuto dimidio vix ad fanem vergente convulfum perit.

Idem iterum experimentum, phsenomeni peculiaris gratia, bis repetii. Alterum $T_{f}^{*}T$ aeris fixi; $200-1225=78$; alterum $T_{\pm v}$ acidi aerei & gradum qualitatis $200-125=75$ monftravit. Uterque aer flammam ardere fivit, uterque animalibus lethalis,

E X P E R I M E N T U M I V .

Inclufi animal in campana vitrea, capiente 8 s pollicēs cubicos aeris communis, cujus bonitas erat 92 graduum* Elapfis quatuordecim horae minutis inquietiffimum fuit, orthopnoicum, fuifocationi proximum. Aer hie, jam rU fixi aeris gravidus, erat qualitatis $200-137=53$ *

EXPERIMENTUM V.

Iptemet 64 pollices cubicos aeris communis 92 graduum duobus haufibus infpiravi inftrumento in hunc fcopum invento & a Cl» Ingwi-Housxio defcripto, Quantitas aeris fixi T^*T ; qualitas 200—137=63. Animal elapfo dimidio minuto morti proximum vifum eft. Flammam non extinguit

EXPERIMENTUM VI.

Tandem infpiravi aerem communem unico dumtaxat haufu, quantitate & inethodo ut prius. Inde ejus bonitas naturalis 92 graduum redufta eft ad 200—125=75. Animal ipfi immifumpoft novem minuta aegerrime animam ducere cspit. Flammam alit.

Quod diverfitatem refultatowm in reiteratis experiments attinet, quæ aeris (ixi quantitatein , tum quæ qualitatem ipfius aeris, detonantibus corporibus expofiti fpe&ant, hanc non alteri caufa?, quam majori minori-ve deflagratae mafias indeque evolutorum fluidorum aeriformium quantitati tribuipoffe, per fe fluit. Nihilominus tamen omnis aer, ubi nitrum addito corpore phlogiftico majore quantitate detonavit , animalibus • noxius & lethalis vifus eft, quantumvis diverfi fuerit gradus. Hujus rei exemplum pra?bet aer in I. experimento obtentus , qualitatis dumtaxat 78 graduum, ficque 12 tantum gradibus inferior bonitate aere communi , adeo noxium in animal exercens effe&ura, ut hoc vix dimidio elapfo minuto morti proximum efTet.

Enarratis haftenus experimentis liceat jam quasdam subjungere animadvertiones; visuri num phaenomena istarum aeris specierum legibus eudiometricis adeo contraria sint, ut primo intuitu videntur; an non potius ad fulciendam, firmandamque eudiometriae doctrinaui concurrere valeant. Juvat autem brevissimis primas tangere hujus doctrinae lineas, eo fine praemitendas, ut ea, quae jam in explicandis experimentorum phaenomenis enarranda restant, tanto paucioribus a me expediri, tantoque facilius intelligi possint. En principales Eudiometricae canones[^]

I Phlogiston respirabilem aerem vitiat, eumque respirationi sustentandae ineptum reddit.

II, Aer communis proprietate gaudet esse conjungendi cum phlogisto; certam dumtaxat quantitatem recipere **valens**.

III Medium examinandi qualitatem istius principii inflammabilis in certo aeris respirabilis volumine inter alia princeps est aura sine di&a nitrosa. Istius enim proprietatis singularis consistit in absorptione vel imminutione aeris respirabilis[^] quantitati phlogisti huic inhaerenti proportionata. Ut igitur aura nitrosa eo imminuat magis aerem respirabilem, quo minus hic inflammabilis in se fovet principii, & vice versa; hocce vero laturatum imminuat aerem nullatenus. Inde canon est: puritatem[^] salubritatemque aeris esse proportionatam absorptioni voluminis utriusque aequali portione mixti aeris videlicet examinandi & nitrosi. Atque haec sunt, circa quas omnis Eudiometria & diagnosis constitutionis aeris[^] referantur.

Enarratis ha&enus experiments liceat jam quasdam fubjungere animadverfiones; vifuri num phenomena ilia rum aeris fpecierum legibus eudiometricis adeu contraria fmt, ut primo intuitu videntur; an non potius ad fulciendam, firmandamque eudiometriae doclrinam concurrere valeant. Juvat autem breviffimis primas tangere *hujbs* doftrinx lineas, eo fine praemitendas, ut ea, quae jam in explicandis experimentoruin phaenomenis enarranda reftant, tanto paucioribus a me expediri, tantoque facilius intelligi poffint. En principales Eudiometria *canones*.

I. Phlogifton refpirabilem aerem vitiat, eumque refpirationi fuffentandas ineptum reddit.

II. *Ae?* commimis proprietate gaudetfefe conjungendi cumphlogifto; certam duntaxat quantitatem recipere valejs.

III. Medium examinandi quisihtitatemiftius principii inflainmabilis in certo aeris refpirabilis volumine inter alia princeps efi: aura fie di£h nitrofa. *l(\ms* enim proprietate fingularis confiftit in abforptione *vc* inimimitione aeris refpirabilis, quantitati pblogifti huic inha?renti praportionata. Ut igitur aura nitrofa eo imminuat magis aerem refpirabilem, quo minus hie inilammabilis in le foveat principii, & vice verfa; hocce vero iaturatum imminuat aerem nullatenus. hide canon eft: puritatem, falujjritatenive aeiis efieproporti^natam abforptioni voluminisutriusqueBequali portione mifti aeris videlicet examinandj & nitrofi. Atque haec funt, circa qua; onmis Eudiometria & diagnofis conftitutioms aeris *verfantur*.

p̄o minuto primo morti proximum fueiit. Aer hie adeo modificatus con-
ftanter tanea inflammabilis imo explofivus obfervatus eft,

Sed aliaquaefitio eft, unde primaria caufa hujus qualitatis, refpira-
tionis mechanifmo adeo fatalis, derivanda fit; hoc opus , hie labor. Tan*
tis enim premitur ejus indago difficultatibus, ut et heic non nifi probabilia*
fequi, neque ultra id, quam quod verifimile occwrit, progredi liceat. Ego
vero maxime fie puto, eam in peculiari cjuodam ftimulo eſſe quaerendairu
Quidnam autem hie fit, quidnam in refpirationis negotium agat,, difficilli-
mum diſto eft. Praeſtat igitur hac in re ignorantiam foam fateri, quam hy-
potheſibus aliorum animos demulcere* . An aeres iſti confringendo fpafitice
pulmonum bronchias ipſasque cellulas aereas ? ane totum refpirationi dicatur;
viſcus paralyticum reddendo enecant}

Jam ergo in altera aeris ſpecie exp. III. detonatione nitri cum pair-
co phlogiſto obtentaconfiderandaoccupabor. Eſt hicce aeralendae flammæ?
aptus, a nitrofo aere abiorbendus; lethalis tamen animalibus. Multum ae-
ris dephlogiſtati ipſi ineffe, a priori ſuſpicari poteram. Aft, ſi propieta-
tern flammiam alendi excipis, vix ullas in tentamine monſtrat dephlogiſti-
cati notas, Inio eſt puritate aeri communi inferior in ratione media ut 77
ad 92. Non hie jam inquiram, unde haec modifkatia petenda; etfinon in-
ficias eam, aliquid phlogiſti ſub detonatione aeri accedere potuiſſe ex car-
bone* Proprietatibus his inexpl&atis perculſo in mentem venit, an nora
fortaſſis haec in experimentum traſta avium ſpecies aeris atmofphaerico paula
impurioris impatientior fit, ſiquicLem altiores regiones amans purioreaura ve-
fcitur, quam quæ prope terras ſuperficiem eſt. Quare ſtatueram experiri^
aerem communem inſpirando ^1 iliumjcirqter gradum phlogiſticare, quoaer

facilius gaudebat; cui tandem includebam animal. Respiravit autem in hoc aere, qualitatis 75 graduum & alendse flammam apto per integra novem minuta, priusquam segrotare caepit. Patet etiam ex experimento IV. 8c V\ aerem animalibus his turn primo noxium esse, quando qualitas ejus phlogistica 63 gradum excedit. Quum jam istius aeris facilitii vis adeo lethalis in folo phlogisto haud quaerenda fit; debet igitur aliud quidpiam esse, quod eum vita? animali peritioium reddit.

Qua? cum talia sint, quaeritur, quidnam respirationis negotium vitiet? Hoc in eadem causa, si quid recte video, positum esse videtur, quemadmodum superiore loco dixi. Respondet huic sententias aptitudo aeris, tantum intra pulmones exhalantis phlogisti in se recipiendi, quantum ad respirationem reiteratam necessarium est; imo vero & respondent aeres, alterius quam phlogisticae indolis, quippe vaporibus acidis, causticis, aut plantarum effluviis inquinati, etiam elevantibus pulmonibus apti, & nitrofi aeris ope absorbendi, hominibus & animalibus lethales.

Hic omnibus collatis, quando denique consideramus, esse aerem dephlogisticatum unicam substantiam a nitrofo absorbendam, facile patet haecce fluida aeriformia, de quibus hic sermo est, debere pati imminutionem ab aere nitrofo, legibus eudiometricis conformem, quoniam portione puri aeris five dephlogisticati gaudent omnia; esse porro ipsis suas partes, quarum actione effectum illud noxium in respirationis functionem exercent, a sola phlogistica indole neutiquam derivandum. Ut igitur experimenta allata legum eudiometricarum stabilitatem roborque illud, quod jam jam in hac aerologia? parte obtinet, egregie corroborent. Imo accedit etiam pondus

dus obfervatione, qua aerem nitrofum qualitatem noxiam iftarum aeris fpecierum, refpectu habito adrefpirationem, re&e indicaffe videre licet.

Verum quum tentamina eudiometrica, diverfas dumtaxat phlogifU quantitates, quibus aer inquinari poteft, fpefrent, patet ffonte, omniaheterogenea, diverfae maxime indolis, corpora, quaeque refpirationis negotium perinde turbant ac vitiant, in nullam trahi poffe confiderationem* Refero hue, v. g. non unius generis effluvia odorantia, vapores arfenicales, acidos, caufticos, pulveres aliaque fexcenta, qua in diverfis locis & laboratoriis turn chymicis, turn technicis plerumque aeri innatant. Inde intelligitur etiam canon eudiometricus: omnem aerem, fi modo a nitrofo parvam aut nullam profus patitur imminutionem, Temper effe peffimae indolis, hominibus pariter ac animalibus lethalem; quin inde aerem infigniter abforbendum pro falubri aut innoxio femper habeas

Quoniam autem fontes, principium inflammabile in atniofphceram exhalantes, refpectu aliorum inquinamentorum propemodum (int infiniti, & per totum qua late patet naturae regnum diftributi, hinc elucet utilitas Eudometriae, qua refVe ipfiffimum detegere & fumma accuratione determinare valemus principium illud, quod nunquam non atmofphaera; inhacret, fenfibus non patet, & paulo largiori quantitate praefens faepefajpiuslethifertlm eft. Hinc adeo celebrata & magni habita Eudiometria. Exempla rariffima, fi qua proftant, ubi aeris cujusdam faftitii in rerum natura nullibi ffonte occurrentis phenomena noftris aerologiae principiis non refponderent, tantum, me iudice, valent adverfus hanc doftrinam, quantum variolis inoculatis defunftus infans adverfus infitionem variolarum, imo quantum

aedificium electricis conductoribus armatum, fulmine tamen ictum, ad certum ictum magni Franklini praefidium. Manet ergo Eudiometria? suus honos. Quamvis enim, in quo lateat omnis aeris qualitas noxia praecipue non detegat, multa tamen experiundo aeris nos ambientis bonitatem, discimus, in Medicina ipsa & Physica usum habitura.



VI

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN

SIDEROXYLUM,

Ego in Syderoxyli celeberrimi Linnæum non bene capio. Primum Sideroxyli nomen datum fuit ab Hermanno & Plukenetio arboribus diverfi generis pluribus, cum Africanis, tum Americanis, quæ ipfis etiam ab incolis ob firmam ligni duritiem *arbores firres* vocabantur. Atque id quoque vel hodie in utraque India obtinet; & noviter iterum ex India orientali plures ignotæ diversasque arbores sub illo titulo natali in horto Cæsareo Schönbrunnense adveffce fuerunt. Dillenius deinde nomen hoc, ceu botanicum, in Horto suo elthamensi proprium esse voluit arbori, a prioribus distinctæ. Linnaeus Dillenium fecutus fuit, atque sic *Sideroxylum* ejusdem *generis* exfurrexit, genuina vel ipso afferente in Horto Cliffortiano Dilleniæna plauta. Haec itaque arbor characterem generis præbere debuiffet, & effentiam ponere in *corolla quinquefida cum interjectis ad divifuras petali totidem squamulis* inque *bacca tetra/perma*. Et talem Linnaeus determinavit in Generibus suis anno 1742. & iterum anno 1752. editis; quin imo in Syftematis fui editione 1748. *folijs squamis* illas pro caractere adfignavit. Dein autem

tern diverfimode deflexit. Sic in Syftematis editione decima 1759. corollam dicit *decemfidam* & baccam *pentaſpermam*; in generum editione fepta 1764, corollam denuo *quinquefidam cum totitem alternantibus denticulis & drupam cum nuce*; in Syftematis editionibus ſubſequis iterum corollam *decemfidam & baccam pentaſpermam*; dum tamen in Mantiffae ſuae prima parte, Syftemati editionis tertiae & decimae adnexa, adeoque in uno eodemque opere, *Sideroxyli dccandri & tenacis* dicat corollam *quinquefidam cum neſiarii ſquamis quinque*. Nullum forte Linnaeus vivum vidit Sideroxylum, & haec vacillationis caufa extitit*

At etiam in Speciebus Linnaeanis fynonyma quaedam dubia offendo. Sic in Syftematis editione decima tertia & decima quarta pro fynonymo *Sideroxyli mitis* fui citat eandem Commelini plantam, quam in jam ante edita Mantiffae prima parte multo verofimilius ad *Sideroxylum melanophleon* amandaverat Ad *Sideroxylhim mite* reducit nunc plantam Dillenii contra fenium prioris fui Horti Cliffortiani; & ad *Syderoxylum inerme* plantam Milleri, fortaffis quia hie plantam ſuam *inermem* vocavit, quam tamen neutiquam confudit cum inermi Dilleniana. Dillenii planta jam a principio ſtabiliti generis fuit *Sideroxylum* Linnaei *inerme*; maneat ergo in perpetuum. Milleri planta fit *Sideroxylum mite* Linnaei, diu poſt Dillenianam cognita deſcriptaque. Nee moveamur determinationibus Linnaei ſpecificis, qua mutandae temper funt, utpote utroque in caſu fallentes. Nam quale erit Sideroxylum mite *floribusſeffilibus*, dum utraque planta eoſdein pedunculatos habet? Et quale Syderoxylum inerme *Jbliis perennantibus obovatis, pedunculis teretibus*, quando utrique plantae pedunculi teretes funt, foliaque perennantia; Sc haec obovata in Dilleana potius ſtirpe funt quam in Milleriana foliis donata lanceolatis.

Sideroxyla mitt (planta Milled) & *melanophleon* squamis corollas deftituuntur; *inerme* (planta Dillenii), *jktidijimum*^ *Maftichodendrum*, *tenax*, *lycioides*, *decandrum*, & *fpinofum* iisdem gaudent ex fide autoptarum. De *cymofa* nihil publice conftat. Sive nunc squamulas illas partem corollas dixeris decemfidae, five ne&arium, aut denticulos, aut pure squamulas, patet, has modo praefentes, modo abfentes, ad definiendum unum genus nihil va^ lere poffe. Perianthium in aliis omnino pentaphyllum eft, in aliis dumtaxat femiquinquefidus. In *Sideroxylo inermi* fru&us dicitur a Dillenio *bacca tetrafperrna*; in *melanophleo* & *lycioide* *bacca* eft *monofperma*; in *decandro* *bacca tri-vel quinquelocularis*; in *fpinofa* ex Horto malabarico *bacca polyfperma*; in *fatidiffimo*, *tenaci* & *Maftichedendro* eft *drupa monofperma*. Ut non intelligam, quo debeat pa&o, fi quidem ad unum idemque genus omnes has ftirpes pertineant, character genericus concinnari, ut folis *Sideroxyli* conveniat, & a *Chryfophyllis*, *Jacquiniis*, aliisque affinibus rite &c certo dilinguatur^ Donee omnium fru&ificatio plene cognita fit, fruflra tentabimus. Ut ifthuc tandem perveniamus, defcriptis jam a me *Sideroxyli* *melanophleo* & *foetidi* (Hmo quatuor fpecies addam, unam apud Linnaeum defideratam.

I.

SIDEROXYLUM MITE. *Linn.fyjl. pag. 132.*

Sideroxylum mas inerme. MUL ic. pag. 199. tab. 299.

Arbor elegans ex Promontorio bonas Spei floret fob dio apud nos Junio & Julio, hyemem fempervirens in tepidario tranfigens, in patria afferente Milleromolis vaftae, apud nos adhuc dum fexpedalis, ramofa, ligno

albido duroque, cortice fufco, nullo hue usque fructu grvida, ut! xiec apud Millerum in Anglia, unde hie marem putavit, forte talis ob defe&um id piftillo aliquem. Folia funt lanceolata, acuminata, integerrima, fparfa , coriacea, facie faturate virentia lucidaque, dorfo dilutius & glabra, petiolis brevibus purpureisque innixa, majora longa uncias quatuor unamque lata. Pedunculi axillares, aggregati, teretes, breves, alii fimplices & uniflori > alii ramofuli & multiflori, Flores valde parum odorati, corolla nivea, filamentis *alhis*, antheris Havis, piftillo viridi.

CAL. Perianthium quinquepartitum, parvum, patens; foliolis fubrotundis, obtufis, concavis.

COR. monopetala, rotata, quinquepartita; laciniis oblongis, obtufis, concavis, patentiffimis. Nectarii fquamæ nullæ*

STAM. Filamenta quinque, fubulata, incurvato - erefta, fere longitudine corollae. Antherae fubrotundae.

PJST» Germen fubrotundum, fuperunnu Stylus nullus* Stigma funplex^ obtufum.

PER. . 4 •

SEM. . . .

IL

SIDEROXYLUM INERME. *Linn. fyjt. pag. 234. Berg. cap. pag.tf.*
Sideroxyli primum, dein Coriae Indorum nomine data arbor. *Dill. ekh.*
.pag. 357- tab. 26.5. fig. 344.

Etiam haec arbor ex Promontorio bonae Spei est. Apud nos femper-
virens totaque giabra hyemem agit in tepida'rio, sub dio florens Julio &
Augusto, quinquepedalis, cortice cinerascete, ramulis junioribus teretibus
ac viflentibus. Folia habet in ramis junioribus & ad fummitates feniorum
fparla, breviter petiolata, oblonga cum basi anguffata five ex oblongo ob-
verfeovata, obtusiflima, nonnunquam emarginata, crassa, nitida, rigidu-
la, triuncialia, utrinque giabra* Pedunculi uniflori, teretes, breviflimi,
hie illic aggregati, etiam folitarii, fparfi in axillis foliorum infimorum, tum
longe infra ilia in ramis aphyllis. Flores inodori, calyce virente, petalis
filamentisque albidis, antheris flavis; cum una quinta parte omnium par-
tium icepe deficientis

CAL. Perianthium quinquepartitum, parvum; foliolis ovatis, obtufis, con-
cavis, patentibus.

Cos.. monopetala, rotata, quinquepartita; laciniisoblongis, obtufis, con-
cavis, patentibus

Nettarii fquamæ quinque, lanceolate, acuminatae, patentiffimae,
fa?pe incife, cum laciniis corollis alternantes, ejusdemque fere Ion''
gitijdhm

STAM* Filamenta quinque, fubulata, patentia, longitudine nettarii. An-
therae fubcordatae.

PIST, Germen ovatum, fuperum. Stylus filiformis, ereftus, longitudine
fere flaminum. Stigma obtufum.

PER. . . .

SEM. . . .

III.

SIDEROXYLUM TENAX. *Linn, fyft. pag. a 3*. mant. p. 48.*

Chryfophyllum carolinense. *Jacq. obf. vol. 3. pag. 3. AI&. 54.*

Speciofatn hanc arborem ante viginti annos ex fru&ura floris in fpecimine ficco carolinensi, aGronovio mecum commnirato, ad Chryfophylla reduxeram, -cujus cognita nunc fruftus anatome -aliud docet. Exemplar Gronovianum fylveftre fpinis plane carebat, uti etiam caret arbufcyla culta in horto noftro botanico, quibus abundanter armantur arbufculas' horti Schönbrunnensis, quae sub dio florent Septembri & Octobri, hyeme in tepidaria transferendae. Nunc ergo vivam ftirpem defcribam. Cortex glaber, fufcus, cum fuffufo colore cinereo. Spins ex gemmis fparfa?, fubulatae, validae, badae, patentes, fere {emunciales; aut nulla;. Folia ex iisdem gemmis plura, etiam folitaria, breviter petiolata, lanceolata, obtufa, bafi acuta, integerrima, biuncialia, facie lsete virentia glabraque, fubtus fericea & cinnamomeo - argentea. Pedunculi uniflori, aggregati ex eadem gemma plures, teretes, villofi, femunciales* Flores leviter odor^ti, parvi; calyce villolo & fulco; corolla, filamentis ftyloque albis; antheris cinereis; germine viridi & villofo.

CAL. Perianthium hexa-vel pentaphyllum, perfiftens; foliolis oblongis, *<:oncavis> obtufis, conniventibus.

JCOR. monopetala. Tubus calyce brevior* Limbus quinquefidus, vel fexfidus, patentiffimus, calyceduplo longior; laciniis oblongis, obufis, lateribus conniventibus.

Necta-

Neftarii fquamæ tot, quod lacinia petali, cum his alternantes, iisdem paulo breviores, lanceolate, acutae, fæpe denticulate, trifidaj; laciniis exterioribus patulis, intermedia longiore ere&^que.

STAM, Filamenta tot, quot laciniae petali, his incumbentia, iisdem paulo longiora, iubulata. Anthers oblongs, incumbentes.

PIST^ Germen ovatum, fuperum* Stylus filiformis, ere&us, longitudilie ftaminum* Stigma obtufum*

PER. Drupa ovalis.

SEM. Nuxovata, nitidaf bafi foraminibus duobus, fepto arcuato diftin&is, • pervia, unilocularis*

IV.

SIDEROXYLUM MASTICHODENDRON. *Tab. ij. 5.*

Cernus foliis laurinis, fruflu majore luteo# *Catefb. car. 2*pag. i\$.tab. 75,*

Apud Catesby in folo naturali dicitur arbor quinquaginta pedesalta, cujus truncus craflitiem duorum triumve pedum habet, veftitus cortice viridifcenti-albo glabroque; lignum xftimatur ad frufluuram materiariam; fruflus flavus comeditur, faporis dulcis & mellei; qui tamen praeprimis in nutrimentum cedit avibus aliisque animalibus. Crefcere, ait, in Abbacco aliisque infulis Bahamenfibus, & incolis vocari *Majlic-Tree*, cujus tamei* nominis rationem nan reddit* In caldariis noftris laete vegetat, femper virens, quiji eadem etiam folia ultra duos annos confer vans, quarto setatis anno jam quinquepedalis, truncoque fefcuncialis diametri; fed corticem habet hue usque ferrugineum. Rami juniores funt virides & infra folia ftipu-

Us minutis deciduisque infructi. Folia sunt inordinate alterna, lanceolata, acuta, integerrima, nitida, firmula, patentissima, petiolo unciali vel & biuncjali donata, a quatuor ad sex uncias sine petiolo longa, junior a utrinque lucida. Pedunculi uniflori simplicissimi & vix femunciales aggregatim plures, tum & folitarii, ramulos infra folia copiose obfidunt. In figura *li* *Wra a* representat florem in naturali magnitudine antice confectum. *h* eadem in dorso. *c* eundem nectarium exariluni. *d* florem auctum. *e* autem petali laciniam cum squama nectarii utrinque adhaerente cumque stamine. / drupam# *g* nucem. *h* eandem transversam* i° nucleum pellicula propria nudatum* Flores toti flavi caractere gaudent frequenti.

CAL. Perianthium pentaphyllum, persistens, parvum, inferum: foliolis subrotundis, obtusis^ concavis^ patulis*

COJU Petalum rotatum^ Tubus ipso calyce brevior. Limbus quinquefidus; laciniis ovatis, obtusis, concavis, patentissimis.

Nectarii squamæ quinque, cum laciniis petali alternantes, iisdem duplo breviores, iubilatae, acutae, integerrimae, patentissimas.

STAM. Filamenta quinque, subulata, patentissima, cum nectarii squamis alternantia, earundemque longitudine. Antherae oblongas, incumbentes.

PIST* Germen ovatum, definens in Stylum subulatum, erectum & longitudine staminum. Stigma obtusum, simplex,

PER> Drupa ovalis, styli parte mucronata, caeterum obtusa.

SEM^ Nuxovalis, obtusa, basi cicatrice notata, nitida, unilocularis- Nucleus ejusdem figuræ^ tenuissima membrana vestitus^

VIL

N I C O L A I H O S T

MED. DOCTORIS

CIMEX TEUCRII.



 ccurrit tnihi antequatuor annos in asperimis prope Bertholdsdorf colli-
 bus in Teucro fupino cimex inter notos facile minimus* Sola clauftri, in
 quo larva, pupa & imago vivunt, & nutriuntur, formatio excitavit cog-
 nitionis defiderium. Pervolvi, quantum per otia licuit, celeberrimos in ento-
 mologia fcriptores; nee apud quemquam inveni* Hinc aliorum obfervatio-
 nibus deftitutus, quanta potui exaftitudine, omnia ab initio ad finein ob-
 fervavi, obfervata notavi; quæ hie cum entomologis communico. Cum
 tanta inter Teucrium fupinum & animalculum hoc connexio, ut ex cog-
 nitione unius ad cognitionem alterius .via pateat, a nomine generico plants
 novam cimicis fpeciem denominavi, in alia enim planta nondum videre
 contigit* Larvam, pupam & imaginem, microfcopio fumopere auctas,
figu-

figura exprimi curavi* His praefru&is, deicriptionem armatis oculis aggrediar; defcriptioni obfervata fubmittam.

Cimex muticus, oblongus, minimus, fufco-cinereus; antennarum articulis anterioribus duobus, nigro - cinereis, glabris; pofterioribus nigris, pilofis; poftremo elevato, increffato, apice attenuato.

Caput cinereum, fronte emarginatum. Oculi extantes, nigri. Antennae corpore breviores, in quiete porre&ae, verfus bafim convergentes, verfus apicem divergentes; in motu mobiliffimae, auricularuoi leporis timidi motitationem imitantes; quadriarticulatae, articulis duobus anticis brevioribus, nigro-cinereis, glabris; pofticis duobus longioribus, nigris, pilofis; ultimo elevato, increffato, apice attenuato. Roilrum fufcum, fulco, peiftori infulpto, adpreffum.

Thorax corpore brevior, muticus, cucullatus, bafi annulatus; tranfverfe fubcarinatus, carina in partes duas fubsqnales divifus: antica marginata, margine punftis nigris albisque alternantibus: longitudinaliter lineis tribus parallels elevatis, duabus lateralibus brevioribus, intermedia longiffima a bafi ad apicem decurrente exaratus: interftitiis rugofis. Peftus fufcum, canaliculatum; canaliculo roftro longiore, margine increffato.

Alae quatuor, cruciato - complicate. Superiores abdomine longiores, marginatae, margine punftis nigris albisque alternantibus, qui cum margine partis anticae thoracis coincidunt, totum corpus marginatum representat: anticae coriaceae, crifpa?, fufco - cinereae: poftice membranaceas, albi-

cantes, filis-fuscis reticulate. Alae inferiores hyalinae, sub superioribus complicates

Dorsum concavo-planum, fuscum. Abdomen convexum, fusco-cinereum, segmentis sex ferrugineis, in apice partes genitales gerens.

Artus sex, abdomini concolores; femora incrassata; tibiae controprefe; pedes unguiculati.

Cimex hie magnitudine, lineam parvam vix attingit, & pedicellum humanum adultum vix superat. Inter feminam & marem tantum castitiei vix perceptibilis differentia est.

Larva nudo oculo vix visibilis, hexapoda, agilissima, teres, rubra, rotata; oculis nigris; antennarum alarumque rudimentis & pedibus albis, segmentis undecim.

Pupa, larva major, fusca, alarum rudimentis majoribus: reliquis omnibus, ut in imagine, sed figura, magnitudine, colore, imperfectioribus*.

Foetorem in nullo metamorphoseos stadio percepi.

Tabulae decimae octavae figura prima sub *a* fit ramulum Teucris cum corolla in claustrum mutata; sub *b* & *c* imaginem dorso & facie visam & auctam ad microscopium; sub *d* fit auctam pupam; sub *e* imaginem in naturali magnitudine; sub *f* talem larvam; & sub *g* hanc quoque auctam.

K k "

Lar-*

Larva rtiptis ovi tunicis, quotannis verfus finem Julii vel initium Augufti, aliquando citius, aliquando tardius; (citius, fi sftatem citius exceperit autumualis humiditas & hyemale frigus; tardius fi contra) afcendit Teucree lupini corymbum, & ut fibi idoneum inveniat vi&um, & habitationem, intrat recens expanfam corollam, rodit germen, & filamenta. Corolla, percepta rostri vi, miram fubit mutationem. Tubus elongatur, laciniae labii fuperioris obfolefcunt. Lacinia labii infetioris intermedia inflectitur, marginique labii iuperioris arte adprimitur: laciniae laterales adprimitur ad laciniam intermediam: fie admirando naturae prodigio fit hoftibus, pluviat, radiis folis., iinpervium clauftrum. Larva, confumptis germine & filamentis, arrodit latera cla'uftri, haec arrodit ut pupa, arrodit ut imago: hoc quo magisarroditur, eo magis llb/lantia & volumine crefcit; ita ut intra ofto decemve dies coriaceam induat naturain, nucisque avellanas inioris acquirat magnitudinem; quo fit ut calyx dehifcat, & qui cfteroquin perfiftens, decidat. In hoc ftatu remanet corolla, nee amplius crefcit facile. Quo tempore corolla, fubit & animalculum fuas mutationes: roftrum, quod ab initio refta porreftum, inflectitur, peftorique adprimitur: corpus teres fit dorfo planiufculum: color ruber incipit mutari, punfto in apicecaudae, medio doifi, capite, fufco: antennae, artus, alarum rudimentaalba, evolvuntur, fiuntque fufca: tandem dorfum fit concavo-planiufculum, & totum corpus fufcum. Incipiunt evolvi antennarum artuumque articuli, omnesque cordons partes partibus imaginis perfeftione accedunt: fie larva attingit increment! punftum, in quo deponit larva, & acquirit pupa nomen. Pupa pofitis exuviis fit imago: imago remanet per duos, tresve dies perfefta claufa; donec labiuminferius, non viribus infeti, ha enimhuicoperiinfufficientiffims, fed viribus natura, recedat, ficque exitus, & aditus porta pateat. Nunc jam fuo exit mas, & invifit alio inclau-

ftrofeminam, & viciflim; in clauftro celebrant nuptias, & vivunt, donec Venere frangantur vires: his frattis, defcendit uterque ad radicem, ubi mas depofito cinereo polline, femina depofitis ovis & polline, brevi imponunt vitae finem. Quantum poffibile fuit, dies vitae computavi, invenique cimicem in larva, pupa, & imagine, non ultra menfem vitam protrahere: vidique toto hoc tempore, fibi a natura vifihii & habitationi prsefixam, plantam non deferere. Cur vero provida natura pro habitat[^]ne tam arfte claufum felegit clauftrum? Opinor, primo ut rapina viventes hoftes eludantur; vidi enim iaepius formicamrufam, fuperficiem externam degenerantis corollae fruftra rodentem; fecundo ut prefervetur a pluvis injur[^]tus, incidente enim pluvia labium inferius, quod jam receffit, denuo magis adprimitur: ideo tantum in alperrimis collibus, faxofo folo, quarrendus; tandem, ut ne fucculenta larva & pupa percipiant nimiam radiorum folarium vim, utraque enim, fi fplendente fole cautiffime corollam aperire tentaveris, quad infaniens aufugit. Forfan <6c alii naturas fines, fed impoffibile in tantillo infefto omnia accuratiffime fingillatim penetrare.



VIII

TSTICOLAI JOSEPHI JACQUIN

OBSEFTVATIONES BOTANICE,

continual pod vol. Coll z# pag, 168.

<ca

HELONIAS PUMILA.

Crefcit in Carolina* Ex radice crafla & perenni folia enafcuntur plurima, longe lanceolata, acuta, intcgerrima, feffilia^ glabra, duas tresve uncias longa^ parum conniventia cum nervo dorfali medio cariflato. Plura familia per caulem fparfa funt, altiora fuceffive breviora. Caulis annuus, fimpliciffimus, femipedalis, ereftus, acute ftriatus. Spica terminalis, (effi-
lis, ovata, compafta, erefta, femiuncialis digitumque minimum craffa*
Braftese ad fingulos flores folitariae, obtufas, virides, flore paulo breviores. Calyx nullus, Ifetalafex, fupera, oblonga, obtufa, erefta, alba, fupra
conniventia* Filamenta fex, alterna breviora. Antherae flavas. Et alia
generis* Floret Augufto, fcutuni nedum tuiit;

CCIL

AGAVE VIRGIMCA* *Linn. fyft. pag. 338. Gron. virg. pag. 53.*

Ex radice perenni, fufiformi, in noflis individuis praemorfa , uncialis diametri, carnofa, foris fufcefcente, intus alba, (ubdulci , in ambitu fibris fufiformibus calamumque craflis jubata, quotannis *primo vere folia prodeunt plura, craffa, coriacea, a tribus ad 0610 uncias longa, avenia, ab una ad duas uncias lata, idque fine refpectu longitudinis, ad oras cavtilagineo - dentatofpinofa, fed ficminutim, ut denticuli nuduiy oculum fere fugiant, cartilagineo-mucrunata, pallide virentia, in quibusdam indivi-
duis variegata maculis rotundatis atrofanguineis, Scapus quinquepedalis, ereftus, viridis, rore glauco obduftus, teres^ ornatus foliis five fpatbis acuminatis, inferioribus amplexantibus & concavis, fuperioribus ieflilibus, ad flores breviffimis^ Racemus fimplex ex floribus circiter quadraginta, fequipedalis, terminalis. Flores fubfeftiles, parum incurvi, virides, fexunciales, fuaveolentes, fucco dulci in fundo pieni. Antherae fufcefcent, explofo autem polline albet. Filamenta & ftylus virefcunt cum adfperfis pun&is ferrugineis. • Stigma albet. Floret fub dio apud nos • Aug>fto & Septembri, hyeme fervanda in tepidario* Fructum nedum tuTit. Subjuncto chara&erem floris^

CAL. nullus*

COR* monopetala, fupera, fexfida. Tubus teres, iexfulcatus. Laciniae longe lanceolatae, obtuiulae, concavae, ereftiufcirte , alternae profundius fefta?.

STAM. Filamenta sex, ex iuperiori parte tiibi corollas, fubulata, er<?fta, corollam ad unatn tertiam partem fuperantia, *Anthexx* lineares, verfatiles.

PIST* Germen inferum, oblongum, obfolete trigonum* Stylus filiformis, craffus, obfolete trifulcatus, ftaminibus paulo brevior. Stigma trifidum, capitatum, patens.

ccni.

HEDYSARUM PICTUM.

Speciofiffima planta> in Guinea arenofis crefcens, in caldario noftro florens a Septembri ad Novembrim, fed pauciffima perficiens femina, ab ampliffimo Ifferto detefta, una cum numerosis aliis flirpibus guineenfibus, quarum plures in hoc Collethaneorum volumine a me defcriptae fiuntur, omnes eidem egregio viro debitis Huic Hedylaro radix eft perennis, foetida, albida, fufiformis, digitum craffa, aliisque fibris craffis abunde ftipata. Caulis unicus, erechis teres, fefquipedalis, fere digitum minimum craffus > medulla alba farftus, totus foliofus, pilis minutiffimis albidis denfe hifpidus,[#] plerumque fimpliciffimus, iuffruticosus, in caldariis nempe nofttris bafi tantum perfiftens, proximoque anno ramos ex deperditorum foliorum all'feu totidem novos caules emittens. Folia alterna, petiolata, horizontalia, pinnata ex pinnis utrinque tribus vel quatuor cum terminante impari Cofta teres, fupra fulcata, hifpida, plus minus femipedalis. Pinnæ fubaequales, a quinque ad oſto uncias longae, lineari-lanceolats, obtufula?, integerrimae, fupra ^labrae & atrovirides cum difco longitudinaliter diverfimode viridi-albo colorepifto, fubtus venis reticulate & fcabris, craffie

crasse & brevissime petiolatae, oppositas, stipula subulata rubraque fultat*
 Stipula utrinque ad costas ovato-acuminata, erecta, superne purpurascens*
 Spica terminalis, erecta, teres, fusiformis, quatuor vel quinque uncias
 longa, totaque composita ex bracteis dense imbricatis, ovato-cuspidatis,
 hirsutis, ciliatis, integerrimis, concavis, erectis, inferne virentibus, su-
 perne rubris. Atque t^{alis} primus spicae est flatus. Dein ocyus spica admo-
 dum elongatur, bractee cadunt modo ex uno tantum latere ad solem obver-
 sium, modo in ambitu toto, idque per magnam spicae longitudinem, tunc-
 que in conspectum prodeunt flores, adhuc dum clausi, sed post unam alte-
 ramve horam expandendi; & sic tota spicae fides mutata fit^{er}atur, v^{er}^a*
 que in racemum cylindricum. Pergit sic elongari spica ad pedalem longitu-
 dinem, bracteis summis successive delabentibus. Nunc flores rubri sunt,
 proximo die & vel laepe jam eodem post meridiem caerulei, caduntque apud
 nos plerique brevi, persistentibus pedicellis. Tandem ad basim spica prin-
 cipis una alterave alia spica semipedalis nascitur; atque sic successive foli-
 tari« ex omnium foliorum alis, sed breviores, apud nos ob hyemem ingru-
 entem vix ad florescentiam perventurae, Pedunculus communis & pedicelli
 dense obsidenter pilis capitatis sapore acidissimis. Ille teres est, calamus-
 que crassitie (aepe aequat. Hi geminati, graciles, patuli, & tres quatuorve
 lineas longi, Calycis hirsuti & ciliati tubus campanulatus; limbus quinque-
 fidis, subrubellus, patens, laciniis lanceolatis & acuminatis, quarum supe-
 riores du« breviores* Vexillum subrotundum, integerrimum, patens. Alae
 oblongae, obtusae, vexillo oppositae, Carina figura & situ alarum. Stamina
 diadelphea, tandem ex carina egressa medium occupant florem. Legumen ar-
 ticulatum hinc illuc flexuosum; articulis circiter quin[^], rotundatis, com-
 pressis rugosis, mutuo incumbentibus. Semina reniformia. Calyx in fru-
 ctu patens. Tunus est,

[CCIV-

ALBUCA ALTISSIMA. ASI. fuec. nov. ^dit germ. vol. 5* pctg. 293.*

Hujus faeculi anno feptuagefimo femina hujus fpeciofae plants fub titulo Albucae novae a beato Spielmanno acceperam ^cx quibus enatae plants jam altero aetatis anno florem fru&umque produxerunt, optime vegetantes fub dio, fed hyeme tegendae, feneftra elevata & fimo equino. Bulbus depreffus, albidus* Folia radicalia plura, late enfifonnia, fcilicet inferne tres uncias lata, longiora fere bipedalia, fed fie canaliculate - convoluta, ut fubulata evadant; caeterum acuta, integerrima, glabra, lineata, craffa, fucculenta, interiora fcapum involventia, exteriora multo breviora & patula. Scapus unus alterve, ereetus, quatuor vel quinque pedes ad lummum usque florem altus, digitum minimum craffus, teres, firmus, glaber, intus fubmeduUofus, fupra folia longilfime racemofus. Bra&eae ad pedunculos folitari^, unciales, lineari - lanceolatae, acuminatae, concavae, virentes cum oris albidis. Pedunculi uniflori, brafteis duplo ad minus longiores, in flofe recurvati, in fruftu patuli, Flores inodori'', nutantes. Petala albida cum fascia longitudinali media viridi. Interiora tria alterna obtuffiffima cum apice jncraffato renifornii antrorfum inflexo, ere&a, Tria exteriora obtufa & patentia. Filamenta fex, alba, erecta» Horum tria fertilia ponuntur ante petala interiora, quibus avulfis aut vi expansis, tanquam elatere quodam acla, ilico extrorfum refleltuntur, tune patentiffima; caeterum petalis paulo breviora, compreffa, bafi articulata articulo inferiori fquamiformi & latiori. Alia tria fil_{am}enta craffiora, fubtriangularia, fterilia, femper erefta. Anthetaj in fertilibus filamentis oblongae, magnae, fulco longitudinali notat», incumbentes, fulphureae, appendicula veluti cum filamentis con-

xa. In fterilibus effoetae, fulphureae, multo minores, utrinque in mucronem album definentes. Germen breviter pedicellatum; triquetrum, ad basin & apicem trimucronatum, ad lentem per lineas longitudinales adscendentes & descendentes muricatura. Stylus crassus, inverse pyramidalis, apice tricornis, undique glandulose ciliato-tuberculatus, longitudine germinis. Stigma pyramidale ex centro elongate styli. Capsula glabra, membranacea, oblonga, trilobularis, trivalvis, straminei coloris, erecta. Semina plura, angulata, atra, nitida* Floret Majo & Junio. Semina maturefcunt sub finem junii & Julii.

CCV,

OPHRYS CORDATA. *Linn. fyfi. pag. 813. fior. lapp. pag. 247. num. 16. flor. fuec. pag. 315. num. 809. A&» up/. 1740. /%. 29. Gmel fib* 1. pag. 25* num. 23. ASK helv. z. pag. 70, tab, 6,*

Ophrys minima. Bauh. pin 87. prodr. 31. Rudb. el. 2. pag. 227. fg. 4.*

Ophrys minor alpina. Rupp. jen. pag. 238.

Epipactis cordata. Allion. pedem. 2. pag. i\$2.

Epipactis foliis binis, cordatis; labello bifido, postice bidentato Hall. hijl, helv. 2. pag. 151. num. 1292. tab. zst. fg. 4.*

Bifolium minimum, Bauh. hift. 3. pag. 534. Moris hijl. 3. pag. 489-

Pseudorchis minima bifolia, Moris, hi/t. 3. / ia. t. u fg. 4.*

Tenella & elegans plantula apud nos. dimidiata altitudine pædem raro excedit, in fylvis umbrosis subalpinis montis Gans obvia, radice perenni donata, constante ex fibris plurculis albicantibus, simplicibus, a tri-

bus ad octo uncias longis, & per mucos terramque tenuem horizontaliter protensis. Tota glabra est. Caulis herbaceus, erectus, angulatus, inferne pallidus, superne leviter purpurascens, infra medium foliis duobus oppositis ornatus, caeterum aphyllus* Etiam aliquoties folium unicum observavi; rarissime unum folium majus, & alterum magis inferius multo minus. Sunt vero folia triangularia, sessilia, nitida, obtusa vel acutula, integerrima, ad oras leviter undulata, patentissima, supra virentia, dorso glauca. Racemus terminalis flores a quinque ad decem pedicellos breviterque pedunculatos sustinet. Bracteae subulatae, breves, Germen fere subrotundum, celeriter incrementum, brevique maturum, cum flore adhuc infidenti per totam longitudinem dehiscit in sex valvulas, basi & apice cohaerentes. Petala sunt lanceolata, obtusula, patentissima; tria exteriora viridia; interiora duo paulo angustiora & purpurascens. Labium inferius trifidum, petalis longius porrectum, purpurascens; laciniis duabus superioribus brevibus, infra originem labii; intermedia longa & lobifida; sic ut labium etiam dici quadrifidum possit; laciniis omnibus linearibus *Si* acutis. Floret Julio.

CCVI.

Irt)MOEA LUTEOLA.

Semina ex Guatimala transmissa fuerunt. Planta annua in calendario floruit, sed perit sine fructu. Caulis volubilis, ramifusus, quadripedalis, obsolete muricatus, nec hoc ad oculum nudum, hinc scabriusculus, caeterum glaber, subangulatus, viridis. Folia alterna, petiolata, cordata, acuminata, inaequaliter & valde rariter dentata, glabra, Pedunculi communes
axil-

axillares, folitarii, erecti, foliis duplo longiores, bipartiti cum flore in dichotomiam, dein racemosi & subquadriflori, Flores inodori. Perianthii virentis nitidi & profunde quinquepartiti pars inferior est quinquangularis; latissime sunt lanceolato-lineares & erectae. Corolla calyce multoties longior, longe infundibuliformis, aurantiaco-lutea; limbo femiquinquefido, acuto, & breviter tubo. Filamenta petalo duplo breviora* Anthers oblongi, incumbentes, albi. Stylus filiformis, longitudine petali. Stigma capitatum, papillosum, obsolete bifidum, album. Forte mera varietas est *Ipomoea*? coccinea.

CCVII.

ORCHIS VARIEGATA.

Orchis radicibus subrotundis, spica brevissima; labello breviter quadrifido, circumferrato, punctato. *Hall, hist. herb. num. 1275, tab. 30.*

Orchis *militaris* *pratensis* *elatior*, floribus variegatis. *Seg. ver. 2* pag. 12^.*
tab. is//?. 3,*

Orchis *militaris*. *Riv> hex. tab. 15.*

Orchis *militaris* *minor*. *Ruppert, jen. pag. 295, tab. 6, Vaill. paris. pag* 149.*
tab. 31, fg. if.

Cynorchis *militaris* *pratensis* *elatior*, floribus variegatis* *Bauh. pin. pag.*
fti. prodr. pag. 28.

*Crescit in Austriae pratis, florens Majo. Bulbi gemelli, subrotundi, compressi. Fibra radicales crassa & breves. Scapus erectus, * dimidio ad totum pedem altus. Folia plura, inferiora approximata, acu-*

ta, ftriata, ex glauco viventia, tres uncias longa, unum raro lata, fumma vaginantia* Brakes longitudine germinis, acuminatae, ereftse, ftria'ts, pallide earner Spica brevior, denfa, florens fubrotunda, fru&eicensmagis elongata* Flores parum odorati. Petala quinque, omnia in cucullum ere&um conniventia, pallide purpureo-carnea; tria exteriora duplo longiota & lanceolato - acuminata; duo interiora lanceolafll - linearia & acutiufcula; fitque *hxc&* petalum exterius dorlale linea unica, intus atropurpurca, foris minus faturata , percurrit, dum tales duæ percurrunt petala exteriora duo lateralia. Neftarii cornu fubulatum, ftriatum, carneum, reftiufculum, germini parallelum > quo paulo brevius. Labium fuperius fanguineum. Inferius quadrifidum, petalis concolor, & totum adfperfum punftis purpureis, lobiis ad apicem ferratis; lateralibus oblongis; intermediis rotundatis cum denticulo inter utrumque; difco glabro.

CCVIII

ORCHIS MILITARIS, *Linn. fyl. pag. 809.*

Orchis radicibus fibrotundis; fpica conica''; labello quadrifido; brachiolis & peftore peranguftis. *Hall hijh helv. num. 1277. tab. 23.*

Orchis galea & aliis fere cinereis* *Bauh. hifi. 2. pag. 755,*

Orchis latifolia, hiante cucullo, major* *Vaill. paris.pag. 148* tab. i\$\$.fig*ti.*

Cynosorchis latifolia, hiante cucullo, major. *Bauh. pin. pag. Qo.*

Cum priore crefcit, eodemque tempore floret Bulbi gemini, elongate - fubrotundi. Fibrae radicales longiufcul^e , graciliores. Scapus ereftus, pedem vel fesquipedem altus* Folia pauca, viridia, lineatula, acutiufcula,

thtfcula, quinque uncias longa, fescunciam lata. Braſteae acutae, breves, purpureae, ere&ae. Spica oblonga, conferta. Petala omnia in cucullum ere&um connivent, foris purpureo - cinerea, intus purpura lineisque fatura-tioribus percurfa, acuta. Horum tria exteriora funt lanceolata; duo inte-riora lanceolato - linearia, prioribus paulo breviora. Neftarii cornu cine-reum, breve, obtufumjp compreffulum. Labium quadrilobutu cum denticu-lo inedio; lobis integerrimis, obtufis & faturate purpureis; difco pallido, muricato pilisque fafciculatis purpureis *te&o*. Uti variat colore floris ma-gis minusve purpureo, fie etiam flore albido occurrit.

CCIX.

ASTRAGALUS EXSCAPUS. *Linn. fyl. pag. 685. mant. pag. «75.*

Aſtragalus perennis, fupinus; foliis & filiquis hifpidis. *Buxb. cent. 3» p. a 1. u ZB. fig. 2»*

Glaux moritanum acaulon. *Bauh. pin, pag. 347. prodr. 147-*

Glaux lanuginofa montana acaulos. *Rupp. /en. * pag. 270.*

Sponte crefcit in Hungaria & Thuiingia, florens Majo & junio, fruftefcens Julio. Radix perennis, longe fufiformis, ramo uno alterovc aufta, perpendicularis, foris fufceicens, intus albida cum centro flavente, odoris naufeofi, faporis pauci; adulta tripedalis & fuperne plus minus un-cialis diametri, multiceps* Folia radicalia omnia, numeroſa, iemipedalia, alia procumbentia, alia erefta, tota villoſa, pinnata ex foliolis utrinque numero vario ad usque viginti cum impari, oblongo-ovatis, obtufis, in-tegerrimis, breviffime petiolatis; cofta terete, rubente. Sca^i axillares,

racemofi, a quinque ad novem flores fuftinentes & ipfos breviter pedunculatos, erefti, pilofi, femunciales, Bra&eae fubulatae, villofae. Perianthium villofum pallet > longiflimum, femiquinquefidum; dentibus fubulatis, ere&is, acutis, fubxqualibus. Corolla flava faturate, erevla. Vexillum cvinelforme, emarginatum, dorfo carinatum, patens. Alee oblongs, obtufae, vexillo breviores, ungue gracili & longo. Carina alis paulo brevior, emarginata, connivendo fupra unguem lanceolata, Filainenta diadei^ha, Anthera lutes. Germen lineari - oblongum, compreffum, dorfo glabrum, csterum villoium. Stylus apice ad angulum return incurvatum. Stigma obtufum. Legumen cymbaeforme, five ad alteram futuram carinatum, ad alteram depreffum & planum, albidum, pilofum, flyli parte acuminatum, inflatuo), biloculare, in futura carinata dehifcens, pendulum. Semina plura, oblongo-reniformia, glabra, cinereo - fufca* In planta culta caules nonnunquam adfunt pedales & procumbentes >

CCX.

CELSIA LINEARIS.

E feminibus ab illuftri Ortega fub hoc titula acceptis enatus in caldario fuit frutex elegans, fempervirens, & totus glaber; qui altero statis anno florere ccepit, fed maturum fru&um nondedit, Truncus lignofus, debilis, calamum cra&us, ftriatus, pallide fufceicens, tripedalis, pe** totam longitudinem emittens ranios numerosos & patentiffimos. Rami juniores vixent, fulcati & foliofiffimi^ Folia funt terna^ lanceolato - linearia, acuta, rariter ferrata vel integerrima, utrinque nitida, fubpetiolata, patentiffima, longiorabiuncialia. Pedunculi axillares, folitarii, uniflori, foliis breviores,

res,

res* uti haec terni. Flores inodori, calyce virente, corolla miniata cum fauce fanguinea, antheris & filamentis flavis. Corolla post explicationem haud 4iu plana manet, sed inordinate lateribus reflexa folet.

CAL. Perianthium pentaphyllum, persistens, petalo multo brevius; foliolis tuncolatis, acutis, erectis, subaequalibus.

^COR. monopetala, subrotata, inaequalis. Tubus brevissimus. Faux ampliata. Limbi quinquefidi lacinae subrotunda;, quarum duae superiores ceu labium superius parvas, infima ceu labii inferioris lacina intermedia maxima.

STAM. Filamenta quatuor, aequalia, brevissima, crassa, inclinata versus corollas lacinas minimas, glabra. Antherae subfagittatae, erectae, magnae, conniventes uti in Solanis.

PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, crassus, staminibus longior. Stigma obtusum.

PER. Capsula (subrotunda,

SEM. plura,

CCXI.

CONYZA CAROLINENSIS.

Arbustula quinquepedalis crevit sponte in Carolina, apud nos in caldariis, sempervirens, florens Majo & Junio, totainodora, & ingrata fapidula. Truncus erectus, glaber, fusco-cinereus, erectus, undalis diametri. Rami teretes, juniores tomentosi ac incani. Folia alterna, lanceolato-oblonga, acutiuscula, integerrima, petiolata, utrinque tomentosa mollia

lia & vifcidula, fupra virentia, fubtus albida, a quatuor ad fex unciaslonga. Ramuli florentes funt breves & oppofitifolii. Pedunculi communes in his axillares, multiflori, ramofi, ere&i, flores corymbofe fuftinent. Flos magnitudine & forma Senecionis vulgaris. Calyx tomentofulus pallide viret Faeminae albet. Anthera & limbus corollulae hermaphrodite purpurafcunt

CAL. communis imbricatus, cylindricus, in medio coar&atus; fquatnislanceolatis^ acutis, ereftis omnibus, interioribus fuceflive longioribus.

COR. compofita tubulofa, Corollulae hermaphrodite plufculae in centro. Faeminae numerofiflms circum hermaphroditas.

Propria hermaphroditis longe infundibuliformis, limbo quinquefido patulo.

Propria femineis fubcylindrica, limbo trifido patulo.

STAM. Hermaphroditis filamenta quinque, capillaria, breviflima* Writhe-ra cylindrica, tubulofa, quinquedentata.

PIST. Hermaphroditis germen oblongum. Stylus filifonnis, ftainibuslongior. Stigmata duo, patula.

Fasmineis ut in hermaphroditis.

PBR. nullum* Calyx connivens.

SEM. Hermaphroditis & famineis folitaria, oblonga. Pappus pilofus, feifilis.

REC. nudum, planum.

CCXII.

PTERIS CAUDATA. *Linn./pec. plant, pag. 1533. ft*

Filix faemina feu ramofa major, pinnulis anguftiflimis rariffimisque* *Sloan.*
UP. jam. i. pag. 101. tab. 63.

Eft haec planta, quam Linnaeus pro mera varietate Pteridis caudatae habet, quam tamen cum Sloaneo ab eadem ceu fpeciem diftinguere mallAi. Crefcit ffonte in infulis Caribaeis. In caldariis noftris floret a Julio ad Oftobrim. Radix teres, calamum & ultra craffa, fibris aufta, fufca, repens, in decurfu frondes elevens fpargas ereftasque. Stipes his femipedalis aut altior, teres, ereftus, glaber. Frons pedalis, bipinnata; pinnulis pinna- rum inferiorum inferioribus ipfis profundiffime pinnatifidis cum laciña termi- nante longiffima; laciniis omnibus linearibus, obtufulis, integerrimis, ad oras replicatis, intra quarum Ac enatam duplicaturam locantur flores nume- roffimi iub forma pulvereae globulorum mj^utiffimorum fufcefcentiuni, foras ex margine in longa linea prodeuntium.

CCXin.

MYRICA SEGREGATA.

Frutex tertio aetatis anno humanam jam attingens altitudinem, afta- tem fub dio, reliquam anni partem tranfigens in caldario, fempervirens, trunco ad bafin digitum craffb, cortice fufco, ramis totus brachiatus, ligno albido, ffonte cji fcit in America calidiore. Folia (unt oppofita, brevif-

M m

time

viffime petiolata, anguftius & longius lanceolata, acutiufcula vel obtufnla, integerrima, nitida, adoras parumper revoluta^ fupra faturate & fubtus pal- lide virentia, duas tresve uncias longa, ingrati & amaricantis faporis, om- nino liguftrina. Rami teretes, etiam juniores cinereo - fufcū Ex gemmis oppofitis fquamofis minimis racemi exeunt axillares, folitarii, femunciales, filiformes, ratnofi, glab'ri, e viridi flavescentes, meros gerentes $m^{^^}$ In his fquamae five bracteae funt oppofitae, ovatae, feffilifae, concavae, acutae, ciliataeque; ex quarum alis pedicelli exeunt folitarii, uniflori & patuli. In horto Schönbrunneni numerofae coluntur individual, quae pleraeque lolos ferunt flores mares; paucae praeter hos etiam plurimas feminas in diflin&is racemulis fimpliciffimis, fubfexfloris, brevioribus, fquamas quinque haben- tibus maribus fimiles, fed alternas &c deciduas* Character utrisque eft fe- quens, in quo fi racemus fquamofus dici poffit amentum folutum elongatum- que, exfurget ille Myrica? cum tantillo difcrimine, ut novum inde genus condere non fuerim aufus* Bacca faturate caerulefcit cum pulpa molli viridi- que, faporis ingrati. Semen cum virore fufcelcit.

Mas.

CAX* Squamae uniflorae, fupra defcripta?>

COR. nulla,

STAM. Filamenta a tribus ad fex, filiformia, patentiffima, longitudine pe- dicelli. Antherae ovatae^ fubdidymae, ereftas, obtufae.

PIST* Germen nullum. Stylus in quibusdam floribus lubulatus cum Stigma- te capitate

Egmina.

CAL# Squamae uniflorae, fupra defcripta»#

Squamae* dein aliae ab una ad quatuor, lanceolate, ad basin germinis sessiles perianthii adnatae, eidemque adhaerentes, rarius ab-
sentes*

COR. nullae

PIST» Germen ovatum. Stylus filiformis, crassus. Stigma capitatum, ob-
scure lobatum.

IEK. Bacca ovalis, glabra unilocularis.

SEM. unicum, teres, acuminatum, falcatum, striatum, scaberrimum, cor-
tice durissimo.

CCXIV.

JILTHEA NARBONENSIS*

In culta sub dio apud nos planta radix perennis, intus alba, & fo-
ris fordens[^] in cruralonga uncialis fiametri differtur. Caules annui, plu-
res[%] erecti, a quatuor ad sex pedes alti, ramosi, digitum crassi, teretes,
pilis stellatis albidis incani & scaberrimi, Talibus etiam pilis infertuntur
rami & venae principes duobus foliorum, Stipulae fimbriatae, acutae, ciliatae
Folia sunt alterna, petiolata, serrata, utrinque tomentosa, subtus magis
incana; infima quinqueloba & obtusissima; superiora palmata, trifida, acu-
ta, lobis lanceolatis cum lateralibus lobulo auctis. Ramuli (olvuntur
in pedunculos unifloros. Bractae ad hos fimbriatae & parvae. Calycis ex-
terioris & profunde fecti lacinae sex septemve lanceolatae & acutae; interio-
ris femiquinquefida lacinae? acutae & latiores; in utraque hirtulae* Corolla
ex purpureo rosea., calyce duplo longior, laciniis emarginatis. Antheras'

reniformes, atropurpureae. Stigmata alba. Arilli glabri. Floret apud nos Augusto & Septembri.

CCXV.

DOLICHOS GLADIATUS.

Planta annua & tota glabra in caldario apud nos crefcit, florens Augusto, lemna perficiens Novembri; ex zona torrida. Caulis volubilis, o&opedalis & ultra, teres, calamum craffus. Folia ternata, petiolata; foliolis ovatis, acutulis, quatuor vel quinque uncias longis. Pedunculi axillares, calamum craffi, pedales, incurvati, fupra medium denfe racemofi; pedunculis propriis breviffimis, ternis, craffis, cernuis, ortis ex nodo incurvato. Flores iua^eolentes, Brafteola ad calycem fubrotunda, omnium minima, caduca* Calyx tubulofus, pallide virens, bilabfatus; labii fuperioris longioris majoris & femibifidi lacinias fubrotundae & obtuffimse; labio inferiori tridentato, acuto & parvo. Co*rolla tota nivea, dum expanditur, brevi deinmagis minusve carneum colorem induit. Vexillum profunde emarginatum, obverfe cordatum, reflexum, alis longius. Ala; oblonga; obtusae, ereftae, concavae, anguftae, inferne callofae Carina dipetala, alis fimilis. Antherae in ftaminibus diadelphis flavescunt. Stigma fubrotundum. Legumen pedale ut plurimum, fed etiam quandoque duplo brevius, utroque tamen in cafu femper fescunciam latum, oblonguiffimum, obtufum cuni mucrone re&iufculo ex iutura interiore, ad hanc futuram quadrimargin^{um}, glabrum, fufcfcens, uniloculare, bivalve, polyspermum. Semina elliptica, compreffula, nitida, rufaque cum hilo cinereo, nidulantur in membrana. cellulofa alba.

CCXVI.

CCXVI.

CONVOLVULUS CRENATUS.

Sponte crefcit in Peruvia. Radix fuffiformis, albida, carnofa, gracilis, ^/fte in loco natali perennis, fed apud nos hyeme Temper Vnarcfcens* Caulis annuus, volubilis, a quatuor ad feptem pedes altus, parum ramofus, teres* Folia alterna, petiolata, bafi cordata cum lobis rotundatis & produftis, caeterum oblonga, obtufa cum mucrone in* nocuo, integerrima vel obfoletius repanda, plus minus duas uncias longa* Pedunculi foliis ^aulo breviores, axillares, folitarii, bifidi & biflori; inferiores fxpe indivifi & uniflori; ereftiufculi, in fruftu fuperne increffati. Calycis pentaphylli foliola funt ovato-acuminata, erefta, mutuo amplexantia. Corolla alba, infundibiliformis; tubo'longitudine calycis; limbo patentiflimo, fubcrenato, femiquinquefido: laciniis acumiffatis. Antheraefubhaftats, ochroleucae. Stigma bifidum, album; laciniis teretibus, craffulis, longiufculis* Capfula fubrotiinda, glabra, ftraminei coloris, l^ilocularis. Semina in quolibet loculamento gemina, glabra, nigricantia. Caulis, folia, pedunculi & calyces funt fericea, lubincana & moliffima. Floret in caldario Junio & Julio. Semina perficit Julio & Augufto* Semina ante pluculos annos transmiffa fuerunt fub titulo Convolvuli biflori, fed Linnaeana haec planta eflenequit, fi conferatur Linnxi defcriptio; cjuare novum tri-viale uornen impofui.

CCXVII.

GOMPHRENA BRASILIENSIS. *Linn. Jy/l. pag. 26\$. amen. acad. 4. pag. 310.*

Amarantho affinis brasiliiana, glomeratis parvisque flocculis.. Bryn, cent, pag. 111. tab. 52.

Caulis tripedalis, obsolete tetragonus, glaber, ramofus, digitum crassus, ad genicula incrassatus, perennis, erectus, debilis. Ramuli villosi, plerique annui. Folia sunt lanceolata-ovata, acuta, integerrima, opposita, breviter petiolata, glabra cum nervis utrinque ad lentem villosulis, a tribus ad sex uncias longa. Stipulas nullas. Capitula alia foliaria & axillaria, alia plura aggregata ramulos terminant, atque haec omnia pedunculis sustentantur brevifloro & villosis, aequibus diphyllis cum foliolis minutis; alia iterum in pedunculis ad unam alteramve unciam elongatis. Floret in caldariis nostris magnam anni partem. Flores albi.

CAL. Perianthium scariofum, triphyllum, erectiusculum, persistens: foliolis duobus lateralibus lanceolato-acuminatis, concavis. ad oras inordinate & acute incisus; Tertio extimo lanceolato, acuto, pauciferrato, duplo breviori.

COR* Petala quinque, etiam tantum tria; lanceolata acuta, -ferrata*-ciliata erectiuscula, externe villosula, calycis fere longitudine,

Nectarii monophylli femiquinquefidi & petalo duplo brevioris lacinae acuminatas, erectae, pauciferratae.

STAM. Filamenta quinque 9 &c.

CCXVII.

GOMPHRENA BRASILIENSIS. *Linn. fyfi. pag. 265. anon, acal 4. pag. 310.*

Amarantho affinis brasiliensis, glomeratis parvisque flocculis. *Bryn* cent. pag. in, tab. 52.*

Caulis tripedalis, obsolete tetragonus, glaber, ramifus, digitum crassus, ad genicula incrassatus, perennis, erectus, debilis. Ramuli villosi, plerumque annui. Folia sunt lanceolato-ovata, acuta, integerrima, opposita, breviter petiolata, glabra cum nervis utrinque ad lentem villosulis, a tribus ad sex uncias longa. Stipule nullae. Capitula alia foliaria. Si. axillaria, alia plura aggregata ramulos terminant, atque haec omnia pedunculis sustentantur brevifloro Si. villosis, aliquibus diphyllis cum foliis minutis; alia iterum in pedunculis ad unam alteramve unciam elongatis. Floret in caldariis nostris magnam anni partem. Flores albi.

CAI. Perianthium scariofum, triphyllum, erectum, peristens: foliis duobus lateralibus lanceolato-acuminatis, concavis, ad oras **inordinate** & acute mucis; lobis extimis lanceolato, acuto, pauciferrato, duplo breviori.

COR. Petala quinque, etiam tantum tria, lanceolata, angustata, ciliata, erectifera, externe villosula, calycis (ere longitudine).

Ke^arii monophylli femiquinquefidi & petalo duplo brevioris lacinae acuminate, erectae, pauciferratae,

STAM. Filamenta quinque, &c.

FIST.

- STAM.** Filamenta quinque, fubulata, erefta, petalis duplo breviora^ bafi in neftarium urceolatum coalita. Anthers oblongs, didyms, incumbentes.
- PIST.** Germen ovatuou Stylus filiformis, ere&us. Stigma trifidum, filiforme, patens*
- PER.** Capfula fubrotunda, membranacea, circumfciffa, uniloculafi?
- SEM.** circiter fex, lentiformia.

CCXIX.

IPOMOEAE LEUCATSTHA.

Sponte crefcit in America torrida; apud nos annuaplanta floret sftate in caldario. Caulis ramofus, volubilis, quadripedalis, gracilis, teres, inferne fordide purpuraicens *Sc fubafper*. Folia cordata, abeuntia in acumen obtuium, integerrima v el obiter repanda, glabra, petiolata, 'alterna* Pedunculi axillares, folitarii, erefti, teretes, glabri, unciales, uniflori. Flos inodorus, uncialis; calyce viridi pilisque raris imprimis inferne ciliato; corolla nivea; antheris purpureis; glandula germinis iulphurea; feminibus nigroferrugineis.

- CAL.** Perianthiumpentaphyllum, perfiflens: foliolis oblongis, acuminatis, erefris cum apice patulo.
- COR.** monopetala, iniundib^iliformis, calyce duplo longior; limbo patulo, feiniquinquefido, laciniis latis acutiufculis & brevibus.
- STAM.** Filamenta quinque, fubulata, fundo tubi corolls ?dnata, qua duplo breviora, ere&a* Anthers oblongs, incumbentes.

PIST.

PIST. Germen ovatum, pilis erectis coronatum, ad basin glandula circumdatum. Stylus filiformis, erectus, longitudine faminum. Stigma . capitatum, bilobum, echinatum.

PER. Capsula subrotunda, ad apicem pilifera, caeterum glabra, bilocularis.

SEM. in quolibet loculamento gemina, glabra.

CCXX.

CLITORIA BRASILIANA. *Linmfyft. pag. 660,*

Planta leguminofa brasiliana, pliafeoli facie, flore purpureo maximo. *Breyn. cent, pag. 78. tab. 32.*

Quantumvis hæc planta in caldariis noflris ljetiflime vegetet, Moresque producat copiofilimos, fructum tamen nulluni hue usque dedit. Radix perennis componitur ex tuberibus fuffiformibus albidisque. Caules annui, teretes, graciles, volubiles, glabri, ramofi, a quatuor ad feptem pedes alti. Folia infima funt fimplicia, Cordata vel ovata, acuta, petiolata; foliolis oblongis, acutis, integerrimis, utrinque ad lentem minutiffime villofulis, hinc ad tadum fcabriufculis. Pedunculi axillares, folitarii, biflori, petiolorum plus minus longitudine. Brafteolae ad pedunculos proprios subrotundae, acutae & concavae; ad flores>ipfos magis ovatae & gemellae. Perianthii bilabiati afperi & virentis lacinia& funt subulatas; tres in inferiori labio, in fuperiori minus profunde incifo duae. Vexillum amplillimum, intus caeruleopurpureum cum macula longitudinali media flavescente; foris autem pal lens; ceterum ilrufturam generis habet. Alas oblongs & carina ejusdem cuai vexillo coloris* Filamenta coalita novem & unum (implex.

Anthers flavae. Germen lineare. Stylus versus superiora latefcit & cpra-
primitur. Stigma obtufum, fubtus barbalulum, Semina ex Carolina trans-
miffa fuere fine titulo.

CCXXL

PASSIFLORA LUTEA. *JJnn_t fyjt. pag. 8*2. Gron. virg. pag. 140**
Brown, jam. pag. 328. num, 7.

Flos paffionis minor, folio in tres lacinias non ferratas minus profundas di-
vifo. *Shan. hifLjam* 1. pag. 231,*

Clematis paffionalis triphyllos, flore luteo* *Moris hifi. 1. pag, 7. / i. u*
s. f. 3.

Ex r a dice perenni, ramofiffima & reptante caules quotannis herba-
cei egrediuntur plures, teretes, graciles, ramofi , quadripedales & ultra,
juniores Cuti etiam pedunculi & petioli) adj lentem pilofuli. Folia al-
terna, petiolata, eglandulofa, bafi cordata, femitriloba, glabra; lobis in-
teggerrimis, acutiufculis, latis. Pedunculi ad petiolos & cirros laterales,
oppofiti vel folitarii, ante florefcentiam erefti, dein patentiffimi, graciles,
uniflori, petiolis longipres. Flores erefti; fruftus penduli; atque illi parvi
& fuaveolentes. Perianthii foliola oblongo - lanceolata, trinervia, acuta,
reflexa vel patentiffima, virentia. Petala pallide ochroleuca, acuta, caly-
ce anguftiora. Nettarii corona exterior patentiffima flavescit, Germen gla-
bruin viret. Anthers ex flavo virent, Floret apud nos in caldariis A»i-
gufto, led fruftum Jiuc usque ferre recufavit, quem in infulis Caribaeis vi-
di atrum, ovatum & parvum.

CCXXIL

^ESCHYNOMENE SESBAN, *Linn. fyfi.pag. 671.*

Sosban, *jBp. agypt. pag> 4*- tab. 24.*

Dolichos Sesban. *Forfk. agypt. pag. 134.*

Emcrus filiquis duabus longiffimis. *Bum. zeyl. pag* £3, tab. 41.*

Galega aegyptiaca, filiquis articulatis. *Bauh. pin. \$\$2.*

In caldariis noſtris annua planta floret Julio & Auguſto, fruſtumque perfidit O&obrũ Radix ramofa valde & albida* Caulis ereftus, fexpedalis, digitum minimum craffus, teres, glaber, rore glauco teftus, ft rig is raris fparſisque aculeatus, inferne purpurafcens, ex foliorum alis ramofus^ alba medulla far&us* Folia pinnata fine impari, cujus loco eſt fetula, modo brevior , modo longior; alterna, breviter petiolata, orta ex callo decurrentq, glabra, a tribus ad novem uncias longa, plana; coſta fubtus aculeis albis hiſpida; foliolis utrinque numero incerto plus minus viginti, breviter petiolatis, oblongis, obtufis cum mucrone innocuo, nonnunquam emarginatis, integerrimis, inermibus. Flores inodori, modo gemelli in planta juniore, dein plures ex racemis axillaribus patentibus foliisque multo brevioribus oriuntur. Perianthium pallide viret Vexillum intus luteum, extus flavefcit punftisque & lineolis atroviolaceis vel ferrugineis valde variegatur. Alae & carina funt lutes. Calyx omnino ad charaſterem Linna?anni eſt; caetera adinodum ab eodem defleſhmt. Nam vexillum obverſe¹ cordatum & planum fie ſupra calycem refleſtitur, ut ungui fuo evadat parallelũ, Alae funt oblongae, obtuſiffims, apice lateſcentes, ereftas, & Ion* gitudine vexilli. Carina ovalis, fubfalcata & obtuſiffima fitum & longitudi»

nem habet alarum, Filamenta sunt diadelpa, simplex & novemfidum, Pifillum totum glabrum* Legumen glabrum, teres, arcuatum, plus minus-femipedale, gracile, ad femina fmgula torulofurn & ifthmis interceptum, uniloculare, bivalve, nec articulis difcedens. Semina pluriina, terstia^ lufcefcentia, folitaria in qiolibet inter ifthmos loculo, Utiliffimam Agyptiis plantam, ait Forfkalus, ad fepes vivas circa hortos & agros; denfeque & cito excrefcere praefantiffimo adfpe&u. Utilem dein foco, & hanc bb caufam copiofe cultam. Semina feri in foffulis, potiffimum ad canales; large enim irrigari. Annuo intervallo caulem attingerealtitudinem quatuor ulnarum, craffitiemque brachiü Poft tres annos ramos adultos effe utiles# Ut itaque in iEgypto frutex fit

CCXXUL

SOLANUM PERUVIANUM. *Linn. fyfl. pa**. 224-

Lycoperficon pimpinellae fanguiforbae folio. Feuill peruv. S.pag. 37^ tab. 25.

CeleberrimusLudovicusFeuilleéin Peruvia ad littora maris innafcens faxorum fifiliris detexit hoc elegans Solanum. Apud nos in caldariis floret Septembri & Oftobri, fed fructum nedum dedit* Caulis bipedalis, teres, gracilis, jam ab ipfa bafi ramofus, debilis, inferne una cum ramis fruticulofus lignefcens &c perfiftens, dein herbaceus & villofus. Folia sunt alterna, petiolata, vix Liuncialia, tomentofa, incana, interrupte pinnata cum impari; foliolis oblongis, obtufiufculis, fubieffilibus, fuboppofitis, venofis, ferrato - crenatis, undulatis, femuncialibus; foliolis interpoftis fubro* iundis 8L minutis. Stipule ad petiulos gemellce, fubrotundaj, exiguae. Tales

les etiam bra&eolae ad pedunculos. Sed h* & iliac & foliola ilia interpofita nonnunquam defiderantun Racemi terminates, qui dein evadunt laterales, a me vifi tantum fimplices, nee bipartiti, villofu Perianthii fere ad bttfirrusque quinquefeti foliola funt fublinearia, acuta, patentiffima, incana & villoia. Corolla rotata, femiquinquefida, acuta, ampla, calyce duplo longior, lutea, Antherse lutes. Stylus albus cum ftigmate virente,

CCXXIV.

SOLAKUM VIRGINIANUM. *Linn. fyl. pag. 225^*

Solanum americanum laciniatum fpinoffimum. *Dill elth. 2. pag. 360. tab. zfy. fig. 34*-*

Solanum annuum vjrginianum nigricans fpinoffimum fiore caeruleo. *Plukn* aim* pag. 351, tab. 62. %. 3,*

Ex radice annua caulis erigitur breviffimuS/fcilicet mox in ramos duos principes horizontaliter patentes divifus, ipfos tandem ramoffimos, fie ut tota planta fupra terram extendatur, ut % non capiam bipedalem altitudinem caulis apud Dillenium. Caulis & rami funt teretes, hie illic obfolete angulati, glabri, aculeis fubulatis reftis longis albidis nitidisque armati; quales etiam petiolos, folia utrinque, pedunculos & calyces plurimiobfident Folia funt alterna, longe petiolata, pinnatifide finuata, acuta, finibus obtufis, laciniis acutis & ipfis lubfinuatis, glabra, faturate virentia cum venis pallidioribus. Raceraimei, foliis breviores, flores fuffinent a quadr ad o&to. His calyx viridis profunde fecatur in quinque lacinjas lanceolatas & acutas. Corolla femiquinquefida ex csruleo purpurea eft. Bac-

cae globosae, globosae, immaturae ex viridi albidoque vanae (quod etiam in aliis Solani speciebus aliquot observavi) ad maturitatem haud perveniunt.

CCXXV.

SOLANUM LANCEIFOLIUM.

Sponte crevit in America meridionali. A pud nos semper virens, florensque totam statum in caldariis; sed fructum non tulit. Caulis pollicem crassius, teres, erectus, lignosus; cortice vestitus fuscocinereo, superne debilis, decempedalis, ramulos, superne viridis nitidusque. Tales etiam rami, qui debiles magis minusve propendent, nisi sustineantur a vicinis, in integrum perennantes. Aculei in caule & ramis numerosissimi, breves, recurvi, ex lata compressa basi subulati, valide pungentes, apice aurantiaci. Folia gemina, petiolata, lanceolata, utrinque acuta, integerrima, utrinque nitida & ob piles stellatos albos fereque ad folium microscopium conspicuos (qui etiam caulem ramosque obfidunt) parumper ad tactum scabra, facie atrovirentia & inermia, subtus dilutius virentia & ad folium nervum medium aculeata, a quatuor ad octo uncias longa. Petioli plus minus lescunciales & aculeati. Racemi laterales, asperi, inermes. Calycis profunde fecti, brevis & virentis lacinis sunt lanceolatae - acuminate & patulae. Petali albi & profunde fecti lacinae sunt lanceolatae & acutae. Antherae lutes, stigma virens.

CCXXVL

50 LANUM CAROUNENSE, *Um.fyft, pag. 225. Cliff, pag. 6u*

Solanum carolinense spinosum, boraginis floribus spicatis. *Dill elth, 2. pag[^] 362. tab. 269. fig. 348.*

Elegans planta suffruticosa apud nos in caldariis late vegetat, florens aestate, led fructum huc usque negavit. Radix perennis, albida, longa, calamus crassa, ramosa, repens. Caulis bipedalis, flexuosus, subereftus, teres, calamus crassus, bast tantum perfertens, ramosus, pallidius virens, una cum ramis valde pilosus, tum aculeis subulatis rectis sparsisque armatus, dein etiam pilis stellatis fevilibus albisque tectus. Folia sunt alterna, oblonga, acuta, in lobos lanceolatos acutosque per longitudinem incisa, utrinque ex incano virentia, mollia ac tomentosa, ad iolum nervum medium rante aculeata superne; subtus etiam prsterea[^] ex principibus venis; femipedalia; petiolis aculeatis & hirsutis. Recemi laterales & terminales, qui dein laterales evadunt, simplices, multiflori, elongati, patuli, una cum calycibus hirsuti, csterum inermes. Perianthii profunde fecti lacinias sunt lanceolatas & acuminate Petali modo nivei, modo caerulei, modo albo caeruleoque varii, modo iterum primo nivei, dein caerulei, &c femiquinquefidi lacinae sunt femiovatae & acutae. Anthers lutes. Stigma viret. Non puto specie differre a planta Dillenii, quam etiam colimus in caldariis nostris.

CCXXVII

SOLANUM NODIFLORUM.

Crescit in insula Mauritiæ, apud nos floret integrum annum* Frutex inermis, erectus, decempedalis, glaber, debilis; ramis teretibus, subdichotomis, erectis, ad divisiones nodose incrassatis. Folia alterna, petiolata, ovata, acuta, integerrima, tenuia, utrinque virentia, venosa, basi per petiolos plus minus decurrentia, longiora femipedalia. Pedunculi communes filiformes, fasciatae, patuli, teretes, virides, umbellati ^ laterales ex nodis ramorum infra folia. Pedicelli proprii plus minus sex, uniflori, filiformes, unam tertiam unciae longi. Flores parvi, Calycis minuti & virentis foliola oblonga, obtusa, plana. Petalum album, basi flavescens, rotatum, profunde quinquefidum; laciniis lanceolatis, %cutis, patentissimis# Antherae luteae. Bacca globosa, pifelli magnitudine, atra, glabra, lucida. Semina albida* Ab incolis malaico nomine vocatur *Bret*> coliturque pro oleo.

CCXXVIII

CYNANCHUM CAROLINENSE-

Radix perennis constat cruribus fasciculatis, albidis', teretibus> calami columbini crassitie. Caulis unus alterve annuus^ hinc basi nequam suberosus^ volubilis, teres, quadripedalis, inferne purpureus, caeterum viridis, hirsutus. Folia opposita, patentia, petiolata, plana, longe cordata, acuta, integerrima, venosa, supra villosa, iustus & ad
 eras

oras hirintula, tres quatuorve uncias longa, petiolis vix uncialibus, villo-
 fulis cum interperforis rariter pilis* Pedunculi communes folitarii, alterni,
 laterales inter petiolos, horum circiter longitudine, teretes, eretti, villo-
 fuli, apice subumbelliferi. Bractea tabulate, parvae. Flores inodori, plus
 minus septeni, pedunculati. Aetatem agit apud nos sub dio, & floret Au-
 gusti & Septembri, Frustrum adhucdum desideramus. Petala facie badia,
 subtus ex badio pallida, utrobique tamen fordide, turn facie ad lentem ru-
 gofula. Calyx viret Nectarii tubus inferne pallet, iuperne badius. Ejus-
 dem lacinis sunt atrae. Bractes vaginales sunt atropurpureae. Antherae fla-
 vent. Maxima affinitate jungitur cum Cynancho suberoio Linnæo, sed nec
 fructum illud caulem minime suberosum habet, nec prenentem quidem; turn
 corollam obtusissimam, quam in suberoso describit & delineat Dillenius cu-
 pidatam. Germen muricatum indicare videtur futurum fructum similem fructu
 Cynanchi suberosi apud Marcgravium, Characterera inveni sequentem

CAL., Perianthium quinquepartitum, patentissimum; laciniis angustie lanceo-
 latis, acutis, villofulis, ad apicem ciliatis.

COB., monopetala, rotata, patentissima, quinquefida; laciniis lanceolatis,
 obtusis, planis > calyce ferine triplo longioribus.

Nectarium campanulatum, parvum, ex fundo corollas ascendens;
 tubo pentagono; limbo quinquepartito in lacinias triangulares, ad
 latus utrinque cornutas, crassas, & genitalibus incumbentes. Vagi-
 na germen circumdans dividitur superne in quinque bracteolas in-
 tus ad basin bifaccatas & apicibus (vis fructuati incumbentes*)

STAM. Filamenta decem, congenerum situ & figura.

FIST, Germina duo, ovata, hinc plana, illinc convexa, muricata; abeuntia in stylos duos fubulatos; quibus est stigma commune difcoideum, pentagonum, in superficie fulco transverso exaratum.

PER. & SEM. . • .

CCXXIX.

ASCLEPIAS CITRIFOLIA.

Crescit in America. A pud nos sub dio floret Julio, hyetnem ageas in tepidario, nec fructum huc usque dedit. Tota laefcit. Radix perennis, carnofa, alba, digitum crassa & longa, fibris aucta. Caules annui, erecti, simplices, teretes, pedales, ad lentem villosuli. Folia opposita, petiolata, ovato-lanceolata, acuta, ad oras repandor-undulata, firmula, supra pallidius virentia & glabra, subtus glauca & ad lentem pilosula, quadriuncialia. Umbella terminalis cum axillari sepe una alterave, hemisphaerica, erecta, rigidula, se denla, ut petala florum (ibi mutuo incumbentia) transirent oculis negent. Flores albi magnitudine & figura partium exacte congruunt cum floribus Asclepiadis curatavica^

JCCXXX.

CALEA ASPERA-

America meridionalis patria ^ft# Apud nos in caldariis late viget, florens totam sftatem, modo annua^ modo hyeme inferne persistens* Non potest esse Calea linnasi jamaicensis, cuius Amaenitatibus academicis adferi-

Luntur

buntur caules teretes, corolla fanguineo-lutes, &c* Nee effe Calea oppositifolia, cui spicae /subeffiles ovatae & congestae. Nee tandem Calea fo-
 uaria, cui folia minuta, & alia. Novam igitur credidi, & dixi asperam,
 quia tota alpera est. Radix ramosa, fibrosa, fordide aliens, inodora, &
 parum sapida» Caulis unicus, vel ab ipsa bad ramosus, a duobus ad quin-
 que pedes altus, tetragonus, in altioribus individuis etiam una compressus,
ereRus, viridis cum maculis atrofanguineis. Folia sunt opposita, petiolata,
 caulina majora deltoidea, reliqua lanceolata, acuminata, insqualiter
 ferrata, subtripplinervia, venosa, femipedalia, ad pedunculos five ramos
 ultimos quandoque folitaria absque oppositione. Pedunculi elongati, fere
 aphylli, tetragoni, terminales in caule & ramis, modo simplex, modo
 parum divisi. Flores inodori, hemisphaerici. Calyx viret Corolla al-
 bet. Anthera nigra in principio extra corollulara eminet, dein intra hanc
 elongatam conniventemque includitur. Pappi letae albae ante feminum matu-
 ritatem decidunt, fere jam una cum corollulis, unde femina pappo destituim-
 tur. Paleae in flore virides, in fructu fufcescunt. Odor plants nullus; fa-
 por paucus & ingratus,

CAL/coimmunis subimbricatus; squamis lanceolatis, acutis, planiusculis,
 patentiflimis*

COR« compofita, uniformis, subtus plana, supra convexa, calyce duplo
 longior. Corollulae hermaphroditae plurimae, squales.

Propriainfundibuliformis; tubo cylindrico, incurvo; limbo quin-
 quefido ex laciniis lanceolatis, acutis, erectis.

ST^AM. Filamenta quinque, capillaria. Anthera cylindrica, tubulosa.

PIST. Germen turbinato-oblongum, tetragonum. Stylus filiformis, longi-
 tudine corollae. Stigmata duo, revoluta, corollam superantia,

ip*

OBSERVATIONS*

PER. nullum. Calyx immutatus.

SEM. folitaria, oblonga, tetragona, truncata. Pappus ex fetis paucis, longitudine palearum, caducus.

RBC. convexum, paleaceum. Paleae oblongae, introrsum mucronatae, concavae, omnes aequales.

CCXXXI

GALEGA CAPENSIS.

CAT*. Perianthium monophyllum, campanulatum, femiquinquefidum; dentibus lanceolatis, subaequalibus, acutis; tribus exterioribus erectis; duobus superioribus minus profunde incisus & ad dorsum vexilli reflexis.

COB., papilionacea.

Vexillum subrotundum emarginatum, convexulum, amplum, ex ungue erecto breviter ad angulum reflexum*

Alae oblongae, obtusae, concavae, erectae, lateribus anticis patentibus, posticis sibi mutuo ad vexillum incumbentes, fere longitudine vexilli.

Carina falcata, acuta, brevis.

STAM. Filamenta decem, diadelpa (implex & novemfidum) fitu **pauciflori***
Antherae subrotundae

IST. Germen oblongum, teres, villosulum, erectum. Stylus ad angulum **rectum** ascendens. Stigma subrotundum, apice barbato.

PER.

PER. Legumen lineare, teres, réctum, ad femina torulofum, uniloculare, bivalve.

SFM. plura, teretiufcula, fubrenifortnia.

Ad Proraontorium bonae Spei ffonte creícit; apud nos in caldariis lactius viget, florens Julio & Augufto, perficiens femina Septembri & Oftobri. Radix fufiformis, albida, bafi fibrillis autta, calamum craffa & ultra. Caulis vel ex ipfa bafi ramofus, ad lentem una cum ramis inferioribus villofolus, ceterum glaber, teres, totus procumbens cum ramulis ultimis adfcendentibus, fuf&uticofus. Folia iunr pinnata, plerumque ex quinque vel quatuor jugis cum impari terminante, longius petiolata, alterna, glabra; pinnulis oblongis, oppofitis, obtufis, integerrimis, breviter petiolatis. Stipulae fubulatsE, parvs. Racemi oppofitifolii, graciles, femipedales, pauciflori tamen, fcilicet ad diftantias ferentes fuperne flores gemellos aut (olitarios, fuceffive prodeuntes. Calyx ad lentem villofolus viret. Corolla tota rubra eft. Anthers fordide luteae. Legumen ad lentem villoium. Semina fufco nigroque varia.

CCXXXII.

SANICULA MARILANDICA. *Um.Jyft. pag. 272. Gron. virg pag. 4*.*

Sanicitla marilandica caule & ramulis dichotornis, echinis minimis in eodem communi pedunculo ternfs. *Raj, fuppl* &60.*

Lappula fere umbellata, afrantiae foliii, virginiana. *Plukn.mant, 114.*

Floret apud nos Julio & Augusto, femina perficiens Octobri. Tota glabra est* Radix perennis constat fibris crassis, albidis, sapore petrofelini. Caulis annuus, erectus, plus minus bipedalis, calamus crassus, striatulus, totus ramis alternis ornatus, ad summitatem trichotomus, ramis dichotomis cum umbella in divisionibus. Folia radicalia plura, longe pretiolata, ternata, acute ferrata, acuta; foliolis subrhombis, subfifilibus; intermedio superne trilobo; lateralibus bipartitis in lobos etiam subtrilobos adinflar folioli intermedii. Caulina inferiora alterna, radicalibus familia, sed acutiora & minora* Summa caulina & ramea ad divisiones opposita, ferre fessilia, ternata, ferrata, acuta, at vix lobata. Umbellae pedunculatae, simplices, pauciflorae. Flosculi mares breviter pedicellati Feminae fessiles. Involucri folia pauca ovata & acuta, nonnunquam lobata. Perianthii pentaphylli foliola lanceolata, acuta, concava, erecta, viridia, longitudine corollae. Petala alba, acuta, inflexa, erecta. -Antherse pfifilidas didymae. Germen hispium, inferum, Styli duo, filiformes, erectiufculi, petalis paulo breviores. Stigmata simplicia, obtusa^ Fructus compressus - subrotundus, echinatus, fuscus, parvus, separabilis in duo femina.

CCXXXIIL

MESEMBRYANTHEMUM CORDIFOLIUM. *Linn. ftjl. pag. 468**
Linn, fupph pag. 260.

Plantafruticosa, sempervrens, adspeclu tamen herbacea, caule foliis calycibusque excavata punctis innumeris^ & hinc ad tunc scabriufcula, csterum glabra, apud nos aestatem sub dio, byemem in tepidario transit,

figit, florens totam aetatem. Caulis obfoleto tetragonus, calamus crassus, pedalis & ultra, erectus, ex omnium foliorum alis brachiatus; hinc rami infimi toti proftrati, tandem ipso caule longiores. Folia opposita, cordata vel ovata, acuta, integerrima, petiolata, carnosula, nitida, laetevirentia, longiora biuncialia. Pedunculi uniflori, breves, crassi, folitarii, in principio terminates; sed qui deinde evadunt axillares ad ramum futurum, aut etiam locantur in eorundem dichotomia, prouti vel unicus vel oppositi gemini ramuli ex foliorum alis egrediuntur* Germen turbinatum, punctatum. Perianthii tetraphylli foliola opposita duo lanceolata, alia duo ovata & majora. Fetala faturate purpureorubra, calyce breviora* Styli quatuor. Capsula tetragona, quadriocularis, quadrivalvis. Semina nigrofusca, punctata.

CCXXXIV.

GNAPHALIUM EXIMIUM M. *Linn. Jyji. pag. 745. Linn, mant. pag, 573**

*Elichrysum africanum, foliis lanceolatis integris tomentosis decurrentibus capitalis congestis ex rubello aureis. Edw. av. pag. 183» tab, 183**

Frutex speciosissimus ad Promontorium bonae Speis ponte crevit. Caulis erectus, ramifusus, digitum & ultra crassus, lignosus, teres, una cum ramis albo tomento dense vestitus foliisque totus testus. Haec sunt imbricata, longe ovata, acuta, sessilia, integerrima, erecta, utrinque dense tomentosa incana molissimaque, nervo dorsali instructa, ceterum nervis aliis venisque destituta, coriacea, duas plus minus uncias longa, numerosissima. Pedunculi folitarii egrediuntur ex summorum foliorum alis, simul corymbum forman-

formantes, fescunciales, teretes, erecti, tomentosi, foliolo fparvo uno, alterove adinfar brakes vestiti, plerumque biflori, etiam triflori, rarius uniflori. Flores fubrotundi, inodori, digitum craffi, aut ipfi etiam brevity pedicellati, aut feffiles. Calycis fquamas numerofiffimae, ovatae, obtusae?« concavae, imbricatae, nitidiffimae, glaberrimae, icariofas, eleganter & latu-
ratiffime purpurea?, tandem partim in fordentem flavedinem tranfeuntes. Co-
rollulae albids?*

CCXXXV.

KIGGELARIA INTEGRIFOLIA.

Migravit hsc arbukula quinquepec^{alis} ex horto Hagenfi Schwenkiano in hortum Caefareum Schönbrunnensem, empta fub titulo novae Rha&mi fpeciei. Adeu^{fimilis} eft, dum floret, Kiggelaris africanae man, iitadprimum adfpe^{um} eandem quis crederet, nifi folia videret non ferrata. Quantumvis flores obfervaverim hermaphroditos omnes, nullus tamen vel fructus ^{gcipientis} indicium dedit, ut fnt forte hermaphroditi fteriles, qui loco mafculorum inferviunt Ad Kiggelarias Igitur reduxi, donec cognitio fructus conjefturam aut firmet, aut emendet, In caldario fempervirens floret Augufto & Septembri. Rami teretes, juniores villofi. Folia funt lanceolato-oblonga, acutiufcula, integerrima, breviter petiolata, alterna, firma, craffa, utrinque ad lentem fericeo - villola, tres quatuorve uncias longa, fubtus laeteviridia, fupra atrovirentia, ad lucem reticulato - venofa. Racemi axillares, folitarii, circiter oftoilori, erectiufculi, ad lentem villofuli, unciales» Flores ex pedicellis propriis cernui, fubfecundi, inodori; calyce hirsuto, corollas concolorej petalis craffulis, fulphureis, glabrisj antberis pallidis
cum

cum linea media fusca; & germine hirsuto. Brakes parvae, acutis, deciduas. Floribus hujusce individui arbuticulis fuit frequens character.

•~~£~~AL. Perianthium monophyllum, femiquinquefidum, patulum, corolla duplo brevius; laciniis ovatis, acutiusculis, ciliatis, planis.

COR. pentapetala, rarius tetrapetala; foliolis lanceolatis, acutis, simul corollam campanulatam formantibus.

Neftarii glandulis nullis.

STAM. Filamenta circiter viginti, crassa, brevissima, receptaculo communi inferta. Antheris oblongis, erectis, superne hirsutis, ad apicem utroque latere dehiscentes.

PIST* Germen subrotundum, superum^ Styli duo * crassi, patulissimi Stigmata obtusa, simplicia*

~~PER.~~ & SBM. • . .

CCXXXVI

IPOMOEIA PENTAPHYLLA. *Unn./pec. pi edit. i. pag. 162. Linn, hart. up/, pag. 39.*

Convolvulus pentaphyllus. *Linn- fyfi. pag. «oa» & rm. fpec. pi edit. s. pag. a a 3.*

Convolvulus americanus villosus pentaphyllus & heptaphyllus major, *Hem* hgd. pag. 183. tab. 185**

Elegantem hanc plantam fepissime obviam habui in fruticetis apricis infus Martinicis, quae tota longe obducitur, nee habitum in caldariis nostratibus

tibus ullo modo mutavit, annua hie femper, forte longsvior in patria. Jam a triginta annis cum in CaesareiSj- turn in Botanici horti caldariis fsepenumero ex:femine multiplex enatafuit, vegetavit Temper omnium Uetiffime, led perii* lesnper ad primum hyemis adventum fine ilore. Anno demum 17871 radiis folaribus maxime expofita, .& aqua copiofa, cujus- eft fitientiflima, contimso irrigata, caule intra fex menfium fpatium jam ad oſto & triginta pedes elongato, produxit menfe Oftabri plurimos flores, paucosque dein maturos fructus* Sloanei^ Linnaeo citatum fynonymum omifi; non .eniin flocneana planta in naftram quadrat, nee radice donatam tuberofa, nee pilis .pungentibus, nee feminibus hurfutis. Plumieri autem a Linnseo addufta varietas meretur, opinor, ob folia denticulata dici fpecies diftincta^ Brades duae magns, calycem a Linnaso inclidere didae, funt calycis ipGirs foliola duo extima. Laſ^e candido tota fcatet. jladix .conjflat plurimis fibriflongis, fordentibus, vix pennicolumbinae craffitie. Caulis ypicus_f fte- res, volubilis, longus, ramofus; tandem bafi digitorum craffus, glaber, cinereo- fufcus & adfpeftu lignefceiis; caterurn purpurafcens, calami craffitie, pun- ftatus & pilis longioribus denfe teclus. Rami juniores virides & graciliores/ Folia funt digitata, akerna; petiolis plus minus longitudine foliorum, ter- e- tibus, hurfutis; foliolis lanceolatis, acuminatis, integerrimis, feffilibus, ru- gofis, pilofis, in foiiis majoribus fuperne latefcantibus. Pedunculi axilla- res, folitarii, teretes^ hurfuti, plus minus quadriunciales, fubdichotomi, a tribus ad feptem flores ut plurimum fuffinentes. Pedicelli proprii fescun- ciales., hirtiti. Calycis j)entaphylli foUola funt lanceoJata, acuta^ oiutuo' incumbentia; exteriora longiora, magis minusve .purpuraicontia, punftata & infra medium hiriuta; interiora fere glabra & excoloria. Corolla infun- dibuliformis, alba, calyce longior, margine obfoletius quinquelobo cum iabis denticulo acutis. -AntheicE niv.ea?, liaeares, erefta?, Stigma capi- tatum>

tatum, didymum, papillofum. Germen flavescens & glabrum ad basin circumdatur glandula flava & quinquefida. Capsula subrotunda, glabra, bilocularis, Semina in quolibet loculamento bina, subrotunda, glabra, fo-
 ^cescentia cum hilo albo.

CCXXXVII

COREOPSIS LIMENSIS.

Planta suffruticola, bipedalis, in caldario apud nos flores a Septembri producens ad Novembrim, femina matura Decembri, Caulis teres, tomentofus, calamus & ultra crassus, ramofus. Folia sunt alterna, petiolata, obtusa vel acutula, late ovata, subtrinervata, integerrima vel obfolete denticula^, utrinque tomentosa & firbincana. Pedunculi terminates, elongati, erecti, teretes^ villofi, subdivisi Flores odorati* Calyx villofus viret. Corollas radius saturate flavet. Corollulae diici sunt luteae. Antherae rufescunt Stigmata sunt lutea. Paleae extims virent, interiores scariofas albescunt Semina nigricant cum ciliis albis. Haec ab aliquot annis saepius mihi missa fuerunt sub titulo Enfeliae liinensis; sed non mihi videtur a Coreopsi avelli posse; uti patet ex totius fructificationis caractere subjun&*

CAL» com munis imbricatus, polyphyllus, persistens; foliolis lanceolatis, acutulis, planiusculis, patulis, interioribus longioribus.

Con. composita radiata, Corollulae hermaphrodites in disco elongato numerose. Feminae circiter decem in radio.

Propria hermaphrodites longe infundibuliformis; limbo quinquefido; laciniis lanceolatis, revolutis.

Faeminea ligulata, difformiter bifida, trifida vel quadrifida; laciniis latis, reflexis»

STAM. Hermaphroditis filamentosa quinque, capillaria, brevissima. Anthera cylindrica, tubulosa, quinquefidata.

PIST. Hermaphroditis germen inferum, compressum, cuneiforme, ad verticem & latera ciliatum. Stylus filiformis, longitudine filamentum. Stigma bifidum, crassum.

Faemineis Germen ut in hermaphroditis. Stylus nullus* Stigma nullum.

PEK. nullum. Calyx immutatus.

SEM* Hermaphroditis foliaria, cuneiformis, compresso-plana, bicornis, ferricea.

Fsminis nulla,

REC» convexum, punctato-tuberculatum, paleaceum. Paleae fere > acutissimae breviores.

CCXXXVII.

MIMOSA TAMARINDIFOLIA. *Litm. Jyfl. pag. 917. Mart. pag. 503.*

Acacia aculeata, flore albo, foliis tamarindi. *2km. Jpec. pag. 17. ic. pag. 4. tab. 7.**

In caldariis nostris floret aestate, sed fructum nondum tulit. In Caribaeis insulis arbutula sponte crescit. Caulis & rami teretes, glabri, aculeis fuscis rectis nigricantibus parvisque armati. Stipulae ad folia & bracteae ad pedunculos sunt cordatae, acutae, ferrugineae & pallide virentes, in ramulis

novellis rubentes. Folia bipinnata; faepius quadrijuga, etiatn quinquejuga & trijuga; pinnulis numero incerto plus minus duodecim, linearL-oblongs, acutulis, glabris, fubfeffilibus, parvis, Racemi laxi, terminates & pxillares, plus minus femipedales; pedunculis propriis biuncialibus, teretibus, patulis, apice colligentes flores in capi'tulum Cubrotundum, Hi toti pallide ochroleuci, feffiles & fuaveolentes chara&ere gaudent frequenti.

CAL. Perianthium monophyllum, turbinatum, ereftum, valde inaequaliter & diverfimode quinquedentatum, corollas ad unam tertiam brevius*

COR. monopetala, turbinata, erefta; ore contrafto & quinquedentato.

STAM. Filamenta numerofa, capillaria, ere^a, petalo duplo longiora, ipfa bafi connata in unum corpus. Anthers fubrotundae, parvae*

PIST. Germen ovatum, pedicellatum. Stylus capillaris, longitudine & fitii^laminurp. Stigma (implex.

fER. Legumen oblongum, acutum, compre(To-planum»

SEM. plura, rotundata, compreflb - plana.

CCXXXIX.

VERBENA PRISMATIC A. *Unn.fyjl.pag. 66.*

Verbena minima, chamsdryos folio. *Sloan. hijl,jam, 1. pa£ 17a. tab. 107-.*

fig. 2.

Crefcit in Jamaica. Radix annua, ramofa, albida. Caulis, rami, folia utrinque, fpicse & calyces funt molliia & breviffimovillo obfita» Caulis ere&us, in caldariis noftris a tribus ad quinque pedes altus, (bipeda-

lem in fylveftri planta aflerit Sloaneus, & tamen minimam Verbenam vocat,) inferne digitum minimum craffius, obtufe tetragonus & quadrifulcatus, ramofus, medulla alba fartus. Folia funt oppofita, petiolata, ovata cum bafibus ad petiolum parumper produ&is, acutula, ierrata cum dentibus ol^p tufulis & mucronatulis; majora triuncialia cum petiolo biunciali; longe nri nora ilia, qua: in planta jam adulta prodeunt Spies plus minus femipeda- les ex divaricatione ramorum, ere&tae, denfae nee tamen carnofs. Brakes fubulatae; feffiles, parva?. Flores feffiles, inordinate fiti, ad fpicam ap- preffi* Calyx tubulofus, compreflus, tetragonus, obfoletius quadrifulca- tus, truncatus cum dentibus quatuor fubulatis diftantibus & ereftis. Co- rolla purpurea; tubo incurvo longo & gracili; limbo patentiffimo bilabiato, cum labio fuperiori bifido, laciniis omnibus fubrotundis obtufis, & infima duplo iatiore. Stamina duo. Semina duo, linearia, fuica, longitudine ca- lycis*

CCXU

SALVIA PSEUDOCOCCINEA.

In America calidiore crefcit, apud nos in caldariis floret aestate, & femina perficit autumnno, adeo fimilis Salviae coccineae, ut ad primum intui- tum eadem credi poffit, Caulis fuffruticofus, ramofus, ereftus, tetragonus, alba medulla fartus, tripedalis, bafi calamum craffus, pilis longis<dnereis ihollibusque denfc hirtus. Folia oppofita, longe petiolata, ovata cum ba- fibus verfus petiolum pilofum parumper produftis, adeoquemirrimo cordata, caterum acuta, ferrata, venofa, utrinque villofa & mollia. Racemus ter* minalis, verticillatus ex fex floribus in quolibet verticillo bre\iter pedun- cula-

culatis. Calyx paulo minor quam in *Salvia coccinea*; oeterum totus flos magnitudine ftruftura & colore fie huic fe fimilem praebet, ut nequeat dignolci* Differtplanta a *coccinea* foliis ovatis, nee ad bafin finuatis, & jaube longa.

CCXLL

GLADIOLUS GRAMINEUS- *Linn. fyft. pae. %6.fuppl, pag. 9.*

Ad Promontorium bonae Spei fponde crefcit, florens apud nos in tepidario menfibus Novembri & fubfequis. Bulbus fubrotundus, folidus, intus albus, tunica fufca & fibrofa veftitus, ex bafeos plana? margine radículas emittens. Folia enfiformia, acuta, integerrima, glabra, longitudinediverfa, ere&a, nervo niedio utrinque protuberante, bafi fiffa caukm amplexantia, latiora quadrilinearía. Caulis gracilis, compreffulus, adlentem ftriatulus, fuperne latus, foliofus, ere&us, fesquipedalis vel etiam tripedalis, foliis longior, tina cum foliis piano - compreffus & anceps, ut in pluribus *Iridibus*; ad pedunculos communes *in* racemo parva, fubulata, & feiTilia. Pedunculi communes axillares, plus minus quadriflori, *h* xi, graciles, patuli; in planta altiore ramofi. Braftese ad hos flores plerumque gemellce, acuminate; quæ floribus fubjiciuntur, ovatae, oppofita?, virides cum oris membraneis albidis, concavae, ftriatulas, quarum altera iub petalis anguftioribus bifida eft* Flores inodori, feffiles, fuceffive ex pedunculo elongato prodeunt. Corolla? cum virore albae & fubcampulatsB tubus vix ullus; limbi laciniae iubxquales quidem, fie tamen; ut tres fuperiores, tribus inferioribus oppofita^, fint latiores atque ovata?; omnes ariflatcP, foris linea media prtuberante viridi *fk* intus ad bafin lineo-

lineola purpurea notatae. Ex latioribus lacinia intermedia & ex angustioribus duae laterales intra tres reliquas locantur, ut videatur corolla hexapetala. Filamenta tria, alba, & praedita antheris luteis, ascendunt verhis laciniam summam petali quo duplo breviora. Gernien triquetrum. Stigma his albus*, filamentibus longior. Stigma capitatum, Capfula subrotunda, triloba, glabra, fusciflora, trilocularis, trivalvis. Semina in quolibet loculo duo vel tria, subrotunda cum mucrone, nitida, dilute badia. Ex alis foliorum in caule adultae majoris plantae saepe bulbi nascuntur subrotundi nigri nitidique.

CCXLU.

POA SICULA.

Cynurus spica disticha, compresso-plana; spiculis atheris, sessilibus, acutis. Jacq» obs. part, a. pag, 2 a. tab. 43.

Gramen filiceum, paniculis integerrimis. Becc. sic pag. 62. tab, 33. fig. a. Moris, hist. I pag. 204- / 8. t. 6, fi 53**

Gramen paniculis elegantissimis, densis; ficulum Town, injt. pag. 52-2.

Sicilia patria est. Radix fibrosa, apud nos in tepidariis .hyemem agens perennis, culmos producit plures, graciles, teretes, (pithamaeos aut paulo altiores, glabros, geniculatos, primum simplicissimos, dein amovos, nudo erectos, modo adscendentes & flexuosos, etiam bast procumbentes. Folia sunt glabra, acuta, vaginantia, erecta, ad oras retrorsum scabra, a duabus ad quatuor uncias longa. Culmum ramosque terminat rachis erecta striatula ac flexuosa, qua lateraliter in sinus alternos excinditur, quibus

fingu-

lingulis infidet fpicula difticha, oblongo-lanceolata, acuta, rigidula, compreffo-plana, denfa, numero vario utrinque ab unico ad oflo, a dimidia ad integram uncia longa, continens a viginti ad quadraginta flofculos, nullis bra&eis fuffultos. Calycis communis bivalvis valvulae funt lanceolatae, acutae, conniventi-concavae, glabrae, virides cum oris albiis & lcariaofis, perque longitudinem ftriis quinque albidis percurfas. CoroUularum bivalvium valvula exterior calyci fimillima, fed dorfo medio hirtula. Valvula interior paulo brevior, magis hirtula magisque fcariofa, Germen fubrotundum, glabrum, Styli duo, luperiori margine per totaro longitudinem lacinulis fubulatis fimbriatae.

CCXLVI.

LLIUM SUAVEOLENS.

In Auftriae pratis paludofis copiofe crefcit, florens Augufto, totum glabrum* Folia, Icapus & germen ad lentem punftata funt Bulbus oblongus, digitum minimum crafius, tunicatus. Scapus a fex ad novem uncias longus, ereftus, gracilis, teres cum uno alterove angulo obfoleto, aphyllus, ante florefcentiam fuperne nutans* Folia plus minus quinque, bafibus vaginantibus connexa fie ut primo intuitu fcapus videatur foliofus, linearia, acuta, integerrima, fcapo aut breviora aut longiora, craffula, canaliculata cum nervo dorfali acutulo. Umbellaiubrotunda ex pedunculis plus minus triginta femiuncialibus & teretibus, quibus fere lingulis interjiciuntur rudimenta fpathacea fcariofa minima & vix confpicua. Spathas bivalvis valvulae funt acutae, umbella breviores, prinium-purp»reae, dein fcariofas & cinerea;, Flores fuaveolentes cum pauco allii odore. Petala alba cum fuffu-

faepe purpurea, ovata, acutiuscula, parum concava, patula, tria aUerna exteriora breviora & fubtus ad apicem magis purpurea. Filamenta (ubulata, erecta, alba, petalis duplo longiora. Antherae ovatae, incumbentes, fucats, ex flavo rufae. Germen viride, ovatum, obscure triquetrum, obtusum. Stylus fubulatus, erectus, albus, ftaminibus paulo brevior. Stigma fimplex, acutum. Capfula ovata, obtula. Semina pauca, oblonga, acuta, nigra.

CCXLIV.

CYPERUS ALTERNIFOLIUS. *Lim.fyjl. pag. 96.*

Ex ipfius Linnsi detenninatione fpecifica: *culmo triqretro, nudo, apice alternatim foliofoipedunculis lateralibus, p̄roliferis; ad amuffim huicj. n. tae conveniente, judico, effe Cyperum alternifolium; fed Morifoni ab eodem citata planta ede nequit, utpote quae caulem habeat geniculatum, &c quam puto ad Cyperum fpathaceum Linnxi aiuandari debere, quod jam ipfe antea Linnaeus fecerat in Speciebus fuis, Koftrae plant? inodora radix perennis componitur ex congerie denfa numeroiffimarum fibrarum fufcarum, quae per totum fere annum fuceffive emittit cefpitem culmorum; unde etiam per totum annum viret floretque, hyemem agens in tepidario. Culmus plus minus bipedalis, calamum craffus & ultra, annuus, erectus, inferne fpathis vaginatus, caeterum nudus, enodis, nitidus, obtufe fie triquetrus ut ad primum ad fpe&um videatur teres, medulla alba foidiore & fubdulci far&us, ad ipfum apicem foliofus. Folia approximate, alternatim jparfa, leffilia, lanceolato-linearia, integerrima, glabra, acuminata, ad bafin parumper concava, caeterum plana, infima novemuncialia & dimidiam unciam*

unciamlata, summa brevia & angustissima; omnia (imul in elegantem umbellam reflexo - patentissima. Pedunculi graciles, glabri, axiliares, folitarii, obfolete triquetri, foliis duplo breviores, basi incrassati, patentissimi, superne alternatim & approximate ramofi; pedicellis quibusdam ad spiculas iterum ramosis five proliiferis. Bratteae ad pedicellos lanceolatae, ^ acuminatas, membranaceas, albiae, exiguae. Spicula terminales, a tribus ad septem digitatae, lanceolato - lineares, compressae, acuta, glabra», cineres* Calycis squamae sunt acutissimae, dorso virentes, & ad oras albae?

CCXLV.

HIBISCUS DIVERSIFOLIUS.

Speciosa planta communicata mecum fuit sub titulo Hibisci ficulnei Commerfoni ex India orientali; quoniam vero a ficulneo Linnaei certissime difcrepet, a foliorum diversissima figura nomen triviale dedi. Caulis arboris, ereftus, fexpedalis, teres, uncialis diametri & ultra, ramofus, viridis, villofus, medulla alba farftus, armatur aculeis brevibus pungentibus, fufcentibus jreftisque. Rami virgati patent Folia sunt alterna, longe petiolata, inferiora quinqueloba, fuperiora triloba, funima indivifa & oblonga, acutiufcula, ferrata, utrinque hirfutula, venofa, fubtus ad nervos hispida; petiolis teretibus, villofis armatisque faepe fubtus raris aculeis. Pedunculi uniflori, axillares, folitarii, breves. Calyx exterior polyphyllus ex ibliolis plus minus undecim linearibus, acutis, rigidulis, hispidis ^ patulis. Interior etiam pilis albidishipidus, longitudine exterioris, patulus, ad duas tertias quinquefidus; laciniis ovato - acutis. Corollas amplissimas & calyce multo longioris petala ex ungue angustata dilatata in laminam

latiffimam, Jfotundatam, obtufiffimam, obfolete crenatam, patentiffimam, fulphuieam cum bafi atrofanguinea* Stamina & ftigma tota atrofanguinea, polline fanguineo - miniato. Stigma quinquefidum, capitatum, planum, pi? lofulum. Germen hirfutum. Capfula ovata, quinqueiocularis, polyfperma: In caldariis hoftris primo anno floruit demum a Septembri ad Decembrim; proximis annis jam Aprili & fublequis; atque tune caulis, eodem plane modo ac Malachra fasciata, fed obfoletius, maculatus evadit.

CCXLVL

LEDUM LATIFOLIUM,

Ex Anglja fub hoc titulo ad nos pervenit, patria nobis ignota, jeftatemlut dio agens, hyemem in hybernaculo, florens Aprili & Majo, frutex fempervirens, tres quatuorve pedes altus, ramofus, facie Ledi paluftris, trunco digitum craflb, ramis primi anni lanatis & albidis, fubfequentis anni tomentofis & fwrugineis, fenioribus glabris & fufcis. Folia funt alternatim fparfa, breviter petiolata, integerrima, obtufa, unciam vel fescunciam longa, ovata, ied lateribus fie revoluta, ut evadant tandem vere bullata; juniora dilute virentia, iupra pilofa & fubtus albo - lanata; feniora fere glabra, atrovirentia & fubtus nonnunquam ferruginea. Pedunculi communes terminales, vix unciales, erefti & fquamis imbricatis ferrugineis veftiti. Pedunculi proprii ex fingulis fquamis filiformes, villofuli, corymbofi. Flos fimillimus colore, magnitudine & ftruttura Ledo palufiri, fi folum jde mfts ftaminum numerum. Scilicet calyx villofus, minutus. Petala alba, obtufa, patentia. Stamina tantum quinque. Stylus longitudine flaminum, Sijgma obtufum. Capful* quinque,, univalves & uniloculares. Semina pluri-

plurima, minuta. In piufculis floribus deficit in omnibus partitas una quinta pars numeri,

CCXLVD.

EUPHORBIA ANGULATA.

Hujus plants mentionem fed in volumine tertio Flora Auftriacae, ubi de Euphorbia dulci agebam, dete&ae in Auftria a clariffimo Mygindo. Nunc copiofam egregius Haenke ad me tulit, ut defcribere atque icone illustrare poffim. Nulluni fynonymum adjungo, quum certum nullum apud aurotas inveniam. Halleri Titymalus num. 1051. non magis hucreferri poffe videtur, fi defcriptionem radicis fpe&es, quæ in Euphorbiam dulcem, nee bene in hanc quadrat; tum quod ille angulos in caule toto tam manifeftos filentio praetereat, adducatque {ŷnonyma.omnia Euphorbiae dulcis; inter qu2B forte Barrelieri planta effet expungenda, & hujus loco ponendus *Titymabs dulcis, tuberoŷa radice* ejusdem ic, 909, At tamen ex involucellis floribusque flavis ab Hallero diclis fuŷpicaremur, effe eandem fuam cum noŷtra. Autoptas Helveti judicabunt, utrum vir celeberrimus unam ex duabus diverŷis plantis defcriptionem concinnaverit. Noŷtram plantam fie defcribo. Floret Majo & Junio. Laŷte tota ŷcatet. Radix perennis, horixontalis, repens, longa, teres, albida, calamo duplo triplove gracilior, hie illic bulboŷo-nodoŷa fibrillasque agens» Caulis annuus, ereftus, glaber, pedalis, baŷi ŷola teres, cŷterum argute ŷtriato-angulatus, parum ramofus vel ŷimpliciffimus. Folia oblonga, obtuŷa vel'acutiufcula, ŷeflilia, patentiffima, ad lentem minutiffime ferrulata, fuŷra glabriufcula & virentia, ŷubtus pallidiora & villoŷul* Involucri ŷoliola quina, ovata, ŷeflilia, ŷoliisque caŷte-

rum familia, Involucellorum foliola oppofita, cordata, obtufa, ferrulata, plana, patentiffima, cum flavedine virefcientia. Umbella quinquefida, dein bis bifida. Flos umbells centralis pentapetalus, germine carens & fterilis. Tales etiam quandoque flofculi umbellularum primis divifionis; aut hi funt pentapetali & ex genuine prsefente fertiles, aut funt tetrapetali & fertiles, cujusmodi funt illi ex fumma divifione. Flores omnes feililespetala habent fubrotunda, convexula, flava, dein lutea, tandem emarcida ferruginea. Calyx eft glaber. Germen verrucofum. Fru&us muricatus.

CCXLVIII.

EUPHORBIA SERRATA, *Linn. fyl. peg.* 453.

Tithymalus characias folio ferrato. *Bauh, pin.* 390.

Tithymalus myrtites valentinus. -*Cluf. hift. pag.* CLXXXIX.

Crefcit iponte in Hifpania, Italia & Gallia narbonenfi; apud nos culta in horto per plurimos jam annos perennis fub dio perfiftit, admodum mine multicaulis, & florens Majo &c Junio. Tota lafte abundat. Radix perennis, ramofa, digitum & ultra crafla, caules productt annuatim plures, ereftos, pedales, in culta bipedales, teretes, calamum craftos, virides, plerumque fimpliciffimos, in culta nonnunquam ex omnium foliorum alis longe ramofos & florigeros. Folia alterna, reniota, feffilia, fubnervofa, ferrata, a cut a, inferiora elongate lanceolata, fumma rhombea cum angulo extinao productt multoque latiora. Involucris foliola cordata, acuta, ferrata, latiffima, hinc mutuo incumbentia, cum flavedine fuffufa virentia, nervofa. Involucelli foliola duo, oppofita, ex flavo virentif, prioribus familia,

lia, fed cum alterolatero latiori. Umbella quinquefida, rarius trifida; dein bis bifida. Flores pedunculati, primarii ex centro umbellae & subdivisione prima a germine deficiente fertiles, atque hi raro pentapetali aut tetrapetali, fed plerumque cum omnibus reliquis floribus dipetali vel tripetali. Petala lata, lutea, modo obfoletius retufa, modo bicornuta, modo emarginata. Calyx glaber flavescit. Antherae funt luteae?. Germen & capsula glabra iunt. Semina oblonga, obtufa, nitida, caeruleo-cinerea. Tota glabra laefcit admodum.

CCXLIX.

MALPIGHIA COCCIGERA. *Urn. fyf. pag. 4*6.*

Malpighia humilis, ilicis cocciglandiferae foliis. Plum. ic. pag 161. tab. 168. %. a.*

In insulis Caribis sponte crefcit, frutex diffusus[^] ramosissimus, fern-pervirens, quadrupedalis > ramis teretibus, asperis, junioribus etiam fuscis. Folia opposita, subovata, brevissime petiolata, glabra, laste virentia, nitida, parva, obtufa vel retufa, dentato-spinosa, rigidula, raro inermia integerrima buxoque tunc finillima. Pedunculi in ramulis brevibus terminates, turn etiam alii axillares, longit[^]dine plus minus foliorum, folitarii vel gemelli, plerumque uniflori, rarius bifidi & biflori, geniculati, ac geniculum brevissime bracteati, infra hoc virefcentes, supra idem purpurafcentes* Flores inodori. Calyx punctatus, virefcens. Petala rosea. Antherae lutes. Perianthii pentaphylli & parvi foliola funt lanceolata, acuta, concava* & erectiuscula; quorum duo proxima dorso duas glandulas oblon-

oblongas fingula gerunt; horum latus claudentia duo unicam; his intermedium glandula caret. Petala inaequalia ex longo gracilique ungue in fubrotundata & crispam laminam latefcunt; quorum duo magis approximata locantur ad calycis foliolum eglandulofum. Styli tres incurvati. Eacca" magnitudine pifi majoris, trifulcata, rubra. Semina rugofa.

ecu

AGAVE FOETID A. *UmjyJt.pag.M9.*

Aloe americana viridi rigidiflimo & foetido folk), Piet difta indigenis.

Comm hort* 2* pag. 35. tab. 18,*

Aloe' americana radice tuberofa minor, *Plukn. aim. pag. 19. tab. s^Sfig. «•*

Nullibi in Europe hortis ante hunc annum vidi hanc plantam florentem, nee forte ab ullo viva florere fuit. Tandem in horto C^fareo Schdnbrunnenfi floruit menfibus Januario & Februario, led nullum poft tot florum millia fructum dedit. Hi omnes delapfi funt una cum germinibus eorundemque loco fuceffenint bulbilli ovati, acuminati & feffiles, conftantes ex foliis convolutis, qui Junio (ponte decidere coeperunt, tum apti ad numerosam procreandam fobolem. Adeo fimilis flos eft *Agava, cubenfi*, quam in Hiftoria ieleclarum ftirpium Americanarum defcripfi, ut charatteri generico ibidem a me dato, quodaddam, ne vel leviilimum momentum habeam; quare nee hie repetam, Quin color etiam floribus idem fit; tantummodo funt in hac paulo majores, &c bulbilli acumiifati, nee uti in cubenfi obtufi. Propter corollam vere hexapetalam mereretur utraque ab *Agavis fejng1*, novumque conftituere genus, Sponte crefcit in infuljs *Canhxis*.

Ex

Ex radice brachium & ultra crassa fibrisque crassis capillata prodeunt folia plurima, in orbem fita, erecta, subeniformia, mucronata, integerrima, ad oras inermia, rigida, crassa, parumper canaliculata, nitida, laete virentia, infibrosa, subspongiosa & alba, longiora sexpedalia dimidiumque pedem lata, fracta aut trita foetentia. Scapus triginta duos pedes altus, brachium crassus, erectus, teres, nitidus; vestitus spathis lanceolatis, mucronatis, pungentibus, integerrimis, sessilibus infimis pedibus, superioribus successively brevioribus; supra medium in amplam paniculam effusus. Haec componitur ex ramis alternis circiter quadraginta patentissimis, quorum medii longiores sunt, quinquepedales, digitum crassi. Atque hi ramulos gerunt numerosos, alternos simplices calamum crassis, a quatuor ad duodecim uncias longos. Bracteae ad pedunculos lineares, parvas, ferrugineae. Pedunculi uniflori, sparsi, brevissimi > folitarii vel gemelli aut terni. Flores penduli.

CCLL

ORNITHOGALUM COMOSUM. *Una. fyl. pag. 7.*

Ornithogalum pannonicum albo flore five quartum, *Clus. hijl. pag. 187**

Ornithogalum Ipicatum feu comolum, flore lacteo. *Bauh. pin. 70* Rudb. el 2. pag. 135. fig. 1.*

Ornithogalum ipicatum, flore viridi lactescente. *Bauh pin. 70.*

Ornithogali lactei species major, & Ornithogalum ipicatum maximum, *Besl. eyjl. vern, O, 5. foU 14* fig* 1.*

Planta Clusii certissime est, quam ex iisdem, quos indicavit Clusius, locis erutam filius nescius mihi attulit, Clusians etiam descriptioni omnino de convenientem* Ex Linnaei determinatione adaequatissima esse ejusdem comofum oportet. Beslerii icon ad plantam cultam facta confirmat judicium, dum tamen contra propriam figuram vocat Ornithogalum maximum. Nec Ornithogalum panonicum Beslerii clusiana planta est, sed potius Linnaei pyrenaicum. Casparus Bauhinus bis eandem hanc stirpem proposuisse videtur. Floret Majo fructumque perficit Julio* Bulbus ovatus, vel etiam magis subrotundus, uncialis diametric saepe obliquus, fibrillis castulis radicans. Folia plura, radicalia, vix semipedalia, unam quartam uncis partem lata, canaliculata, acuta, ex glauco virentia, glabra, reflexa, in illo recente planta sylvestri l'pe (nec tamen Temper') jam emarcida. Scapus folio fere duplo longior, teres, ereflus, glaucus, supra medietatem in racemum solutus oblongum, flores inodoros plus minus duodenos continentenu Spathae membranaceas, lanceolatae, acutae, longitudine pedunculorum. Hi cum in flore tum in fructu sunt erefculi -five adscendentes. Petala sunt lanceolata ^ obtusa idque interdum cum parvo mucrone, patentissimaj sub-squalia vel alterna paucillo angustiora & breviora, intus tota alba vel rarius viridi-maculata^ ior is virentia cum oris albis. Filamenta omnia sunt lanceolata & plana^ Antherae ochroleucae. Germen flavum* Stylus albus. Capsula ovata, obtusa, trilobularis, trivalvis. Semen in quolibet loculamento utj>urimum unicum, subrotundum, atrum, punilatum.

CCLIL

ORMTHOGALUM CAUDATUM.

Sub dicto titulo ante plures annos femina accepi elegantis hujus Ornithogali a celeberrimo Thouin, forte originis afræ* Sub dio apud nos ætatem, hyemem in tepidario agit sempervirens, florens Majo & Junio* Bulbus pugni magnitudine, subrotundo • ovatus, albidus, extra terram prominens, ex filis lateralibus brevibus facileque rumpendis, Sempervivi globiferi more, bulbillos emittens, atque sic foliferus denique bulborum cepitem aggregatorum brevi producens. Folia sublinearia, canaliculate, nitida, crassa, reflexa, in bulbis senioribus bipedalia, etiam tripedalia, unamque unciam lata, in junioribus breviora & angustiora; superne absunt in caudam teretem, subulatam, acutam, semipedalem, marcescentem & deciduam, nec hinc in foliis adultis conspicuam; in bulbis novellis mere subulata. Scapus teres, calamus crassus, erectus, viridis, tripedalis. Racemus erectus, tandem pedalis* Spathe scariofas, duplo pedunculis breviores. Hi florentes & frutescentes patentissimi. Flores suaveolentes odore prunorum. Petala obtusa, patentissima, crassa, utrinque virentia cum oris laevibus, alterna paulo breviora & angustiora. Filamenta omnia plana ex lata basi oriuntur, sed horum tria alterna hanc habent multo latiora & ovata* Antheræ ochroleucæ Germen viret Stylus albus. Capsula subovata, obtusa, trifurcata, trilocularis. Semina pauca.

CCLIII.

ORNITHOGALUM SUAVEOLENS.

Crescit ad Promontorium borne Spei; apud nos floret in tepHario menfe Majo. Totum glabrum. Bulbus fubrotundus, albus. Folia radicalia pauca, fublinearia, acuta, integerrima, canaliculata, carnolula, fere longitudine fcapi, bafi erefta, ceterum flaccida. Scapus pedalis & ultra, teres, ereilus, fuperne plus minus flexuofus, purpureo - fufcus / apice laxe racemofus i& circiter quinqueflorus# Spatha angufte lanceolatae, acutse^ longitudine peduncilorum, c^lore fcapi. Flores fuav«olentes# Petala oblonga, obtufa, planiufcula, tota patentiffima, utrinque viridia cum oris flavis, alterna tria anguftiora, Filamenta omnia compreffo-plana, lanceolata, aqualia, erefta, petalis breviora, albido - virentia* Anthers incumbentes, flavae^ Germen triquetrum, viride. Stylus filiformis, erectus, ftaminibus paulo longior. Stigma capitatum, fubtrifidum, hirsutum^ Capsula ad maturitatem non pervenit.

CCLIV.

ORNITHOGALUM TENELLUM.

Sponte crescit ad Promontorium bonfé Spei; apud nos in tepidarie floret Majo & Junio. Totum glabrum eft. Bulbus fubrotundus, niger, parvus. Folia pauca, canaliculata, linearia, anguftiffima, acuta, fcapo breviora. Scapus unus alter ve, debilis, gracilis, teres, erectus> pedalis, viridifuscus, fuperne ex floribus ab oſto ad duodecim laxe racemofus. Spatha
ths

thæ iubulatse, pedunculis duplo breviores. Pedunculi graciles, florentes patentiffimi, fructiferi magis erecti, Flores inodori Petala lanceolata, acuta, patentiffima, intus laevia, foris etiam laevia cum fascia media longitudinali subvirente, alterna paulo breviora & latiora. Filamenta omnia fubulata, aequalia & alba* Antherse parvae, ochroleucæ. Germen oblongum, inferne pallens, superne flavens Stylus albus^ Capsula oblonga, ^trilocularis^ trivalvis* Seminaria quolibet loculo pauca, atra.

CCLV,

ORNITHOGALUM PYRAMIDALE. *L'wufyfi. pag. 327.*

Ornithogalum angustifolium spicatum maximum. *Bauh. pin. 70^ Rudb. eU 2. p. 114. fig. 4**

Ornithogalum lacteum maximum* *Befl. eyji. vern. 0. 5. fol 14. fig. 2.*

Lusitania patria est* Apud nos sub dio optima vegetat, hyememque perfert, florens Junio & Julio, Augusto fructifera. Bulbus subrotundus, tunicatus; duarum circiter unciarum diametri. Folia bipedalia & ultra, dimidiam plus minus unciam lata, canaliculata, acuta, ex glauco virentia, recurvata, striatula, plura. Scapus teres, calamus crassus, erectus, glauco rore testus, tripedalis cum ipso racemo, infra racemum vix pedalis. Spathæ lanceolatae, acutae, pallidæ, breves. Pedunculi proprii biunciales, florentes patentiffimi, fructiferae erectiusculi. Flores inodori Petala omnia intus tota laevia, foris viridia cum oris lacteis, lanceolato-oblonga, obtusiloba, patentiffima, alterna paulo angustiora. Filamenta omnia late lanceolata) - acuminata, plana. Antheræ oblongæ, flavescentes.

thae lubulats, pedunculis duplo breviores. Pedunculi graciles, florentes patentiflimi, frufVigeri magis ere&i. Flores inodori. Petala lanceolata, acuta, patentiflima, intus la&ea, foris etiam la&ea cum fafcia media longitudjaali fubvirente, alterna paulo breviora & lattora. •**Filamenta oornia** fubulata^ aequalia & alba. Antheras parvae, ochroleucac. Germen oblongum, inferne pallens, fuperne flavens. Stylus albus. Capfula oblonga, trilocularis, trivalvis, Semina in quolibet locuhmento pauca, **atra**.

CCLV.

ORNITHOGALUM PYRAMIDALE. *Lhm.fy/1. pag. 327.*

Ornitliogalum anguflifoliuin fpicatum maximum. *Banh, pin. 70. Rudb, el, z.p. iU>fe 4.*

OrnitJiogalum lacUuni maximum, *JBe/L eyjf, vern. 0. 5. foi 14. fig. %.*

~~Lulitania patrica est. Apud nos liiu ism vpitme vs uga. ljuvenem~~
 5jue pe:fert, llorens **Junio** & Julio, Augufto fruftefcens, Bulbus {ubrotundus, tunicatus; duarum **drciter** unciarum diametri. Folia bipedalia & ultra, dimidiam plus minus unciam Iata, canaliculate, acuta, ex glauco virentia, recurvata, ftriatula, plura, Scapus teres, calamum craffus, erefitis, glauco rore teflus, tripedalis cum ipfo racemo, infra racemum vix pedalis. Spathte lanceolatae, acuta, pallidje, breves. Pedunculi **propiii** biunciales, florentes patentiffimi, fruftefcences ereftiufculf. Flores inodori, Petala oinnia intus tota laclea, foris viridia cum or is la&eis, lanceolato-oblonga, obtuflila, patentiflima, alterna paulo anguftiora. Filam^nta omnia late lanceolato-acuminata, plana. Anthers oblongs, flavefcente*.

R r 3

Ger-

pyramidalis, trifurcata, trilocularis, trivalvis. Semina plura, atra, subrotunda vei oblonga vel angulata*

CCLVIL

MESEMBRYANTHEMUM CUNEIFOLIUM

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Ex radice annua caulis teretibus, ramosis, purpureis, semipedalibusque aut longioribus procumbit, succulentum & tutum quantum ad instar Mesembryanthemi crystallini papulifolium. Folia sunt lanceolato-cuneiformia, obtusula, opposita, integerrima, plana, sessilia, sed basi tam longe angustata ut petiolata credi possent, hic canaliculata & purpurea, longiora quadriuncialia. Pedunculi axillares, folitarii, teretes, uniflori, tres quatuorve uocias longi. Flos inodorus, elegans, diametri fescuncialis. Calyx quinquefidus; laciniis valde inaequalibus, carnosissimis, Harum duae, fere oppositae, quae corollam nuda expandunt includebant, eadem expansa duplo sunt breviores, abeuntque in apicem cucullatum & acutum, Tres reliquae sunt obtusulae, subspathulatae, & corollas plus minus longitudine. Petala circiter quadraginta linearia, acutula, plana, utrinque pallide purpurascencia cum linea media saturate rubra, vel tantum sic pallide carnea. Filamenta temperatissime rubra brevique in conum connivent. Antherae lutes, Capsula depressa, quinquelocularis. Floret sub dio Maio & frequentibus.

CCLVll

TRAGOPOGON CAPENSIS.

Promontorium bonae Spei patria est, Radix ramosa & biennis altero anno caulem promit foliarium, tres quatuorve pedes longum, basi digitum crassum, erectum, supra medium ramosum, pilis albis rigidis hirsutum, subangulatum; caule ramis ramulisque in pedunculos semipedales, unifloros, erectos, infra florem incrassatos, & parumper dumtaxat hirsutulos abeuntibus; atque hos una cum ramis teretes. Folia runcinata, aciculiifolia, alternata hirsutula, spinoso-dentata, rigidula, squarrosula, nec tamen pungentia* Calycis viridis, pilis albis ad dorsum nec in oris hirsuti, in flore oblongi, in fructu valde aucti & ex latissima basi conici, foliolifera octo, lanceolata, acuta, concava & fibraequalia. Corolla flavo, uncialis diametri. Semina incurva, scabra. Pappus stipitatus, plumosus > niveus. Receptaculum nudum Floret apud nos Junio,

CCLIX.

IRIS XIPHIUM. *Linn. syst. pag. 90.*

Iris bulbosa latifolia caule donata. *Bauh. pin. 38¹.*

Ingens agmen Iridum bulbosarum apud Bauhinum, Bessefium aliosque scriptores reperitur, quas plerasque Linnaeus sub Xiphio comprehendit videtur, ceu unicas constituentes speciem, quas tamen in duas distingui posse, autumo, quarum prima haecfit; quae plerumque major est, colore floris

floris minus apud nos varians, fere femper violaceus, licet hoc diverfimo-
de, raro albus, ab altera diftinguitur petalis omnibus manifeſte & faepe fat
profunde emarginatis, floris magnitudine nonuncjuam Iridem* germanicam
aequans. Bulbus eſt ovatus, tunicatus & uncialis quandoque diametri. Fo-
lia funt canaliculata, fie convoluta ut fubulatavideantur, acuta, longiora bi-
pedalia & ſemunciam lata, friatula, recurvata, fubbifaria; caulina fumma
ereſta, brevia, longe" ventricofa. Caulis ere&us, teres, foliis radicalibus
longior, ca'jlinis inferioribus brevior, biflorus. Spathſe ventpculofae, vi-
rides, genuine longiores. Flores feffiles, inodori* Germen profunde tri-
angulare, Corollae imberbis petala emarginata. Stigmata bifida, acuta.
ArAhexx ochroleucac. Capſula oblonga, triangularis, trilocularis, trival-
vis, polyſperroa. Semina fubrotunda, rijgoſula.

CCLX.

IRIS VARIABILIS*

Iris bulbola anguſtifolſa verficolor. Bauh. fin. 38.

Tota facie convenit cum priore, fie ut deſcripſione fuperfedeam.
Sed minor eſt folet, folia habere multo anguſtiora, bulbum minorem, pe-
tala exteriora vix emarginata, potius at plurimum integerrima, &c variare
floris colore quam maxime, ut ex femine unius ejusdemque capſulae diver-
ſiffimi flores exoriantur, nunquam tamen apud nos ex variabili hac Xiphium,
nee ex hoc variabilis enaſci vifa fuerit.

CCLXL

IRIS VIRGINICA, *Um. fyft. pag. 9 Q.*

Iris corollis imberbibus[^], .germine trigono , caule ancipitu[˙] *Gron, virg. pag. 7.*

Ex ffdice perenni, intus albida, foris nigricante, p[^]lhcem crafla , fibris albis capillata, fuperne a foliorum reliquiis fetofa , csfpitofe folia oẽ caules annuatim attolluntur affinium more; ut floreat fub dio apud nos Junio & Julio* Folia funt eniformia, acuta, ftriatula five nervulofa, plus minus fefquipedalia, & glabra uti tota planta. Caulis foliis paulo altiur, compreffus, ereftus, multiflorus. Spatha; membranaceae, acut<e, fufcefcentes, pedunculis breviores* Pedunculi duas tresve uncias longi, teretes, graciles, erefti, unifloru Flores elegantes, inodori, ere&i, uniflori. Geraien triangulare, gracile, virens. Corolla imberbis. Ungues canaliculati petalorum exteriorum extus virefcunt[^]ntus flavent cum lineis mediis ftriisque marginalibus atropurpureis; hinc vero ampliantur in laminaiiii planam, rotundato - ovatam, obtufam, integerrimam, in ortu pallidam, dein csrulefcentejn, cum lineis ftriisque faturate csruleis* Petala interiora fpathulata, obtufa, erefta, brevioraque, cserulea magis funt, etiam ftriata. Stigmata bif\da& obtufa colorem'petalorum interiorum habent, *Anthers* funt violaceje,

CCLXIL

LACHENALIA PUNCTATA.

Crescit ad Promontorium bonze Spei. In tepidariis nostris floruit Novembri. Tota glabra est. Bulbus subrotundus^ crasse tunicatus, albus. Folia radicalia duo, lanceolato-lineariter, acutula, canaliculata, integerrima, erecta, semipedalia, utrinque maculis basi-folis adpressis, dorso fusco-fanguinei, facie glauco-virentia, basi albida cum punctis inaculisque rubris. Scapus decemuncialis, teres, erectus, nitidus, calamo duplo gracilior, nudus, ex rubro pallidoque totus maculatus, superne pauciflorus. Pedunculi uniflori, albidi, patuli, bracteis minutis albidis instructi, fere tibi, fuminis una cum florum gemmis abortantibus. Flores elegantes, nutantes, inodori, plus quam unciales. Corolla albida; exterior tota quanta utrinque punctis rubris densissime notata; interior fere punctata dumtaxat superne, & inferne in linea media dorsali. Antherae rubellae, effectus nigricantes*.

CAL. nullus.

COK.. tubulosa, incurvatula, limbo brevi patente, Petala sex. Tria exteriora inverse cuneiformia, erecta, obtusa, approximata simul tubum formantia, ipsa tantum infima basi connata cum interioribus. Tria interiora longe cuneiformia, obtusa, interiorem tubum formantia, exterioribus paulo longiora, apice patula, infimo duobus reliquis paulo breviori*.

STAM. filamenta sex, subulata, erecta, fere longitudine corollae.* Antherae oblongae, incumbentes.¹

PIST, Germen fuperum, ovatum, triquetrum. Stylus filiformis, ere&us, longitudine llaminum. Stigma (implex., obtufum.

PER* Capfula ovata, obtufa, triquetra, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura,

CCLXIII.

EUPHORBIA KiCiEENSIS. *Mon.pedem. i. pag. 285. ra/r-1039. tab. 69. fig- 1.*

Plantam cultam defcribo, quæ fponte crefcit in comitatu Nicaeenfi, apud nos hyemem agens in hybernaculo. Jam primo aetatis anno floruit Septembri & O&obri, fubfequis praecocius Junio &c Julio. Tota glabra, la-
 c>efcit abunde. Ex radice perenni, calamum craffa, & fufca caules annua-
 tini attolluntur plufculi femipedales vel pcdales, teretes, purpurei, calamo
 graciliores, foliofi, adfcendentes autcrefti, fimpliciflimi vel ex fummorum
 ioliorum alis uno alterove ramulo aphylo cum umbella bifida aufti. Fo-
 lia funt fparfa^ feffilia, fubcuneiformia, integerrima, acutula cum mucron?
 reflexo, firma, craftula, glauca, plus minus fescuncialia, patentiffima vei
 ettam deflexa. Umbella terminalis, ere&a, a quinquefida ad dccemfidam,
 moda quinqueuncialis diametri, modo multo brevioris. Radium purpurei,
 bis dichotomi. Involucris uni\erfalis foliola a quinque ad o£lo, foliis fimil-
 ima fed breviora & latiora, hinc wiagis obverie ovata. Partialium foliola
 duo, cordato fubrotunda, feffilia, integerrima cum exiguo mucrone refle-
 xo, ex flavo virentia. Flores glabri, calyce turbinato. Primores umbells
 pentapetali, mafculi, Aeriles. Tales etiam in umbellis majoribus magisque
 divifis flores primjB dichotomia?. Reliqui tetrapetali, hermaphroditi, fer-
 tiles.

tiles, Petala breviterbicornia, nonnunquam sine ullis cornibus integerrima, lutea, Germen glabrum. Capsula glabra.

CCLXIV.

CHENOPODIUM CAUDATUM,

Guinea Africae crefcit, ab ampliffimo Iffert dete&um, quod a racemis elo&^atis caudatum dixi, apud nos fub dio cultum florens Junio & Julio. Planta ar.nua, glabra, erefta, ab uno ad duos pedes alta; caule tereti, faepe obfcure angulato, gracili, vix ramofa. Folia font alterna, petiolata, rhombico-ovata, obtufa, nonnunquam emarginata, integerrima, venulola, plana, pallidius virentia, Racemus terminalis, ere&us, a tribus ad quinque uncias longus, alternatim & fimpliciter ramofus, denfe obfe&us floribus fe&ilibus conglomeratis. Ex inflorefcentia & foliis Amaranthum diceret* Calyx ^cutus viret. Antherae flavent. Germen viret. Stylus bifidus pallet. Semen atrum nitet.

CCLXV.

ECHiUM GLAUCOPHYLLUM.

Ad Promontorium bonae Spei crefcit; fub dio apud nos floret Julio, hyememagensjn hybernaculo, Caulis fruticosus, ereftus, bipedalis & ultra, teres, glaber, fupra medium ramofus; fenior aphyllus, lignofus & fufcus; junior una cum funilibus ramis pallidiffime virens* Folia fparla, feifilia, lanceolata, acuta, carnolula, utrinque glauca & glaberrima, ad oras

tiles, Petala breviter bicornia, nonnunquam fine uHs cornubus integerrima, lutea, Germen glabrum. Capfula glabra.

cctxiv.

CHENOPODIUM CAUDATUM. . . •

Guinea Africa crefcit, ab amplifllmo HTert deteftum, quod a racemis elor^vatis caudatiim dixi, apud nos fub dio cultum florens Junio & Julio. **Plants** a.inua, glabra, erefta, ab uno ad duos pedesalta; caule tereti, faepe ubfcure angulato, gracili, vix ramofo. Folia funt alterna, petiolata, rhombeo - ovata, obtufa, nonnunquam emarginata, integerrima, venulofa, plana, pallidius virentia, Racemus terminalis, ereftus, a tribus ad quinque uncias longus, alternatim & fimpliciter rarofofus, denfe obfeffus floribus feffilibus conglomeratic. Ex inflorefcentia & foliis Amaranthum dices* Calyx acutus viret. Antheras **flavent**. Germen viret. Stylus bifidus pallet. Semen atruin nitet.

CCLXV.

ECFFIUM GLAUCOPHYLLUM.

Ad Promontium bonis Spei crefcit; fub dio apud nos floret Julio, hyemem agens.-in hybernaculo, Caulis fruticosus, ereftus, bipedalis & ultra, teres, glaber, fupra medium ramofofus; fenior aphyllus, lignofus & fufcus; junior una cum **fimilibus** ramis pallidifTLme virens. Folia fparfa, feffilia, knceolata, acuta, carnofula» utrinque glauca & gUberrima, ad oras

fimi floresque fere umbellatim colligentes. Pedunculi proprii uniflori, punctati, bracteola fuffulsi minuta squamofa & ferruginea. Flores utrobique fecundi, propenduli. Perianthii, corolla duplo tantum brevioris, fere ad basin usque quinquepartiti, & virentis cum punctis purpureis; lacinae erectae, anguste lanceolatae & acutae. Corolla rosea, tubulosa, fere cylindrica, limbo breviter quinquepartito & acuto* Filamenta iubilata, erecta, ex receptaculo communi nee ex corolla orta, petalo duplo breviora. Antherae iordide flavescens, imbricantes, oblongae, inferne filae, & hinc in duo cornua distendentes. Germen subrotundum, viride* Stylus filiformis, circa medium incrassatus, ultra stamina successively se efferens, purpurascens. Stigma quinquepartitum. Capsula fusca congenerum* Semina ovata, compressa, flava.

^CLXVII

GERANIUM SCABRUM. *Unn.fyji.pag. 613.Bwm.ger.pag. 34. num. 39, tab. 1.*

Promontorium bonae Spei patria est* Caulis fruticosus, teres, tres quatuorve pedes altus, digitum crassus, erectus, rubro-badius, ex alis ramifolius, fenescens glaber, caeterum valde asper, uti tota planta* Folia longe petiolata, latissime cuneiformia, trinervia, femitriloba, ad oras etiam scabra acuta, rigidiuscula, summa ad inflorescentiam opposita, reliqua alterna, longiora una cum petiolis septem vel octo uncias longa, lobis lanceolatis, incisus vel rariter dentatis, aut nonnunquam integerrimis. Stipulae parvae, ovatae-acuminatae, utrinque ad petiolos. Pedunculi communes terminales & axillares, breves, umbellati, a quatuor ad sex plerumque flores

fimi fioresque fere umbellatim colligentes. Pedunculi proprii uniflori, punctati, bracteola suffulti minuta squamofa & ferruginea. Flores utrobique fecundi, propenduli. Perianthii, corolla duplo tantum brevioris, fere ad basin usque quinquepartiti, & virentis cum **punctis** purpureis, lacinae erecte, anguste lanceolatae & acute. Corolla rosea, tubulosa, fere cylindrica, limbo breviter quinquepartito & acuto, Filamenta iubilata, erecta, ex receptaculo communi nee ex corolla orta, petalo duplo breviora. Antherae iodide flavescens, incumbentes, oblongae, inferne filiformes, & hinc in duo cornua distendentes. Germen subrotundum, viride. Stylus filiformis, circa medium insertus, ultra stamina fere effert, purpurascens, Stigma quinquepartitum. Capsula fusca congenerum. Semina ovata, compressa, flava.

CCLXVII.

GERANIUM SCABERUM. *linn, f. y. l. p. 613. Burnett, ger. p. : g. z. num. 39, tab. 1,*

Promontorium bonae Spei patria est. Caulis fruticosus, teres, tres quatuorve pedes altus, digitum crassus, erectus, rubro-badius, ex **alibus** ramosus, fere glaber, csterum valde asper, uti tota planta. Folia longe petiolata, latissime cuneiformia, trinervia, femitri-loba, ad oras etiam scabra, acuta, rigidiuscula, summa ad inflorescentias¹ opposita, **reliqua** alterna, longiora una cum petiolis septem vel octo uncias longa, lobis lanceolatis, incisus vel rariter dentatis, ant nonnunquam integerrimis. Stipulae parvi, ovato-acuminatas, utrinque ad petiolos, Pedunculi communes terminales & axillares, breves, umbellati, a quatuor ad sex **plerumque** flores

CAL. Peridithium monophyllum, femiquinquefidum, decemftriatum; tubo campanulato; limbi laciniis ovatis, obtuiulis, una alterave infra apicem in dorso fubmucronata, patentiflimis, planis,

COR. nulla.

Ne&arium monophyllum, conicum, truncatum, inferne tubo calycis accretum, ere&ctum, calyce brevius, o&decimftriatum totiesque denticulatum.

STAAI. Filafnenta nujja. Anthers o&decim, fagittato-oblongs, ere&ctee, denticulis neftarirtnfixae»

PIST. Germen oratum. Stylus filiformis, ere&ctus, longitudinq ftaminum. Stigma capitatum, convexum.

PER. Cajifula iubrotunda, quinquefulcata, coriacea, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, fubovataj baccata, affixa parietibus valvularum»

CCLXIX.

HEDYSARUM VESPERTILIONIS, *Linn.JyJ!.pag.67*. Linnjuppl*

Cochinchina plantae hujus elegantis & finguhriffima: patria eft. In caldariis noftris floret Julio, & femina Augufto perficit. Ex radice ramofa caulls attollitur unicus, ere&ctus, totus foliofus, teres, viridis, cal|po triplo gracilior, tres quatuorve pedes altus, ad microfcopium hicillic hirtulus, caeterum ad taftuni partim afper, partim glaber; qui dum fiorere ex fummitate incipit, ex alis primo foliorum fuperiorum ramulos etiam florentes, 9 emittit, dein fie pergens ad inferiora. Ex pluribus individuis alia? hyeme

CAL. Perianthium monophyllura, femiquinquefidum, decemftriatum; tubo campanulas; limbi laciniis ovatis, obtululis, una alterave infra apicem in dorfo lubmucronata, patentiflimis, planis.

Cos.. nuUa.

Neftarium monophyllum, conicum, truncatum, inferne tubo calycis accretum, ereftum, calyce brevius, oftudecimftriatum totiesque 'denticulatum.'

STAM. Filamenta nu^a. Anthers oftodecim, fagittato-oblongs, ereftse, denticulis neftarifitifix.

PIST. Germen r>yatum. Stylus filifprmis, ereftus, longitudine. Aaminum. Stigma capitatum, convexum.

PER. Capfula lubrotunda, quinquefulcata, coriacea, unilocularis, quinquevalvis.

SEM. plurima, fubovata, baccata, affixa parietibus valvularum,

CCLXIX.

HEUYSARUM VESPERTILIONIS. *Linn.fyjl. pag.672. Linn.fuppl pag. 331-*

Cochinchina planta; hujus elegantis & fingulariflhna: patria eft. In caldariis noftris floret Julio, & femina Augnfto perficit, Ex radice ramofa cauKs attollitur unicus, ereftus, totus foliofus, teres, viridis, caljpio triplo gracilior, tres quatuorve pedes altus, ad microfcopuim hicillic hirtotuluS, csterum ad taftiim partim apher, partim glaber; qut dum florere ex fummitate incipit, ex alis primo foliorum fuperiomm ramulos etiam florentes emittit, dein fie pergens ad inferiora. Ex pluribus individuis alise hyeme

perierunt, alia; fruticose fuerunt, quin una alterave per totam Wiyetnem folia nonnulla confervavit. Folia sunt alterna, subaspera, graciliter petiolata, horizontalia, biloba; lobis divaricatis, mutuo oppositis, retrofalcato-oblongis, bi- aut trinerviis, obtusis, dorso pallide virentibus, facie varicoloribus, (cilicet oblique contra folem adipetKs viridi-purpureis cum fascia longitudinali una alterave faturatius & simplicitate purpurea, perpendiculariter vero adpressis vel etiam oblique, dum folia tergo est, magis virentibus cum fasciis iisdem cinereis. Setula terminalis inter lobos est. Pleraque folia, & quidem primo prodeuntia omnino, sunt simplicia; dipetiora quaedam sunt ternata cum foliolis lateralibus obverse. Scoblique cordatis, deficiente etiam quandoque alterutro, Racemus terminalis, erectus, tandem femipedalis, asper; pedunculis binatis, brevibus, suffultis bracteola communi lanceolata & decidua. Flores parvi, inodori; calyce viridi, piloso, frutescente inflato & clauso; corolla tota alba cum vexilli ungue rosaeo. Character totus *ell* fequeiis.

CAL., Ferianthiimi campanulatum, patens, perfoliatum, profunde quadripartitum; laciniis ovatis, cuspidatis, summa sub vexillo lobifida.

COR. papilionacea.

Vexillum subrotundum, emarginatum, patens,

Alae oblongae, obtusae, concavae, cum-

Carina oblonga obtusaque connivendo finit formantes galeam vexillo oppositam & ejusdem longitudinis.

STAM* Filamenta decem, «diadelphia {(implex & novemfidum,) erecta, fita nuda in medio (patio inter vexillum & alas. Anthers par vs.

PIST, Gemen lineare. Stylus (ubulatus, erectus. Stigma (implex acutum, adfendens*

PER.

CCLXXL

BUDLEJA CAPITATA.

Elegantiflimus frutex ex horto Schwenkiano Hagaebatavo in Caesareum Schönbrunnensem migravit, patriae ignotae, apud nos aetate sub dio, hyemem in tepidario agens, o&o pedes altus, trunco pollicem craflb lignofo fufcoque, florens Junio & Julio, Rami teretes, incani, tomentofi, ftriis aliquot elevatis distantibus notati. Folia sunt opposita, breviter Si craiTc, petiolata, lanceolato - acuniinata, crenulata, rugofula, facie viridia & glabra, dor fo torn en to fa & incana, patentiflima, longiora novemuncialia & nncias duas lata. Pedunculi terminales, terni, teretes, incani, ere^i; intermedio lateralibus duplo longiori, plus minus quinqueunciali, & bracteolis duabus incanis fubulatis oppositisque veftito. Capitulum terminate, compa^um, fubrotundum, quandoque fubbilobum#. Flores odoratiffimi, mellei, faturate aurantiaci. Gernien villofum. Stylus albet* Stigma viret.

CAL. Periantlium monopbyllum, tubulcfftmiij ereftum, quadridentatum, obtufum, perfiftens.

Cos.. monopetala, infundibuliformis, calyce duplo longior; limbo quadrifido^ patente; laciniis iubrotundis, -obtufis,

STAM. Filamenta quatuorj, breviffima, in fuprema parte tubi corrolla^ Antherae oblongs.

Pist. Germen obverfe ovatum, fuperum. Stylus filiformis, ereftus. Stigma bifidum, obtufum, utrinque ftylo dependenti - **appreffum.**

PRE.

CCLXXL

BUDLEJA CAPITATA.

Elegantissimus frutex ex horto Schwenkiano Hagsbatavo in Casarem Schönbrunnensem migravit, patriae ignotae, apud nos aetate sub dio, hyemem in tepidario agens, octo pedes altus, truncus pollicem crasso ligno fofo fufcoque florens junio & Julio. Rami teretes, incani, tomentosi, ftriis aliquot elevatis distantibus notati. Folia fiunt opposita, breviter & crasse petiolata, lanceolato-acuminata, crenulata, rugosula, facie viridia & glabra, dorso tomentosa & incana, patentissima, longiora novemuncialia & longiora duas lata. Pedunculi terminales, teretes, incani, erecti; intermedio lateralibus duplo longiori, plus minus quinqueunciali, & bracteolis duabus incanis subulatis oppositisque vestito. Capitulum terminale, compactum, subrotundum, quandoque subbilobum, Flores odoratissimi, mellei, faturate aurantiaci. Germen villosum, stylus albus, stigma viret.

CAL. Perianthium monophyllum, tubulosum, erectum, quadridentatum, obtusum, perflorens.

COR. monopetala, infundibuliformis, calyce duplo longior; limbo quadridido, patente; laciniis subrotundis, obtusis.

STAM. Filamenta quatuor, brevissima, in fuprema parte tubi corollae? Anthera; oblongae.

PIST. Germen obversum ova turn, fuperum. Stylus filiformis, erectus. Stigma bifidum, obtusum, utrinque ftylo dependenti - apicatum.

COR. papilionacea, calyce duplo longior.

Vexillum amplum, subrotundum, emarginatum, convexulum,
Alae oblongae, obtusae, concavae, erectae, longitudine vexilli.

Carina subfalcata, acuta, dipetala, alis brevior.

STAM. Filamenta decem, diadelpa, simplex & novemfidum, Antherae
oblongae, incumbentes.

PIST. Germen lineare, compressum, erectum. Stylus capillaris, ad an-
gulum fere recte ascendens. Stigma ex ipso apice barbatum.

PER, Legumen lineare, acutum, compressum, reflexum, glabrum, uniloculare,
bivalve.

SEM, plura, reniformia, compressula.

CCLXXIII.

VERBENA MUTABILIS,

Crescit in America torrida; apud nos in caldariis floret totam sphaeram, & Julio prima femina maturefcunt Frutex erectus, sexpedalis, ramifus; trunco pollicem crasso, tetragono, medulla alba farinosa, subincana, tomentosa, scabriusculo. Rami juniores acute tetragoni, magis virentes & villosi. Folia opposita, petiolata, ovata cum oris ad petiolum decurrentibus, acuta, ferrata, rugosa, supra villosa & asperiuscula, subtus tomentosa & subincana, quinque uncias longa. Spica terminalis, carnosa, teres, villosa, aphylla, tandem sesquipedalis. Bractea ad singulos flores sessilis, lanceolata, fetaceo-acuminata, superne patula, unde pica evadit squarrosa. Calyx bractea longior, compressus, viridis, villosus, erectus, denticulis duobus exterioribus longioribus & fetaceis. Co-

rolla

rolla primo faturatiffime miniato - coccinea, dein rofea awt carnea, limbo amplo. Filamenta duo. Antherae ochroleucs, lineares, incumbentes. Seminaduo, oblonga, acuta, atra, nitida,

CCLXXIV.

PIPER UMBELLATUM, *Linn.fyjl. pag. 74.*

Saururus arborefcens, foliis amplis cordatis non umbilicatis* *Plum. amer. pig. 53. tab. 73.*

In *fylyis* umbrofis montofis & udis Martinicas &c Donringo fponte crefcit; apud nos In caldariis laete vegetat, florens totam aeftatem. Cailif fruticosus, fexpedalis & ultra, ereftus, debilis, pollicem & ultra craffus, nodofus, hie illicflexuofus, teres, fuiatus, nudus; fuperne, uti & rami juniores, multangulatus villisque albis ad angulos ciliatus. Folia cordato-fubrotunda, acuta, integerrima, petiolata, alterna, tredecimnervia, fupra Hvfinofo, fubtus reticulata, utrinque villofula & mollia, ab o6to ad duodecim uncias longa lataque; petiolo villofo, tereti, fubtus ftriato, calanjam craffo, longitudine circiter ipfius folii, inferne antice lulcato, & bafi dilatata amplexicauli. Stipulas lanceolata?, acuta?, villolula?, caduca. Pedunculi communes axillares ex foliis, & infra haec ex nodis, folitarii vel pauci^retes, craffuli, ere&i, villofuli. Partiales umbellati, a duobus ad quinque aut plures, rarius fine fimbella folitarii, breviflimi, brafteolis bafi fuffulti fubulatis minimis. Spadices plus minus triunciales, teretes, er^aiufculi, albidi primo, dein virides, in fruau fufci, carnofi, squabiles, calamo |raciliores, flofculis immerfis toti teai. Germina alba, fiibrotun-

rotunda. Stylus nullus. Stigmata tria, linearia, patentissima, glabra > nigra, longitudine germinis, cui incumbunt Filamenta nulla. Anthers ad bafin cujusque germinis gemin^e, fubrotundae, fulcats, albs. Fructus minutissimu

CCLXXV-

RHAMNUS VOLUBILIS. *Linn. fyl. pag, 233. Linn. flppLpag. 152.*

Sponte crefcit in Carolina meridionali; apud nos hyemem in caldario, sftatem agens fub dio, & florens mense Julio* Caulis fruticosus, teres, calamum vel digitum minimum craffus, decempedalis, glaber, volubilis, petiolorum bafibus obtuie fpinescentibus exasperatus, ramofissimus. Folia alterna, petiolata, glabra, ovata, acutiufcula, integerrima vel obiter repanda, per venas ftriata. Pedunculi terminates, fubracemofi, breves. Flores parvi. Corolla viridescens, quinquepartita, patens; laciniis ovatis, acutis* Squamae oblongs, albidas, longitudine fere petali. Anthers lutes* Germen fubrotundum, depreffum, viride* Stylus unicus; ftegmateiimplici, obtufo. Bacca oblonga, obtuia, nigra, unilocularis. Semen unicum, ejusdem figurae.

CCLXXVL

SIDA EALMATA. *CawaUL dijf. pag. ao. tab. §:fig. 5.*

Annua planta in ficcis circa Limam Peruvif locis crefcit. Et radice ramoia caulis attollitur octopedalis, calamum plus minus, craffus, teres,

res, medulla alba & viscida farctus, debilis, glaber, superne villosus, superne tantum ramus tandemque ramulis florigeris paniculatus, caeterum implicatissimus. Folia alterna, longe petiolata, utrinque villosa, venosa, palmata, novemlobata, diametri quatuor vel quinque unciarum; lobis lanceolatis, acutis, serratis, incisis. Petioli teretes, infra folium atri, caeterum virides, in foliis inferioribus saepe glabri, in frequentibus supra pilosi, in summis ad ramos toti obferti villis capitatis viscosisque cum interjectis saepe pilis longioribus. Stipulae & bracteae nullae. Rami axillares, teretes, solles, viscidi, paucifolii, in pedunculos paniculatos soluti, ut tandem junctis caulibus superior paniculam formet bipedalem. Flores parvi. Perianthii viscidi & quinquepartiti, nec angulati, lacinae lanceolatae, acutae & patentiusculae. Petala ex caerulea purpurascentia, obtusa, nec emarginata. Capsula a seorsum ad octo, rugosulae, fuscae*, calyce breviores, bifurcatae, rostris modo brevifloris, modo longis erectis & fetaceis* Semina folitaria. In caldario apud nos floret ab Augusto ad Novembrii,

CCLXXVII

ELYMUS HYSTRIX. *Linn, Jyfl. pag. 1*5. Gron. virg. pag. 15.*

Virginia patria est. Ex radice perenni, fibrosa, & albida quotannis subditi attolluntur plures caules erecti, bipedales, foliosi, simpliciter, teretes, >>ti vaginati, glabri, & nodosi. Folia lanceolato-lineariter, acuta, integerrima, glabra, vaginantia, plana, seorsum septemve unctis sine vagina longa. Spica terminalis, erecta, seorsum/pedalis, glabra^ Rachis compressa, rigidula, alternatim denticulata. Dentibus fingulis infident pedicelli duo breves incrassati & callosi, finguli sustinentes spiculam subquadrifloram,

ram, patulam, rigidulamque, Glums virent; squamulae albicant. Anthe-
 xx & germen hirsutum flavent Styli albescent. Floret Junio & Julio, Semi-
 na maturefcunt Augusto, Characterem hie totum lubjungo*

CAL, Receptaculum commune elongatum in spicam.

Gluma carterom nulla*

COR» bivalvis* Valvula exterior lineari - lanceolata, concava, acuminata,
 aristata. Interior eadem figura & longitudine; sed obtusa, mutica
 & plana.

Neftarii figuam *dux*, fits intra valvulam corollae exteriorem an-
 te genitalia, longitudine germinis, ex gibbula crassaque basi lanceo-
 late, acutae, erectiusculis,

STAM. Filamenta tria, capillaria, longitudine valvulae interioris^ Anthe-
 rs lineares, basi bifids.

PIST. Germen oblongum Styli duo, divaricali, inflexi^ pilosi. Stigma-
 ta simplicia.

PER. Corolla femina involvens

SEM. unicum, sublinear^

CCLXXVIII

POA CILIARIS. *Linn.fyji. pag. 115.*

Brizatenuissima, paniculis quasi lanuginosis, pediculis brevibus & tenuif-
 fimis. *Brown, jam. pag. 1351*

Gramen pratenfe, paniculis & foliis anguftiffimis, fpicis brevibus &muticis»
locuftis minimis% Sloan, *hifl.jam.* i. pag. 114. tab. 73. fig. 1.

Gramen maderafpatanum, fpica interrupta, totali e fpicis parvis villofis con-
ftru&a. *Plukn.pkyt.* 109. ^ 5.

Sponte'crefcit in Jamaica & in Guinea* Radix fibrofa, albida &
perennis caules promit plurimos, graciles, (glabro5, teretes, alios fim»
pUciffimos, alios bafi ramoios, geniculatos, inferne nonnunquam flexuo-
ibs, caeterum ereftos, plus minus bipedales. Folia vaginantia, acuta, dor-
fo glabra, ad ora^& in facie afpera, ad vaginae ortum barbata, fine vagi-
^ina plus minus femipedalia, tres quatuorve lineas lata. Panicula ter-
minalis, flaccidula, coaftata, hinc anguftiffima, femipedalis, mollis,
cinerea* Pedunculi particulares plurimi, fparsi, erefti, infimi fescun-
ciales, superiores fuceflive breviores, erefti. Spiculae in his plufcu-
lae, breviffimae, pedunculate, ereftae, ut plurimum fexflorx* Glumae ca-
lycinae oblongo - ovatae, acutae, conc^vae, glabrse, albidae cum dorio vi-
rente; altera p&tilo longiore. Corollarum calyces longitudine aequantium
valvula exterior eft ovata, compreffb - concava, acutula, alba cum tribus
ftriis viridibus* Interior ad oras pilis longis ciliata eft. Anthers viola-
ceae, Semina linearia, minutiffima, rubra« Floret & fructum fert in cal-
dario totam aestatem*

CCLXXIX,

EUPHORBIA LITERATA.

Patriam ignore Jam a pluribus annis possideo hanc plantam in hor-
 >*o, qua sub dio sponte se propagat Saepe etiam in fœmina fuerunt in
 titulo Euphorbia pilosae, cujus determinatio specifica Linnaeana in hanc op-
 time quadrat; sed repugnant cœtera. Nostrae plantae radix est annua, al-
 bida & gracilis. Caulis unicus, erectus, teres, circiter pedalis, glaber,
 gracilis* totus foliosus; & modo simplicissimus, modo [^] x alis summis uno
 alterove ramulo floriferus aufertus; modo ex ipsa basi ramifusus, ut multicaulis
 videatur. Folia inferiora in tenella adhuc dum [^] antula, quae dein decide-
 re solent, macula fusca, literam V exprimente, supra basin infinguntur,
 atque haec obtusa & rotundiora sunt. Reliqua folia sunt longe lanceolata,
 acuta, sessilia, alternata, ad lentem obsoletius ferrulata [^] utrinque & ad oras
 pilosula, patentissima, virentia, uncialia vel paulo longiora. Umbella
 quinquefida cum involucri totidem foliolis, fimbriatis fa%) caulino; dein
 trifida, rarius quadrifida cum totidem involucellis, magis ovatis; tandem
 bifida cum binis involucellis fere deltoideis, vix pilosis, sed manifestius
 ferratis & luteolis. Flores omnes hermaphroditi & tetrapetali, foliis exce-
 ptis umbellae centalibiis pentapetalis & sterilibus. Petala subrotunda, in-
 tegerrima & fœdide lutea. Calyx hirsutus pallidus. Germen verrucosum,
 glabrum, rarius parvipilosum Capiula verrucosa. Semina subrotunda, fu-
 sca, nitida. Tota laetissima. Floret a Junio ad Augustum. Nonnunquam
 ex feminibus Julio lapsis eodeni adhuc anno plantula florens nascitur.

CCLXXX,

EUPATORIUM MYOSOTIFOLIUM.

Ex feminibus in America inter tropicos collectis enatant sunt plants in caldariis nostris biennes, altero xtatis anno per totam sftatem florentes. Caulis quadripedalis, teres, ftriatus, villofulus, calamum crafius, fuperne ramofus & paniculatus. Folia alterna, lanceolata, bafi longe anguftata in petiolum, obfoletiffime denticulata vel integerrima, obtufula^ utrinque villofula, fescuncialia v Pedunculi terminates & axillares^ inordinate ramofi, iKUlou. Calyx villolus, multiflorus, fquamis acutis. Corollae purpurese. pappus pilofus*

CCLXXXI.

TRICHOSANTHES FOETIDISSIMA.

In Guinea fponte crefcit; apud nos sftatem iub dio, hyemem in tepidario agit Toti plants odor fctidiffimus carnis putridse, plane ut in flore Stapelie hirfute, manibusque attreftantis fortiter a^haerens. Flores frutumque fert per totara asflatem. Radix carnofa, alba, fubfufiformis, perennis, primo jam anno digitum crafla, nunc caulem profert unicum, dein plures, annum, herbaceum, oftopedalem, angulatum, ramofum, pilofum, bafi calamum craflum* Cirri ad petiolos laterales, fimlices, convoluti. Folia alterna, oblonge cordata, denticulata, vifcofa, venofa, utrinque & ad oras pilofa, petiolata, craffula, longiora quadriuncialia. Pedunculi communes mafculini racemofi, axillares, plus minus unciales. Fseminei ad la-

tus praecedentium uniflori, iolitarii, craffiores, brevissimi. Corolla lutea, nervola, pilofa. Filamenta hirsuta, pallida. Antherae luteae?. Germen viride, pilosum. Stigma viride* Fructus maturus foetide flavet, uncialis* Semina fusca*

Masculi flores.

CAL* Perianthium monophyllum, basi globosum, dein cyathiforme, femi-
quinquefidum: laciniis lanceolatis, acutis, erectis, distantibus.

COK* monopetala, quinquepartita, patens, calyce duplo longior, eidem-
que adnata; tubo brevi, campanulato; laciniis ovatis, brevissime
dentato-ciliatis,

STAM. Filamenta tria, subulata, superne dilatata in discum expansum ful-
catum & bicornem; cujus utriusque lateri adnascitur anthera oblonga
& distincta.

Feminei in eadem planta cum masculi[^]

CAL# Perianthium ut in mare, superum, marcescens*

COR. ut in mare, marcescens.

PIST. Germen ex basi ovata subulatum, longum, inferum. Stylus filiformis,
erectus, longitudine calycis. Stigmata tria, patentia, fimbriato-
incisa.

PER* Pomum ex basi subrotunda subulatum, hirsutum, trilobum*

SEM. unum alterumve, ovatum, compressum, tunicatum

CCLXXH.

BUPLEURUM ARBORESCENS.

Patriam ignoro* Apud nos aestate Tub dio, hyemem in tepidario tranfigit. Floret sempervirens Augusto, femina perficit sub finem Septembris. Truncus humanae altitudinis, lignosus, basi pollicem crassus, teres, cinereus, glaber, erectus, debilis. Folia parva, subsessilia longe lanceolata, acuta, mucrone terminata ut plurimum recurvato, rigidula, integerrima, ad oras cartaginea, glabra cum nervo medio dorsali & abscissulo, a basi lentem venis reticulata, longiora fere quadriuncialia, trita balsamici odoris. Umbella terminalis in caule ramisque, erecta, planiuscula, radiis a quinque ad duodecim. Involucrorum universalis & partialium foliola quinque, oblonga, mucronata, tota reflexa. Petala oblonga, obtusa, inflexa, lutea. Antherae lutes. Germen oblongum, glabrum» Fructus oblongus, obtusus, incurvatus, fuscus, glaber, bipartibilis in femina duo ejusdem figurae, hinc plana, illinc quinquelata, saporis aromatici & ingrati

CCLXXXI.

LEYSERA GNAPHALODES *Linm fyl. pag. 770. amcen. acad. 6, pag. 104.*

Afteropterus luteus, laricis foliis, VaiU. aft. 585.

After ythiopicus, ftschadis folio, flore aureo. Herm. hgd, pag. 68. tab, 71. Breyn, prodr 3. pag. a 5. tab, 14. fig. 3»

Frufti-

Fruticulis sempervirens, hyemem in tepidario, seftatem agens sub dio florens Julio & Augusto; ex Promontorio bonae Spei, totus odore balsamico praeditus, truncis ramisque junioribus aphyllis fuscis rimulosis & glabris, junioribus densissime foliosis, ramis patentifloris. Folia confertiflora, filiformia, patentiflora, integerrima, incana, lanata, flaccida, uncialia, villisque fuscocapitata donata. Haec inter fasciculi prodeunt foliorum quoniamdam, veluti rudimenta ramulorum novorum, qui tamen ad evolutionem pauci perveniunt. Pedunculi filiformes, terminales in ramulis, folitarii, uniflori, Calycis squamulae pallent cum dorio medio virente. Corolla lutea est. Semina fuscescunt

CAL. communis ovato - oblongus, imbricatus; squamis lanceolatis[^] acutis, erectis, concavis, superne scariofis, interioribus longioribus, intimis iuperne patulis,

COR. composita radiata. Corollae hermaphrodite tubulosae plures in disco, Faeminae ligulatae plures in radio.

Propria Hermaphroditis infundibuliformis, quinquefida; laciniis lanceolatis, acutis, erectis, folio apice revolutis,

Faeminae ligulata, longe lanceolata, obsolete tridentata, acuta, patentissima.

STAM[^] Hermaphroditis filamenta quinque, capillaria[^] breviflora, -Anthera cylindrica, tubulosa*

PIST_# Hermaphroditis & Faeminis germen lineare. Stylus filiformis. Stigma bifidum.

PER. nullum. Calyx patentissimus.

SEM. Hermaphroditisfolitaria, teretia, linearia, obiter hispida. Pappus duplex; exterior quinquefidus, plumosus, longus; interior corona paleacea brevissima.

Faemineis fimillima, sed pappo plumoso illo destituta.

REC, nudum, Paleae ad folios radii flosculos lanceolato-acuminatae, concavae,

CCLXXXIV.

ANDROPOGON BARBATUS. *Linn. fyft. pag. 904,*

Crescit in India utraque, apud nos colitur in caldariis. Ex radice fibrose, fasciculata, albida & perenni culmi exurgunt sesquipedales erecti plerumque, etiam basi geniculatim procumbentes, toti compressi > glabri, infra medium raro folii. Folia inferiora sunt opposita, reliqua alterna, basi longe vaginantia & ancipitia; hinc plana, acuta, linearia, ad oras retrorsum scabra pilisque ciliata, vel ex adverso pilo destituta omni. Spica ad fuminitatem culmi a decem ad octodecim, approximate, lineares, subsessiles, patulae, duas tresve uncias longae, graciles. Rachis compressa & ad oras cartilagineo-aculeata subtus ex utroque latere gerit duplicem series florum fecundorum alternantium breviterque pedicellatorum. Calycis biflori & biglumis valvulae sunt lineari-lanceolatae, acuminatae, carinatae? pallidae & pellucidae cum dorso virente & scabra nonnunquam purpureae > quarum exterior longior est. Flores bini, inferior in speciminibus nostris semper hermaphroditus & sessilis, superior masculus & pedicellatus, Hermaphroditi valvula exterior ex ovato lanceolata, acuta, connata, subsessilis, albida, dorso promissulo marginibusque virentibus pilis fat

gis albisque ciliata, ex dorso infra apicem emittens ariftam longam, re&ani
 purpureamque. Valvula interior lanceolaia, plana, acuminata, mutica,
 ejusdem fere longitudinis, glabra. Filamenta tria, capillaria, alba. An*
 theræ oblongæ, utrinque bifurcæ, fulphuræ, incumbentes. Germen ova-
 to-oblongum, glabrum. Styli duo, brevifliini, capillares, albi* Stigma-
 ta plumofa, purpurea. £ regione hermaphroditi in glumas calycins axilla
 .fasciculus pilorum fedet, Mas ftru&ura admodum differt ab Hermaphrodito.
 Valvula illi exterior obverfe ovata eft, obtufiffima, truncata, concavo-for-
 nicata, laevis, pallida, fubpellucens, dorfo marginibusque virens, ex ipfo
 purpurafcente apice porrigens ariftam reftarum longam purpureamque. Val-
 vula interior, in cavitate exterioris partim latitans, eft ventricofe for-
 nicata fereque lubglobofa, ex dorfo fupremo ariftata adinfar prioris.
 Stamina uti in hermaphrodite** Calyx poft iëminis, corolla inclufi, la-
 plum perfiltit

CCLXXXV.

CHENOPODIUM GUINEENSE

Annua plantta, ejrefta, tota glabra, fesquipedalis, fub dio apud
 nos florens)unio & Julio, in Guinea (ponte crefcens. Caulis teres, cala-
 mo gracilior, ftriatus, purpurafcens, in toto decurfu ornatus ramisaxilla-
 ribus breviffimis. Folia alterna, petiolata, tenuia, deltoideo-ovata, fi-
 nuato-argute dentata, acuta, venofula nee rugola, virentia, longiora duas
 cum dimidia uncias æquans cum petiolo infuper unciali. Racemi raroofi,
 Jerminales & axillares, floribus viridibus conglomeratis onufti. Calycis
 folio-

foliola ovata, acutula, crassa. Styli duo. Semen orbiculare, depressum, fordide nigrescens.

CCLXXXVI.

CACALIA VILLOSA,

Crescit ad Promontorium bonae Spei; sub dio apud Jaos* florens Julio; tota villosa, asperiuscula, & odore balsamico ingrato praedita. Radix crassa, perennis. Caules plures, annui, erecti, pedales, striati. Folia alternata, lyrata, squarrolosa, crassa; infima longe petiolata, orbicularia; superiora dentata, amplexicaulia, obtusa, venosa; summa acuta, sub lanceolata, incisiva-ferrata. Pedunculi terminales, ramosi, corymbosi, erecti; ramis lateralibus inferioribus tandem ultra centrales elongatis. Flores erecti. Calycis simplicis villosi & oblongi squamis plus minus duodecim, lineares, acutas, concaves, erectae, pallide virentes, unius ordinis. Flocculi circiter quinque & triginta, omnes hermaphroditici. Corollulae longissime infundibuliformes, albidae cum limbo parvo purpureo quinquefido & reflexo. Anthera tubulosa, cinerea. Stigmata extra hanc tandem eminentia duo, obtusa, reflexa, purpurea. Gernien oblongum, glabrum. Calyx in fructu immutatus, Receptaculum nudum, Semina oblonga, pappo coronata piloso & feflili.

CCLXXXVII.

GALEGA FIUFORMIS.

Sponte crefcit in America calidiora In caldario florefc per totam jeftatem. Ex radice ramofa caulis unus alterve exit gracilis, volubilis, omnium ramofiffimus, bafi fufcefcens, caeterum viridis, teres, ad lentem villofolus, quadripedalis, una cum plerisque ramis perennis. Folia funt ternata, breviter yetiolata, alterna, parva; foliolis oblongis, obtufis, breviffime pedicellatis, integerrimis, iupra nitid^s, utrinque ad lentem villofolis. Stipulas fubulatse, minute. Racemi axillares, folitarii, .iitormes, patuli, a duabus ad quatuor uncias longi, villoluli. Flores ternati, breviter pedicellati; etiam binati aut folitarii. Calyx villofolus ex rubro purpu[^]rafcil. Corolla unicolor ex violaceo fordide purpurafcit. Antherae funt ochroleucs. Germen villofurn. Legumen ad lentem villofoluin, fufcum, unam alteramve unciam longum. Semina glabra, compreffa, iordide lujca aim hilo nigro. Brakes lanceolate. ' •

CAL. Perianthium monophyllum. Tubus campanulatus. Limbus quadridus, tubo longior; laciniis lanceolatis, acutis., patentiflimis*, fubfequalibus; fuprema iatiore, integgriina*

COR. papilionacea, calyce dimidio longior.

Vexillum fubrotundum leviter emarginatatiei, patens.

Alae lineari-lanceolatas, obtufaj, planae, patentiflimae, longitudine vexilli.

.Carina difetala, erefta, figura & magnitudine alarum.

STAM. Filamenta decem, diadelpa* (fimplex & novemfidum) erefta. Anthers' oblongs.

PIST. Germen oblongum, compreffum. Stylus fubulatus, ereftus. Stigma fimplex, obtufum.

PER. Legumenlineare, compreffum, acutum, retrofalcatum, ftriis inter feraina transversis & obliquis notatum.

SEM. plura, rotundato-reniformia,

CCLXXXVIII.

GALEGA LONGIFOLIA.

In America calida crefcit; apud nos in caldario floret aeftate, & ex radice ramofa & fufca caules emittit plures fuffruticofos, volubiles, teretes, graciles, glabros, quinquepedales & rainofos, Folia funtternata, brevif-
fiks petiolata, alterna; foliis angufte oblungis, obtufis, integerrimis, utrinque ad lentem villofulis; intermedio longiori lateralibus, fjepe plus quam triunciali latoque tres tertias unciae partes. Racemi axiilares, folitarii, foliis longiores, erefti(culi. Flores geminati, pedicellati. Calyx villofus vifret Corolla purpurea & unicolor. Anthers flavent. Germen villofum eft» Legumen biunciale ex cinereo fufcefcit, denfogue villo obducitur. Semina ex cinereo fufcoque variegantur*

CAL, Perianthium monophyllum. Tubus brevis. Liirilms quadripartitus; laciniis lanceolatis, acutis, concavis., patulis; infima longiote; lumma a vexillo reflexa latiore & integerrinia.

COR, papilionacea.

Vexillum late ellipticum, obtufum, integerrimum vel emarginatum, planiufculum, reflexum.

Alas oblongs, obtufse, concavae, ereffce, longitudine vexilji.

Carina dipetala, falcato-oblonga, fitu & longitudine alarum.

STAM. Filamenta decem, diadelpa ((implex & novemfidum,) ere&a, apice adfcendentia. Anthers fabrotunds, incumbentes.

PIST. Germen oblongum, compreffum. Stylus filiformis, fitu & longitudine ftaminum. Stigma fimplex, obtufum.

PER.. Legumen lineare, compreffum, acutum, <reflum, ^ad lemna transversim torrulofo friatum.

SEM. plura, reniformia.

CCLXXXIX.

MALACHRA ALCEJEFOLIA.

Radiatam Linn si Malachram, Plumieri plantam, videre mihi nunquam contigit. In Martinica haud procul a vico Francisci in apricis faxofis udis Malachrs ipeciem obiervavi floribus luteis donatam, omnium hifpidifunam Si pungent!flimam, qus ex leminibus JI me allatis colebatur olim in horto Botanico, foliis caulinis omnibus una cum petiõlis deflexis a cognitis reliquis diicrepantem, quam deicribere neglexi. Halfca me difta alceaefolia a radiata ex icone Plumieri differt minore longe hifpiditate, foliorum figura, involucris minoribus, aliisque momentis. Carraccas in America calida, patria eft. Odor plants cucumerinus., In caldario floret a Julio ad Novembrim. Radix annua, ramofa. Caulis unicus, fexpedalis, erectus, bafi

pol-

pollicem craffus, teres, viridis, ex foliorum alisramofus, pilis albis rigidis fubpungentibus micantibusque fparfim nee denfe hifpidulus. Tales etiam pilos petioli, pedunciili, & rami habent, multo denfiores rami petiolique in antica parte. Folia funt alterna, bafi cordata, fubrotunda, venoia, pa* tentiflima, obtufe ferrato - crenata, glabra utrinque cum adfperfis ad nervos pilis rariflimis, quinquelobata, inferiora minus profunde incifa & obtufa f fuperiora profundius fefta & acuta* Stipulae fubulat<e, ereftae^ acutae, virides fere unciales, utrinque laterales ad petiolos terna? vel quaterna?^ Pedunculi communes axillares, folitarii cum ramo focio, vel gemelli cum ramo intermedio, patuli? teretes, villofi, biunciales, Flores capitati. la uafn toji'filibet folioli calycis communis flos fedet, ut in petiolo Turners ulmifolia; cl^in centrum capituli flores alii occupant breviflime pedunculati plus minus quatuor* Corolla lutea eft, Antherae luteae, Arilli glabri^ ftneri, ovati, hinc convexi, inde angulati. Semina atra*

CAL. Perianthium commune pentaphyllum, fubdecemflorum, perfiftens: foliolis inaequalibus, patentibus, acuminatis, nervofis, bafi albidis & diaphanis, caeterum virentibus, ad oras pilis albis ciliatis, extimis iemitrilobis; fingulis utrinque ad latus ftipatis fetula.

Perianthium proprium profunde quinquepartitum, erettiufculuti f perfiftens: laciniis lanceolatis, acuminatis; ad oras ciliatis, tribus ftriis virentibus percurfis, ipfis pallidis, corolla fere duplo brevioribus.

COR. monopetala, la?e infundibuiiformis cum limbo patente, quinquepartita; laciniis obverfe ovatis, obtufis, planis.

STAM.

polKcem craflus, teres, viridis, ex foliorum alis ramofus, pilis albis rigidis fubpungentibus micantibusqueparfim cec denfe hifpidulus. Tales etiam pilos petioli, pedunculi, &ramibabent, multo denfiores rami petiolique in antica parte. Folia funtalterna, baficordata, fubrotimda, venofa, pa' tentiflima, obtufe ferrato- crenata, glabra utrinque cum adfperfis ad nervos pilis rarifllmis, quinquelobata, inferiora minus profunde *incifk* & obtufa, fuperiora profundius fefta & acuta. Stipulae fubulats, ereftas*, acuts, virides fere unciales, utrinque latencies ad petiolos ternje vel quaterns,, Pedunculi communes axillares, folitarii cum ramo focio, vel gemelli ctim ramo intermedio, patuli, teretes, villoft, biunciales, Flores capitati. la *UAU* cuj.'slibet folioh calycis communis flos fedet, ut in petiolo Turners ulmifolije; cl^in centrum capituli Hores alii occupant brevilime pedunculati plus minus quatuor* Corolla lutea eft. *Anihexm* luteae, Arilli glabri, Snerei, ovati, hinc convexi, inde angulati. Semina atra.

CAL, Perianthium commune pentaphyllum, fubdecemflorum, perilftens: foliolis insqualibus, patentibus, acuminatis, nervofis, bafi albidis & diaphanis, ceterum virentibus, ad oras pilis albis ciliatis, extimis iemitrilobis; fingulis utrinque ad latus Aipatis fetujs.

Perianthium propnum profunde quintjuepartitum, ere^ciufcuJuni, perfiftens: laciniis lanceolatis, acuminatis; ad oras ciliaris, tribus Uriis virentibus percurfis, ipfis pallidis, corolla fere duplo brevioribus.

COR. monopetala, lafe infundibuliformis cum limbo patente, quinquepartita; laciniis obverfe ovalis, obtufis, plants.

STAM.

communis fedet flos; 'reliqui brevissime pedunculati centrum occupant Uterque calyx longe ciliatus est, exterior infuper utrinque hispida, Perianthii proprii tubus viret; lacinae pallent cum ftriis badiis* Corolla foris rosea cum ftriis purpureis, intus pallet, & ad lentem extus inque oris villosa est. Antherae ochroleuca?. Stigma album. Ariili glabri, cinerei.

CAL. Perianthium commune triphyllum, subquinqueflorum, persistens: foliolis ovato-acuminatis, argute ferratis, nervosis, inaequalibus, cum interjunctis foliariis.

Perianthium proprium profunde quinquepartitum, erectiusculum, persistens: laciniis lanceolatis, acuminatis, trifidis, corolla duplo brevioribus,

COR. monopetala, infundibuliformis cum limbo patente quinquepartito; laciniis obverse ovatis, obtusis, planis

STAM. Filamenta plurima, in unum corpus coalita erectum, inferne villosum, corolla brevius. Antherae subrotundae.

PIST. Germen subrotundum, quinquelocatum. Stylus filiformis, longitudine filamentum. Stigma decemfidum; laciniis linearibus, obtusi apice villosis, recurvatis,

PEH. Ariili quinque, in capitulum subrotundum collecti, introsum dehiscentes, decidui.

SEM. folitaria.

CCXCI.

DRACAENA TERMINALS *Unn. fyfi. pag. 334.*

Terminalis rubra. *Rumpf. amb. 4. pag. 80. tab. 34. fig. 2+*

Crescit in insulis Mauritii, Java, Teraate aliisque India Orientalis locis. In caldariis nostris floret Februario & Martio, sed fructum nedum tulit. Radix crassa, cinerascens, & fibris albis crassis longisque aucta, caules producit plures, sexpedales & ultra, fruticosos, teretes, cinereos, tuberculis inaequales, erectos, tandem brachium crassius; ramis (superne tantum foliosis, inferne a foliis delapsis cicatrices circulares gerentibus. Folia sunt longe lanceolata, acuta, glabra, lucida, integerrima, sesquipedalia cum pedunculo femipedali calliculato & amplexicauli, in summa parte caulis ramorumque approximata. Racemus terminalis, erectus; compositus ex racemulis patentibus, cylindricis, a duabus ad quatuor uncias longis, purpureis, glabris, rectis, fulcatulis. Pedicelli proprii uniflori, crassi, brevissimi, rigiduli, attentissimi, ad basin circumdati bracteolis minutissimis & fuscis. Flores inodori, corollis purpureis, filamentis albis, antheris ilavis, germine niveo, stylo & stigmate albis cum suffusa purpura.

CAL. nullus.

COR, Petala sex lanceolato-linearia, obtusula, inferne in tubum erecta, superne patentia, tria interiora & tria exteriora.

STAM, Filamenta sex, late compressa, acuta, erecta, petalis paulo breviora. Antherae inoimbentes, sagittatae.

PIST*

CCXCL

DRACAENA TERMINALS *Una. fyft. pag. 334.*

Terminalis rubra. *Rumph amb. 4. pag, 80. tab. 34. fig. 2**

Crefcit in infulis Mauriti, Java, TerHate aliisque Indiae Orientalis locis. In caldariis nostris floret Februario & Martio, sed fructum nescit. Radix crassa, cinera Teens, & fibris albis crassis longisque au&a, caules producit plures, fexpedales & ultra, fructucolos, teretes, cinereos, tuberculis inaequales, erectos, tandem brachium crassos; ramis [u^{me} tantum foliosis, in femina a foliis delapsis cicatrices circulares ger^{itibus}. Folia sunt longe lanceolata, acuta, glabra, lucida, integerrima, sesquipedalia cum pedunculo femipedali calyculato & amplexicauli, in summa parte caulis ramorumque approximata. Kaceimis terminalis, erectis; compositus ex jacemulis patentibus, cylindricis, a duabus ad quatuor uncias longis, purpureis, glabris, rectis, fulcatis. Pedicelli proprii uniflori, crassii, brevissimi, rigiduli, patentissimi, ad basin circumdati bracteolis minutissimis & fuscis. Flores inodori, corollis purpureis, filamentis albis, antheris flavis, germine niveo, & stigmate albis cum iuffusa purpura.

CAL. nullus.

Gox. Petala sex, lanceolato-linearia, obtusiuscula, inferne in tubum erecta, superne patentia, tria interiora & tria exteriora,

•STAM, Filamenta sex, late compressa, acuta, erecta, petalis paulo breviora. Anthers incunabentes, sagittatis.

PIST.

Stylus & stigma quinquefidum lineare & revolutum fanguinea* Fruclus iongerostratus, erectus, fericeus, calyce connivente basi vestitus. Semen basi acuminatum, fuscum, villosum, cum arista tortili & pilosa,

CCXCUL

PORTULACA QUADRIFIDA. Ta*. 17. fig. 4. Linn. *fyft* pag. 445.
manUpag. 73.

In hortum nostrum ex infuU Borbonise venit, ubi sponte crescit. Radix annua, fibrosa, tenella. Caules filiformes, tenelli, tetetef?, purpurU, glabri, ramosissimi, debiles, prostrati, tandem pedales, **p^xrimi**, tott foliosi, ad folia geniculati & radtcantes, ibidemque **fnkraflati**, articulati, quadriidentati, & pilis albis barbato. Folia sunt oyato-lanceolata, acuta, integerrhna, breviter petiolata, glabra, carnosula, utrinque ad lentem punctata, opposita, parva; terminalia in ramulis florentibus erectis quaterna. Flos in his seflilis, folitarius, erectus. Calycis foliola duo, Qvata, obtulula, pallida, pilosa* Petala quatuor, calyce duplo longiora, ovata, obtufa, patentissima, lutea. Stamina oflo, fere longitudine corolla. Germen subrotundum. Capsula circumfcilTa. Seinina plurima, ad lentem muricata.

Stylus & figraa quinquefidium lineare & revolutum fanguinea. Fructus longiflorus, erectus, ferrugineus, calyce connivente basi vestitus. Semen basi acuminatum, fuscum, villosulum cum arista tortili & pilosa.

CCXCUI.

PORTULACA QUADRIFIDA. *lab. 17..ft, 4* Linn. fyl. p. 445.*

matit. pag, 73.

In hortum nostrum ex insula Borneae venit, ubi sponte crescit. Radix annua, fibrosa, tenella. Caules filiformes, tenelli, teretes, purpurei, glabri, ramiflori, debiles, prostrati, tandem pedales, primis, toti foliosi, ad folia geniculati & radicanes, ibidemque incrassati, articulati, quadridentati, & pilis albis barbati. Folia sunt ovato-lanceolata, acuta, integerrima, breviter petiolata, glabra, carnosa, ut in quinque ad lentem punctata, opposita, parva; terminalia in ramulis florantibus erectis quatuor. Flos in his feffilis, foliarius, erectus. Calycis foliola duo, ovata, obtusula, pallida, pilosa. Petala quatuor, calyce duplo longiora, ovata, obtusa, patentiflora, lutea. Stamina octo, fere longitudine corollae. Germen subrotundum. Capsula circumscissa. Semina plurima, ad lentem muricata.

CCXCIII.

CCXCIV.

INDIGOFERA DENDROIDES.

Crescit in arenosis Guineae; in caldariis nostris floret Augusto & Septembri; **femina** perficit Novembri, Annuā planta habitu arbutulam comofam refert. Radix ramosa fordide albet. Caulis **pedalij**, ereftus, gracilis, Untura luperne ramotus. Folia iunt alterna, pinnata ex paribus a quoque ad duodecim, **plus minus biancialia**; foliolis oppufitis, oblongis, acutulis, breviffime petiolatis, nudo oculo integerrimis & glabris, armato abtem utrinque per fe tulas decumbentes albidis & ad oras obiter ciliato-aculeatis. Ramus axillares, multiflori. Bracteola ad pedicellos immutata. Calyx villosus pallide viridis. Corolla rubella. **Vexillio** fubtus & ad oras villosi ad lentem, magis pallens, **ictus** ad unguem loturate rubrum cunctis punctis albidis. Legumina nitidum, uncinata, Semen atra.

CAL. Feriarthium proinde quinquepartitum, patentissimum, planum; laciniis lanceolatis, acutis, subaequalibus, sub vexillomagisdivergentibus.

COR. papilionacea.

Vexillum obverse cordatum, reflexum, patentissimum, planum, calyce triplo longius.

Alae obverse ovate, obtuse, pinnatae, totae deflexae, patentissimae vexilloque oppufita*.

Carina oblonga, obtusa, connivens, inter alas deflexa, earundemque longitudine.

STAM. Filamenta decem» diadelphica (simplex & novemEdiun,) carinae inclinatae. *Antherae* subrotundae.

CCXCVL

INDIGOFERA HIRSUTE *Linn, fyft. pag. 678.*

Afragalus fpicatus, filiquis pendulis hirsutis, foliis fericeis. *Burnt, zeyl.*

P^a & 37- tab. 14.

Colutea lanuginosa, floribus parvis, filiquis pilosis, deorsum tendentibus.

Petiv. mus. num. 45.

Orobus zeylanicus iccanus, filiquis pendentibus torosis. *Breyn. prodr. 2.*

pag. 80.

Kattu Tagera. Rheed. hort. mal. vol 9. pag. 55. tab. 30.

Crescit in Guinea & Zeylona. In caldaris apud nos annua floret demum mense Novembri, & fine fructu dein perit. Tota pilis fuscis hirsuta est, & viscosa. Caulis erectus, pedalis & ultra, teres, mox supra terram ramos oppositos duos emittit, tandem ex omnium foliorum axillis futura ramosa. Stipulae fetidae, hirsutae, feminales & ultra. Folia alterna, patentissima, pinnata ex paribus duobus cum impari, infima ternata; foliolis obverse ovatis obtusis, brevissime petiolatis mollibusque. Pedunculi axillares, folitarii, teretes, foliorum longitudine, dein in spicam longam paulatim ultra viongandi. Bractae fetidae, parvae. Flores parvi, brevissime pedicellati, parvi. Calyx hirsutus pallide viret. Petala miniato-rubra funt, &c caduca. Antherae flavae. Lugumen pendulum nigricat, pilisque albidis dehisce obfidetur. Semina sunt cinerea.

CAL. Perianthium monophyllum, profunde quinqueartitum: dentibus subulatis, acutis subaequalibus patulis.

COR. papilionace[^]

Vexillum late ovale, obtusum, integerrimum, patens.

Alae cuneiformes, obtusae, erectae, longitudine vexilli.

Carina oblonga, obtusa, alis paulo brevior, eorundemque (itu,

STAM. Filamenta decem, diadelpa ((implex & novemfidum,) erecta, Antherae subrotundas.

FIST. Germen oblongum. Stylus filiformis, fitu flaminum. Stigma obtusum.

PER* Legumen lineare, tetragonum, rectum, acutum, uniloculare, bivalve*

SEM, plura, subteretia, utrinque truncate

CCXCVIL

PHYLLANTHUS SPECIOSA.

Stirps elegantissima, cujus patriam ignoro, in ealdario herti Caesarei Schiinbrunnenfis colitur, lempervirens, per totum fere annum floribus fructibusque onusta. Caulis arboreus, nunc quadripedalis, (impliciflorus[^]. erectus, digitum basi crassus, teres, cortice cinereo testis, a foliis deciduis tuberculatus, in summitate purpurascens. Folia in summo caule alternatim parva, patentia, firma, glabra, petiolata, pinnata; toliolis utrinque quinque vel sex fine in pari alternantibus, lanceolatis, acutis, ferrulatis, subsessilibus, coriaceis, per venas triatis, biuncialibus, supra serrate, subtus dilute virentibus, junioribus hic illuc purpura suffusis. Stipula infra petiolum lanceolata, acuta, rigidula, fuscescens. Ex crenis foliorum pedunculi exeunt graciles, ad summum ferulaceae, uniflori, modo folitarii, modo plures aggregati. Flores parvi, sulphureo - albidus, mares & feminae mixti, in*
odori.

odorj. Caffuls veftiuntur pellicula glabra, per exficcationem fponte abfcendente, atque tunc elaftice diftillunt. Semina nigricant.

Mafculi flores.

CAL* Perianthium monophyllum, coloratum, patentiffimum, fexpartitum; laciniis rotundatis cum bafi anguftata.

Con. nulla.

Neftarii glandulat fex, orbiculares, plans, breviflimo pedunculo peltatis infidentes fingulis fingulis divifuris perianthii.

STAM. Filamenta tria, inferna medietate connata in unum corpus, fuperne patula, craffa, calyce multo breviora. Anthers in filamentis cujuslibet dilatato apice geminae, fubrotundae, feffiles.

Fasminei flores.

CAL. ut in mare, perfiftens.

Con. nulla.

Neftarium ut in mare.

PIST. Germen fubrotundum. Styli tres, patentiffimi, plerumque duo trifidi, unus bifidus. Stigmata fimplicia*

.PER. Capfula tricocca, deprefla, glabra > trilocularis, trivalvis,

SBM. unicum, alterumve.

CCXCVin.

EUPHORBIA PILULIFERA. *Unnnyji. pag. 450.*

Tjthymalus bptryoides ereftus, florum capitulis CQpju^{atis} & longiori pediculo infidentibus, *Burm.zeyl. pag. 224. tab. 105. fig. 1. Petty, gaz. tab. 14. fig. 14.*

In iniula Mauritii & in Zeylona crefcit; in caldariis floftris annua piana prima jam xftate floret, & ex feminiliis numerofiffimis delapfis fpon- te eodem adhuc anno novam iobolem generat, fru&iferam quoque futuram. Ex radice ramoia caulis attollitur circiter pedalis, fuperne nutans, caeterum ereftus, teres, folio(us, hirtutulus, fufcefens, tandem ex unius alteriusve folii inferioris ala breviffimum ramulum porrigens, alias fimpliciffimus. Folia oppofita, breviffime petiolata, patentiffima, ovato-lanceolata, inferne in uno latere longitudinaliter truncata, acuta, ferrulata, utrinque villofuk, fupra faturate virentia, fubtus glauca, plus minus biuncialia. Pedunculifub- axillares, iolitarii, alterni, teretes, erefti, villofuli, femunciales, flores numerosos in duo capitula colligentes, in noftris omnibus individuis ficcon- denfata, utunicum videatur, contra ac infigura Thefauri zeylanici citata. Pe- dunculorum fubdivifio eft breviffima, tamen ut plurimum dichotoma. Flo- res minutiffimi, omnes hermaphroditi. Calyx turbinatus, quinquentatus> acutus, ereftus, villofulus, viridis. Petala quatuor, orbiculata, exigua, convexula, nitida, viridia, intra calycem. Anthers ochroleucs. Ger- menviride, triquetrum. Stigmata bifida, alba, obtufa. Capfula hirtula. Semina rubella,

CCXCIX.

CASSIA SENSITIVE.

Jamaica patria eft. In caldariis noftris florft totam aftatem, fruftus- que fert maturos. Radix, ramofa, annua. Caulis ereftos, bipedalis, pa- runi ramofus, teres, calamum craffus, inferne glaber, csterumvillofus. Fo- lia patentiffima, alterna, quadrijuga vel quinquejuga, Cofta villofa, bafi
in-

incafiata, antice iulcata, ties quatuorve uncias longa, ex fulco eroittit inter quolibet foliorum paria glandulam cylindricam, longe petiolatam, erectam, aurantiacam, unaque cum petiolo suo pilofulanu Foliola sunt obverfe ovata, veloblunga obtufa cum mucrone fericeo, integerrima, exteriora majora fescuncialia, mollia, fctidula, facie villofula & ex glauco virentia, dorfo fericea multoque magis cinerea. Pedunculi communes multiflori, breves, axillares, folitarii, eretti, pedicellis approximatis veluti umbellati. Calycis foliola ~ovata, obtufa, concava, inaequalia, cum flavedine virentia. Petala lutea, fubaequalia, obverfe ovata, obtuffiffima, concava, patula, calyce dimidio longiora. Anthers decem & piftillum ad characterem Linnaei. Legumen lineare, comprimitum, acutum, recurvum, ad femina torulofum, villofum, punctis extantibus fcaabrum, fufcum, erectum, bivalve, propter membranatum interiorem utriusque valvulae inter fingula femina elevatam & diftumentiformem multiloculare* Semina plus minus decem, fubteretia, utrinque oblique truncata, cinerea, nitida. Foliola fenfitiva funt, fed non aequae omni tempore; naturaliter enim horizontaliter expanda, ad contactum mox pendula evadunt & plicata, brevi iterum feffe reftitutura, cofta femper manente immobili.

CCC.

DIOSCOREA VILLOSA* *Linm. jyl. pag. 888- Gror. virg. pag. 156.*

Bryonis finiflis floridana, mucofis floribus quernis, foliis fubtus lanugine, villofis, medio nervo in fpinulam abeunte. *Plukn. aim. pag. 46. tab. 375. fig. 3.*

Omni citatum a Linnaeo Rumphii synonymum, quod ille plantaefuae radicem tribuat rapaeformem pugnoque paulo minorem, caules inferne spinosissimos, deciduorum foliorum petiolos spinosissimos, unde caules credi perennes possunt, aliaque, quae minime conveniunt plantae nostrae. Omni etiam synonymum Plumieri, utpote valde dubium. *Difcorea villosa* spon- te crevit hi Virginia & Florida* In caldariis horti Caesarei Schonbrunnen- fis & botanici Vindobonensis numerosae aluntur individua, laetissime vege- tantes, etiam quaedam sub dio optime hyemem passae, sed ¹ tot unica in caldario horti Vindobonensis huc usque floruit macula copiosissime ab Aprili ad Julium tertio aetatis anno. Radix perennis, lignosa, vix calami cras- sa, nodosa, fusca, amara, inodora, horizontaliter ramosa, fibrisque numerosis capillata, ex ramulorum apicibus caespitose caules emittit annuos, quadripedales, teretes, glabros, graciles, totos foliosos, inferne erectos, dein volubiles, simplicissimos. Folia sunt cordata, acuta, innocuo mucro- ne terminata, obsolete undulato-repanda, caeterum integerrima, septem- nervia, supra glabra, subtus in nervis ad microscopium villosa, duas uncias longa cum petiolo gracili plus minus aequae longo, inferiora quaterna aut ter- na, dein fitu in distantis inordinate alternata rarius etiam opposita. Race- mi foliis breviores, axillares, folitarii, patentes, multiflori, inferiori simplices, reliqui compositi. Flores inodori, minuti, fulphurei, pedicellati aut sessiles. Antherae pallide flavae. Semina fusca, nitida, subrotunda, pla- na, cincta plus minus ala membranacea tenuissima pellucida con calore & in- aequaliter subrotunda.

Mas.

CAT.* Peri-anthium sexpartitum, patentissimum; foliolis oblongis, orbatis, planis*

COR. nulla.

STAM* Filamenta sex, fubulata, apice bifida, erefta, breviffima, Aithe-
 rx geminac, fubrotundas, feffiles.

PIST. Germina tria, conica, truncata, brevia. Stylus nullus. Stigma
 nullum.

CCCL

DIOSCORIDA -TRIPHYLLA- *Linn.fyjl. pag. 388.*

Ubium fylveftre. *Rumph. amb. vol. 5. pag. 361, tab. 128.*

T(ageri - Nuren. *Rheed, mal vol 7. pag. 63. tab. 33.*

Crefcit in Malabaria pluribusque aliis India; orientalis locis. Semi-
 na mecum communicavit illullriflimus Bankfus, collegia in ultimo itinere
 celeberrimi Cook. Omnia germinarunt, ut plura habeamus elegantis hujus
 plants individua; & tamen unica hue ufque in horto noftro botanico floruit
 femina, idque a Majo ad Auguftum ufque copiofiffime* Jam ad finem pri-
 mi autumnis radicis tuber pugnum aequabat, mine conftat radix ex aggerie
 tuberum, inter quae iunt, qui capitls infantis magnitudinem habent, mag is
 minusve fubrotunda omnia, foris nigricantia Qlutea vel alba Rhumphius fua
 afferit) intus alba & carnofa, coharentia fuperne, fibrisque numerosis albi-
 cantibus a fupremo communi vertice ortis tefta. Caulis annuus, unus alter-
 ve, celerrime increfcens, vigintipedalis, ad humanam altitudinem ere-
 ctus deinde volubilis, inferne aphyllus ut plurimum, deinde foliofus & raro-
 fus, calamum digitumve craffus, ex glauco virefcens, teres, aculeis nigri-
 cantibus brevibus fortibus fubulatis re^is & ex bafi lutea ortis totus denfe
 obfeffus. Folia funt alterna, & omnia (emper ternata. Petiolus teres, ba-

fi incrassatus, paucis parvisque aculeis armatus, foliolis longior. Folia sunt inermia, utrinque villosula, integerrima, acuta, nonnunquam cuspidata, triplicinervia vel iubequintuplicinervia, brevissime petiolata; intermedium obverse ovatum vel latissime lanceolatum; lateralia oblique ovata. Racemi axillares per totum caulem & aliquot etiam in ramis, folitarii, toti ex cinereo flavescentes, ramosi, ad lentem hirsuti, inferiores ante folia prodeuntes, longiores semipedales* Flores numerosissimi, fertiles, minuti, concolores, ad lentem extus villod. Styli fuscescunt* Semina sunt nitida & bacca.

Faemina*

CAL. Perianthium tripartitum; laciniis ovatis, acutis, crassulis, patentibus, persistentibus.

COR. nulla*

PIST# Germen parvum, iubeotundum^ trigonum/ Styli sex, lanceolati, patentissimi Stigmata simplicia, acuta.

PER.

SSM. ovata, obliqua, excurrentia in unam alam oblongam obtuse magis reftamque,

CCCII.

GALAXIA GRAMINEA. *lab. i&fig. *, Lim.fyjl. pag. 609. Thunb. nov.gen.pag. 51. Cavanill. diff.pag. 341, tab. 189. fig. 3.*

Ixia fugacissima. *Linn.fuppLpag.94.*

Abunde crefcit in collibus Promontorii bonae Spei. A pud nos in tepidariis floret per totam aestatem ad Decembrim usque, non eadem quidem

dem planta, fed prouti diverfae fuceffive ad florefcentem setatem pervefliunt. Ut plurimum unum dumtaxat alterumve florem eodem die apud no* fingula* plantulae producunt, atque fie pergunt diverfis diebus aliquamdiu. Bulbus ovatus, pifo major, tunicareticulata fufca tegitur, fcapumque emit* tit (nifi partem radicis dicere. hunc malis) infra terram uncialem, gracilem, album, teretem, ad terra fuperficiem terminatum in plura folia fafciculata, plus minus biurxialia, ex bafi latiore fublinearia, canaliculata, in apicem definehtia fubulatum & compreffulum, acuta, nitida, virentia; extrema breviora & latiora* Flores feffiles inter folia. Spatha univalvis, membranacea; albida, tenuiffima, germen involvens, brevis* Corolla tubus uncialis & ultra, gracilis,* albus» Limbus^hiteus, infundibuliformis, tubo brevior, fexfidus, patulus; laciniis oblongis, obtufis. Filamenta tria# concreta in unum corpus, fuperne libera, petalo multo breviora. ^Antheraeluteae, oblongae, fulcatse. Germen inferum, oblongum, obfoletius trifurcatum. Stylus filiformis, ftaminibus paulo longior. Stigma luteum, infundibuliforme, lacero * multifidum.

CCCM

1P0M0EA ANGUSTIFOLIA.

Ex Guinea eft. In caldariis noftris floret Julio, & femina dat matura Augufto, tota glabra & tenella planta* Caulis teres, debilis, erefticululus, gracilis, plus minus uncialis, eft propagatio vel potius pars radicis confimilis, intra terram perpendiculariter defcendentis, continuata extra terram, in patria forte perennantis. Ex hoc fie difto caule aggregatim exeunt plures rami (altero in cafu ipfi caules vocandi) debiles, filiformes, tere-

teretes, subglobulosi, vix pedales, toti foliosi & vix ramosi. Folia sunt parva, brevissime petiolata, linearia, basi argute hastata, ceterum integerrima, ovata cum mucrone, patentia, unciam longa, lineamque lata. Pedunculi axillares, folitarii, uniflori, filiformes, foliis breviores, supra medium bracteolis duabus subulatis minimisque instructi, atque ex hinc versus florem magis magisque inflati. Calycis conniventis foliola lanceolata, acuminata, erecta, viridia. Petalum calyce multoties longius, flavum, infundibuliforme; limbo patentissimo, quinquefido; laciniis ovatis & obtusis. Filamenta quinque, albida, subulata, longitudine tub. corollae. Anthera oblongae, erectae, ochroleuca?. Germen subrotundum. Stylus subulatus, albus, longitudine filamentum. Stigma capitatum, globosum, didymum, papillosum viride. Capsula subrotunda, glabra, bilocularis, quadrivalvis. Semina in quolibet loculamento bina, atra.

CCCIV.

ORNITHOGALUM MACULATUM. Tab. i. fig. f₃.

Crescit ad Promontorium bonae Spei. Totum glabrum & palmare. Bulbus ovato-subrotundus, albus, ex squamis caulis, fungosus, totum bulbis ambientibus indivisisque conflans. Folia radicalia plura, linearilanceolata, canaliculata, acuta, erecta, integerrima carnolula. Scapus cretus, teres, foliis brevior, racemosus, pauciflorus. Spatha lanceolata, concava, acuta, viridis ad quemlibet florem. Pedicelli breves, cauli. Petalorum, lanceolata, plana, acuta, patentissima, faturate lutea; quorum tria alterna latiora gerunt infra apicem unam alteramve maculam fulcam, Filamenta sex, omnia subulata erecta, petalis duplo breviora, flava. Antherae

thers oblongs, incumbentes, flavs. Germen ovatum* triquetrum. Stylus *brevis, crassus. Stigma trifidum, patentiffimum; laciniis lanceolatis, acutis,¹ supra pubescentibus, Capfula ad maturitatem nedum pervenit.

CCC.V.

MELOCHIA CARACCASANA..

Sponte crefcit in America prope Caraccas. Frutex elegans, humans altitudinis & ramofus, Truacus ereflus, lignofus, pollicem & ultra craifus, fufco nigrefcens. Rami alterni, teretes & villofi. Folia petiolata, alterna, cordata, acuta, crenata, venofa, utrinque villofa & mollia, longiora quadriuncialia cum petiolo villofo biunciali. Pedunculi breves, craifuli, villofi, terminales primo, dein in ramuli elongatione oppofitifolii, apice fuftinent plurimos flores fuaveolentes & breviflime pedicellatos in denfum capitulum colleftos. Bracleas ad pedicellos fubulatae, parvse & fufcae. Calyx villofus pallide viret. Patala alba & fupra unguem lutea. Filamenta alba. Anthers lutes. Germen in apice pilofum vireU Capfula cinerafcit. Semina funt badia & nitida,

CAL. Perianthium monophyllum, campanulatum, femiquinquefiduin, laciniis femioyatis, acuminatis, planis, patulis*

COR. Petala quinque, cuneiformia, obtufa, integerrima, pi ana, calyce longiora, fuperne patentiffima.

STAM. Filamenta quinque, patalis breviora, connata in unam. columnam bafi pentagonam. Anthers haftats, erefts.

PIST. Germen ovatum. Styli quinque% filiformes, erecli, ftarainibus longiores. Stigmata clavata, obtufa, papulofa.

PEK. Capfula fubrotunda, quinquelQCularis, quinquevalvifie
SEM. folitaria, acute.

CCCVL

GLADIOLUS CARNEUS. *D* la FocJu difff. pag. 30, tab. 4.*

Crefcit ad Promontoriuin bome Spei; in hybermaculo apud nos flo-
ruit Aprili & Majo. Totus glaber. Bulbus depreffo-fubrotundus, tunica
fufcefcente veftitus, feniori bulbo fuperinipofitus. Caulis pedalis & ultra,
fimplex y ioliofus, flexuofus, ereftus* Folia enfiformia, acuta, friata,
rjgidula, erefta, alterna, difticha, plus minus iempedalia, ad oras albi-
da & iubcartilaginea, nee ramen ibidem increffata. Spathsc oblongo - lan-
ceolats, acutas, canaliculato-conniventes, virides, extedore biunciaii.
Spica terminalis; fere quadriflora, laxa, ex floribus alternatim in utrum-
que lattis verfis & fubnutantibus. Sunt hi incarnati cum fuffufa hie illic
majore rubedine, infundibuliformes, & quatuor uncias longi. Tubus co-
rolla incurvus, Ipathis longior. Limbus inaequalis, ringens, reflexo-pa-
tulus, fexfidus; cujus lacinia fumma reliquis latior eft, fere refta ex turbo
antrorfum protenditur, ftaminibusque incumbit; huic oppofita infima reli-
quis anguftior eft; & quas hujus latera claudunt, maculam gerunt inferne
faturate rubram* Caterum omnes laciniae funt lanceolatae & acut». An-
therae funt ochroleucae. Stigma trifidum, album; laciniis ad apicem late-
fcentibus. Eruftum apud nos neduin tulit.

CCCVIL

GUILANDINA MORINGA, *Linn. fyji. pag. 396. mant. pag. 379**

Moringazeylanica, foliorum pinnis pinnatis, floremajore, fructu angulofo*

Burnt, the/, zeyl pag. i6z. tab. 75,

Morunga. *Rumph amb. vol 1. pag. 184- tat. 74* & 75.*

Mouringou, *Rheed. mal vol 6. pag. uj. tab. ii,*

Nux Been ceylanica, filiqua triangula, feminibus alatis. *Comm.)iorL vol. 1, pag. 219* ^ 11 a.*

In caldariis noſtris, quanllimvis ex femine facile germinet, fere languere folet, rarius ultra tires quatuorve annos peffiftere, parum vel vix evadereramoia; flores tamen fa?pe tulit, fructum nunquam. In omnibus omnium annorum individuis charaſter illorum unus i^emque fuit, icilicet hermaphroditorum; nee mas utiqiam vifus. Horum charaſterem iubjungam, cum defcriptione fructus integri, ex infula Mauritiĩ tranſmiſi. Tota inermis & glabra. Truncus pollicem craffus, ereftus, debilis, fexpedalis, cinereus, teres, dumtaxat fuperne foliofus. Folia alterna, bipinnata; coſta pedali, terete, compreffula, nee fulcata. Pinnae utrinque fere quaterma eum terminante impari, oppoſite; inferiores inferne bipinnate ex partialibus & bijugis vel tantum tematis; omnes cum 4>innula terminante impari obverſe ovata# Pinnul\$ ovata?, obtuſe, integerrimae, plus minus uncials. Stiputenulla. Pedunculi communes axillares, iolitarii, flaccidi, tteretes, femipedales, (upra medium ramoſi & nultiflori. Calyx dici pentaphyllus* poſſet, ſi pars ejus infima viridis & craffa, a qua lacinia iponte decider^ folcñt, ceu pedunculi elongati quoddam receptaculum haberetur; at in huk-

jus centro libewm ftans germen, & in flore recente ejtisdem ne vel ad oculum armattum ullatenus interrupta continuatio in ipfas lacinias, & alia fecerunt, ut perianthii partem crederem. Lacinias calycis & petala concoloria ochroleuca Cunt. Sic etiam filamenta & pistillum. Anthers flavescunt. Capsula pedalis & ultra. Semina fucum cum alis albidis. Nucleus niveus, triangularis, (apertis singulariter amari ingrati diuque ori inhaerentis. Vidi flores cum calyce quadrifido petalisque quatuor vel cum petalis tamen quinque. In tali calyce unica lacinia deorsum flectitur.

CAT-. Perianthium monophyllum, quinquepartitum. Tubus campanulatus brevissimus. Limbi laciniae longae, coloratae, oblongae, obtusae vel acutae, patentissimae; quarum duae inferiores, tres sursum vergunt.

COJL. Petala quinque, calycis tubo inferta, inferne canaliculata; (superne plana, omnia sursum flexa, vel unica deorsum patente, caeterum laciniis calycinis brevissima.

STAM. Filamenta decem, fimbriata, approximata, declinata, petalis breviora. Anthers ovatae, obtusae, incumbentes.

FIST. Germen oblongum, villosum, filamentis inclusum. Stylus fimbriatus, ascendens, longitudine corollae.

PEIL. Capsula longissima, triangularis, acuta, ad femina torulosa, unilocularis, trivalvis; valvulis triangularibus, angulum scilicet internum formante medulla firma cum foveolis, ubi femina haerent.

SBM. plura, remotula, unaferie longitudinali nidulantia in centro medullaricapfulis, triangularia, ex quolibet angulo egrediente ala membrana penetrante ad respondentem angulum capsulae.

I N D E X

PLANTARUM HIC DESCRIPTARUM.

		Pag.			Pag.
A.			Euphorbia pilulifera	- - -	361
/EfdiyneineneSesban.	- - -	283	— — l'en-iita.	- - -	310
Agave feetida.	- - -	312	G.		
— virgittica.	- - -	260	Galaxia graminea.	- - -	366
Altraca alriflma.	- - -	264	Galega capensis,	- - -	292
AHintn Ibaycoliens.	- - -	305	— — cinorea.	- - -	333
Althaa nurbonenti.s.	- - -	275	— ^ filiformia.	- - -	348
Andromeda jimiana.	- - -	326	— — iotigiiblia -	- - -	349
Andrupogon barbatus.	- - -	545	Geranium ovamm.	- - -	355
Afc^eptas cirrifolia	- - -	290	— — feabruai.	- - -	327
Astragalus exfeapus,	- - -	26m	Gladiolus caroeus*	- - -	370
B.			— — graminens.	- - -	303
Budleja cnpit;ita.	- - -	332	Gnaphalium cxiiniun,	- - -	295
Uupleuruin arborefcens-	- - -	543	Gomplirena bralilienfis,	- - -	278
C			(h i f r i u Moritiga	- - -	371
Cacalia villofa.	- - -	347	II		
Calea aipert.	- - -	290	Hedy farum pi<Unn.	- - -	262
<*aBa fenluiva	- - -	362	— — vefpertiii onis	- - -	329
CeJoOii virgata.	- - -	279	Hclonias pumi!;i	- - -	260
Ceiia linearis,	- - -	370	iiiliifcus diveriifolins	- - -	307
Chenopodhun rantonio.	- - -	325	L		
— — guineenfe.	- - -	M	Iodigofera ilendt-oides.	- - -	357
¹ Clitorta brasiliiana.	- - -	281	— — hetuli;c:ipbylb.	- - -	358
Coiiivolvulus crenatus.	- - -	277	— — hirfht.	- - -	359
Conyza carolinenfis.	- - -	271	Ipomoea anguftifolia.	- - -	367
Coreopfis liinetifis.	- - -	299	— — leucamia.	- - -	280
Cy^lanv-luim carolinenfe.	- - -	288	— — luteola	- - -	266
(>yperus ahernifolius.	- - -	306	— — pcnraphyJa	- - -	297
D.			Ms variabilis.	- - -	321
Diofcorea triph^lla.	- - -	365	— vivginica.	- - -	322
— — villofa.	- - -	363	— Xipiimii	- - -	320
Doliclios ghdiatus.	- - -	276	K.		
Dracoena terminalts.	- - -	354	Kiggetaria iotegi-ifolia*	- - -	296
E.			L.		
Echtum glaucophyllum^	- - -	325	Lachenalia piinfVats.	- - -	323
Klyijus Hyftric.	- - -	337	Lcdutn lacifolium.	- - -	308
Kupituriuu myofotifolium	- - -	341	Lcyiera gnaphalotles.	- - -	343
Eupliorbi;i augiilata	- - -	309	Mala-		
— — literata.	- - -	340			
— — mcxeulls.	- - -	324			

	Pag.		Pag.
M.		Poa ciliatis.	338
Malacbra nkeifolia.	350	— Bcala. >	304
— — fafctatu.	-	Portulaea quadrifida.	356
Malpighia coccigera.	3 "	Pteris candata.	273
Melochia caraccafana	-	R.	
MefembryantlieinumcordifoHum.	294	Ahamiros volubilis,	336
— — — ciineifoliuin,	3*9	S.	
Mimofa tamarindifolia.	300	Salvia pfeutlococcinea*	302
Myrica fegregata.	27?	Samyda ferrulata.	328
O.		Sanicula marilaiidica.	293
Orchis miHtaris*	-	Sida palmata	336
— •variegara.	267	Solannin carolinenfe.	2B7
Ornitho^alura candatnm. •%.	315	— — di h llum.	-
— — comofnm.	313	— — laucexfolium.	286
— — latitbliiim.	318	— — nodiflonim.	288
— — inaculatum.	368	— — pcruvianum.	284
• — — py ram i dale,	317	— — i U i	285
— — fuaveolens.	316	T.	
— — teneHuin,	3*6	Tragopogon capenfis.	320
Ochrys cordflta*	265	Trichofanthes fctidifjma.	341
P.		V.	
Paffifiora lutea.	282	Verbena tnutnbilis.	-
PJiyllafitus fpeciofa.	360	1 j- — prifmatica. \ -	3 i
Piper umbeUtuum	335		

CONTENTA IN HOC VOLUMINE,

	pag.
I. Obfervationes botanies in Bohemia, Auffria, Styria, Carinthis, Tyroli & Hungaria fafta? . . . *	I
II. Phalaena vitifana, , » „ . . .	97
III. Deferiptiones plantarum rariorum ad fpecimina ficca;	101
IV. Hkntae rariores carimhiacEB. * - • ' » * , . . .	11 a
V. Animadverfiones circa EudiGmetriam. r » « . . .	255
V L Sideroxylum, , - * , * * . . .	347
VII Cimex Teucree, r . . .	355
VUL Obfewationes botanic^ • • ^ «• ; . . .	260