

W. B. Schlegel *hinc Wale*

ANDREAE IOHANNIS RETZII

PHIL. MAG. AD REG. ACAD. LVNDENI. HISTORIAE NAT. ADIVNCTI

ET BOTANICES DEMONSTRATIONIS, SOC. PHYSICORUM, LVND.

SECRETARII

FASCICVLVS



OBSERVATIONVM BOTANICARVM

PRIMVS.

CVM FIGVRIS AENEIS.



LIPSIÆ

APVD SIEGFRIED LEBRECHT CKVSIUM,

c131J ECLXXii!

AMICIS OPTIMIS

"i*

D. IOH. GERH. KÖNIG

MEDICO MISS. TKANQVEBARIENSI,

NATE GODOFR. LESKE

PROFESSORI LIPSIENSI.

D. LARS MONTIN

MEDICO PROV. HALLANDIAE.

D. IOH. EHRENF. POHL

PROFESSORI LIPSIENSI.

D. CAR. PETR. THVNBERG

DEMONSTRATORI VP5ALIENSI.

D. CHRIST. EHRENF. WEIGEL

PROFESSORI GRVPHISWALDENSI.

*Quorum benevolentiae, quae per ultimam quinquennium praecipua
incrementa accepit hortus noster botanicus debentur, has revivās au-
ctasque observationes facras voluit*

AVCTDK.





inirne ignoras B. L. Botanicam *io* majors capere incremental quo attentius in fingulis Plantis earum partes ac proprietates obferventur.. Hinc characteres plantarum certi redduntur.; hinc etiam fcientia difcentibus facilior evadir. Obfervationibus fuperfruuntur fyftemata botanica, obfervationibus quoque ftabilitur fyftema jam exfructum, vel emendatur. Plantae pro folo, climate^ cultura variant ec uniraro contigit plantam in umni ejushincproveniente vanatione intuerij necelTeitaque eft, ut vegetabilia in diverfis locis defcribantur, utqueBotanici fua inter fe obfervata communicent, quibus demum collatis character plantae genuinus, invariabilis conftitui poffit, ' Aliis quidem melius vifum eft plantam qiamvis in folo natali vigentem tantum defcriberej fed quarens permultaefirpes e fob natali translatae, hanc vel illam notam exuunt et maxima earum pars, vel utiliratis vel curiofiraris gratia, hie et illic colitur, facile eft judicare, nullum abfolute certum characterem plantae dari poffe, nili omnes varietates ejus obfervatae fint. Dum varia denique loca amat haec vel illaplanta, non femper datum eft de ejusmodifirpis verD folo natali certum effe.

CbaraEteres praeterea vel *nomina* fie *fixflb fpevifica* plantis a fummis in fcientia viris impDfua, iis ipfis aliisque in cDgnitione firpium multum verfatis, quidem fufficiunt, ideo tamfin tyronibus vel in botanicis mediocriter adhuc doctis non fatifaciunt, inprimis fi quis fine viva manuuctione phntas CDgnofcere cupiat. His aiuem optimefuccurritur defcriptionibus accurate concinnacis, quibus tota abfolvitur firps. Non cujusvis effe opus concinne defcribere plantas, lubenter fa-reor, hoceniin requirit liabicum omnino proprium eruc, uno quail OCULidtlj omne, quod in planta fingulare occurrat, adaequatur. Sed neque hoc folum defcriptori fufficiat; concife quoque calamo excipiat obfervata et terminis utatur fixis (*a*), ne taediofaefiantdefcriptionesj Leaoribusambiguae. NefciDan hie vel ille confuho in hac re peccet, ut confpectior fit vel aliis doctior videntur; id autem certum eft, ejusmudi Auftorum operibus multum ucilitatis hanc ob caufam periiffle.

Pruritus innovandi et invidia gloriae aliorum aliquos etiam commovit, utno-Va fingerent fyftemata, nulla licet neceffitate id eflagitante. Donec enim clavis inveniatur genuinae methodi naturalis, fufficit nobis unum, facillimum, optimum, per to turn fere orbem receptum fyftema Linneanum. Huic fyfteinat^ objiri-v-iL, quod genera dirimatnatural!affinitatejunftai fed artlioremnexum undenamprodu-

[a] Mirur fan?, mannas in aitE viros non magis ad terminos ufu jam rEceptos attendifTe, fed potius novas finxi/I'e, obbletos adoprail'e, Multitudo haec tenninoruirij idem fignificantinn, difficultatem line dubio nun parvam difcentibus parit, inprimis ii eadem idea termino non ubique jungatur,



cant novatores isti!" Quantum enim vel optima methodus artificialis distat anaturali, tantum systemata illorum ab hac abluunt, nihil aliud quum fuit, quam ex aliorum laboribus exigui pulveris iactu condita et aliis, laepe depravato ordine propofita, ut proprii fudoris foetus licet divulgentur. Culpandi non sunt illorum conatus, qui nexum quaerunt naturalem, suaque in hac re tentamina cum rirbe botanico communicantj fed edrum tantum, qui abortum faciunt, quando maturum partum eniti se credunt: fetibeie enim, ut occasio fit fummos ariis magistros perpetuo obtrectandi, cavillandi, calumniandi, invidi et mordacis animi est indicium, scientiaque plus nocet quam prodest, His enim per faspe contingit, ut multo peiora committant vitia, quam illa sunt, quae aliis objiciunt, an ex fervore vel ignorant vel utrisque, nefcio. Is itaque scientiae melius cunfult, qui rite describendis ac determinatis generibus et speciebus cum suis varietatibus operam navat, quam qui novam fingit methodum, veteri non praestantior. Sed sibi quoque diluendo tuseft, qui observationes suas, ut aliis etiam inferyiant, in yuvus non edit.

Postquam Sveciam perquiverunt RUDBECKII, CELSIUS, «LINNF», permultos illustriissimi Equids discipulo, taceam, vestigia tandem praeceptoris arst, prementes, quis crederet patriam nostram magnis hisce yiris adhuc incognitas ut ut indigenas nempe, alre plantas, praeter eas, quae forte nuperrime jus civitatis fib, vindicarunt vel postea forsitan vindicabunt. Novitiae tamen Sveciae Faunae edmoae altera allatae, nee non Catalogi Sveciae Scientiarum Svecnae plocuit in AS* suis et quae idem pro antio MDC. Irim. 3-p. 243 * c. m. fa w fid. demonstrant, plantas in lodiviii iniepriab. l. in vestigamium fefobduxi Nil itaque mirum, quod ex orbis nostrorum v. l. «hil per agraus nova quotidie increinema botanicae expaant botanici ut participes finnt rerum rarissimarum pensis vere magnis Dni BANKS et SPIANDER in Europa noster honoratissimus D.D. THUN BERG met D.D. SPARRM caemulta domum miserunt spolia, longe plura tamen expsa l. varia itinera Botanica versus interiora Africae, jam Africae divitias ro ad ignotas plerumque circa polum antarcicum terras tionis focus, domum feliciter redux, varia r a : I. a . . . » M. D. Is India peragravit ibique varia nova conquestive ab illustri . . . M. Dan. Conf. iust. et Med. Prof. (r) de-

« Sic Drawpbalum hodie Upfidia. te Etatu Acea Inh. bita. ro Himncardimann, Uma arundi » acta Mm Brdica in l. funt et Qirduus Maria, ngru inhabitare coepit. (0 b eju s Afhandling om en d= d ent En ? and fke re Phnter. Vol. X Affior. S. Sciint. Maffin. U. rePhnter. Vol. X Affior. S. Sciint. Maffin. U. n, en dog fwoff »



scripta, dein Africam vidit, postquam ut missionis Danicae medicus Tranquebariae vixit, tandem quotannis femina stirpesque bene multas misit, tum hortum Hafniensem, tum splendidum opus jam laudati RDTTBÖLL (d) ornantes jam verum exoptatissimum simul ac rarissimum naturae occasione in naturalium locupletandi, quum Regis cujusdam Indiae Medicus constitutus fit, annuo stipendio 4000 Thalerorum donatus et simul libertatis potitus, regiones illius peragravit. D. COMMERSON Medicus fori Sebustianorum in Gallia, partem suam reliquit, Dominique BOUGAINVILLE in itinere fortius, maximam partem globi nostri circumivit, imprimis vero insulas Isle de France, Bourbon et Madagascari, perlustravit. Retulit ille in litteris, ad Astronomum Fonge celeberrimum D. DE LA LANDE datis (e) libi jam viginti quinque millia plantarum in Herbario esse et credit superficiem telluris adhuc tertium quater hunc numerum alere: quod si vel illi maxime propriam ejus collectionis tertiam partem minuerent, vel emus et de reliquo ejus calculo novies denarium detraxerit, easque partim pro varietatibus, partim pro specierum habere, quantum novi hic vidit Vir curiosissimus? Si huic addantur peregrinationes botanicae a CLUSIO, PLUMIER, TURNEFORT, BARRELIER, BUXBAUM, GME-LIN, SLOANE, SHERARD, JUSSIEU, ADANSON, HASSELQUIST, LÖFLING, DESBECK, KALM, JACQUIN, FORSKÅL, FALCK, LAXMAN, PALLAS, GEDRIGI, ROTHMAN & C. institutae, facile quisquis crederet, post tot, plantarum tantum causam factas perlustrationes, omnes globi nostri terraeque stirpes intra breve tempus decessit fore; sed quae de Svecia sola nuper dixi, hanc intentionem mutare debent; unica enim provincialis quam viri, supra laudes meas positi, Illustratiss. P. Equitem d. LINNE (f), Professorem Aboensem D. LECHE (g) et Lycaeum nostri Patres Nobilissimi D. E. B. ROSENBLAD (i) et E. G. LIDBECK (l) Equ. Ord. Reg. Suevici tamen itaque industria peragravit, incolae duni offert ab his non vix, quomodo sperare fas est, regiones semel hoc faepe festinante cursu pervagatas, omnes suas prodidit divitias.

facile largior Sveciam post hunc diem vix plantam absolute novam, h. e. a botanico nullo hucusque vix oblaturam, nisi cryptantham forte, vel quod plane negari nequeat, stirpem aliquam incognitam tractu quodam Lapponiae frigidissimo

(l) conf. ejusdem descriptionum et iconum reliquas et pro maxima parte novas plantas illustratiss.

Lib. I. Historia 1773. fol. c. Tab. aeneae XXI nitidissimas.

(e) Suppl. Um. au Voyage de M^r. de Bougainville. p. m. 173.

(f) Vide IU. Viri Iter Scanicum.

(g) in Diff. sub titulo Priinitiarum FJorae Scanicae. *a. 1744 habita. Lundini.

(h) vid. ejus Observationes Botanicae circa Plantas quasdam non ubivis obvias &c. Lond. Goth. 1749.

(i) Deservata sua circa rem Botanicam imprimis Scaniae, variis sub itineribus Plantationum causa instituit collea: adhuc quidem non edidit, speramus tamen illum brevi voti nus compotes redditurum.




latentem. Nihilominus omnes florae Sveciae incolas adhuc non esse detectas, recentissima docent inventa virorum in re botanica meritorum, medicorum. Provincialis Hallandiae D. D. LARS MONTIN et praepositi pastorisque ecclesiarum Hafflof et Woxiorp D. PETRIOSBECK, et propria quoque me certum fecerunt observata.

Ingratum igitur botanicis non fore praefens opusculum spero, quod plantas post editiones nostrasque Florae Svecicae, Faunaeque et denique post catalogum nostrum cum Regia Academia Scientiarum Svecana Anno 1769 communicatum detectas, una cum propriis nonnullis observationibus emendationibusque, plantarum cognitionem illustrantibus, tradit.

En itaque L. B. observationum botanicarum fasciculus primus.





CANNA;///fw foliis linearibus nervosis.

E. *China* allatum exemplar dedit amiciff*. D. BLADH.

Folia linearia (graminea) nervosa, nervis quinque elevatioribus, bad vaginantia, properadicem fibris capillaribus obtefta, fpichamea et pedalia.

Scapus vaginis plurimis lanceolatis inftruftus, pauciflorus.

Corotta parva, obfcure rufa.

Pericarpium muricatum.

Diffintiffima planta a *Canna aiiguiffifolia*, foliis minime petiolatis, multo anguftioribus.

2. CIRCAEA *LuUtiana*. Sp. Pl. 12.

Catties rarius pilciffi.

Folia ovato-acuminata.

Racemus faepius folitarius, qualem quoqueicon, DEDERI repraefentat-

Calyx viridis, apidbus rufis.

3. CIRCAEA *alpina*. Sp. Pl. 12.

Caules glabri, geniculis rubris.

Folia cordata.

Rdcemorum numerus incertusj I-V.

Calyx albus apicibus viridibus nobis vifus eft, ruberrimus REYGERO.

Poflideofpecimen, in quo *racemi* duo terminates iterum trifidi ec ex quacunque folii ala fimplex racemus. Anneitaque numerus ex charaflere fppecifico excludendus?

4. VERONICA *maritima*. Sp. Pl. 13.

In hortum Academicum introdufta, folia inferiora terna, Jliperiora quaterna habuic.

5. VERONICA *latifolia*. Sp. Pl. 18.

Sub hoc nomine duas nobisdedit plantas, exAnglia adduftas, D. KALLSTRÖM Horti Reg. ad St. Jacobum Holmiae Director, quarum

ot Fo/wlatiora^ hirtuca, aequaliter ferrata, fubfeffilia (adultiuria paruni, juniora manifefta petiolara):

Caulis debilis, bifariam hifpidus:

Racemi laterales, longi:

Calyces tetraphylli aequales, trinervii, ciliati^ una cum *ha&tis* lanceolari.

BP *caulis* eredtus, friclus, leviter tomentofus.

Folia feffilia, hirtuta, inaequaliter crenata, faepius vero (praefertim florente plnnta) adeoprofunde inciffa, ut pihnatiffida did mereanrur.

Racemi laterales quidem funt, ita tamen, ut *caulis* terminum multum fuferent; adeopraeterEa denfi, ut lpicarum potius nomine infigniri debeant.

Calyces pentnphylli: foliolis inaequalibus, lanceolatis, pilofis, vix manifefta nervolis: quinto minimo lineari. *Bra&eae* oblongae faepe dentatae.

CoYollat magnae purpuieo-coeruleae, ficcatae rubrae.



Si observatio D. GOUAN Syft. Nat. XII. T. 2. p. 58 ad *latifoliam* pertineat, neutra harum *latifolia* erit, posterior vero vulgo probachabeturet nullalium in Syft. Nat. dato nomini specifico convenit: *HaUmana* tamen *Hift. stirp. Helv. T. I. 537* non est, cui prior nostra magis limilis est.

6. DIANTHERA *licalyculata* floribus paniculatis, bicalyculatis, paniculis dichotomis. *A8JL. Ac. Svec. 1775- p. 297. Tab. IX,*

Poftquam hujus descriptionem cum Reg. Academia Holm, communicavi *ha** AFDRSKKL *Floram Mgyptiavo-Avabicam* accepi, in qua duae occurrunt *Diantherae* calycibus duplicatis. MuUm similitudinis cum nostra habet ejus *pankulata* paster paniculas trichotomas et utrumque calycem pentaphyllum; fupicor autem *I/Jumpe-rianthia* profunde quinquefida pro pentaphyllis habuiffe. Trichotomia paniculae minorem parit differentiam, forfitan enim dichotomam in cujus medio adest flos foWarius, trichotomam cum avis appewavit.

7- VALERIANA *dioica*, Mas. Sp. Pl. 44.

In horto Academico rarius MDCCLXXIV femina dedit perfecta, li vero ab immixtis foemineis vel hermaphroditis floribus, quos non observavi. Sic etiam *Cannabin* et *Spinaciam* in specirtine foemineo iiniim alterumve florem niafculum protulit it, ac femina dedisse perfecta; argumentum contra veri fexus existentiam ALSTONI, MILLERI &c. fupicor. Si enim planta mafcula flofculos foemineos protrudere valeat, cur oppofitum impoffibile erit.

Sexum plantarum adhuc oppugnatores habere vix credo, fed fi qui fint, experimentum adducam illorum gratia, quod jam per quadriennium continuavi. RHAMNUS *Alaternus foemina* per g annos in horto academico floruit fine Dmni fructu. Nono anno quoque flores dedit *mafcula stirps*, fed in repidario et ad aliquot a foemina orgyarum distantiam. Antequam ego ilium observavi, perfecta fere fuit utriusque fexus florentia; quinque camen inveni flores foemineos adhuc ve-etos, quos pollinemasculofocundos reddere tentavi. Nee experientum fefellit; °quinque habui baccas vegetantes. Sequenti anno tempus melius attendi; dimidium corymborum numerum filo rubro notavi eorumque flaresfoecundari curavi. Hibaccae dederunt femine foeto gaudentes i reliqui omnes^ perfecta florentia cum pedunculis deciderunt.

8. SCHOENUS *compvetfus*) A3. *Holm. Vol. 30. p. 245.*

A me quodque Holmiae Diurgarden prope repofitorium — pulvM-isPyrii N°. c. yifus est. In variis praeterea colle&ionibus ilium vidi sub nomine CARICIS «//>. *nojae*, adeo ut hanc plantam per Sveciam fat vulgarem eflecendum. Dein plantam misit Cl. D. ERHARDT nomine SCIRPI *caricis* inferiptam, adeo ut Schoeni genus forfan deferuit.

9. MELICA *unifora* panicula rara, calycibus bifloris: flofcub altero hermaphroditu: altero neutro.

Radix pti'Qnnis, fibrosa.

Culmi (implex, filiformis/triqueter, laevis.

Folia graminea, vaginarum ftriatarum oris pilufis.

Panicula rara, pedunculis inferioribus geminis, altero brevior, faepius unifloris superioribus folitariis.

Calyx bivalvis, biflorus, coloratis; gluma exterior major, ovata concava- " terior minor, lanceolata; muticus, trinervis.

Flores bini, mutici,

bermapbr. feffilis; gluma exterior magn^ventricofa, marginibus interiorem amplectens, quae plamufcula marginibus membranaceis reflexis, praecipue prope basin.

flerilis pedunculatus, nihil praeter rudimentum floristruncatuin, hyalinum, biglume, cucullatum habens.

Stamina 3, filamemis capillaribus, antheris utrinque fiffis flavefcntibus.

Piftillum; *germen* ovatum, glabrum, nitidum, bicornis, *filis* 2 bafi difcretis, divaricatis *5* *ftigviata* villofa.

&#??0 ovatum; nitidum.

Habitat in fylvis foliofis Scania e, vulgaris. Crefcitfaepe cum *Melica nut ante* mixta, a qua plurimum differt, pro varietate licet habita fuerit. Paniculam fimplicemvel, fi mavis, racemum, in plus quam mille fpeciminibus obfervatis, nunquam vidi, fed femper ad bafin ramofam, nee unquam calycem floribus binis perfectiis. Per triennium in horto academico floruit, nee genium mucauit, idcoqus partu hybrid 0 *Melicae nut amis* ilia nequit haberi.

10. PANI CUM *miliaceum*. Sp. PL 86. hujus varietas eft,

Milium femine nigrD MO 11 is. 3, f. 8- P- 196- T. 5. f. 2. C. B. Pin. 26.

Culmns teres, geniculatus, ereftiufculus, ramoflis.

Folia pedalia, dimidinm pollicem lata, pilofa, vaginis hifpidisj *liguh* nulla, fed ejus loco ferae latiusculae.

Pankula nutans, pedunculig plerumque binatis, dichotomis, retrorfum fcabris^ flexuofis. *Flores* in fingulo pedicello plerumque bini, raro 1 vel 3, pedicellati₃ rariffime 1 feffilis.

Calycis glumae ovatae, acutae, nervofke, tertia, quae tamen niagis brevior.

Corolla globofa, hyalina.

Semen milii, fed fufco - nigricans#

11. BROMUS *giganteus*. Sp. PJ. 114.

Figura 19 Tab. V. in scHEUCHZEUI *Agroflographia* fpiculas noftrae plantae perfecte exprimit, fed defcriptio non quadrat. *Bromns* hic in horto academico cultus quoad omnem par tern, altitudo fi excipiat, luxuriat *Folia* enim unciam lata, *paniculas* fere bipedales, *fpiculasque* 6-7-8 floras; rariffime 4 floras, gerit. *Cel. D. WEIGEL* in *obf hot.* p. 11 huic plantae *glumas* iibhirfutas tribuit, quae in nuftra tarn (poncanea, quam culta, glaberrima flint.

iz. BROMUS *fterilit*. Sp. PL 113.

Hunc cum *B. TeElorum* Sp. PL 114. in unam fpeciem conjungit *Cel WEIGEL* 1. cit. p- 9- fub nomine BROMI *grandiflori*; magnitudinem quoque fi excipias, nullam aliam obfervare licet differentiam, quam quod pedunculi *in fierili funi* fcabris, non pilofi; in *B. te&orum* vero pilofi, non fcabris. Crefcit utrumque gramen Lundini et confanter hanc, licet levem, diftinctionis notam offert.

13. AVENA *fturigofa* panicula oblonga, contrafta₇ fecundaj flofculis geminis apice biariftatis, dorfo arifta geniculata.

SCHREB. *Spic. FL Lipf.* p. 52. c₉ *defer.*

Crefcit inter Avenam fativam_J et hordeum₇ rarius fecali immixta.

Defcriprio III. s CHREBERI optima, fed *paniculam* contraftam dicere nequeo, potius fubnutantem ex pedunculis 1-4 floris, fcabris, *Gluma corollina*, maturo femine, nigra. *Semen* mediae magnitudinis altero apice barbatum. *Culmus* IU *Qt folia* nuda_p

14, PLANTA GO *alhicans*. Sp. PL 165*

Non eft Scaniae indigena, ita licet in Aft. Holm, 1. cir. indicavi. Synonymia D. LECHE me in hunc errorem induxit. Dum enim plantam in Herbario celeberrimiviriintueor₃ video eandem omnino eflecum PLANTACINE *ferpentina* noftra



AS. cit. p. 245. Utraque ideo est varietas procerior PLANTA GINIS *maritimae*, quae juxta vias arenosas in locis mari vicinis non rara est, et caepos nonnunquam fere pedales cum foliis ejusdem fere longitudinis planis.

15. ANCHUSA *M/Zfir*, foliis lucidis ftrigofis, racemis bipartitis diphyllis, floribus fubinaequalibus, fauce barbatis.

Non nova est planta, sed ut puto cum *officinali* et *angustifolia* confusii.

Radix biennis (fDrfan alibi longitis perdurans.)

Caulis erectus, angulatus, ramosus, ftrigofus, quadripedalis et ultra.

Folia radicalia *stinferiora* caulis bipedalia, lanceolata, in petiolum definentia: *media* lanceolata: *superiora* femipedalia, cordata, acuminata, feffilia; omnia integerrima, nicida, ftrigofa.

Pedunculi terminales et axillares, diphylli (foliolis cordatis feffilibus), terminati *fpica* conjugate, *fecunda* reflexa. *PedicettiwxRx* longitudine calycis.

Calyx monophyllus ad basin usque quinquepartitus, laciniis linearibus, uncia: libusbiniS) tribus aliquantum brevioribusj hifpidus.

Corolla hypocrateriformis, nonnihil inaequalis, calycis longitudine; *tubus* cylindricus; *limbus* quinquefidus, longitudine tubi: laciniis rotundatis; *faux* clausae squamis 5 erectis, planis, penicillatis.

NeEtariitni margo elevatus germina cingens.

Stamina filamentis brevibus in fauce. *antbevae* nigricantes, polline flavo.

PiftiUttm germinibus glabris, *flyh* altitudine ftaminum, *ftigmate* didymo.

Se?nina, ovata, rugosa, albida, hinc plana, inde convexa, basi marginata.

Ergo *Anchusa officinalis* esse nequit. Ab *angustifolia* etiam differt, magnitudine et foliis integerrimis, convenit vero cum hac *racemis conjugatis diphyllis*. Synonyma plantae sunt.

Anchusa officinalis GOUAN *H. Monsp.* p. 81. *FL M.* p. 19.?

Buglojftm foliis linguiformibus, asperis, *fpicis* supremis gemellis. HALL. *flm* *Heh.* p. 599- omnibus synonymis *Unmi*, *Lorelii*, *Buleri*, *C. Baubini* et %V. De *HiUiij Cordi* et *Tragi* nihil scio.

Bugloffhm vulgare. J. RAJI *Hi ft-* p. 493-

Bügtofum perenne majus fativum MORIS. 3 p. 438. f. XL Tab. 26.f. 1. mala.

Bughjfum angustifolium majus. C. B. *Pin.* 256.

Bughjhm italicum flore coeruleso BESLERI *H. Eyftm &ftm Ord.* §. foL 5.

Bughjfa vulgaris TABERN, *ed. Baub.* P. 2. p. 129.

BughJJa italica mas et foemina *itiid*, p. 130.

BughJJum angustifolium L O B. *obf.* p. 310. *adv.* 246.

Buglojfum magnum FUCHSI *ed. Bat.* c. 129. *ed. Germ. Bafil.* 1543. c. i₂r. *icon.* *buna.*

Bughjfum vulgare majus J. BAUH. *Hift.* T. 3. p. 578.

De allatis synonymis omnino certus sum, excepto GOUANI, ex eo quod botanici exceri hujus synonyma ad *officinalem* plerumque retulerunt *autem* etiam illum nostram intelligere. *credo*

16. ANCHUSA *officinalis*. Sp. PL 191.

Quae primointuitu *Aitt/iM* descripta distingnitur, ab exreris botanids Darum cognitaviderur. Differt vero magnitudine, floribus aequalibus infundibuliformibus, multomagis imbecatis, innbi laciniis ovatis, faucis squamis leviter tan-



turn tomentofis et quad cucullatis, calycis laciniis latioribus brevioribus. Hujus fynonyma, quantum eruere potui, funt:

Buglojfurn fylveftre majus nigrum. C. B. Pin. 256.

Bughjfum vulgare noftrum BES L. H. Eyft. JEft. Ord. 8./0/. 6.

Icon OEDEUI Tab. DLXXII.

Bughjfum germanicum FUCHS. 1. cit.

MORISON et RAJUS videntur plantam non vidiffe, uterque enim fynonyma confundit et defcriptiones; ceterum figura *Morisoni* 3, Tabulae 26 cum nomine, *Baubini* ab omnibus notis *Anchufis* recedit. Ipfe C *Baubinus* fynonyma hujus et anguftifoliae commifcuit.

17. CYNOGLOSSUM //ff//o//«w. Sp. PL 193.

Hujus cum *Liifitanico* character in Syft. Nat. Ed. XIII p. 156 mutptus videtur. Folia ciliata, imprimis ram ca,

18. CYNOGLOSSUM *liifitanicum*. Sp. PL 193.

Sub hoc n online plantam dzCzriblt Rev. sflms FDRITIS in OJferv* Jbpra Cherfo & Ct p. 63. quae a *liifitanico* III. LINNEI aliquantulum diverfa videtur#

19. PULMONARIA *officinalis*. Sp. PL 194.

Varietas hujus *mantata* abunde fatis crefcit inpratu depreffo ad praedium *Ger- nerof. D. Baronis*. RUNTH, Eker5.

20. PULMONARIA w «m m Sp. PL 195.

Crefcit in infula Kaefön, Paroeciae Quille in Bahufia D. D. M QNTIN.

21. CAPSICUM ^ ^ w « w MILL. Diß.

Varietas quidem eft CAPSICI *annul* L. Sp. PL 270, fed in eo fingularis, quod fruftus conftanter trilocularis obfervetur.

22. CHENOPODIUM *Ambrofioides*. Sp. PL 330.

Crefcit in platds Halmfladii copioie, ut obfervavit Exper. D. M DNTIN-

23. PAEDERIA /orf/ ^ i Manc. 52.

Colleftiunculam meam gratiofilime, praeter bene multas alias, auxit *IU. Eques a LINNE'*, fpecimine, cui *W/jvolubilis, /o/rVi* cordata jacuminata jfubtus tomentofa. Sed aliud quoque poffideo exemplar, dono D. BLADH, cui *r^jniftridi, folia glabra, oblonga, lineari-lanceolata^ obtufa^ panicula denfior*. An vero revera firm diftinctae, vel varietates tantum ex aetate, examinent Autoptae. Flores utriusque feffiles, racemoli in panicula di- vel trichotoma.

24. GENTIANA *teneUa* FRIIS Aël. SOC. SC. Hajfn. Vol. X. p. 436 Tab. z f. 6. et o ED. FL Dan. Tab. 31 g

Vix eft varietas *Gentianae campefiris* Z. haec enim gerit *caulem* non tetragonum fed quadri-alatum et *folia* magis oblonga, minime bafi foluta. Ceterum figura FRIIS 11 aptior.

25. GENTIANA *detonfa* FRIIS L C. T. I. f. 3.

eft otinnu varietas GENTIANAE *ciliatae**

a6. GENTIANA *involucrata* FRIIS 1. c. Tab. i. f. 2. A. 2?. et OED. FL Dan. T. 344-

Omnino a *Gentiana quinquefolia* L. Sp. PL. 333. diftincta : *pedunculi* enim in illa non quinquefiori, fed j, a, ad 10 flori; *folia* obtufa funt et *calyces* aiinime bre«

vifimi. Potius ad (ILTOWLINNEI cum FRISO, cui exemplar *involucratae* debeo, iferrem.

27. GENTIANA *islandica*. Lc. o ED. T. 343

examinetur an *Swertiae* fit species.

28. BUPLEURUM *temiijimum* S*i*. PL. 343.

Hujus plantae specimen in Gothlandia lectum vidi apud *Gener, Equit. D. von ENGSTRÖM* Supi*. Cancell. Confil.

29. SIUM *angustifolium* Sp. Pl. 1672.

Generof. HALLERUM hanc plantam pro *sio nodifloro* Sp. Pl. 361. habere nulum est dubium, ex allatis in *Hift. ft. Helv.* n° 773 synonymis. Ut enim figura *Morifonicitata* Dptime refert s 1 u M *nodiflorum*; sic etiam *Oederi* s 1 u M | *angustifolium* faltem nostrum, eleganter exprimit. Descriptionibus a *HaBero* et *Gouano* dactis addam, quod *caulis* apud nos nec effectus, neque humanae altitudinis, sed potius diffusus biachiatus, 2, 3, rarius 4 pedalis. Distantiam foliolorum inferiorum, de qua loquitur *ill. GOUAN*, in multis exemplaribus ego non vidi, in *Sio* aurem *nodiflor* faepius. Non tantum *folhlum impar* mihi semper trilobum visum, sed quoque reliqua foliola faepius utrinque adeo profunde auriculata, ut trilobadicimereantur. *Involuvra* et *involucvlla* mihi n *Mius lanceolata* quam ovata. *Cisztum ferrafur*ae foliorum argutae, inaequales cum auriculis, faciem dant plantae omnino singulari. Synonyma haec erunt,

SIUM *angustifolium* foliis plnhatis inaequaliter arguteque ferratis, auriculatis; umbellis oppositifoliis pedunculatis.

Sium angustifolium LINN. S. N. XII. p. 234.

Sium Berula. G O U A N *Fl. Monfp.* 218,

Sium foliis radicalibus ovatis, pinnatis, dentatis; caulinis appendiculatis umbellis alaribus. HALL.?). *Helv.* 778,

Icon OEDERI *Tab.* 247- optima.

Sium 10. ROSE'N *obf. hot.* p. 14,

Sium nodiflorum WHIG. *obf. hot.* p. 27. w 1 LLICH *iB. hot.* p. 31. MURRAY *Prod. Goti.* p. 49.

Sium minus RI V. *pert, irreg.*

Sium erectum humiliter et ramofinis, foliis profunde ferratis MORIS 3 n j>n S. IX t. 5. fig. a. minus bona. * * y' o3*

Sium majus angustifolium GERARD *emac.* p. 256-fig. mala-

Haec itaque florum SvEcicam loco frequentis intrare deber.

30. SIUM *mdiflorum* Sp. Pl. 361.

Planta a me intra patriam nunquam observata, optime ad figuram AfDr^b»/re, spondec *Foliola* ovata lanceolata, aequaliter nec profunde ferrata, ut euo ilia potius acute crenatadicerem, 3 1. 4 parium. inferiora longe remota. ifaro unica pinna cum impari coalescit. *UmbeUa* axillaris minime oppositifolia, plerumque ex parte felicilis, raro pedunculo 1 1. 2 linearum longitudine infruitur. *Involucrum* et *invokeeUa* linearia. -Synonyma sunt:

Sium nodiflorum G O U A N *Fl. Monfp.* 219.

Sium aquaticum procumbens adalastroidum MOKIS. 3. p. 253. IXT c £q

Sium umbellatum repens RAjiJyH. III. p. 211. Quae sub hoc nomine in VERA R

D o *emac.* p. 256 et 258 pi^tonitur, nostra est planta, ut a descriptione nater' fed deficit icon. t c Paies

31. ALLIUM *urfimm* Sp. Pl. 431.

In multis pratis fylvestribus Scaniae vulgare, *fcapum* fert inferne fimicylin-dricum, sup erne triqueirum.

92. *ALLIUM mgrum* Sp. PL 430.?

Bulbus allii lativi, bulbillis nidulantibus, nonfoetens-

Scapus bi-tripedalis, nudus, laevis, teres, versus apicem craffior.

Folia, radicalia, lanceolato-lineararia, acuminata, fesquipedalia, a-3 digitDS lata₃ integerrima, glabra, nitida, craffiufcula, inDdora,

Spatha ante explicationem globofa, mutica, membranacea, ftriata, in 3 1. 4. partes inaequales finditur, marcefcens.

Umbella maxima, mulriflora, cDnferra, faftigiata'', nonbulbifera; *pedunculi* pol*licares et fesquipollicares, teretes; *rtceptaculi* nullarudimenca fpathacea.

Corolla patens, petalis lanceolatis concavis, albis, carina viridi. *Odor* fvavisfed debilis.

Stamina | *filamenta* alba; bafi dilatata connata, gErmen ample£1 entia, fubulata# longitudine vixpetalorum. *Antbwaz* ereftae, fubdidymae, flavae.

PiftiUum | £era«fubglobDium, iilcis tribus profundis, laeve, viridi-nigrefcens; *Jlylus* Inngitadinefere filamentorum, fubulatus, albus ; *Jligma* limpliciffimum.

Convenit nomini Ipecifico ALLII nigri exceptis petalis, quae erefta dicuntur; in defcriptionepraeterea ftamina lanceolata ec Ipatha acuminata vocantur^ quaealifer in noftro fe habent, Nee ullo modo cum fig. RUDBE CKII *Elyf.* 2^ .160. f.2L quadrat. An ided fit

ALLIUM *mwispejfulanum*, fcapo tereti folido, umbella faftigiata, petalis linearibus, foliis lanceolatis, ftaminibus fubulais G OU AN *ill. et ubf.* p. 24.T.XVI.

Certe conveniunt noftrae defcriptiones, excepta magnitudine₃ quae [a cultura dependere queat.

33. *S CILL A italic** Sp. PL 442,

Hanc *bifoliam* nominavi in *A\$.R_m Acad. Sc. Svec. 1769.* p. 246 ex exemplar! fcco paucifloro, quod luncad manus effat. En defcriptionem plantae.

Radix; bulbi congefti, tunicatū

Scapus dodrantalis, nudus, inferne teres, fuperne fubangulatus."

Folia, radicalia, lineararia, fcapD fere longiora, vix dimidium pollicem lata.

Racetnus conicus, floribus 7 ad 30 et ultra, fparfis, pedunculatis.

Bra&eae 2 ad fingulum pedunculum colorataej harum una pedunculo longior^ altera brevior.

Corolla patentiffima, petalis ovaris (pallide coeruhis) lateribus ungvium reflexis.

Filamenta et *Antberae* ereftae, coeruleae.

'*PiftiUum* coeruleum, *germinz* fubgbbfofo, fexfulcato: *ftylo* longirudineftamiouQi, lineari, perfiftente; *fugrna* minutum.

Capfula trieocca, trilocularis^ fexvalvis, trilperma.

Hue pertinere credo

Pbalangium radice bulbofaj foliis latiffimis obtnfis, fpica multiflora, ftipulis longitudine petioli. HALL. *Hdv* ij^^ et J-BAUH. *Hift.* 2. p.jgi licet *Italic* am efle negat *Gen.* HALLER. f^^ quidem vocat latiffima, fed hoc r-atione ad reliqua *Pbalangia* faftiim puto.

Uyacinthus germanicus^ liliiflorus, ftellaris. LDB, *objp.* 53?



34. CONVALLARIA *bifolia* Sp. PL. 45s.

Ut unicam tertiam partem in partitione corollae et taminumque numero exdudic pulchella planta, in pistillo quoque idem observatj *stigma* enim gerit leviter bifidum, *baccam* az producit bilocularem.

35. JUNCUS *effusus* Sp. PL. 464.

Singularem, hujus varietatem, quae scHEUCHZERoin *Agrost.* p. 343 *Innciis* aquaticus, medulla feve destitutus, panicula sparfa, audit, a *Nob.* LECHE ad Fpglefong in Clivo Viperino, leftam vidi. A vulgari, quantum observare potui, differt tancum *capfulis* angustioribus, auclioribus ec *medulla* culmum non farciente, fed ifthmos tantum formante.

35. JUNCUS *articulatus* Sp. V_w 465,

Tres hujus priores 1. cit. adductas varietates in Scania legi, circa quas id modo mDnendum esse puto, *Gen. de* HALLER in *Hi/L ft. Helv.* e *Junto articulato* fine sufficienterati Dne/rejfeciflèj^{af/Vj}, idque eo minus, quo certiorum, non orhneshas varietates constames esse. CuibonD citatio figurae *Tabtraemvntani* fit, non video, adeo enim rudis est ec mala, ut ad quam speciem pertineat, judicatu foret impossibile, niG expresse in descriptione dixisset folia articulata esse.

37. JUNCUS » o %. Sp. PL. 466.

Hue pertinere *Gramen* junceum elatius pericarpis ovatis, americanum PLUK. *Phyl.* T. 92. f. 9 dubito, et hoc praecipue ex eo, quod folia in ejus figura nec articulata pinguntur, neque capitati sunt flores fed omnino distincti.

38. -JUNCUS *bujknius*. Sp. PL. 466.

Varietas hujus £ feu

Gramen holofteum alpinum minimum C. B. Pin. 7 in Scania non est rara.

39. JUNCUS *campestris*. Sp. PL. 463.

Hujus quoque varietatem fingularem ad praedium Ljungby in Willandia legi, quae cum nulla ab *III.* à LINN.F' L cit. allata convenire mihi videtur. Tenerior multo est *Gram.* hirf. capit. pphyllii C. B. *Culmus* foliounicp, brevi, angustidimoin niediq) infruitur, *vapituh* wt uno vel duplici, pedunculato terminuur. CapimU haec vel spiculae si mavis, breviores sunt, quam in varietate lapponica /3.

40. ALISMA *Yammculoides*. Sp. PL. 487.

Est quoque Scaniae in Cola, illam enim in viis humidis per campum arenaceum graminofum inter Eogelholmet Rao *Cei D.* LECHE legit, ut ex Herbario ejus intellexi. In simili loco cum *Myrica Gale* florentem inveni d» 7. Julii inter HeKingborg & Rao.

41. EPILOBIUM ^ « w foliis oppositis alternisque ovato lanceolatis periolatis ferratis glabris SCHREB. *Lipf.* p. 147-

Plantam ad featurigines Scaniae et Hallandiae (atis frequentem faepius vidi fed pro diversa specie non habui, varietas enim est *Epihbii montani*, quae huic fimilli_{ma} praeter stigma, quod habet quadrifidum.

42. EPILOBIUM ^ rw // oKKdM | iis oppositis lanceolatis ferratis, feffilibus cauleque villolis, SCHRISIA /. I ^ 6,

Plantam raram unico in loco, nempe ad *Görarps m'olla* inveni, optime descriptioni *Schreberianaz* convenientem-

43. TROPAEOLUM *minus*. Sp. PL. 490.

Revera *fylos* habet tres, licet inferiore parte connatos, ut *ftylos trifidus* dici possit, nee tamen aequaliter filius. *Stigmata* depressa-plana, *Rarius farrum* nomen castratum adest.

44. PYROLAE Svecanae distimili stigmatate instruantur.

Rotundifoliae est intricatum, quinque-dentatum, dentibus erectis acutis. Huic exacte simile est

Uniflora nisi quod majus lacinis et peltatis ideoque coroniforme appellari potest.

Minoris est peltatum, convexum, quinquelobum, in etiam

Secunda) fed hoc poris simul quinque pertusum.

Umbrata? subsessile est, magnum, orbiculatum, in medio excavatum.

45. SAXIFRAGA autumnalis.

Sub hoc nomine plantam in Act., Reg. Ac. Scient. Holm. 1. cit. p. 240 proposui, quae longe alia est. Annona errandim praebuerit pili foliorum pro ciliis habitae a Nob. ROSENBLAD *obf. bot.* p. 27. descripti et a me visi, una cum icone *Breyntiana* ab III. EQULINNE ad *autumnalem* circumscribita. Jam autem dum in altera *Mantissa* p. 393 observo esse figuram BREYNTII transpositam esse mentionem fieri pedunculorum pubescentium, video quoque non SAXIFRAGAM *autumnalem*, sed *Hirculum* in palude ad Oleröd collegisse. Lanuginis ferruginae in pedunculis mentiduum iniecit BREYNIUS *Cent.* p. 105 pedunculosque etiam in figura hirsutos notavit. Summirarem caulis lanuginis rubiginosi deniffima testam pronunciavit Nob. ROSENBLAD I. cit. p. 26. In Tabula CC Fasciculi IV; *Florae Danicae* optime exprimitur hoc tormentum, a nobis quoque in specimenibus omnibus observatum. Hinc facile induceremur, ut tomenti hujus mentionem in charactere specifico SAXIFRAGAE *Hirculi* effectivalem crederemus, quominus autem hoc absolute statueri possumus impediunt figurae et descriptiones in *Gen. de HALLER Hist. Nat. Helv.* T. I. p. 417 tab. XL. et *Cel. J. MELIN. Sib.* T. IV p. 165 Tab. XLV. f. 3. ubi omnis tomenti vestigia exulant. Verum est, in *Hist. Nat. Helv.* plantae tribui caulem uniflorum et petala latissima, nihilo tamen minus ex figura et descriptione GMELINI citata, dabitur non possit, eadem ab utroque indicari, idcirco ex characteribus expungi debere verba *caulis uniflorus* (in cot specimenibus, quot in Scania lecta vidi, pedunculi 2-3. ferre). Ceterum per se la ab utroque minor latiores pista sunt, quam vel nostrae planta habet vel BREYNTII DEDERIQUE, idcirco tamen vel clima efficere poterit. Exemplar quidem manus est, pedale, quod in Alpibus Lulensibus decerpit Adn. Rev. Praepos. HOLLSTEN, nobis vero amice communicavit Exper. D. D. MONTIN, cui unicus est flos, sed petala Hallerianae et Gmelinianae multo angustiora et pedunculus manifeste tomentosus, licet paulo rarius sit tamentum, quam in Scania planta. An ideo ad hanc circumstantiam non attenderunt Excellentissimi Viri, vel vera sit varietas pedunculis glabris, iis disquirendum relinquo, quibus datum est, plantam Helveticam aequae ac Sibiricam intueri. Si ita, chaméler, hanc ab *autumnali* distinguens, difficilis crit. Pili aliquot gaudent folia *Hirculi*, unde ciliata (*) dici possunt, sed differunt haec cilia quam maxime ab illis, quae in SAXIFRASA *dizoide* obviae sunt, de qua infra monendum. *Folia radicalia* nobis sunt lanceolata: *caulina* lineari-lanceolata, qualia quoque in figuris GMELINI et OEDERI expressè videre licet; in specimenibus Alpino elliptica vidi.

SAXIFRAGAM *autumnalem* ab omni alia distinguere vult CW. SCOPOL, *Ann. Hist. Nat.* 2. p. 50. caulis foliosis, floribus et petalis flavis croceo-purpureis, sed eosdem habet characteres *Hirculi* nosci aliae sunt quaerenda distincta notae.

[*] Cilia haec non bene exprimit figura OEDERI citata: in illis enim crebrae sunt et non pilorum sed bucculorum forma, qualia in *aizoide*, minime vero in *Hirculo* nostro videmus.



48. SAXIFRAGA *Aizoides*. Sp.Pl. 576.

In characteris specifico hujus plantae ciliDrumTnullam fecir mentionem in foliis III. a LINNE, fed ea nuda inermia dixit. Plantam eo modo occurrere non audeo negare, quum fieri poffit ut in alio fok^aliove climate ciliisdiftiruatur. Hoc aitem omnino circum est, SAXIFRAGA hujus specimina, et a *Cel. D. D. SAHLBERG* (in Jemtialefta puto) benevole communkata et ab amiciffimo *D. MDNTIN* accepta, manifefta ciliata effe, qualia ea repraefentat *Tab. LXXII Florae Danicae*. Hinc quoque fa&um autumo, UISAXIFRAGAE *autumnalis* nomenfigurae fuaeaderet *Nob. DEDER.* Cilia haec, fi ope microfcopii intueantur, non pilorum fed aculeDIDrum forma apparent. Si eadem denique eft proportiD inter petala et calycem in *autumnali*, quaminhac obfervamus, fententiaeExcellentiffimorumyiroruin *THALLER, JACQUIN* et *WILLICH* fubfcribere non dubiramus, qui fcilicet contendunt, has meras effe varietates. *Folia* in noftris fpeciminibus minimis fubulata dici queunt, fed ovato-lineararia funt, et breviter acuta.

47- SAXIFRAGA *trida*ByVius Sp.Pl.578-

3- foliis omnibus lanceolatis integerrimis.

In Infula Skeppsholmen prope Holiniam copiofefatiscrefcentemoffendi,

48- SAXIFRAGA *petraea* GUNN./7. *Norv.* 2. p. 30 et defer, p. 53. N°. 544. c. ic. *Tab. IX. f. 1. 2. 3. o ED.//. Dan. Tab. 68.*

Diftinaiffima omnino planta a

SAXIFRAGA *petraea* LINN. J. IV. XIII. 345. wiLL. oij/:5p.p.30et GDUAN *otyp.* 29. T. 18. f. 3.

In GUNNERI enim *folia* omnia feffilia cuneata, tri-quinquedentata et *calyx* tantuni quinquedentatus, omnino ut *mtrid.ulylzte*; in GOUANI vero *folia* longe periolata, fere digitata, et *calyx* ad dimidium fiffus, laciniis linearibus. Exemplar noftrum cum icone *Nob. GOUANI* egregieconvenit, fiexcipias, quod foliorum lobos et ipfo petala nimis acuta picta fint. Ceterum planta noftra prope caulis bafin pluves emittit ftolones, quos *Nob. Fir* non annotavit. An planta GUNNERI, *ajugaefolia* vel *adfeendem*, vel faltem *trida&ylitis* varietas infignis fit, nefcio; a *Sawy^/7caulefDliofomultiflDio*, foliis palmatis hirtutis *HALL. fi. Helv. T. 1 p. 422* non mulcum divcifa, quantum ex defcriptione conjicere poffum.

49. STELLARIA *cer a/hides* GUNN./1. *Nurv.* a. p. 119 *Tab. VI. f. a.*

Vix differt ab ilia, quam depingi curavit *Nob. FIM 1 s* in *AS. S. R. Sc. Haffh. T. X. tab. 3. f. 12.* Aitquidem *Rev. GUNNERUS 1* cit. foliola calycina deftitua effe membrana nitida marginali, quae in exemplari Islandico a *Nob. FRLIS* benio-ne communicato, adefit. An vero haec fufficiant, ut diftinguentur plantae? *Figura FRIISI* quoque multo major eft, fed etiam in hac circumftantia cum noftro fpecimine convenit. Ceterum inter *LINJJEI, ntisnet GUNNERI* plantas nullamviedo differ entiam.

50. SEWMfexangulare. Sp.Pl. 620.

Radix biennis vel perennis?

Cfla/^plureSj ramulofi, patentes.

FM ovaca gibba 2cDnfat, imbricata, (ante florefcentiam a in 2am is sterilibus f c x f a m m) ,, late ^ i o n bafeo5 adnMa> pa|U(Je ^ ^ «

Cyma terminalis, mfid., flo^prfunculatb, tribtu rarius quatuor in fingulorum ramulo, reliquis fim liolum

Calyx pentaphyllus, rarius tetraphyllus, foliolis vefcentibus, corolla multo minoribus. ctiara adnato-ffilibus, bafi fla-



Pttala 5 (etiam 4) ovato-lanceolata, concava, flava.

Stamina 10 (rarius 8) capillata, longitudine petalorum.

Pistilli communiter 5, faepe 4, rarius 3, germinibus erectiusculis, fubulatis, angulatis, in stylium brevem distinctis. Stigmata limplicita.

Pericarpium stellatum ex capsulis 5-4-3- figura *Sedi artis*.

Floret ferius quam *acre*, cum annuo.

51. *SEDUM annuum*. Sp. PL. 620.

Radix annua, fibrosa.

Caulis ramosus, glaber, substantia corticali pellucida.

Folia parva, ovata, gibba, sessilia, purpureo-maculata.

Cyma proprie nulla, sed rami recurvati florentes. *Flores* in interiori vel superiori ramorum latere breviter pedunculati, alterni, cum folio plerumque fingulis floribus adposita.

Calyx pentaphyllus, foliolis ovatis, gibbis, maculatis.

Petala 5 ovato-lanceolata, concava, calyce, minora, flava.

Stamina 10, capillaria, petalis paulo breviora.

Pistilli 5, germinibus erectis compressis, lanceolatis, styliis breviflimis, stigmatibus breviflimis.

Pericarpium stellatum ex capsulis 5 divergentibus, rubromaculatis, supra limbo nouatis.

52. *OXALIS corniculata*. Sp. PL. 623.

In urnis locata ac per hyemem in frigidario fervata per plures annos durat, ut perennare videatur a gelu defensa, sed habitum decumbentem retinet, quo *vsfriBa* distingui solet. Elasticitas qua profiliunt matura femina, in arillis relidescit.

53. *SPERGULA* / *W W A J*. Sp. PL. 631.

Tenellam hanc punctam *SAGINJE procumbent?* multum fimiJem ad *Ha/TlofFHollandiae* crescere percipit *Pur. Rev. Praepos. os BECK* inque hortuni fuim illi *Oduxic*, unde specimen ec fenstra amiciter nobis praebuit.

Gen. *HALIERVI* detur hanc cum *STELLARIA hi flora* confundere. *Hist. ft. Helv.* 562. a qua tamen abunde differt styliis 5. Nee de icone *o EDER I Flur. Dan. T. J2.* certus est *D. GOUAN*, dum ad utramque plantam illam refert, *III. et obf. hot.* p. 30 et 31. quam autem auctoritate *IU. Equ, a LINNE* Sp. PL. 604 et *Nob. FRIIS ROTTBÖLL, Rar. Plant*, p. 447. ad *STELLARIAM bifloram* ut fecit ipse audlor, referimus.

54. *EUPHORBIA exigua acuta*. Sp. PL. 654. a.

Hac juxta sepem inter *Hojebro* et *Knåstorp* prope Lundinum parce proveniente planta, Scaniae floram accepit *Exper. D. D. C. F. PALM*. Spontanea palmaris est, erecta et inordinate ramosa, in orto vero culta, pedalenis acquiivit longitudinem et prope radicem emittit ramos simplices patenciffimos. Quoad numerum pedunculorum in umbella, variat haec ut in spontanea observavit *ClariJJI D. WEIGEL* loc. cit.

→
55. *ROSAE viBofae* Sp. PL. 704 varietas maxigla e Belgio allata, anno praeterito (177a) in loco pingui vigens, fructibus tulit glaberrimos minimeque hilpidos, dein vero, dum interea in terram minus pinguem transportata fuerit, germinaprotrulit plurimum hilpida. Repetita experientiae undem non edidit *FeftuiiL*

56. *ROSAEglantria*. Sp. PL. 703. est

Rosa faetida HERRM. *Dijf. de Rosa* p. 18.

Rosa lutea. DUROIBJ/ *Jof. p. XVII. MUHR. Prod. Gott. p. 159.*

Rosa eglantria. SCHOLL//. *tarJ. 399,*

Jok flavaLobelii. HALL. *H. ft. Helv. T. 2. p. 39.*

Noftra parutn abludit a defcriptione HERRM.

Folia obovatá, biferrata, quina aut fepiena, fubtus etiam glabra.

CW/J nonhinc inde, fed denfe aculeatus, aculeis reftis.

Calycis lacinae intus tomentofae, rarius pinnatifidae.

Pétala magna, obcordata, vel biloba finu magno rotundato praedita, odorem ipargunt cimicinum.

57. *ROSArubigofa* S. N. XIII p. 333. *Mant. alt. p. 564 est* •

Rosa fpinis edunds, fbliis fubtus rubiginofis. HAIL. A *Hth. T. 2. p. 39-*

JBoi cghnteria ODUAV //orr. Mo^ - p. ^45- Du R o 1 rf/ p. XV.

7?/i cglantrin HE » RM. */ P-17 ^clufis fynon. LinnMni«.

Nomen C. B. in *Mantiffa* 1. c. allatum ad praecedentem omnino fpedat.

5 g. *R O S A imi/rij/i* MILL. i>iff. Du R o I ohf. p. XXVI.

Cftf/x deniffime aculeatus, fimulque hifpidus..

Pedunculi longi, *germina* ec M//W ftrigis crispis globulo refinofa rerminatis, faepius ramofis, obiiri.

Petoli, minus hifpidi, inermes.

ir//tf omniumRofarum, quotvidi, maxima, ternata, quinata, glabra.

Pulcherrimafane varietas, fi non diftinch fpecies. Cum *centifolia* inmultisconvenit praefertim pedunculis longis rrifloris, quos ei adfcribit HERRM. 1. c. p. 13. immo crederem *ilium* noftram loco *centifoliae* dcfcripGffc.

59. *RUBI Chamaenwi* Sp. PL. 708 flores'fexu diftinftos effe extra dubium eft, fed

utrosque ex una radiceortum ducere, obfervare VDLuit D. s O L A N D E R. Conlendit e contra D. CTEDER. in *Litt. radicem mafculi floris a foeminei diftinftam effe: ftciledifcuipotexithaec difFerentiaabotnicoquodam, borealesplagasinhabitante.*

6c. *POTENTILLA Norvegica*. Sp. PL. 715.

Crefcit fpontanea quafi inhoito botanico, ibique pedunculos superiores ex dichotomia jamorum, inferiores vero ex ipfo ramo, fpatio ab axillaremoto, emittit. Synonymon *Morifoni* in flora Svecica allegatum vix hue pertinere credo.

61. *LAGERSTROEMIA*.

Aut hujus binae font fpecies, vel faltem maximae varietates. Utramcue habeo benevolentia D. B L A D H ad Soc. Ind. Or. *Commere. djfift.*

et *Minor*, Chinenfis, ex affe convenit cum *Tpin-kin* RUMPH. ^ . 7 . tab 28 *Folia* haberglaberrima, ven ofa, ovata, emarginata, alia lanceolata, aciua u'nius adfesquipollicis longitudinem. *tylyces* glabii, fufci. *Petalmtm* ungues capillares lonoitudine limbi. m . »

0. *Major*, Javanenfis, /Zorw plus duplo majores, unguibus ratione limbi brevionibus. *Color* quantum ex ficco exinplan videre licet, cocruleus *Calyx* tenui tomento albo extus obduftus. *Folia* coriacea, fubtus glabm, fopra fubruo^fa, DV to-Dbldnga, 5 ad 8 pollicum longitudine, 2 ad 2J latitudine.

62. RANUNCULUS *reptans*. Sp. PL 773.

In humentibus Scaniae frequens.

63. RANUNCULUS *repens*. Sp. PL 779.

Pilis raris hujus asperfus est caulis. *Caulis et rami teretes, hirsuti. Petioletiam hirsuti fed rarioribus pilis et fulcati. Folia ternata, foliolis trilobatis incisis, ad incisuram bafin macula pallida (qualeni in lanuginosae observavit de HALLER) nutatis.*

64. RANUNCULUS *bedevaccus*. Sp. PL 781-

Circa Halmftadium in fossis collegit *Exp* D. D. MONTIN* ad Oeflö vero Scaniae *Perex. Cand. D. SÖDERBERG.*

65. TEUCRIUM *trifidum* foliis lanceolatis trifidis, pedunculis axillaribus trifloris.

Habitat ad Cap. B. Spei, unde habui, dono D. BLADH.

Caulis tetragonus, -hirtus, rarius foliosus.

Folia opposita, lanceolata, majora lobo, minora dente utrinque acuto incisa, cererum inaequalia, supra scabra, subtus tornata; tomento flavescence vix conspicuo,

Pedunculi oppositi, axillares triflori, longitudine internodiorum.

Calyx campanulatus/patens quinquedentatus: dentibus lanceolatis, subaequalibus j pubescentibus.

Corolla purpurea, labio extus pubescente profunde trilobo lobo medio-reflexo, concavo, emarginato.

Stamina 10

Stylus longior. Stigma bifidum, lacinia altera brevior, utraque reflexa-

Semina subrotunda, rugosa, ratione calycis magna-

66. TEUCRIUM *Cbamaedrys*. Sp. PL 790.

d. Cbamaedrys major repens. C. B. Pin. p. 242.

Caulis decumbens, pilis, pilis rectis distindis.

Folia opposita, inciso-ferrata, utrinque hirta, internodiorum plerumque longitudine.

Bractae utrinque pilosae: inferiores foliis limiles, superiores integerrimae concavae, acutae, intermediae ferraturis rarioribus.

Flores fecundi: inferiores bini, superiores terni ex quavis bractea.

Calyx hirsutus

Corolla pallide purpurea, labio inferiore truncato, cavo.

Genitalia apices purpurei.

fi. Cbamaedrys minor repens C. B. Pin. 248- humilior planta.

Caulibus etiam decumbentibus submentofis, praefertim ad genicula-

Folia obtusa, minus profunde ferrata, lucida, prope bafin ciliata, internodiis longiora.

Flores fecundi: inferiores bini, superiores terni ex quavis bractea obtusae, nifi quod bractea obtusae sunt et color corollae genitaliumque albus.

Odor praecedentis, sed multo debilior.



Utraque horti nostri alumna est. Ultima, media quasi inter *Teucrium Chamaedrystyl lucidum*.

67. *PRASIUM* *wimts*. Sp. Pl. 83B-

Melissa fruticosa, calyce amplopatalo RAJI *Hift.* p/568-

Caules fruticosi, virgati, tetragoni, foliosi, laeves ramosi.

Folia opposita, petiolata, ovata, serrata, venosa utrinque glaberrima, laevia.

F/DW terminales ramorum, axillares, folitarii, breviter pedunculati, calyce longiores, albi, in fauce pallide rubropunctati.

Calyx infundibuliformis, patentissimus, glaber; aristatus, bilabiatus, labio superiori planiusculo tridentato: inferiore minoribus bidentato. Nonnunquam utrumque labium aequaletridentatum.

Corolla laevis; *lobi* compressi, longitudine fere calycis; *faux* ftriata: *labium* superioris *lobis* bifido, bifido; *inferius* trifidum, lobis lateralibus verticalibus obrutis, intermedio majore cordato lateribus deflexis.

Semina 4 baccata in calyce ampliata.

Odor foliorum Draccephali Moldavicae fere debilis.

Ergo nullus character, minus a majoribus distinguens, a foliis vel illorum crenis. *Ratni* virgati et odor lubricam dant, fere unicam distinctionis notam.

68. LUNARIA *rediviva* Sp. Pl. 911. filiculis lanceulatis, radice perenni.

Haec est, quae ad Gudmundtorp inter Diverforia Hurfwaet Hörby crevit, quamque indicavit *Beat*, *LECHE Primu. florum Scaniae*, p, 12, n. 4g# alt era.

69. LUNARIA *annua*. Sp. Pl. 911 filiculis ellipticis, radice bienni,

Non inventa in Scania.

70. *CARDAMINE* *parviflora*. Sp. Pl. 914-

Crevit in praeis ad Hunnemara Blekingiae.

71. *ARABIS* *Thaliana*. Sp. Pl. 929-

Varietas quae prior est *D. de HALLER Hift. ft. Helv.* 452, cujus folia radicalia subdentata, crevit vulgaris per Scaniae. In utraque varietate pars inferior dimidia caulis hirta est, reliqua glabra.

72. GERANIUM *difforme* Oum. Sp. Pl. 956.

Lundini copiose crevit et corollas profert purpureas, minime pallide incarnatas: variat itaque florum color in hac planta an clima hujus ratio?

Caulis genuiculatus, una cum petiolis pedunculisque hirtus.

Folia opposita quinquepartita, lobis lanceolatis trifidis, glabra, marginibus et novis hirsutis pilosis.

Stipulae fimbriatae, rubrae.

Pedunculi axillares, alterni, biflori, petiolis breviores.

Calycis folioli ovato-acuminata, trinervia, hirta, aristata, petalis longiora.

Petala leviter emarginata.

Styli purpurascens: *Antherae* coeruleae.

Arioli hirti nigricantes.

73- GERANIUM *Carolinianum* Sp. PL 95 6.

Hujus neceffario binae fint varietates. Arillos enim nigros, hirtutos ait *IB. Equ. a LINNE' Mant. alt. p, 434.* et DILLENII *bort. E/tb.p. 162.*; in noftro vero arilli pallide fufcij Figura DILLENII etiam parum a noftrD recedit, quod lobos magis rotundatos obtufosque habet. Varietarem quidem in *Dijf. de Geraniis p. 27.* indicat *Nob. BURMANNUS*, fed ex fola denominatione Eoerhaviaa nil certi colligere poffimus. Calyx, foliorum figura, fplendor et tota fades hoc cum GERANIO *lucido* ita CDnjungit, ut facile fola Varietas videatur. -

74. GERANIUM *pbaeum*. Sp. PL. 953.

Prope Norra Wram Scaniae inyenit antea laudatus D, OSBECK, indeque in hortum proprium rr.insculit.

75- GERANIUM *paluftre*. Sp. PL, 954. -

Ad Nona Wram D. OSBECK. ad Ramlöfä Scaniae et Åkerö Sudermanniae *Nor.*

76. *SIDapi/ofa* foliis fubrotundis cordatis, ferratis, fupra pilofis, feminibus ecornibus.

Radix annua nobis.

Caulis ramofus, procumbens, teres, pilofus-

Folia fubrotunde cordata, ferrata, fubtus fcabra, fupra pibfa, petiolata: petiolis longis pilDlis.

Stipulae filiformes, aliquantulum recurvae.

Pedimculi folitarii (rariffime bini) uniflori, axillares, petiolo longiores.

Cff^jrfimplex, mDnophyllus, penragDnus, quinquepartitus, pilofus.

Corolla Sidae, parva, flava. *Stam.* et *Fiji*, generis.

Pericarpium. Arilli 5, membranacei, angulati, apice perforati, monofpermi, mutici.

i4/rf4Mmorifolia Ind. Or. ad foliorum finuscapitulisfingularibusparvisPLUK.

Pbye. T. i3z.f. 1. plantatn cultam optime refert, uc -

jiltbaea minima furrefta Veronice villofae foliis ibid. £ 3. fpontaneam eTranquebaria.

Sida cordifolia LINN. Sp. PL. 961. noneft, noftra enim a figura DILL, in omnibus nimis diftat ec deftituitur praeterea omnino corniculis feminum.

Habitat ad Tranquebar, unde femina ad hortum Hafnienfem etfpeciminafica mifit *Praeclar.* KÖNIC.

77. GENISTA *Germanica*. Sp. PL. 999.

In Hallandia fponte crefcenteminvenit femper cumlaudenominandusD. MIJNTIN ejusque tarn fpecimina ficca, quam femina, benique nobis communicavit.

78. ON ON IS *arvenfis*. Sp. PL. 1006. fub nomine *fpinofae*.

Ad eandem fpeciem referunturj^wq/uf ec *tnitis* et ab *IB. de LINNE' 1. c.* ex auctoritate LoESELiitti *Gen. THALLER ffifi, ft. Helv. T. 1. p. 155. nD. 356*, nec tantis Viris contradicere animus eft; dicam modo propna experiinenra: *Mitem* in hortum transtuli anno J773 ibique laete crevit et quoiannis floruit, etiam mine 1776 mitis ac inermis. Semina *fpitiofae* annD praEterito collegi et praefenti tErrae commifi; prodierunt plantae piures Julio, augufto et feptembn florentes, omnes fpinis armatae et propriamfaciemfervantes. Negat quoque oculatiffimus MILLER in *Di&. mitem* et *fpinofam* mutari.

79. OROBUS *tuhrofus*, Sp. PL. 102 8.

• Gaudet caule bialato. Varietas hujus pulchra ad Foglefong nobis obvia fuit, caule plus quam pedali, foliis latis, magnis, ovatis, obtulis, ftipulisque grandibus, bafi erofD-dentatis.

8D. LATHYRUS/a/^w. Sp. PL. 1034.

In meridionalibus Sveciae provinces rara, in Sylvula Lingenaefet prope Chriftianftadium crefcit. Ewnthuic *cirrho* hexaphylli, *internodia* alata, *folia* lanceolaia, *Jtipulae* feinifagittatae, *pedunculi* fubtriflori, *corollae* coeruleae.

gl. VICIA *dumetorum*. Sp. PL. 1035.

Folia hujus ovata villofa apice emarginata, defcribit D. REYGEE. *Tent. fl. Ged-T.* 2. p. 116. In fpecimine veto ad Kaddelib prope Yftadium a Cl. D. M. JGRLIN lefto etnobis communicator folia omninu glabra funt, tenuifiime tantum ciliata et obcufa cum acumine. *Stipulae* profunde lerratae.

82. VICIA *CnJubha*. Sp. PL. 1035.

Inter Halmftad et Sperlingsholm illam collegit D. D. MONTIN et femina nobiscum communicavit. In JBlentarps lille wong quoque crefcere ex Herbario LECH EI intellexi. Haec end em eft, quam *Vkiam militmtem* nomine adgenium inventoris repondente, VDcavit infelixnovator etmeitiifiimorum virorum perperuus cavuator, ac fimul cum *Vicia Jylvatica* confundere ftuduit.

53. VICIA *Lathyroides*. Sp. PL. 1037.

Cirrhis inftruitur et dcfituicur.

54. CORONILLA *cretica*. Sp. PL. 1048.

Quos pro charaflere effentiali plnntae ponit Rev. FORT is *libr. cit.* p. 6\$ fcil. *petiohs a baji ad dimidium usque lanuginofos*, ego in culta obfervare non potui.

85. TRIFOLIUM *Melihtus MeJJanenps Mam. alt, 275.*

Hujus Synonymon₃ni valde fallor, eft

Mclilotus minima, recta, futea, filiquis craflis curtisincapiculum congeftis, femine Foenugraeci. MORIS. 2. f. 2. p. 16a. T. 16. f. 9.

g6. MEDICAGO *cirdnnta*. Sp. PL. 1096.

Variecatem colimus in horto academicD, *qxteelegumina* habet integerrima. Ad hanc fpeciem quoque referenda videtur

MEDICA *Hifpanica* MILL. *DiEl.* et

MEDICA *cretica ejusdem*.

87. MEDICAGO *olfcura*, pedunculis racemofis, leguminibus reniformibus integerrimis, caule diffufo hirtio. Tab. I.

Radix annua.

Caules decumbentes, diffufi, longi, tetragoni, pilofi.

Folia petiolarā, temata: foliolis obovatis, argute ferratis, rarius pilofis, *P₂ tioli\ongi*, fupra canaliculati.

Stipulae ciliato-dentatae.

/><&•<&• axillnres longitudine folii, multiflori, p_oft florefcentiam elongati.

F/orw Medicaginis polymorphae, flavi, vexillo dilutiore.

Legumina in raceme, brvci congefta, rcniformia., tomprelTa, carinata internma' venofa, difperma. *fig. a*, fruftum naturali magnitudine, J veto S₂ auuum, ut margo et venae appareant, exhibet.



Semina oblongo-reniformia, glabra.

Ex unico femine, quod aliis immixtum inveni, excrevit et jam per aliquot annos in horto academico viguit. Florens planta *poly m or plain* omnino refertur fed legumina differentiam producit. Germaniae incolam credo, nam exinde primum fem en form it o cafu habui.

Medica italica. MILL. *Diſc.*_m?

Medicago polymorpha cochleata lenticularis WILCKE *Hort. Gryph.* 73?

Medica lunata quaedam minor. I. B.?

Trifolium filiqua falcata, alterum C. 5. *Pin.* 330 an fit nefcio, quum deficient CLUSII opera citata. RAJUS in *Hift. Plant.* I. p-966. ga dubiosnos facit.

Obf. Legumina, quoad figuram proxime conveniunt cum fructu MEDICAGINIS *circinata**₇ fed dimidio minora, rigidiora, mngisinflexa^ ut extremitates fibi incumbant, quare etiam circumſcriptio fere orbicularis. MEDICAGINIS *polymvrbae* varietas eTè nequit, ob fructum minime cochleatum,

83, MEDICAGO^/jwor/ik Sp. Pl. 1097.

Speciei charaflar facilis, varietaturft difficilis. Figuras nonnullarum deflit MDRISDNUS, fed defcriptiones ad illas non ubique pertinent^ vinman Chakograph^ vel ſcriptoris nefcio. Quum vero vix nifi ex iconibus forma leguminum diverfa, difficillime verbis exprimenda, intelligi poflit, optandum foret, ut, qui omnes colic varierates, ſculpturam iljarum curare vellet. *Rev. D. WILCKE* in *borto Gvyphico WiW* quidem defcripſit varietates^ fed leguminum tantum fecit mentionem, reliqua omiit, quae tamen aequae neceſſaria. Non nifi feptem varietates hatlenus aluit hortus Lundenſis, quarum defcriptiones ſubpingere lubet.

88- A. MEDICAGO polymo^a orbicularis?

Moris. 2. f 2. t. 15. £ 2^m #

Caules ereſtiufculi, ramis decumbentibus hirtutis.¹

Folia ovata, acuta, leviter dentata, ſubpilofa,

Stipulae ferratae.

/WH7;fK#uniflori, ariftati, pilofi.

Legitmina cochleata,, depreflufcula, anraftibus pilofis, nitidis, imbricatis#

88- B. MEDICAGO polymorpbavigra*

Moris. z f 2. t. 15. £.19.

Caules decumbentes, laeves, ſubangulati.

Folia ob cordata, einarginata, dentata, laevia, ſubco-alboque maculata.

Stipulae ciliato-lacerae.

Pedunculi a-4 Son-

Legumina cochleata: anraftibus diſjunftis dorfb biipinofis, ipinnlis divaricaribus hamulofis.

88. C. MEDICAGO polymorpha arabica ?

Moris, a. £ a. t. 15. £ 17? nam noſtra legumina majora,

Caules decumbentes, tetragoni, pilofi.

Folia obcordata (trifolii pratensis) retufa, ſubdentatulata, macula, ſubca difci.

Stipulae ciliato-dentatae, hirtutae.

Pediunculi z-^flori, ariftati.



Legumina cochleata, fubglobofa, utrinque truncata, anfraftibus dorfo bifpino-
• lis, fpinis longis divaricatis.

88- D. MEDICA G D *pvlymorpha intertexta*.

Moris, a. f. a. t. 15. f. 7.

Caules decumbentes, tetragoni, glabri.

Folia obovata, dentata.

Stipula? ciliato-dentata e.

Pedunculi 3-4 fieri, ariftati, aborcientes excepto unico/

Legumina folitaria, maxima, globofa, cochleata, anfraftibus dorfo bifpinofiSj
fpinis divaricatis, appreffis, longis, fubulatis.

88. E. MEDICA G O *polymorpha cor mat a*,

Moris, 2. f. 2. t. 15. f. 21.

Caules decumbentes, fubtetragoni, glabri.

Folia inferiora obcordata, fuperior^ obovata, fubdenticulata.

Stipulae ciliato-lacera?.

Pedunculi 2-3 flori, ariftati.

Ltgumina duo, fubcylindrica, cochleata, anfraftibus difjunftis dorfo bifpiculo-
fis, fpinulis breviffimis divaricatis.

gg. F. MEDICAGO *polymorpha*.

Moris. I f. 2. t. 15. f. ID?

Caules decumbentes, ftriati, glabri.

Folia inferiora ob cor data, fuperiora DbDvata, Abdentata.

Stipulae ciliato-lacerae.

Pedunculi 2-7 flori.

Legumina plura, cochleata, anfraEtibus difjunftis, dorfo bimuricatis.

gg. G. MEDICAGO *pofymorpha twnata*.

Mvris. quidem hujus figuram non habet, fed fig. n i_n tab. 15 et fa z i_n
tab. 16 quae utraque ad *Medkagimm fativam* pertinet, legumina etiam
hujus bene exprimit.

Caules decumbentes, laeves, vix angulati.

Folia obovata et obcurdata, denticulata.

• *Stipulae* dentatae.

Pedunculi a-6 flori, mutici.

I^fininaplurima, cochleata, cylindrica, utrinque plana, laevia, inermia.

89. LEDNODON FIBOT > fl/f. Sp. Pl. 1123.

Planta fat vulgaris, fed polymorpha et faepeaequivoca, quare accuratam de-
fcriptionem mereri videtur.

Radix praemurfa.

Fo/wradicalia, ad bafin vaginis fiifcis obtefta, lanceolata denmra. 1 u
langi. vel antroifum ve. retr^{or}fUm ad angulum a2 V ^ ' J ^ Z
genere runcmata dm nequeant. Apex bugus, haftatus. PIU a? h1 i 1 1 1
praecipue circa coftam.

Cflw/wfoliisduploaltior, teres, ftriatus, nudus ramosus. *Folium* lineare, in-
teggerrimum (raro uno alterove dente) parvum ad quamlibet ramificationem.

Pedunculi fuperne incrallati, villofi, squamati: squamis lanceolatis, carinatis, appreffis.

Calyx polyphyllus, yillofus, foliofcs imbricatis, erettis, carina hifpida ex pilis longis fufcis.

Receptaculum planum, nudum, punftatum,

tfww0*fubcylindrica, tenuiflimetransverfim ftriata: *pappus* feffilis, fubplumofus.

Planta in fteriliori folo fpithamea, nonnihil ramofa, foliis runcinatis: in fertiliiori bipedalis foliis *Scorzoneræ laciniatæ*, caule multiim ramofa.

Picridifiaz *Hift. Helv_m* p. 12. n° 28 calycem lividum glabrum cribuic *Gen. de HA'LLER*, quern in noftra nunquam vidi.

Aliam varietatem foliis uno alterove dente tantum inftruffis et caule unifloro vide apud *Nob. GDUAN. Obf. et IU.* p. 56.

50- *HIERA CIUM Jylvaticuvi* caule ramofa foliofo, foliis radicalibus ovatis acutis petiDlatis: caulinis feffilibus, pedunculis multifloris. *COUAN, Obf. et IB. Bot.* p. 55.

Plantam anno 1771. circa Ulricsdal legi, quam cum GDUANI eandem eTe, omnino perfuafus fum, *Tabernaemontana* licet citata figura non convenit, ejusdem Vero *Ptilmo72aria gallica tenuifolia* ed. Bauh. 1525 p.m. 487* quae ad *Hieracium* 46 HALL, *fzrp. Helv.* § all egatur, noftrae multo melius refponderet, fi folia paullo minus dentata et caulespluresfuifTent. Ait autem ipfe *Gen. HALLER* folia vixdentata *zftz.* Bafis petiolorum etiam minus pilofa alba eft, quam indicate videtur defcriptio *Nub. GOUAN*; in eo autem variare poteft e loco, planta ceterum fatis polymorpha. In noftra planta

Radix fere praemorfa, fib rifque folum conftare videtur.

Caules plures ex eadem radice7 foliofi, pilofi, multiflori

- *Folia radicalia* petiolata, ovato-hnceolata: alia integerrima, alia denticulata, margine et nervo praerpfmis pilofa, in difco rarius et tune parcaffime. In petiolos mulcum hifutDs decurrunc bafi dilatatos: *caulina* lanceolata fuiuet feffilia,

BraQeae ad exortuift pedunculorum inque ipfis pedunculis flibulatae.

Flores HIERACII *murorum*, fed minores etpallidiores.

Si varietates praediftae fpeciei dividuntur, *fylvatico* SOUANI adjungatur no* lira, fin minus iingularis varietas erit HIERACII *murorum* Sp.Fl. iaig. B>

91. *SERRATULA arvensis*, Sp. PL 1149.

Hujus binae in Scania occurrunt varietates lat vulgare^ quarum

OL foliis utrinqueunicoloribus,

/3 foliis fubtus albidis eft.

92. *CARDUUS*/iff^F/ffBi¹ foliis decurrentibus finuatis fpinofis, fubtus pedunculis que fubaphyllis tomentofis, multiflois, calycibus ipinofis deciduis.

Cardnus leucographus. L. Sp, PL 1149?

Carduus lafteus peregrinus Camerarii. *RAJI Hift.* T. 1, p. 312 c. defer, bona.

Radix annua.

Caulis tripedalis, ramofus, ftriatus, alatus; nudus, fed rami terminales tomentofi.

Folia frnuatD- dentata, fpinofa, feffilia, deenrrentia^ fupra nuda albo-maculnta, fubtus tomentofa.

Pedunculi terminales et axillares; terminal es ram Dfi tomentofi, alati, longi, multiflori, floribus3-6j axillares breviffimi.



Calyces feffihis et pedicellati, ublongi, fer|cylindrici, molliter f̄pinoli, fubto-
mentof^, maturi decidui.

Corollulae paucae, rubrae, vix calyce longiores.

Semina parva, alba, gummi tenaei oblinica, unde pappo arftiflime adhaerent ec
difficillime extricantur.

Carduo albis maculis notato exotico MORIS T. 9- p- 155 eadem fynonyma ad-
jecir, qua RAJUS fuo tribuit, fed defcripAo et figura S. 7, tab, 30. aliam plantam
indigitare videntur.

Sub nomine *Cardui Leucographi* femina accepi, fed a charaEtere ifpecifico in
Spec, P/A. c. obvio recedit noltra et auftores praecerea diftinguunt.

93. BIDENS.

Planta in Scania⁵aeque ac Hallandia vulgaris eft, quam pro BIDENTE *frondo-*
fa habei'i debere plurimae fuadent rntibnes, praefertim magna ilia.folia calyci fub-''
jefta, fed cum proraifcuc cum tripartitecrefcac ethujusfrondescalycinasplurimuin
ubfervaverimus variare, ejus quoque progeniem credimus.

94. BIDENTIS *tripartite* Sp. PK 116j. quoque nobis eft

var. *\$.pumila* teneraque caule fimpliciflimo unifloro, quam pro *minima* Sp.
PL 1165. ne habeant Tirones moneo. *Pumilae* noftrae *radix* eft fimplex, *folia* fer-
rata, *calyx**£o||otx|s foliolis plurimis | *Minimae radix* repens, *folia* aut Integra, aut
crenata lältem, ec *calyci* folia tantum duo fubjiciuntur.

95. CONYZA *antbdminthica* Sp. PL 1207.

Specimen ficcum in Bengala colleaum ec a *Nobi D.* ARV. ADK. STJERNE-
CRANTZ amiciffime communicatum, femina fuppeditavit hujus plantae.

Radix annua.

Caulis ereftus^ teretiufculus, ramofus, leviter tomentofus, purpureo-macula-
tusj ramis ereftis fparfis.

Fol/jakerna, ovato-lanceolata, ferrata, dentibus acutis^naequalibus, bafi in
periolum anguftata, fupra fcahra, (iibtus venofe'', glabra.

Inflorefcentia paniculara, terminalis ramorum; pedunculis longifuperne incref-
catis , folio unko inftruttis. Pedunculus fulcarius caul em terminal.

Calyx communis, polyphyllus, ovatus, fuperne connivens; fquamis linearibus
interioribus longitudine tubi corollarum: exterioribus elongatis quaqu-
verfum divergentibus.

Corolla *compofta* uniformis, flofculis tubulofis, numerofis 25-40 aequalibus
hermaphroditis, rubrifj radii reflexis. *

— *propYiae tubus* tenuiflimus yerfus limbum anguftatus; *limbus* oblonD-D-OVA.
tus, quinquefidus, laciniis lanceolatis, eredlis, fere conniventibus.°

Stamina, *filamenta* ^ brevia cfauce tubi. *Anthera* cylindrica alba, lineis § *nigris*.
PiftiUum, *Germen* oblongum, ftriatum. *Stylus* filiformis longitudine corollae.
Stigmata 2 refi exa. 0

Semina oblonga, obconica, longitudinaliter ftriata. *Pappus* fimplex fernfi^ 1
gitudine cubi corollae. * IUS, ion-

Receptavulum nudum₃ punftatum.

Sapor foliorum amariffimus.

Quum nullae adfmt corollae foemineae, potius *Serratulae* fpecies erit.

96. TUSSILAGO ^ z'^. Sp.Pl. 1213.

Scapus fere pedalis, ruber, ftriatus, tomentofus, uniflorus, bratteis 1-3.

Calyx ereftus, apicibus patuli* rubris, prope bafin auftus brafteolis coloratis.

Corollae foemineae. radii 10-13, tubo anguftiflmo, trim cat D; vix dimidiuin ftylm veftiente. *Stamina* omnino nwlhifyluf recurvus, *figmate* bifido, reflex D, excus rubente.

— *hermapbrvditae*.yv-35 generis.

97. TUSSILAGO A Sp.PI.1214.

Crefcit etiam ad Gudmuntorp.

Folia exa&e Petadtidis : multoties licet minora flint.

Scapus femipedalis, plus minus lomentofus, foliis veftitus fublanceolatis, acuminatis, nervofis.

7^r/J/jaftigiarus, brafteis lineari-lanceolatis fub quovis pedunculo, longitudine fere florum. *Bra&ea* minor in medio pedunculiP

Calycis folia 12-15 carinatn, margine membranaceo.

CoroUae bermaphroditae 15-30, *tubuh* lineari, anguftiflmo, *limbo* campanulato, quinque- rarius quadri-dentato, dentibus reflexis. *Stigma*, craffiufculum, acutum, bifidum, laciniis ereftis. *Filamrnta* tubulo adnata; *antbeva* ex 4 1. 5connatiSj fupra limbum eminens, apice acuto. *Pappus* fimplex, fcs-filis.

— *foemineae* 1-3 in radio, conflatae ex rudimento tubuli ftylum dimidiumveftiente. *Stylus* longitudine corollae hermaphroditae; *figma* parvum, bifidunij reflexum, plerumque lphacelarum. *Pappus* prioris.

cjg. TUSSILA GO^)<r&foliis triangulari-cordatis, denticulatis; lobis finuatis; thyrfio faftigiat, flofculis foemineis fubperaloideis plurimis. Tab. 2.

Crefcit copiofe ad *Bofirja* juxta Ringfion in Scania,

Radix longiflime repens? geniculata, alba.

Folia radicalia, longe peciolata, triangulari-cordata, fufco-denticulata, in junioribus utriufque, adultioribus flibtus lanata, cucullatd vel lobis (finunid-gio mox acuto, mox rotundato, excifis) convergendbus.

Scapus et *Tbyrfus*.T.^alba N° 97.

Calycis foliola 14-19 planiufcula, margine membranaceo.

Corolla bermaphroditae 34- 39- ut in *alba*^ nifi quod *figma* in hac magis craffum, minus fillim occulretur fere intra cyJindrum anrherae apice quinquedenatae. vid. Tab-II. f. a. in *alba* vero magis acutum eminec tocum fupra antheram.

— *foemineae* 12-13 in radio, tubulofae, lineares, longitudine corollas hermaphroditas aemulantes; *limbus* etiam tubulofus fineanguftato, oblique apertus, [vid. Tab, 2 b. magnitudine nutta) *ftylus* corollulae multo brevior,)?/^MM* parvp, obfolete bifido, fterili^ terminacur.

Apud nullum inveni Auftorerp nifi fit

Petafites minor alter Tuffilaginif. folio MDRIS, 3/p. 95 et PLUK. *Pbyt.Tab.* 206.

£3.

Quocum foliorum figura quadantenus convenit, thyrfi autem non. *A bybrida* diftincta eft er thyrfi et foliorum forma, ab *alba* flofculorum foemineorum numero, figura, ut ec foliorum conformations

99. TVSSILAGO bybrida. Sp. Pl. 1214?

Etiam horti academiici noftri alumna. Hujus vero folia a figura DILLENII-*Hort.Eltb.*:. 230.?. 297. plurimum differunt, cum foliuniin fpunac n ^.~~Sxf~~ te



conveniunt, nili quod minora fine et fade magis pbfeura ludant. Sufpicor illam*
bybrida diverlãm effe et eandem cum

^/^^.floribusfpicatis ereftis, foliis calycinis lanceolatis, flofculis paucifli-
mis androgynis. HALL. *H. ft. Helv.T. i. p. 62 n^D 141.*

100. TUSSILAGO *Petaftes*. Sp.Pl. 1215.

In hac flares foeminei faepe defunt omnino.

101. CINERARIA *alpina*. Sp.Pl.1243.

Polymorpha fane planta, cujus character vel emendari debet, vel varictates
in pltues dirimi fp cries, ut jam fecit *Nob. G 0 u A N, IU. et QhF_m Bot. p. 68,*

Unam eandemque hujus fpeciei varhtatem invenerunt in coemiterioEgnaber-
genli oculatiffimus D. *Praepoftus* DSBECK, et juxta Anndof verfus Käflinge *Clay.*
D. Cand. s'Ø D;EK BFR G, cujus defcriptio haec eft.

Caulis foliarius, limplex, ereftus, tomentofus, fpithamaeus vd pedalis, termi-
natus corymbo 5 ad g florum, minimE vero umbella involucrata.

Folia, raJicaIia\Zi3hte) ovata, dentata dentibus parvis acutis, fufcis; tomen-
tofa (tomentum vero *Tuffilaginis Farfaræ* in modum exuunt); *caulina* fes-
filidj ícni-amplexicaulia, fere adpreifa, linearia, integerrima, alterna.

Flores lutei, inaequaliter pedicellati, fingulo pedunculolad bafin brattea lineari
tomentofa' inftrufto. Reliqua generis.

Ideoque y. vel *integrifolia* eric-, fed nullum ex allatis fub hac varietatcfynony-
mon,praeter GMELINI, quadrat.neque hoc tamen, nifi fimul cDnferatur defcripcio
ctfigara^in7)ifr.7i. Planta_{genim} MORISONI, RAJI^ GERARDI, J.etC. BAU-
HINI quae eadem z&zwjvubata zPannonica CLUSII et ex quo et figuram et de-
fcriptionem mutnarunt, folia habet mulco majora, lato-lanceolata, acuminata,
plantam dimia longitudine aequantiaj noftrae vero vix fes quip olli car la et fere ro-
tundara. Auftornm planta-flores habet in umbella invDlucrata pauciores, noftra
plnres bracleatõs in corymbo. Nee *Senecio 5^ Hift.ft. Helv. T. 1. p. 29* noftra eft
planra, GMELIN I licet fynonymon ibi adducatur, folia enirn cordata et calyx to-
inentofas abfunt. Refle vero hanc HALLERI *Seimimtm* ad"*Cineraviam cordifoliam*
fuam refert GDUANL cit. cum qua nihil commune habet *Solidagv* GMELINI. Erit
noftra haec *tomentofa* j A C QUIN I *Misc. Find. p. 2g 7jn* ifi dicer et figuram c L U s n b o -
nam effe, quod refpeftu noftrae plantae non eft.

102. ORCHIS *lifolia*. Sp.Pl. 1331.

Zolumna ftamima, proprie fie difta, millaj fed *fligmamaximum* fornicntum cu-
jus latera fifla includunt partes mafculas. *Stamina* omninolibera, id eft nullo loco
adnata, fed in rima piftilli laterali abfcondita, filamento anthera lono-iore pdta
laterali prope bafin vicida inftrufto, * *

103. ORCHIS *Morio*. Sp.Pl. 1333.

Plurimum variant hujus flores, in eodem enim traftu eos obfervavi *lahk*™
etarii inflexo et piano, quadrifido; indivifo et leviter tantum cmarrinato *Jnũ*
praeterea obtufo etgibbo, cylindrico, compreflb vel fubcompreffo!

103, ORCHIS *mafatta*. Sp:Pl. 1333.

Nee minus variabilis; vidi enim *neSmì lalium* imeDrum em_armnmm pr
quadrilobum plus minus, comu conicum et cylindricum em_aar2inatum et

ID4. ARUM/piV^acaule, foliis lanceolatis, fpatha fpirali, *feffili*.

llahitat ad Tranquebar, K 6 N I G.

Radix geniculata, repens.

Fo/whnceolata, acuta, nuda, petiulis ad bafin dilaratis membranaceis, venofis.
Spat if a feffilis, Jpiraliter convoluta, perpetua.
Spadix brevis.

IOJ. AMARANTHUS *bybridus*. Sp. PL. 1405.

In horto academico per|plures annos ipontanea.

Plant a tota cum floribus pallide virens.

Caulei, petioli et nervihirfuti. •

Folia, cordata, lineata, margine undulata, apice deorfum fpeftantia:

Racemus terminalis, decompositus, ereftus, ad bafin foliofus; racemuli exfoliorum alis.

Flores mafculi triandri, tetrandri, rariffime pentandri.

— *j'oeminei irigyni, minDies.*

* 106. JUGLANS *oblonga foliis cordato lanceolatis inferne nervofis; pediculis faliorum pubefcentibus.* MILL. *DiCl.* 3.

Eferainibus a Rev. D. D. k A LM ex America ailatis excrevit' arbor nu^{ae} anno 1774 pnum tulic fruftum, ex quo videre licuit diftinaam effepeciem a ju GLANDE *mgra* Sp. PL. 1415. pro qua habita fuit. Differe enim et figura et colore fruftus odoreque fohorum.

Fo/wpinata, 5-8 parium, foliolis alternis feffilibus/ovato-lanceolatis, obliquis, acutis, ferratis, fupranudis, fubtus pubefcenuibus, inodoris.

Petiolut et neryus fuperipr tomentDfi:

Drupa ovaliSi tomentofa, vifcida,

*Nux oblonga, acuminata, profunde ac acute fulcato-fimiDfa, col. ore JugUregiae**

Otf. Juglandis nigrae fblia etiam in Anglia odora, teffe Millero 1. cit.

107. VERA TRUM *SabadiUa.*

Eracemo ficco. inter femina repertD, quern in Mufeo fuo fervavit Cl D Fr ZIERVOGEL. *Pbartn. AuU* fe qu entem formavi d ecrip ti on cm. " "

ibrnrasfpriatus, iitvidetur, fimplex, floribus fecundis fiibnutantibus pedunculatis, nigro-purpureis.

Flor.- Hermapbr:

Calyx nullus.

Corolla hexapetala, petalis tribus exterioribus, omnibus ovatis.

Stamina fex bafi corollae inferta, filamentis infernelatoribus^ perfiftentibus,

PijliUa tria, germinihus oblongis, glabris, flylis breviffimis. Stigmata fimplicia.

Capfulae 3 ovato-oblongae, acutae, intus dehifcentes.

Semina 2. 3. oblonga, altero apice- truncata.

Flor. Mafculi

Omnia ut Hermapbrod. praeter pijliUum, cujus modo ru dim en turn adeff,

log. ATRIVLEX *pedunculata.* Sp..Pl. 1675.

Crefcit in Urbe Lands Crona, loco depreflb arenofa cum Salicnnia.



109. ATRIPLEX,

Hujus generis species floruit in Horto Academico, ex Seminibus sub nomine *Spinae ferreae* ab Amico missis. Quod autem, licet polygama non fit, sed monocaca, ad Atriplicis genus pertineat, e riorum foemineorum fabrica patet.

Radix annua.

Caulis tripedalis, sublignosus, flexuosus, fulcatus, ramosus, patens, foliosus.

Folia oblonga, sinuata, nuda, albo-micansia, praecipue subtus ex infinitis aromisnitentibus: inferiora subhastata, superiora linearia.

Inflorescentia racemosa, monoica.

Racemi terminales ex glomerulis masculis, immixtis paucis floribus foemineis. Reliqui flores foemineifertiles, congesti, axillares.

Corollae masculae calyx turbinatus, pentaphyllus, foliolis membranaceis apiceinflatis, carina viridi. *Corolla* nulla. *Stamina* 5 filamentis filiformibus calyce nonnihil longioribus; antherae subrotundae.

— *foeminae calyx* diphyllus, compressus, quadrideniatus, denticulis inaequalibus; micans. *Germen* subrotundum compressum, styli 2, rarius 3, calyce triplo longiores; stigmata reflexa villosa. *Semen* foliarium orbiculatum, compressum, in fine calycis magnitudine parum aucti, laevis.

Figura tenus convenit cum

ATRIPLEX foliis ex sinuatis hastatis, spicis aiffimis, valvulis feminum dentatis GMEL, *Fl.Sik* III. p. 69. tab. 14. f. 1. nec multum abfcedit descriptione

SPINACIAE foliis ex deltoideo-ovatis, ruberrimis, capulis in orbem positis *ibid.* p. 86.

110. OSMUNDA ^W. Sp.PL. 1522.

In alpebus Dalecarlicis lectam vidi in Herbario B. LECHE.

in ASPLENIUM B. ^{frondibus} subbipinnatis, foliolis oblanceolatis alternis, apice ferrulatis.

A.JpUnivLm Germanicum WE is *Crypt. Gott.* p. 2⁹ *.

Asplenium caule pinnato, pinnis imis trifoliatis, superioribus simplicibus dentatis. *HbLL.f. Helv.* T. 3. p. g.

Adiantum foliis in oblongum scissis, pediculo viridi. MORIS. ^v ⁱ ⁴ P. 585. tab. 5. f. 25.

Adiantum novum germanicum Rutae murariae facie, BREYN. *Cent.* p. 180 f. 97.

Filicem hanc in rimis petrarum circa Ulricsdal offendimus, promiscue cum *Acrostichoseptenionah* crescentem.

Radix fibrosa, fibris longis ramosis.

Stipites multi, basi ferrugineo-nigrificantes, superne virides.

Fronde subbipinnatae. *Pinnae* inferiores foliolis constant 2 1 TM. 1 . . .
terminales bifidas sunt, reliquae simplices - t 2 S ¹ ³ ^B [!] [?] lat 15: m ^u
3 raxis; omnes alterni in petiolum d S i ^ S ! ^{ON} TM ^ b * S *

Fruificationes lineares 2. 3. in fingulis ^{foliis} ^{verfos} ^ ^ ^ ^

Fronde praetenti anni cum icone BREYNI exaste ^{m n w} ⁿ ^J ^{converg} ⁿ ^J bito. quinnostraplantae ademit cum illa *Cel* WE, [?] ^{n t} ^{el} ^{nu} ^{Uus} ^{du} ^{ElssII} > PO" im hct variem descri-

ptiones nostrae. Ejus enim exemplar forte in et BREYNI adultius fuit, huius enim mensis septembris lectum, nostrum Julii. MORISONI figuram, quam ipse quidem a Breyniana filice distinxit, ad *Ofmundam crispam* retulit Gen. de HALLER, sed ad nostram potius pertinere ac neutiquam ad *Ofmundam* referri debere persuasus sum.

112. POLYPODIUM *crispum* KOT. Sp. Pl. 1551.

Polypodium filix femina spinosa WEIS Or. Gott. p. 316.

Polypodium MÜLL. *Fl. Fridr.* p. 193. no. 841. T. 2. fig. 2.

Crescit in Sylvis. Gotungiae.

113. PILULARIA *alpina* Sp. Pl. 1565.

In Hallandia prope amnem, qui trans Hafllöf fluit, legimus.

114. LICHEN *fulvireus* A3. Holm. 1769. p. 249. est

Lichencapitatus SCHREB. *Spic. Lips.* p. 134 et

Mucor furfuraceus Lin. *Sp. Pl.* p. 1655.

Color enim viridis et luteus in Lichenibus multum ludic,

115. TREMELLA *Agaricoides*, Aft. Holm. 1. z. p. 250

Peziza polymorpha OED. *Fac.* 8. T. 464. fig. non bona.

HALL. *H. ft. Heh, Tab.* 48. § 8» icones bonae, nomen non inveni.

Lycoperdon trmvatvm LINN. *Syft. Nat.* XIII. p; 824 est

initium nostrae Tremellae.

115. TREMELLA *granulata* A8. Holm. 1. cit. p. 250. est

Spbaeria Mori WEIS. *obf. hot.* p. 45. t. 2. § II.

117. ULVA *radicata*, A3. Holm. 1. cit. p. 250 est

Ulva granulata SCHREB. *Spic. Lips.* 141.

U8. BOLETUS *Buglossum* AB. Halm. 1. cit. p. 253.

Boletus asbestinus SCOP. *Ann. H. N. IV.* p. 148?

Polyporus fanguineus fessilis, crassus, mollis, obscure lobatus. HALL. *H. ft. Heh.* 2315.

119. CLAVARIA *ophioglossoides* Sp. Pl. 1652.

Raro hoc fungo, in Westrogothia lecto, me donavit Nob. D. J. A. CYLLENHAHL.

129. LYCOPERDON *aggregatum* A3. Holm. X. cit. p. 254.

Mucor lycoperdioides SCOP. *An. H. N. IV. T. 1. f. 11.*

Trichia breviflora petiolata purpurea piriformis de HALL. *H. ft. Helv.* 2167. *tab.* 48- § 5.

121. LYCOPERDON *gregarium parafiticum, congestum, iphaericum, cortice fusco nitente, farina aurea.*

Hoc in ligno putrido prope Upsaliam nascens mihi amicissime obtulit D. GYLLENHAHL,



Ad *Trichias Gen. de* HALLER pertinet. Fungus est parvus, capitulo aciculæ vix major, farina foetuseffilis; hac autem amiffa, iam longepetiolatus apparet, fitepitate nigro capillaceo, capitulo hemisphaerico, concavo inani, ac tum cum fitepitate 3, d in Tab. 48 HALLERI apprimè convenit.

12?> BYSSUS *homycina* A3. *Hom.* cit. p. 251. est

Byssus floccosa SCHREB, *Spic. Lips.* 144.





APPENDIX*

SOPHORAE, foliis simplicibus.



Imo sane botanicorum Caput bonae spei adiit, quin plurima oirmino nova ibi invenerit; imo regio ista prae aliis, plantarum dives videtur. Mihi falem ignota est terra, quae intra tam parvas limites, tot sibi propria et numeroia Gen Era alit; exempli gratia sint *Ixiae*, *Gladhli*, *Proteae*, *Ericae*; *Mefanbvyanthma* *Gnatiia* *Gnapbalia*, *Xerantbema*, *Pteroniae*, *AJpalatbi* & L\ ftirpes, quae plane singulari ec pulcherrima facie, omnes etiam Botanices ignaros in admirationem rapiunt.

Sopfwrae omnes, siunica species quae *Lupinoides* dicitur, excipiat, Indiarum fimm incolae, sed *Sophoraz monopbyttae* hadtenus nullibi, nisi circa Caput Bonae Spei viae sunt crescere. Harum quatuor mihi Hint in Herbario obviae, quae distinctae videntur, licet charatrer *Sopborae biflorae* Syft. Nat, Ed. XIII. p. 325 omnibus qua dan ten us competit.

Facile contingit bDtanico etiam fummo, ejusmodi characterem, plures species sub se comprehendentem, unicae speciei imponere; ignotis enim reliquis, quis de notis distinctivis somniare possit, quae? Et haec est ratio, cur continue necessarium habemus, characteres non tantum Generum sed etiam Specierum emendare; quo plures enim deceduntur species, eo quoque plures difficultates occurrunt effectuales inveniendi notas, quamcunque Speciem absolute distinguendi.

Maxime similes quamvis mihi videntur hae quatuor *Sopborae* ut ex descriptionibus frequentibus patebit, ideo tamen jjegare non audeo, varietates intermedias dari, quibus 1. 2. et 3. in unam connectuntur speciem; sed quamdiu hac ignorae liint, vix me errare credidero, si illas distingUD.

I. SOPHORA *buxifolia*, foliis simplicibus ovalibus, si supra glabris, subtus fericeisj pedunculis uniflorisj calycibus basi intrufis, romentosis, coloratis,

Genista africana frutescens, nummularia hirsuto folio, floribus parvis purpureis. RAJI *Dentr.* p- 105?

Brevis haec descriptiuncula, quam e SHEHARD 0 mutuatus est RAJUS huc pertinere videtur, synonyma vero ab IU. a LINNE eta *Nob.* BERSID ad *Sopboram hiflwam* allata, hujus speciei non sunt de HERMANNI nihil judico. Delbriptione haec est:

Caulis suffruticosus, laxus, teres, foliosus, tomentosus, ramosusj ramis brevibus, patentibusj magis tomentosus.

Folia simplicia, sparsa, brevissime petiolata, ovalia, 6 linearum longitudine, 3 autem latitudine, integerrima, obtusiuscula, supra glabra fulco longitudinali exarata, subtus tomento-ferrea, carinata: carnofa. Tenera autem folia, praefertim margine et subtus rufo-tomentosa, nitentia.

Stipulae 2, filiformes, intra petiolares, petiolo triplo longiores.

Flora ex summitate ramulorum axillares, foliarum, pedunculati; pedunculo longitudine folii subiacentis, rufo-tomentoso.

Calyx campanulatus, quinque-dentatus, basi intrusus, hirsute rufaeustus, alba vero intus vestitus; laciniis acutis.

Corolla purpurea, aliis pallidioribus.

Germen maxime hispidum. *Stylus* terminatur capitulo parvo.



0^/Petalorum mentionem minus necessarium facere credo, nisi lingulare quid in fig *Lira* occurrat.

- a. *SOPHORA myrtillifolia* foliis simplicibus obovatis, utrinque fericeis, obtusis cum acumine j pedunculis unifloris; calycibus basi intrusis, tomentosis.

Sophora biflora LINN. *Sp. PL* T. a. p. 534.

Sophora rotundifolia BERGII *Cap.* p. 133.

Plautam a *Nob_m* BERGIO habui.

Caulis fruticosus, teres, foliosus, laevis, ramosus j ramis erectiusculis, tomentosis, versus apices subangulatis.

Folia simplicia, parva, breviter petiolata, obverse ovata, longitudine 10, latitudine 4 linearum, integerrima, apice rotundato cum acumine reflexo inflexa, utrinque tomentoso-fericea, supra fulco longitudinali, infra carina elevatopraedita, coriacea.

Stipula fubulata, tomentosa, petiolo duplo longior, utrinque ad petioli latus-

Flores versus fines ramorum erumpunt ex foliorum axillis, solitarii, pedunculati j pedunculo longitudine folii adjacentis, albo-tomentosi, raro biflori.

Calyx campanulatus, quinque-dentatus, basi intrusus, pedunculo concolor.

Corolla purpurea, Carina pallidiore,

Germen maxime hispida. *Stigma* simplex, nigrescens,

3. *SOPHORA biflora*, foliis simplicibus, ovaris, subtomentosis; pedunculis bifloris; calycibus basi intrusis, tomentosis, coloratis.

Distincta a reliquis, foliorum figura ovata non obovata, neque obtusa. Vexillum non maximum, nec colorat.

Caulis fruticosus j teres, foliosus laevis, flavus, ramosus: ramis teretibus, tomentosis.

Folia simplicia, parva [in ultimis ramulis nonnunquam opposita] breviter petiolata, ovata, longitudine n, latitudine 6 linearum, integerrima, acuminata: acumine reflexo; glabra^a teneriora subtus, teneriora utrinque tomentoso-fericea, omnia supra fulco, fimbria carina elevata inflexa, cuneata.

Stipula fubulata, tomentosa, petiolo vix longior ad utrumque petioli latus.

Flores terminales ramorum ex ultimorum foliorum axillis.

Pedunculus communis longitudinem habet folii proximi, dein dividitur in duos pedicellos unifloros, articulatione communi junctos; pedicelli hi fimbriati versus (superiora) incrassantur et tomento flavescente, ut ipse quoque pedunculus, induuntur.

Calyx campanulatus, quinque-dentatus, gibbus, basi intrusus, frangit longis crispis flavo-rubentibus dense vestitur, unde amplior corolla videtur.

Corolla praecedentium major, pallideflava (ut videtur), fimbria purpureis pitta.

Germen hispida. *Stigma* capitatum.

4. *SOPHORA calyptata* foliis simplicibus subovatis pubescentibus, pedunculis unifloris j calycibus tomentosis 3 florum calyptra decidua.

Crotalaria foliis ovatis, petiolis simplicissimis, ramis teretibus. *Hort. Cliff.* 357- 3- *

Genista africana arborecens, calyce scabro, foliis salicis capreae rotundifoliae, floribus amplis purpureis. *RAJI Dmdr.* ID6.11.49.

Gemfeltella arborefcens, ftyracis folio major, flore cosruleo PLUK. *Phyt.* T. j 85. f. 2. neque figura neG colore cum noſtra convenit: ita etiam res feſe habet cum *Myrtogenifla* Cap. B. Spei, BREYNII *Cent.* p. iſg. t. 27, cujus flos aureus, alae parvae et fimilis floribus Cytifi vel Geniftae. An *j4rhor* filiquofii africana Geniftae femine BARTHOL. AEL *Hajfn.* T. z. Obf, 131 noſtra fit, nee ne, ab icone determinari nequit.

Singulare forſan alicui videtur, me Nomina ſpecifica *Speciemm Plantnrum* et *Horti Cliffbrtiani* ita diftribuiſſe; fed *MyrtiUifoliam* noſtram, *rotuvdtfo/iam Nob_m* BER Gii eſſe ex illius Herbario intellexi, ec deſcriptio in *Horto Clifford* dara, optime cum hac noſtra convenit. Calyptras a nomine Auſtorum obſervatas fuiſſe, facile explicatu eſt, ſpecimina enim tan turn florentu illis oblata, ceruo certius credo.

Caulis fruticosus, ramis ftriftis, obfolete angulatis, folioſis, tomentofis, ramuloſis.

Folia ſimplicia, ſparſa, petiolata, ovata, (teneriora obovata) longitudine 22, latitudine 12-13 linearum, integerrima, auſta, rarius acumine parvo reflexo inſtruſta, utrinque creberrime venoſa, fupra ſcabra e pilis breviffimis vix conſpicuis, fubtus villoſa, non autem mollia aut fericea-Venae fubtus ec cqtſa cinereo-tomentofae.

Stipulae 2 ſiibulatae, petiulu breviores, caducae.

Flores axillares, pedunculati, folitarii: pedunculis tomentofis folio proximo brevioribus, verſus florem genu unico praedicis. *Rudimenjum* floris tegitur *calyptra* globoſt, villoſa, ad genu pedunculi adnata, vid. Tab. IV. a. a. a; increſcente flore dilcedit haec a bail ſim er decidit ante futuris explicationem.

Calyx villoſus reflexus > minime intruſus.

Corolla maxima generis, purpurea.

Hanc licet calyptratam vocavi, reticere tamen non poſſim, quod geniculum pedunculonun, omnibus his quatuor commune, ſuſpicionem mihi movie, cundtas calyptra inſtrui poſſe, licet ego in hac fola illam obſervavi.

Calyptra quum ſimili omnino cum calyce gaudet colore et villoſitate, difficile ab infcio obſervatur, antequam a geniculo difceſſibrit. Hoc ita procedit, ut circa pedunculum ſolvatur totum, praeter punctum, qitod ſub labio ſuperiori calycis eſt; in hoc loco, quod primariam cum vafis fuccofis pedunculi communicationem habere videtur, diutius adhaereſcit, donee incrementum floris illius quippe rupturam promovet. Flore demum dimidium perfeſto, decidit omnino.

Ut nihil fuperfluum etiam floribus dedit fapientiffimus Creator, ita neque haec ufu carere poteft. Qui mox in mentem incuenti cadit, eft, quod calyptrae illae, tenues adhuc flores ab ardente Sirio et forfan pluvia fub illo temp ore cadente, praefervent.

C o r r i g e n d a .

«

- p. 7. Un. 4. bcuptetandi lege *lozuphtandi*
— 9 — 13 poll: *icon* deleatur 4
— 14 — 31 *pert*, leg *pent*.
— 16 no 37. lin. 3. *Phyl.* leg. *Phyt*.
— 17 lin. 43 *obviae* 1. *obvia*
— ibid. not. Hn. 1. *crebrac* leg. *zrebra*.
— Ig. lin. 5. *arts* leg. *acris*.
— — lin» IS pofit: calyce del.,
— — no. 54, lin. 3. pofit: *Scaniae* del.,
— 33. lin. I. *Vtraque* leg. *Viraque*.
— 23. n. yy. lin. 3* *benique* leg. *benigne*
^ 27. no. yy. lin. vlt. pofit *fin minus* ponatur ;





Medicago obscura.



Tubiflago spuria

M. von Sieber

ANDREAE IOHANNIS RETZII


PHIL. MAG. AD REGIAM ACADEMIAM LVNDENSEM PRDFESS. REGII,
SDCIET. PHY510GRAPHICAE LVNDENSIS SECRETARII &C.

FASCICVLVS

OBSERVATIONVM
BOTANICARVM

SECVNDVS.

CVM FIGVRIS AENEIS.



LIPSIAE

APVD SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM.

CI3I3CCIXXXI

I L L V S T R I
I O S E P H O . B A N K S

A R M I G E R O

& E G A L I S S D C I E T A T I S L D N D I N E N S I S

F R A E S I D I & C

Seczindum hum Obfervationum Fafciculum conficrat

A V C T O R .



L. B.

Prodiit nunc alter Observationum Botanicarum Fasciculus, mole minor! quam sperare ram; animus enim erat, tutum Apfalathi genus describere iconibusque coloratis illafrare. Id vero propofuum mutare coactus fui, pDitquam Camoenis nostris valdidit humaniorum litterarum & Hiftortee Naturalis fluidiofus indefeflus *IV/J. Schwartz* in arte pingendi dexterrimus. Centuria itaque hac ucere interea Lector humaniflime Sc cominuaationem, li Deo placet vitam & vires largiri, expedita. Plus quam reriarm plantarum in hucce Fafticulo defcriptarum partem fruftra in fcripris Linneanis quifris; reliqua vel notamm ftirpiuin perfeftiores, quam quoz, quantum ego €{o, alibi proilant, defcriptiones, vel eciam erronearum emendationes iiftit.

Neceflitatem defcrlendi etiam notiffimas vulgo creditas plantas, alibi urfi, nee crederem aliquem genuinum Botanicum contradicere. Si quis vero fie, qui lize fipeiflua iudicec, attendat modo quarfo, quod adhucdum bins vel rres, for fan nonnunquam plures plants in diverfis regionibus Tub eodem nomine legantur, colantur, ferventur; alibi vero una cademque flirps fub diverfo nomiye pro diverfa fpciecer quater & ultra a diverfis Botanicis habeatur, feponatur.

Evitari non pocuit confufionis huius caufa, idque exemplo illuftrem. Sic mi hi novi generis fpecies unica: genericum charafterem e fruttificatione defumo, uc mos eft & fana fuadet ratio, fpecificum vero determinare nequeo, quamdiu unica fpedes nota fit, nee adhuc fpecificus exiftit character. Poll tempus alia detegitur huius generis fpecies, quam folia gerere oppofira obfervo, prior vero alterna habet: fie limplicidima erit ex his & facillima fpecifica nota. In herbario autem vel horto &c. aliquis habet generis huius Unas plantas, foliis in vtraque opppfuis, huius vero fimul dentatis, illius integerrimis &c. quaenam harum a me determinate erit fpecies? Confer Anchufas, Sia, Selina, Ononides &c.



Optatetn son una vice audiui *IU. LINNEVM*, ut fibi tempus viresque fuper-
efflent omnes in Herbario fuo obvias plantas ea, qua vfus eft, methodo in Mantiffa
defcribendi, vel fakem e difcipulis aliquem faris in Botanies verfatum, ciii hunc
concredere pofflet laborsm, habersc. Nifi, ut iaverum chaos, unde tot illuftriura
celeberrimorumque Virorum laboribus furrexit, iterum ruat Botanica, velint, vo-
lum immortalis Viri folvant, quibus datum eft poffe! Quotidie fere augecur fpe-
cicrum numerus & cum illo de illis incenitudo, usque dum nuVius fpeciei dudum
notae defderetur defcriptio.





* * *

- V**
1. **ALERIANA** *faxatilis* Linnei, Iacchini & Scopoli planta est dioica, *Vah diuicae* fide didtae proxima.
2. **PANICVM** *Caffrovum*^ panicula verticillarim ramofa, corollis nullis, nechris villofo-laceris.
- Radix* annun , fibrofā.
- Culmus* erefl us 3-4 pedalis, cylindricus, fartus, teftus vaginis foliurum: geniculacus , geniculis tumidis.
- Folia* fesquipedalia , parentia, fesquipollicis fere latitufline, fubfecunda (in caldario) glabra, margine fcabra, prope bafin feu ad ligulam vaginae fuperne villoia. *Faginat* DDD raro farina alba aranearutn celas referece conrperfae obfervaniur.
- Panicula* verticillatim ramofa: ramis patentibus multifloris. *Rachis* fulcato-fexangulaca, glabraj fed ad exortuui ramutonim barbaca. *Ptdkdi* flexuoi, piloi, muUifloru
- Calyx* exalbido - hyalinus, hirtutus, viridi - ftriatus, mejubranaceus vel porius cartilaginous, rigidus, triglumis. *Qlnmae* binae exteriores aequales, ovatine, acuae, akera alceram marginibus ampleftens, utraque t^rtiam minurem lanceolatnm includens.
- Corolla* nulla, eius loco *Neflarium* vel membrana tenuis, lacera, villofa, germen vellieus.
- Germen* lenticulare, viride. *Styli* 2 hyalini longitudine gsrminis. *Stigmata* fcurateflava, undique pilofa.
- Filamma* 3 filifDrmia. *Anthrae* longae, fagictatae, flavae.
- Semen* fubrotundum, parum compreffum.
- Qbs.* Flori omni perfefto adfidec unus vel alter *calyx* biglumis parvus plane vacuus. Fades *Holdy* calyx *Panici* inverfus, *Neflarium* loco *Corollae*. Si placet *HQIC* fpecies eric. In Cap. B. Ipei fubj^Djnioe *Cafferkom* riorum Afncanae originis.
3. **PASPALVM** *birfutum*, fpicis alteinis fubbinis, rachi membranacea, calycibus multinerviis laevibus, foliis pedicellis hirtutis.
- Culmi* erefli, foliofi, fuperne pilofi.
- Folia* & ^tfgwize undique piloia; oris barbatis, plana nervofa.
- Spicae* ereftiufulcae , fubfeftiles, aliernae , in meo exemplari binae. *Rachis*, quam in fcrobiculato, anguftior.
- Flores* fecundi, alterni, glabri, pedicellati: pedicellis pibfis, calycibixs 3 - 5 nerviis.
- £ *China* mifit Cel. BLADH.
- Oh.* In *Pafpalo diff*£h7 quod e *Tranquebaria* accept folia glaberrima func aequae, ac in culco.
4. **ROMVS** *montanus*) panicula nucante, fpiculis Tub fexfloris, ariftis longioribus. Prodr. Fl. Scand. 124, Poll- Hift. PL Pal. I. 11G.
- Br. montanus*, panieula fuberefla; pedicellis fimplicibus diftichis: ariftaperali longicudinc. Scop, Fl. Cam. ed. 2. 117-
- Br.ramyfus*, panicula nutance fcabra, fpiculis villofis ariftatis^ foliis fcabris. Linn. Syft. Nac. ed. 13. p. 102.



Br. afptr. Murr. Pr. Gotc. p. 42. ex fpecimine ab oculatissimo *Ehrbart* communicato.
Br. femoralis panicula ramosa nutante scabra, ramis binariis, fpeculis linearibus
 tereribus aequalioribus. Hudf. FL Angl. ed. 2. I. p. 51.

Br. glaber, panicula nutante, locustis quadriangulis, glumis subhirsutis. Hall. Hid.
 Helv. 1506- (non 1507 err. typogr. in Prodr. nostro.)

Gramen Iromoides monianum, hirsutum, panicula, minus sparsa, corniculata,
 Scheuchz. Agr. p. 263. c. 5. f. 15. fide Halleri, cui repugnare videatur *hirsutum*.

Festuca avenacea fpecie illegitimibus et glumis glabris compactis. Rari Syn. 5.
 p. 414.

Ois. Synonyma Bauhini & Morisoni omnino delibata sunt. Nomen *Rari* & ad hunc
 & ad 1503 seu *vericolorum* Pollichii (quod in Anglia, teste *E. Dryander* non
 crevit. Huic amico specimen *Br. montani* sub nomine *Br. fntini* debet)
 citavit *Halbr.* Bromos has transpulerunt *Poltich* & *Hudson**

g. HEDYOTIS fruticosa Unnei?

Rami tetragoni, glabri, *Stipulis* rhombicis caulem amplexantibus, e quarum
 finibus prodeunt:

Folia opposita, vix petiolata, lanceolata, integerrima.

Floris in chyro brachiato vel panicula more *Galiorum* divisa.

Involucra nulla, sed ad ramificationes foliorum 2-fida.

Calyx quadrifidus

Corolla tubulosa, limbo quadripartita, inclusis tomis.

Stamina 4. in medio (ubi filamentis brevissimis, antheris linearibus.

Pistillum gynostemium biloculare (jv/w corolla longior, stigma capitatum.

Capula ovata (infera) quadripartita calyce, bilocularis.

Sanina foliaria, oblonga.

Oh. In variis haec nostra a descriptione Linneana in Fl. Zeilan. p. 25, recedit.
 E. China specimen accepimus.

B. PLANTAGINEM *mediam* cum *maiore* nullibi coniunxit, vel sub una specie
 comprehendit // a Linn. id quod sine omni ratione obiicit CV. *Scopoli* in
 Fl. Carn. ed. 2.1. p. 106¹ ubique illas distincte cumque illo* *Ruyenus*, *Halle-*
rus & quantum scio omnes.

7. HELIOTROPIVM / f^y < w, foliis lanceolatis trifloris, caule ramoso diffusis
 floribus congestis.

Radix simplex, fusiformis.

Caules subdichotomo-ramosi diffusi, triflori.

Folia alterna lanceolata, plerumque obliqua, in fumis ramis quandoque opposita,
 integerrima, triflora.

Flores ramulosis terminantur, parvi, albi, foliis obvallati: calycibus subaequalibus
 hispida.

Semina 4 subrotunda, glabra, apice nonnihil rugosa.

Ab amicissimo KÖNIG accepti. Fides fere *Sberardiae*.

8. HELIOTROPIVM *marifolium*, foliis lanceolatis hispida, caulibus procum-
 bentibus fruticulosis, fpecie simplicibus akernis.

Radix lignosa.

Caules fruticulosi, procumbentes, ramosi, hispida.



Folia alтерна fersaque, hnceolata nonnihil *id* ova lam figuram accedencia, ácu*
ta (Teucree Mari, Jicec rainora) hífpida.

Spicae copiofac ^ inordinate, minus cornpáclae, braifteis forma foliorum.

i7or*j albi, extus ut er eslyccs hírfuti,

Hanc eíarn dedit, CL KÖNIG.

9. HELIOTROPIVM *CwomanMianum* foliis obovatis villofis imegris, fpicis
fimplicibus conjugatisque, feminibus puntlatis.

Radix fimplex, fufiformis.

Caules eredli & profrati, hífpidL

Folia obovata, imegerrinia, villofo-hífpida, aherna & oppoficá.

Spical folitaiiae & conjugarae, laterals & lerminales.

Calyx inaequalis> hífpidus.

Flora parvi, albL

Semina 4 punctata.

Dedic quoque ^Cel KÖNIG.

10. MY OS OTIS *fquarrofa*, feminum angulis fetofu - unclnatis, foliis lanceolaus,
pilofis, apice callofis.

Radix annua 3 ramolá.

Vaults (in culta) bipedalis, tsreciufculus) pilofus; denfb raixiofuS: ramis iuferio-
ribus brevioribuff.

Folia akerna, Linceolara, inregerrima, [cbmfd, apice callofa, pilofa: pilis
pundtis callaiis infideniibus. v;;^

Flora in racemis longis laxis akerni, parvi > coerulei fauce flava, brafleis minu-
tis lineari - lanceolatis ' fuffulci.

Calyx monophyllas, quincjueparrirus, ereftiufculus, pilofus, tubo corollae lougiorj
fruftifer major 3 pareiuifTirmis,

Semina fuburigono - pyramidara. Horum aag'uli bini excerior^s ut et angulus
bafos binis ordinibus fetarum apice uacina[arum pukhre vdtiuncur.

An *Myofotii ecbinopbvra* Pali.itr"Te III. p. 717. tab. li f. I. A?

11. ECHIVM *violaceum*. Lin. Mant. PL p. 42.

Radix annua, iimplex, fufiformis.

Caulis ramofus, hífpidus, erediufculus.

Folia inferiora lanceolata obtufá: Tuperiora bblotigo - cordata, acutaj bmnia líiG
pida, pilis e bafi tuberculata non exeuntibus.

Flores racemofi, fecundi: racecno revolub, elongato, brafteis lanceolatis, cilia-
tis, alternatim lateralibus.

Calyx (ubfeffilis, quincjueparritus, fparfifn píbfus, laciniis lineari - lanceolatis,
patenribus.

Corolla violacea, ftriata, irregulafis, cubo ealyce mukum breviora, ad dimidium
albidoj rarius pilofá.

Stamina inferiora longitudine labii fuperioris: fuperiora longitudine labii inferio-
rs: quinto breviora, omnia verfus labium fuperius arcuatira Hexa. *Fila-
mmta* carnea^ bina longiora nuda, reliqua pilis longis raris aferla, *Antht-
rae* parvae, nigrae.



Piftillum, *Stylo* piloso rubro, longitudine filamenti brevioris, tandem ad longitudinem corollae excrefcente. *Stigma* bifidum, cœnue.

Semina parva, nigro-fusca, punctata - scabra, acuminata.

12. PRIMULA *calycanthoides* foliis crenatis, rugosis, mollibus, calycibus hypocrateriformibus coloratis.

Vulgatissima in horti planca inter varietates *Primula** *veris* numerata, a qua meo fieri in judicio utrinque diversa. *Calycis* tubulosus, minimis inflatus vix nisi angulis subvillosus dilataur in limbo amplius, corollae figura atque colore similem ibi magnitudinem excedens. Variat pedunculis radicalibus unifloris & capitulis umbellatis, colore rufarum, coccinea, chermesina.

13. PRIMULA *veris* foliis crenatis, rugosis, mollibus, calycibus villosis, inflatis, pentagonis, dentatis.

Primula veris Lin. S. N. ed. 13. p. 162.

Obs. Calyx pentagono - subcampanulatus ore quinquepartito, in medio inflatus, ut quasi succus appareat, viridi - albus, villosus. Variat limbo majoris & minoris, plus minus concavo, albido, flavo, luteo, caeruleo; capite umbellato vel pedunculis radicalibus unifloris.

14. ANDROSACE *elongata** foliis lanceolatis dentatis, umbella scutifera donata corollis calyce angulato brevioribus.

Androsace elongata Lin. S. N. ed. 13. p. 152. exdestina *Gmelini* figura, quae omnino aliam designat plantam.

Radix carnosa, tenuis fibrosa.

Folia radicalia, congesta, sub lanceolata, acute demata; demibus inaequalibus.

Stemata numerosa usque ad 40, bi vel tripollicares, filiformes, teretes.

Stemata simplicia 9-16 florum; pedicellis longis capite conformibus, post florescentiam elongatis, ut aliam longitudinem capi aequent, divaricatis.

Involucra polyphylla, lanceolata, integerrima, involucribus *Androsaces septentrionalis* plus duplo majora.

Calyx angulatus in *Androsace septentrionali*, sed corolla duplo major. Dentium apices rubent.

Corolla alba, tubo brevi ovato superne coarctato, limbo quinquepartito: laciniis linearibus parvis bifidis, calycis dimidio brevior. Glandulae quinque dimidiatae flavescences in faucem perviaro posita.

Capitula & *Semina* *Androsaces septentrionalis*.

Obs. Perquam similis *Androsace septentrionali*, differat capitulis numerosioribus humilioribus, calycis magnitudine relativa, foliis minus incanis, magis longiusque demum, involucribus majoribus, habitu reneriore,

- 3j, ANDROSACE *filiformis* foliis ovatis, dentatis, periolatis, umbellae radiis capillaribus, corollis calycem campanulatum excedentibus.

Eadem (scilicet *Androsace septentrionalis*) foliis periolatis rotundioribus. Gmel. El. Sib. T. IV. p. 81* > b. 44. f. 4. minus bona,

Radix fibrifera, crevis,

Folia radicalia, (proprie radicalia non sunt, nam caulis, licet brevissimus, adest) petiolata, ovata, demiculata, glauca.

Scapulae 2-7 cœces, triari, filiformes.

Involucrum polyphyllum; foliolis filiformibus brevissimis.

Umbella simplex, 6-16 florum, radiis inaequalibus capillaribus.



Calyx campanula to - pentagonus, breviflimus.

Corolla alba, parva, calycem cameo limbo fuperans, laciniis integerrimis.

Obs. Pro *Androfaces fptentrionalis* varietate habuit B. GMELIN, ad *donga* tarn* retulit ///. LINNE ab utraque diverfilimam planiam, quam ficcam beevolentia CI. PALLAS poffideo.

16. CONVOLLVVS *copticus*, Lin. Manr. Plant, 2. p. \$79.

PJatnam hoc nomine infigiram mifit egregius KÖNIG cum defcriptione a B, LINNEo data, egregie convenientem, fequencia fi exúpias:

Cauks fpirhamaei vel brevior^s, profrari, minime volubiles.

Folia potius palmata vel ad bafin fere quinquebba, unguicularia^ cecerum defcripcis fimillima.

Pedunculi vix comprefli.

Brafieae foliis fimiles figura & magnitudine, lacinae aucem nonnihil aoguftiores.

Capfalae ratione planrae magna.

An diftiaéta ipecies?

17. RIBES *alpinutn* Linn. S. N. ed, 13. pp sor.

Hujus fruricis binas notatu dignas haber varietates Hortus Lundenfis.

a. Suerice *Mabatr*.

Foliis hioribus, obtufioribus, minus profunde trifidis.

Racemis creftis, imbricacis, mukifloris, ovato - oblongis;

Fhribus naajoribus; *bra&eis* ovaco - lanceolatis longiitudine florumip

B. Suerice *Corintbufke*

Foliis anguftioribus, acutioribus, ultra dimidium fere crilobis-

Racemis patentibus pauciPioris.

Floribus dimidio minoribus: bra&teis ovaris flurum longitudinis dupla.

ig. MANGIFEK* cerce plure? fpecies Tune. *K\imeTU5j?aminU7n* in quibusdaiD duplicatur. *Racemi* in aliis compDliri. *Fru&us^emform'xs*, globofuSj carnofus, fere exfuccus, &c. diStrentias fpecifkas p̄rodere videmur. Examinent Boianici Indhc.

ij). RHAMNVS *Oenoplia* Linn, folia ovata, lion raro obliqua, quod *acukatis Rbamnis* fatis familiare vidi, miuime femicordata gerir.

Foliis huius, Terminaliae & Iamboliferae viclicat *Phalaenat Atlantis Larva*, lion autero Citri vel Aurantii, obfervance accuranflinio KÖNIG.

ao. RHAMNVS *Xyhyrus* caule acuhato, aculeis recurvis, foliis ovatis fubws lomcncoiis, floribus corymboGs.

Arbur vix homine altior in defercis ad radices monuim Indian orientals crefcens.

Rami e pelUcula tpmenti albidi, rarius aculeo parvo foliario recurvo fub petiolo armati.

Folia late ovata, feepe ad cordatam accedentia, non raro obliqua, inaequaliter ferrata, fuperne obfeura, inferne tomento albo tenuiffimo obdufta.

Flores in corymbis axillaribus pedunculatis, calycibus tomentofis-

Fru&us, *Drupa* ficca Cerafo major, infipida, fubadftringens wee inaequali-

Obs. Hie & reliqui drupacei a *Rbamni* genere forfan fepearari debent.



21. LYCIVM *indicum* inerme, foliis ovatis utrinque acutis nervosis.

Ma J. Kaempf. Amoen. p. 780.

Frutx laevis, inermis, trifidus, ramis brevibus patentibus.

Folia parva, ovata, nervis datis utrinque urnata, aufla, integerrima, subtus pallidiora, in petiolos tenues definita, opposita.

Stipulae fuscae, spiniformes j molles, binae*

Flora obscure purpurei, fertiles ad apices ramorum.

Calyx minutus, quinquefidus, fuperus*

Corolla infundibuliformis, tubo lineari curvato; limbo ampliato quinquefidus laciniis ovatis trilobis, lobo medio productior. Faux villosa.

Stamina quinque longitudine tubi.

Stylus bifidus. Stigmata parum incrassata, compressa,

Dedit Celsus Koenig.

Oh. Rami sub siccatione saepe caeruleum induunt colorem. Quae de odoribus ftercoris refert Kaempfer 1. dr. falsa esse in Horto Hafnensi observavi, 6c ad singularem Botanice ignotam arbor em, a Baravis Strunbom dictam, referri debere monuit amicij. THUNBERG.

—22. STRYCHNOS *cuiuhina*. Linn. S-1st. ed. 13. p. 185.

An a Nuce Fumica distincta? Exemplaria refert C. Koenig in febris nuncius: *Strychnos culubrina* v. *Nux Fumica*, cui:

Folia ovata, crassiuscula > nitida.

Floras cymosae terminales ramorum: cymis pedunculatis, intus laeves, fimbriate magno peltato.

Aliam simul speciem dedit Thunberg nomen

STRYCHNOS *Titanifolia*, cui;

Folia ovata lanceolata, venosa obscuriora.

Florae in umbellulis simplicibus ad latera ramorum, intus hirfutissimae, Koenig odoratissimae fimbriate simpliciter.

23. ACHYRANTHES *indica*

Num nova species, an varietas tantum *Achyranthes lappaceae*? Unica plantam invenit C. Koenig prope montem Apuhr; sed exemplum ejusdem plantae ex tunc iam Vindobonensi, quam Vpfalensi habeo. Distincta a nominata *Achyranthes lappacea* a Linn.

Foliis ovatis cum brevi acumine, utrinque nitide villosis*

Spicis cymosis, e

Floribus magis approximatis, majoribus, magis albo fimbriatis.

Fasticulis flosculorum uncinatarum fraxineis, divaricatis.

24. ACHYRANTHES *polygona* caule decumbente tetragono foliis ovatis cordatis, petiolo laxo laevibus.

Dignata *arvensis* Forsk. Fl. JEg. Ar. p. 65. defer.

In Arabia FORSKAHL, in graminosis Malabaricae KOENIG vidit. Similis *Polygonum orientale* foliis & spicis, minus licet corollatis, ab *Ilhvebro fatigui* nuncius distinctissima planta.

25. CELOSIA *polygona* foliis cordatis, caule hispido, racemo spicato laxo, floribus trigynis.

Caulis herbaceus, erefliufculus, ftriatuſ, hiſpiduſ.

Folia tordata; obtuſa, petiolata, aherna, ſcabra.

Racemi ſirapliceſ, ſpicati: glomeruliſ alterniſ, reDODtiſ, feſſilibuſ, ſubbifloriſ, laevibuſ.

Flores trigyni, calycibuſ ſcarioſiſ.

Capſula urceolata: ore contralto, opeſculara, calyce longior, polyſperma.

E Tranquebaria miſit Cl. KÖNIG Planta ſimiliſ *Acbyrantbae polygonoidi*. *Cdoſia trigyna* Linn, a noſtra differt i) magnitudine tripla. 2) caule laevi. 3) foliis ovatiſ, acutiſ, 4) glomeruliſ multifloriſ pedunculatiſ. j) capſula globoſa.

36. CELOSIA *Monſonia*, caule proſtrato, divaricato, tomentolo, foliis filiformibuſ, ſpicis cylindriciſ.

Radix ſubramoſa, lignoth.

Caulis proſtratuſ, divaricatuſ, tomentofuſ, ramis brachiatiſ.

Folia Celofiae corymboſae, nuda. *Stipulae*, ſi quae, foliis ſimillimae.

Spicae numeroſae, folitariae, pedunculatae (raro feſſileſ) craſſicie pennae corvinae, albae, rubore ſaepe tinctae.

ſpicae imbricati, extuſ lanati, calyce pentaphyllo.

Oh. Facie lenuſ *Acbyrantbae* erit, deficit vero in meo exemplari, quod amicitiae D. KÖNIG debet, fruſtuſ, e quo certuſ determinanduſ genus.

2.7. CELOSIA *corymboſa*, foliis linearibuſ, corymbo dichotomo. *Simillimae Acbyranthae corymboſae*, fed:

Cauleſ creſcunt nec dichotomi proſtrati; anſemper?

Folia plura, linearia, verticillata, longiora.

Stipulae majoreſ, numeroſioreſ

Calyx pentaphylluſ, membranaceuſ, longior.

Corolla tripetala, foliolis ſubrotundiſ concaviſ, calyce dimidio brevior, rubra.

McMioſtaecifficiana: Charter *ſpicae* «l&Z>ae, *Celofiae*, *Illecebriflora* ſimillimae, lubricuſ, nec in hortiſ Europaeorum e plantiſ facile morboſiſ eruenduſ.

ag. ILLECEBRVM *lanatum* Lirni. S. N. eti 13. p. 206.

In aridiſ petroſiſ Malabariae varietateſ occurrit notatu dignae

p. foliis rotundiſ.

29. GARDENIA. In hoc genere conſtituendo fituſ verticaliſ laciniaruſ calycia nihil valet. Certioreſ characterem dant *Corolla* contorta cariaceae, *ſtyluſ* clavatuſ, bilobuſ, *Bacca* infera, ficca, polyſperma. Sicque *Oardemae* genus intrabunt THUNBERGIA *florida* Monn. Adt. R. Ac Svec. 1774. p. 11. vel *Bergkiae* Sonnerat it. ed. Germ. p. 20. numero licet diſpar & ROTHMANNIA *capenſiſ* Thunberg Aft. R. Ac. Svec. 1776. P. Ji. quibuſ frequentateſ novae ſpecieſ addi poſſunt. *Naudi Ervatam* Rumphuſ Amb. IV. r. 39. eſt contortuſ fruſtuſ folliculaco.

30. G A R P E N I A *Jasminoides*,

Frutex oſſepite alterneque ramofiſſimuſ, ſpiciſ ſupra-axillaribuſ brevibuſ.

Folia oppoſita ſparſaque, ovaia, integerrima, magnitudine *Gardexiae dumetorum*,

Floruſ ſerminaleſ ramulorum, ſubfolitarii, pedunculati, omnino *Jasmini odor**

ti-ſ fed



Stamina & Pistillum Gardeniae

Calyx etiam *lasmini*, fed uti etiam *Corolla* magis coriaceus.

E China ratnulum dedit Cel D. P. I. BLADH.

31. GARDENIA *dumetorum*.

Fruux ramis teretibus, fpinis pollicaribus oppofitis, fimplicibus, fupra-axillaribus.

Folia obovata, Integra, *Buxi* paula minor*.

Fhres folitarii, breviter pedicellati, parvi.

Calyx tubo catnpanulaco, limbo quinquelobo, laciniis ovatis-

Corolla coriacea, limbo quinquepartito, laciniis rotundatis, utrinque hirsuta.

In fpinetis Indiae Or. crefcit, unde cam mific *CeL* KÖNIG.

32. GARDENIA *uliginofa*.

Frutex ramis fubtetragonis fufcis, ramulis oppofitis brevibus, apice foliofis & bifpinofis.

Folia elliptic^a obtu^a, glabra.

Corolla crassa^a coriacea, laciniis rotundatis^a cavis, tubo brevi, intus hirsuta.

Calyx careofus, quinquepartitus^v denriculis brevibus obtufis.

Stamina & Pistillum generis.

Obtulit fpecimen *egregium* KÜNIG in paludofis Indiae h^um.

1. GARDENIA *Thunbergia*^a inermis, foliis ovaris, corollis obtufis novemfidis.
 2. GARDENIA *fiorida*^a inermis^a foliis ovatis, corollis obtufis quinquefidis.
 3. GARDENIA *Rythmannia*^a inermis, foliis lanceolatis, corollis acuds quinquefidis.
 4. GARDENIA *uliginofa*^a fpinofa, ramis apice (pinofis, corollis intus lubo hirsutis.
 5. GARDENIA *dumetorum*^a fpinofaj fpinis fupraaxillaribus, corollis utrinque hirsutis.
 6. GARDENIA *lasminoides*^a fpinofa, fpinis firaaxillaribus, corollis* glabris.
33. VINCA *parviflora*^a caule herbaceo eretto, foliis lanceolatis, floribus geminis involucraus.

Caulis herbaceus, palmaris, ramofus, angulatus, laevis.

Folia lanceolata, finuato - dentata, fcaftiuffula.

Flores fuh-binarii, breviter pedicellati, axillares, involucro ferofoj minuti, tubp longo.

Folliculi lineares, ftriati, quafi articulati.

E Tranquebaria mific indefflus K 6 N 1 G.

34. PERIPLUCA *emetica*, caule fruticofa diffufa, foliis lineari- lanceolatis.

Caulis fruticofusj ramis diffufis, virgatis, laevis.

Folia Unsari* lanceolara, Integra, glabra, brevker petiolata, oppofua.

Pedunculi breves, mukifiori, fquamofi brafteolis, praecipua ad fines ramorum.

Flores parvi, glabri.

‡ Tranquebaria mifit *Cd. KÖNIG. Radicem hujus loco Ipecacuanhae in India Orientali adhiberi reculic oculatiffi THVNBERG.* ^{if^g^}

36y. PERIPLOCA *tunicata*[^] floribus umbellatis, foliis cordacis.

Caulis volubilis, laevis.

Folia oblongD - cordara , acunynata , oppofita , peciolara , utrinque glabra **A** ^{as}

Stipulae cordacae, periolarae.

Flares glabri in umbellis axillaribus paucifloris (2-5).

E Tranquebaria mific *optimus* KÖNIG.

35. PERIPLOCA *fylvefiris* ⁷ floribus umbellatis, foliis ovauis.

Caules fruticofi, tomenrofi.

Folia ovaca, lurinque hirtutula ⁷ *integra.*

Flores parvi in umbellis oppofuis axillaribus, intus laeves.

Calyx tomsncofus, laciniis ovatis obrufis.

Quoque hanc dedic *Cl. KÖNIG.*

37. CYNANCHVM *cordifolinm*, caule volubili hirtto, foliis cordatis utrinque [^] glabris acuris, floribus cymofis.

Caulis ramofus, diffufus, volubilis, hirtus.

Folia longe petiolata, fubrotundo-cordaca[^] *rarius fubangulata, acuta, utrinque glabra oppofica.*

Flores cymofi: cyma longe pedunculata; pedicellis tenuibus filiformibus e tuberculo exeuncibus, bradeola brevi filiformi fub quocunque pedicello.

Mific *CeL D. KÖNIG.*

38- CYNANCHVM *reticulatum*⁷ uaule volubili inferne fubero(b rimofu, foliis ovauis acuris.

Caulis lignofus teflus cortice craflb, albido, fuberofo, rimofu; ramis volubilibus, ftriatis, glabris.

Folia longediflira, pcriolar[^] *glabra, ovata, 3cuta, fuprema lanceolata.*

Flores parvi, extus hirti, insqualiter pedicellati in umbellis psdunculacis axillaribus.

Dedit *Cd. D. KÖNIG* cum mulcis aliis.

35. *Gentiana verticillaris* Linn. S. N. ed. 13. p. 222.

Binas mific plantas *honor*, KÖNIG, quibus charafter Linneanuscompecir, inter fe tamen plurimum diftinttas.

K. *Caulis bafi angulacus, fuperne teres; ramofus, (hiatus.*

Folia lanceolata, trinervia.

Flores verticillad, e fummis alis.

Hanc l. cir. defcripfit *///. a LINNE.*

[3. *Vaults* exafte retragonus, firopliciflimus.

Folia lineari- lanceolata, carnofi, enervia.

Flares ex omni ala venicillati,, figura & magnitudine prioris.

Centaurium anguftifolium, floribus ex alis feffilibus. Burm. Dec. Afric.

P- ao6, L 74[^] f. 3- hu^c fi^{ne} ^{dubio} peninct.

40. LIGVST1CVM *peloponwfc* L. S. N. ed. IJ. p. 233.

Caulis tripedalis, flexuofus, teres, glaber, levjter ftriatus.

Folia r adze alia duo vel tria tripinnata. Periolils iiftulofus, terES, trifidus; petio-
li parriales bipinnati, pinnis trium vel quaiuor parium: infimo pari peiio-
lato, reliquis feffilibus. Pinnae oblongs, lanceola[se₃ acuminatae, ad nervuin-
ufque inciik cecerumque profunde denies. *Caulinum* plerumque unicum-
fulium vel dub.

JPedutictihs terminalis; adhujus vero bafin quatuor alii verticillatim pofiti. Infra
hos demum alii bini remoci alcerni, cum folio bipinnato.

Vtiibda univerfalis hemifphaerica, involucro 2 vel 3 phyllo incifo, fed involu-
crum umbellae cerminalis 6-8 phyllum, lineare.

Vmbellula 24.-30 pedunculate₇ fubglobofe, involucellis fubtriphyllis linearibus
vel lineari-hnceulatis radianhbus mnore ^ T H V S I.

Flores 24 - 30 pedunculati, squales, petalis lanceokns, candidis₃ involutis, in-
tegerrimis, carinaiis, in umbella tanium terminuli fertiles:

FruSus trigonus, lucidus, compoficus e binis feminibus, quorum unum quad
dimidiatum laterè abiiziflb akerius lateri laiori adjungitur: oblongis₇ obfolece
fukatis, marginatis; altero hinc carinaro concavo, illinc convexo: altero diffii-
diato, margins uno exftanie, akero obfolero & levicer canaliculaco.

Odw debilis ChaerophyUf fylveftris, fed fenrinum odor & fapor Angelicae Arcban-
gehcae fimiTfs.

Oh. lea fe in horto Lundenli gcilit planca, cum Liguftico GMEL. Fl. Sib. T. I.
p. 196. tab. 45. eerie nihil communis habens« De ipfe *Halleri* planta, *Li git-
fucnm* &c Hift. Scirp. Hclv. 758 dubium mihi exortum eft, quum de parii-
culari feminutn ftruftura ne verbutn fe eerie, illisque hifuciem femifpopgiofam
tribuent in uofiris irinime obviam; nee bacillos hirlutos vidi. *Radix* tenio
quartove anno apud nos demum floret, & *Sztnina* poft biennium excreve-
runt.

41. SELINVM *Jtiricum*) foliis tripinnatis, involucro univcifali panialibusque de-
coloribus enneaphyllis.

Radix biennis, fuffiformis.

Caulis ereftus, iripedalis, fiftulofiis, ftriatus, gjaucus.

Folia inpinnata: pinnis laciniatis acutis apice albis, periolis compreffis fupi* «
naliculafisj vaginis fuperiorum albis.

Ptdimcidi fukati.

Involucrum enneaphyllum, radiis appreffum, foliis lanceolatis membranaceo - albis
pellucidis, longiitudine circicer dimidia radiorum, coda viridi.

Invoke ell a familia, enneaphylla, pauum latiora 8c flores fuperantia.

Vmhda radiis 20-30, *umbdlulis*^ fiuribus tocidem albis.

Strnina coftis cribus dorfalibus praeter alas marginaks, oblongo-rotunda.

Odor Radicis Dauci recentis. Plantae fades fingularis ab involucellis albis umbel-
lulas ante perfeftam explicationem plane involventibus. Semina inter alia
Sibirica accepi.

43. SEL1NVM *Carvifolia*. Sub hoc titulo ceniffime tres latent Plamae diverfae.

1* *Sir/.* *Carvifolia* Linnei, Halleri t.20. & Mulleri Fl. Dan. 667.

2* *Sel_m* *Uarvifolia* Iacquini, cujus iconem equidism non vidi, fed fpecim^n ficcun
ex ejusdem colleftione poffideo, benevolentia !!! HANKS acceptum.

3^a *Stl* *Carvifolia* Crantzii Fafc. Auftr. 3. t. 3. f. 2.

Obs. SELINVM Gmelini Fl. Sib. T. I. p. 204 r. 48. folia habet *Selini* 1 A C H V I N |
Jicec minora & in iconis vagina longse, latse, apice simpliciter pianarx defi-
derantur; potius tamen ad hoc perunec quam ad *carvijdiam* Linnet. In
varvifolia Crantzii eadem vagmamm conformatio quam in *Iacquini*2 folia
vero diffimilia.

43. PEV CEDANI JIAI? involucrum in horto noftrp non diphyllum, fedpolyphyl-
lum folioks linearibus apice fufcis.

44. BVLBOCODIVM *vernum*. Linn. Sp. Plane. 2. p. 412.

Bonam hujus iconem defcriptioni Linneanx, in Generibus Plantarum date, adde-
re fuperfluum non duxi: vide Tab. I. Fig. i./cotam plantain, 2 florem fingulum ex-
plica turn fiftir.

4f. ALLIVM *muhihulhfutn* D¹* Iacquini omnino eft *Allium nigrum* Linn.) in fasci-
culo primo defenpeum.

45. ORNITHOGALVM *unifolium*> folio radicali folitario, carnofo, oblougo,
cilicco, (capo nudo, racemo brevi.

Radix > bulbus ovatus magnitudine Avellanae.

Folium unicum, erectum, planum, lato-lanceolatum, obtufum, nudum, ciliatum,
bafit vaginans (capum.

Scapus erectus, ceres, folio longior, nlidus, terminatus racemo paucifloro
brevi.

Flores pedunculari, alterni, braileati- *Bra&ea* pedicellum aequans, bafin ample-
fiens, fubulara, fub quovis flore.

Corolla fordide flavescens, patentiffima, petalis lanceolatis obtufis.

Stamina filamemis lato - lanceolatis, integerrimis: akernis aoguftiuribus. *Anthera*%
verfifiles, lureae.

Pijüllum^ *germ en* fubrorundo-tricrenunij angulis canaliculatis. AJbafi hi anguli
albenc & germini quafi jmpofiti in *pylum* fubul?ro - rrgonum cerminaniurj
his interjefti finus profundi virides melhferi (unr. *Stigma* fimpkx.

Floruit in Hprrip Lundenft AD. 1776. *Bulbos* e Cap'it e bonx fpei mifit honor.
THVÑBER 6.

47. HYACINTHVS. Numerus, fitus & forma braclarum in bulbosis atwnriub
Dbfervandus.

H. orientalis fub pedunculo binas gnit brafleas parvas:

H. Mufcart' bradham unam Tub pedunculo, alteram fupra ilium:

H. racemofus auiem plerumque foliariam br&vidimam. Huic etiam Flores fura-
mi fteriles. *Corolla* deorfum imbricatse, ovatae, nigro-caeruleae, ore tri-
gooo albp. *Scapus* fub ft Drib us caeruleus, apice compreflus. *Odor* debi*
lis Prunorum vel Iridis gramineae.

48- *Saxifraga trichodes* Scop. Fl. Cam. 2, T. I- p. 297. ab *Aizoide* Linn- omnino di-
verfa, quantum ope defcriptiois ac iconis tab. 15. judicare pDtul Confer etiam
priorrem Fasciculum & Prodromum noftrum FL Scandinavise-

49. SAXIFRAGA *umfrofa*. Linn. Sp. Pl.a. p. 574.

Radix filament ofi.



FoM radicalia rofacee expanso, oblongo-cuneata, obtusa, subcarnosa, glaberrima, canilagineo-crenata, in petiolo longos ciliaios defluentia, lucide viridia.

Caulis sub foliis brevissimus, foliosus. **Scapus** erectus, e centre foliorum, ruber, plane aphyllus, pilosus, pilis apice glaberrimis.

Flores paniculati. **Panicula** pedunculis cauli filibus 6-7 floris, foliolo lineari, nigro, ciliato, ad basin pedunculorum & pedicellorum.

Calyx inferus, post floris explicacionem reflexus.

Corolla fere plana, **petali** oblongis apice rotundatis, albis, in medio punctis parvis coccineis, prope basin duabus cicinis non raro conuenibus, pilis.

Filamenta lanceolata, longitudine circiter petal Drum, **antheris** didymis.

Stylus generis, ruber.

Capula in medio coarctata.

Obs. Vulgaris in Hortis nostris Planta vario nomine videtur enim *S. punctata* mox *cuneifolia*, immo *hirsuta* nuncupatur. Non dubio, quin *S. punctata* a Filio Rottb. K.öb. Selsk. K.öb. D.X. p. 445 1. Hl. f. X. nostra sit. Figura etiam *S. cuneata* Stop. Fl. Carn. 2. tab. 13. nostrae fac bene respondeat si descriptio pag. 21. &c. simul conferatur.

50. **CVCV BALVS** guttiferus. **Stylus** bifidus, calycibus ciliatis, panicula dichotoma simplicissima, genibus rectis.

Radix aereo anno florens.

Caulis erectus, dichotomus, subvillosus, hinc inde viscosus tenaciter obdus.

Folia lanceolata; acuta, inaequaliter, hispida, praecipue carina; supra linearia.

Flores paniculati albo-viridiflori in panicula dichotoma simplicissima.

Calyx infundibuliformis, subangulatus, viscidus; fructifer clavatus.

Petalum unguibus longitudine calycis; lamina bipartita fere ad basin.

Stamina tria, longitudine corollae vel paulo longiora, antheris incumbentibus.

Stylus triplicifidus, cylindricum, subulatum, calyce altius. **Styli** 3 divergentes. **Stigmata** simplicissima, obtusa.

Capula globosa, (clavata videtur sub pedicellum) longitudinaliter fetitricularis, apice (exdemum revoluta) deflexa.

Serena plurima reniformis.

Oh. E (eniim) sub nomine *Cucubali viscosi* trifloris excrevit ignota mihi pariter planta. An *Lychnis viscaria* Scop. Fl. Carn. T. 1. p. 306 ab hac distincta?

51. **SEDV M anglicum** Hudf. Fl. Angl. 2. V. 1. p. 138 & **SEDV M annum** Guna. Fl. Norw. 331. eandem sine dubio continent plamam, ab *ammo* Linn, diversam.

52. **SPERGVA laricina & faginoides** Linn, vix distinctas credo. *Sp. laricina* Hudf, Angl. 2. V. i. p. 203. cum *faginoide* Prodr, Fl. Scandin. 52^a perbelle convenit, rarius verò ciliis & vix nisi armato oculo apparent. Si *laricina* Gmelini vere diversa sit planta, quod in dubio relinquo Hudf. nis ab illa necessario diversa *Sp. faginoides* Linnei erit.

53. **CLEMATIS chinensis** foliis quinato-pinnatis, foliolis lanceolatis. Tab. II

Caulis debilis, sustentandi, tetragonus, vix scandens.

Folia pinnata. foliolis quinatis: paribus longe remotis, petiolatis, lanceolatis basi ovata.



Pedunculi oppositi, axillares, cri-vel quinqueflori, pedicellis lateralibus bracteolis binis a florelongae remotis infructu: terminali nudo.

Flores parvi, retrapekali, petalis lineari-lanceolatis obscure purpureis, margini interiore linea eminentia pictis. *Pappus* pithillorum antheris vix brevius.

Rarum & nunc fallor novam speciem e China misit (CL I), B L A D H.

54. ANEMONE *alpina* Scop. Fl. Cam. a. T. i. n^D 6fo. t. 26. est.

Silntum baldensis Linn. Mant. Plane. 1. p. 78. cui femina vix candara. Locum potius habet inrer *Intmums caul** foliofo Linn, vel in eadem cum *A. hortensii* 6L *coronarii* familia.

yy. RANUNCULUS *nivalis* Linn, a *lapponico* ejusdem fatis diversus calycet hirsuto foliis caulinis feliibus, caule firmiore, fore majore. De existencra *R. lapponici* nullum nostris fecit dubium, aut licet fenciac CL Scopok, quom puto JR. *numfiliacum* pro nivali habuiffi^l, quod *caulis birtutus* iudicat.

56. AIVGA *pyramidalis* Linn. Sp. PK2. p. 7By.

Neque CeL SCHRESERO, qui hanc cum *genevefi* & *alpina* conjungit, multo minus Gen. de HALLER, qui fere unnes LINNEI *stjugas* cummilcer, affenriri possunt. Duratio, crescendi modus, partium pro pur [io & figura uptime *gtzwnftm* a *pyramidali* diihguunr. HALLEKVS n^o 223 nomtn *pyramidalis* aLlferc, fed *genevmscm* defenbic 6c iib varierace)3 *alp* in am illi adjungit, *geneveff/em* vtro feu- *carneam Cluj* icerum 2² cum *reptanU* confundit.


57. MARRUBIUM *Mcamlidffimum* Linn. Sp. Pl. a. p. Bi&

Certe confusio fubeft; planra enim, *quxfoha* gerit nicide feriea, ovato-lanceolata, ab apice ad dimidiam pjrreTB forma, ceterum integra, *calycumque* denies fubularos omnino est *Marrubium HiJpunuiM* *Jupinum foliis friceis argmttis** Dill. Hon. EI[h. p. 219. c. 174. f. 215.

58. MARRUBIUM *nfricanum* Linn. 5. N. ed. 13. p. 449, an?

Radix fibrosa, annua.

Caulis bipedalis, erectus, tetragonus, subtomentosus, laeribu/oppofitis, fuko profundo exaracis. *Rami*... oppofni.

Folia oppofua, cordata, rugofa, creuata, fubiomentofa. 

Flores verticillati: verticillis remotis, involutis; albi.


Involucra polyphylla, linearia, ciliata, bngirudine f^re calycum.

Calyx rubulosus, curvus, hispida, 9 J- io ftriatus, 5 J. ID den rat US, denticulis brevibus fubularis: fupenore lungiore fpinulofo.

Corolla calyce minor. *Lab. fuperius* utrinque villosum, parum bifidum; *infrius* iripanirum, laciniis lareralibus femiovatis, integris, divergencibus: incarmedia reflexa, truncata, fubbiemarginata. *Tubus* longus, lmearis.

Stamina alba longitudine mbi; *nutberis* fhvis, infperlis punflis nkenribu^ per microfcopium lancum obfervandis.

Oh. Hanc defcriptionem e planra femimortua anno 1773 <ncinnavi. *Involucra*
• *Phlomidis*, *Corolla* *Marrubii*, *Antberce* *Leonuri* dubium me & de gaiere & fpecie reddiderunr. Primo anno floruit, fed fub florefcentia comabuit, nee dein viva.

13. PHLOMIS *vbinensis* foliis ovacis ferratis tornenrofo-fericeis, calycibus  cillais decenjencacis.



Caulis fruticosus, ramis tetragonis hispida.

Folia oppofua, ovata & fubcordata, petiolata, ferrata, tDmentofa - fericea.

Verticilli 5-Sflori, axillares, floribus pedicellaris.

Calix infundibuliformis, decemfuitatus, demibus decem ariftatis.

Flos albus, hbio fupiore compreffo extus hirtuto, imprimis margins: inferiore
irilobo nudifculo.

Stamina & Pistillum generis.

E China accepti.

6D. GLECOMA *hederacea* Linn. S.N. ed. 13. p-44J.

Omnino fingiari eſt, quod *CL Scopoli* in FJ. Cam. 730. huic fitum cruciformem antherarum denegat plus millies a noſtris Bocanicis obſervatum. Primo vere aniherae ſpſius plane defunt.

61. CARDAMINE hirtuta Scop. Fl. Carn.a.T. a- p. 21- t- 3S- anne a £w»«' diverſa?

CARDAMINEN *hllidifotiam* Linn, cum ARABI *bllidifolia* ejusdem male confudit idem *CL Scopoli* luc. ric. p. 31. quas optitno jure quoque diſtinxit
Gen. de Halhr Hift. Stirp. 1-lelv. iw. ~~446~~ & 476.

Ga ERYSIMVM *bieranfolium* Linn.

Radix biennis.

Caules eiedi, ftridli, quandoque ramofi, multanguli, giabri.

Fol/J akerna, hnceolata, glabra, remoius demaia, minime ferrata.

Florex racemofi, flavi, debilker odoraci.

Calyx ereftus, connivens, viridi-flavus, apicibus fufds,

Af^/rz fere linsaria, iruncata.

Ne&arii glandula parva ad ftamina minora.

Siliqua ere ^, ftriflae, exaſte tetragonae, fligmate eraarginato terminate.

Ab hoc differc *Scop.* FL Carn. 2. p. 28. 831- *Poll.* Hift. Planr. c. 2. p. 342.

63. ERYSIMVM *campefire* Scop. Fl. Cam. a. T. 3. p. 27. minime eſt *Brajfica*
campeſtris Linn, fed potius

Brajfica turrita Weigel. Obs. Bor.- p. 32. &

Brajfica omntalis *Poll.* Hift. PL 3. p- 247.

64. ERYSIMVM *Cbtirantboides* Linn.

Radix biennis.

CWti erefti, ftrifti, ramofiffimi, multanguli glabri.

Folia aherna, lanceolata, oblique verſa, glabra, remote dentata.

Fhres racemofi, ciirini, parum odori.

Calyx ereftus, minus connivens, toius flavus apicibus concoloribus.

Corolla limbus brevior, latior, emarginatus.

Siliquae patentees, tetragonae, ftiginate minuto terminate.

~~C.~~ A *bitracifoliv* ergo prxcipue differc *foliis* parcius dencacis, oblique fins, proportione au colore *fiorum* ac defectu maculae in apicibus *calycis*. A noſtro differre videiur *Eryf. Cburantb.* *Pullich.* 1L p. 241.

65. *BVNIA S aspera*, filiculis muricatis quadra'ngulis, foliis lanceolatis fubdentaris, pilis fur cat is.

Radix annua , fiibramofb-fibrofa.

Caulis palmaris * pedalis, fubramofus, aculeolis minutis asper.

Folia inferio'ra oblanceolata, fuperiura lanceolata, parcius dentata, piiia albis fur cat is irifidisque hinc hide adfperfe.

Fhres racemofi, flavi, Generis; calycibus nonnihil ventricofis cDnniventibus.

Sffiqua breviflimae, fufco-muricatje, angulis quatuor oppofitis ferratis criftarae; ftylo pyramidato capitacd longitudine iiliqua terminacxi

Qbs. Similis *Bitniae Erucagini*^ quantum ex br^vi definiuone Linneana at defcriptio-
ne Halkriana pacer, diftinclam tain en puco.

66. *CROTALARIA juncza* Linn. Mane. 2. p. 433.

Quae ex benevolentia D, KÖNIG in Herbario meo reponitur, calycis labium inferius cymbiforme quidem habei, fed nullo tnodo obfolete u id en rat urn dici poceft^
quum ad bafin fere in lacinias ires hncoelaias fitTum fie.

67. *ONONIS arvenJtSy* floribus racemofis geminis, foliis remans: fuperioribus r^{olitariis}, ramis inermibus fubvillofis. Prodr. FJ. Scand. 7^1.

Catties erefliufculi, villofi, virides, vifcidi, fequenris duplo craffiores, inermes.

Fvlia (implicia & cernata, ovaia, circurferrata, fubrus nuda, fupra villofa: pilis flpice globigeris. *Pctioli* alad, ftipuiifbLines: alis magnis, ferratis^ iübam-plexicaulibus.

Fhres duplo fere majores fequentis, ia racemo terminali, plerumque gemini: utroque pedunculo ex uno puntto prodeunte.

Calyx villofus, quinquefidus, dentibus linearibus, acuminatis, ftriacjg, quorum fupremi 2 vexilh dorfum fequiiicui: inceimedii bini vexilli roarginibus incumbum & quintus hiacum carina: in feme operit.

yexilluni parum emarginacum. *Ala* longitudine carinae.

Toia planta (equenci major, ma^is fucc^fa, paliidior, hitefno inftruffa odore, nunquam fpinefcir, nee repir. Conf- Ait Soc. Phyfiogr. Lund. V. 1. p. 12a &c. quibus ex licceris *Clar. DRYANDRI* Lond. Angl. d. 24. Iulii 1778 addere luber.

„*Ononis tua arvenfis c/i mitis Clufii & hiucina iacquini Hort. Vind. p. 40. *- 93- &- lac quin plant am ex Hungaria bahuít, uti etiam a D. Lipp circa Brisgaviam invntant** Neque Angliá, nee Helvetia indigena eft; bints ideoque in Europa Onon. mites *baftenus cvnfu(a,*» An *Onvnis mitis* Anglica, Gallica, Helvetica, a repente Linn, diverfa?

68. *ONONISfpixofa*, floribus racemofis {olitariis, foliis cernaiis folicariisque, ramis fpinofis. Prodr, Fi. Scandiu.. 732.

Caules decumbemes, villofi, rubences, fpinbfí, inprimis a bafi ad mediam. *Spinaz* bipollicares, fubulaiae, pungentes, rarius foliolo uno alterove donarse.

Folia flc *Pctioli* pracedentis, at minora foliolaque obovaia, utrinque pilofi, nee per locam circumferentiam ferraca.

Fhres renidii ad pollicis 1. 1 2. diftantiam, ideoque vix racemofi, plerumque folitarii; fed fi bini adfunt, peduncub cDmmuni bifido adhsrenr.

Calyx fimilis antecedents.

Vexillum minime emarginatum, apicub molli, fubulato inftruffuni. *Carina* fubtus magis hians *alis* Doonihil longior.



Plama longitudineexcepta, minor, tnagis lignofa, obfcurior.

De hac, obfervante eodem CL DRYAKDRO, dicit LÖSEL p. iS. »Iavis eft vere \$f prima afiatis parte, pvft aculeos contrahit^ qua verba perpeiam itQa & imelle&a occafionem dederunt fpinofain cum arvwi confundendi. Conf. Aft. Soc. Phyfiogr. 1. cit.

69. CORONILLA *Vahntina* Linn.

Folia novena, undena, obioDgo-cordata vel cuneata retula, mucrone vd nullo
|tl parvulo, glauca, fubcarnofa.

Stipula magns, cordatae, albae margine viridi.%

Fhres minores, faturadus flavi.

Vzxilli unguis vix recedens.

Ala conniveaces occultanc

*Carinam**

70. CORONILLA *glauca* Linn.

Folia quina & fepcena cuneata, rarius obcordata, mucrone parvo, reflexD_B

Stipula parvs, fub lanceolats.

Ala fubtus mulcum hiantss ut

Carina toca appareaL

71. AST^RAGALVS *ffamoideus* Linn.

Radix annua.

Caules proftraii, decumbemes, appreffo pilofip

Folia pinnata: pinnis71.B parium ovatis, emarginatis, pilolis,

Flores capicati, axillares, fefiliss7 violacei albique, 6-7.

***Calyces* aristati.**

legumina bilocularia.

72. ASTRA GALVS *Onobrythis* Linn.

Sola, quam ego vidi, planta, cujus pinnulae non raro in folia ternata mutantur,

73. ASTRAGALVS *arenarius*.lAnn. S- N- ed. 13. p. 568-

Radix ptrennis, filiformis.

Caulis ereftiufculus > fsmipedalis, fepe ramofus, tomentofo-albus.

Folia alrerna, pinna [a, tomentofo-alba; foliolis novem vel undecim linear i-lane eo-
- latis, imegerrimis.

Stipula oppofuifoliae, biHds, fcariofe, cotnentofs.

Ptdunculi axillares folio longiores, fubquadriflori, floribus non arte congeftis
pedicellaiis, braft^lis minuiis forma flipularum.

Calyx campanulacus, oblique truncatus, denticulis quinque parvis, quorum fu-
premu5 breviflimus & quafi abfens; viridi-nigricans, hirtutus.

Corolla cDerulea albaque ftriis coeruleis.

Legumina inrra calycem pedicellata, tumidiufcula, tomenEofa, acuminata, dorfo
canaliculata, bilocularia, polyfperma.

Oh. Non iwqueeft fub^aulefcens, fed caulefcens- Icon KAJI Syn. 3. p. 326. L
12. f. 3 pdlima eft omni refpectu, ut pro lunge' alia haberem, nili eandem
ciiaffe CL Hud/on. Nee optima ilia dft, quae in Fl. Dan. Fasc. XI. r. 614.
proftac. Foliola enim a 13 ad ». haecque oimis laca pingic, capiculum jufto

. jufto ma jus & mulciflorum, calyemque omnino alienum, nifi haec omnia a fpecimine, in *Colo* luxuriante lefto, pendeant, vel alia fit fpecies.

74. *LOTVS medicaginoides*, leguminibus umbellatis arcuatis, foliolis obcordatis denticulatis.

Radix annua. *

Caulis profratus, fulcatus, hirtus.

Folia ternata, longe petiolata, obcordata, denticulata, glabra, lineata.

Stipulae femifittatae, integrae, bafi lobo bid en tato.

Pedunculi axillares, elong-aci, 5-6 flori, umbellari[^] flofculis parvis-luteis.

Legumim 4-6, linearia, arcuata, lDrulofa-

Oh. Planta e feminibus Sibiricis enara, florens fimillima *Mdicagini polymorpL*[^] Jicec minor, leguminibus Trigondlae. Dubiiw cciaraaum fum; aa revera Loui vel Trigondlas fpecies.

75. *MEDICAGO polymorpba marginata*

Caules prDfrari, dccumbentes, reteces, fulcati, glabri.

Stipula muhipartitae: hciniis fubulatis.

Folia ucrinque glabra, obcordata, circumdenticulata: teneriora hirra riliata.

Pedunculi fohtarii 1 1. 2 flori, mutici.

Legumina 1. C 2. orbiculara, depreffa, cochleHa, anfraftibus binis rernisve compredis, marginacis, aervoffis.

VaritU duplex

«. *major* leguminibus majoribus pubfcentibus

|3. *minor* _[^]———minoribus glabris.

75. *MEDICAGO polymorpba tubtrculata*

Caules profraci, dccumbenres, angulati, pubefcentes-

StipuliB feraifagutatae, deniatae.

Fal/[^] utrinque pubefcenuia cuneaca & ovata, uhra dimidium tenuiffime dentata.

Pedunculi folitarii, axillares, 2flori, arifta molli lerminali.

Legumina 1. L 2. ovaco-cylindrica, anfreftibus quacuor bituberculatis.

77- *MEDICAGO polymorpba hirtuta* Linn. S. N. ed. 13. p. 575*

Caules profrati, angulati, glabri.

Stipula femifagictacae, laciniato-dentatae, dencibus linearibus.

Folia glabra, glauca, oblonga, inaequaliter denEata.

. *Pedunculi* folitarii, larerales, 2 1. 3 flori, arifta molli terminali.

Legumina 21-3, magna, cDchleaca globofa, echinata fpioulis fubulatis villofis.

78- *MEDICAGO polymorpba rigidula*. Linn. 5. N. ed. 13. p. 578.

Caules profrati, dccumbemes, fubangulati, tenuiffime pubefcentes-

Stipuld femicordatae, praeter laciniain terminalem quatuor dencibus infruftae.

Folia utrinque pubefcentia; inferiora obcordata: fuperiora ovata, ad dimidium inaequaliter denticulata, rarius prona parte rufo-maculaia.

Pedunculi folitarii, axillares, 2. vel 4. flori, ariftati, hirtutuli.

Legumina a 14, anfraftibus tribus, oblonga, echinata, fpinulis brevibus craffis carnofis.-.

j 9. *CREPIS pulebva* Linn. Sp. Pl. 2. p. 1134. ft

Radix annua, ramofi.

Caulis eredlus, ramofiis, 2-y pedalis, fulcatus, glaber, paniculatus.

Folia infima lyraia, fuperiora oblongo cordata, reliqua haftaia; omnia feffilla, iinuato-dcutata, pubefceniia praeter fitprema, quae liuearia integra.

Fhres paniculatij flavi, pedicellis nudis.

Calyx cylindricus, glaber, decaphyllus, fuliis liaeatibus, carinatis, bafi auflus fquamis J brevibus marginais.

Fhfcuhs 24 nuneraviy calyce paulo aliiiores, flavos,

Receptacujum nudum.

Semina oblonga, cylindrica, laeviffime ftriata.

Pappus limplex, feffilis.

go. *HIERACIVM beterophyllum*, caule repente, foliis radicalibus trilubis: caulinis ovacis.

Prenantbes repens Linn. Sp. Plane. 2. p. n ». Amoen. A cad. 2. p. 350. t. IV. f. 23.

Caulis repens, radicans.

Rami adfcendentes, foliofi, glabri.

9 *Folia radicalia* longe pecioUca₇ criparcia₉, lobb ovalibus dcutitulais.

Folia caulina brevius peliolara₉, ovata, demiculata.

Pedunculi 1-3 flori, fquamofi.

Calyx fimplex, ereflus, glaucus, foliis lineari-lanceolatis, margine fubfeariofis; bafi fquamis minoribus quafi calycularus.

Corollae onmts hermaphrodiiae, luieae, 12 circiter.

Pappus fimplex, feffilis.

Receptatum nudura.

Hieradis porius, quam Preoanrhibus, annumerandam Plantain e China mifu *D. JLADH*, quam ohm e Kamchatkahabuic *Gen. a LINNE*.

gi. *TVSSILAGO paradoxny* chyfo Tubovato, florculis foemineis nudis multris: hermaphroditisiernis, antheris liberiS, foliis triangulari cordaris demkulaiis vid. Tab. HI.

Fetafites floribus fpicaiis, ereftis, foliis calycinis lanceolaiis; flofculis pauciflimis androgynis Hall. Hift. St. Helv. 141.

Ohs. Sub nomine *hybrids* accepi planram, quam in primo Pafculo obiter tantum nominavi. Singularis inier Flores compofites antheris liberis minime coalicis- nec tamen a genere *Tuffilaginis* divelli fe patitur ob perfeclam in reliqui* fil milieu dinem.

Radix vix repens.

Folia radicalia, longe peuolara, iriangulari-cordata, denriculata, fubtus albo-tomento a.

Scapus piope radicem fquamDfo-foliofuS, inferne nudus, fuperne albi, tomento-fus, tutus fquatnatus, fquamis lanceolatis, laxis, tomemofis.

TbyrftiS fubovatus, floribus ereftiufculis, 20 circicer.

Pedicli brafleis 2-4 liuearibus, glabris, floribus paulo longiores.

Calyx fokiolis 12-1C lanceolaus, obtufis, eredlis, apice rubellis.

Fhfculi fotminei ultra 80, longitudine Pappi, limbo vix ampliato, inaequaliter trifido, ftyh longo calycem excedente, ffigmaU leuicer bifido. In ritnnullis



limbus obliquus integer videtur, turn vero ad bafin vel finum inferior em denciculi 2 miuuci obferuanmr.

Fhfculi bermaphroditi tres circirer, infundibuliforroes, bngitudine calycis, /*<- /t> quĩDque pariio erefto hciniis acutis. *Stamina* quinque antheris linearibus. *Stylus* brevis. *Stigmata* 2, loDga, recfa, linearilanceolata, curollula breuiora.

Pappus longiradine tubi.

82- MATRICARIA [^]*maritima* Linn, in horto Academico perennar & luxuriac caule plus bipedal! erefto, foliis quadruplo majonbus, peiegrina omnino facie.

S3. ACHILLEA /errata, foliis lineari-lanceolacis feffilibus torn enrõlls, profundi ferratis, bail lacinians.

Dracunculus alpinus Agerati foliis incanis. *Rup. Hift.* p. 344.

Radix perennis.

Caulis ramofus, panicularus, angulacus, fubtoraentofus.

Folia lanceolata, femiamptrtcicaulia, albo-iDmenrofa, profunde fimplidrerque (errara: ferratus magnis squalibus, prope bafin ad coftanr usque in Jacinulas filis.

Calycis fquams margine fufco-violacefe*

Flores Ptarmics, radio decemfloro, bifemarginato, difco elevato grifeo.

Obs. Ab *Acbilha alpina* Linn. differe ferraiuris, foliis magis albis, floribus majoribus. Fades Ptarmicse, ^L/; fl/pz/ij vtro ad Millefolia magis accedic

84. ACHILF.EA *cnjlata*, foliis linsaribus ferratis, ferracuris transversis criftacis, cauls ratnofo debili.

Ftar mica Linarix folia anguftiflimo cum margin e peculiaricer dentate & vduti fquamofa, floribus albis. *Micb** Hort. Fior. p. 77. D. J.

Radix perennis;

C7</> ramofus, debilis, reretiqcfulus, fubtomentofus.

Folia linearia, feffilia, vix fubtomentufa; margo ferrous, ferraturis nen pagins-parallelis, fed margini oppoliris, tenuiflime fen:ulatis,

Calycis fquamtc margins albs.

Ftorum radius albus 6-S florus, bifemarginatus, difcus planiufculus, flavefcens>

*Obs** Forfin *AcbiUfa* n. i&r. Gmel Fl. Sib. T. 2. noftra eft. Pro *AchilUa fakata* Linn, vulgo habetur, *falcata* vero fus corollas flavas & patriam Orienteni iribuit *Gen. a LINNE*. Sequenrem, quam a colleffionibus *B. FOBSKAHL* CDmmunicavit *Cl D. VAHL*, ego pro *falcata* Lin. & Vaill. habeo-

8j. ACHILLEA *falcata*. *Forskahl* Fl. Aegypt. Arab. p. LV. & LXXV.

Achillea incana, Sanwlinac foliis plerumque falcais afpsris, flore fulphureo *Fail* nomen elegans.

Plant a caule, foliis, calycibus albo-tomentofis.

Folia Achillese criftata; fed ferraturae profundiores, ceterum finili modo verfe.

Corymbus Achillea romentofe, licet minor, flofculis fulphureis.

86. ACHILLEA *tomntofa*.

Non levis mihi eft fufpicio, binas omnino diftinflas fpedes fub hoc nomine dari. Tota Achillearum gens defcripUDue egei graphica, obferuads. fimul quidrau-

care valeat cukura. Quas mihi magni nominis Bocanicus Tub nomine *atfate* & *alpine* dedic, ego non puflum diftinguere. *Tome?jtofa*, quam nuiric hortus nofter, a *Sibirica*,*b 11L PALLAS Hiifla, omnino diffen: *icec* enim *zft Acbillea* Gmel. FL-Sib-il, p. 198. r. 83« £ a- *Ula* magis cum *Halleriana* III. convenit.

87. ACHILLEA *nobilis* Linn. Nifi ad fortnam foliorum inferiorum atcendatur, facillime cum *Acb. Millefolh* confundi poteft. *Magnitude* nullam Dmnino meretur attentionem, nec *Tanaceti odor* fortis (ufficic. *Corymbi* non magis in hac₃ quam in *Millefolip*, conferti; fed *calyces* magis oblongi, cylinrfri[^]j *radius* quidem albus, fed *dijcus* ochroleucus, & *calycina squama* margins nrinime liigrance differunt.

£B. ARTEMISIA *rupefiris* Scop; FL Carn. 2. T* 2. p. 146. auaenam planta?

Ab *Art. rupe/lri* Linnei fine dubio diverfa. Dehujus calycibus mentionem nullam. fecic *///. a LINNE* fed *Flares* in *FLSvec.753-pznduhsinSyft.Nac.cernuos* vocavir. Ceterum nulla *Artemifce rupefiris* Linn. *QumArt.camptflri* iimihtudo, praecer genericain.

85. SOLIDAGO *ferotina*> race no is terminalibus foliofis fecundis, foliis lanceolacis (ubferraris₇ d[^]flexis.

Radix perenois.

Cfmles 2-3 pedales, fubflexuofi, nitidi, foliofi, obfolete angulofi.

Folia lanceolata, lpDg[^]acuiptiaaEa_rg[^]>r[^] rleftexa[^].fefEUa, i'erratura una'alterave.

Florum racemi cetaunales, foliofi, fecundi; ad quodhbet folium fafciculus 3-6-florus pedicellis imbricatim iquamulofis.

Calyx cyUndricus> anguftus e foliis linearibus obcufis insqualibus.

, *Corollae ligulatae* 4 rarius 5 lanceolatae, apice ^marginals, *ftigmaU* filiformi bifido.

Curdlae tubulofe 3-5, *ftigmaU* bifido clavato.

Pappus pilofus.

Floret menfe Oflobris fine dubio Americz borealis planca. *Radius* in floribus ficcaus ciio albe(cic ficque flos bicolor evadic.

50. ASTER *linifdius* Linn.S. N. ed, 13. p. 634.

Folia hinc hide levicer ferrate, ideoque non femper integerrima. Ab hoc diverfus eft *Aster linifolius* MillerL

91. CENTAVREA *paniculata* Linn.

Planta *fibirica* & *europcea* diver fas conftituere vi demur fpecies.

92- RVDBECKIA *laciniata* Linn. S. N. ed. 13. p. 650.

*Obs** Hujus plurimae forfan varietates & vereor, ne *lacinmta*, *quinata* & *digitate* *Milleri mera fint varietas** Horrtis Lundenfis binas fequernes alit.

«. *Rudb. digit at a Mill.m?*

Caulis obfolece cuber[^]ulaio - angulofus, ad infertionem foliorum inferiorum ferrugineo -maculatus.

Folia hiiora, ferrata: inferiora quinaca, fuperiora ternara lobis lateralibus bifidis, terminal! tripartito; fuprema ovaca, Integra vel levicer trifida.

Radius bipollicaris, dodecaphyllus. J

Pedunculi laeves, fulcati-

p. *Rudb. quinata* Mill, an?

Caulis ball ceres, fuperne angulatus, immaculatus.

Folia inferiora quinaca vel ternata, lobis laciniacis anguftis dentacis: fuperiora ternaca familia: fuprema criloba vel Integra lanceohca.

Radius fesquipollicaris, plerumque decaphyllus.

Pedunculi fubvillofi, fulcaci.



93. *SILPHIVM ptrfoliatum*, foliis oppofnis dekoidibus petiolatis perfoliaris caule terragono laevi. S. N- ed. 13. p. 5^.

jfltitudo humana.

Caulis ubkjue glaber, exafte retragonus, verfbs fuperiora verororundatus.

Folia cordata, fcabra, denticulata; inferiora periolara, petiolis alaris connaris: fuprioraftliii-perfojiata: iuprema vix dciuaca, a laierepedunculo interm'edlig upposito tancum connata.

Tanacula dichotoma, vedunculis cylindrids.

Calyx apicibas parulis.

Corullat radius calyce plus dupiolongior, lanceohius, fubius bicariuaws apie ftmel filius, etiam fubtus faturaie luccus.

Flofculi foeminti piftillis longioribus.

Flofculi btrmaphroditi ad dimidiam partem fere fupra paleas emineatcs.

- 94- *SILPHIVM cotmatum*, foliis oppofitis feffilibus perfoliatis, caule fcabro. L. S. N. ed. 13. p. 657.

A perfoliato differt, quod oranibus partibus minus, fenerius.

Caulis fubtccragonus, bait fcaber, fuperne laevis.

Fo/^ Dvata-lanceolata, denrara, fcabra, perfoliatt.

Pankula & Cffy^r entecedeniis.

Corollae radius breviur, anguftior, fubrusftriis viridibus piftus,

Fhfculi foeminn piftillis brevibus.

Flofculi btrmaphroditi palea adjefta parum bngiorss.

Oh. Singularis ia uiraque fpecie foliorum ficus: fcilicet angulis caulis opponuntur DQU lateti piano.

- 9J. *CAREX fylvatica*. Hudr R Angl. 2. p. 411. Schreb. Spicil. Fl. LipC p. fa. Flor. Dan. tab. 404. Prodr. Fl. Scand. IOJO. Hall. Hift. Sr. Hdv. njy. a *Caria patula* Scop. Fl. Carn- 3. T. 2. p. 225. tab. 59. diverliflima, nifi icnem vitiofliflimam vciis.

- 9S, *ANDROPOGON Bladbir* fpicis fubuaonis, flofcub hermaphrodito feffili ariftacu: ueutro peduncular ciliaco mucico.

Culmus fimplex terer||p9rce foliofus, geniculis barbatis.

FotrV/ grarainea, pilis albis fparfis, prscipue ad vaginarum oras. Vaginae nudae frutae.

Spica fuboftoiKE, pedunculate, culmum csrminantes, lineares, ere&s, inasquales, indiviftu, rachi geniculara pilofa cum psdicellis.

Flojcuti akerniy geminati, bafi pilis albis circumdaci.

Fhfculus bermaphrvditut feffilis, ariftacus: arifta longatorta; fligmata 2 longa nt gra increflaca, brevicer hirfuta, (lylis brsvibus capillaribus infideDua.

Flofculus ntuUr peduncularus 7 omnino vacuus, ixvifTims ciliacus.

In China leftum cum aliis mific bonorat. D. B L A D H.

97. *AEGILOPS exaltata* Linn, Mant. Pl. a. p. 57J- adde

Culmui junci.

GI^JT inermis, ftriatiK & inrer ftrias punftaius.

- SS- *AEGILOPS muricata*7 (picis muticis plaribuslpngs peduncularis, calycibus ciliaro - aculeacis.

Culmus caricis.



apiece non fasciculatae, sed folitariae bin* ternseve ex alis foliorum prodeunt longe pedunculate, crassiores quam *exaltata*.

Calyces glabri, apice scariofi, margine aculeolis parvis ciliatis. Nonnulli calyces angustiores, quod bifidi, margine inerrant hinc inde adjacent, quos vacuos omnino in meo exemplari inveni.

Ex India Orientali diu habui pro *exaltata*, donec illam benevolentia CL D- KÖNIG accepi.

99. PTERIS *lunulata* fronde pinnata: pinnulis alternis petiolatis lunulatis striatis. Tab. IV.

From simpliciflora pedalis & ultra.

Stipes eburneus, niger, compressus.

Pinna virides, teretes, striatae: striis a petiolo ad marginem radiantes. Margo exterior fructificans, fere semicircularis: interior sterilis vix curvus. Superius vero pinnae (recurviformes sunt & terminalis trigona.

£ Bengala pulcherrimam hanc accepimus Filicem.

Obs. Forma hujus exacte convenit cum *Adiantum lunulatum* Burm. F. Ind. p. 231. propter marginem quinqueflorum. Verum nonnunquam margo dividitur in 3 vel plures lacinas sicque *Adiantum* refert genuina *Pteridis* species.

100. ADIANTHUM *fuftum* frondibus pedatis, * fetu pinnarum pinnis rhombicis rotundatis subquadris. Tab. V,

Ofo. Multum funilis *Adiantum pedatum* Linn, sed fusco-nigricans, minus Kera, pulcherrima Filix, cui:

Radix subbulbosa frigidis locis nivalibus obdura

Stipes simpliciflorus, compressus, eburneus, laxis.


Margo replicatus latior, communiter quadrifidus, etiam 5 ad 8 fidus

Pinnula antequam fructifera incipit praeter terminalem folii **subcristatam**.

Pairiam Chinam habet,




Tab. I.



Shu.tbocoHu.ni vtrnurw





Clematis chinensis.


•

•



Tussilago paradoxa.

Tab. IV.



Acris lunulata.

Tab. V.



Adiantum fuscum.

Capitulum J. 1771.

Moschler

ANDREAE IOHANNIS RETZII

PHIL. MAG. AD REG. ACAD. LVNDENS. HIST. NATVR. PKOF. R. ET
ORD. DES. SO CIET. PHYSIOGRAPICAE LVND.
SECRETARII ETC.


FASCICVLVS
OBSERVATIONVM
BOTANICARVM
TERTIVS

CVM FIGVRIS AENEIS

ET

IOH. GERH. KOENIG

DESCRIPTIONIBVS MONANDRARVM



LIPSIAE

APVD SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM.

do IJ CCLXXSIII.

R E G I A E
ACADEMAE SCIENTIARVM
S V E C A N A E

HVNC TERTIVM OBSERVATIONVM FASCICVLVM

D. D- D.

AVCTDK.

1

2

* * *

L. B.

Botanophilis quibus non displicuisse¹ praecedentes binos Fasciculos intellexerim, Tertium iam offero, idem fatum illi exoptans.

In hoc ut in praecedente nonnullas Plantas ab aliis pro varietatibus habitas ut distinctas consideravi species. Forte non omnes necum confensuros habeo, praesertim cum Species aliorum inter varietates numeraverim.

Sed⁷ quid sit, *Species*, quid *Varietal* si quaeratur? optime respondit III. *Eques à LINNÉ* in sua *Philosophia Botanica* pag. 99. *Species tot sunt, quot diner/tie formae I. firuSarae in principio creatae*; et paulo infra: *quot—bvdienum occurrunt*; pag. vero 100. *tot Varietates esse ait, quot differentes plantae ex eiusdem speciei femine sunt produ&ae*. Reddissime haec quidem ita dicitur; sed criteria quae in omni casu id efficiunt, ut Varietates a Speciebus et vice versa distinguantur, vix dedit omnibus satisfactia.

Magnitudo folia, Morsitas, Color, Odor, Sapor et Tempus recte excluduntur, nihil quum valeant ad Specierum constituendos characteres. Constant enim requiritur parris cuiusdam vel plurium differentia secundum numerum⁷ figuram, proportionem et situm, cui forte superficies addi poterit.

Species ergo nihil aliud est, quam *constam Generis Varietas*[^] vocibus in Scientia Botanica receptis determinate exprimenda,

Secundum hoc principium ego Species et varietates diiudicari, etiam ubi suspicio fuisse potest, hanc speciem ex alia olim ortam fuisse.

At quaeris forsitan, Cui bono⁷ quia character plantae essentiali a quacunque causa mutato, sub hoc characterem vltra dignosci nequit ubi vero hanc mutationem constantem non inveni, sub sua specie reliqui varietatem.

Plurimae sane sunt Plantae, quas ipsa facies distinguendas faciat, quaeque perpetuo tales propagantur[^] sed character eorum distinctionis verbis, sicut cum non sine diffusa descriptione, exprimi non potest. Has itaque, donec forte character eruatur, ut varietates considerandas esse iudico[^] e. gr. *Pimpinellae*⁷ *dtbantanae* etc.

Nihil magis commune est, quam inter Plantas vulgatissimas pro varietatibus distinctas habere species. Ratio in promptu est; nam primo illas sufficienter examinatas credimus, dein possibilitatem varietatum per culturam novimus. Hinc fugitive infestas eas praeterimus. Sic mos est, fere omnes *Poenias*⁷ *Medicagines* sic distas *polymorphas* etc. sub vna comprehendere specie, et ut



ex vna olim ortas confiderare, quod mihi minime perfuadere potui. Idem de
 vnultis *Solidaginibus*, *Asteribus* etc. iudicium olim tulic B, LINNE'.

Inter Plantas fpontaneas vero plurimae pro Speciebus habentur, quae re-
 uera varietates funt. Egregie hoc demonftrauit et exemplis illuftraui Celeber-
 rimus Equitis Filius et Succellbr in Differtatione Academica *Noua Graminum Ge-
 nera Vpfaliae 1779-* ventilata.

Doftrinae Botarycac op time itaque confiilererur, fi finguli Hortorum Pa-
 blicorum Praefecti e Generibus diffufioribus ec minus elaboratis certa fibi eli-
 gere et quantum fieri poffec, omnes notas fpecies cum primariis vanetatibus
 vnus Generis in vno loco colere veil en r, Hac via certiores de fpecies gemi-
 nis fieremus et charaferes Generum emendatos tandem haberemus-

Duos errores in Fasciculo Secundo commiffos corrigere fas est-

LYCIUM *indicum* pag- 12. defcriptum corollas habet Candidas, exficacione
 obfeure purpureas faftas, vEnionuic egregius Boranicus Hafniensis D. VAHL.

soiiDAGO/drro//ff« quim p. 26. defcripti, est *Solidago caejia* Linnei, fal-
 tem illam fub hoc nomine in variis poftrmodum yidi herbariis.

Fasciculo huic additi Defcriptionem Monandrarum, Indiae Orientalis^uam
 beneuole communicauit Amicus honoratiffimus D. D. I. G. K DENIG Rerum
 jiaturalium Indicarum Scrutator indefectus. Vt typis exarandam curarem a me
 quid em non exegiu, nee veniam eius adeptus fum, neque haec vt impetrctur,
 breuius quam fere trium annorum tempus fufficeret ob longiorum locorum in-
 tercapedinem; quum autem Manuscriptum miferir, eo fini, vc cum amicis
 Botanicis illud. communicarem, coiumodius illud fieri non poffe videbatur. Spe-
 ro itaque me a debita amico genuino et honoratiffimo obferuantia non difcet
 iluum, fi hoc mudu Ipfius et noftris Amicis fatifecero.





i# T-TIPPVRIS *lanadata* foliis lanceolatis, inferioribus quaternis, fuperio-
iX ribus quinis. Tab. i.

Plantam, quam in Finlandia detexit primum CL D. SCHYLSSEN, benigne
communicauit CeL Prof, SPARRMANN.

Facies *Eladines Alfinaftri* vlreiore non indiger defcriptione, id tantum
monere volui, hanc fpeciem vere *gynandram* effe. Mihi non licuit neque hanc
nee *Hippuridem vulgarem* (fafta fcil. hac Dbferuatione) viuas et per omnes incre-
ment gradus examinare, vt obferuare potuiffem, an reuera *calycults Adanfo-
vii* adfit nee ne. Huius praefentiam negare videtur iitus ftyli, quum calyculi
aperturam conftituere deberet coronula lateralis quadridentata, e qua exit *fta-
men* fig. a, nifi adfumere vellemus calyculum a ftylo perforari, quod apertu-
rae nuces refragari videtur. In onini cafu *Gynandra* eft noftra planta-
lea fc quoque res habet' cum *Hippuride vulgari*, cuius fructus eft *mix* apice perforata;
foramen vero a ftyli ba(i clauditur^ quod in fruEtu longimdinaliter diff'ello fa-
cili negotio obfeiuncur- Vtraque ideo fpecies ad *Gynandras Munandras* referri
debet. Sed au&oribus Buranicis hanc obferuatiunculam commenda^ vt e vüiis
fpeciminibus confirmetur.

2. SALVIA *fyriaca* L.

Caulis obtufe tetragDnus, pilofus.

Folia rugofa, lubtomentofa, crenata, nonnihil repanda; *radkalia* elliptic^;
caulina ouata, inferiora petiolata, fuperiora feffilia*

Panicula brachiata.

Bra&zae cordatae, Mfles minus rugofae, dencatae, acuminatae^ longitudine
circiter calyculum.

Floras in verticillo fex, albi. *Sahtiat pratevfis* fed maiores.

Calyx bilabiatus, quinquedentatus, ariftatus, compreflus-

Filamenta alba longitudine Galeae.

Stylus longior, purpureus.

Planta bi-triennis, fuaeolens.

3. SALVIA *nilotica* foliis inferioribus runcinacis fuperiDribus cordato-angu- latis, rugofis, pilofis, vercicillorum ariftis quatuor-

Planta in Caldario purdurans, ramis laxis herbaceis, tecragunis, pilofis.

Folia primi anni ouata, pEiolara, margine nonnihil repanda, pilofa, luci-
da: fupremum par a floribus remotum, cDrdacum, fertile,

—*fcundi anni* infima petiolata, his fuperiora feffilia runcinata : fuprema cor-
dato -angnlata, prneter par pedunculo communi fubieftum quod fimpli-
citer CDrdatum. Omnia rugofa, pilolā, crenata.

Verticilli remoti fexflori, *Bra&eis* paruis, cordatis, ciliatis, quibus ab Vtro-
que latere adfidet arifta fubulata, pilofa.

Calyx denribus quinque diuergentibus, ariftatis.

Corolla pallide coerulea, *labio fuperiore* emarginato, leuiffime pilofa : *in/trio-
ri* lobo incermedio crenato^

4. SALVIA *difermar*.

Folia ouaca mihi, non cor data.



Obf. In caldario perpetuo culta folia magis ad cordatam formam accedunt, et planta luxuriat ramis longifloris; laxifloris. Racemum (impliciti fimi verticillis longe remotis) tunc iucunde et fortiter odora. In vasis vero, quae per hyemem in frigidario, per aestatem in balneo reponuntur multo minor, erecta, dura, minus odora, panicula brachiata, verticilli minus remoti et folia angusta.

5. ANTHOXANTHUM *avenaceum* spica fecunda, calycibus pilosis, flocculi arista longa torta geniculata. Eranthis *Cel.* KOENIG.

Flores omnino Avenae propter Aristas, sed lamina tantum duo.

Gramen femipedale, erectum, glabrum.

6. PHALARIS *Canariensis* panicula spiciformi ovata, calycibus carinatis pilosis, neclariis binis, dicenda.

Neclaria haec obferuauit Cl. SCOPOLI Introd. ad Hist. Nat. p. 73. sed pro characteribus genericis haberi nequeunt.

7. PHALARIS *minor*, panicula spiciformi cylindrica, calycibus carinatis nudis, neclariis foliatis.

Gramen annuum, cuius femina mihi sub nomine *Phalaridis tuberosae* data fuisse, sed nulla habet tubera. Simile *Phalaridi Canariensi* sed minus, panicula haud ventricosa et angustior. Inter glumam corollinam minorem ciliatam et calycem adest foliolum, quod *Nefarii* nomine appellari posse credo, extra corollam licet fitum sit.

8. PHALARIS *atundinacea*.

Loco Neclarii sub quavis glumae corollina penicillum pilorum gerit.

9. PHALARIS *paradoxa* et *Phleoides* quantum ego vidi Neclariis destituitur *Oryzoidi* nettaria lanceolata tribuit Cl. POLUCH, retinet ///. HALLER, Cl. MIEG ad manus non est.

10. PANICUM *Aegyptiacum*.

Rod. annua.

Culmi 1 - 2 pedales, vestiti vaginis longe et dense pilosis.

Folia 5 - 7. Unaria, longa, vtrinque pilosa.

Spicae subdigitatae, longae, hinc, 4.1. 5.

Rachis plana, membranacea, flexuosa. Huic ab uno latere alternatim addident flocculi bini pedicellati, altero pedicello triplo longiore.

Flaves lanceolati, striati, valvula accefforia minuta.

Obf. Simillimum POICO *filiformi*, at distinxit acutiflorum IVSSIEV.

11. PANICUM *viride*, *glaucum* et *verticillatum* vix characteribus datis distinguitur. Alii itaque in vivis graminibus quaerendi, si adsint.

¶ 12.

PANICUM *«rfilw» spicis akernis fessilibus fecundis, Mifit Clarif.* KOENIG.

Gramen pulcherrimum, laeve, glabrum.

Culmus compressus, foliosus.

Folia Unaria.

Rachis extus plana, intus vel a latere spicularum carinata, marginata.

Spicae alternae, fessiles, erectiusculae, decreffentes, interfluitis duplo longiores.

Limbus fecundis, alternis, fessilibus, imbricatis.

Calyx ouatus, acutus, valuula acceffbria parua, rotundata.

.. 'Obf. Nifi in *Panico Brizoide* monuiffier /// à LINNE' Spicas interflitorum In-
gitudinem habere ec flofculos triplki ordine feffiles etfe, illudipfum effer.

II. PANICVM *cimicinum*^ panicula vmbellata, racemis fubquaternis, glu-
ma calycina altera ciliara.

Milium cimicinum L. Main. alt. p. 194,

Dir quoque *honorauif.* KOENIG, qui Panici fpeciem etfe primum obfer-
vauir,

Corollae glumam alreram, quae ab ariftarae margine eycipitur non obferua-
uir. III. 'a UNNE', fed calycis glumam minorem pro CDrollina habuit.

14. PANICVM *indivum* (pica fimplici nuda, pedicellis geminis^ culmo ad- t
fcendente bafi ramofu.

Miffit *Opt.* HOENIG-

Gramen filiforme, femipedale.

Culmus adfcendens, fuperne nudus.

Spica vix femipollicaris, inuolucellis nullis.

Faluulae calycis interiores leuiter hifpidae, fubfquahs, cymbiformss, acu-
tae : *acceffbria* obtufa, minuta.

Obf. Nulkim etfe dubium quin idem fie gram en, quod in *Mant. alt* p. 1^9.

Panicum indicum diatur, vix vero crediderim *Panicum conghmeratum* ibid,
p. 324. idem dTe fed aliud et quidem id quod ancea *Aira indka* diflum
fuerit. Nam in noftru gramine nee fpica fecunda neque flofculi obcufi.

15. PANICVM *trigonum* panicula erefta pedunculis bifloris, calycibus obm-
fis, hifpidis, vnifloris, feminibus trigonis.

Panicum patens Burm. FJ. Ind. • 10- f. 2.

Cum nomine Burmanniano dedit *Cl.* KOENIG, a *pattyfe* LINN EX diuerlum
talycibus vnifloris.

Uulmi fpichamaei, profrati, foliofi, radicantes,

Panicula parua, ftriila, pedunculis rarius parum flexuofis.

Glumae calyviniae obtufflimae, inaequales.

Folia glabra, angufta.

16. PANICVM *Capillare* panicula capillari erefta patenre, pedunculis (trials,
calycibus acuminaris laeuibus, foliorum vaginis hirfuiiffimis.

Panicum Capillare L.

Cramen tripedale, *panicula* plus quam pedali, *pedunculis pedicellisque* ftriftis,
vaticibus^nWite viridibus, anguftis, aenminatis, nudis. *Genicula* caulis
barbata, fed barba furfumi verfa, *Fglorum Vaginae* ftriatae j iuer ftrias
pun eta callufa pilifera. *Pili* in ipfis fulus eciam e punftis eleuatis profici-
fcuncur.

17. YAHICVM *ficxuoJitni* panicula capillari patents, pedunculis flexuofis,
calycibus ouatis, geniculorum barba reflexa.

Cum Panic* Capillari confundirui*

Gramen fub-pedile



Culmi decumbentes, ramofi kuitter pilofi.

Folia bipollicaria, angufta, pilofa vt etiam vaginae, fed nulla punfta callofa.
Geniculorum *Burba* denfa, deorfum veria.

Panicula vix tripollicaris, circumfcriptione ouata, pedicellia quam raaxime flexuofis.

Calyces ouati, obtufi, pilis nonnullis hirti.

Ijj. PANICVM *Burmanni*, fpicis fubquaternis, remocis, fecundis, fimplicibus, flurum glunris binis exterioribus, ariftaus,

Panicum hirtellum Burtn. Fl, Ind, r. 12. f. I.

Mifit *CeL D.* KDENIG-

Ab *birtelh* L. diuerfiflimum.

Culmus decumbens, ramofus, bafi villofus radicans.

Folia lanceolate, pilis raris adfperfa, *vaginis* margine villofis.

Spiculae quatuor vel tres culmum ternfinanc remotae, floribus fecundis-

Raches pilis longis veftitae praelertim fub pedicellis.

Flofculi pediceltati, alterni pkrumque abonientes.

Calycinae glum a e binae exteriores aequales ariftalonga terminated terda Ion*
gior, acuta, fubariftata: umnes yillofae.

Corolla niuea glaberrima.

19. PANICVM *lineare* accepti

a A KOENIG culmis ramofiflimis foliofis vfque ad fpicas, foliis teneris.

a D% THUNBERG ad Capuc B. Spei leftum culmis repentibus, fuperne minus foliofis, foliis longe rigidioribus, vaginis diftiche equitantibus. An diftinfta?

20. AIRA *fetacea* foliis fetaceis, panicula dimifa, flofculis bafi pilofis: inferiore muticD, fupere arifta breyi-

Gramzn Europaeum. nefcio vnde, femine fub Bromi nomine dato, in liorto perennans, glabrum, pallidum, facie *airae fitxuufa* fed flores multo minores et pedunculi vix flexuofi.

Calyx fubaequalis, viridi-fpadiceus, marginibus hyalinis, criflorus,

Flos infimtis bafi multum pilofus, muticus, *fecundus* minus pilofus arifta corolla parum longiore, *tertius* minutus, fterilis.

Obf Plures forte *Airae triflorae* funt, fed in *Melicis* iudicium tertii fioris cucullatum, truncacum, in *hac* flofculus biglumis, minuius, vacuus.

An *Aira Caryophyllea*, quam viuam haud examinaui, per culturam inhanc mutari poffit? vix crediderim.

21. AIRA *chinenfis* foliis fetaceis, panicula erefta, flofculis ariftatis, villofis.

E China mifit *CLD.* BLADH,

Culmus bafi ramofus, pedalis.

Folia fetacea, glabra, breuia.

Panicula erefta, parua.

Calyx valuulis lanceolatis, ftriatis, glabris, fubaequalibus, biflorus.



Corollae glumae villosae: *exterior* conuexa, atiftata, *interior* planior, longior, acuminata, in fundo cucullato genicula conueniens.

Obf. in alceroflore vei Tolae aritheras vel plane nihil inueni, an itaque potius *Hoc* ipecies? *Facies* omnino *Air* at.

22. *POA pankta*, paniculae ramis iubbinaris remotis filiformibus, calycibus bifloris, vaginis punflato-pilosis.

E China mific *Honoratijf.* BLADH,

Gramen alcum tenue.

Foliorum vaginae punctis imparis callofis e quibus pili prodeunt,

Folia leuia, nuda.

Panicula pedalis fere tenuiffima, rara, e spiculis aeternaum binatis vel ternatis, 3-4 pollicaribus, filiformibus, patentibus.

Flores fscundi, alterni, biflori, pedicellatij calycibus fubulacis longitudine flofculorum*

Obf. Paniculae formam exprimit Fig. *Poae vhinensis* Burm. FL Ind. 1.11. f. g. fed multo major ec cenerior. *Calyces* quadriflorDs praeterea eTe aic **JL** LINN E

23. *POA cntra&a* panicula contrafta, flofculis lanceolatis trifbris nudis reffilibus, foliis filiformibus.

Dedit *amiciffi* KOENKS,

Gramen glaberrimujn, bipedale et vltra, culmo craffu.

Folia filiformi- tereria.

Panicula contrafta, e vagini. folii fupremi vix egrefla.

PeJu?; *cutilongi?* ftrifti.

Calyces acuci, rriflori, nudi, floribus breuiores, alcerui, ffflifes.

24. ANTHISTIRIA *ciliata* foliis fuperioribus bafi inuolucrisque ciliatis. LINN. *Dijf. Nov. Gram, Gen. p.* 35.

Andropogon quadrialu? L_r Syft. Nat. 13. p. 758. et Mant. alt. p. 303. fub *mtantis* nomine.

Obf. Folia infima in meo exemplari non ciliata. *Cuhnus* femiceres. *Arifia torta* flofculi hermaphrodici videtur charafterem generis inguedipoffe, quum in vtraque fpecie adlir. *Panicula* Andropogi,

25. ANTHISTIRIA *imbtvhis* foliis inuolucrifque nudis.

Gvamen hoc e Capite B- fpei allatum communikauit CL Doft. ACH Aki vs.

*Culm** compreffus.

Calyx fimillimns prioris.

Pedunculi folirarii, capillares, biflori e Vaginis duabus fupremis folio breuiores in meo exemplari.

Teneriora praeterea omnia.

25. RDTTBOELLIA *laeuis* pedunculis bngiflimis, ipica flofculis binatis k-teralibus, calycibus ouaiis impunfta is leuibus.

Mifu eTranquebaria CL KOENIG.



Culmi adfcedentes, foliofi ad fecundara vel uertiam arcicitationem uaginam habent, e qua pedunculi 3 l. 4. plus quam pedales monoftachi oriuntur. Horum articulatio inferior fere ttigona vel femicylindrica excauata, fupe-rior' uero quae fpicam geritexafte cylindrical uagina ad diinidium circiier obuoluiur.

Folia breuia, carinata, oris barbatis.

Spica ftriftiffima. In quouis huius articulo.

Flores bini laterales, direftione alrerni.

Calycis ghtma exterior oblique ouata, cartilaginea, umnino leuis.

- . - *interior* aequalis, membranacea, ccnuiffima vti ipfa corolla.

- f 27. **ROTTBOELLIA** compreffa fpicis compreffis pluribusfafciculais peduncu-
lucis, calycibus acuris.

In China leftam atmlit Z). TRANCHELL.

Culmi compreffii, foliofi.

Folia leuia, nuda, uaginis compreffis.

E Uaginis culmi fuperioribus *Fafciculus* fpicarum pedunculatus inuolucratu-
s exit.

Spicae in hoc inuolucro demum pedunculatae et bafi inuolucro uaginato par-
tiali praedico.

Spica fingula compreffa alcro latere plana. Cuicunque articulo adfidenc *Flo-
res* bini, quorum

Calyces acuti, mutici, impunClaci; vterque bialuis fed *alter* oppofitus, val-
uula vtraque cartilaginea, anguftiore longiore et fere ariftataj *alter* lateralis,
cuius ualuula interior membranacea in rachi cauaca vna cum cprolia ab ex-
teriore occultatur. *

- i 28. **ROTTBOELLIA** *punfiata*, fpicis teretibus pluribus fafciculatis fubfili-
bus, flofculis iblitariis alternis, calycibus pundaus

Aegilops exaltata Fafc. Obf. Bot. 2. n. 97. an etiam L-?

: *Ulmus* cylindricus, farttus, aphyllus.

Spicae digiro breuiores, ftridae, fafciculatim e uaginis culmi fuperioribus pro-
deunt demum uaginatae.

Fbfculi fsriz dterna poliri₃ folitarii.

Calyx ouatus, obtufus, ftriaco-pundlatus.

29. **ROTTBOELLIA** *muricata*, fpicis teretibus pluribus longe peduncula-
tis, calycibus ciliato-aculeatis^ neutris bifidis.

Aegilopf muricata Fafc. ObC Bot. 2. n. 98- Defcriptio ita corrigenda et au-
renda.

• *Culmi* an^ulati, foliofi.

Fvliorum uaginae ciliatae₄

Calyces omnes leuiflime pubefcentes; *lateralis* latior apice fcariofus, margins
ciliato-aculearus; *oppofitur* paulo inferior, minor, vix ciliarus, uacuuus.

Obf. In *Rotthoellia muricata* et *comprejfa* calyx alter lateralis alter ©ppofims, in
pun&ata et *Uui* omnes laterales.

30. *ROTTBOELLIA fatiguing* paniculae spicis ariftatis alternis fimplicibus pedunculatis, florutn bradea laterali ciliata-

Ramulum mific C/.BLADH e China.

Fades omnino Andropogi.

Culmits femiteres, articulatus, fuliofus. Superiores articulos *Vaginae* veftiunt fuperne dilaratae ec fere cucullatae- E quacunqve vagina

Spica filifurmis exir, pedunculo intra vaginam larente.

Flores feffiles, alterni, in rachi excauata.

Calyx bialuis oblique laterialis, *gluma* *exteriore* femitereti-fubtilata, cartilaginea : *interiore* aequali, renuiffinia, alba ftriis fanguineis.

Corot/ae gluma *exterior* fianguinea, longitudine glumae calycinae interioris: »• *terior* ad bafin vsque fiffa, vc binae glumae interiores lanceolataedimidiarobalvae (anguineaefque tenuiffime ciliatae adeffe videantur. Ad huius bafin *artifita* longa torta,

BraElea iuxta flurein linearis, cartilaginca, fubariilata, altero latere ciliatobarbaca, in alrerno flore alcerne lira.

Antherae et *fiigmata* fan guinea.

Ohf. Si bra&tea calyci annummerecur et petalum interius pro duplici habearur, tune calyx et corolla in hoc gramine triglumes, glumis inaequalibus, quod fingulare. *Rottböllis* adfociaui forte proprii generis gramen, certe habitus eiusdem eft djuerfus.

31. *STRVTHIOLA* L charaftereflēmialis confittit in

NtElariis o&to antheriformibus, fingulo bafi corona fetarura circumdatD> faucis margini impofitis.

Calyce diphylo, foliis acutis, compreffis, enrinatis.

Ohf. Quod *calyx* nobis eft, id ///. a n NNE' *bratleas* vocauir, fed *BraSleai* folia in ramis fuperiora, magis ftriaca^ er bad conuolura didniU5,

Quatuor diftintfis fpeciebus inftruftum eft Herbarium noftrum, has accuratius defcribere fuperfluum non duco, quum charafteres *Str. virgatw* et *ereflae* in *Mant. Plant.* datae haud fufficianu.

32. *STRVTHIOLA tetragona*, foliis lineari-lanceolatis quadrifariam imbricatis, corollis calycibusque nudis.

Struthiola ert&a L. an ?

NeBandra tetrandra. Eerg. Pl. Cap. p. 133.

Fruticulur totus glaber, ramis teretibus, ramulis tetragonis,

Folia oppofira (fparfa *Bergius*) quadrifariam quafi imbricata : apicibus tantum patulis, nonnihil quam in *luniperina* latiora.

flares in fummitate ramulorum laterales, feffiles, fulirarii incre

Bra&eas foliis fimiles fed anguftioreSp

Calyx glaber, longicudine dimidia tubi.

Corollae glabrae, cxrus rubrae.

Antberae in fauce dilatatae fere feffiles, apicibus faucem claudunr, fufcae, interiori pagina qua pollen fundunt flauae.



33. *STRVTHIOLA* ^J^Mr/J, foliis lineari-lanceolatis ereftis, brafteis galy-
cibusque ciliato-barbaris, corollis extus fericeis.

Strnthivla virgata L.

Thymelaea foliis oppofitis cruciañs, anguftis, floribus tubulofis, ipicae in "
modum ex fpiorum alis ereftis. *Burm. Afr*, p. 127-1. 47. f- i*

Fnttex ramis longis virgatis, ramulis tetragonis.

*Fvli*a oppofita, nuda, margine ciliato*barbata, nonnihil patula.

Bra&eaz confimiles, fed anguftiores.

Flores feffiles, fDlirarii, longi, coriacei, rubri, extus tomencofu-fericei.

Calyx ciliato-barbatus, coloratus, longitudine reniae parcis tubi.

Znthtrae albae apicibus fufcis in fauce.

£. *varietas*: corollis flaneftentibus, calycibus membranaceis albidis, *anthzris*
flaueftentibus apicibus luteis.

Obf Synonymon *Burmanni* ad hanc ipiciem peninei, exprefse enim monec
tubulos vijofis fericeos eflè.

Folia autem breuiora quam in noftris Ipeciminibus delineauic.

34. *STRVTHIOLA lanceolata*, foliis ouato-lanceolaris corollisque nudis, ca-
lycibus pubefcentibus,

Rami ftrifti^ teretes, nudi: ramulis tetragDnis.

Folia integerrima, acuta, nonnihil carnof^ vel potius coriacea, patula.

- *Flares* in fummitatibus ramorum oppofite congefti^ fungulus feffilis incre

Bra&ieam foliis nonnihil anguftiorem.

Calyx pubefcens, longitudine quartae parcis tubi.

Corp/fa? tubus longus, limbus linearisj vterque nudus rufefcens.

Antherae col ore et lieu *Sir. tetragonal*

35. *STRVTHIOLA iuniperina*⁷ foliis linearibus acutis patentibus cordllis ca-
lycibus que nudis.

Fntticnlus totus glaber.

Rami tenues, teretes, ramulis cecragonis.

Folia iuniperina, patenria.

Flores a media ramulorum pane ad fummitatem fere intra *hra&eas* foliis fimi-
les oppofitas, feffiles.

Calyx glaber longirudine tubi corollae.

Corolla braftea parum longior, glabra₃ alba, laciniis acuris.

Stamina infra faucem dilataram fua, vc antherarum fufcD-niirricantium oi-
ces os faucis non adtingant. ^{a M}

36. *PHYSALIS harbadenfts*^ ramofa, foliis pubefcentibus bafi cordata inui-
cem impofita, pedunculis nurantibus-

Alkekengi barbadenfe nanum A Ilia riae folio. *Dill. Hurt. Ehb.v* 10 r 0 £ 0
(ad *puiuofatn* excludendum.) ^{" *' 3 ' " # J'}

Radix annua.



Caulis ramofus, leuiter pubefcens, pellucidus, pallide viridis hinc inde leui rubore tindtus ; ramuli leuiter canaliculati.

Folia cor data, lobis bafeos fpiraliter inuicem impofitis, parum dentata, vcrinque pubefcencia.

Calyx oblongus, longe acuminatus, pubefcens *ifruffifer* conico-prismaticus bad piano-excauata.

Corolla flaua xn-iculis antherisquepurpureis.

Obf. Ob antheras purpnreas, folia nonvifcofa, defectum pruinae, pedunculos floriferos nutances non adraodam longos a *Phyfajide pruinofo* L, diftinfam puto.

37- GROSSVLARIAM *ruhram* Scop. FI. Carn. ed- 2. p. 167. er RIBES *alpinum* hnd differre perperam contendit l. c. *Cel.* SCOPOLI. In fyluis aequac in honis diftinfii manent hi frutices. *Racemi* quidemin varietare akera *Ribis alpini* ObC Fafc. 2. 17. patent, nunquam autem pendnlos vidi.

38- GARDENIAE *dumetovum* Obf] Fafc. 2. 31. quae eft *Gardenia fpinofo* Thunberg *DitT.* de Gard. p. 15. t. 2. f. 4.

Frufus eft bacca exfucca vmbilicata vniualtiis trilocularis.

39. CEL OS IA *max ilandic a.*

Quae fub hoc nomine communicata fuit planta, certe eft *Celofia margaritacca* L. omnia enim charaftei Linneano opime refpondent. ni(i forfandicerem folia pocius lanceolata effe, quam ouata. Ceterum :

Calyx triphyllus corolla breilior.

Stamina, vere monadelpha.

Ne&arium minutum cingit pedicellum genninis ilibtus xetropreffii et filamentum campanulacum apicis quinquedencatD.

Stigma leuicer bifidum.

40. CEL OS IA *margaritacea* quam mifit e Tranquebaria D. KDBNIC ab hac differc

Calycc quidsm triphyllo fed corolla longiore et in apices longos ariftaeforines deiinenrc.

Foliii anguftis lanceolatis.

Petalis lincari-lanceolatis.

Staminibus bafi parum connatis.

Force itaqne diftinfia fpecies.

Obf. *Staminum* in *C. argentea* fabrica eadem ac in fupradifla *marilandica*.

41. SESELI *multicaule*, foliis bipinnotatis foliolis linearibus fimplicibus trifidisque, inuolucellis fubulatis.

Radix perennis.

Caulcs paculi, teretes, ftriati, glabrL



Folia omniabipinnata, /o/w#j linearibus integris et fubtrifidis : caulinis fii-
rioribus longioribus. In foliis caulinis inferioribus *vagina* brevis cer-
minatir in petiolum longum. Perioli fupcriores vaginati caulem fere ani-
pledentes folio compufitu feffili reminaur.

ImiohtcYum nullum.

Inuolucelfa plura fubulata longitiidujegerminum.

Vmbella radiis {? - 12.

Vmhllulae compadtae floribus 6-18-

Styli et apex germinis poll antheffin rub en t.

Obf. Adeo fimilis *Sefeli Hippomarathro* fecundum defcriptionem in Spec. Plan-
larum datam, vt demca Inuollicellorum forma plane conueniant.

42. An fequentes tres plantae varietates taniam fint *Atbamantae Libanotidis* Cum
defcriptione et figura *Atbamantae Libanotidis maioris Holleri* GOVAN 111. «
Obf. p. 83. t. xxvi. fat bene conueniunt praecer cDngericm vmbellulaium fim-
plicium quam fub vmbella terminali appinxic et in noffris omnino deficit, Suae
Cel. GovAN nomen addidit *Atbamantae condenfatae*, quae ab hac longe re-
cedit.

Quam *lucidam* dixi, magis a *pubefcente* recedit, quam *ambigua*, et forte
diftinfta fpecies, licet character aegre exprimetur.

tibanotis RIVINI egregie vmbellani et folia fuprema exprimit, fed deficiunt
in icone folia inferiora.

«• ATHAMANTA *pubefcem.*

Can/is ereffus ftriftus, humanae (in horto)^Ititudinis, angulato- canalicula-
tus, ad genicula pubefcens ; ramis ereffis, fubangulato- ftnatis.

Folia omnia bipinnata (fupremis exceptis) neruis fubtus, margine et petio-
lis praefertim ad pinnarum exortum pubefcentibus : fuprema tanwm cihata.
Fdhla pinnatifida, laciniis lanceolatis acutis : pinna infima maiorc
decuffante.

Tedunculi fulcati, fubpubefcences.

inuolucYum polyphyllum, breue, patens; foliolis linearibus pubefcentibus, a
bafi ad dimidium marginibus albis inuoluculis.

Inuolucella polyphylla, pubefcentia, ereffa, linearia, longitudine fere ra-
diorum,

Petala vtrinque alba, cordata apice inflexo.

Fru6?us ouatus, pubefcens, ftriatu, calyculo et piftillis fufcis reflexis co-
ronatus.

Semen hinc conuexum, ftriis quinque eleuatis, inde planiufculum ftria vni-
ca eleuata in medio.

13. ATHAMANTA *ambigua,*

Similis pubefcentij fed

Caulii cipedunculi minus profunde canaliculati.

Petiali ad pinnarum lantum exortum pubefcentes.

Folia nonnihil laiora, parcius pubefcentia.

y. ATHAMANTA *lucida*.

Caulis magnitudine a *aequac*, irregulariter quinqueangulaio-canalicularus, glaber, ramis compreffis.

Folia omnia glabra, lucida, tenuiffime ciliata, ceterum familia praecedemis, nisi quod pauciora, latiura et pinna infima qua? cruciaram efficit formam longior fit.

Pedunculus fulcato - angulatus glaber.

Inuolucrum, Inuolucella et *Floret* pubefcentes.

Fru&us magis pubefcens et

Semina nonnihil planiora.

4J* *SIVM angustifolium*. Fac. ObJI Bot. i.

Defcriptioni adde

Folia prima caulinis familia sed auriculae nuliae, non multifida vt in *S. vulgari*.

44. Varias *Pimpinellarum* species ab III. J LINNE' coniunctas esse videtur. Sei vr genus hoc maxime naturale fir, He differentiae specificae plus quam diffidies et adeo inter se conriguae, vt tuncis eadem oculis vix pateant. 6^{en}. HALLER cres quid em species constituit, quae in Scania etiom crescunt, ec quodammodo distingui possunt, sed intermedias varietates in fola Scania lectas, quae *Tragofdina* 785 et 7⁶. *ejusd.* coniungunt, tot habeo, vt facile etiam acutiffimum Botanicum confunderent. Varias harum in Hortum Botanicum introduxi, ibi vero, proceritate excepta, constanter in spontaneo folo nadem formam ferunt. Tentavi has varietates ad *Pimpindlam magnam* ec *faxifragam* Lin. reducere, tentavi etiam illas in plures dirimere species, sed incaflum. Fateor primumintuend magnum discrimen videri intermixtadas nuperorurn Audurum species, sed aequae verum est, quod a varietatibus in intermediis omnino inseparabiliter coniunguntur. Quantum potui distinxivi *varietates* has sed inter illas rerum alias in intermediis obseruavi, quasi difficiUraam reddiderunt determinationem. Non dubiro plures dari, modo ab Aufloribus obseruentur, certe *Tragofelinum petraeum Tabernaemontani* nulla c nostris est, licet ad *Pimpinellam degenerem Morisoni* referta fuerit. Hanc separavi, et pro distincta habeo specie.

45. PIMPINELLA *Saxifraga* foliis inferioribus simpliciter pinnatis, foliolo terminali trilobo.

Tragofelinum etc. Hall. Hist. stirp. Helv. 785. 786.

«. P. foliis omnibus simpliciter pinnatis, foliolis lanceolatis, auriculatis[^]

Pimpindla fore rubro. Riv. Cl. pent. irr. t. 51-

Obf. fecundum indicem numeravi.

Pimpindla magna LACQVIRforte. Doleo me egregium opus III Viri non vidisse.

A, P. foliis inferioribus simpliciter pinnatis latis simpliciter bipinnatis.

Pimpinella magna Riv. L et 80.

Pimpindla Prodr. Fl. Scania 326-

Obf. Hue referrem *Pimpinellam magnam* ManL alt. p. 219. (quam inspicere non licuit) nisi expressit dixisset III *Vitnulla multipartite Pimpinella Saxifraga**



gae Maioris Mori Hift. 1.1. 5. non foliorum inferiorum figuram et *Pim**
pin. Saxifr. min. crisp. ibid, foliorum superiorum exprimunt.

- y. P. foliis inferioribus simpliciter pinnatis ovato-lanceolatis, auriculatis: fil-
premis subbipinnatis, pinnis linearibus incisis.

Obf In aliis infima foliola pinnatifida, in aliis subtriloba, in omnibus vero
superiora auriculata, et superiora segmentis linearibus.

3. P. foliis omnibus pinnatis, foliolis radicalibus subcordatis, subtrilobis, fer-
racis: caulinis incisis-anulatis.

Pimpinella media Riu. 1. cit. t. 82. haud bona.

Obf. Folia caulina fere *Athamantae Ceruariae*. Hanc circa Lipfiam leftana
communicavit Amicus horoiatiff. CESXE,

- e. P. foliolis radicalibus subrotundis serratis, caulinis linearibus.

Pimpinella minor Riu, 1. cit. t. 83.

Pimpinella. Ftor. Dan. t. 669.

Obf. 1. Folia inferiora plus minus lata, rotunda, oblonga; in plerisque ve-
ro lobus terminalis folii imparis retusus, tridentatus. Folia superiora
vel simpliciter vel bi-pinnatifida. Hirfutae et glabritie ludunt.

Vbf. 2. Ad hanc varietatem quoque *perinet, Pimpinella nigra Alarum*, quae
folio coloris obscuriore Radicis et Herbae differt. Prope Malmogiam cre-
fcit.

46. PIMPINELLA *Jijetfa*, foliis omnibus pinnatis, pinnis multipartitis, fe-
gmentis subfalcatis acutis. Tab, 11.

Tragofelinum Hall. Hift, ftirp. Helu. 787-

Pimpinella Saxifraga ma toy degener. Morif. Hift. Pl. T. i. tab. 5. folium in cul-
ta apud nos planta ostendit.

Icon tab. 11, melius foliorum formam quam omnis descriptio exprimit.

Folia primaeprimi anni omnino pinnata: pinnis subrotundis, sed postquam
haec evanuerunt, nulla alia virtus se offerunt quam quae supra dixi. In hor-
to culta procerior quidem evadit, et magis fructu caule furc, praeterea
mutata,

Obf Huius aequae ac omnium sub *Pimpinella Saxifraga* enumeratarum varieta-
tum radices perinde in officinis Pharmaceuticis adhiberi possunt.

47. SAMBUCVS *laciniata* cymis quinquepartitis, foliis bipinnatis, pinnis
ternatis, foliolis lanceolatis incisis.

Sambucus laciniata Mill. Dift.

¹ Ideo quod cymas habet quinquepartitas et truncum perennantem, ortam a
Sambuco nigra esse haud credo.

Sambucus nigra cymis quinquepartitis foliis pinnatis > foliolis subovatis ferra-
tis dicenda.

48. TIARELLA *vnifolia*, caule unifolio, foliis omnibus cordatis,

E New Fouijdland.

Quam *Tiarella cordifolia* multo minor, foliis haud lobatis, fcap[^] paucifloro
munophyllo, foliolo fere sessili.

In *T. Mydifoliaefcapusplaneaphyllus* 3/0/wobfcura, sublobata[^] crenis crebrioribus.



- 49- FORSKOHLEA *fcabra* foliis ouato-lanceolatis, dentatis, fcabris, fubtus albidis.
- Planta* capensis, quam beneuolenria optimi amici Pr. THVNBERG poffideo, fruticulofa videtur.
- Caulis* albidus, bad lignofus.
- Folia* ouato-lanceolata fupra pundtis eleuatis fcabra, fubuis albo-romentofa neruis muricatis. Margo demibus 4-6 maioribus,
- Calycis* laciniae albidae, maiores ipathulato - rotundatae corollam men-
ciencur.
50. FORSKOHLEA *anguftifolia*, foliis lanceolatis oflo-dentatis ciliato-
pinulofis, fubtus nudis.
- Planta* annua, vt *F. tenaciflima* adhaerens.
- Caulis* niber
- Folia* lanceolata, denticulis vtrinque 4 raro tribus ipinula terminatis, ciliata; fupra pundtis minutiffimis fcabra, fubtus nun alba, neruis ipinulofis adhaerentia.
- Calycis* laciniae lineares.
51. FORSKOHLEA *latifolia*, foliis ouatis ferratis, fubtus albidis.
- Forskohlea Unaciffima* L,
- Planta* annua
- Caulis* albidus.
- folia* laro-ouata, ferraturis 6-8 profundis, fupra maginc ec neruis ipinulofa, fubtus imprimis junior a tomemofb-albida.
- Calycis* laciniae fpathulatae, acutae vel potius lanceolatae ipatio ab apice remote dilatatae.
- 52- LYCHNIS *maior no&iflora Duhrenfis perennis* Raii Syn. 3-p, 340[^] quae me iudice haud refte aC/. HUDSON in Flor. Anglica ad *Cucubalm vifcofum* L. refenur, adeo in omnibus cum *Cucubah Italica* L. conuenit, vt illas diftinguere (in horto viuas habeo) nequeo, quare eas pro varietatibus rantum habeo. *Italica* quidem tenerior eft ec delicatior, *Dttbrenjis* ftriftior 7 maior, frigoris hyberni noftri pauiens eft, et pecula nonnihii magis fiiiFa, nee vt in *Italica* fubtus tintaj haec vero minime fufficiunt vc diftinguancur.
55. SILENE *vejpertixa*, petalis bifidis, neflavio connato, floribus.alternis.
- Planta* annua, tota hirta, non vifcida, femipedalis.
- Caulis* ramofus, ereftus, ramis plerumque alternis.
- Folia* inieriora ouata, fuperiora lanceolata, imegerrima, feffilia, oppofita-
- Inflw.* racemns bifidus flore vnico pedicellato in dichoromia, tribus vel quatuor alternis in fingulo ramulo breuicer pedicellatis, foliis duobus linearibus fuffulris, carneis, vefpertinis. Saepe etiam racemus fimplex.
- Calyx* Dblongus, fubclauatus, pilofus, ftriis decem viridibus.
- Petala* bifida, corona coadunata.
- Stamina* quinque longiora alcitudine corollae, quinque breuiora.



Piftillum : *germtn* oblungum, *flyli* longitudine ftaminum breuiorum, *fligmata* fimplicia.

Capfula ouata, fubtrigona, incra calycem longe pedunculata, ore fexdentaio dehifcens, polyfperma.

Semina minuta, reniformia, dorfo fiilcata.

54. CERASTIVM *latifolium* Lightfoots Fl. Scot. p. 242A JO. line dubio eft *Ceraftium alpinum* III, a LINNE' quod figura capfulae fatis demohftrat,

Fariat Ceraftium alpinum foliis glabris, fubhifutis et hifutiffimis, caulibus vni etbi-floris non 6 - jji-floris prout vult *Cei*. LIGHTFOOT, licej hoc etiam quamuis rariUime fieri poffe non negamus; in horiis Belgu id enim obferuauit *Bd* LINNE' et caulem quadriflorumpinxit RAIVS.

Nobis videtur *Alfaũ* 5 et 6. *Rai*. Syn. 3, p. 349. ad *C. alpinum* L. referri poffe. Si vero vtraque in Herbario Raiano capfulis infrufta adfit, quaefitio facile folui poteft.

55. SPERGULA *laricina* Lightf. Fl. Scor. p. 244. et HudC FL Angl. ed. a. p. 20[^]. certiffime eft *Spergula faginoides* L. cuius folia etiam tenuiffime ciliata obferuauit.

56. EVPHORBIA *ffiftmr*, dichotoma, foliis oppofuis linearibus integerrimis, pedunculis folicariis.

In infula *S. cruxleftam* communicauit *Cd. D, M.wnt*.

Cauilis teres, nudus, articulatus, dichotomus.

Folia oppofita, angufto-linearia, biuncialia, integerrima, acumine puruo. *fetala* integra.

Capfulae leues videntur.

57. EVPHORBIA *Peplus* L. habet

Inuoluera obonafa, fed

Imtolucella cor data fine rotundato obtufu.

Polygama faepe eft flore vno alteroue in pedicello erefto, (hui *petala*, *flylum* ei *fligmata* gerit, nullucn vero *germen* vel *antheras*.)

Anguli capfulae *bicarinati* bonum fiitunt charafterem huius fpeciel

Farietat quae forte eft

PepJis minor I oh. Bauh.

Folia habet ouato-lanceolata, acuta. minime obouata obtufa.

Inuolucrum foliis conforme, fed

Imiolttcella oblique cordata.

58. ROSA *alpina* L.

Hacc non minus quam multae aliae Rofae AuAores confundit.

Frutex humilis, *caulibus* fusco-rubentibus, inferiore circiter dimidia parte veftitis tfftt/«xreftis, fubulatis, tenuibus, albis, non pungentibus. *Su-peima* vert) nudi funt.

Stipulae margine ciliato-glandulofae.

Petoli glandul ofo - hifpidi.

Foliola plerumque septena, vtrinque glabra, ouata, biferrata, ciliato-glandulosa.

Pedunculi nudi, inermes.

Germen ouato-oblongum, nudum.

... *Calyx* cum germine extus rufo-fuscus, laciniis integerrimis lophulatis villoso-albo-marginatis : incus villosis,

Flores folicarii rubri, mediae magnitudinis.

Obf Mihi nullum est dubium, quin haec fit *Rosa inermis* etc. Hall. Hist. stirp. Helv. T. 2. n. 1107. fieri enim potest, ut hinc inde fructus badilpidus fiat. *Cel.* SDVAN hanc *HaUeri Rosam sive pimpinellifolia* Linnæi coniungit, a qua [amen toco coelo differt, *Pimpinella* *Hi folium eum spinosissima* coniunxit HALLER, illas vero bene distinxit DV RDI, cuius *pimpinellifolia* cum mea egregie conuenit

59. *ROSA pumila* Jacquinii et *ROSA muscosa* Milleri *Obf. Bot. Fasc.* 1. n. 58. multum conueniunt et forte cultura folia differunt, dum haec acuta maior, hispida et floribus plenis, alia minor flore simplici purpurea.

60. *ROSA maialis* germinibus globosis pedunculis petiolisque inermibus aculeis aculeis geminis axillaribus, calycibus integris lophulatis. *Hortman Diss. de Rofa* p. g.

In hortis frequens, parum aestimata ubi flores paruos debilissime odoros.

Radix multum repens.

Caules flexuosi-pedales, femiarticulati, aculeati aculeis versus basin denotibus : aculeis rectis et recuruis, sub articulationibus aculei maiores sunt.

Rami uculosos ad ramulorum et petiolorum bases tantum habent binos vel ternos.

Petali Inermis, hirti, dilatati in stipulas serratas: ferraturis lophulato-glandulosis.

Foliola 5 - 7 oblonga, ultra dimidium serrata, subtus hirsuta, supra glabra, vtrinque venosa.

Pedunculi nudi, glabri, folicarii, bini, terni.

Germina subglobosa, nuda, glabra.

Calyx leuis, laciniis integris sine dilatato, flore longior, intus et margine hirtus Raro foliolum unicum nonnullas habet lacinulas lineares,

Flores plenus, pallidior.

Floret cum Rosa lutea.

Obf. Cum *Rosa ficundissima* DV ROI *Obf. Bot.* p. xvi. satis bene conueniunt, sed nullos periorum aculeos vidi. HALLERVS nostram non habet, sed *Rosa cinnamomea* MILL. Dist. abridg. ed. 1774. finissima est nostrae, an vero ideo fit *Rosa cinnamomea* LINNEI? vix credo.

61. *ROSA Damascena* DV ROI 1. cit.

Germina etiam habet dimidia parte pilosissima

Stipulae integerrimae margine glanduloso.



62. ROSA alba L.

Germina calyces jue^ hifpidos quoque nonnunquam haberp
Stipulae ferratae.

63. PE GANVM *crithmifolium* foliis multifidis, caule frutescente.

E feminibus pr ope Mare Caspium leftis a JW. A P ALL AS commupicatt*
 excreuir.

Similis *Fegano Barmaid?* fed:

Caulis 3-4 pedalis, perennans, femperiurenS»

F/orw minores.

C^JK- fimplex flore breuiot.

in P. Harmala

Vaults annuus, herbageus, vix fesquipedalis-

Flores maiores.

Calycis folia diuifa corolla longiora.

64. AQVJLEGIA *vividiflora* neftariis reftis petalo rugofo longioiibus.

Semina Plantae Sibiricae dedic *Honor atiff D. PALL AS.*

Radix perennis.

Caulis vix bipedalis, fubangulatus, leuiter **villofus.**

Fotia bicernaca, foliolis bilobis incifis.

Pedunculi floriferi nutantes breues, fruttiferi **erecti.**

Petala albo-viuidia, rugofa, nsaarionim limbis breiuora.

Ne8ma TSA, intus flauo-viridia, exrus fusco • viridia decolora.

Stamina corolla dimidio brcuiora.

Styli corolla longiores,

Floret ante reliquas Maio menfe.

65. POEONIA *covallina* foliolis ouatis integriis nudis, capfulis recuruatis tQ-mentofis.

Poeonia fimplex latiore folio tiifido. *Morif. Hift. Pl. T. 3. p. 354. f. 12. r. 1. f. 1.*

Poeonia mas fbre parpureo *Besl. Eyfi. Vern. Drd. vi. f. 10. mala.*

Ctfwferbi-tripedalis, ftibteres, glaber, hinc inde, praecipue in axillis et ver-
 fus fupciora rub ens.

Stipula radicalis vel vagina dimidiata maxima, rotundaia, cucullaia.

Folia bicernata> petiolis diuergentibus fupra canaliculatis, glabris. *Paiolut*
ttrrninalis triphyllus, raro pentaphyllus: *laterales* pentaphylli, *foliofopQ-*
tiolatis, lato-ouacis, integerrimis, raro bilobis, nudis.

Pedunculus ttrrninalis, ereftus, vniflorus.

Calyx hexaphyllus, foliis iribus concauis minoribus, tribus planismaioribus.

Corolla hexapetala, petalis margine vndique leuiter emarginaris, kermefinis.

Stamina filamenris cnpillaribus corolla concoloribus. Antherae ereftae tetragonae,

Pifiilla 5. rarius 4-1. 6. *germinibus* albo-lanatis. *Stigmata* reuohua, compreffiffima, rubra, margine vndulato.

Capfulae ferrugineo-tamentofae, magnae, recuruatae, praeter *Jemina* marura nigra fubglobofa plurima *incompleta* pulchemime rubra, oblonga, compreffa, effoeta conftanter fouent.

Obf. *Folia* primi et fecundi anni fimpliciter renata forma ec magnitudine *Meynyanthu trifoliatae**

66. POEONIA *bumilis* foliolis tripartite-laciniatis fubtus fubiiillolis, capfulis ereftiusculis pilofis.

Poeonia femina laciniata fubtus pubefcens flore purpurea MoriD 1. cir. p. 355. fol. S-

Poeonia tatauica Milleri ?

Caub'r ftesquipedalis, (implex, glaber, filicato-angulofus viridis^

Stipula radicalis fimilis prioris, fed anguftior.-

Folia biternata, petiolis ereftiusculis fupra canaliculatis fub- pilofis : omnibus trifidis. *Folium terminal** triparticum laciniis fublinearibus trifido-incifis; *lateualia* bipartita icerumque incifa laciniis omnibus a cut is. Praeteiea. fuperne caefia, fubtus albidiora pubefcentia,

Pedunculus et *Calyx* prioris ve et *corolla* quae numero peralorum magis variac ec cobre magis fanguinea.

Pifiilla 2- g. viridiufcula leuiter hirfuca-

Capfulae ereftiusculae, breues^ parum pilofae.

67. FOEONIA *officinalis*^ *fuliis* decompositis nudis, foliolis lobatis: lobis lanceolatis, capfulis rediusculis tomencofis.

Poeonia officinalis L.

Poeonia flore pleno rubro maiore etc. *Morif.* 1. c. p. 455. £ 13. 15.

Poeonia polyanthos *Besl EyfL* Vern. ord. vi. f. ft.

Poeonia mafcula Milleri.

Caulis tripedalis, fimplex, canaliculatus, glaber, viridis,

Stipula vna vel alrera radicalis, ouata, cucullaca, rerufa.

Petioli nudi, virides, fupra canaliculati.

Folia nuda (in fylueftri fubtus hirra *Hall. Mill.*) glatira, fingulnri modo compofita. Confac enim, binis petioloruin paribus vnicoqucimpari. *Infimi paris petiolui* terminatur folio tripanito parum jdecurrence : infra hoc par iimplex, er fpatio iterum ab hoc remotD par periolorum rriphylloum quonim terminale eft triphyllum. *Medii partis petiolus* terminatur folio inaequaliter trifido : infra hoc folium vnum vel alcerum feffile, cui fimile ad bafin petioli adeft. *Petiolus impar* vel terminalis fimpliciter triphyllns eft; medio inaequaliter trifido.



Folium in caule supremum ternatum, medio trifido.

Foliola plerumque bi-1. triloba, lobis inaequalibus: omnia lato-lanceolata.

Calyx, Corolla et lamina prioris, fedmaiora.

Qtrmina plerumque terna, albo-romentofa, rarius 2-4-

Capfulae erectae, femigineo-tomentosae.

63. POEONIA *anmala* JoWoYis triparrko-laciniatis, laciniis lanceolatis vtjin-
que glabris, capfulis nudis depreffis.

Poeonia anomala L.

Caulis fere tripedalis, fimplex, viriclis, nudus, subfulcatus.

Folia angusta, nitida, nuda, tecnata, laciniis lineari-lanceolatis, acutis. *re-*
tioli patentes, non adeo diuaticati ac in antecedentibus, supra canaliculan,
nudi. *Folium impar* tripartitum varie et inaequaliter in angustas lacinias
fiffimj ita ctiam *folia later alia*, fedlobus interior reliquis multo minor.

Calycir foliola criaconcaua: tria elongata, lanceolata, faepius partita.

Corolla petalis margins crispatis, punicea.

Filamentum carnea.

Germina 2 - 4 flauescencia, nuda. *Stigma* fa rofea.

Capfulae glaberrimae, multo minus quam in *corallina* recuruatae.

Folium primi anni tripartito-fiflum, flauo-viride, splendens.

Obf. Numerus ternarius huic generi familiaris. Genos *Poeoniae* nimis contract
III LINNE; dilatantC/ MILLER. Character specierum vtique difficilis,
non tamen impossibilis. Si *Poeonia anmala* pro distincta haberi debet ipse
cie, non video cur ni etiam reliquae, nee mihi perficiere potiu omnes
ab vna productas fuisse. Si vero quis aliter sentiat, per me hcebit, tunc
vero binerantum ftatui debent *Poeoniae* species, *officinalis* nempe; et *P.*
niifolia, Memoratas species faepius e feminibus educaui, femper fabi ii-
miles.

69. ARABIS *turritae* L.

Caulis tenuiter villufus.

Folia tomentofa, dentata.

Siliquae minime pendulae, pedicelli enim erefli, filiquae vero curuancur; com-
preffaequidem fed craffiores, lineares fed margine inaequali ec fere ioru-
lofae.

Smina plus triplo maiora, fusco-nigricantia > reniformia, marginata.

70. ARABIS *pendulae* L. autem

Caulis pilosus-hispidus;

Folia ferrata.

Siliquae pendulae, lineares, margine aequales.

Smina minuta, compressissima, oblonga, minime emarginata, flaua.

Quit quid ita que dicac CL LA CHENAL *Obf. Bot.Mtd.\$m* io. diuerfae sunt
species.

71. SJSYMBRIVM *Sinapios*, foliis rftdicalibus runcinatis dentatis hirtis, cau*
linis incis linearibus glabris, filiquis patentibus.
- Plant a biennis.*
- Caules* 3-4 pedales, ramofi, erefti, fubangulati.
- Folia* inferiora runcinato-pinnatifida lob is dentatis: inferioribus diffindtis
remoris, fuperioribus confluentibus 3 parum hirta, fed nerui et margo al-
bo-pilofi. Sapor *Sinapis*.
- Calyx* ei *Corolla* flaua.
- Stigma* capitauun, perfDratum, magnum.
- Clandula* magna yiridis inter piffHllum et ftamen breuius.
- Siliquae* paterites^ anguftiffimae, torulofae, glabrae.
72. EKEBERGIA *capenfis* quam in Aftis Reg. Acad. Scien- Holm. 1779. tri-
meltri quarto defcripiit CeL SPARRMANN ad ClafTem Monad dp h arum
forte amandanda.
73. SIDA *vlmifolia*, foliis inferioribus cordato-lanceolatis, fuperioribus li-
nearibus : omnibus ferratis, capfulis bicufpidacis.
- flanta* annua, bipedalis, erefta.
- Folia* fubms nulliHima, licet.tDmentum vix obferuetur.
- Stipulae* fetaceae.
- Spinae* nullah
- PeduHCuli^xzs^* axillares, vniflori.
- IFloves* lutei.
- Obf.* Potius eft *Sida anguftifolia* Milleri, quamuis feminum biculpidatorum
nullam fecit mention em.
74. SIDA *crifiata* L-
- Huius tres poffideo varietates quarum nulla habet folia panduriformia.
0. *foliis* omnibus laro-cordatis bafi truncata, leuiter crcnatis.
- fiovibus* magnis.
- Dili** Hort. Elth. tab. 2. f. 2. crenis nimis incis.
- y. quam fub *S. haftatae* nomine accepi
- foliis* inferioribus et ramorum cordate-angulatis (forma Hederae Helicis)
vna vel akera crena inftruffis | fuperioribus triangulo-haftatis, acumina-
tis, inregris.
- floribus* multoties minoribus.
- 1, *foliis* inferioribus fimilibus y. fuperioribus quinquelobo-haftatis.
- foribus* magnitudine prioris.
- Obf** & *folia* fuperiora habet panduriformia ct in parte latiore dentata.
- fores* magnitudine inter 0 et y media.
- Capfula* in omnibus imiltilocularis yidetur, rcuera aucem eft vnilocularis, f-
mina enim nullo diflepimento. diftinguuntur.
75. MALVA/w**/*, caule ereiao, foliis quinquepartito-irifidis, caly:e exteriorB fi-
liformi-



Ecollezione ficca *Nob.* IOH. ALSIROEMEK Neapoli faffl benigne com*
municata.

Caulii palmaris, femipedalis, echinato-hiipidus.

Folia circumfcriptione femicircularia, in quinque lacinias anguftas partita: la-
• ciniis apice dilatatis trifidis obtufis.

Calyx exterior nonnihil a flore remotus foliis fubulatis ciliatis.

interior laciniis cordatis acutis ciliaris bafi praecipue echinato - hilpidis.

Corolla ratione plantae magna coerulefcens.

Obf. Cum *Malua Alee** confundi non debet ob pilos echinatos abunde diffin-
fta; differt enim magnitudine, foliorum forma et fuperficie, calycibusque.

76. PHASE OLVShh-tus, caule femiuolubili, leguminibus teretibus, canna
liniftrorfum comma.

E feminibus a *General. D. Celfing* Conftantinopoli allatis excreuit.

Radix annua

Caulis angulatus, hiipidus, 1 - 3 pedalis, flexuofus, debilis, nee ercftus nequ»
volubilis.

Petioli longi, hiipidi, compreffii, fupra canaliculati, bafi nodofi.

Stiptilae oblongae, femicordatae, adnatae, ciliatae.

Fp&repanda, acuta, vtrinque hiipida : *lateralia* oblique ouata: *terminal**
ouato - lanceolatum. Sub lateralibus vnum et fub terminali alterum par m-
pularum fubularum, ciliatum. *Petiolipartiales* communi craliores, OD-
fcuiores non canaliculati.

?^K>fH//axillares, 2 -h pollicares, hiipidi, fubcapitati quidem, licet raro
plus quam duos geriifflores fructificantes : fingulua ad pediedlonun o o r-
tum nodofus. *Stipulii* hi ad bafin inftruuniur foholoium hmilibus.

BraSite, fub floie parua caduca, ciliataj binaealiae anguftae carinatae, aco-
minatae, ciliatae, calycis lateribus arfte appreffis, illiusque longitudine.

Floret fordideflaua, fuperiore impiimis vexilli parie fufcefcnie.

Calyx glabec₄ •

Vexilhm late cordatum in latere dextro intus callum vel'gibbum luteumgent
ab,extra impreffum, complicatum formam habet falcata.

Alae luteae.

Carina fordide flaua, minus quam in reliquis torta, in finiftro latere cornuta.

Legumina patentia, cylindrica, hiipida, vix torulofa.

Semina fubcylindrica, breuia, viridia.

77. PHASE OLV S *nanus*L.

Character a magnitudine braftearum plane lubricus, varietates enim multas
examinaui et vidi illam ita variare, vt in vna varietate maior fit in altera mi-
nor calyce.

78- PHASE.OLVS *vulgarit.*

Idem de hoc valet quoad braftearum magnitudinem.

Vmlhm callum habet fed paruum etiuxta marginem fupra vnguem pofitum.



- . *Squama neEtarifera* inter Vexilli vnguem et ftamen libcrum alba, furfumflexa ipib filamento adnaca. Aliud praeterea
- Nt&avium* oblique campanulntum, pellucidutn, ftriatum pedicellum germinis intra filamentum connatum cingit. Magnitudo huius in diuerfis varietatibus diuerfa.
- Obfi Bratfeae* non patentes fed appreflae et *Alae* amplae vexillo fere maiores, *fiores racemofi* racemis ereftis et *ftipulae* pedicellorum angufliores *anvarietatem coccineam* quae praererea floribus albis etiam ludic, a *Pb. vulgari* diftinguere valeanu?
79. LATHYRVS *fphaerictts_m* pedunculis vnifloris ariftatis, cirrhisdiphyllis finv pliciflimis, foliolis enfiforraibus.
- Flanta* annua, toca glabra.
- Caitlis* angulatus, fupenieiriqueter.
- Folia* binnta, peciolata, linear! - enfiformia, acuta, neruofa. *Pethliliiperio*. res ciirhifeii: cirrho (impliciffimo).
- Stipulae* lineares ytrinque acutae.
- Fedunculi* vniflDri, breues^ ariftari.
- Flos* paruus *L. Nijfbliae*.
- Legumen* tereciufculmn, longimdinaliter rugoflim, longe acuminatum, toru* lofum^ dorfo leuiter carinato fufco-violaceo, polypermum-
- Semina* 10- 12/phaerica, glabra, fufca, punftis obfcursoribus afperfa.
- fiOt VIQlh *globofa*, leguminibus fubfclilibus folitariis, foliolis Duatis, ftipu* lis no tat is quadridentatis.
- Flanta* annua.
- Caulis* angulatusj, nudus.
- Stipulae* praecer vtrajneque apicem dentes habet *binof*? nutatat.
- Cirrho* fimplices.
- Foliola* quatuor ad ofto ouata, pubefcencia, feta reflexa terminata.
- Fiores* axillares, folitarii, erefti, breui pedunculo <nfidentes, *Ficiae fatiuae*, fed coerulefcetes.
- Calyx* pentagonus, kciniis lo'ngis linearibus lanceolatis ciliatis#
- Legumine* patentia, teretia, nuda, feminibns fubglobofis.
- Obf. Ficiae fatiuae* fimilis differt *ftipulis*, longiore *calyce*, forma 1. nmero *le* guminum*, paucioribus *foliis*.
- gi. VICIA *mviantba* padunculis vnifloris ariftacis, foliolis lanceolatis obtufis, ftipulis bifidis.
- Plavta* annua, glabra.
- Caulis* decumbens, bipedalis, fubtetragonus.
- Stipulae* bifida^
- Cirrho* polyphylli.
- foliola* 12-13 decrefcencia, obtufa cum acumine.
- Veduncuhs* cirrho circiter dimidio brevior. vniflwui ariftarus.

Flos tuba venis coerulescentibus, magnitudine *Viciae fatiuae*.

Legumen glabrum 6 - 7 fpermum.

Obf. Demum sub nomine *Viciae fyriacae* communicata.

82. COLVTEA *fiflulofa* cauk herbaceo, foliolis ouatis cemplicatis fubtus pubefcentibus.

Radix fubramofa.

Caules herbacei, angulofi, ftriati, fiftulofi, altero anno florentw.

Stipulae anguftae, acuminatae, fubfalcatae.

I'Ma 7- I₇ fuboppofita, ouata, vix ^{vix} [^] [^] [^] [^] [^] ^S [^]
integerrima, complicata, fubtus iota « fupra circa marginem p
A. W^r T axillary elongati, racemofi, multiflori, pubefceniB, bratteo is
latis.

Calyx pubefcens.

Corollae paruaealbidae vel rubentes, ftriis fanguincis.

Stigma pubefcens, denticulatum.

Stylus nudus.

Legumina comprefla, ouata.

of Sub JL « « -. f cr * — ^ . ^ l ; « « P^elMBsfUb h^oCnD^r
mine dantur fpecies,

In £ « *. ^ r « tiff. i - f c » » « q « « ftylus fup^ei neba^a b^a u.

83. HEDYSARVM , ^ ^ . foHis remans ou«is acun^s Unea«^s vmbefe
axillaribus, ramis triquem^s flexuolis.

. In bo. Icaom fpecimen dedit honoratiff. Amicus P^r. THUNBERG.

Simile in multis *Hedyfaro lineato* ; fed

F_D/w acmiota fubtus tota et fupia margine tomentofa['] - * « ^ ^ J magis ob-
fcara. Ncrui omnes fubtus et fuperwr inteitnedius plutunum tomentofus.

Floret parui feffiles in vmbella pedunculata axillari.

Rami triquetri angulis tomentofis.

Petioli ciliati.

Stipulae filiformes.

84. ASTRAGALVS *Tragacanthoides* U

Quem in Sibiria leftam dedit Nob. PALLAS egregie cum defcriptione Linneana? nSⁿ e^c Plant. ah^a conuⁿ enif^e video, praeter nigreduitm dcnuam calycis, auae deeft. Gel AHALL. R funn *Aftragalum* n. 415- *Tragacanthndem* LIW. I S fau^o cer^te diuerfus / orfe longe niaioribus, yUSr.ouaDs r.tufis et inferne tamum villofis, haec enim in *fibirica* angufto-lanceolata et vinnque vti tota platita exceptis corollis mulium hirfuta.

85. ASTRAGALVS *arenarius* Hudf. ec Lightf. qui

Ajkragahs incanus. paruus purpureus noftras *Raii Syn.* 3. p. 326. c, xu.

. Accepco iam a Cl. D. DRYANDER fpecimine plantae anglicae video ab *arenario* Linn, longe differre. Multum limilis eft *Ajiragak Danico* iam defcribendo, tamen diuerfus videtur[^] Percnⁿem[^] cffe fufpicor et legumina quam in *Damco* Ion-



giora, Mifir planculam nuper nominatus amicus sub nomine ASTRAGALI *montani* Cum descriptione *Astragali montani* Jacqu. Enum. stirp. Austr. p. 265. et *Phacae montanae* Crantz stirp. Austr. Fasc. V. p. 42a. 4. etiam satis bene convenit, sed ab *Astragali n. 408* Hall, stirp. Hebr. a quo characterem suum desumisse videtur HL LINNE' vere differt, ut et ab *onobricide* IV Clusii, *Astragalus montanus Sibiricus* quem amicariae /?. PALLAS debet etiam ab hoc diuinius et magis forte quam Helueticus.

86# ASTRAGALVS *Dam'cus* caulescens, decumbens, hirtus, capitulis longe pedunculatis, leguminibus breuibus inflatis pilosis.

Astragalus arenarius Flor. Dan, tab. 674.

In Selandiae Danicae arenosis crecit.

Planta 3 - 4 pollicaris, tota pilosa, viridis, non tomentosa alba,

Radix ramulosa.

Caulis decumbens, angularis, pilosus.

Stipula? oppositifoliae, folitariae, amplexicaules, bifidae, basi membranaceae* albae apicibus viridibus.

Folia alterna, foliis plerumque 21 ovatis, lanceolatis, planis.

Pedunculus longus, plerumque vnicus in planta*

Capitulum 7 ad 12 florum, floribus erectis subpedicellatis

Batlea lanceolata nigro-pilosa sub quous flore.

Calyx viridescens nigrus - pilosus, dentibus quinque acutis quam in *arenario* multo longioribus.

Floris *Fexillum* margine coeruleum subfalcatum. *Alae* et *Carina* apice tantum coeruleo, vexillo breuiore,

Pistillum carina longius, stigmae capitellato,

Legumina pilosa, lateouata, breuia rurgida, nonnihil depressa, apice breui recto, omnino bilocularia, loculo 1 - 3 spermo.

Obf. Legumina in i^o figura supra allata acuta et longiora pinguntur,

87. ASTRAGALVS *arenarius* caulescens ramulosus erectus tomentoso-albus, foliolis complicatis, pedunculis subquadrifloris, *dicendus**

Iconem vide Tab. III.

Descriptionis in Fasc/ Obf Bot. 2. n. 7J. adde

Foliola complicate,

Legumina falcata.

gg# TRIFOLIUM *incarnatum* L.

Huius ut puto varias est.

Trifolium rttbens Mill-Dift. abridg. cni

Folia minime crenulata, sed integra et potius canalicata quam orbiculata.

Corolla monopetala, colore omnino *Amaryllidis formosissimae*.

Filamenta apice incrassata, imprimis inferius, quod etiam longius.

Calyx lobis hirsutis.



Legumina monofpsrma.

Planta tota hirtuta.

Spica manu traktata odorem fpargit fortem Cucumerum recentium.

89. SCORZONERA. tt/f ^ L ?

Vel culcura plurimum variat, vel sub eius nomine binae diuerfae plantae obueniunt; in nostra enim, cuius femina sub hoc nomine accipi.

Radix biennis.

Caulis erectus, ramofus, demum glaber.

Folia nuda, glauca: *radicali* v. integra fpathulata vel laciniata caulinis fimi-
^ *caulna* pinnatim laciniata lobo terminali fpathulato, lateralibus a - 3
PWum lanceolatis j *fuprema* fimplicia vel linearia vel fpathulaia.

Calyx et Corolla omnino fimiles Scorzonerae laciniatae.

Differt ergo folia foliorum forma a *Scorzonera laciniata* etiam in hortu obuia, quae non iolum cum definitionibus *Lumema* fed etiam cum defcriptionibus ab *Hat-Zero* et *Polchb* datis optime quadrat. De varietate *Monfpelio miffa* loquitur HALLEK, quae nostra *effe* videtur, an itaque nostra nihil aliud fie quam *infigms* vanetas *Scorzonerae laciniata** (Certe *Scorzonera refejifolta* Gouan III. et ObC p. S3. maxime a nostra recedit.

90. SENECCIO *vniflorus*, corollis nudis, foliis ouatis dentatis, erofis, pedunculis vnifloris elongatis.

i'/aw/afannua, indica.

Caulis 1. 2 pedalis erectus parum pubescens.

Folia alterna, ouata, dentata, in florente planta erofa et lyrata, fcaabriufcula.

Pedunculi axillares, folitarii, longi, foliofi, vniflori.

Calyx cylindricus, bali hemifphaericus.

Perianthium *exteriori* breue foliolis patulis fubulatis.

Interiorius longius foliolis linearibus quafi agglutinatis, apicibus hinc inae nDtans.

Corollulae omnes tubulofae, limbo ftingmatibusque rubris.

Receptaculum cauum.

91. CENTAVREA *moschata* L.

Nulla inuenio nota, qua varietas *fi* vel *Centaurea AmlerUi* Millcri
a r < A v e: cen faUre. mo fbata eiusd. bene ditingui poffit. Viramque viam
examinaui.

92. CAREX *chinensis* spicis erectis, mafcula terminali foemineis pedunculatis quaternis, capfulis acuminatis.

E China miffit Cl. BLADH.

Gramen fpathameum.

Foka culmiflongiora, margine fcaabra.

Culmi triquetri, glabri.

Spica foemineae omnino *Pfiudo. Cyptri*, fed erectae rem, rap, cv
niiores et sub Cngula «c«ae, remotae, fohtariae, te

Imolucrum tenue vix spicae longitudinem attingens.

93- *SALIX nitida* S. G. GMELIN it, Ruff T. 3. p. 282. t. ig. fine dubio est
&?/* *aegyptiaca* L.

Quamuis folia integra subhirsuta suae tribuit *Gmelin*. Cui enim nota fit iaculum polymorpha natura etiam facilem hanc esse variationem concedar. Non forma tantum foliorum sed etiam color ramorum et amenrorum *cum nomine* Ferfico *Badmufcbk* et aquae Amctorum abstractae odor fuadent.

94. ANDROPOGON *contortum* L.

In hoc *fiosculi mufculi* femper murici calyce piloso, sed in aliis specimenibus alio modo. In specimine enim nuper accipito calycis gluma exterior iuxta marginem superiorem verruculas albas callosas pilos albos saepius stellatos gerens habet. In alio specimine gluma cava pilis longis eiusdem colonis obfita. Gluma interior nuda vti etiam flores fertiles ad alterum latus spicae fiti.

55. ANDROPOGON *ww'^to* panicula contracta, spicis verticillatis, calycibus muticis muricatis.

Dedit *Honoratiffi* KDENIG.

Gramm 5. pedale et ultra glabrum

Culmus compressus.

Folia angusta.

Panicula spithamea, contracta, et spicis flexuosis, erectis, verticillatis, bipolaribus.

Flos masculus pedunculatus hermaphroditus feifilis.

Calyces parvi subaequales, valvula altera muricata.

Vistilia purpurea.

Arifia nulla.

Tamulis *Wottiwae* Y. Radices ab indigenis vitatiffimae ob gratum odorem, quem aqua irroratae spargunt. Ex his *Flabella* praecipue parantur, quae penis Pauonum ornantur. *Koenig**

96. ANDROPOGON *harbatum* L.

Descriptioni in *Mant, Plant, alt.* p. 302. datae, adde:

Culmus saepe ramofus.

Folia plura vaginis barbatis ciliatis.

Pedunculus sub exitu spicularum incrassatus, pubescens.

Spicae conniscentes, umbellatae.

Rachis teres, scabra.

57. ANDROPOGON *ow'^*, spicis fasciculatis leuibus, flosculis alternis subfeffilibus, fecundis, arifatis.

Habitat in Gallia meridional!. *Stmina* comunicavit *Cl D.* DAHL,

Gramen annuum radice fibrosa,

Culmi pedales, foliosi, ball ramofi.



Folia hinc inde ciliata, oris nudis.

Spicae terminatae, fasciculatae, 15 - 16. minime umbellatae, patulae, fiovihu: fecundis, alternis, in rachi lineari plana fere feffiles,

Calyx valuulis fubulatis, inaequalibus, flore breuioribus, muticis.

Flos hermaphroditus valuula exteriori longiore, ampleftente, ariftata : interiori minure ciliata.

- - neuter paruus, pedicellatus, ariftatus, arifta breui.

Fades Andropogi barbati.

98. A E GIL OPS *vuata* L'.

Calycis gluma altera tri-altera quadri-ariftata praeter calycem terminalem.

99. LICHEN *fluuiatilis* Wfb. Spic. Gott. p. 265. t. iv.

Super Japides in riuulo prope Waftra Karup in Scania legi, etiam finefructificatione.

Mihi omnino videtur DILLENIVMfub fuo

Lichenoides imbricato /undo Hift. Mufc. t. 30. f. 1ag. noftrum intellexifle, figura licet riDn adeo bene refpondeat, nimis properanier itaque hanc *Dilleni* iconem ad varietatem rupeftrem *Lichenis miniati* Nob. DEDEB. in Flora Danica et LIGHTFOOT in Flora Scotica retulerunt,

Lichen fluuiatilis Hudf. Fl. Angl. ed. 2. p. 436. a nDftro certe diuerfus eft, id monftrante figura *Dilleni* et epitheton *gelatinofum*.

100. LICHEN *fphaerocephalus* Web. Spic. Gott. p. 198-

Eadem ratione qua ego in Aft. R. Ac. Sc Holm. 1769. p. 249. et Fafc. ObC Eor. 1. p. 31, *Mucuran furfuracevm* ad Lichenes retuli, *Muvores fphaeroccephaium* et *Lichenoidem*. Lichenis fpecies fecit Cl. WEBER. Vereor autem ne perperarn *Trichiam HalUri* fob hoc lichene adduxerit. *Trichia* enim haec certe eft *Lycoperdi* fpecies et proxime cum *Lycoperdo aggregato* Frodr. Fl. Scand. 1627-^{con} lienir



Mosbrough

IOH. GERE KOENIG

MED, DOCT. SOC. PHYSIOGR. LVND. NAT. SCRVI.
BEROL. ETC. SOCI.

DESCRIPTIONES
MONANDRARVM.

PRO ANNIS

1778 ET 1779.

•

•

* * *

OPTIME KOENIG.

Descriptiones Tuae exadiffimae, quas Te infcio publicas patrio, adeo gratiae mihi fuere, vt quum veniam dederis illas cum amicis communicare, in dubium non vocaui, quin etiam concederes, vt illas diuulgarem, quo omnibus Botanicis laborum Tuorum fructus vni voluptatique effete

Ex his descriptionibus, quas liuntuofis non minus quam periculofittimis icineribus comparasti, mecum ceteri Ledtores facili negotio difcere poffunt, characteres 'Gneium *immortalis* a' LINNE' quae *Scitamineas Monandras* plurimas lpeftant omnino infufficientes eflé; nec haec mirari debent, mulro minus acriter reprehendi, ve iam mus est; obferuari enim debet, Virum vere magnum omnes fuas harum defciptiones a ficcatis fpeciminibus cuncinnaffe. Quam vero ardua hneec res fie *in genere*, multo magis circa ficamineum ordinem, nullum vel tantillum etiam pericum Bocanicum fugere poreft. Dixie quoqueide:) in ed. XIII. Syftematis p. 49. *Chara&er Amomi > Alpiniae, Cucumae, Thaliae ab antoptis in plantis vixtis accuratius defcribendus est.* Huius magnam partem egregie fane abfoluifti, nimis aiuem caucus noluiifti, muka conftitueie genera, anrcquam umnes notae vel fahem ab aliis diflae fpecies exaftitudine Tibi confueia examinatae fuerinr.

A me eMegifti, vr de his quid fencirem, dicerem. Sed Amice honoratiffime quidfenciam, quid difcutiam, quid certi ego determinem, qui Flntas has nequidem ficcaras vidi^ Ne autem umnino nihil relpondeam, cogitaca mea mihi ipfi dubia Tuo iudicio fubmitcere fas est.

Scitamineae forte vnicum genus naturale conftituunt, cuius *charaBer essentialis* confittic in *Calyc** fupero, *Limbo* duplici ramen monophyllo, *Filamento* corollae adnato | ideo autem neceflhrium puco, illud in plura artificialia diuidere, ve facilior euadac fpecierum cognitio, alias enim nimis prolixa forent et fine dubio confufioni anflim praebences fpecierum definitions, quum, quae iam characterem generis licec artificialis intrant, momenta, definitionem Ipecificam neceffario incrabunt.

Ex hoc fundamento rentau, Plantas a Te hie defcriptas in Genera diuidere. Sed vnde ddlimi debec character? Sola *corolla* haud fiifficit, multo minus *Limhus interior*^ queni minus refle neftarium vocauic ///. d LINNE' genuina neftaria in his Plancis ignorans; *Calyx* varius nihil decerniac j abfenlla, praefencia et forma *Ne&ariorum* maxime inconftantem dabunc characterem. Fericuium ideo feci *Limhum corollae* et *Stamen*, imprimis vero *Antberam* in plurimis pulchre appendiculatam in conftituendis Generibus cc quidem hoc modo adhibere:

- I. ZERVMBILTH. *Cor.* fubperfonata. *Filam.* 4. *Anther* a 1. biparcita.
- 2- HVRA *Limb** *inter*, bifidus. *Filam.* alatum. *Anther* a coronata membranula.
- g# KAEMPFERIA. *Limb*, vterque tripartitns. *Axtbera* n||d*, vtrinque recufa.
4. ALPiNiA. *Limb*, vterque criparcius. *Antbera* membrana coronaca, mucica.
- 5, r. VRCVMA. *Limb*, vterque triparcius. *Anthra* coronula membranacea calcaraca. {*Jtigma* 4 *dentatum*?)



6. ZINGIBER. *Limb, exter. tripartitus, inter, bifidus, Anthera rostro coronata.*
7. AMDMVM MONTANVM, L/wf. *exter. tripartitus, inter, ouatus, integer. Anthera corniculo coronata.*
8. COSTVS. *Limb. exter. tripartitus, inter, trilobus. Anthera nuda.*
9. HEDYCHIVM. *Limb, vterque tripartitus. Anthera nuda basi haftata.*
10. AMDMVM 5, *Limb, inter, trilobus dupliciter cordatus. Anthera coronula femilunari.*
11. AMOMVM 2.7. 9. 15- a6- 17. *Limb inter, indiufus, Anthera membrana Integra vel diufâ. corDnata.*
12. LANGVAS 13. 14. AMOMVM 4. *Limb_m int. indiufus. Anthera nuda-*
13. BANKSEA. Z/wi. »/. *cucuUnto - caiiipanulatus dorib fiffus. Anthera apice filamenti recuruo coronata. {figma biglandulofuni.}*

Sed fateor multa mihi fupereflê dubia, quin hanc diuifionem optimam crednm j fateor leue effê difcrimen inter *Hedyvhium* ec *Kaempferiam* nifi force calycis forma aliquid valeat, fateor etiam charaſterem generis vndecimi mihi nondum fufficere, vt reliqua tacl^êam. Tentauit tantum, Tuum eſt limam fuperaddere.

Probe video, nihil abfolure certi de horum Gene rum charaſteribus determinari poſſê, antequam reliquac fcitamineae Indiae orientalis vti *Zingiber*, *Zeduar*, *Cardamoma*^ varia, *Galangae*, *Curcuma rotunda* etc. defenptae (Int. A Te haec Iperamus, qui tanto aniore Sciential Botanicae ardes, qui tot pulcherrimas nouasque Plantas *heato* JLINNE' et aliis communicati, qui nullis periculis.nullis funitibus parcis, vt noua detegas ipfeque videas.

Vale Amice honoratiffime femperque a ma

Tibf

addiEliffimum

R E T Z I V M.

HVRA *Siamenfium* Nouum Genus.

Radices nodosae, fupernefibris nuinerufis horizontalibus (iibfimplicibus filiformibus (ibrillisque hiriuiufculis obfitae, craflitiem pennae anferinae fuperantes.

Caules plerumque folitarii, ereftiufculi, parum comprefij, glabri, aphylli. Supra radices *vaginae* alternae, adpreilae: fuperiores remotiores glabrae apicibus rotundatis cauletn ambiunt. Ab his ad temam vsque partem nudi, viridi-rubro-variegata-colorati, bipedales.

Folia infra medium fcapi feffilia, vaginis adnata, patentiffima, ouato-oblonga, acuta, integerrima, vtrinque leuia. In pagina fuperiore *venae* fimpliffimae parum prominulae ftriata folia efficiunt. *Inferiura folia* minura funt et magis ouatn₇ fumma acumine lpngo cerminantur.

Racemus terminalis, fpicatus, fimplex, ereftus.

Pedunculi cum munis parum flexuufus et comprefus, fcapo minus coloratus, vix pedalis.

Pedicelli terni, (implices, pacentiffimi, alterni, teretiufculi, leues₇ triflori, ab inuicem parum remori, vix pollicares, inuolucrati,

Inuolucra pedicello Yum folitaria, adprelta, uuatu-oblonga, acutiufcula, marginata, vcrinque leuia, membranacea, femipollicaria, caduca.

- *fiovum* fingula fingulum florem obuoluentia, magis concaua, carinata, colorata, prioribus mulco minura > caduca.

Flores terminal es, plerumque tres, feffiles, fingulo pedicello horizon tali ter adnati, viuiffime aureo-colorari.

Calyx. *Perianthium* fuperum, monophyllum, patens, tubulofodauatum, infra medium parum conraftum, verflis apicem inflarum, a pice rifido, glabrum, leue, colorarum er pundhs fanguineis adfpeiTum. *Lacinae* duae lateral?* longiores, minus diuifae, ouatae, ciliatae, acumine pruminul[^] corniculato terminatae: *inferior* breuior parum incuruata, rotundata, ciliata pilis albicantibus.

Corolla monopetala, irregularis, bafi tubulo(a_#

Tubus filiformis, calyce multo anguftior er longior, extra calycem (inter lacinias laterales calycis) ereftus.

Limbus duplex quinquepartitus. *Lacinae* tres *exterior*es ouatne, acutae, integerrimae, concauae, membranaceae, viuide coloratae; harum duae inferiores patentes, fuperior vero eretla et nonnihil longior: *Lacinae* duae *intrivres limbi* bafi duarum inferior urn limbi exerioris adnae funt illisque incumbunc parenciufculae, lineari-oblongae[^] apicibus rotundatae, longitudine exteriorum.

Stamen vnicum-

Filamentum fauci tubi adnatum et decurrens, extra rubum ereftum, lineare, canaliculatum, prope medium vtrinque lobato-alarum; fupra alas iterum canaliculatum, ad apicem incuruatum, corolla multo longius, glabrum, nitidum, fanguineum. *Alae* memoratae, patentiffimae funt, apicibus retufte, planae, leues, nitidae, filamentum vtrinque duplo latiores, fubcarnosae, aureo-rubentes[^] longitudine tertiae partis ftaminis.

Antbwa terminalis, pendula, cordato-haftata, magna, plana, apice obtufiufculo, terminata membranula magna acuca. Apices laterales patentes, acuti, longi, membranacei. Pagina anterior feu dDrfum parum conuexum. Ai interius verfus florem vergens laius prope apicem antherae duae veficulae oblongae, lineares, acutae, verfos bafin inflatae, callofae, dehifcentes, polliniferae,

Piflilhan, *Germen inferum*, parum rugofum, laeue.

Stylus intra cubum capillaris, extra tubutu a fulco ftaminis recipitur nec non a veficulis antherarum, ftamine vix longior, albus.

Stigma tubulofum, ftulo craffius, apice perforatum, obtufum, tenerrime ciliatum.

Pwicarpitn. Capfula globofa, fulcato - rtigofa, Cardamomo minori parum minor, obmfior.

Semina plurima ouato-angulofa.

Habitat in nemorofis graminofis Infulae Young- Ceylon ftis frequens. In fyluis prope urbem Malacca rarior pygma.

2. AMOMVM, an *Ghhbam'spa*?

Rumple Herb. Ainh. Vlp. 133. tab. 61.

Radix filiformis infra humum decurrens, minus diuifa, longa, fibras parallelas emittens, alba, vix craffitie pennae anferinae, fob caules parum adfeendens, annulaca, craffitie digiti et vix femipollicaris, demum in UK berculum glDbofum incraflata, glabra, viridis, fquatnulis vaginata; ex hoc tub ere;

Cavl's folitariws, ereftus, comprefliufculus, vaginatus, bipedalis, craffitie d[^]giti minohs, ad apicem reraruatus, foliatus.

Folia alterna, pacentia, petiolata, bifaria, oblonga, acuminata, integerrima, inferiora latiora, fumma apgufta; fupra glabra venis fimplicibus obfoletc ad angtilum acutum lineata, infra romentofomollia, cofnta.

Petioli triangulares, leues, vix pollicares, in vaginas defmunt ore longitudinlter filib et paium lacero-ciliato. *Vaginae* ad apices oblongae, acutiulculae, poftea tubulofae glabrae, *inferiores* caulis breues aphyllae, *hiltbi* radice ouatae, acutae, breues, vix pollicares, in iunioribus minus coriaceae.

Florei ad radicem feffiles, fafciculatim conferujpatbis plurimis ouatis membranaceis femitransparentibus tuboque longe breuioribus inuolucrati, oblique adfcendentcs»

Fafculi bomm ^ faepius ad pedis diftantiam a caulibus remoti, parui pro- rkunt.

Calyx duplex.

Exterior : *Spatha* monophylla, inuolucris breuior, bafi tubulofa, pilis punflisque rDfeis adfperfa, carnofa, alba, ad apicem bifida j *laciniis* membranaceis rofeo-pun Claris, minus tamen ad apices.

Interior : tubulofus, ad apicem inflatus, bifidus, membranaceus, pellucidus, longitudine tubi floris[^] *kciniis* ouatis, acutis.

Corolla monopetala.

Tubus incuruatus, bafi anguftior, ftriatus, limbo dupb longier (vix femipollicaris, bafi lineam, fub limbo tres lineas in diametro habens) albus, bafi pilis adprsfis fericeis barbmis.



Limhu irregularis, quadripartitus. Laciniae tres exteriores ereftiufoeulae, fiibacuales, ouatae, acutae, membranaceae, concauae, albae, femi-transparentes : inferior parum longior npice incuruato callofb j lacinia quart a interior cum exterior e fuperiore ad faucera tubi floris con-nata, adfcendens, obuerte ouata, emarginata, apice crispam, denticu-lara, margine reuoluta, concaua, niuea, difco longitudinaliter callofa; pagina inferiors flaua, fericea, reitquis laaniis duplo lungior et multo laciort figura dimidia campana?.

Stamen vnicum,

*Filamentum in tubo floris cum lacinia inferiore connatum, ereftum, la-tum, callofum, bnfi dilatatur, laeue, lacinia corollae multo breuius**

Authera oblonga, vtrinque obtufa, magna, altero latere fulco exarata al-tero plana, ad fuperiorem apicem coronata fquamulis cribus, ereftis, qua-rum binae lacerates lineares angudae obtusae, media his rriplo latior, rotundaca, denticulata^ plana, iota alba.

Piftillum.

Germ en inferum globofum, tubo floris vnitum/paruum.

Stylus intra tubuin capillaris, glabei^ albus, longitudine antheram liiperans et inira rimam ipfius inclufus.

5//gi7ft;campnnulatum, comprefum, margine ciliawm^ latitudine antherae, bad callofum, album.

Pericarpium. Capfula folitaria ad radicem feffili Sj globoia, parum vtrinque de-preifa, inaequaliter et profunde fulcata, inter fulcos carinata, ruberculis fubechinata, trilocularis, magnitudine cerali maioris.

Semina plerumque nouem, raro plura.

Obf. In meis exemplaribus capfulae folitariae remutac funr.

Habitat in fyluis opacis.

3. AMOMVM *Montanum* ftrobilo coccineo.

Lampuio maiori proximum. Rumph. Herb. Amb. V. p. 143.

Kalah Siamenfibus.

Radices nodosae fibras filiformes perpgndiculares emit rentes fibrillisque plu-rimis obfitae, craffitie digiti.

Scapi plurimi, ere^i, parum diftantes, teretes, vaginati, renaces^ craffitie pennae anferinae, quadripedales,

Vaginae plurimae : inferiores approximatae, breues, latiores, ouatae, magis coloratae : superiores oblongae, apicibus rotundatis, nwrgrinae omnes, le lies, fubcoriaceae.*

Folia alcerna, bifaria, patientiufoeula, petiulata, ouata, acuta, vtrinque leuia, leuiter ftriaia, incegcrrima, fuperne nitida venis nonnihl eieuaiis ad angu lum acutum ftriaia 5 fuperiora anguftiora, minora.*

Petioli femitereues, breues, callofi, craffi.

Flores e radice cum proprio pedunculo a caule parum remoto egrediuntur, in fpicam ftrobiliformem elegantiflime coccineam ouato-oblongam acu-tain colleCti.



Pedunculi simplices erecti, interdum parum incuruati, vaginis plurimis vestiti, glabri, elegantissime CDCcinei, scapo crassiores, palmares, raro spithamei, in picam folicariam patentifuculam terminau.

Spica ftribiliformis, DUato-oblonga, acuta, e bracteis magnis rotunda^s imbricatis, concavis compolua.

Bra&tae integerrimae, leuiter ihiatae, fubcoriaceae, coccineae.

Vhs inter fingulam bratteam fulitarius, feffilis, receptaculo coftimuni infidens.

Calyx. Sparhae diphyllae, ahernae, oblongae, neruofae, membranaceae, pellicidae, fubaequales, tubo floris dimidio brcuiores.

Corolla munopecala, irregularis.

Tubus erectus, curuatus, aequalis, glaber, albus, longinidine bractearum, infra faucem parum crassior.

timbus obliquus, quadriparritus. *Lacinia superior* erecta, planifucula, oblonga, acuta, integerrima, neruis plevumque ftriata, alba; *inferiores* duae patentes, minus diuifae, approximaiae, lanceolatae, acutae, glabrae, albae neruisque ftriatae, longitudine *superiori* aequales, infra diuifuras lobo interiori prope bafin longitudinaliter adnaeae. *Lacinia quarta* interior bafi in tubum cumy^{r/or}/connata, patens, ouata, aciuu, planifucula, bafivntnquebibba, maculis lineolisque fanguineis ec albis marmoris infar pifla, reliquis mtiUo latior, longitudin? vero acquallis.

Stamen vnicum, petalo interiore brcuus.

Filamentum planifuculum, fauci ad laciniam fuperiorem adnatum_pbreue, coccineum.

Anthera oblonga, comprefliufcuh₃ magna, apice corniculata, dorfo conuexa, alba, glabra, altero latere fulco diuifa pollinifera. *Corniculum* filiforme glabrum, apice bifulcato, purpureum_y lungitudine antherae.

Piflillurn. *Uermen* inferun[^]oblongum, paruunij album.

Stylus intra tubum capillaris, a rima antherae et corniculo recipitur vix hoc longior, glaber, albus.

Sigma campnulatatum, cilia turn, album, mediocre.

Fericarpium. Capfula comprefliufucula, parabolica, apicibus obtufiufculis, exteⁱDre latere conuexa altero planiafucula[^] bilocularis, polyfperma.

Semina angulofa.

Habitat in fyluis opacis montofis.

4. AMOMVM littorale.

Radices nodosae, articulatae, fibris filiformibus inftruttac, aromaticae.

Caules plurimi fimpliciflimi, teretes, erefli, ad tertiam circiier parte_m aphylli, fuperne nutantes, homine altiores, fupra radicem chuaati, globofi, glabri, vagina vnica inclufi[^] demum vaginis tribus vel quinque alrernis remotis cauli arte adnatis obuokui. In fummo cauls vaginae oblongae, marginatae, :iliauas, adpreffae, virides.

Folia bifaria, alterna, petiolata, patentia, oblonga, acuta, inregerrima, leuicer ilriara vt i in omnibus fcitamibus mDs eft. Inferiora folia magis r^{scm}ota, minima.

Petioles patentcs, glabri, compreffii, breues, lignofi.

Flores ad radicem vix e terra prominuli, numeroſi, in fafciculos denſe con-
ferri, inuolucris numeroſis bi'adteaci, magnitudine oui anaris.

Pedicelliz radice intra terrain breues, teretes, fquamis paruis obueſtiti, albi,
vix craſſitie digiti minoris.

Inuolucra exteriora (effilia, imbricatim adpreſſa, orbicuhto-cordata, acuta, in-
tegerrima, apicibus dorſo parum carinatis, extus leuiter ftriata, incus le-
uia, lineis lon^icudinalibus albis pellucidis alternatim ftriata, fubcuriacea,
rigida, margine tenaiore ferruginea,

Braftea ſingula ad (ingukim florem infra germen receptaculo floris adnata,
lineari-lanceolatii, inregerrima, apice aciuuſculo incuruato ciliato, con-
cnuua, extus glabra leuiter ftriata ad apices pilis raris adſperſa^ alba fub-
pdiuſida, intus leuis, (pathis florum parum longior, laticudine aequa-
lis.

Calyx duple*:

exterior. Spatha monophylhi, vtrinq̄ue parum inflata et carinata, comprell
fa, tubo floris latiur, membranacea, alba, apice bifida, *laciniis* cum api-
cibus flori adpreſſis, acutiſ, ciliaris, roſeis, tubo floris pafum longio-
ribus.

interior monophyllus, bai tubuloſus, ouato-lanceolatus, labio maximo
inferiori floris adpreſſus, integerrimus, acutus, minus concauus, mem-
bra naceus, roſeus, praeferrim verſus apicem maiore floris labio angu-
ftior, parum breuior.

Gorilla monopetala, baſi tubuloſa.

Tutus erectus, parum curuatus, glaber, albus^ pollicari^ interdum non-
nihil longior.

Limbis duplex: ^

exterior paruus, irregularis, cum labio maximo interiore ſupra tubum
vnitus, tripartitus. *Lacinia ſuperhr* anchorae incumbens, oblonga', oua-
ra> integerrima, acutiufcula, tenerrima, membranacea, elegantiflime
fericeo-coccinea, breuior. *Inferiores* duae approximatae labio infe-
riori interiorique maximo adpreſſae, lanceolatae, acutae, tenerrimae,
parum breuiores.

interim et inferiui labium ftamini oppoſitum, cordatum, marginibus
tenerrime vndulato-crilp̄um, elegantiflime aurantiaco coloreſucattm,
apice recuruatum, diſtiche bidentatum, concolor.

Diſcus floris vtrinq̄ue iericeo-coccineus.

Stamen labio inferiori oppoſitum.

Filamentum latum, planum, carnoſum, rigido, breue, coloratura.

Anthera adſcendens, oblonga, apice lato truncato, emarginatn, dorſo le-
ui nudo, pianiuſculo, colorato j akera pagina profundiori fulco longi-
tudinali diuifa. inde ad margines fertilis, albicans 7 labio inferijori
oppoſita, dimidio breuior et multo anguſtior.

Pijillum.

Germen inferum, paruus, album, glabrum, compreffiuſculuin.



Stylus intra tubum tennis, glaber, albus, extra cubum adfcndens in fulco antherae, hacque parum longior.

Stigma clauatum, dorfo callofitate acutiufcula prominulum, rofeum, forma fere cupulae, concauum, margine tenuiffime ciliaco albicante.

Pericarpium. Capfula oblonga, ubfolete triangularis, putredine euanefcens, *Semina* plurima angulofe.

Obf. Folia ad apicem nutantia longitudine pedis vnus.

Habitat ad litcora maris in infulis paruis Young-Ceylonenlibus, locis decliuibus, folo argillofo.

5. AMOMVM.

Kaputh Nay prope Caftellum D. Ligth nafcens.

Radices nodofae, articulatae, ad aniculos vaginis cinftae, Zinziberi limilimae.

Caules plurimi remDtiufculi^ fimplices, erefti, apicibus parum nucames, iereces, glabri, vaginaii, craflrie pennae anferinae, homine altiores, infr^i medium aphylli, fupra radices dauati, globofi, coccinei.

Vaginae caulibus arfle adpreffae, glabrae, apicibus rotundatis emarginatis infra marginem apice callofo prDminulo, leues, coloratae, viridimarginatae | inferiores breues, superiores longae, remocae.

Folia fub-bifaria, minus quam in pra^cedenribus patencia, petiolata, ouato-oblonga, acuca, apice elongato tortuoib, incegerrima, lcuiffime ftriata, lacte viridia 3 fuperiora maiora, iDngiora,

Petoli comprefli, dorfo conuexi, breues, leues, ad vaginas parum decurrentes ec dehifcentes. *Ora* in vaginis foliorum fupra peciolum eminent rotundata, marginaca, languinea.

{ *Pedutmi* e radicibus laterales, folitarii, horizontaliter curuad, verfus apices ex humo parum adfcendentes, teretiufculi, articulati, vaginati, fpi-thamei> craflitie vix digiti minoris.

Vaginas alternae, bifariae, numerofae, breues, cordatae, glabrae, carnofae> coloratae.

Flores in fafciculum ouato-oblongum denfe conferti, fob floreandi initio uuura gallinaceum aequantem, finguli feffiles brafteisque diflinfli.

Bra&eae duplices fingulu fiori infra germen adnatae ;

exteriores cymbiformes, apicibus nonnihil magis concauis rotundatis, obtufis, inaequalibus, ciliatis, marginibus membranaceis, fubpellucidis, dorfo rotundato rigidioribus j neruis albicancibus ftriatae, glabrae longitudine tubi floris.

vreriores tubulofae, marginibus vtrinqe comprefTae, carinatae; rigidac, vtrinqe denticulo terminatae^ bafi villofae, glabrae, pellucidae carinis exceptis, exterioribus dimidio breuiores.

Calyx. *Pmanthium* monophyllum, fupcrum, tubulofum, comprefliufculuni, incuruatum, marginibus carinatis, glabrum, tridentacum : denticulis adpreffis, CDrdaris, acutis, aequalibus; membranaceum, fubrofeum, longitudine tubi floris.

Corolla monopetala, irregularis, tubulofa, fupera.

Tubus ereflus, minus curuus, comprefliufculus, verfus faucein vix incrafatus, lcuis, albus.

ZJrnbus duplex :

exterior tripartitus ; *lacinae* ereEtae etpatentes, obuerfe ouatae, integerri-
mac, niueae, fubaequales: *fuprior* ad dorfum antherae parum latior, lon-
gi(udine tubi floris. *Interior* reliquis longior, latior, patens, trilobatus
. concauus, albas: lobus intermedius clauato-bifidus planus minimus, laue-
rales oblique rotundaci, crenulati, inrermio, muUo maiores. Forma
huius limbi fere eft dupliciter cor data.

Difcus lineis punftatis verfus bafin decurrentibus coccineis piftus pilisque
luteis adfperfiSj rigidior.

Stamen. *Filamentum* planum, glabrum, niueum, breue, fauci innatum, ad-
fcendens.

Antlera lineari-oblonga, planiufcula, coronata, anteriori latere fulco di-
uifa fertilis, pofteriori conuexa, glabro, nwda, tota niuea.

Coronula antherae dorfo adnata, erefta, femilunaris, plana,; anthera Ions
gior₃ niuea.

Pifillum. *Germen* inferuih, fubcomprefTuin, partium, coloratum.

Stylus intra tub urn capillaris, glaber, a fulco antherae demum receptus,
verfus ftigma aliqu^ntulum increaftatus et pilofus.

Stigma clauatum, fub campanula turn.

Pericarpium. Capfula baccata, globofa, obfolete trigona (interdum parum
oblonga) glabra, carnofa, triloculaha, polyiperma.

Semina nidulantia, angulofa.

Habitat in nemorofis prope Young Ceylon.

Obf. Fruelli5 ab incolis comeditur, magnitudo Pruni communis. Habitus
huius plantae cum figura *Rumphii* Herb. Amb. VI. tab. 60. quodammodo
cunuenit, praefertim cum fasciculis fiorum B. C. attamen fasciculi iunio-
res fimiliores *Lampujo maivri* Herb-Amb. V. p. 156. t_f 64. § i,

AMOMVM' *Zerumbeth.*

Rumpb. Herb. Amb. V. p. 6g - 72. tab. 6g.

Radices nodofae, circulis annularibus remotis obfoletis cinftae, foboliferaef
di<nro vix craffiores, luteae. Curcumae limillimae.

Caulis nullus ni(i *petioli* 3 -5 inuicem vaginantes e radice prodeuntes, erefti,
concaui, leues, laepius canefcentes, vix pedales, foliis terminati.


Folia patientiufcula, oblongo-ouata, acuta, integerrima, vtrinque glabra, le-
uiter zi denfe friata, ad neruum in pagina fuperiore vtriuque macula lon-
ga purpureo-fanguinea colorata.

Pedimculus folitarius ereftus/inter petiolos egrediens, teres, vaginis tribus
remotiufculis inftrufus, peciolis craffior, breuior.

Spica eredta, clauata, apice ventricofa e brafleis inflatis, coloratis, foliis breuior^

BraEleae duplicis ordinis ;

exteriorum infimae vel ad bafin fpicae eredliufculae, vix inflatae, viridiores;
intermediae patientiores, parum inflatae, albae; fummae inflatae, purpu-
reo-rofeae, omries clauatae, oblongae, membranaceae. Singula harum
includit. quinque vel plures flores cum fuis brafteis fecundariis inuolu-
crisque propriis,



fecundariae oblongae, acutae, membranaceae, niueae, punilis atro-purpureis denfe adferfae. Singuli flores, in uolucris minoribus gaudenr.

Calyx. *Periantbium* monophyllum, tubulofum, membranaceum, ore aequali, album, punetatum vtinuolucra, bad pilofum, pilis luteis.

Corolla monopetala, fubperfonara, flaua, bafi tubulofa, intra tubum pilis barbara, brafteis exerioribus breuior,

Satmina.

Filamnta duolabio inferior! corollae adnata, breuia neruosque deoirrenres emiccentia,

Amhera vnica apice cDnnaca, rBtundata, bipartita, compreffa, alba, bafitaminibus getninis adnaca, caicarata: cakaribus curuatis, a cur is, glabris.

Piftillum. *Germen* vix vllunu

Stylus ereftus, parum curuatus, filiformis.

Stigma clauatum, recufura, fulcis quaternis notatum, magnum.

Neftaria gemina ad bafin ftyli adnata, erefta, lincari - lanceolata, compreffifufcula, acLita, tubo breuiora.

Obf. Alum fpeciem oberuauit, radicibus omnino albicancibus, quae ab incolis eriam nomine diftinguitur, licet folia cum fpecie defuripta omnino conueniant. Huius autem flores nondum reperi.

7. AMOMVM vligmofum*

Raput-Nok. d. i9Maii 1779.

Radices filiformes, nonnullae longae, ferrugineae, fub caule parum nodosae, ~~vaginatae~~ : vaginis ferrugineis.

Cauks folifarii, remoti, erefti, bafi clauati, vaginati, vix craflitie digici, inde ad inmit^{reai} e foliis approximatis nutantes vaginaui^{tripedales} vel parum altiores.

Folia feffilia, bifarin, patentia, oblonga, acuta, vtrinque leuia, nitidq, vix pedalia, in vaginas definenua.

Vaginae radicates ouatae, ftriatae, breues

superiores longiores apicibus puodudlis, his

ftipmores foliolis terijiinantur

fummae foliiferae : otunes lateralicer fiflae, marginatae, ciliatae, firiaiae^{oris} tpmentofis ferrugineo-fufcis,

Flovitm fafciculi conferti, pedunculati, a caulibus remoti, floribus fubpedicellatb; brafteatis,

PeduacuK radicales, erefto-curuari, articulati, bafi tenuiores, vaginaci.

Vaginae feffiles, alrernae, adpreflae, ouato-oblongae, glabrac, fubprieccae# rubrae.

¹ *Bra&eae* duae ad fingulum florem :

inferior articulo pedicelli verfus medium adnata, florem femiuaginans, approximarn, oblonga, concaua, neruofa (neruis 6- 7.) membranacea, rigida^{al} alba, flore parum breuior.

superior parum altior, illi subopposita infra germen ad latus antherae adnata, adpressā, oblonga, clauata, apice tridentata, membranacea, nervosa, alba, inferiore dimidio brevior, albo-pilosa imprimis ad basin.

Calyx. Perianthium monophyllum, fuperum, tubulosum, parum incurvatum cum, vtrinque longitudinaliter plicato-filcatum, membranaceum, tubo floris paulo latius, bifidum, laciniis aequalibus latis, acutis, longitudine tubi floris, coloratum, basi pilis albis nigris adpersum.

Corolla monopetala, irregularis, papera, basi tubulosa.

Tubus incurvatus, compressifolius, fulco cui vtrinque notatus, roscus, fauce vix ceniur.

Liribus duplex.

exterior tripartitus. *Laciniae duae* exteriores maiori approximatae lateraliter parviculae, lanceolatae, aquales, niueae; *tertia* ad dorsum antherae erecto-patens, clauata, concava, basi angustior, minor, obtusa, bidentata, niuea, apice incurvato et basi aliquantulum rosea.

interior maior, antherae oppositus, basi unguiculatus, recurvato-planus, fulco levi notatus, crassus, rigidus, coloratus, dein recurvato-adfendens, cymbiformis, marginibus erectis, rotundatis, albis, venosis, ante apicem vtrinque ad margines plicata minuta quasi emarginata; flavus (vel totus apex) apice incurvato, bifido.

Dorsum planiusculum, glabrum, rigidum, minus luteum.

Interioris paginae discus glaber lineolis geminis remotiusculis purpureis a lateribus usque versus apicem pictus.

Stamen. Filamentum unicum, latum, cum lacinia superiore limbi exterioris unitum, lateri germinis adnatum pagina interiore planum, albicans, versus faucem dilatatum, fukatum, roseum vel reliqua staminis pars pagina exteriori convexum j tubo floris longius,

inthera tempore florendi ad unum latus extra florem flectitur foblonga, obtusa, dorso parum convexo glabro nudo, apice coronata lobis quatuor, quorum duo laeviores, angustiores, minores: duo interiores supra antherae divifuras, latiores, rotundati, omnes glabri albicantes. Pagina altera antherae fertilis fulco divifa, fingula pars interiorum fulcis geminis levi bus notata, alba.

Pijillum. Germen inferum nectariis coronatum.

Stylus capillaris intra tubum floris, deinde a fulco filamento et antherae recipitur, albus.

Stigma clauatum, obtusum, rotundatum.

Nebaria duo gemini adnata linguaeformia, carnosa flava.

Pericarpium. Capsula globosa, obsolete triquetra cirrhis fanguineis ante excissionem echinata, trilobularis, polyperma.

Habitat in umbrosis minus frequens.

§. KAEMPFERIA *purpurea*.

Plantae vix pede akior*

Radix praemorsa, lateraliter fibrosa: fibris paucis, filiformibus, parentibus, simplicibus, flexuosis, fibrillisque brevibus obfita ipichamea.



Vaults (implex, supra radicem parum decumbens, dein ereftus, reres, arciculatus, leuis, albus, ad articulos decrefcens vel fenfim attenuatus; articuli 3.1. 4. bafi biuaginati, reliqui a foliorum vaginis veftiti, palmam altus, cum vaginis compreffus videcur. *Vagina** 2. interdum 3.alternae, prior fupra radicem altera articulo proximo adnatae, adpreffe, ouatae, neruofa-rugofae, fanguineae.

Folia bifaria, alterna, petiolata, patentia 4-6ouata, inregerrina, acuta, inferiora latiora breuiora magis patentia, fuperiora magis eretta, duplo longiora (vix pedemlonga er palmam lata) acutiora; fuperne glabra, ftnara neruis ad angulum acutum parallelis, vndulata, viridia, rubro parum colore admixto; inferne eciam glabra, lineata, pilis rarioribus praelertim ad latera neruorum adpreffa, ianguina.

Petoli femiteretes, canaliculati, glabri, pollicares, in vaginas definenres, minus colorati.

Vaginae auriculatae, auriculis creap-patentibus, lineari-lanceolatis, acutis, membranaceis, parum coloratis, petiolo vix breuioribus; marginatae, membranaceae, dorfo fulcatae, inuicem caulem amplectentes, rubrae.

Spica intra vaginas foliorum feffilis, fecunda, vnum vei duo flores quoddie extollens, lineari-oblonga, acuta, apice vix curuato, compreffiufulca, albicans, digito parum longior, vix digito minore craffior, compolita e bra&eis geminatis, imbricatis, adpreffis, ouacis, membranaceis, vnifloris, raro flores plures includencibus.

Bra&eae duae oppofitae bafi germinis adnatae, ereftae, exterior minus compnUDluta, ouato-oblonga, acuta, cxtus pilis rarioribus adpreffa; haec abfoluca florefcentia ad vnum latus reflexicur; interior glabra, neruis minimis notata, membrana:ea, longitudine tubi floris er exeriore parum longior.

Calyx Pevianththm fuperum, tubulofum, tubo floris latius, plicarum, margine inregerrimum, membranaceum, pellucidum, tubo floris dimidio circiter breuius.

Corolla monopetala, tubulofa, limbo irregulari duplici patenti-curuato, infra faucem fragili caduco.

Ttibus ereftus, parum tortuofa-curuatus, filiformis, glaber leuiter ftriatus, albus, bra&teis lantillum longior,

Limbus duplex, vterque tripartitus.

exerioris lania fuperior erefta, inferiores approximate, reflexo-patientes, umnes lanceolatae, acutae, planiufulcae, aequalcs, membranaceae, albae!

interior patens; laciniae duae [uperiores dorfo antherae incumbentes, approximatae, ereftae, obuere ouatae, vel potius clauacae, apicibus vndulato-crispatis, glabrae, nitidae, exteriore breuiores, verfus bafin magis carnofae, minus albae parum vero flauicantes; lacinia inferior obuere ouata, lata, cymbiformi-excauata, reflexo-parentiflima, margine crispato, denticulato, vtrinque leuis, imus coccineo-alboque pifta, reliquis omnibus latior, vix longior.

Stamen. *Filamentum* faici 'nuda, glabrae, vix perforatae, callofae vnirum, planiufulcum^ fubcarnofum, anierius fulco profundo longitudinali excauatum, anthera breuius, album, verfus laciniam maiorem^ limbi^ ris^ curiatum.

Anther a verticillis limbum inferiorem curvata, oblonga, vtrinque recurva, dorso convexo glabro raris pilis adasperata, altera pagina fulva diuina pollinifera, alba.

Pistillum. Germen inferum, cylindricum, truncatum, glabrum.

Stylus intra nebaria germinis, ascendens a fundo filamenti et antherae receptus, capillaris, longitudine antherae, albus.

Stigma extra antherae fulcum prominulum, obtusum, pilis rarioribus adasperatum, per fora turn.

Nebaria duo approximata, pedunculata, femicylindrica, apice subclauata, calyce parum breviora, tubo minus alba, germine infidentia.

Pevicypium capitatum.

Habitat in fyluis opacis solo humidifculo, copiose in Young-Ceylon

AMOMVM *Cardamomum*

Radices mox sub humo horizontales, subarticulatae, cicatricibus equamiscaducis oblongis femicinctae, crassitie digiti minoris, rosae, interne folidae, furculis acutis terminatae, subtus fibras nonnullas filiformes descendentes emittunt.

Caules folitarii, interdum e furculis elongatis plurimi, semper tamen remoti, erecti, ad apicem inter folia nonnihil recurvati, basi durati, colorati, vndique vaginis vestiti, glabri, crassitie digiti et pedes 3-5 alt.

Vaginae infimae cordatae, latae, rigidae; reliquae oblongae, acutiusculae, integerrimae, leues, superiores gradatim longiores, superiores foliiferae ore bifido membranaceo.

Folia ad vaginas sessilia, patentiufcula, inferiora ovata, superiora longiora, angustiora, erectiora, integerrima, longe acuminata, vtrinque leuia, nervis remotiusculis parum prominulis striata, laete viridia.

Pedunculi e lateribus radicum, folitarii, curvato-erectiusculi, vaginati, parum colorati, vix crassitie pennae anferinae et digito minore breviores, lignosi.

*Vagina** pedunculorum 6-g scapum obueftientes, inferiores cordatae superiores oblongae integerrimae, leues, nitidae, parum coloratae, subcarnosae.

Spica laxa basi inuolucris tribus circumdata, erecta, ovata, obtusa, magnitudine vix oui gallinacei.

Flaves finguli bracteati et inuolucrati.

Bracteae oblongae, recurvae, concavae, nervosae, membranaceae, albescentes, longitudine tubi floris.

Inuolucrum tubulosum, laxum, striatum, pilosum, membranaceum, ore subtrifido: laciniis duabus minus diuifis, tertia angustiore, breviora magis diuifa, calyce parum breviora. Interdum bifidum quantum ex profun diuifum obseruatum.

Calyx. *Perianthium* superum, tubulosum, striatum, membranaceum, subinflatum, pilosum, album, longitudine tubi floris, ore trifido: laciniis rotundatis adpressis aliter lacere profundius diuifis.

Corolla monopetala, erecta, tubulosa.



Tuhus filiformis, parum curuatus, fauce nonnihil inflata, leuiter ftriatus, pilis rarioribus adferfus, albus, lineas longus.

Limbus duplex.

Exterior tripartitus. *Lacinia* fuperior erefta, ouato-oblonga, integerrima, parum concaua, membranacea, alba, vix longitudine dimidia tubi floris 5 inferiores patentes, approximatae, ouaro-oblongae, minus concauae, membranaceae, albae, fuperiore parum longiores.

Interior indiufus, patens, laciniis inferioribus limbi exterioris incumbens, concauus, oblongo-ouatus, apice bilobatus: lobis paruis marginibus incuruato-ereftis dentatis, crifpatis, membranaceis, albis-

Difcus longitudinaliter fubcarnofus et rugofus, flauus lineis vtrinque lateralibus punftacis rofeis ad faucem decurremibus, bngicudincfubaequalis laciniis exterioribus.

Glandulae minimae vtrinque ad bafin limbi inrra faucem pilis adferfam.

Stamen.

Filamenti vnicum intra faucem laciniae fuperioris limbo exteriori adnatum, incuruatum feu verfus limbum interiorem inclinatum, lineari-oblongum, planum, fub anthera parum anguftius, dorfo vix conuexum, glabrum, neruofum, altera pagina fuko leui longitudinali exaracum, album, limbo proximo dimidiu breuius.

Anthera obcordata, craffa, coronaia, dorfo conuexa, glabra; pagina anteriori fulco diuifa: diuifuris in difco longitudinalicer polliniferis.

Cwonula dorfum et latera erefta membranacea cingens, alba, nuda, tridentata: dente medio ouato, lateralibus anguftioribus-

Piftillum.

Germen inferum, fubglobofum, cubo vix craffius-

Stylus ereftus intra rubum floris capillaris, glaber, canaliculo uibi floris inferius, extra cubum inter antherae rimam occuitatus.

Stigma intra coronam antherae prominulum, campanulatum, compreffum, perforatum, margins ciliatum, anthera parum anguftius, album.

NeBaria duo fupra germen intra cubum erefta, ftylum includentia, lineari-dauaca, obcufa, dorfo concaua, latere interiori fulcb longitudinali exaracum, carnofa, glabra, germine duplo longiora, fublucea.

Perkarpium Capfula oblonga, vtrinque acuta, triangularis, cortice tenui et tenaci albicante tefta.

Semina Cardamomum optimum.

10. 21 NZIBER *fpurium.*

Makys Thumung.

Radices parum infra humum horizontales, fquamulis obfoletis obfcae, albae, vix odoriferae, amarae, fubarpmaticae, craffitie digiti maioris, ftolonifera?.

Cw/f/plunmi, approximati, fimplices, crefti, ad apices parum nutantes foliofi, compreffii, vndique yaginati, fupra radicem parum increffati vix co² IDraii, craffitie digiii maioris, quacuor pedps alti. *

Vaginae inferiores a - 3 oblongae, acutae, ftriaiae, nudae, reliquae foliiferae.

Folia bifaria, patentia, subpetiolata, vtrinque glabra, leuiter ftriata, oblonga, acuta, integerrima, inferiora latiora breuiora, infimum purpureum, Tubus pilis mollioribus adspersa,

Pedunculi folicarii a caulibus nonnihil remoti, erecti, squamis oblongis, rotundatis, marginatis, ftriatis, glabris, inferioribus breuioribus obtusius, subarticulati, pedales, craffitie pennae cygneae. Summae squamulae inflatae, recusae.

Spica ftrobilliformis, ouata, globosa, ouum gallinaceum magnitudine superans, e bracteis, inuolucris et floribus composita.

Bracteae obtuse ouatae, obtusae, marginatae, inflatae, extus glabrae, leuiter ftriatae, virides, incus leues, albicantes, inferiores duae vacuae, ouo compositae lumbino maiores, membranaceae, plerumque uniflorae. Ex eo quod margines ad apices bractearum inflectuntur magis inflatae euadunt.

Inuolucrum infra germen receptaculo floris infidens, tubum floris inuoluens, ouato-oblongum, apice rigidum, ftriatum, pellucidum, longitudine tubi floris.

Calyx. *Pcrianthium* fiperum, monophyllum, tubulosum, oblongum, truncatum, membranaceum tenerrimum, duodecim ftriatum, rubro floris breuius amplius.

Corolla cubulosa irregularis.

Tubus erectus, parum curuatus et infra faucem inflatus vix pollicaris.

Limbus duplex.

exterior tripartita, subaequalis; *lacinae duae exteriores* approximatae, saepius parum inuicem agglutinatae, patentiusculae, lanceolatae, actinae, membranaceae, neruis pellucidis ftriatae superior erecta reliquis parum latior, minus acuminata; longitudine aequalis; omnes luceo-albicantes.

interior exterioribus approximatis supra basin dorso connatis, monophyllum, trifidum; *lacinae duae interiores* verticaliter adnatae intermediae, patentiusculae, oblongae, rotundatae, obsolete dentatae, intermediae multo breuiores intermedia lata, cordata, bifida, laciniis acutis concava, marginibus repanda, membranacea venosa dorso et versus basin craffior, rigidior, albicans, disco intus citrina exterior limbo breuior.

Stamen. *Filamentum* planum, erectum, breuissimum, lacinae folitariae limbi exterioris adnatum.

Anthera erecta, oblonga, plana dorso ftriato nudo laevi, altera pagina pollinifera emarginata, fulco diuisa, apice sulcata

Roftrum incuruum, cylindricum, tubulosum, glabrum, longitudine antherae.

Pistillum. *Germen* rotundatum, inferum.

Stylus intra floris tubum capillaris, glaber, dein intra fulcum antherae et roftrum induratus.

Stigma extra roftrum vix prominens, obtusum, craffius, perforatum, margine barbato,

Pericarpium nondum reperi.

Habitat in fyluis, locis humidiusculis.

11. LAMPVJANG «/ THVMVNG

An *ZinzibefJpuYium?* An fola varietas praecedeniis ?

Exhorto D. *Clementis de AW** Mercatois Malaccensis celeberrimi.

Radices, Caules, Folia et Spica praecedeniis, fed maiora omnia.

Cafyx. Pmântbium fuperum, monophyllum, ad vnum latus fiffum, apice elongato obiufo tenerrime denticulato, fupra medium nonnihil inflatum, neruis duodecim ftraium, membranaceum, pellucidum, tubu floris vix dimidiu breuius.

Corolla monopetala, tubulofa, irregularis.

Tuhui ereftus, filiformis, parum curuarus, glaber, albicans, fiab fauce aliquantulum incraffatus, fubcarnofus^ bratteis longior.

Limbus duplex, irregularis,

exterior triparruius ; *lacinia fuperior* erefta^ ouara, oblonga, apice pamm incuruata et cymbiformis, infra apicem minus concaua, vtrinq; leuis, neruis ftriara, femipellucida, colore framineo ; *laciniae duae inferiorer* ereftiufculae, approximatae, lanceolatae, acutae, glabrae, imegerrimae, minus concauae, neruis ftriatae, contolores, longitudine fuperiori aequales.

interior patentiflimus, trifidus, laciniis duabus inferioribus limbi exterioris incumbens ; *lobus intermedius* planus ad apicem obuerte uurdatus, tenerrime denticulatus margine et crippatus, vix reuolutus, membranaceus, fubrubro framineoque colore teffelato-piftus, difco longitudinaliter callofus, piloliis, pallide luteus, maior j *later ale i* verfus medium intermedii ad angulum acutum erefti, oblique femiouati, tenerrime denticulati, colorati, membranacei, lubo intermedio plus dimidio minores.

*Stamen** *Filamntiim* laciniae fuperiDri exterioris limbi adnatum, planum, denticulo acuto ad bafin vtrinq; intrudum, breuiffimum, vix vnus lineae longitudinem ec duarum latitudinem habens.

Inthzra oblonga, limbo inferiori incumbens, pagina anteriori planiufcula marginibus pollinifera, mediu fulco longitudinali dinifaj dorfo paxumconuexa, fubcarinata, corniculu terminata.

Cornu antherae circiter longitudine, incuruatum, glabrum, flauum, longitudinaliter fuluo diuifum, apice tereciufculo, obtufo.

Piftillwn. Germen inferum, oblongum, compreffum, vtrinq; obtufum, leuiter ftriacum, glabrum.

Stylus intra neftaria germi adnatus, a fulco antherae et corniculi receptus, capillaris, glaber, albus, verfus ftigma craffior.

Stigma obtufum, perforating cilium, extra antherae cornu parum prominulum.

Ne&aria duo approximata, lineari-acuta, fubflaua, germine longiora.

12. ALPINIA *fefftlis*.

Kentfchur-

Katfiula-Kelengu Rheed. Hort. Malab. XL p. gi. tab. 41-

Radices plurimae, confertae, fubbulbofae, cicacricibus annularibus notatae, albae, fubtus fibras plurimas, fimplices, longas fibrillisque hirtutas, palma longiores emittentes,

Caules nulli.

Folia parentifolia, decumbentia, petiolata, orbiculato-ouata, acuta, integeriraa, marginata, fuperne glabra punctisque minutis adperlii, interne glabra, canescentia, neruofa, carnoia, luperficie parum verfus margines undulata i plurima inuicem incumbentia.

Petoli erectifculi, iemitereres, marginati, canaliculari, glabri, ftriaci, vix pullicares, fcapum vaginances.

Florum fasciculus paruus, pollice breuior intra petiolos vaginantes uculcatus, 3 -6 florus (raro pluribus).

Vagina membranacea, pdlucida, albicans, bipartita^ lobis inaequalibus, longitudine fasciculi florum.

Bra&eae geminae fub germine₃ germi adnatae, lineari - anguftiflimae, albae, membranaceae, pellucidae^ longitudine vaginae.

Calyx. *Perianthium* fuperum^ monophyllum, tubulofum, tubo floris amplius, apice dehifcens, membranaceum, tenerrimum, album, inuolucro paulo longius.

Corolla monopetala, tubuloia, inaequalis..

Tubus curuatus et erectus, filiformis, leuis₇ albus, bipollicaris, infra faucem vix inilatus.

Limbus duplex,

exterior triparticus ; *lacinae* duae approximatae, patentes, lineares, acutae, anguftae, parum concauae, niueae, longitudine dimidia tubi; *tertia* prioribus oppofita, patentiflima, vix latior, longitudine aequalis, con color.

interior patentiffimus, tripartitus, *laciniis* duabus obuerfe ouatis, marginibus inaequalibus, ad apices dentatis, exteriori iongitudine aequalibus; *tertia* multo maior laciniis duabus exterioribus incumbens, bipartita^ vix concaua, verfus faucem craffior, rigidior, ftriata : laciniulis obuerfe uuatis ad apicem fublobatis, inaequaliter dentatis, albis, membranaceis, ad bafin aliquantum purpureis.

Faux pilis niueis nonnihil barbata.

Stamen. *Filamentum* intra lacinias duas minores fauci adnatum, erectifculum, cumpreffim, latum, breue, rigidum, album.

Anthra adfcendens, filamento longior et latior, durfu parum conuexa, neruis ftriata, nuda.niuea; anterior pagina pollinifera, prominula , fulco profundiori diuifa, alba, ad apicem membranula recuruata, obtufa, tridentata, coronaia.

Piftillum. *Germzn* inferum rotundatum.

Stylus capillaris a fulco tubi floris et denium antherae receptus, leuis, albus.

Stigma campanulatum, parum compreffum, ore ciliatum, vix extra antherae fulcum prominens.

NeQaria duo approximata, ante ftylutn germi adnata, cylindrica, acutifucula, longa, albicantia.

Pericarpium non repertum.

Habitat in fyluis obfcursoribws Mallaccae.



"13, LANGVAS vulgar e, vfitatiffimum Maleys.

frjfa. Galanga alba.

Radices horizontales, teretiufculac, cicatricibus annularibus obliquis remp-
tufculis cinftae, ramofae, albae, poliice craffiores, fibras filiformes retta
defcendentes fubtus emittentes.

Caules fimpliciffimi, bafi fubglcrbofi, e radicibus protuberantibus erefti, tere-
tes, glabri, inferius fquamis aphyllis, fupra has foliorum vaginis veftm,
verfus apices parum nutantes, nomine altiores.

*Vagina** alternae, oblongae, glabrae, leuiter ftriatae, rotundatae, cum acu-
mine fupra apices adnaco, folicario, ceretiufculo, acuto, adpreffib, cal-
lofo, breui. Inferiores vaginae fenfim longiores 5- 6, aphyllae, fupe-
riores foliiferae.

Folia alterna, bifaria, horizontaliter patentia, oblonga, acuta, integerrima,
marginibus callofis albicantibus ciliatis fubafpcris, virinque leuia, CDI-
fertiffime ftriata, ftriis ad angulum acium decurremibus neruisque ob-
foletis plurimis longinadinalibus notata, duas fpithamas longa et palmam
yix lata.

P^o // femiteretes > lati, marginibus pilis adfperfis, breuiflimi.

Vaginae foliorum lace dehifcentes oris prominulis rotundatis, ciliatae, ce-
lerum vein inferioibus.

Racemus lerminalis, paniculacus, fubnudus, oblongus, pedunculatus.

Pedunculus communis comprefliufculus, leuis, bad articulo folitario infru-
ctus, racemo breuior, craffitie pennae antennae, bafi inuolucratus.

Peditnculi partiales pacences, dichotome diuifi, lereciufcili, glabri, breues,
punftis pilisque minimis albicanibus adfperli; inferiores duo (raro plu-
res) inuolucrati.

Pedicetti ereftiufculi, teretes, glabri, punftis pilisque adfperfi vt pe-
dunmli, floribus multoties breuiores, bafi bradtejti.

Inuolucra triaj *iuferiur* ad bafin pedunculi communis articulo adnatum, *in*
termdium primo feu inferior! pedunculo partial! et *tertium* fecundo adna-
turn. Reliqui pedunculi inuolucro deftituti. Omnia lanceolaca, acua
integerrima, membranacea, ftriaia, ferruginea, caducaj duo inferior!
racemo parum breuiora, tertium minimum, anguftius.

Bradeae ad bafin pedicellorum folitariae vel geminae, pedicellis ap|)roxi-
matae etvix breuiores, lanceolatae, acutae, membranaceae, caducae, ferru-
gineae albaeque.

Calyx. Perianthium fuperum, monophyllum, campanulatum, anguftum, lcu(
fubcoriaceum, ore crifido : laciniis iemiuoatis acutis paruis, niueis, tubi
floris parum breuius.

Corolla monopetala bafi tubulofa, irregularis.

Tubus ereftus, glaber, verfus faucem vix incuruatus et inflatus, calyc
parum longior.

Limbus duplex.

txterior rripartitus ; *lacinia fuperior* adfeendenti rccuruata, oblonga, coi-
caua, neruis ftriata, integerrima, apice rotundato magis cauo, tub'o loi-
gior -, *infnwu duac* rccuruatae, parum. apprgximatae, oblongae, aci



tae, minus concauae, marginibus membranaceae, dorfo craffiores ner-
uisque ftriatae, longitudine aequales, viridi-albicantes.

interior bad cum floris tubo laciniisque exterioris limbi connarus, patens,
parum adfcendens, concauus, bad elongatus, linearis, hinc quoque
quafi vnguiculacus, fuperne planus fulco medio longitudinali diuifus,
luteo-nlbicans, fubtus carnofus, conuexus, rigidus, dorfo albicame,
Lamina obcordata denticulato-lacera ef lcuiffime crifpata margine, limbi
exterioris laciniis latior longiorque. E (inu laminae lobuli gemini adfcen-
denies conniucntes, iifiura profundiori diuifi, ouati, denticulate-la-
ceri, firm parum) longiores, concolores. Sulcus vnguem diuidens
per laminam conrinuatus verfus mnrignes venulas rofeas emittit, ceie-
rum vtrinque niuea lamina fubtus dorfo leuiter carinato rigido viridi
venisque rofcis pifta.

Glandulae geminae, magnae, rofeae ad bafin limbi ante faucem adnatæ,
fulco profundiori diuifae, corniculatae, a^cutae, diflichae, carnofae.

Stamen. Filamentum vⁱ fuperiori limbi exterioris in fauce adnatum, lim-
bo interiori oppofitum, ndfcendens, lineare, planuni, glabrum, limbo
proximo parum breuius (quam in multis congeneribus longius et angu-
ftius) albicans, antice fulco kui exaratum.

Ant her a patens, oblonga, quadradgula, apice bifida et hians, dorfo late-
ribusque planis, anteriore pagina fulco profundiori diuifa, fertilis, alba,
filamento tertia parte breuior.

Viftillum. Gernnen inferum, ouamm, abfolete angulofum, calyce anguftius.

Stylus badneflariis cinftus, craffilis, viridis, dein capillaris, glaber, albus,
intra fulcum antherae incuruatas, fubpilofus.

Stigma craffius, obtufum, perforatum, ciliatum, album, ad apicem an-
therae prominulum.

Pericarpitum. Capfula oualis, ubfolete angulofa, membranacea, rigidifcula,
ftriata, triluclearis, qaccinea.

Setnina plurima triquetra, cardamomo minuri fimillima.

Ne&aria duo bafin ftyli cingentia, ercfta, oblonga^ apice rotundata, carnolkj
ftriata, albicanria, germine breuiora.

Colitur in hortis.

14. LANGVAS *chinenfts.*

Maleys Sina Languas.

Radix horizontaliter fub humo diffufa, teres^ ramofa, circulis annularibus
cinfta, apicibus obcufis rotundatis, craffitie digiti maioris, alba, aromati-
ca₃ vrenti-fapida.

Qaules ad apices radicum remotiufculi, bad aequales (nee vt in congeneribus
inraftati) teretes, glabri, vaginati, ad dimidium aphylli, a - 3 pedales,
fummitate parum nutantes.

Folia bifaria, alterna, patentia, fubpetiolata, oblonga, acuta, apicibus recur-
uata, membranaceo - albicanti -marginata, margine pilis rariffimis fubcilia-
ra, verfus apices tenuiffime denticulata, vtrinque glabra, tenerrime ad an-
guluin acutum ftriata, cofta prominula alba, Ipithamam longa ec pollices
2 ad 2± lata.

Vaginae caulis oblongae, rotundatae cum paruo acumine; leues, *infimae* bre-
uiores : prima colorata, rofea, *fuperiores* quatuor (rare plures) longiores.



aphyllae, his superiores foliolo paruo ouaco patenti terihinatae ; foHonim minus leues, imerftitiis longiores, ore membranaceo rotundaio prominulo, vfque ad inferius folium fiffae.

Racemus paniculatus, oblongus, anguftus, palma parum longior.

Peduncidus communis eredlus, fubflexuofus, parum angulofus, glaber, pilofus, pilis adpreffis. *

Pedunculi partialei alterni, remoti, patentiurculi, inferior ad bafin inuohicrarus folio lineari-acuto, membranaceo, caduco, pedunculo multo longiore y reliqui braftcad, comprefsi, flore breuiores, glabri, minus piliofi, 16-20 inferioribus tri-fuperioribus plerumque bi-floris, viridibus.

Tedicdli ad pedunculum partialem arciculacione inferti, inuolucrati, conferri, tereiufulculi, glabri, pilofi, longitudine inaequales.

Inuolucella folitaria, campanulas, membranacea, ore inaequaliter tridentato, ferruginea, flore breuiores.

Brafteae albicantes pedunculis parcialibus vtrinquelateraliter adnatae pedunculo communi adpreffae, lineares, acutae, pilofae, minimae caducae.

Calyx. *Pevianthittm* fuperum, campanulatum, parum incuruatum, membranaceum, ore fubaquali-tridentato, denticulis adpreffis rotundatis, integerrimis 7 viride.

Corolla mohopetahj fupera, breuis, fublucea,

Tubus longitudine cdlycis. -

Limbus duplex.

exterior tripartitus j *lacinia fuperior* erefta, obuerfe ouata, concaua, membranacea, pallide viridis, inferiores dime pacenci-reflexae, ouarge, integerrimae, concauae, ad apices parum inflatae, membranaceae; concolores, fuperiore vix breuiores, omnes ad fauces connatae.

interior ad lams inferius in fauce fitfris cum uubo vnitus, patentiffimus, oualis, vtrinque rotundatus, antice emarginatus, niaginibus denticulatus ball vtrinque dente mniori erefto ftamini approximato fanguineo diuifus ; inter hos denies marginales duo; demiculi glandulofi. Pagina fuperior venbfa venis quatuor fanguineis pifla lineaque lata longimdinali et rugis transuerfalibus aurantiacis. Limbo cxteriore longior eiusque laciniis latior.

Stamen. *Filamentum* e floris fauce proueniens, ereftum compreffum, glabrum, longitudine limbi incerioris, pallide aiiramium.

Anthera erefta, ouato-oblonga, dorfo plana, anceriore latere fulcaia, filamentum breuior, concolor.

Piftillutn. *Germen inftum*, globofum, fub calyce contraftum, leue viride, calyce breuius.

Stylus bafi increaftatus neftariisque femicinfus, dein per tubum capillaceus « a fulco antherae receptus eique longitudine vix aequalis ad vnum latus ciliatus, albicans.

Stigma campanulacum, parum compreffum, margine nudum, album.

NeEtanza'dno approximata, carnofa, oblongo-ouata, dgrfum ftyli cinffentia, ferrugineo-rubra.

ftricarpm capfuh.

Colitur in hortis Sinenfium pro vfu medico.

15. LANGVAS *aquaticum* *Lfylueftre*.

A[^]/wniimerofae, filiformes, ftolones emiccentes, albae.

Caulis fimplex, eredtiufculus, fubteres, parum compreffus, leuis, vaginatus, 4 pedes plus minus alms, fnpra radices tub ere deftitutus, craffitie digiti, panicula florum terminatus.

Folia petiolata, patentia, alterna, bifaria, oblonga, acuta, margine denticulata, denticulis callofis minimis, ad bafin ecapicem vix obferuandis, coriacea, elegantiflime viridia, fupra ad angulum acium ftriis fubaferis denfe lineata, fubcus laeuin.

Vaginae foliorum incrcfticiis longiores.

Panicula terminalis, oblonga, angufta, apice fubnutans, pedunculata, ball inuolucris binis caducis inftructa.

Fedunculus commimis teres, leuis, inferne ad exortum inferiorum pedunculorum partialium articulia notatus inuolucrisque caducis veftitus; inter fuperiores inarticulatus, angulufus, fubflexuofus, leuis, magis albicans, braileis deftitutus.

Pedicelli dichotome diuifi, biflori, patentiflimi, teretes, kues, colorati, albi, ore fbbiores.

F/ores erefli, xiiperi.

Inuolucra 2. 1. 3. inferioribus pedunculis adnata Onde cingulum articuli) linearilanceolata[^] acutiufcula, concaua, membranacea, colorata, albican-
tia[^] caduca.

Calyx. *PeYanthjum* monophyllum, tubulofo - campanulatum, glabrum, niueum, fubcoriaceum, corolla plus quam dimidio breuius, ore tridentata, denticulis fubaequalibus, latre interiore aliquantulum profundius diuifum.

Corolla monopetala bad tubulofa.

Limbo duplici.

exterior tripartitus 5 *lacinia fuperior* adfeendens, ouato-oblonga, apice rotundata, planiufcula, neruofa, alba; *laciniae duae inferhres* fubaproximateae (minus quam in congeneribus) patemes[^] lanceolatae, aculae, planae, albae, fuperiorE vix breuiores.

interior dunbus laciniis limbi exteriuriſ inçumbens, patens, planus[^] obcordatas, quadridentatus: denticulis incermediis parum longioribus, lateralibus vtrinqe ad bafin glandula oblonga inftruftris; inrus fucus, ereftus, paruus, prnpe filamentum limbo adnatus, rofeus, fuperne ftriatus, limbo exteijori breuior, craffior, rigidior.

Stamen. *Filamentum* limbo interiori oppofitum, fauci ynatum, adfeendens, planumj leue, callofum, rofeum, fulco exaracum.

Antbera oblonga, dorfo conuexa, anterius fulco diuifa, lateribus polliniferis albis, adapicem membrana femi-orbiculari ereda colorara parua coronara, limbo fuperiore vix longior et ftamine vix duplo craffior, fubrofea.

Pifillum. G*rw*«inferum, globoliim, nitidum, album.

Stylus fupra germen neflarib tubulofo cinftus, dein a fiffura aniherae, receptus, filiformis, glaber, albus, longitudine anchene.



Stigma intra filuram antherae vix prominulum, clauatum, obtufum, perforatum, ciliatum, album.

Nt&arium tubulofum, ad vnum latus filium, margine digitatum* denuciatum, inaequale, carnofum, album, germine duplo longius.

Pericarpium. Dacca oualis, glabra, nigra, membrana tefta.

Semina 5 vel plura, triquecra, hinc conuexa.

Habitat in viginofis ad riuulos inter fruuces, minus frequens.

6. AMOMVM *ftyphiferum*.

Maleys Thupus,

Radices horizontales in fuperficie fere terrae radículas fibrofas remodores emittentes, annulis et fquamis femicubulofis cintlae, craffuie digiti, ires circiter pedes longae.

Culmi oftopedales et vltra, tenaciffimi, inferius vaginati aphylli, dein vaginis foliorum bifariis, alternis veftiri.

Fo/wfifilia, patientifcula, oblonga, acuta, integerrima, fuperne glabra, nervis longicudinalibus obfoletis (quod fingulare eft;) iubcus [omentofomDilia, fubcoriacea; fefquipedalia.

Or a VcignaruTi pruminula, rotundata, membranacea.

Strvibili ad radices nonnulli a culmis plerumque et inuicem remDtiufcalj, fubfeffiles, erefti, oblongi, verfus apicem nonnihil contrafti, inde dilatati, fummitate lata patenre, vnde fcyphiformes, fefquipalmam fere longiores, craffitie bipollicari,

Squamae ftrobilorum inferiores fuborbiculatae, latiores, breuiores, *fuperivres* ouato-oblongae, acuAe, intcgerrimae, pollicis || longitudine et vnus bricudine j *fupremae* fcyphum formantes apicibui 4.1- 5. denracis. Omnes coriatae, rigidiufculae marginatae, neruofae, transuerfe rugosae, cinerafcenti-fubuillofae, margine et bafi ghbris coccineis, intus leues nitidiffims coccineae.

Fhres confeiti, numeroft, brafteati, fuceffiuie expanduncur, vnus, raro duo fingulo ^die.

BvaEieae communes numerofae, infra flores receptaculo obrufo craffib adnatae, oblongo-clauatae, apicibus denticulatae, concauae, fubcoriatae, vtrinque pulcherrime coccineae, ftrobili fquama breuiores.

- *partiales* folitariae germi inferiores illudque fEmiobuolentes, oblongae, acutiufculae, membrana fufca marginatae, cecerutn coccineae' bafi rofea, longitudinem calycis vix attingentes ; apex infr_a marginem recurvatus, prominulus, membranaceus^ rigidiufculus.

Calyx. *Periantbium* monophyllum, tubulofunr, nonnihil ampliaum, plicarum, compreffum, vtrinque carinatum : cauinis ciliatis in apicem recuruatLim definentibus, bifidum ; *laciniis* femiouatis, obtufis, fufco-marginatis J tubo floris triple breuius, coccineum.

Corolla monopetala, tubulofa^infenfe coccinea.

Tubus filiformis, ereftus, fub fauce parum inflatus, leuis niidus elegantiffime coccineus, fubcarnofus, fquamis ftrobilorum longior.

Limhus duplex, patens;

exterior tripartite ; *lacmia fuperior* ereaiufcula, lanceolata, plana, apice

rotundato, vcrinque leuis, quinqueneruia, nitens; *inferiores* minus diuiciae ; approximatae, patentes „ bad do lib limbi inerioris adnatae, lanceolatae, obtufiufculae, parum concauae, neruofae, fuperiore parum breuiores.

inferior exteriori adnarus, patens, laciniis duabus exterioribus fulcratus, lanceolatus, apice rotundato, parum concauus, limbo laciniae fuperioris magnitudine aequalis, integerrimus[^] fubcarnofus, bafi auriculatus.

Auriculae ere&iufrulae, femilunatae, marginibus repandis, ciliaeae, rigidiores, minus colorauae vel rofeae.

Faux pilis albicantibus.

Stamen. *Filamentum* fauci floris innatum, decumbens, planum, glabrum, fubcarnofum, anthera multo breuius, rofeum.

Anthera limbo inceriori incumbens, auriculis fulcrata, liricari-oblonga, plana, baft latior, parum incuruata, apice membrana rorundata colorata nuda coronata. Pagina aneriur fertilis incra margines rotundatas, glabras, nudas, in linea re&a vrrinque parum pilofa pilis cinereoalbicanibus, difco longicudinaliter fulco profunde diuifo. Longitudo limbi inerioris circicer. >

Piftillum. *Geymen* inferum, oblongum, obtufum, obfolete trigonum, glabrum, nitidum, rofeum.

Stylus capillaris, bafi neftario cinftus, dein a fulco antherae receptus.

Stigma cyathiforme vix extra antheram prominulum ciliatum.

Pericarpium. *Capfula* oblonga, obfolete iriquetra, pollicaris, crafficie digiti minoris, trilocularis, polyfperma.

Semina numerofa, clauata, oblonga»

Odor plantae vix vllus#

Habitat in nemorufis ad pedes montium prope*Malaccam iacis copiofe.

17. AMOMVM *Leonurui*.

Scyphifero proximum.

Radices infra humum fimplex, horizontaliter diffufae, fquamis cordatis ftriatis^{is} "februgineis omnino teftae, cornpreffiuufculae, ftoloniferae, crallicie digiri maioris[^] albae, lignofae, odore aromatico-caryophyllacco, lapore aromatico vrente praeditae; fubtus radulas nonnullas filiformes[^] defcendentes, craffiuufculas, tenaces, luc?o-albefcentes emictunt.

Cwules fimplex, folitarii, raro plures, remoti, erefti, fupra radices bulbofo-clauati, verfus apices nutantes, teretiufculi, vaginati, homine alciore, e vaginis imbricacis fabftantiam msdullarem ubuDuentibus tenaces.

Folia bifaria, alterna, petiolata, infra vaginarum apices adnata, patenia, oblonga,- aciuas³ iritegerrima, pilis aureis fcriceis ciliata, vtrinque glabra, fuperne nitida, leuiffime ad angulum acutum ilriata neruisque paucis obfolete notata[^] pedc lorigiora, odor em leuem caryophyllis*fuauiozem digitis communicant,

Petoli femiteretes, lignofi, canaliculati, breues, glabri.

Vaginae ad proximum folium dehifcentes, dein fe inuicem vaginantes, interftitiis foliorum multo IDngiorcs, glabrae, leuicer ftriatae, ciliatae, coria-



ceae, virides, oris prominulis, erectis, femiouratis, membranaceis, rigidiusculis, pilis aureis testis.

Spicae pedunculatae, radicales, lateraliter prodeuntes, a caulibus remotae, sparsae, plurimae, fimbriiformes, erectae vix apice extra humum prominent, oblongae, angustae, obtusae, parum apicibus dilatatae, palma longiores, vix-pollice afflores confanc.

Squamis adpressis, oblongis, acutis, integerrimis/parum marginatis, concavis, rigidis, extus nervofo-friatis, adpressis-pilosis, rubro-cinerascentibus apicibus viridibus, intus leuibus, friatis, fuscis-fanguineis.

Fedimuli sub humo laterales, erecti, teretes, lignosi, squamis nonnullis partibus glabris friatis coriaceis fuscis imbricatis, breves, crassitie digiti minoris.

Flores inter bracteas fasciculatim conferti, folitarii vel bini de die florent, aduki iunioribus numerosissimis dimillimi.

Bracteae numerosae se invicem cum floribus vaginantes, lanceolatae, acutae, concavae, membranaceae, integerrimae marginatae, glabrae, leuofriatae, rigidae, floris tubo breviores, parum coloratae, marginibus apicibusque roseis, albicantes, diu persistentes.

Calyx, Perianthium monophyllum, tubulosum, glabrum, membranaceum, pilosum, coloratum, parum roseum, rigidum, versus fimbriatam magis inflatum, ad apicem lateraliter diffusum, ovatum, bifidum, tubo floris brevius.

Corolla monopetalae, tubo tubo, tubo tubo

Tubus calycis angustior, gibber, carnosus, rigidus, spica vix longior, fuscus, versus faucem curvatus, patens.

Laciniae duplex.

Exterior tripartita; *lacinia superior* ascendens, basi laciniis duas inferiores obvolvens, utrinque pappo decurrens, maior, rigidior inferiores patent! - descendentes, basi limbum inferiorem inducentes; omnes lineares, convolutae, obtusae, laeves, subcarnosae, atro-fanguineae, nitidae, inferiores tamen minus obscurae apicibus roseis.

Interior laciniis inferioribus limbi exterioris incumbens, patens parum descendens, lineari-oblongus, integerrimus, apice angustior, obscurus, CDncausj versus basin utrinque auriculatus, superiore vix brevior, concolor, rigidus, subcarnosus.

Auriculae florum femi-obvolventes, cretiosculae, rotundatae, membranaceae, albicantes.

Faux hians, magna ratione tubi floris, carnosae, nuda.

Stamen. Filamentum lacinae superiori ascendenti limbi exterioris in fauce adnatum, verius limbum inferiorem flexum, lineari-clavatum, basi antistiore, dorso parum convexum, pagina inferiori concavum; carnosum, longitudine antherae, ferruginea-fanguineum.

Anthra oblonga, fulco longitudinali cinereo-piloso diffusa dorso nuda, ad apicem membrana bifida erecta coronata.

Pistillum. Uermen inferum, subglobosum, paruum, pilis cineriscenti-ferrugineis nitidis nudum,

Stylus filiformis, glaber, basi nescio inclusus, dein a fulco filamenti arithraeque receptus, roseus.

Stigma prominulum, retufum, perforatum, criquetrum, glabrum.

Ne&arium tubulofuiiiy fulcatum, carnofum, rigidum, • apice denticulatum, genuine triple longius, cinereo-albicans,

Pericarpium. Capfula oblclffiga, obfolete rriquecra, mngna.

Semina numer^aofa»

Habitat in fyluis denfilimis Malaccae.

Obf. Huius et praecedentis icones apud *Rumphium*^ *Rbeedium* ei *Plukenetium* haud inueni.

18. COSTVS *scalaccenfis*.

Mahys Piuer.

3. Radices

Catties plurimi, approximati, erefli, fimplices, parum comprcfli, glabri, vaginis foliorum veftin, homine fesquialtiores, verfus fumniitates nbnnihil incuruati.

Folia alterna, fLibbifaiia^ inferiora patentia, fuperiora ereftiufulca, petiolata, oblonga, longe acuminata/ margine denticulis fetaceis exafferato iuxta futuram Dbtufiufulcam; fuperne glabra, leuia, neruis remotiufulculis ad angulum acutum ftriqta, laete viridia i fubtus renuifllme tomencofo-mollia; fesquipedalia, palma latiora.

Petoli vaginis adnati, femitereces, canaliculati, glabri, breues, bipolliciaes.

Vaginae latere dehifcentes| glabrae, ftriatae, interflitiis longiores, ore ouato-oblongo membranaceo ciliato acuto.

Racernus terminalis e vaginis foliozum fupremorum emiffus, vnilateralis, latus, nutans, pedunculatus, inuolucratu.

Pedunculus com m tin is incuruacus, verfus medium articulatus, vaginatus, teres, fubpilofus, ruber, palma longior, craffitie vix digiti minoris.

- - *partiales* bafi inuolucrafi etcompreffiufulculi, poftea teretiufculi, fuperne clauati, pilofi, curuati, fafciculis florum multo longiores.

»

Florum Faſciculi confeini, feffiles, plerumque fexflori, inuolucratu Singuli flores intra fafciculum demum inuolucro proprio donatu

Inuolucrum pro e medium pedunculo communi adnatum illumque bafifuafubcingens^ dein inflatuinj Oblongum jacuminatum^ picelongo torruofo terminatum, ftnatum, pilofum, membranaceum^ rdi quis maius, palliderubrum.

- - *fcundum tertium* et *quartum* pedunculis parrialibus longiora, reliqua vero parua j omnia inflata, membranacea, concolora,

- - *faſciculo Yum fto Yum* perforata vel campanulata, fubtriquetra, marginibus obfolete dentata, membranacea, glabra, calycibus breuiora, Reliqua fingula vsque ad vkimum florem obuoluentia.

Flores finguli, praefertim vltimi pedicellis clauatis compreffiufulculis breuiffimis iniidentes.

Calyx. *Perianthium* fuperum, monophyllum, tubulofum, bafi angulofum, verſus fummitatem inaequaliter inflatum (eminentiis rribus irregulariter difpofuis callofis inftruftum) ore contrafto 3-4 dentjato membranaceo; lacue, coriaceum, rigidiffimum, limbo exteriore dimidio breuius^

Corolla monopetala, bafi tubulofe.

Tubus obuerve conicus, teres, glaber, albus, breuis.



Limlus duplex licet ringens videtur.

Exterior tripartitus ; *lacinaefuperioris* bafis margine fuo reliquas obuoluit, inde parum adfcendens, concaua, marginata, ad apicem inflata, quad cornuta, refta, vtrinque leuis, nitida, djpfo neruofa; callofa, albicans, alteris duabus laciniis maior. *Cornu* femiouatum, acium, magis callofum et albicans ; *lacinae duae inferior?** approximatae, clauatae, ad apices inflatae, rotundatae, magis concauae, marginibus membranaceis fiaucantibus, dorfo neruofa, callofo, albae.

Inferior, intra faucem tubo adrtatus, inferioribus limbi exterioris lacinnis incumbens, patens, concauus, trilobatus, marginibus erectiufculis cnfparo-denticulatis membranaceis albicantibus. *Difcus* glaber viuidiflime flaims, lineolis quaiuor inaequalibus ai faucem decurrentibus venisque verfus bafin fanguineis piftus, magnus, *Denticuli* folitarii, callofi, nitidi[^] purpurei ftamini vtrinque vnici-

Stamm. *Filamentum* tubo latere (iiperioreadnatum, paruum, incuruatum, planum, latum, vtrinque leue, nicidum, albicans, laticudine duplo longius.

Anthera obcordaca, dorfo planiufculo cum leui fulco a finu continuato, pilis dferfo j alcera pagina rDtundata, fulco profundiore pilofo diuifa, ad cuius margines linea angufta pollinifera. *Corona* nulla. Margines anthsrae rotundatae. *Tula* pilofa, flaua.

Piftillum. *Germen* inferum, fubglobofum, pilis fericeis lutefbentibus teftum, tubo florii nonrihil craffius, breue.

Stylus ad bafin ne&ariis cinctus, filiformis, glaber[^] a fulco filamenti antheraeque receptus, in pofteriore aliquantulum craffior pilofus.

Stigma intra fin urn antherae prominuluin, campanulatum, comprsffiufculum, ciliatum, perforatum, album.

Perivarpium. *Capfula* globofa, pilofa, cerafo maiore maior, calyce perfiftente coronata, vniuauis, trilocularis-

Semina numerofa, clauato - angulata-

NeEtaria gemina, germi adnata, erefta, approximate, oblongn, obtufa, extus conuexa, intus concaua, carnofa, callofa, leuia, albicantia, bafin ftyli cingentia, germine breuiora-

Hahitat in fyluis opacis prope Tfing in vicinia Mallaccae-

Ip. CVRCVMA *longa.*

Spka folitaria inter vaginas vltimas foliorum egrediens, pedtinculata, erefta, clauata, fquarrofa, vix pedalis, foliis breuior, e brafteis imbricads ouatis concauis infra medium inuicem dorfo connatis rucuruato-patentibus" acutis marginatis venofo-ftriatis viridi- albicantibus ad apicem brafteis fterilibus anguftioribus vndulato-flexuofis magis albicantibus connata.

Floret intra fingulam brafleamtrEs plerumque, interdum plures inuolucrati.

Inuducrum diphyllum. *Exterius* folium ouatum, bullofum, concauum, neruis ftriatum, membranaceum, album, femipellucidum, longitudinetubl floris-interius obuerfe ouatum, emarginatum, coucauum, neiuis transparentibus ftriatum, concolor, exteriore rigidius, vix duplo maius.

Calyx. *Periantbium* monophyllum, tubulofum, parum inflatum, obtufum, denticulatum, membranaceum, femipellucidum, hinc ad dimidium ^{d i i f 1} tubo iioris dimidio breuius:

Corolla monopetala, bafi -tubulofa,

Tubas ere&us/parum incuruatus, teres, leuis, rigidiufculus, albus, fupra medium campnnulatus, compreffiuſculus | durlb car i flatus, rotundatiis, bud multouies latior, parum luteſcens, vix rigidior.

Limbus duplex.

exterior Tripartite; *lacinia dorſalis* vel quae interiora (picaeſpeſtai, erefta, ouaca, lata, ad apicem incuruata, roſtrata: *roſtro* acuto ſub tubuloſo breui, poſtea planiufcula, cum limbi interioris dorſo ſtamineque connata, membranacea, alba, ſubſtriata; *laciniae 2 anſiores* approximatae, ereftae, apicibus paruip recuruatae, ouatae, acutae, planiufculae, ſuperiore vix breuius, anguſtiores, minores; rigidae, concolor.

interior tripartitus 3 *laciniae duae dorſales* a ilamine ſeparatae eiq; baſi connatae, ereftae, obliquae, oblongae, acutae fupra antheram tortuoſoſcuruatae, apicibus dorſoque canaliculatae, marginibus praefertim exterioribus planis membranaceae, rigidiufculae, neruoſae, albae, langitudine exterioris limbi, dorſali vix longiores; *lacinia anterior* curuato-adſcendens, obcoidata planiufcula, marginibus ereftis, hinc parum concava, ad apicem parum plicato-vndulata, finu lobata, rdiſquis omnibus laciniis longior, latior, concolor. *Lybus* e finu pronatus paruus, bipartitus, apicibus rotundatis incuruatis flauis. *Linea* lata longitudinalis (atura-tius flaua paginam ſuperiorem percurrit. *Faux* barba flauicante clauſa.

Stamen. *Filamentum* vnicum, ereftum lanceolato-ouatum, inter lacinias duas dorſales limbo dorſali adnatum, planiufculum, antice conuexiufculum, poſtea linea exaratum, laciniis approximatis dimidio breuius, rigidius concolor,

Anthera verſus medium anteriore pagina ſtamine adnata, adſcendens ouata, comprefſa, tota alba, hinc plana, marginata, fulco profundiore diuiſa, fertilis, dorſo rotundata, glabra, apice ſuperiore, roro»«/^ prominula fupra finem fnki dorſo adnata, obiua, membranacea, minima baſi bifida acuta calcarata, calcare vtrinque ſolitario e dorſo antherae prodeuncc trifido tereti acuo longitudine antherae, albo.

Pifillum. *Germen* inferum, cylindricum, breue, piloſum, vix tubo craſſius

Stylus inter neſtaria ereftus, capillaris, glabe a fulco antheraereceptus,

Stigma vix extra apicem antherae prominens, clauatum obtuſum, concuum, quadridentatum, album.

Neſtaria duo intra tubum germini infidentia, erefta, cylindrica, ſtylum femicingentia, longitudine vix germinis.

Colitur in hortis Sinenſium, copioſiſſime Malaccae. Rariſſime femina proferit.

20. HEDYCHIVM *coronarum.*

A

Gandfulium Rumph. Herb. Amb. V. p. 175. tab. 69. f. 3*

Gandajfuri Maleys.

Krantz-odzr Huren-Blumen.

Radices horizontals ſub humi ſuperficie, teretiufculae, cicatricibus annularibus quae ſquamis deciduis cinſtae, albae, ſubſtans fibras filiformes emittunt.

Caules plurimi conferci et remotiufculi, ſimplices, creſti, vaginis foliorum undique veſtiti, teretes glabri, bi-tri-pedales, craſſitie pennae anſtrinae,

Folia feſſilis, alterna, bifaria, patentia, oblonga, acuta, integerrima, virinque glabra, ipithamea, feſquipollicem lata, laete viridia.



ffrfts terminates numeroſi in fafciculum cDlleſti, ante efflorefcenAm aliqua-
liter in ſpicam ouato-oblongam per braſteas caducas conuoluti.

Bra&eae geminae, oppoſitae, ereſtae, irfaequales, flores 2 - 3 fimulque fa-
fciculum flurum iuniorum iterum inuolucratuni includentes : *exterior* oua-
to-oblonga, marginata, acuta, extus glabra leuiterque ftriata, intus leuis
coriacea,*calyce parum breuior j *interior* lanceDials, acuta, membranacea,
minus concaua, exteriori muko minor.

Calyx. *Ptiantbium* monophyllum, rubuloſum,, fupra medium parum infla-
wm, adapicem diuifum, lanceolatum,¹ acutum, ipfoque apicc caronatum,
glabrum, membranaceum, tubo floris dimidio br&uius.

Corolla monopetala, ilipera, tubuloſa.

Tubus ereſtus, parum curuatus, ſihformis, leuis/ albus, infra fauccm pa-
rum inflatus, fubcarnofuS, fubrigidus, vixpalmaris *),

JJmbus duplex.

exterior tripartitus \ *lacinia inferior* pendula, *lattrales duae* pacentes: omnes
lanceolarae, acutae, (laterales aciuioreſ) membranaceae, neruoſae, extus
ftramineae, intus magis albicantes, tempore matutino praeferrim pluuiio-
fo planiuſculae, alias comiDlucae hincque teretes.

interior tripartitus ; *lacinae*. ereſto-patentee approximatae, in femicirculum
diſpoſitae. *laterales duae* oblongae apicibus recuſſis, margins repando in-
terdum lubo vno vel akero audio, vndulato, niueae, bafi fublutcae^
calloſae, fulcp longicudinali inftruſtae, longitudine aequales; *intermedia*
obuerſe cordata, lata, pro fund e fifla, repanda, CDncaia, tenerrimevc-
noſi, membranacea, niuea, difco bicarinato nitido luteo callofo, latera^
libus multo latior, longitudine aequali-

Faux perforata, oualis, marginata, margine denticulaio, prominulo, luteo.

-*Stamen*. *Filamentum* fauci tubi adnatum, ereſtum, canalicularum, glabrum,
craſſum, luteum, longitudine corollae.

Anthra ereſta, parum recuruata, lineari-oblonga, profunde canalicula-
ta, marginibus fertilis, bafi haftato - diuifii, apice rotundato, calloſo, dorſo
concaua, leuis, nitida; aurantio - lutca, filamento vixduplo craſſior.

Piftillum. *Qermen* lineari-triquetrum, glabrum, craſſiue tubi floris, circiter tres
lineas longum.

Stylus intra tubum neſlariis cinſtus, capillaris, tenuis, glaber, albus, ful-
co tubi, filamenti antheraeque receptus.

Stigma extra antheram prominuluiq, obuerſe ouatum, oblique truncatum
perforatum, ciHatum, viride..

Ne&aria gemina germini infidentia, fubcylindrica, apicibus fotundata, glabra
approximata, germine breuiora,

Obferu. Figura limbi interioris variat. Lacinae laterales non raro ad ^{margi}
nes denticulatae, repandae, vel vno pluribusue ;lobis inftruſtae, ^{vnd}
Rumphii iigura citata tantum differt a plerisque exemplaribus, Lacini^M in
lermediae margines bafi faepe paruas luteas nitidas glandulas habent

Odor huius floris gratiffimus^ideoque a mulierculis ad Coronulas vfitatiffim
Malaccae-

Semina ibidem nunquam profert, fed propagatur e gemmis fruſtulisque radi
cum, et ex hisfacillitne crefcit, vbique quafi ipontanea.

*) Menſura haec mihi quidem dubia videtur, in |m ideo crrgnea fit, diindiun non iudju,

21. BANKSEA *speciosa*.

Herba spiralis Rumph. Herb. Amb. VI. p. 145, 144, t. 64, f. 21

Tftana kua Rhee Hort. Mai. XL p. 15. t. g.

Tawar Malays.

''' *Radices* horizontaliter infra humum diffusae, leres, cicatrigibus annularibus Zinziberis infar notatae, ramosae, nodulos protuberantes erectos conicos acutos pro futuris stolonibus sparsim emittentes, pulvere duplo erasiores, albae, fibras filiformes simpliciter descendentes habent.

Caules plerumque numerosi, remotiusculi, simpliciter, raro erecti, plerumque ascendentes, supra radices clausi, teretes, inferne ad quartam partem vaginis aphyllis vestiti, supra has foliosi, versus summitatem parum spiraler rotati, saepius homine sesquialtiores, pollice erasiores, articulis plus minus palmaribus, geniculis nonnihil prominulis, planiusculis.

Folia patentia, alba, petiolata, superiores 1 partes caulis vaginis suis obducunt, Duato-oblonga[^] integerrima, apicibus parum recurvatis, acutis, saepius acuminatis acumine fetaceo, vix apices vix ante margines nervo magis conspicuo albicans 3 supra leuia ad angulum acutum leuissime striata, nervo communi albicante 7 subtus pilis mollissimis brevissimis adpressis vestita et nervis evidenter striata inferiora latiora, minus, acuta, breviora, omnia subcoriacea.

Vaginae inferiores articulis adpressae, interstitiis longiores, vnde parum imbricatae, tubulosae[^] ad apices femistriatae, marginatae, marginibus parum fimbriatis, glabrae, nervosae, membranaceae, rigidiusculae, vix sesquialtiores.

- - *foliorum* similes, oppositae, oris bifidis fimbriatis, fimbriis cauli adpressis, feracis albicantibus e fibris vaginarum elongatis productis.

Petoli femiteretes 7 brèves, subcallosi, crassiusculi, supra canaliculati.

Spicae teretiales, folicariae, fere, nutantes, strobiliformes, ovato-oblongae, subpithamiae et pollice plus minus triplo crassiores, diu persistentes, e floribus in nuemferis regulares diffusis, imbricatim receptaculo communi impositis; series spiraler descendentes; interstitia propter angustiores calycum apices magis distincta.

Bractae, duz pro fungulo flore;

exterior calyce adpressa, ovata, marginata, ciliata, apice prominulo acuminato carinato callosa, concava, nidida, leuiter striata, coriacea rigidissima, fanguinea⁵ calyce brevior.

interior angulo laterali calycis arte adpressa, oblonga, acuta, carinata, leuis, minus coriacea et colorata, exteriore brevior

Calyx. *Ferantium* monophyllum, tubulosum, triquetrum, basi dilatatum, dorso latiore, angulis lateralibus acutis, minus coloratis, leue, nitidum, coriaceum[^] rigidum, fanguineum, ore angustiore trifido; laciniae duae dorsales approximatae, erectae, femi ovatae, acuminatae, parum marginatae; anterior vero lacinia magis oblonga, apice destituta.

Corolla fupera, basi rubulosa.

Tubum ereciusculus[^] campanulatus[^] subangulosus[^] calyce brevior, subcarnosus,¹ albus.

Limbus duplex.



exterior tripartitus ; lacinae interiori limbo ^prellke, oblongo-lanceolatae, acutae, apicibus, prominulis ci nuob «*.. glabrae ; planiusculae membranaceae, U ruld quatuor l i g i U b us approximatis TMueus. incus praeferrim larere infriore et verfiu us, membranaceus. *Faux* pilis densis dimidio fere brevioribus.

Stamen. Filamentum supra faucem tubo corollae vnitum, W^tum ec apice recurvatum (inst^ litterae S, inuerfie) l««i.inferior!"limbi interioris incumbens, lanceolata Umi planum; niembranaccum, rigidiusculum, nervosum, d Z%? U ruld quatuor l i g i U b us approximatis TMueus. incus praeferrim larere infriore et verfiu us, membranaceus. *Faux* pilis densis citrinis clausa.

Antbera in disco filamentum " c recurvata, n^on TMa U ruld quatuor l i g i U b us approximatis TMueus. incus praeferrim larere infriore et verfiu us, membranaceus. *Faux* pilis densis citrina, anthe lon Slor « nmko lator, membranacea, filamentu tenior.

Corona apex filamenti recurvatus, vtrinque glabra, pili. minimis adfperfa, marginibus vndulata J difcQ Pa & linae anterioris linea lon^tudinali citrina, anthe lon Slor « nmko lator, membranacea, filamentu tenior.

Pistillum. *Germen inferum* basi calycis vnitum. Si lus e ft J r^ce U ruld quatuor l i g i U b us approximatis TMueus. incus praeferrim larere infriore et verfiu us, membranaceus. *Faux* pilis densis citrina, anthe lon Slor « nmko lator, membranacea, filamentu tenior.

Stigma supra antheram pr^v^ ulum, dilatatum inraruatam.comprelTuni, obtusum, ciliatum, dorso biglanduloso, giandulis albis minutis.

Ne&aria nulla.

Pericarpium. Capsula oblonga, triquetra, calyce coronata, trilocularis, marginibus dehiscens.

Semina plurima, oblonga, angulosa. *Hab* inf U ruld quatuor l i g i U b us approximatis TMueus. incus praeferrim larere infriore et verfiu us, membranaceus. *Faux* pilis densis citrina, anthe lon Slor « nmko lator, membranacea, filamentu tenior.



exterior triparrirus ; *larinia** interior? limbo adpreflae, oblongo-lanceolatae, acutae, apicibus prominulis conuolutis-acutis, glabrae, planiufculae, membranaceae, 7- 8 nerueae, niueae, fubaequales, interioris limbo dinudio fere breuiore.

inferior nucans, cucullato-campanulatus, magnus, 2 pollices longus, ore ires pollices lato, primo afpectu nwwwo/iiK/ijJimillimus, dorfo vsque ad tubum fiflb ; marlines dorfales bafi fupra dorfum ftaminis hiantes, poftea inuicem impositi, finiftro dextrum incumbente, vtnpque plicaco vndulato; latere iriferiore carinulis feu fulcis quatuor longitudinalibus approximatis notaws, exxus glaber, niueus, intus praefenim latere inferiore et verfus faucem pilis citrinis mollibus obfitus, membranaceus. *Faux* pilis derifis citrinis claufa.

Stamen. Filatnmtum fupra faucem tubo corollae vnitum, Incuruatum et ^pics recuruatum (infar litterae S. inuerfae) lateri inferiori ^limbi inteipris incumbens, lanceolatum, planum, membranaceum, rigidiufculum ^neruofum, dorfo pilis maioribus albis bafi citrinis, denfe obfitum, limbo inccriore dimidio breuius, lines 4 - 5 lacum.

Anthera in difco filamenti paginae anteriori infra apicem adnata, apice recuruato coronata, linearis, angufta, fulco paruo diuifa, virinque ad apices callofa, alba.

Corona apex filamenti recuruatus, vtrinque glabra, pilis minimis adperfa, marginibus vndulata, difco paginae anterioris linea longitudinali citrina, antheraj longior et muko latior, membranacea, filamento tenerior.

Piftillum. GVra*» inferum bafi calycis vnicum.

Stylus ereftus, reses, glaber, albus, bafi craiffior, fuperne a fulco antherae receptus.

Stigma fupra amheram prominulum, dilatatura, incuruatum, compreffum, tbtufum, ciliatum ^ dorfo biglandulofo, glandulis albis minutis.


Nt&arza nulla.

Pençarpium. Capfula ablonga, triquetra, calyce coronata, trilocularis, marginibus dehifcens.

Semina plurima, oblonga, angulofa.

Habitat in nemorofis humidifculis Malaccae. Colitur in hortis pro vfum medico,

Tab. I.





28



a. a. flor magnitudine naturali et aucta.

Hyptis purpurascens





Pimpinella dissecta.

Tab. III.



Astragalus arcuatus ft.¹

■

W. Retzius

ANDREAE IOHANNIS RETZII

PHIL. MAD. AD REG. ACAD. LVNDINS. HISTORIAE NATVR. PROF.
R. ET ORD. DES. SOCIET. PHYSIUGRAPHICAE LVND.
SECRETARII ETC.

FASCICVLVS

**OBSERVATIONVM
BOTANICARVM**

(iVARTVS.)

CVXI FIGVRIS AENEIS.



LIPSIAE

APVD SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM.

clclcccclxxxvi.

1786

VIRO NOBILISSIMO .

D. THOMAE PENNANT

ARMIGERO .

Hunc Quartum Fasciculum in tefferam grati afiimi ojfert.

AVCTOR.

L. B.

Ultra dimidiam huius Fasciculi partem pulcherrima constituunt Gramina, quae, nunnulis exceptis, communicavit infatigabilis in India orientali Botanices cultor, anicus mihi et paucis feledus D. KÖNIC, quem nec impensie, nec molestiae, nec ipsa vitae pericula deterrent, modo Botanice, dilectissimi mihi Scientiam, locupletari inde videat. Plus una vice faucibus orci erectus {a} mox novura iter parat, novisque perculis exponit.

Hic egregius Vir, cuius erga me benevolentiam et amicitiam vix fatis laudare possum, varia antea ignota Materiam Medicam illustrantia indagavit, nonnulla (!) communicavit, reliqua, si unquam ad nos forent, quod det Deus! recedat, curiosi ab eo expectare possunt.

00 Scribit in ultimis litteris d. 16 Octobr. 1782 Tranquebariae datis: „Nuper itenim morti proximi» „fui, niorbu enim diru, quem Dy[criteria Apoplethica] appellare fas est, tenbar, quo me snor-
99 tuum jam in urbe rumor spargebat. Sanitation reddidit Clementissimus Dcus. Integer tamen
33 iicnijs ante perfrtain reilitut Joiirni tranfit. Morbi curfus hic est: Diarrhoea corripitur aeger
„cum elastica tjuafi uxreinciUonim cjeffionc; dein fcquuntur ejusmodi dejeffionc, quae nihil nisi
„ humor em lymphaticum clarum continent. Mains mox frigent cum pedibus. Manuum musculi
17 contrahuntur, et hae aquae ac fides flavidum glutinofum niucuni trauffiunt. Pulmones angu-
„ftantur, vox raiaca vix adstantibus percipienda. Alii timore percutiuntur, alii in Jolentes videu-
„tur. Pulfi in omnibus extremitatibus deficit et tantum ad arteriam Carotidem observatur, qua: n-
„ vi irregularis. Nonnulli iam vomerit. Ungues lividi fiunt, et diri spafmi brachia et furaf
9> corripunt, cum clamore aegroti. Haec mors fcquitur fine infigni convulfu motu. Curfu in linc
„ fequitur morhua, qui faepe intra femihorium terminatur, iudnunquam fex ad oVo horarum fpa-
„tio abfolvitur. Qiii rcinidiis fubJevantur i donec is adnychthemum spatium illum protrahere possunt.
„Pauci hinc relicti convalescunt. Hunc ego niorbu in periculofiffimiiu vici et fuppei prolixo de-
„fcripti.“ —

Viz fanatup iter in Berfalam meditalur, qui Ma lac cam, Siatn, ter aut quater Zeykinam etc. vi-
dit, et plura quam ullus alius in hi fce uris collegit. Fati cclberriinDruni *Haifdqmji*, *Forsk?tb/o*
Löfting, *GomtrfoN* metnor rogavi, immo obfecravi, ut Europam cum thefauris suis redeat, nec
fatal em terminuu in India expe^ec, ne cum ejus vita praecipuus itinerum' firu&us deHderetur. Sed
infatiabile rerum naturalium desiderium illum tenet, omni laude dignissimum. Hiftoriam Natura-
le in quidam inultis et curiosissimis inventis ditat, et cum amicis in Europa degentibus multa com-
municat e re Herbaria, sed quae haud minus momenti in Animalium regno detexit, vereor ne, si
in India diem subiret supremam, omnia cum CD percant.

(b) Haud inutile duco, quae ad inaeas de his quaestiones communicavit, apponere.

Excoecaria ad Tranquebar vili/fiffimum est lignum, quod combustum foetet, leve est, et frami-
115 instar deflagrat. Nonnulli mihi pro certo affirmavere Succum lasleuin venenitum esse et homi-
nes eo infertos intumescere, etiani niori. Ego autem faepe raios abrupti, ut femina kabrem, et
fuccum hinc itile in me sparfuui absque ullo inconunodo vidi.

Columba Radix a Lusitanis et Mozambique adducitur; ibi vero a Caffis in continentem com-
municatur, et kicrofa uranino est men, nam Infulani illa multiim utuntur, etiam in Dyfenteria, sed
nioriuntur faepe cum Medicina in ore.

Sfuigiuh Draconis copiose in peninsula Malacca colligitur a specie *Calami*, sed ad Chinam fere
Qinnis transporratur, ibi enim raaziino cum lucro venditur, De *Sanguine Draconis Soccotrincfi*,
quod ab eadem planta colligatur, vix credo. *Malqctnfit* faepe Gil mini Damar, quod Animes est
species, adulteratur.

Terra Japonica. D. FOTHERGILL, qui D. KERR sequitur, can tendit illam e *Mimfa spicata*
Fluk. Mant. fol 1, pi. 5. 6. tab. 329. f. 5. 6. provenire. Ego de hoc dubito. "Quia e Malabanco
litore huc venit Tamulis *Malagalati* dicitur. Vera Terra Japonica Tamulis *Kaskatti* audit, et a



Interea mei Fasciculi de ejus, non minus quam reliquorum Amicorum, erga Scientiam et erga me animo testis fuit. Infruiet simul infra continuationis *Supplementis Plantarum*, a LINNE'O utroque, pro dolor! demortuo editi. Illos continuare mihi proposui, donec potero. Si placet propositum, et labor ipsi Amicorum est, benevolas porrigere et auxiliatrices manus. Si vero incus, opto, ut, quibus copia est novarum plantarum, illas ipsi describant. Perinde enim est a quo describantur, modo fiat. Laudem enim et nomen non quaero, sed utilitatem et scientiae florentiam.

pauperioribus cum Bectd manducatur; opulentiores vero Tucco utuntur, qui e Malacca provenit, et *Cattu-La-nbar* vocatur, quique e *Ciuchonae* specie copiose excoquitur, Secundum *Kacmpfer* in itin. Japon hinc vix erit Terra japonica.

Gummi Gutta vix *Zylonertfo* e *Cambogia* *Gutta* non provenit, sed ab alia arbore polygaraa fructu Ceraiformi, eduli, quam alia vice describam. Gummi illud in Zeylona collegi, quod prunis in perfura fuavi odoris relquit.

Flura in sequente Fasciculo communicabo.





* * *

[I. USTICIA *acaulis* L. Suppl.

Descriptioni adde

Folia fjeplus lyrata, alia tamcn in eadcm planta Integra.

>• GRATIOLA *Lobelioides* caule fubnudo ftipulato, foliis oblongis integerrimis, panicula dichotoma, capfulis fubglobofis.

Descriptionem celcberrini inventoris, quamvis non nimirum prolixam, potius quam novam ex ficco fpecimine conficere, addere volui.

Stipulae capillaceae, numerofae, falciculatim confertae, fimplices, breves, niveae.

Gemmae juncturae, varius fupra medium divifis, erechis, aphyllus, teres, fulculo oppofito obfoleto lato utroque latere notatus, leviter ftriatus, glaber, articulatus, articulis plerumque 5 fcipulatis, pedalis.

Flores fupra radicem a^m 1. 3^m pariura, oppofita, ad articulos approximatos adnata, feffilia, credla, apicibus parum recurvatis, lineari - oblonga, acuta, integerrima, ftriis leviter notata, utrinque glabra, pagina inferiore parum concava fubcarnofa, inania, caule triplo latiora pollicjria, interdum bafi parum colorata praelertim fubtus.

Stipulae ad articulos adnatae 2 oppofitae, feffiles, femiovatae, adpreffae, acutae integerrimae, glabrae, fubcarnosae, caule foliisque viridiores, parvae.

Panicula terminalis, laxa, rara, ex pedunculis plerumque fimplicibus compofita.

Pedunculi patentiufculi, alterni, remoti, teretes, glabri, pilis raris interdum adpreffi, teimes, fubaequales, bafi bradeati, fubrubro - virides.

Pedhelli flore longiores.

Bractae Aipulis fimiles, nifi quod parum anguftiores, parvae.

Flores inferi.

Perianthium monophyllum, carapanuhturn, glabrum, parvum, quinquepartitum; *lacinae* adpreffae, oblongae, marginatae, inaequales: fuperiores z parum majores apice magis rotundato; floris tubo brevius

Corolla monopetala, irregularis, patens, bafi tubulola. *Tubum* erecSiufculus, teres, colore obfeuriore ftriatus, calyce longior. *Limbus* incurvato - patens, campanulatus, inaequalis compreffurculus, quadrididus. *Lacinia Juperior* vix adfeendens, obcordata, planiufcula, reliquis brevior, coerulea; *lateraks* rettae, oboratae, apicibus oblique retusae, fuperiore paulo longiores, concolores; *inferior* patens, obcordata, planiufcula, in difco macula alba obcordata punftisque coeruleis obfeurioribus raris pidta: reliquis duplo major. *Faux* nuda compreiTiurcula.

Stamina. *Filamenta* 2 remota intra faucem tubo adnata, bafi erefta, apicibus parum tortuofa-curvatn, glabra, brevia, fufco - yiridia. Barba ad bafin filamentorum ex pilis fericis albis brevibus. *Antbrac* connatae! fingulaegeminatae etante efflorefcentiam diftindae; iingula pars oblonga, eregla, utrinque acuta, lutea, pofttea difformes biloculares.

Rudimenta *Staminwn* 2 approximata inter vera tubo floris adnata, parum prominula, plana, ftrifte decurrentia, pilis niveis minutiffime barbata, ia nonnullis fpeciminibus vix diftinguenda.

Pifullunu *Germen* fuperum, ovatum, glabruin, fulculis utrinque notatum.

Stylus erectus, glaber, viridis.

Stigma infra anthers peltatum, fuborbiculatum, magnum, parum concavum, glabrum, margin? anteriore integrum: doriali utrinque emarginatum: intra emarginaturas denticulis geminis redlis approximatis callofis. Iuxta dentes verfus difcum callus prominulus, albicans duriufculus,



- Capfula* ovata, glabra, fulco minimo notata, calyce duplo longior, bilocularis, bivalvis.
- Semina* numeroza, oblonga, utrinque acuta, fubrugofa, receptaculo bipartite adnata,
- Habitat* in agris Oryzaceis. Viget tempore pluviato CDpiofe prope Tranquebar, alibi rarior. CHKÖNIG.
3. GRATTOLA *grandiflora* caulibus ttecumbentibus, foliis ovatis ferratis, pedunculis oppositis, capfulis fubulatis.
- Habitat* prope Tranquebar, Madras, Siam, Malacca, folo humido pingui* Dedit Cl: K 5 N 1 G.
- Caules* decumbentes, bifidi, angulofi, glabri.
- Folia* opposita, ovata, ferrata, facie etiam crenata, glabra.
- Peduncululi* oppositi.
- Flores* ratione reliquarum partium magni.
- Capfulae* langae, fubulatae.
4. GRATIOLA *veroniaefolia*, caule repente, foliis ovato-lanceolatis, acute ferratis, floribus terminalibus oppositis.
- Crescit* cum Gr. grandiflora D. KÖNIG, qui plantam dedit.
- Caules* angulati, diffusi, procumbentes, addenacula longas radicales emittentes.
- Folia* opposita, sessilia, ovato-lanceolata, acute ferrata.
- Flores* parvi, faturate coerulei, terminales, oppositi, bracteati, pedunculati.
- Calyx* quinquefidus, linearis.
- Capfulae* fubulatq.
5. GRATIOLA *oppositifolia*, caule adscendente, foliis lanceolatis ferratis, pedunculis oppositifoliis.
- Habitat* ad Tranquebar in agris oryzaceis et huraidiufculis. Viget tempore plu-
_V10fo CL KONIG.
- Caules* plerumque adscendentes, rarius erecti, quadranguli, ftriati.
- Folia* lanceolata, argute ferrata, nuda, inferiora opposita: axillis faepius ramiferis, fuperiora alterna.
- Peduncululi* ad folia alterna oppositifolii.
- Capfulae* longae fubulatae.
6. GRATIDLA *byjlopifolia*. Linn. Mant.
- Folia* faepius ovata, in primis inferiora.
- Capfulae* ovatae.
- Obf* Foliorum ad articulos proportio, nullam dat notam constantem.
7. LOEFLINGIA *indica*, caulibus depreffis, foliis fubtragonis lanceolatis, ftripulis fcariofis, pedunculis dichotomis,
- Pbatiaceum depreffunu* L. Mant. alt. p. 56a*
- Habitat* in agris oryzaceis et ftagnis tempore arido exficcat. Viget copiofe Aprili et Majo. CeL KÖNIG.
- Calyx* pentaphyllus, fbliolis carina viridi-nigricante: margine lato fcariofo.
- Corolla* calyce minor, purpurea.
- Capfula* unilocularis, polyfperma.
- Cetera vide Mantill. 1. cit.
- g. SCHOENUS *cyperoides*, culmo compreffo femitereti nudo, fpicis feffilibus lanceolatis tortis: infima involucrata.
- In partibus aridis folo indurato Zeylonae ledlura communicavit Honorau KÖNIG.



Radices simplices, filiformes, descendentes.

Culmi foliarii, pedales et ultra, nudi, compresso-femiteretes, Kliati.

Folia filiformia, longitudine drdter dimidia Cuhni, basi vaginis fufds emar-
cidis vefliti.

Spkae a - 7 feffiles, forma et torfione *Cyper* *monofiatbyi*; fed plus duplo la-
tiores, nitidae: infima. involucrum habet monophyllum, fpica brevius.

Squamae cymbiformes, compressae, xarinatae, mucronatae, cartiagiatae.

Stamina tria; filamentis membtanaceis.

Germen trigonum, pedicellatum, album.

Stylus triqueter.

Stigmata tria.

- p. SCHOENUS *Bobartiae* culmo compresso, capitulo terminali involucro
pentaphyllo).

Dedit CL ICONIC forte e Zeylona.

Radices plures, congefti, e tunicis furds inflatis bulbolie videntur, fibras lon-
gas perpendiculares demittunt.

Folia lineata, laxa, faepe cultii altitudinera Tuperant.

Culmus compressus subpedalis.

Capitulum spiratum, breve, terminate, involucratum, rachi tereti.

Spiculae plures, squamis scariofis ovatis, cavis subquinis.

Involucrum pentaphyllum, foliis decrefcentibus: longiore 9, brevissimo Tesqut
pollicis lotigitudine.

10. CYPERUS⁵{^»^«> tulmo tereti, umbella compofita involucrata, ipids
lanceolatis, glumis mucronatis.

In arenofis Tranquebariae leftum mifit *Cel.* KÖNIG.

Radicalae fasciculatae, fibrofae, pollicares.

Folia radicalia, filiformia, culmo duplo longiora.

- *Culmus* teres, ftriatus, vix fesquipollicaris.

Ufibella compofita, pedunculis 5-6 umbellulatis.

Spiculae umbellubrum 4 - 6, lanceolatae, compressae pallidae, taicdio rufo*
fufcae: glumis carinatis mucrone parvo terminatis.

Involucrum tetraphyllum umbella triplo longius.

- 11, CYPERUS *arenarius*, culmo compresso Hudon, ipids capituli glometatis
feffilibus, involucro fobmonophyllo,

Creicit in arena volatili Indiae oricitalis. Coiliimuiicavit *Honor*, K 6 N i c.

- " *Radices* articulatae, repentes, plures, fasciculos foliorum basi vsinatosemit-
tutit.

Folia filiformia, nuda, 3 - 6 pollicaria, compressa, ftriata, hinc tannliculata,
flavo-viridia.

Otlmus e fasciculo foliorum folitariis, ftriatus, compressus, folus nonmhil altior.

Capitulum feffile e spiculis S-12 compofitum.

- *Spiculae* crassiores, compressae, distichae, e squamis lato ovatis, tymbiformi-
bus, ftriatis, fulcis, albo marginatis.

involucrum monophyllum, capitulo longius, tormpiretum. Saepe alterum fo-
lium capitulo brevius adest.

- x2. CYPERUS *capitatus*, culmo subangulofo ftriato medio fohofa, capitulo
terminali triphylo, spicis feffilibus.

tucum natalem ignoro forte indicuii gramen*.

It)

Radiculae fibrofae, breves.

• *Qdnutt* 4pollrcaris, fubangulatus, tompreffils, (tt-iatus, bafi folium unum vel alterum, in medip vero fafciculum habet.

Folia bafi snultum latiora altitudinem culmi parum fuperanf

Capitulum globofum *zfpitulu* feffilibus linesri - bblorigis.

Glumae imbricatae, fcariofae, raucrone fubariftato recurvo terminatae.

Invokcrum triphyllum, inaequale.

13. CYPERUS *fthohnifems*, culniio riudo triquetro, umbella compofita invOlu* crata, ijiiculis lance Dlati.

E Tranquebaria mifit *Honor*, KÖNIG.

Radix bulbofaj fibris longis praedita, ftoloncs horizDntales Tquafnis veftitos ipicc biilbos folia *st* culmos geretites cmkttt.

Folia angufta, linearia, complicata, palmaria et femipeclalia/bafi fua ciilmura obveftiunt.

Culmiis ipittamaeus, triqiicten

Vmhella depauperata umbellulam unicam fubfeffilem tresque circiter pedunculatas, 3-5 ftachyas habet.

Spiculae lanceolatae, rubentes, glumis irabricatis.

Involucnhn fubdiphyllum, foliD longibre *i* breviore fcemi -pblKcari. Praeterca unum vel alterum folium fldhuc brevius: umiia fubulata, ftriata.

14. CYPERUS *Panporei*, culmo triquetro bafi foliofo, involucro triphjlloj umbella univcrfali decompofita: partialibus fubffifidis.

Cyprus Paugorei Friis Rottb. defer, "eric. p. 31. tab. 7. f. 3.

E Tranquebaria mifit *Amk*. KÖNIG.

Benc convenit cum deftriptiDne Rottbblliana, nifi quod

Involucruw umbella bngius

Squamae loco involucri partialis lanceolatae, ajJice loitgo Uiformi.

Ochreae duplo longiores.

Spiculae non filiformes, fed compreffae, Hneares, latiores quain in ictme citata.

*edtdta"haec differentia forte ab aetafe pendet. -Ccterum

Radix fibris multis" inanibus.

Culmiis 2, \ pedalis.

I^b/rVfonga, inermia, laxa.

Pedimculi umbellularum flexuofi,

15. CYPERUS *dnnamomeus*, culmo triquetro foliofo, umbella fpiculis capita* tis pedunculatis feffilibusque, involucro pentaphyllo feffulato -fcabro.

In Caldario Horti fuit, fub nomine *Cypri ligularis*.

Radix fibrofa, arinuü.

Cuhni tripedales et ultra, folitnrii, triquetri, bafi foliofi, fuperne nudi.

Folia culmo altiora, pollkem dimidiumfere lata, plicata, carina inermi. Margog interioris partis inermis, fed fuperibris aſper.

Involucrum pentaphyllum: Toliolis plicatis marghie ferrulato - fcabris, carina inermi.

Folium extimum i £ - 2 pedes longuin, reliqualircviora, ut quintum bipollicare fit.

Umbella capitulis compofitis: tribus pedunculatis pbaunculis cOmpreffis; quinque vel plurHjus feffilibus, involucello fubulato fub fingub.

Ocbreae 2 ad 12 linearam longitudine ancipites, oblique truricata?-

Capitulaoym, cgmppofita, cinnainomea, c

Spiculis Congestis, cornupressis, difflidiis, linearibus. *Squamae* oblongae, imbricatae, viridi-carinatae, obtusae, 6-9.

Obf. Figura Scirpi ligularis in Friis Rottb defer, et ic, A XL bene nostrum refert. Sed nullum nullo modo squamularum spicae vidi, nec squamas lanceolatas ad pedunculorum divisionem, nisi involuella fubulata capitulo fungulo fubstituta longiora intelligat. Ceterum defer. Linnei pedunculos habet triquetros et spiculas fubulatas.

16. CYPERUS *geminus*, a Nob. ROTTBÖLL in Defer, et ic. p. 25 defcriptus est. VIII. f. r. deprehensus etiam in graminosis Zeylonae nascitur, ubi bulbi ab indigenis comeduntur, ut in litteris refert Celsus et WIG. Definitio vero proprie a D. ROTTBÖLL data minus apta, potius haec erit:

C. culmo triquetro feminudo basi bulbofo, involuero diphylo* unibella fubfimplici spiculis linearibus,

17. CYPERUS *compreffus* L.

hi Americana varietate *Involucrum irifphyllum*

Malabarica *tetraphyllum*

Zeylonica *pentaphyllum* est foliis longis*

18. CYPERUS *Luxiae* Friis Rottb, Defert. t. ie. p. 5^a lib. 2^a,

A Scirpo *Luxiae* III a Linné describitur, nisi erronea sit III. Vixi describitur.

Cyperus enim Rottböllii, quoniam benevolentia CL. RÖNIG poillideo fine tillo dubio Cyprus est Variat nunculum quoad involucri numerum, vidi enim foliis tantum tribus in truncatun

19. SCIRPUS *glomeratus*, culmo nudo teretiusculo, umbella glomerata involuero diphylo brevi, floribus diandris.

E Zeylona communicavit Amiaff. RÖNIG, Ubi ad margines agrorum cum Scirpo diGhotomo creciti

Radices longae, filiformes.

Folia radicalia, conferta brevia, rigida, clivida.

Cidmus Tubtereti-fulcatus, nudus, foliarius, palmari

Umbeila composita glomerata.

Involucrum foliis diobus brevibus rigidulis confert umbella brevioribus

Involuella, fquamae nomenclaturae fariofa

Spiculae ovatae

Squamis Jatis, obtusis, concavis fuscis, alba-marginatis.

Stamina duo.

20. SCIRPUS *arvensis*, culmis compressis ftrintis/umbellis simplicibus, iavo lucro monophyllo brevi.

E Zeylona mittit Honor. RÖNIG.

Radices fibrosae.

Culmi bipedales, basi vagina fufci arigukta bipolycari vestiti, compressi, ftrinti.

Folium breve simul cum culmo e vagina exiens.

Umbeila terniinalis, fimplex, 5-g ftachya. Raro pedunculus intermedius fpicas duas pedicellatas gerit.

Involucrum plerumque monophyllum Umbellae brevius

Squamis ovatae, fufcae, pedunculatae, e

Squamis lanccolitis, a tali fenfin d d d d d.

ai. SCIRPUS *Polytrichoides* culmis compressis fctaceis, fpicis terminalibus foliariis fubnutatitibus monandris.

Grammolytrichum Rumpert. Amb. T- VL p. 17. t. 7. f. h



Vulgatiffimus in paucis depressis tubulis Zeylonae. D- KÖNIG-

Radices capillaceae, nigricantes.

Culmi cepitofii, depressi, 4-6 pollicares, fetacci, compressi, ftriati, basi una cum foliis vaginata.

Folia breviora, filiformia,

Spva folitaria, fubovata.

Bra&ea unica fpica nonnihil brevior, acuminata.

Squamae Dvatac, carinatae/obtufac, fcariofae; apicc Fufcae.

Stamen folitarium, raro duo.

22. SCIRPUS *nutans* culmo compresso fubtetragouo nudo, fpica ovata, folitaria terminali nutante.

In uliginosis Malaccas kiiluini dedit *Cel* Kb NIG.

Radix fibrDfa^

Culmi plures, fpittamaci, filiformes, compressi, ex ftria profundiore laterum angustiorum fubtriangoni, bal squamis brevibus fuitis, dein v^iginis 1-2 pollicaribus aphyllis vctiti.

Spica folitaria, tenninalis, ovata, nuda, nutans, c

Squdmis ovatis; integris, fcariolis, fubfufcis.

43. SCIRPUS *dichotomus* L.

Rinas varietates e Zeylona mifit *Opt. m*ÖNIG.

a> bipedalis, umbella rriagna, diffufa, ramoJiffima.

p. femipedalis umbella parva parce ramofa.

utraq; cubnos habet nudos compressos, latere altero piano altero nonnihii

Fig. Pluk: t. 119. f. 3. verum icon ROTTB. t. XII- f. 1. et defcriptio longe aliam innuunt plantain,

Semina in utraque varietate alba forte aliquam attentionem xnerentur.

24. SCIRPUS *lateralis* culmis triquetris nudis, fpicis fubternis lateralibus, involucrb monophylb brevi.

In Zeylona leflum dedit *Gar.* KÖNIG.

Culmi fpittamaei-pcdales, filiformes, triquetri, bali vaginati.

Folia COiiformia* fed breviora.

S-phae plerumque trcs, quarura una peduncubta, paulo fupra medium culmi egrediuntur. His faepius adest

- -*Involucrum* breve, monophyllum.

Qbf. His itaqu^a *Scirpo fupino* abunde differt. *Flares* dercribers nequcu, fpecimina enini noftra fruclu mature gaudent.

35. SCIRPUS *mribaeus* culmis fasciculatis fetaceis filicatis, fpica minima ovata terminali. *Frits* Rottb. *Defer*, p. 46. t. XV." § 3.

E Zeylona miit fpecimina *Amidj}* KÖNIG exadle defcriptioni et figurac i\Nob. ROTTBÖLL datis repondentia, praeter triquetros culmos, quos obiervare lion potui; in meis exemplaribus enim compressi lijnt. Cecerum

Filcunenta longitudine piftilli, €

Setae tres tantum.

Semen ab interiore latere planiufculum est, et ab exteriori dorrum elevamm liabet, uV ovato - fubtriectrum dici poteft.

26. SCIRPUS *aefivalis*, culmis depressis triquetris nudis, umbellis compoiw tis involucratiss, floribus motiandris.

E Zeylona dedit CL KÖNIG, ubi vulgatiffimus in fluvii fundo Jimofd Tub Sirio exficcatissi

kadiculae capillares, nigricantes

"*Culmi triquetri*^ nudi, filiformes, bijollicares **depressi**.

Folia filiformia^ canaliculata, culmo plerumque longiora hirta, basi cum culmo ope vaginae conjuncta).

Umbellae pedunculis simplicibus et limbatis.

Involucra filiformia, hirta^ oliolis 5*5 quorum tria umbella longiora sunt.

Involucra breviter ciliata.

Spiculae tereti - subangulatae.

Squamae fuscæ, carinatae, flabellatae, decumbentibus divaricatis, monandrae;

27- KYLLIN (in *Jiimatrensis*) umbellae terminali: flosculis sessilibus pedunculatis que cylindricis squarrosis, involucro universaliter polyphyllis partiali nullo

In-Sumatra lectum dedit, flor. rever. Mag. WENNERBERG.

Sed defectu involucri partialis differt a *Kyllingia umbellata* Rottb. et forte magis pertinet ad umbellatam.

Scirp. cyperoides L. Mant. al. p. 18r*

&8- SCLERIAE genus, quod in Aft. Reg. Acad. Sci. Sutti, ty6\$ cottidit Noh BERGTUS, omnino videtur distinctum esse, et a genere CARICIS diversum, pluresque species sub hoc comprehenduntur omnes fere sub nomine *Caricis litoralis* corifusae,

Hujus characteristicae erit:

Spiculae Mafv\ Gluma fexvalvi inflexa.

* - Folia - - fexvalvi; flora.

Semen globosum album nitidum.

Abderus *Styloturn* diversus est. D* BERG I t> s. hinc fuit Scieris tribuit, hinc fere tres habent.

Calantagrostis Rumphii diversissimum ab his est *caricis* veto *Amboinica* ejus videtur hujus esse generis*

589- SCLERIA *aponiformis*, culmo terphylo, paniculae coriatae ramis flexuosis, spiculis sessilibus: foeminae axillaribus masculis bifloris

Mi fit amicis LÖNIG»

Folia - * -

Culmi trigonus, lateribus pinnatis

Tenduntus communis paniculae multangulus, felixque triangulus

Spiculae masculinae teretes alternae.

Folia plum capillare, breve sub quo vis paniculae ramis.

Fides fere-Poc.

go. SCLERIA *tennis*, culmo folioso; foliis inermibus, panicula capillari, floribus sessilibus: exteriore masculo, interiore foemineo*

Zeydneffe granien communicavit honor. LÖNIG.

Fides juvenis tenuioris.

Folia filiformia

Panicula parva, junctis divinis

Flores dimicantes praeter terminales fere hilohini, sessiles intra squamas constrictas, altera masculo exteriore, feminae altera interioris.

31. SCLERIA *ievis*-3 tulmo folioso, foliis inermibus, paniculae ramis dimicantibus involucratis, spiculis sessilibus pedunculatisque

Ex India Orientali dimicantibus habui.

Plurima cum *Scleria mitis* Bergii 1. eit. t. 5. habet dimicantibus, ied



Spiculae majculae leffiles et pedunculatae

- - foeminne onlifcs ieffies.

Tdliotiim V Tnvblūtrimi filiforme sub quovis ramulo paniculae,

Folia anguftiora.

Qdmus anguftior.

Si, ^ ESTID *aniailat'us* cūlmis teretibus aviculatis, fpica'folitaria articulate.

1f Trnquebnria cDmmunicavit *Clar. KONIG.*

Radix repens, horizontnlis.

^Tolia \|. *culmi ft crib's*) filifbrmi - teretiā, artictlata, inter articulos inatitia,
2 - 3 pedalin. " % • i •

Vaginae tres aphyllae, quarum i^a breviflimi tertiam pollicis-pafterft,
3^a pollicem umimvel unum cum dimidiD, 3^a quatuor ad quinque
••^ollicum longitudineni acquat.

Qdmus folitarius, craffilic pennae anferinae, 4-pedalis, treti-articulatus. 1

Vaginae qualcs in foliis, fed longimfes.

Spied"bvata, fquai'rofa, pdilicfs ab apicc culmi acuto remota fpatio, lateralis.

33. CENCHRUM *granitlare* Mant. alt. p. 575. e Sūmatra et Malabaria poffido*

"Uterqucyō/«bt *Vaginas* pildfas, lhdgis fttis ctalbis pilis.veftitas habet.

Brafyeae parvac flores in racemis diffiiguuiit.

Racem facpe plures quam duo ex cadem provcaunt vaginā.

34. SACCHARUM *animifnaceum* paniculae CDnfctafe pedunculis divifis, flofcil-

Us gemiis fcflili pedibellatoqub;x:0rolli5 triyalvibus polygamis.

Colitur juxta fcpes ctad fagnorum matgines pōps Tranquebar, alibi r-
rius. Inde mifit *honor.*"uŌINIC.

Culmi alti, usque ad 10 pedes, craffi, femi-iwnBS, "toliofi»

fōtolata, vci-cicillata, culmo npproxiiiata.

^ - "*Pawoula*-bipedalis, contredia, rachi tetragona.

Fedwiculi ycticiilati, triquetri^ articuiati, divifi.

• *Flarēs bini*, altero fcflili hcrinaphrodito, altero pedicellato fucpē itiafcūlo.

" Cfl/yx'uniflorus, gkrais aequalibus lana triplō fere lbngibfc vcttitis.

Corolliae faepius trivalves, valvulis hynlinis calyca minoribus: unalongiore acu-
minata. »

Nectarium fquafiuac a. 1. 3. tenerrhtiae, hyatinac.

Samina tria, in mafculis faepe duo.

Sty It barbati, nigricantes.

∴ - Taimilis *PM-Caru^bo*, id est: Saccharum Dacinpura. *QU/m* toti Tacpe ad
itifimum tefloruin fratrum adhibent'ur, quūLi feliqviis hielius duVenti fed reftri
gium quoque praebent Serpfcntibus, Lacertis etc. haec teda. *Cel. KONIG in tin.*

35. PHALARIS *fentat* & "\.mb.. Siipl. p. rc6.

In excmplaii mco glumac rainimc hifutac funt, fed glabrae ac nudaē, e
characVcre itaque excludi defect *birfuties*.

3Q. PHALARIS *aspera* panicula fpicata treti, xalycibus obcordatis **mucronatis**

* " *tiabilft* in alpous Eurbpae hierifiionalis.

Radix annual'fibrofa.

Culmi fpithamaei, ercdi, bafi taftiofi vaginatf.

folia angufta, nuda, brevia.

Patticuty ificata, craffitic pennae anferinae", i - 4' pollicēs longa.

Calyx obverfe cordatus, pafiide viridis, ^urus, gliimis aequalibm, fujperne **vōn**
tricofis, mucrone terminatis^ leviter carinatis.



Cofollae glumae aequalcs.

Semen ovafe, oblongum, mimrae comprdfuni,

37. P *PASPALUM longifiorum*, spica gemina, floiculis oyali- oblongisi

E Malgbaria, ubi ad inargines agrorum crefcit, mifit *Son.* KONIG.

X2ulmi adlcendentcs, filiformes, tenues.

- *Folia* brevia, acuta, patentia ad culmi bafin j :dpia vagina ad bafin fere culmi protenfa in folium breviffimum terminatur.

- *Spicae* 2 cteftae, lineares culmum terminant

'*Flares* alterni, pedicldti, apprefli.'

Rachis plana, parum flexuofa.

Calyces ovaies, aeliti, platii, virides, ftriati, nudi, *Vdtbulis* aequalibus.

Corollae valvula altera calyci figura et magitudine coiiformis, altera minof.

Fades Panici diftachi.

-Hiiicgicri putius quahi *MUii* affociari puto-

38. P *ANICUM* /cft^rw») Ipicis remotis, floiculis fecundis^ tacheos dentibus fetigeris.

E Chiua mifit *Cel.* BLAITH.

T: *Odmi-filituhWdsj* famoll, fblicth

Folia bipollicaria, bafi fubcordata, marginibus vaginarum ciliatis.

Spicae inferiores remDtae, superioresTnepe VertiCillatfle, breves.

. *Flows* fecundi, geminati, verc felTies, altero tamen fitu altiore.

. *Rachis* clépreffa, deniibus pro fbiltulis manifestis feta iina vel alter^ ab utro-
' que flofculi latere in frudlis.

''' *Caly'X* OviiUS, neums, valvula accefforia brevi> ht^

Obf. Paniain repens Burm. Fl. Ind. p. 26. T. 11. § 1. quod a *Ptfm'co* ejusdem nominis apud Linnicum liti etiam a *PanhogroHario* ejusdem tiiVeriffimum cil, huic percinefc credo.

39. P *PANICUM flavidum* culmo-foliOfo, fpiculis remotis feffilibus appreflis fe-
cundis paucifloris.

E Zeylona mifit *bonon* HÖNIG,

Gramen creftum a bipo^pri ad femipedalem altitudinerti excrefcit^

Radix fibrofd, fibris inaHms.

Culmi plures erefti, ad infumam Tpicaiii usque fbliis glabris Veffiti.

^ *Ray* CHpata.

''' *Spiculae* 3 - 7" Irtives, plerique fexfibrac, eredlae, feffiles, apprefae tres pollicis quarcis partes inter lb.rciuotae.

Ipbres globoli, alferni^ jfecundi, Havi, Viridi - Indrvbi.

Calycis glumae omnes apice violaceo.

Ob(Mulmm affine.P^?Vo-fir/zo/rf/Vquod vero majus eft, viride, foliis Ion-
gioribus, vaginis relative anguftioribus. *Spiculae* floribus usque ad 13 ovatis u/bis
ilhrnaculatis ihAruuntur III a LINNE' in Martilla huic feil *P. Briz.* adfcribit
fpiculas longitudine internodiorum et flores ttiplici (bric diipofitosj quae in no-
rtrD exemplari nan iaveniuntur.

40. Y *ANICUM quarrofum*, fpicis geminis horizontalibus, involucris florum
< " Ajuarrölis, tulmi^ deciiiiibentibus.

In arcnolis Malabariae teniforc pluviofo frequen?.

Gramen facie et ftru([iura adco firtgulare, ut prDprfum videatur conftituert

* *genus.* CL autem KONIG, Eui id debco, Pan cis adjunxit.

Cuhni profrati, radicantes, ramofi, folioff,
folia brevia, conferta, cum vsiginis tomentofa.
Pedunciulus elongatiis, eredlus, nudus, terminafur
fyitis bims horizontaliter divergentibtis, fecundiss, fquarrofis*
Kacbis membranacca, dilatata, flqxuofa, articulata. Cuique articulo adidet
Tafcicuhts floruni involucris velbrafteis difformibus cartilagineis 'obvuHatus*
 bi- tri-florus.
Calycis valvula altera maxima ovata acuminata flexuofa, altera minore lanceo-
 lata: utraque vero dura cartilaginea uti bradlcac. *Vahula accqffbria* -par-
 va, acuta, Tub majore.
Corolla lanceolata, magnitudine glumae calycinae minoris^
Spicam termitiat fafciculus florum ftriliuin.
Facies AOnnihil Cmtbri.

41. PANICUM *umbrofum*, fpicis fubquaternis remotis, Aofculis geminis IH2C-
 qualiter pedicdlatis, culmo repente flaccidD.

Habitat in graminofis umbrofis Indiae Orientalis.

Mifit CeL KÖNIG.

Cuimi fiUformes, pedales, adfcndentes, foliofi, debiles ad geniciAa radicW
 emktunt.

Folia lineari - lance olata, brevia, nuda.

Sficae fubquaternac, rachi depreffa.

Floftuli fecundi, fub -binati, ovati, acuti, uterque pkrumque pedicellatus:
 pedicellis inaequalibus*.

Calyx viridi-ftriatus, lunc convexus, illinc planus, valvula -accefforia brevi
 albida.

Corolla magnitudirie et forma calycis, mtnirae rugofa.

Stigmata fufco - nigricainia.

Semen album, a laiere p-anicfi mar^inatuiti.

a. PANICUM *ciliare*, fpicis fubdigitatis apprbximatis er^lii Unearibus, ra-
 ehi ffxuctfa: dentibus biflpris, caVycibus ciliatis.

E:Java et China addulit honor. WENNEkBER

Adeo fimile *Panico filifernri*, ut facillime confundantur.

Oramen fefjuipedale, bali ramofum.

Calycis gluma exterior minor kiiccolata, interior major longitudine corollae,
 utraque mai^gite pilolii

VakuU ncefforia eft fquamula vix oblervabilis, faepe etiam deficiens.

Corolla glaberrima.

Fi&res lanceDlati, acuti, altero fcmlti.

Variat foliis plus minus vaginis geniculisque pilofis et nudis.

Obf. In *Panica Aegyptio* Fafc. III. *valvula accefforia* eft, dentiaibs minutus
valycis valvula exterior brevis, ovato-lanceolata, iudij..

III *Panico Jiliformi* vix major eft *valvula accefforia*, fed *valvula exterior*
calycis longior et lanceolata*

In *Panico fanguinali* *valvula accefforia* cuin *Panici Aegyptii* coinciditi
 fed *calycis gluma exterior* magis ovata.

Forte haec quatuor *Panica* nihil praeter varietates fint.

43. PANICI *flexuoji* in Fafc. UK defcripti varietatenl Omnino ^labrahi in Agri:
 Oryzaceis paffim obveniehem habui ab amicijf. KÖNIG.

- 44, **PANICUM** *ifibaemoides* panicula erecta contrafacta calycibus bifloris polygamis acutis, culmo simplicifolii, foliis distichis rigidis.

Vulgatissimum Malabaricae in udis ad margins stagnorum gramen, proceritate reliqua Panica excedens. *CeL* *Kb* *NIG?*

Culmi erecti, simplicifolii, foliosi.

Folia disticha, vaginis margine tomentosis.

Paniculae rami erecti, pauci, ad dimidias nudis tridli 5 pars florifera vtro flexuosa.

Flores plerumque binati, altero pedicellate.

Calyces acuti, biflori, valvula accefforia brevissima truncata

Corollae longitudine calycis, altero hermaphrodito, altero raafcub.

Semen uvatum, planiusculum.

Gramen toturn exalbidum.

- 45, **PANICUM** *antidotale*, panicula nutante, calycibus bifloris polygamis acutis culmi erecto rarioifolium.

Colitur in hortis Mahibarorum. *Honor*, *KONIG*.

Radix perennis, Aelonifera.

Culmi obtusipedales et ultra, crecti, rarioifolii

Folia margine aspera, etiam nervis majoribus licet minus.

Vaginarum Or a pilorum albidorum fasciculis fimbriarum more barbata.

Panicula pedalis, ramifoliosa, nutans.

Pedicelli biflori, ita ut unus flos in pedicello alterius subsessilis sit.

Flores copiosae, virides, tereti-acuminati.

Calyces biflori, valvulis acutis etiam acceltoria, quae tertium parte brevior.

Corolla hermaphrodita dipetala, macula mihi monopetala viva.

Semina ibi nunquam profert, sed fortibus propagatur, quare aliunde aliam turn existinat *D. KONIG*.

Nigri hoc utuntur praecipue ad Ulcera Nafi, etiam ut discutiens in aliis casibus vel tritum, vel in Cataplasmate decoctione redadlum. *Idem*.

- 46, **PANICUM** *remotum*, paniculae ramis triquetris, flocculis subgeminatis: alteris pedicellato, culmo ramoso tetragono-cinodrora

E Tranquebaria mifit Opf. *KOHIG*.

Culmi bipedales et ultra, tenues, cinodrii-pedunculati-tetragoni, ramosi.

Folia linearia, 4-6 pollicari?, angusta, nuda.

Panicula ramis trigonis, capillaribus, remotis, foliariis subsessilibus.

Flores remoti, plerumque foliarii, sessiles et pedunculati: hinc inde geminati, tuncque alter sessilis, alter pedicello longo inflexus, ovati, **albidi**.

Pedicelli quoque triquetri.

Calyx subaequalis, albidus, viridiflorus, valvula accefforia ovata.

47 *Semen* album, ovatum, planiusculum.

PANICUM *arifiatum*, culmo repente radicante, paniculae ramis indivisis, flocculis binis sessilibus arifatis.

E China adduxit plur. rever. *D. WENNESBERG*,

Culmi ramosi, tange repens, ad genicula radices longas simplicifolias emittens, deinceps affurgens, supra folia pubescens.

Folia lanceolata, nuda, brevia.

Vaginae ciliatae, inter articulos distantes.

Pamela tridli, ramis paucis erectiusculis, simplicifolias,



Flo/cult plerumque birti, rarius terni vel folitarii, fcfilicSi

Involucra fetacea, numero variantia, alba.

Calycis vak | *extima* lanceokita, longitudine fere floris, arifta triplo longior. re
refta terminata.

- - *altera* ovafa, flore dimidio brevior, arifta breviflima terminal!
inftrudta.

- . - *-tertia* corollam amplecleiis, major, latior, muticaj oinnes viri-
des, ftriatae.

Corolla lanccolata, aequivalvis, -Candida.

48. PANICUM *muricatum*, panicula patente, florifeus folitariis muricatis, cul-
mo radicante adfeend^ntc.

Mifit *Cel.* KÖNIC.

Gramen fcsquipedale.

Qdmus filiformis, -bali-dcumbens^ hinc inde radicans.

Folia brevia, perfecte lanccolata, pilis albis lparfis.

Pankula ramis brevibus folitnriis rrimulofis, nd angulum acutum p?.tentibus.

Flores parvi, folitarii, fcfilics pedicellatique, obliqui.

Calycis gluma vava brevior fere cyrabtforfiis.

- - *planiufcula* longior: utraque muricato-fcubra.

- * *acefffhria* parva, lanccolata, ftriata, fub antcedente pofita.

Corolla obliqua, glaberrima^

49. PANICUM *notatum*, panicula pateirte: axillis liotatis, foliis lanccolatis
ciliatis.

In Sumatra ledum dedit nuper numinatus D, WENNERBERG,

Gramen altum.

Culmus tenuis, geniculis nigris.

Folia lanccolata, acuminate, leviflime pilofa, margine oiliata^ 5 pullices lon-
ga et f poll. lata.

Vaginae articulis breviorcs, oris barbatis.

Panicula fere pedalis, ramis longis ad angulum acutum patentibus fcabris, m
axillis nigro - notata.

Flores fparfi, folitarii et binati, pedicellati, oblo*%i, acuti, parvi.

Calycis glunrae hijac iuteriores aequales, purpurafecntes, *valvula accefma*
parum brevior albida; omnes lanccolatuc.

Corolla longitudine ct forma calycis-

P 50. PANICUM *radicans*, pdnuculatum, culmo ramofo radicante, folforum bafi
vaginisque longitudinaliter ciliatis.

Ad Canton leftum dedit *Honor*, WENNERBERG.

Gramen pedale, tenue, glabrium.

Culmus usque ad paniculam foliofus, decumbens; adgenicula fibras longas fim-
plicifTimas folitarias radicanter demiltens.

Folia lincari-lanccolata, acuta/fesquipollicaria, bafi utroque nmrgine ciliis¹⁴ Toi¹⁴ ^
gis albis inftrudta.

Vaginae longitudinaliter ciliatae.

Panicula bipollicaris, tenuis, ere&a.

Flores parvi, pdunculati, obliqui, obtufi, purpurci, nudi.

Calycis valvula accefforia acuta, longitudinaliter dimidia planioris_p

Obf Simile *Panko Arigo*)w Fafc. III. ctiam Ibminum fonn-k Vix hoc gra-
men fub varietate anguiftifolia *Panici brtvifolii* intelUxit *Equ_m* a LINNE'.

5r. AGROSTIS *linearis*, spicis subquaternis digitalis,¹ flocculis unilateralibus alternis appressis muticis.

Mifit honor, KÖWIG. Ad viarum publicarum margines tempore pluviis vulgatifinum.

Gramen canescens, femipedale, firmiter Panico lineari.

Culmi praefertim ball foliosi.

Folia brevia, angusta, disticha, patentia,

Spicae tres, quatuor umbellatae, vix pollicares.

Rachis linearis, flexuosa.

Flocculi alterni, fecules, fecundi, rachi appressi.

Calycis glumae imbulatae, patentes

Corolla major, gluma exteriori majore impre obvolvens,

Antherae ratione graminis grandes.

5a. AGROSTIS *proccra* paniculae pedunculis racemosis crediufculis, liliis hirsutis muticis lanceolatis-

In graminosis subhumidis Malabaricae frequens. KÖNIG.

Culmi ascendentes, quadripedales et ultra, rufi, foliosi, geniculis fuscis villosis albo obtusis.

Folia angusta, nuda, bipedalia*

Panicula spithamaca, pedunculis foliariis circiter inflorescentiis racemosis,

Pedicelli clavati.

Floris imbecillati, compressi, acuti, hirsuti.

Calycis glumae subaequales, altera limbo-purpurea, altera viridi, utraque planifolia, ita ut calycis margins non planis feminis lateri, sed margini ejus respondant.

Corollae glumae minores, ejusdem flos, inaequales.

Antherae flavae.

Stigmata purpureo-nigricantia.

Semen album, divinum, planifolium, hinc marginatum.

55. AGROSTIS *voromaudeliana* panicula ovata patente, pedunculis simplicibus, floribus fecundis muticis, calycibus aequalibus acutis nitidis.

In aridis duris Malabariae legit, indefusus KÖNIG.

Gramen fere pedale, canescens, rigidum a pecoribus non tangitur.

Radices rufae, flexuosae, fetidae, rigidae, albae.

Culmi ascendentes, filiformes, fulcati, ball foliosi, vagina longa denum verticillata, quae line foliolo perumque terminatur.

Folia radicalia, pollicaria, inflorescentia, lanceolata, carinata, acuta, rigida.

Panicula ovata, rara, pedunculis verticillatis patentibus subtus florigeris, ut mihi videntur viscosis, spatium a pedunculo communi remoto nudis.

Flores minuti, breviter pedicellati, nitidi-

Qilyx aequalis, valvulis acutis nigricantibus.

Corolla paulo minor, valvula altera obtusiore.

Semen flavescens, plicatum.

54. ?*Anutans*, panicula contracta apice nubente, spiculis decemfloris, valvulis reversis.

E Tranquebaria mifit Oixonic, ubi ad margines agrorum et in agris
ccis minus submersis fere frequens effe solet

Culmi bi- tripedales, teretes, cretati, simplices.



Fvlia angufla, brevia.

Paniadae coiitra&ae rami femiverticillati.

Spiculae fubrubescentes vel viridi-albicanes, lineares, fubdecemflorae.

Valvula corollina exterior apice deflexo marginibusque reverfis.

755. POA *cynofuroides* panicula trifida pyramidalis, pedunculis patentifloris, fpiculis dependentibus diftichis.

Habitat in aridis fertioribus I. Dr. *CeU* KÖNIG,

Culmi bipedales, folitarii, teretes, tunc ftri, basi veftiti foliis diftichis reflexis. In culmo praeterea

Folia 3-3 convoluta.

Panicula tereti-pyramidata, faepe culmo longior*, fub florefcentia colore CmguiKD iniignis.

Pedunculi tereti - verticillati, horizontales, fentim fupDriura verfus breviores. In his diftiche pofitae funt

Spiculae confertae, numerofae, multi [io) florum, dependentes.

Calyx valvulis inaequalibus.

Corollae valvulae acutae, curinatae.

56- VOA *flumofa*, panicula diffusa, calycibus fifixis, valvulis corollarum interioribus linearibus recurvis dorso ciliatis.

E Tranquebaria milit *amhijf.* KÖNIG.

Radices fibrosae.

Culmi plures conferti ad 1 pedales, filiformes, foliosi.

Folia 1 - 2 pollicaria linearia, levia, vaginis ore pilis longis albis terminato.

Panicula diffusa, pedunculis ramosis flexuosis.

Flores nartierosi, minuti,

Calyx fubaequalis, acutus, carinatus, valvula fexteriore fiviro intueatur minutiflime dorso ciliatus, 5 - 6 florum.

Corollae glabra exterior valvulae calycinae exteriori fimilis fed aliquantulum maj Dr.

interior angusta, recurva, dorso ciliata, ciliis tamen quam in *Poa dliari* minoribus.

Obf. Flores lente vitrea infesti pellucidi pulchritm tfferunt fpeclaculu in feminibus etiam pellucidis transparentibus. A *Poa dliari* L. differt forma paniculae, floribus et ciliis minoribus.

57. POA *ombointia* L.

Quod Tub hoc nomine communicavit gramen *CeL* KÖNIG

Culmum habet eydenter comprelTum,

Paniculam breveni contraAam fpiciformem, et

Corollarum valvulam interiorem linearem turvatam et ciliatam ut *Poa ciliaris* a qua tarn en differt *

Ciliis multoties minoribus,

Culmis depreffis et

Foliis brevibus, vix pollicaribus.

Obf Errore factum sll, ut in Mantiff. Plant, altera ad Poam amboinicam citetur *Phoenix amboinica Kumpbii* Herb. VI. p. 19. t. 7. f. 3. Haec enim figura ut et defcriptio ab hac max) me aliena est.

58t POA *vifcota* panicula oblonga patentis, fpiculis inferioribus trifloris: fterioribus duodecimfloris, culmis rigidis demum vilcofis.

In glareosis aridis Malabaricae minus frequenter tempore calido viget, CLKU NTG.

Radices articulatae, ftoloniferae culnorum foliofbrum faiciculos emittunt.

Cithni fpithamaei, trectes, rigidi.

Folia filiformia, convoluta, difticha, brevia, rigidula.

Panicula ovato-oblonga, pedunculis brevibus patentibus ramoliflimis*

Spadae lineari-lanceolatae, inferiores pauciflorae (3-5), superiores multiflorae (12 - 13-)

Calycis gluma altera longior, altera brevior proxima gluma corollia.

Corollinae glumae limiles Poae nmboinicac, valvula fcil. interiors lineari verius, exteriorem rcurva et dorfo paruin ciliata.

Color paniculae faepius viridefcens, alias incanus, non raro fanguineus.

Obf. Culmi, pedunculi, pedicelli et calyces vicida lateria obdudi, qua fit, ut obanibulantiuui soleae et fibulae invirecentur, totaeque glumis obduciuntur. Odor terebinthinaceus atmofphaeram praepimis velpertino tempore replet et obumbulantes haud ingratic afficit.

59. *FESTUCA indka* panicula contracla eredla, fpiculis tomprefflis fubariftatis fubfexfloris.

Tfiama pullu Rheed, MaL T. XII. t. 45.

E Tranquebaria dedit *Omk. KÖNIG*, ubi in agris Oryznceis crefcit, in fubmcrfis eredlis, in ficcioribus decumbentibus culmis.

Fades omnino *Poae*.

Culmi tripi'daks ft ultra, cniffitie pennac columbinae, friatus, foliofus.

Folia linearia, vagiuis ball tumidis.

Panicula femipedalis, erecta, contracla, ramis fimplicibus.

Spiculae compreffae, 6-8 floriae, parvac, nlternae, breviter pedicellatae.

Calyx inaequalis, gluma exteriore majore carinata: interiors minore plana.

Corollae glumae fubaequales^ leves, exterioris nervo in ariftam brevem plerumque terminato.

Obf. Colore coerulescenti-viridi e longinquu dignolcitur. Paniculae dimidia pars limul floret et patet, &:in contrahitur florente altera parte.

60. *ARUNDO hifaria* culmo ereflo foliofo, foliis bifariis, panicula coarctata, calycibus trifloris.

Habitat ad margines ftagnorum et folTarum in India Orientali. *CeL KÖNIG* dedit.

Xjthni erecli, crafficie digiti minoris, foliofi.

Folia conferta, bifaria, patentiffima, plana, pollicem lata, fpithamaea.

Panicula crefla, contradla.

Calyx triflorus: valvulis ncutis, trinerviis, membranaeis, exteriore anguftiore nonnihil longiore.

Corollae gluma exterior longa, fubariftata, ventricofa, extus lanata.

- interior duplo brevior, hyalina, emarginata, nuda.

Antherae flavac.

Stigmata barbata, viridi-cDerulea-

Flos tertius faepe neuter.

M*labaris *Nana Cadbi*, ad tefta ufurpatur, minus bene licet tegat. *Gr/ KÖNIG*.

61. *ARUNDO karka* calycibus unifloris nudis flore fububto intus lanato multo brevioribus, panicula fecunda nutante.

Dedit *C/ KÖNIG*.

Culmus altus, priori anguftior, inanis,

Folia longa, digitum transversum lata, scabra.

Panicula bipithamaca, contracta, fecunda, nutans, rachi fulcato-niultangula.

Pedunculi femiverticillati, filletti, non articulati, longi, inaequaliter divisi

Flores impari, pedicellis longis capillaribus innixi, folitarii, fubulati.

Calyx uniflorus, linearis, ftriatus, uudus, inaequalis, corolla multo brevior.

Corolla lineari-fubulata, calycis gluma majore duplo longior: glumis ftriatis

fere aequalibus convolutis extus nudis.

Lana longitudine corollae genien cingit

In India Orientali vulgatissimum ad tecta Indorum utitur. Panicula a ventis fudliiic mota directionem eorum indicat. KÖNIG.

62, ARISTIDA *fetacca* culmo cretulo, aristis scabriusculis.

In aridis sterilibus Malabaricae *CeL* KÖNIG; iudicilib' lwrniac Aristidac arundinaceae mi(it). Ab hac vero certe distincta.

Culmi ftridli, simplices uti ex nostro exemplari videtur.

Tanacula contracta.

Calyx uniflorus: *valvula interior* longiore tenuiore fere ariflacformi: *exterior* parum breviora crinata, a cumina a.

Corolla hinc lanata, ceterum nuda.

Aristae scabriusculae.

Inter utilissima Indorum graminum. *Scopae* inde conficiuntur, ad dentes pediculi textorum adhibentur; chartae confedlores loco filii Orichalcci illo utuntur auuum vices fubit ad Ti-mpla floribus ornanda, ad patinas c foliis conficiendas etc *CeL* KÖNIG in litt.

63- ARISTIDA *deprecifa* culmis trifido - ramosis decumbentibus, aristis scabriusculis.

Habitantem invenit honor, KÖNIG in sterilibus Malabaricae cum priori.

Xulmi decumbentes, filiformes, plerumque trifido-ramosi, fcsquipedales.

Folia angustissima, vix convoluta.

Panicula iubfecunda.

Calyx uniflorus, valvulis carinatis acutis albis dorso viridi, exteriori dijnido breviora,

Aristae scabriusculae.

Corolla uti pnecedentis ball tan turn lanaM.

Multum fimilis priori differt culmo, glumarum calycinarum longitudine relativa et forma. *Flores* ut etiam *Aristae* minores, breviores, minus dividit ac.

Aristae tertiae longitudo prae ceteris in distinguendis Aristidae speciebus vix illiquid valet.

64. OLDENLANDIA *fentandra* floribus pentandris monogynis, foliis linearibus, pedunculis bifloris.

E Tranquebar misit *CL* KÖNIG.

Similis *Oldenlandiae biflorae*, fed major, femipedalis,

Caulis erectus, pubescens.

Folia opposita, feifilia, linearia, integerrima, pubescentia.

Pedunculi axillares, folitarii, simplices, apice bifidi, foliis breviores,

¹ *Petala* 5 parva, albida cum tindlura rubra.

Calyx 5 dentatus, pubescens.

Stamina 5.

Pistillwn 1.

65. OLDENLANDIA *digyna* floribus pentandris digynis trifloribus, foliis lanceolatis.

E Tranquebaria etiam nunc *CeL* KG NIG.

Facies ab Oldenlandiis aliena.

Caules ramorum, decumbentes.

Folia lanceolata, integra simplicia.

Flores axillares, fertiles vel breviter pedunculati.

Calyx 5-fidus tubo globofo.

Petala 5 imbricata, alba.

Stamina 3.

Styli 2.

Capfula bilocularis, bivalvis.

66. OLDENLANDIA *trinervis* caule decumbente, foliis ovatis trinerviis, floribus verticillatis axillaribus, capfulis simplicibus.

In umbrosis declivibus solo arcuato humido praecipue sub *Pandano* crescit.

CeL KÖNIG, qui communicavit

Radix ramulorum, tenuis. /

Caules depressi, angulati, ramosi.

Folia opposita, petiolata, lato-ovata, integerrima, trinervis, subpilosa.

Flores axillares, verticillati, breviter pedunculati.

Fruclus didymus, 4-dentatus, simplicis.

67. HEDYOTIS *simplicis* foliis lineari-lanceolatis, floribus verticillatis.

E Canton adduxit honor, WENNERBERG.

Caules semipedales, decumbentes, quadranguli, simplicis, ramo uno altero.

Folia petiolata, lineari-lanceolata, acuminata, integra, utrinque simplicis,

Periochi maximè simplicis, cum *stipulis* filiformi-laceris connatis vaginam breviter constituant.

Flores verticillati pedicellis vix observandis innixi.

Calyx simplicis, dentibus acutis.

Corolla infundibuliformis, laciniis acutis.

Stamina longitudine corollae

Stylus filamentibus longior, clavatus.

Stigma inflatum.

Capfula simplicis, diffinito in medio capulae evanescente nec apicem attingente, polypenna.

68. SPERMATOPHYTES *fumatarensis* simplicis, foliis lanceolatis, corymbis terminalibus dichotomis.

In Sumatra Indica dedit *CeL* WENNERBERG.

Caulis herbaceus, tetragonus, tomentosus, articulis longis. *Nodes* oppositi,

Folia lanceolata, petiolata, integerrima, simplicis, nervis subtus tomentosis.

Corymbi terminales et racemulis dichotomis.

Calyx minutus, 4-dentatus,

Flores infundibuliformes.

Fruclus dimorphus, 4-dentatus.

69. EMBELIA *Burmanni*.

De charactere hujus generis essentiali nihil certi pronunciare audeo, non vix specie Burmanniana, fide autem OSHA KÖNIG binariae ejusdem generis species, scilicet



EMBELIA *Riles* foliis obovatis alternis. Burm. FL Ind. p. 62. t. 23. et
EMBELIA *Groffitlaria* foliis ovato-lanceolatis oppofitis, floribus tetrandris.

Hanc e Tranqusbaria communicavit CW. KÜNIG,

ilrfor ramis oppufitis.

Foliá ovato-lanceolata, integerrima, pallide viridia, petiolata, nervofa.

Raceyii compofiti, terminates ramorum, e foliorum axillis prodeunt.

Floref parvi, albefcentes.

Calyx inferus, monophyllus, cavus, 4-fidus, laciniis rotundatis.

Staimna 4.

Filamenta ad divifuram cdrollae adnato - decurrentia, fupra diviuram petal o breviora.

Antherae fubrotundae, coinprefiufculae, ab ufroque margine dehifbentes.

Satpe alter tantum margo dchifcit, unde trigona apparet.

Fiflillum.

Germen globofurn, fuperum ,

Stylus nullus-

Stigma capitatum.

FruUus Kacca.

Obf. Hujus generis mihi videtur *Ribejivides* Linn. Floe. Zeyl. 403* quainvis pentandra fit et pentapetala dicitur, quod ultro examinanduni,

70- CELOSIA *nvdiflora* L.

Calycis loco *braiieae* 1-3 lineares.

Corolla pen tape tala.

Stamina ball nedtario affixa.

Stigtna capitato - didymum.

Semen unicum, lenticulare, bafi emarginatum iu

*Capjitla*¹ circumfciffa.

Varietates duas habeo

*> foliis oblongis, capitulis pedunculatis

p. — brevibus fubrotundis cum acumiac, capitulis feffilibus priorem e Sumatra, alteram e Malabaria.

71. CRESSA *indica* corollarum apicibus bsrbatis, capfulis tetrafpermis.

Habitat in falis Indiae Or. Viget a Februario in Iulium *CeL* KÖNIG.

Adeo finiilis *Crejfae enticae* ut ovum ovo, fed differt

Corollis niveis extus pilolis, praclbrtim ad apices laciniarum,

Capfulis tetrafpermis.

CRESSA CRETICA *itaque* corollis iraberbibusj capfulis monofpermi dicenda.

72. CAMERARIA *zeytanica* foliis ovato-lanceolatis transverfe venofis.

Apcyno-Neriwn Linn, Fl. Zeyl. 404. ubi defcriptio.

E Zeylona ramulum miffit *CeL* KÖNIG.

73. HELIOTROPIUM *malabarkwn* foliis ovatis plicatis ftrigofis inte*erriniis fpicis fubfolitariis,

Habitat in Malabaria.

Ut varietatem *Heliotropii Eurypaei* *CeL* BURMANN in Flor. Ind. pag: 40. ico nemque dedit in tab- 16, f, i. ab hoc vtro facile diftinguitur

Strigofitate tutius plantae^

Foliorum plicis et parvitate
Petiolis brevibus
Spicis faepe quidem geminis, vcruin non conjugatis
Calycibus minime imbricatis, fed diftiuftis niaioribus, firmina etiam niatura obvolventibus.

74. IPDMOEA *paniculata* 7 caule vplubili, foliis ovatis acuminatis, pedunculis paniculatis. *Burm. FL bid.* p. 50. t. ai.f. 3- defcriptioni adde

Caules versus fines, *folia* tenuiora, *pedunculi* et *calyces* tomentosi.

75. PDLYGONUM *barbatum* L.

Tiwmihi Tub hoc nomine in Herbario plantae funt, quas ab autoptis ut vivae examinentur opto.

i» in *China* L'fla

Folia et *Ocb'reas* habet hispidas,

Ocb'reas denique et *braBeas* dliatas habet

2. e *Malabaria*

tota glabra.

Och'cae tantum dsnticulatae.

Bractcae integerrimae.

- 3- e *Gap*/* J5. ^{Spei}

tota glabra,

Ocb'reae et *braRzat* biliatae.

Staminum et *fyllorum* numerum in ficcatis plantis tuto eruere non potui.

76. TURRAEA W»»J L. *Mant. alt.* p. 237. habet

Stipulas geminas lineares,

Rnmulos tefragDno-cDmpr^TDs^

Flores in pankulis brevibus iixillaribus,

Fetala lanc^olata, obtusa.

77. MELASTOMA *ottandra* L.

In Syftemate Nat: Ed. XIII non minus quam in *Generojiflimi AuBoris Flora Zeylanica* ad hanc per errorem certe relata fuit *CcL BUKMAN^I*.

Melaftoma ftabra trinervia Thel^ Zcyl. p. 154. t. 72. quae figura fine dubio ad *Mdajhmam off' tram* L. pertinet.

Si vera *Fragarhu tuber* vel *nigr* Rumphii vel neuter hanc defignabit difficile eft diclu.

Mtaftoma autem *Osbeckii*, quam in *itin.* p. 213. d^fcribit et *oilandra* Linn, eft, planta eft procumbens, nee frutex vd iliffFrutex, quae numero frudificationis vnriat» Examinaui enim varia fpecimina, quibus

Calyx urcl-olatus, fquamato- echinatus, f^xfidus, apicibus ciliatis, interj?-flis fex denriculis ciliatis.

Corolla fexptala, *peralis* ciliatis.

Stamina. Filamenta 5 comprefTa, antherifera, *antheris* oblongis.

- - - 5 alia clavata cum prioribus alterna, *antheris* nullis.

Foliorum forma, hispeditas in margins et nervorum numerus ternarius 110-tae iuiit confantes.

- 7g. AMYRIS *zeylanica* foliis pinnatis pstiolatis glabris, racemis interruptis axillaribus, floribus involucratis hexandris.

In Zeylona detexit indeque communicavit *amic.* KDNIG.

Arbor cortice cinereo.

Folia pinnata, quina vel feptena: foliolis petiolatis ovatis, acutis, integerrimis? nudis, venis fere transversalibus.



Pedunculus axillaris, danga tus, tomentofus, in quo glomeri nonnulli florum involucrati: infimus pedicellatus, superiores feffiles.

Involucra cordata, tomentofa, feffilia.

Calyx fubglobofus, tridentatus, coriaceus, tomentofus, corolla major.

Petala tria cava, extus tomentofa, margine fufco nudo.

Stamina 6.

Drupa ficca, ovata, feffipollicaris.

Nux offea, craffa, praeter loculamentum pro nuclei bina habet in ipfa fubstantia offea uci parallela foramina, quad trifperma dTeX nux[^]

Elehii fundit hanc arbor, quae venum z&Elemi officinarum Orientis ab Americano ejus nomine dicitur

Quamvis nunc[^] partium fructificationis differat, genuinam credo Amyridis fpeciem.

79 LIMONIA *acidifima* L.

Ramulum mihi CeL KÖNIG fipinis deditum, fimulque in Litteris obfervavit, illa in ad *Crataevae* genus amandari debere.

80. MEMECYLON *grande* fidiis acuminatis.

Coniunnicavit honor, KÖNIG.

*Arbor grandis**

Kami teretes-

Folia oppolita, integerrima, femipedalia, ovata, longe acuminata.

Pedunculi axillares, alterni, 4 - 1. 5- fidi, pedicellis multifloris.

Antherae incumbentes, omnes curvatae, an ab exliccatione?

31. LEDUM *groenlandicum* Prodr. Fl. Scand. 43S.

Quae de hoc libro cit. attuli, jam confirmarunt fpecimina turn ejus, turn *Rhododendri Daurici* in Groenlandia ab autopta flur. revcr. v. OTHONE FABRIC 10 lefta mihi benevole communicata. *Rhododendron Dauriaon* itaque in Groenlandia etiam crefcit; ideo tamen a Nob. OEDEF[^] rae Dani-cae Fabric[^]. tab. 567. depiclus & nominatus fruticulus Ledi n. — ^ geiuna eft, quae, ut mihi videtur, UEDO *palufiri* fatis differt foliis ovalibus, ftaminibus corolla brevioribus; fed quin folia in *Ledo Groenlandico* magis fint ferrugineo-tomentofa, etiam fub revoluta margine, character *Lah palu/lris* ita corrigi debet, ut dicatur

Ledum foliis lineariibus, ftaminibus corolla longioribus-

§2. EUPHORBIA *rofea* dichotoma, foliis obovatis ball obliquis apice denticulatis, caule depresso diffuso.

Habitat in arena mobili Indiae Orientalis, ibique per totum annum viget. CeL KoxiG, qui plantam communicavit.

Radix fubfunplex, fpithamaca, fubdrutuofa, refta defcendens.

Caules depreffi, in orbem diffufi, tetraarticuli, articulis nodofis, dichotomi, leviter hirfuti.

folia ad genicula oppolita, breviter pctiohita, obovata, fupcriora obverfe lanceolata, bafi obliqua, apice denticulata, nuda.

Flores ad apices ramorum congefti, maiculi hermaphroditis mixti, petalis pulcherrime rubeis.

Capulae glabrae.

33. MYRTUS *laurinus* pedunculis racemofis bracticolatis, foliis ovato-lanceolatis ferrulatis glabris.

*Burm. Thei: Zeyl. p. 139- *• 62. ubi defer.*

E Zeylona mihi amic. KÖNIG.

94. *ROSA fimpriellifolia* L.

In horto c feminibus a *Clar.* D. EHRHART benevole communion tis excrevie, ct tertio anno floruit- Defcripta a *Cel.* vv ROI in Obi! Bot. p. XXII. Circa quam defcriptionem monuiffe juvabit, quod

Gaules nou decumbentes, fed erefci in noftra.

Calycis hiciuia margins interiore villofo, apicesque dilatatae, bi-trifidae.

Flos magnitudine *Kofae caninae* albus, rubore levi hinc inde fuperfufus.

Pctioli iūbtus aculeati, et facpius quoque coftae foliorum.

Foiiorupi ferraturae apice glandulofac.

Stifulae fbratae, ferraturis glandulofis.

Ohf. Si haec *Koja fctica Milleri* fit, nefcio, quid per *foliola apēc imifa* intelligat.

85- ELAEOCARPUS *copalliferus* foliis integris.

E Zeylona miffit *honor*, KÖNIG.

Arbor.

Folia magna, ovata, coriacea, intsgerrima₇ nervis transverfis.

Flores paniculatē

Calyx ad bafin quinquepartitus, fuperus, laciniis lineari-oblongis obtulii utrinque tomentofis, pcrfiftens.

Corolla pentapetala, petalis calyce longioribus ovatis integris.

Stamina 40 plura, *filamntis* breviflimis.

Antherae longae, lineares, apice bifidp filiformi,

Germen conicum, ftriatum, tDmentofum.

Styliu antheris longior, angubfus.

Stigma fimplex, acutum-

Fruclus, *Pomum* conicum₇ carnofum, refHiofuiii, uniloculare.

Sanina. < - - -

Ohf. *Antherae* linenres longae fills cirrhoiis terininatae mcliurem characle-rem fiftre mihi videntur, quam *Petala lacera*.

Reinam *Copal* diflam fundit, huius vero plures funt fpecics.

§6- ELAEOCARPUS *frrata* quam e Zeylona coinmunicavjt *honor*. KÖNIG, habet

Folia obovata, ferraturis longis,

Calycem laciniis ternis, quaternis et quinis acutis carinatis,

Petala tria tripcirtito-lacera.

Stamina 25,

Antheras filis cirrhoiis terminatas,

Germen multum tomentofum.

Icon Burmanni bene cum hac convenit.

87. PEDICULAREM c Grocnlandia in *Prodr. Florae Scandhu* p. 117. n. 6§o.

ilib nomine *Pedkularis intarnatac* dubie propofui. Jpfam *Pedkularem incarnatam* e Sibiria nunquam vidi, nee adhuc librum *Allioni*, quem quotidie exrpcclo, accepi; video autem, me perperam 1. cit. applicable verba, *fed calyces villqji acutiores* in *Spec. Plant*, occurrentia, et haec ad plantain *Allioni* referenda effe. Scd aliac Dcurrunt difficultates, quac noftram cum *P_m j u . tarnata* conjungere prohibent. Ait fcik *Gener. Equcs* in *Spec. Plant*, *folia radkalia* pedalia effe, *finnasque* pinnatifidas habcre, *fpicas* nudas *calycesane* femiglobofos et *galeas* acutas ei tribuit, quac omnia in noftra aliter ieñābent, ut ex icone in *Tab. I.* propofita patet.

88. *SESAMUM javanatum* foliis lanceolatis ferratis fefilibus. *Burm. FL ind.*
 P. 133-
Caulis tetragonus.
Folia ferrata, nDn dentata.
Reliqua vide apud *Burm.*
89. *SESAMUM proiratum* caule deprefso diffufo, foliis orbiculatis crenatis hifpidis.
Pluk. amalth. Tab. 373. f. 2.
Crefcit in arena mobili circa Madraftam, alibi rariQlma. *Cel KÖNIG.*
Caules deprefsi, diffuli, lignofi, hifpidi, ramis oppofitis et alternis.
Folia petiolata, fuborbiculata (figura ad *Hermanniae alnifoliae* proxima) profunde crenata, denfe hifpida, oppolita, ramorum floriferorum vero alterna.
Flores folitarii, ereftiufoeli.
Calyx 5 partitus, laciniis linearibus hifpidis.
Corolla campanulara leviter quinquefida: lobo infimo longiore, extus e pilis rainutiflimis dcnlis cahefcens, intus fanguineo colors fuper funduni flavum pulcherrime pjela et pmidata.
Kudimentum quinti ftaininis nullum.
Stigma lancl'olatum.
Caffula dura, lignofa, ovata, bafit fubtetragona, apice comprefla rectufa inu-
 crunata, fulco utrinque uptata, quadrilocularis.
Semina plurima oblongn, angulofa, nigra.
Odor nullus.
Sapor fubacris.
Mtilabaris medicinalis.
90. *RUELLIA fafiimlata* decumbens, fbliis lanceolatis petiolatis dentatis op-
 popuis: alterno minore, floribus fafciculatis.
Habitat in nemorofis prope Thermas Trinquemallenfes Zeylonac. *Cel. KÖNIG.*
Muha habet coramunia cum *Prunella molucca* Rumph. VI. t. 13. f. 3. fed mi-
 nora funt folia, lanceolata et longe petiolata, nec cordata,
Caulis decumbens, tetragonus, tenuis.
Folia oppofitaf alterno minore, petiolata, lauceoiata, dentata, nuda.
Faficuli florum terminales.
BraBeae ovatae, integrae, trinerviac, pilofac,
91. *CLEOME tenella*. L. Suppl. Pi. p. 600.
Sinapjtrum indicum triphyllum tenuiffimis foliis e Maderafpatan. *Pluk Pbyr*
 t. 224. f. 3. bona. J
Habitat in aridis arenofis fat copiofe *Cel. KONIG.*
Foliola pctio'is longiora impar hucrnlibus longius.
Pedicelli folitarii in matura filiqua longitudine petiolos aequant.
Corolla lutea.-
Stamina 6.
91. *MALVA abutiloides* Spec. Plant p. 971. cafu in Syft. Nat. cd. XIU
 fa, nullo modo cum *Malva abutibide* Suppl. Plant, p 30^, quam exclu-
 lentia Amici femper lionorandi tf THUNDERD cum plurimis ||||* benevo-
 plantis poffideo, confundenda. Audivi hanc in Angliã nomine Ma Africac
 Itcae appellari. Bhae au-
93. *SIDA lanceolata* foliis lanccolatis R-ratis, [tipulis linraribus acutis nervoCs
 Miiit exemplar honor, KÖNIG.

- Caulis* ere;?lus; ramofus, tomento hinc inde afperfus.
Folia oblongo-lanceolate, acuminata, acute ferrata, nuda, breviter pctiolata.
Stipulae lineares, acutae, nervofafe, petiolo longiores*
Pedunculi folitarii ftipulis parum longiores.
Flares parvi,
Capfulae acuminato-ariftatae.
94. *SIDA cbinenjis* foliis ovalibus fubtus tomentofis ferratis, ftipulis filiformibus.
 E China fpecimen adduxit plur. re~c. WENNERBERG.
Caulis fruticofus, farina quafi afperfus, ramis divaricatis fimilibus.
Folia petiolata, qvalia, ferrata, fubtus tDmentofa.
Sdpulae breves, filiformes, fufcae.
Pedunculi uniflori, folitarii, floriferi folio breviores, demum elongati, geniculati.
Flores parvi, fiavi. ^
Capfulae quinqueloculares* glabrae.
95. *HEDYSARUM triflorum* O. L.
 E China communicavit boju WENNERBERG.
Caules vix femipedales, hifpidi.
Folia ternata, foliolis obcordatis petiolisque hifpidis et nudis.
Stipulae ovatae, acutae, friatae.
Pedunculi longitudine folii, axillares, folitarii, uniflori, oppofitifoliL
Flores parvi.
Calyces hifpidi.
Legumina uni - et multi - articulata, altcro margine integro
96. *INDIGOFERA* // ; ; ; / ^ . *This is all Indigofera*
 Sic potiori jure vocatur planta ad Hedyfari genus in *Supplem. Plant*, p. 331, relata, quum Indigoferae charadterem gerat, tefte autopta ICONIC.
97. *INDIGOFERA* / r ^ r ^ « j foliis quinquato-pinnatis: foliolis ovatis piloiiis extimo mnjorc, leguminibus tetragonis.
 Dedit auric, KONIO.
Caules tcretes, fubpiloli*
Folia pinnata, quinata, utrinque pilofa-
foliola paria ovata.
foliolum impar obovatum, majus.
Stipulae lanccolatae, acuminatae, hirtae.
Pedunculi folio longiores, axillares, 3 - 5 flori.
Flores rubri calydbus albido-piloiiis.
Legumina lincaria,, tetragona.
Colutea Jiliquofa glabra ternis quinisve foliis maderaspatana femine rubello
PluL Pbyu t. 166. fji. fatis bona, quamvis planta non glabra.
98. In Mantifiis Plantarum et Syft. R. Vegetabilium *Equ. a* LINNE perperam confufae funt fub nomine *Indigoferat enneaphyllae* et *Hedyfari profrati* non minus quam tres *Colutcae Plukenetii*. *Indigofera mneaphylla* noftra, quam amicitiae D. KONIG debeo, bene cum *Colutea Pluk. Pbyt. t. ifif. fm 2*, minus cum *Hedyfaro profrato FL Ind.* convenit, nam legumina multuin tomentofa, quamvis difpermiã et fpiculas feffiies habet.
Indigoferam tneaphyllam. Mant. 272..57¹ et *Hedyfarum profratum* ibid. 102. equidem pro eadem habeo planta, fed inter fynonyma ejus eliminari debent



citationès P/aA. P/yt. t. 165. § 4. et 166. f. 3. non minus quam *Burm. Fl. Ind.* t. \$4. f. a, noracn *Pforakae finnatae* p. 272, et citatio *Mantiffae* 496. in pag. nuper memorata occurrrens.

Forte magis vel minus feffilia capitula ha beat, et filiquis glabris et toinentofis ludat.

99. TRIFOLIUM *alhidiim* fpicis pilolis ovalibus pedunculatis ebrafteatis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis ovatis.

£ feminibus Tub alieno nomine miffis in Hurto floruit.

Planta annua.

Caules ramofi, diffufi, teretes, leviffime pubefcentes, ramis bafi nodolis.

Folia oppoiita, *foliolis* inferioribus ovatis, fuperioribus lance olatis, arifta brevi recurva terminatis, margins et carina ciliatis.

Stiptlac linenri-lanceolatae, albo-viridique ilriatae.

Pedunculi clongati, ftrifli, fubftriati.

Cafitihi ebrafteata, *floris* fubglobofa, fruchis ovata.

Calyx cylindricus, pubefcens, dentibus adpreffis* infimo lungitudine circiter corollae trinervi, omnibus fubulatis. Dorlales dentes, qui lateralibus paulo breviores funt, ad corollam adeo deprimuntur, ut apices coruin iib lateralibus ocLultantur.

Corolla albida, leviffime ad flavedinem vergens, monopetala.

In *capitulo frttSiferoq* calycis dentes latiores fatti divergunt, ut in Trifolip ftelato, et in ball gerunt

Legitmen monofpermum.

100. DOLICHOS^y? «f///j L.

In+ioitq academico fub dio terrae commiffa femina Plantas caufe cre^D * •CiT^daii^dedeEUHt, iq urjji^erp fabL et tepidario inclufa caulem vDlubilem quadripedalem protrulbruntj *fiiivolubilis* itaque *caulis* dicendus.

101. HIERACII *Taraxaci* quae fine dubio eft *Picris*27. *Halleria*Nok LINNE' in Spec. Plant, p. 1125. defcripti icon nullibi, quantum fcio, prollat, quare illam addere iiperfluum non duxi. Tab. II.

102. ORCHIS *hyperborea* L. Mant. PL 121. Prodr. Fl. Scandin. p. 167. quum ab *Drcbide* Kb'nigii ibid. p. 168- cujus icon in Fl. Dan. t. 333. proftat, diverfiii fit, ejus figuram addere volui. Vid. Tab. m.

103c LICHEN *fcopulorum* foliaceus, reftus, compreffus, linearis, laciniatus, nitidus, lateribus verrucofis.

Lichenoides- fuciforme tindloriim, corniculis brevioribus et obtufioribus *Dill. Hifl. Mufc.* 167. t. XX. f. 60.

Rupium latera nidi cauro xpoiita in littore manis ad Houfshallnr Scaniae co-
- piolc obveftit. In rupibus Infulae Yerfey *DiUem'us*.

Ucbeni farinaceo quoad ftruffuram hpud abimilis.

Fronde caepitofae crercntes, fequipollicares, lineares, laciniatae, compreffue, nitidae, albo-viridiilac.

Laciniae fteriles acutas, fruftificantes obtufic.

FruBificationes incipientes feffiles excavatae, *maturae* verruciformes fubpedunculatae convexae et nitidae.

Obf. Figura et defcriptio Dillenii fat bene cum noftro Lichenc conveniunt nifi quod folia in noftro fint anguftiora, et omni villo dtflituantur.



Tab. I.



= *P. groenlandica* Retz. Fl. Scand. 2

ofebicutari incarnate. * Groenland:

Tab. II.



Hieracium & araxar i.

Cyprus, Julij 1772.

Tab. III.



Orchis hyperborea.

.

ANDREAE IOHANNIS RETZII


PHIL. MAG. AD REG. ACAD. LVNDENS. HISTORIAE NATVR. ET DÉCDNDM
PRDF. R. ET DRD. SOCIET. PHYSIO GRAPHICAE LVND.
SECRETARII ETC.

FASCICVLVS

OBSERVATIONVM
BOTANICARVM

QVINTVS.

CVM FIGVRIS AENEIS.



L I P S I A E

APVD. SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM.
CIOIDCCLXXXIX.

**GENEROSISSIMO DOMINO
ALEXANDRO**

C O M I T I

DE SOWZA ET HOLSTEIN

**EQVITI, ET REGINAE PORTVGALLIAE AD REGIAM
AVLAM DANICAM LEGATO EXTRAOKDINARIO ETC. ETC.**

**SÇIENTIAE NATVRALIS PATRONO ET CVLTOKI
ILLVSTRI**

in pictat i S t e g e r a m

offert

AVCTOR

In decima tertia editione Syftematis Vegetabilis Perill. a LINNE' varios detege*
bam errores, quos fedulo notatos cum v en e ran do Sene communicabam, vt
in nova forte Editione hos evitarek Quin Crantfciafd. Mediceave bile non cun-
fpurcatae erant, verum debita erga Verum Botanices Patrem Statoremque vene-
ratione concinnatae meae annutationes, gratam fiam de hoc ingrato meo labore
mentem litteris mox teftabatur, mihiq; continuationem ejusmodi obfervationum
fimul amice injungebat. Verum hae cum multis aliis poft mortem Summi Viri in
manus Filii pervenerunt, et tandem, proh dolor! extra patriam cum pretiofiffi*
mis collectionibus profectae flint. Tandem prodibat Liber errorum, ne pejora
die am, plenus fib titulo Supplement! Plantarum, quern oculatiffimus EHRHART,
omni licet cura adhibita» a mendis purgare' non potuit. Minime ergo mirum,
quod hi errores omnes in editione decima quarta, etiam Nob. Equitis MURRAY
cura quae prodiit, transiverint Quos ego notavi, heic iiflo, ut quivis eos
ipfe corrigat. Plures forte adfunt, quos vel ego fenfim, vel alii obferventi ut
terfior aliquando evadat XV. edition

Nova Sj qias in quinto hoc Fafciduo defcripfi, Plantas ab egregio KOMIG
etiam quoad maxilnam partem datas fuiffe duln teftor, vellem ut Amici hujus me-
rita digno encomio celebrare fimul poffenti- Verum huic labori vires meas im-
pares ientio» Mihi lane irreparabile fuit damnum maturus ejus obitus j non fb-

him enim amicum genuinum, verum etiam liberalem, qui, praeter alia, copiosissimi
Indiae Filicium meum, ut Plumerianum opus continuarem, proponit, amicum
Doleant me cum certe omnes Scientiae Botanicae veri cultores. Doleant Viruti
pium) integerrimum, indefectum, qui, inexplebili res naturae scrutandi ardore
ductus, omnia incommoda, omnia pericula infansque sumtus prevertit; quem
Vana gloriae cupido foedave avaritia vel invidia non contaminavit quicquamque ad
ultima suspiria (singularis modo fit iam comitavit* .

Sed fuit Aeternum res nostras Me restat.



* * *

IN SYSTEMATIS PLANTARUM

ED- XIV. ET SUPPLEMENTO PLANTARUM LINNEANO ADDENDA, OBSERVANDA ET CORRIGENDA.

- i. VERONICA *bihba* racemis lateralibus, foliis oblongis dentatis, capfulis bipartitis. Mant. alt. p. 172.
poft Ver. *scutellatam* inferenda.
- a. IUSTICIA *Gandaruffh* Suppl adde *FL ind. Burm.* p. 10.
3. VERBENA *Aubletia* Suppl adde *Act. R_m Acad. Holm. 1773- P-²- *• 5-*
- 4» SALVIAE *covci?jeae* locus natalis *ziiFlorida*, non autem C- B, Spei-
5. COMMELINA *cucullata* corollis aequalibus? foliis ovatis, involucris cucullatis turbinatis. Mant alt. p. 177. et
6. COMMELINA *fpirata* corollis aequalibus, foliis lanceolatis, floribus paniculatis. Mant- alt. p. 177.
poft Comm. *Zanoniam* inferendae.
- 7- IRIS *ciliata et mtJiuta* lege *pptalis* ^ non vero petiolis.
8. CYPERLTS *Jhrigoffts*, SCIRPUS *cyperoides et intricatus*> ad *Kyllingiae* genus amandandos fuppicor,
5. NARDU5 *Thomae* S. Veg. p. 102. lege *imbricata* non incurvata-
10. PHALARIS *dentata* exclude in definitione *birfutis* aequae ac in defcriptione, *hirfutiera* enim deponit
11. ANTHISTIRIA *ciliata* adde charaflerem Speciei ex Fasciculo noftro III. p. 11.
12. PANICUM *limare*. Hue pertinet *Burm.FL ind.tab. 10- f. 3.* non vero £z.
13. PANICUM *patens*. *Burmanni* non omnino excludi debet Confer Fasc. noftr. III. p- 9-
14. ALOPE CURUS *geniculatus*. Exclude *peflimam* Florae Danicae iconem- 15; AGROSTIS *indica*. *Plukenetii* nomen excludatur^ ad *gramen* enim longe *diverfiflimum* ftit- *Andropogon cvntortum* pertinet.
- i€ ARUNDO *Bambos* eliminatur.
17. PLANTAGO *inairvata* S. Vejj. p- 156. eft
Plantago recurvata foliis linearibus canaliculatis recurvatis nudis. Mant- alt. p. 158-
18. ILEX *cuneata* foliis cuneiformibus tricufpidatis. Spec. Plant, p- *igi- defid- ratur*.
19. CALLICARPA *cana* foliis ferratis fibtus tomentofb. Mant alt p. ~~198-~~
dee/L

Num hic frutex idem fit cum *Callicarpa americana*, quae in Mantissa minima
occurrit, . 80. tantum descripsit
b. Equ. a us, nec dubium
descriptio Iohnfonta apud MILLER. Diversas vero suspicor 1°) ob

- Carolina australi habuit MILLER, in V ^ g TM ^ TLHEL omen-
Ejus J. nova Genrra. 2°). OBseip MM folia habet ^ ^ ^ Iohn-
tofa, et tomenti nulla fit mentio neque in ULLEEI ^ ^ I.
fonia ^ neem definitione specifica CONOVU, * " " * folia tantum
fcabrfcmeminit Infynonymo in fpcodbus P^antar .p 161. a ^ d fieri
NETIO mutuab occurrunt quidem verba: *foho molli etweauq*, tibi ^
potest, ut ejus piana *CaMcarpa cam* fuerit, et patiara hic, u: « f d-
L s t^anspofuerit. HEISTER in sua ad Burkhardi Epiftolam P ^ ra
tione p. 54. aliqua ntim te^«j& esse folia ait, fed si supra vd «
vel utrinque quaerenda fit haec lanugo, reticet. >>-.*« to,
20. CALLICARPA ^{Bligny Wa.} Syft. Nat. Ed.X. forte est C₂/^'i'
ffimrD^ quae in Mantissa p. 323. *hmata* dicitur. .. /;«^ ffi.
21. ANCISTRUM ^{fanguijorbae capitub lobofol.} foliis subtus cam ai
22. ANCISTRUM / ^ ro>w floribus p^{ca}tis, foliis utrinque fencib^{inaicum}
«. ECNIUM ^{testum.} Quam laevis significat, TMWV* heb m m yl . 334.
hujus varietatem esse, led e^r ii to/iri, ut quoque in Mant alt. p 3P.
monitum fuit. -riinet
24. LYCOPSIS ^ r ^ ^ . Icon Florae Danicae ad *L arvufem?* ^ ^ ^
25. PRIMULA *minima*. Corollas purpuras esse docet JACQ
nonluteas. HALLEB. carneas dixit. /o miatis ---- . acu-
a & HYOSCYAMUS v ^ t o x , foliis caulUis petiolatis Ph^udattfli ^
tis: floralibus integerrimis, corollis ventritois. ^ pec. jr ^ ^ ^
restitui debet, nisi idem fit cum *H. mutico* Mant. '1. p. 45. to
Forsk. quem iterum cum *H. minon Milleri* euntein « tr + ina ' to dilati
27. CAMPANULA « m j foliis ovatis rugosis, pctjolis; m ^ b 20 .
tis ferratisqu.,
tis ferratisqu.,
(uo loco inferenda.
(uo loco inferenda
a«. CAMPANULA *canarUnfis*, quam CANARINAM vocavit t^ bene
andras amandavit t>. « 1. ' . Sub utroque nomine haud
occurrit.
29. CAMPANULA *dichtoma* vel p. 20g. eliminanda, velut vanctas a ^{Can} dedit
pnuh matti feparanda. Quantua ex descriptionibus brevibus, quab
Syftematis Auclou, patet, diversae species videntur.
30. LISIANTHUS *chelmoifa*. Ab hoc diversus *L. alatus* Anbkii-
31. CONVULVULUS *scoparius*. Hic et saepius alibi in supplemento U¹
tarum occunit vox hispanicas Barranca, quae, ni fallor, colles « r^{ena} ceos
denotat.
32. LYCIUM *europaeum*. Synonymon *Tnaii* sub *L. barhw* allotum ad euro-
paeum per tinet.
33. LYCIUM *foetidum* L. est *Lycium illium* IV *
34. DATURA *laevis* adde
fVeigelin Act. SDC. Phyiogr. T. I.
35. ACHYRANTHES *alternifolia*. Synonymon Burmanni maxime dubium.
36. ILLECEBRUM *Monfmia* est
Cehfia Monfvnia Fafc. N. II. p. 13.
Fluk:Pbyt. t. 357. f.4. '



- 37- CELOSIA *Janata* et ILLECEBRUM *Iavanicum* an distinctae plantae?
38. VINCA *pufilia*. Quomodo haec fimillima *Fi roseae* did possit, non video. Est praeterea
Finca. parviflora Falc N. II. p. 14-
Quupa Fee/a Rheed- Mal IX. p- 61. t 33.
Pluk. F/jjt t 119. f- 7-
- 39- THESIUM/i/fftf/c¹ floribus spicatis, corollis ciliatis, Caule suffruticoso, fo-
His subulatis breviflimis. Spec* Plant p. 302.
restitui debet
40. THESIUM *alpimim*. Jacqu. Vind- p. 213. n- 15-
- 41- GENTIANA *campestris*. Varietas j3 distincta est species *G. Umla* distae.
- 42- BUNIUM *aromaticum* involucellis triphyllis. Mant. alt- p. 218- *defidtratr**
Paflinacarum characteres haud boni ita forsan corrigi possunt:
- 43- PASTINACA *hicida* foliis simplicibus ternatis pinnatisque lucidis
P. lucida Gouan ill. et Obf. Bot p. 19- t- 11. et 12.
44. PASTINACA *fitiva foliis* pinnatis subbipinnatisque auriculatis*
f. glabra.
f. hirsuta*
- 45- PASTINACA *Opopanax* foliis pinnatis bipinnatisque, foliolis basi antica
excisis, ftrigofa-
P. Opopanax Gouan L cit. p. 19. t- 13. et 14*
- 46- CRASSULA *dichotomabis* in Syft. Veg. occurrit; priorem in Supplemento
descriptam *ramosam* vocavit inventor ill. THUNBERG.
- 47« TULBAGIA *alliacea*. Mfntiffam alteram editurus b. Equ. d LINNE
aon nili unicum viderat Tulbagiae speciem, ut ex Mantiffa patet jam
vero cum in generico caractere p. 148. nectarii limbum fexpartitum di-
xerit, quod in Supplemento *Tulbagiae alliaceae* tribuit, *capense* vero tri-
phyllum nei Sarium esse ait, patet quoque *Tulbagiam capensem* eandem
esse cum *Tulbagia attiacea*, vel forte tertiam adhuc existere speciem- De
icone Jacquiniana nihil dicere audeo donec illam videre licuerit.
- 48- AMARYLLIS *capensis* Syft. Veg. et HYPOXIS *Jlcllata* eadem est planta,
priori itaque loco eliminanda.
- 49* DRACAENA *medeoloides* et MEDEOLA *ajparagoides* numne una
eademque planta? Certe inter plantas capenses a honorati TIMO THUN-
BERG mltas nullam vidi Medeolam, nisi quam Dracaenam medeoloi-
dem dixit.
50. PHORMIUM ^ W J Suppl. et LACHENALIA *tricolor* Syft Veg ^
eandem esse plantam omnia fvadent-
51. ALETRIS *farinosa* acaulis, foliis lanceolatis membranaceis, floribus alter-
nis. Spec. Plant p, 456. *immerito omiffa**
- 52- ALLIUM *multibulbosum* Syft. Veg. excludatur- Conf. Falc-Noftr. L Speci-
men ex ipso Nob. IACQUIMI herbario possideo, quod dedit Gener. BANKS.
- 53* HYACINTHUS *Janatns* male inter Hyacinthos relatus, *Augzam* dim
nuncupavit Nob. THUNBERG-
- 54- POLYGONUM *divaricatum*. Figura Gmelini, quae mala judicatur ad
aliani speciem pertinet, vti etiam varietas /3.
- 55- MELASTOMA *octandra*. Figura et descriptio Burmanni longe diyer-
sam refert
55. RHODODENDRUM *dauricum* adhuc cum diversiflortio LEDO *grom-
landicy* confusum manet.



57. RHODORA *canadensis* Spec. Plant, p. 561. restitui debet, omnino enim existit hocce genus a Rhododendris diversum corolla tripetala.
58. IAGONIA *indica* foliis simplicibus ovalibus* spinis geminis. Mant. ah. p. 238- Burm. Fl. ind. 102. t. 34, f. 1. suo hinc infrenda.
59. BERGERA *Koenigii* Mant alt. p. 563. post *Samydam* forte locanda.
60. SAXIFRAGA *cernua*. Hue pertinet icon Florae Danicae, quae quoque, licet perperanii ad *S. bulbifirata* occurrit. »
61. SILENE *orctidea* Suppl. est SILENE *Atockn* IACQUINI, exterminari ergo haec debet
- Sz. LYCHNIS *alpestris* et *quadridentata*.
 Planta *Plukenetii Phyt.* t 75. f. 5. quae in Supplem. ad *alpestris* refertur, in Syft. Veg. ad *quadridentatam* relata video. Ad utramque pertinere nequit. HALLER illam ad *alpestris* retulit, in Syft. Veg. itaque hoc synonymon una cum *HaUeri* nomine ad *quadridentatam* expungendum.
63. SOPHORA *tetraptera*. Hic binae species, scilicet *Sophora tetraptera* et *microphylla* confusae sunt, folia enim hujus, fructus vero illius, descriptioque intermixtae sunt.
64. SEDUM *coeruleum* foliis oblongis obtusis teretibus sessilibus patentibus, racemis simplicibus. Mant. alt. p. 241. In Syft. Veg. deest.
- €\$. SEDUM *Ahoon*.
 Etiam hic perperam citatur GMELIN.
66. MANGIFERA *pinnata*. Suppl. p. 156.
 Monente *Cel. KOENIG* flores decandros pentagynos, raro octandros nucem quinquelocularem, pentaspermum, involucrium Nucis *MoQ* iatae ad instar, led calloso cinctam habet, quodque LINNEO *jun.* saepius scripsit, ergo a *Mangiferae* genere plurimis diversum genus.
67. LYTHRUM *Pmiphis* est
Mangium porcellanum Rumph. Herb, Amb. III. p. 126. t 84.
- *8. TACCA *pinnatifida* est " "
Leontice Levntopetaloides Linn, notante *Cl. DRYANDER* in litteris-
69. SONNE[^]ATIA *acida* est
Rhizopora vascolaris Linn, ex eiusdem observatione.
70. MESPILUS *Xanthocarpus et Pbaenopyrus* in Supplemento descriptae plane defiderantur-
71. MESPILUS *Canadensis, Amelajicbier et arbutifolia*, quas ad PYRI genus amandavit *Nob.* LINNEO videri Mespilos in Syft. Veg. adhuc militat.
72. ROSA Fl. Dan. t 398. nequit et ad *R. arvensis et spinosissimam* pertinere, uno loco itaque excludenda. In icone pedunculi omnino nudi pinguntur, ideoque jure ad *R. arvensis* referenda mihi videtur, licet cymosum finit flores. HUDSON *fuhymosus* dicit, et varietatem flore folitario affert.
- 7j. POTENTILLA *verm.*
 Excludere iconem Oederianam, quae ad *P. auream* omnino, pertinet.
74. CAPPARIDEM *borridam* e *Coromandel*, non vero e *Ceylono* misit
 ^ KOENIG.
75. DELPHINIUM *puniceum* Pall. it. 3. p. 736. 96. est perennis planta.
76. AQUILEGIA *viscosa* nectaria habet incurva la *CHENAL Dijf.*
77. THALICTRUM *famineum* nova non est planta, sed quae in Spec. Plant. p. 771 • frbnomine *THMICTRI petalodei* occurrit.



78. *NEPETA mthifida* Spec. Plant p. 759-etSuppl p. 273- nequeunt%andem esse plantain, nisi una in alter am per culturam mutari possit, prior enim habet folia pinnatifida integerrima, posterior bipinnata. "Hanc quoque *bipinnatam* vocavit III- FALLAS*
75. *OCYMUM vertkillatum*.
Habitat ad C. B. SpL
80. *DRACOCEPHALUM moldavica*.
Definitioni adde: *foliis fubtus punctatis*.
81. *PEDICULARIS rosea* si eadem sit cum *Pediculari ALLIOHII Pedem-* p. 52. t. 11. §-1. nescio, IAQUINI opus enim conferre non potui, id autem absolute certum est, . ALLIONU plantam a *Pediculari bifida* differre* PedemDntii *Pedicularis* dedit *fonorat* DANA Prof.Taurin.
82. *HEBENSTREITIA ciliata* foliis linearibus dentatis> calycibus trivalvibus ciliatis. Mant alt. p- 410- Berg. Cap. 154.
In Syft. Veg. deficit, ut etiam
83. *SIBTHORPIA africana* foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis foliariis Spec. Pl. 880. An hujus generis?
84. *SCROPHULARIA chinmjs* foliis ovato.-oblongis ferratis pubescentibus- Mant. alt* p- 250- *quoque dee/2**
85. *BIGNONIA fpathacea*. Exclude norrien *Rumpbiu*
86. *ERINUS lycnidea* est *Erinus capensis*. Mant alt. p* 252.
87. *LUNARIAE* characteres maxime vagos in Fasciculo 1° correxii.
- 88^ *SISYMBRIUM Irio*. Exclude *Arn^n. Agad*.
89. *SISYMBRIUM Loejilii* p- 322. eliminatur et ejus loco p. 275. adscribitur
90. *SISYMBRIUM orientalis*** Hue pertinet *Amoen. Acad.*,4. p. 322.
91. *CHEIRANTHUS lacmis* eliminandus, quum *He/pmdisipeciem* dudum dixerit *Equ. a LINNE'*.
92. *BUISIAS aegyptiaca* in tab. 9. I. cit. proftat
93. *GERANIUM cucullatum*-
Sub hoc nomine duae species confusae sunt, a DILLENII enim longis diversis est *HERMANSII* frutex.
94. *GERANIUM glaucum*-
Exclude in *Ugerrimis*) dupla enim adeft varietas
a foliis integerrimis,
/3——ferrulatis.
95. *MALVA Abutibides* foliis lobatis villosis, caule erecto, calycibus brevissimis, capsulis globosis striatis = loculis polyspermibus* Spec. Plant, p. 971.
Debet restitui. Conf. Fasc. Nostr. IV. p. 28.
- <j6. *HIBISCUS birtus* *Sp. Plant p. 977. Syft. Veg. XIII. p. 523. relinquendus, non enim est varietas *Hibisci pboenicei*.
97. *GUSTAVIA augnsta*.
Pirzgara bexapeta/a a tetrapetala distincta omnino species.
98. *CAROLINEA prweeps*.
Habitat in Gviana, non in Gvinea-
99. *BORBONIA latvigata* et *LIPARJA umbcUata* una' eisdemque planta videtur, faltem plurima conveniunt, et lapsu^tnemoui^ae falfrum puto/quoJ in *Mant. alt.* p- 269- *Borbonia umbztata* nominetur,
100. *PTEROCARPUS [antalinut*.
Moutouchi fuberofa multum diversa.



- IBI." *SPHRTIVMfupranultum* ab inventore D. *UkssQtifupranubium* dictum, quum in altiilimis montibus fupra nubes crefcere tantum obfervatum, nee fingularis illi cum *Spaitio junceo* fimilitudo.
102. SPARTIUM *patens* Syft. Veg. p. &44. et CYTISUS *patens*? • 666, idem omnino frutex in Supplem- Plant, p. 328. duplicate errore iterum fub nomine CYTISI *pendulini* occurrit.
103. CROTALARIA *linifolia* videtur *zfcRumpb. Herb. Amb.V. t. §6. f. 1.*
104. ONOWS *arvef?Jis.*
Neqvie MILLER, nee GOUAN hanc plantam, quae eadem eft cum *Ononide bir- cina* Syft. Veg p. 651. cognoverunt, ut me certiores fecit amicus honor, DRYANDER, verum aliam pro *.0- miti* habuerunt.
105. ROT3INIA *Halodendron* folia habet plerumque quaternã, rarius binata vel fena, minim e *ternata*.
105. AESCHYNOMENE *coccinea* non crefcit in novaZelandia, fed in Ota- heite et Huaheite.
107. HEDYSARUM *fruticofumj lege racemispro ramis.*
108. HEDYSARUM *Alhagu Qmel u. Roff 1L p. 197. t. 29.*
109. PHASEOLUS *vulgaris.* Exclude *bracteis calyce minorihus*^ et ad no. PHASEOLUM *nanum*^ *bravteis calyce majoribus; ut&rqut enim chara- fter inconfans.*
- Hi. ERVUM *Lens.* Exclude iconem *Oederi.*
- 11a. ASTRAGALUS *arenarius.* Conf. *Fafc. N. II p. 22. etIII. p. 41.*
113. TRIFOLIUM *pratense.*
Huic nonfolium competit *corolla monopetala*, ergo vel excludendus hie chara- fter, vel et reliquis eadeiu infruulis adflendus.
114. MELALEUCA *lucida.*
Crefcit in Otaheite.
115. MELALEUCA *viBofi.*
Crefcit*in nova Caledonia.
- u CHYPERICUM *reflexnm.*
In Teneriffa reperit MASS ON.
117. PRENANTHES *pinnate* fine dubiD eft so « u i fpecies.
- 1 iB. HIERACIUM *prumHaefolium* caule ramofo multifloro, foliis lyratis to- mentofis, peduneulis unifloris. *Gouan iU. et Obf. p. 57. t. 22. f. 3. eft* *Leontodon dentatt/m** Mant. 1. p. 107. *Hieracium pumilum* Mant 2. p. 279. et *Crepis pygmaea* S. Veg. teffe *Cel ALLIONE.*
119. EUPATORIUM ^ *rew* fquama calycinas habet hirtutas. ex obferva- tione defunfci amici D. MONTIN.
120. PTERONIA *j^o/2r* in nofiro herbario flores habet pedunculatos.
121. SENEÇIO *alpimis.*
Quo jure haec planta ad Seneciones relata fit, fateor me non perfpicere, faltem ilia in Prodromo Florae Scandinaviae memorata ab hoc genere aliena.
122. TANACETUM *Jujjfruticofutn* foliis pinnato-iriultifidis: laciniis iinearibus fubdiviis acutis, caule fuffruticofo. *Spec. Plant- 11S3.*
Debet reftitui. *Conf. fimul MonU hit. p. 465.*
123. ERIGERON *dbliquwh*) ramoiiunum, foliis ovatis obliquis. *Mant. alt** •p. 573. et
124. COTULA *pyrethbraria*, foliis oppofitis ovatis crenatis petiolatis. *Mant i.* p. 116. in *Syft. Veg. omiffae.*



- 125- STOEBE *gnaphahides* et *gompbrenoides* eadein omnino planta.
- W6. SERIPHIMUM *gnaphahides* floribus fpicatis unifloris. *Spec. Plants* 1317- numne *Seripbii fufci* varietas ?
- 127- LOBELIA *comofa*
Qvatenus *Lobeliae triquetrae* varietas fit, excludenda*
128. LOBELIA *birfuta*
In Syft. Veg. bis occurrit; quum verò planta in Supplemento Plantarum determinate nequeat aliam effe, quam illam in Spec, Plantarum nominatam, excludatur altera. In icone Burmanniana *pedunvuli breves* quidem pinguntur, fed in defcriptione *admodum longi* dicuntur. In *Suppl. Plant-* p. 395. exclude *hi-fzu trifloris*, faepius enim uniflori funt
129. LOBELIA *bettidiflora* fingularis fane planta fi bellidiflora, reëtius *bellidifolia* dicenda, quod itaque in Supplfem, aequè ac Syftem. Veer, cprrige.
- "130* ORCHIS *flexuofa* Suppl-ab O&CHIDC *fiexnofa* Spec. Plant multum diverfa* Prior e fuppleraento Plant* mutuata, quae in Syft. Vzg. p. g^ occurrit eadem videtur cum ilia⁷ quam *b. Equcs* fub nomine *Orchidis bijiorae* iff Spec- Plant, et Syft. Naturae propofuit, quarpque in fexto Volumine Amoen. Acad. p. iog» fub nomine *Orchidis fatyrioidis* bene defcripfit. Inter orchides itaque galea calcarata expungi debet *O. flexicja*.
- 131- ORCHIS *hahtnavia*. Icon FL Dan. ad *Orchidzm bifoliam* pertinet.
132. ORCHIS *hyperborea*. Nomen et icon Oederi excludi debent- Icon in Fafcicnlo N. IV. adeft*
133. SERAPIAS *latifolia*. Icon FL Dan^ 267. ab hac removeri debet^ quum ad *S. longifo/iam*, notante dudum HALLER, pertineat.
134. NEPENTHES *diftillatecia*
Eft planta dioica monente *Cl KOENIG-*
135. CAREX *Dioica* Oed- Dan, t, 369. loco 166.
136. CAREX *Drymeja* eft *C. fylvatica* Prodrumi Fl. Scand-
Mirum eft ill. Syftematis editorem praeter *uncinatarn* et *cyperozdem* omnes "in Supplemento Plantarum lenumeratas *Carices* praeterviciflè- Ego praeterviiàs ippecies poflideo et non polTuin⁵ quin pro diftincliis habeam.
137. I^ARIETARIA *zeylamca* excludatur ad *Urticatn alimatam* telata.
- 138- BEGONIAE *obliquae* nomen triviale haud felicem fibiit mutationem, nam fi quoque ad C. B. Spei crefcat, in multis Indiae Orientalis locis occurrere certum eft. Melius *acaulis* diceretur\
139. ACROSTIC HUM *fbalictf rides et filiquofum* ex mente defunfci amici KOENIG una eademque eft Filix, nam frondes fteriles fub aqua faepe putrefcunt, antequam fru&ificantes juftam acquifiverunt ftaturam et aetatem-
140. VTERIS *fermlata*. Suppl. p. 445.
Hie maxima Synonymorum confufio. Excludi debent PLUMIERI-etsLOANEI nomina ac iterum *Acruficho trifoliata* una cum habitatione reddi.
Ad *Pteridemferndatam* vero quae Chinae Ceylonaoque eft incola, frequentia pertinent
Fi/i* fronde pinnata: pinnis enfiformibus ferratis, inferioribus oppofitis: inferne folio longo auflis- *Linn. FL Ziyi.* p. 199.
Polypadium caule fimplici, foliis fimplicibus variis longis ferratis- *Barm. Zeyf.* P- 198- t 37. fig.*xter.



- De Filice Plukenetii, quamvis nomen ejus aptum videatur, nihil dicere audeo; in Bibliotheca enim publica non nisi priores 250 Tabulae adfunt-
- 141- PTERIS *pedata* .
A filice Plumeriano certe distincta est illa, quae In Comment. Acad. Petropol. V- XII.^at. 12- f. obvenit, quamque benigne communicavit ML PALLAS, licet character utrique conveniat.
- 142*. ADIANTHUM / « r a t e k
Figuram *Pluknetii* huc non pertinere vidi apud desideratum cito nimis amicum D- D. et *AJfest** *L. Montin**
143. HYPNUM *fiuitans* Flon Suec. 1034.
IVEis Crypt. Gott. p. 2.26.
Suo loco inferi debet, vt etiam.
144. BRYUM *rubrum* anthera oblonga nutante, foliis fubulatis* caule fim^ pliuiflimo mediu pedunculifero, *ManU alt.* p. 309.
145. LICHEN *Oederi* #
Hunc dudum Rev. GUNNERUS in Flora Norvegica vocavit *Lichm Koenigii* > aliumque in eodem opere *L. Oederi* dixit. Ilium ego fecutus *Curu* in Prodro-mo Florae Scandinaviae. Cur haec denominationes sine ulla necessitate à L'INNE' ; « « . mutaverit", non video-
- 146% LICHEN *flammms* in Syft. Veg- perperam inter scyphiferos locatus, medius inter fruticulofos et foliaceos,
- 147- LICHEN chryfophthalmus Mant et *Capenjis* Suppl. certe idem est.
148. FUCUS *aczeleatus*, lege *Oed. Dan.* 355.
149. FUCUS *crnatus* fr on de plana oblonga prolifera ciliata ramentis fuliacels confertiflimis^ *Mant. alt.* p- 309.
etiam locuiii inter reliquos mcretur.





* * *

- I. NYCTANTHES *viminea* ramis teretibus elongatis, foliis ovatis acumi*
natis, pedunculis axillaribus unifloris: terminalibus trifloris.

E Tranquebaria mifit CL KOENIG.

Frutex ramis teretibus debilibus vimineis, glabris.

Folia breviter petiolata, nuda, ovata cum acumine parvo, pollicaria.

Pedunculi axillares breves folitarii uniflori, ramulos vero terminantes triflori

Calyx truncatus, dentibus fubulatis tubo corollae brevioribus.

Corollae iubus fenfim in cr aflät us

Idciniae longitudine tubi, lineari-lanceolatae.

- £• NYCTANTHES *pubescens* ramis teretibus hirsutis* foliis cordatis utrinque pubescentibus.

E Calcutta mifit honor, KÖNIG.

Frutex ramis oppofitis albo-hirsutis.

Folia oppofita, cordata, petiolata, integerrima, utrinque, magis tamen fubtus pubescentibus; fuprema fubrotunda.

Florts fafciculati, terminales ramorum.

BraBeat lanceolatae, hirsutae.

Calyx hirsutus, dentibus longis linearibus.

Corolla inter majores generis, glabra,

tubo calydnfe dentibus longiore*

3. NYCTANTHES *scandens* glabra, ramis teretibus dongatis fcandentibus^ foliis oblongo-cordatis, paniculis brachiatis axillaribus.

Habitat Bengaliae, ubi ad fummitates arborum fcandit, tefte D. KÖNIG, qui communicavit.

Frutex glaber, ramis teretibus longis virgatis-

Folia oppofita, oblongo-cordata^ integerrima, glauca, apice (an in omnibus) curvato.

Ptuiculae axillares, oppofitae, longe pedunculatae, brachiatae.

Flores in paniculae peditellis capitati, *Jasmini fyticantis* minores-

Galyx dentibus fubflatis, hirtus, tubo brevior.

Corollae limbus fexfidus tubi longitudine; laciniis hneari-lanceolatis.

- 4, IUSTICIA *parviflora* diffufa, foliis ovatis integris, ipicis fecundis, braffteis lanceolatis: anterioribus alatis.

E Calcutta mifit honor, KÖNIG.

Caulcs fubherbacei, diffufi, angulati, pubescentes.

Folia ovata) integerrima, acuta, nonnihil hispida-

Spicae femiunciales, terminales et axillares, pedunculatae^ fecunda, multiflorae.

Bractee dorfales imbricatae, lanceolatae, acuminatae, virides, oblique nervolae, margine tenui albo.

. , . . *anterfores* his fimiles, fed margine membranaceo albido latiore et intus hirsutulo quad alatae; fuperiores emarginatae.

Calyx minutus, hyalinus, dentibus acutis.

Corollam minutam albidam galea viridi ob parvitatem in fieca examinare non potui*

C&pfnla generis.



5. PAEDEROTA 'MIH'W*, foliis oblongis integris oppofitis, floribtis axill-
ribus oppofitis, calycum dentibus intus hirfutis.

Coijimunicavit *CeL KONIG*, cujus auctoritate Paederotam facio, nam in tenel-
la planta ficcatas examinare non potui corollas.

Fades Elatines Hydropiperis.

Cauks fesquipollicares rarius ramofi, bafi radicantes.

Folia oppofita, oblonga, obtufa, intcgerrima₃ nuda.'

Flores axillares, felfiles, folitarii.

Calyx quinquefiduS) pentagonus, campanulatus, dentibus intus hirfutis.

- 6, *CYPTLRUS fetaceus* culmis fetaceis ftriato-angulofis nudis, fpica terminali
fubquadriflora nuda.

Habitat in graminiois humidifculis frequens Calcuttae, *Hon. KÖNIG*.

Simillimus *Sdrpo adulari*.

Culmi fasciculati 3 - 4 pollicares, tenuiffimi, ftriato ->ngulofi, aphylli, bafi
vaginis purpurafirentibus veftiti-

Folia nulla.

Spica tenninalis folitaria, nuda, fubquadiflora.

Ghtmae purpurafcentes-

Stamina tria.

Stylus trifidus.

Semen albidum, tiirbinatum, triquetrum, rugofulum. Anguli mucrone trun-
cato Tupra femer elevantur, unde coronata (emina.

O^/SCIRPUS *adularis* huic proximus Cyperis omnino affociari poffit, fpi-
cam enim diftichain gerit, obfervante dudum HALLERO.

- 7- *CYPERUS compactus* culmo tereti foliofo, umbelladecutnpofita, involu-
cro pentaphyllo, fpiculis fongeftis (iibfpiralibus-

E China allatum communicavit *Rev. D. D** OSBECK.

Radices fibrofae*

Culmiis bipedalis et vltra₃ teres, ftriatus, inferne foliofus-

Folia altitudine fere culrii linearia, vaginis purpurafcentibus, margine et ca-
rina inerraia, ftriata: licet plana inter ftrias ifthmis intercepta videantiir-

Umbetta deuompofita, radiis teretibus patentibus-

Involucrum fphyllum, folio longiflimo fesquipedali, fcreviflimo tripollicari,
omnibus margine fcabris.

Umhllulae 0 3 - 5 radiis compofitae* "

InwluceUa pro numero radiorum, capitulis breviora, ciliata. -

Capitula cpmpta e fpicis patentiffimis lineari-fubulatis ferrugineis*

Spicae felfilesi femipoUicares, lineam latae, tortae videntur, plerumque
. fexflorae-

Squamae fubulatae marginibus conniventibus₃ ftriatae, purpurafcentes carina
viridi-

Stamina 3*

Stigmata 3 villpfa.

- g. *CYPERUS mucYonatus* culmo tereti? nudo, fpicis lateralibus felilibus, in-
volucro monophyllo.

Habitat in fcauriginofis ad Wiflagapatnam *CeL KONMG*.

Radix rep ens vaginis fufcis veftituS.

Culmi pedales, nudi, ftriati, bafi vaginis fufcis truncatis veftiti ; numvero te-
res lit vel compreffus difcernere haud potui in ficcato.

iFolium tinum Vel altefurn radicale, breve > anguftum.

Capittlüm e fpicis feffilibus paucis feffipollicari ab apice culmi fpatio r#
motum.

Involucnim monophyllum fpicis vix longius.

Squamæ ovatae, acutae, convexae, albiae.

Obf Num hie a *Cypro mucronatv* KOTTB. id p. 19. t g. f. 4. vefe difierat,
nefcio; figura certe fimillima, fed involucrum fub fpicis in noftro oiii-
no adeft.

9* CYPERUS *diphyllus* culino fubtriquetro diphylo, umbella fupradecompo-
fita, fpiculis teretiufculis fuppinnatis.

In aquis fluentibus Indiae Orientalis letum mifit *amiciffi* KÖNIG.

Radices capillaceae.

Culmi Gpedalis. Ex eo quod fub unftella triqueter fit, triquetrum judicOj
fub exficcatione omnino compreffus fathis*

Fofya duo ad bafin culmi. vaginis integris; verum a fluminis motu haec fo-
lia in tenerrima filamenta refoluta fuere*

VmbeUa terminalis quaflripollicaris, fupradecompofta.

Involucrum foliis pluribus brevibus acutis,

Pediunculi compreitl.

Involucellnm fub omni pedunculo partiali laticeolatum, albidum*

Spkulae feme pinnaræ^ teretiufculæ, acutæ, pallidæ circier i2floræ«

Squamæ imbricatae, ovatae, acutae, longitudinaliter ftriutae*

Stamina \$.

Gtrmen anguftum.

Styli 3. ftigmatibus villofis.

ID- CYPERUS *leucocephalus* culmo fetaceo triquetro nudo, capitulo feffili,
invulcro fubtetraphyllo patentiffimo, floribus munandris.

Habitat in nemorofis Tfchandranconae. D. KÖNIG.

Radix- bulbofa oblonga, fibris longis capillaceis.

Culmi femipedales fetacei, triquetri, nudi, bafi vaginis emareidis veftiti*

Folia graminj&a, laevia, culmo dimidio breviora.

Capitulum parvum niveum*

Involucrum plerumque tetraphyliuffi, foliis fetaceis: longiore pollicari, pa-
tentiffimis-

Sficae 8-12 feffies, lato- ovatae.

Squamæ lineares, compreffae, infimae longae, fuperiDres fenlim breviores,
obtufae^ ftriatas.

Stamen f.

• *Stylus* i- *Stigmata* 3. villofa.

Semen longum, lineare, trigonum, nigrum.

11. CYPERUS *rotundus* a LINNEO in Flora Zey^lanica defcriptus a *Cypro*
procero ROTTB. p. 29. t. 5* f. \$* plane diverfus eft.

12. CYPERUS *exaltatus* culmo triquetro bafi monophyllo, umbella fupra-
decompofita polyphylla, fpiculis lihearibus pedunculatis.

Cypirus fafligiatus Roth icon. p. 32. t. 7- f. 2. forte hujus eft fpicimen
mancum.

E Tranquebaria mifit hynor, xoNiff»

Radix fibrofa*



Culmus quinquepedalis', triqueter, ftriatus.
Folium unicum e radice, praeter vaginam pedalem, fere tripedale, duas quintas pollicis partes latum, planum, ftriatum, margins asperum.
Umbella pede altior, fastigiata, fupradecomposita.
Involucrum polyphyllum: folio longiflimo bipedali, reliquis ad pollicis unius longitudinem decrefcntibus, margine asperis.
Radii umbellae triquetro-compjeifi.
Ochreae pollicares, albiae, truncatae cum acumine.
Umbellulae multiradiatae, radiis inaequaliter divifis compofitisque. *
Involucdla numero inaequalia, brevia, filiformia..
Ochreae breves truncatae fine acumine.
Spicae pedunculatae, Jineares, 2oflorae, compreflae, lateribus ferrugineae*
Squamidac 2 minutae ad exortuft pedicellorum.
Squamae compreflac, acutae, carinatae.
Stamina 3.
Stigmata 3 villofa.
Semen triquetrum album.

13- *CYPERS niveus* culmo triquetra filiformi nudo., umbella terminali fe9-
 fili diphylla^ fpicis compreflis lanceolatis.

Crefcit in nemorofis ad Midnapour^ Tfchandrancona. D-KÖNIG.

Culmi fesquipedales, filiformes, nudi, triquetri, ftriati.

Folia radicalia, pauca, brevia, angufta, *Vagina* Integra: ligula folio oppoflta brevi obtufa.

Umbella feffilis, terminalis, e fpicis niveis pluribus plerumque feffibus.

Involucrum diphyllum, reflexum, capitulo longius.

Spicae comprefliflimae, lanceolatae^ femipollicares, floribus ad 30.

Qlumae compreflae, carinatae, ftriatae*

Stamina 3 membranacea.

Gevrnen trigonum.

Stylus fimplex ftigmatibus tribus, vix villufis.

Semen nigrum Eagopyri.

14. *CYPERS imbricattts* culmo triquetro nudo, umbella decomposita, umbellularum radiis imbricatis, involucri hexaphylli foliis tribus longiflimis, tribus breviflinhs.

E Tranquebaria mifit CeL KÖNIG.

A *Cybero ligulari* diverfus.

Folia radicalia-

Culmi triquetri nudi-

Umbella inaequalis quadripollicaris*

Involucri folia tria longiora pedalia vel bipedalia, linearia, margine aculeata, carina laevi.

. . . . breviora umbella, anguftiora.

Ochreae truncatae cum acumine, bafi purpurefcntes.

Umbellulae aliae feffiles, aliae pedunculis fesqui - tripollicaribus triquetris inn&ae.

Involucella nulla.

Radii umbellularum a bafi ad apicem ufque fpiculis imbricati, teretes, minime capitati*

- Spiculae* utrinque convexae medio longitudinaliter compressae, lanceolatae, 12- zoflorae, vix duas lineas longae, flavo - fufcae, pedicellatae.
Squamae imbricatae, lato-ovatae, acuUe, marginibus membranaceis.
Stamen unicum mihi vifum-
Germen triquetrum.
Stylus (implex *stigma*U trifido.
15. CYPERUS *cruentus* culmo triquetro basi monophyllpj umbelti terminali diphylla, fimpliciflima.
 E Tranquebaria mifit Cel. KÖNIG.
Culmits 4-5 polliGps altus, filiformis, triqueter, ad bafin
Folium unicum, lineare^ culmo brevius gerit.
Umbella fimpliciflima.
Spiculae 2-10 lanceolatae, fangvineo-fufcae, lineas 2-3 longae.
Involucrum diphyllo umbella quadruplo longius.
Squamae imbricatae, cymbiformes, obtufifcutae.
Stamtfia 3- "
Stigmata totidem obfcure purpurea-
Semen lenticulare 1. utrinque cDnvefum marginibus acutis nigro-purpurafcens.
16. CYPERUS *nitenf* culmis triquetris basi foliofis, umbellis fubiimplicibus, involucro triphylo^ flpribus monandris.
 E Tranquebaria communicavit *amicijl* KÖNIG.
Radices capillares.
Culmi plures triquetri, pollicem unum vel alt'erum alti, basi foliofi.
Folia 2 - 4, linearia, culmo longiora."
Umbetta glomerata, fpicis aliis iimplicibus, aliis umbellulam fere fefllem con-
 •ftituentibus.
Involucrum triphyllum folio longiore fesquipollicari, reliquis decrefcentibus.
Spiculae lineares, anguftae, nitidae, albiae medio longitudinaliter fulcae, fquamarum apicibus divergentibus^ ID - i4flurae-
Squamae ovatae, compressae, carinatae, Ariatae, hyalinae, carina viridi, ob-
 tufte cum atruraine.
Stamen 1.
Stigmata 3.
Semen cihereum. %
Qbf. Proximus *fquarrofo* fed fpiculae aliter coloratae, duplo latiores fquamarum apicibus brevioribus minus divaricatis, nee umbellae partiales in noftro pedunculatae.
17. CYPERUS *flavidus* culmo triquetro ftriato, umbella compofita triphylla, fpicis lanceolatis, fquamulis monandris.
 E. Tranquebaria mifit *hoiwn* KÖNIG fub nomine *Cyperi flavefcantis*.
Culmi femipedaldS, monophylli, trianguli, ftriati.
folia fasciculata, brevia, angufta, in culmo unicum culmo dimidio brevius.
Umbella fpicis nonnullis feflilibus, aliis umbellulatis.
Involucrum triphyllum₃ erectum, umbella triplo 1. quadruplo longius, lineare.
Spicae lanceolatae, flpribus 26 circiter.
Squamae fcariofae latenbus purpurafcentes, difcretae^ anguftae.
Stamen 1 tantum vidi.
Stigmata 3 villofa-



ig. SCIRPUS *plantaginum* culmis teretibus geniculatis nudis, spica terminali cylindrica nuda.

Scirpus plantaginens Roth* Defer, p. 45* t. 15. f. 2.

Culmi 3-4pedales, basi vagina emarcida vestiti, teretes, ftriati, geniculati et inter genicula (in ficco exemplan) isthmis extus apparentibus dense notati-

Folia familia, fed breviora et versus apices compressa.

Spica terminalis, pollicaris, cylindrical dense imbricata,

Reliqua vide JV^o. RDTTBÖLL 1- cit

Fateor me nescire, in quibus a *Scirpo geniculato* differat, quum neque ipse Scirpus, nee Sloanei opus adfit, culmum vero in hoc factum dicit Nob. ROTTBÖLL, qui in nostro praeter isthmus omnino vacuus est.

15. SCIRPUS *atropurpureus* culmis fetaceis teretibus fasciculatis, spicis terminalibus ovatis foliariis, floribus monandris.

In humidifuculi uliginosis Indiae crecit D- KÖNIG.

Similis *Scirpo caribaeo* fed tenuior*

Radices filamentosae.

Culmi conferti, ftritti, fetacei, teretiufculi, ftriati, nudi, basi vagina brevis purpurascens vestiti, pollicares - femipedales.

Folia familia pauca.

Spica foliaria, terminalis, ovata, nuda, temp ore praefertim pluvioso atropurpurea.

Squamae ovatae, obtusae, carina viridi.

Stamen 1.

Szmen atrum fetis nuntiis niveis basi circumdatum*

ao, SCIRPUS *scaberrimus* culmo fetaceo compresso ftriato, spica ovata, involucri monophyllo brevi membranaceo, femini^{us} turbinato-compressis*

Ex India misit Ccl KÖNIG-

Radices capillares.#

Culmi plures, femipedales, fetacei, compressi, ftriati, basi foliosi.

Folia culmo nonnihil breviora, fetacea, marginibus convoluta*

Vaginae emarcidae, fuscescentes.

Involucrum monophyllum, lanceolatum, spica brevius.

Spica terminalis ovata, tumida.

Squamae latae, breves, acutae, albidae carina viridi-

Stamina tria filamentis latiusculis.

Germen ovatum, compressiusculum, utrinque convexum, margine acuto, album-

21. SCIRPUS *complanatus* culmo compresso ancipiti, umbella supradecomposita involucri diphylo longiore.

Ex India misit C7- KÖNIG.

Culmus tripedalis, compressus, anceps-

Folia longitudin^{al} culmi, plana, culmo triplo fere latiora.

Vaginae compressae ancipites^{ae}.

Ora in piano lutere oblique ascendens fusca - marginata-

Umbella erecta, coitfracta, quadripollicaris.

Involucrum, folia duo plana, alterum pollkare, alterum dimidio longius filiformia,

Spiculae angustae, icutae, pauciflorae.

¹* *Squamae lanceolatae, acutae, compressiflorae, fuscae.*

Stamina 3.

German trigonum candidum.

Stylus (implex. Stigmata 2 reflexa.

22. SCIRPUS *diphyllus* culmis femicylindricis ftriatis diphyllis, umbella com-
pofita involucro diphylo longiore-

E Trail quebaria miit ho77or* KÖNIG*

*Radices fibrosae, breves**

Culmi 2 1. 3 vix pedales, filiformes, femicylindrici ftriati, basi foliis duobus infructi.

Folia glauca, radicalia breviora, caulina culmi fere longitudine, graminea-

Umbella compofita, inaequalis^

Involucrum folia duo umbella longiora radicalibus familia, praeter haec unum vel alterum filiforme brevius.

Involucrum brevia, fcariosa.

Spicae ovatae, pedicellatae.

Squamae ovatae, acutae, concavae, fuscae, dorso linea viridi.

Stamen L filamento compresso-plano-

Pistillum. Germen obovatum, acutum, compressum, utrinque convexum, longitudinaliter ftriatum, transversim minutissime rugosum.

Stylus latifolius, compressus, longitudinaliter utrinque hirtus,

Stigma bifidum-

33. SCIRPUS *anomalus* culmo triquetro folioso, panicula terminali brevi, spiculis ovatis, floribus corollatis infimis monandris, superioribus diandris.

Specimen dedit Honor, THUKBEIG, ex India Orientali forte allatum.

Radices fibrosae.

Culmus subpedalis, triquetus, foliosus, laevis.

Folia ad basin culmi raulta longitudine culmi, plana triaria, nuda, inermia, pollicem dimidiu lata; in culmo tria hisce familia, sed breviora.

Panicula fespipollicaris, pedunculis brevibus femiteretibus ciliato-fcabis,

Involucrum sub infimo pedunculo folium panicula quadruplo longius, ciliato-fcabrum;

sub fecundo pedunculo huic simile, sed panicula vix longius; reliqua folia femim breviora, omnia ciliato-ftabra,

Pedunculi 3 - sflorL

Pedicelli brevissimi, squamis duabus tribusve lanceolatis-

Spiculae ovatae, squamis imbricatis ovatis obtufu.

Flores inferiores monandris superiores diandri.

Corolla dipetala, magnitudine circiter squamae calycinae.

Glumae aequales, compressae, carina ciliata.

Filamenta capillaria, longa. Antherae lineares, flavae.

Pistillum Germen trigonum.

Stylus simplex, longitudine corollae

Stigmata duo, filamentis breviora, villosa.

24. SCIRPUS *groffus* Linn. Supplem. p. 104.

Vulgaris in Indiae lacubus. Cel KÖNIG,

Ctilmi novempedales, crassi, triquetri, latere tertio juxta balm angustiore;
anguli acuti -inermes-

Umbdla terminalis, fupradecomposita, femipedalis.

Involucmm triphyllum, folio i^d 21 pollices, 2» 14 <* 3° septem longo; mar-
gine retrorfum fcabris-

Peduuculi inaequales, alii umbellulati, alii alternatim pinuati, triquetn*

Involucella brevia, fufca, diphylla: interiore amplexicauli.

Spiculae ovatae.

Squamae lato-ovatae, fufcae, carinatae*

Stamina tria, filamentis latiu fcillis*

Gtrmm triquetrum.

Styli duo *ftigmatibus* viliofis.

Setae nullae, *

11 *Obf* Nulkm cum *Scirpy miliaceo* video fimilitudinem fingularem-
if *SCIRPUS lateralu* Fafcic.-IV. p. 12.

adde

Spicae 2- g, ovatae.

Squamaz pallide fufcae, carina viridi, ovatae, acutae, concavae.

Stamina 3 antheris linearibus.

Qermen % trigonum ^ utrinque^ acutum-

Stylus brevis, *ftigm*^U leviter ififido.

25- *SCIRPUS miliaceus* Spec, frant. p. 75.

Descriptioni adde

Ctilmi variant' a femipedis#d fefquipedis altitudineni^

Folia bafi equitantia.

Spiculae globosae > minime ovatae.

Staminum numerum obfervare haud potul.

Stigmata 2 flexa.

27. *SACCHARUM bengalenfe* paniculae confertae pediunculis diviljsy fio
feulis gemiriis felRli pedicellatoque, corollis bivalvibus hermaphroditib-
Habitat Bengaliae, uadetenevale communkavit *Cel. RÖNIG*.

Adeo magnitudiue et reliquiis fimile *Savcharo arundinricco*, ut pro eodem
facillime habeatur, differt

Corvllis bivalvibus, omnibus a-me examinatis hermaphroditis et

Stigmatibus fufco-flavefcntibus,;

modo haec filficiant.

^28- *SACCHARUM Koenigii* panicuia fpitata, floribus diandris, culnii geni-
culis barbatis, foliis planis.

Saccharum fpicatum Thunb- Fl. Iapon^p. 42

Num hoc etUm *Saccharum fpicatum* Linmi .fif, omnino dubius fum, defcri-
ptio enim haud fufficit. Idem vero, quod fub nomine *Savhari dian-
dri* aliquoties mifit honor, KÖNIG ab *amiciffimo* THUNBERG accepi
fub nomine *Savbari fpicativ* ex Iaponiu.

Culmus teHuis, pedalis 1. fefquipedalis, geniculis pilis albis ereftis barbatis.

Folia radicalia multa, plaiu

• . *caidina* pauca, tota§ vaginantia.

Panicuia tota lana vid^tur. candidiffima, quae floribus triplo longior.

Corolla aegre obfervatur.
Stamina duo antheris fixis.
Stigmata duo utroque fufca.

25. SACCHARUM *Thunbergii* panicula fpicata, floribus diandris, culmi geniculis nudis, foliis convolutis.

Etiam hoc dedit Nob. THUNBERG in Orientali India lechim.
 Altius proceriusque gramen.
Panicula magis contrafta duplo longiore, lanugine magis flavescente.
Gmicula culmi omnino nuda.
Folia rigida, convoluta.
Flures diandri, digyni, duplo majores.
Corolla calyce duplo minor, tenuis, albo-nitidiffima.

30. PANICUM *difiachyon* fpicis fubternis fecundis laevibus ciliatis.

Saepe enim fpiculae tres, immo quatuor adfunt.

31. PANICUM *fuarrofi* Falcic. IV. p. 15. iconeni vide Tab. I.

32. PANICUM *lanceolatum* fpicis alternis, calycum valvula externa ciliata, aristata, foliis lanceolatis.

Mifit Opt. HONIG., *grows in sandy places.*

Culmi fimplices, decumbentes, foliofi, radicanes, longi.

Folia lanceolata, nuda, nervosa et inter nervos tenuiffime lineata, basi ciliata.

Vaginae tuberculato-pilofae.

Spica compofita e fpiculis alternis uncialibus.

Flores fecundi, alternatim binati rachis flexuosa trigona, altero majore utroque aristato, rarius in inferiori fpicae parte folitarii; omnes virides.

Calycis valvula exterior fortis bafi ciliata, arifta flore triplo longiore flexuosa. interior ejusdem fere longitudinis, anguftior, utraque compressa,

intima corollam omnino occultans, longior teretiufcula.

Aequilum fquamula linearis apice pilofa intra calycern.

Corolla biglumis, valvulis aequalibus hyalinis acutis, exteriori interiorem, hirtioribus ftamina piftillumque obvolvete.

33. PANICUM *ftagnium* fpicis fecundis alternis, calycibus bifloris aristatis hirtis.

Habitat in ftagnis Indiae Orientalis D. KOENIG.

Culmi erefti, tripedales, foliofi,

Folia linearia, plana, laevia, margine afpera, oris vaginalium pilofis.

Spica compofita, fetiipedalis.

Spiculae fesquipollicares, floribus fecundis, alternis, binatis folitariisque majusculis.

Calycis valvula exterior planiuscula, ovato-lanceolata, definens in ariftam longam hirtam, trinervia.

interior ejusdem formae et magnitudinis, fed magis convexa, mutica.

accejbria dimidio brevior et lanceolata.

omnis hirta praefertim margine.

Stylus exterior mafculus, petalo unico, piano, lanceolato, hyalino.

interior foemineus calycis valvulis fere longior, dipetalus, petalis cartilagineis, altero piano > altero convexo marginibus amplexante,



Germen fubrotundo-ovatum, compreffuin.

Styli 2.

34. PANICUM *hipiduhm* f̄p̄icis binatis ternatisque ereclis, calycibus hispidis biariftatis.

Ex India Orientali mifit *honor*, KÖNIG-

Proximum *P. ftagnino* valde tamen differt

Culmi et Folia praecedentis-

Spica compofita, femipedalis, conferta.

Spivulae vix pollicares, rachi fere adpreffae, binatae 1. ternatae, etiam folitariae.

Calycis valvula exterior in ariftam flore quadruplo longiorem nucjain terminator,

interior aliquantulum longior mucrone feu arifta brevi terminatur, utraque hispida praefertim margine-

accejfbria brevis e bafi lata pedicellum ambiente in acumen terminating nuda.

Corolla praecedentis, fed acuminata et hermaphrodita. Praeterea inter corollam et calycis valvulam longius ariftatam *petalum hyalimtmife* quale in praecedentij fedhuic neque ftaminum» nee piftilli rudimentum adfidet.

at-35. PANICUM *Brizoides*.

Hujus in Mant. alt. p. 184- defcriptio adco manca, ut tota deleri debeat.

Culmi bafi decumbentes compreffii, geniculis purpureis.

Folia ad genicula culmi quidem primo fingula prodeunt, dein veropluraim tra communem vaginam proveniunt linearia, laevia.

Vaginae compreffae, tumidae, oris ciliatis circuloque purpureo notatis.

Spica compofita palmaris-

Spiculae 2L&XII- lineares interftitiis breviores, ereftae et fere adpreffae, unciales-

*Racis univtrfal*is. trigona

partialis linearis, repanda, nonnihil afpera, mucrone elongato terminatur.

Flores duorum (minime trium) ordinum, compreffii, mutici, facie Pafpali.

Calycis vahulae binae exteriores minute, retufae, fquamukrum forma-

tertia plana, magnitudine corollae, lato-ovata, acuta, trinervia-

Corvlla cartilaginea *valvulis* planis glaberrimis, altera margine amplexante.

Stamina 3-

Styli duo *jügmatibus* barbatis pallide rofeis.

Nettarium fquamulae 2 retufae margine fubvillofae.

Vbf. PANICUM *fluians* FafclH p- B huic fimile differt *valvulis* duabus longitudine CDrollae, *acccforia* tantum brevi retufa. Ceterum utrumque faciem habet Pafpali.

36. AGROSTIS *Cinna* panicula contrafta mutica, floribus acuminatis f₀b- monandris, foliis planis firabris. * •

Cinna arundinacea Spec. PL p. 7.

Quum variet ftaminibus folitariis, duobus et tribus commode WoftMic neri affociatur. ~ i^mais ge-

Folia lata, multinervia, fcabra.

Panicida coerulefcenci-glaucâ, racemis imbricatis.



3% AGROSTI5 *diandra* panicula elongata contrafta, floribus fubulatis muticis diandris, foliis convolutis-

Mifit *CeL* Kb NIG fub nomine *Cinnat*.

Culmus filiformis, fefquipedalis, foliofu*

Folia tenuia, convoluta.

Panicula tenuis, fpithainam longa, race mis brevibus ereftis.'

Flores pedicellati, fubulati, diandrL

f 38. POA *tenella*. Syft. Veg. XIV. p. 114.

Non folum *Folia* fauce pilofa, fed tota panicula ad pedunculorum bafin fafciculos gerit e pilislongis 3-1& candidiflimis.

39. POA *malabariora*. Syft. Veg. XIV. p. 114.

Flores minime feffiles, fed pedicellati et magis quam in *cbwnfi* remoti et elongati.

Calyx in noftro fpecimine quadrifloras, floribus brevior, carina, fi probe atteudetur, ciliata.

Rachis arifpera.

Folia et *vaginae* nuda.

40. POA *Cbinenfis*. Syft. Veg. XIV. hujus varietas eft

Poa panicea Fafc. III p. n-

Ludit haec *calycibus* 2 - 3 - 4floris non minus, quain altitudine, ut ex pluribus fpeciminibus inter fe collatis poftea vidi.

Flores pedicellati, non feffiles, rachi fere adpreffi, fereque imbricati

Calyx longitudine flofculorum, carina laevi-

Rachis non afpera.

Folia pilofa praefertim ad *vaginas*.

41. POA *unioloides* panicula eredtiufcula, fpiculis fiibdecemfloris ovatis, calypibus inferioribus multivalvibus.

Communiljavit *Honor*, KÖNIG.

Gramen H^c medium fluali inter Poas, Brizas et Uniolas.

Spicaz ovatae_p breves *Brizae*, fed valvulae acutae, carinatae.

Calyx florum inferiorum paniculae quadrivalvis, fuperiorum vero bivalvis.

Flores infimi 4flori₃ {iuperiores 8 - 10 - i2flori.

42. POA *hiflora* panicula denfa, calycibus fubbifloris glabris[^] culmo adfeendente.

Mifit *CeL* KÖNIG.

Culmus pedalis, adfeendens, foliofus.

Folia fuprema culmo vix breviora, nuda, linearia acuta.

Panicula elongata, anguftata, pedunculis hrevibus patentibus, femiverticillatis.

Flores numerofti, minuti.

Calyces glabri, pellucidi, ovati, comprelli, magnitudine glumarum corollae, biflori, rarius triflori.

43. CYNOSURUS *indicus*L.

Bra&earum dorfum ferrulato - ciliatum*

44. SCLERIA *fumatrenjh* culmo foliofo, panicula prolifera erecla, involucri tripnylliSj floribus polygamis. *Tab-IL*

E Sumatra adduxit *Rev. D. WEMNERBERG*.

Culmi alti j craili, triquetri, foliofu

Folia linearia, longe acuminata, fuprema panhiula longiora, nuda, margines
aspera.

Panicula femipedalis,*compofita, prolifera videtur, nam praeter involucrum
fub panicula aliud habet in paniculae medio.

invducrum vtrumque triphyllum panicula brevius.

Involucella monophylla, brevia, filiformia.

Pedunculi et *Pedicelli* triquetri, ramofi-

Spiculae parvae ferrugineae,

Mafculae pedunculatae triflorae.

flofveli 2 mafculi antheris fubfepilibus linearibus flavis nigro-cufpidatis.

. . *Urtius* foemineus digynus fterilis", *gzrmim* nullo,

ftylis longitudine *tpiculae* nudis.

Femineae *Veffiles*, axillares^ folitariae, uniflorae.

Gerrnrn rotundatum

Styli tres

Stigmata villofa.

Semen fubrugofuixi₅ atrum?

Nura fola haec fpecies feminibus. albis laevigatis deftituatur?

- 45. ARUNDO *bcTjgalmfis* calycibus bifloris, paniculae ereftae pedicellis tri-
flovif-

Habitat in Bengala. *CeL* KÖ>3 1G-

Culmi alti, inanes, craffi, foliofi.

Folia glabra, bipedalia et vltra, bafi 2 pollices lata.

Panicula bipedalis, ramofiflima, ereda,

Pedunculi femiverticillati, inaequales, rarnofr.

Flores in inferiori paniculae parte ternati, unico . feffli_r duobusque pedicel-
latiSj dein binati alter0 feffli, fupremi folitarii.

Calyx fubulatus, nudus,. biflorus, valvula altera parum longiore.

Corotae 2 lana longitudine calycis cindae, altera pedicellata calyce parum
longiore, *petalis* anguftis linearibus, trinerviis, hyalinis-

46. ANDROPOGON *glauvum* panicula foliacea^ involaceliis calycibusque
bifloris, florum feffilium calycibus trivalvibds: pedunculorum bival-
vibus.

Miffit opt. KÖNIG', qui *Anthiftiriae* fpeciem credidit

Culmi filiformes, psdales, foliofi-

Folia linearia, plana, glauca»

Panicula fparfa, foliofa.

Pzdunculi breves e vagina folii prodeuntes, folitarii L plures.

Involucrum breve, cymbiforme, arifta latiufulca brevi.terminatum. Ex hoc
prodeunt

Pedicetti 2 breves, quorum fingulus iterum *znvolucelh* priori fimili bifloro
inftruuntur.

Flores bini altero feffli, pedunculato altero.

Seffilis Calyx triglumis, cartilagineus, valvulis duabus lateralibus fubfalca-
tis planis, tertia longiore convoluta recta acuminata; biflorus.

Corolla hermaphrodita yel foeminea, valvula altera cymbiformi ma-
jore, altera plana lanceolata^ -utraque hyalina.

Pedunculati ptdictllus longitudine floris feffilis, craffus, rigidus.

Calyx bivalvis₃ acutus, longior, biflorus.



Corollae bivalves, lineari-lanceolatae, hyalinae, altera £ -eminea, vaiba altera.

Stigmata plumofa.

47. ANDROPOGON /erratum *fpica fimplici imbricata feriebus binis flo* rum ariftatig feffilium, binis muticis pedicellatorum, calycibus univalvibus.*

Crtfcit ad oras fluminis in Bengalia, *CeL* KÖNIG.

Culmi pedales, filiformes, ramofi, foiofo > geniculis barbatis.

Folia linearia, laevia-

Pedumulus elongatus, fere capillaris,

Spica fimplex, folitaria, imbricata₅ fesquipollicaris.

Flores rachi adprefli, in quatuor feriebus digefti, auarum binas unius lateris conftituunt flores ariAati feffilesj alteras mutici pedicellati.

Mafculi Calyx univalvis, valvula ovata, obtufa, viridi-ftviata, ciliata.

Corolla bivzivis, valvulis hyalinis lanceolatis, interiure carinata*

j4ntberac tres lineareS.

Foemwei Calyx et *Corolla* mar is.

Germ?/? o vat urn, utriaque acutum, CDmpreflum.

Styli duo.

Arifla longa₅ fufca > .tortilis > ad germinis latus inferta.

48. ANDROPOGON *incurvatum fpicis filiformibus fubdigittatis, floribus geminatis: foemineo pedicellato ari/lato? mafculo feilili rautico^ calycibus univaivibus.*

Habitat in Tranquebaria juxt^i flumina, *CeL* K b N1 a

Culmi bipedales, filiformes, foliofi, ramofi.

Folia linearia, ad radicem tnulta, in culmo pauca-

Peduncuhts elongatus.

Spicae plures* filiformes, viridi-fufcae.

•*Flores* geminati, hirti₉-ba(i) barbati, mafculo ieffili mutico, foemineo pedicellato ariftato.

Calyx in utroque linearis, univalvis, obtufus₃ hirtus, viridi-fufcus,

Corolla bivalvis, lanceolata, hyalina.

Arifla foeminei florid longa, torta, gepiculata₇ ad genii usque fufca, dein albida, prope germinis bafin inierta.

Gwmen longum cylindricum-

Antherae tres, parvae-

49. ANDROPOGON w ^ t e Fafcic. III- p. 43-

Idein eft gramen, quod minus apto nomine *A-fquavrofum* in *Supphm, Plant* p. 433 diftunrfuit, nihil enim fquarroli in toto gramine apparet-

50. ANDROPOGON-&i72atmn *fpicis geminis lanatis, calycum valvula altera : acuminata: altera truncata tridentata/petalo majore ariftato**

Tfchandranconae leiftum dedit *amiciffi* KÖNIU.

Culmi filiformes, pedales, fesquipedales-

Ptdumitli 1-3 longi, filiformes.

Spicae geminae, pollicares.

Rachws denies Janugine flava fafciculata.

27or^feffiles eadem lanugine obfiri.

Calyx ftriatus, vahula majore acuminate, *toiantfi* truhcata fridentata-



*Corolla% vahitk exterior linearis, ariftata, arifta geniculata**

. *interior brevior, mutica** *

Styli duo. Stigmata villbfa, fufca,

Objl In variis fpicis nulla ftamina adfuere, num deciderint? vel num flores hermaphröditi aut mafculi in diftinftis individuis |

51. ANDROPOGON *aviculatum* panicula contracla erefta, pedunculis trifloris, floribus mafculis binis pedicellatis acuminatis, foemineo feffili ariftato.

Gvamen acintlatum Rumph. Arnb. VI. p. 14. t 5- f- 1.

Habitat in Indiae Orientalis fterilibus et ruderatis-

C«/mbafi radicante\$j adfeedentes, pedales bipedalesque, fimpliciffimi.

Fylia lanceolata, ferrulata-ciliata, fuprema vaginantia-

Panicula fufco-purpureaj ftñ6\ a, contrafta, pollicaris.

Peduttculi triflbri.

Rictptaculum floris feffilis pilofum et hinc lineae 2 pilofae in pedunculo decurrunt-

Fhs feffilis foemineus, *calyce* aculeolis ciliato, acuminator *petah* interiore ariftato, *arifta* fcabra.

Fhres peditättati mafculi duo, *calycibus* fubulatis acuminatis angulatis.

Cotolte nulla»

Stamina 1.

- *Rudimintum* germinis.

Obf. Defcriptionem ex unico fpecimine deflorato concinnavi; dubius itaque etiamnum fum, an, quod in floribus mafculis obfervaverim, filamenta tint, petalave anguftiffima.

- ≠ 52. CISSUS *baptaphylla* foliis feptenis ferratis hifpidis.

E Calcutta mifit* bonon K 6 NUG:

FruUx larmentofus 7 fcandens.

Rami pubefcentes-

Cimbi oppofitifolii bifidi.

Folia alterna, petiolata, compofita e binis ternatis et unico fimplici majoi^ iterutn petiolatis*

Foliola ovato-lanceolate acuminata, inaequaliter ferrata, fuperne fparfim hifpida, inferne magis; nerui veroet margines utrinque hifpidiores.

Paniculae faftiagtae, brachiaUe, pedunculatae, oppolitifoUae.

Fhres parvi,

53. SOLANUM *corymhfum* caule ineremi fuffruticofo, foliis ovatis integris fubtrilobisque, floribus cymofis.

Habitat in Fenu Semina communicavit CL THOUIN-

Caulis -bipedalis, fuffrutefcens, debilis, angulatus, nudus. In Caldatio frutefcit.

Folia fparfa', ovata, nuda, pier unique Integra > rarius triloba. In Caldario lanceolata*

Cymae ex foliorun^fupremorum axillis, breves, e racemis firnplicibus com-j>ofitisque.

Flows purptirafcentes, parvi*

Baccae nigrae, parvae.

54. pHYSSALIS *limmfis* herbacea, foliis ovatis repandis pilofis, calycibus floi'uttiinflatis of 3.

- Habitat* in Lima. *Seinina benevole mifit C/*. THOUIN.
Planta annua, fucctilenta, tenera.
CW/^J teretes, debiles, pilofi.
Folia ovata, repanda, petiolata, binata, altero minore, pallide viridia, pilofa.
Pedunculi fblitarii, foliis longiores, uniflori, viol[^]cei, pilofi.
Calyx inflatus, fcarioflis, decemcarinatus, 'cJUnquedentatus- *Carinae* violaceae pilofiffimae. *Denies* acuti, vihdes-
Corolla campanulata, extus pilofa, yiolacea.
Tubus calyce brevior, anguftus.
Limbus ampliatus^{Sj} fubpentagonus, fuhquinelobus, angulis extus: carinis intus, trilineatis*
*Filament** fauci adnata, fubulata, inaequalia, bafi pilofa^p albida, *anthcris* [^] erectis coerulei's.
Germen oblongum, viride, bafi circulo aurantio continuo circumdatumt
Stylus filiformi^{Sj} ftaminibus longior, verfus ftigma nonnihil increflatum.
Stigma lobis duobus acutis ad ftyli latera deflexis adnatisque, viride marginibus fufcis-
*Fvuthi*S abortiit.
Fades Hyofbyami, corollis coerulefcntibus majoribus.
55. CEJLOSIA *baccata* floribus trigynis, fruftibus baccatis.
 Communicavit *Cel.* KÖNIG.
Caulis ere&us.
Folia alterna, petiolata, cordata, acuminata, integra[^]
Racemi axillares folitarii, terminates plures longi-
Flores parvi> breviffime pedunculati.
Calyx foliola duo minuta appre^Ta.
Pctala quinque ovata, nonnihil cohcava.
Stamina 5[^] *filamentis* atris bafi dilatatis, ut germen omnino cing-ant-
Germen fubrotundo- trigonum.
Styli 3 ftigmatibus fimplicibus.
Bacca atra, trifperma.
Semina latiufcula[^] hinc convexa inde concava, utrinque nitida.
56. PHARUS *ciliattts* panicula flibramola, calycibus apetalis ciliatis-muticis.
 Ad margbes fiagnorum ledum dedit *honor*, IÖNIC,
Cttlmi multum foliofi³ bipedales.
Folia linearia, angufta, fcabra.
Panicula parum ramufa, brevis, vel etiam racemus fimplex.
Calyx valvulis ovatis convolutis, dorfo bifulcatis, muticis, margine ciliatis-
Corolla nulla-
57. PHARUS *arjiatus* panicula umbellata, calycifius apetalis ariftatis nudis.
Habitat in Indiae aquofis.
Culmus fupra aquam vix bipedalis ad genicula fub aqua radículas plures petinatas emittens, ereftus, foliofus. •
Folia lanceolifita, brevia, latiufcula, nuda, fuperne afpera[^] ligula niilla.
Vaginae iij ramis fterilibus tumiLke-
*Panicul*dL umbellata, pedunculis racemofis inaequalibus.
Flows pediclati, pedicellis increflatis.



Mafculi plures, fuperiores, lanceolati.

Calyx biglumis, *glurna exterior** quinquenervia, ariftata, dopfo et marginibus ciliata, *interior?* angufhore arifta excepta longiore, uniner-
via> hyalina, acuftrinata, non ariftata*

Corolla nulla.

Stamina fex, *filamntis* breviffimis, *anthriis* linearibus tongis flavis
apice laeyiter bifidis- *

Fotrninei paitciores, inferiores.

Calyx et *Corolla* Maris.

Germert mirilitum.

Styli '2.

Stigmata plumofa, alba;

Obf. Valde affines funt Phalaridi Oryzoidi. •

58. BAMBOS.

- Cum Arundinis genere nihil communB habet, uti floribus perfpeftis IUDX patebit E variis peregrinatoribus Flores habui, fed Temper mancos et diffolutos, ita ut charaeterem extricare impoffibile fuerit, donec ramulum melius fervatum ab amiciffimo KÖNIG acceperim. Nomen Bainbos fervavi, quia notum, licet barbarum-

Inflortfventia Spiia difticha multiflora.

Calyx fquamae plures bfeves inaequales concavae.

Flores plerunlque quaterni, caeterum 3 - 8 in fpica vidi.

CoroUae valvula exterior obloriga, mucronata₅ convexa₃ marginibus ad bafin nonnihil inflexis, enervia.

interior planiufcula₃ lanceolata^ marginibus ad angulum acur-
turn iuflexis- *Anguli* hi piloii. - "

Stamina filamentis fex breviffimis, *antheris* linearibus. Saepe filamentum unum antheram folitariam, ieeundum duo ec tertiuin tres antheras gene,

Piftillum. *Gtrmen* minimum.

Styli breves 2, etiam unicus-

Stigmata longa, longitudinalrter plumofa.

1. *Bambos arufdmacea.*

Arundo Bambos Auftbrum.

Panicula ramofa^ divaricata, dura.

Spicae alternatim congeftae^ numero inaequales, feffiles-

53. LIMONIA *pentapbylla*^ inermis, FDIUS fubquinatis.

Dedit ex India *honor*, KÖNIG.

Spinaz nullae.

Folia plerumque in petiolo quin?, alterna, ovata, acuta^ Integra, magnitu-
dine foliorum *Citri Medkae.*

Petioli partiales breves fubalati, alae vero inflexae-

Racemi breves₃ compofiti.

Flores minuti-

Calyx quinquedentatus.

- 60. *S AXIFRAG A punttata* Gunn. FL Norveg. 1076. Rottb. Aft. Hafn. Vol. X- p- 445- t. in. f. 10. quam pro *umbrofa* L. habui in Prodr. Fl. Scand. p. 79. *CeL* DRYANDER'contendit *dk cnteifolia*Linn, et Scop. quae proprie defectu puntforum ab *umbrofa* differt, fi modo haec: fuffitint. For- te omnes tres unicum conftituunt fpeciem*

- tfi. *SEDUMJlcllatum* L.
 CWZJ ereflus, angulatus.
 F0/0 infima faepius oppofita, reliqua fparfa, cuneiforania, angulato-feptem-
 dentata, fquamulis pellucidis ciliata, utraque pagina tenuiflime ftriata ac
 minimis punftis lucidis obdufta.
Cyma bifida, foliofk-
Flores in axillis foliorum floralium feffiles.
Folia floralia obovata, inferiora 5 L 3dentata, fuperiora integra-
Calyx foliolis lanceolatis, acutis, ereftis-
Petala calycinis foliolis anguftiora et vix breviora, lanceolata, acuta^ com-
 prdla, Candida carina rubsnte-
Stamina et Germina petalis breviora, candida-
Stigmata purpurea.
Nectaria fquamulae quinque citrinae, oblongiu&culae> fiib germinibus^
Capfulae divergentes-
62. NEG TARIA in
 SEDO *populifolio* fquamae 5 fubrotundae albae tantillum ad flavedinem
 vergentes.
 . . *Tehp&io* - . . . truncatae, lineares, longiores-
 . . *hifpanicy.* . . . truncatae, emarginatae, flavo-rubentes.
 - . . *rupeffri* truncatae flavae-
63. LAGERSTROEMIA *F/os Reginae* foliis ovato-oblongis, calycibus
 rugofis tomentofis-
Lagerftroemia Major javanica Fafc. N. I. p. 20.
Murtughas L. Fl. Zeylan. 533-
Ketmia indica foliis laurinis flore violaceo fpicato. *Burm. Zeyl.* p, 137.
AdamboQ Rheed. Malab. IV. tab, 20. 21.
Crefcit in fylvis Calcuttae KDNIG, Iavae BLADH.
 Defcriptionem vide in Fafc. I- 1. cit. cui addi poteft
Calyx turbinatus, coriaceus, rugofus.
Florum panicula pyramidalis braehiata ipithamaea.
Pedunculi tomentofi.
64. LAGERSTROEMIA *indica* foliis ovatis, calycibus nudis laevibus* / ^ ?
Lagerftroemia indica Spec* Plant p* 734.
Lagerftroemia minor vfnienfis Fafc. N.I. p. 20.
65. SPARRMANNIA *afnvana* Suppl PL. p. 265.
 Iconem pulcherrimi fruticis vide Tab. III.
Tfin-Kin -Rumph. Amb. VII. t. 28.
Habitat in China.
 Defcriptioni 1- cit. adde
Calyx campanulatus.
Panicula brevis pedunculis alternis laevibus.
66. STEMODIA *ruderalis** foliis ovatis ferratis petiolatis.
 In rufleratis Indiae Or. leftam mifit *CeL KÖNIG*.
Caulis fuffruticosus videtur, teres, pubefcens, ramofus-
Fdia oppofita, ovata, ferrata: ferraturis magnis, bafi integra.



Petioli tenues *IDI*igitudine fere foliorum.

Flora axillares, folitarii, oppofiti, pedicellati-

Calyx campanulatus, quinque-dentatus > pubefceis.

Corolla aurea.

Stylus corolla brevior.

57. *ARACHIS fruticofa* caule fruticofa eredo.

Hedyfarum hamatum L. Syft. Veg. XIV. p. 674.

Trifolium procumbens zeylanicum hirtutum Loti facie *Barm.* 7.tjl. p. 226*
t. 106. § 2.

Habitat in Zeylonae, Tranquebariae aridis, D. KÖNIG.

CM Varietas jamaicensis ulterius examinanda, num revera huc pertineat

rtg. *CROTALARIA* Falc. N. II. N°. 66. est

t \ *CROTALARIA litifolia* Supplem. Plant, p. 322.

69. *CROTALARIA fericea* foliis simplicibus lanceolatis acutis subtus ferriceis, florum racemis elongatis-

Communicavit *Opt* KÖNIG.

Planta proceras, fruticosa videtur, annua tamen.

Caulis ramosus, striatus.

Folia breviter petiolata, oblonga, lanceolata cum minuto acumine, versus petiolum decrefcentia, supra glabra, subtus ferriceo-tomentofida

Stipulae femicordatae, acuminatae.

^r^wiielongati, simplices, terminales et axillares,

Bractiae cordatae, acuminatae.

Fructus pedunculati, folitarii, lutei.

Pedunculati bracteolis 2 1. 3 in medio-

Calycis lab. fimbriatus profunde bifidus.

. . . . inferius tridentatum, dentibus lanceolatis-

Stylus versus stigma incrassatus, pilosus-

70. *HEDYSARUM gramincum* foliis simplicibus linearibus lanceolatis > fimbriatis fimbriatis, racemis nudis, pedicellis bifloris, dentibus calycis bifloris.

Mifit *amiciff.* K b N I G.

Fructus determinate ramosus.

Caulis teretes, striati, articulati.

¹*Folia* bipollicaria, fesquilineam lata, linearibus lanceolata, acuminata, venosa, petiolata, petiolis brevibus fuscis.

Stipulae lanceolatae, acuminatae, fimbriatae juxta folia; alterum par ad caulis articulum quod in adultioribus rariis¹ in fibras resolvitur-

Rami trifidi, elongati, aphylli.

Pedunculi gemini, uniflori, diftantes.

Calyx tubulosus, angulatus, fimbriatus, dentibus fimbriatis intus barbatis.

Corolla parva, purpurea.

Legumina convexo-angustata, glabra, mucronata, articulis 3 - 5; forte et¹ pluribus-

71. *AESCHYNOMENE cannabina* caule herbaceo, foliis obtusis acuminatis, pedunculis foliariis, leguminibus compressis laevibus,

Dedit toft"K8NiGj qui cannabinam vocavit, quia hujus in modum tractata, cannabis speciem praebet.

Caulis herbaceus, angulosus, striatus, parce pilosus.

Folia numerosa, opposita, linearia, obtusa cum acumine parvo, pilosa, subtus glauca.

Petioles ad petiolorum partialium infertionem barbati.

Pedunculi axillares, foliarii, uniflori- * - &

Flores parvi-

Calyx campanulatus, bilabiatus, nudus.

Legumen longum, lineare, tetragono-compressura, laeve* .

72. **ABROMA** *Whdzri* foliis ovato-lanceolatis acuminatis, subdentatis*

Mifit honor, IÖNIG.

Frutex cortice fusco*

Rami ultimi tomentosi.

Folia alterna, ovato-lanceolata, acuminata, hinc inde dentata^ alia Integra, nervis tomentosis.

Pedunculidi oppositifolii^ multiflori, involucrati, articulo unico instructi; fructiferi recurvati lignoli.

Involucrum polyphyllum foliolis lanceolatis deciduis^

Flores triflorae purpureae.

Neotaritim utrumque ciliato-barbatumj

interius obcordatis squamis.

Antherae ternatae, feikles in finibus inter lacinias U fquaittas Neclarii interioris-

Capitula magna, quinquevalvis: valvulis membranaceis,

Receptaculum quinquepartitum barbatum, valvularum futuris adnatum.

Setina ovata, atra, punctis elevatis ftabra.

Obf Emendatione itaque eget Generis charactef in Suppl. Plant.

73. **HYPERICUM** *cbimnfe* fruticosum, trigynum, pedunculis axillaribus bifloris, foliis ovato-lanceolatis integerrimis.

E China adduxit *Clar.* D. u LA oil.

Arbutula rimis alternis.

Folia opposita, petiolata, ovato-lanceolata, acuta, integerrima > nuda, bipollicaria.

Pedunculi axillares foliarii, oppositi, bifidi, biflori.

terminates multiflori*

Flures flavi-

Calyx laciniis subrotundis margine altero incumbentibus CofiaceiSi

Petala obovata, striata; calyce longiora.

Filamentum tria lata in multa fila ab exteriori latere fentim altiora divisa, quarum fuprema flerilia, exteriora antherifera.

Germinum trigonum.

Styli tres latiusculi 1 figmatibus fimplicibus,

74^ **SENECIO** *uniflorus* fasc. III. p. 42. est

Senecio cerium Supplem- p- 370..



75. ERIGERON *fumatrenfe* tomentofum, floribus racemoso-paniculatis, foliis lanceolatis subferratis.

E Sumatra adduxit adm. Rev^AD. WENNERBERG.

Caulis tripedalis et ultra, teres, striatus, tomentofus, ruber.

Folia feffilia, lanceolata, tomentosa - hispida, inferiora dentata : superiora ferrata.

Pedunculi longi, racemoso-paniculati, foliolo uno alterove angustolanceolate, plerumque integro.

Calyx tomentofus, foliolis linearibus longitudine pappi.

Flocculi radii multi, capillares, pappo nonnihil breviores.

- . , *disci* infundibuliformes, pauci, longitudine pappi, fertiles.

Pappus simplex, copiosus.

76. ERIGERON *ra* floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis tomentoso-fericeis integris ferratisque basi appendiculatis,

E Java allatam dedit phntzm adm. Rev. D. WENNERBERG.

Caulis erectus, simplex, tomentofus.

Folia alterna, petiolata, ovato-lanceolata, alia ferrata, alia integra, alia denique altero margine variantia, utrinque tomentosa fericea ad basin utrinque dentem acutum longum unum alterumve habent

Panicula diffusa

Flores magnitudine *Conyzae cinebae**

Calyx imbricatus, foliolis externis brevissimis, interioribus nonnihil flocculis longioribus.

Flocculi quantum e Specimine ficco hariolari licet) laevissimi, *disci* hermaphroditi circiter XX, radii pauciores filiformes.

Pappus pilosus, ruber ens.

77. ARTEMISIA *littoralis* procumbens strigosa, foliis spatulatis ferratis densatis, calycibus nudis pedicellatis.

In littoribus marinis Indiae Orientalis lectam dedit *ainic*. KONIG.

Similis *Artemisiae Maderaspatanae* fed

Tota tomento strigosa obdura praeter *calyces*, qui grandiflori scariofi, nudi.

Folia simplicia, spatulata, ferrata - dentata.

Fructus pedicellati, plerumque oppositifolii, fed etiam axillares et terminales; foliarii rarius binati.

78. ZINNI \ *Bidens*: foliis pinnatifidis, femina arillis longis retro-aculeatis

In Bengala lectam mifit opt. KONIG.

Planta parva, vix bipedalis, anomala.

Radix simplex, lignosa, rations plantae longa.

Caulis erectus, simplex, apice in pedunculos nonnullos divifus.

Folia radicalia pollicaria, petiolata, inaequiliter pinnatifida: laciniis lanceolatis acutis integris.

caulinum unum vel alterum pinnatifidum sessile

Pedunculi uniflori, nudi.

Flos magnitudine grani piperis.

- Calyx* fimplex, quinquefolius.
Flores radii foeminei quinque, difco nonnihil breviores, lamina ovata nervosa tridentata (?) perfiftente-
difci tubulofi, altiores, 7-8 hermaphrodite
Paleae floribus difci breviores, linear es.
Semina radii brevia biariftata compreffa.
. . . *difci* duplo longiora, compreffa, vtrinque triftriata, ariftata.
Ariftae longitudine dimidia feminum, divergentes retro - aculeatae-
Species itaque anomala charafteres *Itinviae** *Bidmtis* et *Coreopfidis* con-
jungens.
79. IMPATIENS *rofmarinifolia* foliis oppofitis linearibus, pedunculis foli*
tariis unifloris.
E Zeylona mifit *Cel.* KÖNIG.
Pedunculis alternis folitariis.
Nectario petalis majors.
Foliis fubtus glaucis.
Ab *Oppofitifolia* L. videtur differre, reliqua cum defcriptione in *Fl. Zeyl.*
p, 148. N^D. 314. conveniunt.
80. ARISTOLOCHIA *braéteata* foliis cordatis obtufis, caule infirmo, flo-
ribus folitariis, brafleis cordatis petiolatis.
Mifit plantam *honor*, KÖNIG circa Madras in agris et collibus folo argil-
lofo minus frequentem.
Caulis flexuofus, infirmus, friatus.
Folia petiolata, cor data, rotundata.
Flores folitarii^ axillares, pedunculati, folio breviores, labio longo curvo.
BraEleae tordatae, petiolatae.
Planta Indis medica.
- g1. PHYLLANTHUS *Jimplex* ramis folisque lanceolatis decurrentibus
fimplicibus.
£ *Tranqusbaria* mifit *Uonar*, KÖNIG.
Rami virgati, an^ulati, raro ramofi, fpithamaei et pedales, e radice adfcen-
denes, trunco fere mitlo.
folia lanceolata margine et carina albidis, breviflime petiolata, *petiolo* ad
proximum folium decurrente.
Stipulae minutae, acutae.
Flores ad petioli finiftrum latus prodeunt.
Foeminei longe pedunculati.
Mafculi feffiles.
82. PHYLLANTHUS *ftcUat** foliis fimplicibus alternis lanceolatis, umbel-
lis feffilibus axillaribus.
E Zeylona mifit *Cel.* KÖNIG.
Arbor 1. Frutex.
Folia magnitudine et forma Citri, glauca, integeriima.



83. **PHYLLANTHUS** *rbamnvides* caule fuffruticofo, foliis pinnatis, foliolis alternis ovatis floriferis, pedunculis inferioribus geminis mafculis: fuperioribus folitariis foemineis-
Rhamnus Vitis idaea Burm. Fl. ind. p. 61. c. Synon.
 Communicavit *Amicifi* K 6 N I G.
Plant a fuffruticofo, nuda.
Folia alterna.
Foliola etiam alterna, ad 14. ovata, integerrima, acuta»
Stipulae parvae, acuminatae, caducae.
Psdunculi axillares foliolorum.
f0/trfortj'biaati mafculi, altero longiore, calycibus tiruncatis.
superiores folitarii foeminei, calycibus filis.
Fru&us forma et magnitudine lumpcri vulgaris.
84. **ACALYPHA** *betulina* fruticofa, involucris foemineis cordatis crenatis, foliis ovatis acutis ferratis.
Caudfelis agreftis Ruraph Amb. IV. p. 84. t. 37.
 In Zeylona fponcanea, plantatur in India in uium medicum indigenoi-um.-
Cel. Kb NIG, ex quo Specimen accepi.
Frutex ad altitudinem humanam excrefcens.
Rami teretes, cortice cinerafcenti-fufco.
Folia ovato-lanceolata, acuta, ferrata, petiolata, alterna.
Amenta axillaria, tomentofa.
Involutro vel nullo vel rotundato, cordate crenato rachim amplexante
intra quod
F/ora 2. 1. 3. foeminei tomentqfi
Jyilis tribus non tri-fed multipartitis longis.
 » . mafculi plures fupra foemineos.
Odor aromaticust
- 85- **CROTON** *punftatum* foliis ovatis acutis integris fubtiis tomentofis punftatis, caule fruticofo.
 E Zeylona mifit *Cel. KÖNIG.*
Fru&us fpicatus, capfulis fericeis coccineis pilofis.
Flores rion vidi.
86. **TROPHIS** *aspera* foliis ovatis inaequaliter ferratis aſperis.
Habitat in fylvis etnemoribus In'diae Orientalis. Cel. KÖNIG.
Arbor.
Folia ovata, inaequaliter ferrata, aſpera praefertim fubtus.
Mas Amentum globofum, axillare, pedunculatum, fldribus 1203 feffilihus.
Fwmiua Flores congefti,- axillares, ftylis longis.
Fruſos bacca aurantia, glabra, nonnihil. compreffa, magnitudine
Pifi, difperma. Pulpa parca.
An Cudranus amboinicus Rumph. Herb. ^ . p. 25. t. 15. f. 1. 2.
Obf. Folia ad laeviganda ligna loco Equifeti aScriniariis adhibentur. KÖNIG.
- A.87- **ANTIDESMA** *acida* foliis obovatis, fpicis folitariis-
 Dedit *Amic% K&NIC?*

Folia obovata, minus acut*

Spicae fulitariae vel axillares. Vel ramulos late rales brevifloros terminant

Calyx quinque-dentatus.

Flores foeminei stylis plerumque tribus reflexis-

SB. DID5PYROS *Ebenafier* foliis ovali-oblongis coriaceis, gemmis glabris*

*Ztfxōjpyros *Ebenm* L» Supplem. p. 440-

*** *Hzbzhaftw* Rumph. Amb. III. p. 13. t. 5.

Habitat in fylvis circa Cakuttam. HONIG.

r ^ *Obf** Manifeste utrasque Dioipyri species CDnfundit Nob. h LINNE^ FIL De*
r fcriptio hujus habetur in *SüppL L i* qua cum conferri meretur *Rum-*
phhtU

B^ DID5PYROS *Ebenum* foliis ovato-lanceolatis acuminatis, gemmis hirtisi

Diofpyros glaberrima Friis Rottb: in Novis Aft- Hafn. II- p. 540- tab. 5.

Diofpyrus Ebenum Philipgr- Saefk- HandL V. L R 3. p» 17^

Habitat in Zeylonae fylvis-

De/criptionem ab inventore concinatam Vide 1. cit.

Folia circiter tripollicaria, quoad consistentiam tenuia; flexilia^ obscure viridia.

50. TERMINALIA-

Clar. KONIG, qui hujus speciem invenit, essentialem generis char after sm
ponit in

Calycis fundo glanduloso, barbato.

Nuce lignosa, nucleu cylindrico utrinque acuto, cutibus spiritaliter con-
tortis.

91. TERMINALIA *c&tbu/a*, foliis ovatis nudis, petiulis supra biglandulo-
is^ racemis simplicibus.

Habitat in montibus Palliacatt^nfibus vel Natienlibus mixta cum *Pterocarpv*
Santalino.

Arbor triplam vel quadruplam hō minis altitudinem vix excedens; fronds
haud multum diffusa.

Rami parii cortice cinereo.

Folia subopposita, petiolata, ovata, nuda, integerrima; juniora ferruceo-
hirfuta.

Glandular 2 (lib folio in superiore petiolorum latere, nonnunquam 2 alias in
ipfa folii basi, quod praepressis in teneris obtinet.

**Peduncul* racemosi, floribus sessilibus, verticillatis, terminales ramulorum-

Calyx monophyllus, superus, campanulatus, brevis, quinque-dentatus, extus
nudus flavescens, intus barbatus.

Glandulae fundi oblongae^ dense barbatae-

Corolla nulla.

Stamina ID calyce duplo longiora: alterna in calyce situ inferiora-

Filamenta fetace*.

Antherae didymae-

Germen inferum, dilatatum, basi crassiore pilos-

Stylus filiformis, longitudine fere stamina-

Stigma simplic-



Obf. In meis specimenibus ab *Opt* KÖNIG acceptis, omnes fibres hermaphroditici, sed foecundi flores a sterilibus facile dignosci queunt horum enim germinum aequale, illorum febris incrassata.

92. LYCOPodium *ciliare* foliis bifariis: superficialibus, distichis, caule ramoso, ipicis terminalibus fulcariis foliosis Lompeilis v. unilatera-
libus

E Zeylona dedit *CeL* KÖNIG*

Mucus ibsquipollicaris, inordinate ramosus, ex axillis radicales capillares demittens-

Folia *majora* alterna, disticha₅ patula, ovata, acuta, ciliata*

minora cum his alternant ab altero caulis latere appressa, acuminata, non ciliata._a

Spicae ramos terminant e foliis similibus sed majoribus, compressae, distichae, et in his folia *majora* integra finis sterilia, *minora* vero unilata finis capulifera.

Capula folitaria, bivalvis, feffilis, globulos tres raro quatuor polliniferos dilute flavescentes, gerens. #

93. CLAYARIA *bifida*, bifida, laciniis subbifidis-

In Malacca, Siam habitat *CeL* KÖNIG.

Fungus pollicaris luteus. v.

Stipes tenuis, versus fummitatem bipartitus₃ laciniis divergentibus, vel laeviter bifidis vel fatis emarginatis.




Tab. II.




Scleria sumatrensis.

Cavan. pl. 100.



Tab. III.



Sparrmannia Africana.

ANDREAE IOHANNIS RETZII
PHIL. MAG. AD REG. ACAD. LVNDENS. HISTORIAE NATVR. ET
DECDNOM. PROF. R. ET DRD. SOCIET. PHYSIO GRAPHICAE
LVND. SECRETARII ETC.

FASCICVVS
OBSERVATIONVM
BOTANICARVM
SEXTVS

CVM FIGVRIS AENEIS

ET

I. G. KOENIG

DESCRIPTIDNES EPIDENDRORVM

IN INDIA ORIENTALI FACTAE. ..



LIPSIAE,
APVD SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM.
MDCCLXXXI.

L. B.

Ultimam Tibi jam offero Plantarum a b. ru. KÖNIG mislarum meſſin. Plures earum quidem pallideo, fed ita comparatae funt, vt ceito deſiiri non poſſint.

In hoc Faſciculo nonnulla noua Genera conſtituere tentauit. Dantur Botanici, qui ex quouis in fructificationis partibus etiam leuiori differentia noua fingant genera & ſe nobilem ſcientiam confundant, ac veterem magno magnorum Virorum labore ſexpurgatam barbariem denuo introducere ſiſſerent. Cum his non ſentio. Has, noui, vt puto, Genera conſtituentes plantas non heri accepi; fed per annos feruauit cum multis aliis, quas ſibi a variis illuſtribus Botaniris determinatas ac deſcriptas vidi. Difficultas c ſiccatis plantis certos ac indubios genericos characteres eruendi, vnios in Botanica introduxit errores, quos ſolum euitare poteſt conſummatus in arte Botanicius, plantas vegetantes cultura haud deprauatas inſpiciens femel vcrej introductos corrigere difficile fatiſ eſt. Non raro etiam contingit, quando ex vnica ſpede generis character deſumptus fit, vt deſſis nouis ejuſdem generis ſpeciebus ſuppoſitum eſſentialem genericum character em in ſpecificum transire iubeat natura. Sic etiam fieri putuit, vt ego in his errauerim.

Quam facilis enim in his error fit, demonſtrat praeter alia *Schreherae* genus in Nouis Aſtis Upſalienſibus conſtitutum, quod ex flore Cucutae cujuſdam Africanae & fruſtu Myricae conſtitutum eſſe obſeruauit acutiſſimus VAHL Linneanum Herbarium ſcrutatus. Aliud itaque genus Botanico, inter noſtri temporis principes jure numerando, dicaui.

In tertio harum Obſeruationum Faſciculo pag. 47 & 48. characteres Monandrarum a b. «ÖNIG deſcriptarum propoſui. Monuit incomparabilis, at cito nimis ereptus ailiicus, inflorefcentiam in hanc tribu magni eſſe ponderis. Ex hoc fundamento tria jam tentauit genera conſtituerej quam ſelkiter judicent autoptae.

Quam alio loco *Swarziam* dixi, jam *Helleniae* Tub nomine ſiſſirum Intellexi enim a nobiliſſimo Viro, bina genera ab aliis jamjam nomine ejus inſignita fuiſſe.

Sic etiam *Gaertneram* antehac alio, ſcilicet nobiliſſimii SMITH nomine nuncupauit, poſtquam autem hOnoratiſſimus VAHL *Smiibiae* numen alii plantae[ex Diadclpharum claſſe datum eſſe, mihi certioſem fecerit, *Smhhiani* vero mean? jamjam ab alio GÄERTNERAE nomine dici, idcorreat; charadle-

»<S

—————TtL—————Q

rem autem generis, ab alio quamvis antea profectum, quoniam quid era non vidi, qualem ego illum invenni, describere, superfluum non ideo duxi.

Excellentissimi HÖLMSKIÖLD in rebus Botanicis merita, quamvis exteris adhuc forte minus nota sunt, poscunt, ut ejus nomine superbiat planta, non minus pulchra quam singularis. Egregium hujus Viri funusque splendidissimum de *Clavariis* opus quotidie expectamus.

Cymbachne facie extern* omnino *Kotthoelliis* accedit, verum ab his recedit tota ejus verna ruderata. Ex recentis autem graminis infusione, vel colitione faltem plurimum exeniplarium major de ^haradere certitudo necesse habebitur.

Video ex ill. SCHÆBER *Gram. tab. 34* et cum hac collata descriptione *Mantiss. alt. p. 3D_a. Panicum squarrosum* Fasc. IV. p. 15. & V. tab. 1. esse *Ostrum muricatum* Linnei. Cenchrus facie nūdem, vix characterè accedit, nec regulariter polygamum est granium.

Descriptiones Epidendrorum Orientalis Indiae, quas laboriosissimus KÖNIC concinnavit, benevole communicavit ill. SCHREBER, ut huic Fasciculo annecterem. Gratius sane mihi injungere non potuisset officium.

Vale meisque conatibus fauc

—————

II

I. J. JHERITIERA

*Infivrejçen'tia panicuiata**

*Corollae limb us duplex, exterior fubtrifidus**

NeStariutn diphyllum vcl bifidum.

Capfula trilocularis, coriacea, inflata fubgloboCh

I. HERITIERA *Allugba;neftariis diphyMis> cap fulls fubfpongiofis, foliis integerrimis. Tab. L*

AJlugbas. L. Flor. Zeyl. 445^

Habitat in Zeylon, KÖNIG.

JC^WJ-bipedalis, iimpiiciflimus, coinprelTus^ ft rial: us, gcnicuiatus, foiiorum petiolis vaginantibus ad femipedis circiter a panicula diflantiam V eft it us.

*Folia oblonga, pedalia, acuta, integer rim a, margins albicantia, nervofa & utrinque ad angulum acutum tenuiffime et ^onfertislime friata duos cum dimidio ad tres pulliccs lata, vtrunque aequali fere proportione decreibentia**

Panicula (pithamza, pedunculo tDmentofo.

fedunculipArtiales etiani tomentofi, ramoii, alterni, [bradleis cucullatis ab altero latere fisiiis, tumentofis, caducis intrucSi, multiflori- Ad pedicellorum exortum alias bradleae Icariolac, nudaee, femiorbiculare^, deciduae.

Calyx Spatha campanulata, tomtnttofa^ inaequaliter bifida: laciniis ubtufis, fupera.

*Corolla niDnopetala, bilimbis^ extus hirta**

*Tubus cylindricus longitudine fpatkae**

Lirnbu exterior ringens; labium Juperius longilis Dvatum, cymbiforme, apiculatiim, inferius bifidum, lobis femiovatis, obtulis, tnargine exteriote inuoluto.

; . . interior longior, latior, ereftus, bifidus, lobis ouatis neruolis.

Filamentum lineari-lanceolatum limbo exteriore longius, interiore brcius, fupra antheram apicem extollens. Sub antheft autem apice finditur, ita vt in uno filamento binae videantur antheft bafi cohaerentes.

Antberd margini interior! filamenti adnata, lincaris, bipartita.

Germen inf^erum, fubtrigonum, hirtum.

Stylus filiformis, fub anthefta flexus, dein in rima inter utrumque antherac lobum latens, port explicationem corollae feniim fupra antheram elongatus.

Stigma fuborbiculare, medio elevatum.

UeBarium diphyllum, comprefliim: foliolis lanceolate ftylum includentibus eiusque dimidiam longitudinem habentibus.



FruSut nonnihil ovalis, vtrinqueparumretufus, quafi iti tres capfulas exto-
mento compaftomollifragili tonfccl^s polyfpennas refolvitur.

Smina arillata circiter Dfto in quovis IDCUID fubreniformia, gcifeo-fufca,
quae contufa Ddorem & faporem Galangae nonnihil camphoratae Dferunt,

2. HERITIERA *ah* neforiis diphyllis, capfulis flriatis, **foliis inte-**
gerriinis.

Langvas vulgate König Defer* Monandr. p. 64.*

3. HERITIERA *dmienjis*, neftariis diphyllis, foliis ciliatis.

Langvas cbinenfis: Ktinig 1. cit, p. 65.*

4. HERITIERA *quatutu* neftariis monDphyllis bifidis, foliis marginc den*
tkulatis.

Lanpas afiatkum lfylueftre. Hbnig 1. ciL p. 67^*

II HORNSTEDTIA.

Inflorefcentia fpica ftrobilifsrrais apice hians, fubacaulis,

Calyx bifidus

Qmlae tubus longus, filiformis) limbus duplex: exterior tripartite

NeBarium tubulofum. *

Capfula trilocularis oblonga.

5. HORNSTEDTIA *Scybus* foliis fubtus tDmentofis.

AmomnfyypbiferntH König 1. cit. p. 63.*

6. HORNSTEDTIA *Lmurusfi*) liisglabrisciliatis.

*Amomum Lemurus** König. L. cit. p. 6^.*

III. HELLENIA.

Inflorefccntia Spica ftrobiliformis ouata, fcapo elongato foliofi) infidens^

Calyx trifidus.

Grolk(limbus interior cucullato- campanulatus dorfo fifTus.

Nefarium nullum.

*Cap/iVi*trilocularis, oblonga coronate

7. HELLENIA *grandifim.*

Bankfea fpetiofe. König 1. cit. p. 75.*

8. InegregiafunDi/wMf/flM I?PHIPFURIDE p.8- Cel.Aboenfium Profelfor
HELLENUS amice moiiuit, me haud recte genus *Hiffluridis* ad Gynandraruin
clafTem retulille. Pace celeberrimi **Viri** diflum fit, me ratiuncs ibi allatas
haud bene intelligere. Germen piAilli partem effe nemo forte negabit, et
ipfe eel. Vir fatetur, et ftylum (piftillum errore forte calami dicitur) fiifta-
men germi ni infidere, adeo itaque iinifre hDcame faftum lion puto, Gsr-
men eft piftilli pars elfentialis, ftylus haud ita. Charadkrem Gynandriurum
-ita definivit £(l«. a LINNE: *Stamina fifillis, non rtceftawlo injidmt, nc-*
*cellTarium ideo non eft, vt itamina Aylu inlideant**

9. VERONICA *Pfeucfabamaediys* Jacqu. Auftr. 1.1. 60 est

Veronica latijolia (3. Obf. Bot Fafc. I. p. 9.

10. PIPER *lotigum* L.

cf: Planta monoica obfervante *Cel. K 6 N 1 G.*

11. SCIRPUS *glohulofus* culmo compreflb nudo, panicula¹ terminali, fpicula vnica feffili: pedunculatis pluribus globofis.

Habitat in India Orientali)*

Culmi fimplicifimi, nudi, fpithamaei, craffitie fili groffioris, cemprefli mihi videntur.

Spicata terminalis feffilis, globofa, fufca, magnitudine feminismilii praeterca 3-5 pedunculatae.

P^««ra//mdivilimonoftachyi, raro alterain fpicam feffilem fimul gerunt, a a ad g lineas longi, inaequales, ad bpin vagina breviffima veftid. *Vaginae* hae foliolo breviffimo, vel potius apice libero terminantur.

Spicu/arum Jquamae fubrotundae, obtuliffimae, concavae, fufcae margins albido.

Stamina 3.

Stylus 1.

Stigmata 3, hirtuta, fufta_k

n. SCIRPUS *junciformis* culmo nudo filiformi fubtrigono, paniculae (piculis feffilibuspedunculatisque, inuolucro diphylo.

£ China dedit *Ce'L Fk B L A D H.*

Folia radicalia, linearia, levia, culmo breviora*

Cuhnus pedalis, filiformis, triqueter angulo tertio oblitterato, vt irregulariter fere quadrangulus lit.

fanicula fanci bufonii fed brevior.

Involucrum vniuerfale diphyllum panicula brevius.

Spkulae acute trigonae) pauciflorae.

Squamae inprimis tres exteriores acute carinatae, mucronatae, inter quas vel - ftamen 1 vel 2, vel etiam piftillujri tantum} interiores minus carinatae, herniaphroditae, *ftamimhus* tribus *pftilloque* uno, cujus

Germen minutum, oblongurn

Stylus fimplex,

Stigmata tria, longa, villofa.

is. SCIRPUS *pilofus* Mmo tereti ftriato foliofo, panicula terminali!diphylla fubfaRigiatâ, fpiculis ovatis fquarrofo - echinatis.

Ex *India Orientali* accepi.

C«MKjfpithamaeus, tennis, ftriatus, verfus fuperiora pilofus.

Folia radicalia . . .

Culmi unicum in medio, culmo nonnihil longius, § poll. Jatura, nervofuaa supra et margine pilofum.

Panicul brevis, fastigiata fere, ex pedunculis mono-vel distachyis, pilofis* iimis.

Xnuoluerum diphyllumj folium ihfeifus panicula iquinquies longius, fupcrius fesquilongius, figura et vestitu folii, fed etiara fubtus pilofum.

Wra/ouatae, | pollicislongae, fquarrofo-echinatae tx pilis copiofis albidis apparent.

Squamae imbricatae, obovatae, rtuues, pelluddae, friatae, filo albido JDngitudine ipfius squamae t^rminantur. Hoc filum ariftac nonnihil reflexae infar apparet et ab vtroque laterc pilis albis redis quasi pinnatum.

Stamina tria fufca longitudine squamae*

Germen triqu etrum fufcum.

Stylus longitudine ftaininum^

Stigmata tria*

13- *SCIRPUS barbatus* culmis triquetris nudis, vaginis foliorum pilofobarbatis, capitulo terminali feifili inuolucrato.

Scirpus barbatus Fdis Rottb. Rottb. Defer, et icon. p.5a. t. XVII. f. +

Descriptioni 1. cit. datae addcre Iubet, quod graminis hujus folia etiam fet quipedalera attingant longitudinein et involucri folia pollicarem. Ceterum figura et defuriptio optimaec*

14- *CYPERUS racemofus* culmo triquetro nudo, umbella fupradecoropoiita, pedunculis ramofis racemofisque, inuolucro polyphylo longo.

Ex *India orientali* habui,

Folia radicalia, uulmb ahiora, levia.

Culmus pedalis, triqueter, craffus.

Umbella decempollicaris, fupradecomposita.

pedunculis simplicibus, umbellatis, biumbellitis. *••* M ramofc triquetris.

Inuolucrum uniuersale foliis X & pluribus: exteriore umbella duplo longiore, reliquis fenfim minoribus.

. . - *fartialetoliis* nonnullis filiformibus umbellula brevioribus.

Ocbrae breves, albae, truncatae, foliob fubulato terinatae.

Sficuke denfae et fine ordine pedunculos cingentes, lineares.

Flofculi XII imbricati, rufefcentcs,

15. *CYPERUS canaliculatus* culmo triquetro canaliculato, nudo, Umbella Ac compofita, pedunculisracemofis, inuolucropolyphyUolongiffiH10t

Ex *India Orientali* allatum fpecimen.

Folia ad culmi bafin longa, levia.

C</><<rip_e daU_s, tri_gOni<, angulU rotundatis, latwibus. canali excavatis.



Utiubelia. pedunculis simplicibus umbellatis et biumbellatis, crctis, indivisis; Inuolumm vniuerfale fubhexaphyllum, folio extimo fere bipedali, teli^uis dectefcentibtis.

. . . *fartiate* foliife iionnullis filiformibus umbella brevioribus.

peduncidi et Pedicetli triquetri *echfea* flavidatruncata, hinc in adumen elongata baf vctitii

Pedicelli ffcxuofn

Spicalaefcnfc et fine online iripedicellis feffiles, paruaeV-VIIIflorae, flofculis imbricatis acUtis.

15, CYPERUS *albidus* culmo triquetro nudo, umbella compofita, pedunculis corymbofis, inudlucro polyphylo longiiliino*

E Chind redux dedit *Gil.* BLADH,

Folia ad bafirt culmi bipedalia, levia.

Culmus tripedalis, triqueter, nudus, levis;

Umbella compofita t pedunculis oclo circiter, patchtibus 1 - a pblicairibus, ec centrali breviflimo.

Inuduzrum vniuerfale ofDphyllunij folio longiore fesquipedali, reliquis de- crefcentibus ita, vt breuiflimum tripollicare fit: omnia levia*

t * , *fartiale* nullum.

Pedunculi comprefli, ad bafinochrca filifa vctitii, apicc fpicuks corymboft emittunt

Sticulat latiufulcae ad x_t poll, longitudine 4 ad dimidium pollicis, albidae XVI ad XX flsribus.

Flofculi acuti, imbricati, apicibus diuefgentibuSi

5^/zmquetrumviridi-nigrum, fplendens, alterb apice; acumine elongatd, altero capitulo truncato terminate figmati peltato fimih.

19. CYPERUS *aeiypthae*Ui quern pulchre delineavit. *Cel* CLOXIN inDifferfc inaug. *Obf. Bo tan.* p. 21. t. HL eft

SCHOENUS *mucronatus* Linn, Syft. Veg, XIV. p>95- h*ud ^ene ad Cyperi genus relatus. Melius autem forte dicitur

'*Schoenus* culmo tereti nudo, capituld terminall conglomerato, inuolucro h e ^ aphylo patenti.

18. Ad Cf d T_n 1 f ^ b U ? P' — , e_t ex his forme in iU. *FriuRvM* tati_{er} ct To" nov Plant, introdufla, elimi»ari dcb«. *Gramen cypero*,* Defcr. w u. " , *Malabar*, in Amakheo vel Alniagcdo non in-

n« £ »: adductor) boDa eft et hucperunrt.

KYLLINGIA *tipeH*h* culmomiuetroftriatobafi foliofb, "bel» fim= 19' --Jd, SS faiS feffiUbus, inuolucto vniuerftli polyphylo longUE^mo, partiali null©.



Habitat in India Orientali.

Culmipedales ultra, bafifoliosi, triquetri, ftriati.

Folia culmo duploferelongiora, angusta, basi vaginantia, vagina truncata.

Umbellae terminalis, simplex, fastigiata.

Huolucrum polyphyllum, foliis longiflomis inaequalibus, partiale omnino nullum,

Spicae pollicares, triflorae, subcylindricae, virides.

Calyx feifilis, biglumis, compressus, corolla multo brevior: glumae altera latiore amplectente alteram, utraque acuta.

Corolla erecta, subulata, bivalvis. Valvula exterior brevior obtusa amplectens interior est tertia parte longiorem convolutam.

Stamina tria antheris longis.

Germens minutum,

Stylus longitudine floris

Stigmata an duo vel tria determinare non potui.

30. AGROSTIS ⁷o/a spicis digitatis linearibus, foliis margine pilosis.

Ex India orientali misit.

Culmus sesquipedalis, geniculatus, unifolius.

Folia radicalia kmive & Aia, linearia, margine pilis longis albis discretis infertuta.

Spicae fasciculatae, lineares, fecundae.

Rachis plana dentibus villosis,

Flores gemini altero feffili, pedicellato altero, hinc convexi, illinc plani, villosi.

Calyx valvula plana ovata, magnitudine feminis convexa triplo minor.

Semen fuscum, glabrum in piano latere fulco exaratum*

ar. AGROSTIS *Cinna* FalcV.11.3S.

excludit

Cinna arundinacea L

cuam longe aliud est gramen, ut in litteris me certiorum fecit ^{CHRÉBER} s
Agrostis Cinna, quae cum *Agrostide mexicana*, nisi eadem omnino sit, multa communia habet, diu in variis hortis pro *Cinna* Linn, etiam in Opfalienfi habitavit. Apud nos sub dio crescit et quid em laete ac perennat quod de gramine mexicano vix crediderim.

aa. MILIUM *ramosum*, culmo ramoso, floribus paniculatis subbinais hirsutis,

Ex India Orientali habui.

Culmi ramioi, foliofi, compreflij decumbentes, geniculis pubefcentibus.

Folia linearia, angufta, omnino, etianivaginis, levia.

Paniculae pures lorige pedunculatae e fuperioribus vaginis exeunt. *Singula* pithainea liridla, fimpliciter ramoji.

Pedicelli plerumque biflori, villofi, incrati, receptaculo fuborbiculari margine longius pilofo. Sub quovis flore ahulus nigricans.

J&J inferior libellilis. Non raro pedunculi inferiores panicula bis biflori.

Calyx laeceolatusj acutus, valvulisaequalibusj extus pilofisj vniflorus.

Corolla fere cartilaginea, glabra, nitida, calyce brevior. *Valvula exterior* conuexa apice mucrone rigido intra calycem occultato, marginibus Jevitè inflexisj *interior* mutica plana, niarginibus inflexis et bail conniventibus;

Stamina tria, antheris vtrinque bifidis;

Germen minuhim.

Styli duo albi, longitudine fere corollae:

Stigmata ongn, plumufa, fufca;

Obs. Si stigma penicilliforme differentialis erit character Agrostides transire debet hoc gramen. Disfuadent vero habitus, calyx corollam occultans, corolla ovata, non aduminata quamvis mucro adlit.

33. PANICUM dimidiatum spica dimidiato-fecunda; spiculis quinquefloris rachi excavatae alterne appressis.

CM/w«j-decenipedalis^tenuifrimeftridus; adfcendens.

Folia ad culmi bairn distichealternaj tripollicaria, in medio culmi vnicum, linearia^ obtufa:

Sped terminalisj linearis, tripollicaris, dimidiata quafi.

Rachis dilatata, membranaefca, articulata, ad articulos alternatim ^rofuhde incifa, antice alternatim pro spiculis excavata:

Spiculae quinqueflorae in Caulo rachidis quafi agglutinatae, feffiles, partiali rachi flexuofa.

Flores fubulatij feffiles, friati, antice plani, pofticegibbi.

Calyx triualuis vniflorus:

Valvula exterior cartilaginea; plana j hiteribus ad ahgulum redum iexisi lanceolata, ftriis exarata.

interior longitudine aequalis, tenuior, cyinbiformi-gibba, ddrfoi rotundata friata, apice ciliato-barbata; exterioris margines obuolvens;

interior aiceflrid brevis, truncata,- ad baffil exteriorise

Corolla longitudine et forma calyci omnino aequalis > fed anguftib>

Oh. Hoc est *Panicum dimidiatum* h. *quitis* à LINKE, longe ab illo famine diuerfum, ex quo *Roitbolliæ* Q>eciem fecit à LINNE junior, mente dudum opt, K 6 N I G in lilt; ad ill. s c H R E B E R- HOC ergo in fyftemate Vegetab. reftituendum.

•4

^ s ^ a ^ ^ _ ^

24. *C. A. ... L. ...* *Maras n one Pedes 99. £ I- • nostra fuerica*

25. *Ca* *b X ^ ^ f i m P o n i l e f i t e r e t i »* *flori* *bus subspicatis fessilibui, tri-*
hispick *decemingulttu, foliis ovatis duplicato Gratis, "><*

Campanula striata. Syst. Vcg. XIV. p. 209 an?

Habitat in australiori Europa, vivam apud imicuft examinavi.

Folia radicalia ousta in petiolum decurrTM rugosa, duplidter f[^]ata, d. liata, vtrinque hispida.

. . . *caulina* subsessili_a praeterea familia.

Caulis subbipedal_i*, «*&», tres, hispidus.

Flores inferiores ex foliorum a²^¹ fupcrioreiinpica bxa, omnesibffiles, foliati, bini, terni.

Bractee tres lanceolatae, hispidae, «Iy_{cc} dimldfo breviores.

*Cal*_w deceminguhtus, hispidus, laciniis patendbus corolla brcuiorib<s

Corolla patens, coerulea basi obfcuioie.

Capfua trilocularia haud obtefta*

26. RIBES 4[^]/nmi J_{aqu}. Fl, Auftr. 147. est

Mbesalpinum *. F[^].1, ObHBot.

27- GAERTNERA*

CharafterElfentialis

flu raonopetalus inferus angiofpermufe

Cap/ulahihcuhrls, compreffa, circumfcilTa,

Stigma capkatum perfiftens.

• AERTNERA *Pangati*.

fangaii Rheede Hort. Maiab. f. XL £ 2+

Habitat in humidis Malabariac.

Rad/# annua, fibrofa*

Caulis pedales, fimlices et tomosi, foliofi, ftepcetiamaphyiti, *fulcati*.

Folia sparsa, pedolata, lanceolata, integra, nuda.

FhiSifcatio terminalis ramorum, Tpicata.

Spica fubouata ex A[^]te congeftis floribus.

Squamu fpathulatis diftinfific

Calyx inferus, perfiftens,

tubo comjprfld, tenuiffime mtmbtonaceoj,

fera[^]quinquefidoviridi, laciniis femiovatis, *acutis inflexis*,

Qrolla calyci conformis flava, fed duplo minor.



Stamina quinque, Filamentis breviflomis

*antheris breviflomis, didymis**

Germen superius horizontaliter oblongum, depressum.

Stylus brevis.

Stigma capitatum perflans.

Gemmae horizontaliter ovatae, breviter compressae, circumscissae, bilobularis, perflans.

Semina acerofa (Hyperici).

fig- SCHREBERA.

Characteristis.

Drupa nucleo femibiloculari.

*Stamina ex nectario perflans margine**

SCHREBERA *all* CHS.

Habitat in Ceylona et Coromandel.

Arbor ramis alternis sparse diffusis.

folia opposita, petiolata, ovata, serrata, pallida, nitida.

Corymbi dichotomi foliis inter se ramos terminant.

. Pedunculi tetragoni squamis oppositis infructu et arduos & diuiferas.

Pedicelli squamis alternis.

Calyx inferus perflans, planiusculus, quinquefidus laciniis brevibus, latis, rotundatis.

Corolla pentapetala inflexa.

Petalae subrotunda, alba a basi ad dimidium fusco-tomentosa.

Nectarium orbiculatum, margine elevato rugoso germen cingens, perflans,

Stamina quinque.

Filamenta brevia ex ipso nectarii margine prodeuntia, postanthem inter petala tub calyce reflexa, fusca.

Anterae quasi ex corporibus binis cylindricis filamentis apice dilatato insertae consistunt. Filamenta in trigulo carpuli cujus transverso aperiantur, ut pollen exitum inueniant.

Germen nectario immersum sensim in

Stylum conicum brevem terminatur.

Stigma simplex

Frustrum. Drupa ficca ovali-oblonga, acuminata, calyce et nectario infra infructu.

Nucleus femibilocularis.

An *Wahmdya* Linn, Fl. Zeyl* 4ty Huepertinet?



29- ELAEODENDRUM [^]aramisfpinofis, foliis ouatis obtufis.

Habitat in fyluis regionis Moroccans, unde bencuolcntia CeLD. ProfcfToris SCHULTEM fpeciraen accepi.

Arbor mediocris, ramis fpinofis. .SW breues, craffiufculac, ad fines ramorum.

Foli. i folitaria et fafciculata, pollicaria, petiohti, ouata, integerrima, obtuia, conacea. Aha verius petiolum decreicunt vt ipathulata fere fint.

Flores in axillis foliorum et f_pi_{narum C9ngeftij feffi>eSi}

Cl* J_t''?f_{ff} P ^ V M u s : foliclisfubinaequalibus, fubrotundis, concavis; eatfils hirfutufufcus, marginibus leuibis albidis.

Crolla ^penhprtahi petalis calycinis foliis majoribus, femiouatis, concaws, mtegnis, vindulis marginibus albidis.

St ^ > / ^ quinque, ^//rwrwfj corolla longioribus, compreffis, petalorum baibus adoati. *Antberae* ouatae.

Germen e bafi ouata coni cum, pilofum, terminatur y^A> longitudine ftaminum *figurate* que fimplici

Drupa ouata, ficca.

Nux dur^{^i113}, ^Iaberrima > pallide fufca, fecundum longitudinem linea alba diuiditur, bilocularis.

^/ ^ inquouisloculofolitaris.

Obf. 1. defidSr[^] ^ ^ ^ qidem Pofit p[^]ctalorum cafum p[^]ff[^]nt> ^ f[^]u[^] yer o^o ^ff[^] << ^ Ocu[^]us aker in nuce faepius abortit et minutum foluro ve^o ^ff[^] << ^ igium relinijit.

Obf. 2. ^it> ^ ^ S f # ^ . ^ icitur - Opeume e ftuffi M[^]ri a d[^]os o^ondis > in-
H r / ^ S t X 7 r e.

30. CELOSIA *comosa* fpicis cylindricis comofis, foliis lanceolatis.

Ex India Orientali data.

Caulis erectus, nudus, angulatus, ramofus.

M<lanceolata, integerrima nuda.

Spicae cy

dunt e

emeijit.

<<TMaas. inter has hinc inde flos Tolitaris

Ore, braaBisfubu>atis coroj>a nonnihi, ^ . ^ ^ ^ uuntur.

** Cobrem in fi << Plant, diftinguere non potui.

Stamina generis.

Syl m ^ ^ 7 kuit, ttifi ^ <TM_{Ua} f - dupb l_{ongiora} perMllnt ,

Capfula operculata, difperma.

31. HERACLEUM *angustifolium* Jacqu. Fl. Austr. 2. t. 173, a Suecica planta, quae circa Upfaliam fpontanea est, omnino diuerfa fpecies, magisque cum *longifolia* ejusdem conuenit.

33. *SAMBUCUS laciniata*. Obf. Bor.Fasc. III. p. 30. no. 47. revera nihil aliud est quam varietas *Sambuci nigrae*, aliter licet credidcrim. Ter enim baccarum ejus fationem repetii, Temper autem excreverunt plantae foliis simpliciter pinnatis, et foliorum mutationem per quinque annos frustra exipeclavi. Verbo e feminibus *Sambuci I acini atae* plus mille fads ne vnicam plantam accepi matri jfimilem.
33. *TAMARICIS* binae ad minimum species in India occurrunt, ab Europe's diuerfae, quasvariis occafionibus accepi, femper vero a mucore adeo iiflorum fpica corrofae, vt illas rite examinare et tuto diftinguentes characteres elicere haud poffibile fuerit. In loco itaque vt attente examinentur obtandum est.
34. *ARALIA lappaefolia* caule . . , foliis ovalibus fubdentatis fimplicibus, cymis pctiolaribus.
 JEx India mifit amic. K 6 N I G.
Folia pedem Jonga & 4 P^cdis lata.
 Vix arborea.
35. *ALLIUM nigrunu* Allionc Fl.Pedem. iggi. t. 25. f. 1. a Linneana plants, quam in Fair. I. p. 15. defcripfi, et forma & odore diuerfiffimum. Nee *Allium montanum bicorne lat(folium, fiore magno dilute purpurajecnte Bur-Jerif* Rudbeck Camp. Elyf. a. p. 160. t. 21. quod, a Burferiano Herbario deceptus, *Allio* fuo *nigro* adlbripfit a LINNE, cum defcriptione vel icone ALLJONI conuenit. RUDBECKJI planta melius cum *Allio odoro* Linn, convenit.
35. *FRITILLARIA inuolucrata* All. Auft. ad Fl. Pedem. p. 34. forte est *FritiUaria pyrenaka* L. defcriptio enim *fat* bene conucnit cum variis fpeciminibus in Horto Academico noftro florentibus.
37. *SCILLA bifolia* L. floribus erefliufculis vnilateralibus *fotius dicenda*,
Scapus teretiufculus.
Pedunculi vnilaterales: inferiores longiores, rubicundi, teretes.
BraBeae plane nullae.
Corolla Scillae italicae.
Filamenta coerulea. *Antherae* coerulefcntes polline fordide nigrefecnte.
Pifillum c 0 eruleum. *Germen* conicum, fexful catum
Stylus decrercens. *Stigma* fimplex, albidum.
78. *CRINUM/ato«w JACO^U. an obliquutn THUNBERG.* In defcriptione *ill TAcoūIN* omifit, quod petala tria exteriora apice vnguiculo tubulofo gaudeant. *Corolla* nuper expanfa leviffime incarnata fenfim omnino rubra evadit. *Germen* triquetrum, fexfulcatum.
39. *LAURUS inuolucrata* foiiis obouatis, vmbellifinuolucratis. .
 ETranquebaria olim mifit b. KDNIG fine nomine; examinent vlterius genus autoptae.
Arbor rands cicatricibus petiolorum delapfis verrucosis.



Folium alterna, obouata, integerrima, petioluta, niida, fubtufi pallidiora.
Pedunculi ex axillis foliorum folitarii vel binati, vmbellis tribus quatuorug
 Corni, multifloris.
tnwllurtum tetraphyllum, foliolis longitudine vmbellae ovatis, concauis, ob-
 tulis, extus hirtutis.
Pedicelii breues, hirtuti.
Calyx minutus, hirtutus; diuilionem haud obferuare potui.
Petala in vno flore duo vidi parua, in ceteris nulla.
Stamina 11-15. *Filamentis* extus hirtutis in *antberas* dilatatas definentia.
Corptfcula pedicellata peltata ftaminibus breuiora & obfcuriDra mia, qua-
 tuor; an neftaria?
Germen oblongum hirtum.
Stylus ftaminibus longior.
Stigma peltatuin.
Obf. De genere dubius ex facie *Laurum* dixi, forte *Tomkis* fpecies.

40. SAXIFRAGA *hypnoides* Linn,

Abhaediuerfa eft et SCDPOLI planta Fl Cam. 499. t. 16. 61 ALLIDNI Fl.
 Pedem. 1538. t. 21. f. 4.

41. SAXIFRAGA *trichodes*. Scop. Fl. Cam. 496. 1.15. nifi omnino vanetas,
 fit *Saxifragar airoidis* L. ci certe proxima et a *Saxijraga nmfioide* Ail. ri.
 Pedem. 1523 diuerla.

42. SAXIFRAGA *mufcoides* Syft. Veg. XIV. fi a *caefpitofa* L. vere fit diuerfa,
 de quo dubito, certe ad fequentem fubdiuilionem referri debet.

43. SEDUM *Oederi* Prodr. Fl. Scand. 501. Fl. Dan. tab. 59. illud eft quod
Jaxatile dixit ill. AUDNE in Fl. Pedem. 1749. t. 65. f.6.

44. SEDUM *annuum* illud, cui flores albos tribuit *m.rever*. GUNKERUS in
 Fl, Norveg. n. 331. forte eft *Scduin anglicum*. Hudi. Fl. Angl. ed. a/ p. 156.

45. SEDUM *album* Linn.

Planta perennis

Radix fibrufa,

Caules ramok, decumbentes, fadicantes, glabri, rubentes, folia fenfim de*
 mittunt et verfus apices, vbi folia conferta feruantur, eriguntur. E cica*
 tricibus foliorum delapforum radículas emittunt, quarum ope cirrumrc-
 pit planta.

Folia clauata, femiteretia 1. fuperne planiufcula, obtufa, giabra, feffilia, bafi
 fubtus foluta, apicibus fufco - rubentibus.

Kami fioriferi a bafi mox eriguntur et folia fere quadruplo majora gerit ac ru-
 bru-punctata.

Cyma bifida, ramis faepius ramofis.

F/orfjpedunculati, albi, leuiffime fuperfufi tinctura carnea.



Calyx pentaphyllus; foliolis ovatis, bruceibus, rubens.

Petala lanceolata, acuta, concava, fere cymbiformia, Candida, carina nervisque duobus lateralibus rubris.

Stamina decem.

FHamentis carneis longitudine fere petalorum. Horum quinque petalif bafi adnata, quinque cum petalis alternanda.

Anther at subrotundae, fufcae.

Germina alba, ftriis tribus Jligmatibusque rubris.

Neftaria. Squamulae quinque breves, latiufulcae, flavo-rubentes adbalinger* minium.

Sapor Plants herbaceus.

46. PHYTOLACCA *heptandra* floribus heptandris hexagynis, foliis lanceolatis.

Habitat in America.

Radix perennis,

Caulis bipedalis, ramofus, erectus, ftriarius, glaber, fiftulofus,

Folia fparfa, petiolata, lanceolata, integerrima, levia, fefquipollicaria.

Flor racemofi, pedicellati, pedicellis juxta & fuprabafin bradleolis nonnullis fubulatis.

Corolla alba fubtus viridis, patens.

Stamina Teptem longitudine petalorum, antheris fubrotundis.

Pi/lilla fex dimidio breuora.

Baccae fexfeffiles in calyce, didinctae, lutcae, pellucidae, monofpcrimae.

Oh. Reliquis fpecicibus multo minor & tenerior. In omnibus Horibus a me examinatis Aamina feptem.

47. CO OK IA *Sonnerai*

Charadler effentialis.

Calyx quinquefidus, inferus.

Grtf//^ pen tape tala, aequalis, infera.

Capfulae quinque monofpermae in bacca.

C 0 ox 1 A *funftata* Sonner. Voy. ic. & defer,

Chinenfibus *Wampi*.

Habitat in China auftrali.

Arbor foliis pinnatisj foliolis ovatis acutis, integris nudis, impari majore.

Cortex ramorum, petiolorum & pedunculorum punftato-verrucofus.

Petioli partiales hifpidi-

Panicula pedalis, ramis fparfis compofita, pedunculis pedicellisque ramofis.



- Flares pedicellati*, abbl.
Calyx quinquefidus (5phyllus *Sonnerae*.) hifpidus, laciniis acutis
torolla pentapetala; petalis ouatis, cauis, patentibus, extus hifpidis:
Stamina discernbreuia, *antheris* fubrotundis.
 (Fwwapedicellatum, ouatum, pentagonum, hifpidum*
Stylus breuis.
Stigma clauatum, nigruin.
Bacca oualis, hifpida, puhftata, capfulas \$ includetiS.
Semiia folitafia oblonga;
Obf. Baccam multilocularem dicit *Cel. SONNERAT*, e genuine vero pentago-
 gono, fiib quo calyx laciniis reflexis, poit petalorum et Itaminum calum
 manente, ad loculos concludh
48. EUPHORBIA *heterophylla* dichotoma, vmbella bifidai ihuolucns fb*
 liisque ouatis panduraetorinibusque culuratis.
Euphorbia heterophylla incrmis, jfoliis Terratis petiolatis difformibus ouatis lan-
 ceolatis punduraeformibus. *Linn. Spec. Plant.p. 64*[^]
Cadis bafi fruticosus, demum herbaceus, ereftus, tercs, vimincus, panun
 famolUs: fiorigcri iemel dichotonii.
 fttfflparfa, dentata, leuia: infima ouata, acuta, in meSHo nonnihl finuuta:
 fuperiora pandurxformia; fepius fub vmbella folium vnicum ouatum, p''-
 rumque macula ex candido rubella tiudla,
Umbetta bifida, pauciflora.
Inuokra triphylla; foliolis duobus panduraeformibus, tertio lanceolato
 omnia argute ferrata. & bafi macula ouata ex candido-rubella grandiore
 fere dimidium inuolucruirt occupante pifta.
tetalum vntcuni, CUcullatuftl, compreffum, lutcum. •
FruStus pundlis eleuatis minutis tectus.
Obf. Ad dichotomas itaque transportaf i debet, Viuani alui.
49. FRAGARIA *vesca* var. 0. *Linn. Spec, Plant. 709.* polygama ~~diana~~,
 alie enim radices pure mafculos floressterilesque produciunt, aliae herma-
 phrodites fertiles, nee vnam in alteram mutari vici.
 In *Fragaria vesca fykefiri*, in *Fragaria VirginianaMilleri* et varietnte omnium
calendarum hanc fexus differentiam non obferuauit, nifi quod vltima haec
 verfus odlobris initium nonnullos flores pure mafculos aliquando tulcrit;
50. Ad *Pjidiumpyriferum hpmiferum* in Syft.Veget. exclude tab. 31. *txjatqu**
Obferv.
51. LAGERSTROMIA *indica* Fafc. V. n. 64. Sub impreffione fatali er-
 rore fadlum eft, vt fynonymon *cxRumpbio*, locus natalis et circa defcriptio-
 nem obferuanda, Tub *Sparrmannia* translata lint, quod B. L. obicruet
 vclim.
52. THALICTRUM *atropurpUreum* Jacqu. eft



Thalictrum aquilegifolium Linn. Quorfuin vero pertineat *Tbali&rum aquilegifolium* Jacqu. nefcioi

53. RANUNCULUS *Philonotis* Ehrh. Bcytr. 2. p. 145.

Inpratis Scaniae campeftribus mari vicinis pffm occurrit. E Norwegia il* lum quoque mifit Rev. D. Stroem.

54. RANUNCULUS *nhialisCrantzii* fir *Sccepli* a Linneano diurfus vidctur; Prior incpte omnino *Stir]** *Auftr. I.* p. n6, &c. Linnei delbriptionem carpit.

55. RUELLIA *dotjflora* decutabftis, ^oliis oppofitis, brafteis late cbrdatis ciliatis,

E Bengalia dedit *amicij*. K b N I G.

Folia oppofita, alcerio minorc, oiiata, acuti, denticilata, otliqua.

Flores albi, nodurni.

56. SESAMUM *lutewn* foliis laiceolatis longe petiolatis^ corollis extus hifpidis.

Habitat in nemorofis Nidrapur. K O N I G.

Quiis erectus, foliofus, palrum flex«ofus»

jb/r'f alterna, longe petiolata, lanccolata, acuta, piiis breuiflimis margine & neruis fubtus aferfa.

Flores axillares, folitarii, breuitcr peduncubti, pedunculo ex ipfa bail petioli quafi prodcunte:

Calyx & *Capjiila* hifpida.

Corolla faturate lutea extus hifpida*

57. HOLMSKIOLDIA.

Charader effentialis:

Calyx ampliatus patentiflimuSi

Corolla ringens.

Capfida vnilocularis? polyperma.

HOLMSKIOLDIA *fatigvitica*.

Frutexttmis tetragonis, corticc cinereo, leui.

Folia oppofita cordata vel ouata, acuta, ferrata, petiolata, punctata, neruis tomentofis, fubtus pallidiora.

fioralia fubrotunda vel ouata, faepius integerrima.

Pedunculi axillares, oppoliti, multiflori, foliofi.

Calyces et *Corollae* fanguinea.

Habitat in Vallibus Bengaliae;

Calyx araplus, campanuiatus, pafentiffimus, integer * dentibus quinq. ie rai- nimis vix obferuandis* .



Croffu ringens, calyce longior.

lulus bafi dilatatus demum anguftatus, verfus limbum curuatus

faux ampliata.

Labiumfuperius bnue) bifidum, laciniis rotundatis.

. . . *inferius dongatum, trilobum: laciniis lateralibus rotundatis: intermedia for ui cat a emarginata,*

Stamina didynama, corolla longiora; filamentis compreffis.

Ailtberae ouatac in dorfo gerunt corpufculum nigrum, fob quo immittituf filamentiapex; fubtus quadnfulcatac.

Germen femiouatum.

Stylus ftainibus longior apice incuruus,

Stigma acutum leuiffime bifidum.

Capfula polyfperma.

Ok. Non nifi vnicam vidī capfulara femimaturam, in qua femina plura quīdem manifeſte obieruauī, abſolute autem iudicare non potui, an vinca-
pularis fit.

58- **CARDAMINE** *bellidifolia* Allion. FLPedem. 949. fiB. i- 3- V^l ^ DI
fall or, eſt

Plantuk Cardamints aherius atmula. CluſiHiſt. Plant. CXXIX.

quam *Arahim bellidifoliam* eſſe credit ill. J A C ^U 1 v, omnino diucrſa a *Cardamine bellidifolia* Linn. Fl. Lapp. 260. t. IX. f. a. videtur.

59. **ALYSSUM** creticum L.

Caulis vix fuffruticofus, tomentofo-incanus.

Fo//Vioblanceolata, dentata, in petioluin decurrentia, tonientofo incana.

Racemus elongatus.

Calyx patens, viridi-flauus.

Corolla lutea, pctalis bifidis.

Staminum dentes nullij fed breuiora ad b5fin tuberculura tomcntDfuni habent.

SiUqua inflata, oblongo-globofa,

60. **GERANIUM** *afrkanum arhrefcensfoliiscucullatisangulofis.* Dill. Hort. Elth. 155. 1.129. f. 56. 61

GERANIUM *afrkanum arborefcens ibifci folio rotmdo carlinae odore.* Herm. Lugd. 274. t. 275. Sebae Theſ. 1.1.26. f. 2,

diucrſiffimae funtplantae; prior nullo inodo ad *Geranium tucullatum* L. pertinet, poſterior vero aequae ac

Geranium afrkanum maximum Riv. pentap. illud bene refert

61. In FaſciculoIV. p. 2Q monui, *Hedyfarum lintfolium* L. Suppl. 33r. ad Indigoferae genus pertinere. En iconem ex viua planta defuaitam *Tab. II. & deſcriptioJiem.*

INDIGORRA *Uniolta* foliis simplicibus linearibus incpnis, cflule profrato, floribus fubquaternis axillaribus, fruttibus globdfis.

Caulii breuis, ere&us. *Kami* elongati, tenues, virgati, decumbentes, angulpii, fcniis villó veftiti.

Folia alterna, linedria, obtufa cum acunirie breui, inregerrima, rafinata, pubefcenti-albida: *Petioli breucs-*, pills albis breuibus apprcfiis veltiti.

fhre's tres vcl quatuor breuitcr pedicellati in axillis fohorum, rubri.

Calyk quinquefidus, laciniis neutis, ciliati.Sj patentibus.

VexiUum cordatum^ acutum, planum, ad angulum acutum reflexum,

Aiae deflexae, planae^ ouatae, obtufae, marginibus fuperioribus longitudi-
naliter carina incunibentes.

Carina \6ny\tudinc Vexilli, cymbiformis, comprcfa, extus viridispilofa, ad medium lateris vtriusque dentem dangatum acutum cxfrenS.

FruBus globofus, Aylo coronatusj niucus, monoffpermus.

- 6s. *TR?OLIVMoMenrakdtitftmum cmtlefiftiilbfa fiorealbo* Vaill. Bot. Par; t. 22. (.5. a *Trifolio hybrido* Unn. forte eft diucrfa (pecies. *Trifolium* enim hybriduin Linn. Omnino perennat; nee annum eft, vt dē? fuo *Tifolid* hñfido annotavit ///. ALLIONE Fl. Pedem. 1091. Nee altifliniuin dici JjOcll: noftrum, neque proprie album eft, rubore enim Temper perfu- fum obibruatur. •

Sy **VICIA** *lathyroides* Linn, omnino dhua eftplanta, Vt in Prodr. Vh Scan- din, dudum annutau. Negari non poteft, circa duration em plantarum. nonnunquam efrallē *Gene'r: h* LINNE aliorum deceptus aucloritate, fae- pius autem hi errores Tub impreffione per ijgiiDruni. transpofitionem a ty- pognpho conimifTain irrepiffle, certd certius mihi notuni eft*

64. **POLYOLA** *major* Syft. Veg. XIV. p. 638. Jacqu, Fl. Auftr. V. 413. quae in Scjniae fylueftibus pafsim occurrit Tola magitudine a *vulgari* differt, nec diucrij eft fpecies.

65. **VICIA** *Gerardi* Syft. Veg. XIV; p. 664* Jacqu. Fl. Auftr; III. 229; eft

Vicia Caffubica Linn. 61

. . . mi!it ait s Crantzii.

66. **AESCHYNOMENE** *Seshan* L. Vatiáf

x. floribus flauis.

p. calycibus, vexillis crfrinaque atropurpureis;

- 67; **HIERA** *G f I muror'um* icon in *AIL Fl. Mem.* t. XXVIII, f. i a planta naftrñ in fylueftribus locis vulgatiffima niultum aliena.

- 6g. **MIERACIUM** *ntyinunt* All. *FL Pedcrti.* t. XIV. f. 2. a Lapponico nofiro nirtiis abludit;

- 6g. Vereor, ne transpofitae *tint* icones tabulafum XIII et XXXIV in *All. FL Pe-*
.*dfm.* vt prior ad *Carduum heterapbyllum*^ poflerior verb ad *btlemeidon*



linn, per dneati ilia enim *Carduum heterophyllum Jiiecicum* bene fans re-
fert, haec autem non.

7a CINERARIA *campefiris* Prodr. Fl. Scänd. Q2a. Obf Bot.Fafc. I p. 3°- tftv
Cineraria integrifolia fratensis Jacqu. Auftr. ii. p. 48- t. 180.

71. MENISPERMUM C W w L. Spec. PL 1468.

Forte hie aliqua fubeft confufio. *Plukenet* in Mantiffa pag. 5a. abfolute ne-
gat, ilium *Cocculum* cum *Nntfiatam Kbeede Mai.* eundeni effe. B. KONIG
ramulum miffit fub nomine *Menifpermi birfuti*, qui optimecum/£ *tluken.*
t.345. conuenit, inajora quarauis folia mngis ob'onga (int. Minora tolia
ouatam habent figuttmi et ramulorum axillarium lanceoiatam, omnia vero
hurfutie alba imprimis fubtus iplendunt. DirBcile eft creditu, b. KONI D noil
cognouiffe Menifpermuin *Cocculum*, in India vulgarenn Ad hunc de
hurfutie ne verbum fi-cit *Equ* «LINNE. Minora folia fpeciminis noun
M.birfutumdiiYi uptimerefpondent charaderia LINNE *M.btrfuto* i
fito, Dubia haec foluant autoptae-

7z. URTICAJAPONICA Linn. Suppl. p. 418. Dmnino eft

Vrticafpicata Thunb. Fl. Japon. & Syft. Vcg. XiV.

73- SALIX *arbutifolia* Jacqu. Auftr, V.t 408 a fruticeLapponico diuerfa ^{vide}
tur. Idem quoque valet de

SALIX *Ejufia* ibi d t. 409.

74- CELTIS *orientalis* L.

Folia forte potius *ouatoMnteolata haft obliqui*, quilm oblitjue cordate, ^{dici-}
da. In meis rpeciminibus ab *opt.* ICONIC communicatis ita faltem ie
hub en t.

Dubito etiam, num fynonyroon *Pluknetii* in Syft. Veget. iterum allato reuera ad
hanc pertineat, ob fructum folitarium feffilem, quum noflra, etiam 10
Flora Zeylonica confentiente à LINNE pedunculop-multifloros habcat.

75. ISCHAEMUM w«r/c«/;ifoliislanccolatls, floribus muticis.

Ifchaemwn mutizum Linn.

Culmipedals, fcsquipedalsvc foliofi ad fpicam vsquej adbnfinfaepe ramou,

Folia lanceolata, bipollicaria, marginibus ciliato-fpinulofis.

Spicae duae terminates conjunctae, vt vnica vide tur, vel ii mavis, vnica ad
bafm vsque bipnrtibilis.

Calyces binnti, cartilaginei.

a. *feffilis*, biflorus, androgynus.

(3. *pedunculatus*, mas vel neuter, vniflorus.

a, *gluma exteriore* ouata planiufcula, margine explanato, a pice bifidaj fed
margo alius interior inflexus.

. . . *interhre* magnitudine aequali, apice thucronato, margins altedas
tantum lateris inflexo.

Corolla exterior mafcula valuulae exterioris margine vno inflexo, altero piano;
interior veru vatuula vkrumque rnarginem inflexum habet.



Cofolla interior fceminea valuula exteriorc mutica: interidre iri niucronein ariftaefbrmem breuem definente, vtroqcc mnrgine inflexo-. *Stigmata* duocrafia, plumofa, flaua. *Glumae corollinae* omnes hyaliriae.

. . . *interior foeminea* valuula exteriorc mutica; interiore iii mucro- rjcm ariflacforaiem breueni definente^ vtroque margine inflexo. *Stig^ mata duo* crafla, plumpfa, flaua. *Glumfle corollinae* omnes hyaline,

P. lateralis, neuter vel aliqliarido mafculuSj, pedicello triquetro^

valnttke talyeinae triquetro- comprefTjc

ghma alt era *corollina* fubariflata; .

76. ISCHAEMUM/wW^fdliis lancedlatis, florculis nudis, fcayicis fef* filis valuula cxeHore vtrinque binoduloih; corollaqtJ arifta tortili .clongata.

Ifcbacmum ariftatum L, Spec; Plant. 1487*

Culms bipedales, foliofi, fubramoi*

Folia praecedentis, fed longiora.

Spica etiam prasqedemis, fed ariflata, epilis*

Calyces binati.

as fcfililis biflorus;

p. *fedUnculatus* viliflbruš, neuter,

«. *vafiiTila exterior* cartilaginea, pbniufdula ^ lanceolata, extus ad vtriumi< que latus nodulis duobus elcufitis, margine vtroque inflexu; *interior* niembranacea acuta; altero margins explanato, altero inflexo.

Corotia exterior neutra ? miitica.

. . . *interior* hermaphrodita, arifta tbrtiJi etongata geniculo nuJlo.

(3. *Valuula exterior* cartilaginea, lanccolata, margine altero inflexo, altero pliltio, cum alio margine interiore meir.braiiaceo inflexo5 *interior* longitudine aequalis, acuta, membranacea, vtroque margine inflexo.

Corolla neutra.

Glumas corollinae. hyalinae rufefceiifes.

Obfi Ob flores raucOre confpurcatos magis BDfolucam darb riori *pbtui* defcriptionem; interea haec inferuiet, donee meiiorem habeamus. Obferuent quaefto autoptz, vtrum *flylus* fit lineafis comprefius, vel capillariS.

77. ISCHAEMUM *barbatuniy* foliis lanccolatis, calycibus bifloris bafi barb- batis niargineque ciliads: fiflilis margin© vtrinque binbdulofo, arifta tbria geniculata.

E Jaua accepi a *pl. rev.* D. WENNERBERO.

Culmus & folia praeedentis, fed *hxc* breuiora.

Spica Jongior, bipartibilis, ariftata, dentibus racheos ciliatd- **barbatis**.

Calyces binati, Vter^uc andfbgyHiis; biflorus, at

«. yλ^/// *valuula exterior* cartilaginej, bafibarbata, ad vtrumq̄tie *latusbi-*
m-nodulofa, lanceolata, vtroque margine inflexoj *interior* *carinata*,
acuta, margine vtroque ciliata.

Flares |>|h|| *exteriore* mafculo, *interiors* foemineo ariftato, arifta fracta
bafi fufca dciu alba. *Glumae* corollinae hyaljnae, alba acute.

0. *fedunculatus* i *valuula exterior* femiouata, cartilaginea, nuda, *interior*
lanceolata, acuta.

Fhres bini *exteriore* mafculo, *interior** foemineo 1. neutfb, vtroque mu-
tico; *gluma* corollina priorum^

73. ISCHAEMUM *ciliare* foliis lanceolatis, ralycibus biflbris, pedicellis ci-
liatis, flore vtroque fbemineo arifta torti geniculata.

£ China accepi.

Culmus ftsquipedalis, ramofus, decumbens radicansj geniculis pilofis*

Folia lanceolata, breuia, vaginis orcpilofis_k

Pedunculus nudus.

Spèce bina-, fcsquipollicare5j anguftiores reliquis, ariOatSi

O/yffj-binati, biflori.

«. *fejfilis*^ *gluma exterior* cartilaginea, ouata, ventricofa, (tdata, margin^
vtroque inflexoj *interior* lanceolate, carinata.

Flos exterior mafculusj muticus.

, . . *interior* focmineus, arifta longa tortiligeniculd inftruffa.

j3. *pedunculatuj*, pedunculo triquetro angulis margineque fupcriote ciliatisi

Gluma vtraqucartihgitiea, carinata, aciita.

Flares alter mafculus muticus, foemiticus alter ariftatus_k

Arifta in vtroque flore foemineo fufco exit e dorfo corollz ad arifls bafm
vsque fifiae.

Corollinae *glumae* tenues, hyalinz.

Obf. Quintam lſchatnii ſpeciem equidem poſſideo eJCcap.B. Spci, qua *foliis*
filiformihus primo aſpectu a jam deſcriptis differt, cjuſ autem deſcriptio-
nem dare nolui, ab dmiciiTuno enim inuentore in Flara Capenii mdiorem
exſpedo.

79. CYMBACHNE

Sub hoc nomine gramen proprio, quod ad null urn e deſcriptis Graminunt
generibus rEducere potui, cujuſque *Character ſſentialis*, donee in recenti
attente examinatus fuerit, erit:

hflorefcentia dimidiato-ſpicata.

Spicae Hermafrod. calyx biglumii, vniflorus, rachi parallelus^ *valuula extr-*
riore lineari, oppoſita cymbiformi.

, . . *Foemineae* calyx vniglumis, ouatuſj fachi oppoſitus.

CYMBACHNE *ciliata*.

Habitat in regione Bengalensi, unde vicum specimen dedit. KÖNIG.

Gramen tenue, pedale, culmis pluribus simplicibus ramosisque, his uno folio instructis, illis aphyllis.

Folia brevia, tenuia, margins supra vaginam pilis longis discretis albis ciliata.

Vagina truncata, ore pallide fusco, ciliata.

Spicae binae terminales, lineares, sesquipollicares, lineam latz, aliz hermaphrodite, foemineae aliae.

Rachis linearis, membranacea, poftice plana ftriis tribus longitudinalibus, antic e alternatim flexuofe excauata,

* *Hermaphroditi* Fhres.

Calyx bivaluis, uniflorus, ita pofitus, vt vtraque valvula rachi fit appreffa et parallela, nee vna ab altera occultetur.

Valvula exterior linearis, obtufa, dorfo ciliata^

interior longitudine xqualis, femiounata, acuta, cymbiformis, compressa, ftriata, colorata, dorfo ciliata, corollam includem.

Gro/Z^biglumis, hyalina, calyce minor.

Stamina tria, antheris nigris.

Germen minutum.

Stylus limplex.

Stigmata duo nigro-barbata.

** *Foeminei Flores*,

Calyx univaluis, ovatus, apice leuiter bifido, margine ciliatus, rachi oppositus, appressus.

Corolla nulla.

Pifillum pcedentis, fed ftrigmata longiora videntur.

go. ASPLENIUM^/fflr</wfronde pinnata: pinnis falcatis acuminatis incisio-ferratis: basi integra.

Trichomanes adiantoides frondibus pinnatis: pinnis enfiformibus acuminatis incisio-ferratis: ferraturis bifidis. *Spec. Plant. 1561.*

Felix non ramosa Zeylanica, foliis adianthi in modum ferratis. *Burm. Zeyl. p. 97. t. 43.*

E Zeylonâ dedit honor, KÖNIG.

Stipes pedalis, glabra.

Stipes tetragonus.

?/«^plurium pariuni, 4 & supra, pster terminalem, falcatis, acuminatis, basi rotundatis, nee furfum neque deorfum angulatae.

Lineolae fructificantes obliquae.

Obs. Ex facie forte *Trichomanis* speciem iudicavit *Equ. à LINNE* flores quum non vidisset, sed reuera *Asplenii* species. *Adiantum africanum rutae murariae aemulum* &c. *Pluk. Phy togr. 1.123. f. 6.* bngc alia est,

- 8r. ASPLENFUM *falfum* fronde fubbipinnata, pinnis oppolitis, pinnulis alternis cuneiformi-trifidis acutis.

Habitat in Africa, ad Bay Falso leftunu

Stirps pedalis, fesquipedalis, glabra.

Stipes niger, leuis, fubtetragonus.

Pinnae oppofitz difiitz, fesquipollicares, pinnulis quinis alternis fubcuneiformibus profunde trifidis: laeiniis acutis fzpe incifis.

Ueae fru&ificantes a. 1.3. in pinnuk quauis.

- 8a. ADIANTHUM >/n/;> Fafic. II. p. 28. t. V. eft

Adiantum fiabe Uukitum L. Spec. Plant. 1557.

83. H E MIO NITIS *efculenta* fronde pinnata, pirim̄ alternis lanceolatis, trenatis, bai fubaauriculatis.

Habitat in India orientali.. Radices efculentae, K6NI&;

Stirfi fesquipedalis & vltra.

Stipes leuis, fulcatus.

Pi^ ^ alternis, lanceolate, fere fefliles, profunde crenatae, fed crena ytraque bafeos ftipiti proxima profundius fefta et elongata. Pinna terminate quail fagittata.

84. H E M I O N I T I S *prolifra* fronde pinnata decumbente axillis pinnarum proliferis, pinnis lanceolatis crenatis.

Ex India Orientali mifit *honor*, XÖNIG fub nomine Polypodii proliieri.

Frons primaria yinnatn, decumbens, grandis, *pinnis* feflilibus alternis, lanceolatis, crenatis, bai truncatis, fere femipedalibus. Ex axillis harum progreminant aliae frondes fepe binatz, fesquipedales, quarum pinni prioris in omni iimiies, fed multo minores, &/?//>raad exitum tuberculi iiftar increffatus.

Fru&ificatio in lineis decuffatis, fed irregulariter erumpit, unde mox Polypodium, mox Acroftichum mentitur.

85. PTERIS *nigra* fronde tripinnata, foiolisouatis: terminali fiibtrilobo.

Circa Canton lechm dedit *honor*, WINNER BERG.

Stipes fpithamsus, fri.ntus, hinc canaliculatus, leuis, ater.

Frons decompoita, ramis oppofitis alternisque.

Pinnulae paruae, ouatae, obtufa: integrz prater terminalem, quae faepius triloba*

FruBiJjcatro margmalis, faepe difcuai ita replet, vt ncruus pinnulae tantum nudus mancat.

86. PTERtS *quadriaurita* frondibus pinnatis;, pinnis pinnatifidis apice dwitatis: infimis quatuor paribus bifidis.

ECeylona mifit *b*, XÖNIG.

Stipes fubtetragonus, le\fis.

Frons pinnata, pinnis ad neruum fere pinnatifidis, laciniis obtufis apicc dentads: terminali lanccolata, acuminata, Ionga, ferrata imprimis veriis apicem.

infima duo pinnarum paria bifida vel duplicate, ceterum familia.

Ob/. A *Pteride biaurita* Linn, diftindliflima magnitudine, ferraturis & numero pinnarum bifidarum.

87. POLYPODIUM *pteroides* fronde pinnata: pinnis alternis Inicrolatis incuib-ferratis: ferratus is fupcrioribus ctwleccntibus, frudiicationibus marginalibus.

E Ceylona mifit €eL it6NI e»

Serraturae grandes fere addimidiam marginis a nefuc diflantiam»

FunBa in marline ferraturarum denfe polita, vt Pteridem fere mentiatur.

88. POLYPODIUM *lineare* Burm. *Fl. lad.* p. 235, *tab. 67. f. 2.* «ICPOLYPODIUM *dicbotomum* Thunb. *Fl. Jap.* p. 333. *tab. 37. fine* dubio eadem eft Filix, qua: in China Infulisque Oceani indici.vulgtiris. Sufpicor etiani *Acroftichitmfuriatum* Linn, hue pertinere, pro certo autem diccre non iudeo, Jamaicnfem'enim filicem nori vidi, verum *Nob. SWARTZ* in *Prodi:* p. 133. *Acroftichnmfurcatum* Linn, et *Polypoiium dichofomum* Thunb. conjungit. Icon & nomen *Plum. fit. t. 23.* ferraturns, adeffe negant, in Thunbergiana icone & in variis fpeciminibus ab India Orientali allatis adfunt, PLUMIER fuae filici ad oras foliorum cingulum veficularum nigricantium adferibit, quod in noftris fpeciminibus omnino deert, nee fingularem glaucum frondis colorem meminit.

59. ACROSTICHUM *unuefrondibus* bipinnatis, pinnulis obbng< pinnatifidis, laciniis obouatis apice crenatis.

Dryopteris campeftrts Rumph. *Amb. VI. p. 77. t. 34. f. 5.*

Habitat in nemEffofis regni Siam, Midnapur, Tfchandranconz, ad fcpukreta Sinenfium Malacca, KÖNIG,

Stirps Ipithamia.

Stipes teres, ftriatus, nigef.

Petoli alterni, hirtuti, hinc canaliculati.

P/««<fpplerumiue conftant feptera fbliolis vel laciniis dirtantibus, obouatis, apice crenulatis.

00. ACROSTICHUM *quercifolinm* frondibus ternatis: fterili folio terminali ouato inrifo, lateralibus trilobis: fructificante lineari.

E Ceylona mifit honor, xÖN 115.

Frons fterilis trifolia.

*Stipes brevis, hirtus**

Folium terminate ouatum, incifo-Iobatunii tateralia minora, fubtriloba.

, . . *fruBiJicans* duplo alcior, ctiam trifolius.

Stipes tenuis, Icuis.

Folia lineari-lanceolata, dentata.

91. TRICHOMANES *thinense* L.

» diorem huius figuram in itin. tab. 6. max. reuer. D. OSBECK dedit, meliorem PLUKENET in Phytogr. t. 4. f. 1. sub nomine *etara* bono, dicitur enim

Adiantum nigrum thinense tenuiter diuifum pinnis minimis obtufis plerum-

Stylum fetaceum terminalem, quem pro charactere Trichomanis habet Gerner. ffiiNNi in plurimis exemplaribus hujus speciei frustra quacivi, vti etiam in *Trichomane Canariensi* & *Culcitra* Gen. BANKS. Haec forte ratio est cur eandem Filicem sub nomine *Adianti chinensis* & *Trichomanis chinensis* in Flora sua Indica proposuit Cel. BURMANNUS.

92. F V, 9. US *Zy lanicus* caule triquetro, foliis ouatis petiolatis denticulatis cuspis veficulis ouatis carinatis pedunculatis.

E Mari Ceylanico miffi D. K6 N I G.

Cnula triqueter ramulis breuibus vndique obfitus, quos terminant rudimenta foliorum crispatorum.

Folia explicata ouata, denticulata, margine crispata.

Vejkulae rariores, folitariae, ouatae, bicarinatae, pedunculatae.

DESCRIPTIONES
EPI DENDRORVM
Itf INDIA ORIENTALI FACTAE

D. 10. GERH. KOENIC,

'r

KPIDENDRORVM DESCRIPTIONS

A V C T O R E

D. I. G. KOENIG.

No. i.

Efidendrum Jpatbulaium. Kifuhn,

Folia bifaria, alterna, approximata, spice (duplicate praemDrfa) coriacea, vix petalalia.

Pedunculi axillares, erectiufculi, interdum penduli, teretes, giabri, articulati, lignofi adarticulos bradeati vsque ad dimidium indiufi, fesquipedales, inter racmum angulofi.

pedicelli patentiffimi fparfi, baf bradler.ti, tcfetes, lfuës, albi, longitudine florum,

Brarteae oblongae, adpreffae, acutae, ferruginae, Peduncubrum majore Sj pedicellorum i putis fubftitutae paruae.

Calyx nullus nifi. brafleae.

Corollae petala quinque bad tftario vnita, ptana, quorum duo lateralia, pateftiffima, ouata, lata, acuta, majora, inferiora 3a obuere ouata, ex his intermedium ma jus} omnia niuea apicibus macula rofea magna picla.

JeAarium fupra partem friftificatione inflatum, rotundatum, tripartitum ad fceridens_T apice fuperibricornutum, recuruatum, Corolla inuolucris niuis,

Laciniac apicis inferioris feu inflari laterales oblique ouatae, marginibus dentate, majores niueae, Superior linearis angufta, apice bidentata incuruata, colorata, purpureo-rofea et partem rigidiori Inferior horizontaliter vsque ad medium diuifa.

Pars inferior Neftarii antefius corpus erectum, truncatum, latere exteriori rotundatum, interiori concauum cum foveola magna fucco mellofo-fimbriante impleta; breue poftea prominula, fubcarnea, parum concaua, akerioris partis feu columnae parum latior, longitudine petalorum pofteniiliti, poftea cum parte cornuta connata

Apex corporis truncati fquamata cordata, concaua difco longitudine cariniua notata (inde Capitis Gallinae fimillima) apex verfus neftarii cornu vergens foluta, infra fquamam Antherac duae magnae globosae glutinetenaciffimo id flum traclabili corpori truncato adherentes latere exteriori rima hianti diuifi, lutae.

Stylus nullus. Stigma. Squamulae geminae approximate infra apicem squamatae antherasque tegens, Neftario corpori truncato adnata, fericeo-fubtomentofi, minima e.

Pericarpium. Siliqua clauata triangularis angulis acutis bafiatenuata, apicetrun-cata, craffa, corollis marcefcentibus coronata, pollice longior, glabra,



Epidendrum Variegatum.

Folium peltatum Rumph. HB. amb. P. VI» pag. 93, Tab. 41. Fig. 3?

Radices anni praecripi, buibus supra terram crectis, oblongus, anguta, com*
preffiusculug, squamis 401 vel pluribus alternis membranaceis subuectitis,
pollicaris; vix lineas 3 latus, viridis inferius fibras horizontals filiformes
flexuosas, albicantes emittens. Radix praesenti tempore vigens ex ball
prioris lateraliter pronata, vix bulbosa, vaginis tribus oblongis, acutis,
apicibus patentibus, membranaceis, cotaratis purpureis tecta.

Caulis nullus.

Folia 3''' alterna, patentissima, scapum tafi vaginantia, sessilia, patentissima,
ouata, acuta, trinervia, marginibus crispato-vndulatis, piftis albo-fanguin-
eis fidiua pars viridi fanguinea, vtrinque glabra, tenera.

Scapus frectus, palmaris, folitarius (rarogeminatus) angulofus, ftriatus, glaber,
coloratus, racemo oblongo terminatus.

Pedunculi simpliccs subalterni, patentissimi, teretiufculi, clauati, ftriati, colo-
rati, vix longitudine floruin.

fipathz feu braftri folitariz infra pedunculos adnatae, penduiz, fcapo adpreffe,
lincari-acutz, glabrz, membranacez, coloratz, fubroiéaf, lon^itudine pe-
duncubrjum.

Calyx nullus, nifi Spathac.

Corolla petala quinque patentissima, oblonga acuta, marginibus reuolutis, mem-
branacea, fubrofea, quorum duo la t era li a, inferior a parum anguftiora 2*
fuperiora et inferius gqualia.

Nefarium marginatum, margo plana, fuperior latior denticulata, inferius di-
uifa, laciniK diflantes, lanceolate, acutz, membranacez, citrinz* Inte-
rior pars galeata feu fornicata obtegens Nefarium proprium turbinatuna
vel corpus truncatum squamula cordata, adpreffa, alba tedium.

Squamula pagina exteriori conuexa, interiori loculamenta gemina antheras in-
cludentia.

Antheras feviles geminac corpore truncata adnatae, oblongae, Julculo diui-
fae, luteae.

Stylus nullus, nifi corpus truncatum, columnare, erectum, breue, latere exte-
riori rotundatum interiori foueola excauatura paruum an Stigma? Squa-
mulae duae ad latera apicis corporis truncati adnatae, feviles, erectae,
oblique ouatae, carnofae, pagina interiori filo infra difcum parum fupra
apicem corporis truncati connatae, virides. Squamula antheras te-
gens, majores.

Pericarpium filiqua clauata, compreffiuscula, fulcis profundioribus angulofa.

Obf. Habitat in fyluis deniffimis opacis, viget temp ore pluuiifo cum reliquis
Epidendris.

*Epidendrum Calceolarias***Paralitica.**

Radices stipitaceae, numerose, flexuosae, albicantes.

Caulis plurius confertus, teretifolius, flexuosus, articulatus cernitantes, Vix ipathamei.

Folia bifaria, patentiflora, alterna, remota, fimbriata, crassa, pauca, glabra.

Racemi terminales saepe in caulibus superantibus, simpliciter flores remoti.

Calyx spatheae vaginae duae vel plures pedunculo racemis distinctis, oblongae, membranaceae coloris albi rufoque mixti coloratae, pedicello multo breviores.

Pedicelli nulli, nisi germinis infra erecti, glabrae, tubulosae coloratae, infra florum crassiores, magis coloratae albo rufoque mixtae, corollae vix longiorae, vix fus medium petali majore adhaerent.

Corolla rotunda 4-lobata, petalorum infimorum tubulosae lobis angustis cor-niculatis et parum distinctis; alterum adhaerens latum, tripartitum, lacinia intermedia lanceolata angustius laterales latiores.

Petalum superius in apice corniculato insertum, erectum et fere incurvatum claustrum, planum apice emarginatum et parum crispatum album longius uel inferius.

Petalum inferius laciniae partem inferiorem ad basin hanc adhaerens distincta, lanceolata (quasi alae hanc) longitudine lacinarum petali inferioris aequalia, albicantia.

Nectarium ovale truncatum, ferrugineum, brevis, anteriori parte foveoid magna excavatum, posteriori latere rotundatum, vtrinque margo decurrens ad cornu.

Apice excavatum squama orbiculari convexa interiori paginae distincta distincta longitudinali distincta (quod locum antherarum) tecta, tota niua;

Stamina filamenta duo brevissima intra apicem concavum torporis truncati tenuissima.

Antherae subglobosae fulculo notatae, magnae.

Stylus nullus.

Stigma foveola lateralis bilabiata magna; Labium inferius ex margine distincto corporis distincti truncato distinctum, inferius margo rotundatum prominulus ad basin coloratus ruber.

tericarpium (ut in congenere)

*Epidendrum Hexandrum.***Paralitica.**

Radices capillares, flavae, albae, corticibus arborum adhaerentes.

Caulis plerumque supra radices parum nudus, teretis, squamis oblongis, tubulosis, acutis, striatis, rigidis, albicantibus tectis, pollicaris vix parum importus inferius nudus, foetae foliose.



Folia bifolia, alterna, paten tiufcula, feffilia in vaginas defmentia, remotiufcula, lanceolata, oblique emarginata, cum a cumins paruo proniinulo integerima parum cafnbfa, riglda vix magnitudine hyperici feu magis anguftiora.

Racemi parui axillares pedunculati dorfo ramorum reflexi, fparli, plurimi frequentiores, ad apices, rarius verfus radices jpronati, foliis breuiores.

PCduriculi exaxillisfoliorlim fimplices, folitarii, ere&i et ad dorfum ramorum curuati, teretes, bafi vaginati, iinguli flares alterni germinibus inferioribus clauatis Inco Pedi cell Drum pedkellati- Vagina peduncolorurt oblongs, a cuts, breues*

Calyx Spatha Monnphylla ad bairn germinis pedunculo adnata, ouata, **acuta**, recufuata, pedunculo adpreila, membranacea^ glabra, vix longitudine germinis.

Corolla quinque petala, Fetaium fuperius feu ad dorfum Neftarii germinc ad* naturu, eredtum, ouato-lanceolatum acutum, parum concauum, albicans. 2duni t ^tium acJ latera nedlarii adnata, erefta, lanceolata, priori parum minoraj 4^{tu}m anterius ad bafin corniciatum, corniculo rotundato inflato adfcendens, verfus petalum fuperius et bipartitum. Laciniz (cliftich^c patertes) ad apices recuruatae, ouatz, acutz, fidf^breuiores; 5^{tin} in corniculo petali 4ll interne cidnntum, obiongo-clauatum, adfeendens ad apicem obtufum, parum rccuruatum, in medio denticulo minimo notatum. Laci^ nils petali 4Vl parum breuius.

Nectarium corpus truncatum, ereclum, comprefliusculum, fquamulis geminis terminatuuiK

Squamula: eredsc, prior dorfo neftarii, altera in dillepimento transuerfali fuprodifcum truncatum adnatx, cordato acutz.

Scjuamula: dorfi pagina interior? concaua, difsepimento longitudinali bilocularis, membranacti alba ahguftiflime acuta, apice parum rubni.

Stamen filamentum vix vllum.

Anthers fex cum Hypomochlio niinimo rubro ad apicem fquumnlac dorfali nectarii adnatx, clauatz, cum filament is capillaceis Hypomochlio adfixar, flauae fubpellucidx, quarum^ in flngulo loculamtrnto teftx, licet ad vnum hypomochlion vnitz minimi. Corpus truncatum diffcpiniento apice biloculare anterius ftigma oblongum, concauum viride, poflerius infra apices femicylindricum clauati prominule antheras includentes.

Pericarpium. Siliqua clauata, angulofa, fulcata, paruin incufuata, magnitudine grani fecalis feu tritici vix minor.

Obf. Habitat in fyluis denffilimis fads frequens, tota Planta vix pedalis. Folia late glabra. Flores albi.

No. 5.

Epide ndrum Opbry di s.

Radices iibrolkin orbiculam plurima:, difperfae, filiformes, hirtuti, albs, in terra nafcentes.

Scapus ercdus, fupra radicem vaginisfoliisque obuettitus, teres, fulcatus, fulcis profundioribus, acutus, coloratus, ruber, ftipulisque recuruatis,

Jineari- acutis, glabris, viridibus longis adperfus, pedalis, interdum parum altiur,

Vaginountz, acute, integerrimz, carinatae, neruofe, membranacez, inferiores latiores, breuiores, viridiufculz, neruis rubris piflx.

Folia alterna, bafi fcapum vaginantia, erefto-potentia, ouata, acuta, integerriraa, neruofa, neruis 4, ^ads¹⁰ carinatis, glabris, glabra et leuiter firiat, a neruis contraclioribus fuperficie parum bulbofa, membranacea, fcapo parum breuiora, in vaginis tubulofis carinatis, glabris, definentia.

Spica erefta cylindrica, fofibus fanguineo-purpufeis denfe obnata, fefquipalmaris, crailitic digiti majoris.

Pedunculi breuilTimi, fimpliciffimi in germinibus ereftis ad apicem parum recuruatis, flauatis, Ariatis, coloratis terminati. Striz carinatx, trifpatadit cu atz.

Ca^yx Spatha monophylla. infra Pedunculum fcapo adnata, recuruata et adpreffa, Cdri-acuta, integerrimfl, glabra, angufta, flore duplo longior, parum colorata.

- Corolla Petal a quinque irregularia, quorum tria inferiora potentia ad anteriora curuata, linearia, acuta, marginibus reuoluta, vtrinqueglabra, intermediis parum latiora.

Fetala 2o fuperiora ad latera Tub poAeriora apicis germi adnata et cum prioribus verfus anterior em partem curuata, oblique ouata, bail conuexa, po flea plana, patientiufcula, prioribus parum breuiora.

Neftarium corpus truncatum ad bafiii dorlilobaturhj lobus adfeendens obuertif cordatusj Corpus exfinu cordis corniculatum, corpus truncatum femicincgens, coque duplo longius carnofum, cuncolor:

Propium ereftiim, cylindrico-coiilpreffurculum, laeue, concolor, oblique truncatum. Difcus feu apex foueola oblonga extrauatiis.

Squamula ad anteriorem marginem adnata (quod fingularis) teclus.

Squamul.1 orbiculata glabra, ulbicans, memSranucca pagina interior! concatia indudens.

Anther* gemins obuiffè ouatac feu clauatac, flauz, fubpellucidz, bafi connatac, minimx ac iimillimz antherarum contortarum.

Stylus nullus nili Neclarium, ad cuius dorfum parum infra difcum rim a oblonga, labiata, labia membranacca, albfi I

Pericarpium filiqua obuiffe ouata, angulofa, fcabra, femine hordei major, apice nedarii perfiftenti coronata.

Scmina numerofa.

Mo, 6.

Epidendrum Herba Suppkx minimal Rumpk

Parafitica radicibus capiilaccis, coiiprèfliufculis arboribus adhzrens.

Caulis nullus.

folia fafciatim coffrrtn enfiformia bafi invicem fe vaginantia compreffb-plana5 ad 7integerrima, acuta, vtrinque glabra, caruofa, digitum minorem longa.



Spicif terminates eJtvaginisfoliDrum balinudz, filiformes, foliis longiores, // floribus fclilibus verticillatis verticillo regulariter remotiufcute, licet in verticillis approximate colore coccineD.

Scapus infra flares, telés, glaber, braclcis rarioribus adfperfus, **ittra** flores flriis prominulis friatus.

Calyx fpatha folitaria infra germén fpadice adnatd) ereftiufcula, lanceolate acuta, glabra, membranacea, genuine longi or, parum colorata.

Corolla pctala fex, quórum tria exteWdtH pat^ntia, lin&ari-lanceolata, glabra, femipellucida, minus colorata^ quorum duo petala afiteriora, 3^{1n*} poffe* rius, duo interiora prioribus anterioribusincumbentia, parum latiora, magis cDilcaua & colorata, 6«»* pofferius eredtutn, bafilatum concauum.

Nectarium truncatum femi"-cingens, fuperius in lobo obuerve corduto ter* minatum.

Corpus truncatum breviflimutri minimum. Squamula alba tectum continetis antheras glandulace.ii geminas minutiflimas.

Stigma ad dorfum corporis truncati Infra apicem difci foueola oualis mi" nima.

Pericarpium, filiqua giobofa corpbre truncate pfrifflenti coronntum fulcatum . fulcis marginibus acutis triualuibusi

Obf. Habitat in fyluis denfiflimis ad arbores prsfertim minores, rara vsque && hoc tempus, tantum 6. Exempl. obftraui.

No. 7.

§j>idendrum Orchideum.

Paralítica radicibus filiformibus ramofis glabris, viridibus, triincis arbdruiti ^{arlnn-fi} adnatá.

Caules plurimi fimlices penduli articulati, fbliofi, flexuofi, vagihis foliorum vaginati, radice cralfiores, bipedales vel parum longiores & bafi parum tenuiores,

felia bifaria, alterna, feffilia, patentia (ndn horizontaliter) lateolata, inte* gerrima, acuta, cura contrác^ione ante apicern glabra, carnofa, rigida vir fcsquipalmam bnga et pollicem lata, kteviridia.

Vaginftubulofe, glabrae, nuds, ofe integerrimae longitudine interAitiarum vix pollicares, coriaceac.

Flores fupra folia parum oppofiti, plerumque folitariij ihterdum plures, patentes, feffiles, genuine infero pedunculati₄ magnitudine orchide-pyramidalis.

Calyx Spaths, ruga, cordate, parusr, fubcafnofx, flauicantes, caducx.

Corolla petala 5 lancedata, flaua, maculis obfeurioribus magnis pi(fy quorum duo fuperioraladfcendentia et intermedium ab inferioribus patens ma* jora duo lateralia magis verfus dorfum refixa, anguiiõra, omnia pagini interiori conuexa inferieri concaua.

Nectarium in disco floris bipartitum labium superius patens haustatum, apice superiori recurvatum et intra lacinias inferiores glandulz geminae superius connatae, inferius decurrentes ad alteram partem, purpurco-roseae, posterius cornutum cornu vix descendenti conico, acutiusculo, albo, genuine dimidio brevius. Inferior (vt in congeneribus,) corpus truncatum, apice seu disco concavum emittens superius labium lineare apice bifidum, subcarnosius, breve (vtzpe in congeneribus) quod stigma? pallido-album.

Stamen filamentum vnicum intra apicem labii adnatum, planiusculum, album eique incumbens et longitudine aequale.

Anthera globular gemini lateribus vergentibus fulculo diuisis, majuscula in concavitate corporis truncati incumbens citrinac.

Stylus nullus nisi labium antea descriptum. Stigma foucola concava infra labium & discum corporis truncati.

Obf Margines decurrentes intra labium haustatum formant orificium in cornu e cunctis, rigidi, coljrat[^], fzius roseae vel purpureae.

Pericarpium. Siliqua linearis triquetra angulis alatis incuruata, flori adfendens, pollice longior.

NB. Dixi in descriptione mea petala superiora, quae versus apicem plantae vergunt et inferiora versus radicem vergentia, inde etiam quod Nectarium cornu supra germen in linea aequali horizontaliter situm est. Sed dum plantae pendula est, omnia inde reuertuntur, si apex plantae pro fumitate affumitur.

No. 8.

Epidendrum Puffillum.

Radices capillares, rare, albae, arboribus adhaerentes.

Surculi fasciculati corticibus adpressi, parum ramosi, interdum articulati, inaequales, pithiamei, et vix lineas duas latiores, canescentes, virides.

Racemi folitarii raro approximati simplicissimi, erecti, empressiusculi, inferius nudi, versus apices denticulati, femipollicares, glabri, virides, ferruginei.

Calyx spatulatus folitariac, pedunculo seu racemo simplicissimo adnate, alternis, sessilibus, cordatis, acuti, carnosius, parvis, persistentibus, 5adg^l«».


Flores gemini erectiusculo loco Pedunculi adnati, alterni, patentes.

Corolla petala quinque Nectarium truncato adnata, erecta, linearis-linearis, acuta, Nectarium parum longiora, sequalia, flava.

Nectarium basi truncatum semicylindricum, latere superiori ex basi corniculatum. Corniculum adfendens, ovatum, inflatum, compressiusculum, corpore truncato parum longius. Disco squamula pedicellata, concava, bilocularis, rosea, anterieus membrana, acuta, alba, rostrata, minima, # reliqua vt in congeneribus.

Pericarpium. Siliqua teres, vtrinque angustius incuruata, glabra, vix pollicaris.

Plantula rara.



No. 9.

*Epidendrum Complanatum**

Radices filiformes plurimae longifunac viride albicantes, ramis arborum adhaerentes.

Caulis pierumque cum radicibus longis pendulus, teretifolius, foliis vaginatus, simplicis, brevis.

Folia alterna, sessilia, patentissima lineari-lanceolata, retusa, utrinque glabra pagina superiori concava, in inferiori carinata vix spithamea, carnosa.

Spicae foliis oppositae, pedunculatae patentes, compressae-planae, marginibus serratae spatheae longitudine foliorum, remotiusculae.

Calyx spatheae bifidus, alternis cymbiformes, compressae, acutae, carnosae, rigidae, persistentes, spicam strigatam formantes, singulas pro singulis flore»

Corolla fupera.

Germen inferum pedunculatum.

Tubus filiformis is, spatheae duplo longior flavus, quinquepartitus, perianthio quinquelobato-acuto, pediculis, junctis, flore tri-vel quadruplo longiora flava,

Guleae Nectarium Nectatio incumbens inflata ante apicem bilobatum lobis patentiusculis apice cornutum cornu erectiusculum, pagina interiori infra connatis lobis lingulatis, reflexis, parvis adhaerens dilato adnatis, coccineis.

Nectarium truncatum semi-cylindricum apice concavo album, membranaceum-oblongum, obtusum, concavum album-inclivum.

Anthrac foliaria oblonga, obtusa, fulco notata, magna, alba.

Ferocarpium?

No. 10.

Epidendrum Clavatum

pendenti proximum.

Radices filiformes plurimi arboribus adhaerentes, albae.

Caulis ad fila radicibus penduli, teretes, foliis vaginatis brevibus.

Folia alterna, sessilia, patentiuscula, lineari-clavata, apice bidentata denticulis inaequalibus, utrinque glabra, plana, nuda pagina superiori fulcra et inferiori prominulo notata, late viridia.

Spicae florum breves foliis oppositae patentissimae, pedunculatae, clavatae. Pedunculi teretiusculi, glabri, pediculis rarioribus coloratis adpressis, lignosis, vix longitudine foliorum, versus medium bifidae foliaria adpressa, cordata, glabra, rigida, bracteata.

Calyx spatheae plurimae alternis, pediculis, cordatis, acutae, dorso compressae, glabra, coriacea, singulis pro singulis floribus[^] #

Corolla genuina pedunculata hexapetala (minimè monopetala).

Laciniae quaedam patentes lineari-lanceolatae, subaequales, brevissimae, longae.



Sextum galeatum inflatum Neftario incumbens, apice cornutum, cornu eFchim oblongum, rotundatum, villofitate barbatum, album, rcliqua pars col ore aurantiaco tincluin,

Neftartum truncatmn ereftum magis concauum, apice ouatum, fubmembranaceum, album, Membrana oblonga, obtuiã, concaua, alba tedium, qua: continet Anthcram folitariam flauicantem.

Stylus clauatus paruus intra concauitatemNedlarii, quodtantumin nonnullis fpeciminibus obftuau,

Pericarpiumfiliquafiliformisftriatarulculo vtrinque notata, glabra, palma longior et liicain vnara in diaraetro cralfa. • •

No. li,

Lpidcndrum ftibulatum.

Parafitica radicibus filifurmibus plurimis glabris arboribus pendula albi5.

Caules iimplices erefti, teretes, glabri, vaginis foliorum vaginati, breues.

Folia alterna, erefta, fertilia fubulata, teretia, glabra, acuta, /pithameaj vangi nsc obtufx, marginatz glabra: punctis miniinis atro-purpureis adfperfa, (myjorcs vt in f oliis) breues.

Pedunculi ad radioes alierni, patentiffimi, terctes, glabri verfus medium,

Bra flea cordata adpre.Ta, folitaria braceati, colorati> fubrubi, fpica terminatè

Spica teres, ipathis braceisque fquamuis adpreflis, *obnata*, peduncuJo xnulto brcuior.

Calyx /patlia monophylla fupera cordata, lata, apice patens, fubglabra, carnoiii, periffiteis.

Corolla petala 5 lanccolata, patientiufcula, requalia, niuca; fexta galeata neftario fuperius oppolita, dorfo inflata, marginibus vtrinque lobata, lobis ap-pro.vimatis apicibus Ercdiufculis, hitco-aurantiaca ad apicem cornuta, cornu eredu III, oblongum, apice parum cra/Tius inde fubclauatum, tomentofum, luteuni,

Neftarium in difco iloris petalis iriferioribus cindium, femicylindricum, obtu- (um, glabrum, niueummargineapicis obtufi ebgantitime canineum.

Apexfquamulafuborbiculata eonuexa teftus.

Squamula membranacea dorfo marginis Neftarii arfle adnata, pagina exte- riori fulculo interiori diffepimento dinifa, alba, parum rofeo coloic ininiixta.

Anthen geminE feffiles corpore truncato, concauo, et fquamula membra- nacea include, lutez.

Stylus corpus truncatum, latere inferiori rima longitudinali, margine colo- rata, quod /ligma.

pericarpiumfiliquafiliformis, glabra, terctiufcula, vtrinque fulco notata, apico corpore truueatonunc incuruato coronata, foliis anguftior.

Limbus 2plex inferior cymbiformis patens ad basin, nectarium obtusum, quadripartitum includens. Laciniae dux laterales ex marginibus limbi parum prolongatae et ascendentes acutae, dux intermediae laciniae infra basin nectarii limbo adhaerens, approximate, erectae, lanceolatae, acutae, integerrimae cum apicibus lateralibus, longitudine aequales. Apex alter hujus limbi parum magis ascendens (cornuiformis) teres, inflatus, apice angustior et cylindricus ac rotundatus, priori multo longior.

No. ia.

Epidendrum *Nudum.*

Radices filiformes, ramosi, nuciformes, glabri, virides, ramulis arborum adhaerentes.

Caulis nullus.

Pedunculi plurimi simpliciter uniflori, teretes, lignosi, vaginis vaginati inde postea articulati pollicares genuine terminati.

Vaginae tubulosae dux vel tres, glabrae, membranaceae, ore obliquo pedunculis junioribus obaequantes, caducae,

Bracteae geminae ad apicem germinis adhaerens, subaequales, oppositae, patentissimae (non horizontaliter cum suis paginis) ovato-lanceolatae, acutiusculae, integerrimae, carnosae, glabrae, genuinae parum breviores.

Calyx nullus, nisi vaginae obaequante tubo adpressus, albus, tubulosus, brevis.

Corolla monopetala irregularis. Tubus erectus capillaceus, pilis adpressis, niueus, longus,

Limbus duplex inferior quadripartitus. Lacinia inferior cymbiformis, patens major. Apex inferior obtusus quadripartitus. Laciniae dux laterales ex apicibus limbi majoris ascendentes acutae duae intra hos apices verbi gratum nectario truncato adhaerens erectae, lanceolatae, acutae, longitudine priorum.

Apex alter cornuiformis, ascendens parum inflatus, teres, priori multo angustior, longior. Intra cornu limbus superior adhaerens, inferiori inclusus et descendenti procumbens versus supra corpore truncato junciformis, concava, apice obtuso, inquamvis antherarum tegens eoque loco flavus, coloratus, nigriculus. Reliqua pars membranacea alba.

Nectarii inquamvis ut in congeneribus et antheris {emiglobosae, geminae citrinis loculamentis inclusis.

Pericarpium, filiqua, lineari-oblongum, angulosum, striatum, parum in curvatum, longitudine pedunculorum.

NB. Interdum limbus inferior ad nectarium quinquepartitus, tunc lacinia intermedia latior; laterales angustiores.

Habitat in fylvis opacis,

*Epidendrum Tomentojum.***Parafitica.**

Radices filiformes, teretes, squamis obvestiti, flexuosi, ab uno bulbo ad alterum caespitibus anferinz, fibris fetaceis caespitibus emittentibus, praeterim infra bulbos, colore castaneo, postea ramificatis arboribus adherentes.

Bulbi supra radices caespitibus feffiles, obverse ovati, compressi, rugosi, foliis terminati, vix niagnitudine oui gallinacei.

Folia exbulbis plerumque 40*, rarius 2° vel 3" alterna, erecta, basi bifaria, bulbum femi-vaginantia, oblonga, integerrima, acuta, concava, apicibus recurvata, vtrinque glabra, nervis distinctis striata, carnosa, kteviria.

Apexradicis clavatus, articulatus, vaginis foliisque alternis bifariis compressis terminatus.

Scapi folitarii ex basi bulbi subaerigialiter pronati, erecti, basi vaginis alternis ovatis et oblongis 6 ad 7 vaginati, vaginis dense bifarie imbricatis. Inferiores (sc. vaginæ carnosæ) brevius, superiores superiores magis divergentes, longiores) acuti. Teretes tomentitate castanea terti. Bractea foliatarum vel duz alternis versus medium scapi bracteati. Pedales longi et penina anferina tenuiores.

Flores racemosi, distichi, subalterni pedunculati.

Pedunculi patentes, teretes, tomentitate castanei, involucri fimbriatis breviores. Bractea adpressiulz lanceolata, acuti, concava, membranacea, magis albicantes quam scapi, vix longitudine spatularum,

Calyx fimbriatus monophyllus infra pedunculum scapo *adnata*, genuine adpressus, lanceolato-oblonga, plana, marginibus recurvatis, septemnervi subvillosa dorso carinula notata carnosa, rubro-ferruginea.

Corolla fecunda 6 a Linnaeo petala 6, mihi irregularis ex petalis duplicatis. Exterius monopetalum naviculare ascendens.

Apex anterior rotundatus indivisus, posterior ascendens, tripartitus.

Laciniae 2" laterales oblique lanceolatae parum latiores decurrentes versus apicem anteriorem. Intermedia distincte lanceolata, omnes paginae exteriori tomentitate castanea anterior! glabra, vix pilis rariis distinctis, virides.

Petala interiora 3*, quorum superius in apice anteriori innatum adnatum decumbens, altero apice ascendens intra hincias exteriores oblongum, pagina superiori convexum, inferiori concavum, ante apicem parum contra autem feugustatum, apice rotundatum, tota alba, apice tantum coccinea. Reliqua petala duo dorso nervarii lateraliter adnata, posteriora erecta, lanceolata linearia, alba longitudine laciniarum exteriorum squamula, fed angustiora.

Neptarium corpus truncatum femicylindricum basi longitudine floris decurrens, postea ascendens petalis distinctis brevibus, squamula femiglobosa pagina inferiori biloculari distincta, concavum.



Anther* glandul* geminz margine dorfi filamento adnatæ intra concauitatem nedarîi loculamentisque fquamuk obtedbc, flauac, ouatx.

Stigma infra corpus truncatum.

Pericarpium, filiqua erefta, parum incuruata, clauara, teres, pilis ljneisqnc nudis, alternatim ftriata, corolla perfiftentc coronata, hepatici colore.

Obf. Habitat adtrunros arborum cum radicibus altiffiniè adfcendens.

No. 14.

*IEfidchdrum Bidcntattm**

Radices numerofæ inuicem leuiter complicate, filiformes, parum flexuofe, glabra, albicantes, virides, longiflimz.

Caulis vix v||us.

folia ad bafin inuicem vaginantia, terna *ve|4**TM**, 'nfa plura (quinque), enfi' formia, bifaria, feffilia, integerrima, apice bidentata, denticulis acutis vtrinquelsuia, dorlbneruo carinata, longitudine digiti majoris et digito ininori anguAior.

Scapus e'c axilla vaginz folii in/erioris lateraliter curuatus, patentiT?mus, teres glaber infra medium et ad bafin fmgulis vaginis ouatis, acutis, obfoletis breuibus aréte cinclus, pollicaris, fpicam gerens. Spica finplcx raro ad bafin tripartita feu duplex, pedunculo longior,

Rachis fpicac fubflexuofa, tercs, kuis, finguli flores patentes, germinibus parum declinantibus adnati, parui lutei, interdum pallidi.

Calyx fpatha monophylla germi arfle adpreffa, ouata, acuta, concaua, glabra, viridis, marginata germine dimidio breuior.

Corolla fecundum a Linne petala 6, (proprius quam multz aliz fpecies) infra nedarium germi adnata. Quorum duo lateralia oblique ouata, erefta glabra, luted, tria dorfum nedarîi cingentia, erefta, ex his duo *map's* lateralia lanccolata, 3^{rium} exterius latius ouatum. Omnia altitudinezqualia. gtum anterius verfus nedarium incUmbens apice fuperiori parum adfeendens rotundatum, altitudine priorum, interdum denticulis 3[^] notatum, & marginatum ac conuexum carilula interius decurrenti verfus cornu notatum.

Apex inferior defceti dens cofniculatus, rotundatüSj germine breuior,

Stamca, filamentum vnicum corpori truncato margini interiori adnatum, planum, membranaceum, album, breue.

Anthers globulz geminae pallidi, concauitate neflariî incumbentes. Squamula obuerfe cordata, diffeppimentia diuifiâ, alba, nedarîi dorib adnata, teiierri* rima membranacea, tedla.

Nedariumtruncatumfemi-cylindricufti, apice concauum foftca decurrens, vt in congeneribus, album.

Stigma foueoia rotundata infra apicem corporis truncati magnum.

Siliqua oblonga, anjulofa.



No. 11»

Epidendrum Lycopodioides,

Malacca, d. 5 Sept. 1779,

Radices rarioribus, simpliciter filiformes, tenues, flexuosae, scariosae, ca-
nescenti-virides, corticibus arborum mangostanarum adnatae.

Caules plurimi ad radices conferti 9 vel plures penduli, simplicissimi, foliacei,
compressi-plani, interdum longitudinem pedis superantes (quod tamen
rarius) ex foliis alterius bipartitis balli inuicem vaginantibus et dense ad-
pressis, patentibus, supra vaginas lanceolatis, acutis, parum margina-
tis, glabris, carnosis, pollicares,

Spici terminales, foliatis, pedunculatae, cylindricae ad apicem acaules, (spicis
lycopodiis similes, sed minus crassae) bipollicares longae.

Pedunculus basi foliis germinis adpressus vaginatus, teres squamulis cordatis,
margine ciliatis, teres, brevis.

Flores fertiles dense approximatae spatibus cordatis, ciliatis, adpressis membris
a-
caulis, pallide viridibus, ante efflorescentiam testibus caducis.

Calyx spatibus descripta.

Corolla, petala sex inaequalia germini colorata adhaerentia, quorum superius paten-
tissimum spicis adpressum ovatum, (interdum obversum cor datum) concavum*
vum. Duo lateralia superius reflexa versus dorsum superioris ovata, mi-
nora. Duo lateralia inferiora patentiora inferiori incumbunt ovata, acuta
minima parum crassa et inde magis colorata. Inferius patens, planum
cordatum, superioris vel summi parum minus.

Tota corolla colore aurantiaca.

Stamina filamenta nulla.

Antherae duae concavitatem necdarii truncati minimi albicantis inclusae, operculo or-
biculato, concavitatem diuiso membranaceo albicantis testibus.

Antherae oblongae callosae, magis quam corolla coloratae*

Pistillum germinis clauatum fructibus minimis notatum, infra florem concolor.

Stylus nullus.

Stigma supra corpus truncatum difformiter separato membranaceo concavitate
antherarum separatum.

Nectarium foveola oblonga margine callosa petalo superiori adnata, concolor.

Pericarpium, filiqua obversum ovata. Habitat etiam ad Ternarindos.

Obs. Foramina corporis truncati puluerulenta prominula apparent, fructibus
lycopodiis albedine minimi

No. 16.

Epidendrum Longifolium.

Species incerta cum anthera? necdarii incumbens

Radices ad furculos fasciculares, plurimae filiformes, flexuosae, corticibus arbo-
rum inhaerentes.

M ft



Surculi ad arbores repentes filiformes inzquales cortice albicante tefti.

Folia bulbis adnata, folitaria, fubpetiolata, eredla, lanceolato-retufa, margine integer rim a recuruata, vtrinque glabra, carnofa, rigid a, fragilia, palnia longiora et duas tertias pollicis lata.

Bulbi fupra fafciculos radicum ad furculos fecliles eosque bafi incumbentes, inde recliufuli folitarii, oUati, fulcati, rugofi vix dimidium pollice longiorcs, viride flauicantes.

Scapi folitarii ex furculis ad latera buiborum adnati, fimlices eredli, teretci glabri, fubarticulati, fquamis plurimis obueftiti. Foliis breuiores.

Squamx 4 vel 5 fcapo vaginantes, oblongs, a cuts, bafi tubulofe, fuperius parum iinflata:, membranacex, pellucidz, interftitiis breuiores.

Flores ad fummitatem fcapu fei pedunculi confetti plurimi ,germinibus loco pedicellorum adnati.

Calyx fpatha monophylla infra germen fcapo adnata, patens, incuruata, apice adfeendens, lineari-acuta, concaua, integerrima, dorfo rotundata, glabra, tenerrima, membranacea, alba, pe dirt ens, germine multo longior.

Corolla petaia quinque inqualia, quorum duo fuperiora approximata, lineari-oblonga, bafi fupra florem curuata, et hoc modo patentia, parum concaua, marginibus ciliata, neruis notata, pilisque minimis adlperfa, apicibus longiffimis pendulis (fzpius bipollicanibus) anguAiffinis colors ftramineo.

Petal a duo lateralia, eredla, oblonga parum oblique acutiufcula, plana membranacea, concolorea, parua, nedlario truncato vix longiora.

gum fei inferius, patens nauiculare, apice acuto adfeendenti, membranaecum, ciliatum, concolor, lateralibus plus 3plo longius.

NeAarium corpus truncatum calceolifonue partes fruffificationis, continens, difco floris innatum.

Apex adfeendens incuruatus obtufiufculus, callofus, carnofus, lutefcens, in cuius apice corpus antherae Jimillimum cum breuiffimo filamento albo adnatum, recuruatum inde nedbrio incumbens, haftatum, acutum, marginibus ubtufis, longitudine neflarii zquale, flauuni.

Corpus truncatum proprium femicylindricum, ereftum, marginibus fuperioribus mimbranaceo- album, marginatum, dorfo rotunda to, apice truncatum, tridentatum, denticuli hiterales prolongati, albi.

Squaniula dorfo nedlarii apice adfixa fubglobofa, corpori truncato incumbens, membranacea, alba, latere inferiori parum dehifcens, diffepimento paruo notata, continens antheras oblongas, flauas glabras, geminas paruas.

Fiftillum nullum nifi corpus truncatum. Stigma foramen orbiculare infra difcum corporis truncati.

Pericarpium fili^ua oblonga, angulofa.

OhC. Licet corpus antherzformc genitalia incumbens et omnino habitu antheris iimillimum, tamen cum omni diligentia polliniferum effe nondum detexi. Tern pore matutino flores radiatim expand, inde petala duo longa flricla eredto. Pomeridie pendula.



No. 17.

Epidendrum Fubdlum Veneris.

Para/itica.

Species 2^d» cum anthera? neftario incumbenti.

Radices filiformes, flexuofi fun pi ices.

Caulis*nullus.

Bulbi fupra radices denfe conferti, ouati, quadrangulares, paruni rugoli, magiutudine auis paff'eriſ.

Folia folitaria, fingula exfingulo bulbo, erefta, petiolata, Janceolata, oblonga, integerrima apicibus parum emarginata, parum recuruata, neruis obfoctisnotata, vtrinqueglabra, carnofa, rigida, palmaria longa, et duas5_iai pollicis lata.

Petioli femiteretes, canaliculati parum tortuofi, breues, duplolongiores, vtin Epidendro longifluro.

Pedunculus ad bafin bulbi lateraliter adnatus vaginaque cordata, acuta, ftriata, rigida, membranacea, longitudine bulbi adpreltus, fimpliciffimus, teres, lsuis, fupra bafin vagina a Item folitaria, oblonga, acuta, articulo folitnrio paruo adnata, bafi tubuloib, breuis, (vix lincas 4 longa) membranacea. Rcliqua pars pedunculi nuda vsque infra vmbellulam et longitudine foliurumzqualis, vmbella latcmliſ terminata; vmbella in femi-circulo credo, piano, in vna ferie florum dilpofita ex fioribus 6 ad cj.

Pedicelli erefti et patentes verſus apices ad vnum latus parum curuati, teretes, glnbri, colorati, bafi bradleati, genninibus vniti.

Bradlez lineari-oblongz, concauz, acute, membranaceſc, albicantes, finguls ftngulo pedicello adnatz, eisque breuiores.

Calyx null us ni/i brakes.

Coroflatetrapetala, in*qualis.

Petalum fuperius, ereclum, lineari-lanceolatum, apice bidentatum, ad bafin foramine ouato magno perforatum, ball cum marginibus reuergentibus poſtea connatum (inde parum tubulofum eſſe apparet), germini adnatum, fulculo longitudinali anteriori pagina in diſco notatum, album, bail fupra foramen colors purpureo coloratum, pollice longiusj petala duo latcralia, erec^a, oblique lanceolata, apicibus parum incuruatis, luteis marginibus recuruatis, ciliatis, pilis aureis. Nedlario longiura, colors fanguineo.

Petalum inferius patens, ouatum, acutum inflntum, neruis ftriatum, ciliatum, meinbranaceum, vix longitudine lateralium zquale, colore rubro luteſcenti.

Neftarium corpus truncatum cum apice incuruato adfeendenti, parum callofo, colorato, calcoliforme, adapicemadfeendens. •

Anthera? SeffiUs, haftata, acuta, curuata, genitalibus incumbens fubcarnofa, inanis colore fanguineo, apice lutea. Sterilis, corpus truncatum proprium inferius difco concauum, marginatum, tridentatum, dorſo femi-tereti, glabro, concauo.

Squamula femiglobofa pagina interiori difcipiento fubdiuifa, difco corporis truncati incumbens. Anthera gemina includens fubglobofa, lutea, parua.



Piftillum germen inferum clauatuin, friatum, glabrum, rubrum, paruun.

Stylus nullus nifi nectarium truncitum, Were interiori infra difcum perioratum, foramen orbiculare. Satis magnum, quod ftigma perforatum.

Pericarpium, Sb' qua.

No. 18.

*Epidendrum Flos aeris > vel Saaronicum**
Copiofe ad Tberocarj.

Radices filifomes infra bulbos ramorum ad caules fasciculatim confertz, caulinz, fubfolitarix, corticiblis arborum innatz, flexuofz, glabrz, lignolx, viride albicantes, nitidiufculx, mediocres.

Caules ad Cortices arborum fubfendentes Vario modo diuifi, comprefliufculi, glabri articulati interdum vaginis obibletis vaginati, ferrugineo-virides, longi, rarios numeroibs imittentes.

Ranii fimplices interdum in vnum ramulum dinifi, patetites alii fupra caules communes, ex bulbo pronati) albi, bulbis deftituti, parum incuruad, articulati, comprefliufculi, vaginati, caule multo breuiores, pedales, raro bipedales, rarius longiores.

Folia alterna fubbifaria, ad eorum vaginas feffilia, patentiflirna, lanceolata, planiufcula, pagina fuperiori leuia, leuiter ftriata, prxfertiin neruis quinque euidetioribus, pagina inferiori giabra, ad nerulum majorem fulculo longitu inaliter exouata, ftriis nullis apicibus emarginatis, carnofa, interfittilib geniculorum duplo longiora, rigida.

Bulbi ad bafin ramorum plurimorum caule pronati, interdum pedunculati, pedunculis breuibus, fzpius, przfertim in junioribus, feffiles eredli, ublongi, Rrticulis duobus vel tribus paruis transuerfaliter cindli et parum contradti, fulcis profundis fulcati, glabri, fufco-virides, fublignofi, interne tubulofi, humide ri-pleti, palma interdum longiores et craftitie digiti. Rani nonnulli bulbis deftituti.

Vaginz caulium vix vllz, nifi rudiment a neruorum a vaginis fuperañnuatis, Vaginz ramoruin fupra bafin aphylli tubulofz, arde adnatse, membranaccz, neruis friatz, obtufz, interfittitiis urticulorum fuperantes, cinerez, fuperiores foliis terminate, tubulofz, adpreltz glabrz, neruis leuiter ilriatz, ore obtufz, interfittitiis articularum longiores, virides. Vagiriz pedunculorum tubulofz, neruis ftriatz, rigidz, membranacez, ore tenuiores, cinerez, interfittitiis articularum breuiores.

Racemi terminales fimpliciflimi interdum ramo longiores (fesquipedales, fed raro.)

Pedunculus communis, ereAus, parum curuatus, et ab articulis parum flexuofus, compreflus, vaginis antea defcriptis tectus.

Pedicelli bafi vaginati, iolitarii alterni remoti, fimplices, ereftiufculi, teretes, bafitenuiores, glabri, colorati, niuei, longitudine dimidii, interfittitiis articubrum & vaginis plus duplo longiores germinibus inferioribus patentiacuruatis terminati, inde florej iutantes.



VaginS fiduini feu fpatha: fupra articulos peduicili adriatz, fili'tari*, fdliiles adpreffz apicibus, parum ad vnum latus alternatini curuatz, ouatD-oblongx, tubuiofz, apicibiis bi-vel tridentatac ex variis fqlidtnis exterioribus obfoletis, rigidis, vix diuifis, FugDiis, cinerafcntibus, interiori vix brevioribus.

Squamulz intermedia, membranacea^ ferruginefc, paruz, fenribfaE) intetiofe^ membranacez, tubulofz, acutz, glabrx, ferruginez, vix fupra exteriorcs prOiminulz.

Corolla iriegularis cymbiformis quinquepetala, nUtans. Petalurti fuperius majus fupra germen adnatum, haftatum. Laciniz dus fuperiores patentifflinae (tempore dumflos expanfus) laneolatsc, verfus apices parum obliqvarj-acuta, longitudine dimidii petal! fupeirantcs, margines parum incuruatac intcErrimac(indeconcauitas corollz), apex defcendens, lineari-oblongus, cdncauuS) antb aplcem parum inflatus, apice acutiufculo callofo, paruni flaiiD, lateri inferiori piano, tricarinato, carinis rotundatis reliquis omnibus petalis plus duplo majus. Petalum 2^{dum} apice priori concauitate an« Itaturti, mafgiilibusque fubinciufum interiori parte fldris, heftarioqUe reiii^ Cumbens, dupliciter cordatum, ifldc transuerfale bifidum, inferior pars obcordata, vnguiculata, marginibus integerrimum, lobis fotUndatis tenerrime denticulatum in finu hujus altera feu fuperior pars cordata acuta, eredia, marginibus trifpata tenerrimS denticulata inferiori vix dupb minor minus coricaua, ex UngUe linea lata longitudinalis quadri-fulcata, verfus diuifuram pctali lines papillofz feu denticulate, magis Cdbrati, flauac, ante apicein fuperioris partis evanefcentes, callofa, Pagina aneriori flauicans, exteriori alba, Petalo inferiori breuius cdducuii. Rtliqua petala 3* inferiora approxiinata tempore floreudi pa» tentiffima apicibus parum recuruata, lanceolata, acuta integerrima, quorum duo lateralia interius intermedium, exterius genuine adnata, magno petalD dimidio brcuiora. Oitinia tDtA niuga [exceptis locis ndtatis.)

Nefbrium corpus truncotum parum oblique deuatum, emittens verfiis apicem defcendentem corollz coriuiformis nefuos g callofos in apicem eorolJi multo craffiores) przfertim intermedius, magisque coloratus, flauus.

FrDpfium femi-cylindricUrii, breue, difcD cdncauo matginato tridentato laterb anteriori: Labiorecuruatolabiatumjdenticuli laterales, anguftiores, Jongiores, dorfalis latior. Membrana galericulata difcum tegens, apice dorfaai ne'^arJi fulculoque adnata, alba, latereinferiori cDrpufcula duo otlonga, longitudinaliterfulculo minim0 diuifo adnata, umnino andierxfor'' mes, flauicantes, partiales glandulas antheriferas incumbentes.

Glartduk antherifera concauitate difci incUthbentes, foluts*, oblongst, glabrz, callofz> flauZ) fatis magnz.

Stylus nullus nifi foramen infra iabiuii nctarii, fapius liumiditate fepletum, quod ftignu poptium lutefcens

Peric arOiuert. Silidud oblongd ijuinqueailgularis angulis inzqualibus glabrt, craffitie digiti. Lateraliter dehifcens 3valuis, Semina puluerulento-lutea rpleta¹.

Habitat ad Therficarpum, aliasqM arbof es,

Obf. Floret tempore matutino port meridiem petala recDnclufa, multosquB dies fie permanent, *tam* petalum curnu neftarii innatum foluminodo caducum.



Epidendrum Plant'-aginifolinm.

Parafitica.

Radicibus fibrosis, flexuosis, arboribus adhzrens, acaulis.

Folia bifaria inuicem vaginantia erefta, lineari-triquetra, fubcanaliculata, accl-
tiufcula, glabra, carnofa, bail ad vaginas angufta, vix bipollicaria, et It-
neas duas craffiora, carnofa.

Vaginae membranacex, friatae, margin n tar, glabrz, latitudinc foliorum zquales
breues.

Spica ex axillis vagina rum foliorum intermediomm, fimpliciffima, peduncu-
lata, bifaria, erefta, foliis bngior.

Pedunculus eredlus, glaber, comprefsiurculus, ad medium articulo notams,
bradlea majori oblonga, acuta, membranacea, caduca cindhis. Superior
bradeis alternis minoribus 2 vd 3. caducis bradkatus.

Flores pedicellati, pedicellis alternis breuiffimis bafi inuolucrati; inuolucra lan-
reoljta, ouata, acuta, folitaria, adpreita, membrynacca, albicantia, pe-
dicidiis multo longiora —

Calyx nullus nifi inuolucrum.

Corolla hexapetala; petalcrum tria exterior a majora, omnia paten tiufcula, con-
caua, membrmiacea, albicantia.

Kedlarium corpus truncatum minimum membranainflata, femi-globofa, difco-
tedium.

Anthers duae didymz filamento folitario adnat^.

Pericarpium. Siliqua ouato-oblonga, obfoleteangulofa glabra; iemina nume-
rofilima alba, cap ill'is feu fibris tenuiffimis elailice mouentibus, longifThne
disjefta, quod in hac fpecie fingularis.

Obf. Habitat ad fummos ramos arborum altiffimarMm in fylua prope Tting in
Vicia vrbis Malacca

Efidendrum Seffitc.

Caules fcandentes ad ramos arborum ramofi, teretes, filiformes, fquamulis ri-
gidis, fcarrofis, friatis tedi, Squams ouato-oblongs, acute, adpreifr,
paruz.

Folia fparfa ex bulbis feffilibus pronata, patentia, fubpetiolata, apicibus retufa,
pagina (uperiori glabra, parum canaliculata inferiori conuexa, carnofa,
vix pollicaria & lineas tres vel 4* lata, luteo-viridia.

Flores ad caulcin intra fquamas germine infero tantum pedicellati, geminati,
cauli approximati, parui, (rarius fglitarii).



Calyx. Squamula ovata, acuta, carinata, infra corollam germini inferè adnata. (a reliquis squamis plurimis germinis distincta), inflata, membranacea, alba, brevis.

Corolla petalii 5, quorum 3* exteriora, erectiuscula, ball ovarii, apicibus prolongatis, inferiori parte longioribus, fubaristata, longitudinexqualibus, albicantia, rigidiuscula.

Petala 2o interiora lateralìa ad latera nectarii adnata, erecta, ovato-oblonga, iritegerrima, apice rotundata, plana, membranacea, alba, parum transparent, exterioribus multo breviura.

Petalum 3^{tium} interius ad apicem superiorem nectarii adnatum, adscendens, lanceolatum, recurvatum, parum canaliculatum, recurvatum prioribus 2obui interioribus longius callosum, lutescens.

Corpus truncatum (vt in congeneribus), sed minutissimum, album, operculo, quod squamula campanulata, dorso nectarii adnata, membranacea (in proportion e) albo tedium, continens antheram didyuiam globosamj callosum, flavam, elasticè prolitentem, parvam.

Pistillum germen inferum lineare-oblongum, parum angulosum, altum, flore brevius, squamis plurimis oblongis, acutis, adpressis, membranaccis, albis germine brevioribus, obvolutum.

Stylus nullus.

Stigma foucola infra discum corporis truncati.

Pericarpium. Siliqua parabolica obsolete triquetra, glabra, pama, Semina, vt in congeneribus, numeroia. Habitat ad fummitatem arborum minus frequens.

Obs. In nonnullis exemplaribus arifl* petalorum sunt flavicantes et pctalum apice acuto adscendenti nectarii adnatum, saepius ad apicem minus acutum est.

Operculum nectarii maturitate elasticè refilit, et antheram projicit, vt interdum foueola stigmatis incumbit. Radices hujus plantae fibrosae, numerois, albicanti-virides, cortices arborum intrantes, rigidiusculae.

No. 21.

Efidendrum Liliifolium,

Parafnica.

Radices filiformes flexuosae, albae.

Bulbi plurimiconferti, ovati, angulosi, fulcati, pallide virides, foliis duobtis, raro tribus, terminati, magnitudine oui alaudis.

Folia ex bulbis pronata et raro plura subpetiolata, basi erecta, apice patentiora, lineari-lanceolata, acutiuscula, vtrinque glabra, dorso nervo carinata, membranacea, vix rigida, obscure viridia vix sesquipatmas longa et lineas 4^{or} lata.

Pedunculi KOidprcfl Tulculo profundiori diuili vtrinqe ad apices obtufi, mēdie anguftiori cum articulatione a fuliis diJtindli> breucs.

Scapi ad bafin bulborum pronati folitarii, erectiufculi bafi propria parum craffi et quail bulbo vagitiati vagina folitaria, fcariofa, albicanti, breues filiformes, teretiufculi, laeues articulis duobus, interdum tribus, notati, vaginfsque breuibus ad articulationes oualibus, fcariofis, menibranceis, fcmi-vaggiati, vix pedem longioreS| obfcure virides, intra flores flexuofi, anguiofi,

Racemus fimpbxfuLfpicatus.

Fibres minterbfi ig ad 3c*B pedicellati Venrdli, infeiores infertibiorcs, rummi magis apprdximati (inferius polliceni vel magis dilantcs, fuperiores vix longitudine florum inuicem remoti, altctni.

Pedicelli cum germine tecuruato denticulo.pedunculo coinmutii adnati, tefetes *labfi, p&fum colanfti, bafi braclcati, germine infero vix longiores.

Brafca iblitaria bafi pedicello adnata, adpreffa, cordata, ncuta, membraftacea, alba, parua, prxtcr has fpathz feu calyces nullx.

Corolla ptfala e'rteriora 4^{to} patentiffima^ quorum inferius et fupeffhis lihearua acuta, apice parum incuruata, conoaua, difco lateralia latiora, ad apices rotundata, concaua, magis colorata purpurea, omnia longitudine acqualia, iubcarnofa, ad apices purpur^ra; reliqua pars albicans.

-Limbus inftriolr feu nctarii prtiffaluf, bafi tubuhbfis, inflatlis, latcre'Jlz-priori planus, dorib feu laterc inferiori conuexus, poflea contmciior ad medium lacinia L-reda, bafi parum cum canicula adfcridens obuerr cor^ data, plana ex finu, lobus erectus, lanceolatus, pianus vix inferiori kuior, verfus baiin lobi fuperioris et linum in difco carinulx gemina:, femi-cordatz, approxiraat?, longitudinaliter decurrentes, promimike, coloratt, purpurex, vt reliqua pars difgh Continuatío limbi canaliculataj ac aLaciuia priori parum remota, glandule ex niarginibus limbi canaliculatae, vtrinqe pronati, eredte, ftriati, geminz, pedicellatz, clauatz, teretes, Ixues, balifufco-puypure^ apicibus flauicantibus callofk, latinia adfeen-denti 5^{rfafc} partis breuiores, poftea caflalcula parum prolohata In lacinulas duas flpproximatas efeelas, acutas^ albicames, glandulisque pedictllatis, parum breuioribus diuifa.

Canalicula jam defcripta, rigida, callofa, fufco-purpurea^ tubum ftyli includens,

Corpus truncatum vix vlluni, nifi rudimentum, cujils loett carnicula erefta, in-tta glahdulas et lacinias apicis difco canaliculi adnata, erefta, compreff^, acuta^ apice incuruata (verfus apicis lacinias), rigida, alba^ ancicc fblco foramineque intranti diuifa, laciniiis apicis vix brcuior.

Stamen fibmentuni nUllulu nili pedkelluS dapillaceus, tenferrimus, albus, pel* lucidus, glob'ulo ininimo albo intra apicem carniculz incumbens vix ad-fixus altero apire intra lacinias apicis, canaliculi glandulas geniinas anthe-irifcras lanceolato-oblongas, acuMs, compreffas, opptoxiuatas, calloihg; fliUKiSp temiinatas ;vtin congeneribus)* -

Anthra membrarid caiyprzfofmis ante efflorefcēntiam tēta, poftea elj-ilicc membraua exfilieus, fxpius cum anthera ^initio conglutinata, &

fttturitate elastice feparantes, nil! quod pedicellus torriu adhzferis impedinientuui piodmdt.

Calyptra obliqua c'onica interior diflepimentulo hptata luteo - albicans minima pedicello tenuifilmó rudiment© neftnrii atffixa FragilS pedicellatá.

Stylus nullus nihi conicula totius nēchrii.

Stigmā riniula cūm Ifouēola intra cotnu d efcipfūm.

Jtericarpium: • Siliqua obuerte ouata^ obfolcte triquetra, fulcisque tribiis rte-
tatpj fubglabra, pollice breuior.

Obf. Habitat intra axillas raaVorūm arboriim, Throcarpo, aliisque arboriblis minus frequens.

Nō. 21.

Epiitndrum Galee o lariat,

Terrēstre fl. Niueo.

Radices humurn repentes, horizon tales terctes cifigulis annukribus r^mō-
tis cfnclz, albz, cmfTitie pennz cygni. Fibms ad articulationes numero-
fas filiformes, hinpliciifiiiias, flexuofa's, fafcicuktim etiiittentes craltitid
fili groffioris.

Gaules plurimi remotiusculi, fimlices, erecti, teretes, fupra radices et port
medium, vaginati, compieflufEuli^ lxues, articukti, interfittis folio dimf-
diid breuioribus 3adtetrapedales longi et pennz anferinz dimidio tenuiores.

folia patentiaj bifaria, fcfilia in vaginis dcfinentia, oblongo-lanceolata, intē-
gerrima, aplGeparum oblique eiiMrginata, pagina fuperiori kruia, nitid^,
iriferJori gtabrii, ncruis 9 vel 14 ftriata, ngida, inferiora, breuia, latiora,
fuperiora interdum palnia longiora, vix pollicem latd.

Vaginae caulēm arfte obiolutentes articulis adnatx, inde m'emDranaces, firiataj
Vtrincjuē carinulis decurrentibus dorfo folio et latere oppolito notatz, ore
obtufo, dertticuloque folid oppofito fDitarto ftVargine Dbiufufculo den-
litulatO: Interfittis articularuin parum breuiore. Vagina: radiculs c!
infra medium caulium, poftea vsque verius apices foliis deftituta: ori femU
ouatz, apiceque dorfu carina terminate. Reliqua p»rs priotuiii limillimá:

florēs tSfmihales fpadicibus 2^ vel 3^3 alternis compreffis marginibus bifarie
denticulatis, flexuofis, nudis, (feu fpatiis d&ftitutis) ciiri 'geuine ail-
nati. DenticuliprominenteS) acuti, cuncaui, marginnti, marginibus fpa*
dicem lateraiiter lilpeřincludentibuš, membranaceis, breuillimis;

Galyx przter denticulos nullus:

CorollapetalaS, quoriim quinque exterioralahctolata, àcuta, intēgetriniij ere<fli-
longitudinezqualia, ex his 34: exteriora pagina exteriori minus niuea, i<
infra bafin neftnrii adnatfl, magis niuea, nerueque femipellucidb notat^,
tenuiora vix minora.

Petalum neclarii oppofitum 6^{lum} interlus feu liinbus heflarii, latum, apieg
3fidum, difco ad bafin inflatum, carniufumj ad apicem feu kcinia inter-
media diico rugofa, carnoib, flauo.



Lacink duæ laterales, erectz (inde difcus labii concauus), femi-ountz, membranacex, coloratoe, ftriis purpureis approximatis, intermedia: niulto breuiore. Lacinia intermedia, planiufcula, carnofa, marginata, marginibus membranaceis, parum purpureis reliquis petalis breuius.

Nettarium patens cymbiforme, oblongum, marginatum, apice retufum, dorfd carinatum, carnofum, rigidum, iiiiueum, petalis exterioribus vix dimidio breuius.

Stamina filamenta dorfo corporis truncati vix vlln.

Antherz gemina; diftindlc, ouAtx, inflatz, opcrulo feu'membrana cOrdatà, muea.

Stigmaque obcludens plana adnata, mcmbkana altera latere fuperiori femi-te- & fatis magnx, aibs (non callolsc). .

Membrana antheras femitegens, apice neftarii intra emarginationem, cum pedicello breuiflimo piano, niueo adiiata, antheris incumbens, campanulata, emarginata, membmircea, interior locuJamuntis 2^{bu}) diuifa, minus linea» amheris vix duplo niijor.

Pi/lillum germen infcrum, teres, ftriatum, flore dirnidio breuius, corpus truncatuni ad apteni nedarii adnatum, parum prominulum, marginatum, marginibus bifidis, infra concauum, album.

Stylus intra neftarium.

Stigma infra antheras foramen triangulare operculo membranaceo jam defcripto tedium, fatis magnum.

Holes narcifis albis majores,

Obf Habitat in fyluis opacis locis humidis, cum floribus 6 excixiplasia, et line flor. 20 vel plura repern

Habitat in ncmorofis paludofis prope Malaccam. —

Tdung - Seylon, A. 10 Jan» 1780.

No. 23.

Epidendrum Ft. acrij?

ScandenS ad arbores vario *mpdo*.

Folia ex bulbis, interdum plurima ouato-oblonga, acuta, plana, carnolb.

Scapi ad bafin bulborum pronati, folitarii, interdum gemini, bafi vaginis ouatis, inflatis, nudis, membranaceis plurimis vaginati, tomentolitate niuca obdudli, raro pedales, fzpius breuiore.

Flores fubfpicati, folitarii, alterni, remotiufculi, ad germina infera feffiles, fpathacei cymbiformes.

Spatha: ad bafin germinorum ouato-oblongz, acutz, apicibus prolongatis longitu dineflor urn integerrimae, neruofc, pagina exteriori pilis albis pilolk interior! nuds, meinbranacez.

Calyx nullus.

Corolla petala 6, quorum tria exteriora infra Neclarium fupra germen con-
nata, lanceolata, acuta, integerrimaj pagina exteriori lanugioe niuea
obdudta, interiori nuda, neruofa, flauicantia, maiora.

Fetala duo .id latera Neftarii verfus apicem truncatum adnata, ere&a j lanceo-
lata, acuta, vtrinque glabra, lutea, minora.

Petalum 6^{tu}m fupra baiin Nedhrii adnatum eoque incumbens dupliciter cor-
datum, lacinia bafis cordata, integerrima, concaua, difco callofo - carno-
ia, punftis ftriisque fufco-fanguineis parum adiperfa anteriure parte pa-
rum maiur, glabra.

Lacinia exterior ex firm prioris obuere cordata, acuta, margine repando
fublobata, concaua, difco callofo carnofa, verfus apicem callofitate in-
zquali feu glandulofa, glandulis difformibus albicantibus, Reliqua pars
magis quam prior colorata, fufco-fanguinea.

Neclarium pruffratum limbis maioribus adnatum, lineare ad apicem parum
adfcendens, lineare glabruin, album, callofum.

Apex. Corpus truncatum erertiufculum, concium, bilobatum. Lobus
dorfalis, obtufiufculus marginatus, anterior femirotundatus, margini-
bus parum coloratis, galca membranacea tcclum.

Galea oblique conica, interior cum Plica intranti loco difpimento
• bipartita.

Stamina fiamenta *oQp* breuiffima, tenuiffima inuicern connata.

Aiitherae oculo pariter connatz, obuere ouatae, planz, *fads magnx* et diAinflsC,
flaux, callofe, licc<ndo pollen fecerentes.

No. 24.

Serafias Epidendreae.

Radix. Bulbus fupra terram clauatus, bad obtufus, Tula's longitudinalibus ro-
tundatis fulcatus futuris transuerfalibus tribus, raro pluribus, interceptusj
nicmbrana fcariofa, alba, przfertim ad fummitatem teflus, obfcure viri-
dis (onmino vtin Epidendris), foliis enfiformibus fafciculatis terminatus,
inferius emittens fibres nonnullas fimlices filiformes albicantes.

NB. Craflitie bulbi fesquipblice craflior.

Folia bafi fafciculatim conferta, pauca, erefta, liireari enfiformia, apice acu-
mine prominulo acuto, integerrima, glabra, neruo kui carinata, vix
pede longiora, late viridia (now carnofa).

Scapus ad latus bulbi verfus medium pronafcens, folitarius, erecluc, teres,
articulatus, glaber, verfus fummitatem ad articulos flexuofus viridis,
intra flores obicurior, maculis oblongis albicantibus adfperfus ad articu-
los vaginatus bipedalis crafliaA flranunis hordei.

Vaginx folitarix, ereclsc, adpreffe, ad bafin fcapum tantummodo cingentes,
oblongz, acutz, membranacei, fcariofz, interAitiis inferiores vix polli-
cares, fuperiores paruz, nullo modo fcapum cingentes, patientiores.

Braftez feu Spathz fummis inuolucris fcapi fimiles, infra pedunculos adnatz, adpreflz, ouatz, acutz, integer rims, minus membranacez acprioses et parum minus coloratz, paruz.

Racemus limplex fcapum terminans vix fpathrtnéus ex floribus alternis remotiufulis- ad flexuras fcapi feu pedunculi communis adnatis.

Pedunculi partiales fulitarii patentiufuli, breues, triangulares, glabri cum articulatione Fedunculo com muni adnati in germine infero terminati.

Calyx nullus, nid Braftez defcriptz.

Corolla petala 6, quaruni tria exteriora partem fuperiorem floris femicinigentia, patentiufula. lanceolata, apicibus acutiufcula, et recuruata, in-
 , tcgerrima, neruis rubro-fufcis ftriata, lineisque talker fufcis conuerfalibus parum inde reticulata, interioribus parum maiora, fufco-viridia. Fetala duo interiora etiam laterc fupcriori cum prioribus adnata, approximata, credla, apicibus parum repanda, neruu/a, reticulata, vtintxte* rioribus, fed viridiora.

Fetalum fextum feu Labium Neffarii reliquis Omnibus oppofitum ereclum, -obuerfe cordatum, concauum, dorfo planiufuluni, vix recuruatum» rigiduñ, neruo notatum, lateribus vtrinque incuruatis, membranaceis, venis oblique transuerfalibus obfcure viridibus pidlis marginibus repant* dis coloratis, roièis.

Ex Sinu cordato lobus iterutn pronatus, obuerfe cordatus, margine repandus, apice incuruatus, ante apicem pagina interiori fibrillis curua^ tis, coloratis fibriflatus, neruisque tribus prominulis decurrentibus coloratis, rofeis neruofa; reliqua pars huius lobi magis albicaus, quam infe^ rior, quz tantum lztius viridis «ft. Longitudine petalorum exteriorura aqualis.

Poftea ad bairn emittens Ne^ariura carniforme ad apicem recuruatum, retufum, comprefliufculum, pagina fuperiori carina notat»in, inferiorique glabrum, breue, viride.

Stamina, filamenta vix vlla.

iVntherz geminz ad apicem ftyli adnatz, approximatz, operculo tedz', Tub* globofz, flauz.

Operculum ad apicem ftyii cum filamento breui, planiufulo adnatum, obuerfe ouatum, concauum, apice coronatum, corona bidentata, rofeaj membranaceum, caducum.

PifillLUTI, germen inferum curuato-eredlum, clauatum, obfolete triquetrum ad latera fulcuhs duobus notatum, glabrum.

Stylus ex difco floris neftarie vnitus cymbiformis, lineari-oblongus, labio neftarii oppoiitus vfque verfus apicem parum concauus, dorfo rotundatus, inde carnofus, ante apicem multo concauior inde femiperforatus, fup prior diffepimento tedlus, vnde anthers adnatz.

Apex acutiufculus loco operculi. Labio neclarii fine lobo longitudine zqualis, viridis.

Pericarpium. Siliqua oblonga, (vt in congenerilms).

Obf. Habitat in aridis et montofis prope Madrafs ac Trangambar

Sumtibus S. L. Cruftii impreffi funt:

- I.; C. G. Bautngarten flora Lipfienfis* fiftens plantas in agris circui Lipfici fponte nafcentes etc. fec.
 Syftetna feuale reuifum atque emendatum, cum IV. Tabul. 8- me). 1790. 2 Rthlr. 8 Ggr-
 idem liber cum Figuris ctloratia 2 Rthlr. 20 Ggr-
1. M. Bechfteins gemeinmützige Naturgefchichte Detitfchlands, nach alien 3 Reichen. Ein Hand-
 buch zur deutlichen und vollftändigern Selbftbelehrung befonders für Forttmänner, Jugendleh-
 rer und Dekondmen, mit 17 Kupfern. gr. g. 1789- 2 Rthlr. 20 Ggr,
 Diefelbe mit illuminirten Kupfern 4 Rthlr.
- I. L. Filcheri Delcriptio anatomica Neruorum Lumbaliuitij Sacralium et Extremitatum inferiorum)
 cum IV Tab. libenribuj et IV adumbratis, fbl. maj. 1791. 8 Kthlr.
- C. L. B. de Gcer Gmera et fpecies infettarum a generofiff. auEionis fcriptis extraxit digeffit, lat.
 quoad partem reddidit, et terminal Dgiam infeft. LinneariBm addidit'A. I. Retzius, 8 maj. 783- 12Ggr«
- I. Hedwigii Fundamentuuhiftoriae nnturalis fnufcorum frondnforum, concernens eofum flores^
 fructus, feminem prnpgatiDnem, adiefta generum difpofitione methodica xconibus illuftrat.
 2 Panes, 4 maj. 787*_p 4 Rthlr. 12 Ggr.
 Idem liber cum Figuris coloratif 7.Rthlr.
- G.F-Hoffmann! Hiftoria Sail cum iconibus illuftratn. torn, I. Fasc. I-IV. et Tom. II. Fasc. I *
 foLmaj. 78?-791- 5 Rthl. 8 Ggr-
 Idem liber cum Figuris colotnUs 1; Rthlr. IB Ggr-
- ^ ^ ————— Plantae lichenofae delineatae et defcriptae. Tom. I. Fasc. I - IV. et Tom. IV. Fasc. 2
 cum Fig-cobratif fol maj. 789 - 791. 17 Rthlr. 12 Ggr,
- N. G. Leskens AnFangsggrinde der Naturgefchichte, ir T*heil. Allgeitleine Natur- und thier-
 gefchichtè mit izKupf. ate Auflage. gr. S. 784, 2 Rthlr.
 Diefflbc mit illuminierten Kupfern 4 Rthlr.
- C. iLinné PUNtarum rariorum horti Upfalienfis Defcriptio. Fasc. I. fol. maj. 767- 20 Ggr
- F. Ludwigil Icones Cautaturti thoracis et abdominii a tergò nperiaruin cuin Fig. fol. tnaj. 789^
 16 rjgr.
- ^ _ - ———. DcleQus opufcolorum ad feientiam naturalem fpeflantiüm. Vol. I. cum Figur.
 8 maj. 789. I Rthlr. 20 Ggr.
- S. Llimnitzeri FloraPofunienfis exh!bens plantas tirca Fofonilim fponte crefcentes, fecundùm Syftemi
 Sexuale Linnearum digeltas, cum Figuif. 8 maj. 791. 1 Rthlr. 12 Ggr.
- D. F. MUUm Hydrachnae, quae in aquis Daniae paluftribus detexit, defcripfij p'ngi et labulis
 XI aeneis incidi curauit. 4 rriaj. 781. a Rthlr. 12 Ggr.
- Pennants nBrdliche Polarzoologie. Aus dem EngliTchenj 2 Theile, rnit den engl. Original-
 kupfein. gr. 4. 787. 9 Rthln
- A. I- Retzii Obferaaiones botanicae^ VIFaïciculij cum Fig. fol. maj. 778-791. 5 Rthlr.
 Idem liber cum Figuris coloratis 8 Rthl. 16Ggr.
- I. C. D. Schreheri Plnntarum verticillatarum vnlabiatarum genera et fpecies. Cum icons eenea.
 4 maj. 774. .. 16 Ggr,
 ————— de Phafco Obferuaiones, quibus hoc genUs mufcorum vindicator atque illuRra-
 tur§ cum Tab. aenea 4 maj. 770. — 6 gg.,
- ^^ ————— Befchreibung der GraTer/nebft ihrer AbbiMung nacli der Natur, Iten Theili 1 — 5te
 u. 2tenTheils 1 — jteAbtheil mit fchwarzen Kupfern. gr. fol. 1769 — 779, 7 Rthl. 2 Ggr.
 Diefelbe mit illuminierten KupYern 11 Rthlr. 8 Ggr.
- ^ ————— Befchreibung derQueeke, nebft ihrer Abbildung nach derKatur. gr.4. 772. 6 Ggr.
- f. C. P. Werneri vermium intefitnflium praefertim taerliae humanae breuis expolitio, IV Fascicull,
 cum Fig. 8 maj. 782-788- 2 Rthlr. 1 Ggr.
- et C. G. Felleri Vaforum idElcorum atque lymphaticorum anatom. phyfiol. de-
 fcriptio, Fasc. primw. cum Fig. 4 ihaj. 785. 1 Rthlr. ia Ggr.




Fleritiera Allughas.

Caracas, Julio 1830.

1
1
1
1
1

Retzū. fasc. VI.

Tab. II.



Inih'artera tt'nivfia.

Wm. Miller del.



Schrebera albens.

Retzii fasc. VI.

v



INDIAN BOTANIC GARDEN.
LIBRARY.

PROCESSED ✓

ACCESSION ✓

CATALOGUING ✓

CLASSIFICATION ✓

DATE 16.7.64. ✓

ir

