


Indian Botanic Garden library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA.

CLASS No. 5.81.9 (922)

BOOK No...BLU-F

ACC. NO-B:: 19.78.9

FLORA *JAVÆ.*



FLORA JAVÆ

NEC NON

INSULARUM ADJACENTIUM,

AUCTORE

CAROLO LUDOVICO BLUME,

men DOCT.MmMIKIm* IIVKSTISATOMIIK COLON in un ro i^m^omisTiLis MQH in n UNO! rn mam,
PLURIUMQUE SOCIETATUM DÖCTORUM SOCIO:
HIMTI linTiMa iniLuniEMIII PBCCTOU, DUTIL UOO IUTKMIII. KDIU, • « — « — • MI

ADJUTORE

JOANNE BAPTISTAFISCHER,

ADJUTONE

CUM CUM TABULIS LAPIDI ÆRIQUE INCISIS



BRUXELLIS,

SUMTIBUS LIBRARIÆ J. FRANK,

TYPIS H. REMY

MDCCCXXVIII.

1828.



Majestati Regiae

Guilelmo Primo

Potentissimo Augustissimo
a

Batavorum Regi.
a

(D. (D. (D.

Auctor.

*Historiam cunctas artes liberales
innenuasque quum, <J LOCIUX/ D JLCC Majestas patrocinio
phacui/, u/ cowhuwiari, uile /xufe4ttUM7i> ratio AnūMca, /MWM
justo mwiut. mdcbMtſu, mi, /ucevn, /w*ofaañ&refifi?/ l^uoarca
nutu, DWO Jſawa auo&ue, az c//cd ſu??tae cteiAwma, ad auaaoſ
lustrid i/Mae, auam, TTtaaxmd ſuicaenfid eſ /tedu/tfate &a/i/oraſa
fuit.*

*Pluribus,
town orade/^dimiu^n, recutimique lucemque Araeciuſ. Laboribus*

*emīm coeūpnie inclementid confectv, audacem naturae mv&fti-
gandae ardorem morte immaturā expiarunt.*

*G?dnmdēm, gui&m v&ftižua md̄tiftu&ŋ. ef e^aome/ (foe
wučtuāmem CMniw. ^Vd/ Tfiečua mt&rAewaúa, inecūod inter
TnM&nad mnumeraj M&J Ttie con^o/am^ ef Jitetenfcwt?, /ore,
u//a&or&f mev aliquando Regiae Euæ Majestati
· aMmwčweñtwr.*

*Votū comAod gaiušio emui/to. (btenwn, auae perquisiri,
auae co//eav, uf Dill6 <uü aud/uaid, /wç/ewmtur, atmuere
dignatus es c/antut/vraemud'miceiteud, tanta, c/eimentui\denwdud
anji> twatdūmi// tofuj AeynufUd, iWjflwucđe wtewjauēaacmerej
usoū /udſtine o/ie^cmv ncwavo.*

*F. P.
KDWL*

Addictissimus

C. L. Blume.

LECTORI SALUTEM!

Quamvis Java ab EUROP[^]IS , imprimis vero a BAT AVIS , *gentium Germam̄carum*, ut scribit TACITUS, *virtute pr̄cepituis*, per tot secula lustrata, vel jam dudum armis pactisve subacta sit, aperte tamen et ingenue nobis fatendum est, hujus insulae naturam, praesertim *Floram*, nondum accuratius cognitam esse- Cujus inscītiae culpam ad naturae impedimenta propemodum insuperabilia, maxime coelum tēterrimum*, quibus insulae interioris aditus difficillimi redduntur, transferamus, minime vero majores nostros, literarum nunquam non amantissimos, incusemus oportet.

Inveniuntur tamen scriptores, c̄jui, licet morum *Societatis*, c̄juae olim exstitit, *Batavo-Indicce* prorsus ignari, calumniari non vereantur, quod ab ill[^] expeditiones, quae ad augendas scientias spectarent, non modo neglectae, sed et praepeditae fuerint, ut terris istis quasi aeterna obfunderetur caligo. Quod longe secus est! Quamquam enim inclyta ilia *Societas*, cuius proprium et praecipuum

* Negari quidem nequit[^]Ja^{^^} insularumque confiaium partes iateriores, cum littoreis collatas, vix indignas esse, quae salubres vocentur. Attamen, ut oras istas maritimas, ubi mors citissima *Europasorum* plerosque sternit, silentio transeam, in regionibus etiam interioribus, quas aēr purior amplectitur, coelum alienum nosmet *Eurvpceos* ad oneris instar gravat. Ut pulcherrima Floras tropicae proles, ad nos translata, summum evolutionis suae gradum unquam consequitur, imo, quamvis diligentissime et benignissime curata, aegram languidamque trahit vitam, ita nos *Europcei* in terris istis, licet naturse prodig& largitate fruantur. Num forte exempla desiderantur? Nonne in ipsissim& Javd interiore legiones nostras laboribus, qui in *Europd* perlevi reverb momento aestimantur, absuntas doluimus atque dolemus? Quam cito viri omne laude majores, KUHL et VAN HASSELT, molestiis succubuerunt, quibus, montosa altiora perquirentes, afflicti fuerant! Et paucis abhinc mensibus ad aures nostras acerbissima fama funeris pervenit, quo ibidem, iisdemque miseriis gnarus historian naturalis scrutator BOIE exsinctus fuit!

munus esset, mercaturaे inservire, id sibi maximaе curae esse duxil, ut coloniarum thesauros in patriae usum converteret, nulli tamen uuquam datas occasioи, historiae naturali incrementa conciliandi, defuit. Profecto opera splendidissima, in quibus divulgandis beneficentia et liberalitas *Societatis mercatorice Batavo-Indicce* viros immortales, RHEEDE atque RUMPHIUM, pecuniis lautissime sustentavit, perenni vel ipsam gloriae commendabivit, praeprimis, quum *Hortus Amboinensis* RUMPHII patriae gazaеque aromatum pretiosissimorum consecratus sit, e quibus turn temporis opes omnium maximaе affluebant.

Pariter et eruditи exteri in BATAVORUM coloniis non modo liberalissimo hospitio excipiebantur, sed et generosissimo Senatus BATAVI praesidio tegebantur. Ita Hispanus NORONHA, inops in *Javam* abreptus, ab egregio RADEMACHER, Societas Doctorum Bataviae auctore, subsidiis quam plurimis munitus, *Javce* interioris Floram pvestigavit. Ita et Americanus HORSFIELD, sumtibus a summo BATAVORUM magistratu suppeditatis, cum pluribus pictoribus cunctas fere *Javce* regiones per annos perscrutatus, ingentem rerum naturalium copiam, eximium Musei *Londinensis* nunc decus, coUegit. Ad hos accedunt Suecus ille THUNBERG, Botanico-rum nunc Nestor, et haud infelix gloriae LINN^EANJE aemulator, ac meritissimus Gallus LESCHENAULT DE LA TOUR, uterque per aliquot tempus in *Java*¹ commoratus, qui justas liberalis, quo usi sunt, hospitii laudes nunquam detrectabunt. Quâre, quam bene atavi, patresque et aequales nostri de scientiis meriti fuerint, pluribus evincere argumentis, supervacuum foret.

Ad discutiendas autem tenebras, quibus accuratiorem terrarum istarum cognitionem adhuc premi innuimus, nihil sane prosperius evenire potuit, quam imperium REGIS AUGUSTISSIMI, et sapientiа et literarum amore praestantissimi, quo sospite omnis natio ovat. Quum enim ex eo tempore, quo regnum adeptus erat, omnibus provinciis optime consulere studeret, spes affulsit invaluitque, fore, ut et physica coloniarum BATAVARUM, potissimum *Java*?, indeoles tarn laetis auspiciis brevi in lucem proferretur.

Quae quodsi spes, historiac naturali blandissima, nondumpenitus impleta est, causa nee inde repetenda est, quod adjumenta necessaria a summo magistratu denegata fuerint, nee quod viorum, qui expeditioni susceptae praefecti fuerant, industria ac strenuitas desiderata sit. Quis enim doctorum est, cui firmius largiusque praesidium, majorque fiducia tributa sit, quam ill⁰ REINWARDT ab Excellentissimis Gubernatoribus Generalibus ELOUT et VAN DER CAPELLEN , viris dignissimis, quos REGIA MA JEST AS selegit, ut per ipsos civibus, in orbe extumo sitis, beneficia SUA impertiret? Et sane ab ardore tanti viri — cujus utrum insignem ingenii aciem, an profundam doctrinam, omnes historiae naturalis partes complectentem, majore prosequaris admiratione, merito haesitas — fructus uberrimos pulcherrimosque exspectare fas fuit.

Verum eheu! et sumtibus maximis a Senatu *Batavo-Indico* impensis, et viribus studiisque cum ill¹ REINWARDT , turn virorum indefessorum KUHL et VAN HASSELT profusis, iter, ad explorandum *archipelagum Indicum* susceptum, tristissimos habuit exitus. Namque ut locupletissimum rerum naturalium thesaurum, jam in *India* deperditum, omittam, non tantum quatuor collectiones, laetissima museum patriorum spes, invidis oceani fluctibus obrutae, periere, sedetiam — quod multo magis plangendum! — sagacissimus KUHL , laboribus coeloque dirissimo consumtus, morte cecidit, quem mox amicissimus suus VAN HASSELT ad inferos secutus est*. Ipse ill. REINWARDT, nullis impedimentis, nullis periculis deterritus, quominus *Javam* et *archipelagum Indicum* pervestigaret, sero *inEuropam* redux, animam vixservavit.

Ita contigit, ut ego quidem, ad istas regiones remotas desiderio delatus, cognoscendi coeli aërisquenaturam, tam *Europais*, quam

Amicis, ^ita letoque inter se conjunclissimis, generosissimus Gubernator Generalis, Baro VAN DER GAPELLEN , humanitate juxta inclytus, atque ingeniosus Literarum literatorumque patronus, sepulcrum magnificum iu horto botanico *Bqgoriensi* exstruxit. Idem tumulum RUHPHII in insult *Ternate*, tempore, quo *Molucca* sub BRIT AN NORUM ditione fuere, eversum, sumtibus suis ita restauravit, nt monumentum, pristino ornatus, et mei-ila immoialiu defuncti, et sempiternum conditoris honorem loquatur.

indigenis adeo infestam, et inquirendi eorundem vim, quam in corpora organica exserant, unus superessein, qui rem, tantis calamitatibus interceptam, sustinerem. Sed quum adimplendas tanti negotii partes vires meas haud sufficere sentirem, rebusquemedicis praefectus, totius colonise saluti invigilare necesse haberem, tempus nonnisi subsecivum inceptis illis dare potui. Virtutes tamen vegetabilium *Javanicorum* explorandi studiosus*, quum *Botanicen*, maxime familiarum naturalium doctrinam, validissimis studiorum meorum adminiculis redundare mox animadverterem, ex improviso scientiae amabilissimae illecebris quasi irretitum me sentiebam. Ejus reverâ amori, quern divina providentia in animo meo accendere voluit, vitam acceptam refero, quippe qui periculorum et miseriarum, quibus in illis terris undique pressus, omni paene quiete carebam, praemia dulcissima e plantarum studio perceperim.

Ab initio anni i8a3, quo rei herbariac suavitate demum penitus captus fui, omne otium in *Florce Javanice* studio consumsi, neque ullis impensis parcus, indigenas plures alui, qui in regionibus, a me lustratis, plantas colligerent. Quorum operâ aequâ ac plurium clientium auxilio adjutus, e quibus NAGEL, LATOUR, KENT atque ZIPPELIUS memoriâ, qui nominentur gratâ, digni sunt, paucis annis species circiter 3000 plantarum siccatas in herbarium congregavi, notatis simul in diario botânico, quaecunque in illis vivis observavi.

- Anno autem 1824 ad finem vergente, impedimenta subitanea cursum meum represserunt. Etenim quum sylvas, pedibus Euro-paeorum hâctenus intactas, in orâ australi *Nusce Kambangan*, insuke parvae, herbis non minus exuberantis, quam aurâ letliiferâ infamis, pervestigarem, servos plures, eosque fidelissimos pau-

* Studiis meis et nonnihil utilitatis geaeri humano adlalum videtur! Non raro in diversis morbis endemicis medicainina, e ditissimâ *Fiord Javanicd* deprômpta, quae et egomet ipse, et alii medici adhibuimus, sexcentis indigenis sanitatem restituerunt. Unum ex illis, *Alyxia** species qnsedam, quam *Javani Pulusanæ* vocant, ob saluberrimam in diarrhoeo chronicâ efficaciam in ipsâ *Europd* inclaruit, nova forsan, et minime spernenda merx!

corum dierum spatio subitd morte stratos, ceterosque, paucis exceptis, gravissimo morbo afflictos lugendos habui. Ipse demum febri continue violentissimd, ob paludes littoreas *Europceis* perniciosissimA, correptus, vix amplius mentis adeo compos fui, ut, relictis extemplo uliginibus pestiferis, comites, quam possent, longissime recedere juberem. In hoc tarn flebili statu quum res essent, nil nisi plantae aegre servaripotuerunt, specimina vero, insulae geologiam illustrantia, maximamque animalium collectorum partem relicta, penitus interiisse, perpetuo non minus querar, quam opem promtissimam, non modo a servis vernaculis, sed a primoribus quoque *Javanicis* mihi latam, in aeternummemoriA tenebo. Namque, etsi ipsi aegri, sponte manus obtulere, ut ab or& desert^ in *Javam* interiorem transportarer, et, ubi primum aerumnae nostrae fama in regiones cultas delata fuerat, principes indigenae undique adproperarunt, agmen nostrum, miseriis morbisque fere confectum, recreaturi, itautprovinciam *Tjamis* triumphantis instar introirem.

Purissimi aëris montaiii beneficio quidquam refectus, ab eo inde temporis momento iterum atque iterum in morbum recidi. Qu& de causâ pericula, ibidem vitae meæ semper impendentia, respectans, synopsin observationum, rem herbariam spectantium, prelo committere statui*. Cceptis autem ad finem nondum perduc-

* Opuscula botanica, quae in *Indid*, ac inde reversus juris publici feci, sunt:

- 1) Catalogue van eenige der merkwaardigste gewassen, te vinden in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. *Baiav.* i8a3. 8.
- 2) Beschrijving van sommige gewassen op eenen togt naar den Salak waargenomen in Batav. *Ferhandel.* T. IX. *Batav.* i8a3.
- 3) Over de Javaansche eiksoorten in Batav. *Ferhandel.* T. IX.
- 4) lets overde Bhizantkece, enz. *Batav. Zeit.*, i8a5.
- 5) Bijdragen tot de Flora van Nederl. Indië: Fasc. I-XVII. *Batav.* i8a5-i8a6. 8.
- 6) Overde Oost-Indische Pepersoorten in Batav. *Verhandel.* T. XI. *Batav.* 1826.
- 7) Over een nieuw Plantengeslacht, de Brugmansia, in Bij'dr. tot de natuurk. Wetensch. T. II, N° 3. p. 419. *Amsterd.* 1827.
- 8) *Enumeratio Plant. Java etinsul. adjacent. Fasc. I —II. Lugd. Bat.* 1817-1828.8.

In illis prater plurimas novas species etiam nova genera haud ita pauca proposui, quae omnia, descriptionibus accuratis dilucidata, opere hocce recepturus sum. Quum in *Indid* ab *Europd*, alma Musarum patron4, remotissimus, exiguum tantummodosupellectilem lilerariaih usurpare potHissem, fieri non potuit, quin complura nomina generica, quibus plantas meas

tis, propter valetudinem magis magisque labefactatam Julio 1826 in *Europam* redii, generosissimo Gubernatoris Generalis Du Bus DE GISIGNIES atque Vice-Gubernatoris Generalis DE KOGK praesidio egregie munitus. Quare gratissimi officii duco, viros illos illustrissimos, nee non Excellentissimum Ministrum rerum domesticarum VAN GOBBELSCHROY, perinde ac Summum Admini-

insignivi, multft castigatione egerent. Plures etram denominatioes protuli, quas auctores alii eodem tempore vel prius aliis plantis aut animalibus adtribuerant. Quare de causis & nomina generum omnium, quorumcunque in opusculis supra recensitis mentionem fed, simulque errores hujuscemodi cunctos — typis vulgaribus indigitatos — hinc enumerabo. Nomina vero, typis obliquis impressa, generibus istis conservanda sunt, omnesque species, quae ad singula genera in locis istis indicavi, complectuntur.

Acanthoglossum (fam. ORCHID.), *Acanthephippium* (fam. ORCHID.), *Achjrospermum* (fam. LABIAT.), *Acriopsis* (fam. ORCHID.), *Acronodia* (*Acwzus* SpRERG.-fam. EL^EOCARP.), *Actegiton* (fam. RHAUR.), *Actephila* (fam. EUPHORB.), *Adenilema* (fam. CUROR.), *Adenoncos* (fam. ORCHID.) *Adenocwpis* (fam. EupnoRB.), *Adenostylis* (fam. ORCHID.), *Adisca* (fam. EUPHORB.), *Agalmyla* (*Orithalia*, fam. BIGROR.), *Agathisantes* (fam. COMBRET.), *Agivstophyllum* (fam. ORCHID.), *Amaracarpus* (fam. RUBIAC), *Ambljrglottis* (fam. ORCHID.), *Ane-cochilus* [*A nee do chillis*, fam. ORCH.], *Aphanamixis* (*Amoora* Roxs.-fam. MELIAC), *Aphania* (fam. SAPIND.), *Apista* (fam. ORCHID.), *Aporusa* (fam. URTIC), *Aporum* (*Dendrvbium* Sw.-fam. ORCHID.), *Apostasia* (fam. ORCHID.), *Apoterium* (*Calophylli* spec, *Auct.*-fam. GUTTIF.), *Appendicula* (*Octomeria?* R. BR.-fam. ORCH.), *Aracknis* (*Arachnanthe-hm.* ORCHID.), *Anioldia* (fam. CITRON.), *Aromadendmn* (fam. MAGWOL.), *Arthrophyllum* (fam. ARAL.), *Arundina* (fam. ORCHID.), *Asteromoea* (fam. SYKARTH.), *Astronia* (fam. MELASTOM.), *Asystasia* (fam. ACANTH.), *Axanthes* (*Maschalanthe-Wa|ichiaRwT>T.-hm.* RUBIAC), *Baliospermum* (fam. EUPHORB.), *Bischojia* (fam. RUTAC. aff.), *Brongniartia* (fam. URTIC), *Brugmansia* (fam. RHIZANTH.), *Bulbospermum* (*Bulbine*-fam. ASPARAG.), *Calcearia* (fam. ORCHID.), *Callostylis* (*Tylostylis*-fam. ORCHID.), *Calosanthe* (fam. BIGNOIT.), *Calpandria* (fam. MELIAC), *Campanumcea* (fam. CAMPARULAC), *Capellia* (fam. DILLER.), *Cenolophus* (fam. SCITAM.), *Centronia* (fam. BIGROR.), *Ceramium* (*Bragantia* LOUR.-fam. ARISTOLOCH.), *Geralium* (*Cylindnolobus*-fam. ORCHID.), *Ceratochilus* (fam. ORCHID.), *Ceratostachys* (fam. COMBRET.), *Ceratostylis* (fam. ORCHID.), *Cheilosd* (fam. EUPHORB.), *Cheirostylis* (fam. ORCHID.), *Chelonanthera* (*Pholidota* HOOK.-fam. ORCHID.), *Chilocaryus* (fam. APOCTR.), *Chisocheton* (*Schizochiton* SpRERG.-fam. MELIAC), *Choopsis* (fam. ASPARAG.), *Chlorosa* (fam. ORCHID.), *Chrysoglossum* (fam. ORCHID.), *Cipadessa* (fam. MELIAC), *Cistela* (*Ascochilus-MaUxid.* sp. WiLLD.-fam. ORCHID.), *Cleidion* (fam. EUPHORB.), *Cleidostoma* (*Polychilos* KUHL et VAR HASS. Orchid, ed. BREDA.-fam. ORCH.), *Clypea* (*Stephania* LOUR.-fam. MERISPERM.), *Cnesmone* (fam. EUPHORB.), *Cochlia* (fam. ORCHID.), *Ccelospermum* (fam. RUBIAC), *Collabium* (fam. ORCHID.), *Conchophyllum* (fam. ASCLEP), *Conigiton* (fam. TEREBIRTH.), *Conocephalis* (fam. URTIC), *Cordyla* (*Roptrostemon* - fam. ORCHID.), *Cotylanthera* (fam. SOLAR, aff.), *Cratoxylum* (*Hornschuchia*-fam. HTPERIC), *Crepidium* (Malaxid. sp. Sw.- fam. ORCHID.), *Crinonia* (fam. ORCHID.), *Crypteronia* (fam. RHAMR.), *Cryptoglottis* (fam. ORCHID.), *Cryptotheca* (fam. SAUCAR.), *Cyanitis* (fam. SAXIFR.), *Cyanthyllium* (*Cyanopis-hm.* STRARTH.), *Cyclostemon* (fam. EUPHORB.), *Cyrtophyllum* (fam. STRTCHN.), *CyHosia* (fam. ORCHID.), *Daphniphyllum* (fam. RHAMR. aff.), *Dendrochilus* (Epidendr. sp. HOOK.-fam. ORCHID.), *Dendrocolla* (YARDA R. BR.-fam.

stratorem artium liberalium VAN EWYCK, fautores mihi reverso
praclarissimos, laudibus gratiisque publicis concelebrare, ne
uncjuam benevolentiae, & scientias fovent, memoria intercidat.

**Si FLORA JAVIE INSULARUMQTJE ADJACENTIUM nuncin lucem pro-
dit, id literarum studio ardenti debetur, quo viri isti illustrissimi**

ORCHID.), *Dendrolirium* (Dendrob. sp. HooK.-Octomerke sp. KUHL et VAN HASSELT Orchid, ed. VAN BREDA.-fam. ORCHID.), *Desmotrichm* (*Dendrobium* Sw.-fam. ORCHID.), *Diacalpe* (fam. FILIC), *Diacecarpium* (fam. CAPRIFOL.), *Didymochiton* (fam. MELIAC.), *Diglyphis* (fam. ORCHID.), *Diphyes* (*Odontostylis-hm.* ORCHID.), *Diplycosia* (*Amphicalyx-fan*). ERIC), *Diracodes* (fam. SCITAM.), *Donacodes* (fam. SCITAM.), *Drapiczia* (fam. COLCHIAC), *Dysoxylum* (Guareae sp. Auct.-&m. MELIAC), *Echinocarpus* (fam. BIXIN.), *EcHioglossum* (fam. ORCHID.), *Eicosia* (fam. ORCHID.), *Elateriospermum* (fam. EUPHORB.), *Ellodium* (fam. SCROPHUL.), *Endespermum* (fam. LEGUMINOS.), *Ephippium* (Anisopetalon HooK.-Seslochilus KUHL et HASS.-fam. Orch. ed. v. BREDA.-fam. ORCHID.), *Epicarpurus* (fam. URTIC), *Epi-
charis* (*Guanas* sp. Auct.-*favci*. MELIAC), *Epicrianthes* (fam. ORCHID.), *Epilithes* (fam. NYCTAGIN.), *Epiphanes* (fam. ORCHID.), *Epirizanthe* (fam. OROBANCH aff.), *EpitJ.j.ema* (fam. PRIMUL.), *Erioglossum* (fam. SAPIND.), *EHosolen* (fam. THTMEL.), *Erythrocarpus* (*Geloiuum* RoxB.-fam. EUPHORB.), *Erythrocillus* (fam. EUPHORB.), *Erythrodes* (fam. ORCHID.), *Ei-
throropalum* (fam. GUCURB.), Esenbeckia (2Vee<>a-fam. Tiliac), *Galera* (fam. ORCH.), *Gastroglossis* (fam. ORCHID.), *Geeria* (*Eurya* THUNB.-fam. TERNSTROEM.), *Geunsia* (fam. VERBEW.), *Glochidionopsis* (fam. EUPHORB.), *Glomera* (fam. ORCHID.), *Gonyanthes* (fam. BuRMAJN), *Grammatophyllum* (Gymbidii sp. Sw.-fam. ORCHID.), *Gastridium* (*Dendrobium* Sw.-fam. ORCHID.), *Gymnosiphon* (fam. BURMANN.), *Gynochthodes* (fam. RUBIAC), *Gyno-
cephalium* (fam. URTIC), *Gynopachys* (fam. RUBIAC), *Gynostemma* (fam. MENISPERM.), *Gynotroches* (fam. GUTTIFER.), *Hcemospermum* (fam. STRTCCHK.), *Hanguana* (fam. ASPA-
RAG.), Hasseltia (JK.rz7i-fam. APOCTK.), *Helictophyllum* (fam. PROTEAC), *Helygia* (*Helignie*-fam. APOCTN.), *Henico sterna* (fam. ORCHID.), *He tee Ha* (Etaeria, fam. ORCHID.), Hornschu-
cliia (v. *Cratoxylum*), *Hydmcera* (fam. HTDROCER.), *Hymenanthes* (fam. ERICIN.), *Hypoba-
thrum* (fam. RUBIAC), *Jackia* (*Xanthophyllum* RoxB.-fam. POLYGAL.), *Illigera* (fam. RHAMN. aff.), *Jodes* (fam. MENISPERM. aff.), *Irina* (fam. SAPIND.), *Kaulfussia* (fam. FILIC), *Kopsia* (fam. APOCYW.), *Kuhlia* (*Fagraea* THUiiB.-fam. STRYCHW.), *Lecanopteris* (fam. FIL.), *Leiocar-
pus* (fam. EUPHORB.), *Lepionurus* (fam. RHAMN.), *Lepisanthes* (fam. SAPIND.), *Lepistemon* (fam. GONVOLV.), *Leposma* (*Lepisto?na*-fam. ASCLEP.), *Leptostemma* (fam. ASCLEP.), *Leucoxy-
lum* (fam. TERNSTROEM.), ZI7?WIW<> (fam. ORCHID.), *Lithocarpus* (fam. AMENT.), *Lithosanthes* (fam. RUBIAC), *Loxophyllum* (fam. SCROPH.), *Manglietia* (fam. MAGHOL.), *Maranthes* (*Exitelia-hm.* BUETTN.), *Mastixia* (fam. CAPRIFOL.), *Mecosa* (*Habenaria* R. BROWN.-fam. ORCHID.), *Melanthes* (Phyllanth. spec. ^uc£.-fam. EUPHORB.), *Meliosma* (*Millingtonia* RoxB.-fam. SAPIND.), *Meniscosta* (fam. MENISPERM. aff.), *Mesona* (fam. LABIAT.), *Metabolus* (fam. RUBIAC), *Micromelum* (fam. AURAWT.), *Microsaccus* (fam. ORCHID.), *Mischocarpus* (fam. SAPIND.), *MycaHdanthes* (fam. ORCHID.), *Myxopyrum* (fam. 3ASNiux.) *Nephelephyllum* (fam. ORCH.) *l Nomaphila* (fam. ACANTH.), *Omcea* (fam. ORCHID.), *Onycbium* (*Dendrobium* Sw.-fam. ORCH.), *Orchipeda* (fam. APOCYN.), *Orophea* (*Bocagea* HiL.-fam. ANONAC), *Ostodes* (fam. EUPHORB.), *Osyricera* (fam. ORCHID.), *Oystophyllum* (*Dendmbium* Sw.-fam. ORCH.), *Pachyderma* (*Stereoderma-hm.* JASM.), *Pachystemon* (fam. EU?HORB.), *Pachj^stoma* (*Pachy-
chilus-fam.* ORCHID.), *Pedilonum* (*Dendmbium* Sw.-fam. ORCH.), *Peristylus* (fam. ORCHID.),

difficultates, quac editioni operis, tot tamque pretiosis iconibus collustrandi, obstitere, felicissime propulsarunt. Subsidiis itaque glorios& REGIME MAJESTATIS munificent& quam maximis paratis, sperare ausim, fore, ut benevolentia publica accipiat opus susceptum, cui, quod vitae reliquum est, lubentissime impendam.

Jussus autem librum aut lingua vernacula&, *antLatind* edere, ut *Floram Coix>mandelianam* cl¹. ROXBURGH imitarer, animus inclinavit, turn quia observationes argumenti botanici plerasque antiquissim& lingual *Batavd* conscripseram, turn quia popularibus nostris facilius fore putavi, opus cum BRITANNIGO conferre. Labores tamen meos justo minus iri cognitum, nee redactum venditionis in regno BATAVO sumtibus satis facturum arbitratus, consiliis mutatis *sermonem Latinum* praetuli, ut quaelibet nationes cultae emolumentis, quae liberalitas magistratus nostri scientiis adtulit, fruantur. Quam ob rem ad elaborandas descriptiones *Lafmas* adjutorem eo libentius mihi junxi, quo utiliores labores illi ita fiant, citiusque progrediantur necesse est. Medicinae et

Phalcynopsis (Epidendr. sp. Sw.-fam. ORCH.), *Phildgonia* (fam. RUTAC), *Phyllanthera* % (fam. ASCLEP.), *Phjrlocephalus* (fam. SYWANTH.), *Picrasma* (fam. RUTAC), *Picmphlceus* (fam. STRYGHN.), *Platen* (fam. SANTAL. aff.), *Platysma* (*Placostigma-fajn.* ORCHID.), *Ploco-glossis* (fam. ORCHID.), *Podochilus* (fam. ORCHID.), *Polydonta* (*Polystorthia-fom.* ROSAC), *Poljasma* (fam. GAPRIFOL.), *Porpa* (fam. TILIAC), *Prosthesia* (fam. BUETTN. aff.), *Psilotrichum* (fam. CHENOPOD.), *Pterisanthes* (Cissi spec. SpREwe-fam. AMPELID.), *Pjrenaria* (fam. TERNSTROEM.), *Rhinanthera* (fam. FLACCOURTIAN. aff.), *Rhuacophila* (fam. ASPARAG.), *Rhjn-choglossum* (fam. Rhinanth.), *Rhynchospermum* (fam. STWANTH.), *Rhynchostylis* (fam. ORCHID.), *Rhpichotcechum* (fam. BIGWOW.), *Rjrparia* (fam. EUPHORB.), *Saccolabium* (*Sacco-chihiSy* fam. ORCHID.), *Saprosma* (fam. RUBIAC), *Sarcocarpus* (fam. AUOUAC), *Sarcostoma* (fara. ORCHID.), *Sauropus* (fam. EUPHORB.), *Scepasma* (fam. EUPHORB.), *Schcenorchis* (fam. ORCHID.), *Schubertia* (*Horsfieldia-fom.* UMBEIIF.), *Sciaphila* (fam. URTIC. aff.), *Sclerostylis* (*Glycosmidis et Limonice* spec. AucU - fam. AURAUT.), *Spathostemon* (fam. EUPHORB.), *Spathoglottis* (fam. ORCHID.), *Sphcerostema* (fam. ANON.), *Spiradiclis* (fam. RUB.), *Stemonurus* (fam. SANTAL. aff.), *Stenogramme* (fam. FILIC), *Strobilanthes* (fam. ACAKTHAC), *Strombosia* (fam. MARCGRAV. aff.), *Symmetric*, (fam. SALICAR.), *Tceniphyllum* (fam. ORCHID.), *Tainia* (*Mitopetalum-hm.* ORCHID.), *Tarrietia* (fam. MALPIGH.), *Tetraotis* (fam. SniANTHER.), *Thelasis* (fam. ORCHID.), *Trichoglottis* (fam. ORCHID.), *Trichosper-mum* (fam. BIXIN.), *Trichotosia* (fam. ORCHID.), *Trigostemon* (*Trigonostemon-fam.* EU-PHORB.), *Tripterospermum* (fam. GENTIAN.), *Trommsdorffia* (fam. BIGNON.), *Ttypkera* (fam. CHENOPOD.), *Vireya* {*Azalea* et *Rhododendri* spec. LiNN.-fam. ERIC), *Wahlenbergia* {*Stylocoryne* CAv.-fam. RIBIAC.) , *Wallichia* (v. Axanthes), *Whitia* (fam. BIGNON.), *Xanthophytum* (fam. RUBIAC.) , *Zosterostylis* (fam. ORCHID.) , *Zuccarinia* (fam. RUBIAC).

Chir. Doctori, Jo. B. FISCHER, laudatissimo *ceV* Professoris SCHULTES discipulo, quern electum mihi gratulor, ob eximia, quae in libro perficiendo praestitit, officia grates publicas maximusque agere justum censeo.

Opus totum, quod «FLORA JAVE nee non INSULARUM ADJACENTIUM» inscribetur, plantas omnes, quascunque *J.* REINWARDT, KUHL, VAN HASSELT* et egomet ipse itineribus diversis collectas, maximam partem in locis natalibus perquisivimus, complectetur, ita ut e conjunctis laboribus nostris natum, et quaecunque nova in eo inveneris, nobis communia esse existimes. Ut autem sua cuique vindicentur, diligentissime indicabo, a quoniam et in quibusnam locis plantae singulae detectae fuerint, bonore eodem omnes decoraturus, quoscunque ad operis perfectionem aliquid conferre lubebit.

In opere disponendo ordinem familiarum naturalium sequentes, qui, si quis aliis, optimam vegetabilium cujusdam regionis imaginem exhibit, sensim, quum Flora *Javce* e cunctis ferme familiis speciem unam pluresve profert, conspectum vegetationis totius completum dabimus. Ita familiae singulae partem quidem operis totius, per se vero tractatus omnibus suis numeris absolutos constituent, id quod emolumento baud mediocri erit illis, qui coeptis nostris subscriptent, si difficultates improvisae totum opus absolvivetent.

Praeter accuratissimas generum, specierum varietatumque descriptiones structuram, affinitates, stationes et distributionem

* Illi historic naturalis iadagatores, praematuero obitu patriae literisque ercpti, qui in *Java* modo occidentali provincias *Buitenzorg*, *Bataviam* et *Bantam* perlustrarunt, curas praecipuas *Orchideis*, *Asclepiadeis* JPungisque navarunt, plantis ceteris etiam sedulo collectis, non autem, quod sciam, descriptis. *Fungos* opere meo recipiam; *Orchideas* et *Asclepiadeas* e relictis iconibus et descriptionibus cl. VAN BREDA divulgabit, qui, laude doctrinae Botanicae excellens, familias istas difficillimas me longe melius enucleabit. Sed quum *Orchideas* et *Asclepiadeas* *Javanicas* baud in mu&eo, imo in natura examinaverim, cognitioni illarum quaedam in hoc opere me suffragaturum esse confidam, iconibus ceterum non repetitis, solum citatis.

geographicam explicabo, nominibus vernaculis simul indigitatis, nee non numerosis circa plantarum utilitates noxasque observationibus subnexis, et omni praetereaope enitar, ne spectatissima et vere aurea cl.^{orum} HUMBOLDT et BONPLAND opera « *Plantes e'qui-noxiales et aJvova Genera Plantarum* » frustra aemulatus videar. Quoad synonymiam tantummodo libros, plantis *archipelagi Indici* terrarumque confinium dicatos, e. g. *Hortum Malabaricum* cl. RHEEDE, *Hortum Amboinensem* RUMPHII, etc., perinde ac tractatus speciales operaque universalia allegabo, synonymis, quae ipse conferre non potui, vel omissis, vel asterisco (*) notatis.

Icones* maximâ e parte in plantarum stationibus ad naturam delineandas curavi, plurimasque partium, fructificationi inseruentium, analyses aut ipse perfect, aut sub oculis meis depingi jussi. Quum lithographia temporibus novissimis ad summum perfectionis gradum proiecta, vegetabilium iconibus optime conveniat, tabulae nostrae, quibus species nondum pejusve depictas illustrabimus, lapide, nonnullae tamen, phytotomiam spectantes, acre incidentur.

Bruxellis, Idib. Maji MDCCCXXVIII.

D* C. L. BLUME.

* Ab initio pictorem unicum, cui nomen LATOFR , sumtibus propriis alui, postea a Senalu mihi adjunctum, cuius de sedulitate ex eo judicium ferre poteris, quod intra quadrienniuu circa 1400 imagines planlarum delinearit. Picture vero, quascl. REINWARDT mihi communicavit, a fratribus BICK , et quas KUHL et VAN HASSELT reliquere, a KUHLTJES , paucae a VAK RAALTEN confectae sunt. Ex quo in Europam redux fui, lithographa solertissimus»VIVIEN, quampluriinas plan las, prseprimis *Filices*, *Muscos*, *Gramineas*, etc., lapidi insculpit.

FILICES.

FILICES LINN.

LINN. *Philos. botan.* p. 35, 64.

Filices I et II. Juss. *Gen. Plant,* p. i4- — JAUME ST. HIL.
Exposit. des Fam. not. Vol. I, p. 42.

Filices (Hypophyilospermae) SWARTZ *Syn. Fil.p.* I.

Filices, Scliismatopterides, Poropterides, Stachyopterides
(part.) WILLD. 5/?ec. *Plant.* Vol. V, p. LV.

Filices SPRENG. *Anleit. zur Kenntn. der Gew.* Vol. II,
/>. 89, 7. — DE CAND. *Théor. élément,* p. 249, i55. —
RADD. *Filic. Brasil.* p. 3.

Filices (part.) GASSEL *Lehrb. der natuerl. Pflanzenordn.*
p. i33, 3.

CHARACTER DIFFERENTIALS.

CAPSULIE (*Sporangia, Sporocarpia, FollicuU*) plerumque aggregate, rarius in series simplices distributee, e frondis paginâ inferiore marginibusve sese evolentes, nudae vel tegumentis (*indusiis, involucris, epi- vel peri-sporangiis, membranulis, glandulis squamulosis*) celluloso-membranaceis coriaceisve aut tectae aut inclusae, uniloculares, polysporae.

PERIGARPIUM COMMUNE pedicellatum aut sessile, liberum vel adnatum, crustaceo-cellulosum, rarius coriaceum, exannulatum (*inornatum*), vel annulo (*anello, gyro, gyromate, symplocio*) articulato aut vittâ seu prominentiâ verticali aut laterali, striatâ aut reticulatâ (*annulo spurio*) cinctum, simplex, per rimam porumve transverse vel longitudinaliter dehiscens.

SPOILE innumerae, liberae, simplicissimae, appendiculis nullis, lseves aut tuberculatae.

VEGET : Plantæ vasculares, herbaceæ, plerumque sub-perennes, raro annuae vel arborescentes, radicibus fibrosis, saepe spuriis (*racines adventives* DE GAND.), raro crassis carnosis. Gaudex saepe brevis frondesque rosatim profrenſ, aut repens aut radiciformis, tumque frondibus plerumque unilateralibus obſessus, aut elongatus et vel indiviſus frondibus superne verticillato- vel spirali-congestis, vel diviſus et plerumque scandens aut volubilis, frondibus alternantibus, furcatis, raro verticillatis, atque, utcunque sit, fere perfecte cylindricus, extra paleis * squamisve scariosis aut membranaceis, interdum durescentibus, vel pilis vel glandulis stipitumve delapsorum reliquiis, vel radiculis plus minusve vestitus, centro, telâ cellulosa ibi laxiore deſtructâ, nonnunquam fistulosus, contextu celluloso (qui ambitu densior amyloque ditissimus est) cylindroque compositus vasorum spiraliū copiosissimorum, porosorum, tubulorumque lymphaticorum, per membranas demum fuscas varie flexas fasciculato-connexorum **.

* Palearum forma non modo in diversis *Filicibus*, sed et in una e&demque planâ cum pro state, turn pro partibus diversis diversissima est. In frondibus pluribus admodum juvenilibus, quas perquisivimus, baud expansiones cellulosas, sed tubulos articulatos sistunt, e cellulis sibimet seriato-impositis conformatos, et caducissimae sunt. Paleae contra, quas in plantis jam magis explicatis observamus, multo magis persistentes sunt. Enimvero, dum illi velut epidennidi ipsimet elongatis originem debent, hæ ratione peculiari e stratis cellulosis superioribus sub epidermide, ut gemmæ vegetabilium nonnullorum, nascuntur, sed cum epidermide puncto insertionis cohaerent. Referunt ab intio -verruculas parvas, quæ cito quâquâversus, maxime vero sursum (forsan ob succorum congestionem versus plants apicem) extenduntur, et, peripheriâ saltern, e cellularum strato simplex constant, puncto insertionis peltato, quod magis deorsum spectat, non modo saturatiſ tincto, sed et persspe e stratis cellulosis pluribus conformato. Epidermide, poris vasisque destituta admodum hygrometricas sese præstant, bincque non solum obtegendis surculis novis aliisve organis, sed etiam sugendis humoribus inserviunt.

** Fasciculorum talium, membranâ tenui nitidâ involutorum, unus pluresve in caudice occurſunt, et vasa sua singula tenuissima mox in ductus scalariformes abeunt. Membranae vero, quâ fasciculi obvolvuntur, ne vestigium quidem in plantis junioribus detegere potuimus. Posterius itaque efflormari videtur, dum tubuli lymphatici, in fasciculi unfuscij usque peripheriâ siti, approximantur, et cum telâ cellulosa finitimâ concrescant..

Frondes pedunculis foliaceis comparandae, sgepe per nodum processumve caudici articulatim junctae, pro vasorum divisione simplices aut divisae, plerumque pinnatse, partim pinnato-venosse, rarius nervosse (saepe simili modo ut in plantis multis ordinis altioris), poris corticalibus, maxime subtus raro destitutse, omnes, paucis exceptis, primâ setate ab apice ad basin convolutae (*cestivcdio circinata*). Fructificationis dispositio e venaram structurâl imprimis e ramulis extremisque tenerioribus pendens, plerumque in frondis facie infernâ, vel in ipsius margine, vel in frondibus abortivis stipitumve ramificationibus ejusmodi spicatis aut paniculalis, vel in appendicibus foliaceis.

OBSERVATIO.

Etsi *Filices* ob fabricam subsimilemque vegetationem ad plantas alliores quodam modo accedunt, nequ&quam tamen in numerum familiarum *phanerogamarum* recipi possunt. Etenim embryo, semine inclusus et vegetabilis futuri rûdimentum, quo plantae ordinis superioris excellunt, in seminibus *Filicum* aliarumque *Cryptogamarum* plane nequit distingui. In *Mis* (*Phanervgamis*) ovula sive semina, et idecirco simul embryo, quern continent, formantur, ubi organ a mascula tetigerunt feminina, quibuscum ovula per funiculum umbilicalem juaguntur, et nutriuntur. In his semina, quae propter formacionem simplicem *sporas* vocamus, libera pericarpo membranaceo aut coriaceo includuntur, alimentaque extrinsecus haurientia, ob structure simplicitatem, et maxime ob funiculi umbilicalis defeculum, explicationis, quaesol& condensatione telae mucoso-granulosae continetur, gradam alliore non attingunt. Ex ipso isto defectu funiculi umbilicalis, uti e sporarum structure simplicissimA, absque embryone seu corenlo, augurari licet, in hisce plantis organ a mascula, si ad sporas evolvendas sua actio necessaria foret, fabric[^] longe simpliciore exstructa esse oportere, quam in *Phanerogamic*, in quibus fecundatio stigmatum vasorumve absorbenium ope, ovulorumque cum pericarpiu ipso communione fit. Hinc factum eßse \idetur, quod ad bunc usque diem scrutatorum labores ad indaganda *Filicum* genitalia masculina irriti fuisse videantur, licet organa ista jam dudum in *Muscis* innotuerunt,.qui structure simpliciore (vasis enim propriis porisque corticalibus carent) a *Phanerogamis* multo longius adhuc, quam *Filices*, distant. Immortalis HEDWIG pro iis duxit corpuscula parva, ovalia, pedicellata, nuda, sparsa, praecipue supra juxta costam medianam frondis adhuc convolutae obvia, quae jam oculatissimus MICHELI pro floribus masculis arbitratus, ut pilos articulates descripserat. MARATTI vero capsules ipsas quasi flores-liermatproditos credidit; STJEHELIN , HILL et QEDER, quibus SCHMIEDEL assentitjur, in capsularum annulo organum masculum repertum putarunt. GLEICHEN contra, vir sagacissimus, epidermidis rimulis, in frondis facie superiore conspicuis, functionem masculinam adscribit; KOEHLREUTER indusium, soros obtegens, pro *Filicum* stamine censem; viri solertissimi autem

GAERTNER et MIRBEL ovula s. sporas in capsulis ipsis ab humore, qui in hisce eodem tempore secerneretur, foecundari opinantur. BERNIARDI denique, adeo praeclare de *Filicibus* meritus, sententia ista impugnatA, yasorum extremitates incrassatas in frondis paging superiore, quae saepissime squamarum instar solvuntur, genitalia masculina, partes yero, quibus GLEICHEN functionem masculinam assignavit, stigmata judicat, quibus cum capsulis, lateri obverso affiis, per ductum quemdam commercium sit.

Inter sententias y arias, de *Filicum* genitalibus masculis prolatas, quas modo enumera-vimus, HEDWI&IANA et BERNHARDIANA attentione omnium dignissimae sunt, quippe quae partium, in plerisque hujusce familiae plantis obviarum, obseryatione nituntur. Illarum tamen primae admodum repugnare nobis videtur: i° Quod corpuscula s. organa, quae HEDWIG masculina existimavit, yix ac ne vix quidem differant a multorum aliorum vegetabilium vestitu granuloso, quern primd aetate gerunt, et quern pro glandulis s. cellulis expansis, materie amylacei refertis, statuerimus. 2° Quod yestitus iste in *Filicibus* multis jam eyanuerit, quum capsularum pars maxima adhuc in evolutionis primordiis hsereat. Ipsarum enim evolutio in uno eodemque soro baud coetanea est, sed pedetentim fit. 3° Situs denique partium, quae pro masculis describuntur, contrarium nobis yidetur is Li, quern in plantis aliis, maxime ordinis inferioris, obseryamus. Enimvero tanquam e lege naturae, quo simpliciores plantae sunt, eo magis in unum locum condensantur organa, quae propagationi inseryiunt, ut effectum mutuum in sese exercere yaleant. Organ a vero, quae MICHELI et HEDWIG mascula putant, admodum dispersa, eta femininis remotissima deprehenduntur. Idem in squamas valet, a BERNIARDI pro antheris descriplas, a quibus pollen granulosum nunquam excretum vidimus. Pariter rimulae, quas vir praeclarissimus stigmata judicavit, nullo plane modo a poris corticalibus distingui possunt, neque in ull& *Filicum* Javanicarum, quas peryestigayimus, ductum detegere nobis contigit, qui rimulas cum soris jungere dicitur.

Quamquam longe absumus, ut sexcentis sententiis, quae circa rem istam jam propositae fuerunt, novam superaddamus, taciti tamen praeterire nolumus, in *Polypodiaceis* saltern organa mascula, si quae exsistant, in capsularum vicinift quaerenda esse. Species enim ex illis plurimas *Indicas* diligentissime rimali, capsulas fere in omnibus, praesertim prim&aetate, intermixtas affirmarimus corpusculis parvis, plerumque clayatis, pedicellatis, quorum plura apertul lateral i instructa vidimus, et quae materiem viscidam continere videntur. Quoad formam ad *Muscorum* antleras proxime accedunt, a capsulisque juniores, quibus confundi possent, abunde differunt, eo quod annulo usque careant. Saepe eliam situ excellunt, utpote quorum plura pedicello communi insideut.

Ast capsularum sporarumque structuram nostr& aetate maximopere collustrarunt viri celeberrimi BERNIARDI, FR. FISCHER, CHR. G. NEES AB ESENBECK, TREVIRANUS, KAULFUSS, sicuti *Filicum* evolutionem e sporis d¹ EIIRHART, LINDSAY, WILLDENOW, MIRBEL, SPRENGEL et imprimis FR. NEES AB ESENBECK nee non KAULFUSS experimentis soiertissimis ad liquidum fere perduxerunt. Quum capsularum figuram naturamque sub diversis hujusce familiae divisionibus accuratius descripturi simus, sporas tantum atque germinationem subtilius adhuc contemplari yolumus.

Miramur primum sporarum, quae semper capsulis certae formae includuntur, et copiam ingentem et parvitatem incredibilem, quae fabricam scrupulosius examinare vetat. Sporae capsulas penitus explent, et in natu minimis materiam mucoso-granulosam sis tun t> quae sensim sensimque in vesiculos parvas decolores abit. Quamquam sine omni ordine liberaeque conglobatae, nullo modo inter sese, nee cum capsulis commercium habere videntur, sua explicatio tamen pariter excurrit cum capsularum formatione. Quae explicatio in utrisque praesertim expansione, qu& certain formam adsciscant, et in sporis simul condensatione

testae materiaeque mucosae consistere videtur. Nam vesiculae s. spone juvenes form& nondum adeo circumscript&, uti majores, gaudent, parietibus tenuibus plerumque hinc inde colapsis. Ab initio hyalinae, poslMc, ubi formam certam induerunt, saturalius tinguntur, pressioni fortius resistant, et nunc pellucidissimae manent, nunc intus substantiam granulosam, saepe quasi nubeculoso-diffusam , monstrant. Aliae tune exacte globosae , aliae ellipsof dese, reniformes, pyramidales aut varie angulatae, rarissime hinc pedicellato-producUe, nunc lseves, nunc punctis magis minusve scabrae sunt. Elisae materiem effundunt mucoso-granulosam, primum aquae non miscendam , testamque relinquunt simplicissimam —ut videtur —, quam in sporis plurimis, quas inquisivimus, metabranA vegetabili simplice, i. e., cellule unicA, attamen crassiusculsi, forma tarn pulamus. Si res fa vent, sporae brevi germinant : quidpiam intumescunt, form& tamen haud insigniter mutatA; lest& fissA vesicula s. cellula oblonga propullulat, sporaeque aperturam magis magisque dilatat. Eodem tempore materies granulosa, quae prius sporae centrum tenuerat, vesiculae parte superiori accumulatur, unde baec virescit, inferior aulem decolor manet. Vesiculae isti primae paulatim plures apponuntur, form& totA dein tanquam pedicellum articulatum aemulante. ParLi hujus inferiori testa assidet, supra quam nunc demum radiculae solitariae, tenerae, simpliciter tubulosae, proveniunt, quarum numerus eo magis increscit, quo plures cellulae novae, magis confertae, apice pedicelli articulati apponuntur, et pedetentim magis versus latera cedunt, perinde ac novae cellae superne inter vetustiores erumpunt.

Hicce ralione pedicellus articulatus in figuram clavatam abit, quae, superne sensim complanata, cellulis recentibus in medio ad formationem spissiorem coalitis, in lobos duos rotundatos convexos panditur. Nunc testa a basi inde plerumque detruditur, aut aliquamdiu adhuc restat in corpore celluloso nunc obcordato, neque vasis vestigium offerent. Hoc enim tandem appareat cum ortu plantae novae s. embryonis, si placet, qui in cotyledone preeformat^ s. massa cellulos^, modo descript^, illo loco evolvitur, ubi tela cellulosa densissime constipatur, in sinu inquain, lobis duobus rotundatis circumscrip. Hie cellulae in prominentiam parvam nodumve concrevere, e cujus extremitate superiore planta novella propullulat, primum quidem nodulo obtuso similis, mox vero in formam oblongam vel conicam mutala, cujus extremitas superior uncinata s. plumula sinum, inferior rectaque basin expansionis cotyledonaceae spectat. Extremitas ueraque ope nodi turn inter sese, turn cum cotyledone in aliquod tempus connata, tandem fruslatim decidit aut emoritur.

Filicum e germinatione facile intelligitur, seminum fabricam penitus aliam esse, ac in plantis ordinis superioris. Licet enim typus ad regenerandam plantain primitivam procul dubio ipsis insit, nemo tamen inficias iverit, ilium nondum organice esse constructum, ut in familiis *phanerogamis*. Prouti jam supra commemoravimus, harum semi a a perfecte evoluta embryonein plus minus perfectum continent, et germinatio ipsa ab ejus parte radicali incipit, quae cum plumule intime cohaeret. Nil autem hujus modi in *Filicibus* observari potest. Semen sub germinatione demum in conformationem is tarn, cellula rem abire videtur, qu& posterius radices emergunt, quae, cum plantA propri& s. plumulA haud junctae, un& cum corpore, quo provenerunt, decidunt. Massa ilaque ilia cellularis primitiva , quam pro embryonis cotyledone decliare multis auctoribus placet, propter radices, quae ips& exoriuntur, cotyledon radicans appellanda foret, cuius nullum, quod sciām, exemplum exsistit. Verumtamen negari nequit, similem ipsi atque cotyledonibus vegetabilium perfectiorum functionem, plantae juvenis nutritionem, esse adtribuendani. Ast functio ista turn demum locum obtiaet, postquam massa primitiva plantam novam generavit, dum cotyledones verae plantulam nonnisi alunt et tutantur.

Quibus rationibus moli, *Filices* a plantarum colyledonibus gaudentium numero excludimus, tametsi aperte fatemur, eas nee non alias quasdam familias a *Cryptogamis* propriis, quibus a LINNJEO aliisque accensentur, tan tope re distare, ut classis *Cryptogamarum* in

divisiones duassequoac pañ jure dispescenda videatur, ac *Phanerogame:rum* in *Mono-et Di-Cotyledoneas*. Uti hae pro vasorum straturd duplice dividuntur, ita *Cryptogamce* ab illonnn proesentiA vel defectu in tribus duas segregandae for eat.

Systematicam denique *Filicum* divisionem quod attinet, imprimis melhodum, quam divus WILLDEOW proposuit, sequemur, neutiquam tamen neglectis, imo diligenter obser-vatis, quaequaegregia viri cl[‡] R. BROWN, BORT DE ST.-VINCENT et maxime KAULFUSS ad earn corrigendam perpoliendamque coDtulerunt.

Historiam studii *Filicum* a primordiis inde exposituri, cum ea, qua^{*} rerum Botanicarum scriptores jam pracsiterunt, repete necesse haberemus, turn ab operis nostri ratione aperte discederemus. Illam vero, quâtenus *Filices Lidice orientalis* spectat, paucis enarrasse, vix supervacuum, imo necessarium existimavimus.

Viri memoriâ aeternâ dignissimi, RHEEDE et RUMPHIUS, primi fuerunt, qui ope-ribus splendidissimis, de quibus COMMELINUS uterque et BURMANN optime meriti sunt, divitias revelarunt, quibus Flora *India orientalis* circumfluit. *Filicum* species circiter *quinquaginta*, et formas jam istas magnificas, quibus traiisitus ad *Palmas* paratur, libris illis descriptas maximamque ad partem iconibus collustratas reperimus, quarum plures definitionem accuratam adhuc desiderant*. Eâdem

* Quum consilium cepimus, hocce opere res obscuras in libris istorum auctorum, quantum in nobis si turn est, explanandi, *Filices* omnes, quas descripserunt, enumerare, et genera, ad quae pertinere \identur, determinare volumus. Quod autem hujusmodi conatus claudicent nee labe careant, in rem ipsam cadit. Etenim iconum et descriptionum istarum facie imiversâ potius, quam scrupulosa partium singularum consideratione inniti possumus, utpote quarum imago xpissime non nisi adumbrata ibi exhibetur.

Cel. RHEEDE volumine duodecimo *Horti Malabarici* genera et species *Filicum* septemdecitu descripts et depinxit :

<i>Acrostichum</i>	i	Tab. 19, p. 39.
<i>Antrophyum</i>	1.....» 10,	p. 21 (HEMIONITIS <i>cordata</i> HOOK.)
<i>Grammitis</i>	1 » 74» P« 1 4 ^I -	
<i>Niphobolus</i>	1 » 29, p. 57.	
<i>Polypodiwn</i>	2 » 11, p. 23; tab. 12 et i3, p. 25.	
<i>Aspidium</i>	3 » 16, p. 33; tab. 17, p. 35; tab. 3i, p. 61. Inter haec uiuum dubium.	
<i>Asplenium</i>	i *	18, p. 37.
<i>Diplazium</i>	i *	i5, p. 3i.
<i>Adiantum</i>	i *	39, p. 72.
<i>Lomaria</i>	i *	35, p. 69.
<i>Leptochilus</i>	i *	30, p. 59.
<i>Lygodium</i>	3	32, p. 63; tab. 33, p. 65; tab. 34, p. 67.

Apud Rumphium vero volumine sexto *ffortus Amboinensis* *Filices* triginta quinque descriptas repe-rimus, quarum plures iconibus carent. Attamen quum et harum nonnullas possideamus indolemque

fere aetate eel¹¹ viri BREYNIUS, HERMANN, KAEMPFER, PETIVER et PLUKENETT species quasdam novas addiderunt. Uti cl^{if} MORISSON, RAY et TOXIRNEFORT prima fundamenta systematic[®] *Filicum* dispositionis debemus, ita immortalis LINN[^][^] non modo genera earum certiora condidit, sed et species circiter triginta *Indies orientalis* terrarumque confinium divulgavit. Ab incrementis laetissimis inde, quae viri illustrissimi ingenio historia naturalis, et praesertim *Botanice* cepit, *Cryptogamologia* in genere, et hinc *Filicum* cognitio celerrime progressa est. Sane neminem inter rei herbariae peritos fugit, quam praedclare viri egregii SMITH, SWARTZ, BERNHARDI, WILLDENOW, temporibusque novissimis R. BROWN, KAULFUSS aliquie, quorum nomina singillatim recitare longum foret, de pulcherrimâ istâ familiâ meriti fuerint. Hinc fieri non potuit, quin numerus haud ita exiguus *Filicum Indios orientalis* regionumque adjacentium pernotesceret. Ita BORY DE ST.-VINCENT, vir in Flora delubris seque ac in Martis castris versatus, plus 70 species ex insulis *Mauritii* et *Borbonice* protulit, et longe plures adhuc in scriniis suis esse reconditas innuit; cl. BURMANN ex+herbario ditissfrno, quod eel. HERMANN reliquit, species nonnullas *Zeylanicas* edidit; viro solertissimo CAVANILLES species circiter decem e *Philippinis*, totidemque cl^o DESVAUX ex insulis *Mauritii* et *Borbonice* debemus; viri cV DON, HAMILTON, HOOKER, ROXRURGH et WALLICH e thesauris immensis *Nepaul Indiceque* finitima species plus 80 novas in lucem ediderunt, quorum copia adhuc major cV WALLICH *Tentamen de Filicibus*, jam dudum exspectatum, condecorabit; cl¹ DRYANDER, FORSTER, HOFFMANN, HOUTTOTJYN, JACQUIN, LAM ARK, LOUREIRO, POIRET, RETZIUS, SCHKTJHR, SMITH, etc., diversis e regionibus ad 4° species in medium protulerunt; eel.

descriptionum sat bene nosse nobis videamur, ipsas quoque utcunque ad genera sua amandare valemus. Genera nempe sequentia in opere isto occurunt :

<i>Platycerium</i>	i	P. 83.
<i>Polybotrya</i>	ii	Tab. 35, fig. i, p. 78.
<i>Polypodium</i>	IS.	» 36, p. 78; tab. 35, f. a, p. 80; p. 84 (hoc dubium). *
<i>Aspidiurn</i>	I.S.	P. 69, tab. 30, fig. a; p. 70, 7a, 3, 74 (quorum plura ambigua).
<i>Asplenium</i>	II.	Tab. 37, fig. i, p. 8a; tab. 37, fig. a, p. 8a.
<i>Viplazium</i>	\$.	» 29, p. 67 ; p. 72 (hoc quadam modo dubium).
<i>Cheilanthes</i>	< ¹	" 34, fig. a, p. 74; p. 74.
<i>Adiantum</i>	¹	34, fig. 1, p. 77.
<i>Lomaria</i>	1.	» 3i, fig. 1, p. 71.
<i>Davallia</i>	1.	11 3a, fig. 1, p. 73.
<i>Cyathea</i> vel genera affin.	II.	P. 63 (unica depicta).
<i>Gleichenia</i>	1.	Tab. 38, p. 85.
<i>Lygodium</i>	I.J.	» 33, p. 75 ; t. 3a, f. 2 et 3, p. 76 (quorum unum fors nil nisi varietas).
<i>Schizaea</i>	i	P. 9 ² .
<i>Ellobocarpus</i>	i	Tab. 74, f. 1, 176.
<i>Helminthostachys</i>	ii	w 68, f. 3, p. i53.
<i>Ophioglossum</i>	I.	» 37, p. 84; t. 68, f. a, p. i5a.
<i>Marattia</i>	i	» a8, p. 65.
<i>Angiopteris</i>	1.	» 30, f. 1, p. 70.

- KATELFUSS turn ex opibus, quas peregrinator infatigabilis CIAMISSO collegerat, turn ex suis circiter 12 descripsit; ad 60 species vir egregius SWARTZ praeclarissim⁹ *Filicum Synopsi* divulgavit; illustris THUNBERG *Japonice* illibatae species fere 20 erepit, dijusque WILLDENOW ad 50 in opere suo, nunquam satis laudando, palam fecit.

Numerus idcirco omnis *Filicum Asice meridionalis* insularumque confinium prope quadringentas explebit, partemque circiter quartam specierum cunctarum, quae hucusque in orbe terrarum detectae fuerant, adaequabit. Ex hisce vix 40 species hactenus in *Javd* innotuerunt, quarum 20 circiter insulae isti propriae forent. Exiguus sane iste numerus apparebit, ubi cum multitudine comparator, quam in *Enumeratione Plantarum Javce* (fasc. II) jam nunc indicavimus. Hinc enim patet, Floram *Javanicam* non modo ingenti et *inexspectata* copia, sed et, prouti totam vegetationem archipelagi Indici et maxime hujus insulae, prodigia superbire luxurie, plia vegetabilia ista veluti in immensum crescunt.

Hisce tamen divitiis baud praepollent regiones depressae magisque cultae, licet non omnino iisdem orbae. Jamjam enim in littore, praesertim fluviorum ad ostia, nonnullae proveniunt *Filices*, uti *ACROSTICHUM incequale* et *speciosum* WILD., quarum formae colosseae primā fronte clementiam coeli tropici loquuntur. Verumtamen paucae tantummodo species paucaque genera pro copia plantarum *phanerogamarum* ibi crescunt. Quo longius autem a littore abieris, per colles cultos versus montes progressus, eo majore tarn specierum quam generum multitudine familia ista exuberat.

Profecto stupenda est *Filicum* abundantia in sylyis radices montium altorum convestientibus, qui in *Javd* interiore quāquā versus patescunt, nunc in jugum humilius excurrentes, nunc in fastigia aēria 6-i3000 pedum editi. Jam hie tot *Filices* aliaque *Cryptogama* conspicaris, ut fluctues, utrum haec an *Phanerogama* praevalere dicas. Si enim *Phanerogama* laeto vigore modo fruticeta sistunt mirum quantum inter se contexta arborumque altiorum cacuminibus inumbrata, modo sylvas profundas ex arboribus crassissimis et procerissimis, quarum coronas longe lateque diffusae quemvis solis radium arcent : vegetabilia acotyledonea haud minore excellunt largitate. Mole quidem massāve stirpium singularum *Phanerogamis* cedunt, ast, quum non raro plus quinquaginta species *Cryptogamorum* diversae uni eidemque stirpi inhaereant, in dubio relinquitur, utra tribuum istarum regni vegetabilis numero antecellat.

Quamvis nobis contigit, ut complures per annos Floram *Javce* per vestigaremus, plantis *Cryptogamicis* nequāquam neglectis, ingenue tamen fatemur, nos de ratione numerali, quae *Cryptogamis* cum *Phanerogamis* ibidem intercedat, nil certi statuere audere.

Etenim herbarium, quod congessimus, minime pro completo censendum, partem reverā exiguum thesaurorum complectitur, quibus Flora terrae istius afflit. Quāre, quae ad familiarum naturalium numeros spectant, melius omissis,

utpote quibus Flora demum accuratissime exquisite multum tribuendum est, ad genus quod yis distributionem specierum paucis exposuisse satis habemus.

Observatum adhuc volumus, in *Javd* insulisqire a cljacentibus non nisi in fitiontosis conditiones concurrere, quae *Filicum* ubertati atque copiae maxime favent. Plurimum ad hoc conferre solum Vulcanium multa humo commistum, nemo dubitabit. Quum autem pleraque *Filices Javanicce*, licet parasitae stride sic dictse non sint, arboribus innascentes cum solo ipso nullum habeant commercium, praeter latitudinem, sub qua terra sitae sunt, et alias quasdam res respicere oportet. Inter has tenet primas aëris humiditas nee non insignis saltuum altitudo, quibus calor tropicus imminuit, ita ut montes iidem saepe temperie terrarum plurium, latitudine diversissimarum, fruantur.

POLYPODIACETE R. BROWN.

R. BROWN *Prodr. Flor. Nov. Holl. ed.* NEES, p. i. — KUNTH
Syn. I, p. 66. — BORY DE ST.-VINCENT *in Diet, class, d'hist. nat.* VI, p. 586. — KAULF. *Ueber das Wesen der Farrnkr.* p. 52.

Filices gyratce SWARTZ *Synops.* p. 5.

Filices WILLD. *Spec. PL V*, p. XLVII.

Filices vera? SPRENG. *Syst. Veg. IV*, p. 5.

CHARACTER DIFFERENTIALS.

CAPSULE liberae, annulo vero centrali vel excentrico ornatse,
 transversim irregulari-dehiscentes.

FRONS circinata.

OBSERVATIO.

Haecce *Filicum* tribus non modo genera plurima, sed et specierum omnium paries ferine ^ complectitur. Praecellit autem magis capsularum structure, quam habitu, quo genera plura, hûe spectanlia, cum ad *Gleicheniaceas*, turn ad reliquas tribus accedunt. Ut in omnibus *Filicibus* ita et hie situs organorum fructificationi inservientium e frondis vasorum decursu, distribulione exituque pendet. Apparent primum, el quidein vel in fronde adhuc convoluta ut vesiculae parvae, flavicante-virides, quie tegumenlo tenero

pellucido materiem mucoso-granulosam continent. Ulterior vero evolutio vim exserit singularem non solum in locum, quo inseruntur, qui plerumque plus minusve spliacealim degeq^rat, sed etiam saepe in totum frondis habituni, explicatione parenchymatis foliacei nonnunquam omnino suppress[^]. Vesiculae istae s. capsulae juvenes magis magisque intumescent; gyrus s. annulus clarus magis magisque conspicuus evadit, qui in ipsis aut rectA adscendit, aut eas directione sub-obliquA cingit, et, si hoc accident, supra punctum insertionis exoritur. Hoc contra cum annulo rectA adscendentem plerumque jungitur, et velut in ipsum transire videtur. Constat annulus ille serie simplice cellularum connexarum, et quasi canalem sistit, qui septulis transversis in loculos plures divisus, ad alterum capsulae latus eyanescit, cellulis suis attenuatis magisque contractis hie speciem annuli spurii referentibus. Quo magis capsulae maturescunt, eo distinctiores annuli articulos singulos conspicimus, ita ut advertere liccat, eos cum capsularum pariete in tern o baud cohaerere. Quae quum ita sint, capsulae prius magis oblongs plerumque formam magis rotundam assumunt, demumque irregulari-transversim dehiscunt a latere annulo opposito, quo membrana capsularis tenuissima est. Sporae turn subsultim exploduntur, annuli articulis magis magisque inter sese deeedeutibus.

H&c igitur annuli structure *Polypodiacece* ab omnibus reliquis *Filicum* tribubus differunt, quarum capsulae itidem annulo gaudent. In bisce enim vitta striata s. annulus spurius non modo capsulam circumcingit, sed etiam tandem aperturft sursum direct[^] et in capsulae membranam abeunte perforator; in *Polypodiaceis* autern tubus articulatus s. annulus verus capsulas non ab omni parte vallat, capsulaeque latere ill! opposito debiscentia hiatuque articulorum annuli rumpuntur.

Cl. BORY DE ST. VINCENT primus *Polypodiaceas* R. BR. in tres familias disribuendas proposuit : 1° In *Polypodiaceas*, quarum sori indusiis carent; 2° In *Aspidieas*, indusio convestitas; 3° In *Hymenophylleas*, non modo frondis consistent[^], sed et columell& (*sporangiphoro*), cui capsulae insident, insignes.

Tribuum istarum sola ultima naturalis nobis videtur, quia un& cum babitu peculiari, a reliquis *Polypodiaceis* alieno, capsularum quoque formatio insigniter aberrat, quiapropter plantae illae quodammodo ad *Gleicheniaceas* accedunt. Capsulae enim lateraliter affixae sunt, annulusque, etsi incompletus, sub-oblique, tanquam anfractu, ipsas excentrice cingit, capsule tamen non per annum, sed a latere, quod ipso denudatuin, et oppositum est, debidente. Similis excentrica annuli insertio, minori tamen gradu, etiam in *Cyathea* aliisque quibusdam generibus occurrit, ita ut et baec, ubi *Hymenophylleas* a genuinis *Polypodiaceis* sejunxeris, excludere necesse foret, imprimis quum'in bisce jam columella adsit, capsulis pro receptaculo inserviens. Talis vero diremtio ne longius prolaberetur, timendum esset, multaeque plantae, habitu penitus inter sese congruae, liicce ratione notis omnino artificialibus divellerentur. Hoc imprimis in generibus *Cyathea* SMITH, *Alsophila* R. BROWN et *Hemitelia* R. BROWN patet, quae totft facie intimam cum *Polypodiaceis* cognitionem pree se ferunt. Nee minus idem in *Aspidieas* BORY valet, quae a *Polypodiaceis* non discrepant, uisi quod indusio*, parte saepe parumper conspicuA, imo fugacissimA, nulisque habitus mutationibus stipatA, munitantur. Quae diximus, ipsis generibus *Poly-podium* et *Aspidium* luculentissime probantur, quae, familiarum istarum typus, saepe

* E *Botanicis* multi indusium pro substantiae foliaris epidermide solutâ existimant. Subtilis vero ipsis consideratio a primordiis suis inde nobis persuasit, ipsum peculiarem esse partem, quae e vasorum decursu exituque pendeat. Quâ notâ magis, quam structurâ et functioue a paleis diffcre videtur, quarum supra (p. 4) mentionem fecimus. An vero ad conformandum indusium inem-brana, vasa obducens, plus contribuat, quam vasa ipsa, uti suspicamur, experimenta ulteriora docebunt. Nullo tamen alio munere, nisi quod genitalia obtegat, et, maxinie in evolutionis principio -^ tutetur, fungi videtur. Nam si ad fructificationem pertmeret, prouti cl. TAEVIRANUS affirmat, cert% iu tanto *Filicum* numero haud omnino deesset.

difficillime distinguuntur. Utique ipsissimus cl. BORT C POLYPODIO *Oreopteride*, *Thelypteride* et *unito uovum* genus *Lastrea*, in veris *Polypodiaceis* numerandum, condidit, licet omnes istae species, indusiis oruatae atque *Nephrodia* genuina, *ad. spidieas* ainandari deberent.

Quod de caus& satius ducimus, *Polypodiaceas* pro annuli insertione in divisiones duas, genera vero secundum affinitatem naturalem distribuere. Accensemus illarum prionem genera omnia, in quorum capsulis annulus centraliss. rectus est, i. e. a capsulae pedicello vel insertione versus latus allerum recti adscendit, quare BERHARDI ipsa *Filices catetogyratas*, KAULFUSS autem *Polypodiaceas* vocavit. Alterius vero in numerum recipimus *Helicogyratas* BEAHARDI S. *Cyatheaceas* KATJLF, quarum annulus excentricus s. obliquus capsulae partem ambit. Reliquum est, ut notemus, nos exemplum auclorum aliorum secutos, ad discernenda hujus familias genera notis insignioribus, e. g. capsularum dispositione, indusii praesentii aut defectu form&que fuisse usos. Capsularum enim formatio ipsa, mullo constanterior, in plerisque parumper aberrat.

A. POLYPODIACEJE GENUINE.

I. POLYBOTRYA HUMB. ET BONPL.

HUMB. et BONPL. NOV. *Gen. Plant.* I, p. 23. — WILLD. *Spec. PI.* V, p. go. — KUNTH *Synops. PL* I, p. 91. — KAULF. *Enum. Fil. fa* 55. — EJUSD. *Veber das Wes. der Farrnkr.* p. 71. — SPRENG. *Syst. Feget.* V, p. 5. 5233.—BLUME *Enum. Pl. Jav.-Fil.* p. 99.

Olfersia RADD. *Opusc. scient. di Bol.* 1819. //, p. 282. — EJUSD. *Fil. Brasil.* p. 7.

Osmundce spec. LINN. *Spec. Plant.* i52i.

Acrostichi spec. SWARTZ *Syn. Fil.* p. i3 et i4. — WILLD. *Spec. PI.* p. 112 etp. 120.

CHARACTER DIFFERENTIALS:

CAPSULJ: faciem inferiorem frondis contractae involutae dense tegentes.

INDUSIUM nullum.

VEGET : *Filices terrestres*, caudice ut plurimum repente vel ten-is oblique immerso. Frondes ternatae, pinnatae vel tripinnala* (plantae nondum explicatae saepe simplices), sub-membranacese,

veni» furcatis, rarius reticulatis; fertiles subtus capsulis confertim obductae, sensim magis magisque contractae, marginibus simul involutis, ita ut, frondis substantiâ fere penitus absumentâ, margo tantum angustus, capsulis dense opertus, ad costam utrinque remaneat. Quam ob rem frondes fertiles, ab initio sterilibus conformes, tandem magis dividuntur, quia capsulae costulis venisve foliolorum lateralibus approximantur. Talis frondis metamorphosis per contractionem circa venas laterales istis tantum accedit speciebus, in quibus venae sat fortes capsularum evolutioni atque coarctationi ulteriori resistunt, e. g., in POLYBOTRYA *cervind* KAULF. (OSMUNDA *cervind* LINN. — ACROSTIGHO *cervino* SWARTZ — PLUM. *Fil. Tab. i54-*). Venae aulem superficiariae aut reticulata[^] contractione insigni vel evanescunt, vel vestigia solummodo oblitterata ad costam utriusque linquunt, circa quae capsulae conglomerantur, id quod, e. g., in *P. queriefolid* BL. (ACROSTIGHO *queriefolio* RETZ. — SCHKUHR Kiypt. *Gew. t. 3*) et in *P. vivipard* HAMILTON (HOOK. *Exot. Flor. XI, Tab. 107*) videmus.

AFFINIT : Genus hocce, a cl^{is} HUMBOLDT et BONPLAND conditum, hinc *Acrosticho* LINN., illinc *Hemionitiidi* LINN. et[^] *Xymnogrammce* DESV. summe affine, ab omnibus eximiâ frondis fer-tilis contractione, et ab hisce praesertim fructificationibus differt, quae minime soros lineares venis lateralibus insidentes referunt, imo amorphae s. dense aggregatae circa easdem contrahuntur. Minorem ceteroqui contractionis gradum etiam in fronde *Acrostichorum* quorundam, e. g., *A. incequalis* et *speciosi* WILLD., deprehendimus, unde maxima generis utriusque cognatio magis adhuc liquet. Limites itaque accurati certique inter genus utrumque poni nequeunt, quum contractionis gradus a fortuito, e. g., a substantiâ frondis plus minus tenerâ, a venarum evolutione majore vel minore, dependeat.

DISTRIBUT : Species *quinq*ue, hunc ad diem usque cognitae, quibus *unam* novam *tresque* prius in *Acrostichis* numeratas addituri sumus, zonam calidam incolunt, *quatuor* quidem *Americanam*, et *quinq*ue *Asiam australem*; ex his *duce archipelago Indico* propriae videntur, *una* vero tarn huic quam *Asia?* continentis communis est.

1. POLYBOTRYA AURITA.

TAB. I.

P. fronde longe stipitatA ternatA in venis utrinque puberulA, foliolis sessilibus pinnatifidis, sterilibus laciniis oblongo-lanceo-jatis acutis integris, superioribus obtusissimis, lateralium infimâ exteriore elongate lato-lanceolat&, fertilibus laciniis angusto-linearibus costatis capsulis creberrimis obtectis, stipite paleaceo. BL.

P. orientalis BLUME *Enum. PL Jav.* — *Fit. p. 99. 1.*

Acrostichum auritum SWARTZ *Syn. Fil.p. i3. 22, etp. 198.* —
WILLD. *Spec. PL V. p. 112. 31.* — SPRENG. *Syst. Feg. IV,*
p. 36. 43.

FILIX Jlorida RUMPH. *Hort. Amb. VI* p. 78. tab. 35, fig. 1.*

HABITAT : Reperta sylvis humidis montis *Javanici Nagar* et in insula *Nusa Kambangan*, ubi saxosis umbrosisque moram ripis frequens. Amicus SPAHOGHE, cui plantas multas, in *Javd occidentali* detectas, debemus, specicin eandem parte meridionali provinciae *Bantam* e memoribus magis depresso legit. Primus autem immortalis RUMPHIUS ipsam in *Moluccis* detexit; iconem enim suam, supra citatam, huc spectare, dubium non est. Cl. THUNBERG eandem in *Java* reperit, et SWARTZ ex istis speciminibus *ACROSTICHUM auritum* descripsit, quod nuperrime etiam in *Philippinis* innotuit. Quarum rerum ab initio inscii plantain hance nomine *POLYBOTRYJE orientalis* salutaveramus, quod, leges philosophise botanies veriti, nunc in *P. auritam* mulamus. Namque ob spicas angustas, quibus frons fertilis componitur, planta nostra haud minbri jure, quam *ACROSTICHUM ceruinum* Sw. et *A. linearifolium* PRESL *Polybotryis* cst adnumeranda.

FILIX 1-2-pedalis.

CAUDEX fere subterraneus, lignosus, brevis, digitii crassitie, stipitum vetus-torum reliquias circumvallatus, prosertim inferne radiculosus, apicem versus, quo supra terram paululum assurgit, dense paleaceus. *Radiculce* s. *Fibrilke* 3-6-pollicares, basi crassitie filii linte, ramosae, partim ramosissirae, sub-horizontales, fuscae, fibrillis tenerioribus leviter tomentosis. *Rcliquice stipitum* sibimet propinquae, appressae, basi quidpiam incrassate, paleaceae, in speciminibus adultioribus sub-conicae et fere denudatae.

FRONDES ex eodem caudicej^/erft'/e^ longius stipitatae.

STIPITES sterilium 5-pollicares vel fere pedales, fertilium 1-2-pedales et longiores, graciles, crassitie pennae corvinae, sub-erecti, teretiusculi, supra canaliculati, longitudinaliter sub-striati, badii, in planta adhuc circinatâ tomentosi totique paleacei, in adultioribus sursum nudi et vix ferrugineo-tomentosi, proxime frondem pubescentes, deorsum glabri sparsimque paleacei, inter foliorum insertionem nonnunquam proliferi. *Pwlificationes* solitariae, sessiles, ovato-globosae, e paleis arete imbricatis. *Palece* tarn caudicis quam stipitis 2-3-lineares, linearis-subulatae, acuminatissimae, sub-patentes, membranaceae, margine tenuiores, ferrugineae, arctissime reticulatae, pube minutissimâ obsitae; proliferationum minores et angustiores.

FRONS *sterilis* ternata, circumscriptione cordato-bvata, 5-7-pollicaris, latitudine vix minore. *Foliola* sub-sessilia, inaequalia, acuminata, pinnatifida, membranacea, hinc inde, maxime in venis utrinque, sub-pubescentia; *intermedium* lateralibus longius, circuitu oyali-oblongum, basi attenuatum, ad integrum apicem usque pinnatifidum; *lateralia* circumscriptione dimidiato-cordata, lateribus valdopere inaequalibus, margine externo profundius pinnatifida. *Laciniae* inaequales: *superiores* decrescentes, sensim confluentes, obtusae, integerrimac; *inferiores* sub-falcato-lanceolatae, acuminatae, acutiusculae vel obtusiuscula?, repando-crenatae vel integerrimae; infima exterior foliorum lateralium elongata, deflexa, leviter pinnatifida. *Costa media* subtus stipiti concolor, supra, prouti venae laterales primariae, ferrugineo-tomentosa. *fence secundarie* sub-dichotomo-reticulatae, in pagina inferiore distinctiores.

FRONS *fertilis* angustior sterili, cuius quasi skeleton e costis venisque primariis, hinc profundius partita folioque ternato, foliolis sub-bipinnatis instructor similis. Divisio sua divisioni costarum venarumque primariarum frondis sterilis tarn exacte respondet, ut laciniae et hie oppositae aut alternae sint, pro modo, quo venae primariae in sterili dividuntur. *Pinnidice* graciles, assurgententes, indivisa^ ramulis brevibus instructae, ut laciniae angustae, quarum margines inflexi capsulis omnino teguntur, spiculis sub-cylindricis similes. *Rachis* cum universalis turn partialis capsulis destituta, utrinque leviter tomentosa, subtus distinctior, quam supra, ubi reliquiis substantiae foliaris contractae angustis inflexis fere penitus obtegitur.

CAPSULÆ pedicellatae, numerosissimae, confertissimae, minimae, lenticulares, ferrugineae, subtiliter reticulatae, hinc annulo incompleto cinctae, illinc infra annuli finem transverse dehiscentes. *Pedicelli* longitudine inaequales, superne parum incrassati, pellucidi, cellulosi. *Sporas* sub-globosae, parum angulatae, fuscae.

EXPLICATIO TABULÆ.

POLYBOTKYA aurita ; mogn. not.

Fig. 1. Fragmentum frondis fertilis; *auct.*

Fig. 2. Capsulae ; *auct.*

2 POLYBOTRYA CICUTARIA.

TAB. II.

P. fronde longe stipitatA ternatd in venis subtus fulvo-tomentos&, foliolis petiolatis pinnatifidis, sterilibus laciniis linear-lanceolatis acuminatis integris, superioribus obtusiusculis, lateralium infimd exteriore elongate lanceolate pinnatifidâ, stipite inferne paleaceo. BLUME Fil. Jav. p. 100. 2.

HABITAT : Cl. VAN HASSELT speciem hanc ad ripas lapidosas *Tjikalong* provinciae australis *Bantam* detexit. Specimen in ipsius herbario servatum sterile quidem est, asthabitu cum praecedenti adeo congruit, ut generi *Polyhotrya* ipsam accensere nulli dubitcmus. Differt a *P. auritA* BL. imprimis foliolis petiolatis, profunde pinnatifidis, longius accuminatis, quorum laciniae multo angustiores, magis acuminate potiusque erecto-patentes, quam sub-falcatae.

FILIX circiter 1 2-2-pedalis.

CADEX obliquus, prope subterraneus, lignosus, brevis, crassiusculus, inter stipitum reliquias undique radiculas exserens, sursum squamis multis coacer-vatis horrens. *Radiculae* 4-8-pollicares, horizontali-proserpentes, fuscoe, inferne filiformes, et in fibrillas multas teneras tortuosas divisae. *Stipitum reliquiae* solitariae, appressoe, teretiusculae, fistulosae, fragiles.

FRONDES 7-10-pollicares, stipitatae, e parte caudicis supernâ alia supra aliam exortae.

STIPES 8 poll, ad 1 ped. longus vel longior, erectus aut sub-tortuosus, e fusco atro-purpurascens, inferne crassitudine pennae corvinae, sub-trigonus[^] paleis sparsis, sursum tenuior, teretiusculus, glaberrimus, hinc sulco levi sursum sub-tomentoso exaratus. *Prolificationes* in petiolorum axillis haud raro obviae, solitariae, parvae, squamis plurimis teneris efformatae, inferne saepius fibrillas plures filiformes, simplices, tortuosas, sub-tomentosas, emittentes. *Palececaudicis* stipitisque circiter i[^]-lineares, linearis-subulatae, acuminatae; caudicis erectiusculae; stipitis patulas aut yarie flexae, membranaceae, fuscae, margine denticulato-sub-ciliatae; proliferationum longe minores.

FRONS sterUis ternata, circumscriptione oyata, 5-8-pollicaris, et vix angustior. *Foliola* breviter petiolata, magnitudine inaequalia, acuminatissima, profunde pinnatifida, membranacea, in cost& mediâ venisque primariis supra ferrugined-

tomentosa, subtus puberula; *intermedium* lateralibus longius, circumscriptione ovato-oblongum, inferne in petiolum attenuatum, superne in acumen longum sub-integerrimum excurrens, venis divergentibus, pinnatis. *Foliola lateralia* circumscriptione dimidiato-ovata, ob venas sub-ternato-pinnatas velut folium ternatum simulant, cujus laterale, introrsum directum, minimum, ligulatum et integerrimum, medium maximum utrinque pinnatifidum, externum denique extrinsecus solummodo pinnatifidum, intus remote dentatum. Vel quoad foliola frondis lateralia dixeris, latus interius angustius minus profunde obtuso-pinnatifidum, externum latius autem fere usque ad costam medium pinnatifidum esse cum laciniā basilari elongatā, obtuse pinnatifidā. *Lacinios* lineari-lanceolate, acuminatae: inferiores longiores, erecto-patentes, remote bbtuso-dentatae aut denticulate aut integerrimae; superiores sensim breviores, sub-falcate, obtusiusculae, apicem versus dentiformes, foliorum lateralium intus breviores, obtusiores, uti et externe laciniarum basilarium elongatarum. *Roches* s. *Petioli* folioli intermedii semipollicares, lateralium dimidio breviores, teretes, supra ferrugineotomentosi, subtus glabriuscui et uti ad basin coste mediae stipiti concolores. *Venos* primarice utrinque distinete, sub-opposite, secundarice solum in pagina inferiori conspicuae, inter sese conferte, reticulato-anastomosantes, sub microscopio scabriuscuse.

EXPLIGATIO TABULA.

Planta ; magn. nat.

Paleac duae ; auct.

3 POLYBOTRYA MARGINATA.

TAB. III.

P. fronde utrAque pinnatA, pinnis sterilibus sub-sessilibus oblongis obtusis basi sursum truncato - auriculatis, deorsum cuneatis crenato - serratis glabris, fertilibus multo minoribus cylindricis' aut sub-globosis, rachi sterili marginatā, stipite glabriusculo. BLUME *Fil. Jav.p.* 100. 3.

ACROSTICHUM *viviparum* HAMILT. MSS. — SPRENG. *Syst Feg.* VI,
p. 36. 47.

A. *appendiculatum* HOOK. *Exotic Flora II.* 11.108. tab. 108.

HABITAT : Species haec primo D^{ri} BUCHAWAF HAMILTON in *Bengale meridional[^]* mihi autem in provinciS Krawang Java innotuit, ubi ad radicem montis Burangrang rupibus basalticis, cataractac plus 80 pcdes altae

con termini's, innascitur. Ob frondis fertilis substantiam demum vix non omnino absorptam marginumque residuorum involutionem ab *Acrosticho* scparanda est. Quae notae quum in figurfi citat& haud expodtae sunt, iconem accuratiorem description! adjungere, minime prater rem duximus.



FILIX 5-1-pedalis et altior.

CATJDEX lignosus, repens, teretiusculus, pennâ anserinS. tenuior, portione recenti paleaceo-crinitus, emoriente sub-nudus et supra hinc inde circumval-latus, per longitudinem totam infra radiculosus. *Radiculce* capillares, numero-sissimae, confertissimae, ramosae, intricate, deorsum imprimis, ubi lapidibus inhaerent, ferrugineo-tomentosae. *Reliquiae stipitum* caudicem supra vestientes, sub-alternae, partis emortuae minus confertae, partim protuberantiis brevibus solidis, partim petiolis fistulosis longioribus similes.

FRONDES tarn steriles quam fertiles e parte caudicis recenti profectae, supra ad utrumque hujus latus sub-alternae, utraque impari-pinnata.

STIPES usque ad pinnarum insertionem 2-3-pollicaris, crassitie pennae passe-rinae, erectus, teretiusculus, basi sub-nodosus, sub-paleaceo-crinitus, fuscus, sursum gracilior, e fusco-flavescens, supra canaliculatus, glabriusculus, hinc inde punctis fuscis paleisve setaceis solitariis adspersus, proxime pinnas utrinque ad canaliculum angustissime alatus; fertilis plerumque unciis aliquot longior et flexuosus, pallidior. *Palece* caudicis junioris vix lineam longae, confertissimae, appressae, angusto-subulatae, acuminatissimae, margine irregulari-denticulatae, fuscae, laxe reticulatae; stipitis superioris racheosque remotae, appressae apiceve patentes, multo minor es, ast pro portione basi latiores magisque ro tun date, margine sub-erosae, pallidae magisque diaphanas quam in centro, ubi punto obscuriore quasi peltato-annexae, lapsae punctum fuscum relinquentes.

FRONS *sterilis* 4-8-pollicaris, circumscriptione lanceolata, pinnata : pinnae utrinque circiter 18-17, alternae aut sub-oppositae, deorsum quidpiam, sursum maxime decrescentes, in acumen longum, lineare, obtuso-serratum s. pinnam terminalem, nonnunquam proliferam confluentes, brevissime petiolatae, patentes, lanceolato-oblongae, obtusae aut obtusiusculae, basi sursum truncate et (plerum-que) obtuse auriculatae, deorsum cuneate, grosse crenato-serratae, serraturis acutis inflexo-appressis, sub-membranaceae, supra nigricanti-virides, glabrae, nitidiusculae, ad margines versus nigro-punctate, subtus e viridi-canescentes, hinc inde paleis minutis consite; *superiores* minores, sessiles, obovate, non auriculate; *terminalis* omnium longissima et angustissima. *Fence laterales* supra distinctions, sub-parallelae, furcatae, rarius trifidae, ramulo interno versus serraturam inflexam, externo versus crenulam obtusam assurgente, et margine, ubi evanescit, punctum parvum nigrum oblongum efformante. *Rachis* teretiuscula, ad pinnarum insertionem utrobique alata margine angusto, decurrente, integer-rimo, membranaceo, supra glabriuscula, subtus sparsim paleaceo-setosa. *Proli-ficationes* solitariae, lateribus pinnarum terminalium infixae, globosae, squamulis atro-fuscescentibus conformatae.

FRONS *fertilis* longius stipitata, sterili brevior, circumscriptione linearis, subopposito-pinnata, apice pinnatifida. *Pinnae* breviter petiolatae, erecto-patentes, ab initio sterilibus ferme conformes, astminores, sensim marginibus magis inflexis magis magisque contract®, itaut demum spicaslineari-oblongas, sub-cylindjicas, capsulis nudis obductas, repraesentent; superiores adhuc minor es, magis rotundatae, sessiles 1. racbi adnatae, versus latera cum terminalibus angustioribus et paululum acutioribus junctae. *Rachis* uti in fronde sterili, sed longe minus marginata, supra obsolete canaliculata.

CAPSULÆ valdopere coacervatae, pedicellate, turgide lenticulares, ferrugineæ, hinc ad f annulo articulato cinctæ, iUinc sub annulo transverse dehiscentes. *Spores* sub-angulatae, pallide fuscae.

EXPLIGATIO TABULA.

POLYBOTEYA marginata; magn. not.

Fig. i. Capsulae; multum auct.

Fig. a. Pinnula fertilis; bene auct.

II ACROSTICHUM LINN.

LINN. *Gen. Plant, ed. SGHREB. //, p. j56. i6%5.* — SWARTZ *Syn. Fil. p. 9. 1.* — SCHKUHR *Krypt. Gew.p. 1. 1.* — WILLD. *Spec. PL V, p. 100. 1954.* — KUNTH *Syn. PL I. p. 66.* — KAULF. *Enum. Fil. p. 58.* — EJUSD. *JJeber das Wes. der FarrnKr. p. 73.* — RADD. *Fil. Bras. p. 3.* — SPRENG. *Syst. Feg. IV, p. 5. 3234.* — BLUME *Fil. Jav. p. 100.*

Hemionitidis spec, nonnull. LINN.

Osmundce spec. quad. SWARTZ et JAGQU.

Gymnopteridis spec. BERNH. in SCHRAD. Journ. I, 2, p. 20.

CHARACTER DIFFERENTIALS :

CAPSULE sparsæ (squamis nullis mixtae) discum totum inferiorem frondis (sub-confonnis) vel ejus partem obtegentes.

INDUSIUM nullum.

VEGET. : Filices fronde simplice, pinnatâ, rarius bipinnatâ vel tripinnatifidâ, plerumque percursâ venis tenerrimis, confertis, parallelo-furcatis vel simplicissimis, rarissime reticulatis,

subtus ex toto vel e parte capsulis opertâ irregulariter aggregatis, sparsis, magis minusve contiguis, absque indusii vestigio. Species quaedam, e. g. ACROSTICHUM *auritum* SWARTZ, A. *quercifolium* RETZ., A. *appendiculatum* HOOK. (non WILLD.) et verosimiliter A.*heterocliton* PRESL, fronde fertili admodum contract^ inflorescentiam spicatam aut paniculatam referunt, quâpropter ab *Acrostichis* separandae, justius *Polybotryis* adnumerantur. Parker aliae quaedam habitu singulari adeo excellunt, ut genus proprium, *Platycerium* DESV., constituere mereantur, ad quod A. *Stemaria* BEAUV., A. *alcicorne* et *biforme* Sw. pertinent.

AFFIN : Quum ad discernenda *Polypodiacearum*, indusio carrentium, genera diversam imprimis capsularum aggregationem usurpemus, genus *Acrostichum* LINN, veluti typum omnium istarum *Filicum* sistere videtur, utpote cujus fructificationes, in ceteris plus minus symmetrice congregate, omnino confluunt. Proxime vero affine est *Polybotryce* HUMB. et BONPL., in qu& capsularum aggregatio propter frondis contractionem fortem maxima, dein *Gymnogrammce* DESV., cujus multae species, e. g. G. *calomelanos* et G. *chrysophylla* KAULF. , G. *tartarea* et G. *sulphurea* DESV., utrum genus spectent, in medio relinquuntur.

DISTRIB : Circa 70 hujusce generis species unâ cum novis nostris h&ctenus novimus, quarum 16 *Javanicas* ceteris etiam insulis *Malayanis* obvenire veri simile est. Octo ex illis *Javce* cum terrisaliis communes sunt. Scilicet *cjuincjue* cum terr4continenti *Indies orientalis*, A. *obtusifolium*, WILLD., A. *decurrens* DESV., A.*flagelliferum* WALL., A. *incecjuale* et A. *speciosum* WILLD., quorum ultima 2 etiam in *Nova Hollandia* degere videntur; una, A. *conforme* Sw., cum promontorio *B. Spei*, et simul cum *Brasiliâ*; una forsitan cum insulis *Sandwich*, A. *gorgoneum* KAULF.; una denique, A. *viscosum* Sw., et in montibus *Jamaica** et in *India orientali* provenire dicitur.

FILICES.

ACROSTICHUM CALL»OUDK

TAB. IV.

A. frondibus longe stipitatis oblongo - lanceolatis elongatis utrinque acutis coriaceis sub - marginatis parallelo - venulosis glabris, fertilibus longissime stipitatis brevioribus conformibus aut obtusiusculis, stipitis basi caudiceque paleaceis. BLUME *Fil. Jav.* p. 100. i.

HABITAT : In *Jaud Occidentali*, declivia borealia montis igDivomi *Gede*, 8000-9000 ped. supra mare edita, inhabitans, ubi frequentissimum in jugis, quae massis basalticis conformata, inquiline *Goenoeng Batoe* (saxus mons) vocantur, cum multis aliis cryptophytis rupes quam maxime steriles vegetationi uberiori praeparare videtur. Etiam inter plantas, quas RUHL et VAN HASSELT montibus *Karang Java*, altitudine 5000 ped., leguntur, specimen hujus plantae paullo minus, marginibus revolutis stipiteque frondis fertilis nigro-maculato hospitatur. A *latifolio* 5w. perquam affine, fronde sterili conformi, solum aliquantulo minore (in isto ovato-lanceolata) differt, prouti ab *A. longifolio* JACQ. fronde fertili minime spirali revoluti, imo constanter plani, et ab *A* simplice* Sw. fronde marginati discrepat.

FILIX 1-2-pedalis.

CAUDEX lignosus, pennâ anserinS. plerumque crassior, super axis proserpens, dense paleaceus, inferne sparsim radiculosus, superne per 2*i* poll, stipibus ipsorumve reliquiis horrens. *Radiculce* simplices, rarius sub-ramosse, breves, fuscae, pilis fulvis dense obtectse, praesertim juniores. *Reliquiae stipitum* remotiusculae, ^-i-pollicares, cylindricae, fistulosae, sub-nudae.

STIPES 5-io-pollicaris, crassitate pennae corvinae majoris, rectiusculo-adscendens, sub-tetragonus, supra canaliculatus, sulcis i lateralibus, sursum glaberimus, sordide badio-ilavicans, basi tortus, fuscus paleisque similibus uti caudex vestitus. *Paleos* J-i-pollicares, lanceolate vel sub-falcatae, acuminate, integer-rimae, membranaceae, reticulate, ferrugineo-fucescentes, glabrae, margine tantum rare pilifero.

FRONS sterilis 6-i4-pollicaris, i ^-3 poll, lata, oblongo-lanceolata, acuta vel acuminata, infra et haud raro inaequaliter vel oblique in stipitem decurrentis, integerrima, sub-callosa-marginata, planiuscula, margine leviter undulata, coriacea, pallide virescens, opaca, glabra, subtus nonnunquam punctis adspersa solitariis, parvis, minutis, sub microscopio squamulas orbiculares, saturate ferrugineas, in centro affixas, ceterum solutas, referentibus. *Costa media* utrobique, praesertim subtus, elevata, supra sulco exarata, stipiti concolor, modo dilutior. *Vence* tenelloe, parallelae, inaequali-furcate, raro simplices, juxta marginem frondis sub-reflexum pallidum evanidae.

FRONS *fertilis* 4 2-10-pollicaris, 1-2 poll, lata, sterili conformis, ast ssepius obtusior marginibusque tenuioribus diaphanis, subtus prater margines costamque capsulis onusta.

Capsulce minutissimae, confertissimae, fuscæ, ellipsoideæ, per f-f ambitus annulo angusto sub-elevato cinctæ, lateraliter dehiscentes, filo tenero diaphano annexæ. *Sporæ* minutissimæ, sub-globosæ, fuses.

* **Frondibus utrinque acuminatis obsolete punctato-scjuamulosis.**

HABITAT : Haec varietas, quam VAN HASSELT in interioribus provinciae *Bantam* detexit, notatu videtur digna ob frondes utrinsecus magis attenuatas, margine pellucido cinctas, et utrinque, maxime pagina* infera pallidiore, paleis punctis minutis stellatis pallide ferrugineis adpersas. In costa autem utrobique prominulfi, subtus superficie unisulcati hinc inde praesertim versus basin pales occurunt solitariae linearis-subulatae, partim lacerae, varie tortæ, ferrugineaæ, magnitudine admodum inaequales. Pariter caudex stipitumque basis quidpiam incrassata paleis angustioribus quam in *jveslitur, Ceterum superfluum rati, ob discrimina ista perlevia varietatem hancce iconem collustrare, adhuc notamus, stipitem esse circiter 4-pouicarem ac frondem 10-11 poll, longam, latitudine nondum a poll, explete.

2 ACROSTICHUM CONFORME SWARTZ.

TAB. V.

A. frondibus stipitatis oblongo-lanceolatis utrinque acutis rigidis sub-marginatis parallelo-venulosis supra glabris subtus squamuoso-punctatis, fertilibus angustioribus longius stipitatis, stipite inferne caudiceque repente dense paleaceis. BL.

SWARTZ *Syn. Fil. p. 10.* 4» et *p. 192. Tab. I, Jig. 1.* — WILLD.

Spec. PL V, p. 107. 20. — KAULF. *Enum. Fil. p. 62.* —

SCHLEGHTENDAHL *Adumbr. PL Fasc. I, p. 14-1• T" RADD. Fil.*

Brasil. p. 4 — SPRENG. *Syst^eg. IF, p. 55. 27.*

A. *latifolium* SWARTZ in SCHRAD. *Journ. 1801, p. 271.*

A. *oblongum* DESV. *Journ. de Botan. 1813, p. 211.*

A. *cemulum* BLUME *Fil. Jav. p. 100. 2.*

HABITAT : Planta revert omnivaga, quippe qua in Promontorio Borue Spei, St.-Helend et Brasilid inventa, et a nobis in regionibus altioribus montis ignivomi Gede Java ab arborum trancis lecta. Ipsam priu pro *A. amidoKxoht.* juniore putavimus(quodparumpercerte ab *A.conformi* Sw. discrepare videtur), ast pottquam

cum iconē SWARTZIANA scrupulosius comparavcramus, earn *AJricance* parumper differre mox iutellcximus. Etenim licet SWARTZ frondem immarginatam dicat, in iconē margo levis adest. Quod vero in nostris frons fertilis falcatim reflectatur, unde ad *A. longifolium* JACQU. (PLUM. FiL Tab. i35) proxime accedit, non minus e casu pendere videtur, quam squamae parvulac, in frondis paging praesertim inferiore dispersae. Plan tamen *Javanicam* iconē atque descriptione accuralis illustrare, \ix supervacuum erit.

FILIX 5-io-pollicaris.

CAUDEX lignosus, repens, digitulum crassus, dense paleaceus, e lateribus et inferne radiculosus, supra fere totus frondibus sterilibus et fertilibus obsessus, stipitum reliquiis solitariis intermixtis. *Radiculce* simplices vel sub-ramosae, obscure fuscae, apicibus fibrillisque junioribus sub-tomentosis. *Reliquiae stipitum* teretiusculae vel obsolete trigonae, fuscae, paleis solitariis laceris.

FRONS *utraque* stipitata, fertilis longior, simplex, erecta vel sub-decumbens.

STIPITES steriliū i J-2-pollicares, fertilium fere 3-pollicares, crassitate pennae passerinae, sub-tetragoni, supra canaliculati et utrinque margine quidquam elevato decurrente, basi paululum incrassati, fusti et paleacei, sursum pallide ochracei et glabriuscui, paleis parvis, spar sis, deciduis. *Palece* caudicis stipitisque inferioris majusculae, ovato-lanceolatae, acuminatissimae, irregulariter dentato-erosae s. sub-lacerae, reticulatae, scariosae, spadiceae, minoribus lanceolatis mixtae; stipitis superioris minutae, subulatae, erosae, fuscae^ lapsae maculam obscuram linquentes.

FRONS *sterilis* 4-6-pollicaris, I-I $\frac{1}{2}$ poll, lata, oblongo-lanceolata, acuta, deorsum sensim in stipitem attenuata, ita ut sub-marginatus appareat, integerrima aut leviter repanda, tenuissime marginata, plana, pallide viridis, exsicca flayicans, ulrinque, infra praecipue, investita paleis dispersis, minutissimis, partim subulatis, plerisque stellato-laceris, punctiformibus, fuscis, in plantā adultiore propemodum evanidis. *Costa media* supra unisulcata, subtus convexa. *Venas laterales* tenerrimae, vix conspicuae, maxime supra, plerumque furcatae.

FRONS *fertilis* sterili prope conformis, angustior et tenuior, parum falcata, margine supra paululum saturatius colorata, sub-repanda parumque revoluta, subtus praeter costam medium capsulis tecta.

CAPSELLE minimae, confer toe, longiter pedicellatae, fuscae, sphaericæ, lenticulari-compressæ, annulo incompleto, lato, plaiiisculo, articulato, lateraliter dehiscente circumcinctæ, transverse et irregulariter infra ilium dehiscentes. *Pedicelli* diaphani, longitudine inaequales, cellulosi. *Sporæ* minute, sub-reniformes, fuscae.

EXPLICATIO TABULA

Caudex cum frondibus sterilibus unique fertili; *magn. nat.*

Fig. i. a, b, c. Paleas magnitudinis diversæ e caudice stipitisque parte inferiore; *auct.*

Fig. a, d, e, f. Paleæ stellato-lacerae ex inferiore frondis sterilis paginâ; *valdoprc auct.*

Fig. 3. Fragmentum frondis fertilis; *magn. auct.*

Fig. 4- Gapsulae sporaeque; *quam maxime auctte.*

3 ACROSTICHUM ANGULATUM.

TAB. VI.

A. frondibus longe stipitatis oblongo-lanceolatis basi apiceque attenuatis coriaceis marginatis parallelo-venulosis glabriusculis, costâ subtus stipiteque sub-quadrangulari paleaceo-squamulosis, fertilibus confonnibus longissime stipitatis. BLUME *Fil. Jav.*
p. 101. 3.

HABITAT : Specimen unicum et quidem sterile, *Javce occidius* montibus altioribus ex arborum truncis lectum, quum toto habitu exakte cum *Acrostichis* congrueret, huic generi accensui, postea specimine fertili, quod in herba.nò KUHL et VAN HASSELT reperi, de veritate confirmatus. Dubius adhuc sum, num ab *A. splendentis*, quod primum GOMMERSON, et posth&c BORY in insula Borbonica detexerunt, satis sit distinctum. Gerte planta nostra junior in frondis facie utrque easdem, quae illi attribuuntur, squamulas monstrat. Icone nostr& cum exemplaribus originalibus *A. splendentis* BOBY collate dubitatio omnis toiletur. *A. conformis* Svr. itidem affine, fronde longius stipitat&, minus rigid&, acuminatiore fortiusque marginal discrepat, et longius jam ab *A. laurifolio* THUAB. (*A. lingua* RADD.) et *A. hybrido* BOBY recedit.

FILIX circiter pedalis.

CAXIDEX lignosus, repens, crassitie pennse anserinae, squamis imbricatis dense vestitus, inferne radiculas raras agens, superne hinc inde frondes stipitatas proferens, reliquis stipitum yetustiorum admixtis. *Radiculce* simplicissimae, capillares, breves, fuscae, pleraeque villosoe. *Stipitum reliquiae* breves, teretiusculae, saepe quidpiam inflatae, inferne velut nodosoe, fistulosae, nudae vel infra paleis paucis laceris consitae. *Palece* membranaceo-scariosae, reticulatae, pallide spadiceae, caudicis stipitisque inferioris maxima, ovato-oblongae, acutae, irregularidentatae; stipitis partim lanceolate, partim ovatae vel sub-rotundae, irregularis inuatae vel dentatae vel lacerae, patentiusculae; *costarum* mediarum similes, pleruinque angustiores.

FRONS *sterilis* : *Stipes* 25-4-pollicaris, pennae columbinae crassitudine, sub-erectus vel adscendens, sub-tetragonus, 4-1 poll, supra basin uninodosus, inferne atro-fuscus et juxta ac caudex squamis dense opertus, sursum e fusco saturate cinnameus, squamisque multo rarioribus, in plantâ aduliore deciduis, obsitus.

Frons 6-8-pollicaris, i|ii poll, lata, oblongo-lanceolata, acuminata, inferne in stipitem attenuata, integerrima aut sub-repanda aut repando-angulata, margine diaphano cincta, plana, coriacea, utrinque squamis minimis, inaequalibus,

stellato-laceris, ferrugineis,, sensim evanescenibus, investita, subtus dilutius viridis, sub microscopio uberrime punctata, exsiccando supra rufa. *Costa media* supra sulco longitudinali exarata, subtus depresso-angulata, et hie praesertim paleis similibus, uti stipes superior, objsessa. *Vence laterales* obsoleta, parallels, altitudine inaequali furcate, marginem versus evanidae.

FRONS *fertilis* conformis, stipite 6-pollicari paleaceo, 4-5-pollicaris, circiter unciam lata, subtus, praeter costam sparsim paleaceam marginemque diaphanum, *capsulis* innumeris, par vis, confertissimis, obtecta.

EXPLICATIO TABULJE.

Planta; magn. not.

Palea major caudicis, duae stipitum et portio frondis cuoi[^] Reis stellatis inherenteribus; auct.

4. ACROSTICHUM MELANOSTICTUM.

TAB. VII.

A. frondibus brevissime stipitatis elongato-lanceolatis acutis basi decurrentibus coriaceis obsolete marginatis parallelo-venulosis glabris subtus nigro-punctatis. BL,

HABITAT : Specimen unicum sterile inter plantas exstat, quas VAN HASSKLT in *Java occidentali* legit. Ex *Jungmanniis* pluribus, quibus obducitur, augurari licet, ipsum in editoribus fuisse reperluni. Quamvis sterile sit, *Acrostichis* sine ull& dubitatione ad numero, quippe quod compluribus hujus generis speciebus quam maxima jungitur affinitate, e. g. *A. conformi* Sw., cui tamen frondis magnitudine et substantial longe minus rigida differt. Nec minus ob frondis brcviter stipitatae figuram accedit ad *A* apodium* KAULF., quod vero ulrinque, imprimis margine, pilosum est, dum in nostro ne vestigium quidem pubescentiae adest.

FILIX absque dubio parasita in arborum truncis, altitudine circa if ped.

CADEX repens, crassiusculus, fPesertim inferne radiculis numerosis, subramosis, fusco-villosis, paleisque ovato-lanceolatis, acuminatis, sub-erosis, imbricatis, fuscis[^] aut vetustior earundem reliquiis obtectus.

Stipites plures, caudici veluti disticbe impositi, circiter pollicares, sub-arcuati, supra sulco profundo exsculpti, infra rotundati, fusci, ubique, maxime juniores, paleis similibus atque caudex, modo angustioribus, vestiti.

Frondes simplices, 14-17-pollicares, if-25 poll, latae, oblongo-lanceolatae, acute, basi in stipitem angustate, margine sub-repandae et limbo angustissimo

tenui sub-pellucido cinctae, planae, coriaceae, opacae, supra laeves, costata basin versus canaliculate, subtus pallidiores, costata rotundata elevatiore punctisque multis nigris elevatis resinosis, prouti et paleis minutis stellatis laceris adspersae. Venae laterales parallelis, plerumque furcatae, supra vix conspicuae, subtus paululo distinctiores.

EXPLICATIO TABULÆ.

Planta; ad f magn. not. reducta.

5. ACROSTICHUM VISCOSUM SW.

A. frondibus longe stipitatis linear-lanceolatis utrinque acuminatis coriaceis parallelo-venulosis ad costam utrinque stipiteque squamuoso-viscidis, fertilibus angustioribus obtusiusculis supra stellato-pubescentibus. BL.

SWARTZ *Syn. Fil. p. 10. 6, et ibid. p. ic/5.* — WILLD. *Spec. PL V, p. 103. 8.* — SPRENG. *Syst. Feg. IV, p. 33. 4.* — HOOK. *Icon. Fil. fasc. IV, tab. LXI.*

ACROSTICHUM *petiolatum* SWARTZ *Flor. Ind. occ. p. i588.*

A. *salicifolium* WILLD. *Herb.* — KAULF. *Enum. Fil. p. 58.* — SIEB. *Syn: Fil. n. 28.* — SPRENG. *Syst. VEG. IV, p. 33. 5.*

HABITAT : Tarn divus WILLDENOW quam SPRENGEL speciem hanc solum in *Jamaica* degere indicant, licet cl. SWARTZ earn etiam in *India orientali* provenire testetur. Id confirmatum videmus spccimib⁹ numerosis, ab hortulano ZIPPELIO in *Java* ad montem *Burangrang* colleciis, quæ ab Americanis herbarii SIEDERIANI non discrepant, nisi quod aliquantulum longiores sint. Videtur vero omnino haec species, quæ etiam in insulis *Mauritii* et *Borbonice* nee non in insula **St. Vincentii Indite occidentalis* detecta fuit, quoad longitudinem stipitum valdopcre variare. Quocirca sententiam di. HOOKER sequimur, plantam, quam RAULFUSS (*Enum. Fil. p. 58*) nomine ACROSTICHI *salicifolii* descripsit, pro varietate A. *viscosi*, stipite breviori distincti, esse habendum. Pubescens enim, quæ frons istius vestitur, pariter specimina juniora A. *viscosi* tarn *Javanica* quam *Jamaicensia* gaudent, dum vetustiora fere penitus nuda deflenduntur.

FILIX circiter i -1 -^pedalis.

CAUDEX repens, calamo anserino crassior, inferne fibrillis congestis, filiformibus, sub-ramosis, nigro-fuscis, fulvo-villosis, stipatus, paleisque linear-setaceis, rigidiusculis, curvatis, margine remote spinuloso-denticulatis, atro-purpureis, nitidis, obtectus.

STIPITES plures, 4-6i? ^{oNi^{cares}} erecti vel sub-arcuati, sub-teretes, supra sulco notati, paleis parvis stellatis peltatis nigro-fuscis scabriusculi earumque residuis resinosis punctiformibus centralibus viscidii, ad caudicis exortum sub-incrassati paleisque similibus setiformibus ornati.

FRONDES simplices : *steriles* circa 9-14-pollicares, f, raro 1 poll, latae, linearilanceolatse, acuminatae, basi aequaliter vel oblique attenuate, integerrimae, sub-reflexae, costal supra planiuscul&, subtus rotundata, utrinque pilis stellatis punctisque resinosis obductae, parallelo-venosae, coriaceae, glabriusculae pilisve similibus stellatis uti costs obsitae. *Venos* tenerrimae sub-furcatae.

FRONDES *fertiles* sterilibus longius stipitatae, circiter 6-pollicares, {, raro $\frac{1}{2}$ poll. latae, lineares, apice obtusiusculae, basi inaequaliter attenuate, supra quasi ferrugineo-tomentosae paleis parvis, appressis, stellato.-laceris, ferrugineis, subtus, exceptis margine angusto costâque, capsulis dens# tectae, planiusculae vel revolutae, rarius involutae, ante capsularum maturitatem utrinque replicatae. *Capsule* sphaeroideae, pedicellis crassiusculis, diaphanis, ultra dimidium annulo elevato flavicanti-ferrugineo cinctae, pro maturitate flavidae aut fuscescentes. *Sporae* irregulariter migulatae, tuberculatae vel asperae, fuscaa, opacae.

6. ACROSTICHUM GORGONEUM KAULF.

TAB. VIII.

A. frondibus lanceolatis obtusis basi angustatis sub-marginatis parallelo-venosis glabris, fertilibus angustioribus longius stipitatis, stipitibus laevibus, caudice paleaceo-squamoso. BL.

KAULF *Enum. Fil. p. 63.* — SPRENG. *Syst. Feg. IF, p. 34-* i4-
— BLTJME. *Fil. Jav. p. 101. 4-*

HABITAT : Ad arborum Iruncos baud procul a cacumine xnontis *Burangrang*, plus 8000 ped. alti, in Javce provincie australi *Buitenzorg*. Ab *A. gorgoneo* KAULF., quocum conferre nequeo, frondibus undulatis, feitiibus linearilanceolatis, paleis multo minoribus, partiumque proportione forsitan distinguendum, ad *A. angustatum* SCHHAD. qua varictas posset referri. Deflectit tamen ab hoc fronde minori (in *A. angustato* sesquipedali), sterili usque ad stipitis basin marginal, atque caudice squamis dense vestito, in illo sub-nudo. At haec nota a planta? actate dependere potest, quibusdam conofhirium filicum partibus juventule saxe squamosis vel setosis, postea glaberrimis. Sin *A. lingua* RADD., teste SPBENGEL, ad *A. laurifolium* THUAE. pertinet, a nostris plants fronde sterili lato-oblongi stipiteque tetragono immarginato discederet.

FILIX circiter io-pollicaris, pallide virens.

CATJDEX lignosus, crassiusculus, compressus, repens, paleaceo-squamosus, superne frondes numerosas, inferne radiculos sparsas emittens. *Radiculce* simpli-

cissimae aut sub-ramosae, atro-fuscae, nudae aut parumper tomentosae. *Paleas* dense imbricatae, scariosae, magnitudine inaequales, ovato-acuminatae, ovato-lanceolatae aut obtusae, margine remote lacerae, planiusculae aut concavae, reticulatae, fuscae.

FRONS *sterilis* et *fertilis* ex eodem caudice prognatae, utraque, *fertilis* longius, stipitata, simplex, integra.

STIPES basi assurgente, crassiore et squamosâ atro-fuscus, dein sat erectus, stramineus, frondis *sterilis* semiteres et marginatus, *fertilis* teretiusculus, utriusque leviter canaliculatus.

FRONS *sterilis* 4-7-pollicaris, f-i poll, lata, lanceolata, obtusa, inferne sensim angustato-decurrans, margine integerrima vel leviter repanda, obsolete marginata, sub-undulata, glabra, coriaceo-opaca, subtus flavescente-virens squamisque minutis, stellatis, laceris, paucissimis, oculo nudo vix conspicuis, obsita. Costae *medias* supra planae, subtus convexiusculae. Vena laterales in pagina inferiore tantum distinctae, tenerae, parallelae, maximâ eparte simpliciter furcatae.

FERTILIS stipite 4-pollicari gracili suffulta, 4" P° Hi^{caris} paululo plus h unc. lata, lineari-lanceolata, obtusa, inferne angustata, margine tenuiore revoluta, paululum erosa nee non undulata, supra glabra, costâ mediâ obsolete canaliculate, avenia, subtus, costâ mediâ prominulâ margineque angusto inflexo exceptis, capsulis obducta.

CAPSULE minima, pedicellate, arctissime sibimet approximate, pallide ferrugineae, lenticulares, turgidae, annulo incompleto, lato, piano, pallido, cinctae, irregulariter transverse a latere uno deliiscentes. Pedicelli tenerrimi, saturate ferruginei, capsulis delapsis persistentes, unde pagina frondis inferior tum tomentosa. Spore sub-angulatae/ pallide fuscae.

EXPLIGATIO TABULiE.

Fig. 1. Squamae caudicis; magn. aucta.

Fig. 2. Segmentum frondis fertillis; auct.

Fig. 3. Capsulae; auct.

7. ACROSTICHUM OBUQUUM.

TAB. IX.

A. frondibus longe stipitatis linear-lanceolatis obtusis basi oblique attenuatis immarginatis reticulatis glabris, stipite sub-trigono glabro, caudice paleaceo. BLUME *Fil. Jav.* p. 101. 5.

HABITAT : Specimen unicum sterile, habitu toto *Acrostichis* plurimis cōgruum, quod a VAN HASSELT in provincia *Javanica Bantam* ad thermas prope *Pandeglang* repertum fuit, ad *A. reticulatum* KAI/LF. fronde relicata proxime accedit, sed caudice cespitoso (non repente) et fronde sub-lincari, immarginati (niimic oblongo-lanceolati, sub-marginati) abunde differt.

FILIX i-if-pedalis.

CAUDEX lignosus, sub-perpendicularis, crassus, teres, e cano fusco scens, inferne emortuus et hinc praemorsus, paleis dense tectus, e lateribus fibras multas et superne frondes plures emittens. *Fibrce* descendentes, crassiusculae, elongatae, extra atro-fuscescentes, intus ochraceoe, **fibrillis** lateralibus numerosis, fusco-tomentosis. *Palece* accumbentes, 3-5 lin. longae, i-ii lin. latae, membranaceae, lanceolate, acuminatae vel obtusae[^] margine tenuissimae et lacerae, pallide fuscae, reticulatae.

FRONDES fasciculate > longe stipitatae, simplices, integral, rarius inaequali-bipartitae.

• STIPES 4-6-pollicaris, gracilis, crassitie pennae corvinae, rectiusculus, obsolete trigonus, supra planiusculus, fere ecanaliculatus, utrinque sulco decurrente notatus, glaber, ad caudicis insertionem modo sub-paleaceus, exsiccus e flavescente purpurascens.

FRONS *sterilis* 5-7-pollicaris et ultra, semiunciam lata, linear-lanceolata, obtusa, inferne inaequaliter in stipitem decurrens, ibique nonnunquam leviter gibba, ceterum integerrima, margine angustissimo, oculis armatis modo conspicuo et introrsum quidpiam incrassato cincta, sub-coriacea, utrinque saturate virens et nitidiuscula, subtus paululum glaucescens. *Costa media* supra plana, substantial folii dilutior, subtus convexa. *Vence* utrinque conspicuae, subtus distinctiores, pulchre reticulatae.

EXPLICATIO TABULiE.

Planta; magn. not.

Paieae caudicis; auct.

a ACROSTICHUM OBTUSIFOLIUM WILLD.

A. frondibus sterilibus obovato-oblongis basi attenuatis apice rotundato-obtusis sub-marginatis parallelo-venulosis coriaceis glabris, fertilibus longius stipitatis angustioribus obtusis, stipite teretiusculo glabro, caudice repente paleaceo. BL.

WILLD. *Spec. PL F.p.* 107. 21. — BLUME *Fl Jav.* p. 102. 6.

HABITAT : ID raontosis *Java occidentalis* ad arbores rupesque basafticos muscosos, minus frequens. Cl. WILLDENOW plantain sterilem et absque dubio valde juveuilem descripsit*, nostra eniin partibus omnibus pro portione major est, id quod etiam a loco provenire posset. Quum WILLDEMOW iconem POLYPODII *indit fide tertii*, BBEYN. *Cent.* 191, *Tab.* 98, %- intermed. quat optimam citet, et haec species cum sequenti raaquam similitudinem alat, ipsam delincare noluimus.

FILIX totacirciterpedalis, siccata fusca.

CAUDEX brevis, lignosus, repens, crassiusculus, fuscus^ parte emortuâ nudiusculus, junior paleaceus et inferne dense cespitoso-fibrosus. *Radiculce* sub-simplices, ferrugineo-villosae. *Stipitum reliquice* solâ in parte caudicis vetustiore denudaiA solitariae, breves, atro-fuscae.

FRONDES plures, approximatae, e superiore caudicis portione adscendentes, tam steriles quam fertiles simplices et integrae.

STIPITES adscendentes vel errecti, teretiusculi vel, frondis maxime fertilis, sub-tetragoni, supra canaliculati, basi sub-flexuosi et paleacei, sursum glabri, proximo frondem marginibus bujus decurrentibus obsolete marginati, crassitie pennae corvinee, frondium sterilium 4-5-pollicares, fertilium 5^7 -pollicares. *Palece* caudicis stipitisque inferioris ovato-lanceolatae evallanceolatae, acuminatae, margine setis spar sis ^ reticulate, pallide ferrugine, meinbranaceo-scariosae, circiter 4-lineares, 1-15 lin. latae.

FHONS *steriUs* 6-7^pollicaris, 2 poll, et ultra lata, obovato-oblonga, obtusissima, inferne in stipitem angustata, vix repanda vel rarius — e casu? — sinuato-incisa, margine angustissimo pallido, plana, coriacea, glaberrima, nitidiuscula. *Costa media* glabra, supra obsolete unisulcata, subtus prominula. *Vence* obsoletoe, supra quidpiam distinctiores, parallels, marginem versus pleroque bifurcate.

FRONS *fertilis* conformis, 5-poDicaris, i⁴ poll, lata, angustior, sursum minus obtusa, marginibus quidpiam revoluta, subtus, si costam excipias, capsulis operata.

CAPSULE minims, fuses, sphaericae, singular breviter pedicellatae, ultra medium ambitus annulo articulate cinctae, irregulariter transverse dehiscentes. Spores numerosissimae, sub-angulatae, atro-fuscae.

9 ACROSTICHUM DECURRENS DESV.

TAB. X.

A. frondibus sterilibus obovato-oblongis basi decurrentibus apice rotundatis sub-incrassato-marginatis parallelo-venulosis coriaceis subtus stellato-puberulis, fertilibus longius stipitatis conformibus angustioribus, stipite sub-complanatoglabro, caudice repente paleaceo. BL.

DESV. *Journ. hot. I*, p. 2⁴3. — BLUME *Fil. Jav.* p. 102. 7.

A. *obtusifolium* SPRENG. *Syst Veg.* p. 34< 21.

HABITAT : Speciem hanc in sylvis montis Salak provinciae Buitenzorg apud Tjitjelobak ad praeruptas fluvi Tjapus ripas semel modo, frondesque aliquot steriles ibidem, parasitis aliis mixtas, in vetustis arborum truncis reperi. Differt A. *obtusifolio* WILLD., quod SPHEHGEL cum ips& conjungit, stipite sterili fere penitus piano, substanliA frondis longe crassiore atque margine multo latiore. Squamae parvae stellatae, oculis **modo** armatis in paging inferiore conspicuae, et sensim sensimque pacne evanidae, ab ill⁰ DESVAUX forte pratermissae fuere; robur preterea, quo planta *Javanica* sororem ex *India continentis* antecellit, a terreno faustiore videtur profectum.

FILIX 7-11-pollicaris, pallide virens, sicca in ochraceum vergens.

CAUDEX sub-lignosus, repens, brevis, pennâ anserinâ crassior, paleaceo-squamosus, supra tanquam ex unâ serie frondes efferens, inferne sparsim radiulosus. Fibres filiformes, simplices, atro-fuscescentes, villo ferrugineo obductae.

FRONS utraque stipitata, simplex, ex eodem caudice, sibimet valdopere approximata, rectiusculo-assurgens.

STIPITES inferne ad caudicis insertionem paululo crassiore, saturati tincti et paleacei, sursum glabri, sterilium crassiore, sub-complanati, supra leviter canaliculati lateribusque sub-marginati, 2-4 2-pollicares; fertilium graciliores,

sub-tetragoni, sulcati, minus marginati, circiter 6-pollicares. *Palece* et caudicis et stipitis inferioris magnitudine valde inaequales, ^-6-lineares, circiter lineam latae, lanceolate, acuminate, margine irregulariter setaceo-lacerae, e parte fissae, reticulate, membranaceo-scariosae, pallide ferrugineae aut spadicea?.

FRONS *sterilis* 4-7-pollicaris, if poll, lata, spatulato-oblonga, apice rotundata, infra valde angustato-decurrans, integerrima vel vix repanda, margine sat lato parum incrassato cincta, plana, coriacea, supra glaberrima et nitida, subtus pallidior pubeque stellatâ subtilissimâ adpersa. *Costa* supra plana, pallida, basin versus depressiuscula, subtus convexa. *Venae* tenuissimae, paralleliae, furcate, rarius indivisae.

FRONS *fertilis* circiter 5-pollicaris, | poll, lata, conformis, superne tantum minus rotundata, margine quidpiam crispata, revoluta, opaca, tenuior, ita ut venae supra conspicuae sint, subtus praeter costam planiusculam capsulis pallide ferrugineis dense vestita.

CAPSULE minimae, pedicellate, turgido - lenticulares, ad £ ambitus annulo latissimo piano obscuriore circumdate, basin versus latere annuli experte irregulariter transverse dehiscentes.

EXPLICATIO TABULJE.

Planta; *ragn. nat.*

Paieae caudicis atque squamulae stellate frondis; *magn. auct.*

10 ACROSTICHUM NUMMULARIFOLIUM SWARTZ.

TAB. XL Fig. i — 2.

A. frondibus coriaceis aveniis subtus cano-tomentosis, sterilibus sub-sessilibus sub-cordato-rotundis, fertilibus longius stipitatis obovatis oblongisve, caudice repente paleaceo-crinito. BL.

SWARTZ *Syn. Fil. p. 191. Tab. II, Jig. 1, et p. £19.* — WILLD.

Spec. PI. V, p. 100. 1. — BLUME *Fil. Jav. p. 102. 8*

pSubpeltatum; frondibus sub-sessilibus orbicularibus sub-peltatis utrinque pilis stellatis adspersis.

HABITAT : Species haw in archipelago *Malayano* ubique provenire videtur, utpote cujus specimina cl. REIN-WAHDT et in *Moluccis* et in insula *Celebes*, nosmet vero plurima in truucis arbomm *Jafte*, altiludine prxsertim 700-1200 ped., legimus. *Moluccanaet Celebica* frondis magnitudine antecedunt/aww/m, quibus frons multum

brevior et sterilis paullo longius stipitata magisque ovata, basi simul magis rotundat. Varictas /9 autem, quam uidis montis *Salak* nemoribus detexi, gaudet fronde sterrili sub-sessili, orbiculari et utrinque pubescentia rarissima stellata adpersa, id quod forte loco natali potest attribui. Ut species haec ab *A. obovato* BL., mox describendo, facilius dignoscatur, iconem tamen plants *Celebicce*, a ccl^o REINWARDT repertae, quam varietatis /3 adjecta.

GAUDEX longissimus, filiformis, tenax, hinc inde ramosus, in truncis reptalibus radiculisque cortici illorum intime annexus, subtus unisulcatus, fuscus, at squamis teneris velut ferrugineo-hirsutus. *Radiculce* tenerae, breves, simplices vel sub-pinnato-ramosae, villo atro-fuscescente obducta?

FRONDES simplices, sub-alternae, dispares, coriaceae vel sub-carnosae, planisculae, supra pallide virides, exsiccando hepaticae.

STIPES sterilius vix linearis vel brevior, fertilius 3-5-pollicaris et ultra, prope caudicem paleis multis setaceis ornatus, sursum quidpiam stellato-tomentosus. *Palea* caudicis stipitisque conformes, angusto-lanceolatae vel subulate, acuminatissimae, longe ciliatae, basi puncto obscure ferrugineo annexe, marginibus liberae, tenerimac, laxe imbricatae, tenuissime membranaceae, breviores et inferne pro portione latiores in speciminibus *Javanicis*, quam *Moluccanis*.

FRONDES steriles numerosae, /-I uncias longac totidemque latae vel adhuc minores, sub-sessiles vel sub-peltatae, sub-rotundae aut ovato-rotundatae, obsolete cordatae vel basi rotundatae, nunc integerrimae, nunc paululum repandae, ecostatae, aveniae, supra pilis stellatis solitariis consitae, demum lacvigatae, subtus incano-tomentosae, pube stellata ferruginea velatae. *Fertiles* pauciores, longiores, angustiores, i-i¹-pollicares, 2¹-5 lin. latae, obovatae aut oblongo-spatulatae, basi cuneatae, integerrimae, supra obsolete unicostatae, aveniae, glabriusculae pube stellata adspersae, subtus ex toto capsulis pilisque longis stellatis ferrugineis obtectae, et ideo convexiusculae.

CAPSULIS inter pilos stellatos immersae, pedicello longo tenuissimo fultae, sphaericae, lenticulari-compressiusculae, fusco-nitentes, hinc annulo incompleto articulato-instructae, illinc elastice dehiscentes. Articuli annuli numerosi, constipati; ubi latus liberum capsulae attingunt, latiores et tenuiores, annulum quasi spurium laxum formantes. *Spores* ellipsoideae, vix angulatae, pallide fuscae, diaphanae.

EXPLICATIO TABULÆ.

Fig. 1. *Acrostichum nummularifolium* Sw., *Clebicum*; magn. not.

Palea caudicis; magn. auct.

Capsulae pilis stellatis tectae; auct.

Capsulae; quam maxime auct.

Fig. 2. *A. nummularifolium* Sw., /9 subpeltatum; magn. nat.

AGROSTICHUM.

a ACROSTICHUM OBOVATUM

TAB. XL Fig. 3.

A. frondibus coriaceis aveniis subtilis cano-tomentosis, sterilibus obovatis, fertilibus longius stipitatis linearis-spatulatis, caudice repente paleaceo-crinito. BLUME *Fl L Jav.* p. 102. 9.

HABITAT : Filicem hanc parvam et eleganulam semel modo de truncis arborum circa *Lebak* in *Java occidentali* carpit. Ob maximam ipsius cum *A. nummularifolio* Sw. similitudinem difficillimum est judicatu, utrum distinctae specie honores potius, quam varietatis mereatur ignominiam. Distat imprimis fronde sterili longius stipitata, obovatiflora, basi cuneatifi, nunquam rotundata vel subcordata.

CAUDEX longissime repens, iilifonnis, tortuosus, crassitie filii majoris, vix ramosus, squamis appressis setaceis imbricatus, subtus sulco exaratus, e quo praecipue fibroe proveniunt. *Radiculce* numerosac[^] tenerae, breves, sub-ramosae, fusco-tomentosae.

FRONDES caudici per longitudinem insertae, erectae, simplices, coriaceae, margine parum reflexae.

STIPES tenerrimus, crassitie setae suillae, frondis sterilis J-, fertilis plerumque i-pollicaris, sub-sulcatus et tortuosus, supra stellato-pubescent, ad caudicis insertionem, ubi quidpiam articulato-incrassatus, fasciculo palearum angustarum horridus. *Paleae* caudicis stipitisque angusto-lanceolatae, acuminatae, sub-ciliatae, pallide ferrugineae, subtus loco obscuriore stipiti adnatae, marginibus liberae, imbricatae, tenerrimae, minoribus ovatis solitariis commixtae.

FRONS *sterilis* circa 5-pollicaris, 4ⁿ-1^{ta} obovata, apice rotundata, basi cuneata, integerrima, costata medii venisque destituta, supra pube stellata, decidua, subtus tontento albo, pilis stellatis pallide ferrugineis obpresso, detractili, dense vestita. *Fertilis* circiter pollicaris, vix 2 lin. lata, linearis, obtusa, inferne in stipitem attenuata, supra costata angusta percursa, ab initio pilis copiosis stellatis pubescent, postea glabra, opaca, subtus capsulis ferrugineis, paululum nitidis, absque ordine et indusio pubescentiaestellate densae immersis, obducta.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. 3. Acrostichum obovatum; magn. nat.

Frons sterilis, supra visa; auct.

Velamen e paginâ inferiore frondis sterilis; magis auct.

Paleae caudicis; auct.

12 ACROSTICHUM DIVERSIFOLIUM

TAB. XII.

A. frondibus membranaceis parallelo-venosis glabris, sterilibus simplicibus oblongo-lanceolatis, fertilibus longissime stipitatis unijugis cum impari, pinnis lateralibus minoribus obtusis, terminali elongate utrinque acuminate, stipite sub-tetragono glabriuscule.

BLUME *Fil. Jav.* p. 103. 12.

HABITAT : Speciroina pauca semel tantum ad radicem montis *Burangrang* provinciae *Buitenzorg* prope rivulos, per nemora densa perfluentes, invenimus. Frondis fertilis form& species haec *A. Jlagellifero* WALL. proxime accedit (mirura enim non foret, si frons ilia ternata etiam cum pinnis pluribus occurreret); fronde vero sterili simplicissima* ab omnibus aliis abunde distinguitur.

FILIX plerumque plus 2 ped. alta.

CATINDEX repens, lignosus, pennâ anserinâ crassior, depresso-fuscus, ab initio paleis rarissimis, mox deciduis, consitus, e lateribus et inferne radiculosus, superne stipites multos emit tensi, vel siccis illorum reliquiis vestitus. *Radiculce* filiformes^ parum ramosae, fuscae, praecipue subtus, ubi terrain attingunt, tomentosae.

FRONS utraque ex eodem caudice, stipitata, membranacea, parallelo-venosa et obsolete reticulata, glabra, dispar.

STIPITES satis approximate erecti, basi aliquantulum crassiori arcuatA teretes, caudici concolores, paleis solitariis deciduis obsessi^ sursum plerumque pallidiores, tetragoni aut sulcis aliquot decurrentibus angulati, glabri, steriliū crassitie pennae corvinae et 5-8 poll, longi, fertilium paululo tenuiores, sesquipedales et longiores. Palece stipitis caudicisque laxe accumbentes, 13-2-J-lineares, lanceolatae, acute, eroso-denticulatae, tenerrima3, siccae^ reticulatae, pallide fuses.

FRONS *sterilis* i4-i6-pollicaris, 3-4 unc. lata, oblongo-lanceolata, longe acuminate, basi attenuata, nonnunquam sub-inaequilateralis, integerrima vel leviter repanda, utrinque opaee viridis, costâ supra linea elevata sub-cristatâ, subtus magis prominulâ.

FRONS *fertilis* circiter 8-pollicaris, impari-pinnata, pinnis tribus ina^qualibus : lateralibus minoribus, alternis, sessilibus, 22-pollicaribus, vix semiunciam latis,

lineari-lanceolatis, basi sub-oblique attenuatis; terminali s. intermedia majore, petiolata, fere 6£ poll, longa, paene unciam lptA., lanceolata, longe acuminata, basi attenuata; omnibus integemis, £kpra juxta ac fronde sterili transverse parallelo-venosis, interstitiis subtiliter laxeque reticulatis, subitus quasi fusco-granulosis, costata mediâ margineque angustissimo nudis.

CAPSULE numerosissimae, minimae, fuscantes, turgide lenticulares, breviter stipitatae, per f ambitus annulo latiusculo articulate cinctae. *Sporate* quidpiam irregulariter angulatae, fuscae.

EXPLICATK) TABULiE.

Planta; *magn. not.*

Capsule sporaeque multac; *valdopcre auct.*

13 ACROSTICHUM FLAGELLIFERUM WALL.

TAB. XIII.

A. frondibus pinnatis menihranaceis parallelo-venosis reticulatis glabris, pinnis oppositis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis erosocrenulatis, terminali longissimll prolifer^, fertilibus angustioribus integemis obtusiusculis, stipite glabriuscule. BL.

HOOK. *Icon. Fil. Fasc. II. Tab. XXII* — BLUME *Fil. Jav. p. 104. i3.*

Panna Mara-maravara RHEEDE Hort. Malab. XII. p. 59.
Tab. 11.

HABITAT : Teste RHEEDE in ora *MalabarA* locis petrosis supra arborcs, ubj Brachmanis *lliola* vocatur; in *fiengale**. D^ra WALLICH , et a nobis nunquam in arboribus, sed in solo argillaceo-calcareo proxime desertas auri fodinas montis *Parang Java*, alluvialibus provinciae *Bantam* tractibus, et soliarium ad saxosas ripas rivorun insulae *Nusce Kambangan* lectum. Quum icon in pulchroopere cl^r HOOKER frondes solas sine caudice, cuius figura in *Horto Malabarivo* minus exacta, exhibet, descriptioni nostrae imaginem planae elegantissimae adjecimus. Geterum in nullo usu medico *Javanis* esse credo, etsi RHEEDE annotat : « cum saccharo in syrupum redacta, tussim, etc.»

FILIX i-3 pedalis una cum pinnâ terminali caudiformi.

CAUDEX longissime repens, sub-horizontalis vel parum tortuosus, crassitie pennae anserinas vel adhuc tenuior, lignosus, fuscus, intus stramineus, portione vetustiore sub-nudus; juniore paleaceus, supra stipitibus deciduis bine inde

nodulosus, subtus radiculas numerosas agens. *Radicuke* confer tae, filiformes, ramosae aut simplices, nunquam ultra } ped. longae, saepe vix pollicares, nudae vel fulvo-tomentosae, fuscae.

FRONDES numerosae, stipitatae, erectae, membranaceae, glabrae: steriles ternatae aut pennis 5-7, rarius 9, tenninali plerumque proliferā, fertiles semper pinnatae nee apice proliferae.

STIPES sterilium 5-8-pollicaris, fertilium circiter pedalis, crassitie pennae corvinae vel tenuior, teretiusculus, hinc canaliculatus, sursum glaber et sordide stramineus, deorsum fuscus, prope eaudicem quidpiam incrassatus, laevis adspersus reliquiis palearum^ quibus junior circinatus totus obtegitur. *Palece* caudicis coacervatae, imbricatae, stipitis imi minus numerosae, oyatae vel ovato-lanceolatae, acuminatae, fere integerrimae vel parumper erosio-denticulatae, reticulatae, fuscae, infra maculâ saturatiore sub-peltatae, margine magis diaphanae, scariosae.

FRONS *sterilis* prouti et pinnae suae magnitudine valde inaequalis; *pinnae* fertilibus semper maiores, plerumque oppositae > rarius alternae, sessiles aut breviter petiolatae, ovali-oblongae vel oblongo-lanceolatae, magis minusve acuminatae, basi aliquantulum, et saepe oblique attenuatae, leviter repandae, erosio-crenulatae, utrinque costâ elevatâ venisque parallelis, interstitiis subtus reticulatis; *terminalis* major, longius petiolata, apice ut plurimum producta in caudam saepe pedalem, angustam, sub-repandam, nutantem, sub apice proliferam; *laterales* frondis ternatae saepissime ovato-oblongae, basi minus attenuatae, inaequilaterales, latere interno nonnunquam obtuse auriculatae vel partitae. *Plantce nwelce* e proliferationibus prognatae fronde constanter ternatâ, pennis lateralibus minoribus nee raro obtusis.

FRONS *fertilis*: Pinnae minores, paullo longius petiolatae, linear-lanceolatae, obtusae, inferne in petiolum angustatae, sub-integerrimae, tenuiores, costatae, obsolete venoso-reticulatae, supra glabrae, marginibus diaphanis capsulis confertis obductae; *terminalis* aliquantulo major atque magis minusve acuminata.

CAPSULE minutae, pallide fuscae, breviter pedicellatae, turgide lenticulares, annulo obscuriore, sub-completo, latiore, elevato, cujus articuli versus basin lateris, quo capsula déhiscit, magis extensi apparent. *Sporce* minutissimae, varie depressae, glabrae, pallide fuscae.

EXPLICATIO TABULA

AckOSTicmuJlagelliferum; magn. naL
Pales caudicis stipitisque; and.
Fragmentum frondis fertilis; auct.
Capsulae; multum adact.

14 ACROSTICHUM REPANDUM

TAB.'XIV et XV.

A. frondibus pinnatis membranaceis parallelo-venosis reticulatis glabris, pinnis sterilibus oblongis acuminatis inciso-crenatis, terminali longissime caudat&, fertilibus angustioribus obtusiusculis repandis, stipite sparsim paleaceo. BL.

A. repandum BLUME FilJav.p. 104. i5. {frons fertilis}.

A. proliferum EJUSD. ib. i4- {frons sterilis}.

HABITAT : VAIT HASSELT specimen juvenile hujusce plantae prope *Batoe-dwal* ad fluvium *Tjiminjak*, et annosiora ad montem igniyomum *Pulusarie* provinciae *Bantam* legit, comet autem eorundem copiam baud ita exiguum locis umbrosis provinciae *Tjanjor*, ad radicem montis *Parang*, art semper absque fructifications fiinc etob figurant frondis fertilis a sterili diversissimam factum est, ut utramque species distinctas arbitratus, hanc nomine *A. proliferi*, illam, cuius specimen unicum ill. RENWAADT in *Java orientali* detexerat, quā *A. repandum* descripsicerim. Verum speciminibus completis nuperrime ab bortulano *Zippelio* missis quum erratum meum agnorim, denominationem *A. proliferi*, prius frondibus sterilibus impositam, tollo, quia certum non fuit, eas ad *Acrosticha* spectare. Differt ab *A. Jlagelli/ero* WALL, basi frondis obtusiore, laciniis rotundatis crenaturis magnis*, prouti pinnis superioribus confluentibus atque reticulatione inter venas laterales discrepante.

FILIX 12-pedalis vel major.

CAUDEX uti in specie praecedenti, ast crassior, sub-ramosus, paleis similibus fuscis con-festitus, supra stipitum relicpiis multis parvisque tuberculatus, infra radiculis confertissimis, longis, filiformibus, fibrillatis, tenacibus, hinc inde leiriter tomentosis.

FRONDES' steriles raro ternatae, plerumque impari-pinnatae,,siib-nutantes, stipite 7-12 uncias longo, obsolete tetragono, supra canaliculate, pallide flavicante, fisco-maculato, paleis furfuraceis obsesso. Pinnae utrinque 7 ad 13, oppositae vel sub-alternae, oblongae vel lato-lanceolatae, paululo supra basin subornata crenaturis magnis, rotundatis, inaequaliter serrulatis, glabrae, costā media subtus elevatione venisque parallelis transversis, quas inter venulse sub angulis obtusis ratione simili atque in *Menisci*s connectuntur; inferiores breviter petiolatae, acuminate, basi parumper oblique acute aut deorsum rotundate, sursum

cuneatae; *superiores* laterales sensim decrescentes, sessiles > minus acuminate, ad apicem costa? mediae subtus saepe nodis parvis squamosis rudimentisve proliferationum instructs, demum obtusae et inpinnam terminalem confluentes, quac longius petiolata, omnium maxima, nutans, i-i¹-pedalis vel longior, inferne saepe cordata aut semicordata, ob pinas laterales connatas infeme pinnatifida, laciniis obtusis serrulatis. *Rachis* tetragona, sub-furfuracea, supra striata et utrobique leviter marginata. E proliferationibus frondes proveniunt breviter stipitatae, trifoliatae, pinnis ovatis vel oyato-oblongis, basi sub-cuneatis, sursum duplicato-serratis, intermediâ majore magisque acuminatâ.

FRONDES steriles erectae, impari-pinnatae; pinnae longe minores, lanceolate aut linearis-lanceolatae, obtusiusculae, basi oblique cuneatae, repandae, breviter petiolatae vel sursum adnatae; terminalis major, ovato-lanceolata, acuminata nee vero caudata, supra basin attenuatam pinnatifida; omnes planiusculae, subtus, cost& ipsâ non except¹, capsulis innumeris parvis pedicellatis fuscis operatae.

EXPLICATIO TABULARUM.

Tab. 14. Frons sterilis.)
15. Frons fertiliſ. } magn. nat.
Capsulae; aucL

15 ACROSTICHUM NEQUALE WILLD.

TAB. XVI

*

A. frondibus pinnatis coriaceis glabris reticulatis, pinnis elongato-lanceolatis integerrimis basi oblique cuneatis, omnibus obtusis mucronatis, superioribus fructificantibus. BL.

WILLD. *Spec. PL F. p. 117. 43.—BLUME Fil. Jav. p. 104. 96.*

HABITAT : In paludosis prope mare, vcl ubi aquae stagnantes commiscentur marinis, rarius in paludibus Javce interioris terreno alluviali calcareo, ubi thermae scaturiunt, carbonate calcis et muriate sodae ditissinue, e. g. apud Kuripan provincial Buitenzorg boreali-occiduac. Quum figura PETIVERII (*GazophyL X, Tab. 49, fig. 5*), a cl° WILLDENOW^{hie} allegata, hujus ipsius judicio minus bona sit, descriptioni nostrac addimus meliorem, id quod eo magis necessarium videtur, quo vero similius censemus, tarn A. *incequale* quam A. *speciosum* WILLD. varietates potius A. *aurei* LIB*, quam proprias esse species. Sin enim A. *incequale* WILLD. pinnis obtusis mucronatisque difflcre dicitur, notas istas minime esse constantes turn ex iconibus A. *aurei* turn ex observatione cl° RAULFUSS (*Enum.fil p. 65*) in promptu est, qui in specimine uno codemque sterili pinnas obtusas, acuminatas, obcordatas et breviter mucronatas deprehendit. Nee minus equidem eadem et in speci-minibus, in Zeylan a ROEHIG lectis, et in illis observavimus, quac SIEBER e Jamaica nomine A. *aurei* Livv. misit.

Etenim nullo plane modo ab illis *archipelagi Indict* discrepant. Quum itaque notis a divo WILLDENOW indicatis plantas illas ab A. *aureo* vix acne vix quidem distinguere possis, varieUtes sunt putandae, licet cl. KAULFUSS easdem in opere supra citato p. 68 ut species proprias recenseat.

FILIX frondibus compluribus 5-io-pedalibus, rectA assurgentibus e *caudice* brevi, crasso, lignoso, perpendiculari, subterraneo, inferne vestito^{^m} numerosis, longis, ramosis, tenacibus, saturate ferrugineis, partim villosis.

FRONS impari-pinnata, *stipite* rigido, lignoso, glabro, inferne fere digitum crasso, hinc profunde canaliculate, illinc rotundato, *rachique* conformi, sursum sensim sensimque tenuiore.

PINN[^] utrinque circiter i5-30, oppositae vel alternae, erecto-patentes, elongato-ligulatae, abrupte mucronatae vel obtusissimae, aequali- aut inaequali-retusae, basi oblique cuneatae, integerrimae, planae, *costd* supra plana vel unisulcatâ, infra prominulâ, subtus distinctius et elegantissime reticulatae, coriaceae, lucide virides: *inferiores* saepius plus quam pedales, 2. poll, latae, *petiolo* i-f-pollicari, semiterete, glabro, ad angulum internum racheos primariae paulisper calloso-incrassato; *superiores* magnitudine sensim decrescentes, brevius petiolatae, demum sessiles, *terminates* nonnunquam racbi adnatae et latere exteriori oblique decurrentes.

Pinnae fertiles saepe 3-4, saepe multo numerosiores, versus apicem frondis, basilaribus minorès, sed conformes, solummodo contractione nonnunquam sub-inoequaliter repandae, ad apicem plerumque (eâdem de causâ) instructs mucrone parvo, obtuso, utrinque nudo, supra glabrae et peraeque ac steriles, paululo densius* tamen, *venis lateralibus* tenerrimis, sub-parallelis reticulatisque adornatae, subtus, exceptâ majore costae parte, *soris* innumeris laete badiae.

CAPSULE rarius modo partem pinnarum obtegnnt, aut primum ab apice basive profectae frondis substantiam vario modo contrabunt, totamque obducunt paginam. A cl° SCHKUHR describuntur sessiles mixtaequa corpusculis parvis, clavatis, apice breviter radiatis, sed tarn in plantâ *AmericanA* quam *Javanicd* sunt pedicellatae, ellipoideae, inferne paululum attenuatae, pallide fuscae, *annulo* cinctae pallido, articulate, sat lato, ast minus elevate neque penitus complete; ubi pedicello inseruntur, incrassatio adest obscurior, fusca, capsulis delapsis plerumque in pedicello residua et corpuscula ilia clavata efformans, quae SCHKUHR indicavit. Nonnullos minores pedicellorum clavatorum ego quoque inter capsulas reperi, quos a capsulis abortivis exortos crediderim. *Sporce* sub-angulatae, pallide fuscae, diaphanae, laeves.

EXPLICATIO TABULiE.

Planta; *rnagn. nat.*

Fig- 1. Fragmentum frondis fertilis; *auct.*

F*g- 2. Capsulae; *auct.*

* Hâc notâ sola planta *Indica* a *Jamaicensi* quidpiam differre videtur, quod in hâc pinnae fertiles sterilibus laxius sint reticulatae.

16 ACROSTICHUM SPECIOSUM WILLD.

TAB. XVII.

A. frondibus pinnatis coriaceis reticulatis glabris, pinnis elongato-lanceolatis utrinque sub-aequali-attenuatis, superioribus fructificantibus obtusis aut mucronatis. BL.

WILLD. *Spec. PL V. p. 117. 4²-* — SPRENG. *Syst. Feg. IF. p. 37. 53.* — BLUME *Fil. Jav. p. 105. 17.*

A. aureum SCHKUHR *Krypt. Gew. Tab. I..B.*

A. Jraxinifolium R. BROWN *Prodr. Fl. Nov. Holl. p. itfi. 2.*

HABITAT : In depressis paludosis fruticosisque *Java*, imprimis provinciae *occidentalis Bantam*, unde et VAH HASSELT et egomet spedmina plura retulimus. Varietatem *A. aura* LINK, esse habendam jam diximus, quae a praecedente ob formam pinnarum summopere variabilem vix qu& varietas, nedium species, secerni queat. Sin enim pinnis paulisper magis elongatis, acutioribus basique minus inaequilateralibus discr^pare dicitur, notas hasce minime esse constantes, e speciminibus plurimis videmus. Haud injurii itaque fusiori ipsius descriptione possumus supersedere, prassertim quoniam notae istie ex icone nostrA satis perspicuae sint.

EXPLICATIO TABULiE.

Pars superior frondis ; *magn. nat.*



III. PLATYCYERIUM DESVAUX:

DESV. *in Annal. de la Soc. Linn, de Paris VI. p. 171.*

Neuroplatyceros PLUKEN. *Amalth. botan.p. 151.*

Acrostichi spec. AuCT.

CHARACTER DIFFERENTIALS:

CAPSULÆ sparsae, squamis peltatis intermixtae, frondis discum inferiorem totum vel ipsius partem tegentes.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Filices in arboribus parasite, fronde dispari coriacea, un& sub-integrd, alterā sub-dichotomA, quae plerumque inter sinus, aut apice laciniarum, aut appendicibus peculiaribus diversae formae, toro obtegitur e squamis innumeris, longiter pedicellatis, peltatis, stellatis capsulisque breviter pedicellatis absque ordine interspersis.

AFFIN : Dubium non est, quin plantis hujus generis maxima intercedat affinitas cum *Acrostichis*, praesertim, nisi *A. peltatum* Sw. et *A. flabellatum* HUMB. pariter in *Platyceriis* numerari oporteat. Id autem veri simillimum est propter dichotomos frondium sterilium nervos, quocirca utraque ista species habitu ab *Acrostichis* discrepat, potiusque ad *Platyceria* accedit. Etenim habitu peculiari specierum hūe spectantium, nee vero aggregatione capsularum irregulari, partem tantummodo

frondis occupanti, moti cum cl^o DESVAUX sentimus, qui illas ab *Acrostichis* separavit. Accedit capsularum insertio inter squamas peltatas stellatas simili modo, ac in *Pleopeltide* HUMB. et BONPL. observamus. Hinc et quia e. g. in PLATYCERIO *Stemaria* (ACROSTIGHO *Stemarid* PALIS.) fructificatio nil nisi sinum laciniarumve margines tenet, cognatio hujus generis cum quibusdam *Nothochlcenis* R. BROWN elucet, habitu tamen diversissimo.

DISTRIBUT : Si ACROSTICHUM *Stemaria* PALIS. reverA cum PLATYCERIO *alcicorni* jungi deberet — id quod veri simile non putamus — hūcusque duo tantum *Acrosticha* AUCT. hūe pertinerent. Utraque haec species in *Java*, in *archipelago Indico* et in *India orientali* continent! crescit, PLATYGERIUM *alcicorne* vero etiam in *Nova Hollandia tropica*, in *Madagascar* insulisque *Borbonicus* vel in oris *Africce occidentalis* repertum fuit.

1. PLATYCERIUM BIFORME

TAB. XVin.

P. fronde primordiali sessili ovato-vel trapezoideo-rotundata sub-lobata basi incrassata, seniori longissima dichotoma pendula basin versus in appendice reniformi fructificant. BL.

ACROSTICHUM *biforme* SWARTZ *Syn. Fil. p. 12. 18.* — WILLD.
Spec. PL V, p. i n. 28. — SPRENG. *Syst. Feg. IF, p. 35.*
40. — BLUME *Fil. Jav. p. io3. 11.*

OSMUNDA *coronaria* MUELLER in *Naturforsch. XXI*, p. 107,
*Tab. III**.

Simbar majangan seu Tando russa RUMPH. *Herb. Amb. VI,*
p. 83.

HABITAT : Pulchra haec species udis *Javm sylvis AREITGJE sticclarifera?* LABILL. innascitur, mihi semel modo cum fronde fertili ad radicem montiuro *Gunung Seribu* obvia, nee minus, etiam si sterilis, ab indefesso VAN HASSET.T

ad Lebak provinci. Jta M carpta. Distributee suam ab ilia Palm*, cui inter net qua, p^r U m in archipelago Malayan* atque Molucca**, item in Malabaria interiore, orA G,™™*/,*™ et Siam ranm' degit, pendere veri simillimum est.*

Fiux omnium facile maxime monstruosa, fronde vasta, dispari.

FRONS primordial sessilis, alteram circumvallans, ad nidi ingentis instar caudici vētusto ARENG* saccharifice, ubi versus coronam squamis dens* reticulatis vestitur, affixa, frondibus pluribus, tanquam in orbem disports, conformata, inferne e centro radicans. Frondes magnitudine valde inaequales, forma divers*: laterales magis horizontales, planiores, minores, saepe vix spībamam long* lateque, orbiculares vel renifonnes, plerumque integerrim*, margme solo subfoliace*, ceterum crassae, suberosae et hinc obsolete nervpso-venosae, pallide spadiceae, margme supra pilis paucis steUatis sparsae, ceterum glaberniae j frondes exteriores multo majores, partim patentes aut reflexae, sub-arcuate, i^-3 ped. longae, et fer<J totidem late, oblique rotundate seu potius trapezoideae, basi latā crassiores, suberosae et supra convexiuscul*, amedio ad margmem usque expansum, repandum vel sinuato-lobatum plus minus membranaceæ, tote per longitudinem nervis elevatis, parallelis, dichotomo-partitis, reticulatis percursae, subtus fulvae atque glaberrim*, supra paululo palHdiores, pnma aetate. pūqe stellatā tenerā vestite. Lobi inaequales, plerumque inaequaliter smuato-mcisi, laciinis obtusissimis.*

FRONDES/Mē arete alia supra aliam e centro priorum exorte, in morem fasciculi cornuum pendulae, haud raro 3-5 ped. longae, super stipitem brevem extemplo fere semicirculari-expansae et pluries profunde dichotomae in lacmias multas, lineares, plerumque bifurcatas, obtusas, planae, obtecto-venosae, glabrae, pallide virides, proxime sitipitem crassae, coriaceae, sursum sub-membranaceae, inferne ad dichotomiam primariam appendicibus a orbiculato-remformibus, basi cuneatis, marginatis, undulatis, coriaceis, supra obtecto-venosis glabnſque, subtus extoto capsulis obductis. Radices fibrosae, infra ad basin frondis pmor-dialis admodum congeste, sub-pinnato-ramosae, fulvo-villosae.*

STIPES velut confluentibus frondis nervis formatus, unum pluresve pollices longus, digitulo vix tenuior, glabriusculus, lignosus, fuscus, baſi crassiore atque ktiore tectus squamis imbricatis, lanceolatis ovatisve, chartaceis, margme tenerrime membranaceis, saepe laceris, pallide spadiceis.

F^CTIFICATIONES totam inferiorem appendicis paginam, basi cuneatA mar-gineque angusto solis exceptis, investiunt, itaut fusco-tomentosa appareat Cap-sukeprater morem minute, elliptic, sub-lenticular-compressae, pedicellate, annulo angustissimo, ad medium usque ambitus pertingente, circumsess*,*

pallide fuscae, sporis majusculis, ellipticis, pallide flavis, diaphanis refertac. Inter capsulas haerent *pedicelli* multi, saturatius tincti, longissimi, articulati, apice partim squamis tenellis, ovato-lanceolatis, in clavam coadunatis, rarius pilis stellatis horriduli. Praterea occurunt corpuscula clavata pedicellata, materie grumulosâ repleta.

EXPLICATIO TABULAE.

Frons fertilis minor cum parte primordialis; quidpiam diminuta.

Fig. 1. Fragmentum frondis fertilis; parumper auct.

Fig. 2. Squamae clavato-connatae pilique pedicellati inter capsulas dispersi; mult. auct.

Fig. 3. Capsulae; auct.

Fig. 4- Corpuscula clavata inter capsulas.

% PLATYCERIUM ALCICORNE

P. fronde primordiali sessili sub-rotundat& lobatâ vel indivisa, seniori sub-stipitatâ nutanti dichotomy nervos& subtus stellato-tomentos& apice fructificanti. BL.

ACROSTICHUM *alcicorne* SWARTZ *Syn. Fil. p. 12.19. et ibid. p. 196.*

(*eaccl. syn. COMMERS. et PALIS., forsitan et PLUKEN. atque SCHKUHR.*) — R. BROWN *Prodr. FL Nov. Holl. p. i45. 1.* — SPRENG. *Syst. Feg. IV, p. 35. 39. (excl. syn. A. Stemarice PALIS.).* — BLUME *Fil. Jav. p. 102. 10.*

A. *bifurcatum* CAVANN. *Praslect. 1801, p. 105. 58^*.*

HABITAT : In depressis turn Java, Sumatrc > insularum Moluccarum plurimum, turn Nova: Hollandice, verosimiliter et insularum Borbonice nee non regionum nonnullarum Africa, ad arbores parasiticum. Attamen vix dubium est, quin species, a PALISOT DE BEAUVOIS' ora occidufo Africce prope Oware reperta, quam prius jam a COMMERSON in Madagascar detectam ferunt, A. *alcicomi* SWARTZ tam fronde fertili erectâ, quam lacinias minime apice, sed sinibus sorophoris differat. Hoc luculentius adhuc patet, ubi iconem A. *Stemarice* PALIS. (*Flore d'Oware V. / Tab. 2*) comparaveris plants, quae plerumque in hortis botanicis occurrit, et in fasciculo a8° tabularum Lexici Historice naturalis (*Planches du Dictionnaire des Scienc. nat.*) iconem optima* collustratur. Imo et haec forte specifica distinguitur ab Indicd fructificationibus a laciariis margine remotis. Certe diversitatem istam quam maxime constantem observavi. Esdem de causâ *Neuroplatyceros athiopicus* PLUK. rectius ad A. *Stemariam*, quam ad A. *alcicorne* videtur citandus.

FILIX 1^-2-pedalis et altior, ob dimorpham frondium formationem structure valdopere singularis.

FRONDES steriles s. primordiales peripheries, sessiles, fere rosaceo-congestae,

sub-horizontales, spithameae et longiores, reniformes, margine rotundato repande
s. irregulariter lobato, planiusculae, fulvae, nervoso-venosae, glabras, foliaceae, ad
basin incrassato-suberosae et pallidiores. *Radiculos* numerosissimae, inferne e
centro plantae enatae, filiformes, divisae, tomentoso-ferrugineae.

FRONDES *fructificantes* plures e centro primordialium, nutantes, basi admodum
angustatae aut nervis in fasciculum coacervatis quasi stipite brevi rigido suffultae,
sursum planae et sensim magis expanse, foliaceo-coriaceae, nervosae, supra
pallide virides, pilis stellatis raris, subtus glaucescentes, stellato-tomentosae,
margine omni quidpiam revolutae, utrinque dichotomae in lacinias 3-5 vel plures,
fastigiatas, digitiformes, obtusiusculas: interiores externis longiores.

STIPES ^h-i-pollicaris, pennâ anserinâ crassior, compressus, inferne obsessus
squamis multis, appressis, setaceis, subulatis, nigro-fuscis, sursum pube stellatâ
similiac in paginâ inferiore frondis fertilis vestitus, in adultioribus glaber, fuscus.
Nervi utrinque prominuli, versus stipitem crassiores, magis conferti, paralleli,
sursum magis divergentes et pluries furcato-divisi, *Lacinice* apice subtus fructifica-
tionibus opertae et hinc valde incrassatae j fructificationes tomento e pilis stellatis et
inter capsulas squamis breviter pedicellatis, tenerrimis, stellato-laceris, obiectae.

CAPSULE minimae, velut in lineolas confertas ac confluentes aggregatae, breviter
pedicellatae, fere obovatae, lenticulari-compressae, pallide ferrugineae, reticulatae,
annulo paullo saturatius tincto, angusto, sub-completo, articulato, cinctae, latere
altero versus basin transverse dehiscentes. *Sporae* numerosae, ovales vel sub-
reniformes, pallide flavae, diaphanae, nitentes.



IV NIPHOBOLUS KAULF.

KAULF. *Enum. Fil.* p. 124. — EJUSD. *Ueber das Wesen der Farrnkr.* p. i n. — SPRENG. *Syst. Veg. IF,* p. 5. 3242.

Cyclophorus DESV. *in Berl. Magaz.* V, p. 500. — *Journ. de Botan.* I, p. 19.

Cahdollea MIRBEL *in BUFF. Hist. nat. des végét. e'd. De'terv.*

Polypodii et Acrostichi nonnullce spec. AUCT.

CHARACTER DIFFERENTIALS:

SORI annulares aut rosacei, conferti vel sparsi, pilis stellatis obducti.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Caudex repens, radicans, squamis membranaceis peltatis vestitus. Frondes simplices, rarius sub-pinnatifido-partitae, integerrimae, subtus plus minus stellato-tomentosae, coriaceae vel carnosae, costâ mediâ percursae, venis lateralibus aut plane nullis aut obsoletissimis, rarissime distinctis, apice subtus vel parte superiore ex indumento tomentoso crassiore soris obtectae annularibus, frondis substantiae plerumque plus minus profunde immersis, unde frondis pagina obversa pro portione tuberculata aut pustulata. Sori singuli constant capsulis plurimis, rarius paucis, circa papillam s. receptaculum centrale carnosum superne plerumque penicillatum orbiculatim afluxis, raro eidem insidentibus, pedicellatis : externis internis longioribus, versus centrum assurgentibus et ad latera sibimet ita accumbentibus, ut latus annulo incompleto munitum peripheriam, oppositum vero, quo capsula transversim dehiscit, receptaculum centrale spectet. Annuli lati, parum elevati, post capsularum disruptionem assurgententes. Sporae ovales aut reniformes, punctis asperae, diaphanae.

AFFIN : Genus hocce, tametsi propterconformem specierum habitatum multis aliis longe magis naturale, hinc cum *Acrostichis* istis, quibus frondes carnosae et aveniae sunt, e. g. cum *A. nummularifolio* Sw., illinc — et proxime quidem — cum *Nothochlcnis* R. BROWN cohaeret, quarum sori tamen potius marginem totum, <juam frondis partem so] am superiorem tenent, habitu simul diversissimo. Pariter inter *Polypodia* et *Pleopeltides* species haud itapaucae occurunt, quae soris quidem immersis, attamen regularius dispositis nee unquam adeo confluentibus, quam in *Niphobolis*, gaudent. Accedit capsularum aggregatio circularis circum corpus centrale elevatum, in hoc genere notatu dignissimum. Est enim receptaculo illi globoso, cui in *Cyaiheis* generibusque confinibus capsulae, absque ordine tamen, insident, quoddammodo analogum, at in nonnullis speciebus nil nisi punctum elevatum sistit. Species vero hasce a reliquis segregare, et cum cl^o DESVAUX (*Annal. de la Soc. Linn, de Paris, FI}* in proprium genus (*Pyrrhosia*) conjungere nobis videtur superfluum. Inter *Polypodia* AUCT. plures adhuc militare species, quas *Niphobolo* accensere justiusforet, nulli dubitamus. Ast species staturā frondiumque simplicitate sibi met simillimae difficillime distinguuntur, frondis magnitudine insuper in uno eodemque stirpe quam maxime variante.

DISTRIB : Cl. KAULFUSS species *septem* descriptsit *totidemquc* circiter indicavit, quarum aliae procul dubio h̄ae pertinent, aliae subtiliore adhuc egent inquisitione. Confidere sane licet, cl^{um} SPRENGEL, qui species modo indicato conjunxit, et *septem-decim* enumeravit, autopsia summe necessaria fuisse usum, quā sold confusio scientiae nostrae quam perniciosissima evitari queat. NIPHOBOLUM *longifolium* SPR. (CYGLOPHORUM *longifolium* DESV.—CANDOLLEAM *longifoliam* MIRB.—ACROSTICHUM *longifolium* BURM.) et IV. *polycarpum* SPR. (POLYPODIUM/7O(^-carpum CAV. et Sw.), quern utrumque in Java degere tradunt, inter species nostras reperire nobis non contigit. Quodsi *N. polycarpus* SPR. reverb frondem glaberrimam subtusque reticulato-venosam gerit, valde quaeritur, an rite h̄e militet, congenibus cunctis stellato-pubescentibus. Utcunque sit, species omnes, hactenusnotae, unacum nonnullis noviscirciter

viginti ad viginti quatuor explent, cunctaeque in insulis *oceani Indici*, praesertim *Malayani*, *Moluccani* et *Philippinici* degunt, paucis exceptis, quae *Indianam orientalem* continentem, nee non paucissimis, quae ab austro aequatoris *Novam Hollandiam* ad oram usque *Nova? Guineas* inhabitant. *Decent* in *Javā*, maxime interiore nee tamen in montibus altissimis occurrunt, quarum sex illi cum terris aliis communes sunt: *Quatuor* cum *India* orientali*, *N. adnascens* KAULF, VZN. *carnosus* BL., *N.glaber* KAULF. et *N.puberulus* BL., quorum ultimi duo etiam in *Novā Hollandid*, *Novā Zealandid* insulisque *Societatis* reperti; *dune* verosimiliter cum insulis *Philippinis* atque *Marriannis*, *N. varius* et *caudatus* KAULF.

a. *Fronde fertili a sterili discrepante.*

1. **NIPHOBOLUS CARNOSUS.**

TAB. XIX.

N. frondibus carnosis breviter stipitatis stellato-pubescentibus, sterilibus obovatis, fertilibus longioribus linearibus obtusis, costis vix elevatis, soris confluentibus. BLUME *Fil. Jav. p. 105. i.*

*Man*etla-mala "maravara* RHEED. *Hort. Mai. XII, p. 52.*
Tab. 29.

fi. Frondibus supra glabris.

HABITAT : Vulgatissimus in archipelago *Malayano* et *Moluccano*, peraeque ac in ora *Malabar*, teste RHEEDE, truncis arborum tam vivis quam emortuis frequentissime inhserens. In iconē cl' BHEEDE satis bond multa tamen desiderantur, quodre ab auctoribus aliis alias ad plantas citata fuit, e. g. in praedicta *Enum. Fil. cl' KAULFUSS* ad *NOTHOCHLIEWAM piloselloidem*. & congeneribus cognitis proxime hinc ad *N. adnascentem* KAULF., illinead *iV. heterophyllum* SPREVG. accedit, ab utroque fronde sterili obovaliacrotundata' salisdistinctus*. Ast

* Inter filices, qua: a ROBKIG in ZeyIon collectae nuac iu herbario *Lugduno-Batavo* servantur, quædam exstat, quae NIPHOBOLO rupestn*SPBEITC. (POLYPODIO rupestri R. Bn.) et speciei noslrae affinis, ab utraque fronde angust' aberrarci videtur. KOBIG ipsum pro POLYPODIO piloselloide LINK, habuit, atque annotavit, in arboribus Zey ton minus frequentem esse. Si itaque species haec a *N. rupestri* SPR. foret distincta, eam sequenti definiremus modo : NIPHODOLUS *Ktenigii*; *frondibus breviter stipitatis carnosis linear-lancolatis supra glabriusculis subtus incano-tomentosis*, *sterilibus obtusis*, *fertilibus longioribus utrinque acuminatis infolatis*, *costd supra depresso subtus convexiusculd*, *soris confluensibus*. — Frons utraque vix ??" lata; sterilis i^a" longa, fertilis 4-polliraris.

N. rupestris SPRENG. (*Herb. Sieb.*) a nostro fronde minus obtusæ fertilique planæ nee involute param per differt, Succus frondium carnosarum quidpiam stypticus in aphthis atque stomachace saluberrimum sesa prestat.

CADEX longissimus, filiformis, tenax, ramosus, juxta atque rami alterni simplices vel sub-ramosi teretiusculus, subtus sulco longitudinali exaratus, *radiculis* numerosis cortici arborum annexus eique velut circumvolvatus, totus squamosus, supra per longitudinem frondes multas alternantes proferens. *Radiculce* tenerae, plerumque breves et simplices vel sub-pinnato-divisae, fulvo-villosae, horizontales. *Squamæ* parvae, appresse imbricate, ovato-lanceolate, acuminate, castaneæ, margine cinereæ et tenuiores, pulchre ciliatae, basin versus puncto centrali obscuriore peltato-affixæ.

FRONS simplex, utraque ex eodem caudice, obliqua vel erecta, carnosa, avenia; *fertilis* minus numerosa, longior longiusque stipitata.

STIPES frondis sterilis vix aliquot lineas longus, fertilis saepe plus semipollicaris, teres, supra obsolete canaliculatus, basi paululo crassior, atro-fuscus squamisque aliquot parvis vestitus, frondi concolor et pubescens.

FRONS *sterilis* absque stipite plerumque vix pollicaris, dimidio angustior, obovata, apice rotundata, rarius quidpiam retusa, basi in stipitem angustata, integerrima, crassa, subtus plana, supra convexiuscula, ecostata et avenia, subtus obsolete costata, ast densius pubescens, quam supra, ubi magis nitida. Pubes e pilis parvis, stellatis, sericeis, puncto centrali fusco afluxis, in adultiore plants sensim evanescens.

FRONS *fertilis* 2-3-pollicaris et longior, 2 lin- lata vel latior, linearis, obtusa, supra canaliculata, glabriuscula et vix depressiuscula, subtus convexa, sorphora, stellato-pubescentia, costâ mediâ valde prominulâ, inferne (basi) admodum angustata, planior, marginibus paulisper reflexis.

SORI confertissimi, rosacei, pube sericefi. stellatâ emergentes, singuli fasciculo capsularum pedicellatarum, cavitatibus planis frondis immersarum, compositi. *Capsules periphericee* longe pedicellate, *centrales* sub-sessiles, ellipsoïdeæ, inferne magis attenuatae, flavescentes, annulo lato, piano, articulate, ferrugineo. *Spam* oblongæ, plerumque reniformes, punctate, flavicantes, diaphanae.

EXPLICATIO TABULÆ.

Planta; magnit. not.

Fig. 1. Squamae caudicis variâ magnitudine; *auct.*

Fig. 2. Sori quidam transverse secti; *auct.*

Fig. 3. Capsularum aggregatio circa pa pi 11 am centralem; *auct.*

Fig. 4*. Capsulae cum sporis; *auct.*

Fig. 5. Pubes stellata; *auct.*

X NIPHOBOLUS ELONGATUS.

TAB. XX.

N. frondibus coriaceis longe stipitatis linear-lanceolatis obtusis supra glabriusculis subtus stellatim sericeo-pubescentibus, fertilibus longioribus, costis elevatis, soris confluentibus. BLUME Fil. Jew. p. io5. 2. (excL Var. ?.)

HABITAT : Ail arborum trunco regionibus diversis *Java insulacque Nusa Kambangan*, quicq; altioribus adnumerari nequunt. Quum forma atque statura frondis in omnibus fere hujusc generis speciebus siimmopere variat, dif&cillimum est dijudicatu, utrum species sint an varietates. Ita haec species a praecedente non nisi fronde magis elongat!, longius stipitati, potius coriacci quam carnosâ, cost&que media* frondis sterilis multo distinctiore recedit, et a *N. adnascente* RAULF. fronde longe stipitat figurae diversae, a *N. bicolore* KAULF. vero pubescenti tenuiore sorisque arctissime confluentibus neque remotis distinguitur.

FILICULA facie speciei praecedentis, modo robustior.

CAUDEX longissime et superficiarie repens, flexuosus, crassitie fere pennae corvinae, inferne fibris solitariis vel saepe copiosis, pinnato-partitis, nigro-fusco-villosis, instructus squamisque imbricatis fuscus. *Squamae* parvae, surculorum juvenilium caudicis ovato-lanceolatae, acuminatae, sub-peltato-aflixae, saturate ferrugineae, marginibus liberis tenuissimae ciliataeque; in partibus caudicis vetustioribus obscuriores, marginibus apiceque solutis magis ovales aut orbicularis, paululum erosae, demum prope penitus eyanidae.

FRONDES alternantes, caudici impositae, sub-erectae, simplices, integrac, longe stipitatae, coriaceae, aveniae, supra nitidae, pilis solitariis stellatis aut glaberrimae, subtus pilis ejusmodi numerosis densis fere sericeo-nitidae.

STIPES sterili plerumque pollicaris[^] fertilius saepe duplo longior, crassitie paene caudicis, hinc sulco adscendente notatus, inde rotundatus, ad caudicis insertionem stipatus squamis multis, parvis, appressis, sursum prouti frondes pilis stellatis, tandem fere evanidis.

FRONS sterilis 2-3-pollicaris, 3-6 lin. lata, linear-lanceolata, obtusa vel rarius leviter retusa, inferne in stipitem angustato-decurrens, plana, utrinque costâ conspicuâ, subtus prominulâ. (In specimine quodam stipitem obseryamus, qui frondes 2 petiolatas, alteram alterâ minorem gerit, ceterum descripto conformis).

FHONS *fertilis* absque stipite 4-6-pollicaris, sursum angustior, quam sterilis, ceteroqui conformis, astplerumque per totam longitudinem conduplicata apiceque subtus ab initio tomento densiori stellato obducta, e quo sori haud absque omni ordine, sed utrinque ad costam lineis parvis, parallelis, quam maxime approximatis, prorumpunt.

Sow copiosissimi, sub-rotundi, cavitatibus frondis sat profundis immersi, pilis sessilibus vel pedicellatis steUatis occulti, dein emersi centroque depresso, tandem convexiusculi, sub-nudi et confluentes. *Capsuhe* interiores externis brevius pedicellate, obovate, turgide lenticulares, flavescentes, annulo obscuriore, pallide ferrugineo, lato, incompleto, post capsulam disruptam assurgente. *Spone* pallide flavidae, diaphanae, reniformes, quidpiam scabriuscule.

EXPLICATIO TABULJE.

NIPROBOLVS clongatus; magn. not.

Fig. i. Squamae caudicis junions; *auct.*

Fig. a. Squamae caudicis veterni; *auct.*

Fig. 3 — 6. Segmenta frondis fertilis ad monstrandum sororum explicationera.

3. NIPHOBOLUS ADNASCENS KAULF.

N. frondibus coriaceis subtus stellato-pubescentibus, sterilibus sub-sessilibus oblongis obtusis, fertilibus Hneari-lanceolatis obtusiusculis, soris confertissimis, costa vix prominente. BL.

KAULF. *Enum. Fit. p. 124.* - SPRENG. *Syst Feg. IF, p. 44-* *

NIPHOBOLUS elongates, *p. BLUME Fil. Jav. p. 106.* 2.

CYCLOPHORUS adnascens DESV. *Journ. de Botan. I, p. 20.* 1.

POLYPODIUM adnascens SWARTZ *Syn. Fil p. s5.* 2. *et p. 222.*

Tab. II, Jig. 2. — WiLLD. *Spec. PL F, P-* * & ' 4- *K^{QXcL}*
relicju. syn. et fig.) . .

HABITAT : Annosis arborum truncis provincial *Bantam* interioris, a ~~ROTTNER,~~ Klxix aliisque etiam in *Asia* continentⁱ repertus. I

noyam nolumus exhibere.

CALCES filifonnes, longissimi, ramosi, teretuscu^U, subtus linea[^] depressa notati, prouti congeneres reliqui squamis imbrica^Us ornati subtusque per fibras breves tomentosas cortici arborum inhaerentes.

FRONDES simplicissimae, integrae, coriaceae, praecipue subtus pilis parvis, albis, appressis, stellatis velatae, aveniae, ordine simplece e caudice emersae, circa $\frac{2}{3}$ poll, inter sese distantes, steriles minores et obtusiores, fertiles mayores longiusque stipitatae, magis versus finem caudicis sitae.

STIPES sterilium vix lineam longus, fertilium plerumque semipollicaris, gracilis, basiplerumque leviter tortus et crassior, squamis aliquot consitus, sursum glaber, hinc leviter canaliculatus.

FRONS *sterilis* sub-pollicaris, oblonga, obtusa, basi attenuata, costâ mediâ fere oblitteratè, plan a, pallide virens.

FRONS *fertilis* bi-tripollicaris, linear-lanceolata, obtusiuscula, inferne angustata, supra per longitudinem costâ mediâ depressâ, subtus prominulâ, ab apice ad medium usque in tomento cinerascente confertim fructificans.

SORI minutti, confertissimi, sub-annulares, pallide ferruginei.

I. NIPHOBOLUS VARIUS KAULF.

TAB. XXI.

N. frondibus stipitatis coriaceis margine revolutis subtus stel-lato-pubescentibus, sterilibus lanceolatis obtusis, fertilibus lon-gioribus linear-lanceolatis supra versus apicem papillosis, costis elevatis, soris confluentibus. BL.

KAULF. *Enum. Fit. p. 125-126.* — SPRENG. *Syst. Feg. IF, p. 44-3.* — BLUME *Fil. Jav. p. 106. 3.*

NIPHOBOLUS *pertusus* SPRENG. *Syst. Feg. IF, p. 44-5.*

POLYPODIUM *pertusum* ROXB. *Mss.* — HOOK. *Exot. Fl. II, P. 23. 162. Tab. 162.*

p. Fronde planiusculâ utr&que sub-confoni.

HABITAT : Planta haec, a eel" CRAMISSO in insulis *Mariannis* et *Philippinis* reperta, degit etiam in monlosis *Java* ad muscosos arborum truncos, prsesertim prope flumina aut cataracras, e. g. apud *Tjibiton*. Exslat pariter inter plantas, a cl^o REIHWARDT in *Java* lectas, nomine POLYPODII *adnascentis* SWARTZ, varietas *fl* vero quæ *P. stigmatum* SWARTZ, quæ etiam a cl^o VAS HASSEL TID *Bantam* crebro carpta fuit, Nulli plane dubitamus, quin nostra planta cum POLYPODIO *pertuso*, quod primus ROXBURGH in *Bengale* ad *Gangem* detexit, et HOOKER postea e *China* in *Angliam* transtulit, eadem sit. Num vero NIPHOBOLUS *spissus* KAULF. (CTCLOPHOHUS *spissus* DESV., POLYPODIUM *spissum* BOBY), quern frondibus paululum minoribus, plânts et acutis différre dicunt,

nostra m spectet varictatem, e*icone nostrā dijudicari potent. E *rie speciminum persuasum nobis habemus. vari t̄i & eo minus specie! deberi honoren,, quo inconstant nota ipsius <t. Calces en.n, occur̄nt, quo in f̄rondes steriles partim acute, partim acumiuatx, partim obtus* sunt, «c«U summafr̄m long.ludo et latitudo frondium mirum quantum variat.

CiUDicK erasshisculi ad filorum longorum, tortuosorum instar truncos ramosque arboramsuccingunt, neque raro totos obyelant, ramosi, teretusculi aut supra Le depress!, tenaces, suroulorum junioram s^amis long* palhde foscescentibus suicriniti, adultiorum nudiusculi yel s,[uainarum reliquās basilanbus obscurioribusvestiti.hii.cindeelateribusetiirfen.eradiculisinnamenſdens^snine ciremnſessi, superne per longitadinem frondes alternas, rarius vest^ū, nonnuU_{IS} stipitum ddapsorum mixtas, efferentes. *Badicul** breves, tenelte, plerumque d i L , TUlo nigro-fusco obduete. &,umue peltato-afte, caud.cB juniois angusto J a n o e o k L .a.mn̄ matisste.longē te.med opp^turāl.ores, margine flaTido-fuscescentes, adultioris appressa!, mnlt saturahus Uncte, irregulares, sspe ovales aut oblongs, lateribus erosaj Tel eroſoHahate.

F«oTMM erecte, slipitate, simpUcissimK, ooriaoea, amente, costiUnedia s^ra anguste sulcatā, s»bt»s prominulā, juniores ubique tomento paJbde ferrugmeo dense investite, natu majores supra glaierrim* pilisre adsper̄e rans, stellahs, appressis, subtus crebrioribus.

STH-ES -i-pollicaiis, prope oaudicem sub-paleaceus et hine gibbus, sursum s i Z s , fecūsTlo^ad'fronde.n usque adseendente exsculptus, glaber aut paululum furfuraceus; junior stellato-pubescens.

F«o»ssterilis H-poUicaris, J-. poll, lata (in, nonnunquam H * i <*> I > <- .I poll, to), lanceolata, obtusa yel rotundato-obtusa (m , plenun.pe aouta aut aeuminata), basi in stipitem attenuate, margme mtegrō revoluta, subtus pallidius wens. *FertiUs* 4-&-pollicaris (w A j^pollicans), stenli angustor, nnean-lanceolata, apioe obtusa, obtusiuscula aut aouta, inferne angustata, bas. marg-nibusrevolutL, a medio ad apieem usque plana rel subtus utrmque ad costam median, soris innumeris, confluentibus, paUide ferrugineis tuimda, supra sensnn sensimque magis pustulosa.

SOB. oopiosissmri, primum indumenta e pilis steUatis orasso, flavescente-albo, lanoso absconditi, dein yelut annuli parvuU, sub-senah, approximati, emergentes magis magisque extensi, demum fere confluente, a^ue pressione mutuā L i e angulati. C^IL situ et figura, uti in specie pra^cedent, ast multo numero-i l H L » l o .s .e x .8 .m .a n g e a p s u l i s compositos refert. siores, quam HOOKER aanutat, ^ *—o— quippe tum capsulae Quocirca sori in specimine suo parom emersi fuisse ydentur, tarsis sub-sessilibus tantum extern*; s. peripherieslonge pedicellate apparent, " J — ~ emersere, tomento denso adhuc oeculfc et posterius modo, «b. son pemtus conspicuis.

EXPLICATIO TABULiE.

5. NIPHOBOLUS CAUDATUS KAULF.

TAB. XXII.

N. frondibus sub-coriaceis lanceolatis planis glabriusculis, sterilibus obtusis, fertilibus longissime caudatis obtusiusculis, costis elevatis, soris confluentibus. BL.

KAULF. *Enum. Fil. p. 127.* — SPRENG. *Sjrst. Feget. IF, p. 45.*

14. — BLUME *Fil. Jav. p. 106. 4-*

HABITAT : A dct° REINWARDT in *Moluccis*, a nobis in *Java occidentali* prope tumulos *Baduinorum* detect us. *N. vario* KAULF. apicibus frondium fructificantum contractis ideoque angustioribus parumper differt, quare forte illius varietatem constituere debet.

CAUDEX longissimus, filiformis, arborum cortici fhirillis plurimis, brevibus, ramosis, nigro-fuscis, tomentosis adhaerens, dense opertus squamis parvis, peltatis, arete imbricatis, plerumque ovato-lanceolatis vel obtusis, sub-ciliatis, saturate badiis.

FRONDES dispares, e caudicis superficie erectae[^] stipitatae, distantiâ circiter 1 poll, alternoe, simplicissimae, integrae et integerrimae, sub-coriaceae, glabriuscule, subtus pilis sparsis stellatis, oculo armato puncta albida elevata monstrantes, costâ mediâ suprâ planâ, subtus elevatâ.

STIPITES tam sterilium quam fertilium sub-aequales, in *Javanicis* eirciter semi-pollicares, in *Moluccanis* pollicares, basi paululo crassiores, tortuosi, squamu-losi, sursum nudi pilisve solitariis, stellatis, appressis ornati, et bine obsolete canaliculati.

FRONS *sterilis* 2£-4-pollicaris, i-i poll, lata, lanceolata, obtusissima, basi attenuata, marginibus plana, raro quidpiam reflexa, supra nitens, subtus pallidior, basin versus costâ mediâ saepefuscescente[^]e/f/Zw conformis, ast 7-10-pollicaris, a medio usque ad apieem produeta in eaudam longam, angustam, quae subtus utrinque ad costam medianam soris accumulatis tumidior, quam portio frondis inferior; supra pilis aliquot stellatis adspersa, costâ depressiusculâ, marginibus lateralibus leviter pustulosis.

SORI parvi, sub-rotundi, cavitati sat profundaes immersi, in cuius fundo tuberulum minutum, conicum, apice faseiculo e pilis fureatis coronatum; priusquam in infer A. frondis pagina conspicui evadunt, obvelati pilis multis, stellatis, flavid-albidis, medio fuscis, sessilibus aut pedicellatis. *Capsulce* sphaericæ, pedicellis teneris inaequalibus impositæ, pallidoe, annulo obscuriore, pallide ferrugineo.

incomplete, lato, piano, post diruptionem persistente. *Sporate* fere ovales, flavescentes, punctate, diaphauae.

EXPLICATIO TABULAE.

NIPHOBOLUS *caudatus*; *magn. not.*

Fig. 1 —4- Segmenta frondis fertilis, quibus sororum stadia varia monstrantur; *auct.*

Fig. 5. Portio frondis fertilis cum soris duobus vertcaliter secta; *multum auct.*

Fig. 6. Capsulae sori singularis circa papillam centralem inserts; *auct.*

b. *Fronde utrdque conformi.*

6 NIPHOBOLUS PUBERULLS.

TAB. XXIII.

N. frondibus coriaceis angusto-lineari-lanceolatis obtusiusculis revolutis supra glabris subtus pube minuti obsessis, costis elevatis, sbris confertis. BLUME *FiL Jav.* p. 108. 9.

CYGLOPHORUS glaber DESV. *Journ. de Botan. I*, p. 20. 6.

CANDOLLEA lanceolata MIRB. in BUFF. *Hist. nat. des Fég. Deteiv.*

r8p. *

POLYPODIUM acrostichoides FORST. *Prodr. n. \$/[. — SwARTZ*
Syn. FiL p. 29 et pi 225. (excl. syn. LINN. etjig. RHEED.).

HABITAT : In insulis *Societatis* a cl° FORSIER, in Java depressis, imo prope littora, ex arborum ramis a THUNBERG nobisque frequenter coUectus. Vix enim dubitamus, quin planta nostra POLYPODIUM acrostichoides -FORST. et SWARTZ sit; nomen vero nostrum servavimus, quia species diversas sub denominatione ilia confusas fuisse luce clarius patet.—Comparatio speciminis FORSTERIANI oranem solveret dubitationem. Certe quidem tarn diagnosis *afrofrondibus linearibus glabris* » quam notae, quas eel. SWARTZ indicavit *ujrondes lineares*, vix acuminate, subtus tomento incano oculis nudis vix distinguendo tectm » nielius in bane speciem, quam in NIPHOBOLUM glahrum KAULP. quadrant. — A *N. bicolore** KAULF. fronde marginibus magis minusve revoluta sublusque baud dense incano-tomeDtosa, sed pilis parvulis oculo armato conspicuis pallide canescente recedit.

CAUDEX ramosus, teres, rigidus, pennâ corvinâ vix crassior, squamis arete incumbentibus nigro-fusco-punctatus[^] inferne radiculosus, nunc longe extensus,

*Synonyma, qua cl. KAULFVSS ad hanc speciem laudat, *nobis* minus plana sunt, et species videntur spectare divenas. VAHI, (*Synth. Ill*, p. 104) caudicem «pilis ferrugineis kirtutumn yocat, dum SCHKUHH (*Krjpt. Gcw.p.* 10) squamis appressis fuscis testitum, ast haudquamquam pilosum ase dicit. Secundum Ogirramipsius (*Tab. Fill*) frons subtus admodum incano-tomcutosa ea» idetur, id quod minus descriptioni suae, quam HOOKERIAWE (*Icon. FiL Fate. Ill*, Tab. 44) convenit. Ast forsitan coloritus iconis SCHUJHBLAHJE fallimur; quod si ita sese haberet, ipsam pro fronde minore POLTPODII acrosticholdis FORST., non vero speciei, a VAHL descripta, dedarare viz dubitaremus. Notandum adhuc est, in *Herbario Siebeviano* plantam *Novo-HoUandicam* nomine POLTPODII acrostichoUiis FORST. extare, qua: ab ilia, quam nosmet pro illohabemus, toto ccelo disUt. Etenim frondes lanceolata;, obtuse, utrinque maxime subtusstellato-puberulae sunt, et fructificationes soli margini apicis frondis incident..

ast adhuc flexuoso-proserpens, ramis divergentibus, nunc horsum vorsum flexus, tantum non deliquescens. *Radiculce* simplices aut pinnate > tenuissimae, fuscae, parum villosae. *Squamce* surculorum quoque juniorum ovatae, acutae, sub-integerimae, arctissime appressae, peltatae, nigro-fuscae, nitidae, margine tenuiores et pallidiores, partium yetustiorum caudicis obtusiores. *Reliquidce stipitum* partibus caudicis fere emortuis innatae, cylindris brevibus excavatis similes, extra squamis similibus atque caudex velatae.

FRONDES erectae vel leviter retroflexae, magnitudine diversissimae, nunc 4-pollicares, nunc i-i[^]-pedales et longiores, 3-5 poll, latae, lineares, obtusae aut obtuso-acuminatae, inferne angustatae, marginibus integerrimis maxime sursum revolutae, juniores planiores et utrinque velut lepidoto-stellato-puberulae, adultiores supra vel glaberrimae ac nitidae, pilisve raris stellatis sparsae, subtus pilis iisdem quidpiam cinerascentes, coriaceae, rigidae, aveniae, supra sub-rugosae, plano-costatae, subtus costâ mediâ fortiter elevatâ aut carinatâ, nonnunquam apice tantum, plerumque vero usque ad medium fructificationibus tectae.

STIPITES aequo ac frondes longitudine diversissimi, 5-, soepissime 1-/ rarius 3-pollicares, processibus caudicis articulatim impositi, teretiusculi, hinc canaliculati vel obsolete angulati, glabri aut sericeo-cinerascentes.

SORI magis inordinati, quam in congeneribus aliis, soepe solitarii, modo irregulariter congregati, ita ut frondis interstitia vacua remaneant, modo omnes confertissimi et sese vicissim comprimentes, frondis cavitatibus parvis immersi, primum pube pallide ochraceâ, tenerâ, stellatâ velati, postea quâ annuli parvi, plani, flavi emergentes. *Capsules* minimae, numerosae, sub-sphaericæ, basi quidpiam attenuatae, incomplete annulato, ferrugineæ, sori cujuslibet inferne per pedicellos circum corpus centrale penicilliforme affixae.

EXPLICATIO TABULiE.

Planta; *magn. nat.*

7 NIPHOBOLUSmsus

TAB. XXIV.

N. irondibus sub-coriaceis elongato-lanceolatis margine planiusculis supra glabris subtus albido-ferrugineo-tomentosis, fertilibus confonnibus aut caudato-pinnatifidis, costis elevatis, soris confertis sub-confluentibus. BLUME *Fil. Jav. p. 106. 5.*

HABITAT : Parasiticus in arboribus sylvarum *Javte*, circa aooo ped. supra mare elatarum, qua fluviis uberius irrigantur, e. g. ab indefessn VA« HASSBLT *Javd occidud* adcataractam *Sadian*, a nobbmet prope jugum *Rarang*

provincial *Tjanjor* repertus. Species base praeprimis notatu est digna, eo quod, siccata saltern, venas laxe reticulatas ostendat, quae nonnunquam ad dividendam frondem ansam præbent, ita ut planta nostra fidain tanquam imaginem illius *Pleopeltidis*, quam BOBY nomine POLYPODUM *multifidi* delineavit, repreäsentet.

FILIX 1-2-pedalis, perpendicularis, in arboribus erepens.

CADEX admodum tortuosus, pennā corvina paululo crassior, totus squamis obssessus, infra radiculosus, e lateribus surculos breves, superne frondes multas reliquiis stipitū squamatā intennixtas emittens. *Radiculce* subtilissimae, solitariae aut confertae, plerumque pinnato-partitae, caudicis junioris surculorumque fulvo-villosae, annosiorum nudiusculae et atro-fuscae. *Sguamce* ovato-lanceolatae, acutae vel acuminatae, sub-integerrimae, basi saepius sub-obliquae, arete imbricatae, centro atro-fuscae, margine teneriore palKdiores, peltato-adnatae, ad marines perfecte solutae.

FRONDES plerumque simplices, stipitatae, planae aut marginibus parumper reflexae, tenuiter coriaceae, supra dilute virentes, nitidiusculae, costā medid leviter promimilā venisque (licet obsoletissimis) solitariis, ramosis, subtus pube confertissimā teneri appressā stellatā pallide ochraceae, costAmediāconvexiore*

STIPES 1-2-pollicaris, crassitie pennae passerinae, rectiusculus, super insertio nem quidpiam articulatus, infra articulationem paleaceus, sursum nudiusculus, pallide fuscescens, teretiusculus, hinc canaliculatus, supra marginibus frondis decurrentibus marginatus.

FRONS *sterilis* fertili plerumque paulo brevior, elongato-lanceolata, apice obtusiuscula, infeme instipitem decurrens, integerrima. *Fertilis* io-18-pollicaris, J-i poll, lata (si pinnatifida, adhuc tatiō), sterili conformis, attamen plerumque acutior marginibus fortius revolutis, aut sursum in laciniis 4 inaequales acuminatas divisa: laciniis lateralibus 2 brevioribus, lanceolatis, terminalibus 2 elongato-lanceolatis, admodum divergentibus; supra obsolete punctulata, subtus tomento stellato densius vestita et per dimidium superius yix non penitus sons punctiformibus occupata.

SORI ab initio solitarii, uti annuli parvi, superficiarii, centro land referti;# ^ postea magis magisque emersi, e pallide ferrugineo saturatius tincti, sub-nudi, ^t se se invicem contingentes, ita ut irregulariter angulati fiant. *Capsulce* numerosissimae, parvae, ope pedicellorum tenerorum diaphanorum affixae circum receptaculum sub-globosum, pilis brevibus ornatum, pro singulis soris centro frondis immersum, pallidae, annulo latissimo, obscuro, transverse dehiscentes, *Sporas* sub-irregulariter angulatae, pallide flavescentes, diaphanae.

EXPLICATiO TABULiE.

Wanla ;magrii. not.

Fi-g- 1. Squamae caudicis; met.

*Pi*8> 2. Segmentum frondis fertilis cum son's prim* atatis; auct

*f**g- 3. Idem, soris jamjam magis explicatis; auct

^Hl- 4. Sori evoluti, transversim secti; auct.

Fi-g- 5. Capsule, sporae et pili stellati; auct.

8 NIPHOBOLUS ALBCAN.

TAB. XXV.

N. frondibus sub-coriaceis elongato-lanceolatis utrinque acuminate, margine sub-revolutis supra nitidis, subtus albido-ferrugineo-tomentosis, costis elevatis, soris apicem versus seriatis confluentibus. BLUME *Fil. Jav.p.* 107. 6.

POLYPODIUM stigmosum SWARTZ *Syn. Fil. p.* 29, 3*i et* 226. —

WILLD. *Spec. PI. F,* *p.* 162. 44- — SPRENG. *Syst. Feg. IV,* *p.* 48. 4¹-

HABITAT : In montosis *Java occidentalis*, ubi jam cl. THUITORG hanc speciem observasse videtur, a eel⁰ REIH-WABDT in provinčia *Tjanjor* ad montem *Siembar*, a nobisque ad *Burangran* provinciae *Krqwang* ex arboribus carptus. Licet cum *POLYPODIO stigmoso* Sw. absque dubio idem sit, satius tamen duximus nomen nostrum retinere. Namque puncta nigra in superiore frondis paginS, a quibus nomen deproraptum est, fortuito tantum, praesertim in plantis adultioribus, obviam veniunt.

FILIX magnifica, in ramis arborum vetularum parasita.

CAUDEX longissimus, varie tortuosus, lignosus, tenacissimus, intus fistulosus, crassitie pennae olorinae, squamis squarrosis densissime vestitus, inferne radiculosus. *Radiculce* numerosae, 1-2-unciales, tomento denso nigricanti hirsutae, in arborum ramis horizontali-proreptantes, pinnato-partitae. *Reliquiae stipitum* solitariae, frondibus interjectae, breves, squamosae. *Squanice* i-pollicares, 1 lin. latae aut paululum latiores, lanceolatae, acuminatissimae, integerrimae aut superne rare denticulatae, basi liberā ligulatae, tenuiter chartaceae, tenerime reticulatae, pallide obraceae, punto baseos centrali fusco-castaneae, ibique nonnunquam pliosae; quārē margines tenues liberi baseos lacerantur.

FRONDES circiter 15 poll, inter sese distantes, caudici impositae, conformes, elongato-lanceolatae, 2-2-pedales, 1-2 poll.latae, utrinque acuminatissimae, marginibus integerrimis quidpiam revolutae, mediocriter crassae, coriaceae, aveniae, costā mediā utrinque distinctā, supra nitidae, glaberrimae (adultiores plerumque nigro-punctatae), planae, subtus albido-ochraceae, dense stellato-tomentosae, sub-angulatae.

STIPES 3-7 -pollicaris, pennā corvinā crassior, rigidus, basi incrassatus et squamatus-, sursum sub-angulatus, hinc canaliculatus, frondem versus magis complanatus, utrinque obtuse marginatus, junior, uti costa, subtus tomento canescente arachnoideo obductus, demum glaberrimus, pallide fuscescens.

SORI in frondis apice per lineas breves, parallelas, sibimet approximatas, e tomento crasso, stellato, pallide ferrugineo, sensim sensimque rosaceo-emersi

et extensi fere confluentes, singuli frondis cavitati planac immersi. *Capsuke* numerosissimee, minimae, ellipticae, lenticulari-compressiusculae, pallide ferrugineae, reticulatse, annulo nitido, ferrugineo, articulato (cujus articuli basi lateris, quo capsulae transversim dehiscunt, latiores minusque prominuli), elongate, tenerrime pedicellatae. *Sporce* oblongae, iirregulari-angulatae, pallide flavescentes, diaphanae.

EXPLICATIO TABULJE.

NIPHOBOLUS albicans; magn. not.

Fig. i. Squamae duae caudicis; *auct.*

Fig. a. Segmentum frondis fertilis, soris in Dneas ordinatis; *auct.*

Fig. 3. Tomentum stellatum, soros initio obtegens; *auct.*

Fig. 4. Capsulae et sporae.

9 NIPHOBOLUS FLOCCIGER

TAB. XXVI.

**N. frondibus coriaceis rigidis linear-lanceolatis obtusiusculis supra glabris subtus pallide ferrugineo-tomentosis margine revoluto albido-floccigeris, costis elevatis, soris confertissimis. BLUME.
Fil. Jav. p. 107. 8.**

f> Frondibus minus rigidis margine vix revolutis.

HABITAT : Ad montem ignivomum *Pulusarie* provincia *Bantam*, ubi VA» HASSELT de arboribus kgit. Varietatem *fi in* sylvis *Bantam* interioris, sed sterilem tentummodo reperi, ita ut noodum oonstet, annon potius varietas *N. albicanis* At. A *N. angustato* SPBEHO. (POLYPODIO *angustato* Sw.) fronde obtusa neque io acumen ebngatum angustum product*, a *N. bicolore* KATJLF. autem caudice squamu longu vestito, maiginibus frondis revoluti* sorisque numerosioribus confluentibus discrepat. *N. albicanem* quasi parrulum referens, fronde obtusiore et rigidiore satis distinguitur.

CAUDEX repens, radicans, teres, lignosus, solidus, dense paleaceus, sursum surculos longos curvatos frondesque alternantes assurgentess emittens. RadkuUs solUariae aut sub-fasciculatae, capillares, breviter ramosae simplicesve, nigro-fuscae, hinc inde villo nigro obductae. *Squamce* imbricatae, majusculae, lanceolatae, acuminatissimae, sub-integerrimae, tenuissimae, splendide ochraceae, basin versus fusco-maculatae, primo appressae, turn patentes et crispatae.

FRONDES absque stipite 4-7-pollicares, i-f poU. late, apice obtusae, inferne admodum angustatae, integerrimae, margine fortiter revolutae tomentoque obtectae floccoso, albo, ab initio et paginam inferiorem totam investiente, rigidae, coriaceae, supra viridulae, nitidae, glabrae et rugosulae, aveniae, costâ media depressiuscula, subtus tomento densiore, pallide ferrugineo e pilis magnis radiatis.

STIPITES i-2-pollicares, recti, sub-trigoni, obsolete canaliculati, basi confertim paleacei, sursum glaberrimi aut aetate primâ tomento arachnoideo albo vestiti, quo priis frondis pagina tota inferior velabatur.

SORI copiosissimi, frondis apicem occupantes, sub-rotundi, ad costam medium utrinque ex indumento denso piloso emergentes, parum immersi, cito intimeque confluentes, ita ut planta, accuratiore capsularum aggregatarum ratione non habita, pro *AcrosticJio* duceretur. *Capsules* autem, peraeque ac in ceteris congeneribus, creberrimae in fasciculum sunt congregatae : exteriore longissime pedicellatae, centrales brevius pedicellatae, ellipsoideae, lenticulari-compressiusculae, pallide ferrugineae, reticulatae, annulo incomplete, piano, obscuriore cinctae, omnes cujuslibet sori receptaculo cylindrico piano-convexo insertae pilisque intermixtae innumeris, longis, teneris, tortuosis, diaphanis.

EXPLICATIO TABULAE.

Planta; magn. not.

Fig. i et a. Squamae caudicis; auct.

Fig. 3. Sorus cum pilis tortuosis capsulis interspersis; auct.

10 NIPHOBOLUS GLABER KAULF.

TAB. XXVII.

N. frondibus coriaceis elongato-lineari-lanceolatis acuminatis revolutis supra glabris subtus albido-ferrugineo-tomentosis, costis elevatis, soris confertissimis. BL.

KAULF. *Enum. Fil. p. 127* (*excl. syn. pier.*) — SPRENG. *Syst.*

Feg. IF, p. 45. 15 (*excl. syn. FORST. et DESV.*) — BLUME *Fil.*

Jav. p. 107. 7. (*excl. syn. FORST. et DESV.*).

POLYPODIUM *acrostichoides* WILLD. *Spec. PI. V, p. 156. 28.* (*excl. syn. omn.y except. LINN.*) — R. BROWN *Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 146. 1.* (*excl. syn. FORST. et SWARTZ.*) — POIRET *Enc. me'th. Bot. Suppl. IV, p. 484** 2. (*excl. syn. pier.*).

ACROSTICHUM *lanceolatum* LINN. *Spec. PL 1523*.* — EJUSD. *Flor. Zeyl. n. 380*.* — LAM. *Enc. me'th. Bot. I, p. 34-1.* (*excl. syn. etjig.* RHEEDE *Hort. Mai. XII, Tab. 74*).

HABITAT : ID *India orientally* archipelago *Moluccano* atque *Malayano* et in *Novâ Hollandia* tropicfi; in montosis *Java?* ad arbores, ast minus creber. POLYPODIUM *acrostichoides* FORST., a cel° SWARTZ (*Synops* Fil. p. 225*) fusius descriptum, quod KAULFUSS ad NIPHOBOLUM *glabrum* laudat, ob frondes lineares, obtusiusculas, subtus tomento oculis nudis vix distinguendo vestitas, certe h̄tē non pertinet, sed ad plantain, quam nomine

N. pubemli supra descriptimus. Nomen Liu JCIEI, jam prius receptum, eo dignius esset quod restitueretur, quo minus concinna est denominatio «*N. glabem* et insuper a CTCLOPHOBO *glabro* DESV. desumpta, qui idem cum POLPODIO *acrostichoide* FOKST. et Sw. est. Sed quum nomen *N. glaber* KAULP. jam tritum sit, mutarenoluimus, nesynonymia adhuc magis intricetur. — *AN.albicante* NOB., cui habitus imitatus, fronde rigidiore, marginibus revolutiore, costis subtus stipiteque minus angulatis distinguitur.

Fmx i^2-pedalis et altior.

CATJDEX repens, lignosus, teretiusculus, crassitie pennae anserinae, junior squamis confertis horridus, annosior earum reliquiis adspersus, supreme frondes efferens, inferne et partim e lateribus radiculosus. *Badkula* numerosae, ramosae, villo nigro ornatae. *Squamce* dense imbricatae, elongatae, lanceolatae, acuminatissimae, sub-integerrimae, puncto sphacelato peltatae, tenues, membranaceae, juniores stramineae aut pallide ochraceae, yetustiores fuscae.

FRONDES longe stipitatae, simplices, integrae, elongatae, 1-2-pedales, i-ii unc. latae, Uneari-lanceolatae, acuminatae, basi in stipitem decurrentes, integerrimae, revolutas aut revolutissimae, praesertim inferne et versus apicem, supra glabrae, rugosulae, hinc inde punctis ferrugineis consitae, aveniae, subtus tomento denso e pilis albidis ferragineisque obductae et supra medium sorophorae.

STIPES erectus, 4-6-pollicaris, firmus, crassitie pennae corvinae majoris, subtrigonus, hinc rotundatus, illinc profunde canahculatus, basi sub-tortuosus squamisque similibus atque caudex yestitus, cetera glaberrimus. *Costa media* distincta, lata, sensim attenuata, subtus valdopere prominens, sub-rotundata et hinc inde cano-pubescentia.

Sow annulares, palhde ferruginei, in lineolas transversas sibi approximatas marginem frondis vix attingentes dispositi, e tomento emergentes.

EXPLICATIO TABULA.

NIPHOBOLUS *glaber*; magn. not.

Fig. i et a. Squamae caudicis; auct

Fig. 3. Fragmentum frondis fertilis; auct.

u NIPHOBOLUS VENOSUS.

TAB. XXVIH, Fig. i.

N. frondibus sub-coriaceis elongate-lanceolatis margine sub-involutis venosis subtus ferrugineo-steato-tomentosis, steribus acuminatis, fertilibus longioribus obtusiusculis, sons crebernis, caudice paleaceo-crinito. BL.

H_{«.TAT}: Former h_{«.c} species, uam hortulanu. Z o ». «dtibus editiorib, proWnd. ^r detexit congenerib. omnibus prim* fronte frondibus «uosis, in hoc genere rarissimus, pr^a^.t. Hmc qu.dem ad

plantain acoedit, a cl' HOOKEB et GREVILLE nomine NIPHOBOLI *spherocephali* (*Icon. FU., Tab. g4*) depiutam, cuius frondes tamen multo brevius stipitatse, et sols fertiles subtus stellato-pubescentes, steriles autem utrinque glabrae sunt. Ast vel neglectis hisce notU, qua ob diversam sororam dispositionem et magnitudincm levidenses sunt xstimands, planta utraque genere differre videtur. Nam, uti icon modo citata monstrat, sori baud annulares s. rosacei sunt, imo juxta ac in *Polypodiis* e multitudine capsularum aggregati. Quam ob rem et ob squamas multas peltatas s. pilos stellatos, quibus sori juniores teguntur, planta ista ad genus *Pleopeltu*, utpote quod a *Polypodiis* solo isto sororam vestitu distinguitur, amandari debet.

FILIX in vetustis arborum truncis parasitica, in altitudinem fere 2 ped. eminens.

CAUDEX horizontalis, repens, pennâ olorinâ crassior, paleaceo-crinitus, supra ad stipitum exortum nodulosus, infra et lateribus radiculis multis, longis, ramosis, fulvo-villosis stipatus. Palece linearis-subulatx, tanquam setiformes, curvatae, obiter denticulate, nigro-fuscoe vel saturate ferrugineae, basi pallide flavidanti diaphanâ, et bic interdum utrinsecus lacerae.

STIPITES altemantes, ap'proximati, erecli, nonnunquam sub-torti, supra sulco angusto, sed profundo exarati, compressi, ex toto lanugine seu tomento pallide ferrugineo, nonnunquam cinerascente, obducti.

FRONDES lanceolate vel elongato-lanceolatae, vii 1| poll, latae, basi acutae et sub-inaequilaterales, sub-integerrimae, planae aut plerumque marginibus sub-in volutis, parallelo-venosae, costa supra oblitterata et excavata, subtus fortiter prominida, sub-coriaceae, supra pallide virides, hinc inde decorae 'squamub's orbicularibus, margaritaceis, immersis, subtus lanâ compactâ pallide ferruginea pilisque multis stellatis. Steriles circiter pedales, sat dLCuimmatx; fertiles longiores, plus minus obtusae, subtus a medio usque infra apicem soris minimis punctiforibus conspersse.

Sori copiosi, conferti, tomento sublato demum conspicui, non immersi, plerumque capsulis 3-5 in punto parum elevato rosaceo-congestis compositi. *Capsules* parvae, e globoso obovatae, brevissime pedicellate vel sub-sessiles, flaviantes, annulo incompleto, latiusculo, cartilagineo, ferrugineo. *Spores* Ovales, scabriusculae, pallide flavae, pellucidae.

EXPLICATIO TABULiE.

Fig. 1. NIPHOBOLUS venosus;  ragn. nat.

- H.) Squamas caudicis; auct.
- b.) Segmentum frondis fertilis, soris lanugine atlhuc operatis; auct.
- c.) Idem, soris denudatis; auct.
- d.) Capsulae ac spora; auct.

V. NOTHOCHLJENA R. B. R.

Notho(ch)kena R. BROWN *Prodr. Flor. Nov. Holl.* p. i. —
 KAULF. *Enum. Fil.* p. 133. — EIUSD. *Ueber das Wesen der*
Farrnfir. p. n. S. — SPRENG. *Syst. Feg. IV,* p. 5. 3240.

Cincinnalis (GLEDITSCH) DESV. in *Berl Magaz.* V, p. 510.

Acrostichi et Pteridis nonnullce spec. LINN, et APCT.

CHARACTER DIFFERENTIALIS :

SORI marginales, sub-continui, squamis, setis pilisve frondis
 obtecti.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Filices terrestres, rarissime parasitae. Frondes pinnatae vel
 tripinnatae, raro simplices, habitu *Acrostichis* quibusdam, et
 magis adhuc *Cheilanthis* et *Pteridibus* similes, subtus varie
 pūosae. Sori marginales, lineares, continui aut rarius inter-
 rupti, indusiis omnino destituti, frondis pubescentiā velati.

AFFIN : *JSTothochhqnas* omnium proxime ad *Cheilanthes* Sw.
 accedere, extra dubitationis aleam est positum. Utrumque enim
 inter genus, licet notis suis admodum distare videatur, transitus
 existunt adeo molles, ut incertissimi simus, utri quasdam
 inseramus species. *Cheilanthes* equidem soris punctiformibus
 discretis marginalibus, indusioque marginali exceUere dicunt.
 Verum in speciebus haud ita paucis sori admodum approximati
 et continui confluunt, indusio simul seu potius margine frondis,
 levissime reflexo, vix digno qui indusium nuncupetur. Etenim
 turn sola exploratio, utrum sori in plantis prim[^] setatis ab
 initio punctiformes, an statim neque confluendo lineares fue-
 rint, nos conducere potest, id quod in vivis ipsis difficillimum
 cognitu. Quamobrem nobis persuasissimum est, inter *Chei-*

lanihas hucusque descriptas, praesertim exoticas, esse plures, quae a Botanicis aliis *Noihochlcenas* existimantur, et quidem eo facilius, quum utrumque genus eundem prae se ferat habitum. — *Pteris piloselloides* LINN., quam KAULFUSS huic generi adnumeravit, tarn habitu, quam sororum formatione *Tcenitides* AuCT. (non WILLDEN.) cum *Nothochlcenis* jungit. Jam R. BROWN (*Prodr. Nov. Holl.* p. i5>4) plantam istam, quam LINNJEUS eodem tempore cum inter *Acrosticha*, turn inter *Pterides* recensuerat, genus *Tcenitis* spectare affirmavit, absque dubio habitu ductus specierum hujus generis recentissime detectarum. KAULFUSS contra propter soros pilis stellatis obvelatos eandem fecit *Noihochlcenam*. Ad dissolvendam vero quaestionem, utri generum debeat accenseri, summe necessarium nobis videtur, ut notae differentiales utriusque rite perspiciantur. Divus WILLDENOW quidem et SWARTZ soros *Tcenitidis* costam inter marginemque dicunt continuos, uti in *T. blechnoide*, minime autem costales vel marginales vel infra-apicales, sicut in *T. lanceolatdKiF.*, multisque aliis, recenter descriptis. Hisce, quibuscum et fronde simplice, et vitâ parasiticâ congruit, planta nostra potest adnumerari, non vero generi WILLDENOWIANO. Verum tamen, quum eas, quas par esset, nequeamus instituere comparationes, exemplum secuti cl' KAULFUSS, cui *Filicum* doctrin& paucos licet conferre, plantam istam ut *Noihochlcenam* descripturi sumus. Ceteroquin ipsam ob habitum diversum, vitamque parasiticam, a genere hocce esse segregandam, transitumque *Filicum*, sons linearibus nudis instructarum, ad illas credimus parare, quae indusiis muniuntur. Vestigium enim indusii geminati perinde ac in *Vittariis* (quibuscum forsitan conjungi posset), etiamsi obsoletius, jam adest.

DISTRIB : E tredecim *Nothochlcenis* f quas SPRENGEL in *Systemate Vegetabilium* enumeravit, unica, *N. piloselloides* KLF., in *Java* reperta fuit. Ast inter *Cheilanihas* nostras forte hospitari quasdam, quas alii pro *Noihochlamis* habent, jam memoravimus. Sic e. g. CHEILANTHES *Moluccana* et *Ch. Kleinhqfii* Nob. (*Fil. Jav.* p. 136-13⁸), haec quidem forsitan eadem, ac NOTHOCHL⁸NA *ciliata* DESV., quae *Jav am* inhabitare traditur, sed strictius descripta est, quam ut quidpiam certi liceat profari.

1. NOTHOCHL T E N A PILOSELLOIDES KAULF.

N. frondibus simplicibus, sterilibus obovatis, fertilibus elongato-linearibus. BL.

KAULF. *Enum. Fil. p. i33.* (*exclig. RHEED. Hort. Mai. XII. Tab. 29.*) — SPRENG. *Syst Feg. IF, p. £2. 1.* — BLUME *Fil. Jav. p. 108. i.*

PTERIS *piloselloides* Lsm. *Spec. PI. II, p. i530**. — THUNB. *Flor. Jap. p. 55i.* — SWARTZ *Syn. Fil. p. g^.* 1. — *Ibid. p. 286. Tab. II, Jig. 3.* — SHKUHR *Krypt. Gew. p. 83. Tab. 87.* — WILLD. *Spec. PI. F, p. 356. 1.*

ACROSTICHUM *heterophyllum* LINN. *Spec. PI. II, p. i523**. — *Flor. Zeyl. p. 180, n. 378**. — LAMK. *Enc. me'th. Bot. I, p. 34-* (*excl. syn. RHEED.*).

HABITAT : Inter tropos in AM, et v& extra eos in Japonia Chinaqx* longe lateque diffusa; teste LAIUHCK in Africa quoque degit. In Jam plenimque una cum nortro NIPUOBOW carnosu arborum Iruncos obducit, quare frondes steriles difficiles distinctu. Specimina nonnulla, qua! Koemo e Czylon reportavit, pra Javam exellunt frondibus sterilibus magis rotundatis, obovatis, fertilibus angustioribus, sorisq;ie tanlopere couferty, utnullum relinquatur intersticium vacuum. Costa media, »wi» tecta, multo magis tamen prominet, quam in Javanicas,

CATOICES longissimi, folidiformes, flexuosi, pinnato-ramosi, sciamis minutis tanquam fusco-punctati, inferne *radiculis* numerosis, brevisimis, hirtis, migris, supeme frondibus instructi. *Squamae* appressae, sub-rotundae vel ovales, medio peltato, puncti saturate fusci ope affixa, marginibus solutistenuiores, longe et inaequaliter ciliatae, apprime surculorum juniorum.

FRONDES dispares, alternae, steriles fertilesque sine ordine ex eodem caudice profecte, simplices, integrae, integerrimae, juniores utrinque pilis steUatis ferrugineo-lepidote, natu majores glabrae, nitidae, nonnunquam subtus puncis stellatis asperse.

STIPITES sterium brevissimi, fertium longiores, basi squamis parvis peltatis ciliatis persistentibus vestiti.

FRONDES sterues numerosiores, sub-rotundo-obovatae, aut oblongo-obovatae, ^-fere if-pollicares, M pou. late (in Zeynicis adhuc latiores), plana-,

aveniae, siccae, costâ mediâ quidpiam elevata. *Fertiles* linear es, rarius spatulato-oblongae, i|4-pollicares (TM *Zeylanicus* breviores), plerumque vix plus i lin. latae, apice obtusae, basi in stipitem valde angustatae, aveniae, costâ mediâ quidquam distinctiore (maxime in *Zeylanicus*), inferne vel carinatâ, subtus margine secundum longitudinem in sulco debili fructificantes.

SORI linear es, utrinque fere ad basin usque pertingentes, plerumque continui, rarius interrupti, apice coadunati, turgidi, quasi ipsi folii margini inserti, utrinque per longitudinem margine parum elevato, continuo atque membranaceo limbati, exteriore distinctiore, interiore saepe obliterate. *Capsules* numerosissimae, parvae, sphaeroïdeae, saturate ferrugineae, hinc annulo lato incomplete, demum adscendente cinctae, illinc irregulariter dehiscentes, inferne pedicello tenero diaphano suffultae. *Spores* majusculae, ovales aut reniformes, punctis multis asperis muricatae, pellucidae, flayicante-hyalinae.

VI. TIENITIS SWARTZ WILLD.

SWARTZ *Spi. Fil. p. 24. 5.* — JVILLD. *Spec. Plant. F, p. 135.*
1957.

Pteridis spec. WILLD. *Phytogr: I, p. 13.*

CHARACTER DIFFERENTIALIS:

SoRUS linear is, longitudinalis, continuus aut quandoque interrups, inter costam marginemque frondis.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Filices terrestres. Frondes pinnatac, sub-membranaceae, venis lateralibus multis, teneris, approximatis, dichotomo-reticulatis, subtus utrinque costam inter marginemque pinnum tectae soro longitudinali, linearî, nonnunquam quidpiam interrupto. Sororum situs in hocce genere memoratu dignissimus est. Etenim soriminime, uti in reliquis *Filicibus*, secundum venarum directionem vel versus earundem apices oriuntur, sed ipsas transverse persecant. Quare venas quidem paulo fortius contrahunt, ast nullâ plane ratione suo interpellant cursu. Sin autem venae laterales, multipliciter dichotomo-ramosae,

laxissimam constituerent telam, etiam sori absque dubio evadent interrupti, atque in vel potius sub venarum dichotomiis insererentur superioribus. Linearis idcirco ipsorum formatio e solâ forti venarum coarctatione videtur pendere, quam accumulatio tomenti fusci, corpusculisque clavatis materie granulata repletis compositi, inter quod capsulae pedicellatae emergunt, adhuc augere videtur. Sporae trigonae.

AFFIN : Pro differentiali hujusce generis charactere, quaFem tarn WILLDENOW, quam SWARTZ stabilise voluerunt, tres solummodo species, *T. blechnoides* Sw., *T. chinensis* DESV. (*T. blechnoides*, p PRESL.) et *T. interrupta* HOOK, et GREV. genuinarum *Tcenitidum* in numero possunt haberi, quippe quae, habitu CQnformi insignes, filices sunt terrestres, frondibus impari-pinnatis. Reliquae vero omnes parasiticae caudice gaudent repente, frondeque simplice, magis coriace[^] et, perinde ac in *Antrophyis* et *Grammitidibus*, solum obsolete venosa, sorisque vel marginalibus vel costalibus a *Tcenitide* maximopere discrepant. Id jam cl. SWARTZ (Syn. Fil. p. i|) videtur præsagisse, quum BLECHNUM *seminudum* WILLD., quod eel. KAULFUSS (Enum. Fil. p. 132) qua TJENITIDEM *pumilam* describere non haesitat,*

- * tantummodo dubitanter isti generi subjunxit. — Nosmet plures ex octo speciebus, quae sub *Tcenitide* militant, ad *Antrophyia* esse ablegandas autumamus, si quidem frons similem ac in hoc genere exhibet reticulationem, venaque fertiles magis minusve immersae sunt, nulla\ ceterum habitu ratione, utrum sori reticulatim confluant, an continui linearesque , decurrent, utrum margini costaene propiores sint. Ubi vero sori, costae approximati, ab initio discreti vena simplici ramulove superiori ipsius furcatae insiderent, et aetate demum aut evolutione forti continui fierent, veras liaberemus *Grammitides* Sw. Verum usque dum perquisitiones novae omnem sustulerin dubitationem, putamus aptissimum, plantas illas *Antrophyis* ut duas subjungere subdivisiones, quae posthac forte genera propria, *Antrophyum* inter et *Grammitidem* intermedia, constituent. Primae harum sectionum, quae ob soros costae mediae approximatos ad genus *Grammitis* Sw. prope accedit, nomen *Pleurogramme* (aiAeopa, costa et Tppif linea) proponimus,

eique accensemus *TyENTIDEM Unearem* KAULF., *T. pumilam* KAULF. (GRAMMITIDEM *seminudam* WILLD.) et *T. graminifoliam* Hoo\$, quibus omnibus frons simplex sorusque linearis, continuus, solitarius, sine indusio, utrinque costae mediae proximus atque parallelus. Alteri e contra divisioni, quam a soris marginalibus *Chilogrammen* (a yeo, labium s. margo, et Tppif linea) vocamus, inseri debent *T. lanceolata* KAULF. (PTERIS *lanceolata* LINN.), *T. angustifolia* SPRENG. (PTERIS *angustifolia* Sw.), *T. furcata* WILLD. (PTERIS *furcata* LINN.) et *T. tricuspidata* SPR. (PTERIS *triciispidata* LINN.), quarum omnium frondes simplices, rarius partitae, sorique margini proximi, lineares, continui. —Istis *Antrophyi* subdivisionibus species *Tcenitidis* Sw. paucae, ad hunc usque diem notae, praesertim quoad sororum formam directionemque accedunt, habitu, imprimis pinnis inferioribus haud raro partitis, *Pteridibus* quodammodo affines.

DISTRIB : Specierum trium, quae in *India orientali*, *Chinā* insulisque *Philippinis* degunt, una habitat *Javam* et *Moluccas*.

1. T ^ N I T I S BLECHNOIDES WILLD.

TAB. XXVIII, Fig. 2, et TAB. XXIX.

T. frondibus pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis sub-integerrimis glabris inferioribus passim partitis geminatis ternatisve. BL.
SWARTZ *Syn. Fil.* p. 24. 1, et p. 220. — WILLD. *Spec. PL F,* p. 135. 1. — SPRENG. *Syst. Feg. IF_y* p. 42. 8. — BLUME *Fil. Jav.* p. 108. 1.

TJENITIS pteroides SCHKUHR *Krypt. Gew. p.i\|.* *Tab. VI. b.* — SPRENG. *Anleit. Ill,* p. *Sj^.* *Tab. Xfig. 106.*

PTERIS blechnoides WILLD. *Phytogr. p. i3.* *Tab. IX, Jig. 3.*

HABITAT : In provincia *Bantam Java* interioris, solo alluviali inter frutioeta puirtila prope *Lebak*; in *Moluecis** ab ill^o REIHWAET lecta.

* Inter specimina *Moluccana* unicum a *Javanicis* deflectit pinni< magis reflexo-patentibnc, nib-coriaceii, nitidioribui, inferioribus itib-Mttilibus, superioribui fortius decnrrenlibuf, venis regularius atshrgentibus lorisqnc turgilioribux. Nun forte propria specie* potins, qnam »arieta»?

FILIX bi-tripedalis, e caudice brevi, terras oblique immerso, radiculis multis longis diffusis hirsutis instructo, setisque atro-purpurascens vestito frondes complures stipitatas efferens.

STIPITES in plantis junioribus frondibus duplo longiores, in adultis easdem circiter oequantes, aequae ac raches tetragoni, hinc profunde canaliculati, utrinque obsolete sulcati, glabri, nitidi, flavicante-virides, sub-lignosi, ad pinnarum insertionem fere crassitudine pennae corvinae, caudicem versus sensim crassiores setisque similibus vestiti. *

FRONDES longe stipitatae, erecte, pinnatae. *Pinned* II-13 (in planta juniore plerumque 3-5), sub-opposite aut sub-alternae, erecto-patentes, linear-lanceolate, 9-10 pollicares, f poll, late, plerumque in acumen longum productae (plantae junioris latiores et obtusae aut obtusiusculae), inferne saepissime sub-oblique attenuate, margine sub-cartilagineo-incrassato inaequali-repandae et sub-undulate, glabrae, supra nitidae, saturate virides, venulosae, costâ angustâ depressiusculâ, subtus dilute virides, costâ elevatâ; inferiores magis extensae, petiolis brevibus sub-angulatis (in *Mohicanis* sub-sessiles), apice saepe bifidae, aut ad basin usque bi-tripartite, aut foliolis composite 2-3 sub-sessilibus, quorum lateralia minora; superiores laterales sessiles aut adnate, basi externâ ad rachin sub-cuneato-decurrentes, plerumque breviores minusque acuminate, imo obtusae; terminalis sa?pissime inferioribus paulo minor, brevius petiolata aut sessilis, integra, raro bipartita.

SORI, paginam frondis inferiorem tenentes, utrinque costam inter marginemque vittam referunt linearem, ab initio badiam, postea ferrugineam, a basi frondis inde ad apicem adscendentem, rarius attingentem, continui aut, maxime infra apicem, quidpiam interrupti, convexi, parumimmersi, unde pinnae supra tineis 2 longitudinalibus notate. *Capsuke* numerosae, minimae, ellipticae, pallide flavicantes, pedicello tenui sub-articulato impositâ, ultra ! ambitus annulo piano, pallide femigineo, articulate, cincte, corpusculis innumeris, clavatis, simplicissimis, basi tenuiore diaphinis articulatisque, apice incrassato sub-opacis et materie grumulosâ fusca partis immixtis. *Sporcetn%<m&*, pallidae, sat diaphanae, laeves.

EXPLICATIO TABULARUM.

TAB. XXVIII.

Fig- a. Frons sterilis cum caudice; magn. nat.

TAB. XXIX.

Frons fertilis; magn. nat.

Fig. 1. Segmentum frondis fertilis; auct.

Fig. a. Corpuscula clavata, capsulis adniixa; auct.

Fig. 3. Capsule et spore.

VII. ANTROPHYUM KAULF.

KAULF. *Enum. Fit. p. 197.* — SPRENG. *Syst. Feg. IV, p. 6.* 5253.
Asplenii, Hemionitidis, Vittarice et Grammitidis spec, non-
nullce AUCT.

CHARACTER DIFFERENTIALS:

SORI lineares, sub-continui, frondis venis primariis reticulatis plerumque immersi.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Filices, quae *Cryptogamis* aliis, maxime *Muscis*, mixtae humectis inhaerent saxis, aut parasitae in arborum cortice degunt, caudice reperite, radicante, fronde simplice, rarius sub-lobatâ, venis primariis ab exortu inde laxe reticulatis, infra sorophoris, costa\ medi& plerumque vix distinct^¹. Cl. KAULFUSS (*Enum. Fil. p. 197*) soris adscribit indusium geminatum, medio dehiscens, cuius ne vestigium quidem detegere valemus. Venae contra furcato-partitae et reticulato-confluentes locis, quibus sori emergunt, maximopere contrahuntur, ita ut sori parietibus parenchymatis conterminis veluti involvantur, indusio vero membranaceo neutiquam repraesentato. Id quod-in illis maxime est perspicuum speciebus, quibus contractio venarum adfructificationum lineas debilissima est, quo circa sori nullis elevatis venarum parietibus limitantur, e. g. in A.. *Boryano*"KAULF., quod partem omnino nullam, indusio comparandam, monstrat. Quam ob rem capsulae insident venis laxe reticulatis in medio frondis plus minus elevatis, versus latera magis immersis, spbaericæ, lenticulari-compressiusculæ, annulo sat alto et elongato articulato cinctæ, articulis plerumque, ubi transversim dehiscunt, dilatatis. Memoratu dignissima sunt organa magis minusve clavata, pedicellata, inter capsulas obvia, quac pro masculis antberiformibus ducere animus fert. Referunt utriculum septis quidem non divisum, ast materie grumosa referendum,

in aliis maxima, e. g. in *A. Boryano* KAULF., ubi per fissuram ovalem lateralem disrupta vidi; in aliis, e. g. *A. reticulato* KAULF., pilis longis similia, ejusdem ceterum structurae, uti reliqua apicibus magis incrassata. Sporae hyalinae, plus minus trigonae.

AFFIN : *Antrophyia* tam habitu, quam soris linearibus proxime ad *Grammitides* accedunt, praecipue ad species frondibus coriaceis, sorisque oblique a costa mediâ distantibus instructas. Plures adeo *Grammitides* ut sectionem propriam, a soris obliquis nomine *Loxogramme* (a*ofo obliquus et P<w> linea) insignitam, subjungimus *Antrophyis*. Licet enim sori, venis parumper immersis inserti, plus minus a costa versus marginem diriguntur, ab istis *Grammitidum* genuinarum tamen venarum divisione penitus diversa, et exacte cum ilia *Antrophyorum* congrua, discrepant. Nonnullae *Antrophyorum* species, soris marginalibus ornatae, magnam habent affinitatem cum *Nothochlcnis* R. BR., imprimis cum *N. piloselloide* KAULF., jam a nobis descripta, atque si specie se jussi modi, e.g. *ANTROPHYUM marginale* NoB., geminato gauderent indusio, *Fittariis* necessario forent adnumerandae. Propter soros autem venis s. vasis primariis frondis laxe reticulatis insertos *Antrophyum* distinguuntur ab *Hemionitide*, in qua vasa ternaria, nee primaria, reticulationem capsulis obsessam sistunt. — Ceterum cunctae hujusce generis species ob frondis magnitudinem praeter modum variabilem determinatu sunt difficillimae.

DISTRIB : Cl. KAULFUSS (*Enum. Fil. p. 197-199*) *quinq* species descripts, *tresque* indicavit, quibus SPRENGEL (*Syst. Veg. IV, p. 6j.j*) *HEMIONITIDEM sessilifoliam* CAVANN., non dum rite cognitam, addidit. Nosmet unâ cum *quatuor* speciebus, quas a *Grammitide* Sw. se junctas ut propriam enumeramus sectionem, *tredecim* *Antrophyi* species in *Java* reperimus, qu» omnes sylvis humidis, maxime prope fluvios, proveniunt. *Sex.* ex ipsis hactenus incognitae videntur, *septem* vero *Florce Javanicce* cum terris aliis sunt communes : *quatuor* scilicet cum insulis *Borbonicis*, *A. Boryanum* et *obtusum* KAULF., *A. lanceolatum* BL. (*GRAMMITIS lanceolata* Sw.) atque *A. co-*

riaceum BL. (GRAMMITIS *coriacea* KAULF. ?); *una cum insulis Philippinis Mariannisque, A. plantagineum* KAULF. ; *duos cum India orientalicontinenti, A. involution* BL. (GRAMMITIS *involuta* DON) et *A. reticulatum* KAULF. , *etiam in insulis Societatis inquinatum.*

a. Antrophyia genuina.

i. ANTROPHYUM PLANTAGNEUM KAULF.

TAB. XXX.

A. frondibus longe stipitatis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ecostatis, soris rectiusculis parum reticulatis nudis. BL.

KAULF. *Enum. Fil. p. 197.* — SPRENG *Syst Feg. IF, p. 67.* 3.
— BLUME *Fil. Jav. p. 109.* 1.

HEMIONITIS *plantaginea* CAVANN. *Prclect. 1801. n. 643**.

HABITAT : In insulis *Marianrds* et *Philippinis*, nobis in primigenis *Java sylvis* ad ripas basalticas muscosas semel obvium.

CATIDEX repens, verisimiliter simplex, inferne per fibrillas filiformes, subramosas, partim fulvo-tomentosas, saxis inhaftirens, supra (parte emortua) reliquiis stipitum deciduorum tuberculatus, sursum frondes emittens, squamisque rarissimus obsitus. *Reliquiae stipitum* brevissimae, crassae, truncatae, alternatim approximatae, fuscae, sub-nudae squamisve sparsis, filamentosis, laceris. *Squamae* breves, lanceolatae, acuminatae, tenuissimae, pallide fuscae, laxe reticulatae, margine remote denticulatae.

FRONS erecta, stipite 2-4-pollicari, glabro, sub-tetragono, prope caudicis insertionem multum incrassato atque squamoso, 3^{^-}6-pollicaris et longior, i^{^-}fere 2 poll, lata, utrinque acuminata, integerrima vel hinc inde sinuosa, plana, glabra, supra saturate yiridis et nitida, coriacea, ecostata, supra soris in paginâ inferiore inter venas immersis quidpiam elevata-reticulato-venosa, subtus dilutior.

SORI in lineas rectas vel catenaformes, raro reticulato-anastomosantes dispositi, angustissimi, glabri, ad latera marginibus yenarum, ast indusio peculiari nullo limitati. *Capsulce* minima, numerosae, sphaericæ, pallide fuscae, brevissime pedicellate, lineæ paululum elevatae in fundo venarum aciculatarum affixæ, annulo fere complete, angusto, aliquantulum obscuriore, tubulis mixtæ multis,

partim sat longis, teneris, pellucidis, intus paululum granidosis, partitis, rarius simplicibus, apice ramulisque clav& sub-globosâ obscuriore terminatis. *Clava* ista in his oranino pellucida, fulva, in illis saturius tincta, ubi membranam vegetabilem simplicem, quâ formatur, materie subtili grumulosâ repletam, facile distinguere licet.

EXPLICATIO TABULA.

Planta; magn. nat.

Fig. i. Portio frondis fertilis; *auct.*

Fig. a. Eadem transversim secta, ut capsularum insertio in oculis sit; *aucL*

Fig. 3. Corpuscula clavata, capsulis immista; *auct.*

2 ANTROPHYUM BORYANUM KAUJ.F.

TAB. XXXI.

A. frondibus longiter stipitatis ovato-ellipticis cuspidatis basi in stipitem attenuatis, soris parum reticulatis prominulis. BL.

KAULF. *Enum. Fil. p. 199.* — SPRENG. *Syst. Feg. IF_f p. 67. 4*
— HOOK, and GREV. *Icon. Fil. IV, Tab. 74**?

HEMIONITIS *Boryana* WILLD. *Spec. Plant. F, p. 128. 7.* —
BLUME *Fil. Jav.p. 111. 1.*

H. reticulata BORY *Voy. I, p. 2i4*-.*

HABITAT : Quum vix dubitemus, quin nostra planta eadem sit cum specie, quam BORY DE ST. VINCEUT insulâ Mauritiî ad arborum radices detexit, Java interior inter habitacula sua recenseatur necesse est. — Propter so rosin ipsæ venis frondis haud excavatis insidentes prius (*Enum. Fil. Jai>. p. 111*) earn pro verâ *Hemionitide* LINN, duxeramus. Etenim genus utrumque, prater habitum, inter sese praesertim eo differre dicunt, quod in *Hemionitide* soris nudi s. indusiorum expertes venis reticulatis insideant, in *Antrophyis* autem, teste cl° KAULFUSS, indusio geminato gaudeant. Verum jam supra, quum de affinitatibus, quibus genus hoc cum aliis jungatur, dissereremus, monuimus et ostendimus, nullum adesse indusium, sed soros parietibus venarum magis minusve immersis limitari. Quae nota insuper ne in omnibus quidem speciebus obvia, etiam in hæcce specie deprehendi nequit. Attamen exploratio HEMIONITIDIS *palmate* LINN, nos edocet, sororum positionem in genere utroque esse diversam. In *Hemionitide* enim venis lateralibus reticulatis, in *Antrophyo* nervis venosis insertos. Quam sororum sedem quum planta nostra exhibeat, habituque cum reliquis conveniat speciebus, *Antrophyis* merito adnumeranda videtur.

FILIX inter congeneres pulcherrima, pariter rupibus mu[^]cosis umbrosis in-nascens, vel in arbóribus parasitica.

CAUDEX repens[^] undique obsessus radiculis longis, flliformibus, parum ramosis,

* Specimen, a cl^{is} HOOKER et GREVILLE descriptum et depictum, a nostro fronde magis elongata minusque acuminata videtur differre. Sin itaque ut genuinum *A. Boryanum* (HEMIONITIS *Boryana* WILLD.) spectaretur, planta nostra *A. latifolium* nominanda foret.

atro-fuscis, saepe e toto fulvo-villosis, superne ad stipitum exortum vestitus paleis multis, teneris, congestis, linearis-subulatis, denticulatis, fuscous, demum deciduis.

FRONDES nunc remotae, quasi seriatae, caudici impositae, nunc yaldopere approximate, erectae, longe vel longissime stipitatae, 35-9-pollicares, 2-4.5 poll, latae, ovatae aut ellipticae, plerumque longe cuspidatae, basi in stipitem attenuatae, integrirnae vel irregulariter sub-angulatae, praesertim apicem versus, margine angusto pellucido, nonnunquam reflexo, sub-coriaceae, plans, glabrae, supra nitidae, subtus pallide virides, venoso-nervosae, nervis modo in fronde fertili subtus leviter prominulis, basin versus in fasciculum aut in stipitem contractis.

STIPITUM 2-5-pollicares, crassitie vix pennae corvinae, planiusculi, hinc obsolete canaliculati, glabri, superne marginibus frondis decurrentibus quidpiam marginati, prope caudicis insertionem fere nodosi et paleaceo-criniti.

SORI lineares plerumque mediā in paginā frondis inferiore, rarius ad margines orti, rectā adscendentes aut parum divergentes, simplices aut furcato-partiti, continui aut abrupti, prominuli, e fusco in badium vergentes, delapsi sulcos nullos planissimosve linquentes. *Capsules* numerosissimae, pedicellis pellucidis articulatis, sphoericae, lenticulari-compressae, pallide fuscae, annulo lato[^] articulato obscuriore per I ambitus cinctae, corpusculis multis clavatis, rufulis, majusculis immixtis, quae lateraliter per aperturam oblongam dehiscent, materie grumulosā scatent, pluraque pedicello tenero articulato insident. Disrupta unilocularem referunt utriculum, cuius parietes tenuissimi e membranā vegetabili simplice cellāve unicā formati videntur; apice et basi, quibus tenus disruptio non pertingit, ob materiem grumulosam residuam colore simili, atque nondum aperta, tincta.

EXPLICATIO TABULJE.

ANTROPHYUM Boryanum; magn. nat.

Fig. 1. Portio frondis fertilis; auct.

Fig. a. Eadem transverse secta; auct.

Fig. 3. Capsulae duae et corpuscula plura clavata; auct.

3 ANTROPHYUM FALGATIUM.

TAB. XXXU.

A. frondibus breviter stipitatis falcato-lanceolatis acuminatis rarius obtusis basi in stipitem decurrentibus ecostatis, soris rectiusculis parum reticulatis sub-nudis. BLUME Fil. Jav. p. 109. 2.

HABITAT : Plantam hanc *Java occidentali* prope tumulos *Baduinorum* ad ripas umbrosas *Tjikundul* reperimus, *Muscis* et *Jungermanniis* compluribus intermix tain. Postquam soros, microscopio subjectos, pariter, etiamsi minus, tomentosos quam in *A. reticulato* RAULF. deprehendimus, ipsam pro hujus varietate facere vix dubitaverimus. Frons tamen multo brevius est stipitata, et constanter magis minusve falcata. Fortassis etiani *HEMIOVITIS Jalcata* WILLD. (*Spec. PL V*, p. 126. 1), cuius frons sterilis sola innotuit, quæ synonymon hic spectat, quia frondes quaedam apice rotundato-acutae dicuntur.

CAUDEX repens, dense vestitus fibris plurimis, longis, intricatis, ramosis, fulvo-lanatis, quaque versus horizontals diffusis, sensim excrescens paleisque multis, linearis-subulatis, atro-fuscescentibus, denticulatis, veluti crinitus.

FRONDES valde approximate, assurgentis, stipite brevissimo, piano, utrinque marginibus frondis decurrentibus quasi ancipite, falcato-lanceolatae, plerumque magis minusve acuminatae, vel obtusae, vel rotundatae, inferne admodum angustatae, integerrimae, planae, ecostatae, reticulatae, coriaceae, glabrae, supra nitidae, et impressione sororum lineis elevatis flexuosis ornatae, $4^{....}10^{\wedge}P^0\wedge$ cares? $3-1\$ P^0 U \ll$ latae.

SORI angustissimi, absque indusiis propriis sat profunde venis immersi, mediæ in fronde ramis magis longitudinalibus venarum sub-continui, margine magis flexuosi et per venas laterales breves furcato-connexi, partim interrupti: juniores inter capsulas pilis pallide ferrugineis, tortuosis, obtusis, compressiusculis, vetustiores sub-nudi. *Capsule* sub-globosae, longe pedicellatae, pallide fuscae, annulo obscuro, incomplete, elevato. *Sporce* sub-globosae, pallidissimae, pellucidae, laeves.

EXPLICATIO TABULÆ.

Planta; magn. nat.

4 ANTROPHYUM SEMICOSTATUM.

TAB. XXXIII.

A. frondibus stipitatis spatulato-lanceolatis acuminatis basi in stipitem decurrentibus semicostatis, soris rectiusculis parum reticulatis nudis. BLUME *Fil. Jav.* p. 110. 3.

HABITAT : In sylvis humidis, e. g. montis *Parang* provinæae *Tjanor*, prope originem fluminis *Tjiburrum* ad montem iguivoinum *Gedt*. Varietas frondibus miioribus. crassioribus, obtusiusculis, sub-sessilibus apud cataractam *Sairnn* a VAH HASSELT fuit lecta. Ecopia sprainum, quæ asservamus, persuasum nobis est, filicem hanc tanu frondium quam stipitum loigitudine admodum variare, et *A. reticulato* RAVLF. praecipue frondibus

supra medium, ad quod usque costae cursum observare licet, magis spatulato-expansis diiferre. Frondes minimis aetatis primae perfecte spatulatas et apice rotundatas sese praestant, cost& medif statim supra basin bifid&; frondes paululo majores spcciminis ejusdem jam lato-lanceolatae, parum acute laxeque reticulatae sunt.

FILIX creberrime, et cum aliis *Cryptogamis* promiscue, putridis arborum truncis udisve fluviorum parietibus inhaerens.

CAUDEX crassiusculus, sub-carnosus, undique radiculis intricatis fulvo-villosis frondibusque tectus, ita ut vix repens videatur, paleis, ubi frondes superiores exserit, vallatus arete appressis, partim plus semipollicaribus, subulatis, atro-fuscescentibus, reticulatis, siccis, setaceis.

FRONDES sub-caespitoso-approximatae, erectae, unâ cum stipite piano carnoso (in quern basi decurrunt; qu&re longitudo ipsius vera determinari nequit) circa io-i8-pollicares (quaedam multo breviores), 2, rarius 3 poll, latœ, e basi angustâ elongatâ versus apicem sensim latiores, dein subito magis minusve acuminatae, integerrimae vel sub-repandæ, margine angustissimo pellucido, planæ^ vix conacæ, costâ ad medium usque utrinque distinctâ, ast penitus planâ, glabrae, supra nitidiusculæ, soloque fructificantes venis elevatis adscendentibus flexuosis ornatae.

SORI subtus venis quidpiam immersi, inferiores sub-oblique a medio ad marginem utrinque adscendentes et catenatim connexi^ superiores magis parallelî et rectiusculi, sat turgidi, rutilo-fuscescentes vel vetustate fusi, indusio penitus destituti. *Capsulæ* sub-sphaericæ, lenticulari-compressiusculæ, pallide fuscae, fere per I ambitus annulo angusto, elevato, ochraceo, nitido, articulate* cinctæ, ad hujus finem sub-gibbae, et transverse dehiscentes, pedicellis brevibus, inaequalibus, pellucidis. *Gorpuscula* numerosa, minuta, clavata^ plerumque arcuato-inflexa, rufa, partim pellucida, partim sub-opaca, ad apicem saepissime loco obscuriore notata, extrinsecus laevia, nitida^ inter capsulas dissita, iisdemque brevius pedicellata, nonnunquam fasciculato-connata. *Sporæ* obtuse triangulæ, hyalinae, vix punctatoe.

EXPLICATIO TABULÆ.

Planta; magn. not.

Fig. 1. Paleæ caudicis; auct.

Fig. a. Segmentum frondis fertilis; auct.

5 ANTROPHYUM PARVULUM

TAB. XXXIV, Fig. 3.

A. frondibus breviter stipitatis lanceolatis utrinque acuminatis sub-membranaceis ecostatis, soris rectiusculis nudis. BLUME Fit. Jav. /?. n o . 4-

HABITAT : Speciem hancce indefessus VAN HASSELT in *Java occidentali* legit, ego vero in montibus *Salak* ad fluvium *Tjapus*, ubi per strata basaltica scruea perrupit, pluresque procreat cataractas. Ab *A. lanceolate* RAULF. coste media solummodo subtus sub-distinct[^] neque ad apicem usaque percurrente, et forlasse fronde tenuiore distinguitur. Varietatis, frondibus longe stipitatis et magnitudine valde insignis, mox mentionem sumus facturi.

- **FILIX** habitu congeneribus simillima, caespitis spissi instar super saxis uvidis diffusa, radiculis longis teneris fulvo-villosis alimenta sugens.

GAUDEX yix conspicuuus, squamis teneris nigricantibus subulatis quasi pilosus, praesertim ad basin frondiumjuniorum.

FRONDES inter sese confertae, erectae, cum stipite brevi piano confluentes, magnitudine diversissimae, plerumque 4-7-pollicares, 5 poll, latae, interdum minoribus spatulatis obtusis mixtae, lanceolatae, acuminatae, inferne valdopere angustatae, in stipitem decurrentes, integerimae aut remotiuscule repandae, margine tenerimo pallido limbatae, planae, sub-membranaceae, sub-pellucidae, parum nitidae, glabrae, supra saturatius virides, nervis longitudinalibus furcato-divisis, qui per ramos transversos braves reticulatim connectuntur, exteiiores autem marginem frondis baud attingunt[^] sed yel ramo venae altius adscendentri arcuatim incumbunt, vel prope marginem paginae superioris in apicem coecum, paululum incrassatum, excurrunt.

SORI paginam frondis inferiorem ab apice infra medium usque occupant, in lineas simplices longitudinales dispositi, potius nervis primariis adscendentibus quam ramis secundariis inserti, et si hoc obtingit, minus recti, sed flexuosi, alii sub-continui, alii breves et interrupti, angusti, ab initio pallide ferruginei, postea badii, capsulisdenudati canales aciculatos, latere opposito prominulos, infronde relinquentes. *Capsulce* sphaericae, pallide fuscae, annulo succinctae saturate fusco, incompleto, arete articulato, post disruptionem assurgente, breviter pedicellate, corpusculis innumeris, parvis, fusco-rufis, oblongo-clavatis aut obpyriformibus immixtis, quorum saepe plura inpedicello sub-partito connata, etquae in soris Viinus evolutis pallidiora, hinc inde penitus hyalina, alia materie grumulosâ repleta, semper cellulam unicam, simplicem, distentam referentia, pedicello suo contra e cellulis pluribus efformato et veluti articulato; veterna saturatius colorata, substantial item granulosâ, ast ob compagem plerumque majorem minus distinctâ farta. *Sporce* pallidae, obtuso-triangulae.

p. *Elongatum*; frondibus longiter stipitatis elongato-lanceolatis acuminatissimis.

HABWAT : Parasiticum in altis *Java: occidentalis* jugis, ultra 4000 ped. supra mare elevatis, ubi VAH HASSELT hancce detexit varietatem. Cum plant* modo descriptâ comparatam pro specie proprii declarare vix hasci-taveris, nullas autem alias notas, quibus distinguere possis, nisi quae magnitudinem parUum spectent, reperias. Namqueformatio sororametmembranacea frondis substantia penitus esteadem. Fiiix lota i-irpedalis, stipile 4-6-pollicari, fronde 8-12 poll, long*, et paululo plus i-if poll. latS.

e. ANTROPHYUM OBTUSUM KAULF.

TAB. XXXIV. Fig. 4.

A. frondibus breviter stipitatis spatulatis obtusis ecostatis, soris rectiusculis parum reticulatis glabris. BL.

KAULF. *Enum. Fil. p. 199.* — SPRENG. *Syst Feg. IF, p. 76.* 6.
—BLUME *Fil. Jav. p. no. 5.*

HEMIONITIS obtusa BORY apud'WiLLD. *Spec. PL F, p. 127.* 4-

HABITAT : A cl° BORY DE ST-VIKCENT in insula *Borbonue* de arborum radicibus, a nobis cum de his, turn desaxis calcareis ad montem *Tjampia* et ad *Kuripan Java*; carptum. Specimina *Javanica* constanter minorata videntur *Borbonicus*.

FILICULA caespitoso-diffusa, caudice repente, inferne radiculosas innumeratas subtiles agente, et aequae ac frons junior tota, squamis vestito tenellis, atrofuscis, subulatis[^] capillaribus.

FRONDES simplicissimae, valde approximate, partim sub-sessiles > majores stipite 1-i-pollicari, parumper compresso, erectiusculae, 1-2-pollicares (fide WILLDENOW in *Borbonicus* 4-pollicares), {I poll, latae, spatulatoe, apice rotundatce, aut lanceolate obtusae, saepe fere lineares, basi admodum angustata?, integerrimac aut sinuate, coriaceae, glabrae, supra saturate virides aut opacae, costâ mediâ solum subitus prope basin distinctâ, fertiles supra rugulosae.

SORI copiosi, quâ lineae angustae frondi subtus immersi, rectiusculi, furcatim confluentes, rufuli, indusiorum expertes. Capsulce sphaericæ, turgidæ lenticulares, annulo elevato, vix f ambitus cingente, pedicellate, corpusculis similibus atquif in *A. plantagineo* mixte, lineae sub-elevate in fundo venarum impressarum inserte. Sporos pallidae, fere decolores, obsolete trigonae.

7. ANTROPHYUM MARGINALE.

TAB. XXXIV, Fig. i et 2.

A. frondibus sessilibus linear-lanceolatis utrinque attenuatis ecostatis, soris marginalibus sub-continuis villosis. BLUME *Fil. Jav. p. in. 8.*

HABITAT : Ad radices montium altorum, qui medium per *Javam occidentalem* decurrent, parasiticini in annosis truncis nemorum primaevorum. Accedit proxime ad *A. lineatum* KAULF. (*Enum. Fil.*, p. 199), cuius sori tamen, utrinque gminati, amargine longius distant. Perinde ac hocce mox ad *F'ittariam* (v. SWARTZ in *Nov. Act. Soc. Nat. Cur. Berol. II*, p. 133. *Tab. VII*, fig. 2.—EJUSD. *Syn. Fil.*, p. 109. 6), dein ad *Hemionitidem* (SWARTZ *Prodr.* p. 129), et tandem ad *Antrophyum* (KAULF. l. & revocatum fuit, etiam nostra planta, si solius situs sororum ratio haberetur, ab *A. atrophy* is posset excludi. Etenim quum sori juxta marginem in lineam continuam dispositi sint, pro *Vittaria* haberri posset, sed perperam, quippe quae, ut omnia *Antrophyia*, gminato caret indusio. Nee minus *Nothochlamis* accenseri nequit; licet enim sori marginales, cootinui et villoso sunt, habitus et lineac fructificantes immersi repugnant. Eadem sororum indoles ipsum ad illas vetat amandare *Tcenitides*, quibus *prop' tern** *Grammitidum* divisionem formari memoravimus. Profecto sori eadein ac in *ANTAOPHYO reticulato* KAULF. ratione lanati, et pacto eodem, quo in congeneribus ceteris omnibus, constructi sunt, ita ut silus suus marginahs nosmet haud impedit, quominus plan tam nostram hinc collocein.

FILICULA tri-octo-pollicaris,

CAUDEX repens, brevis, crassitie pennae passerinae, parte emortuâ reliquiis stipitum vallatus, superne frondes congestas efferens, iuferne et e lateribus radiculosus, fuscus, sursum squamulis setaceis vestitus. *Radiculce numerosx*, ramosae, intricatae, fuscae, liinc inde ferrugineo-tomentosae. *Reliquiae stipitum parvulae*, obconicae, truncatae, fuscae.

FRONDES 13-9-pollicares, J-f poll- latae, simplices, integrae, rarius apice inaequilater bifidae, sessiles, linear-lanceolatae, interdum falcatae, utrinque attenuatae, integerrimae vel, maxime fertiles, undulatae, rarius leviter revolutae, coriaceae, marginibus apiceque diapanae, ecostatae, laxe reticulatae, exsiccae rugosae, utrinque glabrae, fertiles supra ad margines a soris, paginam inferiorem tegentibus, sub-carinatae.

Sow marginales, sub-continui, rarius interrupti, lineares, yllosi, parum immersi. *Capsuke* minutae, sphaeroideae, turgide lenticulares, flavescentes, semi-annulatae, pedicellatae, mixtae pilis simplicibus, acutiusculis, varie tortis, fulvis, transverse dehiscentes. *Sporce* ellipsoideae, obsolete angulatae, pallidae, pellucidae.

a ANTROPHYUM RETICULATUM KAULF.

A. frondibus stlpitatis elongato-lanceolatis utrinque acuminatis ecostatis margine pellucidis, soris reticulatis villosis. BL.

KAULF. *Enum. Fil.* p. 198. — SPRENG. *Syst. Feg. IF*, p. 67. 5.

— BLUME *Fil. Jav.* p. 110. 6.

HEMIONITIS *reticulata* FOZS T. *Prodr.* p. 79.n. &5*. — SCHKUHR

Krypt. *Gew.* p. 6. *Tab. VI.* — SWARTZ, *Syn. Fil.* p. 20. 2.

— *Ibid.* p. 208. (excl. syn. HEMIONIT. *plantaginece* CAVANN.)

— WILLD. *Spec. PL V*, p. 128. 6. '

HABITAT : Species hasc, a d'' FOHSTER in insulis *Societas* delflcU, frequentissime udis sylvi* Aw *orientalis* ad lapidosas fluminum ripas, rario vero ad arborum truncos digit. Frondes s^{ix} et magnitudine et formâ

adeo variant, ut, accurata specie descriptione praemissa, varietates ipsas uberior tractare opera pretium sit.
Utrum veroquaedam ex illis potius species, quam varietates sint, relinquimus in suspense

GAUDEX corticibus saxisve arctissime adhaerens, reptans, tenax, vix lignosus, intus luteus, ad stipitum ortum paululo incrassatus squamisque aggregatis, nigro-fuscescentibus, subulatis, setaceis obtectus, quāquāversus emittens radiculas longas, filiformes, sub-ramosas, plerumque fulvo-villosas.

FRONDES alia super aliam, saepius quasi geminae, caudici supra insertae, erectae, stipite 2-3-pollicari, piano, pallide viridi, ad basin paleaceo-crinito, sursum glabro, marginibus frondis decurrentibus ancipite, simplices, lanceolatae, saepissime elongato-lanceolatae, 8-i5-pollicares, i-if poll, latae, apicem versus acuminate, inferne in stipitem decurrentes, sub-integerrimae, margine pellucido distinction, quam in congeneribus reliquis, sub-coriaceae, glabrae, basi, ubi stipes in frondis substantiam abit, costatae, ceteroquin ecostatae, nervis furcato-anastomosantibus quodam modo reticulatae, planae, glabrae, utrinque nitidiusculae, fertiles supra reticulatione admodum conspicuS..

SORI prorumpentes e venis canaliculatis paginae inferioris, plerumque e longitudinalibus, turn lineares, nonnunquam e furcatis, dein sub-reticulati, angusti, ab initio ferrugineo-villosi, sensim sensimque obscuriores, tandem linquentes lineas vix non glabras impressas. *Capsules* turgide lenticulares, ultra | ambitus annulo obscuriore cinctae, pedicellatae, et peraeque atque lana, quā intermissione, in fundo venae immersae affixa. *Lana* composita e pilis simplicibus, longitudine inaequalibus, tortis, apice obtusis aut sub-clavatis, diaphanis, pallide ferrugineis, seu potius e tubulis simplicibus, per septula interrupts, hinc inde granulorum gerulis. *Spores* hyalinae, trigonae, intus — ni fallimur — grumulosae.

p. Frondibus longe stipitatis elongato-spatulatis obtusis.

HABITAT : Ad cataract as calidas monlis ignivomi *Gedc.* — Excellit prasertim magnitudine frondis obtusae, coriaceae, 15-pollicaris, i-i± poll, latac, stipiteque elongato, fere 6-pollicari, sub-arcuatim flexo.

T. Frondibus lanceolatis obtusiusculis apice passim inaequali-bifidis, lobo majore acuminato, altero obtuso.

HABITAT : In valliculis humidis umbrosis montis ignivomi *Tankuwan-Prahu* provincial *Krawang*, a VAN HASSELT apud *Soudi-Manik* provinciae *Bantam* reperta. — Fraecedente brevius stipitata, frondibus erectis, parum falcatis, apice obtuso saepissime fissis in lacinias duas, plerumque sibimet accumbentes, rarius divergentes, quarum altera Iongior et acuminata, allera minor et obtusa. — Longitudo frondis unꝝ cum stipite -J-i ped., latitudo 1^2 poll, et ultra.

***. Frondibus tenuioribus lanceolatis acuminatissimis.**

HABITAT: Ad ripas fluvii *Tjikolowong*. Differt a praecedentibus fronde tenuiore membranacefi, in acumen longissimum acutum excurrente. Paleae tenerae atro-fuscae ad exortum slipitum sunt quidquam latiores, linear-lanceolatae. Stipes circiter 3-4 pollicaris, frons i4-ao poll, longa, paululo plus 1-1) poll, lata, apicem versus sub-repanda.

e. Frondibus breviter stipitatis elliptico-lanceolatis apice obtusiusculis, soris discretis.

HABITAT : Cl° VAN HASSELT prope cataractara *Binding obvia*, fronde brevi distinclusima. Ad *A. pumilum* KAULF. * ipsam referre haud dubitaremus, nisi sori villosi, in illo procul dubio nudi, obstarent. Propter transitus, quos in speciminibus nostris advertimus, pro varietate earn facimus. Fortassis nil est nisi junior variatum, quas tractavimus.—Frons unâ cum slipite 3-5-pollicaris et circiter uncJam lata. Sori lineares, breves, recti vel sub-obliqui, neque reticulato-connexi.

9 ANTROPHYUM CALLÆFOLIUM.

TAB. XXXV.

A. frondibus coriaceis breviter stipitatis lato-lanceolatis acuminatis in stipitem decurrentibus ecostatis, soris rectiusculis yillosis.

BLUME *Fil. Jav. p. III. y.*

HABITAT : In Java interior!, altitudine 3000— $4^{\circ}00' P^{\text{60}}$ * supra mare, praeprimis ad originem fluviorum, v. g. *Tjiburrum* prope montem ignivomum *Gede*. Ab *A. reticulato* KAULF. frondis crassitie et latitudine, margine multo angustiore pellucido sorisque rectis, haud reticulato-connexis, differ!.

FILIX 15-2-pedalis, rarius 6-pollicaris.

CADEX sub-lignosus, repens, crassitie prope digituli, nodulosus, extra fuscus, intus flavidus, superne squamuloso-crinitus frondesque efferens, undique radiculosus. *Radiculce* mimerosae, crassiusculae, sub-ramosae, passim intricatae, canofuscae, femigineo-hirsutae. *SquamuUs*, caudicem basinque stipitis adornantes, congestae, lanceolatas vel linearisubulatae, acutae aut acuminatissimae, denticulato-ciliatae, scariosae, fuscescentes, grosse reticulatae.

STIPES brevissimus aut nuUus, sensim in frondem abiens, planiusculus, saspe tortuosus, basi aequa ac caudex squamulosus.

FRONDES aggregatae, erectae, li-pedales et longiores, rarius modo 5-pollicares, f-3 poU. Iat32, spatulato-lanceolatae, rarius sub-falcatae, acuminatae, basi admodum attenuate, in stipitem decurrentes, integerrimae, margine angusto, flavicante, diaphano, rarius revoluto, coriaceae, crassae, glabrae, siccatae rugosae, ecostatae, venis distinctis, laxe reticulatis, subtus sorophons.

SORI in series plures, lineares, sub-continuas dispositi, nunc marginales, nunc super totam paginam inferiorem frondis dispersi, ferrugineo-aut demum tusco-villosi, recti, immersi.

EXPLICATIO TABULiE.

Planta, circa ad magn. not. reducta.

Fig. i. Squamae caudicis, auct.

Fig. a. Fragmentum frondis fertilis; auct.

Fig. 3. Sori nonnulli, transverse secti et aucti.

* *I concl. -H o o « v e t G » ^ (/ ^ ' ^ u f ' -u » n e U t i g i - quiden, vil.osiUli, in p., ibu, magnitudine ,uctis, ibidem depictis, appareat.*

*b. Loxogrammce.***10 ANTROPHYUM LANCEOLATUM.****TAB. XXXVI.**

A. frondibus breviter stipitatis linear-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis coriaceis aveniis glabris margine planis, soris linear-oblengis costae contiguis sub-obliquis, caudice repente paleaceo. BL.

GBAMMITIS lanceolata SWARTZ *Syn. Fil. p. 22. 3. — Ibid. p. 212.*

*Tab. I, Fig. 4. — WILLD. Spec. PL F, p. i5g. 5. — SPRENG.
Syst. Veg. IV₉, p. 4i. 9. — BLUME Fil. Jav. p. 117. g.*

ASPLENIUM plantagineum LAMK. *Enc. bot. II, p. 5oi. — EJUSD.*

Illustr. Gen. Tab. 867, Fig. 1.

HABITAT : A divo COMMERSON in insulis *Borbonicas*, a nobis in *Java occidentali lectum*. Plura specimina etiam in herbario KUILL et VAN HASSELT, absque indicio patriae, hospitantur. Specimen, quod cl' HOOKER et GREVILLE (*Icon. Fit., Tab. XL HI*) decipiunt atque describunt, a verè plantæ *Swartzia* fronde tenuiore sorisque verticalibus, supremis confluentibus, discrepare videtur. Specimina *Javanica* ceterum *Borbonicas* majora, reticulationem eandem, quam GREVILLE in fragmento adacto delineavit, monstrant, fronde lumini ob versa. Quam ob reticulationem et ob soros quidpiam immēsos spcciem hanc et sequentes tresa genere *Grammitide* Sw_M cui prius admuraeraveramus, ad *Antrophyum* ablegavimus.

FILIX pulchra, 9-pollicaris vel pedalis et altior.

CADEX repens, admodum depresso, yix lignosus, crassitie pennae passerinse vel corvinoe, infra ferrugineo-tomentosus, supra paleaceus, superne frondes^ inferne radiculas emittens. *Radiculæ* numerosae, sub-ramosae, fuscantes, dense ferrugineo-tomentosae, *Paleæ* tamen caudicis, quam baseos stipitum laxe imbricatae, lanceolatae aut lanceolato-subulatae, acuminatissimæ, denticulate, tenerrimæ, membranaceæ, pulchre reticulatae, cano-fuscantes, leviter ferreo-nitentes.

FRONDES inter sese remotiusculæ, erectæ, 9-pollicares-pedales et ultra, 3 lin. ad 5 poll, latae, brevissime stipitate, stipite sub-nullo, depresso, marginato, simplices, integrae, linear-lanceolatae, acuminatae, basi valde attenuate, integrinæ, coriaceæ, glabrae, planæ, costæ mediæ supra prominulæ, subtus planiusculæ, sub-aveniae, tantum lumini ob versa? venas laxe reticulatas monstrantes.

SORI partem frondis superiorem, apice tamen excepto, occupantes, sub-obliqui, costae contigui, marginem non attingentes, superiores et saepe inferiores minores, ast nunquam confluentes, imo superiores inter semet remotiores, i|-4 tin. longi, latiusculi, lineares vel linear-i-oblongi, supremi sub-rotundi, omnes basi apiceque obtusi.

EXPLICATIO TABULiE.

ANTAOPHYUM *lanceolatum*; *magn. nat.*

Fig. 1. Squamae caudicis; auct.

Fig. 2. Segmentura frondis fertilis; auct.

u ANTROPHYUM CORIACEUM

TAB. XXXVII, Fig. i.

A. frondibus breviter stipitatis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis coriaceis aveniis margine planis, soris linearibus elongatis obliquis marginem non attingentibus. BL.

GRAMMITIS *coriacea* (KAULF.) SPRENG. *Syst Feg. IF, p. 4i. 8.* —

BLUME *Fil. Jav. p. 117. 10.*

HABITAT : Cl. SPRENGEL /. c. insulam *Mauritii* patriam hujus speciei, a KAULFUSS priinum descriptae, allegat. Ast dubii adhuc suuia, num planta nostra, quae in herbario KVHL et VAW HASSELT exstat, et verosimiliter in provincia *Bantam* lecta fuit, eadem sit cum KAULFUSSIWA, quippe cuius diagnosin tantum succinctam, a SPREWGEL indicatam, novimus. GBAMMITIDI *involute* DON siuillima, diff'ert cost*A* supra fortiter promiou[^], subtus plan&, quum in ilia contrario locus sit. Sori quoque in nostris multo angustiores siunt minusqie turgidi, ceteroqui frondi leviter immersi.

FILIX ii-pollicaris vel i{-pedalis, caudice, *uti* videtur, repente.

FRONDES stipite brevi, vix pollicari, complanato, hinc leviter canaliculato, simplicissimae, 10-15 poll, longae, i-ij'poll. latae, lanceolatae, acuminatae, inferne sensim in stipitem decurrentes, integerrimae, planae vel (vetustiores) margine hinc inde involutae aut revolutae, coriaceae, aveniae, attamen versus lucem inspectae laxe reticulato-venosae, cost*A* supra convex*A*, subtus plan*A*, glabrae, opacae, supra saturate virides, fertiles sursum ob soros immersos leviter striatae, subtus flavicanti-virides.

SORI numerosi, qu*A* lineae transversae rectae a cost*A* divergentes, marginem non attingentes, r-pollicares vel longiores, inferiores et praecipue superiores decre-

scentes, sibimet approximati, post lapsum capsularum pallide fiavarum, partim a pedicellis harum residuis, partim a corpusculis clavatis fuscis longe pedicellatis fusco-tomentosi, tandem sub-nudi ut vena immersae.

TAB. XXXVII.

Fig. i. ANTROPHYUM coriacewn; magn. nat.

12 ANTROPHYUM AVENUM

TAB. XXXVII, Fig. 2.

A. frondibus brevissime stipitatis linear-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis sub-coriaceis glabris aeniis margine revolutis, soris linearibus obliquis marginem attingentibus, caudice repente paleaceo-crinito. BL.

GRAMMITIS *avenia* BLUME *Fil. Jav. p. 117. 12.*

p. Soris confertissimis.

HABITAT : In Java interiori ad arbores parasitum. *A. coriaceo* (GRAMMITIOI *coriacea* KAVLF.) proxime affine, fronde angustiore, tenuiore, marginibus constanter revolutis sorisque marginem attingenibus distinctum. Vivum non iditnus, sed specimina tantummodo nonnulla esploravimus, qua; inter plantaa, a KVHL et VAN HASSELT collectas, exstant.

FILIX *levida*, circiter pedalis.

CAJDEX repens, lignosus, crassitie pennae anserinae, portione superiori paleaceo-horridus, vetustiori sub-nudus, sordide fuscus et supra stipitum reliquiis brevibus excavatis circumvallatus. Radices fibrosae, numerosissimae, praesertim infra e caudice exortae, vix ramosae, partim elongatae, sordide fuscae, juniores ferrugineo-tomentosae. Palece et caudicis et processuum brevium, quibus stipites insident, linear-lanceolatae, aut linear-subulatae, longissime acuminatae, integerrimae, glabrae, siccae, membranaceae, nigro-fuscescentes, fibris crassiusculis, longitudinalibus, reticulato-connexis formatae.

FRONDES sat approximate, erectae, sub-sessiles, stipite propter decunentes frondis margines ubique ancipite, 5-vel plerumque 9-11-pollicares, H poll, latae, linear-lanceolatae, superne nunc obtusiusculae, nunc acuminatissimae, inferne usque ad caudicem decurrentes, integerrimae, margine revoluta?, sub-coriaceae, aeniae, glabrae, subtus pallide virides, costâ supra elevatâ, subtus planâ, imo depressiusculâ.

SORI a medio usque ad apicem frondis, lineares, paralleli, oblique a costa ad marginem directi, eundemque attingentes, utrinque circiter 12 (in/smulto plures, valde approximati, fere confluentes), vix pollicares, nonnulli inferiorum fere dimidio breviores, superiores decrescentes, sat turgidi, cylindrici, utrinque obtusi. *Capsules* lineae quidpiam elevatae, lateribus depressae insidentes, longe pedicellate, pallide fuscae, lenticulares, annulo lato, pallide ferrugineo, tandem assurgente. *Spores* sub-angulatae.

TAB. XXXVII.

Fig. 2. ANTROPHYLM avQniun; magn. nat.

B ANTROPHYUM INVOLUTE.

A. frondibus Lreviter stipitatis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis coriaceis aveniis glabris margine demum involutis, soris linearibus obliquis, caudice repente paleaceo BL.

GRAMMITIS involuta DON *Pro dr. Flor. Nepal, p. i⁸. i.* — SPREING.
Syst. Feg. IF, p. 4i. 7. — HOOK, and GREV. *Icon. Fil. III.*
Tab. LIII (opt.) — BLUME *Fil. p. 117. n.*

HABITAT : *Filix* baec pulcherrima, primum ab HAMILTOH et WALLICH in montibus *Nepal* *Bengales interiores* detecta, nobis et cl° REINWARDT in sylvis montium altiorum *Java* innotui, rara tamen et semper locis humidis trudcisve putridis degens. REIVWABDT ipsam ad genus *Hemionitis* LINN, spectare credidit, KAULFUSS contra in literis ad eundem datis potius ad *Selligueas* BORY referendam esse putat. Reverb planta haec luce clarus demonstrat, genus *Filicum* unum in alterum quasi transire, ita ut limites sui admodum vagi appareant. Etenim GRAMMTIS *involuta* DON, ob soros lineares huic generi accensita, rectius ad *Antrophyia* KAULF. amandanda nobis videbatur turn propter habitum, turn propter soros non minus frondi immersos, quam in A. *Boryano* KAULF. Repugnare quidem videtur sororum forma linearis, quum a simplicitate venarum lateralium pendere dicatur, quia in ceteris *A. atrophyis* furcatae laxe reticulatae apparent. Ast frons nimis crassa est, quam ut de re judicare liceat, et insuper in multis *Antrophyis*, e. g. *A. marginali* NOB., formam sororum a nervorum vel venarum divisione baud pendere jam ostendimus. Quum imago, quam cl° HOOKER et GREVILLR dederunt, optima sit, Botanicos ad earn ablegamus.

FILIX i-15-pedalis, caudice repente, sub-lignoso, confertim paleaceo, inferne radiculoso, crassitie digituli. Fibres intricatissimae, simplices velplerumque pin-nato-ramosae, nigro-fuscae, saepe ferrugineo-tomentosae.

FRONDES approximate, stipite brevi, crassiori, triquetro, hinc obsolete canaliculate, prope caudicem paleaceo, sursum glabro, fronde decurrente marginato, i-16-pollicares, ii-i J poll, latae, lanceolatae, utrinque valde acuminatae, coria-

ceae, marginibus paululo tenuioribus, integerrimis, yetustate saepe sphacelosis, magisque minusve involutis, aveniae, supra opacae, costâ pland, subtus flavidovirides, costâ carinatâ.

SORI numerosi, lineares, simplices, paralleli, a costâ sub angulis acutis distantes, marginem fere attingentes, turgidissimi, sub-cylindrici, parum immersi, ita tamen, ut in paginâ frondis superiore lineae divergentes, in inferiore — capsulis demitis — parum immersae fuscae appareant. *Capsulos* copiosissimae, sub-sphaericæ, flavescentes, annulo flavidofuscescente, nitido[^] articulato, lato, articulis bine dilatatis annulumque velut spurium efformantibus (a quo latere capsula transverse dehiscit), pedicellis longis articulatis impositæ, corporibus mixtae multis, articulatis, longitudine inaequalibus, apice aliquantulum incrassatis, basi pedicellisque capsularum obscurioribus. *Spores* sub-reniformes, hyalinae, laeves, intus sub-granulosæ.

VIII. GYMNOGRAMME DESV.

DESV. in *Berl. Magaz. F*, p. 304. — EJUSD. *Journ. de Bot. I*, p. 25. — KAULF. *Enum. Fit.* p. 69. — EJUSD. *Ueber das Wesen der Farmer*, p. 80. — SPRENG. *Syst. Feg. IF*, p. 5. 3236. — BLUME *Fil Jav.* p. 112.

Hemionitidis, *Acrostichi*, *Asplenii* et *Polypodii* nonnull. spec.
AUCT.

CHARACTER DIFFERENTIALS:

SORI lineares vel oblongi, venis frondis furcatis pinnatisve insidentes.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Filices terrestres. Radices caespitosæ. Caudices breves, terræ plerumque oblique immersi, vel sub-repentes. Frondes saepissime plures, pinnatae vel supradecompositæ, in unicâ specie pedatae, venis parallelis, plerumque approximatis, aut furcatis aut pinnatis, haud reticulatis. Sori venis subtus insidentes, lineares, simplices vel basi furcato-connexi, ovales aut sub-rotundi, indusio proprio nullo, ast saepius frondis pubescentid indumentove furfuraceo colorato obtecti. Capsulæ breviter pedicellate, turgide lenticulares, annulo incompleto. Sporæ magis minusve angulatae.

AFFIN : *Gymnogrammce* proxime accedunt ad illas filices, quibus venae laterales parallelae admodum approximate sunt, praesertim ad *Acrosticha* LINN., quâre species quaedam genus videntur conjungere utrumque. Has ideo esse difficillimas definitu, jam ex eo patet, quod ipsissimus DESVAUX , hujus generis auctor, plantam jam notam (ACROSTICHUM *chrysophyllum* Sw.) pro *Acrosticho* novo descripserit, quod cL KAULFUSS rectius ad *Gymnogrammas* relegavit. Filices, huic generi adnumeratae, gaudent plerumque fronde decomposite, subtus dense pubescente, vel materie farinosA adspersâ, quâpropterpositiosororum admodum confertorum necessario adhuc minus distincta evadit. Alias, imprimisistas, quibus frondes simpliciter pinnatae, venaeque laterales parallelae jam remotiores, habitu *Aspleniiis* quibusdam, vel, ubi irons decomposita, laciniaeque pinnularum angustae et profundae, generi DAREA WILLD. quam maxime affines sunt. NonnuUis denique, e. g. GYMNOGRAMRLE *Tottce* SCHLECHT. , G. *polypodioidi* SPRENG., G. *obtusatceNoB.*, etc., quae omnes venis lateralibus pinnatis neque furcatis excellunt, insignis intercedit similitudo cummultis *Aspidiis Polypodiisque*. Qu&re eas in genus proprium, *Gymnogrammen* DESV. inter *Meniscium* *cpie* ScHREB. intermedium, a reliquis segregare, fortassis haud injustum foret. — A generibus cognatis, quae indicavimus, *Gymnogramme* et indusio nullo, et soris, qui venis furcatis pinnatisve incident, distinguitur. In *Hemionitide* contra, sub quApleraeque *Gymnogra/rama?* priusmilitarunt, sori venis reticulatis, et in nonnuUis *Grammitidibus* |enis simplicibus incident. Hoc etiam in HEMIONITIDE *plantagine* DON (*Prodr. Flor. Nepal*, p. i3. 3.) ita sese habere videtur, quam ob rem, et ob frondem simplicem, earn nequ&quam, uti SPRENGEL (*Syst Feg. IF*, p. 39.23), pro *Gymnogramme* ducimus.

DISTRIB : E speciebus circa *triginta* pleraeque incolunt Americam maxime tropicam, et *undecim* modo, computatis *quatuor* novis, partim in *India orientali*, partim in insulis *Malayanis*, *Borbonicis* et *Philippinicis* occurunt. Quas inter *sex* sylvis humectis *Javas interioris* degunt, et una ex his, G. *Totta Schlecht*, etiam in *Promontorio Bon& Spei* reperta fuit.

a. Frondibus hirsutulis.

i. GYMNOGRAMME TOTTA SCHLECHTEND.

TAB. XXXVIII.

G. frondibus pinnatis utrinque stipite rachique hirsutulis, pinnis sessilibus lanceolatis basi truncatis leviter pinnatifidis, laciniis ovatis obtusis inferioribus apice obsolete crenulatis, stipite inferne paleaceo. BL.

SCHLECHTEND. *Adumbr. Plant. Fasc. I, p. 15. i. Tab. VI (From abscjue caudice).* — SPRENG. *Sjrst. Veg. IV, p. 38. 6.*

G. aspidioides BLUME *Fil. Jav. p. 112. 1.*

POLYPODIUM Tottum WILLD. *Spec. PL V, p. 201. 134 (excl. synon. THUNB.).*

HABITAT : Planta haecce hucusque solum in *Promontorio Bonce Spei* reperta fuit, qu& propter specimina, quae sylvis altioribus montis *Javanici Gede* prope cataractam *Tjikundul* legeramus, ad ipsam referre primum dubitavimus. Descriptio enim POLYPODII *Totti*, a divo WILLDENOW concinnata, et praesertim exiguae pinnarum dimensiones minus quadrare videbantur. Nunc vero ex iconে atque descriptione accurate, quam cl. SCHLECHTENDAL evulgavit, nosmet errasse, et cel° WILLDENOW frondem juniores, nondum satis evolutam, proximo fuisse, certiores facti sumus. Licet icon supra memorata optima sit, tamen partemmodo plantae monstrat, ita ut totus filicis hujus habitus vix satis perspicuus sit. Quire completam subnectere sciographiam, laudi potius, quam vituperationi nobis fore speramus, et gaudemus, quod caudicem, cuius natura adhuc ignorabatur, illustrare valeamus. Superest, ut observationem cl' SCHLECHTENDAL addamus, frondes steriles bujus planta? cum POLYPODIO *Bergiano* SCHLECHT. commutari posse, sed imprimis laciniis alternis angustioribus, profundioribus, in e&dem pinnis pluribus, pinnis ideo longioribus, apice totius frondis angustiore magis inciso, et minori omnium partium pubescentiS discrepare.

FILIX elegantula, 5-pollicaris vel sesquipedalis.

CATINDEX brevis, crassus^ sub-lignosus, terrae oblique immersus, superne frondes plures, rarius solitarias, efferens, undique radiculosus, passim reliquiis stipitum delapsorum tectus, fuscus, squamis, maxime sursum, vestitus. *Radiculce* numerosae, ramosae, saepe intricatae, longae, pallide ferrugineo-liarsutae. *Paleae* tern caudicis quam stipitislanceolatae vel ovato-lanceolatae, acuminatae, integerrimae,

utrinque sub-pubescentes, caudicis approximate et appresso, stipitum rariores, patulae, pulcre reticulatae, pallide fuscescentes.

STIPITES 2-6-pollicares, graciles, crassitie vix pennae columbinae, erecti vel adscendentes, rarius tortuosi, aequo ac racbes teretiusculi vel obsolete angulati, supra canaliculati, pilis albidis patentibus aut deflexo-tortuosis hirsutuli, basi, praesertim juniores, paleacei, paleis in adultioribus et sursum evanidis.

FRONDES plerumque aggregatae, erectae vel sub-cernuae, pinnatae, circumscriptione oblongo-lanceolatae, 4-p^oHi^{cares}-p^edales et ultra, ii-3^a poll, latae, membranaceae, virides, utrinque pilis albidis hirsutulae, juniores circinatae et hirsutissimae.

Pinnae utrinque circiter 10-15, oppositae vel alternae, superiores et inferiores decrescentes; *superiores* sessiles aut adnatae, demum magis magisque approximate ac in *terminalem* longe acuminatam, inferne pinnatifidam, superne serr&tam confluentes; *infime* minores, vix petiolatae, sub-cordato-ovatae, obtusae vel obtusiusculae, grosse et obtuse dentatae, reflexo-patentes; *intermedice* plerumque plus 12 poll, longae, ^ poll, latae, sessiles, magis patentes, lanceolatae, basi inaequali-truncatae, leviter pinnatifidae, *laciinis* sub-oppositis, ovatis, obtusis, apice quidpiam inaequali-crenulatis, superioribus magis falcatis, tandem in acumen magis minusve elongatum confluentibus.

SORI ad laciniis pinnarum utrinsecus circa 3-4 iⁿ seriem simplicem dispositi, venulis lateralibus simplicibus, a cos tulâ versus marginem oblique adscendentibus inserti, nudi, inferiores oblongi aut lineares, apicales saepissime minores et rotundi, prout in *Polypodiis*. *Capsules* confertissimae, parvae, brevissime pedicellatae vel sub-sessiles, pallide fuscae, ellipsoideae, lenticulari-compressae, hinc annulo pallido, incompleto, elevato, parum articulato tectae, illinc veluti ad basin versus oblique truncatae et transverse dehiscentes, nonnunquam pilis nonnullis, longis, simplicibus, pellucidis ornatae, et corpusculis intermixtae solitariis, paululo saturatius tinctis, clavatis, materie grumulosâ repletis, setigeris, rarius nudis. *Sporas* fuscae, reniformes.

EXPLICATIO TABULAE.

Planta; magn. nat.

Fig. i. Pinnula fertilis; paululum aucta.

Fig. a. Fragmentum pinnulae fertilis; maximopere auct.

Fig. 3. Gapsulae et corpuscula clavata; auct.

2. GYMNOGRAMME APPENDICULATA.

TAB. XXXIX.

G. frondibus pinnatis subtus glanduloso-punctatis utrinque rachique puberulis, pinnis sessilibus falcato-lanceolatis basi truncatis et sursum auriculatis leviter pinnatifidis, laciniis falcato-ovatis acutiusculis, stipite inferne paleaceo. BL.

ASPIDIUM sub-pubescentis, Var. D. BLUME Fil. Jav. p. 149. 3i.

HABITAT : In sum mo monte BURANGRANG provincial KRAWAHG ad ortum complurium fluviorum. Qumm oh stationem jam prius dubitavi, an mcrito varietas *Aspidii subpubescentis* haber possit, quocum habitu ad amussim congruit. Comparatio vero scrupulosior sororum parumper evolutorum docet, nullum adesse indu-
sium, et quum sori, licet parvi et sub-rotundi, venarum ramis transversis in medio insident, plantam nostram gencri *Gymnogramme* DESV. inserere eo minus hacsitamus, quo magis habitu ad *G. Tottam* SCHLECHT., atque *G. canescens* BL.. accedit, quibuscum et capsularum pubescenctia concinit. Differt *G. Tottos* substantial sub-
coriaceft, pinnis magis falcatis, laciniis acutioribus, basilaribus supernis auriculato-produclis pubescentia minore, sorisque minoribus, magis rotundis qua HI oblongis, notis ii&dein a *G. Lovei* (HOOK, et (FREV. Icon. Fil. F, tab. 89) abunde distincta.

**FILIX terrestris, 1-2-pedalis, caudice —ut opinor — repente, habitu ASPIDII
subpubescentis BL.**

FRONDES erectae, stipite gracilecente, teretiusculo, supra obsolete canaliculate*, canescente, pilis brevissimis obsito, basi paullulum incrassato, paleisque fuscis linearibus vestito, lanceolatae, longissime acuminatae, a^S poll, latae, inferne pinnatae, ad apicem pinnatifidae, sub-coriaceae, utrinque pilis breyibus albis sub-strigosae, supra nitidiusculae, subtus cano-yiridulae, inter pubem globulis par vis, flavis, glandulosis, adspersae.

Pinne-phacesy sub-oppositae, sessiles, i2-3pollicares, semiunciam latae, falcato-lanceolatae, plus minus acuminatae, basi sub-truncatae, leviter pinnatifidae, apice sub-integerrimae, laciniis brevibus, falcato-ovatis, membranulâ diaphanâ junctis, acutiusculis, integerrimis, marginibus sub-ciliatis sub-reflexis, inferiore sursum spectante maximâ, rectiusculâ, rachi plerumque appressi, obtusâ, integerrimâ, aut leviter crenulatâ; *inferiores* multo minores, deflexae, ovato-lanceolatae vel adeo sub-triangulae, grosse inaequaliter dentatae, acutiusculae, basi plerumque inaequaliter rotundatae vel sub-cuneatae; *superiorcs* sensim decrescentes, demum

exauriculatoe et pinnatifido-confluentes, lacinis s. pinnis connatis sensim sensimque obtusioribus. Costae subtus distinctiores; vence laterales parallels, in lacinias singulas singulae erepentes, simpliciter pinnato-ramosoc, in pinnis supremis connatis integerrimis plerumque furcate. Rachis stipiti conformis, ast pilis teneris patulis magis sordide cano-pubescentes.

SORI inter venas laterales rari, biseriati, singuli medio ramulorum transversorum, in frondis apice autem paullo supra furcationem ramo superiori inserti. Capsule in soro quovis haud numerosae, lenticulari-globosæ, sub-sessiles, pallide fuscantes, setis multis albis armatae, annulo assurgente, flavido-ferrugineo, incompleto. Sporate sub-reniformes, pallide fuscae, laeves, pellucidae.

EXPLICATIO TABULAE.

Frondes duae; magn. nat.

Fig. i. Portio superior pinnulae fertilis; auct.

Fig. i. Capsulae; admodum auct.

3. GYMNOGRAMME CANESCENS.

TAB. XL.

Gr. frondibus inferne pinnatis a medio ad apicem pinnatifidis silpla pubescentibus subtus canescenti-villosis, pinnis sessilibus ovalibus obtusis leviter pinnatifidis, lacinis sub-falcato-ovatis obtusis integerrimis margine reflexis, stipite inferne laevigato sursum pubescente. BL.

POLYPODIUM *canescens* BLUME Fil. Jav. p. 133. 42.

HABITAT: A. cl° REINWARDT, qui ipsi nomen *Polypodiicanescens* dedit, in cacumine montis ignivomi, quo insula Moluccana Tidore formatur, reperta, a nobis in Java ad originem fluvii Tjikundul summo monte Gede lecta. Qiamvis habili *P. p/iegopteridi* LIN jr. quodammodo accedit, primo tamen adspectu a *Polypodiis* ceteris valdopere deflectit. Deest enim reticulatio peculiaris, cuius apud plerasque species mentionem sum us facturi, venarumque lateralium divisio longe simplicior est. In pinnis inferioribus vena primaria ad lacinias cujusque apicem escendit, in ramos laterales simplices partita, quarum medio sorus solitarius, parvus, sub-rotundus aut oblongusinsidet. In lacinias vero pianarum terminalium clongatarum plerique, maxime inferiores, ex ipsis ramis lateralibus, simpliciter furcati occurunt, sorique vel sub vel in furcatione ipsi evolvuntur, magis elongati, imo spissius ramum utrumque venularum furcatarum basi obtegentes. Quae res haud secus, ac sororum iuse Kio mediis in venis lateralibus, atque venarum ipsarum distributio nos moverunt, ut plantain hancce ad genus *Gymnogramme* DESV. amandemus, ubi G Tottw SCHLECHT. proxima cst.

FILIX terrestris, io-poUicaris usque i^pedalis et altior.

CAUDEX repens, sub-lignosus, fusco-rufescens, sursum totus stipitum reliquis circumvallatus et fere absconditus, infra et e lateribus radiculosus. *Radiculce* longissimae, numerosae, crassitie fli linte fortioris, simplices aut parum ramosae, fuscae, hinc inde rufo-tomentosae. *Stipitum reliquiae* magnitudine admodum inaequales, graciles, teretiusculae, e fusco flavicantes, glabriuscule, palearum rudimentis adspersae.

FRONDES confertissimae, erectiusculae vel oblique assurgentes, longe vel longissime stipitatae, 5-pollicares vel fere pedales, elongato-lanceolatae, sub-coriacae, supra saturate virides, subtus canescentes, utrinque, maxime subtus/setulis albis birtae, inferne pinnatae, a medio ad apicem pinnatifidae.

PINNAE circiter 8-10, sub-oppositae, sessiles, patentes aut erecto-patentes, ex ovato ellipticae, utrinque obtusae, leviter pinnatifidae, lacinulis falcato-ovatis, obtusis, margine revolutis; inferiores sesquipollicares, £4 unc. latae; superiores sensim decrescentes et in terminalem elongatam confluentes; terminalis maxima, plerumque 6 poll, excedens, unciam lata, elongato-lanceolata[^] in acumen crenatum attenuata, profunde pinnatifida. *Lacinice* falcato-oblongae, obtusae, inferiores obsolete repandae, reliqua integerrimae, margine reflexae, membranâ pellucida junctae,

'STIPES 5-pollicaris aut fere pedalis, crassitie pennae corvinae, bagi quidpiam incrassatus, teretiusculus, supra canaliculatus, inferne glaber, nitidus, sursum, junior praesertim, pubescens. *Rachis costaque media* supra leviter canaliculatae, subtus rotundatae, flavicantes, utrinque dense hirsutae.

SORI—uti supra memoravimus—medio venularum lateralium simplicium venulis furcatis pinnae terminalis inserti, parvi, sub-rotundi vel oblongi, cito decidui. *Capsulce* minimae, fuscae, setis compluribus albis obsitae, breviter pedicellatae, sub-globosae, juniores basi magis dilatatae. *Sporce* parvae, baud perfecte rotundae, fuscae, opacae.

EXPLICATIO TABULA.

GYMNOGEAMME *canescens*; *magn. nat.*

Fig. 1. Pi 11 nu la sorophora ; *bene auct.*

Fig. 2. Capsulae; *maxime auct.*

b. Frondibus glabris.

4 GYMNOGRAMME JAVANICA.

TAB. XLI.

G. frondibus bipinnatis (superne simpliciter pinnatis), pinnulis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis basi oblique attenuatis integerrimis membranaceis glabris. BLUME *Fil. Jew. p. 112. 2.*

p. *Macrophylla*; pinnulis (maximis) oblongis acuminatissimis apice obsolete serrulatis.

HABITAT : Speciem hanc soltimmodo ad radicem monlis *Burangrang* provincii *Javanicae Krawang* inter arbusla humentia obscrvavimus; in herbario autem d¹ VAN HASSELT specimina quam plurima tamen ejus, quam varietatis j³ asservantur, quae vir praeclarus in monibus *Kcirang*, saltibusque aliis provinciae *Bantam* legerat. Quum GYMNOGRAMME *Japonica* DESV. (HEMIONITIS *Japonica* THUNB.) brevissime descripta sit, difficillimum est dictu, iuum species nostra pinnis longe acuminatis basique oblique attenuatis satis distinguantur.



FILIX magnifica, e caudice brevi, terrae fere penitus immerso, frondes plures partim orgyales et altiores efferens.

STIPES 3-4-pedalis, inferne paene digitulum crassus, sursum tenuior, in rachin communem abiens, pariter atque haec teretiusculus[^] supra sulco decurrente canaliculatus, subtus convexus, glaber, extra sordide stramineus, intus substantia medullari fuscâ farctus.

FRONDES erectae, inferne bipinnatae, superne pinnatae, circumscriptione ovato-lanceolatae, 3-4-pedales et longiores, intermixtae minoribus sub-simpliciter pinnatis, quarum pinnae inferiores ternatae.

PINNAE utrinque 5-10 cum impari, sub-alternae, erecto-patentes; juga inflma 2-3 maxima, circumscriptione ovali-lanceolata, bipinnata (rarius ternata), pinnulis (foliolis) 7, quarum basilares ternatae, vel sub-geminatae; juga intermedia circumscriptione ovato-lanceolata, numero pinnularum decrescentia, pinnulis 5, dein tribus vel sub-geminatis, demum simplicia, nunc petiolata, nunc versus apicem frondis sessilia, externe in rachin communem quidpiam decurrentia. *Pinnulce* (Foliola) sub-oppositae, inferiores petiolatae vel sub-petiolatae, reliquae sessiles, simplices, integrae, pinnis conformes, exceptis terminalibus majoribus

oblongo-lanceolatae, 4"-6-pollicares (in p plus io-pollicares), I - I | poll, (inp 2-fere 3 poll, latae), acuminatae vel cuspidatae (praesertim in p), basi sub-oblique attenuatae, et externe nonnunquam in rachin decurrentes, integerrimae aut leviter repandae, in p apicem versus sub-serrulatae, sub-marginatae, margine supra vasis clavato-terminatis quasi transverse striolatae, planae, membranaceae, glaberrimae, supra nitidae, subtus pallide virides, costâ mediâ supra angustissimâ, leviter sulcatâ, inferne forti et convexâ, pallide flavescente. *Venae laterales* paralleliae, approximate, extemplo vel prope marginem bifurcae, rarius bis-bifurcae aut simplices, subtus distinctions, marginem versus, maxime in fronde fertili, in corpusculum oblongo-clavatum, album vel dilute stramineum incrassatae.

SORI sequuntur· cursum venarum lateralium, quâre bifurci vel simplices quâ lineae angustae ferrugineae. in frondis paginâ inferiore, marginem non omnino attingentes, indusio penitus nullo, apparent. *Capsules* parvae, confertae, venae membranaceo-prominulae corpusculisque multis tenerrimis brevibus clavatis tectae insertae, ellipsoideae, turgide lenticulares, breviter pedicellatae, ultra f ambitus annulo articulate cinctae. *Sporas* trigonae, pallide fuscae, intus granulosae.

EXPLICATIO TABULA.

Fig. 1. Frons, ad quartam magnitudinis partem reducta.

Fig. a. Pinna superior trifoliata , soris subornata |magn. nat.

5. GYMNOGRAMME SERRULATA.

TAB. XLII

G. frondibus bipinnatis (superne simpliciter pinnatis), pinnis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus oblongo-lanceolatis cuspidatis basi inaequali-rotundatis serrulatis membranaceis glabris. BLUME Fil. Jav. p. 113. 5.

HABITAT : Inter summum *Burangrang* montemque ignivomum *Tankuwang Praha* palude vaslissim5,e quS fluvii oriuntur, semel tantum mihi obvia. Habitū statuſtique giganted cum specie praecedenti adeo congruit, ut ipsius forte varietatem constituere debeat. Quamobrem notas, quibus differre videtur, paucis enarrasse satis erit. Sunt nempe pinnae superiores simplices sicut et pinnulae apicem versus subito cuspidatae et repands, basi magis rotundatse vel inaequilaterales et integerrimae, margine reliquo argute serrulatae. Pinnulae due supremae pinnarum inferiorum plerumque confluent.

EXPLICATIO TABULÆ.

Pars frondis; magn. nat.

Fig. i. Apex pinnulae fertilis; quidpiam auct.

a.) Sort.

b.) Venae, soris demtis, corpusculis par vis tectae.

Fig. 2. Capsulae ; auct.

e GYMNOGRAMME OBTUSATA.

TAB. XLIII.

G. frondibus bipinnatis superne pinnatifidis glabris, pinnulis adnatis oblongis sub-decurrentibus, basilaribus pinnatifidis, superioribus obtusioribus grosse inciso-serratis, rachi puberulâ, stipite inferne paleaceo-squamoso. BLUME Fil. Jav. p. 115. 4»

HABITAT : Rara in jugis altioribus Java: occidentalem umbrosorum humidorum aroans. Inter species cognitas *G. polyopodioides* SPREVG. (*CKTERACR potypodioides* HAW.) proxima, prasertim fronde magis partita* pinnulisque laciniisve baud ciliatis differt.

FILIX plerumque plus tres ped. alt a, caudice brevissimo, paleaceo.

FRONDES erectae, i-fere i[^]pedales, longissime stipitatae, circumscriptione ovatae, acuminatae, inferne bipinnatae, superne apiceque bipinnatifidae, membranaceae[^] glabrae, vix nitida[^]tus pallide virentes.

STIPITES 15-pedales et longiores, recti, graciles, crassitie pennae corvinæ, supra profunde sulcati, subtus rotundati, sordide straminei aut pallide fusci, glabriuscui, paleis sparsis, ovato-lanceolatis, acuminatis[^] insertione sub-cordato-constrictis, integerrimis, tenuissime reticulatis, patentissimis reflexisve, pallide ochraceis, deciduis.

PINNJE utrobique circiter 10, sub-oppositae, patentes; *inferiores* 3 ceteris majores, brevissime petiolatae, oblongo-lanceolatae, pinnatae, apicem versus obtuse pinnatifidae et in acumen longum grosse serratum excurrentes; *superiors* sensim decrescentes[^] magis lanceolate, e pinnatis in pinnatilMas mutatae, laciniis ovato-oblongis, obtusissimis, leviter falcatis, inaequaliter serratis; *terminates* adnatae, magis approximate, sensim sensimque obtusiores, laciniis minus profundis, tanquam truncatis, irregulariter serratis, demum grosse serratae. *Pinnulce* adnatae, sub-oppositae, angulo externo quidpiam in rachin decurrentes, inferiores intermediis paulo minores, externe s. deorsum spectantes internis s. sursum directis majores et plerumque paulo acutiores, laciniis brevibus, subtruncatis, inaequaliter serratis, superiores confluentes obtusae grosse serratae, omnes supra costâ tenerime marginatâ et ad basin hujus dente grandi membranaceo. Dentes similes minores plures occurunt, ubi costa, subtus oculis armatis pilos parvos monstrans, ramulum pinnatum-in laciniam quamque exserit. *Rachis* cum primaria, turn secundaria sulcata, juxta pinas et supra limbo an gusto membranaceo, subtus rotuudata, pubescens.

SORI venulis laciniarum simpliciter pinnatis, aut venis lateralibus furcatis pin-nularum confluentium obtusiorum, insidentes, lineares, breves, passim sub-oblongi aut punctiformes; ferruginei. *Capsulce* parvae, sphaericae, sub-compressae, saturate fuscescentes, annulo incompleto sat lato cinctae, pedicello celluloso brevi fultae, venulis insertae, corpusculis solitariis clavatis intermixta?. Clava horum corpusculorum nonnunquam sub-globosa vel ovalis est saturate rufa, intus granulosa, basi angustata pedicellum brevem diapbanum referens. *Sporce* ovales, saepe sub-angulatac, pallide flavicantes, fere hyalinae, intus granulis soli-tariis fartaæ.

EXPLICATIO TABULÆ.

Frons; magn. nat.

Fig. i. Paleæ stipitis; auct.

Fig. a. Laciua frondis fertilis; aliquantulw auct.

Fig. 3. Capsulae ; insignitcr auct.

7. GYMNOGRAM'ME STEGNOGRAMME.

TAB. XLIV.

G. frondibus pinnatis utrinque stipite rachique hirsutis, pinnis sessilibus oblongis basi truncatis sub-inciso-pin^tifldis, laciniis ovato-rotundatis integerriijs, stipite inferne paleaceo. BL.

STEGNOGRAMMA* *aspidioides* BLUME Fil. Jav. p, 173. 1.

HABITAT : Crescit declivibus umbrosis humidis, praeprimis ad ripas fluminum minorum Java? occidentalis, altitudine 3000-4000 ped. supra mare. Maxima ipsius aillitas cum G. *Tottd* SCHLECHTEND., quam juxta, in prima sectioe poni debet, est manifesta; differt autem magnitudine, pinnis lalioribus et pro porlionc minus profunde pinnatifidis, prout et soris magis linearibus. Memoratu est dignum, species hujusmodi omnes, qux habitu inter semet convenient, etiam peculiar capsularum liabitu excellere. Etenim in G. *Tottd* SCBLECHT., G. *appendiculatd*, G. *canesceni* et in G. *Stegnogramme* NOB. capsuLe setis muniuntur, id quod in reliquis omnibus, qux et babitu discrepant, locum non babet.

FILIX terrestris, ij ad 3 ped., et quod excedit, alta.

CADEX terris oblique et superficiarie immersus, vel sub-repens, teres, crassitie

* Penitiore sororum in diversis evolutionis periodis exploratione convincimur, hancce plantam ad *Gymnogrammas*, et quidem ad illas spectare species, quæ yerisimiliter — utut p. 89 monstravimus — propter venas laterales pinnatas sectionem s. genus proprium constituunt, quod forsitan a *Cetc-rach* WILLD. non differt, quoniam paleae, soris bujus generis adscriptis, characterem privum non formant. Quod vero in hacce planta prius pro indusio babuimus, nil est nisi venulsc ipsius dilatatio, haud raro marginem angustum inembranaceum reterens, qui sub ulteriore capsularum evoluzione, corrugatur et fere evanescit. -*-Numerus itaque specierum *Gymnogrammce*, quarum prius sex indi-cavimus, und adaugendus est.

digituli, sordide fuscus, sub-lignosus, paleis fere denudatus, undique obtectus radiculis longis, filiformibus, sub-simplicibus, fulvo-tomentosis, s[^]pitum reliquis intermixes, sursum frondes plures sub-fasciculatas exserens.

FRONDES stipitatae, stipitem ^-i^-pedalem, adscendentem, sub-tetragonum, pube densa pallide fuscescente hirsutiim, imprimis inferne paleis sparsis obsesusum longitudine parumper exsuperantes, circumscriptione sagittato-oblongae, longe acuminatae, pinnatae, ad rachin sub-tetragonam supra obiter canaliculatam hirsutissimae : juniores circinatae, paleis similibus (ac stipitum basis) oblongo- vel lineari-lanceolatis varie patentibus arctissime reticulatis extus puberulis fuscis ornatae.

PINNJE utrinsecus 6-8, quin computentur nonnullae ex supremis sensim decrementibus et in pinnam terminalem latam ovatam acuminatam pinnatisectam coalescentibus, oppositae, exceptis inferioribus deflexis patentissimae^ sessiles, 2^4 poll, longae, f ad fere i^f poll, latae, oblongae, sursum in acumen acutum vel acuminatum rectum leviterve arcuatum attenuatae. basi truncatae et interdum inaequilaterales, grosse inciso-crenatae s. obiter pinnatifidae, membranaceae, utro-bique, maxime infra ad costam in venisque, hirsutulae. *Lacinice* breves, rotundatae, integerrimae vel obsolete repandae et sub-reflexaej inferior lateris sursum spectantis reliquis haud raro magis elongata. *J^ence* ratione fere e&dem, quā in *Menisciis*, distributee, i. e. laterales parallelae divisae in venulas breves, quae connectuntur sub angulis acutis, conjunctis per ramulum sub-flexuosum, usque in laciniarum sinum procurrentem, basi autem pinnarum costam non attingentem.

SORI venulas transversas occupantes, angulatim confluentes, interdum venu-lam connexivam flexuosam tenentes, lineares, ab initio pallide virescentes, dein cinnamei et demum fuscescentes, intus saepe margine limbati tenuissimo membranaceo, e venulae dilatatione exorto sensimque corrugato, rarissime paleis cito evanidis tenerrimis tecti. *Capsulce* sub-globosae, sub-sessiles, juventute corpulcis minutis globosis glandulaceis breviter pedicellatis commixtoe, annulo sub-completo articulato, sursum juxta annulum setis pluribus albis erectis exornatae, irregulariter transversim dehiscentes. *Sporce* sub-reniforines, scabriusculae, fuscae, opacae.

EXPLICATIO TABULiE.

Planta minor GYMNOGRAMMIE *Stegnogrammne; magn. naU*

Fig. 1. Pales caudicis; auctce.

Fig- 2. Fra gin en turn pinna? fertilis ; auct.

Fig. 3. Capsulae; itidem auct.

IX. MENISCUM SCHREBER

SCHREB. *Gen. Plant, n.* 1630. — SWARTZ *Syn. Fil. p.* 19. 2. — WILLD. *Spec. PI. V, p.* 133. 1956. — SPRENG. *Anleit. zur Kenntn. der Gewaechse HI, p.* 84. — EJUSD. *Syst. Feg. IF,* *p.* 5. 323⁸. — KAULF. *Enum. Fil. p.* 83. — EJUSD, *Ueber das Wes. der Farmer, p.* 83. — KUNTH *Syn. PL /, p.* 70. — BLUME *Fil. Jav. p.* 113.

Polypodii, Aspidii et Hemionitidis nonnull. spec. AuCT.

CHARACTER DIFFERENTIALS :

SORI sub-lunulati, paralleli, venis frondis transversim interjecti.

INDUSIA nulla.

VEGET : Filices terrestres. Caudices brevissimi, sub terrd occulti, raro arborescentes, erecti. Frondes plures, pinnatae, in specie unicâ trifoliatae. Formatio venarum admodum singiliaris. Venulae breves, opposite, e venis lateralibus exortae, connectuntur sub angulo magis minusve acuto, qui in ramulum incrassatum, admarginem versus adscendentem, exit. Sori ab initio biseriati, inter venas transversas venulis brevibus impositi, sensim sensimque magis versus angulum, quern ex anastomosi venularum 2 sibimet oppositarum efformari jam diximus, extensi, ideo tandem bini confluentes lineam sub-lunulatam referunt. Capsulac pedicellatae, indusio destitutae, sub-sphaericae, compres- siusculae, annulo incompleto. Sporae ovales vel sub-reniformes.

AFFIN : Cum *Polypodiis* LINN., quibus immortalis LINNAEUS species *Menisci* primum detectas accensuit, *Meniscia* quam plurimum conveniunt, seu potius primordiis fructificationis vera sunt *Polypodia*, quae postea demum, ob structuram venarum valde peculiarem, ad aliam formam, sive ex uno genere in alterum, transeunt. Eâdem de causâ manifestum est, quantâ

affinitate genus hocce valde artificiale istis jungatur *Gymnogrammis*, quarum venae laterales itidem pinnate. Nam si hie venulae, quibus sori insident, pariter sub angulo connecterentur, sori quoque procul dubio formam lunulatam assumarent. Totus itaque genericus *Meriisci* character structure venarum et defectu indusii innititur. Quoad fabricam autem venarum adhuc observatum volumus, penitus similem etiam in aliis quibusdam *Filicibus*, maxime *Aspidiis*, occurrere, quorum frons sterilis idcirco facile cum *Menisciis* confundi potest.

DISTRIB : De *septem* speciebus hujus generis, quibus *unam* novam addimus, *quatuor* in *India orientali*, *insulisque vicinis intertropicis* dispersae sunt, reliquae vero inhabitant *hemispharium occidentale*. In Java duw tantummodo innotuerunt, quarum *una*, **MENSCIUM triphyllum** Sw., jam prius in *Indiā orientali Chindque* reperta fuerat.

1. MENSCIUM TRPHYLLUM SWARTZ.

M. fronde ternata, foliolis oblongo-lanceolatis sub-repandis, lateralibus intermedio minoribus. BL.

SWARTZ *Syn. Fil. p. 19. i| et p. 206.* — WILLD. *Spec. PL V, p. 133. 1.* — SPRENG. *Anleit. Ill, p. 84. Tab. Ill, fig- 20.* — EJUSD. *Syst. Veg. IF, p. 40. 1.* — BLUME *Fil. Jav. p. 113. 1.* — HOOK. e*GREV. *Icon. Fil. FI, Tab. 120.*

HABITAT : Speciem hanc, quae prius tantummodo in *India orientali continent* et in *Zeylona* reperta fuerat, d^r VAN HASSELT etiam in sylvis provindse *Javanica Bantam* prope *Harriang*, legit. Quum icon apud d" Hoo- &E& et GBEVULE optima sit, novam noluitnus exhibere.

« CAUDEX crassitie pennoe corvinae, repens, radicosus, squamosus, demum denudatus.» HOOK, et GREV.

FRONS ternata, circumscriptione cord'ato-pblonga, longissime stipitata.

STIPES pedalis et altior, gracilis, (Hiformis, tereti-angulatus, supra sulcatus, subtus plano-convexus, pallide fuscus, glaber, prope frondem tantum puberulus, «basi paleaceo-squamosus.» HOOK, et GREV.

FOLIOLA frondis inaequalia, simplicia, integerrima velleviter repanda, membranacea, utrinque glabra, supra nitida, costâ subtus prominulâ, aequa ac rachis puberulâ, venis lateribus parallelis per venulas verticales (rachi parallelas) angulatas, ramulumque transversum e medio exserentes, connexis; *lateralia* duo minor a, bipollucaria, vix unciam lata, brevissime petiolata, subopposita[^] erecto-patentia, ovato-lanceolata, inaequilaterialia, apice attenuata, basi rotundata vel obliqua; *intermedium* duplo vel prope triplo majus, 5[^] poll, longum, i poll. latum? petiolo semipollucari suffultum, erectum", oblongo-lanceolatum, basi saepyis sub-hastatum, magis attenuatum, basi inaequali rotundatum.

SORI venis lateralibus interjecti, venulis verticalibus connectentibus leviter curvatis insidentes, sub-lunati, angulo obtuso marginem versus spectante. *Capsulce* breviter pedicellatae, pallide fuscae, sphaericæ, sub-lenticulari-compressæ, hinc annulo complete nitente cinctæ, illinc transverse dehiscentes. *Sporos* ellipsoïdeæ, pallide fuscae, glabra, intus obsolete granulatae.

2. MENISCUM CUSPIDATUM

TAB. XLV.

M. fronde pinnate, pinnis alternis vel oppositis oblongo-lanceolatis cuspidatis basi oblique attenuatis sub-repandis, axillis supremis proliferis. BLUME *FiL Jav.* p. 114. 2.

HABITAT : In saitibus provinciae *Bantam*, ubi prope cataractam *Sairan* a d° VAN HASSELT lectum fuit. MENISCO *reticulato* Sw. et M. *sorbifolio* WILLD., quod ab isto vix ac ne vix quidem distinctum videtur, summopere confine, pinnis deflectit longissime cuspidatis, basique magis attenuatis. Gongruit cum M. *prolifico* Sw. propter proliferationes axillares, quæ tamen in nostrî specie globulares non explicantur, in illo autem frondes minores pinnatas proferunt. Forma quoque pinnarum in utrifice specie differt.

FILIX e caudice vix — ni fallor — supra 'terrain emerso, frondes plures 3-5-pedales efferens.

FRONDES erectæ, impari-pinnatae, oblongo-lanceolatae, stipitatae[^] membranaceæ, glabrae, supra saturate virides et nitidae, exsiccae rufulae, subtus glaucescentes.

STIPITES i-i[^]-pedales, inferne crassitie fere pennae anserinae, in rachin transeundo magis magisqie gracilescentes, teretiusculi, sub-fistulosi, substantial medullari fuscâ repleti, pallide fusci aut sordide straminei, glabri, laevigati, at versus insertionem pinnarum juxta ac rachis supra obsolete canaliculati. *Prolificationes* axillis supremis insertae, solitariae, sub-globosae, fuscae, setaceo-squamulosae.

PINPUE utrinque circiter 12, nunc solum inferiores opposite, rarius omnes suboppositae, breyissime petiolatae; terminalis longius petiolata; inferiores magis patentes; reliquae erecto-patentes, oblongo-lanceolatae[^] apice subito productae in acumen longum, subulatum, plerumque leviter crenulatum, incurvum, basi oblique atte[^]uatae, supra magis in petiolum brevem decurrentes, integerrimae vel remote repandae, planae, 5-8-pollicares et ultra, i[^]-fere if poll, latae, supra costâ mediâ angustissimâ sulcatâ, punctisque parallelis albidis inter venas transversas frondis adultioris, subtus costâ elevatori, venisque lateralibus parallelis, simpli-citer pinnatis, quarum ramuli sub angulo acuto, marginem spectante, connectuntur, et ex angulo conjunctionis superne ramulum clavatum liberum emit-tunt, ramis omnibus serie simplice inter venas laterales dispositis. Apices horum fncrassati punctis albis, in pagina frondis superiore obviis, respondent.

SORI fusi, sub-oblongi aut ovales aut saepe sub-rotundi, solitarii in ramulis singulis brevissimis venarum lateralium, demum cum soro opposito venulae angulo respondentis arcuatim confluentes, unde angulus venularum prius (in fronde storili) obtusus magis rotundatus appetet.

EXPLICAT[^]IO TABULA.

Frons MENISCII *cuspidati*; magn. not.

Fig. 1. Segmentum pinnas, ut venarum distributio melius distinguatur; auct.

X. GRAMMITfS SWARTZ

SWARTZ *Syn. Fil. p. ai. 4* — WILLD. *Spec. PL IV*, p. i58. 1959.

— KAULF. *Enum. Fil. p. 84* — EJUSD. *Ueber das TVes. der Farmer*, p. 84 — KUNTH *Syn. PL p. 69*. — SPRENG. *Syst. Veg. IV*, p. 5. 3238. — BLUME *Fil. Jas>*. p. 114.

Polypodii et Asplenii nonnull. spec. AUGT.

CHARACTER DIFFERENTIALS:

SORI sub-rotundi, oblongi vel lineares, inter costam marginemque. solitarii, venulae simplici ejusve ramulo superiori inserti.

INDUSIA nulla.

VEGET : Filices plerumque in arboribus parasftae, aut cum Cryptogamis aliis promiscue saxa obducentes. Caudex repens, squamulosus, rarius caespitosus. Frondes simplices (bifidae in GR. *Jurcatd* HOOK. — pinnatae in GR. *rutcefolid* R. BR., quam ad *Gymnogrammen* DESV. pertinere nulli dubitamus), lineares, integerrimae, repandae vel rarissime pinnatifidae, plerumque coriaceae vel certe sub-opacae, unicostatae, venis lateralibus parallelis, simplicissimis furcatisve, vel sub-pinnatis, ramo superiore et breviore monosoro, altero simplice vel furcato vel ramoso, versus marginem escendente, sterili. Sori primâ evolutionis periodo plus minus oblongi, postea saepe perfecte rotundi, nudi, a costa sub-oblique distantes, vel eidem exacte paralleli, costae saepe accumbentes, aut ipsam inter marginemque medii. Capsulae sphaeroïdeae, pedicellate, in speciebus quibusdam setigerae. Sporae globosae aut sub-reniformes.

AFFIN : Genus hocce, quale etiam nunc constitutum habemus, diversissimas complectitur plantas, quae ad genera alia jam dudum nota, vel ad nova, revocari debent. Secundum cl^{mm} SWARTZ, ipsius*conditorem, inter *Polypodium Aspleniumque*

veluti intermedium, ab hoc soris nudis, ab illo soris linearibus rectis differre dicitur. At jam in speciebus, quas SWARTZ primo posuit loco, e. g. in GR. *linearis* et GR. *marginellus* (conf. SCHKUHR *Krypt. Gew. Tab. VII})* deprehendimus soras potius ovales, in rotundum vergentes, quam lineares, id quod in multis adhuc aliis observare licet. Ejusmodi species, si character primarius e sola form& sororum deduceretur, ad *Polypodia* amandare aequius foret, quum inter haecce permulta occurrant, quorum sori item magis minusve oblongi sunt. Forma enim sororum ovalis, vel ipsissima linearis, sensim abit in rotundam, ita ut certi limites inter ipsas poni nequeant. Verumtamen species supra recensitae, sive rotundis, sive ovalibus gaudeant soris, a *Polypodiis* distinguuntur venis longe simplicioribus, quarum ramus modo superior sorophorus est, dum venulae in *Polypodiis* genuinis, (ne iis quidem exceptis, quorum frons simplex), plerumque reticulatim connectuntur. Quocirca in hoc genere haud multum tribuendum censemus sororum formae, plurimum vero eorundem insertioni, penitus repositae in venarum structura, quam ad discernenda *Filicum* genera maximi videamus esse momenti. — Sin itaque inter *Polypodia* AUCT. adhuc plantae hospitantur, quarum venae structure supra descripta excellunt, eas huc referendas, omnes autem, quibuscunque venae aliter formatae, a genere *Grammitis* removendas esse opinamur. Quare plantas plures, quas prius in *Polypodiis* numeravimus, e. g. P. *hirtellum*, P. *alpestre*, P. *setigerum*, P. *adspersum*, P. *sub-pinnatifidum*, et P. *cucullatum* nunc huc recensemus. Ad *Antrophyum* KAULF. autem tam propter frondis structuram, quam propter venarum reticulationem, omnino cum hoc genere congruam, ablegavimus *Grammitidem lanceolatam* Sw., GR. *coriaceam* KAULF., GR. *involutam* DON et GR. *aveniam* NOB., quibus aliae quaedam Auctorum species absque dubio adjungendae veniunt. Namque si illas inter *Grammitides* militare pateremur, hujus generis characterem latius extendi oporteret, quam plantarum illarum inter sese affinitas permittat. Qu& de causa & adoptamus genus *Selligea* BORY, cui species omnes, quaecunque in nostris Enum. Fil. p. 118-119 sub sectione *Diagramme* hospitantur, adnumerabimus. Species denique*

sectionis nostrae *Paragramme* pertinent ad genus *Pleopeltis* HUMB. et BONPL. — Ex dictis magna patet cognatio, quae *Grammitidi* cum aliis generibus, imprimis cum *Polypodiis* fronde simplice instructis intercedit. Praecellunt tamen *Grammitides* venis nunquam reticulatis. In *Polypodiis* insuper sororum expansio magis in punctum compellitur, hie vero jam longius patet, quum sori singulilibero venarum ramo insideant, e cuius directione sua quoque pendet. Sin autem ramuli isti cum superioribus connecterentur, reticulatio nasceretur quodammodo illi *Antrophyorum* similis, quibuscum genus nostrum praesertim habitu convenit. Nee minus tandem accedit ad plantas, quarum ad genus *Tcenitis* nomine *Pleurogramme* et *Chilogramme* mentionem fecimus, nisi quod sori illuc discreti, hie continui sint, et probabiliter super frondis reticulationem transversim progrediuntur..

DiSTRiB : Species circiter *quindecim* in *Java* degunt, quarum omnes novae videntur, praeter *GR. lanceolatam* Sw., *GR. coriacream* KAULF., *GR. involutam* DON, etc., quac, prius a nobis ad hocce genus relatae, ad *Antrophyia*, *Pleopeltides* et *Selligueas* pertinent.—Numerus itaque cunctarum specierum hucusque cognitarum amplius *viginti* expleret.

« GRAMMITIDES GENUINE. *Frondibus indivisis. Soris linearibus, ovalibus vel sub-rotundis, costae para lie Us.*

i. GRAMMITIS ciEspixosa.

TAB. XLVI; Fig. i.

G. frondibus stipitatis linearibus obtuse acuminatis integerrimis coriaceis glabris aveniis margine reflexis, soris ellipticis sub-obliquis immersis, stipite hirtello, caudice caespitoso. BLUME FIL Jav. p. 115. i.

HABITAT : Ad muscosos arborum francos in montibus altioribus *Java occidentalis*. Maxima ipsi intercedit affinitas, prxsertim ob soros immersos, cum Gn. *lineari* Sw., quae *Jamaican** inhabitat. Planta nostra tamen a *Swartzia* frondibus obtuse acuminatis axeniis recedit.

FILICULA pusilla, vix aliquot pollices alta.

CAUDEX brevissimus vel sub-nullus, paleis imbricatis vestitus, frondesque

multas caespitosas efferens, infra radiculosus. *Radiculce* fibrillatae, tenerrimae, parum ramosae, spississime intricatae, fuscae, hinc inde pubescentes. *Palece* confertissimae, appressae, ovato-lanceolatae, obtuse acuminatae, sub-integerrimae, elegantissime reticulatae, sordide stramineae, scariosae.

STIPES circiter 5-pollicaris, filiformis, teres, ecanaliculatus, pilis parvis multis fuscis hirtellus.

FRONDES simplicissimae, integrae, bi-pollicares, vel paululum longiores, vix 2 lin. latae, linear es, superne in acumen obtusum angustatae, inferne magis attenuatae, integerrimae, coriaceae, glabra, margine paululum tenuiores et plerumque leviter revolutae, aveniae, costâ mediâ subtus, maxime versus basin, quidpiam prominulâ, supra vix distinguendâ.

SORI serie simplice, costam inter marginemque, a medio inde fere ad apicem frondis dispositi, 0vales, sub-oblique a costâ distantes, profunde immersi, unde frons supra leviter tuberculata. *Capsules* ope pedicellorum longiorum tenerimorum articulatorum papillae oblongae fasciculatim insertoe, sphaeroideae, compressiusculae, pallide fuscae, per \ ambitus annulo cinctae pellucido, ferrugineo, nitenti, post capsulae dehiscentiam assurgente, corpusculis intermixtae pallide flavidantibus, crassiusculis, breviter pedicellatis, obovatis, sub-rugosis, quae plerumque setis aliquot obsessa, intus cellulosa et materie grumulosâ repleta sunt. *Spores* sphaericæ, magnæ, fuscae, laeves, opacæ.

EXPLICATIO TABULiE.

Fig. 1. GBAMMITIS cwsptiosa; magn. not.

2. GRAMMITIS PIOSIUSCULA.

TAB. XLVI, Fig. 2.

G. frondibus stipitatis linearibus obtusiusculis aut obtuse acuminatis sub-repandis coriaceis aeniis utrinque stipiteqiiie pilosiusculis, soris ellipticis sparsis, caudice repente. BLUME *Fil. Jau.* p. n 5. 2. #

HABITAT : Fossidemus specimen unicum, ex arboribus vetustis prope cataractas calidas ad pontem ignivomum *Jauanicum Gede'lectum*. Disci-epata GH. *obtusd* WILLD. frondibus aeniis, parumper repandis nequedentatis atque pubescenti*, qui pariter a GH. *tenellid* KAVLF. distinguitur.

FILICULA 3-4-pollicaris, in arborum cortice parasitica.

CAUDEX repens, paleis membranaceis, ovato-obtusis, integerrimis, glabris,

sub-rugosis, flavidо-fuscis, praesertim ad apices, ubi elongatur, obtectus, infra radiculis brevibus, filiformibus, simplicibus, nigro-fuscescentibus, ferrugineo-yillosiusculis.

STIPES £-i-pollicaris, tenellus, filiformis, teres, ecanaliculatus, sordide fuscescens.

FRONDES caudici supra serie simplice imposite, circiter £ lin. inter sese distantes, erectae aut sub-arcuato-adscendentes, 22-pollicares aut breiores, 3 lin. latae vel angustiores, lineares seu potius angusto-lanceolatae, apice obtusae, basi attenuate, margine exigue repandae, nuric planae, nunc marginibus revolutis et sibimet applicitis, coriaceae, aveniae, costâ subtus prominulâ, utrinque, aequa ac stipes, setis sparsis saturate ferrugineis vestitae.

SORI parvi, ovales, circa 5-6 in fronde inter costam marginemque dissiti, subobliqui, vix immersi, post capsularum lapsum maculas nigras linquentes.

EXPLICATIO TABULJE.

Fig. 2. Frondes tarn steriles, quam fertiles GRAMMITIDIS jnlosiusculce; magn. nat.

3. GRAMMITIS CONGENER

TAB. XLVI, Fig. 3.

G. frondibus stipitatis elongato-linearibus utrinque acuminatis integerrimis coriaceis aveniis margine sub-revolutis supra glabris subtus stipiteque sub-pubescentibus, soris rotundato-ellipticis costae parallelis, caudice repente. BLUME Fil. Jav.p. n5. 5.

HABITAT : In sylvis altioribus *JCLVQS* ad arbores inter muscos. Specie praecedenti quam maxime affinis, differt fronde elongato-lineari, subtus modo pubescente, sorisque raagis approximatis. Est elia in simillima *G. linearis* Sw., cui autem venae laterales bifidae, quae in nostrâ planâ demum siccando, et turn solummodo ad frondis apicem, bifidae, inferne sirapliciter pinnatae sunt.

FILIX gracilis, arborum cortici adhaerens, caudice repente, paleis pallide fuscis operto, undique radiculas fibrosas teneras emittente.

STIPES ^-i-pollicaris et longior, filiformis, ecanaliculatus, pilis vestitus brevioribus, ast densioribus, fuscescentibus.

FRONDES alternatim approximate, erectiusculae vel sub-arcuatGB, linearis-lanceolatae, longitudine 3-5 poll, et ultra, vix plus 2 lin. latae, in acumen longum

obtusiusculum productae, infra valde angustatae, integerrimae, plenunque paululum revolutae, costâ mediâ subtus distinctiore, supra glabrae, punctis nigris, quae apicibus venarum lateralium pinnatarum (in plantâ siccâtâ quidpiam conspicuum) respondent, praesertim ad margines consitae, subtus pallidius virides, pilis sparsis, brevibus, nigro-fuscis, patulis.

Sow numerosi, a medio usque ad £ poll, infra frondis apicem costae utrinque approximati, -vix immersi, ab initio ovales, postea capsularum expansione subrotundi.

EXPLICATIO TABULJE.

Fig. 3. GEAMMITIS congener; magn. nat.

- a. Segmentum frondis, in quo venarum distributio perspicue exprimitur, quae nonnisi fronde lumini obversâ cognoscitur; *auct.*
- b. Segmentum frondis, soris nonnullis exornatum; *auct.*

4 GRAMMITIS PUSILLA.

TAB. XLVI, Fig. 4, 5, 6.

G. frondibus brevissime stipitatis linearibus obtusiusculis basi attenuatis sub-integerrimis membranaceis sub-aveniis utrinque hirtis, soris sub-rotundis demum confluentibus, caudice caespitoso paleaceo. BL.

POLYPODIUM *hirtellum* BLUME Fil. Jav. p. 125. 5.

HABITAT : Montibus excelsis Javce interior is, muscis intermixta, et ad arbores parasitica. Propter soros perfeete rotundos prius inter *Polypodia* recensifice situs illorum vindicat inter *Grammitides* locum. Discernitur a *Ga. pilosiusculd* BL. caudice caespitoso, stipite multum breviore, fronde diaphani, tenuiore, setisque crebribus obsitS. Quamvis utriusque speciei vena; turn demum conspicua; fiunt, ubi fi-ons lumini obvertitur, in utraque tamen differunt; in ilia enim trifidae, in hac bifidas sunt. Quum margine fusoo non limbetur, a *Git. marginell* Sw. etiam discrepat, cui habitu quam proxime accedit.

FILICULA i|-3-pollicaris.

GADEX brevissimus, caespitosus, crassitie fili ferrei mediocris, junior totus dense paleaceus, annosior inferne nudiusculus, superne inter paleas frondes emittens, e basi radiculosus. *Radiculos* tenerimae, quâquâ versus directae, sub-simplices, fuscantes, nuda. *Paleas* pro portione majusculae, imbricatas, oblongo-lanceolatae, obtusiusculaa vel acuminatx¹, integerrimae vel obsolete den-

ticulatae, rarius lacerae, scariosae, pallide femigineae, vetustiores saturiores, pulcre reticulatae.

STIPITES brevissimi, 2-3 lin. longi, crassitie setae porcinae, nigro-fusci, setis longis, ferrugineis, patentibus deflexis hirsuti.

FRONDES fasciculate, erectae vel adscendentes, is¹-^f-pollicares, circiter 2 lin. latae, lineares aut spatulato-lineares, obtusiusculae, basi angustatae, integerrimae aut leyissime repandae, membranaceae, planae, exsiccae rugulosae, costâ mediâ subtus distinction, planâ, venulis obsoletis furcatis, utrinque, margine præsertim, setis similibus atque caudex hirsutac, fertiles subtus ab apice usque ad vel infra medium sorophorae.

SORI sub evolutione quâ puncta fusca in medio marginem inter costamque ramulo superiori venulae furcatae medio aliquantulum dilatatae inserti, solitarii^ compositi e capsulis parvis spbacris flavicantibus, sub-sessilibus, setis aliquot longis ferrugineis obsessis; evoluti magni, conyexi, fusci, demum ita confluentes, ut costa media prope obtegatur. *Capsulce* sub-globosae, per $\frac{4}{5}$ ambitus annulo nitido ferrugineo cinctae, rarius ad latera setis nonnullis armatae, pedicellis tenuissimis, elongatis, longitudine inaequalibus, annulo post dehiscentiam assur* gente. *Sporce* globosae, opacae.

3. *Alpestris*; frondibus sub-coriaceis repandis utrinquiie maxime subtus stipiteque hirtis, soris discretis nudis.

POLYPODIUM *alpestre* BLTJME *Fil Jav.* p. 123. 8-

HABITAT : In Javce modibus altioribus ad arbores. Frons ab ilia *GVL. pusilla?* BL. minus diversa nobis videtur, quam ut speciei honore sit digna. Est tamen longius slipitata, crassior margineque nullum magis repanda, quam in ilia. Formatio autem atque directio venarum , uti et sororum, in utraque penitus cadem est. Gaetrum frondis substantia ex membranacea in coriacem transit, et frondes state provectiores supra pilis denudantur.

y. *Lasiosora*; frondibus coriaceis subintegerrimis utrinque stipiteque hirtis, soris confluentibus villosis.

HABITAT : Ad arbomm trunco muscosos, in jugis superioribus montis *Pangarangu*. Facie omnino praecedentis, distinguitur notis modo indicatis, soris longe majoribus lanâ ferruginea dense obiectis frondibusque magis congestis, ita ut caudicis paleae vix distinguantur, quae omnia ex imagine nostrâ liquent.

EXPLICATIO TABULÆ.

Fig. 4. Frondes steriles fertilesque GRAMMITIDIS/7M^{7/8}; ragn. nat.

Fig. 5. Ejusdem var. *alpestris*;)

Fig. 6. Ejusdem var. *lasiosora*;) .

5 GRAMMITIS HIRTA.

TAB. XLVII, Fig. i.

G. frondibus stipitatis elongato-lineari-lanceolatis obtusiusculis medio repandis coriaceis aveniis utrincjue stipiteque hirtis, soris ellipticis sub-obliquis, caudice repente,,BLUME Fil. Jav. p.n5.4.

p. Frondibus tenuioribus utrinque acuminatis subtus ad costam modo marginibus stipitibusque pubescenti-hirtis.

HABITAT : Altissiinis montium jugis ad arbores parasita, ab ill. REINWARDT in montibus *Tenger*, a nobis in monte ignivomo *Gede* detecta. Varietatem /3, frondis substantie tenuiore pubescentiAque minore insignem, VAN HASSELT in montibus *Karang*, altitudine 4-5000 ped., legit. Differt GB. *corigeneri* NOB. magnitudine frondeque repancul

FILIX habitu exacte cum congenibus jam descriptis conveniens, sed paululum robustior, caudice pennâ corvinâ crassiore, paleis membranaceis ovatis acuminatis pallide fuscis vestito, et inferne fibrillis numerosis instructo.

FRONDES valde congestae, ad exortum surculorum juvenilium sub-caespioso — confertae, rectiusculae, stipitatae, 6-pollicâes (in /3 nonnunquam 8-pollicares), vix 3 lin. latae (in (3 5 lin.), lineari-lanceolatae, apice magis minusve obtusae (in)3 acuminatae), basi in stipitem angustatae, margine medio repandac, vel remote grosseque crenulatae, caeterum integerrimae, at magis minusve revolutae, coriaceae, saturate virides, siccatae rufae, utrinque setis multis atro-fuscis. *Costa media* utrinque distincta^ subtus convexiuscula. *Vence laterales* pinnatae, solum fronde luci obversâ distinguendae, in (3 tamen quidquam magis conspicuae.

STIPES circiter pollicaris vel aliquid longior, teres, fuscus, pilis longis, multis, patentibus, saturate ferrugineis hirtus, in /3 glabrior.

SORI numerosi, irregulares, subtus utrinque ad costam dispositi, costa; magis minusve approximate ab eademque oblique distantes, ovales, nonnunquam sub-rotundi, discreti vel sub-confluentes, vix immersi.

EXPLICATIO TABULJE.

Fig. 1. GEAMMITIS hirta; magn. nat.

- a.) Paleae quaedam caudicis;
- b.) Fragmentum frondis sorophorum;
- c.) Capsulae; onui. aucL

6. GRAMMITIS FASCICULATA.

TAB. XLVII, Fig. 2.

G. frondibus longe stipitatis spatulato-linearibus obtusis basi attenuatis integerrimis membranaceis sub-aveniis stipiteque setosis, soris rotundis costae approximatæ, caudice sub-caespitoso paleaceo. BL.

POLYPODIUM setigerum BLUME *Fil. Jav. p. 123. 7.*

HABITAT : Summo in monte Ged<? Javas ad arbores. Distinguitur a *G. pusilla* BL. fronde majorē, longius ilipitatd, venisque maximam ad partem trifidis, prout *G. hirta* BL. substantial frondis niagis elongate, minus abtiisae breviusqec stipitatae deflect it.

FILICULA elegans, 4-6-pollicaris.

CAUDEX brevis, sub-caespitosus, vix pennae columbinae crassitie, fuscus, sursum lense paleaceus, superne frondiger, undique radiculosus. Radiculæ numerosæ, ;at longæ, capillares, sub-simplices, prope caudicem caespitoso-intricatae, nigritantes, nudæ vel sub-villosæ. Paleos confertissimæ, lauceolatae vel linearisanceolate, acutæ, sub-integerrimæ, tenuissimæ, scariosæ, pallide ferrugineæ, •eticulatae.

STIPITES adscendentes, inter caudicis paleas fasciculatim emersi, filiformes, i^rassitie setæ porcinae, 12-3-pollicares, flavicantes, hirsuti pilis tenerrimis, ongis, patentissimis aut deflexis, pallide ferrugineo-flavidis.

FRONDES magnitudine valde inxquales, i^r-5-pollicares, 3-4 lin. latae, lineares, arms lanceolatae, rotundato-obtusae, raro obtusiusculae, basi acutæ, integerrimæ vel levissime repandæ, membranaceæ, planæ, exsiccae diaphanae, utrinque setis imilibus, atque stipites, hirsutæ, costâ mediâ solum subtus distinctâ. Fronde iimini obversâ apparent venæ parallelæ, trifidae, ad frondis basin apicemque fido furcatae, ad marginem fere pertingentes.

SORI rotundi, magni, ferruginei, utrinque prope costam sub-alterni, a basi ad picem dispositi, non confluentes, sed semper discreti.

EXPLICATIO TABULÆ.

7 GRAMMITIS OBSCURA.

TAB. L, Fig. i.

G. frondibus stipitatis linearis-lanceolatis obtusis leviter repandis coriaceis aveniis planis ad costam utrinque margine stipiteque pubescentibus, soris oblongis obliquis, caudice subreptante.
BLUME Fil. Jav. p. II 5. 5.

HABITAT : Altitudine nooo ped. inter montes *Geđe* et *Pangarangu* ad radices arborum vetustas muscosas a nobis reperla. *G. hirtcc* simillima videtur differre venarum structurę sub-siraplicę (io illę ramosa).

FILIX magnitudine admodum varians, 4~8~P°Uicaris.

CATJDEX reptans, e partibus recentibus sensim elongatis frondes subfasciculatas efferens, ad emortuas sursum brevibus stipitum reliquii circumvallatus, et maximam partem paleis parvis scariosis pallide fuscis laceris oraatus, undique radiculosus.

FRONDES stipite \$-ii-pollicari tenero pubescenti-hirto suffultae, erectiusculae, 32-6-pollicares et altiores, 4-6 lin. latae, linearis-lanceolatae, obtusae, inferne attenuate, integerrimae vel leviter repandae, plaiiae, costā utrinque distinctā, subtus plano-convexā, aveniae, ast lumini obversae venis lateralibus simplicibus aut bifidis, marginem non attingentibus, ramis apice sub-clavatis, superiore brevissimo, coriaceae, margine costāque utrinque pilis nigro-fuscis hirsutulae, saturate virides, vix nitidae, exsiccae fuscescentes.

SORI sub-oblongi aut ovales, utrinque costae approxirnati, sub-obliqui, sulcis frondis admodum superficiariis vix distinguendis incidentes.

β. Angustata; frondiljus angustioribus sub-integerrimis breviter stipitatis utrinque sub-pubescentibus, soris sub-rotundis confluentibus. BL.

HABITAT : Cl¹ KUDL et VAN HASSELT hancce varietatem ad *Paugarangu* legerunt. Differt ab et fronde tantuni 2-3 i lin. longę paucasque latę, breviler stipitatS, qwk admodum ad *G. pusillam* NOB. accedit. Ab hSc tamen perquisitione accuratiore facile distinguitur ob frondis substantiam longe crassiorem et fere adiaphanam, ac imprimis venarum stmeturā, qua?, utut in a, pier unique ramos si m pi ices clavatos referunt. Quam ob rem ipsani pro mera *G. obscurco* ducimus varielale, iconeque collustramus. Notandum adhuc est, in hęcce varietate frondes adhuc minus repandas vel partim integrrimas, et perinde ac stipites, utrinque pube brevi esse objectas. —Sori nondum evoluti sunt ovales, posterius sub-rotundi, demumque confluens, ita ut costa, cui approximantur, vis distingui queat. Ceteruin soris pariter, atque in a, foveolis superficiariis, a costā sub-oblique divergenibus, incidentes.

EXPLICATIO TABULA.

Fig. i. GRAMMITIS obscwra; magn. nat.

Fig. a. Ejusdem var. o angustata.

a GRAMMITIS REHWABDIL

TAB. XLVIII, Fig. i.

G. frondibus stipitatis spatulato-lanceolatis obtusis repandis sub-membranaceis furcato-venosis planis utrinque stipiteque pilosis, soris ovalibus costae approximatis sub-parallelis, caudice paleaceo. BL.

HABITAT : Accepimus frondem unicam ex herbario REINWARDTIANO nomine POLYPODII mo II is. Differt GRAMMITIDI *pusillce* NOB. fronde longius stipitata", venisque a basi inde bifurcis, ramo superiorc brvissimo, inferiore marginem attingente. Quā de causā soris in OR. *pusilld* a frondis costis multo remoliores, hęc autem eidem sub-contigui sunt. — A specie præcedente primā fronte vix distincta, fronde tamen tenuiore, venarumque structure memorata recedit. Namquac vena; in GR. *obscura* adoo abbreviata sunt, tamen ipse exterior ramus vix medium costam inter marginemque attingat.

FILIX — uti videtur — cespitosa et probabiliter 5 poll, non excedens.

FRONS stipite pollicari, filum commune crasso, atro-fusco, ecanaliculato, basi fasciculo palearum oblongo-lanceolatarum acutarum ocliracearum stipato, pilis longis patentibus ferrugineis ex toto villoso, ^i-pollicaris, ^ poll, lata, spatulato-lanceolata, obtusissima^ basi attenuata^ repanda, plana, sub-membranacea^ nitidiuscula^ utrinque, maxime ad marginem costamque subtus plano-conyexam, pilis longis atrofuscis vestita, parallelo-venulosa, venis subtus distinctioribus, marginem versus sub-clavatis, basi sursum breviorem exserentibus ramulum, in venis sorophoris maxime abbreviatum et cum frondis costā angulum ferme acutum efformantem.

SORI ovales, solitarii in venarum furcatarum ramis brevioribus, costae approximati atque paralleli, non immersi, ab initio badii, postea saturate ferruginei. *Capsulce* globosae, breviter stipitatae, setis 2-3 longissimis fulvis obsessaeJ

EXPLICATIO TABULA.

9 GRAMMITIS ADSPERSA.

TAB. XLVIII, Fig. 2.

G. frondibus sub-sessilibus linearibus obtusis basi attenuatis sub-repandis coriaceis glabris sub-aveniis sparsim nigropunctatis, soris sub-rotundis costae parallelis, caudice repente squamoso. BL.

POLYPODIUM adspersum BLUME Fil. Jav. p. 113. 6.

HABITAT : In Java: interioris saltibus ad arborum Iruncos annosoA Congruit habili omnino cum POLYPODIO *lycopodioides* LIHN., quam ob causa in et ob soros evolulos plane rolundos *Polypodiis* prius adnumeraveram. A GBAMMITIDE *obscurd* refipse vix distal; in illia¹ tamen frons latior, multo longius stipilata et pilosa, in hac sub sessilis et glabra est. Venx item, licet vix conspicuse, longe profundius furcalse, sorique adhuc in iugis rotundi deprehenduntur, quam in illia.

Filicium 3-5-pollicaris.

CAUDEX repens, teretiusculus, crassitie pennic corvinae, totus densissime squamosus, superne frondes, inferne emittens radiculos raras, simplices, fuscantes, leviter pubescentes. *Squame* arctissime imbricatae, ovato-oblongae, acuminatae, integerrimos, ochraceae, membranaceae, arete reticulatae, deciduae.

FRONDES alia supra aliam exortae, 2-5-pollicares, 7-11 unc. latae, stipite aut nullo aut brevissimo, complanato, glabro, inter squaraulas emergente, lineares aut linear-lanceolatae, obtusae, basi angustatoe, sub-repandae, planae vel margine parum revoluta, costata. media supra obsoleta, subtus distinctiore, venulis lateribus obsoletissimis, furcatis, marginem non attingentibus, coriaceae, utrinque glabrae, supra sparsim nigro-punctulatae, subtus infra medium usque ad apicem sorophorae.

Sow juxta costam medianam utrinque in seriem longitudinalem dispositi, discreti, singuli ramo breviori venae furcatae insidentes; juniores oblongi, puberuli, pallide fuscantes; setate rotundi, convexi, fusci, post capsularum interdum setigerarum lapsum depressiones planas in locis insertionis relinquentes.

EXPLICATIO TABULÆ.

*Fig. *. Planla ; magn. nat.*

D GRAMMITIS SETOSA.

TAB. XLVIII, Fig. 3.

G. frondibus stipitatis linear-lanceolatis utrinque attenuatis sub-denticulatis fiircato-venulosis ad costam utrinque margine stipiteque setosis, soris rotundato-ellipticis, caudice repente.
BLUME *Fit. Jav.* p. 116. 6.

HABITAT : Rara in montosis altioribus *Java occidental*. Prscedenti qum simillima, ast prjsertim venis jam conspicuis, marginem fere attingentibus, semper furcatis, ramulo uno plcrutnque item furcato, ilistica. *Ga. obtusa* WILLD. fronde obtusfi venisq; simplicib; recedit.

FILIX habitu cum pracentibus congrua, caudice repente, radiculoso, paleaceo.

STIPES i-i[^]-pollicaris, filiformis, canaliculatus, sordide fuscus, setis dispersis.

FRONDES valde congestae, assurgent, 3-6-pollicares, 3 lin. latae, linear-lanceolatae, utrinque attenuate, remote et exigue denticulatae, planae, ad marginem costamque utrinque sub-elevatam setis nigro-fuscis obsitae, venis parum conspicuis, quarum ramulus exterior bifureus marginem fere attingit, alter vero brevior soropborus est, coriaceae, saturate virides, opacae, siccatae fuscescentes.

Sow a medio ad apicem usque ramis venarum brevioribus internis inserti, solitarii, costam inter marginemque dispositi, sibimet approximate primum ovales, postea sub-rotundi, uti in *Polyopodiis*, demum fere in lineam continuam confluentes.

EXPLICATIO TABULA.

11 GRAMMITIS PUBINERVIA.

TAB. XLVIII, Fig. 4.

G. frondibus stipitatis elongato-lineari-lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis vel leviter repandis coriaceis aveniis ad costam stipitibusque setosis, soris rotundatis ellipticis, caudice repente. BLUME Fil. Jav. p. 116. 7.

HABITAT : Cum precedent!, cuius verisimiliter varietas, omnibus tamen paribus robustior. Quire fusione ipsius descriptione possumus supersedere, notas solummodo eas, quibus differre videtur, enumernntes.—*Frons* 8-io-pollicaris, 4 "». lata, illâ crassior, costâ supra parumper, subtus fortiter prominula^c. Venae laterales similes, ast modo, ubi frondem luci obverteris, conspicuae. Sets item, ast sparsc supra in costâ et ad marginem. Maxiroe frons junior plants utriusque tam formâ, quam pubescentid convenit, quocirca magis adhuc uobis persuasum est, cam varie'atcm esse G. setoste.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. 4- Planta; magn. nat.

12 GRAMMITIS FASCIATA

TAB. XLIX, Fig. i.

G. frondibus stipitatis elongato-lineari-lanceolatis utrinque acuminatis vel apice obtusiusculis sub-integerrimis coriaceis sub-aveniis margine supra punctatis stipitibusque glabris, soris ellipticis sub-obliquis, caudice repente. BLUME Fil. Jav. p. 116. 8.

HABITAT : Plerumque in arborum trunds parasitica, rarioer etiam in rupibus basalticis muscosis prope *Kandang-badak* (grabatum rhinocerotum) in latere boreali infra craterem montis *Gedd*. A precedebus longitudine et glabritie frondis, marginibus nigro-punctatae, venisque lateribus proxime basin furcatis obsolelis dislat.

FILIX caudice longe repente, lignoso, fragili, paleis sordide fuscis soariosis obtecto, pennae corvinae crassitie, undique radiculos longas sub-ramosas fusco-villosas emiltente.

STIPES a-3-pollicaris, rarius brevior, teres, atro-fuscus, praesertim basi sparsim paleaceus, glaber, ecanaliculatus, superne anguste membranaceo-marginatus.

FRONDES alternae, remotiusculae, oblique adscendentia, absque stipite pier unique 8-12-pollicares, circiter 4 M^r* latae, stipitatae, linearis-lanceolatae, magis minusve acuminatae, vel obtusiusculse, basi in stipitem attenuate, integerrimae vel exigue repandae, et sinubus exiguis nonnunquam setigerae, planae, glabrae, pallide virides, costâ supra depressiusculâ, subitus prominulâ, utrinque glabrae et sub-ayeniae, yenis transversis, quae ob frondis crassitiem tantum ad lueem versus apparent, singulaeque ramis constant duobus, juxta costam connatis, paululum divergentibus, qui plerumque simplices, rarius bifidi, oblique ad marginem erepunt, et paullo supra huncce puncta atro-fusca, elliptica, elevata, centro depressa, in paginâ superiore conspicua, formant.

SORI supra medium usque ad apicem ad costam utrinque dispositi, solitarii, primum referentes lineas breyes, angustas, pi anas, atro-fuscas, e capsulis minimis sub-sessilibus obovatis parum eyolutis compositas, postea propter capsulas magis evolutas longiusque pedicellatas ovales vel sub-rotundi, convexi. *Capsulas* ellipticae, basi sub-attenuatac, saturate ferrugineae, annulo incompleto, obscuriore, nitido, demum assurgente, pedicellis tcnerrimis in^qualibus fultie, corpusculisque commistae clavatis, breviter pedicellalis, nigro-fuscis, opacis.

EXPLIGATIO TABULJE.

Fig. i. Frondes steriles fertilesque *G^kmaTims JasciaUe*; *magn. not.*

b. XIPHOPTERIDES. Frondibus pinnatifidis. Soris lunulatis, laciniarum margine exteriore reflexo obtectis.

13. GRAMMITIS SUBPINNATIFIDA.

TAB. XLIX, Fig. 2.

G. frondibus stipitatis linearibus acuminatis sub-pinnatifido-dentatis glabris, dentibus alternis rotundatis aut retusis 1-soris, stipite rachique pubescentibus. BL.

POLYPODIUM subpinnatifidum BLUME Fil. Jav. p. 129. 26.

HABITAT : Parasitica ad arbores muscosos summorum montium Java?, c. g. *Gede*, *Pangaranghu*, etc., ubi specimina plura collegi. Propter soros sub-rotundos generi *Polyptodium* prius accensui, ast situs corum in ramo superiore venarum furcatarum ipsam ad *Grammitidcs* relegat. Notattim adhuc volumus, soros cosiac mediae s. rachi quidem approximates, rion autem insertos cossic, utut in speciebus genuinis generis *Xiphopteris* KAULF,

FILICULA lepida, 3-8-pollicaris.

CAUDEX brevissimus aut sub-nullus, caespitosus, sursum paleaceus et frondiger,

infrnc radiculosus. *Radicuke* elongate, sub-simplices, fusculae. *Palece* linear-lanceolatae, obtusae, integerrimae, tenuiter reticulatae, flaventes, nitidae.

STIPES filiformis, erectus aut adscendens, pallide fuscus, oequa, ac rachis obsoleta, pilis mollibus patentissimis plus { lin. longis pubescens, 5-ifc unc. longus.

FRONDES confertae, erectae vel adscendentes, 3-8-pollicares, 2 lin. latae, linear es, utrinque, maxime basi attenuatae, apice obtusiusculae, sub-coriaceae, glabrae, leviter pinnatifido-dentatae. *Lacinulce* s. *denies* alterni, rotundati aut truncato-retusi, margine inferiore interdum reflexi, singuli nervo furcato instructi.

SORI in laciniis singulis solitarii, basi costam versus sub-oblique directi eidemque approximati, nervi furcati ramulo superiori insidentes, parum evoluti, discreti, oblongi, plani, ferruginei, sub-villosi; perfecti magni, rotundi, convexi, fusi, demum confluentes. *Capsulce* juvenes parvae, sub-sessiles, sub-globosae, pallide flayae, superne obsessae setis pluribus, longis, rigidis, fuscis; magis evolutae annulo adscendente ornatoe et distinete pedicellate, setis utrinque annulo assidentibus; maturae sphaero'ideae, pallide fuscae, annulo pallido, ferrugineo, post capsulam diruptam assurgente, pedicellis suffuloe teneris, pallidis, diametri longitudine, rarius setarum modo descriptarum nonnullis armatae. *Sporae* globosae, lacves, fuscae, opacae.

EXPLICATIO TABULiE.

Fig. 2. GRAMMITIS subpinnatifida ; magn. nat.

14 GRAMMITIS CUCULLATA.

TAB. L, Fig. 3.

G. frondibus brevissime stipitatis angusto-linearibus sub-membranaceis pinnatifidis glabris, laciniis ovatis integerrimis, inferioribus acutis planis, superioribus obtusis cucullato-reflexis, caudice caespitoso. BL.

POLYPODIUM cucullatum NEES et BLUME *in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XI, p. 121. 5. Tab. XII, Fig. 3. A, a, b.*

XIPHOPTERIS cucullata SPRENG. *Syst. Feg. IF, p. 43. 4-*

HABITAT : In montanis altioribus *Java occidental** ad arborum truncos, utul e. g. in monte *Gede'et Pangarangui*. Pertinet reverbi ad genus *Xiphopteris* KAIILF., quod vero tantummodo pro *Grammitidis* sectione duci-

FILICES.

mus. Namque non differt a prima* *Grammildum* seclione, nisi sororum formâ in universum magis curvat&, quippe qui, pariter in venis lateralibus exorti, in iisdem versus frondis costam deflectunlur, et, ubi lacinula? parvae sibimet admodum approximate sunt, secus costae longitudinem confluunt. Hoc autem solâ ex frondis divisione laciniarumque ipsius approximatione videtur pendere, quoniam inter eas quoque *Grammitides*, quorum irons simplicissima est, quaedam species occurunt, in quibus sori — etiamsi minorem in gradum — oblique costam versus diriguntur, et saepius simili ratione utrobique confluunt, ast a niarginibus frondis reflexis obtagi nequeunt, quia interstitium inter venas parenchymate conjungitur. Quare satius ccensemus, ejusmodi species, licet fronde pinnatifida, quoad habitum, a reliquis aliquantulum discrepant, tantummodo ut sectionem segregare, quae certe, propter similem venarum strukturam, rectius füe, quam ad *Polypodia*, referenda est.

FILIX pusilla, circiter 4-5 poll, longa, *caudice* brevi, caespitoso, radiculis multis filiformibus simplicibus nigro-fuscis hinc inde ferrugineo-tomentosis instructor et, maxime sursum inter stipites, paleis obtecto a-a^{lin.} longis, angusto-lanceolatis, acuminatis, tenuibus, scariosis, flavidis, deciduis vel irregulariter laceris.

FRONDES 10-20 pluresque, fasciculato-congestae, rectae vel adscendentes, angusto-lanceolatae, acuminatae, inferne in stipitem vix aliquot lineas longum gracilem ancipitem glabrum angustatae, profunde pinnatifido-dentatae, e membran aceo sub-coriacese, glabrae, pallide virides, costâ utrinque distinctâ. *Laciniis* alternae, utrinsecus decrescentes, sub-dentiformes, integerrimae, uninerviae : inferiores e basi decurrente acutae, sub-triangulae, planae, steriles; superiores, fere inde a frondis medio, fertiles, latiores, falcato-ovatae, obtusae[^] margine inferiore reflexo cucullatae.

SORI solitarii, in pagina inferiore laciniarum obtusarum, obliqui vel curvati, dum laciniarum nervum prope totum occupant, et versus frondis costam descendunt, magni, initio penitus inter laciniarum margines reflexos occulti, in frondis medio discreti, superiores confluentes. *Capsulce* numerosissimae, parvae, sub-globosae, pedicello longo tenui articulato, haud per | ambitus annulo ex articulis 12 composite pallide ferrugineo cinctae, laxe reticulatae, flavidae, irregulariter transversim dehiscentes. *Sporce* globosae, pallide fuscae, diaphanae, interdum caudiculâ brevi tenerâ auctae.

EXPLICATIO TABUL.E.

Fig. 3. GRAMMITIS cucullata; magn. not.

- a.) Paleae caudicis.
 - b.) Laciniæ superiores sorophorac, margine inferiore partim inflexo, ut sororum inscrilio magis conspicua sit.
 - c.) Capsulæ; omn. auct.
-

15. GTVAMMITIS DENTICULATA.

TAB. L, Fig. 4.

G. frondibus breviter stipitatis linear-lanceolatis profunde pinnatifidis glabris coriaceis, pinnis infimis dentiformibus decurrentibus, intermediis ovatis acutis raro dentatis cucullatis monosoris, caudice paleaceo. BL.

POLYPODIUM *cucullatum* BLUME Fil. Jav. p. 129. 29.

HABITAT : In montosis altis *Javm* ad arborum truncoꝝ muscosoꝝ, ast rarioꝝ, — Sori plerique in hac specie nequaque mediae rachis frondis incident, sed subbifurcis inseruntur vcnis, quae in laciniaꝝ unaquaque erepunt, astob frondis crassitudinem obsoletissimae sunt. Si contra sori costae laciniarum superiorum admodum approximatamente sese praebent, id penitus e fibroſtuito, e laciniis nimirum magnitudine decrescentibus, pendet. In *Xiphopteridihus* vero genuinis sori in apice frondis reflexo recurvato inserti ad costam medianam ex axilla venarum lateraliꝝ simplicium oriuntur. — Ob venarum structuram sororumque insertionem hanc speciem a *Polyptodiis* segregandam existimavimus.

FILICULA nana, a⁴-4-pollicaris.

CAUDEX caespitosus, brevissimus, paleis occultus, infra radiculas raras subsimplices nigricantes exserens, superne frondiger. *Palece* arctissime imbricatae, majusculae, linear-lanceolatae, acuminatae, integerrimae vel hinc inde erosae, scariosae, reticulatae, pallide ferrugineae.

FRONDES 2-4-pollicares, 2-3 lin. late, adscendentes aut erectiusculae, brevissime stipitatae, stipite ancipite, fili linteī crassitie, glabriusculo, linear-lanceolatae, utrinque attenuate, profunde pinnatifidae, coriaceae, glabrae. *Lacinice* alternae, 1-1½ lin. longae, erecto-patentes; infimae minimae, dentiformes, e basi decurrente acute, planiusculae, steriles, costulā indivisā intermedia⁴ ovato-triangulae, acute aut obtusiusculae, superne plerumque dente uno paucisve, inferne plerumque integerrimae, ast fortius re volute, costā furcatā vel obsolete bifurcatā, cuius ramus princeps extra versus apicem, internus versus dentem lateris superioris adscendit; superiores sensim decrescentes et in acumen longum serratum confluentes.

SORI in laciniis majoribus et terminalibus solitarii, rarissime geminati (in laciniis nempe margine superiore solito magis dentatis), paulo supra coste furcationem ramo marginem superiore spectanti inserti, magni, rotundi, fusci. *Capsulce* subglobosae, breviter pedicellate, laxe reticulate, corpusculis solitariis, pallide flavicantibus, obovatis, breviter pedicellatis pedicellisque teneris, subclavatis, apice obscurioribus intermixtis. *Annuli* capsularum ferruginei, incompleti, articulis latis. *Sporce* magnae, sphaeroideae, multangulae, opacae.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. 2. GRAMMITIS denticulata; magn. nat.

XI. SELLIGUEA BORY.

BORY DE ST.-VINC. in *Diet, class, d'hist. nat. VI*, p. 58⁸-588.
 — KAULF. *Ueber das Wesen der Farnisr.* p. 85. — BLUME
Fil. Jav. Add.

Grammitidis sect. (T)agi[%]amme) BLUME Fil. Jav. p. 118.'

CHARACTER DIFFERENTIALS :

SORI lineares, continui, quandoque interrupti, inter venas laterales solitarii.

INDUSIUM nulum.

VEGET : Filices terrestres, rarius parasitae, caudice repente, fronde simplice, stipitatâ, membranaceâ vel coriaceâ. Venarum structura penitus eadem est, ac in *Polypodiis* fronde simplice instructis; venae laterales a costa versus marginem parallelae escendent, inter se transversis connexae venuulis, reticulum tenerrum formantibus, ramulis multis curvatis incrassatis. Structura ilia paeprimis conspicua est in speciebus fronde membranacea diaphanâ praeditis, in quibus sororum quoque insertio patet. Hi quidem oriuntur e reticulationis ramis, qui venis lateralibus parallel i versus marginem adscendunt, et exacte istis *Menisciorum* SCHREB. respondent, in quibus supra e venuulis arcuato-connexis inter venas laterales erepunt, non vero, uti hie, inter sese junguntur. Quo exactius autem illi rami inter se contingunt, eo rectior est sori, hie exorti, directio. Quam ob rem sori non nulli nunc interruptos sese praestant, ubi rami isti a linea rectâ aberrant, vel in lineam rectam non confluunt.

AFFIN : Quoad sororum formam genus hocce proxime accedit ad *Asplenium*, et praecipue ad *Scolopendrium*, qua; vero et indusiis muniuntur, et, quod majoris adhuc momenti, eâ venarum reticulatione carent, quam supra consideravimus. Eâdem

de causâ plantas istas, quas prius ut sectionem propriam *Grammitidum* descriptsimus, ab hoc genere segregandas putavimus. A *Polyjwdiis* denique, quibus proximac sunt, distant soris magis elongatis, et plerumque in lineam inter venas laterales conjunctis, nisi conjunctio jam a primordiis suis locum obtinuerat. Venarum structurâ dignoscuntur ab *Antrophyis* KAULF., a genere vero *Ceterach* WILLD. nonnisi soris omnino nudis, palearum prorsus privis.

DISTRIB : Hactenus species hujus generis tantum *una* (vel forte *duce*) innotuerat, SELLIGUEA *Feei* BORY, quam prius GRAMMITIDEM *vulcanicam* vocaram. An ad hanc CETERACH *pedunculata* HOOK, et GREV. (*Icon. Fil. Fasc. 1, Tab. 5*) referenda sit, uti GUILLEMIN (in *Bullet, des Sc. nat.*, 1827, p. 3⁵) affirmat, admodum dubium mihi videtur. Namque HOOKER et GREVILLE in descriptione sui dicunt *iifmndem stemlem membranaceam* », quae in *S. Feei* coriacea, et ne vestigio quidem venularum transversarum inter venas laterales instructa est, quas icon CETERACH *pedunculatce* aperte monstrat. — Species itaque (*juatuor*, quas descripturi sumus, omnes *Javce* propriae videntur. *Duce* ex illis in viciniâ montium ignivomorum degunt, reliquae in sylvarum tenebris, maxime ad torrentes.

i. SELLIGUEA FEEI BORY.

TAB. LI.

S. frondibus longe stipitatis coriaceis calloso-marginatis subrepandis parallelo-venosis glabris, sterilibus ovato-oblongis basi ciineatis, fertilibus longius stipitatis angustioribus, soris linearibus transversalibus marginem attingentibus, demum confluentibus, caudice repente paleaceo. BL.

BORY DE ST.-VINCENT in *Diet, class, d'hist. nat. FI*, p. 588. —

Planch. Livr. FH, fig- 10.

GRAMMITIS *vulcanica* BLUME *Fil. Jaw.* p. 118. 14.

**j3. Frondibus fertilibus linear-lanceolatis utrinque angustatis,
soris discretis baud confluentibus.**

HABITAT : Plantam hancce juxta fumantem craterem montis *Gede*, altitudine 9800 ped. supra mare, scorii vulcanicis irrepentem, et locis paululum depressioribus prope *Kandang-Badak* inter saxorum rimas inveni. Varietas /3 autem in herbario cl. VAN HASSELT exstat, a quo cum proximo craterem montis *Pulusarie* in provinciâ *Bantam*, turn parasita ex arboribus hujus montis lecta fuerat. Haec varietas frondis formâ proxime ad speciem a d' HOOKER et GHEVILLE nomine CETERACH *pedunculate* delineatam accedit, ast frondis substantia deflectit. Vix non crediderim, earn a SELLIGUEA *Feei* BOR. ut propriam speciem esse disjungendam.

FILIX i-i⁴-pedalis.

CAUDEX admodum flexuosus, repens, plerumque penn& anserind crassior, lignosus, paleis imbricatis dense vestitus, vel vetustior nudus, inferne fibrillas teneras subpinnatifidas, superne frondes numerosas emittens. *Paleas* ovato-lanceolate, acuminatae, subintegerrimae, tenere membranaceae, obsolete reticulate, pallide ochraceae, versus basin ope puncti centralis obscuri affixaæ.

FRONDES simplices, stipitatae, coriaceae, crassae, glabrae, supra nigro-punctatae, margine calloso, subreflexo, apicem versus subrepando, subtus costâ mediâ valde elevatâ venisque transversis, suboppositis, parallelis; fertiles longius stipitatae.

STIPES sterilium circiter 3-, fertilium 9-pollicaris et altior, oblique assurgens, saepe subflexuosus, crassitie culmi straminei, prope caudicem teretiusculus, articulo obsolete, brevi, paleaceo, sursum supra canaliculatus, subtus convexus, e stramineo fuscescens.

FRONS *sterilis* ovato-oblonga, magis minusve acuta vel acuminata, saepe obtusa, basi subcuneata et nonnunquam obliqua, supra saturate viridis et parumper nitida, subtus flavid-virens, 4 3-5¹/₂ poll, longa, if-ai poll. lata. *Fertilis* plerumque angustior et longior, 6-pollicaris, i¹-if poll, lata, magis acuminata, basi cuneata, in /3 utrinque acuminata, margine magis undulata, quarti sterilis.

SORI lineares, a costâ inde ad marginem venis paralleli, iisdemque interjecti, absque indusiis, sed apice marginem spectante limbo nigro-fusco calloso cincti, frondi non immersi, ast admodum turgidi, et denique adeo confluentes (minus inj3), ut venae laterales evanescant. *Capsulce* ellipsoideae, turgide lenticulares, fuscae, annulo incompleto, ferrugineo, pedicellis longitudine inaequalibus, elongatis, tenellis, sororum juniorum corpusculis multis, pedicellatis, saturate ferrugineis intermixte, alatere uno infra annulum descendente dehiscentes. *Sporce* flavicantes, hinc depressiusculae, obsolete punctate.

EXPLICATIO TABULiE.

2. SELLIGUEA HETEROGARPA.

TAB. LII, Fig. i.

S. frondibus longe stipitatis lanceolatis utrinque acuminatis sub-repandis parallelo-venosis coriaceis glabris, soris linearis-oblongis transversalibus marginem non attingentibus ultimis subrotundis, caudice repente paleaceo-crinito. BL.

GRAMMITIS heterocarpa BLUME FiL Jav. p. 118. i5.

13. Frondibus latioribus basi cuneatis.

HABITAT : Pulchram hanc Filicem, quaiu cl. REMWAEDT ad *Pondok Tonga* in provincia *Tjanjor* lectam in suo diario nomine *ASPLERII amphicarpi* describit, montibus diversis altis *Java occidental*/*, frequentem vero inter craterem montis *Tankuwang-Praliu* cacumenque montis *Burangrang* tarn parasitam ad arbores, quam ad massas basalticas, musco denso stratas, observavimus. Varietas *p.*, frondibus latioribus, basi cuneatis, paullo tenuioribus sorisque angustioribus minus convexis insignis, teste VAN HASSELT ad montem ignivomum *Pulusarie* provincial *Bantam* parasitica crescit. Differt praecedenti fronde tenuiore, sorisque crassioribus, prout a *S. pedunculate* (*Cmm/LCE pedunculata* HOOK, et GBEV. Icon. FiL I, Tab. III) frondibus erianaeis, baud m^cmbranaceis sorisque brevioribus marginem non attingentibus disoedit.

FILIX i-i[^]-pedalis, habitu fere SCOLOPENDRII officinarum Sw.

CAUDEX longe reptans, radiculosus, simplex surculisve brevibus lateralibus, crassitie prope pennae coryinaB, teretiusculus, fuseus, lignosus, tenacissimus, partibus vetustioribus subnudus et supra processibus brevibus tuberculatus, vel ubique paleis setaceis dense crinitus. *Radiculce* praecipue inferne e caudice exortae, nunc breves et fere simplices, nunc 3-4-pollicares, filiformes, fibris lateralibus brevibus, fuscae vel ferrugineo-villosae. *Stipitum reliquios* (seu potius caudicis processus) i lin. longae, cylindricae, truncatae et quidpiam excavatae, atro-fuscae, nudae vel palearum basi latiori residua operatae. *Paleas* 4-5-lineares, angustissimae, fere setaceae, basipaulo latiores et peltato-affixae, ochraeeae, medio crassiores, lateribus membranaceae et integerrimae, appressiusculae vel apicibus surculorum juniorum subinvolutae, supra insertionem demum deciduae, ita ut sola basis remaneat.

FRONDES simplicissimae (rarius, teste REINWARDT, apice bifidae), magnitudine diversissimae, steriles plerumque brevius stipitatae et minores, fertiles 9-12-pollicares, circiter r§ unc. latae rarius modo semiunciam 1^{tae} (in (*i* plus 2 poll.), elongato-lariceolatae, longiter acuminatae, inferne attenuatae (in (3 cuneate), integerrimae aut leviter repandae, margine angustissimo, nonnunquam leviter

reflexo, cartilagineo, glabra?, nitidoe, coriaceae, costâ supra subcanaliculatâ, subtus plano-convexâ, venis utrinque quidpiam prominulis, transversis, parallelis, simplicibus, interstitiis minutissime reticulatis.

STIPES plerumque 4-8-pollicaris, sterilium plerumque brevior, erectus aut subcurvatus, teretiusculus, supra profunde'canalicularatus, glaber, laevigatus, superne angulatus.

SORI solitarii, paralleli inter venas transversas, costam inter marginemque medii neutrique contigui, lineares vel oblongi, inferiores et superiores magis elliptic! vel rotundi, frondi leviter immersi, absque indusiis, post capsularum lapsum lineas nigras linquentes. *Capsulce* ellipticae, inferne paululum attenuate> lenticulari-compressae, fuscae, per f ambitus annulo ferrugineo, tandem assur gente, pleracque pedicellis longissimis tenerisque fultac, multae brevius pedicel late, irregulariter transverse dehiscentes, corpusculis mixte minutissimis, sub sessilibus, clavatis, ferrugineis.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. i. SELLIGUEA heterocarpa; magn. not.

- a.) Fragmentum frondis, son's aliquot instructum ; and,
- b.) Idem, capsulis denudatum.

3. S E L L I G U E A M E M B R A N A C E A.

TAB. LII, Fig. 2.

S. frondibus lanceolatis acuminatis basi decurrentibus integer rimis membranaceis glabris reticulato-venosis, fertilibus longissime stipitatis, soris angusto-linearibus transversalibus marginem subattingentibus, caudice repente. BL.

GRAMMIS membranacea BLUME *Fil. Jav. p. 118. i5.*

S. Frondibus sterilibus brevissime stipitatis, fertilibus.....

HABITAT : Species rarissima, quam in sylvis montis *Salak* ad fluvii marginem semel tantam reperimus. Varietatis fit frondem modo sterilem e montosis *Bantam* interioris accepimus. — Venas eâdem fere ratione, quâ in *Menuciâ*, partiri notatu dignum est, nisi quod hie veniae venarum lateralium primariarum non indivisus rectangulatim confluunt, sed furcate sint. Beticulationem similem in *S. pedunculaU* (*Ctmkcu pedunculatd* HOOK, ct Guv.) occurere suspicamnr, cui planta nostra proxime affinis, fronde integerrimâ (in Ulâ ercnato-repandâ) sorisque angostissimis partim interruptis prtecellit, qui in illâ latissimi et continui venis transversis intersident.



FILIX terrestris, pedalis vel altior.

CAUDEX repens, infra per radiculos subsimplices fUiformes subvillosas adhae-

rens, pennâ corvinâ aliquantulo crassior, subcarnosus, paleis ovato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis aut paululum erosionis, sordide fuscis, deciduis, membranaceis tectus.

FronDES approximate vel remoto-alternae, stipilatae (in /3 subsessiles), erectae, simplices, integerrimae, membranaceae, glabrae, supra utrinque versus marginem pallidius virides, costâ utrinque distinctâ, subter prominulâ, venis lateralibus subparallelis, subflexuosis, laxe reticulatis, tenerrimis, quarum ramulifurcati, furcationibus divergentibus, apice subincrassatis.

STIPES sterilium 3-4-pollicaris, fertilium 8-pollicaris, gracilis, rectus aut leviter flexuosus, teretiusculus, glaber, supra anguste canaliculatus[^] pcene per totam longitudinem fronde angustissime decurrente marginatus, in (3) alatus.

FroNs *sterilis* 8-9-pollicaris, *fertilis* paulo brevior, circiter i{ unc. lata, utraque lanceolata, basi[#] valde angustata et longiter decurrentis, plana, supra nitidiuscula.

SORI lineares, angusti, rectiusculi, saturate ferruginei, sub angulo recto a costa divergentes, marginem fere attingentes, inter venas laterales transversas solitarii venulasque inter illas contiguas quasi connectentes, subcontinui vel parumper interrupti, absque indusiis, post capsularum lapsum lineas atro-fuscas sphacelatas linquentes.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. 2. SELLIGUEA membranacea; magn. nat.

4. SELLIGUEA MACROPHYLLA.

TAB. LIII.

" S. frondibus stipitatis oblongis acutis basi cuneatis subrepandis membranaceis glabris reticulato-venosis, soris linearibus transversalibus marginem attingentibus, caudice repente. BL.

GRAMMITIS *macrophylla* BLUME *Fit. Jav. p. 119. 16.*

HAHTAT : A nobis prope pngum (*Kampong*) Bant provincial Buitenzorg, a VAW HASSBLT apud Baiu-awal provincial *Bantam* parasitica in radicibus arborum vetostis detecta. A praecedenti distinguitur imprimis magnitudine frondium, bant cuneatarum mai[^]neque repandarum. Reticulatio vero penitus eadera.

FILIX inter congeneres venustissima, frondisque magnitudine alque latitudine insignis.

CAUDEX superficiarie repens, crassitie penna* anserinae, compacto-carnosus,

depressus, infra utrinque radiculas filiformes fulvo-villosas emittens, vestitus paleis appressis, sordide fuscis, ovato-lanceolatis, acuminatis, subintegerrimis, inferne peltato-affixis, membranaceis, reticulatis, parum nitidis, superne excrescens frondesque plerumque circinatas proferens.

FRONDES plerumque suboblique e caudice assurgentibus, conformes, fertiles plerumque paululo longius stipitatoe, figurâ foliorum RUMICIS *lapathi*, 10-16-pollicares, 3-4 poll, latae, oblongo-lanceolatae, acutae vel obtusiusculae, rarius acuminate, basi cuneatae et utrinque anguste in stipitem decurrentes, repandae vel rarius subintegerrimae, membranaceae, tenues, glabrae, supra subnitidae, costâ subcanaliculatâ, subtus convexo-prominulâ, yenis lateralibus transversis laxe reticulatis, uti in GR. *membranaced*.

STIPES sterilium plerumque 3-pollicaris, fertiliū 4"8-pollicaris, basi subclavatus, paleisque similibus atque caudex demum evanidis pbsitus, sursum teretiusculus, hinc sulco escendente, utrinque margine angusto membranaceo decurrente notatus, glaber, e fusco stramineus.

SORI, uti in praecedentibus, venis primariis transversis paralleli, sub angulo acuto a costâ mediâ versus marginem adscendentibus, angusti, partim interrupti, partim continui, fusci, explicatione suâ substantiam frondis conterminam yelut sphacelo destruentes, ita ut haec nigrescat, yel. forata evadat.

EXPLICATIO TABULiE.

SELLIGURA *macrophylla*; magn. nat.

XII. FOLYPODIUM TOURNEF. LINN.

TouRNEF. *l?lé/n. de Botan. p.^Zi. IF.* — LINN. *Gen. Plant, ed. SCHREB. //, 1632.* — Juss. *Gen. Plant p. 15.* — JAUME-ST-HIL. *Fam. nat. /, p. 44.* — SWARTZ *Syn. Fil. p. 25.6.* — WILLD. *Spec. PL F, p. 144- i960.* — R. BROWN. *Prodr. Flor. Nov. ffoll. p. 2.* — KAULF. *Enum. Fil. p. 87.* — EJUSD. *Ueber das Wes. der Farrnkr. p. 88.* — KUNTH. *Syn. p. 70.* — SPRENG. *Syst. Feg. p. 5. 5243.* — BLUME *Enum. Fil. Jav. p. 120.*

Filix, Filicula, Lonchitis TouRNEF. /. c. /, //, F.

Dipteris REINWARDT *Syllog. Plant, nov. in Regensb. bot. Zeit* 1825.

Lastrea BORY in *Diet class. IX, p. 252.*

CHARACTER DIFFERENTIALS :

SORI subrotundi, solitarii, seriati aut sparsi, nudi.

INDUSIUM nullum.

VEGET : Filices terrestres aut in arboribus parasitae, caudice simplice, caespitoso, saepius tamen elongato, ramoso, repente, in juventa plerumque paleaceo. Frondes stipitatae, rarius sessiles, figurae diversissimae, nee raro dispares, simplices, lobatai, pinnatifidae, pinnatae aut raro adhuc magis compositae, ssepissime plus minus coriaceae, nunc et membranaceae. Capsulae pedicellatae, conglobatae in soros subrotundos, qui nee squamis, nee glandulis, nee indusiis obiecti, in frondis paginâ inferiore reticulationi delicatae vel ejusdem ramulis liberis curvatis inseruntur, vel rarius in venis simplicioribus oriuntur.

AFFIN : Genus hocce, licet temporibus novissimis egregie castigatum, a multis aliis vix potest distingui, praeprimis si character primarius solâ formâ sororum continetur, neglectâ eorundem insertione. Haec vero pendet venarum ex dispositione et distributione, justo minus adhuc respectâ, quam maximi esse in *Fillcibus* momenti arbitramur. Hoc quidem dTM BORY (*Diet, class. VI, p. 588*) non fugisse videtur, qui de ista re procul dubio adhuc copiosius disputabit. Etenim quum genus *Polypodium* in genera plura esse dissolvendum necessarium putasset, notas genericas non modo e sororum insertione, sed et ex eorundem vestitu (e. g. in genere *Adenophoro*) atque situ (e. g. in *Marginaria*) desumpsit. Attamen modi, quo fructificationes venis incident, solis in *Lastreis* rationem habuit, quas a *Polypodiis* genuinis propter soros indusiorum privos, neque venarum apici, sed medio insertos, disjunctos. Quamvis autem POLYPODIUM *Oreoptens*, *Thelirpteris* et *unitum*, quae BORY veluti typos generis sui novi indicavit, nullo modo illuc spectant, utpote quae indusiis muniuntur, genus tamen istud forte conservari debet, si notae indicatae sufficient, et in plantas alias quadrent. Negari quidem nequit, characteres istos imprimis fundatos esse venarum dispositione et distributione

sororumque insertione, notis inquam, quibus solis genera diversa, uli *Grammitis*, *Gymnogramme*, *Meniscium*, *Anthrophyum*, etc., ab aliis distinguuntur. Cur itaque riotae istae gravissimae, quibus totus *Filicum* habitus innititur, in isto excluduntur genere, quod non solum specierum ditissimum est, sed et hactenus plantas habitu mirum quantum diversas complectitur?

In necessitatemvero, ut genus *Polypodium* in pluradiscerpamus, eo potius adducimur, quo magis numerus specierum in dies increscit, et illis discernendis venarum insertionem optime inservire nostra fert opinio. Verumtamen laboris improbi praemianemosperet, cui non contigerit, ut omnes generis istius formas primarias accurate perspexerit. Quare *Polypodialndica* in tribus sequentes dispescuisse satis habemus, indigitatis simul propinquitatis vinculis, quibus alia aliis conjunguntur generibus.

a. *Polypodia vera.*

Species cunctae, hūe spectantes, excellunt venisanastomosantibus, quae in reticulum plus minus distinctum, ex areolis s. maculis angulatis compositum, ramulisque uncinatis apice clavatis intertextum, connectuntur. Sori aut in apicibus ramorumistorum, vel infra apices clavatos, aut saepe in ramis decussatis reticuli ipsius, oriuntur. Hinc plant* istae plerumque fronde simpliiore gaudent, quia parenchyma cellulosum quasi cogitur, ut circa densatum vasorum reticulum sese contrahat. Eādem de causā frondes persaepe incrassato cinguntur margine, qui iterum venularum ramos singulares, interdum versus marginem erepentes, cursu ulteriore arcet. Venarum idcirco distributio simplex, furcata vel pinnata nullo plane pacto occurrit in h&cce *Polypodiorum* tribu, quare imprimis a *Grammitidihus*, *Gyrnnogrammis* nee non plerisque *Aspidiis* differt. Attamen inter *Aspidia* species quaedam vasorum structuram perfecte similem exhibent, nee a *Polypodiis genuinis* — uti ingenui fatendum est — differunt, nisi quod indusio tegantur.

Quum itaque *Polypodia vera* pro venarum dispositione ordina-

mus, adhuc notatum volumus, in speciebus omnibus, quaecunque frondibus divisis instruantur, quoad venas non frondem totam, sed lobos pinnasve singulas consideratas fuisse.

1. *Polypodia* venis lateralibus nullis distinctis, sed substantiâ foliari utrinque ad costam reticulo vasorum tenero, plerumque arctissimo, percursâ. Omnia habent substantiam frondis plus, minus coriaceam, et species fronde simplice sorisque solitariis prseditae generi *Pleopeltis* HUMB. et BONPL. atque *Adenophorus* GAUDICH. nonnisi fructificationibus nudis differunt. Hûe spectant *P. neglectum*, *stenophyllum*, *superficial*, *albidosquamatum*, *varians* et *phyumatodes*.
 2. *Polypodia* venis lateralibus plus minus fortibus, rectis, parallelis, reticulo obliterate intertextis, fronde itidem coriaceâ. Quae fronde simplice sorisque inter venas laterales uniseriatis gaudent, a *Selligueis* BORY non differunt, nisi fructificationibus longe minus linearibus. Hie militare debent *P. triquetrum*, *rupestre*, *vulcanicum*, *crassinervium*, *caudiforme*, *angustum*, *laciniatum*, *palmatum*, *incurvatum*.
 3. *Polypodia*, venis lateralibus plus minus flexuosis, reticulo fortiore connexis, vel tanquam in reticulum abeuntibus. Hie praesertim species occurunt fronde membranaceâ; quae vero substantiam coriaceam exhibit, transitum ad tribum antecedentem parant, vel ob frondes dispare sectionem propriam aut____j mavis cum cl° BORY — subgenus *Drynaria* constituant. Pertinent autem hûe : *P. quercifolium*, *Willdenovii*, *Gaudichaudii*, *longissimum*, *qffine*, *nigrescens*, *petrophyum*, *diffbrme*, *commutatum*, *insigne*, *heterocarpum*, *pteropus*, *irrioides*, *spatulcefolium*, *muscefolium*, *Zippelii*.
- L* *Polypodia*. frondibus obtecto-venosis, et reticulo inter venas primarias distincto arcto. Propter fructificationum formam et magnitudinem maxime variabilem el. REINWARDT e quâdam specierum hûe spectantium genus proprium *Dipteris* condidit.

Ad bane tribum referenda *P. bicuspe* et *P. Dipteris*.

b. *Polypodia spuria.*

Adnumeramus huic sectioni, praecedente haud minus numerosae, species omnes, quae dispositione simpliciore venarum, reticulum nullum constituentium, excellunt. Quocirca accedunt ad alia quaedam genera, ut ad *Grammitides*, *Gymnogrammas* vel ad *Meniscia*, pluresque habitu cum *Aspidiis* plerisque congruunt. Exornantur in universum frondibus magis compositis, et dubium non est, aliquas saltern tribuum, in quas ipsas dispe-scimus, quondam ut genera propria segregatum iri, quibus nomina jamjam proposituri sumus.

1. *Filices* venis lateralibus teneris, parallelis, simplicibus, pinnatis, ramis, excepto infimo, simili modo ac in *Menisciis* angulato-connexis. Sori apici incrassato rami liberi infimi inseruntur, inter venas laterales solitarii vel uniseriati et, si hoc acciderit, etiam apicibus ramorum clavatorum insidentes, qui singuli sursum versus marginem directi venarum angulis insistimt. Vocamus hanc sectionem *Goniophlebium* (a pm* angulus et <fti€w* venula). *Filices* hue spectantes, *P. cuspidatum*, *P. subauriculatum* et forsitan *P. pallens*, habitu quam maxime similes sunt quibusdam *Aspidiis*, e. g. *A. biserrato*, *splendenti*, etc.
 2. **Filices* venis lateralibus simplicissimis, versus marginem apice plerumque incrassato sorum singulum gerentibus. Omnes habitu conformi insignes, ut genus proprium *Ctenopteris* (a xis pecten et imfr filix) a *Polypodiis* separari merentur. Huc recensemus *P. Celebicum*, *venulosum*, *obliquatum*, *nutans*, *mollicomum*, *fuscatum* et *subfalcatum*.
 3. *Filices* venis lateralibus furcatis, ramo uno ad apicem soro-phoro. Nulli dubitamus, quin saltern e parte ad *Grammitides* amandanda sint, tametsi frondibus magis partitis ab omnibus ad hunc usque diem notis deflectant.
- aa.) *Grammitidibus* qffines venis simplicibus, in ramo lateralibasi brevi sorophoris : *P. parvulum*, *minutum*, *tenuisectum*, *millefolium*.

bb.) *Ctenopteridibus cognatat*, at venis marginem versus furcatis, apice rami alterius sorotocis. Hue pertinet P. *papilosum*.

- 4- *Filices* venis lateralibus subpinnatis sorisque aut venarum medio aut apicibus insertis. — Species paucae, quas Flora *Javanica* profert, habitu proxime ad quaedam *Aspidia* accedunt, a quibus solummodo defectu indusii distinguuntur. Verum istae, quiarum sori venarum medio insident, optime forsan cum *Gymnogrammis jungiposse*nt; ad has, quas cl. BORY *Lastreas* vocat, spectant P. *paludosum etrufescens*. In P. *Hasseltii* vero et P. *subdigitato* sori apices venarum tenent.

DISTRIB : Specierum plus 250, quae hactenus cognitae preeprimis in terris tropicis proveniunt, partem circiter quintam Java in *insultis* que adjacentes alunt. Paucae inter ipsas Javce cum regionibus aliis communes sunt, uti P. *pkymatodes*, quod non modo in India orientali continent frequens est, sed et in insulis oceani pacifici atque procul dubio in ipsa America tropica repertum fuit. P. *quercifolium*, venusta ilia species, et Javam et Novam Hollandiam tropicam, Philippinas, Chinam, Malabar, Indiam et Zeylan inhabitat, nee minus P. *Gaudichaudii* et Willdenovii, ipsi proxime affinia, longe lateque diffusa videntur. Namque jam innotuerunt in insulis Borbonicis, quibus insuper P. *irioides* et *parvulum* cum Java communia sunt. P. *cuspidatum* denique et absque dubio plures aliae species tarn in archipelago Indico, quam in India orientali continent degere videntur.

1. POLYPODIUM NEGLECTUM.

TAB. LIV, Fig. 1.

P. frondibus (minutis) coriaceis marginatis remote crenulatis uninerviis aveniis glabris, sterilibus obovato-rotundatis, fertilibus spatulatis longius stipitatis, soris solitariis, caudice repente paleaceo-setoso. BLUME Fil Jav. p. 121. 2.

HABITAT : Speciem hanc in saitibus *Bantam* interioris legi. A *P. vacciniifolio* FISCH. fronde obtusiore, marginata, subcrenulata paruni differt.

FILICULA lepida, nana, circiter 15-pollicaris, inter muscos cortici. arborum adhaerens.

CAUDEX sat longus, repens, flexuosus, crassitie pennae columbinae minoris, teretiusculus, sordide fuscus, squamulis dense vestitus, superne frondes efferens, inferne sparsim radieulosus, radiculis tenellis, elongatis, subramosis, nigricantibus. *Squamidas* caudicem basinque stipitum investientes, parvae, arete imbricatae, lanceolato-subulatae, juniores tenuiores, rufulae, reflexo-patentes, erosio-ciliatae et insertionem versus villosae, adultiores nigro-fuscae, appressas^ glabriusculae.

FRONDES ex eodem caudice, stipitatae, dispares^ simplices^ integral, remote crenulatae, coriaceae, leviter reflexae, glabrae, supra nitidae, costâ mediâ subtus distinetiore percursae, aveniae. *Steriles* brevius stipitatae, stipite vix 3-lineari, filiformi, hinccanaliculato, basi squamuoso, sursum glabro, flavicante, J-i-pollicares, 14 poll, latae, obovatae, apice rotundatae, basi subattenuatae. *Fertiles* longissime stipitatae, stipite fere pollicari, -J poll, longae, 2-3 lin. latae, lanceolato-spatulatoe^ obtusae, subtus versus apicem sorophorae.

Sow plerumque tres utrinque paralleli eostam inter marginem cipie, rotundi, nudi, frondis cavitatibus planis inserti, post lapsum eapsularum ob pedicellos remanentes in loeis insertionis fulvo-villosi.

EXPLICATIO TABULiE.

Fig. i. POLYPODIUM neglcctum; ragn. not.

2 POLYPODIUM STENOPHYLLUM.

TAB. LV, Fig. i.

P. frondibus stipitatis linearibus obtusis basi angustatis integrerrimis coriaceis glabris aeniis margine revolutis, soris solitariis submarginalibus profunde immersis, caudice repente paleaceo-crinito. BLUME Fil. Jav. p. 124. io.

HABITAT : Locus compluribus Java interioris ad arbores et a RIIHWAUT, et a TAH HASSELT et a nobis simil cum varietatibus pluribus, quas mox indicabimus, crebro repertum. Turn propter frondicid crassam aeniam, turn propter situm sororum, qui tamen vel priuâ explicatione ne vestigium quidem squamarum peltatarum monstrant, habitu ad *Pkoppelide** HOMB. et Bonn, accedit. POLYPODIUM immerto YABL. proximum, fronde multum angustiore deflectit.

FILIX omnino habitu PLEOPELTIDIS percusses HOOK. (POLYPODIUM percussi CAV.), sed multo minor.

CATDEX in arborum truncis longissime repens, tortuosus, lignosus, tenax, crassitudine fere pennae anserinae, totus dense paleaceo-crinitus, supra frondes, infra et e lateribus radiculas emittens. *JRadiculce numerosad*, tenerimae, ramosae, passii* intricate, cineraceo-fuscae, nudiusculae. *Palece* imbricatae, appressae aut patulae, elongatae, linearis-subulatae, acuminatissimae, superne plerumque fissae, inferne integerrimae, juniores albidae et nitentes, basin versus ferrugineae et per punctum sphacelatum subpeltato-affixae, adultiores cineraceo-fuscae, demum nigrae et deciduae, omnes tenuissimae, glabrae, arctissime striatae et basin versus paululum reticulatae.

STIPITES breves, ^4-poulicares, inter paleas emersi, basi subtortuosi, supra canaliculati, infra rotundati, e fusco flavicantes, glabri.

FRONDES 2^-5-pollicares, |-^2 poll, latae, subconformes, simplices, integrae, lineares, steriles plerumque minores saepiusque spatulatae; obtusae (maxime steriles), basi attenuatae, integerrimae, revolutae, coriaceae, rigidae, glaberrimae, nitidae, costâ mediâ supra planâ, leviter sulcatâ, subitus prominulâ, rotundatâ, aveniae (lucem versus spectatae venis reticulatis teneris), fertiles ob soros paginae inferiori profunde immersos ad margines tuberculis parvis globosis obsitae.

SORI solitarii, utrinque circiter 7-15, margini approximati atque parallelâ rotundi, nudi, primum cavitatibus profundis absconditi, tandem magis magisque convexo-emergentes, ferrugineo-fuscescentes. *Capsules* numerosissimae, primum subsessiles, postea pedicellis magis magisque elongatis, peripheries longius pedicellatae quam centrales, sphaeroïdeae, basi tamen aliquantulum attenuatae, fuscae, hinc annulo lato, piano, ferrugineo, illinc dehiscentes. Inter capsulas corpuscula pauca, subsessilia vel nonnunquam longe pedicellata, clavata, ferruginea aut saturate purpurascens, quae partim capsulae nondum evolutae esse videntur. *Sporw* ovales, hinc planiusculae, illinc depressae, fuscae, laeves.

p. Frondibus obovatis rotundatis aut lanceolatis obtusiusculis.

HABITAT : A VAN HASSELT ad montem ignivomum *Pulusarie* provinciae *Bantam* lecta. Prosertim frondes steriles (1-7 poll, longae, I poll, latae) formam modo definitam exhibit, soris aliquot jam sspcius instruclac, fertiles autera magis lanceolat® sunt, fere 8-pollicares, vix 7 unc. latas.

7. Frondibus elongatis linearis-lanceolatis obtusiusculis aut obtuse acuminatis.

HABITAT : Ad *Passir-Ipi** provincial *Bui/enzory*, longitudine frondeque minus rigidâ insignis, 4-8 poll, longa, vix J poll. lata.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. 1. POLYPODIUM *stenophyllum*; magn. nat.

- a.) Fragmentum frondis sorophora? verticaliter sectum; *auct.*
- b.) Capsulae; *auct.*

3 POLYPODIUM SUPERFICIALE.

TAB. LVI, Fig. i.

P. frondibus longe stipitatis lanceolatis utrinque attenuates integerrimis subcoriaceis glabris tenuissime reticulatis supra nigro-punctatis, soris sparsis aut saepius biseriatis, stipite canaliculate* glabro, caudice repente paleaceo. BLUME *Fil. Jav.p.* ia5. 9.

HABITAT : In nemoribus montosis *Javce occidentali** et in *Moluccig*, a *P. elongate* SCHRAD., cui proxinie affine, soris superficiariis (in illo immersis), et a *P. longfronde* WALL. (HOOK. JC. *Fil. 1F*, Tah. *LXF*) frondibus uiiiime sessiibus, inio longe stipitatis distinntum.



FILIX \enusta, 1-3-pedalis et altior, arborum truncis saxisve innascens.

CAUDEX longiter reptans, lignosus, crassitie pennoc olorince, nigro-fuscus, supra dense paleaceus, subtus tomentosus, supra frondes efferens et hinc inde stipitum reliquiis onustus[^] subtus radiculosus. *Radiculce* sat breves, simplices, nigricantes, ferrugineo-hirsutae. *Palece* parvae, confertae, appressae vel patulae, plerumque ovato-lanceolatae, aeutae vel obtusiusculae, inaequaliter denticulate aut lacerae, tenuissimae, scariosoe, reticulatae, juniores pallide ferrugineae, vetustiores sordide fuscae.

FRONDES absque ordine e caudice natae, erectiusculae, longe stipitatae, stipite 4-5-pollicari, erecto, hinc rotundato, illinc canaliculate, basi nodoso et paleaceo, crassitie pennae passerinae, flavicante, glabro, 8-pollicares usque pedales, conformes, simplices, integrae, lanceolatae, acuminatae, basi attenuate et in stipitem decurrentes, integerrimae, rarius hinc inde sinuatae, margine angusto, saturatius tincto, leviter elevato vel revoluto, subcoriaceae, glabrae, supra saturatius tinctae, costâ mediâ supra planiusculâ, leviter sulcatâ, subter prominulâ, rotundatâ, utrinque glabrâ percursae, venis utrinque distinctis, tenuiter reticulatis, supra punctis nigris adspersae, subtus sorophorae.

Sow numerosi, parvuli, discreti, nunc sparsi, plerumque veluti biseriati inter venas laterales, ramulis earundem, nunquam vero apicibus productis sub-iucrassatis magis curvatis inserti, superficiarii, rotundi, nudi, ferrugineo-fusci, post capsularum lapsum pedicellis apice quidpiam incrassatis villosi.

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. 1. POLYPODIUM superciliacale; magn. nat.

POLYPODIUM ALBIDO-SQUAMATUM

TAB. LVII.

P. frondibus longe stipitatis simplicibus aut alterne pinnatis, pinnis petiolatis et frondibus simplicibus lanceolatis cuspidatis repandis membranaceis glabris tenuiter parallelo-venosis supra et ad marginem albido-squamulatis, soris solitariis, stipite rachique glabris, caudice repente paleaceo-crinito. BLUME *Fil. Jav.* •p. i32. 3j.

3. Frondibus ad marginem modo albido-squamulosis.

HABITAT : In sylvis *Java* interioris ad montium altorum radices, semper arborum truncis vetustis innascens. Varietatem a, squamis tanlummodo marginalibus aberrantem, cl. RETTAWAHDT in insula *Celebes* carpsit. Etiam viros infatigabiles KITBL et VAW HASSELT formosa hBC species non latuil; etenim fragmenta ipshu in illorum herbario hospitantur, adnotato habitaculo *Botu-Awol* ad flumen *Tjiminak* proTincie *Bantam*. P. *tomato* Sw. proximo accedit, squamis autem, quaram in UKns descriptione nulla mentio 6t, differre videtur.

FILIX venustissima, i-3-pedalis.

CAUDEX repens, lignosus, crassitie pennae anserinae, extus fuscus, densissime paleaceo-crinitus, annosior nudus, intus rufescens, supra frondiger, infra et e lateribus radiculas elongatas, simplices aut pinnatim ramosas, pallide fuscas, rufo-villosas exserens. Palece imbricatae, elongatas, ovatas, apice subito in acumen longissimum, setaceum, rigidiusculum productae, basi rotundatae vel inaequalilobatae, intus planae, extra convex®, medio fuscae, marginibus tenuioribus pallidiores et ciliato-denticulatas.

STIPITES 4-18-pollicares, erecti, basi prope caudicem incrassati, teretes aut quidquam compressi, graciles, pennae passerinae vel corvinae crassitie, laevigati.

FRONDES pinnatas, rarius simplices, longe aut longissime stipitatae, rachi glabrae. Pinnae alternae, breviter petiolatae (terminales 2 nunc sessiles, nunc subconfluentes) frondesque simplices 5-pollicares usque fere pedales, -J-i unc. latae, lanceolatae vel oblongo-lanceolatae, rarius linearis-lanceolatae, longissime stipitatae, basi oblique attenuatae, margine angusto cartilagineo cinctae, integerrimae aut leviter repandae, nunc undulatae, membranaceae, glabrae, supra nitidiusculae et maxime ad margines squamis suborbicularibus lacteis adspersae, subtus fere opacae et pallidiores, costata utrinque distincta, subtus magis prominente, venis

tenuissimis, parallelis, infra marginem furcate-anastomosantibus, per venulas reticulato-connexis. *Sqüiamulce* albae, quae ad pinnarum margines magis regulares, ceterum inordinatissima? sunt, magnitudine inaequales, punctiformes, planae, friabiles, apicibus vasorum incrassatis arete peltato-insidentes.

SORI inter venas laterales solitarii, paralleli et eostam inter marginemque intermedii, cuspidem non attingentes, primum ut puncta parvanigra, quae superiorem etiam frondis paginam quidpiam contrahendo puncta parumper elevata relinquent, demum magni, convexi, rotundi, castanei, post capsularum lapsum puneta convexiuscula fusca villosa linquentes. *Capsulce* pedicellatae, sphaeroideae, basi, praesertim juniores, aliquantulum attenuatae, fuscae, ultra | ambitus annulo articulate succincae, corpusculis interinxtae plurimis, brevius petiolatis, clavatis, glandulaceis, spongiosis ut videtur, intus substantia granulosa refertis et inde ferrugineis, *Sporce* grandes, subreniformes, fuscae, laeves, diaphanas.

EXPLICATIO TABULJE.

PoLYPOMiM albulosquamiatwn ; magn. not.

5. POLYPODIUM VARIANS.

TAB. LVIII.

P. frondibus longe stipitatis pinnatis (rarius forsitan simplicibus) coriaceis glabris, pinnis alternis petiolatis linearis-lanceolatis utrinque acuminatis subintegerrimis margine revolutis subaveniis supra albido-squamulatis, soris solitariis, stipite rachique glabris.

BLUME Fil. Jav. p. 132. 58.

HABITAT : In montosis ad radicem montis Salak prope vicum Tjitelobak, unde specimen unicum haud compleui ab indigenis mihi adlatum fuit. Praecedentis varietatem fere crediderim; distat lanien pinnis crassioribus, o-qualiter acuminatis neque subito cuspidatis, margine minus cartilagineis fortiusque revolutis. Sori etiam post lapsum vestigia pilosa non linquent.

FILIX habitu praecedentis, parasita in arboribus vegetans.

FRONS erecta, longissime stipitata, in nostro specimine pinnis modo tribus petiolatis, 9 poll, longa, 4 P^oH- l^{at}a> circumscriptione rhombeo-ovata.

STIPES pedalis, rectiusculus, pennam columbinam crassus, ecanaliculatus, laevigatus, teres, prope caudicis insertionem leviter incrassatus. Rachis stipiti

conformis, ad petiolorum insertionem parumper dilatata. *Petioli* pinnarum lateralium circiter bilineares, terminalium 5-pollicares, compresso-teretes, ecanciculati, glabri. *Pinnæ* alternae, erecto-patentes, lineari-lanceolatae, utrinque acuminate, solummodo apice obsolete serrulatae, ceteroquin integerrimae, marginibus revolutse, coriaceae, glabrae, subtus pallide virides, supra — uti species praecedens — per totam longitudinem marginibus confertim, disco sparsim albido-squamulosae, costâ utrinque prominente, venis lateralibus supra obsoletis, subtus fere oblitteratis; laterales 5-pollicares, terminalis plus 8 poll, longa, circa semiunciam lata.

SORI costam inter marginemque paralleli, per totam pinnarum longitudinem, apice excepto, dispositi, frondis substantiam quidpiam contrahentes, rotundi, turgidi, badii. *Capsulae* puncto plano-convexo insertae, pedicellatae, illis speciei praecedentis conformes, paululo saturatius color atae, corpusculis glandulaceis similibus mixtae, quorum pedicelli tamen post lapsum corpusculorum minus quam in iUA, elongati videntur.

EXPLICATIO TABULA.

POLYPODIUM *varians*; *nag. nat.*

6. POLYPODIUM PHYMATODES LINN.

P. frondibus simplicissimis trifidis pinnatifidisve subcoriaceis glabris simpliciter venosis (et obsolete arctissimeque reticulatis), laciniis lanceolatis acuminatis suboppositis, soris sparsis immersis, caudice repente paleaceo-crinito demum nudo. BL.

LINN. *Mant.* 306* — JACQ. *Collect.* IV, p. 132*. — EJUSD. *Icon. Bar.* III_f *Tab.* 65j*. — SCHKUHR JT/j/tf. *Gew. Tab.* IX (*from plantæ adultæ*), *Tab. Fill.* d. (*from triloba*, *Tab.* XVII (*planta junior*)). — SWARTZ *Sjrn. Fil.* p. 30. ^o. — WILLD. *Spec. PL* V, p. 167. 59. — KAULF. *Enum. Fil.* p. 99. — SPRENG. *Syst. Veg.* IV, p. 49- 60. (*excl. forsitan syn. P. leucatomi* Sw. et LAMK.) — BLUME *Fil. Jav.* p. 125. 16.

POLYPODIUM *alternifolium* WILLD. *Spec. PL* V, p. 168, 60.

POLYPODIUM *grossum* LANGSDORFF et FISCH. *Icon. Fil. Tab.* VIII* — WILLD. *Spec. PL* V, p. 168. 61.

P. *Scolopendria* BURM. *Flor. Ind.* p. &i. — EJUSD. *Zeyl.* p. 196. *Tab.* 86.

Filix Hemionitis phymatodes PLUKEN. *Phyt. Tab.* 404* /%• 5
(*pessima*).

PahJio Kaddk-lia MALAYIS.

HABITAT : In tota *India orientate*, *Zeylan*, insulis *Malayanis*, *Moluccanis* et *PHilippinis*, verosimiliter etiam in *Nova Hollandia* ac *America australi*, ad arbores parasitum. Frondes juniores valdopere polymorphic, adultiores constantiores. Primordiales sunt ovato-ellipticae, dein in lanceolatum transeunt, nonnunquam lobo laterali obliquo obtuso instructs vel digitato-trilobae, demum pinnatifidce laciniis 5-7, raro pluribus, elongatis, acutis vel acuminatis. In fronde itaque tarn variabili structura venarum optimum exhibit characterem ad distinguendam bane speciem. Totius enim frondis costa media in Tenas laterales simplices distribuitur, quarum singular costam laciniae cujusque referunt. Prater basce in planta vivâ ubi lumini obvertitur, atque in siccâtâ venuiae plurimse, tenerrirase, arctissime reticulatae, ramulis par vis, curvatis, subclavatis, comparent. Iconem, quum piures bonee jam extent, repetere superyacnum putavimus.

FILIX magnitudine diversissima, saepe vix-, nonnunquam plus 2-pedalis.

CAUDEX elongatus, superficiarie et flexuose repens, cylindricus, lignosus, tenax, crassitie pennae anserinae, ad latera ramis alternantibus breyissimis instructus, superne frondes vel processus parvos, quibus stipites insederant, exserens, inferne radiculosus, annosior nudiusculus et cineraceus, materie viridulâ obductus, junior aequo ac prolificaciones paleaceus. *Radiculce* sat confertae, breves, tenerae, simplices aut subpinnatipartitae, fuscae, subtomentosae. *Caudicis-processus* brevissimi, cylindrici, truncati et plani vel acetabuliformi-excavati, ubi stipites articulatim inseruntur, nudi, rarius uti caudex paleacei. *Palece* minutse, linearis-subulatae, setaceo-acuminatae, margine subciliatae[^] atro-fuscae, basi puncto obscuriore peltatae, appressae patulaeve, tenerimae, reticulatae, deciduae.

FRONDES in caudice altegae, in ramis confertae, stipitatae, statura formâque admodum variantes, absque stipite nonnunquam 4-8-pollicares, aliquot uncias latae, lanceolatae, acutae vel obtusae, simplicissimae costâ unicâ et semper steriles, aut ovatae, basi acutae, tripli- vel quintuplinerviae lobis 3 vel 5 unicostatis, ovatis aut lanceolato-oblongis, obtusis acutisve, modo steriles, modo sorophorae; vetustiores autem longissime stipitatae, absque stipite i-iⁿ-pedales, latitudine vix miifcre, basi cuneatae, superne in laciniam elongatam acuminatam extensae, laciniis lateralibus pluribus, suboppositis, erecto-patentibus, lanceolato-acuminatis, integris, rarius partitis. Frondes omnes planae, glabrae, subcoriaceae, margine angustissimo, plerumque subreflexo, costâ pallide viridi utrinque prominula, subtus convexiore, supra nitidiusculae fertilesque valde papillosae.

STIPITES erecti, frondium adultiorum i-iⁿ-pedales, reliquarum multo breviores, crassitudine culmi straminei, teretes, inferne hinc plane obsoleteque canaliculati, superne ecanaliculati, versus frondes utrinque linea vix distinctâ, elevatâ, decurrente, glaberrimi, pallide virides aut flavidii.

Sori numerosi, sparsi, profunde immersi; costae proximi plerumque ovales, ceteri magis rotundi, demum emersi, convexi, pallide fusi et subtomentosi.

Capsules parvae, sphaericae, basi quidpiam attenuate, pallide fuscae, annulo fere complete, ferrugineo, nitido, cujus articuli latere, quo capsula dehiscit, minores et pleniores, pedicellis pellucidis, teneris. Inter capsulas in speciminibus quibusdam, quorum sori nondum penitus evoluti sunt, licet capsula: multae jam disrupts sint, pedicellos -observamus elongatos subarticulatos, apicibus aliquantulum dilatatos et erosos, pellucidos, tenellos, quorum plerumque complures inter sese connati, nee non corpora solitaria, subsessilia, ovalia, sordide flavidantia sine ullo annuli vestigio; in speciminibus aliis, quorum sori plane evoluti, pedicellos istos reperire nequimus, sed telam tenerrimam, arachnoideam. Sporate subreniformes, pallidae, pellucidae, laeves.*

ft. Partitum; frondibus pinnatifidis subcoriaceis, laciniis linear-lanceolatis acutiusculis, soris solitariis. BLUME Fil. Jav. p. 126.

7. *Immarginatum;* frondibus pinnatifidis subinmembranaceis, laciniis linear-lanceolatis acuminatis, soris solitariis.

HABITAT : Varietas utraque in arboribus Java provenit. Prima figura frondis distincte marginatae P. *Bittardieri* R. BR. quam maxime similis est, altera vero frondibus submembranaceis immarginatis ad *V. pustulatum* FOIST. accedit. Attamen utraque reticulo arctiore, in illis laxo, differt.

7. POLYPODIUM TRIQUEIRUM.

TAB. LIX.

P. frondibus longe stipitatis ovato-oblongis lanceolatisve obtusiusculis vel saepius acuminatis basi attenuatis subintegerrimis marginatis rigidis glabris parallelo-venosis supra punctatis, soris biserialibus subconfluentibus, stipite canaliculate triquetro, caudice repente paleaceo-squamato. BLUME Fil. Jav. p. 124. 13.

13. Frondibus minoribus spatulato-lanceolatis obtusissimis.

HABITAT : In montibus altis Java interioris, plerumque ad arborea parasiticum, rarius ad rupes niusiosas. Est *P. rupestris* No*. proxime cognatuin, a quo imprimis squauis caudicis latis obtusis, in illo semper lineari-subulatis, distinguitur, pariterque frondis magnitudine formaque, et quidem aequo in uno eodemque caudice, valdopere variat. Ex his varietatibus unius tantum, a VAN Hasselt in montibus Karang lecta, mentionem facimus; stipes linearis, 6-pollicaris, tenuissimus, frons 1 1/2 - 2 1/2 poll. longa, 1/2 - 1/3 poll. lata. Varietatem vero aliam, qua specie differre videtur, infra diligentius consideraturi sumos.

FILIX 6-pollicaris-pedalis et altior.

CAUDEX longiter reptans, crassitie pennae anserinoe, ligiosus, pallide fuscus, junior totus paleaceo-squamatus, annosior nudus, supra frondes, infra radiculas

proferens. *Radiculce* sat numerosae, tenerae, plerumque pinnato-ramosae, fuscac aut ferrugineo-hirsutulae. *Palece* i vel fere 3 lin. longac, i lin. latac, laxe imbricate, ellipticae aut deltoideae, obtusae, erosae aut lacerae, pallide ochraceae, puncto fusco peltate, membranaceae, reticulate, vetustiores deciduae.

Frondes 4-7-pollicares, ij ad fere 3 unc. latae, integrae, stipitate, ovato-oblongae vel ellipticae vel lanceolate : steriles plerumque obtusae vel obtusissimae; fertiles nunc acuminate, nunc plane conformes, basi acutae et in stipitem decurrentes, subintegerrimae aut leviter repandae, marginatae, margine angusto, pallidiore, saepius revoluto, coriaceae, rigidae, glaberrimae, nitidiusculae, utrinque, maxime supra, punctis nigris adspersae, costâ mediâ supra sulcatâ, subtus prominulâ, subtriquetra, venis lateralibus parallels, subtus distinctioribus.

STIPITES brevi caudicis processui impositi ibidemque tumiduli et fasciculo palearum vallati, erectiusculi, longi aut longissimi, 2^-7-pollicares, sursum triquetri, glaberrimi, flavicantes vel glaucescentes.

SORI inter venas frondis fertilis plerumque paullulo angustioris longiusque stipitatae biseriati, inter venas inferiores modo sparsi, totam fere frondem obtengentes, profundius immersi, nunc discreti, nunc approximati, nunc fere confluentes, badii, denique puncta nigra fusco-subtomentosa magna relinquentes.

y. *Rhomboideum*; frondibus rhomboideo-oblongis obtusis subcoriaceis vix marginatis, stipite teretiusculo.

POLYPODIUM rhomboideum BLUME FiL Jew. p. 124. 12.

HABITAT: Specimen nnicum, absqne dubio in *Moluccis* repertum, ex herbario REINWALDITATIO hoc nomine acreimus. Notis indicatis, paieis magis ovato-lanceolatis, minus obtusis frondisque substantiâ tenuiore a supra descripto ralde diversiu videtur. Ast comparatis speciminibus nunicrosis *P. triquetri*, transitus manifesti ad hanc varietatom patent.

EXPLICATIO TABULA.

POLYPODIUM triquetrum; magn. not.

8. POLYPODIUM RUPESIRE.

TAB. LV, Fig. 2 et TAB. LX, Fig. 1, 2, 3.

P. frondibus longe stipitatis oblongo-lanceolatis acuminatis basi subcuneatis subintegerrimis marginatis coriaceis glabris parallelo-venosis, soris biserialibus, stipite canaliculato superne tricquetro, caudice repente paleaceo. BLUME *Enum. FiL Jav.* p. 124. 11.

HABITAT : Hanc speciem jugis superioribus montis ignivomi *Gedi* ad rapes basalticas reperimus, pluresque ipsius varietates ex herbario HASSKIIAITO possidenius, in altioribus *Java occidentalU* montibus lcttas. Qua? quuni, froadis etformæt magnitudine admodum discrepent, eas infra accuratius conaideraturiconibusqueillustraturi sumus. Una ex ipsis sociis jam frondem pinnato-partitam exhibet, prouti etiam nonnunquam *P. repent* S WAITS, cui nostra species multum affinis, stipitum tamen longitudine, fronde longe minore et caudice dense paleaceo differt. *P. adtperto* NOB. quoque assimilis distinguitur venis lateralibus inagis prominulis rectâque versus marginem erepentibus, in illo obsoletis et fleiuosis.

FILIX plerumque 6-pollicaris, raro plus pedem longa.

- CAUDEX repens, parum ramosus, tignosus, crassitie pennae corvinae et ultra, nigro-fuscus, paleaceo-crinitus, inferne sparsim radiculosus, annosior subnudus reliquiisve palearum remote punctatus. *Radicuhe* baud numerosae, simplices pinnataeve, tenerae, fuscae, nudae, rarius ferrugineo tomentosae. *Paleas* imbricatae, appressae vel patentes, elongatae, linearis-subulatae, acuminatissimae, leviter denticulatae, tenuissimae, parum reticulatae, juniores ochraceae et per punctum ferrugineum affixae, adultiores sordide fuscae, deciduae.

FRONDES inter sese $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ unc. distantes, erectiusculae vel oblique assurgententes, longe aut longissime stipitatae, 4 2-7\$ poU- longae, 1-2 unc. latae et latiores, conformes, simplices, integrae, oblongo-lanceolatae, acuminatae, basi subcuneatae, integrimae vel leviter repandae, margine angusto, reflexo, calloso, ceterum planae, coriaceae, glabrae, nitidae, oculis armatis utrinque punctis sparsis nigris, costâ supra sulcatâ, subtus carinatâ, venis parallelis, subtus distinctioribus, siccatae inter venas obsolete reticulatae.

STIPITES recti vel adscendentes, i $\frac{1}{2}$ -4-pollicares et ultra, basi per nodum s. articulum paleaceum caudici impositi, sursum glabri, laevigati, graciles, crassitie pennae passerinae, semiteretes, versus frondem trigoni, hinc obsoleto canaliculati, flavicantes.

SORI frondis dimidium superius tenentes, subirregulariter biseriati, sat approximati, modice immersi, parvi, rotundi, saturate fusti, demum puncta ferrugineo-tomentosa linquentes.

3. Frondibus lanceolatis utrinque acuminatis.

HABITAT • Ad *Panaaranghu*. — Frons angustior, utrinque acuminata, subtus fere tota inter venas soñs bicristatis vix non confluentibus tecta. Longitudo stipitum 4"7 PoU., frondis 5-8 poll.; hujus latitudē $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ poll.

r. Frondibus angusto-lanceolatis, utrinque acuminatis.

HABITAT • In montosis altis provincia3 *Bantam*. Stipes circa a-pollicans, frons 4 unc. longa, June, lata; sori totam fere frondis paginani inferiorem operiunt, series autem singulos soris modo a-3 discretū constant.

c Frondibus lanceolatis utrinque acuminatis aut apice passim obtusis.

HABITAT : Gum pracoedentc, eui parumpcr differt. Stipes i ^-2-pollicaris, frons 2~4Hpollicaris, £-f unc. lain. Sori dimidium superius frondis occupant, serie unâquâque ex soris 2, raro tribus compositâ.

e. Frondibus elongato-lanceolatis, sterilibus passim dilatatis subpinnatifidis.

HABITAT : Item a YAH HASSELT in *Bantam* interiori detecta. Magnitudinc omnibus pracoedentibus superior, et nonnunquam, per inostrositatem — uti videtur — fronde sterili latissimâ, circumscriptione ovalâ, laciniis. 5 ovato-lanceolatis, acuminatis, costatis, parallelo-venosis. Fertilis quoad situin sororum a reiquis non aberrat. Stipites 6-pollicares, in fronde partitâ pedales et angulati; frons circiter 10-pollicaris, 2 poll, lata; partita pedalis et seque lata.

EXPLICATIO TABULARUM.

TAB. LV.

Fig. 2. POLYPODIUM rupestre; magn. nat.

TAB. LX.

Fig. 1. Ejusdem var. 0.

Fig. 2. Var. y.

*Fig. 3. Var. **

9. POLYPODIUM VULCANICUM.

TAB. LVI, Fig. 2.

P. frondibus stipitatis oblongis lanceolatisve utrinque acutis vel apice obtusis subrepandis marginatis coriaceis glabris parallelo-venosis, fertilibus angustioribus longissime stipitatis, soris uniserialibus dein confluentibus, caudice repente paleaceo. BLUME
Fil. Jav.p. 122. 4-

HABITAT : Nomine, quo speciem hancce vocavimus, baud indig^a videtur, quum prope crateres adhuc sscientes vel vapores sulfureos exhalantes habitat, e. g. in monte Gedé, circa 10,000 ped. altu>; etiam in monte ignivomo *Ttrnale** inter saxa ejecta a cl° RIBIHWAIID lecta. E speciebus notis *Voixtomo Kterophyllo* Linn, proxima, magnitudine frondium stipitumque admodum variat. Pariter caudicis squamae none obtusae, nunc acuta: sunt, et postquam son'confluerunt, planta nostra SBLLICDU *Feet* imillima est, fronde modo multo minore.

FILIX terrestris, 4-io-pollicaris.

GAUDEX superficiarie repens, tortuosus, teretusculus, crassitie fere penna? anserinae, cineraceo-fuscus, intus flavicans, junior dense paleaceus, annosior hinc inde nudiusculus, superne frondes efferens, stipitumque reliquiis ornatus,

inferne et e lateribus radiculosus. *Radiculos* rarae, subsimplices, juniores fulvo-villosae, adultiores nudae, nigricantes. *Reliquiae* stipitum cylindris parvis truncatis similes, paleaceae aut nudiusculae. *Palece* tern caudicis quam baseos stipitum ellipticae, obtusae, rarius ovato-lanceolatae et acuminatae, integerrimae, tenuissime reticulatae, puncto fusco-peltatae, juniores pallide ochraceae, arete imbricatse, adultiores fuscae, squarrosae, deciduae.

FRONDES ex eodem caudice, longe stipitatae, simplices, integrae, elliptico-oblongae vel lanceolatae, utrinque acutae vel apice obtusae, subrepandae aut remote crenulatae, margine cartilagineo, plerumque leviter revoluto, coriaceae, glabrae, nitidiusculae, supra nonnunquam nigro-punctatae, costâ mediâ supra planâ et subcanaliculatâ, subtus fortiter prominente, rotundatâ, glabra, venis lateralibus subtus distinctioribus, parallelis. *Steriles* plerumque latiores, stipite i⁴-4-pollicari, recto aut tortuoso, subangulato, gracili, basi paleaceo, sursum glabro, 2-4-p^oUi^{cares} 5^o² P^oU- l^{atae*} *Fertiles* angustiores, longissime stipitatae, stipite 4-6-pollicari, 3-4 poll, longae, i-f poll, latae, subtus fructificantes.

SORI maximi, rotundi vel subovales, admodum convexi, frondem totam subtus tegentes, locis nigricantibus inserti, e ferrugineo in badium abeentes, inter venas parallelo-seriati, seriebus simplicibus, quarum superiores et inferiores e soris 1-2, mediae vero plerumque e tribus constant. *Capsules* obovatae, fuscae, annulo incompleto, saturate fusco, nitido, articulis crassissimis, pedicellis elongatis, teneris, pallide fuscis. *Sporce* fuscae, subreniformes, et — uti videtur — punctatae.

• EXPLICATIO TABULJE.

Fig. 2. POLYPODIUM vulcanicum; magn. nat.

10. POLYPODIUM CRASSINERVIA.

TAB. LXI.

P. frondibus longe stipitatis oblongis acuminatis basi acutis marginatis subrepando-crenulatis coriaceis glabris parallelo-venosis supra albido-scpiamulatis, soris uniserialibus, stipite inferne angulato, caudice repente paleaceo-crinito. BLUME *Fil. Jav. p. i4-*

13. Frondibus minoribus brevius stipitatis.

HABITAT : Cl. RXIHWARDT speciem hanc primnm in *Moluccii* detexit, et nosmet varietatem in *Javd oecidental* interiore legimus. Varietas ⁹ nonnisi fironde minori, circa 6-8-pollicari, i⁴-a poll. Iat4, stipitibusque i-a poll, longis recedit. Quâre ipsius in descriptione nostrâ fusioe nullam ainplius mentionem facturi adhuc observatum

volumus, squamis albas, in superiore frondis paginâ obvias, **soliimmodo istis locis reperiri**, ubi vcnulas teneras vix conspicuas inrassato-terminatas videmus. Incrassationes hasce vclut peltato-obtegentes secretioni pcculiari nttribuendu* esse videntur, quippe qua; in frondibus junioribus minimus, in adultis vrco majuscum; sint. Squanis eaudiceque paleaceo-rrinito planta nostra a P. repente Sw., **frondeque** crenulata longius stipitata a P. crasa if olio ~~Linnf.~~ abunde differt.

FILIX venustissima, pedalis vel bipedal is, in arboribus parasilica.

GADEX repens, valde flexuosus, lignosus, crassitie pennae olorinx et crassior, cylindratus, intus solidus et rufescens, extus totus paleaceo-crinitus, supra frondes proferens, passim stipitum vetustiorum reliquis vallatus, infra et e lateribus radiculosus. *Rculiculce fibrosae, subramosa?*, atro-fusca?, hinc inde tomentosae. *Palece* arete imbricatac, linearis-subulatac, in acumen setaceum attenuate, subintegerrimae, membranacca[^] iuscentes, marginibus tenuioribus ferrugineae.

FRONDES longe stipitatae, stipitibus 5-7-pollicaribus, caudicis processui brevi cylindrico paleaceo-crinito impositis, erectis, crassitudine pennae coryinae, subangulatis, glaberrimis, i-iij pedales, 3-4 unc. latae, conformes, simplices, integrae, oblongo-lancicolatx, acuminatac, basi cuneatae, marginatae, margine cartilagineo revoluto repando-crenulatac, coriaceae, rigidae, glaberrimae, supra nitidae squamulisque subrotundis planis niveis adspersae, costâ mediâ utrinque prominula, supra plano-depress&, subtus rotundatâ vel angulatâ, venis numerosis, parallelis, subtus distinctissimis percursx\

SORI seriebus simplicibus inter frondis venas ordinati, discreti, semiimmersi, nodulos in frondis paginâ oppositâ formantes, initio atomis nigris similes, emersi rotundati, convexi, ferrugineo-fusci.

EXPLICATIO TABULA.

POLYPODIUM *crassitiervium*; niagn. nut.

II POLYPODIUM CAUDIFORME.

TAB. LIV, Fig. 2.

P. frondibus longissime stipitatis coriaceis subrepandis glabris parallelo-venosis, sterilibus ovato-oblongis acuminatis basi acutis, fertilibus elongatis linearis-lanceolatis acuminatissimis, soris infimis transversim uniseriatis, ultimis solitariis, caudice repente paleaceo-crinito. BLUME Fil. Jav. p. 122. 3.

POLYPODIUM.

„r

HABITAT : Primum a v|* REIKWARDT in sylvis insulic *Celebes*, a nobis in nioilosis *Jan** occidental is involutiina. In berbario REIKWARTIANO tarn nomine *P. serpentis* LWH. , quam *P. cauduti* R*DT. hospitalur. Recrva P. *Merpenti* Li**. (PLUM. Tab. Iai) habitu multum assimile, superibus tamen multo longioribus, fimbriis coriacea erecta soris ejus inferioribus plorumbque venis transversis {ominato-interjertis (in *P. serpenh* ,y|*. semper solitariis) diffl-rt. Quum denominatio *P. cauduti* jam alii spwipi a KALLFISS indita fuisset, ipsam mutare debet.

FILIX formosissima, i-i^pedalis et altior, in arboribus parasiia.

CAUDEX longe repens, pennâ corvinâ crassior, c^lindricus, lirmus, junior dense paleaceus, annosior hinc inde denudatus, cineraceo-fuscus, superne frondes exserens et hinc inde reliquias stipitum notatus, inferne et c lateribus passim radiculosus. *Radiculos* numerosae, tenerac, pinnalo-ramosac, fusculac, juniorcs ferrugineo-villosae, vetustiores nuda. *Reliquiae stipitum* brevissimae, cylindris truncatis similes, fuscae, squamis residuis vestitae. *Paleas* et eaudieem et stipitum basin investientes, imbricatae, stipitum quidpiam patentes, ovato-lanceolata^ acuminatissimae, integerrimac vel obsolete erosa}, punclo sphacelato peltate, membranaceae, tenuissime reticulatae, juniores laete ochracea; marginibus pallidiores, adultiores rufo-fuscse, deciduae.

STIPITES elongati, 4-8-pollicares, erectiusculi, graciles, crassitale vix penna* passerine, teretes, hinc canaliculati, ad insertionem paleis obsessi, ceterum glaberrimi.

FRONDES dispares, erectae, ex eodem caudice, longe aut longissime slipilata?, simplices, coriaceae, glaberrimae, subtus nitidiores, costi. media supra planiusculâ, subtus prominulâ et leviter sulcalâ, parallelo-venosa?, inter venas subtiliter reticulatac, ramis venularum curvatis, ad apicem incrassatis. *Sterile** G-8-pollicares, 2-2^ unc. latae, ovato-oblongaL', acuminataj, basi acutae et subdecurrentes, integrae, rarius ex monstrositate 3-5-cuspidata;, subrepandac, margine cartilagineo cinctx\ *Fertiles* longius stipitatae, longiorcs et multo angustiores, tenuiores magisque diaphaiuc quam steriles, y-pollicares-pedales et ultra, 31in.-i poll, latae, lineari-lancollata?, utrinque angustata;, repanda*, inter venas sorophora?.

SORI magni, rotundi vel ovales, convexi, inter venas laterales paralleli, inferiores geminati, superiores solitarii, rarius omnes solitarii, discreti aut sensim confluentes, minime apieibus venularum incrassatis, sed ramis quidpiam sphaccatis irregulari-angulatis inter venas connexis inserti, ferrugineo-lusci. *Capsulw* obovatrc, turgide lenticulares, fuscae, aunculo diaphano, aureo-flavo, pedicellis longitudine valdopere inaequalibus, parlim vix capsularum longiludine, parlim sesqui vel duplo longioribus. Inter capsules corpuseula nonnulla clavala, subsessilia^ fusca. *Sptmv* majuscule, ovales vel sili&r<Miiformes.

EXPLICACION) TABULA.

Fig. a. POLYPodium emidiforme; wagn. nat.

,2 POLYPODIUM ANGUSTATUM.

TAB. LXIL

P. fronde pinnate, pinnis remotis alternis sessilibus lanceolatis acuminatissimis remote serrulatis basi attenuatis membranaceis glabris, soris solitariis, stipite elongato canaliculato rachique glabris, caudice repente paleaceo-squamoso. BLUME *Fil. Jav.* p. 155. 4o.

HABITAT : Ad radioera *montis Salak* et in provincia interiori *Bantam*, v. g. ad cataractam *Sairan*, unde YAW HASSELT specimina numerosa misit.— Hinc speciei praecedenti accedit, illinc *P. palmalo* NOB., cuius laciniae tamen s. pinnae omnes adnatae, latere externo occurrentes (in *P. angustalo* modo superiores) et insimul latiores sunt. Reticulatio item inter venas laterales in *P. angustato* longe tenerior est, quam in *P. palmafo*. Ceterum hece species haud confundenda est cum *P. angutatato* Sw. quod ad genus *Nephrolepis* pertinet.

FILIX i-22-pedalis, habitu praecedentis.

GATIDEX repens, lignosus, crassitate pennae anserinae vel olorinoe, superne frondes, inferne et e lateribus radiculas agens, fuscus, junior totus paleaceus, annosior nudiusculus stipitumque reliquiis hinc inde nodosus. *Radiculce* numerosae, pinnato-ramosae, passim intricatae, fuscae, hinc inde ferrugineo-villosae. *Stipitum reliquiae* brevissimae, obconicae vel disciformes, supra vix excavatae, squamularum reliquiis circumsessae. *Palece* majusculae, dense imbricatae, appressiusculae, rectae vel obliquae, ovato-lanceolatae, setaceo-cuspidatae, erosae, basi medioque crassiores et fusci, ceterum tenuissimae, pallide ochraceae, vetustiores oyatae, obtusae, fuscae, demum deciduae.

FRONDES erectae, approximatae, longe aut longissime stipitatae, 7-pollicares vel pedales, 6-11 unc. latae, circumscriptione rhombeae, pinnatae, membranaceae, glabrae, pallide virides, nitidiusculae, *Pinne* remotae, alternae, erecto-patentes, 3-7 pariacum impari, sessiles, 4"7-po^{caries}J à⁻¹! poll, latae, linear-lanceolatae vel lanceolatae, acuminatissimae vel cuspidatae, basi attenuatae, remote et obsolete serrulatae, costâ tenui, subtus magis prominulâ, venis lateralibus parallelis, alternis aut suboppositis > margin em non attingentibus, venulis tenerrimis reticulatis; superiores quidpiam decrescentes et saepe decurrentes, terminalis nonnunquam bipartita.

STIPITES elongati, 6-pollicares vel if pedales, pennae corvinæ vel anserinae crassitudine, basi processui brevi caudicis articulatum impositi et nonnunquam

curvati, dein recti, obsolete tricorni, supra canaliculati, flavo-virides, glaberrimi. Rachis stipiti conformis.

SORI totam paginam inferiorem pinnarum occupantes, solitarii inter venas laterales, costae nunc paullulo proximiores quam margini, mine exaete intermedii, primum punctiformes, demum majusculi, juniores flavescentes, adulti fusti. *Capsules* longe (minus evolutae brevius) pedicellate[^] sphaeroideae, alatere, quo dehiscunt, saepe impressae, pallide fuscae, annulo ferrugineo succinctae, praesertim sororum minorum corpusculis aliquot longius pedicellatis clavatis fuscis mixtae.

EXPLIGATIO TABULJE.

POLYVODWM angustatum ; ragn. not.

13 POLYPODIUM LACNIATUM.

TAB. LXIII.

P. frondibus longe stipitatis profunde pinnatifidis basi sinu excisis membranaceis glabris, laciniis lanceolatis acuminatissimis suboppositis repandis, soris solitariis immersis, stipite supra canaliculato glabro. BLUME/Y/. Jav.p. 131. 34-

HABITAT : VAN HASSILT speciem hancce in *Joed oecidenlali*, altitudine 4-5000 ped. supra mare, detexit, sed nil adnotavit, nisi quod filix terrestris sit. Caudex nobis ignotus, pro affinitato cum aliis congeneribus, repens ease videtur, ut in *P. aureo* Linn. A planta hacce *American** discedit nostra laciniis repandis, a *P. palmafo* NOB. vcro fronde latiore basique sinuprofundo excisa, laciniis suboppositis sorisque immedia.

FILIX circiter bipedalis, h[^]bitu omnino *P. aurei* LINN.

FRONS longe stipitata, stipite erecto, 7-10-pollicari, crassitie pennae corvinae, hinc leviter canaliculato, illinc rotundato, laeigato, 1-15-pedalis, fere aequa lata, circumscriptio sagittato-cordata, profunde pinnatifida, ad basin sinu acuto excisa, membranacea, glabra, subtus pallide glauca, rachi supra plana aut obsolete canaliculata, subtus fortius prominula, rotundata, glaberrima. Lacinice 13-27, suboppositae, 5-8-pollicares, vix 1 poll, latre, linear-lanceolatae, acuminatisimae, basi sinu rotundato vel obtuso inter se disjunctae, margine repandae, costae media subtus distinction, venis lateralibus parallelis, marginem fere attingentibus, per venulas teneriores reticulato-connexis, infimae 2 deflexae, intermedia; horizontales, superiores erecto-patentes, terminalis erecta.

SORI inter venas laterales solitarii, medium plerumque laciniarum tenentes, rarius ad apicem, nunquam ad basin perlingentes, immersi, quâre pagina frondis superior nodulis orbicularibus in medio depressis adspersa. *Capsulce* receptaculo convexiusculo in centro cujusque cavitatis frondis acervatim imposita, ellipsoïdex, fuscae, annulo nitido obscuriore, pedicellis longis, cellulari-articulatis, apice dilatalis ibique magis diaphanis. Setae inter capsulas numerosa, pedicellis modo descriptis, a quibus exortae videntur, conformes et corpuscula nonnulla clavata, saturate fusca, pedicellis longis articulatis. *Spotw* oblonga, vix reniforme[^] flavae, laeves, diaphanae.

EXPLICATTO TABULAE.

POLYPODIUM laciniatum; | magn. not.
Fig. i. Laciniâ frondiſ; *magn. nat.*
Fig. a. Pales.)
Fig. 3. Capsulac. } *auct.*

14 POLYPODIUM PALMATUM.

TAB. LXIV.

P. frondiſ longissime stipitatis profunde tripartitis aut pinna-tifidis basi cuneatis membranaceis glabris, laciniis linear-lanceo-latis¹ acuminatissimis alternis remote serrulatis, soris solitariis, stipite canaliculato glabro, caudicē repente paleaceo. BLUME *Fit.* Jav. p. 131. 55.

HABITAT : In sylvis udis nltioribus *Java occiduw* ad arbores parasiticum, ubi etiam VAN HASSELT nonnulla speci-mina legit. RBINWARDT autem speciem candem in sylvis montis Moluccani *Tidore* reperit. **P. deeumano** WILLD. (*Spec. PL Vsp.* 170. G5) proxiina soris solitariis differt.

FILIX pedalis vel fere bipedalis.

CAUDEX longiter repens, pennâ corvinâ crassior, lignosus, pallide fuscus, junior totus paleaceus, adulior hinc inde nudiusculus, supra frondes, infra radiculas raras breves fuscescentes emittens. *Palece* laxe imbricate, ovato-lanceolatae, longe acuminatae, repandæ vel integerrimæ, puncto fusco basali subpeltatae, tenues, scariosæ, reticulatae?, juniores pallide ochraceæ, vetuste fuscescentes, decidua.

FHONUKS lonpissimc stipilat;r, stjpit 7- i3-|>ol]icart, graci3i, rrnssilic fili mnjoris vel jirnnji¹ oohnnbinae, recto rei orouato, basi proceessiii caudicis brcvi p-tl^{saceo} inipisilo, tereli, supra Icvitur canaliculiin, vindi-fnsoesoente, laevigalo; oieum-scriplione obioiigo-oyajes, G-:o-pollicares, §-6 J⁰"- Inlsej profimdp tripartite! vcl piimaliulx, basi ciincata;, inembraifftca', glabrac, nqira nitidee, rooli O«tä-
quu subtiis distiiLeUoi!>ns, s^{luj} <^{r1,will111}> vonü liityralibus ntruupc distilit-tis.
parallels, marRincm noti ntiiigcitilius, ptr vtnulas leneriores rertioales **modo**
Irre codent, quo in *Hem'sciis*, reliculalo-connexis, *Lacinix* 5-7-pollicares, \ -i [mil.
lain; altci;e, erecto-palentes, liiieari-laiiceobUi¹ s;rpiiMjiic sutiU¹ato-iiin ^{rva},
ncuminali&simo;. t>nsi oblique dwcurrentes, jilanar, sitcilati; rust-ifscL*lit*<>.

SOBI inter venas laterales coslam inter nimirumque medii, solitarji, vemila-
en im'ulo vena; Intraclis iilerno in'eriore adscondeuli insideuLes, fatci. *Qppsmte*
copiosissim^, punclo paullulo edition oontracto inswUe, obhvatae, tur^tdn **HIMI-**
liculares, fusca; laxo relieulaUt, annulo ohsc:iirtsin)o, iuconpleto, pcilicllis
Hemgalti, cpios vas obstrum percirrit. inter capsules h-urent petioli iongij
spiralcs, arLiculali cleorpuscula iniina, cla-vata, apice **cnuiiora**, **ruffi**, inferno
diaphana. *Spora*; ovalis.

EX1M.JCA IK) TABtJLiJB.

Polyodium palmatum avj magu, rtitt.

Fig. 1. Fragmentum fromiit, Miris ilijuni **tdornalam**; <un-t.
Fig. a. Capsule; valde auct.

5 POLYPODIUM NCURVATUM

TAB. LXV.

P. li-ontibus disparibus **coriacqis marginatisglabris** \cnis anasto-
inosntildis. steriJibus luislalis nirins **pinnatifidts remote crenu-**
laLis. laciiis ovalis antminatis, I'crtibus Inn^issiiit.* stiphatis
profunde piimatilidis, lariniis **lippearibus** acumnialis intcgciTimis
oppoafcis marine inflcxis, sorissolilaria immersis, cam lite **i^eote**
paleaoeo. BLDME FU. Jav. />• i a& 17.

Flix sujierba, i-a-pedolis & t allinr.

CAUD K* repens, li;ii<isii>, crassitie \i\ pennsc Snserina;, higro fuscu, palas

ceus, adultior nudiusculus, supra processus dispersos subcylindricos paleis obvolutosproferens, inferne radiculosus. *nadiculce* numerosae, elongatae, ramosae, fuscantes, rufulo-hirsutae. *Palece* arete imbricatae, adpressae, ovato-lanceolatae, acuminatae, integerrimae vel erosae, membranaceae, pallide ochraceae, puncto basali sphacelate peltatae, arctissime reticulatae, caudicis vetustioris albidae, deciduae, processuum maxima, bilineares et longiores, oblongo-lanceolatae.

FRONDES dispares, coriaceae[^] calloso-marginatae, nitidae, glabrae, costâ mediâ subtus elevatiyjp, venisque parallelism ibidem distinctioribus[^] longissime stipitax[^]

STIPITES sterilium 7-14-pollicares, fertilium adhuc longiores, i5-20-pollicares, processibus caudicis impositi, teretusculi aut leviter complanati, erecti vel arcuato-adscendentis, crassitate pennae corvinae, glandicolores, glaberrimi, laeves.

FRONDES steriles simplices, circumscriptione subcordato-triangulares, hastatae, rarius irregulari-subpinnatifidae, lobis oblongo-lanceolatis, acutis vel acuminatis, remote crenulatis, intermedio maximo[^] basi subcuneatae, quidpiam decurrentes, 5-g-pollicares, 6-11 unc. latae. Fertiles profunde pinnatifidae vel inferne pinnatae, sterilibus majores et tenuiores, circumscriptione ovatae. Lacinice circiter 7-11, inferiores longissimae, superiores decrescentes et nonnunquam abortientes, oppositae, adnatae, in rachin oblique decurrentes, erecto-patentes, elongato-lineares, acuminatae, integerrimae, margine demum inflexae, supra per to tarn longitudinem immersione sororum tuberculatae.

SORI magni, marginem inter costamque medium in serie simplice longitudinali, inter venas laterales solitarii, saccato-immersi, inferiores terminalesque ovales aut t)blongi? intermedii [^]ubrotundi, ab initio saturate fusci, denique ferruginei cavitatemque frondis profundissimam explentes *Capsulce* elliptica?, turgide lenticulari-compressae, fuscae, annulo pellucidissimo, aureo-flavo, sub-completo, pedicellis teneris celluloso-articulatis suffultae, corpusculis mixtatis parvis, subpedicellatis, fuscis, quorum saturatius tincta et latere altero reniformi-inflexa capsulas juniores sese praestant. Sporee fuscae, ovales aut hinc depresso-susculae, locves, intus granulosoe.

EXPLICATIO TABULiE.

PoT.YPomuM incur'titwn; inagn. not.