玻利维亚(多民族国)

2016 年人口总数: 10888000 2016 年死亡总数: 71000




21% 其它非传染性疾病 ▶ 22% 传染性、孕产妇、 围产期和营养疾患





到2025年,实施所有世卫组织的"最合算措施"可拯救 13800 条生命										
		设定国家目标		数据年	男性	女性	合计			
死亡率*										
	非传染性疾病导致的过 早死亡	√	非传染病疾病死亡总数	2016	23500	22400	45900			
			30至70岁过早死亡风险(%)	2016	18	17	17			
<u>r</u>	自杀死亡率	-	自杀死亡率 (毎 100 000 人口)	2016	-	-	12			
危险因素										
	有害使用酒精	X	人均酒精总消费量, 15岁以上成人 (纯酒精立升数)	2016	8	2	5			
K	缺乏体力活动	X	缺乏体力活动, 18岁以上成人(%)	2016						
	盐/钠摄入量	X	平均盐摄入量, 20岁以上成人(克/天)	2010	10	9	9			
\odot	烟草使用	X	现在吸烟, 15岁以上成人(%)	2016						
	高血压	X	高血压, 18岁以上成人(%)	2015	17	14	15			
į.	糖尿病	X	高血糖, 18岁以上成人(%)	2014	6	8	7			
Z.	肥胖	X	肥胖, 18岁以上成人(%)	2016	13	24	19			
		^	肥胖, 10-19岁青少年(%)	2016	8	7	8			
%	空气污染	-	超过世卫组织指南推荐的PM2.5年均浓度(乘以倍数)	2016	-	-	2			
备	家庭空气污染	-	主要依靠污染燃料和科技的人口(%)	2016	-	-	20			







国家系统应对								
		X	高风险或患有心血管疾病的的人口比例	-				
	药物治疗预防心脏病发作		高危人群接受药物治疗或咨询以预防心脏病发作和中风的比例	-				
	和中风		初级保健中心报告提供心血管疾病危险分层的比例	2017	低于25%			
			已报告至少50%的卫生机构使用心血管疾病指南	2017	否			
	基本非传染疾病药物和基 本技术来治疗主要非传	X	报告为"一般可得" 的非传染疾病基本药物数量	2017	10中有0			
	染疾病		报告为"一般可得" 的非传染疾病基本技术数量	2017	6中有4			