



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΙΟ (Tc-99m)



Το ραντεβού σας είναι :

Σε συνεννόηση με τον ενδοκρινολόγο και εφόσον η εξέταση **δεν** γίνεται «*υπό αγωγή*»
πρέπει να γίνει:

- Διακοπή T4 για τουλάχιστον (4) τέσσερις εβδομάδες.
- Διακοπή T3 για τουλάχιστον (2) δύο εβδομάδες.

Δεν πρέπει να έχουν ληφθεί **ιωδιούχα σκευάσματα** για περίοδο (2) δύο μηνών:

- ενδοφλεβίως (διάφορα σκιαγραφικά),
- από το στόμα (Angoron, αντιβηχικά, κλπ)
- και από το δέρμα (βάμμα ιωδίου, Betadine, κλπ)

Να έχετε μαζί σας ΟΛΕΣ τις σχετικές εξετάσεις: Προηγούμενο Σπινθηρογράφημα

Θυρεοειδούς αδένα, Υπέρηχο Θυρεοειδούς αδένα, Ορμονολογικές εξετάσεις.