



ACTA BOTANICA VENEZUELICA

Acta Botánica Venezulica

Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser

perezsi@ucv.ve

ISSN (Versión impresa): 0084-5906

VENEZUELA

2007

Fred W. Stauffer / Lizbeth Pappaterra de Stauffer / Rodrigo Duno de Stefano / Ricarda

Riina / Giovannina Orsini / Otto Huber

TIPOS DE MONOCOTYLEDONAE DEPOSITADOS EN EL HERBARIO
NACIONALDE VENEZUELA (VEN)

Acta Botánica Venezulica, año/vol. 30, número 001

Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser

Caracas, Venezuela

pp. 43-97

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México

<http://redalyc.uaemex.mx>



TIPOS DE MONOCOTYLEDONAE DEPOSITADOS EN EL HERBARIO NACIONAL DE VENEZUELA (VEN)

Monocotyledonae types deposited in Herbario Nacional de Venezuela (VEN)

Fred W. STAUFFER¹, Lizbeth PAPPATERRA de STAUFFER², Rodrigo DUNO de STEFANO³, Ricarda RIINA⁴, Giovannina ORSINI⁵, Otto HUBER⁶

¹ Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Case postale 60, CH-1292 Chambésy/Genève, Suisse
fred.stauffer@ville-ge.ch

² Chemin de la Gradelle 22, 1224 Chene-Bougeries, Suiza
stauffer.pappa@bluewin.ch

³ Herbario, Centro de Investigación Científica Yucatán, A. C.,
Calle 43 N° 130, Colonia Chuburná de Hidalgo,
97200 Mérida, Yucatán, México
roduno@cicy.mx

⁴ Botany Department, University of Wisconsin, 132 Birge Hall,
430 Lincoln Drive, Madison, Wisconsin 53706-1381, USA
rgrinaoliva@wisc.edu

⁵ Herbario Víctor Manuel Ovalles, Facultad de Farmacia,
Universidad Central de Venezuela, Venezuela
orsinig@camelot.rect.ucv.ve

⁶ Fundación Instituto Botánico de Venezuela (FIBV),
Av. Salvador Allende, Jardín Botánico de Caracas,
Apartado 2156, Caracas, Venezuela
hubero@rect.ucv.ve

RESUMEN

Se presenta un catálogo de las 767 colecciones tipo correspondientes a la subclase Monocotyledonae depositadas en el Herbario Nacional de Venezuela (VEN). La colección agrupa 256 holotipos, 497 isótipos, 3 isoneotipos, 1 isolectotípico y 10 especímenes con fragmentos de colecciones tipo presentes en otros herbarios. Se discuten aspectos sobre la diversidad taxonómica de esta colección, los colectores y autores de especies más importantes, así como las localidades venezolanas de donde proviene el mayor número de tipos.

Palabras clave: Especímenes tipo, Monocotyledonae, Taxonomía, VEN, Venezuela

ABSTRACT

A catalogue of the 767 type specimens of subclass Monocotyledonae deposited at the Herbario Nacional de Venezuela (VEN) is presented. This collection is composed of 256 holotypes, 497 isotypes, 3 isoneotypes, 1 isolectotype and 10 specimens containing fragments of types deposited at foreign herbaria. Aspects related to the taxonomic diversity of the collection as well as the most important plant collectors and authors of plant names are discussed. The Venezuelan localities containing the largest number of types are indicated.

Keywords: Monocotyledonae, Taxonomy, Type specimens, VEN, Venezuela

INTRODUCCIÓN

El tipo del nombre de una especie corresponde a un espécimen de herbario (o una ilustración) el cual ha servido de base para la descripción válida de un taxón (Greuter *et al.* 2000). Este espécimen seleccionado como tipo es irreemplazable para la delimitación taxonómica de un organismo determinado, de allí que su consulta sea obligatoria para las revisiones y monografías de cualquier grupo. La importancia de elaborar listas de colecciones tipo en herbarios latinoamericanos ya ha sido discutida por Prance (1980) al indicar el limitado uso y conocimiento de este material por parte de muchos taxónomos dedicados a grupos de plantas mayoritariamente neotropicales.

El Herbario Nacional de Venezuela (VEN) contiene actualmente la colección más importante de tipos de plantas descritas para el país, estimada en unas 4000-4500 muestras. Su origen, al igual que el de la colección general, se remonta a los tiempos del Museo Comercial creado por Henri Pittier en el año 1921 (Häslar & Baumann 2000). Los esfuerzos de Pittier hacia la consolidación del herbario del Museo y la consecuente “obligación” de depositar las colecciones tipo en una institución venezolana encontraron un cierto rechazo entre los colectores. Sin embargo, la intensificación de la actividad botánica nacional y la sensibilización de los botánicos extranjeros llevaron a la necesidad de fortalecer una colección taxonómica de referencia y a establecer normativas bien definidas que garantizaran el depósito de los espécímenes tipo en el Herbario Nacional.

La antiguedad y riqueza de la colección de VEN permitió iniciar en el año 1995 un proyecto destinado a caracterizar y difundir esta colección entre los monografistas de grupos taxonómicos e investigadores de la flora neotropical. En el marco de este proyecto aparecieron publicaciones detalladas sobre los tipos de Arecaceae (Stauffer & Pappaterra 1996) y Lamiaceae (Orsini 1996). El presente trabajo ofrece información básica sobre 767 colecciones tipo correspondientes a la subclase Monocotyledonae.

METODOLOGÍA

El trabajo se realizó en tres fases. La explicación detallada de cada una de ellas, incluyendo la descripción de las dificultades encontradas puede ser de utilidad para otros herbarios del país interesados en organizar sus colecciones tipo.

Recopilación de la información y elaboración de la base de datos

Todas las muestras botánicas presentes en la colección de tipos de VEN hasta junio del año 1999 fueron introducidas en una base de datos (Microsoft Access) con el fin de agilizar los procesos de verificación y estandarización de la información. Para cada espécimen tipo se extrajo toda la información contenida en el rótulo (familia, especie, colector, número de colección, país, localidad exacta, altitud, fecha de colección), así como cualquier otra indicación relacionada con el estatus

del tipo. Se mantuvo intacta la información indicada en los rótulos; sin embargo, con el fin de hacer el catálogo lo más comprensible posible, la información introducida en la base de datos debió corregirse ya que la ortografía de algunas localidades indicadas era evidentemente errónea. A pesar de la exhaustiva búsqueda, tanto en la colección de tipos como en la colección general, ciertos especímenes indicados en la literatura como presentes en VEN no fueron hallados y por lo tanto no han sido incluidos en este catálogo. Extractos de la base de datos (listas totales o parciales de una o varias familias) pueden ser solicitadas al primer autor.

Verificación de la información y comprobación del estatus de los tipos

La información de cada uno de los registros fue comparada con las publicaciones originales. De esta manera se pudo complementar o corregir la información suministrada en los rótulos y determinar el estatus de la colección depositada en VEN. Sobre este particular se debe mencionar que repetidamente hubo inconsistencias entre lo que se indicaba sobre la colección y la información que aparecía en la publicación original. Adicionalmente, la consulta de fuentes bibliográficas originales permitió extraer un gran número de tipos intercalados en la colección general o en espera de ser montados, así como identificar los herbarios nacionales o extranjeros donde se encuentra el resto de los tipos (holotipos o isótipos) asociados al taxón.

La recopilación inicial de referencias bibliográficas estuvo sustentada en las bases de datos TROPICOS (Missouri Botanical Garden) e IPNI (Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria y Australian National Herbarium). Para una verificación más detallada de la información introducida en la base de datos se consultaron las publicaciones originales depositadas en las bibliotecas de las siguientes instituciones: Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Missouri Botanical Garden (Estados Unidos), New York Botanical Garden (Estados Unidos), Institut für Systematische Botanik der Universität Zürich (Suiza), Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève (Suiza), Royal Botanic Gardens, Kew (Inglaterra) y Staatsammlung des Botanischen Gartens München (Alemania).

Estandarización de los datos

La estandarización de la información se hizo a través de las siguientes publicaciones: Brummitt & Powell (1992) para los autores de las especies, Lawrence *et al.* (1968) y Bridson & Smith (1991) para la cita de las publicaciones periódicas y Stafleu & Cowan (1976) para la cita de las obras. Las siglas de los herbarios siguen las del Index Herbariorum (Holmgren *et al.* 1990).

Organización del catálogo

Por razones de utilidad este catálogo sigue un orden alfabético por familias, géneros, especies y categorías infra-específicas. Los tipos han mantenido la asignación de familias bajo la cual se encuentran ordenados en la colección de VEN,

caracterizada por tener una delimitación más bien conservadora especialmente de las familias pertenecientes al grupo de los “Higher Asparagales” (ver APG II 2003 para la propuesta de clasificación más reciente de las monocotiledóneas). Cada registro contiene los siguientes elementos: nombre del taxon, autor, publicación, volumen, número o fascículo, paginación, fecha de publicación, colector, número de colección, país, localidad exacta de colección, altitud, fecha de colección, herbarios donde se encuentran el holótipo y los isótipos.

RESULTADOS

Categoría de los tipos y diversidad taxonómica de la colección

El Herbario Nacional de Venezuela cuenta con 767 especímenes tipo de monocotiledóneas, agrupadas en 256 holotípos, 497 isótipos, 3 isoneóticos, 1 isolectótipo y 10 especímenes con fragmentos de colecciones tipo depositadas en otros herbarios. Los géneros *Jasarum*, *Maguirea* (Araceae), *Aristeyera* (Arecaceae), *Brewcaria*, *Steyerbromelia* (Bromeliaceae), *Carpotepala*, *Wurdackia* (Eriocaulaceae), *Thymocarpus* (Marantaceae), *Guacamaya*, *Phelpsiella* (Rapateaceae) y *Achlyphila* (Xyridaceae) cuentan adicionalmente con la especie tipo y su colección original.

Los 767 especímenes tipo representan a 760 taxa (algunos están representados tanto por un holótipo como por un isótipo), y están agrupados en 27 familias, 186 géneros, 732 especies, 23 subespecies, siete variedades y cuatro formas. Las cinco familias con mayor número de tipos, abarcando casi 70% de la colección, son las siguientes: Orchidaceae (125), Bromeliaceae (121), Araceae (108), Poaceae (84) y Eriocaulaceae (81). La diversidad taxonómica de esta colección (estimada en apenas 0,5% del total de colecciones de monocotiledóneas depositadas en VEN) puede apreciarse al considerar que están representados 64% de las familias, 30% de los géneros y casi 20% de las especies indicadas por Huber *et al.* (1998) y Ramia & Stauffer (2003) para la flora de monocotiledóneas de Venezuela.

Colectores y autores de novedades taxonómicas

La muestra de mayor antigüedad de la colección de tipos de monocotiledóneas de VEN corresponde al tipo de *Helleria fragilis* Luces (Poaceae), colectada por Alfredo Jahn en el año 1910 en el Páramo de Tucaní (estado Mérida); sin embargo, también se encuentran presentes fragmentos de los tipos de *Stelis sphaerochila* Lindl. y *Cranichis fendleri* Schltr. (Orchidaceae), colectados por Fendler en la Cordillera de la Costa (Colonia Tovar) entre 1854 y 1857.

Julian Steyermark (Herbario Nacional de Venezuela - Field Museum of Natural History) destaca entre los colectores más exitosos con 320 tipos, cerca de 42% del total de colecciones tratadas en este catálogo, mientras que Bassett Maguire colectó 140 tipos y George Bunting 30. Entre los botánicos con mayor número de taxa descritos cabe destacar a Lyman Smith (US National Herbarium, Bromeliaceae) con 106 tipos, George Bunting (Missouri Botanical Garden, Ara-

ceae) con 90 tipos y Bassett Maguire (New York Botanical Garden, varias familias, especialmente Rapateaceae) con 72 tipos.

Localidades de colección más importantes

La colección de tipos de monocotiledóneas alberga especímenes de 12 países, repartidos de la siguiente manera: Venezuela (705 tipos), Colombia (20), Guyana (12), Brasil y Surinam (9 cada uno), Costa Rica y Cuba (3 cada uno), Guayana Francesa (2) y Ecuador, Estados Unidos, México y Puerto Rico (1 cada uno). Dentro del territorio venezolano el mayor número de tipos proviene de los estados Amazonas (257), Bolívar (235), Táchira (62), Mérida (24) y Aragua (16).

No es sorprendente que la mayoría de los tipos provengan de la Guayana venezolana, región en la que numerosas instituciones nacionales e internacionales han realizado un gran esfuerzo de colección. Debe destacarse que gran cantidad de los tipos es el producto de exploraciones realizadas a solamente dos macizos montañosos. El primero de ellos es el Macizo de Chimantá (estado Bolívar), en el cual se recolectaron 43 tipos gracias a un esfuerzo de colección iniciado por Julian Steyermark en el año 1953 y luego en combinación con John Wurdack. El interés del Herbario de Nueva York se tradujo en las visitas que se realizaron al Cerro Neblina (estado Amazonas), la segunda área guayanesa con mayor número de tipos recolectados de monocotiledóneas. Este macizo fue visitado por investigadores del Jardín Botánico de Nueva York en dos ocasiones entre 1953 y 1958 (Huber & Wurdack 1984).

Más recientemente (1983-1987), la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FUDECI), coordinó la visita de más de 27 botánicos cuyo esfuerzo de colección logró reunir 13.986 muestras (Breuer-Carías 1988). Del resto de los estados del país sólo merece una mención especial el estado Táchira. Casi la mitad de los tipos provenientes de esa entidad fueron especies de Orchidaceae colectadas por Julian Steyermark, Galfried y Elena Dunsterville en tres exitosas exploraciones al Parque Nacional El Tamá, especialmente en los bosques altimontanos, entre los años 1966 y 1968.

Publicación de las novedades taxonómicas

Las novedades de monocotiledóneas descritas para Venezuela han aparecido en 58 publicaciones. Alrededor de 72% de estas novedades, representadas por 541 tipos, han aparecido en obras o publicaciones periódicas extranjeras, mientras que 28%, representado por 217 tipos, ha aparecido en revistas nacionales. Entre las publicaciones extranjeras con mayor número de novedades resalta la revista *Memoirs of the New York Botanical Garden* (New York) con 172 novedades, seguida por *Phytologia* (New York) con 85, *Fieldiana Botany* (Chicago) con 70 y *Annals of the Missouri Botanical Garden* (Missouri) con 56. Entre las revistas venezolanas destaca *Acta Botanica Venezolica* (Caracas) con 127 novedades, el *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* (Caracas) con 70, *Ernstia* (Maracay) con 16 y *Acta Biologica Venezolica* (Caracas) con 4.

Tipos de Monocotyledonae depositados en el Herbario Nacional de Venezuela (VEN)

ALISMATACEAE

Sagittaria planitiana G. Agostini, *Phytologia* 20(1): 1. 1970. *J. Steyermark & M. Rabe* 96484. Venezuela: Portuguesa, west of Guanare, 180 m snm, 25/08/1966. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

AMARYLLIDACEAE

Hymenocallis venezuelensis Traub, *Pl. Life* 19: 41. 1963. *J. Blydenstein* 390. Venezuela: Guárico, Esterro de Camaguán, 30/05/1962. Holótipo (US), Isótipo (VEN).

ARACEAE

Anthurium angelorum G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 266. 1975. *J. Steyermark* 99956. Venezuela: Zulia, Sierra de Perijá, vecindad de la Quebrada Koshida (Kosida), al sur de La Misión de Los Angeles de Tokuku (Tocucu), al suroeste de Machiques, 325-350 m snm, 31/08/1967. Holótipo (VEN).

Anthurium aroense G.S. Bunting, *Phytologia* 60(5): 293. 1986. *R. Liesner & A. González* 9824. Venezuela: Yaracuy, Cerro Negro, 8 km south-west of San Felipe, 1200-1800 m snm, 1-2/04/1980. Holótipo (VEN).

Anthurium berryi G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 293. 1986. *Ch. Wood & P. Berry* 95. Venezuela: Zulia, headwaters of Río Guasare, 2700-3300 m snm, 20-23/07/1974. Holótipo (VEN).

Anthurium bonplandii G.S.Bunting subsp. *rionegrense* G.S.Bunting, *Phytologia* 64(6): 459. 1988. *J. Steyermark & G. Bunting* 102741. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, San Carlos de Río Negro, 125 m snm, 17/04/1970. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).

Anthurium caripense G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 271. 1975. *G. Bunting*

ting 2628. Venezuela: Monagas, Cerro San Bonifacio, 730 m snm, 27/11/1967. Holótipo (MY), Isótipos (NY, VEN).

Anthurium corocoroense G.S.Bunting, *Phytologia* 64(6): 462. 1988. *B. Maguire & C. Maguire* 35425. Venezuela: Amazonas, Cerro Yutajé, 1500 m snm, 01/03/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Anthurium guaiquinimae G.S. Bunting, *Phytologia* 64(6): 462. 1988. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 113258. Venezuela: Bolívar, Distrito Heres, cumbre del Cerro Guaiquinima, 1-2 km río arriba del Salto Szczerbanari (Río Caparo), 750 m snm, 20-25/01/1977. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).

Anthurium guayanum G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 268. 1975. *J. Steyermark* 75100. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 850-1100 m snm, 18/04/1953. Holótipo (VEN).

Anthurium iramirezae G.S.Bunting, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(3): 917. 1989. *I. Ramírez & L. Laskowsky* 310. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Serranía de Tapiropecó, 1350 m snm, 25/03/1988. Holótipo (VEN).

Anthurium julianii G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 272. 1975. *J. Steyermark & M. Rabe* 97325. Venezuela: Trujillo, entre Boconó y Guaramacal, 2100-2300 m snm, 04/09/1966. Holótipo (VEN).

Anthurium liesneri Croat, *Aroidiana* 9(1-4): 43. 1986. *R. Liesner* 18174. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, plateau of Duida above Culebra, 1250 m snm, 02/03/1985. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).

Anthurium lilacinum G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 273. 1975. *J. Steyermark & C. Steyermark* 95294. Venezuela: Carabobo, cabeceras del Río San Gián, 750-900 m snm, 29/03/1966. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).

Anthurium longissimum H.Pittier, *Bol. Soc.*

- Venez. Ci. Nat.* 11(70): 13. 1947. *H. Pittier* 15214. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Aragua, vertiente norte, selva nublada, 900 m snm, 09/02/1946. Holótipo (VEN).
- Anthurium longissimum* H.Pittier subsp. *nirguense* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 295. 1986. *J. Steyermark & G. Bunting* 97722. Venezuela: Yaracuy, Cerro La Chapa, al norte de Nirgua, 1200-1360 m snm, 11/03/1967. Holótipo (VEN).
- Anthurium luteynii* Croat, *Selbyana* 5(3-4): 324. 1981. *T. Croat* 25521. Panamá: Provincia Veraguas, 700-750 m snm, 24/07/1974. Holótipo (MO), Isótipos (CAS, F, K, PMA, SEL, US, VEN).
- Anthurium monsteroioides* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 93. 1951. *J. Steyermark* 56727. Venezuela: Mérida, along Río Onia, near Bolero, north of Mesa Bolívar, 545-915 m snm, 23/05/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Anthurium neblinae* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 273. 1975. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36993. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, Río Yatúa, 140-1700 m snm, 30/12/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Anthurium paradicicum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 275. 1975. *J. Steyermark* 91515. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Fila Paraíso, 1300 m snm, 05/07/1963. Holótipo (VEN).
- Anthurium pariente* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 276. 1975. *J. Steyermark & M. Rabe* 96343. Venezuela: Sucre, Península de Paria, Cerro El Humo, 700-800 m snm, 11/08/1966. Holótipo (VEN).
- Anthurium perijanum* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 296. 1986. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 105560. Venezuela: Zulia, Sierra de Perijá, cerca de la frontera colombo-venezolana al suroeste de Pishikakao e Iría, 1440-1460 m snm, 22-28/03/1972. Holótipo (VEN).
- Anthurium rupicola* Croat, *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 14: 173. 1986. *T. Croat* 27526. Panamá: Provincia Vera-
- guas, Valley of Río Dos Bocas, 11 km north-west of Escuela Agrícola Alto Piedra (above Santa Fe) on road to Calovébora, 450 m snm, 30/08/1974. Holótipo (MO), Isótipos (B, BR, C, COL, CR, DUKE, F, G, GH, K, M, MEXU, MICH, NY, P, PMA, R, RSA, S, SEL, U, UC, US, VEN, W).
- Anthurium smaragdinum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 278. 1975. *J. Steyermark & M. Rabe* 97113. Venezuela: Mérida, arriba de La Azulita, 2100-2400 m snm, 01/09/1966. Holótipo (VEN), Isótipo (NY).
- Anthurium standleyi* Croat & Baker, *Brenesia* 16 (suppl. 1): 88. 1979. *T. Croat* 43439. Costa Rica: San José, ca. 5 miles southwest of Canaán, 900 m snm, 14/08/1977. Holótipo (MO), Isótipos (B, CAS, CR, F, K, M, NY, PMA, RSA, SEL, UC, US, VEN).
- Anthurium steyermarkii* G.S.Bunting, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 30. 1963. *J. Steyermark* 74850. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 2125-2300 m snm, 13/04/1953. Holótipo (VEN).
- Anthurium tamaense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 278. 1975. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98370. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Anthurium wurdackii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 279. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting* 103099. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, 825 m snm, 04/05/1970. Holótipo (VEN), Isótipos (MY, US, VEN).
- Anthurium xanthoneurum* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 298. 1986. *J. Steyermark, P. Berry & F. Delascio* 130054. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Aratitiyope, ca. 70 km sur-suroeste de Ocamo, con riachuelos afluentes al Río Manipitare, 990-1670 m snm, 24-28/02/1984. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Caladium akkermansii* G.S.Bunting, *Acta*

- Bot. Venez.* 10(1-4): 281. 1975. *G. Bunting, L. Akkermans & J. Rooden* 3539. Venezuela: Amazonas, carretera Puerto Ayacucho-Sanariapo, 100 m snm, 6-19/07/1969. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Caladium aristeguietae* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 282. 1975. *G. Bunting* 4495. Venezuela: Guárico, carretera San Juan de los Morros-Calabozo, 25/07/1971. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Caladium coeruleescens* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 284. 1975. *G. Bunting* 4370. Venezuela: Trujillo, carretera Guanare-Boconó, 05/04/1971. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Caladium steyermarkii* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 300. 1986. *J. Steyermark, G. Bunting & C. Blanco* 102035. Venezuela: Apure, south of Río Borgüita, 09/04/1968. Holótipo (VEN).
- Cyrtosperma wurdackii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 285. 1975. *B. Maguire & J.I. Wurdack* 36384. Venezuela: Amazonas, Río Guainía, 140 m snm, 24/11/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Dieffenbachia bolivarana* G.S.Bunting, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 30. 1963. *J. Steyermark* 75666. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 1600-1700 m snm, 05/06/1953. Holótipo (VEN).
- Heteropsis steyermarkii* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 305. 1986. *J. Steyermark & G. Bunting* 102607. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Río Yatúa, margen izquierda bajando la Laja Arauicaua, 125 m snm, 11-12/04/1970. Holótipo (VEN).
- Heteropsis tenuispadix* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 306. 1986. *P. Berry* 2189. Venezuela: Amazonas, a 3 km al sur de Trapicheote, desembocadura del Río Ventuari, 130 m snm, 28/03/1976. Holótipo (VEN), Isótipo (MYF).
- Jasarum steyermarkii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 264. 1975. *J. Steyermark, L. Smith, R. Smith, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 105500. Venezuela: Bolívar, La Gran Sabana, carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén, Río Cauí, 1200-1400 m snm, 19-22/02/1972. Holótipo (VEN).
- Maguirea spathicarpoides* A.D.Hawkes, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(6): 635. 1948. *B. Maguire & G. Stahel* 24998. Surinam: vicinity of km 68, Zanderij, 19/10/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Monstera henry-pittieri* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 286. 1975. *G. Bunting* 1956. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, 1200 m snm, 27/03/1967. Holótipo (VEN).
- Monstera steyermarkii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 288. 1975. *G. Bunting* 4805. Venezuela: Táchira, carretera La Fría-La Grita, en la Pavas, 200-250 m snm, 22/09/1974. Holótipo (VEN).
- Philodendron amplisimum* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 307. 1986. *J. Steyermark, G. Davidse & A. Stoddart* 122689. Venezuela: Zulia, Distrito Mara, Southeast of Río Guasare, 2.5-3 km (by air) southeast of Rancho, 400-530 m snm, 28/05/1980. Holótipo (VEN).
- Philodendron ampullaceum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 289. 1975. *G. Bunting* 2344. Venezuela: Táchira, carretera Rubio-Las Delicias, 2000 m snm, 28/09/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron anaadu* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 309. 1986. *F. Delascio & F. Guánchez* 10916. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Salto Yureba, Caño Yureba, bajo Río Ventuari, 120-150 m snm, 24/10-4/11/1981. Holótipo (VEN).
- Philodendron atabapoense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 291. 1975. *G. Bunting, L. Akkermans & J. Rooden* 3863. Venezuela: Amazonas, outside of Yavita, along Yavita-Pimichín River, 125-140 m snm, 6-19/07/1969. Holótipo (MY), Isótipos (US, VEN).
- Philodendron billietiae* Croat, *Novon* 5(1): 24. 1995. *T. Croat* 74321. Guayana Francesa: along road between Cayenne and Regina, 100-150 m snm, 21/02/1993. Holótipo (MO), Isótipos (B, BBS, BR, BRG, CAS, CAY, CM, F, G, GH, INPA, K, M,

- MG, NY, P, US, VEN).
- Philodendron buntingianum* Croat, Aroidea-
na 9(1-4): 89. 1986. *T. Croat* 60727. Venezuela: Mérida, along higway between La Azulita and junction with Highway 1 (between El Vigía and Capazón), 900 m snm, 24/03/1985. Holótipo (MO), Isótipos (AAU, B, CAS, COL, F, GH, K, MY, NY, PMA, PORT, RB, RSA, US, VEN).
- Philodendron cataniapoense* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 314. 1986. *J. Steyermark, G. Davidse & F. Guánchez* 122235. Venezuela: Amazonas, along Río Cata-niapo, 200-300 m snm, 10/05/1980. Holótipo (VEN).
- Philodendron chimaniae* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 292. 1975. *J. Steyermark* 75355. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1000 m snm, 14/05/1953. Holótipo (VEN).
- Philodendron cremersii* Croat & Grayum, *Novon* 4(3): 212. 1994. *T. Croat* 74336. Guayana Francesa: Montagnes de Kaw, 200 m snm, 23/02/1993. Holótipo (MO), Isótipos (B, CAY, F, K, MG, NY, P, US, VEN).
- Philodendron danteanum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 294. 1975. *J. Steyermark & L. Aristeguieta* 108. Venezuela: Distrito Federal, Cerro Ávila, 2000 m snm, 26/04/1962. Holótipo (VEN).
- Philodendron davidsei* G.S.Bunting, *Phyto-
logia* 60(5): 316. 1986. *G. Davidse, A.
González & R. León* 18702. Venezuela:
Zulia, Distrito Colón, along quebrada, 3 km east of the Río de Oro settlement on the Río de Oro, 100-250 m snm, 27/06/1980. Holótipo (VZM), Isótipo (VEN).
- Philodendron delascioi* G.S.Bunting, *Phyto-
logia* 60(5): 317. 1986. *J. Steyermark, R.
Liesner & F. Delascio* 114387. Venezuela:
Delta Amacuro, Departamento Pedernales, Caño Somoina, west of Isla Cocuina, south of Barra de Cocuina, 50 m snm, 08/10/1977. Holótipo (VEN).
- Philodendron dunstervilleorum* G.S.Bun-
ting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 294. 1975.
J. Steyermark & H. Gibson 95747. Vene-
zuela: Bolívar, hacia el Cerro Maigualida
y Sierra Cerbatana, 300-500 m snm,
26/04/1966. Holótipo (VEN).
- Philodendron dyscarpium* R.E.Schult. var.
ventuarianum G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 317. 1986. *B. Maguire & C. Maguire* 35539. Venezuela: Amazonas, Río Ven-
tuari, 3 horas abajo Las Carmelitas, 100 m
snm, 10/03/1953. Holótipo (NY), Isótipo
(VEN).
- Philodendron gigas* Croat, *Ann. Missouri
Bot. Gard.* 84: 446. 1997. *T. Croat & G.
Zhu* 76988. Panamá: Comarca de Kunayala, 10.1 km north of Interamerican Hwy,
310 m snm, 20/07/1994. Holótipo (MO),
Isótipos (COL, F, NY, PMA, US, VEN).
- Philodendron guaiquinimae* G.S.Bunting,
Phytologia 60(5): 319. 1986. *J. Steyer-
mark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunster-
ville* 113297. Venezuela: Bolívar, Cerro
Guaiquinima, lomas bosqueadas entre el
Río Szczerbanari (Río Caparo) y el pie de
los peñascos de arenisca al sur del río,
750-840 m snm, 23/01/1977. Holótipo
(VEN).
- Philodendron henry-pittieri* G.S.Bunting,
Acta Bot. Venez. 10(1-4): 295. 1975. *G.
Bunting* 1955. Venezuela: Aragua, Par-
que Nacional Henri Pittier, vicinity of
Rancho Grande, 1200 m snm, 23-
27/03/1967. Holótipo (VEN).
- Philodendron holmquistii* G.S.Bunting, *Acta
Bot. Venez.* 10(1-4): 297. 1975. *G. Bunting,
L. Akkermans & J. Rooden* 3565. Venezuela:
Amazonas, carretera Puerto Ayacucho-
Sanariapo, 100 m snm, 6-19/07/1969. Ho-
lótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron holstii* G.S.Bunting, *Phyto-
logia* 64(6): 468. 1988. *R. Liesner & B.
Holst* 21252. Venezuela: Amazonas, 0.5-
2 km west of Río Coro-Coro, west of Se-
rranía de Yutajé, 200 m snm, 19/02/1987.
Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Philodendron krauseanum* Steyermark., *Fiel-
diana, Bot.* 28(1): 98. 1951. *J. Steyermark*
60567. Venezuela: Bolívar, Quebrada
Oparuma, tributaria del Río Pacairao,
915-1065 m snm, 25/11/1944. Holótipo
(F), Isótipo (VEN).
- Philodendron lemae* G.S.Bunting, *Acta Bot.*

- Venez.* 10(1-4): 300. 1975. *J. Steyermark* 89473. Venezuela: Bolívar, suroeste de El Dorado, 300 m snm, 24/08/1961. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Philodendron levelii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 300. 1975. *G. Bunting, L. Akkermans & J. Rooden* 3679. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures. Río Orinoco, alrededores de Síquita, 100-140 m snm, 6-19/07/1969. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron liesneri* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 320. 1986. *J. Steyermark & G. Bunting* 102673. Venezuela: Amazonas, a lo largo del Río Casiquiare, entre Pueblo Viejo y San Carlos de Río Negro, 125 m snm, 16/04/1970. Holótipo (VEN).
- Philodendron linnaei* G.S.Bunting var. *rionegrense* G.S.Bunting, *Phytologia* 64(6): 469. 1988. *R. Liesner* 6707. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, IVIC study site 4 km north-east of San Carlos de Río Negro, 120 m snm, 16/04/1979. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).
- Philodendron maguirei* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 302. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting* 102597. Venezuela: Amazonas, a lo largo del Río Yatúa, 125-150 m snm, 11-12/05/1970. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).
- Philodendron marahuacae* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 320. 1986. *J. Steyermark* 129688. Venezuela: Amazonas, Macizo de Marahuaca, laderas que miran al suroeste, cabeceras del Río Iguapo, 1560 m snm, 13-14/10/1983. Holótipo (VEN).
- Philodendron maroae* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 303. 1975. *G. Bunting, L. Akkermans & J. Rooden* 3980. Venezuela: Amazonas, Departamento Casiquiare, entre Yavita y Maroa, 125-140 m snm, 6-19/07/1969. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron melanochlorum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 304. 1975. *G. Bunting* 2858. Venezuela: Bolívar, carretera El Dorado-Gran Sabana, 1200 m snm, 16/02/1968. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron meridense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 305. 1975. *G. Bunting* 2595. Venezuela: Mérida, carretera La Azulita-Mérida, 1460 m snm, 13/10/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron mesae* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 306. 1975. *G. Bunting* 2790. Venezuela: Mérida, carretera Mesa de Bolívar-Libertad, 760 m snm, 16/12/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron multinervum* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 322. 1986. *J. Steyermark* 107164. Venezuela: Amazonas, vecindades de Simarawochi, Río Matacuni, a unos 6-7 km al oeste de la frontera venezolana-brasilera, 795-830 m snm, 18/04-23/05/1973. Holótipo (VEN).
- Philodendron peraiense* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 324. 1986. *J. Steyermark* 111356. Venezuela: Bolívar, 9 km east of Perai-tepui, 910 m snm, 03/01/1975. Holótipo (VEN).
- Philodendron phlebodes* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 306. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting* 102605. Venezuela: Amazonas, base de la Laja Arauicaua, Río Yatúa, 125 m snm, 11-12/04/1970. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).
- Philodendron pimichinense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 307. 1975. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36335. Venezuela: Amazonas, Yavita-Pimichín trail near Pimichín, 140 m snm, 22/11/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Philodendron rhodoaxis* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 308. 1975. *G. Bunting* 1935. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, Portachuelo-Paraíso trail, 1200 m snm, 18/03-8/04/1967. Holótipo (VEN).
- Philodendron roraimae* K.Krause subsp. *aramunicense* G.S.Bunting, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 948. 1989. *R. Liesner & G. Carnevali* 22510. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Aramuní, 1400 m snm, 26/10/1987. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Philodendron santodominguense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 309. 1975. *G.*

- Bunting 2612.* Venezuela: Mérida, carretera Barinas-Mérida, 915 m snm, 16/10/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron smaragdinum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 311. 1975. *M. Fariñas, J. Velásquez & E. Medina 334.* Venezuela: Amazonas, pie del Duida, a lo largo del Río Orinoco, 01/02/1969. Holótipo (VEN).
- Philodendron spruceanum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 310. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting 102665.* Venezuela: Amazonas, entre Pueblo Viejo y Yacámi, 100 m snm, 16/04/1970. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).
- Philodendron steyermarkii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 312. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting 102603.* Venezuela: Amazonas, Laja Arauicaua, 125 m snm, 11-12/04/1970. Holótipo (VEN), Isótipos (MY, US).
- Philodendron tachirense* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 330. 1986. *G. Bunting, L. Chacón & G. Borges 8587.* Venezuela: Táchira, entre km 19-23 al este de San Cristóbal, 8-12 km al este del Chorro del Indio, 1100-1150 m snm, 23/12/1979. Holótipo (NY), Isótipos (MO, VEN).
- Philodendron trujilloi* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 313. 1975. *G. Bunting 2486.* Venezuela: Táchira, carretera La Fría-La Grita, en Las Pavas, 200-250 m snm, 06/10/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron venezuelense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 315. 1975. *G. Bunting, L. Akkermans & J. Rooden 3864.* Venezuela: Amazonas, Departamento Casiquiare, alrededores de Yavita, 125-140 m snm, 6-19/07/1969. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Philodendron venustum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 316. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting 102593.* Venezuela: Amazonas, bajando desde la Laja Arauicaua, 125 m snm, 11-12/04/1970. Holótipo (VEN), Isótipos (MY, US).
- Philodendron vinaceum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 317. 1975. *B. Maguire*
- J. Steyermark & C. Maguire 46905.* Venezuela: Bolívar, cumbre de La Escalera, Río Uiri-yuk, 1000 m snm, 20-21/08/1962. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Philonotis williamsii* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 99. 1951. *Ll. Williams 13922.* Venezuela: Amazonas, Yavita, 128 m snm, 23/01/1942. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Spathiphyllum mawarinumae* G.S.Bunting, *Phytologia* 64(6): 480. 1988. *W.W. Thomas & T. Plowman 3104.* Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro La Neblina, 140 m snm, 17/04/1984. Holótipo (VEN).
- Spathiphyllum monachinoi* G.S.Bunting var. *perangustum* G.S.Bunting, *Phytologia* 64(6): 482. 1988. *O. Huber 3118.* Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, al norte del Cerro Cucurito, ribera sureste del Caño Yagua, 120 m snm, 17/01/1979. Holótipo (NY), Isótipos (MY, VEN).
- Spathiphyllum neblinae* G.S.Bunting, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(3): 25. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 36797.* Venezuela: Amazonas, Cerro La Neblina, 140-1700 m snm, 14/12/1953. Holótipo (MY), Isótipos (US, VEN).
- Spathiphyllum perezii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 321. 1975. *G. Bunting 2405.* Venezuela: Mérida, carretera El Vigía-San Cristóbal, 125 m snm, 03/10/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Stenospermation ammiticum* G.S.Bunting, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 42. 1963. *J. Steyermark 89543.* Venezuela: Bolívar, cabeceras de Río Chicanán, 80 km (en línea recta) al suroeste de El Dorado, 500 m snm, 27/08/1961. Holótipo (VEN), Isótipos (BH, US).
- Stenospermation ammiticum* G.S.Bunting subsp. *neblinae* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 339. 1986. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 37281.* Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1700-2000 m snm, 01/12/1953-01/01/1954. Holótipo (VEN).
- Stenospermation pittieri* Steyermark., *Fieldia-*

- na, Bot.* 28(1): 101. 1951. *J. Steyermark 57455.* Venezuela: Táchira, Alto de Lirío, between Bramón and Las Delicias, 1890-2285 m snm, 18/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Stenospermation steyermarkii* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 321. 1975. *J. Steyermark 87511.* Venezuela: Delta Amacuro, Río Cuyubini, 90 m snm, 12/11/1960. Holótipo (VEN).
- Syngonium apurense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 322. 1975. *J. Steyermark, G. Bunting & C. Blanco 101942.* Venezuela: Apure, Reserva Forestal San Camilo, 200 m snm, 06/04/1968. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).
- Syngonium atrovirens* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 323. 1975. *G. Bunting 2776.* Venezuela: Zulia, 1 km al sur de Concha, 14/12/1967. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Syngonium meridense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 324. 1975. *G. Bunting 4381.* Venezuela: Mérida, carretera Caño Zancudo-La Azulita, 07/04/1971. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Urospatha somnolenta* R.E.Schult., *Bot. Mus. Leafl.* 18(4): 123. 1958. *R. Schultes & I. Cabrera 15402.* Colombia: Amazonas, Comisaría de Amazonas y Vaupés: Río Apaporis, Raudal Yacacopi, 260 m snm, 16/02/1952. Holótipo (GH), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma bayo* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 325. 1975. *G. Bunting 4403.* Venezuela: Táchira, carretera San Cristóbal-La Fría, 200-250 m snm, 09/05/1971. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma bolivarorum* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 339. 1986. *G. Bunting 3095.* Venezuela: Bolívar, carretera El Dorado-Gran Sabana, alrededores de km 87 de la vía, 200-400 m snm, 22/02/1968. Holótipo (VEN).
- Xanthosoma caulotuberculatum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 327. 1975. *G. Bunting 4757.* Venezuela: Bolívar, carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén, 2-4/03/1972. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma longilobum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 328. 1975. *G. Bunting 4575.* Venezuela: Barinas, carretera Barinas-Barinitas-Mérida, 20/09/1971. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma maroae* G.S.Bunting, *Phytologia* 60(5): 341. 1986. *J. Steyermark & G. Bunting 102845.* Venezuela: Amazonas, Departamento Casiquiare, 1 km al este de Maroa, Río Guainía, 125 m snm, 20/04/1970. Holótipo (VEN).
- Xanthosoma nitidum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 329. 1975. *G. Bunting 3406.* Venezuela: Miranda, carretera vieja Maracay-Caracas, oeste de Los Teques, 29/06/1969. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma orinocense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 330. 1975. *J.J. Wurdack & L. Adderley 43057.* Venezuela: Amazonas, Caño Yapacana, 125 m snm, 18/06/1959. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma pariense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 330. 1975. *G. Bunting 4804.* Venezuela: cultivada y de origen desconocido, 04/07/1974. Holótipo (VEN).
- Xanthosoma peltatum* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 332. 1975. *G. Bunting 4396.* Venezuela: Táchira, carretera Rubio-Las Delicias, 08/04/1971. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma saguasense* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 333. 1975. *G. Bunting 3184.* Venezuela: Portuguesa, carretera Boconó-Biscucuy, 17/05/1968. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).
- Xanthosoma trilobium* G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 10(1-4): 334. 1975. *J. Steyermark & G. Bunting 102670.* Venezuela: Amazonas, between Pueblo Viejo y San Carlos de Río Negro, 100 m snm, 04/12/1970. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).

ARECACEAE

Aiphanes aculeata Willd. *J. Steyermark & V.*

- Carreño* 106916. Venezuela: Miranda, Distrito Brión, along Quebrada Agua Bendita, 2-3 km east of Pueblo Seco, 24-25/03/1973. Neotipo (NY), Isoneótipo (VEN). Designado por F. Borchsenius. *Fl. Neotrop.* 70: 46. 1996.
- Aristeyera ramosa* H.E. Moore, *J. Arnold Arbor.* 48(2): 144. 1967. *J. Steyermark & M. Rabe* 96088. Venezuela: Sucre, Península de Paria: Cerro Espejo, selva siempreverde en la cumbre, entre Mantecal y Paují, 750-850 m snm, 06/08/1966. Holótipo (BH), Isótipo (VEN).
- Aristeyera spicata* H.E. Moore, *J. Arnold Arbor.* 47(1): 5. 1966. *J. Steyermark* 90010. Venezuela: Miranda, Parque Nacional Guatopo, 520 m snm, 23/11/1961. Holótipo (BH), Isótipo (VEN).
- Asterogyne yaracuyense* Henderson & Steyermark., *Brittonia* 38(4): 309. 1986. *J. Steyermark, G. Bunting & J.G. Wessels-Boer* 100311. Venezuela: Yaracuy, Cerro La Chapa, 1200-1400 m snm, 9-10/11/1967. Holótipo (VEN), Isótipo (BH).
- Bactris bergantina* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 71. 1951. *J. Steyermark* 61039. Venezuela: Anzoátegui, Cerro Bergantín, 500 m snm, 20/02/1945. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Chamaedorea minor* Burret, *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 11: 2. 1930. *J. Saer* 427. Venezuela: Lara, Serranía de Tepaima, 800-1000 m snm, 01/04/1930. Holótipo (B, probablemente destruido), Isótipo (VEN).
- Desmoncus velezii* L.H.Bailey, *Gentes Herb.* 8(2): 186. 1949. *J. Velez* 2308. Venezuela: Apure, entre el Río Meta y Caño, 03/05/1946. Holótipo (BH), Isótipos (US, VEN).
- Geonomia spinescens* H.Wendl. ex Burret var. *braunii* F.W. Stauffer, *Acta Bot. Venez.* 20(2): 1. 1997. *A. Fernández, F.W. Stauffer, R. Riina, R. Walter-Weissbeck & O. Kunert* 10087. Venezuela: Yaracuy, Municipio Nirgua, ca. 5 km norte de Nirgua, selva nublada del Cerro La Chapa, 1200-1300 m snm, 28/11-01/12/1996. Holótipo (VEN).
- Geonomia tenuis* Burret, *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 13(119): 478. 1937. *H. Pittier* 13840. Venezuela: Aragua, Rancho Grande, 1200 m snm, 08/01/1937. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Hyospathe pittieri* Burret, *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 14: 137. 1938. *H. Pittier* 14146. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Aragua, 1000 m snm, 17/09/1937. Lectótipo (VEN), Isolectótipo (US). Designado por F. Stauffer y L. Pappaterra. *Acta Bot. Venez.* 19(1): 60-75. 1996.
- Mauritia flexuosa* L.f. var. *venezuelana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 90. 1951. *J. Steyermark* 57649. Venezuela: Bolívar, between Río Caroní y Ciudad Bolívar, 200 m snm, 02/08/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Prestoea acuminata* (Willd.) H.E. Moore. *J. Steyermark* 91608. Venezuela: Aragua, 4 km east of Colonia Tovar, 2000 m snm, 10/01/1963. Neótipo (BH), Isoneótipo (VEN). Designado por A. Henderson. *Fl. Neotrop.* 72: 49. 1996.
- Syagrus stenopetala* Burret, *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 11: 322. 1932. *A. Jahn* 1208. Venezuela: Distrito Federal, Puerto La Cruz, 500 m snm, 26/04/1923. Holótipo (VEN).
- ## BROMELIACEAE
- Aechmea brevicollis* L.B.Sm., *Contr. Gray Herb.* 154: 32. 1945. *Ll. Williams* 14267. Venezuela: Amazonas, Río Guainía, 127 m snm, 11/02/1942. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Aechmea cathcartii* C.F.Reed & Read, *J. Bromeliad Soc.* 31(2): 60. 1981. *D. Cathcart*s/n. Venezuela: Miranda, Parque Nacional Guatopo, 760 m snm, 26/09/1976. Holótipo (TTC), fragmento del Holótipo (VEN).
- Aechmea lasseri* L.B.Sm., *Bull. Bromeliad Soc.* 3: 43. 1953. *M.B. Foster & H. Teuscher*. 2737. Venezuela: Aragua, Rancho Grande, 1600 m snm, 13/10/1951. Holótipo (US), Isótipo (VEN).

- Aechmea politii* L.B. Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 318. 1957. *B. Maguire & L. Politi* 27373. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 150 m snm, 24/11/1948. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Ayensua uaipanensis* (Maguire) L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 18(2): 29. 1969. *K. Phelps & A.S. Hitchcock* 388. Venezuela: Bolívar, Uaipán-tepui, 1900 m snm, 27/01/1948. Holótipo (NY), Isótipo (VEN). El tipo de esta especie fue equivocadamente asignado a la familia Velloziaceae bajo el nombre de *Barbaccenia uaipanensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 477. 1957.
- Billbergia manarae* Steyerl., *Brittonia* 30(1): 39. 1978. *J. Steyermark* 112181. Venezuela: Distrito Federal, Cerro Nai-guatá, 1000 m snm, 22/05/1976. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Billbergia venezuelana* Mez, *Feddes Report.* 17: 114. 1921. *H. Pittier* 8932. Venezuela: Carabobo, Forest of San Juan, 01/01/1920. Holótipo (B), Isótipes (GH, US, VEN).
- Brewcaria duidensis* L.B.Sm., Steyerl. & H. Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 10. 1984. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & R. Liesner* 124582. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo: Cerro Duida, 1500 m snm, 16/02/1981. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Brocchinia cowanii* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 293. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30924. Venezuela: Amazonas, Cerro Moriche, 1250 m snm, 15/01/1951. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Brocchinia delicatula* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 19. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42207. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, Río Yatúa, 1100 m snm, 24/11/1957. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Brocchinia gilmartinii* G.S.Varad., *J. Bromeliad Soc.* 36(6): 251. 1986. *G. Varadarajan & F. Oliva* 1158. Venezuela: Bolívar, 120 km south of El Dorado, near La Escalera, 1150-1200 m snm, 07/11/1983. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Brocchinia maguirei* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 292. 1957. *B. Maguire & L. Politi* 28301. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1500 m snm, 01/12/1949. Holótipo (US), Isótipo (NY, VEN).
- Brocchinia oliva-estevae* Steyerl. & L.B. Sm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74(1): 85. 1987. *F. Oliva s/n.* Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 01/12/1984. Holótipo (VEN).
- Brocchinia vestita* L.B.Sm., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 138. 1951. *J. Steyermark* 58279. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1025-1200 m snm, 02/09/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Connellia smithiana* (Steyerl. & Lutelyn) L.B.Sm., *J. Bromeliad Soc.* 35(4): 152. 1985. *J. Lutelyn & J. Steyermark* 9610. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2100 m snm, 18/02/1984. Holótipo (VEN), Isótipo (NY).
- Connellia varadarajanii* L.B.Sm. & Steyerl., *J. Bromeliad Soc.* 35(2): 52. 1985. *G. Varadarajan* 1205. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 1950-2000 m snm, 12/01/1984. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Cottendorfia arachnoidea* L.B.Sm., Steyerl. & H.Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 9. 1984. *J. Steyermark, M. Guariglia, N. Holmgren, J. Lutelyn & S. Mori* 125996. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo: Cerro Marahuaca, 2480-2500 m snm, 1-2/02/1982. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Cottendorfia atrorosea* L.B.Sm., Steyerl. & H. Rob., *Brittonia* 33(1): 28. 1981. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 117982. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 1650 m snm, 09/04/1979. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Cottendorfia brachiphylla* (L.B.Sm.) L.B. Sm. var. *angustior* L.B.Sm., Steyerl. & H. Rob., *Brittonia* 33(1): 28. 1981. *J. Steyermark, V. Carreño, R. McDiarmid & Ch. Brewer-Carías* 116180. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 1950 m snm, 28/02/1978. Holótipo (US), Isótipo (VEN).

- Cottendorfia geniculata* (L.B.Sm.) L.B.Sm. var. *minor* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 15. 1984. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & R. Liesner* 124526. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures: Serranía Sipapo, 1500 m snm, 17/02/1981. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Cottendorfia gracillima* L.B.Sm., *Phytologia* 7(8): 418. 1961. *J. Steyermark & S. Nilsson* 436. Venezuela: Bolívar, Cerro Venamo, 1100 m snm, 21/04/1960. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Cottendorfia guianensis* (Beer) Baker var. *vestita* (L.B.Sm.) L.B.Sm., *Phytologia* 7(8): 419. 1961. *J. Steyermark & S. Nilsson* 567. Venezuela: Bolívar, Savanna of Río Uarama below Uaramatepui, 1220 m snm, 25/04/1960. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Cottendorfia longipes* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 14(3): 22. 1967. *J. Steyermark* 93790. Venezuela: Bolívar, Auyan-tepui, a lo largo de Río Churún, 1660 m snm, 12/05/1964. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Cottendorfia marahuacae* L.B.Sm., Steyermark & H.Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 9. 1984. *B. Maguire, J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías, C. Maguire & V. Carreño* 65641. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Marahuaca, 2685 m snm, 15/01/1981. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Cottendorfia nubigena* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 16. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42151. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 2100 m snm, 20/11/1957. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Cottendorfia savannensis* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 16. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42167. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 2000-2100 m snm, 21/11/1957. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Gravisia rodriguesiana* L.B.Sm., *Phytologia* 13(2): 153. 1966. *W. Rodrigues* 5399. Brasil: Amazonas, Reserva Forestal Ducci, 26/07/1965. Holótipo (US), Isótipos (INPA, VEN).
- Griegia aristeguietae* L.B.Sm., *Phytologia* 7(3): 106. 1960. *L. Aristeguieta & E. Medina* 3591. Venezuela: Trujillo, Guirigay, 3300 m snm, 08/01/1958. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Griegia ocellata* L.B.Sm. & Steyermark, *Phytologia* 16(2): 72. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96951. Venezuela: Táchira, below Páramo de La Negra, 2600 m snm, 29-30/08/1966. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Guzmania membranacea* L.B.Sm. & Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 380. 1968. *J. Steyermark* 95022. Venezuela: Sucre, Península de Paria, between Cerro Humo and Cerro La Pavita, 1250-1273 m snm, 04/03/1966. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Guzmania nubigena* L.B.Sm., *Phytologia* 4: 355. 1953. *M.B. Foster* 2739. Venezuela: Aragua, Rancho Grande, 1800 m snm, 13/10/1951. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Guzmania steyermarkii* L.B.Sm., *Phytologia* 7: 419. 1961. *J. Steyermark & S. Nilsson* 428. Venezuela: Bolívar, north-west of Cerro Venamo, 1100 m snm, 21/04/1960. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Guzmania terrestris* L.B.Sm. & Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 715. 1986. *J. Steyermark* 129596. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Marahuaca, 2560 m snm, 13-14/10/1983. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Guzmania venamensis* L.B.Sm., *Phytologia* 21(2): 88. 1971. *J. Steyermark & E. Dunsberry* 92522. Venezuela: Bolívar, Cerro Venamo, 1400-1450 m snm, 01/01/1964. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Lindmania brachiphylla* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 416. 1957. *J.J. Wurdack* 34134. Venezuela: Bolívar, Sarvén-tepui, 1900-2050 m snm, 13/01/1953. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Lindmania cylindrostachya* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 286. 1957. *B. Maguire & C. Maguire* 35280. Venezuela: Amazonas, Serranía Yutajé, Río Ma-

- napiare, 1600 m snm, 17-19/02/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lindmania holstii* Steyermark & L.B.Sm., J. Bromeliad Soc. 38: 51. 1988. *B. Holst & F. Oliva* 3539. Venezuela: Bolívar, Muri-sipán-tepui, 2300 m snm, 22/03/1987. Holótipo (F), Isótipes (NY, US, VEN).
- Lindmania imitans* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., Ann. Missouri Bot. Gard. 73(4): 697. 1986. *J. Steyermark & O. Huber & V. Carreño* 128474. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1850 m snm, 2-5/02/1983. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Lindmania navioidea* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 419. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 677. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2165-2180 m snm, 09/02/1955. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lindmania paludosa* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 284. 1957. *B. Maguire* 33034. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 1800 m snm, 09/01/1952. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lindmania riparia* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., Ann. Missouri Bot. Gard. 73(4): 695. 1986. *J. Steyermark* 93895. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2050-2300 m snm, 15/05/1964. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Lindmania serrulata* L.B.Sm., Contr. U.S. Natl. Herb. 29(7): 283. 1949. *F. Cardona* 1587. Venezuela: Bolívar, Cerro Apacará, 2000 m snm, 07/07/1946. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Lindmania serrulata* L.B.Sm. var. *reducta* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 414. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 1167. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1955 m snm, 26/02/1955. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lindmania sessilis* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., Ann. Missouri Bot. Gard. 73(4): 693. 1986. *J. Steyermark & O. Huber & V. Carreño* 128104. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2000 m snm, 26-29/01/1983. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Lindmania stenophylla* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 417. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 951. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1895-1910 m snm, 20/02/1955. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lindmania terramarae* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., Ann. Missouri Bot. Gard. 73(4): 698. 1986. *J. Steyermark & F. Delascio* 129067. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 2800 m snm, 26/03/1983. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia abyssophila* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 10(2): 21. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42471. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1200-2200 m snm, 24/12/1957. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia affinis* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 10(2): 21. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42470. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1100 m snm, 24/12/1957. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia albiflora* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., Acta Bot. Venez. 14(3): 11. 1984. *J. Steyermark, M. Guariglia, N. Holmgren, J. Luteyn & S. Mori* 126421. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo: Cerro Duida, 1400 m snm, 10/02/1982. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia aliciae* L.B.Sm., Steyermark & H. Rob., Acta Bot. Venez. 14(3): 13. 1984. *J. Steyermark, M. Guariglia, N. Holmgren, J. Luteyn & S. Mori* 125654. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Río Cunucunuma, 180-210 m snm, 28/01-8/02/1982. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia aloifolia* L.B.Sm., Mem. New York Bot. Gard. 9(3): 314. 1957. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37146. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1700 m snm, 10/01/1954. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia arida* L.B.Sm. & Steyermark, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 23: 62. 1962. *J. Steyermark* 89698. Venezuela: Bolívar, Sierra de Lema, 300 m snm, 01/09/1961. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia berryana* L.B.Sm., Steyermark & H.

- Rob., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 712. 1986. *J. Steyermark, P. Berry & F. Delascio 130318-A.* Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Villina, 440-600 m snm, 1-2/03/1984. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia breweri* L.B.Sm. & Steyerm., *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 380. 1967. *Ch. Brewer-Carías 248.* Venezuela: Bolívar, Cerro Jaua near Río Canaracuni, 600-700 m snm, 04/01/1965. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia brocchinoides* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 299. 1957. *B. Maguire & L. Politi 28787.* Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 650 m snm, 06/02/1949. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Navia caricifolia* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 312. 1957. *B. Maguire & C. Maguire 35437.* Venezuela: Amazonas, Serranía Yutajé, Cerro Coro-Coro, 1500 m snm, 02/03/1953. Holótipo (US), Isótipos (MO, VEN).
- Navia carnevalii* L.B.Sm. & Steyerm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 952. 1989. *R. Liesner & F. Delascio 22322.* Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro: Cerro Aracamuni, 600 m snm, 22/10/1987. Holótipo (US), Isótipos (MO, VEN).
- Navia connata* L.B.Sm. & Steyerm., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 50. 1963. *J. Steyermark 90223.* Venezuela: Bolívar, Sierra Ichún, 625-725 m snm, 29/12/1961. Holótipo (VEN), Isótipos (US, VEN).
- Navia cretacea* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 308. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack 29882.* Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, Río Cunucunuma, 1400 m snm, 05/12/1950. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia crispa* L.B.Sm., *Phytologia* 4(6): 378. 1953. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack 30966.* Venezuela: Amazonas, Cerro Morige, Río Ventuari, 250 m snm, 16/01/1951. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia delascionis* L.B.Sm., Steyerm. & H. Rob., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 709. 1986. *J. Steyermark, P. Berry & F. Delascio 130410.* Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, vicinity and northward from Cerro Vinilla, 440-600 m snm, 1-2/03/1984. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia diffusa* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 19. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire 42537.* Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1900 m snm, 23/12/1957. Holótipo (US), Isótipo (NY, VEN).
- Navia emergens* L.B.Sm., Steyerm. & H. Rob., *Brittonia* 33(1): 31. 1981. *J. Steyermark, P. Berry, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 117298.* Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 730-900 m snm, 24/05/1978. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia geaster* L.B.Sm., Steyerm. & H. Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 14. 1984. *J. Steyermark, B. Maguire, Ch. Brewer-Carías & V. Carreño 123846.* Venezuela: Bolívar, Distrito Heres, Cerro Marutaní, 1200 m snm, 11-14/01/1981. Holótipo (US), Isótipos (NY, US, VEN).
- Navia gracilis* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 38. 1964. *J.J. Wurdack & L. Adderley 43275.* Venezuela: Amazonas, Río Guainía, 130 m snm, 01/07/1959. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia grafii* Steyerm. & B. Holst, *Ernstia* 38: 44. 1986. *J. Steyermark, B. Holst, E. Graf & P. Redmond 131850.* Venezuela: Amazonas, Cerro Yutajé, 150 m snm, 10/04/1986. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, US).
- Navia hechtiooides* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 299. 1957. *B. Maguire & L. Politi 27574.* Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1500 m snm, 10/12/1948. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Navia hohenbergioides* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 298. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack 30970.* Venezuela: Amazonas, Cerro Morige, Río Ventuari, 200 m snm, 16/01/1951. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia immersa* L.B.Sm., *Mem. New York*

- Bot. Gard.* 9(3): 314. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30325. Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, Río Cunucunuma, 1400 m snm, 18/12/1950. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia incrassata* L.B.Sm. & Steyerm., *Phytologia* 16(2): 74. 1968. *J. Steyermark* 97881. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia intermedia* L.B.Sm. & Steyerm., *Phytologia* 16(2): 74. 1968. *J. Steyermark* 97865. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia jauana* L.B.Sm., Steyerm. & H.Rob., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 287. 1976. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & V. Carreño* 108895. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarisarínamá, 1410 m snm, 10/02/1974. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia lactea* L.B.Sm., Steyerm. & H.Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 14. 1984. *B. Maguire, J. Steyermark, C. Maguire, Ch. Brewer-Carías & V. Carreño* 65705. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo, 1500 m snm, 15/01/1981. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia lanigera* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 304. 1957. *B. Maguire, K. Phelps, Ch. Hitchcock & G. Budowski* 31794. Venezuela: Amazonas, Cerro Camani, Caño Guaviarito, Río Manapiare, Río Ventuari, 1800 m snm, 12/02/1951. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia lasiantha* L.B.Sm. & Steyerm., *Phytologia* 16(2): 75. 1968. *J. Steyermark* 97865-A. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia lepidota* L.B.Sm., *Phytologia* 16(6): 459. 1968. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37288. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, Río Yatúa, 1700-2000 m snm, 13/01/1954. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia lindmanoides* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 298. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30650. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, Río Orinoco, 1000 m snm, 03/01/1951. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia linearis* L.B.Sm., Steyerm. & H. Rob., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 709. 1986. *J. Steyermark* 129646. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 1560 m snm, 13-14/10/1983. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia luzuloides* L.B.Sm., Steyerm. & H. Rob., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 2897. 1976. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & V. Carreño* 109633. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua, 2000 m snm, 27/02/1974. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia maguirei* L.B.Sm., *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 205. 1948. *B. Maguire* 24575. Surinam: Tafelberg, 29/08/1944. Holótipo (GH), Isótipos (NY, US, VEN).
- Navia mima* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 310. 1957. *B. Maguire & L. Politi* 27590. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1500 m snm, 11/12/1948. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia navicularis* L.B.Sm. & Steyerm., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 52. 1963. *J. Steyermark* 90199. Venezuela: Bolívar, Sierra Ichún, 625-725 m snm, 27/12/1961. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Navia nubicola* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 304. 1957. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37392. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, Río Yatúa, 200-500 m snm, 29/01/1954. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia ocellata* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 310. 1957. *B. Maguire & L. Politi* 27500. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1300 m snm, 1-3/12/1948. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Navia ovoidea* L.B.Sm., Steyerm. & H. Rob., *Brittonia* 33(1): 31. 1981. *J. Steyermark, P. Berry, G.C.K. Dunsterville & E.*

- Dunsterville* 117361. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 1490-1500 m snm, 25/05/1978. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia parvula* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 314. 1957. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37326. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, Río Yatúa, 1500-1700 m snm, 16/01/1954. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia parvula* L.B.Sm. var. *expansa* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 22. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42246. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1200-1400 m snm, 26/11/1957. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia patria* L.B.Sm. & Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 953. 1989. *R. Liesner & F. Delascio* 22041. Venezuela: Amazonas, Río Negro, Cerro Aracamuni, 1550 m snm, 17/10/1987. Holótipo (US), Isótipes (MO, VEN).
- Navia pedemontana* L.B.Sm., Steyermark. & H. Rob., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 708. 1986. *J. Steyermark & F. Delascio* 129063. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, vicinity of Culebra, Río Cunucunuma, 200-220 m snm, 22/03-4/04/1983. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia platyphylla* L.B.Sm. & Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 954. 1989. *R. Liesner & F. Delascio* 22062. Venezuela: Amazonas, Río Negro, Cerro Aracamuni, 1550 m snm, 17/10/1987. Holótipo (NY), Isótipes (MO, US, VEN).
- Navia pulvinata* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 306. 1957. *B. Maguire & B. Maguire Jr.* 29111. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1600 m snm, 24/04/1949. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia pungens* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 310. 1957. *B. Maguire, K. Phelps, Ch. Hitchcock & G. Budowski* 31652. Venezuela: Amazonas, Cerro Guanay, Caño Guaviarito, Río Manapiare, 900-1100 m snm, 30/01/1951. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia ramosa* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 14(3): 38. 1967. *F. Cardona* 2997. Venezuela: Bolívar, Cerro Pauo, 500 m snm, 01/01/1963. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia robinsonii* L.B.Sm., *Phytologia* 16(6): 459. 1968. *Ch. Brewer-Carías* 250. Venezuela: Bolívar, Cerro Jaua, 2000 m snm, 04/01/1965. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia scirpiiflora* L.B.Sm., Steyermark. & H. Rob., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 307. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 108880. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Sarisaríñama, 1410 m snm, 10/02/1974. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Navia semiserrata* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 309. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30959. Venezuela: Amazonas, Cerro Moriche, Río Ventuari, 1250 m snm, 15/01/1951. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia splendens* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 39. 1964. *S. Tillett & C. Tillett* 45841. Guyana: Río Kamarang, 820 m snm, 28/10/1960. Holótipo (NY), Isótipes (US, VEN).
- Navia trichodonta* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 301. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30228. Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, Río Cunucunuma, 1300 m snm, 14/12/1950. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia umbratilis* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 309. 1957. *B. Maguire & C. Maguire* 35406. Venezuela: Amazonas, Serranía Yutajé, Río Manapiare, 1200 m snm, 25/02/1953. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Navia wurdackii* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 419. 1957. *J.J. Wurdack* 34324. Venezuela: Bolívar, Sarvén-tepui, along Río Sarvén, 1200 m snm, 07/02/1953. Holótipo (US), Isótipes (F, NY, VEN).
- Navia xyridiflora* L.B.Sm., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 147. 1951. *J. Steyermark* 58152. Venezuela: Amazonas, summit of Cerro Duida, 1700-1980 m snm, 01/09/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Pitcairnia caricifolia* Mart. var. *macrantha* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.*

- 10(5): 37. 1964. *J.J. Wurdack & L. Adderley* 43601. Venezuela: Amazonas, Río Siapa, 130-140 m snm, 23/07/1959. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Pitcairnia juncoides* L.B.Sm., *Contr. Gray Herb.* 161: 33. 1946. *Ll. Williams* 15048. Venezuela: Amazonas, San Antonio, 121 m snm, 27/04/1942. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Pitcairnia kunhardtiana* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 289. 1957. *B. Maguire & L. Politi* 28368. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1650 m snm, 14/01/1949. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Pitcairnia microcalyx* Baker var. *elliptica* L.B.Sm., *Phytologia* 7(3): 107. 1960. *J. Steyermark* 62077. Venezuela: Monagas, Cerro Negro, 1500-2180 m snm, 15/04/1945. Holótipo (VEN), Isótipos (F, GH).
- Pitcairnia orchidifolia* Mez, *Feddes Report.* 17: 114. 1921. *H. Pittier* 8931. Venezuela: Carabobo, Las Trincheras (Gebiet von Valencia), 20/06/1920. Holótipo (B), Isótipos (GH, US, VEN).
- Pitcairnia venezuelana* L.B.Sm. & Steyermark., *Phytologia* 16(2): 76. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96472. Venezuela: Portuguesa, noreste de Acarigua, 190 m snm, 24/08/1966. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Puya aristeguietae* L.B.Sm., *Phytologia* 7(1): 2. 1959. *L. Aristeguieta* 3539. Venezuela: Trujillo, Páramo de Guirigay, 3200 m snm, 01/06/1958. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Puya cardonae* L.B.Sm., *Phytologia* 7(3): 107. 1960. *F. Cardona* 335. Venezuela: Táchira, Páramo de El Tamá, 3100-3300 m snm, 07/01/1939. Holótipo (VEN).
- Puya pygmaea* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 8(1): 27. 1952. *W.H.E. Camp* 2236. Ecuador: Provincia Azuay, Páramo de Tinajillas, 3630-3795 m snm, 17/03/1945. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Puya silvae-baccae* L.B.Sm. & Read, *Ernestia* 17: 9. 1983. *Ch. Wood & P. Berry* 87. Venezuela: Zulia, Perijá, Campamento Frontera V ($10^{\circ}23'7,8''$ N, $72^{\circ}52'45,5''$ O), 2700-3300 m snm, 20-23/07/1974. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Puya venezuelana* L.B.Sm., *Phytologia* 7(1): 3. 1959. *L. Aristeguieta* 3535. Venezuela: Trujillo, Páramo de Guirigay, 3200 m snm, 01/08/1958. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Steyerbromelia deflexa* L.B.Sm., Steyermark. & H.Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 12. 1984. *J. Steyermark, M. Guariglia, N. Holmgren, J. Luteyn & S. Mori* 126432. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1400 m snm, 10/02/1982. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Steyerbromelia diffusa* L.B.Sm., Steyermark. & H.Rob., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 700. 1986. *J. Steyermark, P. Berry & F. Delascio* 130072. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Aratityope, 990-1670 m snm, 24/02/1984. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Steyerbromelia discolor* L.B.Sm., Steyermark. & H.Rob., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 8-9. 1984. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & R. Liesner* 124477. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo: Cerro Marahuaca, 1500 m snm, 16/02/1981. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Tillandsia abysmophila* L.B.Sm. & Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 73(4): 714. 1986. *J. Steyermark, P. Berry & F. Delascio* 130135. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Aratityope, 990-1670 m snm, 24-28/02/1984. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Tillandsia lacera* L.B.Sm., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 150. 1951. *J. Steyermark* 57282. Venezuela: Táchira, at base of Páramo de Tamá, 2285-2430 m snm, 14/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Tillandsia steyermarkii* L.B.Sm., *Phytologia* 28(1): 38. 1974. *J. Steyermark, V. Carrasco & E. Diederichs* 106763. Venezuela: Yaracuy, El Amparo to Candelaria, 1200-1300 m snm, 27-30/12/1972. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Tillandsia turneri* Baker var. *patens* L.B.Sm., *Phytologia* 16(6): 462. 1968. *J. Steyer-*

mark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 100872. Venezuela: Táchira, headwaters of Río Quinimarí, 2600-2630 m snm, 13/01/1968. Holótipo (VEN), Isótípo (US).

Tillandsia turneri Baker var. *orientalis* L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 421. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 928. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimaná, 1925 m snm, 18/02/1955. Holótipo (US), Isótípos (F, NY, VEN).

Vriesea bi-beatricis Morillo, *Ernstia* 39: 2. 1986. *B. Garofalo* 476. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures: Comunidad Indígena Paria Grande, 01/08/1978. Holótipo (VEN).

Vriesea capituligera (Griseb.) L.B.Sm. & Pittendr. var. *lutea* Steyermark., *J. Bromeliad Soc.* 32(3): 113. 1982. *J. Steyermark & V. Carreño* 123808. Venezuela: Yaracuy, Distrito San Felipe, Vuelta de Pavo, 5 km South of Calendaria, 1220 m snm, 17-19/06/1972. Holótipo (VEN).

Vriesea splendens (Brongn.) Lem. var. *oionochroma* Steyermark., *Bull. Bromeliad Soc.* 17(2): 53. 1967. *J. Steyermark & V. Carreño* 95320. Venezuela: Carabobo, Río San Gian, 750-900 m snm, 20/03/1966. Holótipo (VEN), Isótípo (US).

BURMANNIACEAE

Burmannia carrenoi Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 6(1-4): 89. 1972. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 104418. Venezuela: Bolívar, El Dorado, 1300-1350 m snm, 25/12/1970. Holótipo (VEN), Isótípos (NY, U, US).

Burmannia compacta Maas & H.Maas, *Fl. Neotrop.* 42: 53. 1986. *R. Liesner*, 7041. Venezuela: Amazonas, 10 km north-east of San Carlos de Río Negro, 120 m snm, 28/04/1979. Holótipo (VEN).

Burmannia foliosa Gleason subsp. *maraahuicensis* Maguire & Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 14(3): 18. 1984. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & R. Liesner* 124383. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 2500 m snm, 16/02/1981.

Holótipo (NY), Isótípo (VEN).

Burmannia vaupesana Benthem & Maas, *Acta Bot. Neerl.* 30(1-2): 141. 1981. *J. Zarrucchi* 2226. Colombia: Vaupés, Mitú and vicinity, Río Paraná-Pichuna, 11/13/1976. Holótipo (U), Isótípos (A, COL, F, GH, INPA, K, MO, NY, P, RB, S, UC, US, VEN, Z).

COMMELINACEAE

Dichorisandra diederichsanae Steyermark., *Acta Bot. Venez.* 8(1-4): 111. 1973. *J. Steyermark* 106178. Venezuela: Yaracuy, 7 km al norte de Salom, 1220-1250 m snm, 17-19/06/1972. Holótipo (VEN), Isótípo (VEN)

Tradescantia venezuelensis Steyermark., *Fiediana, Bot.* 28(1): 152. 1951. *J. Steyermark* 62688. Venezuela: Sucre, Cerro Turimiquire, 1300-1800 m snm, 10/05/1945. Holótipo (F), Isótípo (VEN).

COSTACEAE

Costus plowmanii Maas, *Acta Bot. Neerl.* 24(5-6): 470. 1975. *P.J.M. Maas & T. Plowman* 1900. Colombia: Departamento El Valle, Cordillera Occidental, Queremal, 1350 m snm, 03/10/1974. Holótipo (U), Isótípos (AAU, COL, E, F, GH, K, MO, NY, P, US, VEN).

CYCLANTHACEAE

Asplundia nilssonii Harling, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 59. 1963. *J. Steyermark & S. Nilsson* 763. Venezuela: Bolívar, Cerro Uananapan, 1330-1450 m snm, 25/04/1960. Holótipo (VEN), Isótípos (S, UPS).

Asplundia pariensis Harling, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 60. 1963. *J. Steyermark & G. Agostini* 91108. Venezuela: Sucre, Península de Paria, Cerro Patao, 800-825 m snm, 19/07/1962. Holótipo (S), Isótípo (VEN).

Asplundia spectabilis Harling, *Acta Horti Berg.* 18(1): 240. 1958. *L. Aristeguieta &*

- F. Pannier* 1903. Venezuela: Yaracuy, Aroa, Los Canelitos near the hamlet of San José, 3-7/07/1953. Holótipo (S), Isótipo (VEN).
- Asplundia venezuelensis* Harling, *Acta Horti Berg.* 18(1): 203. 1958. *E. Killip* 37383. Venezuela: Bolívar, Río Torono, 280 m snm, 11-12/04/1943. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Dicranopygium aristeguietae* Harling, *Acta Horti Berg.* 18(1): 305. 1958. *L. Aristeguieta* 1655. Venezuela: Barinas, near Ciudad Bolivia (Pedraza), 01/02/1953. Holótipo (VEN), Isótipos (NY, VEN).
- Dicranopygium imeriense* Harling, *Acta Horti Berg.* 18(1): 302. 1958. *E. Holt & E. Blake* 480. Brasil: Amazonas, Sierra Imeri, 27/12/1930. Holótipo (NY), Isótipo (F, US, VEN).
- Dicranopygium macrophyllum* Harling, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 63. 1963. *J. Steyermark & G. Agostini* 91273. Venezuela: Sucre, Península de Paria, Cerro Patao, 100-300 m snm, 23/07/1962. Holótipo (S), Isótipo (VEN).
- Sphaeradenia lemaensis* Harling, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 65. 1963. *J. Steyermark* 89611. Venezuela: Bolívar, Sierra de Lema, 700 m snm, 29/08/1961. Holótipo (VEN), Isótipo (S).
- Sphaeradenia rubescens* Harling, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(106): 66. 1963. *J. Steyermark* 75204. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1300 m snm, 20/04/1953. Holótipo (VEN).
- Stelestylis anomala* Harling, *Acta Horti Berg.* 18(1): 398. 1958. *J. García* 93. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Rancho Grande, 900 m snm, 29/06/1951. Holótipo (VEN).
- CYPERACEAE**
- Ascolepis venezuelensis* Schnee, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 9(57): 5. 1943. *E. Killip* 37666. Venezuela: Bolívar, Paso de Carodozo, 50 m snm, 27-28/04/1943. Holótipo (VEN).
- Bulbostylis fluviatilis* Kral & Davidse, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74: 437. 1987. *R. Kral* 71793. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, 25/11/1984. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Bulbostylis junciformis* (Kunth) C.B.Clarke f. *hispidula* Gross., *Repert. Spec. Nov. Regini Veg.* 50: 213. 1941. *H. Pittier* 13710. Venezuela Distrito Federal, Ingomar. Turmerito. 1000-1100 m snm, 07/1936. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Bulbostylis svensoniana* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 37. 1951. *J. Steyermark* 57629. Venezuela: Bolívar, between Upata y Río Caroní, 400 m snm, 02/08/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Calyptrocarya delascioi* Davidse & Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(3): 855. 1988. *F. Delascio, R. Montes & G. Davidse* 11336. Venezuela: Guárico, Parque Nacional Aguaro-Guariquito, 40-60 m snm, 01/12/1981. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Calyptrocarya luzuliformis* T.Koyama, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 44. 1967. *B. Maguire, J. Steyermark & C. Maguire* 53533. Venezuela: Bolívar, Alto Río Cuyuní, 100 m snm, 01/09/1972. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Calyptrocarya montesii* Davidse & Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75: 853-861. 1988. *F. Delascio, R. Montes y G. Davidse* 11342A. Venezuela: Guárico, Parque Nacional Aguaro-Guariquito, Montaña de Guardahumo, Distrito Miranda, 40-60 m snm, 12/1981. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Carex culmenicola* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 65. 1951. *J. Steyermark* 62605. Venezuela: Sucre, Cerro Turimiquire, 2500 m snm, 06/05/1945. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Carex larenensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 66. 1951. *J. Steyermark* 55470. Venezuela: Lara, between Buenos Aires and Páramo de Las Rosas, 2285-3290 m snm, 11/02/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Carex roraimensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 67. 1951. *J. Steyermark* 58870. Ve-

- nezuela: Bolívar, Monte Roraima, 2700-2740 m snm, 28/09/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Carex tachirensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 68. 1951. *J. Steyermark* 57367. Venezuela: Táchira, outcrops of Páramo de El Tamá, 3045-3475 m snm, 15/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Carex turimiquirensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 70. 1951. *J. Steyermark* 62705. Venezuela: Sucre, Cerro Turimíquire, 1900-2000 m snm, 10/05/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Cephalocarpus steyermarkii* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 54. 1951. *J. Steyermark* 59640. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 1600 m snm, 01/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, US, VEN).
- Cladium costatum* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 50. 1951. *J. Steyermark* 60829. Venezuela: Bolívar, along quebrada Sororopán, 1375 m snm, 03/12/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Cladium steyermarkii* T.Koyama, *Mem. New York Bot. Gard.* 18(2): 28. 1969. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 1225. Venezuela: Bolívar, Toronó-tepui, Macizo Chimantá, 1760 m snm, 01/03/1955. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Cyperus guanipensis* Schnee, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 9(57): 23. 1943. *H. Pittier* 15113. Venezuela: Anzoátegui, sabanas anegadas del Río Caní, entre Guanipa y Cantaura, 24/08/1942. Holótipo (VEN).
- Cyperus guaricensis* Schnee, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 9(57): 17. 1943. *H. Pittier* 12474. Venezuela: Guárico, mesa de El Sombrero, 10/09/1927. Holótipo (VEN).
- Eleocharis egleriooides* S.González & A. Resnick, *Novon* 6:359. 1996. *J. Steyermark* 11368. Venezuela: Bolívar, Río Los Borrachos. Entre Santa Elena de Uairén y la frontera con Brasil, 1000 m snm, 01/1975. Holótipo (VEN).
- Eleocharis steyermarkii* S.González & A. Resnick, *Novon* 5: 363. 1996. *J. Steyermark, L. Smith, R. Smith, G.C.K. Dunserville & E. Dunsterville* 105478. Venezuela: Bolívar, Carretera El Dorado hacia Santa Elena de Uairén, 1200-1400 m snm, 02/1972. Holótipo (NY), Isótipos (NY, VEN).
- Everardia brevis* Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 34. 1965. *B. Maguire & B. Maguire, Jr.* 29127. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida. 1700-1800 m snm, 04/1949. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Everardia debilis* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 32. 1965. *B. Maguire & C. Maguire* 35156. Venezuela: Amazonas, Cerro Yutajé, 1400 m snm, 11/02/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Everardia diffusa* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 21. 1965. *B. Maguire & L. Politi* 27825. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1200 m snm, 20/12/1948. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Everardia disticha* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 25. 1965. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 808. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 2150-2200 m snm, 12/02/1955. Holótipo (NY), Isótipos (F, US, VEN).
- Everardia erecto-laxa* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 27. 1965. *B. Maguire* 33399. Venezuela: Bolívar, Ilú-tepui, 1950 m snm, 13/03/1952. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Everardia guaiquinimae* Schnee, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 9(57): 83. 1943. *F. Cardona* 974. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 1740 m snm, 6-7/09/1943. Holótipo (VEN), Isótipos (NY, US).
- Everardia ptariensis* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 55. 1951. *J. Steyermark* 59496. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 1500 m snm, 29/09/1944. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Everardia recurviflora* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 23. 1965. *B. Maguire* 33525. Venezuela: Bolívar, Ilú-tepui, 2400 m snm, 20/03/1952. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Everardia steyermarkii* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 55. 1951. *J. Steyermark* 59781. Ve-

- nezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2200 m snm, 02/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, US, VEN).
- Everardia surinamensis* Gilly, *Bull. Torrey Bot. Club* 76(4): 292. 1949. *B. Maguire* 24382. Surinam: Tafelberg, 520 m snm, 15/08/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Everardia vareschii* Maguire, *Acta Biol. Venez.* 2(6): 43. 1957. *V. Vareschi & E. Fol-dats* 4881. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2300 m snm, 01/04/1956. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Exochogyne amazonica* C.B.Clark. var. *esmeraldensis* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 53. 1951. *J. Steyermark* 57805. Venezuela: Amazonas: between Esmeralda savanna and SE base of Cerro Duida, 200 m snm, 08/1944. Holótipo (VEN), Isótipo (NY).
- Exochogyne steyermarkii* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 53. 1951. *J. Steyermark* 57820. Venezuela: Amazonas, between Esmeralda savanna and SE base of Cerro Duida, 200 m snm, 22/08/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Fimbristylis tamaensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 39. 1951. *J. Steyermark* 57422. Venezuela: Táchira, along Río Táchira, 1675-1980 m snm, 17/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Hypolytrum spongiosum* T.Koyama, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 76. 1967. *B. Maguire, J.J. Wurdack & W. Keith* 41504. Venezuela: Amazonas, north-west base of Cerro Yapacana, 125 m snm, 16/09/1957. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Hypolytrum tepuanum* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 51. 1951. *J. Steyermark* 60238. Venezuela: Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopan-tepui, 1615 m snm, 15-17/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (NY, US, VEN).
- Lagenocarpus bifidus* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 56. 1951. *J. Steyermark* 59302. Venezuela: Bolívar, Gran Sabana, 915-1005 m snm, 03/09/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, VEN).
- Lagenocarpus celiae* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 46. 1965. *B. Maguire, J.J. Wurdack, W. Keith & C. Maguire* 41454. Colombia: Cacaguá savanna, Río Atabapo, between San Fernando de Atabapo and Caño Temí, 135 m snm, 13/09/1957. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lagenocarpus diffusus* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 56. 1951. *J. Steyermark* 58218. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1025-1200 m snm, 02/09/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, VEN).
- Lagenocarpus eriopodus* T.Koyama & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 47. 1965. *B. Maguire, J.J. Wurdack, W. Keith & C. Maguire* 41545. Venezuela: Amazonas, Alto Río Orinoco, Yapacana savannas, 125 m snm, 16/09/1957. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Lagenocarpus glomerulatus* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 57. 1951. *J. Steyermark* 60340. Venezuela: Bolívar, along Río Karuai between Santa Teresita de Kavanayén and base of Ptari-tepui, 1220 m snm, 18/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, VEN).
- Lagenocarpus sabanensis* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 57. 1951. *J. Steyermark* 57855. Venezuela: Amazonas, Sabana Grande, south-eastern base of Cerro Duida, 200 m snm, 23/08/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, VEN).
- Lagenocarpus steyermarkii* Gilly, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 58. 1951. *J. Steyermark* 59363. Venezuela: Bolívar, between Mission of Santa Teresita de Kavanayén and Río Karuai, 1220 m snm, 26/10/1944. Holótipo (F), Isótipos (IA, VEN).
- Lagenocarpus venezuelensis* Davidse, *Novaon* 3:244. 1993. *J. Steyermark, P. Berry & F. Delascio* 130049. Venezuela: Amazonas, Cerro Aratitiyope, south-south-west Ocamo, 990-1670 m snm, 02/1984. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Mapania steyermarkii* T.Koyama, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 61. 1967. *T. Koyama & G. Agostini* 7506. Venezuela: Bolívar, Uaipan-tepui, 1200-1600 m snm, 05/03/1967. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

- Mapaniopsis micrococcia* T.Koyama, *Jap. J. Bot.* 20(2): 130. 1969. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 92317. Venezuela: Bolívar, Cerro Venamo, along the east affluence of the Río Venamo, 950-1400 m snm, 28/12/1963. Holótipo (VEN), Isótipos (NY, US).
- Rhynchospora bolivarana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 40. 1951. *J. Steyermark* 60206. Venezuela: Bolívar, Salto de Iwarcarú-merú, 1615 m snm, 15/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Rhynchospora candida* (Nees) Boeck. var. *pilosa* Schnee, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 9(57): 62. 1943. *Ll. Williams* 13093. Venezuela: Amazonas, Puerto Ayacucho, Río Cataniapo, 88 m snm, 23/05/1940. Holótipo (VEN).
- Rhynchospora chimantensis* W.W.Thomas, *Contr. Univ. Michigan Herb.* 15: 311. 1982. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 362. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1925 m snm, 02/02/1955. Holótipo (F), Isótipos (MO, NY, VEN).
- Rhynchospora culmenicola* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 41. 1951. *J. Steyermark* 62110. Venezuela: Monagas, Cerro Negro, noroeste de Caripe, 2180 m snm, 15/04/1945. Holótipo (F), Isótipos (NY, VEN).
- Rhynchospora papillosa* W.W.Thomas, *Mem. New York Bot. Gard.* 37: 100. 1984. *F. Delascio, R. Montes & G. Davidse* 11342. Venezuela: Guárico, Parque Nacional Aguaro Guariquito, Montaña de Guardahumo, 40-60 m snm, 01/12/1981. Holótipo (NY), Isótipos (MO, VEN).
- Rhynchospora paramora* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 44. 1951. *J. Steyermark* 56550. Venezuela: Mérida, Páramo de los Colorados, between El Molino and San Isidro Alto, 2745-2955 m snm, 14/05/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Rhynchospora ptaritepuiana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 45. 1951. *J. Steyermark* 59830. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2130 m snm, 04/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Rhynchospora sanariapensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 46. 1951. *J. Steyermark* 58469. Venezuela: Amazonas, Sanariapo, near Río Sanariapo, 100 m snm, 08/09/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Rhynchospora sororopana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 46. 1951. *J. Steyermark* 60831. Venezuela: Bolívar, Quebrada Sororopán, between Santa Teresita de Kavanayén and Río Tekyunsén, 1375 m snm, 03/12/1944. Holótipo (F), Isótipo (US, VEN).
- Rhynchospora steyermarkii* T.Koyama, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 70. 1972. *J. Steyermark* 87853. Venezuela: Bolívar, Río Toro (Río Grande), between Río La Reforma and Puerto Rico, north of El Palmar, 200-250 m snm, 07/12/1960. Holótipo (NY), Isótipos (F, US, VEN).
- Rhynchospora tamana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 47. 1951. *J. Steyermark* 57404. Venezuela: Táchira, Páramo del Tamá, 3045-3475 m snm, 15/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Rhynchospora tepuiana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 48. 1951. *J. Steyermark* 58652. Venezuela: Bolívar, Mount Roraima, 2040 m snm, 25/09/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Rhynchospora tomentosa* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 49. 1951. *J. Steyermark* 57391. Venezuela: Táchira, Páramo del Tamá, 3045-3475 m snm, 15/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Rhynchospora trichocheata* C.B.Clarke var. *venezuelensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 49. 1951. *J. Steyermark* 57587. Venezuela: Bolívar, between Ciudad Bolívar and Río Caroní, 100 m snm, 01/08/1944 Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Scleria amazonica* Camelbecke, Strong & Goeth., *Novon* 7: 98. 1997. *O. Huber* 3978. Venezuela: Amazonas, 8 km al norte del Orinoco, ca. frente al caserío Patacame, Departamento Atures, 100 m snm, 06/1979. Holótipo (VEN), Isótipo (NY).
- Uncinia meridensis* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 61. 1951. *J. Steyermark* 57039. Ve-

nezuela: Mérida, Páramo de Mucuchíes, 4025 m snm, 06/07/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).

DIOSCOREACEAE

Dioscorea neblinensis Maguire & Steyerm., *Mem. New York Bot. Gard.* 51: 108. 1989.
B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 37328. Venezuela: Amazonas, Cerro Nebolina, 1700-2000 m snm, 16/01/1954. Holótipo (NY), Isótipos (MO, VEN).

ERIOCAULACEAE

Carptotepala insolita Moldenke, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 114. 1951. *J. Steyermark* 60703. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, between Río Karuai and Salto de Iraba-Naima, 1220 m snm, 28/11/1944. Holótipo (NY), Isótipo (F, GH, US, VEN).

Eriocaulon brevifolium Klotzsch var. *proliferum* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 278. 1957. *B. Maguire & J.J. Wurdack* 34595. Venezuela: Amazonas, Alto Río Orinoco, Laguna at Yapacana, 125 m snm, 20/03/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

Eriocaulon dimorphopetalum Moldenke, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 116. 1951. *J. Steyermark* 59264. Venezuela: Bolívar, Gran Sabana, between Divina Pastora on the Río Kukenán and Santa Elena, 915-1005 m snm, 03/10/1944. Holótipo (NY), Isótipo (US, VEN).

Eriocaulon jauense Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 850. 1972. *J. Steyermark* 98179. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, Cerro Jaua, cumbre de la porción central-occidental, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipos (NY, VEN).

Eriocaulon steyermarkii Moldenke, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 117. 1951. *J. Steyermark* 58868. Venezuela: Bolívar, Mount Roraima, 2700-2740 m snm, 28/09/1944. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

Leiothrix celiae Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 278. 1957. *B. Maguire &*

C. Maguire 35314. Venezuela: Amazonas, Serranía Yutajé, Río Manapiare, 2100 m snm, 17-19/02/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland var. *alpina* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 279. 1957. *G.H. Tate* 1109. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2200 m snm, 01/12/1937-01/01/1938. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Leiothrix steyermarkii Moldenke, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 11. 1951. *J. Steyermark* 59779. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2200 m snm, 02/11/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Leiothrix umbratilis Moldenke, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 119. 1951. *J. Steyermark* 60280. Venezuela: Bolívar, between Ptari-tepui and Sororopán-tepui, 1615 m snm, 15-17/11/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Paepalanthus apacarensis Moldenke var. *humilis* Moldenke, *Phytologia* 54(1): 66. 1983. *J. Steyermark & O. Huber & V. Carréno* 128164. Venezuela: Bolívar, Distrito Piar, Macizo Chimantá, cabeceras orientales del Caño Chimantá, sector centro-noreste del Chimantá-tepui, 2000 m snm, 26-29/01/1983. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).

Paepalanthus aristatus Moldenke, *Phytologia* 7(3): 122. 1960. *J.J. Wurdack & L. Adderley* 42861. Venezuela: Amazonas, Río Atabapo, 125 m snm, 08/06/1959. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

Paepalanthus auyantepuiensis Moldenke, *Acta Biol. Venez.* 2(7): 47. 1957. *V. Vareschi & E. Foldats* 4895. Venezuela: Bolívar, Auyan-tepui, 2300 m snm, 01/04/1956. Holótipo (VEN).

Paepalanthus brunneus Moldenke, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 195. 1948. *B. Maguire & D. Fanshawe* 23020. Guyana: Amatuk Portage, Potaro River Gorge, 27/04/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Paepalanthus capillaceus Moldenke var. *spiralis* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 279. 1957. *B. Maguire & D. Fanshawe* 32292. Guyana: Maipuri Falls,

- Karaurieng River, Imbaimadai savannas on the Upper Mazaruni River, 1250 m snm, 25/10/1951. Holótipo (NY), Isótipo (M, VEN).
- Paepalanthus cardonae* Moldenke, *Phytologia* 3(1): 39. 1948. *F. Cardona* 2281. Venezuela: Bolívar, Cerro Acopán, 2000 m snm, 01/10/1947. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus chimantensis* Hensold, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 78(2): 428. 1991. *O. Huber & J. Steyermark* 6971. Venezuela: Bolívar, Apácaro-tepui, Chimantá Massif, 2200 m snm, 30/01-01/02/1983. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus convexus* Gleason var. *parvicaudatus* Moldenke, *Phytologia* 52 (1): 19. 1982. *J. Steyermark, M. Guariglia, N. Holmgren, J. Lutelyn & S. Mori* 126100. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Marahuaca, 2330-2460 m snm, 3-4/02/1982. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus cumbricola* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 409. 1957. *J.J. Wurdack* 34308. Venezuela: Bolívar, Churi-tepui (Muru-tepui), 2300-2350 m snm, 03/02/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus dichotomus* Klotzsch var. *pubilus* Moldenke, *Phytologia* 49(4): 385. 1981. *H. Moore, J. Ambrose, R. Dietz & D. Pfister* 9632. Venezuela: Bolívar, Northwest of Misión de Santa Teresita de Kavanayén, 1200 m snm, 09/08/1970. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus duidae* Gleason var. *parvifolius* Moldenke, *Phytologia* 54(2): 121. 1983. *S. Tillett & P. Colveé* 752-349. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 2750 m snm, 2-9/02/1975. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus fasciculatus* Körn. f. *proliferus* Moldenke, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 23(103): 300. 1963. *V. Vareschi & K. Mägdefrau* 6646. Venezuela: Amazonas, Morichal de Capibara-Casiquiare, 10/01/1958. Holótipo (VEN).
- Paepalanthus fraternus* N.E.Br. var. *chimanensis* Moldenke, *Phytologia* 54(1): 66. 1983. *J. Steyermark & O. Huber & V. Carrero* 128944a. Venezuela: Bolívar, Macizo de Chimantá, sección oriental del Chimantá-tepui, cabeceras del afluente derecho superior del Río Tirica (Caño del Grillo), 2450 m snm, 7-9/02/1983. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus fraternus* N.E.Br. var. *mara-huacensis* Moldenke, *Phytologia* 49(4): 385. 1981. *B. Maguire, J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías, C. Maguire & V. Carreño* 65609. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Marahuaca, 2685 m snm, 15/02/1981. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus fraternus* N.E.Br. var. *radiatus* Moldenke, *Phytologia* 49(4): 385. 1981. *J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & R. Liesner* 124407. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Marahuaca, 2500 m snm, 16/02/1981. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus holstii* Steyermark, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(1): 311. 1988. *B. Holst* 3523. Venezuela: Bolívar, Distrito Piar, Murisipán-tepui, summit, 2300 m snm, 22/03/1987. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus jauensis* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 850. 1972. *J. Steyermark* 97906. Venezuela: Bolívar, Cerro Jaua, cumbre de la porción central-occidental de la Meseta de Jaua, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótropos (NY, VEN).
- Paepalanthus jauensis* Moldenke var. *caulescens* Moldenke, *Phytologia* 44(4): 215. 1979. *J. Steyermark, V. Carreño, R. McDiarmid & Ch. Brewer-Carías* 115893. Venezuela: Bolívar, Cumbre de Aprada-tepui, 2460-2500 m snm, 25/02/1978. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótropos (F, MO, VEN).
- Paepalanthus kunhardtii* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 97. 1953. *B. Maguire & L. Politi* 27588. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1485

- m snm, 11/12/1948. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus macrocaulon* Silveira var. *venamensis* Moldenke, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 411. 1966. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 92308. Venezuela: Bolívar, Cerro Venamo, 950-1400 m snm, 28/12/1963. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus maguirei* Moldenke, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 198. 1948. *B. Maguire* 24670. Surinam: Tafelberg, 495-560 m snm, 08/09/1944. Holótipo (NY), Isótipos (F, VEN).
- Paepalanthus meseticola* Moldenke & Steyermark., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 281. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 109398. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, 1750-1800 m snm, 22-28/02/1974. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, US).
- Paepalanthus pendulus* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 280. 1957. *B. Maguire* 33538a. Venezuela: Bolívar, Ilú-tepui, 2574 m snm, 20-21/03/1952. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus perplexans* Moldenke, *Fiediana, Bot.* 28(1):120. 1951. *J. Steyermark* 59748. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2000-2200 m snm, 02/11/1944. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus perplexans* Moldenke var. *steyermarkii* Moldenke, *Phytologia* 44(6): 384. 1979. *J. Steyermark, V. Carreño, R. McDiarmid & Ch. Brewer-Carías* 115640. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2360-2420 m snm, 23/02/1978. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus perplexans* Moldenke var. *wurdackii* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 98. 1953. *R. Cowan & J.J. Wurdack* 31141. Venezuela: Amazonas, Serranía Parú, Río Parú, Caño Asisa, Río Ventuari, 2000 m snm, 02/02/1951. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus phelpsae* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 852. 1972. *J. Steyermark* 97932. Venezuela: Bolívar, Cerro Jaua, cumbre de la porción central occidental de la Meseta de Jaua, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipos (NY, VEN).
- Paepalanthus saxicola* Körn. var. *conicus* Moldenke, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 23(103): 300. 1963. *E. Foldats* 3629. Venezuela: Amazonas, along the margin of the Río Atabapo, cerca de la boca del Río Atacavi, at Santa Cruz, 03/09/1960. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus scopulorum* Moldenke, *Fiediana, Bot.* 28(1): 122. 1951. *J. Steyermark* 59914. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2410 m snm, 06/11/1944. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus scopulorum* Moldenke var. *ayuyantepuiensis* Moldenke, *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 153. 1967. *J. Steyermark* 93957-A. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2050-2300 m snm, 15/05/1964. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus sessiliflorus* Mart. ex Körn. var. *venezuelensis* Moldenke, *Phytologia* 28(2): 193. 1974. *J. Steyermark, C. Steyermark, J.J. Wurdack, M. Wurdack & H. Wiehle* 106609. Venezuela: Bolívar, carretera el Dorado to Santa Elena de Uairén, 198 km south of El Dorado, 1200-1400 m snm, 7-10/12/1972. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipos (MO, US, VEN).
- Paepalanthus squamiliferus* Moldenke, *Fiediana, Bot.* 28(1):124. 1951. *J. Steyermark* 59777. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2400 m snm, 02/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus stegolepoides* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 409. 1957. *J.J. Wurdack* 34315. Venezuela: Bolívar, Churi-tepui (Muru-tepui), 2300-2350 m snm, 03/02/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus steyermarkii* Moldenke, *Fiediana, Bot.* 28(1):125. 1951. *J. Steyermark* 59369. Venezuela: Bolívar, Gran Sabana, 1000-1200 m snm, 26/10/1944. Holótipo (NY), Isótipos (MO, US, VEN).

- Paepalanthus subsessilis* Moldenke, *Phytologia* 2(7): 232. 1947. *J. Steyermark* 55495. Venezuela: Lara, between Buenos Aires and Páramo de las Rosas, 3300 m snm, 11/02/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus tafelbergensis* Moldenke, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 199. 1948. *B. Maguire* 24485. Surinam: Savanna VIII, 25/08/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus tatei* Moldenke, *Brittonia* 3(2): 158. 1939. *G.H. Tate* 1326. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2200 m snm, 01/12/1937-01/01/1938. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus venetifolius* Moldenke & Steyermark., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 284. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 109405. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, 1750-1800 m snm, 22-28/02/1974. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, US).
- Paepalanthus venustoides* Moldenke, *Acta Biol. Venez.* 2(7): 48. 1957. *V. Vareschi & E. Foldats* 4854. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2300 m snm, 01/04/1956. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Paepalanthus venustus* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 281. 1957. *B. Maguire* 32840. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 1800 m snm, 30/12/1951. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Paepalanthus williamsii* Moldenke, *Phytologia* 2(9): 367. 1947. *Ll. Williams* 15051. Venezuela: Amazonas, Sabana de San Antonio, 121 m snm, 27/02/1942. Holótipo (NY), Isótipos (F, US, VEN).
- Rondonanthus micropetalus* Moldenke, *Fiel-diana, Bot.* 28(1): 126. 1951. *J. Steyermark* 58777. Venezuela: Bolívar, Mount Roraima, 2255-2620 m snm, 27/09/1944. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Syngonanthus acopanensis* Moldenke, *Phytologia* 3(1): 41. 1948. *F. Cardona* 2280. Venezuela: Bolívar, Cerro Acopán, 1900 m snm, 01/10/1947. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus allenii* Moldenke var. *parvus*
- Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 99. 1953. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 29238. Venezuela: Amazonas, Puerto Ayacucho, 24/10/1950. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Syngonanthus cowani* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 99. 1953. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30466. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, Río Orinoco, 125 m snm, 31/12/1950. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus cowani* Moldenke var. *sim-plex* Moldenke, *Phytologia* 51(4): 245. 1982. *O. Huber* 5096. Venezuela: Amazonas, sabana en la ribera derecha (N) del Río Guayapo medio, 110 m snm, 09/03/1980. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus cowani* Moldenke var. *tabu-latus* Moldenke, *Phytologia* 44(4): 215. 1979. *O. Huber* 1684. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Yapacana, 100 m snm, 14-28/02/1978. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus densifolius* Silveira var. *venezuelensis* Moldenke, *Phytologia* 48(4): 291. 1981. *O. Huber & S. Tillett* 2918. Venezuela: Amazonas, Caño Yagua, 120 m snm, 06/12/1978. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus flavipes* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 100. 1953. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30465. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, Río Orinoco, 125 m snm, 31/12/1950. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Syngonanthus glandulosus* Gleason var. *epa-pilosus* Moldenke, *Phytologia* 26(3): 177. 1973. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 45a. Venezuela: Bolívar, Salto Aricana, Río Urimán, 393 m snm, 09/01/1955. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus guianensis* Moldenke, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 201. 1948. *B. Maguire & D. Fanshawe* 23236. Guyana: Kaieteur Savanna, 04/05/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus humboldtii* Ruhland var. *elon-*

- gatus* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 101. 1953. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30558. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, Río Orinoco, 125 m snm, 01/01/1951. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Syngonanthus humboldtii* Ruhland var. *humilis* Moldenke, *Phytologia* 45(1): 40. 1980. *G. Davidse & A. González* 15961. Venezuela: Apure, Distrito Camejo, about 2 km south of Caño La Cochina de La Pica along the main road south of Paso de San Pablo to the Río Cinaruco, 70 m snm, 02/03/1979. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus humboldtii* Ruhland var. *orientalis* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 102. 1953. *B. Maguire* 29340. Venezuela: Amazonas, Río Temí, below Yavita, 20/10/1950. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Syngonanthus lanatus* Moldenke var. *alpinus* Moldenke, *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 153. 1967. *J. Steyermark* 93931. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2050-2300 m snm, 15/05/1964. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótípos (US, VEN).
- Syngonanthus obtusifolius* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 410. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 406. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 1940 m snm, 04/02/1955. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Syngonanthus phelpae* Moldenke, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 14(78): 12. 1952. *B. Maguire, K. Phelps, Ch. Hitchcock & G. Budowski* 31707. Venezuela: Amazonas, Cerro Guanay, Caño Guaviarito, Río Manapiare, Río Ventuari, 2000 m snm, 02/02/1951. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Syngonanthus phelpae* Moldenke var. *cardonae* Moldenke, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 23(101): 100. 1962. *F. Cardona* 1990. Venezuela: Bolívar, pie de Cerro Aprada, 1850 m snm, 19/11/1946. Holótipo (VEN).
- Syngonanthus phelpae* Moldenke var. *elongatus* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 102. 1953. *R. Cowan & J.J. Wurdack* 31098. Venezuela: Amazonas, Serranía Parú, 2000 m snm, 31/01/1951. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus phelpae* Moldenke var. *pilosus* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 282. 1957. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37308. Venezuela: Amazonas, Cerro de la Neblina, Río Yatúa, 1850-1900 m snm, 15/01/1954. Holótipo (NY), Isótípos (F, US, VEN).
- Syngonanthus rivularis* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 411. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 792. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2120 m snm, 12/02/1955. Holótipo (NY), Isótípos (F, US, VEN).
- Syngonanthus savannarum* Moldenke, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 202. 1948. *B. Maguire & D. Fanshawe* 23280. Guyana: Kaieteur Savanna, 06/05/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus savannarum* Moldenke var. *glabrescens* Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 412. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 539. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 1940 m snm, 07/02/1955. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Syngonanthus similis* Ruhland var. *venezuelensis* Moldenke, *Phytologia* 45(2): 209. 1980. *O. Huber* 1633. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, entre Caño Cotua y el pie occidental del Cerro Yapacana, 100 m snm, 14-28/02/1978. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus surinamensis* Moldenke, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 202. 1948. *B. Maguire* 24502. Suriname: Tafelberg, 200 m west of Grace Falls, 200 m snm, 26/08/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Syngonanthus tenuis* Ruhland var. *minor* Moldenke, *Phytologia* 37(3): 275. 1977. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 113217. Venezuela: Bolívar, cumbre del Cerro Guaiquinima, 1-2 km río arriba del Salto del Río Szczercbanari (Río Carapo), 750 m snm, 20-25/01/1977.

Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).

Syngonanthus tiricensis Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 412. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 739. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2120-2210 m snm, 11/02/1955. Holótipo (NY), Isótipes (US, VEN).

Syngonanthus vareschii Moldenke, *Acta Biol. Venez.* 2(7): 50. 1957. *V. Vareschi & E. Foldats* 4576. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 1100 m snm, 04/01/1956. Holótipo (VEN), Isótipes (LL transferido a TEX, NY).

Syngonanthus venezuelensis Moldenke, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 128. 1951. *J. Steyermark* 59347. Venezuela: Bolívar, Gran Sabana, between Mission of Santa Teresita de Kavanayén northwest to Río Karuai, 1220 m snm, 26/10/1944. Holótipo (NY), Isótipes (US, VEN).

Syngonanthus xeranthemoides (Bong.) Ruhland fo. *brevifolius* Moldenke, *Phytologia* 26(3): 178. 1973. *J. Steyermark, C. Steyermark, J.J. Wurdack, M. Wurdack & H. Wiehle* 106632. Venezuela: Bolívar, carretera El Dorado hacia Santa Elena de Uairén, km 198 al sur de El Dorado, 1200-1400 m snm, 7-10/12/1972. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipo (VEN).

Syngonanthus yapacanensis Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 8(2): 102. 1953. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30782. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, 125 m snm, 07/01/1951. Holótipo (NY), Isótipes (F, MO, US, VEN).

Syngonanthus yapacanensis Moldenke var. *hirsutus* Moldenke, *Phytologia* 36: 51. 1977. *A. Gentry & S. Tillett* 10869. Venezuela: Amazonas, road from San Fernando de Atabapo to Santa Bárbara, 12-40 km from San Fernando, 110 m snm, 24/03/1974. Holótipo (LL transferido a TEX), Isótipes (MO, VEN).

Wurdackia flabelliformis Moldenke, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 413. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 671. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2165-2180

m snm, 09/02/1955. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

HAEMODORACEAE

Pyrrhorhiza neblinae Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 318. 1980. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37108. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1900 m snm, 06/01/1954. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

HELICONIACEAE

Heliconia acuminata Rich. var. *viridicarpa* G. Rodr., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(81): 129. 1954. *G. Rodríguez* 242. Venezuela: Yaracuy, entre Marín y Aroa, 100 m snm, 01/12/1953. Holótipo (VEN).

Heliconia aurea G.Rodr., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(81): 120. 1954. *G. Rodríguez* 230. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, 600-1200 m snm, 01/09/1953. Holótipo (VEN).

Heliconia brachyantha L.Andersson, *Opera Bot.* 82: 64. 1985. *J. Steyermark, G. Bunting & C. Blanco* 101752. Venezuela: Apure, Reserva Forestal San Camilo, 250-280 m snm, 02/04/1968. Holótipo (VEN), Isótipo (NY).

Heliconia costanensis Aristeg., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 208. 1964. *J. Steyermark* 91975. Venezuela: Miranda, Pico Naiguatá, 1000-1300 m snm, 15-19/11/1963. Holótipo (VEN).

Heliconia falcata Barreiros, *Rodriguesia* 28(41): 130. 1976. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 101238. Venezuela: Táchira, Río Quinimari entre La Revancha y La Providencia, 1600-1900 m snm, 23-01-1968. Holótipo (VEN).

Heliconia julianii Barreiros, *Rodriguesia* 28(41): 130. 1976. *J. Steyermark & G. Bunting* 102678. Venezuela: Amazonas, San Carlos de Río Negro, 125 m snm, 17-18/04/1970. Holótipo (VEN).

Heliconia nana G.Rodr., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(81): 127. 1954. *G. Rodríguez* 238. Venezuela: Carabobo, llanos entre

- Urama* y Morón, 100 m snm, 30/12/1953. Holótipo (VEN).
- Heliconia nickeriensis* Maas & Rooij, *Acta Bot. Neerl.* 28: 91. 1979. *P.J.M. Maas, H. Maas & P. Teunissen* 2366. Surinam: District Nickerie, along ditch, 15 km north of Wageningen, 14/11/1974. Holótipo (U), Isótipos (BBS, CAY, F, GB, K, MO, NY, P, RB, VEN, Z).
- Heliconia psittacorum* L.f. var. *rhizomatosa* Aristeg., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22: 20. 1961. *L. Aristeguieta* 4310. Venezuela: Cojedes, alrededores de Tinaquillo, Hacienda Aguirre, 01/07/1960. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).
- Heliconia rodrigueensis* Aristeg., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(98-99): 17. 1961. *L. Aristeguieta* 3890. Venezuela: Miranda, Guatopo, entre Santa Teresa y Altagracia de Orituco, 600 m snm, 01/05/1959. Holótipo (VEN).
- Heliconia schneeantha* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1):161. 1951. *J. Steyermark* 56083. Venezuela: Mérida, above La Azulita, 1310-1340 m snm, 25/04/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Heliconia steyermarkii* Aristeg., *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 25(107): 206. 1964. *J. Steyermark & G. Agostini* 91201. Venezuela: Sucre, Península de Paria, Cerro Patao, norte de Puerto Hierro, noreste de Güiria, 850-860 m snm, 20/07/1962. Holótipo (VEN).
- IRIDACEAE**
- Trimezia chimantensis* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71(1): 301. 1984. *J. Steyermark, O. Huber & V. Carreño* 128071. Venezuela: Bolívar, Macizo del Chimantá, 2000 m snm, 26-29/01/1983. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).
- LILIACEAE**
- Echeandia bolivarensis* Cruden, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(1): 350. 1989. *J. Steyermark, B. Holst & B. Manara* 131761. Venezuela: Bolívar, Serranía de Pijiguo, 100-125 m snm, 12/09/1985. Holótipo (MO), Isótipos (UC, VEN).
- Nietneria paniculata* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1):153. 1951. *J. Steyermark* 59362. Venezuela: Bolívar, Gran Sabana, between Mission of Santa Teresita de Kavanayén northwest to Río Karuai, 1200 m snm, 26/10/1944. Holótipo (F), Isótipo (VEN).
- Pleomele hawaiiensis* O.Deg. & I.Deg., *Flora Hawaiiensis* 7 (family 68). 1980. *O. Degener & I. Degener* 34432. Estados Unidos: Hawaii, near "Belt Road", mauka of Pohue Bay, Kau", 627 m snm, 05/12/1983. Holótipo (BISH), Isótipos (US, VEN).
- Tofieldia duidae* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 156. 1951. *J. Steyermark* 58176. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1700-1980 m snm, 01/09/1944. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).

MARANTACEAE

- Ischnosiphon enigmaticus* L.Andersson, *Opera Bot.* 43: 62. 1977. *C. Blanco* 292. Venezuela: Bolívar, vicinity of Campamento Paraíso and Campamento La Yagua, ca. 24-48 km north-east of Caserío Los Rosos on road between Upata and San Félix, 17 km from Upata, 1-25/08/1965. Holótipo (VEN).

- Ischnosiphon leucophaeus* (Poepp. & Endl.) Körn. subsp. *ramosus* L. Andersson, *Opera Bot.* 43: 79. 1977. *J. Steyermark, G. Bunting & C. Blanco* 101448. Venezuela: Apure, Reserva Forestal San Camilo, 250 m snm, 28/03/1968. Holótipo (VEN).

- Monotagma rhodantha* Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 15. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42501. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, occasional along Cañón Grande, 1050-1100 m snm, 25/12/1957. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

- Monotagma yapacanensis* Steyermark. & G.S.Bunting, *Acta Bot. Venez.* 8(1-4): 114. 1973. *J. Steyermark & G. Bunting* 103062.

Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, 125-400 m snm, 03/05/1970. Holótipo (VEN), Isótipo (US).

Thymocarpus cannooides Nicolson, Steyerm. & Sivad., *Brittonia* 33(1): 24. 1981. *B. Maguire, J. Steyermark & C. Maguire* 53608. Venezuela: Bolívar, southeast end of Cerro Pitón, Cordillera Epicara, Alto Río Cuyuní, 40 m snm, 05/09/1962. Holótipo (VEN), Isótipes (NY, MO, US, VEN).

ORCHIDACEAE

Apatostelis garayi Dunst., *Amer. Orchid Soc. Bull.* 50(9): 1075. 1981. *G.C.K. Dunsterville* 1418. Venezuela: Bolívar, Salto Párvan, Río Yuruán, 250 m snm, s/f. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).

Baskervilla venezuelana Garay & Dunst., *Venez. Orchid. III.* 6: 52. 1976. *G.C.K. Dunsterville* 1240. Venezuela: Zulia, Sierra de Perijá, 1120 m snm, 01/09/1972. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).

Bifrenaria maguirei C.Schweinf., *Amer. Orchid Soc. Bull.* 28: 199. 1959. *B. Maguire & L. Politi* 27598. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1600 m snm, 12/12/1948. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).

Brachionidium julianii Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 39: 6. 1986. *J. Steyermark* 129512. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 2560 m snm, 10-12/10/1983. Holótipo (VEN).

Brachionidium neblinense Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 39: 9. 1986. *T. Plowman & W.W. Thomas* 13584. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 2000 m snm, 15/04/1984. Holótipo (VEN), Isótipes (F, TFAV).

Brachionidium steyermarkii Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 306. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98592. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo de El Tamá, 2750-2950 m snm, 20-23/05/1967. Holótipo (VEN).

Bulbophyllum manarae Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 309. 1968. *B. Manara* 99. Venezuela: Miranda, Pico Naiguatá,

1500-1635 m snm, 27/09/1964. Holótipo (VEN).

Bulbophyllum steyermarkii Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 311. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 100818. Venezuela: Táchira, caceras del Río Quinimari, entre el pie del peñasco de la Peña de la Pata de Judío y el pie del Salto Choréjón de la Mota de la Peña de Ventana, 2500-2800 m snm, 12/01/1968. Holótipo (VEN).

Bulbophyllum vareschii Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 314. 1968. *V. Vareschi* 4000. Venezuela: Táchira, San Antonio, 700 m snm, 09/09/1955. Holótipo (VEN).

Campylocentrum schneeanum Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 274. 1961. *L. Schnee* 507. Venezuela: Distrito Federal, El Junquito, 2000 m snm, 09/10/1949. Holótipo (MY), Isótipo (VEN).

Campylocentrum steyermarkii Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 316. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96715. Venezuela: Táchira, El Piñal, Río Frío, 250-300 m snm, 27-30/08/1966. Holótipo (VEN).

Catasetum merchiae G.A.Romero, *Selbyana* 10(1): 73. 1987. *G. Romero* 1275. Venezuela: Amazonas, Río Cataniapo, cerca de Gavilán, 81 m snm, 23/04/1986. Holótipo (VEN), Isótipo (TFAV).

Catasetum paraguazense G.A.Romero & Carnevali, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(2): 457. 1989. *E. Rutkis* 1985. Venezuela: Bolívar, Distrito Cedeño, Río Parguaza, 12/05/1967. Holótipo (VEN).

Catasetum wendlingeri Foldats, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(2): 460. 1989. *E. Foldats* 2890. Venezuela: Amazonas, alrededores de San Fernando de Atabapo, 01/07/1957. Holótipo (VEN).

Catasetum yavitaense G.A.Romero & C. Gómez, *Harvard Pap. Bot.* 3(1): 53. 1998. *C. Gómez s/n.* Venezuela: Amazonas, vicinity of Maroa, s/f. Holótipo (VEN), Isótipo (AMES).

Cleistes huberi Carnevali & I.Ramírez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 77(3): 549. 1990. *B. Holst* 3480. Venezuela: Bolívar, Aparamán-tepui, 2150 m snm, 22/03/1987.

- Holótipo (VEN), Isótipo (MO). *Cleistes rosea* Lindl. f. *pallida* Carnevali & I.Ramírez, Ann. Missouri Bot. Gard. 77(3): 551. 1990. G. Carnevali, I. Ramírez & G. Romero 2661. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, morichal 1-2 km al este de Piedra Tortuga, 80-90 m snm, 30/06/1988. Holótipo (VEN), Isótipes (AMES, INPA, MO, MY, PORT, TFAV).
- Coryanthes gernotii* G.Gerlach & G.A.Romero, Orchidee (Hamburg) 42(2): 65. 1991. G. Gerlach, T. Neudecker & C. Quijada s/n. Venezuela: Barinas, Río Calderas bei Calderas, 1000 m snm, 15/03/1989. Holótipo (HEID), Isótipo (VEN).
- Coryanthes pegiae* G.A.Romero, Selbyana 9: 147. 1986. G. Romero 1202. Venezuela: Amazonas, Río Cataniapo, Raudal Rabipelado, 75 m snm, 05/06/1984. Holótipo (VEN).
- Coryanthes rutkisii* Foldats, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 28(115-116): 231. 1969. E. Rutkis 202. Venezuela: Bolívar, entre Luepa y Divina Pastora, 01/04/1968. Holótipo (VEN).
- Cranichis fendleri* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 30. 1919. A. Fendler 2135. Venezuela: Aragua, Colonia Tovar, 1856-1857. Holótipo (B, probablemente destruido), Isótipo (AMES), fragmento del Isótipo (VEN).
- Cyrtopodium naiguatae* Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 6: 43. 1919. H.Pittier 6223. Venezuela: Miranda, Pico Naiguatá, 1900-2400 m snm, 05/1913. Holótipo (B, probablemente destruido), fragmentos del Holótipo (US, VEN).
- Dichaea venezuelensis* Carnevali & I.Ramírez, Novon 3(2): 102. 1993. R. Liesner & B. Holst 20477. Venezuela: Bolívar, Distrito Piar, Amaruay-tepui, southern side, 700-910 m snm, 28/04/1986. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).
- Duckeela alticola* C.Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 19(9): 195. 1961. B. Maguire 32973. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaiquinima, 1600-1700 m snm, 04/01/1952. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Elleanthus tovarensis* Ames, Sched. Orchid. 1: 22. 1922. H. Pittier 10010. Venezuela: Aragua, Colonia Tovar, 2150-2200 m snm, 26/12/1921. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Encyclia guianensis* Carnevali & G.A.Romero, Lindleyana 9(1): 63. 1994. J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 93048. Venezuela: Bolívar, a lo largo del camino sur de El Dorado, 500 m snm, 21/12/1963-13/01/1964. Holótipo (VEN), Isótipo (AMES).
- Epidendrum chimantense* Hágster & Carnevali, Icon. Orchid. 2: 121. 1993. J. Steyermark 75836. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2200-2300 m snm, 20/06/1953. Holótipo (NY), Isótipes (AMES, VEN).
- Epidendrum cornicallosum* Foldats, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 28(115-116): 234. 1969. J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 101008. Venezuela: Táchira, entre Las Copas y Alto de Fila de Tierra Negra, 2870-2880 m snm, 16/01/1968. Holótipo (VEN).
- Epidendrum dunstervillei* Foldats, Acta Bot. Venez. 2(2): 34. 1966. J. Steyermark & G. Agostini 91040. Venezuela: Sucre, Península de Paria, Cerro Patao, 1020 m snm, 19/07/1962. Holótipo (VEN), Isótipo (AMES).
- Epidendrum garcianum* Garay & Dunst., Venez. Orchid. Ill. 2: 122. 1961. C. García 523. Venezuela: Falcón, Sierra de San Luis, cerca de Curimagua, 1320 m snm, 01/01/1960. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Epidendrum liliiae* Foldats, Acta Bot. Venez. 3(1-4): 321. 1968. E. Foldats 7005. Venezuela: Mérida, 20 km de Mérida hacia La Carbonera, quebrada Los González, 1800 m snm, 01/01/1967. Holótipo (VEN).
- Epidendrum manarae* Foldats, Acta Bot. Venez. 3(1-4): 323. 1968. B. Manara 91. Venezuela: Distrito Federal, Fila Corozo hacia el Pico Naiguatá, 1800 m snm, 24/03/1967. Holótipo (VEN).
- Epidendrum nuriense* Carnevali & Hágster, Novon 2(4): 316. 1992. G.C.K. Dunster-

- ville & E. Dunsterville* 1333. Venezuela: Bolívar, Altiplanicie de Nuria, 600-700 m snm, s.f. Holótipo (VEN), Isótipo (AMES).
- Epidendrum tachirense* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 325. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98670. Venezuela: Táchira, faldas por debajo del Páramo de El Tamá, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Epidendrum tamaense* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 328. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98380. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo de El Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Epidendrum vareschii* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 28(115-116): 237. 1969. *V. Vareschi* 6442. Venezuela: Trujillo, por debajo del Páramo de Boconó, 2700 m snm, 18/08/1957. Holótipo (VEN).
- Erythrodes elata* L.O. Williams, *Lilloa* 6: 242. 1941. *W. Gehrig* 480. Venezuela: Mérida, Tabay, 2500-3200 m snm, 18/09/1940. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Gomphichis montana* L.O. Williams, *Lilloa* 6: 242. 1941. *F. Cardona* 336. Venezuela: Táchira, Páramo del Tamá, 3100-3300 m snm, 01/07/1939. Holótipo (VEN).
- Gomphichis steyermarkii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 331. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 100883. Venezuela: Táchira, cabeceras del Río Quinimará, a lo largo de las quebradas de Las Copas, 2500 m snm, 13/01/1968. Holótipo (VEN).
- Habenaria guanchezii* Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 33: 14. 1985. *F. Guánchez* 3085. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, 100-120 m snm, 20/04/1984. Holótipo (VEN), Isótipos (MY, TFAV).
- Habenaria huberi* Carnevali & Morillo, *Ernstia* 19: 6. 1983. *O. Huber* 4542. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, Cuenca del Río Manapiare, 150 m snm, 09/10/1979. Holótipo (VEN).
- Habenaria longicauda* Hook. subsp. *ecalcarata* Snuv. & Westra, *Acta Bot. Neerl.* 30(3): 237. 1981. *D. Geijskes* 23. Suri-
- nam: Iavaweg, Lelydorp, 17/03/1950. Holótipo (U), Isótipos (AMES, BBS, HB, K, MO, NY, P, VEN).
- Habenaria nilssonii* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 256. 1961. *J. Steyermark & S. Nilsson* 173. Venezuela: Bolívar, between Luepa y Cerro Venamo, 1200 m snm, 15/04/1960. Holótipo (VEN), Isótipo (UPS).
- Koellensteinia liliiae* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 263. 1961. *E. Foldats* 3899. Venezuela: Amazonas, Laja Cabezón, Río Cabezón, cerca de la desembocadura del Río Atabapo, 11/09/1960. Holótipo (VEN).
- Lepanthes calcodon* Luer, *Phytologia* 59(7): 445. 1986. *G.C.K. Dunsterville* 1120. Venezuela: Táchira, near the pass between Zumbador and Quenequea, 2500 m snm, 01/10/1969. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Lepanthes dunstervilleorum* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 333. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98525. Venezuela: Táchira, faldas inmediatamente debajo del Páramo de Tamá, 2750-2950 m snm, 20-23/05/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthes elaeanorae* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 336. 1968. *B. Manara* 73. Venezuela: Distrito Federal, Fila de Corozo, Cerro Naiguatá, 2300 m snm, 06/08/1966. Holótipo (VEN).
- Lepanthes palmaritensis* Garay, *Canad. J. Bot.* 34(2): 251. 1956. *M. Grant* 9628. Colombia: Departamento Cundinamarca, Cordillera Oriental, east side of the Valle Palmarito, 8 km east of Gutierrez, 50 km south of Bogotá, 2650 m snm, 22/07/1944. Holótipo (US), Isótipos (AMES, VEN).
- Lepanthes pariaensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 339. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96091. Venezuela: Sucre, Península de Paria, Cerro Espejo, 780-850 m snm, 06/08/1966. Holótipo (VEN).
- Lepanthes pectinata* Luer, *Phytologia* 59(7): 449. 1986. *G.C.K. Dunsterville* 832. Venezuela: Bolívar, in forest along the road to Santa Elena de Uairén, between km 114

- and 136, 900-1300 m snm, 01/11/1964. Holótipo (MO), Isótípico (VEN).
- Lepanthes prolifera* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 28(115-116): 247. 1969. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 101198. Venezuela: Táchira, al pie de Pata de Judío, entre alto de cruces y páramo arriba de la Quebrada Teleférico, 2900-3100 m snm, 20/01/1968. Holótipo (VEN).
- Lepanthes rabei* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 341. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96936. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo de la Negra, 2700-2900 m snm, 29-30/08/1966. Holótipo (VEN).
- Lepanthes rutkisii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 344. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98322. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthes steyermarkii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 346. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98381. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthes tachirensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 348. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98524. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, 2750-2950 m snm, 20-23/05/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthes tamaensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 351. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98658. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, cerca de la quebrada Buena Vista, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthes unirrinervis* Carnevali & I.Ramírez, *Novon* 3(2): 115. 1993. *R. Liesner* 23433. Venezuela: Bolívar, Ilú-tepui, 2500 m snm, 16/04/1988. Holótipo (VEN), Isótípico (MO).
- Lepanthes vareschii* Garay, *Canad. J. Bot.* 34(2): 252. 1956. *V. Vareschi* 2306. Venezuela: Mérida, Páramo de Monsalves, 3190 m snm, 10/11/1952. Holótipo (AMES), Isótípico (VEN).
- Lepanthes venezuelensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 353. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98687. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, cerca de la quebrada Buena Vista, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthes zettleri* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 261. 1961. *L. Zettler de Vareschi* 5980. Venezuela: Mérida, Laguna Coromoto, 3400 m snm, 13/01/1959. Holótipo (VEN).
- Lepanthopsis steyermarkii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 356. 1968. *J. Steyermark* 99218. Venezuela: Falcón, Sierra de San Luis, 1400 m snm, 19/07/1967. Holótipo (VEN).
- Lepanthopsis vinacea* C. Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 18(3): 109. 1958. *B. Maguire & J.J. Wurdack* 33866. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 1500-2000 m snm, 17/12/1952. Holótipo (AMES), Isótípico (VEN).
- Lockhartia lasseri* Schnee, *Revista Fac. Agron. (Maracay)* 1: 120. 1952. *T. Lasser* 752. Venezuela: Barinas, Río Paguey, 01/01/1942. Holótipo (VEN).
- Malaxis juliani* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 358. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 100896. Venezuela: Táchira, cabeceras del Río Quinimári, debajo de la Peña de Pata de Judío, 2350-2400 m snm, 14/01/1968. Holótipo (VEN).
- Masdevallia manaranana* Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 44: 15. 1987. *W. Anderson* 13415. Venezuela: Amazonas, Cerro Nebolina, 1850-1850 m snm, 29/11/1984. Holótipo (VEN), Isótípico (MICH).
- Masdevallia schildhaueri* Koniger, *Arcula* 2: 42. 1994. *W. Königer, H. Königer, H. Schildhauer & C. García Esquivel* 267. Venezuela: Táchira, Betania, 2600 m snm, 12/06/1992. Holótipo (M), Isótípicos (K, VEN, Herbario personal de H. Königer).
- Maxillaria aristeguietae* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 266. 1961. *L. Aristeguieta* 3791. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, 900-1300

- m snm, 01/01/1959. Holótipo (VEN).
- Maxillaria auyantepuiensis* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 269. 1961. *V. Vareschi & E. Foldats* 4695. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, altiplanicie de Guayaraca, 1100 m snm, 04/01/1956. Holótipo (VEN).
- Maxillaria auyantepuiensis* Foldats subsp. *epiphytica* Carnevali & I. Ramírez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(2): 376. 1989. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 92993. Venezuela: Bolívar, bosque húmedo en las vecindades del km 119 al sur de El Dorado, 130 m snm, 12/01/1964. Holótipo (VEN).
- Maxillaria foldatsiana* Carnevali & I.Ramírez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(2): 376. 1989. *T. Koyama & G. Agostini* 7378. Venezuela: Bolívar, Uaipantepui, 1200 m snm, s/f. Holótipo (VEN).
- Maxillaria pannieri* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 272. 1961. *F. Pannier & W. Schwabe* 1480. Venezuela: Mérida, La Mucuy, 2600 m snm, 15/08/1958. Holótipo (VEN).
- Maxillaria santanae* Carnevali & I.Ramírez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(2): 377. 1989. *G. Santana* 1. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 1000 m snm, 11/11/1986. Holótipo (VEN).
- Maxillaria steyermarkii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 361. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98384. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo de El Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Maxillaria x dustervilleorum* Carnevali & I. Ramírez, *Novon* 3(2): 106. 1993. *V. Funk* 6258. Venezuela: Amazonas, Cerro de La Neblina, 2000 m snm, 17-22/02/1984. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Mesadenella angustisegmenta* Garay, *Bot. Mus. Leafl.* 28(4): 285. 1980. *H. Pittier* 10985. Venezuela: Zulia, in forest of Río Lora, 18/12/1922. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Myoxanthus aspasicensis* (Rchb.f.) Luer subsp. *arenicola* Carnevali & I.Ramírez, *Novon* 3(2): 117. 1993. *R. Liesner* 25776.
- Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Huachamacari, 600-700 m snm, 11/03/1988. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).
- Octomeria dentifera* C.Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 19(9): 205. 1961. *J.J. Wurdack* 34218. Venezuela: Bolívar, Churi-tepui (Muru-tepui), 2250-2300 m snm, 26/1/1953. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Octomeria flaviflora* C.Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 19(9): 207. 1961. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30024. Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, 1800 m snm, 06/12/1950. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Octomeria gemula* Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 39: 13. 1986. *G. Carnevali, F. Guánchez & E. Melgueiro* 1715. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, 90-100 m snm, 20/02/1985. Holótipo (VEN).
- Octomeria heleneana* Carnevali & Delascio, *Ernstia* 45: 11-15. 1987. *F. Delascio* 12364. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, ladera sur-este del Cerro Huachamacari, 175-805 m snm, 12-14/10/1984. Holótipo (VEN).
- Octomeria kestrochila* Garay & Dunst., *Venez. Orchid. III*: 6: 288. 1976. *J. Steyermark & G. Bunting* 103130. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, 1000-1200 m snm, 05-07/05/1970. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Octomeria nana* C. Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 19(9): 211. 1961. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 1027. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, 2030-2150 m snm, 21/2/1955. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Octomeria romerorum* Carnevali & I.Ramírez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 77(3): 551. 1990. *G. Romero, F. Guánchez & E. Gutiérrez* 1324. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, 14/07/1987. Holótipo (VEN), Isótipos (K, MO, TFAV).
- Oncidium dunstervilleorum* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 364. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunster-*

ville 98855. Venezuela: Táchira, entre Las Delicias y Villa Páez, por arriba del Río Táchira, 1500-1920 m snm, 16-26/05/1967. Holótipo (VEN).

*Oncidium posadaru*m Koniger, *Arcula* 4: 110. 1995. *W. Koniger* 54. Colombia: Departamento del Cauca, Munchiquí, 2000-2500 m snm, s/f. Holótipo (M), Isótipos (JAUM, K, VEN).

Oncidium steyermarkii Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 366. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96993. Venezuela: Mérida, debajo del Páramo de La Negra, carretera hacia Bailadores, 2500 m snm, 30/08-2/09/1966. Holótipo (VEN).

Oncidium vagans C.Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 18(5): 223. 1958. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 762. Venezuela: Bolívar, Chimaná Massif, 2120 m snm, 12/02/1955. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).

Pachyphyllum steyermarkii Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 369. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98345. Venezuela: Táchira, faldas debajo del Páramo del Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).

Pleurothallis carreñoi Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 44: 18. 1987. *J. Steyermark, R. Liesner & V. Carreño* 121458. Venezuela: Sucre, Península de Paria, 850-890 m snm, 21/02/1980. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, MY, VEN).

Pleurothallis deborana Carnevali & I. Ramírez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 77(3): 553. 1990. *G. Carnevali & I. Ramírez* 2317. Venezuela: Bolívar, Distrito Cedeño, bosque al borde de sabana al este del Río Parguaza, 100 m snm, 08/06/1987. Holótipo (VEN).

Pleurothallis delascioi Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 31: 7. 1985. *R. Liesner* 6860. Venezuela: Amazonas, 1 to 2 km SE and east of San Carlos de Río Negro, ca. 20 km south of confluence of Río Negro and Casiquiare, 120 m snm, 22/04/1979. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).

Pleurothallis dunstervillei Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 371. 1968. *J. Steyer-*

mark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 100843. Venezuela: Táchira, Sur de San Vicente de la Revancha, 2500-2700 m snm, 13/01/1968. Holótipo (VEN).

Pleurothallis elvirana Carnevali & I.Ramírez, *Novon* 3(2): 118. 1993. *R. Liesner & B. Stannard* 16898. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro la Neblina, Neblina Base Camp, 1250 m snm, 21-24/03/1984. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).

Pleurothallis holstii Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 39: 18. 1986. *J. Steyermark, B. Holst & B. Manara* 131611. Venezuela: Bolívar, Distrito Cedeño. Forest bordering savanna E of Río Parguaza, km 125 from northern alcabala of Puerto Ayacucho, 85 m snm, 08-11/09/1985. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).

Pleurothallis latilabris Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 376. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 100881. Venezuela: Táchira, cabeceras del Río Quinimarí, 2600-2630 m snm, 13/01/1968. Holótipo (VEN).

Pleurothallis liliiae Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 379. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98549. Venezuela: Táchira, faldas por debajo del Páramo del Tamá, 2750-2950 m snm, 20-23/05/1967. Holótipo (VEN).

Pleurothallis magnispatha Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 382. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 100626. Venezuela: Táchira, cabeceras del Río Quinimarí, 2400 m snm, 10-11/01/1968. Holótipo (VEN).

Pleurothallis nanifolia Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 258. 1961. *J. Steyermark* 86725. Venezuela: Bolívar, arriba del Raudal Cotúa, al sur de La Paragua, 300 m snm, 01/08/1960. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).

Pleurothallis nubensis Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 384. 1968. *J. Steyermark* 99482. Venezuela: Falcón, Sierra de San Luis, 1300 m snm, 23/07/1967. Holótipo (VEN).

Pleurothallis pemonum Carnevali & I.Ramí-

- rez, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 77(3): 555. 1990. *G. Romero* 1334. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, carretera a Gavilán, 29/07/1987. Holótipo (VEN), Isótipo (TFAV).
- Pleurothallis perijaënsis* Dunst., *Selbyana* 2(2-3): 210. 1978. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 105666. Venezuela: Zulia, Sierra de Perijá, 1550 m snm, 01/03/1972. Holótipo (VEN).
- Pleurothallis rabei* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 387. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 97263. Venezuela: Trujillo, entre Urbina y San Rafael, 2300-2500 m snm, 03-04/09/1966. Holótipo (VEN).
- Pleurothallis sanluisii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 390. 1968. *J. Steyermark* 98995. Venezuela: Falcón, Sierra de San Luis, 1400-1500 m snm, 17/07/1967. Holótipo (VEN).
- Pleurothallis steinbuchiae* Carnevali & G.A. Romero, *Novon* 4(2): 90. 1994. *G. Carnevali* 2957. Venezuela: Bolívar, Cerro Guaquinima, 02/1990. Holótipo (VEN).
- Pleurothallis tamaensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 392. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98336. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo de El Tamá, 2475-2550 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Ponthieva ovatiloba* C.Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 19(9): 211. 1961. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42559. Venezuela: Amazonas, Cerro de la Neblina, 140-1700 m snm, 31/12/1957. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Scaphosepalum xystra* Luer, *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 26: 104. 1988. *P. Berry* 136. Venezuela: Zulia, Distrito Perijá, Campamento Frontera VI, 2400 m snm, 23-28/07/1974. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Scaphyglottis michelangeliorum* Carnevali & Steyermark, *Phytologia* 55(5): 289. 1984. *J. Steyermark* 129650. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, 1550 m snm, 13-14/10/1983. Holótipo (VEN).
- Schomburgkia heidii* Carnevali, *Ernstia* 10: 2. 1982. *G. Carnevali* 683. Venezuela: Amazonas, Puerto Ayacucho, vía Samariapo, 01/03/1982. Holótipo (VEN), Isótipo (MY).
- Selenipedium steyermarkii* Foldats, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 22(100): 253. 1961. *J. Steyermark & S. Nilsson* 273. Venezuela: Bolívar, Fila de La Danta, 1800 m snm, 18/04/1960. Holótipo (VEN), Isótipo (NY, UPS).
- Sobralia speciosa* C.Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 19(9): 198. 1961. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42142. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1800 m snm, 19/11/1957. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Stelis corae* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 401. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98725. Venezuela: Táchira, arriba de Betania y Tamá, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Stelis dunstervilleorum* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 404. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98529. Venezuela: Táchira, faldas por debajo del Páramo de El Tamá, 2750-2950 m snm, 20-23/05/1967. Holótipo (VEN).
- Stelis lasallei* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 406. 1968. *Hermano Antonio* 600. Venezuela: Falcón, Curimagua, 19/07/1957. Holótipo (CAR), Isótipo (VEN).
- Stelis latisepala* C. Schweinf., *Bot. Mus. Leafl.* 19(9): 199. 1961. *J. Steyermark* 75712. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 2000 m snm, 19/06/1953. Holótipo (AMES), Isótipo (VEN).
- Stelis norae* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 409. 1968. *J. Steyermark, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville* 98786. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo del Tamá, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Stelis rabei* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 411. 1968. *J. Steyermark & M. Rabe* 96760. Venezuela: Táchira, entre Michelenena y Boca de Monte, 1700 m snm, 28/08/1966. Holótipo (VEN).
- Stelis sanluisensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.*

- 3(1-4): 414. 1968. *J. Steyermark* 99418. Venezuela: Falcón, Sierra de San Luis, 1300 m snm, 21/07/1967. Holótipo (VEN).
- Stelis sphaerochila* Lindl., *Fol. Orchid.* 8: 19. 1859. *A. Fendler* 1464. Venezuela: Aragua, Colonia Tovar, 1854. Holótipo (BM), Isótipos (AMES, MO), fragmento del Isótipo (VEN).
- Stelis steyermarkii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 416. 1968. *J. Steyermark*, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 98661. Venezuela: Táchira, arriba de Betania y Tamá, cerca de la quebrada de Buena Vista, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Stelis tachirensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 418. 1968. *J. Steyermark*, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 98793. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo de El Tamá, cerca de la quebrada Buena Vista, 2300-2450 m snm, 22-24/05/1967. Holótipo (VEN).
- Stelis venezuelensis* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 421. 1968. *J. Steyermark*, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 98497. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo de El Tamá, 2300-2950 m snm, 18-20/05/1967. Holótipo (VEN).
- Stenoptera roehlii* Schnee, *Bol. Acad. Ci. Fís.* 9(27): 249. 1946. *E. Rohl* 48. Venezuela: Distrito Federal, Las Culebrillas, Cordillera del Ávila, 1800 m snm, 01/11/1939. Holótipo (VEN).
- Telipogon steyermarkii* Foldats, *Acta Bot. Venez.* 3(1-4): 424. 1968. *J. Steyermark*, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 98568. Venezuela: Táchira, debajo del Páramo del Tamá, 2750-2950 m snm, 20-23/05/1967. Holótipo (VEN).
- Trichosalpinx drosoides* Carnevali & I.Ramírez, *Ernstia* 42: 1. 1987. *J. Steyermark*, G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville 109882. Venezuela: Zulia, Sierra de Perijá, 1500-1800 m snm, 27/03/1982. Holótipo (VEN).
- Uleiorchis liesnerii* Carnevali & I.Ramírez, *Novon* 3(2): 105. 1993. *R. Liesner* & B. Holst 21893. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, 1050-1200 m snm, 13/03/1987. Holótipo (VEN), Isótipo (MO).
- ## POACEAE
- Agrostis basalis* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 10. 1953. *Z. Luces* 273. Venezuela: Mérida, Laguna Negra, 25/11/1943. Holótipo (VEN).
- Agrostis jahni* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 12. 1953. *A. Jahn* 1044. Venezuela: Mérida, Páramo de Aricagua, 3000 m snm, 31/03/1922. Holótipo (VEN).
- Agrostis meridensis* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 11. 1953. *Z. Luces* 267. Venezuela: Mérida, Laguna Negra. Páramo Mucuchíes, 3500 m snm, 25/11/1943. Holótipo (VEN).
- Andropogon reedei* Hitchc. & Ekman, *Man. grasses W. Ind.* 390. 1936. *E. Ekman* 1004. Cuba: Provincia Camagüey, in savannas at Minas, 05/10/1922. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Aristida temulenta* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 16. 1953. *T. Lasser* 2482. Venezuela: Zulia, sabanas de Machiques, 10/01/1948. Holótipo (VEN).
- Arthrostylidium cacuminis* McClure, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 3. 1964. *B. Maguire*, R. Cowan & J.J. Wurdack 30249. Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, Río Cunucunuma, 1500 m snm, 15/12/1950. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Arthrostylidium geminatum* McClure, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 169. 1942. *A. Jahn* 125. Venezuela: Trujillo, Páramo La Cristalina, 2800 m snm, 20/10/1910. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Arthrostylidium purpuratum* McClure, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 170. 1942. *Ll. Williams* 10905. Venezuela: Distrito Federal, Cumbre de El Ávila, 21/04/1905. Holótipo (VEN).
- Arthrostylidium scandens* McClure, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 4. 1963. *B. Maguire*, R. Cowan & J.J. Wurdack 29957. Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, Río Cunucunuma, 600-800 m snm,

- 20-21/12/1950. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Arthrostylidium steyermarkii* McClure, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 31. 1951. *J. Steyermark* 59926. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 2600 m snm, 07/11/1944. Holótipo (US), Isótipes (F, VEN).
- Aulonemia chimantensis* Judz. & Davidse, *Novon* 1(2): 80. 1991. *J. Steyermark & O. Huber & V. Carreño* 128369. Venezuela: Bolívar, Distrito Piar, altiplanice en la base meridional de los farrallones superiores del Apacará-tepui, 2200 m snm, 30/01-01/02/1983. Holótipo (MO), Isótipes (ISC, K, SP, US, VEN).
- Aulonemia jauaensis* Judz. & Davidse, *Novon* 1(2): 83. 1991. *J. Steyermark* 98093. Venezuela: Bolívar, Meseta de Jaua, 2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (US), Isótipes (F, NY, VEN).
- Axonopus casiquiarensis* Davidse, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74(2): 419. 1987. *G. Davidse, O. Huber & S. Tillett* 16907-A. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Macizo Chimantá, 100 m snm, 30/04-01/05/1979. Holótipo (MO), Isótipes (K, NY, US, VEN).
- Axonopus chimanensis* Davidse, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74(2): 418. 1987. *O. Huber & J. Steyermark* 6931. Venezuela: Bolívar, Macizo de Chimantá, 2000 m snm, 26-29/02/1983. Holótipo (MO), Isótipes (K, NY, US, VEN).
- Axonopus laxus* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 20. 1953. *Z. Luces* 299. Venezuela: Aragua, valle de El Limón, 25/09/1947. Holótipo (VEN).
- Axonopus steyermarkii* Swallen, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 20. 1951. *J. Steyermark* 58001. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1095-1520 m snm, 26/08/1944. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Axonopus tamayonis* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 21. 1953. *F. Tamayo* 2747. Venezuela: Bolívar, Cerro Akurimá, Santa Elena, La Gran Sabana, 11/02/1946. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Calamagrostis chasei* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 6. 1953. *Z. Luces* 292. Venezuela: Mérida, Páramo de Misintá, Piedra de Bartolo, Mucuchíes, 27/11/1943. Holótipo (VEN).
- Calamagrostis mulleri* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 9. 1953. *A. Müller* 897. Venezuela: Mérida, Páramo de Mucuchíes, 11/11/1939. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Chusquea hispida* McClure, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 179. 1942. *H. Pittier* 7159. Venezuela: Distrito Federal, in upper Catuche wood, near Caracas, 1400 m snm, 13/05/1917. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Chusquea spencei* Ernst. *S. Tillett, G. Morillo, B. Morillo & B. Manara* 41. Venezuela: Miranda, Pico Naiguatá, 2700-2765 m snm, 06/12/1973. Neótipo (NY), Isóneótipo (VEN), *Syst Bot. Monogr.* 27: 54. 1989. Designado por L. Clark.
- Cortaderia parviflora* Swallen, *Contr. U.S. Natl. Herb.* 29(6): 253. 1948. *J. Steyermark* 56182. Venezuela: Mérida, between La Trampa and Casadero, along tributary Quebrada del Salado, 2225-2590 m snm, 28/04/1944. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Digitaria atra* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 159. 1942. *A. Müller s/n.* Venezuela: Mérida, Tabay, s/f. Holótipo (VEN), fragmento del Holótipo (MO).
- Ekmanochloa subaphylla* Hitchc., *Man. grasses W. Ind.* 375. 1936. *E. Ekman* 1016. Cuba: Provincia Oriente, Loma Picote, Sierra de Nipe, 500 m snm, 02/11/1922. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Elytrostachys clavigera* McClure, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 176. 1942. *H. M. Currans* 123. Colombia: Departamento Bolívar, along the Norosi-Tiquiso trail, Land of Loba, 150-600 m snm, 04/05/1916. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Elytrostachys typica* McClure, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 174. 1942. *H. Pittier* 9226. Venezuela: Distrito Federal, El Limón, Valle Puerto La Cruz, 600 m snm, 21/02/1921. Holótipo (VEN).
- Eragrostis fragilis* Swallen, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 18. 1951. *J. Steyermark* 59062. Ve-

- nezuela: Bolívar, Gran Sabana, between Kun and Uaduara-paru, 1065-1220 m snm, 01/10/1944. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Eragrostis lasseri* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 6. 1953. *T. Lasser* 2660. Venezuela: Zulia, cerca de Maracaibo, 12/01/1948. Holótipo (VEN).
- Eragrostis plurinodis* Swallen, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 158. 1942. *C.E. Chardon*. 249. Venezuela: Apure, fields around Cunaviche, 13/02/1941. Holótipo (VEN).
- Gouinia gracilis* Ekman, *Amer. J. Bot.* 22(1): 33. 1935. *E. Ekman* 1020. Cuba: Provincia Oriente, Cerro del Fraile, 17/11/1922. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Guadua ciliata* Londoño & Davidse, *Novon* 1(1): 21. 1991. *G. Davidse, O. Huber & S. Tillett* 16924. Venezuela: Amazonas, Departamento Atababo, Cucurital de Caname, 100 m snm, 30/04-01/05/1979. Holótipo (MO), Isótipes (INPA, K, SI, TULV, US, VEN).
- Helleria fragilis* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 157. 1942. *A. Jahn* 62. Venezuela: Mérida, Sierra Nevada, Páramo de Tucaní, 4500 m snm, 17/10/1910. Holótipo (VEN).
- Ichnanthus nubilis* Chase, *J. Wash. Acad. Sci.* 42(4): 124. 1952. *A. Chase* 12439. Venezuela: Distrito Federal, El Junquito, 12/03/1940. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Ichnanthus vestitus* Swallen, *Phytologia* 11(2): 75. 1964. *J. Steyermark* 75533. Venezuela: Bolívar, around dry ledges of Chimantá-tepui, 1700 m snm, 21/05/1953. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Luziola pittieri* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 159. 1942. *H. Pittier* 12530. Venezuela: Guárico, near Dos Caminos, 12/09/1927. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Merostachys maguireorum* McClure, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 5. 1964. *B. Maguire & B. Maguire Jr.* 29163. Venezuela: Amazonas, Upper Río Cunucunuma, 200 m snm, 01/05/1949. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Merostachys retrorsa* McClure, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 6. 1964. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 117. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 470 m snm, 16/01/1955. Holótipo (US), Isótipes (NY, VEN).
- Mesosetum cardonum* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 19. 1953. *F. Cardona* 2223a. Venezuela: Bolívar, Cerro Acopán y el Upuima, Gran Sabana, 900 m snm, 01/10/1947. Holótipo (VEN).
- Mesosetum chaseae* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 160. 1942. *A. Sandoval s/n.* Venezuela: Anzoátegui, cerca de San Tomé, 08-11/1940. Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Muhlenbergia inaequalis* Soderstr., *Contr. U.S. Natl. Herb.* 34(4): 142. 1967. *A. Müller* 973. Venezuela: Trujillo, Quebrada de Durí, 11/11/1939. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Muhlenbergia venezuelae* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 14. 1953. *Z. Luces* 281. Venezuela: Mérida, Páramo de Masantá, 27/11/1943. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus cardonae* Swallen, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 35. 1951. *F. Cardona* 2307. Venezuela: Bolívar, Cerro Acopán, Caroni, 2150 m snm, 01/10/1947. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus churunensis* Swallen, *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 132. 1967. *J. Steyermark* 93281. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 1690 m snm, 03/05/1964. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus confertus* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 397. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 1220. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Toronó-tepui, 1760 m snm, 01/03/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus gracilis* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 393. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 489. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, 1925 m snm, 05/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus purpureus* Swallen, *Mem. New*

- York Bot. Gard.* 9(3): 397. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 658. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Toronó-tepui, 2165-2180 m snm, 09/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus steyermarkii* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 395. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 819. Venezuela: Bolívar, Central Section, Chimantá Massif, 2260 m snm, 13/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Myriocladus variabilis* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 396. 1957. *J. Steyermark* 75879. Venezuela: Bolívar, east-central portion of summit of Apacara-tepui, Chimantá Massif, 2450-2500 m snm, 21-22/06/1953. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Neurolepis densiflora* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 399. 1957. *J. Steyermark* 75806. Venezuela: Bolívar, slope of Apacara-tepui, Chimantá Massif, 2000-2150 m snm, 20/06/1953. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Neurolepis glomerata* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 399. 1957. *J. Steyermark* 74925. Venezuela: Bolívar, north-western part of summit, Chimantá Massif, 2125-2300 m snm, 13/04/1953. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Neurolepis nigra* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 400. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 860. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, central section, 2185-2210 m snm, 13/02/1955. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).
- Neurolepis pittieri* McClure, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 181. 1942. *H. Pittier* 10067. Venezuela: Aragua, between Colonia Tovar y El Lagunazo, 1700-2000 m snm, 02/01/1922. Holótipo (US), fragmento del Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Panicum churunense* Swallen, *Acta Bot. Venez.* 2(5-8): 133. 1967. *J. Steyermark* 93804. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 1660 m snm, 12/05/1964. Holótipo (US), fragmento del Holótipo (VEN).
- Panicum curvifolium* Swallen, *Bull. Torrey Bot. Club* 58(5): 316. 1931. *G.H. Tate* 776. Venezuela: Amazonas, moist slopes of Savanna Hills (Cerro Duida Region), 1450 m snm, 08/1928-04/1929. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Panicum deciduum* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 257. 1957. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30517. Venezuela: Amazonas, Cerro Yacapana, 800-1000 m snm, 01/01/1951. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum densifolium* Swallen, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 25. 1951. *J. Steyermark* 57755. Venezuela: Amazonas, between Esmeralda and base of Cerro Duida, 150 m snm, 21/08/1944. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum fontanale* Swallen, *Phytologia* 14(2): 80. 1966. *J. Steyermark* 76005. Venezuela: Bolívar, western part of Chimanta-tepui, 1700-1750 m snm, 03/07/1953. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum jauanum* Davidse, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 272. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 109486. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua, 1750-1800 m snm, 22-28/02/1974. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Panicum manacalense* Swallen, *Phytologia* 14(2): 77. 1966. *J.J. Wurdack & L. Adderley* 42986. Venezuela: Amazonas, margins of Río Atabapo at Manacal, 125-140 m snm, 06/19/1959. Holótipo (US), fragmento del Holótipo (VEN).
- Panicum mirandum* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 163. 1942. *H. Pittier* 6483. Venezuela: Miranda, Valle de Siquiri, 500-1000 m snm, 19-24/03/1913. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum orinocanum* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 164. 1942. *L.I. Williams* 13090. Venezuela: Amazonas, Puerto Ayacucho, in savannas of the Río Cataniapo, 88 m snm, 23/05/1940. Holótipo (US), Isótipo (US), fragmento del Isótipo (VEN).
- Panicumpandum* Swallen, *Brittonia* 3(2): 150. 1939. *G.H. Tate* 1287. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2200 m snm, 01/01/1938. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Panicum rivale* Swallen, *Bull. Torrey Bot.*

- Club* 75(1): 87. 1948. *B. Maguire* 24732. Surinam: on banks of lower Augustus Creek, 525 m snm, 13/09/1944. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum steyermarkii* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 402. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 954. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Toronó-tepui, 1895-1910 m snm, 20/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum tamayonis* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 24. 1953. *F. Tamayo* 3061. Venezuela: Bolívar, Santa Elena, 03/04/1945. Holótipo (VEN).
- Panicum tirciaense* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 400. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 535. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, central section, 1940-1950 m snm, 07/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum tirciaoides* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9(3): 401. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 475. Venezuela: Bolívar, Maccizo Chimantá, 1925 m snm, 05/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum viscidellum* Scribn., *Circ. Div. Agrostol. U.S.D.A.* 19: 2. 1900. *C.G. Pringle* 8089. México: Veracruz, Gravelly banks near Jalapa, 1250 m snm, 29/03/1899. Lectótipo (US), Isolectótipos (CM, ISC, M, MO, P, VEN). Designado por Hitchcock & Chase, *Contr. U.S. Natl. Herb.* 15: 296. 1910.
- Panicum wurdackii* Swallen, *Mem. New York Bot. Gard.* 9: 401. 1957. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 351. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, central section, 1925 m snm, 05/02/1955. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Panicum yavitaense* Swallen, *Phytologia* 14(2): 72. 1966. *J.J. Wurdack & L. Adderley* 42910. Venezuela: Amazonas, along Yavita-Pimichín Trail, 125-140 m snm, 06/10/1959. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Paspalum dispar* Chase var. *marahuacense* Rodr.-Rodr., *Ernstia* 52: 1. 1989. *H. Rodríguez* 2816. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, selva de galería, 1000-1200 m snm, 17/10/1988. Holótipo (MY), Isótipos (K, MO, MY, MYF, VEN).
- Paspalum erectifolium* Swallen, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 22-24. 1951. *J. Steyermark* 60302. Venezuela: Bolívar, Río Karuai, 1220 m snm, 18/11/1944. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Paspalum indutum* Luces, *J. Wash. Acad. Sci.* 32(6): 162. 1942. *R. Sergent* 37. Venezuela: Mérida, near Egido, 960 m snm, 01/04/1940. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, US).
- Paspalum jimenezii* Chase, *Contr. U.S. Natl. Herb.* 28(1): 159. 1929. *O. Jiménez* 742. Costa Rica: along the margin of Río Bebedero, at Las Playitas, Guanacaste, 50 m snm, 05/01/1913. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Paspalum lucidulum* Swallen, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(1): 84. 1948. *B. Maguire* 24492. Surinam: on wet rocky in spray of Grace Falls, Arrowhead Basin, Tafelberg, 625 m snm, 26/08/1944. Holótipo (NY), fragmento del Holótipo (VEN), Isótipos (MO, US).
- Paspalum secans* Hitchc. & Chase, *Contr. U.S. Natl. Herb.* 18(7): 319. 1917. *A. Chase* 6174. Puerto Rico: Monte Mesa, 17/10/1913. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Paspalum setiglume* Chase, *Brittonia* 3(2): 150. 1939. *G.H. Tate* 1285. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 1100 m snm, 12/1937-01/1938. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Pharus parvifolius* Nash subsp. *elongatus* Judz., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 72(4): 874. 1985. *R. Liesner, E. Judziewicz & B. Pérez* 15281. Costa Rica: Provincia Cartago, Los Espaveles Nature Trail into forested canyon of Río Reventazón, 550-600 m snm, 05/09/1983. Holótipo (CR), Isótipos (BAF, B M, CEPEC, COL, CR, CTES, DUKE, F, IBUG, INPA, ISC, LE, LPB, MEXU, MO, MVFA, NY, P, PMA, RB, SP, US, VEN, WIS, XAL).
- Poa boxiana* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 4. 1953. *H. Box & A. Alayon* 3726a. Venezuela: Táchira, Páramo de

- Poa mucuchachensis* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 3. 1953. *Z. Luces* 277. Venezuela: Mérida, Laguna Negra, Páramo Mucuchíes, 25/11/1943. Holótipo (VEN).
- Setaria submacrostachya* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 28. 1953. *L. Aristeguieta* 443. Venezuela: Dependencias Federales, Gran Roque y Orchila, 09/01/1950. Holótipo (VEN).
- Steyermarkochloa unifolia* Davidse & R.P. Ellis, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71(4): 995. 1985. *O. Huber* 2620. Venezuela: Amazonas, Departamento Casiquiare, sabana cerca de Yavita, a lo largo del Río Temi, 110 m snm, 25/08/1978. Holótipo (MO), fragmento del Holótipo (VEN), Isótipo (US).
- Thrasya hitchcockii* Chase, *J. Wash. Acad. Sci.* 17(6): 142. 1927. *A.S. Hitchcock* 8140. Panamá: Chorrera, on a hill, 09/16/1911. Holótipo (US), Isótipo (VEN).
- Thrasya stricta* A.G. Burm., *Acta Bot. Venez.* 14(4): 75. 1987. *O. Huber* 974. Venezuela: Amazonas, Puerto Ayacucho, 75 m snm, 21/08/1977. Holótipo (VEN).
- Triniochloa andina* Luces, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 15(80): 15. 1953. *Z. Luces* 295. Venezuela: Mérida, Piedra de Bartolo, Páramo Misintá, Mucuchíes, 27/11/1943. Holótipo (VEN).
- ## PONTEDERIACEAE
- Eichornia venezuelensis* Velásquez, *Acta Bot. Venez.* 6(1-4): 367. 1971. *J. Velásquez* 1487. Venezuela: Guárico, Laguna de los Patos, Estación de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, 100 m snm, 20/10/1970. Holótipo (VEN).
- ## RAPATEACEAE
- Duckea junciformis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 43. 1958. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 35697. Venezuela: Amazonas, Río Guainía, 130 m snm, 16/04/1953. Holótipo (NY), Isótipo (F, US, VEN).
- Epidryos guayanensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 89. 1965. *S. Tillett, C. Tillett & R. Boyan* 43979. Guyana: Río Partang, Merume Mountains, Pakaraima Mountains, 1200 m snm, 03/07/1960. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Guacamaya superba* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 36, fig. 6, Ba-h. 1958. *B. Maguire & J.J. Wurdack* 35634. Venezuela: Amazonas, Sabana Venado, Caño Pimichín, 140 m snm, 14/4/1953. Holótipo (NY), Isótipos (RB, US, VEN).
- Kunhardtia radiata* Maguire & Steyermark, *Acta Amazon.* 9(2): 267. 1979. *J. Steyermark & O. Huber* 113851. Venezuela: Amazonas, 35 km south of Puerto Ayacucho, at the Tobogán, 85 m snm, 04/05/1977. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Monotrema affine* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 48. 1958. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36611. Venezuela: Amazonas, north edge of Yapacana Savanna III, Río Orinoco, 125 m snm, 20/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (F, RB, US, VEN).
- Monotrema bracteatum* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 47. 1958. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36624. Venezuela: Amazonas, Yapacana savanna II, Río Orinoco, 125 m snm, 20/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (F, RB, US, VEN).
- Phelpsiella ptericaulis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 29. 1958. *K. Phelps & A.S. Hitchcock* 518. Venezuela: Amazonas, summit of Cerro Parú, 1600 m snm, 11/02/1949. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Rapatea aracamuniana* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 964. 1989. *R. Liesner & F. Delasco* 22197. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Aracamuni, 600 m snm, 20/10/1987. Holótipo (MO), Isótipo (VEN).
- Rapatea chimantensis* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(1): 313. 1988. *J. Steyermark*.

- yermark 75584.* Venezuela: Bolívar, Chimaná Massif, lower southwestern slopes of Chimaná-tepui, 1000 m snm, 24/05/1953. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, NY).
- Rapatea fanshawei* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 96. 1965. B. Maguire & D. Fanshawe 32193. Guyana: Pakaraima Mountains, Imbaimadai Savannas, upper Mazaruni River, 22/10/1951. Holótipo (NY), Isótipos (NY, VEN).
- Rapatea fanshawei* Maguire var. *minor* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 98. 1965. S. Tillett & C. Tillett 45351. Guyana: Mokay-dai savanna; Kukui River, Mazaruni River, 490 m snm, 09/09/1960. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Rapatea membranacea* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 99. 1965. B. Maguire & D. Fanshawe 32365. Guyana: Membaru-Kurupung Trail, Pakaraima Mountains, 750 m snm, 30/10/1951. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Rapatea paludosa* Aubl. var. *sessiliflora* Maguire, Bull. Torrey Bot. Club 75(2): 204. 1948. B. Maguire 24587. Surinam: Tafelberg, 1 mile east of Savanna VIII, 01/09/1944. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Rapatea scabra* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 93. 1965. B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 27474. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo, 600 m snm, 27/11/1948. Holótipo (NY), Isótipos (BM, COL, F, GH, K, MB, MO, P, RB, US, VEN).
- Rapatea steyermarkii* Maguire, Fieldiana, Bot. 28(1): 130. 1951. J. Steyermark 60868. Venezuela: Bolívar, Carrao-tepui, 1675-1980 m snm, 5-6/12/1944. Holótipo (F), Isótipos (NY, VEN).
- Rapatea yapacana* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 101. 1965. B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 36584-A. Venezuela: Amazonas, Yapacana Savanna 3, Orinoco River, 125 m snm, 20/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Saxofridericia compressa* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 25. 1958. B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 37054. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1700 m snm, 04/01/1954. Holótipo (NY), Isótipos (F, RB, US, VEN).
- Saxofridericia duidae* Maguire subsp. *duidae*, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 24. 1958. B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack 29561. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, 1500 m snm, 19/11/1950. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Saxofridericia grandis* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 26. 1958. R. Cowan & J.J. Wurdack 31115. Venezuela: Amazonas, Serranía Parú, 2000 m snm, 31/01/1951. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Saxofridericia petiolata* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 28. 1958. B. Maguire 29320. Venezuela: Amazonas, Río Temi, Río Atabapo, 19/10/1950. Holótipo (NY), Isótipos (F, RB, VEN).
- Saxofridericia spongiosa* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 26. 1958. B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 37485. Venezuela: Amazonas, Laja Arauicaua, Río Yatúa-Pacimoni, 120 m snm, 04/02/1954. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Schoenocephalium coriaceum* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 38. 1958. B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting 36301. Colombia: Vaupés, 1 km west of Cacagual, Río Atabapo, 100 m snm, 19/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Schoenocephalium cucullatum* Maguire, Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 39. 1958. B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack 30486. Venezuela: Amazonas, Cerro Yapacana, 140 m snm, 31/12/1950. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Schoenocephalium sipapoanum* Maguire, Acta Bot. Venez. 14(3): 17. 1984. J. Steyermark, Ch. Brewer-Carías & R. Liesner 124534. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures: Serranía Sipapo, 1500 m snm, 17/02/1981. Holótipo (NY), Isótipos (MO, US, VEN).
- Schoenocephalium teretifolium* Maguire,

- Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 38. 1958. *B. Maguire & J.J. Wurdack* 35600. Venezuela: Amazonas, Sabana Venado, Caño Pimichín, Río Guainía, 130-140 m snm, 14/04/1953. Holótipo (NY), Isótípos (F, RB, US, VEN).
- Stegolepis albiflora* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74(3): 609. 1987. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 108873. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarisaríñama, 1410 m snm, 10/02/1974. Holótipo (VEN), Isótípos (MO, NY, U, US).
- Stegolepis breweri* Maguire, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 278. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 109236. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Sarisaríñama, 1100 m snm, 18-20/02/1974. Holótipo (NY), Isótípos (F, US, VEN).
- Stegolepis cardonae* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 87. 1965. *J.J. Wurdack* 34263. Venezuela: Bolívar, Churitepui (Muru-tepui), Chimantá-tepui, 2050 m snm, 29/01/1963. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Stegolepis celiae* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 80. 1965. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37055. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1800 m snm, 04/01/1954. Holótipo (NY), Isótípos (BRAS, F, GH, K, US, VEN).
- Stegolepis choripetala* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 75. 1965. *B. Maguire & L. Politi* 27573. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1500 m snm, 10/12/1948. Holótipo (NY), Isótípos (F, US, VEN).
- Stegolepis gleasoniana* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 130. 1951. *J. Steyermark* 58040. Venezuela: Amazonas, Cerro Duida, southeastern sandstone bluffs near Caño Negro, 1095-1520 m snm, 26/08/1944. Holótipo (F), Isótípos (GH, NY, US, VEN).
- Stegolepis grandis* Maguire subsp. *grandis*, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 72. 1965. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30023. Venezuela: Amazonas, Cerro Huachamacari, Río Cunucunuma, 1800 m snm, 06/12/1950. Holótipo (NY), Isótípo (VEN).
- Stegolepis grandis* Maguire subsp. *jauaensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 848. 1972. *J. Steyermark* 97942. Venezuela: Bolívar, Cerro Jaua, cumbre de la porción centro-occidental de la Meseta del Jaua, 1900-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (NY), Isótípo (VEN).
- Stegolepis grandis* Maguire subsp. *phelpiae* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 73. 1965. *R. Cowan & J.J. Wurdack* 31114. Venezuela: Amazonas, Serranía Parú, Río Parú, Río Ventuari, 2000 m snm, 31/01/1951. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Stegolepis hitchcockii* Maguire subsp. *morchensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 83. 1965. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30912. Venezuela: Amazonas, Cerro Moriche, Río Ventuari, 800 m snm, 14/01/1951. Holótipo (NY), Isótípos (US, VEN).
- Stegolepis huberi* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74(3): 610. 1987. *O. Huber* 9467. Venezuela: Bolívar, Kukenán-tepui, 2500 m snm, 28/04/1984. Holótipo (VEN), Isótípo (MO).
- Stegolepis humilis* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 74(3): 611. 1987. *J. Steyermark, R. Liesner & B. Holst* 132006. Venezuela: Bolívar, Camarcaibarai-tepui, 1800-1825 m snm, 22-24/05/1986. Holótipo (MO), Isótípos (F, MO, NY, U, VEN).
- Stegolepis jauaensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 23: 848. 1972. *J. Steyermark* 97883. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, 1922-2100 m snm, 22-27/03/1967. Holótipo (NY), Isótípos (F, VEN).
- Stegolepis ligulata* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 87. 1965. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 933. Venezuela: Bolívar, Chimantá-tepui, 1850 m snm, 18/02/1955. Holótipo (NY), Isótípos (BRAS, F, GH, K, NY, US, VEN).
- Stegolepis maguireana* Steyermark., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71(1): 300. 1984. *J. Ste-*

- yermark, J. Lutelyn & O. Huber* 129962. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Acopán-tepui, 1920 m snm, 14/02/1984. Holótipo (VEN), Isótipes (MO, NY).
- Stegolepis microcephala* Maguire, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 280. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewer-Carías* 109305. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, Cerro Jaua porción sur-oeste, 1750-1800 m snm, 22-28/02/1974. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Stegolepis minor* Steyermark, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(1): 315. 1988. *J. Steyermark* 89577. Venezuela: Bolívar, Sierra de Lema, cabeceras del Río Chicanán, 500 m snm, 28/08/1961. Holótipo (VEN), Isótipes (MO, NY).
- Stegolepis neblinensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 78. 1965. *B. Maguire, J. Wurdack & G. Bunting* 37107. Venezuela: Amazonas, Cerro de la Neblina, 2000 m snm, 6/01/1954. Holótipo (NY), Isótipes (BRAS, COL, K, US).
- Stegolepis parvipetala* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 133. 1951. *J. Steyermark* 59514. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, 1810 m snm, 29/10/1944. Holótipo (F), Isótipes (US, VEN).
- Stegolepis parvipetala* Steyermark, var. *chimantensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 75. 1965. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 944. Venezuela: Bolívar, Chimantá-tepui, 1865 m snm, 19/02/1955. Holótipo (NY), Isótipes (BRAS, F, K, MO, US, VEN).
- Stegolepis perligulata* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 88. 1965. *B. Maguire, J. Steyermark & C. Maguire* 46915. Venezuela: Bolívar, La Escalera, Río Uriyuk, Río Cuyuní, 850 m snm, 20/08/1962. Holótipo (NY), Isótipes (BRAS, F, GH, K, US, VEN).
- Stegolepis pulchella* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 83. 1965. *B. Maguire & L. Politi* 27555. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), 1500 m snm, 15/01/1949. Holótipo (NY), Isótipes (NY, US, VEN).
- Stegolepis steyermarkii* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 76. 1965. *J. Steyermark & L. Aristeguieta* 17. Venezuela: Bolívar, Uei-tepui, 15 km south of El Dorado between Luepa and Cerro Venamo, 1100-1400 m snm, 07/03/1962. Holótipo (NY), Isótipes (F, US, VEN).
- Stegolepis terramarensis* Steyermark, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 71(1): 301. 1984. *J. Steyermark & F. Delascio* 129197. Venezuela: Amazonas, Cerro Marahuaca, cumbre, 2580-2600 m snm, 30/03-1/04/1983. Holótipo (VEN).
- Stegolepis vivipara* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 74. 1965. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 332. Venezuela: Bolívar, Chimantá-tepui, 1860 m snm, 02/02/1955. Holótipo (NY), Isótipes (F, MO, US, VEN).
- Stegolepis wurdackii* Maguire subsp. *wurdackii*, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 85. 1965. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37377. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, 1600 m snm, 24/01/1953. Holótipo (NY), Isótipes (F, US, VEN).
- Stegolepis wurdackii* Maguire subsp. *chimantensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 12(3): 85. 1965. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 976. Venezuela: Bolívar, Toronó-tepui (Chimantá-tepui), 1950 m snm, 20/02/1955. Holótipo (NY), Isótipes (MO, VEN).
- ## SMILACACEAE
- Smilax auraimensis* Steyermark, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 26(110): 472. 1966. *J. Steyermark* 90823. Venezuela: Bolívar, Sierra Auraima, 400 m snm, 16/01/1962. Holótipo (VEN).
- Smilax chimantensis* Steyermark & Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 440. 1967. *J. Steyermark* 74652. Venezuela: Bolívar, Apacara-tepui, Chimantá Massif, 400 m snm, 25/03/1953. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- ## THURNIACEAE
- Thurnia polyccephala* Schnee, *Bol. Soc. Venez.*

nez. *Ci. Nat.* 8(55): 243. 1943. *Ll. Williams* 14928. Venezuela: Amazonas, Río Pimichín, Guainía, Alto Río Negro, 127 m snm, 31/03/1942. Holótipo (VEN).

TRIURIDACEAE

Sciaphila brevipes S.F.Blake, *Proc. Biol. Soc. Wash.* 38: 45. 1925. *H. Pittier* 10953. Venezuela: Zulia, vegas del Río Lora, 14/12/1922. Holótipo (US), Isótipo (VEN).

Sciaphila rubra Maas, *Acta Bot. Neerl.* 28(1): 89. 1979. *G. Prance* 18736. Brasil: Amazonas, Igarapé Acará, Reserva Florestal Ducke, 08/08/1973. Holótipo (INPA), Isótipos (NY, U, VEN).

Triuris hexophthalma Maas, *Fl. Neotrop.* 40: 50. 1986. *P.J.M. Maas & L. Westra* 4244. Guyana: Pakaraima Mountains, 1 km downstream of Kamarang, in Mora forest, 450 m snm, 11/11/1979. Holótipo (US), Isótipos (B, BBS, COL, F, GH, INPA, K, MO, NY, P, RB, S, UG, US, VEN, Z).

VELLOZIACEAE

Barbacenia celiae Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 18(2): 33. 1969. *B. Maguire & C. Maguire* 40025. Brasil: Roraima, Serra Tepequeim, 850-950 m snm, 23/11/1954. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

Barbacenia saxicola L.B.Sm. & Ayensu, *Smithsonian Contr. Bot.* 30: 23. 1976. *W. Anderson, M. Stieber & J. Kirkbride* 35344. Brasil: Minas Gerais, 8 km north of Gouveia on road to Diamantina, 1220 m snm, 04/02/1972. Holótipo (US), Isótipos (NY, UB, VEN).

Vellozia decidua L.B.Sm. & Ayensu, *Smithsonian Contr. Bot.* 30: 112. 1976. *H. Irwin, R. Reis dos santos, R. Souza & S. da Fonseca* 22915. Brasil: Minas Gerais, ca. 25 km northeast of Diamantina on road to Mendanha, 1200 m snm, 30/01/1969. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).

Vellozia grao-mogulensis L.B.Sm., *Smithsonian Contr. Bot.* 30: 85. 1976. *B. Maguire*,

M. Magalhaes & C. Maguire 49218. Brasil: Minas Gerais, Serra Grao-Mogul, north base of mountain, 600-700 m snm, 16/08/1960. Holótipo (US), Isótipos (NY, VEN).

XYRIDACEAE

Abolboda acaulis Maguire, *Bull. Torrey Bot. Club* 75(2): 191. 1948. *B. Maguire & D. Fanshawe* 23096. Guyana: Kaieteur plateau, shallow sand pockets in conglomerate bed rock, vicinity of guest house, 30/04/1944. Holótipo (NY), Isótipos (F, GH, K, NY, US, VEN).

Abolboda acicularis Idrobo & L.B.Sm. var. *granularis* Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 17. 1958. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36341. Venezuela: Amazonas, Sabana Venado, left bank of Caño Pimichín, above Puerto Pimichín, Río Guainía, 140 m snm, 23/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

Abolboda bella Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 15. 1958. *B. Maguire & J.J. Wurdack* 34514. Venezuela: Amazonas, Yacapana Savanna III, Alto Río Orinoco, 125 m snm, 17/03/1953. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).

Abolboda ciliata Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 17. 1958. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37132. Venezuela: Amazonas, Cerro Nebolina, 5 km west of Cumbre Camp, 1900 m snm, 06/01/1954. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).

Abolboda dunstervillei Maguire ex Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 79(4): 851. 1992. *G.C.K. Dunsterville & E. Dunsterville s/n.* Venezuela: Amazonas, Cerro Avispa, Río Siapa, 1510 m snm, 05/12/1972. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).

Abolboda ebracteata Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 17. 1958. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30469. Venezuela: Amazonas, Yacapana Savanna III, 125 m snm, 31/12/1950. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

- Abolboda ebracteata* Maguire & Wurdack var. *brevifolia* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 8. 1963. *J.J. Wurdack & L. Adderley* 43689. Venezuela: Amazonas, Sabana de Moyo, right hand bank of Río Orinoco, 10 km above mouth of Río Ventuari, 125 m snm, 31/07/1959. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, US, VEN, VDB).
- Abolboda glomerata* Maguire *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 14. 1958. *B. Maguire & J.J. Wurdack* 35593. Venezuela: Amazonas, Sabana Venado, left bank Caño Pimichín above Puerto Pimichín, Río Guainía, 140 m snm, 14/04/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Abolboda grandis* Griseb. var. *guayanensis* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 8. 1958. *B. Maguire & L. Politi* 27561. Venezuela: Amazonas, Campo Grande, Cerro Sipapo (Paraque), 1500 m snm, 08/12/1948. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Abolboda killipii* Lasser, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 9(58): 178. 1944. *F. Cardona* 832. Venezuela: Bolívar, Alto Paragua, cerca del Río Tonoro, 20/08/1943. Holótipo (VEN), Isótipos (F, NY, US).
- Abolboda linearifolia* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 14. 1958. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30468. Venezuela: Amazonas, Yapacana Savanna III, 125 m snm, 31/12/1950. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Abolboda macrostachya* Spruce ex Malme var. *angustior* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(1): 10. 1958. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36342. Venezuela: Amazonas, Sabana Venado, Caño Pimichín, afluente del Río Guainía, 140 m snm, 23/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Abolboda minima* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 7. 1963. *J.J. Wurdack & L. Adderley* 42977. Venezuela: Amazonas, Sabana Manacal, 15 km above Guarinumo, Río Atabapo, 125-140 m snm, 12/06/1959. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Abolboda neblinae* Maguire, *Mem. New York Bot. Gard.* 17(1): 80. 1967. *B. Maguire, J. Pires & T. Silva de 60523*. Brasil: Serra da Neblina, Río Negro, Río Cauaburí, 2200-2400 m snm, 03/12/1965. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, UB, VEN).
- Abolboda ptaritepuiana* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 104. 1951. *J. Steyermark* 59760. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepuí, southeast-facing shoulder, 2000-2200 m snm, 02/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (GH, VEN).
- Achlyphila disticha* Maguire & Wurdack, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(2): 12. 1960. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42402. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, upper Cañón Grande Basin, approach to southeast escarpment, 2000 m snm, 14/12/1957. Holótipo (NY), Isótipos (F, GH, K, NY, US, VEN).
- Xyris albescens* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 105. 1951. *J. Steyermark* 59734. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepuí, on southwest-facing shoulder, 2000-2200 m snm, 02/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Xyris apureana* Kral & L.B.Sm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 69(2): 412. 1982. *G. Davidse & A. González* 15948. Venezuela: Apure, Distrito Pedro Camejo: ca. 2 km south of Caño La Cochina de La Pica along the main road south of Paso de San Pablo to the Río Cinaruco, 70 m snm, 02/03/1979. Holótipo (US), Isótipos (MO, VDB, VEN).
- Xyris aracamunae* Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 975. 1989. *R. Liesner & G. Carnevali* 22452. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, Cerro Aracamuni, summit, Proa Camp, 1400 m snm, 25/10/1987. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, VDB).
- Xyris araracuarae* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 34. 1963. *B. Maguire, C. Maguire & A. Fernández* 44132. Colombia: Amazonas, Araracuara, Río Caquetá, 05/09/1959. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Xyris atriceps* Malme subsp. *chimantensis*

- Xyris* *chimantae* Kral & L.B.Sm., *Phytologia* 53: 432. 1983. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 768. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Río Tirica, 1925 m snm, 05/02/1955. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris atriceps* Malme subsp. *marahuacae* Kral & L.B.Sm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(2): 557. 1988. *J. Steyermark* 129579. Venezuela: Amazonas, Departamento Atabapo, Cerro Marahuaca, cumbre parte central de la meseta sur-este, a lo largo de la Quebrada Yekuana, afluente del Río Negro, 2560 m snm, 10-12/10/1983. Holótipo (VEN), Isótipo (VDB).
- Xyris atriceps* Malme subsp. *neblinensis* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 19. 1963. *B. Maguire, J.J. Wurdack & C. Maguire* 42416. Venezuela: Amazonas, Río Yatúa, east escarpment of upper Cañón Grande Basin, Cerro Neblina, 1900 m snm, 15/12/1957. Holótipo (NY), Isótipos (GH, K, NY, US, VEN).
- Xyris bicephala* Gleason, *Brittonia* 3: 155. 1939. *G.H. Tate* 1114. Venezuela: Bolívar, Auyán-tepui, 2200 m snm, 12/1937-01/1938. Holótipo (NY), Isótipo (VEN).
- Xyris bicostata* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 30. 1963. *B. Maguire, R. Cowan & J.J. Wurdack* 30169. Venezuela: Amazonas, along right fork of Caño de Dios, Cerro Huachamacari, 1800 m snm, 13/12/1950. Holótipo (NY), Isótipos (NY, S, US, VEN).
- Xyris capillaris* Steyer., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 107. 1951. *J. Steyermark* 57835. Venezuela: Amazonas, between Esmeralda Savanna and southeastern base of Cerro Duida, 200 m snm, 22/08/1944. Holótipo (F), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Xyris carinata* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 36. 1963. *B. Maguire, K. Phelps, Ch. Hitchcock & G. Budowski* 31773. Venezuela: Amazonas, summit of Cerro Guanay, Caño Guaviarito, Río Manapiare, Río Ventuari, 1800 m snm, 04/02/1951. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris frondosa* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 33. 1963. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 346. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Central Section, Summit Camp, 1925 m snm, 02/02/1955. Holótipo (NY), Isótipos (F, NY, US, VEN).
- Xyris fusiformis* Maguire & L.B.Sm., *Mem.*

- New York Bot. Gard.* 10(5): 24. 1963. *B. Maguire, J.J. Wurdack & W. Keith* 41815. Venezuela: Amazonas, sabana El Venado on left bank of Caño Pimichín above Pi-michín, Río Guainía, 140 m snm, 10/10/1957. Holótipo (NY), Isótipos (GH, US, VEN).
- Xyris granitcola* Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(2): 573. 1988. *F. Guánchez & E. Melgueiro* 3425. Venezuela: Amazonas, Departamento Atures, afloramiento granítico en Raudal Pereza, Río Autana, 100-120 m snm, 09/11/1984. Holótipo (VEN), Isótipos (TFAV, VDB).
- Xyris jauana* L.B.Sm. & Steyermark, *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 32(132-133): 276. 1976. *J. Steyermark, V. Carreño & Ch. Brewera-Carías* 109390. Venezuela: Bolívar, Meseta del Jaua, cumbre, 1750-1800 m snm, 22-28/02/1974. Holótipo (VEN), Isótipos (NY, US).
- Xyris juncifolia* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 26. 1963. *B. Maguire* 32750. Venezuela: Bolívar, Cum-bre Camp, Cerro Guaiquinima, Río Para-gua, 2000 m snm, 25/12/1951. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris kukenaniana* Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(2): 719. 1988. *O. Huber* 9460. Venezuela: Bolívar, Kukenán-tepui, cum-bre, 2500 m snm, 28/04/1984. Holótipo (VEN), Isótipos (MYF, NY, VDB).
- Xyris lanulobractea* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 109. 1951. *J. Steyermark* 59336. Ve-nezuela: Bolívar, Gran Sabana, between Mission of Santa Teresita de Kavanayén northwest to Río Karuai, 1220 m snm, 26/10/1944. Holótipo (F), Isótipos (US, VEN).
- Xyris lithophila* Kral & L.B.Sm., *Ann. Mis-souri Bot. Gard.* 75(2): 704. 1988. *O. Huber & C. Alarcón* 7568. Venezuela: Bolívar, Distrito Roscio, 15 km south-west of San Ignacio de Yuruani, Salto La Milagrosa, 1000 m snm, 22/06/1983. Holótipo (VEN), Isótipos (MYF, NY, VDB).
- Xyris melanovaginata* Kral & L.B.Sm., *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(2): 593. 1988. *O. Huber & J. Steyermark* 7136. Venezuela: Bolívar, Macizo de Chimantá, sección oriental del Chimantá-tepui, Caño del Grillo, 2450 m snm, 07-09/02/1983. Holótipo (VEN), Isótipos (US, VDB).
- Xyris neblinae* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 26. 1963. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37243. Venezuela: Amazonas, Cerro Ne-blina, Río Yatúa, 2 km north of Cumbre Camp, 1800 m snm, 12/01/1954. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris pratensis* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 34. 1963. *B. Maguire & L. Politi* 27581. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), camp Savanna, Campo Grande, 1500 m snm, 10/12/1948. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Xyris prolificans* Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76(4): 980. 1989. *R. Liesner & F. Delascio* 22200. Venezuela: Amazonas, Departamento Río Negro, slope of Cerro Aracamuni, quebrada camp., 600 m snm, 20/10/1987. Holótipo (VEN), Isótipos (MO, NY, VDB).
- Xyris ptariana* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 110. 1951. *J. Steyermark* 59919. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, Gran Sabana, 2410-2450 m snm, 07/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (F, NY, US, VEN).
- Xyris riparia* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 20. 1963. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 361. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, central section, near Summit Camp, 1925 m snm, 02/02/1955. Holótipo (NY), Isótipos (MO, US, VEN).
- Xyris rugulosa* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 29. 1963. *B. Maguire & L. Politi* 27699. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), Caño Negro, 1300 m snm, 15/12/1948. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Xyris setigera* Oliv. ex Thurn var. *elongata* Steyermark, *Fieldiana, Bot.* 28(1): 112. 1951. *J. Steyermark* 59660. Venezuela: Bolívar, Ptari-tepui, on plateau portion of southeast-facing slopes, 1600 m snm,

- 01/11/1944. Holótipo (F), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Xyris sipapoa* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 18. 1963. *B. Maguire & L. Politi* 27911. Venezuela: Amazonas, Cerro Sipapo (Paraque), lower Caño Negro, 1400 m snm, 25/12/1948. Holótipo (NY), Isótipos (GH, NY, US, VEN).
- Xyris stenostachya* Steyermark., *Fieldiana, Bot.* 28(1): 113. 1951. *J. Steyermark* 58437. Venezuela: Amazonas, below mouth of Río Sanariapo, along Orinoco river, 100 m snm, 08/09/1944. Holótipo (F), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris steyermarkii* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 30. 1963. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 1096. Venezuela: Bolívar, Chimantá Massif, Toronó-tepui, Caño Mojado, between base of upper falls and drop to escarpment, 1895-1910 m snm, 23/02/1955. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Xyris thysanolepis* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 17. 1963. *J. Steyermark & J.J. Wurdack* 356. Venezuela: Bolívar, central section Chimantá Massif, near summit camp, 1925 m snm, 02/02/1955. Holótipo (NY), Isótipos (MO, NY, US, VEN).
- Xyris toronoana* Kral, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 75(2): 643. 1988. *O. Huber, T. Ahti & J. Pipoly* 10223. Venezuela: Bolívar, Macizo Chimantá, sector centro-meridional, 2100 m snm, 11-15/02/1985. Holótipo (VEN), Isótipos (K, MYF, NY, US, VDB).
- Xyris wurdackii* Maguire & L.B.Sm. subsp. *caquetensis* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 25. 1963. *B. Maguire, C. Maguire & A. Fernández* 44129. Colombia: Amazonas, Araracuara, Río Caquetá, 05/09/1959. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).
- Xyris wurdackii* Maguire & L.B.Sm. subsp. *wurdackii*, *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 25. 1963. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 36366-A. Venezuela: Amazonas, Yavita-Pimichín trail near Pimichín, Río Guainía, 140 m snm, 22/11/1953. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris xiphophylla* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 20. 1963. *B. Maguire, J.J. Wurdack & G. Bunting* 37312. Venezuela: Amazonas, Cerro Neblina, Río Yatúa, 4-8 km south of Cumbre Camp, 1850-1900 m snm, 15/01/1954. Holótipo (NY), Isótipos (NY, US, VEN).
- Xyris yutajensis* Maguire & L.B.Sm., *Mem. New York Bot. Gard.* 10(5): 36. 1963. *B. Maguire & C. Maguire* 35206. Venezuela: Amazonas, Serranía Yutajé, Río Manapiare, 1250 m snm, 12/02/1953. Holótipo (NY), Isótipos (US, VEN).

ZINGIBERACEAE

- Renealmia choroniensis* Maas, *Acta Bot. Neerl.* 28(1): 90. 1979. *J. Steyermark & O. Huber* 114227. Venezuela: Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, near Regresiva del Diablo, 1500 m snm, 21/09/1977. Holótipo (U), Isótipo (VEN).

- Renealmia thyrsoides* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. subsp. *chrysanthia* Maas, *Acta Bot. Neerl.* 24(5-6): 480. 1975. *S. Tillett & C. Tillett* 44996. Guyana: Mountain Ayanganna, upper Mazaruni River, 800-900 m snm, 02-07/08/1960. Holótipo (U), Isótipos (NY, US, VEN).

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer la colaboración prestada por Giovanna de Martino y Alexandría Jiménez, curadoras del Herbario Nacional de Venezuela (VEN) durante el período de registro de las muestras tipo. Carmen Emilia Benítez de Rojas (MY), Larry Dorr (US), Günter Gerlach (M) y Winfried Meier (VEN) colaboraron de diferentes maneras para la obtención de publicaciones y la verificación de los datos. Lisa Campbell (NY), Paul Berry (WIS) y Reina Gonto (UCV) revisaron con especial atención los registros de las familias Xyridaceae, Rapateaceae y Cyperaceae, respectivamente. Queremos agradecer igualmente a los revisores anónimos del manuscrito, quienes incorporaron valiosas sugerencias y correcciones. La realización de este catálogo no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de las bibliotecas asociadas a los herbarios G, K, M, MO, NY, US, VEN y Z.

BIBLIOGRAFÍA

- APG II. 2003. An update of the phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants. *Bot. J. Linn. Soc.* 141: 399-436.
- Brewer-Carías, C. (ed.). 1988. *Cerro de la Neblina*. Resultados de la expedición 1983-1987. FUDECI, Caracas.
- Bridson, G.D.R. & E.R. Smith. 1991. *Botanico-Periodicum-Huntianum/Supplementum*. Hunt Institute for Botanical Documentation, Pittsburg.
- Brummitt, R.K. & C.E. Powell. 1992. *Authors of plant names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Lawrence, G.H.M., A.F.G. Buchheim, G.S. Daniels & H. Dolezal (eds.). 1968. *Botanico-Periodicum-Huntianum*. Hunt Institute for Botanical Documentation, Pittsburg.
- Greuter, W., J. McNeill, F.R. Barrie, H.M. Burdet, V. Demoulin, T.S. Filgueiras, D.H. Nicolson, P.C. Silva, J.E. Skog, P. Trehane, N.J. Turland & D.L. Hawksworth. 2000. International Code of Botanical Nomenclature (Saint Louis Code) adopted by the Sixteenth International Botanical Congress St. Louis, Missouri, July - August 1999. *Regnum Veg.* 138: 1-474.
- Häsler, B. & T. Baumann. 2000. *Henri Pittier (1857-1950). Leben und Werk eines Schweizer Naturforschers in den Neotropen*. Friedrich Reinhardt Verlag, Basel.
- Holmgren, P.K., N.H. Holmgren & L.C. Barnett. 1990. *Index Herbariorum. Part I: The herbaria of the world*. 8th edition. New York Botanical Garden.
- Huber, O. & J.J. Wurdack. 1984. History of botanical exploration in Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *Smithsonian Contr. Bot.* 56: 1-83.
- Huber, O., R. Duno, R. Riina, F.W. Stauffer, L. Pappaterra, A. Jiménez, S. Llamazas & G. Orsini. 1998. *Estado actual del conocimiento de la Flora en*

- Venezuela. Documentos técnicos de la estrategia nacional de diversidad biológica. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables – Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Caracas.
- Orsini, G. 1996. Tipos del Herbario Nacional de Venezuela (VEN). II Labiadas (Lamiaceae). *Acta Bot.Venez.* 19(2): 67-78.
- Prance, G.T. 1980. Tipos de Chrysobalanaceae en el Herbario Nacional de Colombia. *Mutisia* 48: 1-5.
- Ramírez, M. & F.W. Stauffer. 2003. Monocotiledóneas. In: *Biodiversidad en Venezuela* (Aguilera, M., A. Azócar & E. González, eds.), I: 152-162. Fundación Polar, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Caracas.
- Stafleu, F.A. & R.S. Cowan. 1976. *Taxonomic Literature*. 2 ed. Utrecht.
- Stauffer, F.W. & L. Pappaterra. 1996. Tipos de palmas (Arecaceae) del Herbario Nacional de Venezuela. *Acta Bot.Venez.* 19(1): 60-75.