

ADDITIONS

pour la région des Alpes, et spécialement le bassin Sarinien

AU

Catalogue de la Flore Vaudoise

DE

Durand et Pittier.

(M) = notes fournies par M. Gust. Mayor.

(Jt) = notes de M F. Jaquet.

2r. = zone rhodanienne.

3s. = zone sarinienne.

Thalictrum minus L. 2r : Grands Rochers ; 3s : Le Tabousset, rochers en aval du pont.

Anemone ranunculoides L. 2r : Luan, Neyrevaux Ayerne et Folliaux 1500^m.

A. vernalis L. Sonchaux (M) 3s : Châtillon et Vanil Noir, Ausannaz, de Corbeyrier aux Agites, Luan, les Avants.

Ranunculus platanifolius L. Aï 2100^m, Sonchaux (M).

R. Thora L. 3s couloir sur le col de Chaude, sous le point 2104^m et en face près du Plan d'Arenaz (M).

R. auricomus L. Chesières, Ecovets, Pont de la Tine.

R. acris L. Aï, Mayen, Meitreillaz, Ormonts 1950^m Lioson d'Argnaulaz 1940^m.

R. lanuginosus L. 3s vallée de l'Etivaz et de l'Hongrin.

R. nemorosus D. C. var *aureus* Schl. arête entre Aï et Mayen 2142^m.

Trollius europaeus L. Truex 2100^m arête entre Aï et Mayen 2142^m la Dix 2200^m.

Aquilegia vulgaris L. AC. jusqu'à 1600^m et monte jusqu'à 2100^m entre Aï et Mayens.!

Delphinium elatum L. 3s : Pied des Bimis sur le chalet de la Verda (J^t).

Aconitum Napellus L. altitudes extrêmes : Scie de Leysin 1180^m, cc. sommet de Châtillon 2481^m et de la Paraz 2452^m var *glacialis* Rchb.

A. variegatum L. Creux de Champ; — 3s : cc. gorges du Tabousset.

Corydalis fabacea Pers. Tompey, Neyrevaux, Gros Ayerne — 3s : sur l'alpe Merzère en montant aux Portes de Savigny (J^t).

Fumaria officinalis L. c. sur Leysin jusqu'à Feydey 1450^m.

Nasturtium officinale R. Br. 2r : non r., mais c. ; station trop nombreuses pour être énumérées ; s'élève bien au-dessus des 1200^m indiqués : Ormont-dessus, Ensex, 1800^m sur Leysin. En Soud 1600^m.

N. palustre R. Br. lacs d'Ayerne, d'Argnauaz, le Jorat.

N. sylvestre R. Br. gravier de la Veveyse (M).

Arabis alpina L. Châtillon 2470^m, sous le sommet de la Paraz 2500^m.

A. hirsuta Scop. Leysin, — 3s : les Mosses, les Charmilles, vallée de l'Hongrin, Chaude.

Cardamine amara L. Tompey 1550, lac Pourri 1509^m.

Sisymbrium austriacum Jacq. 3s : ravine, route de la Tine à Rossinière (J^t).

Sinapis arvensis L. La Ville, Ormonts 1500^m, de Feydey à Leysin 1450^m.

Erucastrum incanum K. de Feydey sur Leysin 1450^m.

Diplotaxis muralis L. c. à Aigle, Roche (avec *tenuifolia*), Villeneuve, Montreux, route du Sépey, Feydey à Leysin 1450^m.

Draba frigida Saut. Mayen, sur Truex, Naye RR; 3s : Tarent, Châtillon.

D. Traunsteineri Hoppe, Châtillon.

Camelina sativa Crtz. Vevey, graviers de la Veveyse (M).

Thlaspi arvense L. Leysin, Feydey 1450^m Comballaz.

T. alpestre L. sur Leysin, les Esserts ; sous l'arête de Malatrait 1850^m.

T. brachypetalum Jord. col de Jaman. 3s : les Siernes Picats.

Lepidium Draba L. 6 stat. à Aigle ; Territet (M).

L. ruderale L. gravier de la Gryonne ; et de la Veveyse (M).

Capsilla Bursa-pastoris Mch. se trouve autour des chalets les plus élevés, Mayens 1850^m Ai 1920^m Aveneire 1900^m.

Neslia paniculata Desv. Chesières, Comballaz 1370 m Esserts 1300^m.

Rapistrum rugosum Berg. Sonzier. (M)

Raphanistrum Lampsana Grtn. Sur Crettaz de Leysin, aux Esserts 1300^m 3s : Rossinière.

R. Lampsana v. *citrina* Gd. Esserts de Leysin.

Viola palustris L. Creux d'Orsay sous Chamossaire.

V. sciaphila K. Les Esserts sur Bex, Tompey. Nairvaux.

V. alba Bess. Corbeyrier ; environs d'Antagnes et de Forchex (Isabel).

V. Ruppilii All. en Fiaudière derrière le Cubli, en Lally sur Blonay.

V. calcarata L. 3s : Chalets de Naye (J^t).

V. alpestris Jord. la Riondaz, Géteillon et Mayen.

Reseda Luteola L. Cretalet sur Aigle, et Pare Blanche sur Roche 750^m.

R. lutea L. Antagne, c. Chalex, Verschiez, Pare Blanche à Roche 900^m c. Montreux, Vevey, (M). 3s : nouvelle route à Rossinières.

Drosera rotundifolia L. Marais de Chaulin.

D. obovata M. K. pré marécageux à Chamby.

Polygala austriaca Crtz. Chavonnes, Ai, Lioson d'Argnaulaz, Aveneire ; 3s. : Siernes Raynaud, Siernes

Picats, Mosses, vallons du Leyzay et du Petit Hongrin.

Dianthus superbus L. les Prévondes, sur Saumont, Sonloup, de Solady à la Cape au Moine (M).

Tunica prolifera Scop. sur Aigle, c. à Pare Blanche, Roche; graviers de la Veveyse (M).

Vaccaria parviflora Munch. Gryon 1180^m (Isabel) Chernex, Châtelard (M) — 3s : quelques pieds aux Moulins (J^u)

Silene nutans L. ac. chaîne d'Aveneire jusqu'à 1900^m.

Heliosperma quadrifidum Rchb. ac. dit le Cat. ; ajoutez : dans les Alpes calcaires ; manque sur le flysch.

Agrostemma Githago L. Leysin 1350^m Corbeyrier ; Montreux, Blonay (M)

Sagina procumbens L. Villeneuve. Montreux, Clarens (M) monte aux Alpes : Bretaye, 3s : Chaude, Aveneire, Jaman.

Alsine verna Bartl. 3s : C. Gumfluh, Brecaca, Rübli, tous les sommets du Vanil noir à Cray.

Arenaria serpyllifolia L. sous Mayen à 1800^m, Rossinière ; vallée de l'Hongrin.

Alsine tenuifolia Crtz. non R. mais c. Ollon, Verschiez, Fontaney, Yvorne, sur Roche ; Montreux, Clarens (M).

A. verna Naye, Jaman. (M)

Moehringia trinervia Clairv, bois sur Aigle et Corbeyrier ; bois sur Montreux (M).

Stellaria graminea L. 2r : Soud, Corbeyrier, Veyge, Leysin, Luan, Folliaux ; — 3s : les Mosses, Praz Cornet 1700^m, Pré d'Aveneire 1950^m.

Cerastium trigynum Vill. c. à Naye (M).

Linum alpinum L. station inférieure : Fenalet 780^m.

Malva moschata L. vallée de la Tinière (M).

M. Alcea L. Les Ecovets et sur Villars (Isabel) ; Yvorne, vallée de la Tinière.

M. sylvestris L. c. à Leysin, Crettaz, Comballez — 3s : Rossinières.

Hypericum quadrangulum L. 3s : Praz Cornet, La Vaux, Aveneire, Montérel, Chaude ; Jaman (M).

H. tetrapterum Fr. vallée de l'Eau froide ; 3s : vallon du Leyzay.

G. rotundifolium L. non R. mais c : sur Yvorne, Fontaney et route du Sépey, Chernex ; altitude maximum, Pare Blanche sur Roche environ 900^m.

G. palustre L. Chaulin, en Villars (M).

G. sylvaticum L. à 2400^m environ à la Dix, Ormonts.

G. dissectum L. Route du Sépey, Pare Blanche, Villeneuve ; graviers de la Veveyse (M).

Oxalis stricta L. Montreux, Clarens (M).

O. corniculata L. Veytaux (M).

Evonymus europaeus L. 2r : non R. mais ac. : Devens, Antagnes, Forchex, la Cheneau, Pontis, les Afforets, Corbeyrier, la George, le Mont de Roche, Montreux, etc.

Genista sagittalis L. à 1750^m sous Meitreillaz et à 1850^m au-dessus de la Dix.

Cytisus alpinus L. 3s : la Tine, vallée de l'Hongrin, ac. en aval du Tabouset.

Ononis procurrens Willr. c. sur Leysin, Corbeyrier, Montreux (M) — 3s : vallée de l'Hongrin, de Collondaz-jœur à la Preisaz.

Medicago minima Lmk. Drapel sur Aigle et chemin de Ponty 780^m, le Mont de Roche, graviers de la Veveyse, ainsi que le *falcata* (M).

Melilotus altissima Thll. Leysin, Ormonts, Antagnes ; Caux, Glion (M).

Trifolium arvense L. sur Mont, roc de Veyge, Signal de Leysin 1270^m, Pare Blanche.

T. medium L. Leysin, Vuargny, de Roche aux Agites et à Pare Blanche, Ormonts, sous-alpes de Montreux (M). 3s : arête de la chaîne d'Aveneire 1900^m, vallée de l'Hongrin.

T. ochroleucum L. vallée de la Tinière, en Mousse sur Blonay (M).

T. Thalii Vill. La Vaux et la Dix 2300m.

T. repens L. dépasse beaucoup les 1000m assigné comme limite sup. : Bretaye. 1800m, sur la Dix 1800m, sur la Pierre du Moellé 1700m, sur Leysin 1900m, Aveneire 1900m.

T. badium Schreb. Dans toutes les Alpes. Aux stations indiquées ajoutez Alpes d'Ormont-dessous, de Leysin, vallées de l'Eau froide, chaîne de Malatrait — Aveneire — 3s : Seron, La Vaux, Vaudallaz, Rocher du Midi, Vieilleman, vallons du Petit Hongrin et de Chaude ; chaîne de Naye (M).

T. aureum Poll. sur Vuargny, le Flot de Crettaz, l'Efflot de Veyge; Pare Blanche; en Jor, au Chargiau sur Montreux (M).

Lotus uliginosus Schk. entre Chernex et Fontanivant (M).

Tetragonolobus siliquosus L. le Cerf, L'Alliaz — 3s : les Mosses, Siernes Reynaud, vallée de l'Hongrin.

Phaca alpina Wulf. Naye, rare (M).

Astragalus glycyphyllos L. Aigle-Veyge et Aigle-Leysin, Vuargny, Corbeyrier-Agites, sous la Corbaz, Ormont-dessus, environ 1300m ; Montreux-Glion, Chamby-Avants (M).

A. aristatus L'Hér. Versant vaudois d'Hautaudon, en Chauveyssaz (J^t)

A. depressus L. 3s : alpe de Savigny, pied S. de la Dent de Ruth (J^t).

Coronilla vaginalis Lam. Mont d'Or, route des Agites, la Sarse.

Vicia tetrasperma Schrb. graviers de la Veveysse (M).

V. dumetorum L. environs de Salins, de Corbeyrier à Leysin, Cubly; Sendy, vieux chemin de Glion (M).

Lathyrus aphaca L. graviers de la Veveysse (M).

L. pratensis v. *Lusseri* c. pied S.-O des rochers de Tour d'Ai 2050m.

L. tuberosus L. Aigle. Roche, Villeneuve.

L. sylvestris L. Gryon, Glutières, Vuargny.

Prunus Cerasus L. Veyge 1100^m Leysin 1210^m.

Spiraea Filipendula L. la Pierraz à Corbeyrier 850^m.

Sieversia reptans Sprg. La Vaux près Lioson.

S. montana Sprg. Grande Arpille, Truex, Famelon, Taney; 3s : Gumfluh, Seron, La Vaux, Vaudallaz, Naye.

Fragaria elatior Ehrh. sur l'hôtel Byron, Ville-neuve (M).

F. collina Ehrh ac. sur Ollon, Verchiez, c. sur Aigle, Fontanay, Yvorne, Roche, Cubly sur Montreux.

Comarum palustre L. non point r. mais ac. sur le versant rhodanien : ajoutez les Lagots, les Chavonnes, la Badausaz, lac Pourri et lac Rond. — 3s : la Sierne au Cuir.

Rosa rubiginosa L. 3s : vallon des Fenils sur Gesenay, frontière bernoise (J^t).

R. elliptica Tausch. même station (J^t).

R. collivaga Cott. 3s : vallon de Vert-Champ, sur Rossinière (J^t)

R. recondita Pug. 3s : Combe de Chaudes (J^t).

R. omissa D. 3s : la Tine (J^t), station riche en roses, voir Cottet Guide.

Alchemilla amphisericea Buser, pâturage de Naye (J^t).

A. splendens Christ, alpe de Chaudes, rare (J^t).

Sanguisorba officinalis L. non r. mais ac. sur Villard, Badausaz, Carsaleyre sur le Sépey, Rouvenaz sur Cergnat, Scie de Leysin, Corbeyrier; de Chernex à Chamby, Chaulin, les Prévondes, (M) l'Alliaz, Prantin, etc.

S. dictyocarpa Grml. sous Mayen 1750^m, Malatrait 1800^m.

Mespilus oxyacantha Grtn. Signal de Leysin 1270^m, Flot Crettaz 1300^m.

M. monogyna Wlld. ac. partout ; il monte jusqu'aux Esserts 1440^m et au Folliaux 1400^m, vallée de l'Eau froide.

Cotoneaster vulgaris Lindl. 2r : ac. ajouter alpes d'Olion, chaînes d'Aï et d'Aveneire ; Naye (M).

C. tomentosa Ldl. ac. Géricton, Chamossaire, sur Vuargny, Mont d'Or, chaîne d'Aï, Pare Blanche, Malatrait.

Sorbus Aria Crtz. 2r : c. partout de la vallée de la Gryonne à la Veveyse !

S. Hostii Jacq. les Outtans, Malatrait.

S. Chamaemespilus Crtz. les Outtans, Chamossaire, Mont d'Or, Dorchaux, Flot de Crettaz, Chaîne d'Aï, Malatrait. — 3s : versant N. de la chaîne de Chaussy.

Epilobium spicatum Lam. alt. sup. : éboulis au-dessus des chalets d'Aï 1950^m. fl. *albo* : sur Luan, alpes de Corbeyrier.

E. hirsutum L. Barme sur Aigle, sous Corbeyrier ; de Chamby aux Avants.

E. collinum Gmel. La Ville, Ormont-dessus, Leysin.

E. trigonum Schrk. 2r : ac. Chavonnes, Pillon, alpes de Leysin, vallée de l'Eau froide — 3s : Verdaz, vallée du Petit Hongrin.

E. origanifolium Lam. 3s : non RR. mais ac. Seron, La Vaux, Grande Combe du Vanil, la Pierreuse, Aveneire ; Naye (M).

E. alpinum L. le Cat. indique 3s : O. Je n'ai pas de notes, mais je suis sûr qu'on le trouvera sur le versant N. de la chaîne du Chaussy, de Saxiéma à Lioson, ainsi que dans le massif de la Gumfluh.

Circaea lutetiana L. sur Villard, Vuargny, Corbeyrier, vallée de l'Eau froide ; Gorges du Chauderon (M).

Callitriche vernalis Kütz. Bretaye.

Myricaria germanica Desv. bords de la Gryonne, Devens, Bouillet.

Bryonia dioica Jacq. sur Roche ; vieux chemin de Glion (M).

Portulaca oleracea L. plus stat. Montreux (M).

Sedum maximum Suter. c. St-Triphon, Vuargny, alpes de Leysin, Corbeyrier, Pare Blanche, Pissot de

Villeneuve ; — 3s : Colline du Temple à Château d'Ex, Gorges du Tabouset.

S. purpurascens Koch. biffer « le m. Jacc. » je l'ai trouvé fort beau sur Cerniat d'Ormont-dessous,

S. villosum L. 3s : les Mosses, la Joux Noire, vallée du Petit Hongrin.

S. atratum L. alpes de Moreles, la Paraz, Mont d'Or, Truex — 3s : Seron, Châtillon, versant N., Aveneire.

S. micranthum Bast. sentier du Pertuis au Pré d'Aveneire.

S. sexangulare L. chemin de Ponty, route du Sépey-Leysin, Feydey, Pare Blanche, à Roche; Montreux, nombr. stat. avec *acre* et *rupestre* (M).

Sempervivum tectorum L. c. alpes d'Ollon et de Leysin, Famelon, les Chaux, Mayen 1900^m, c. Rochers du Flot de Crettaz, du Suchet, du Signal de Leysin, la Sarse, c. chaîne de Malatrait à Monterel 1950 m.

Ribes petraeum Wulf. Plambuit, les Agites, sur Arnaulaz; Aveneire (M) — 3s : entre le Tabouset et la Pertusaz.

Saxifraga varians v. *atropurpurea* Sternb. Creux de Champ.

S. cuneifolia L. 3s : bois des Siernes Raynaud, du Dégottiau et du Pissot, vallée de la Torneresse, vallée de l'Hongrin au bois de Charbonnière.

Astrantia minor L. 3s : ajouter Thoumaley, Laudalaz et La Vaux.

A. major L. c. 400-1900^m plaine au pied d'Arvel, Gêteillon 1900^m, Chaux de Mont 2000^m, entre Ai et Mayen 2050^m; une var. *purpurea*, involuцelles pourpre plus ou moins foncé sur la Dix, Ormonts 2050^m.

Trinia vulgaris DC. AC. 420-1450^m les Pesses d'Aigle, sur Vuargny, sur Palettaz de Leysin, 1450^m Flot de Crettaz, Roc de Veyge; trouvé à 1950^m aux Dentaux de Naye (M).

Aegopodium Podagraria L. chalets d'Ai 1900^m et de Mayen.

Oenanthe Lachenalii Gmel. Chaulin sur Montreux.

Aethusa Cynapium L. jardins de Cergnat, Crettaz et de Leysin 1100-1280^m.

Feniculum officinale All. Ollon, Antagne, la Tannaz à Yvorne.

Seseli annuum L. le Montet à Bex, cc. St-Triphon, la Glai vaz, Plantour, la George, c. à Pare Blanche, monte à 700^m.

Silaus pratensis Bess. Corbeyrier, — 3s : la Tine (J^t).

Pachypleurum simplex Rchb. 3s : AC. sur le versant N. de la chaîne de Chaussy - Cape au Moine.

Peucedanum austriacum K. 3s : Gorges du Pissot, c. du Tabouset à la frontière fribourgeoise.

P. Oreoselinum Mnch. 2s : non R. mais AC. la Glai vaz, Grands Rochers, Signal de Leysin, Roc de Veyge, Pare Blanche. — 3s : c. Baies de la Dent à Château d'CEx.

P. Cervaria Juss. Flot de Crettaz env. 1200^m.

Pastinaca opaca Bernh. route Aigle-Sépey à Larrevoin.

Heracleum Sphondylium L. monte à 2100^m. : la Dix, Ai.

Laserpitium Siler L. Leysin, Famelon, les Chaux, cc. chaîne de Malatrait, AC. alpes de Montreux (M) 3s : Montérel, Aveneyre, gorges du Tabouset; pâturage de Naye (M).

Orlaya grandiflora Hfm. c à Pare Blanche jusqu'à 650^m.

Torilis Anthriscus Gml. c. AC. partout, Bex, route du Sépey, Yvorne, la George, Montreux — 3s : Chaudanne, Rougepierre, le Perrex.

T. infesta Hfm. route du Sépey, Yvorne, Pare Blanche, Montreux.

Myrrhis odorata Scop. Brison, sous les Verraux (M).

Chaerophyllum Villarsii K. c. aux Ormons, alpes

de Leysin et Corbeyrier, Naye, — 3s : Toumaley, Seron, La Vaux, vallée de l'Hongrin, Montérel.

C. aureum L. c. à Leysin, Sépey, Corbeyrier; Montreux (M), — 3s : l'Etivaz, Cuves.

Adoxa moschatellina L. Luan, les Esserts, vallée de l'Eau froide 1400m.

Sambucus Ebulus L. sous Bryon, alpes de Leysin 1510m.

S. racemosa L. c. vallée de l'Eau froide; et alpes de Montreux (M). 3s: vallée de l'Hongrin, alpes de Chaude, Naye et Jaman.

Lonicera coerulea L. arête de Malatrait - Aveneyre 1850-1900 m. — 3s : vallée de l'Hongrin.

L. nigra L. la Cheneau, Leysin, Argniaulaz, la Joux verte, Cubly.

Sherardia arvensis L. c. champs de Leysin 1200-1300m.

Asperula cynanchica L. Yvorne, les Pontis, la George, Pissot de Villeneuve, Tinière, c. sur Montreux (M).

Galium Cruciata Scop. sous Mayen 1800m. Pointe à l'Aiguille 1900m.

G. verum L. sous Mayen 1750m.

G. boreale L. la Scie et Crettaz de Leysin 1200m entre Gryon et les Pars.

G. sylvaticum L. bois de Villeneuve aux Grangettes (M).

G. sylvestre Poll. la Dix, chaîne d'Aï et d'Aveneyre, 3s : La Vaux.

G. alpestre R. S. toutes les alpes des Ormonts, chaînes d'Aï et d'Aveneyre.

G. palustre L. 2r : Plambuit, les Chavonnes, les Lagots, la Badausaz, lac Pourri, lac Rond, — 3s : marais des Mosses.

Valeriana dioica L. plaine de Villeneuve, marais d'Arvel 377m, lac Pourri 1510m.

V. montana L. vallée de la Grande Eau à Creux de Champ, Marnex, la Dix.

Dipsacus pilosus L. c. au pied d'Arvel, vallée de la Tinière ; la Veraye à Veytaux, La Tour (M).

D. sylvestris L. c. les Larrets sur Leysin.

Cephalaria alpina Schrad. Morcles, en Béroud, au Pomay d'Arveye, au Péray de Chesières (Isabel) ; Leysin, les Ravines, Agites, c. au Folliau et Grand Ayerne 1500 m.

Knautia sylvatica Duby. c. Ormont-dessus, bois du Sépey et de Leysin, vallée de l'Eau froide — 3s : c. vallées de la Torneresse et de l'Hongrin.

Succisa pratensis Mnch. 2r : de Gryon à Taveyannaz, Ormonts-dessus pl. loc., Leysin, Crettaz, Prafandaz 1580m ; Chamby, en Villars, Folliaux (M), 3s : Mosses, Sierne Raynaud et Sierne au Cuir, vallée du Grand, du Petit Hongrin et du Leyzay.

Scabiosa lucida Vill. c. chaîne d'Aï et Mont d'Or, chaîne d'Aveneyre, Naye, La Vaux.

Adenostyles albifrons Rchb. cc. vallée de l'Eau froide, alpes de Villeneuve, entre Aï et Mayen 2100m arête de Truex 2180m ; c. alpes de Montreux (M).

Tussilago Farfara L. la Dix aux Ormonts 2000m.

Petasites officinalis Mnch. c. Argnaulaz — 3s : c. aux Rittes, Sierne Raynaud, vallées de l'Hongrin et du Leyzay, versant N. de Jaman.

Linosyris vulgaris Cass. Drapel et les Pesses sur Aigle, Pare Blanche à Roche.

Erigeron Villarsii Bell. c. Pointe à l'Aiguille près Aveneyre.

E. alpinus L. à Naye et *glabratus* Hoppe Jaman versant Nord (M).

Solidago Virga-aurea var. *alpestris* W. K. la Dix, chaînes d'Aï et du Mont d'Or, Pertuis d'Aveneire.

Gnaphalium supinum L. et v. *pusillum* — 3s : La Vaux.

G. sylvaticum L. Les Tailles, Creux d'Orsay 1850m, Chavonnes ; Plaigne sur les Avants (M) — 3s : Pré

d'Aveneire 1900^m, vallées de l'Hongrin et du Leyzay, Charbonnière.

Antennaria dioica DC. alpes d'Ollon, Ormont-dessus et dessous, c. chaîne d'Ai et du Mont d'Or, c. chaîne d'Aveneire, Naye, Merdasson (M).

Tanacetum vulgare L. entre les chalets de La Ville et la Dix, Ormont-dessus.

T. Balsamita cultivée un peu partout dans les jardins des Alpes sous le nom d'Herbe de saint Pierre.

Achillea Ptarmica L. 3s : la Jointe.

A. macrophylla L. 3s : derrière Jaman (M).

Leucanthemum alpinum Lam. Chamossaire.

L. vulgare DC. alpes de Leysin 1900^m et plus.

L. vulgare v. *montanum* Chaux de Mont.

L. atratum DC. entre Ai et Mayen.

Arnica montana L. Plan d'Arenaz, chaîne de Naye, (M).

Senecio viscosus L. Aigremont, Leysin.

S. cordifolius Clairv. r. aux Ormonts, cc. vallée de l'Eau froide — 3s : vallées du Petit Hongrin et du Leyzay.

Cirsium lanceolatum L. sous-alpes d'Ollon, Sépey, Leysin, Corbeyrier; — Montreux (M).

C. eriophorum Scop. répandu : Coufin; la Saussaz sur Chesière et Marnex (Isabel); la Dix, la Ville, Chavonnes; cc. Creux de Champ; du Sépey à la Pierraz, alpes de Leysin, c. vallée de l'Eau froide; Sonchaux (M); 3s : Cray, les Coullaytes, vallées de l'Hongrin et du Leyzay.

C. rigens Willr. les Ormonts, du Sépey à la Pierraz, le Folliaux; — 3s : les Mosses, vallée du Grand, du Petit Hongrin et du Leyzay.

C. spinosissimo-rivulare 3s : pâturage de Merzère, alpes de Rougemont, c (Jaquet)

Carduus nutans L. c. à Leysin, Feydey, les Larrets.

Lappa tomentosa Lam. les Ecovets, Leysin; vall. de la Tinière (M) — 3s : la Vuichoude et le Lavanchy, vallée de l'Hongrin.

Serratula tinctoria L. v. *monticola* Bor. : en Luan ; c. Folliaux. Gros Ayerne sous Malatrait — 3s : Aveyre et Montérel.

Centaurea Cyanus L., monte partout avec les champs.

C. angustifolia Lej. des formes affines à Chaux-de-Mont et Gêteillon, alpes de Leysin.

Picris hieracioides L. non r. mais c. partout. Citons dans 3s : Chaudanne, Rossinières, vallées de l'Étivaz, du Gd et Pt-Hongrin.

P. pyrenaica L. Bovonnaz, Chesières, Malatrait — 3s : le Pissot.

Scorzonera austriaca Willd. 3s : Dent de Corjon (J^t), nouv. p. le bassin sarinien.

Hypochoeris radicata L. : sous Bretaye 1700 m.; le long des sentiers à la Dix, 1370^m, sous Meitreillaz 1800^m.

H. maculata L. 3s : les Fenils sur Rougemont (J^t).

Taraxacum officinale Web. col d'Ai, 2142^m, versant N. de Châtillon (Chaussy) 2400^m.

Lactuca virosa L. Fontaney et Barmaz sur Aigle.

L. Scariola L. Villeneuve, carrières d'Arvel; Graviers de la Veveyse (M).

Mulgedium alpinum L. Dovray, Chamossaire, Coussy; cc. Lioson d'Argnauz et versant N. de Malatrait — 3s : le Lavanchy, les Charbonnières; sur Chaudes (J^t).

Sonchus arvensis L. Feydey sur Leysin 1450^m, Leyzay 1500^m.

Chlorocrepis staticifolia Griseb. 3s : rives de la Torneresse et de l'Hongrin.

Hieracium Zizianum Tsch. la George, près Roche, Ollon.

Hieracium Zizianum ssp. *actinanthum* N. P., Ollon.

H. cruentum N. P., arête de Malatrait.

H. glaucum ssp. *tephrolepium* N. P. Creux-de-Champ.

H. bupleuroides ssp. *breviflorum* N. P. Creux-de-Champ.

H. bupleuroides Gmel. ssp. *breviflorum* N. P. Creux-de-Champ.

H. bupleuroides Gmel. ssp. *Schenkii* Griseb. Creux-de-Champ.

H. villosum L. ssp. *genuinum* Anzeindaz. Mont d'Or, Aï, 3s : Bonaudon.

H. villosum L. ssp. *villosissimum* f. *stenobasis* Aï, Mont d'Or.

H. villosum ssp. *undulifolium* N. P. 3s : Bonaudon (J^t).

H. scorzonerifolium Vill. ssp. *polybracteatum*, Creux-de-Champ.

H. dentatum Hp. ssp. *ochrochlorum* (N. P.) Zahn = *H. dentatum salævense* b. *ochrochlorum* N. P. non salævense Rap. = *H. dentatum* var. *vaudense* A. T. in sched. Creux-de-Champ

H. salævense N. P. Col de Bonaudon (J^t).

H. dentatum Hp. ssp. *Ormontense* = *H. sixtinum* A.-T. p p. Creux-de-Champ.

H. dentatum ssp. *Gaudini* Christen. Pare de Marnex, Mont d'Or.

H. dentatum ssp. *pseudovillosum* Tour d'Aï, Famelon.

H. expallens Fr. 3s : col de Bonaudon (J^t).

H. parcepilosum A.-T. Chaudes, Bonaudon (J^t) var. *epileion* Zahn. Pertuis d'Aveneire.

H. subvillosum N. P. *H. pseudoporrectum* Chr. Col de Bonaudon (J^t)

H. dentatifolium N. P. Mont d'Or, la Paraz, Creux-de-Champ — 3s : Pertet à Bovey, col de Bonaudon (J^t).

H. aechmetes N. P. f. *glabra* Zahn 3s : col de Bonaudon (J^t).

H. diabolinum N. P. 3s : col de Bonaudon. (J^t).

H. valdepilosum Willd. Creux-de-Champ, Chaîne du Chaussy.

H. subvaldepilosum Zahn = *H. subalpinum* N. P. 3s Bonaudon, Savigny (J^t).

H. elongatum N. P. très répandu, chaîne d'Aï, Mont

d'Or, d'Aveneyre, de Naye — 3s : Lavaux, Lioson !
Savigny, les Pucelles, Bonaudon (J^t).

v. *pseudo elongatum* N. P. 3s : fréquent (J^t).

H. glabrescens Lagg. 3s : Bonaudon (J^t).

H. oligophyllum N. P. 3s : Savigny, les Pucelles sur
Rougemont (J^t).

H. glanduliferum Hoppe v. *microcephalum* : Pare de
Marnex.

H. piliferum Schrd. 3s : Vaudallaz, La Vaux.

H. praecox F. Schtz. Corbeyrier, Yverne.

H. Trachselianum Chr. Javernaz, Creux-de-Champ,
Mont d'Or, Gétéillon, la Berneuse — 3s : Bonaudon (J^t).

H. Trachselianum v. *hirsutum* Chr. 3s : Dent de
Ruth (J^t).

H. hypochaeroideum A.-T. Porreyrettaz, Anzeindaz
(Chenev.).

H. bifidum K. Anzeindaz, Creux de-Champ.

H. subcaesium Fr. Creux-de-Champ, alpes de Leysin,
Mont d'Or. — 3s : La Vaux.

H. subcaesium var. *subglandulosum* Zahn in Koch
Syn : Creux-de-Champ.

H. incisum Hp. Anzeindaz, Creux-de-Champ. — 3s :
Lioson.

H. silvaticum Lm., vallée de l'Eau froide, alpes de Mon-
treux — 3s : vallées de la Torneresse et de l'Hongrin.

H. silvaticum ssp. *graminicolor* Zahn 1904. Creux-de-
Champ.

H. silvaticum ssp. *deductum* Sudre, murs à Aigle ;

H. silvaticum ssp. *gentile* Jord. Ollon, Aigle, route
des Ormonts.

H. doronicifolium A-T = *parcepilosum-silvaticum*,
3s : Bonaudon (J^t).

H. subelongatum N.-P. *elongatum-silvaticum*, 3s : la
Merzère, Savigny (J^t).

H. cirritum A.-T. ssp. *cirritum*, v. *lingulatum* N. P.
Creux-de-Champ.

H. oxyodon Fr. f. *pseudorupestre* N. P. Pare de Marnex.

H. humile Jacq. Creux-de-Champ, vallée de la Gryonne, chaîne d'Ai et Mont d'Or, route du Sépey, Roche; — 3s : la Tine, vallée de l'Hongrin.

H. Cotteti Godet, *H. squalidum* ssp. *Cotteti* A-T. Creux-de-Champ, Anzeindaz.

H. Berardianum A-T. Bovonnaz (Chenev.) — 3s : Pertet à Bovey, Bonaudon (J^t).

H. Cottianum A-T. — 3s : alpes de Naye, çà et là (J^t).

H. prenanthoides Vill. Ormont-dessous, vallées de l'Eau froide et de la Tinière — 3s : Lioson, vallée de l'Hongrin, Chaudes.

H. perfoliatum Fröl. Comballaz — 3s : l'Arenaz (J^t).

H. lanceolatum Vill. ssp. *strictum* Fr. Suchet de Leysin, — 3s : Bonaudon (J^t).

H. juranum Fr. sensu stricto, 3s : Plan l'Arenaz, Chaudes, Bonaudon (J^t).

H. pseudojuranum A-T. 3s : Chaudes, Bonaudon (J^t).

H. lycopifolium Fröl. f. *typica*, Dignes de la Grande Eau à Aigle.

H. subalpinum A. T. les Plans, Pont-de-Nant (Chenev.).

H. trichójuranum Zahn = *parcepilosum-Juranum* 3s : Plan l'Arenaz, abondant, seule localité ! (J^t).

H. juraniforme Zahn, 3s : Bonaudon (J^t).

H. valesiacum Fr. ssp. *bifrons* A-T. b. *trichoprenanthes* Zahn in Koch Syn : Sur Mont à Leysin.

H. tridentatum Fr. Crétasse sur le Sépey.

H. pseudocorymbosum Grml. ssp. *pseudocorymbosum* Dignes de la Grande Eau sous Aigle.

H. pseudocorymbosum var. *aquilejense* Zahn. Dignes de la Grande Eau, les Iles d'Aigle.

Diagnose de l'*H. Aquilejense* Zahn.

Aphyllopode : tige de 90-110^{cm}, finement hérissée, floccifère en haut, distinctement striée. Feuilles cauli-

naires 30-40, assez rapprochées, les inférieures lancéolées, acuminées des deux côtés, les suivantes oblongues lancéolées, les autres ovales-lancéolées, arrondies et un peu embrassantes à la base, denticulées, les inférieures rarement dentées, hérissées des deux côtés de poils fins très courts, plus nombreux aux marges et sur la nervure dorsale; les moyennes et supérieures presque glabres en dessus, toutes très fermes, d'un vert jaunâtre et un peu luisantes en dessus. Inflorescence en forme de panicule subcorymbiforme assez développée, à rameaux étalés-dressés au nombre de 10-20, ramifiés encore 1 à 2 fois; capitules 20-40, pédoncules, 15-25^{cm} de longueur, très tomenteux et à quelques poils fins; péricline ovoïde, 10^{mm} de longueur, à écailles noires, comme couvertes de poussière par des poils étoilés très nombreux, et portant aussi des poils glanduleux assez nombreux, mais presque sans poils simples. Fleurs d'un jaune citrin, ligules non ciliolées; styles d'abord jaunes, achènes grisâtres, enfin bai roussâtre. — La plante est intermédiaire entre *H. lycopifolium* Fröl et *H. umbellatum* L. f. *brevifolium* Fröl. Dignes de la Grande Eau près Aigle.

La plante paraîtra aussi dans mon travail sur les *Hieracium* dans la Flore de la Suisse par Schinz et Keller, pars II. H. Zahn.

Phyteuma betonicifolium Vill. 3s : Crai, Gros Jabloy, *P. spicatum* L. jusqu'à 1900^m pl. loc. alpes de Leysin et de Villeneuve.

Campanula persicifolia L. Fenalet, Roche, Barmaz sur Aigle, les Afforêts, Pontis, 800^m la George; Montfleuri sur Montreux (M).

C. latifolia L. sous la Corbaz, Ormont-dessus.

C. thyrsoides L. Naye, Plan d'Arenaz (M).

Vaccinium Vitis-Idaea L. Flot de Crettaz, Caux, — 3s, vallée de l'Hongrin, pl. loc.

V. uliginosum Jorogne, Ensex, Isenau, Grande Arpille, Marnex, pentes de la Paraz et du Tarent jusqu'au

sommet 2540^m ; Badausaz, Crettaz de Leysin, — 3s : pentes N. de la chaîne du Chaussy, pl. loc., Sur Combe et Potse di Gaulés dans le massif de la Gumlüh.

Arctostaphylos alpina Sprg. 3s : sommet de la Paraz et du Tarent, chaîne du Chaussy.

Rhododendron hirsutum L. Gêteillon — 3s : cc. derrière le Mont d'Or et Dorchaux.

R. intermedium Tsch. hybride des 2 espèces, mêmes stations.

Pirola uniflora L. Coufin ; Signal de Veyge, forêt de Luan.

P. chlorantha Sw. bois de la Glaivaz, de Luan, de l'Ovaille.

Monotropia Hypopitys L. bois sur Vuargny, Flot de Crettaz.

Fraxinus excelsior L. v. *biloba* G. G. St-Triphon, Leysin.

Vinca minor L. fl. purpureo. Plantour, Vers Cort à Corbeyrier.

Menyanthes trifoliata L. Crettaz et Scie de Leysin, la Badausaz, lac Pourri, lac Rond, — 3s : plaine de la Barmaz aux sources du Petit Hongrin.

Chlora serotina K. assez abondant, mais chétif à la Praille de Noville entre le Grand Canal et le bras du Rhône.

Gentiana purpurea L. c. Chaux-de-Mont, chaîne d'Aveneire.

fl. albo. Orgevaux sous Culan (Isabel).

fl. flavido. Crêtelet, Javernaz, alpes de Gryon.

G. purpureo-punctata Javernaz, Ausannaz.

G. cruciata L. la Badausaz. — 3s : vallée de l'Hongrin.

G. excisa Presl. Taveyannaz, Chamossaire.

G. bavarica L. 3s : le Leyzay, f. *elongata* ; Aveneyre, Montérel.

G. utriculosa L. au Suppl. p. 447 le Cat. Pittier indique

une station à Vevèy, c'est une erreur : d'après Rhiner lui-même, Muret lui a écrit Vervev, c'est donc encore la station de Gaud. Jacc. et Blanchet.

G. nivalis L. Naye, les Verraux (M) 3s : Lavaux, Planachaux.

Erythraea Centaurium Pers. sous Corbeyrier, Pare Blanche à Roche; Mousse sur Blonay (M).

Cuscuta europaea L. chemin du Cerf à Leysin 1500 m, Luan ; — 3s : Aveneyre, près du Tabouset, vallée de l'Hongrin.

C. Epithymum Murr. la Dix 1800^m, Folliaux.

Myosotis palustris Roth. les Lagots, les Chavonnes 1720 m.

M. alpestris Schm. Châtillon et Tarent 2450^m.

M. intermedia Lk. les Esserts de Leysin, la Comballaz 1350^m, La Ville, Ormont-dessus 1500^m.

Pulmonaria officinalis L. Gryon, Huémoz, Chesières, les Ecovets, Leysin, Boveau, Plan-Falcon sur Luan 1560^m

P. tuberosa Schrk. Chamossaire, sur Luan, le Chargiau sur les Avants (avec le montana).

Cerinth glabra Mill. Coufin, Chamossaire ; la Dix 2050^m, Ai, Mayen, Tompey, Agites, Luan, Neyrevaux, Ayerne, Jorat, Folliaux — 3s : Aveneire, Vuichoude, Pertuse, vallon de Chaudes, Naye ! pied de Corjon (J^t).

Solanum Dulcamara L. le Bouillet, Gorge de la Grande Eau sous les Grands Rochers. Clarens.

S. nigrum L. Leysin, la Combe au Sépey ; c. à Montreux (M).

Physalis Alkekengi L. Pied d'Arvel, Sales, Antagne, les Fornex, vallée de la Petite Gryonne 900-1000^m (Isabel) Glutières, route du Sépey.

Atropa Belladonna L. usine électrique de Vuargny, Belle place et Pierre de l'Heure, à la Cheneau ; sur le Pont d'Egraz, Roche, route de Glion au Pont-Bridel ; c. de Chamby-Avants et plusieurs autres stations sur Montreux (M).

Datura Stramonium L. Ollon, Leysin 1450m obs. 1895, 97-1900; entre Brent et Chailly (M).

Verbascum nigrum L. Leysin, Sépey, Corbeyrier, Mayen, Aï 1800m, vallée de l'Eau froide, alpes de Montreux (M) — 3s: Lécherette, Tabousset.

V. Thapsus L. Huémoz, Sépey, Leysin, Veyge, Corbeyrier 3s: du Tabousset à la Pértusaz.

V. thapsiforme Schrad. Aigle, Corbeyrier, Boveau.

V. Lychnitis L. Chalex, Corbeyrier, la George, Avenère 1550m, pied du Mont d'Or 1600m.

Scrofularia nodosa L. en Soud sur Villars 1550m, de Leysin à la Pierraz à 1600m.

Linaria Cymbalaria Mill. toujours plus répandue cc. au lieu de RR. St-Triphon, Aigle, Ollon, Roche, cc. à Villeneuve, Grandchamp, Veytaux cc. à Montreux, Chernex, Brent.

Antirrhinum Orontium L. Aigle, Verchiez, Fontanèy, Chernex, c. vignes de Montreux (M).

Veronica Teucrium L. non R. mais AC. et même C. Panex, Veyge, Leysin, Corbeyrier, Agites, cc. Mayen, Aï 1900m, Mont d'Or, c. chaîne de Malatrait, et alpes de Montreux (M) — 3s: la Dent à Château-d'Ex.

V. Beccabunga L. c. Bretaye 1780m, la Dix 1740m; c. lac d'Aï 1900m, Grand Ayerne, Jorat — 3s: Avenère, Pâqueret, Vuichoudaz.

V. spicata L. monte à 2000m, Aï, la Riendaz.

V. alpina L. 3s: Lavaux, Naudallaz, lac Lioson; c. Naye (M).

V. saxatilis Scop. 3s: Châtillon, col de Lavaux.

V. fruticulosa L. Mont d'Or, c. à Famelon, Aï, Mayen, AC. chaîne d'Avenère.

Erinus alpinus L. AR. dans la chaîne de Chaussy; c. chaînes d'Aï et Mont d'Or, murs à Roche 390m, Gorges du Chauderon, Chaulin (M) — 3s: Gorges du Pissot, de l'Hongrin et de la Tine.

Digitalis lutea L. Leysin, Comballaz, Corbeyrier, sur Roche, Liboson, Chamby-Avants, Villars (M).

Alectorolophus alpinus Bmg. La Dix, Truex, Pointe à l'Aiguille.

A. hirsutus All. 3s : jusqu'à 1350m, vallée du Grand et Petit-Hongrin, au Leyzay 1450m.

Pedicularis verticillata L. c. Ai 2250m, Truex 1280m, la Dix 2300m, la Paraz 2350m.

P. palustris L. 2r : c. la Franche, en Saussaz, La gots, alpes d'Ollon; Badausaz, Rouvenaz, Ormont-dessus, lac Pourri, lac Rond, Grand Ayerne, — 3s : la Barmaz au Petit-Hongrin.

P. Barrelieri Rchb. chaîne de Naye (M) — 3s : toute la chaîne de Cray, le Savigny (Jf).

P. foliosa L. la Dix 2150m, Chaux-de-Mont 2180m.

Melampyrum cristatum L. Chalex, la Glaivaz, Flot de Crettaz, Veyge 1450m, le Mont de Roche, Baie de Clarens à Brent (M).

Bartsia alpina L. Ai, 2250m, Lavaux 2350m.

Euphrasia minima Jacq. Famelon, Mont d'Or — 3s : Lavaux 2200m, Charbonnière, Pierre du Moellé, Aveneire, Naye (M).

E. salisburgensis Funk. La Dix, Malatrait.

Lathraea squamaria L. le Montet, Corbeyrier, Montreux, Belmont (M).

Salvia verticillata L. Panex, Pontis; graviers de la Veveyse (M).

Thymus Serpyllum v. *praecox* Briq. Ai, Creux-de-Champ.

Thymus Serpyllum (L. v. *ovatus* Aigle, Fontaney.)

Calamintha ascendens Jord, Plantour, Fontaney, Pontis, Grands Rochers (route du Sépey).

C. officinalis Mnch. Sépey, Aigremont.

Lamium purpureum L. pied de Famelon 2050m.

L. maculatum L. Corbeyrier, Sépey, Luan, chalets d'Ai et de Mayen 1900m.

Galeopsis intermedia Vill. alpes des Ormonts, sous Mayen, Folliaux, — 3s : Charbonnière, Aveneire.

Stachys sylvatica L. Chesières, Leysin, Sépey, Or-

mont-dessus, vallée de l'Eau froide, sous-alpes de Montreux (M). — 3s : vallons de l'Hongrin et du Leyzay.

S. recta L. pied d'Aï et de Mayen env. 1850m.

Betonica officinalis L. 388-1800m.

Brunella grandiflora Jacq. 2r, 3s : c. partout 500-1900m.

Ajuga reptans L. v. *alpina*. chaînes d'Aï et de Maltrait.

Teucrium Botrys L. entre Clarens et Vevey, Leysin 1300m.

T. Chamaedrys L. Flot de Crettaz, sur Leysin 1300m.

Pinguicula alpina L. fentes de rochers humides à la Tour d'Aï 2000m.

Lysimachia nemorum L. 3s : bois des Charmilles, et des Anteines.

Anagallis tenella L. prairie marécageuse à Chamby.

Centunculus minimus L. Praille de Noville.

Androsace helvetica Gaud. Tarent, Châtillon, Truex, Pointe d'Aveneire et de Montérel (rare).

Primula elatior Jacq. sur le lac Segrai 2150m. col d'Aï 2142m.

Primula Auricula L. ac. chaîne de Chaussy, abondant en Marnex, à la Paraz jusqu'au sommet 2543m, aussi à Châtillon et versant N. du Tarent.

- *Samolus Valerandi* L. abondant à Aigle, canaux au midi de la route d'Illarse.

Globularia cordifolia L. 3s : Dorchaux, Montérel.

G. nudicaulis L. ac. au Pillon, Aï, c. versant N. du Mont d'Or et Dorchaux, c. Pertuis d'Aveneire (M).

Plantago media L. montée d'Aï et de Mayen 1650m. près des chalets de la Dix 1700m.

P. lanceolata L. mêmes stations et Maltrait 1800m.

P. arenaria W. K. graviers de la Veveyse (M).

Chenopodium hybridum L. Sépey, Crettaz, Leysin 1300m.

C. album L. c. Leysin, Feydey 1400m.

- Atriplex hastatum* L. Villeneuve, place de dépôts.
Rumex arifolius All. Creux-de-Champ ; Mayen ; sous Lioson d'Argnaulaz.
Polygonum Convolvulus L. les Esserts 1350m, Feydey 1450m, La Ville, Ormonts 1500m.
P. dumetorum L. Combe de Pare Blanche 800m.
P. aviculare L. hameaux les plus élevés des Ormonts 1500m, c. chalets de l'Ortier du Folliaux 1600m.
P. Bistorta L. descend dans la plaine : pl. loc. des deux rives du Rhône, pied d'Arvel ; près d'Illarse, sous Vouvry, près Muraz, etc.
P. lapathifolium L. Sépey, Leysin.
P. Hydropiper L. St-Triphon, Duzillet.
P. mite Schrk. St-Triphon, Aigle, Ollon.
P. minus Huds. Roche, Chessel.
Daphne alpina L. 3s : Rochers des Tours sur le Gros Mont (J^t).
Thesium alpinum L. 3s : Sonlemont, Montérel.
Hippophae rhamnoides L. c. sous Arveye et Villard, baie de Clarens (M).
Euphorbia dulcis L. sous-alpes d'Ollon, les Mandreys à Corbeyrier 1550m.
E. dulcis v. *chloradenia* Boiss. Plantour, Villeneuve.
E. platyphylla L. Yvorne ; Clarens (M).
E. stricta L. AC. partout plaine et coteaux jusqu'à 900m et plus.
E. amygdaloides L. AC. partout jusqu'à 900m Bex-Montreux.
Parietaria officinalis L. Antagnes, Forchex, Sonzier ; Montfleuri, Crin, la Corsaz (M).
Humulus Lupulus L. cult. dans les montagnes, devant les chalets : Crettaz, Leysin 1270m, Comballaz 1376m (commun vallée de la Venoge).
Juglans regia L. à Cergnat, Ormont-dessus 1060m, Huémoz 1010m ; à Villard, Hôtel du Muveran 1270m fructifère en 1893 (Isabel).

Quercus sessiliflora Salisb. Suchet et Signal de Leysin 1270^m.

Corylus Avellana L. les Sassets de Chevril, Ormont à 1600^m (Isabel).

Salix herbacea L. 3s : la Paraz, le Tarent, l'Audallaz, Lavaux.

S. serpyllifolia Scop. le Coin, Mont d'Or, Aï.

S. nigricans Fr. chemin de Gryon à Taveyannaz env 1500^m ; Plan Falcon sur Corbeyrier 1560^m.

Arum maculatum L. Salaz, Villeneuve, Noville.

Orchis globosa L. stations extrêmes : le Furet sous Yvorne 380^m et sous Famelon 2100^m et la Dix, Ormonts-dessus 2150^m.

O. sambucina L. cc. aux Esserts, vallée de l'Eau froide.

O. latifolia L. c. jusqu'à 1600^m et plus haut ; Aï, Mayen, Folliaux 1700^m, sous Famelon 1750^m.

O. palustris Jacq. Chaulin sur Clarens (M).

Gymnadenia conopsea R. Br. — 2000^m et plus ; la Dix et Chaux de Mont à 2100^m.

G. odoratissima Rich. c. marais sous Aigle et Yvorne ; Chamby (M).

Anacamptis pyramidalis Rich. Chamby (M).

Cœloglossum albidum Htm. 3s : Forclettaz et Montérel, vallée du Petit Hongrin.

Nigritella angustifolia Rich. 3s : Vieille Chaux, à Lavaux 2300^m.

Chamaeorchis alpina Rich. 3s : la Chenau sous Chaussy, Mont d'Or et Charbonnière.

Aceras anthropophora R. Br. monte au-dessus de Veyge 1200^m.

Epipogon aphyllum Sw. forêt de l'Ovaille, Luan sur Corbeyrier.

Cephalanthera Xyphophyllum Rchb. Ac. : Lieugex, Aigle 390^m, Pallueyres, Forchex, Panex, la Glaivaz, Larvevin, Plantour ; Pissot de Villeneuve.

C. grandiflora Bbgt. Fenalet, la Glaivaz, sur Roche; de Glion à Caux (M).

Epipactis latifolia All. v. *viridiflora*, vallée de l'Hongrin.

E. atrorubens Schult. sur Feydey de Leysin 1500^m; vallée de l'Hongrin.

Neottia Nidus Avis Rich. ac. Gorges du Chaudeyron (M).

Spiranthes aestivalis Rich. de Villeneuve aux Grassettes (M).

Sturmia Læselii Rehb. Chaulin; entre Chamby et Brison (M.)

Leucojum vernalis L. est à la plaine à Aigle; ac. aux Planches 403^m.

Narcissus pseudo-Narcissus L. 3s : C. aux Bodemos, Rougemont.

N. poeticus L. Noville.

N. radiiflorus Salisb. plaine à la Maladaire et au Duzillet à Aigle 392^m.

N. radiiflorus Salisb. f. *dicéphala*. ac. aux Avants et ailleurs, alpes de Montreux.

Streptopus amplexifolius DC. c. vallon de Nant.

Polygonatum verticillatum All. à plus de 1800^m sous Mayen et Famelon.

P. multiflorum All. à 1000^m sur Roche.

P. officinale All. Le Cat. Pittier l'ignore à l'ouest (imprimé Est par erreur) de Roche et de la Chaudanné; observé au Mont de Roche. Pissot sur Villeneuve, le Folliau, Grand Ayerne.

Ruscus aculeatus L. à plus de 1700^m au Chable rouge près Yverne.

Tamus communis L. plus de 900^m au Pont d'Egraz sur Roche.

Tulipa sylvestris L. bois d'Antagnes d'après Isabel.

Anthericum ramosum L. non point AR. mais C.; Montreux, route de Glion (M); 3s : vallée de l'Hongrin.

A. Liliago L. 3s : Dent de Corjon (J).

Paradisia Liliastrum Bert. 3s : la Vuichoude, Chaude, Naye.

Ornithogalum nutans L. la station de Montreux est à Tavel (M).

O. pyrenaicum L. Devens, Fenalet, Gryon, 1180^m Corbeyrier ; le Basset près Clarens (M).

O. umbellatum L. Noche près Aigle, Yvorne, Vers-Cort.

Gagea lutea L. 3s : Aveneire, Naie d'en bas.

Allium sphaerocephalum L. ac. route du Sépey, cc. Grands Rochers, Flot de Crettaz. Suchet de Leysin, roc de Veyge et Mont de Roche.

A. foliosum Clar. Col de Lavaux versant S. 2350^m.

A. oleraceum L. Roche ; Sonzier (M).

A. montanum Schmdt. de Chambly aux Avants (M).

Muscari comosum Mill. ac. Antagne, Noche, Verchiez, Fontaney, Corbeyrier, Pissot de Villeneuve.

Tofieldia calyculata Whbg. 3s : Lavaux à plus de 2000^m.

Juncus conglomeratus L. Leysin, Badausaz 1450^m. — 3s : vallée de l'Hongrin.

J. filiformis L. et *alpinus* Vill. 3s : Seeberg près Isenau.

J. Jacquini L. 3s : arête du Plan de l'Écrit sur Château d'Œx (J⁴) nouveau pour le district sarinien !

J. bufonius L. env. 1680^m près la Pierre du Moellé.

Luzula pilosa Willd. 1600^m sur Leysin.

L. sylvatica Gd. Gêteillon d'Ai 1900^m, arête de Truex 2180^m.

L. spadicea DC. 3s : Lavaux, l'Audallaz ; la Vide-man à Château d'Œx.

L. multiflora Ehrh. Lioson d'Argnaulaz 1900^m ; 3s : Aveneire 1850^m.

L. multiflora v. *alpina* Hpe. tourbière de la Badausaz.

Notre collègue, M. Chenevard indique le *L. Sieberi* Tsch. à Pont de Nant.

Heleocharis Lereschii Thom. Cette rare espèce qui, paraît-il, a disparu des Pierrettes, avait été trouvée aux Grangettes par E. Secretan. Il serait intéressant de rechercher si elle y est encore.

Scirpus sylvaticus L. cc. Lac Pourri 1510^m; Grand Ayerne, Jorat; c. en Soud sur Chesières 1550^m.

S. caespitosus L. la Badausaz, lac d'Aï 1900^m.

Eriophorum vaginatum L. la Badausaz, lac d'Aï.

E. angustifolium Rth. Lac Pourri; 3s: la Jointe, Sierne Raynaud.

Carex pulicaris L. la Badausaz; 3s: les Mosses, près de la source du ruisseau des Biolles.

C. dioica L. la Badausaz.

C. pendula Huds. du Pont-Bridel aux Avants; Gorges du Chauderon au-dessous du Pont de Pierre (M).

C. Hornschuchiana Hpe. la Badausaz.

C. sylvatica Huds. Gorges du Chauderon à Montreux (M).

C. capillaris L. la Paraz, Mont d'Or, Truex.

C. sempervirens Vill. Col de Lavaux, Ormont 2250^m.

C. ornithopoda Wlld. 1800^m forêt sur Leysin.

C. Halleriana Asso. à Drapel, aux Pesses, Gorges de la Grande Eau, Cretallet, Pontis d'en bas, les cinq au-dessus d'Aigle.

C. clavaeformis Hpe. 3s: Pertet à Bovey avec le *C. glauca* et le *C. Goodenowii* et l'hybride (J^t).

C. ampullacea Good. cc. lac d'Aï 1900^m.

C. vesicaria L. lac Pourri.

Echinochloa Crus Galli Beauv. Ollon, Verschiez; Chailly (M).

Setaria verticillata Bv. Yvorne, Taulan, Vernex-dessus (M).

S. glauca Bv. les Devens; Brent (M).

Anthoxanthum odoratum L. Truex 2190^m, Aï et Berneuse 2200^m.

Phleum asperum Vill. Aigle, Devens.

P. pratense L. c. sur Leysin jusqu'à 1500^m.

- Cynodon Dactylon* Pers. Drapel 680 m.
- Mikium effusum* L. Gorges du Chauderon (M).
- Calamagrostis tenella* Host. 3s : Plan de l'Écrit chaîne de Cray, sur Château-d'Œx.
- Phragmites communis* Trin. marais de Cretasse sur Sépey 1400 m.
- Koeleria hirsuta* Gaud. Rochers de Naye, trouvé en en 1904 par M. G. Mayor; nouveau pour la flore vaudoise!
- Deschampsia caespitosa* Bv. c. partout jusqu'à 2000 m.
- Holcus mollis* L. Duzillet, Pré Nayroud, plaine d'Aigle et sans doute répandu.
- Arrhenatherum elatius* M. K. 2r : c partout, Gryon, sous-alpes d'Ollon, d'Aigle, Sépey, Leysin, Corbeyrier; c. à Montreux (M).
- Avena pubescens* Huds. Gêteillon 1970 m Chaux de Mont 2050 m, Ai 2200 m.
- Melica glauca* F. Sch. sur Leysin 1600 m.
- M. uniflora* Retz. Corbeyrier, Veyge, sur Vuargny, bois du Pissot; sur Montreux (M).
- M. nutans* L. sous Gêteillon d'Ai 1900 m.
- Briza media* L. observé jusqu'à 2000 m alpes d'Aigle.
- Eragrostis minor* Host. c. gare de Clarens, sur La Tour (M).
- Poa compressa* L. les Pesses, le Mont de Roche; Montreux (M).
- P. hybrida* Gd. 3s vallée de l'Hongrin (J).
- Festuca heterophylla* Lam. sur l'église de Montreux (M).
- F. pratensis* Huds. stat. sup. : Plan de la Dix 1850 m, Pré d'Aveneire 1895 m, Lioson d'Argnauaz 1930 m, entre le lac d'Ai et Chaux de Mont 1950 m et plus.
- F. gigantea* Vill. ne manque pas à la plaine c. dans les aunaies bords des Monneresses d'Aigle; 2r : c. Chesière, Villars, Leysin, Boveau, Sépey, Ormont-

dessus, vallée de l'Eau froide et de la Tinière, les Avants. — 3s : vallée de l'Hongrin.

B. asper Leysin, Aigle, Corbeyrier, Sépey, Ormont-dessus.

B. sterilis L. Leysin au Feydey 1400^m.

B. tectorum L. Leysin, chemin de fer Montreux-Clarens.

B. arvensis L. Sépey, Leysin, Feydey 1400^m.

B. commutatus Schrad., Sépey, Leysin, Feydey, près des chalets de Mayen 1850^m.

Brachypodium pinnatum R. Br. c. jusqu'à 1700^m et plus.

v. *rupestre* Aigle, Bex.

B. sylvaticum R. S. cc. taillis de la plaine ; ac. montagnes — 1600^m.

Agropyrum caninum Schrd. 2r : non R. mais c. montagnes d'Ollon, Sépey, Leysin, Veyge, Corbeyrier ; Montreux (M) : — 3s : vallée de l'Hongrin.

A. repens Beauv. Pontis, Corbeyrier ; Montreux. (M).

A. glaucum R. S. le Flot de Crettaz 1270^m.

Elymus europæus L. 2r : ac. des Iles à Creux-de-Champ, Sépey, Crettaz, Leysin, vallée de l'Eau froide. c. au Cubli ; — 3s : vallée de l'Hongrin.

Lolium perenne L. Feydey 1450^m, l'Ortier de Folliaux 1600^m.

Lolium italicum A. B. Yvorne ; Montreux, Chailly (M).

Juniperus nana Wld. chaîne d'Aï ; arête de Malatrait-Montérel, Naye (M).

Selaginella spinulosa A. Br. 2r : Aï, Badausaz — 3s : Mont d'Or, Aveneire, Pointe à l'Aiguille, Naye.

Equisetum hiemale L. forêt de la Joux verte ; Tuffière sur Montreux (M).

E. variegatum Schb. 3s : bords de l'Hongrin entre la Scie et le Tabouset.

E. sylvaticum L. col de Jaman, les Prévondes (M).

Botrychium Lunaria Sw. ac. Chaînes d'Aï et du Mont d'Or, Montérel.

Polypodium vulgare L. v. *cambricum* Chillon. E. Burnat sec Christ in litt.

Pteris aquilina L. à la plaine au pied d'Arvel.

Blechnum Spicant Roth. 3s : bois des Charmilles et de Charbonnière.

Scolopendrium vulgare Syms. Col des Essets vers 1900^m.

Ceterach officinarum Willd. Belmont, Chailly (M).

Phegopteris Polypodioides Fée., 3s : la Praisaz, Sierne Raynaud.

P. Robertianum A. Br., vallon de la Tinière (M).

Aspidium Thelypteris Sw, le Golliez sur Aigle.

A. montanum Asch. sur Villard, en Soud.

Les travaux de M. F. Jaquet, publiés dans les Mém. Soc. Frib. Sc. nat. Botanique vol. I, mentionnent encore de nombreuses stations intéressant le bassin sarinien de la flore vaudoise. Citons seulement : *Geranium lucidum* L. entre Hautaudon et Bonaudon, *Taraxacum nigricans* Rchb. au Plan des Eaux, *Potentilla Nestleriana* Tratt. pâturage de Commune, vallée de l'Hongrin. *Sempervivum arachnoideum* L. arête entre la Dent de l'Écrit et la Dent de Paray. *Sedum atratum* L. même station ; *Sedum micranthum* Bast. Dent de Ruth ; *Salix grandifolia-incana* = *S. subalpina*, entre Montbovon et la Tine; enfin la chaîne frontière, de la Dent de Savigny à Naye — surtout les Dents de Paray ou de l'Écrit — renferme de nombreuses variétés d'Alchimilles, voir le vol. cité, Fasc. V.

H. JACCARD.

Aigle, mars 1905