

Guía de identificación de aves en el Parque Nacional Naciones Unidas



Compilador y editor:
Cristina Chaluleu, FDN

FUNDACIÓN DEFENSORES
DE LA NATURALEZA

PARQUE NACIONAL
NACIONES UNIDAS

Guatemala, octubre de
2018

I. Descripción del Parque Nacional Naciones Unidas

El Parque Nacional Naciones Unidas (PNNU) fue declarado “Parque Nacional” con base en Acuerdo Presidencial del 26 de Mayo de 1955, es uno de los cinco Parques Nacionales más antiguos del país. En 1997 la entidad **Defensores de la Naturaleza** asumió la administración de dicho parque, un espacio de 373 hectáreas.

El lugar posee diversas **exhibiciones culturales**, así como un ambiente natural destinado a la recreación y convivencia familiar. A partir del año 2018, se está trabajando en la actualización de datos de flora y fauna dentro del parque.

Alrededor de 25 especies de árboles nativos de la región, han sido reportados en el Parque. Entre éstas, se encuentran aquellas especies brotonas como: pito (*Erythrina berteorana*); jocote (*Spondias purpurea*); copalillo (*Bursera bipinnata*) y Amate (*Ficus* sp). Así mismo, se ha identificado una especie naturalizada, la cual lo representa el piñón (*Jathropa jurcas*). Además de la vegetación, se han reportado alrededor de 36 de anfibios y reptiles, 11 de mamíferos y 112 de aves (FDN, 2018 - sin publicar).



Características generales del PNNU:




La zona de vida está basado en el sistema de clasificación de Holdridge, siendo Bosque Húmedo Tropical Templado, sin embargo se han perdido las características de este bosque, ya que la flora y la fauna nativas han desaparecido (De la Cruz, J. R. 1982). La topografía presenta diferentes niveles de pendientes desde moderadamente onduladas y planas hasta muy fuertes (100%). La elevación promedio es de 1,500 metros sobre el nivel del mar (desde 1100 a 1500 msnm). Entre la Plaza Guatemala y El Filón, fue construido un mirador siguiendo la cota más elevada de éste último, lo que permite apreciar panorámicamente la escena que principia en el contorno del lago de Amatitlán; hacia el Sur el volcán de Pacaya y el cerro Chino; hacia el Oeste el volcán de Agua que completa el flanco Sur-Este de la conformación geológica de la Caldera de Amatitlán (FDN, 2006 - 2010). Las lluvias se extienden tradicionalmente entre los meses de mayo a noviembre. La precipitación oscila entre 1,100 a 1,349 mm anuales. La temperatura promedio varía entre 20 a 26 grados centígrados (FDN, 2006 - 2010).



El parque resalta especialmente por los hermosos paisajes que se pueden observar desde allí: Volcán Pacaya, el de Agua y el Lago de Amatitlán. También están a la disposición de los turistas agradables **miradores** desde donde pueden descansar a disfrutar el ambiente. Realmente se caracteriza por ser una de las pocas **áreas verdes en la zona metropolitana**.



II. Especies de aves registradas dentro del Parque Nacional Naciones Unidas





A continuación, se describen 112 especies de aves que están presentes en el Parque



<p>1.</p>	<p>Familia: Cathartidae Especie: <i>Coragyps atratus</i> Nombre común: Zopilote Común Nombre en inglés: Black Vulture Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Áreas relativamente abiertas que le proveen bosques aislados y tierras con arbustos. Descripción: Tiene una envergadura de alas de 1.60 m y plumaje negro, cuello y cabeza grises y sin plumas, un pico corto y en forma de gancho. Es carroñero (se alimenta de materia en descomposición). Tiene vista y olfato agudo.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Coragyps_atratus#/media/File:Coragyps-atratus-001.jpg</p>
<p>2.</p>	<p>Familia: Cathartidae Especie: <i>Cathartes aura</i> Nombre común: Aura Común Nombre en inglés: Turkey Vulture Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Habita una variedad de zonas abiertas y semiabiertas, incluyendo bosques subtropicales, matorrales, pastizales y desiertos. Arboledas, pueblos, campo semiabierto. Descripción: Es un ave grande, con una envergadura de 170-183 cm, una longitud de 64-81 cm y un peso que puede variar entre 0.85 y 2.26 kg. Su plumaje es marrón oscuro hasta negro; la cabeza y el cuello no tienen plumas y son de color púrpura-rojo. Su pico es corto, ganchudo, y de color marfil. Se alimenta casi exclusivamente de carroña. Localiza los cadáveres con su aguda visión y su sentido del olfato, volando a una altura suficientemente baja para detectar los gases producidos por los inicios del proceso de descomposición de los animales muertos.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Cathartes_aura#/media/File:Urubu_a_tete_rouge_-_Turkey_Vulture.jpg</p>




<p>3.</p>	<p>Familia: Accipitridae Especie: <i>Buteo nitidus</i> Nombre común: Gavilán Gris Nombre en inglés: Gray Hawk Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques con árboles dispersos y bosques ribereños, algunas veces en regiones semiáridas. También en los amplios trechos de los bosques tropicales poco densos, xerofíticos o deciduos. Descripción: Es pequeño y compacto, de color gris con manto finamente rayado, rabadilla blanca, ojos marrones oscuros, y cera (membrana que rodea la base del pico) y patas amarillas.</p>	 <p>© Larry Thompson http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=L_LHT11961&res=640&mobile=1</p>
<p>4.</p>	<p>Familia: Accipitridae Especie: <i>Rupornis magnirostris</i> Nombre común: Gavilán del Camino Nombre en inglés: Roadside Hawk Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Habita en sabanas, montes y bosques. Descripción: Mide aproximadamente 35 cm y pesa alrededor de 295 g. Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos y pequeños reptiles.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Buteo_magnirostris#/media/File:Buteo_magnirostris_-_Goias_-_Brazil-8.jpg</p>
<p>5.</p>	<p>Familia: Accipitridae Especie: <i>Buteo jamaicensis</i> Nombre común: Gavilán de Cola Roja Nombre en inglés: Red-tailed Hawk Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Desiertos, tierras dedicadas a la agricultura, bosques, hasta bosques tropicales lluviosos e incluso en zonas urbanas. Descripción: Grande de alas anchas y cola redondeada. Tiene un color rojizo en la parte superior de la cola. El adulto es de color café en la parte dorsal, con la corona y la nuca barradas en color ámbar-café claro y blanco, la parte baja de la espalda también está barrada con estos colores. Las alas presentan barras de color café oscuro, la cola es ámbar-café oscuro con una banda delgada negra subterminal y con las puntas blancas. La cara es ámbar-café claro, densamente rayada en café. La barbilla y toda la parte ventral son de color blanco o arena claro con parches a los lados del cuello, manchas en el abdomen y un</p>	 <p>De Photo (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man) - Fotografía propia, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1937523</p>




	barrado fino de color canela-café en los muslos. El pico es azul-negro, los ojos son cafés, las patas son amarillas y las garras son negras.	
6.	<p>Familia: Accipitridae Especie: <i>Elanus leucurus</i> Nombre común: Milano coliblanco Nombre en inglés: White-tailed Kite Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Vuela sobre el matorral de las tierras bajas o de los pastizales. Prefiere las zonas abiertas, y suele verse en zonas urbanas. Descripción: Su coloración es parecida a la de una gaviota, pero su forma y vuelo son los de un halcón, con la cola redondeada. Su plumaje es gris en el dorso y blanco en el vientre, con los hombros y la punta de las alas negras. El juvenil es blancuzco, manchado de pardo canela, y balancea la cola. Tiene una longitud total de 35 a 40 cm. Las hembras, que son más grandes, alcanzan un peso de unos 300 gramos. Para buscar su presa es capaz de quedar suspendido en el aire batiendo las alas.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Elanus_leucurus#/media/File:Elanus_leucurus_(Aguililla_blanca_-_Gavil%C3%A1n_maromero)_(24907842044).jpg</p>
7.	<p>Familia: Falconidae Especie: <i>Falco sparverius</i> Nombre común: Cernícalo Americano Nombre en inglés: American Kestrel Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Campos abiertos, tierras de cultivo, ciudades y bordes de los bosques, bosques talados hasta tierras de cultivo y desiertos, siempre que encuentre la presa adecuada y lugares elevados para posarse. Descripción: Mide de 23 a 27 cm de largo, pesando entre 85 y 140 g. Presentan dimorfismo sexual evidente, incluso en el plumaje juvenil. Los machos son de menor tamaño que las hembras. En su plumaje adulto tienen las cobertoras de las alas de un color grisáceo claro con puntos negros, y las primarias negras con puntos blancos. La cola es rojiza con una franja negra en el extremo seguida por puntas blancas. La hembra es de mayor tamaño que los machos, en su plumaje adulto tiene tanto las cobertoras del ala como la cola de un tono rojizo barrado en negro.</p>	 <p>De Jorge.schlemmer - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33651581</p>



8.	<p>Familia: Strigidae Especie: <i>Megascops trichopsis</i> Nombre común: Tecolote bigotudo Nombre en inglés: Whiskered screech-owl Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Su hábitat incluye bosques densos de coníferas o roble y cafetales. Descripción: La cabeza es redonda con mechones, ojos amarillos y un pico amarillento. El color del plumaje de los adultos ocurre en dos variaciones: un plumaje en que predomina el gris, o el marrón o marrón oscuro.</p>	 <p>(c) Rolando Chavez,</p>
9.	<p>Familia: Picidae Especie: <i>Colaptes auratus</i> Nombre común: Carpintero escapulario Nombre en inglés: Northern flicker Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: habita en tierras bajas y bosques tropicales, bosques deciduos, manglares, matorrales espinosos, bosques riparios, bosques de galería, vegetación secundaria, bordes de bosque, plantaciones de café, y áreas semi-urbanas. Descripción: Mide de 15 a 19 cm, los machos pesan de 46 a 78 y las hembras de 64 a 90 g. Presenta disco facial pequeño de color café o rufo con moteado blancuzco y línea superciliar blanca. Su coronilla, nuca y partes superiores son de color café grisáceo a rufo y en la coronilla y la nuca presenta manchas blanco ante. También presenta un par de manchas redondas de color negro bordeadas de blanco y 5 a 8 barras en la cola de color blanquecino. Sus partes inferiores son blancas ampliamente estriadas de rufo o café, especialmente en los lados y flancos. Esta especie presenta varios morfos. El morfo café grisáceo presenta partes superiores cafés con moteado canela y las cobertoras supracaudales rufo canela con 7 a 8 bandas, no tiene barras en la cola. Los jóvenes son similares a los adultos pero más oscuros y con la nuca y la coronilla más grisácea. Los puntos negros en el dorso son difusos o están ausentes y el estriado de las partes inferiores es menos marcado.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Glaucidium_brasilianum#/media/File:Cactus_Ferruginous_Pygmy-owl.jpg</p>



10.	<p>Familia: Strigidae Especie: <i>Bubo virginianus</i> Nombre común: Búho gigante Nombre en inglés: Great Horned Owl Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques, arboledas, orillas de arroyos y campos abiertos. Descripción: Tiene constitución pesada, con un cuerpo en forma de barril, una cabeza grande y alas anchas. Los búhos grandes adultos tienen una longitud de 43 a 64 cm, con una media de 55 cm y tienen una envergadura de 91 a 153 cm. Con un promedio de 122 cm. Las hembras son algo mayores que los machos. El peso corporal medio es de 1.608 g para las hembras y 1.224 g para los machos. Dependiendo de las subespecies, el peso máximo puede alcanzar 2.503 g</p>	 <p>Topa Dndavis https://ru.depositphotos.com/10499447/stock-photo-great-horned-owl.html</p>
11.	<p>Familia: Columbidae Especie: <i>Columba livia</i> Nombre común: Paloma Doméstica Nombre en inglés: Rock Pigeon Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Parcelas con árboles, pueblos, campo semiabierto. Descripción: Su coloración varía enormemente, desde blanca a multicolor. Tamaño: Largo 29-35 cm, envergadura alar 60-68 cm, peso 315-410 g.</p>	 <p>https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36668510</p>
12.	<p>Familia: Columbidae Especie: <i>Columbina inca</i> Nombre común: Tórtola colilarga Nombre en inglés: Inca Dove Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Su hábitat consiste de matorrales y bosque degradado aunque también puede ser visto en ciudades Descripción: El color del plumaje es castaño claro con los bordes de las plumas siendo más oscuros, dando la impresión de conchas o escamas. De longitud mide de 16 a 17 cm.</p>	 <p>C Greg Lasley http://greglasley.com/content/BirdsofNorthAmerica/IncaDove.php</p>
13.	<p>Familia: Columbidae Especie: <i>Columbina passerina</i> Nombre común: Tórtola Común Nombre en inglés: Common Ground-Dove Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Habita espacios abiertos y montes. Descripción: Son pequeños, de no más de 17 cm de largo; su peso es normalmente de 32 g. Los adultos</p>	 <p>www.naturespicsonline.com - http://www.naturespicsonline.com/,</p>




	tienen el plumaje del lomo de color gris marrón, con pintas negras. Tienen una apariencia escamada del pecho a la cabeza. La cola es marrón por el centro, con bandas negras en los lados y puntas blancas. El pico es naranja tiznado de negro. En vuelo, sus alas muestran, por debajo, una coloración castaña.	Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3510836
14.	<p>Familia: Columbidae Especie: <i>Zenaida asiatica</i> Nombre común: Paloma Aliblanca Nombre en inglés: White-winged Dove Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Matorrales, bosques, y desiertos. Se encuentran frecuentemente en áreas pobladas. Descripción: La tórtola aliblanca mide hasta 30 cm de longitud. Es marrón grisácea con una raya blanca en el borde de cada ala. Durante el vuelo, estas rayas se muestran como crecientes brillantes. Tiene un anillo de piel azul que rodea cada ojo y una mancha negra en la parte inferior de la cara. Los ojos y las patas son rojos.</p>	 <p>SearchNet Media - White-Winged Doves Uploaded by Snowmanradio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7339700</p>
15.	<p>Familia: Columbidae Especie: <i>Leptotila verreauxi</i> Nombre común: Paloma Arroyera Nombre en inglés: White-tipped Dove Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Áreas abiertas con cobertura arbustiva, bordes de bosque enmarañados, matorrales y plantaciones en áreas secas a relativamente húmedas. Descripción: Mide de 23.5 a 29.5 cm. Pesa de 96 a 157 g. Tiene iris amarillo a naranja rojizo, piel orbital desnuda que puede ser azul cobalto a azul verdoso, su pico es negro y tiene patas rojizas. Presenta frente blanca con lavado rosa o rosa verdoso, el cual se torna café púrpura iridiscente o gris en la coronilla. Su nuca y occipucio son parduscos con iridiscencia púrpura o bronce, tiene partes superiores café oliva con tinte grisáceo, coberteras alares internas rufo canela, rectrices centrales café grisáceas y las externas negras con amplias puntas blancas. Tiene garganta blanca, rostro, pecho y lados del cuello rosa grisáceo pálido, el cual se torna blanco en el vientre y coberteras infracaudales. La hembra es un poco más opaca y menos vinácea.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Leptotila_verreauxi#/media/File:Leptotila_verreauxi_near_Rancho_Naturalista,_Cordillera_de_Talamanca,_Costa_Rica-8.jpg</p>




16.	<p>Familia: Cuculidae Especie: <i>Piaya cayana</i> Nombre común: Cucu Ardilla, Cuco, Piscoy Nombre en inglés: Squirrel Cuckoo Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques secos, bosques húmedos, bosques de galería, manglares, bosques inundables, bosques en crecimiento secundario avanzado, pastizales con árboles dispersos, plantaciones de café y cerca de cursos de agua en zonas secas. Descripción: Mide entre 43 y 46 cm de longitud y pesa entre 95 y 105 g. El plumaje es de color castaño en el dorso y la cabeza, más pálido en la garganta. El pecho es gris y el vientre negruzco. La parte central de la cola es rojiza y el resto negra con manchas blancas. El pico es amarillo y el iris rojo.</p>	 <p>https://www.picfair.com/pics/02241680-eekhoornkoekoek-squirrel-cuckoo-piaya-cayana</p>
17.	<p>Familia: Cuculidae Especie: <i>Crotophaga sulcirostris</i> Nombre común: Pijuy Nombre en inglés: Groove-billed Ani Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: En áreas abiertas o semiabiertas, como ecotonos, pastizales, sabanas, huertos y campos de cultivo. Descripción: Completamente negra, parecida a un cuclillo, con el pico grande, curvo, alto surcado de estrías longitudinales. Mide de 30.5 a 34.5 cm. Machos y hembras son similares. Tiene una larga cola, pero las alas son cortas y redondeadas, por lo que no es un buen volador; su vuelo es débil y consiste en planeos y aleteos alternados, suelen saltar por el suelo, con frecuencia cerca del ganado. Como los demás miembros de su familia, entre los que se encuentran los cuclillos y correcaminos, tiene en las patas dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/04/crotophaga-sulcirostris-pijuyo.html</p>
18.	<p>Familia: Cuculidae Especie: <i>Geococcyx velox</i> Nombre común: Correcamino Tropical o Correcaminos Nombre en inglés: Lesser Roadrunner Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Matorrales. Descripción: Su plumaje es de color castaño claro o grisáceo con negro, lo que le provee un camuflaje adecuado para su ambiente. Tiene largas patas, que le permiten alcanzar altas velocidades. Su larga cola le sirve de timón al correr y le permite hacer giros rápidos.</p>	 <p>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Lesser_Roadrunner_-_Mexico_S4E1497.jpg</p>




19.	<p>Familia: Apodidae Especie: <i>Streptoprocne zonaris</i> Nombre común: Vencejo Nombre en inglés: White-collared Swift Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque tropical y subtropical, zonas rocosas y bosque muy degradado. Descripción: 20-22 cm de largo, y pesa 90-125 g. Tiene una cola ligeramente bifurcada. Los adultos son negros, azul glosado en la parte de atrás, y tienen un collar blanco, más amplio y más apagado en el pecho. Las aves más jóvenes son más apagadas que los adultos, y el collar es reducido o nulo.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Streptoprocne_zonaris,_White-collared_Swift.jpg</p>
20.	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Campylopterus rufus</i> Nombre común: Fandanguero Rojizo Nombre en inglés: Rufous Sabrewing Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques y montanos húmedos subtropicales o tropicales antiguos muy degradados. Descripción: 12.5 y 14 centímetros de altura. Los sexos son relativamente similares por lo que es difícil sexar en el campo. Pico relativamente recto, cola amplia, de forma ligeramente cuadrada a redondeada. El rostro, la garganta y las partes inferiores son de color canela, los auriculares son de tono oscuro y poseen una mancha post ocular de color blanco. La corona y las partes superiores son de color verde a azul-verdoso. Las rectrices internas son de color bronce-verdoso. Las rectrices externas son de color canela pálido y poseen una amplia banda subterminal de color negro.</p>	 <p>De Dominic Sherony - Flickr: Rufous Sabrewing (<i>Campylopterus rufus</i>), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15369177</p>
21.	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Colibri delphinae</i> Nombre común: Chupaflor Verdemar Nombre en inglés: Brown Violet-ear Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: bosques altos entre los 400-1600 m cuando está anidando, se difunde ampliamente en las tierras bajas fuera del periodo de anidación. Se lo puede encontrar típicamente en la hojarasca alta de la selva tropical, crecimiento secundaría de altura media y en cafetales, aunque se alimentan también a niveles inferiores, en los bordes y claros. Descripción: 11.5 cm de largo y pesa de 6.5 a 7 g. Es de color marrón con algo de rojo en la cola y plomo cerca del vientre.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Colibri_delphinae#/media/File:050305_Brown_Violet-ear_crop.jpg</p>





22.	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Hylocharis leucotis</i> Nombre común: Colibrí Oreja Blanca Nombre en inglés: White-eared Hummingbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de montañas, bosques de pino y roble. En México y América Central, se encuentra principalmente en las lindes y áreas despejadas de bosques de coníferas en zonas de montañas más altas, así como en bosques de pino en elevaciones de altura media. En Estados Unidos se lo ha visto con mayor frecuencia en comederos ubicados en cañones, en áreas donde abunda el roble, el pino. Descripción: Tanto los machos como las hembras tienen una mejilla oscura rodeada por una larga franja blanca detrás del ojo, y ambos tienen una cierta cantidad de rojo en el pico. Su llamado metálico también ayuda a identificarlos de especies similares.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Hylocharis_leucotis#/media/File:Hylocharis_leucotis_Arizona.jpg</p>
23.	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Amazilia cyanocephala</i> Nombre común: Colibrí Coroniazul Nombre en inglés: Azure-crowned Hummingbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: En las laderas bajas de los sistemas montañosos, en bosques de encino y pino, bosques secundarios, montes espinosos, en el borde del bosque húmedo subtropical y en sabanas con pino. Descripción: Mide de 10 a 11 cm de longitud. Presenta frente y corona de color turquesa brillante a azul violáceo. Alrededor de los oídos el color va del verde esmeralda al azul verdoso, con una pequeña mancha blanca postocular. La parte final de la espalda, donde nace la cola, es de color marrón oscuro. La garganta y la parte superior del pecho son blancos. La cola es de color verde grisáceo. La parte superior del pico es negruzca y la inferior de rosada a rojiza, con la punta negra.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2016/07/amazilia-cyanocephala.html</p>
24.	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Amazilia beryllina</i> Nombre común: Chupaflor de Berilo Nombre en inglés: Berylline Hummingbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques en un amplio rango de altitud; también se le puede encontrar en jardines y cultivos Descripción: Mide 9 a 10 cm de longitud. El macho presenta la garganta y el pecho de color verde muy brillante; el dorso verde brillante a verde cobrizo o dorado, llegando a ser bronce purpúreo en la grupa; el vientre y bajo la cola, es castaño grisáceo; la cola</p>	




	<p>presentan un color púrpura cobrizo y las alas son predominantemente castañas. El pico mide entre 18.5 y 21 mm, es negro arriba y en la punta y rojizo abajo. La hembra es más opaca y el vientre puede ser grisáceo, blancuzco, rosado o beige.</p>	<p>De <i>Berylline_Hummingbird.jpg</i>: dominic sheronyderivative work: PurpleHz (talk) - <i>Berylline_Hummingbird.jpg</i>, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11349269</p>
<p>25.</p>	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Lampornis viridipallens</i> Nombre común: Chupaflor Montañero Nombre en inglés: Green-throated Mountain-gem Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Selvas de niebla, bosques húmedos de mediana altitud en tierras altas, encino, bordes y zonas de matorral asociadas. También se ha reportado en cafetales. Descripción: Colibrí de 11 a 12 cm de longitud y 5.4 gramos de peso. Macho con un pico delgado y largo, corona verde brillante, línea postocular blanca, auriculares oscuras, garganta blanca con discos iridiscentes verde-azulosos; nuca, lados de la cabeza y espalda de color verde bronceado, rabadilla bronceada. Pecho blanco y resto de las partes inferiores grisáceo, lados y flancos moteados de verde; cola ligeramente bifurcada, sus cobertoras superiores negro azulado, cobertoras inferiores de la cola de color gris opaco, timoneras centrales negras, el resto gris pálido.</p>	 <p>http://www.oiseaux.net/birds/green-throated.mountaingem.html</p>
<p>26.</p>	<p>Familia: Trochilidae Especie: <i>Archilochus colubris</i> Nombre común: Chupaflor Rubí Nombre en inglés: Ruby-throated Hummingbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques deciduos y de pinos, y los bordes forestales, huertos, y jardines. Descripción: Mide 7-9.5 cm de largo, tiene una envergadura de alas de 8-11 cm y pesa 2-6 gramos. Tienen es en el dorso verde metálico. El macho tiene la garganta roja iridiscente (que puede parecer negra al cambiar de ángulo) y en la hembra es blanca. El resto de las partes inferiores es blanco grisáceo. Las alas son casi negras. La cola es corta, en el macho es ahorquillada y en la hembra casi no lo es, y además ésta tiene las tres plumas externas a cada lado con puntas blancas.</p>	 <p>De Steve Maslowski - Cropped from U.S. Fish and Wildlife Service Digital Library System, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48297</p>



27.	<p>Familia: Picidae Especie: <i>Melanerpes formicivorus</i> Nombre común: Carpintero Bellotero ó Arlequín Nombre en inglés: Acorn Woodpecker Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de robles, arboledas, bosques mixtos, cañones de pinos-robles, laderas. Rara vez, lejos de los robles. Más comunes donde crecen numerosas especies de robles. Descripción: Los adultos tienen la cabeza, el dorso, las alas y la cola negra; la frente, la garganta, el vientre y el manto, blancos. Sus ojos son también blancos. Los machos adultos tienen el píleo completamente rojo mientras que las hembras presentan una franja negra entre la frente blanca y el píleo rojo.</p>	 <p>De Steve Ryan from Groveland, CA, USA - Acorn Woodpecker - Day 124, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3144333</p>
28.	<p>Familia: Picidae Especie: <i>Melanerpes aurifrons</i> Nombre común: Carpintero Frente Dorada, Cheje Nombre en inglés: Golden-fronted Woodpecker Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques cercanos a arroyos, arboledas. Se encuentra en la mayoría de los bosques abiertos, especialmente junto a ríos; también alrededor de huertos, en bosques de árboles en campo abierto y áreas urbanas. Descripción: Mide unos 24 cm de longitud y 43 cm de envergadura. El macho es pequeño, cabeza gris crema, coronilla roja, nuca amarillo naranja. Espalda negra con franjas horizontales blancas. Rabadilla blanca. Cola negra. Pecho y abdomen gris. Mancha amarilla en la base del pico, garganta blanco grisáceo. Pico negro. Patas grises. En la hembra está ausente el parche rojo en la coronilla y tiene un tinte amarillento en el abdomen.</p>	 <p>De www.naturespicsonline.com - http://www.naturespicsonline.com/, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1041290</p>
29.	<p>Familia: Picidae Especie: <i>Sphyrapicus varius</i> Nombre común: Trepador Nombre en inglés: Yellow-bellied Sapsucker Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques mixtos o de coníferas. Zonas rurales y urbanas. Descripción: La espalda y las alas son negras con franjas blancas. La cabeza es negra con rayas blancas a los lados. La frente y la coronilla son rojas. El pecho y la parte superior del vientre son amarillentos. El resto del vientre y el anca son blancos, y la cola es negra con una raya blanca por el centro. La garganta de los machos es roja, mientras que la de las hembras es blanca.</p>	 <p>De Patrick Coin (Patrick Coin) - Photograph taken by Patrick Coin, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=731140</p>





30.	<p>Familia: Picidae Especie: <i>Colaptes auratus</i> Nombre común: Carpintero escapulario Nombre en inglés: Northern flicker Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos, parcelas con árboles, arboledas, pueblos, campo semiabierto. Descripción: Coronilla gris seguida de una mancha roja en V en la nuca. El dorso es pardo grisáceo barrado con negro. La cara, alrededor de los ojos y la garganta son pardas claras. En el pecho tienen una mancha negra en media luna a modo de escapulario o babero. El resto del pecho y el vientre son blancos con manchas negras gruesas dispersas. Bajo las alas y la cola son de color amarillo brillante. El pico es negruzco.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/12/colaptes-auratus.html</p>
31.	<p>Familia: Picidae Especie: <i>Piculus rubiginosus</i> Nombre común: Carpintero verdidorado Nombre en inglés: Golden-olive woodpecker Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Su hábitat original es el bosque, cerca de los ríos, pero también se encuentra en árboles dispersos, entre los 750 y 2.400 msnm. Descripción: Color dorado oliváceo por encima, con algunas franjas oscuras en la cola. La corona y la nuca son de color rojo carmesí y la frente es negruzca. El pico es de color negro. Las mejillas son blancuzcas amarillentas. La garganta es rayada de blanco y negro, y el pecho y el vientre de amarillo y negro.</p>	 <p>http://www.flickrriver.com/photos/tags/piculusrubiginosus/interesting/</p>
32.	<p>Familia: Thamnophilidae Especie: <i>Thamnophilus doliatus</i> Nombre común: Batará Barrado Nombre en inglés: Barred Antshrike Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Florestas tropicales y subtropicales húmedas de baja altitud, sabanas secas y cerrados, montes y matorrales húmedos y secos, jardines y áreas urbanas y rurales habitadas y florestas altamente degradadas. Descripción: Mide 16.5 cm y pesa 28 g. Tiene la cresta erizada y ojos amarillos. El macho es negro barrado de blanco por arriba; corona negra, muchas veces con blanco semiculto; nuca y lados de la cabeza más estriados. Por abajo, es blanco barrado de negro. La hembra es canela vivo por arriba con la nuca y lados de la cabeza estriados de blanco sucio y negro; por abajo</p>	 <p>De Dario Sanches from São Paulo, Brazil - CHOCA-BARRADA macho (<i>Thamnophilus doliatus</i>) Uploaded by snowmanradio, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15913988</p>




	es pardo anaranjada.	
33.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Mitrephanes phaeocercus</i> Nombre común: Mosquero moñudo común Nombre en inglés: Tufted flycatcher Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abierto de pinos, pino-encino, encino, o de abeto, (durante el invierno) sobre bordes, u orillas de ríos. Descripción: Este pequeño mosquerito de montaña se puede identificar por los mechones de su cresta y las partes inferiores de color café canela intenso.</p>	 <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Mitrephanes_phaeocercus#mediaviewer/File:Mitrephanes_phaeocercus_-_Costa_Rica-8a.jpg</p>
34.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Contopus pertinax</i> Nombre común: Pibí tengofrío Nombre en inglés: Greater pewee Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Ramas más altas en bosques abiertos de pino, pino-encino y bosque de abetos, y bosques de tierras bajas, los bordes del río. Descripción: Gris uniforme con una cresta corta, mandíbula inferior notablemente anaranjada.</p>	 <p>http://www.nmbirds.org/wp-content/greaterpewee_chihuahua_nmos.jpg</p>
35.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Contopus virens</i> Nombre común: Pibí Verdoso Nombre en inglés: Eastern Wood-Pewee Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de hojas caducas, los bosques mixtos, o los bosques de pinos. Descripción: Mide entre 13.5 y 15 cm. Tiene una ligera cresta color café grisáceo a oliva grisáceo, al igual que los lados de la cabeza, nuca y partes superiores. La cola y las alas son oscuras, estas últimas con las puntas de las cobertoras gris pálido, formando dos barras alares. Por de bajo es blanquecino, su pecho y flancos son teñidos de oliva grisáceo y el abdomen a veces posee un débil lavado amarillento, especialmente en individuos juveniles.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Contopus_virens#/media/File:Eastern_Pewee-Yucat%C3%A1n.jpg</p>



36.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Camptostoma imberbe</i> Nombre común: Papamoscas Nombre en inglés: Northern Beardless-Tyrannulet Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque húmedo tropical y subtropical, sabana, matorrales, humedales y desiertos. Descripción: Mide 10 cm, con una ligera crista eréctil y dos amplias listas alares blanquecinas u ocráceas.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Camptostoma_imberbe#/media/File:Camptostoma_imberbe_1.jpg</p>
37.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Mionectes oleagineus</i> Nombre común: Mosquero Nombre en inglés: Ochre-bellied Flycatcher Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque húmedo, incluso sobre suelos arenosos, y en los bordes del bosque, especialmente a los largo de arroyos. Descripción: Mide 13 cm de longitud y pesa 11 g. La base de la mandíbula es rosada a naranja. Tienen las partes superiores y el pecho de color verde oliva; las mejillas y la garganta oliva grisáceo; el vientre es de color naranja opaco; las alas y la cola son parduzcas con bordes estrechos ocráceos y líneas delgadas ferruginosas.</p>	 <p>De Mike & Chris - Ochre-bellied flycatcher Uploaded by berichard, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15574667</p>
38.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Oncostoma cinereigulare</i> Nombre común: Mosquero Pico Curvo Nombre en inglés: Northern Bentbill Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques subtropicales y tropicales húmedos de baja altitud y crecimientos secundarios. Descripción: Pico corto, ancho y claramente descendente ("doblado"). Esta especie también tiene un iris pálido y una llamada áspera similar a una rana.</p>	 <p>https://jimhully.smugmug.com/BirdImagesOrganizedbyFamily/Tyrant-Flycatcher-Tyrannidae/Northern-Bentbill-Oncostoma/i-w7zSwJS</p>
39.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Sayornis nigricans</i> Nombre común: Mosquero Nombre en inglés: Black Phoebe Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Cerca de los cursos de agua, tales como ríos, canales, lagos, etc. Descripción: Mide 14 cm y a diferencia de otros mosqueros, tiene un plumaje altamente contrastante, con una coloración marrón oscura o negra en la</p>	




	cabeza, el pecho, la espalda, las alas y la cola, y blanca en el vientre y debajo de las alas.	De Mfield, Matthew Field, http://www.photography.mattfield.com - Trabajo propio, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5867684
40.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Tyrannus melancholicus</i> Nombre común: Mosquero Nombre en inglés: Tropical Kingbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Mide aproximadamente 20 cm y pesa alrededor de 40 g. El macho no se diferencia de la hembra con respecto a su plumaje, tiene el abdomen de un color amarillo, el pecho de un color oliváceo el cuello es de un color gris claro, la cabeza es de color gris y el dorso verde grisáceo. Descripción: Común, conspicuo y casi omnipresente en áreas abiertas, rurales y urbanas, menos numeroso en regiones más boscosas.</p>	 <p>De Dario Sanches from São Paulo, Brasil - SUIRIRI (<i>Tyrannus melancholicus</i>), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9064604</p>
41.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Contopus cinereus</i> Nombre común: Pibí Tropical Nombre en inglés: Tropical Pewee Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Está ampliamente diseminado y bastante común en los bordes de selva, bosques secundarios y bosques ralos, clareras, plantaciones y, localmente, hasta en manglares. Descripción: Mide de 13 a 15 cm de longitud y pesa en promedio 12.5 g. La corona es de color castaño oscuro oliváceo y el resto de las partes superiores son de color oliva oscuro grisáceo; la garganta es blanca con matices amarillentos; las mejillas, los lados del cuello, el pecho y los costados son entre marrón grisáceo y oliva grisáceo; el crísum es amarillo claro; las alas son fuscas con dos barras alares blancuzcas y márgenes color ante; la cola es fusca. Las patas son negras. El pico es negro arriba y en la punta y anaranjado abajo.</p>	 <p>Lindolfo Souto https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9sueT2IHdAhXJo1kKHQFpCowQjhx6BAGBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.hbw.com%2Fibc%2Fspecies%2Fsouthern-tropical-pewee-contopus-cinereus&psig=AOvVaw1Gc9fer9x05YdggTYfaP82&ust=153506251507077 7</p>
42.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Pitangus sulphuratus</i> Nombre común: Luis Bienteveo Nombre en inglés: Great Kiskadee Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Ambientes semiabiertos y abiertos, rurales y urbanos. Es menos frecuente en regiones boscosas, donde se encuentra más o menos confinado a las márgenes de lagos y ríos. Descripción: Mide entre 21 y 26 cm de largo. Tiene cabeza grande, alas largas y patas cortas. El pico es tan largo como la cabeza y termina en forma de gancho. El lomo y la cola son de color pardo verdoso. La cabeza</p>	 <p>De Mike & Chris - Great Kiskadee Uploaded by berichard, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15574732</p>




	es negra con dos franjas blancas a modo de cejas y garganta blanca, lo cual le da el aspecto de tener antifaz y boina negros. El pecho y el abdomen son de color amarillo vivo y tiene una corona oculta del mismo color.	
43.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Megarynchus pitangua</i> Nombre común: Chatía, bienteveo Nombre en inglés: Boat-billed flycatcher Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: bordes de los bosques y áreas semiabiertas con árboles de gran tamaño. Se posan en las ramas altas del interior de los grandes árboles. Descripción: Mide 21 a 24 cm de longitud. La corona es negra en el centro bordeado por una banda circular blanca, seguida de una banda ocular negra y la garganta y el cuello blancos. El plumaje del dorso, las alas y la cola es de color marrón, con unas pocas líneas delgadas rufas en las alas; el pecho y el vientre son amarillos. El pico es negro y ancho con el culmen notoriamente convexo, característica esta última que lo distingue de otras especies parecidas y de tamaño similar, como <i>Pitangus sulphuratus</i>.</p>	 <p>De Dario Sanches - originally posted to Flickr as NEINEI (<i>Megarynchus pitangua</i>), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4827802</p>
44.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Myiozetetes similis</i> Nombre común: Luis Gregario Nombre en inglés: Social Flycatcher Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: En plantaciones, en praderas con algunos árboles y en bosques de baja densidad. Descripción: Se parece a <i>Pitangus sulphuratus</i> y a <i>Megarynchus pitangua</i> pero en menor tamaño. El adulto mide 16 y 18 centímetros de largo y pesa entre 24 y 27 gramos. La cabeza es de color gris oscuro, con una línea blanca muy marcada sobre los ojos y un tono anaranjado sobre la cabeza. La espalda es de color marrón olivo, y las alas y la cola son marrones con débiles franjas castaño rojizas. El vientre es amarillo y el cuello, blanco.</p>	 <p>De Mdf - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3527324</p>




45.	<p>Familia: Tyrannidae Especie: <i>Myiarchus tuberculifer</i> Nombre común: Copetón capirotado Nombre en inglés: Dusky-capped flycatcher Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Pasturas con árboles dispersos, de bosques secos a húmedos, espacios abiertos parciales, cercos fronterizos. Descripción: Pequeño, con pico relativamente grande, garganta y pecho grises que contrastan con el vientre amarillo. Más pequeño que el copetón Tirano, más contrastante que el Copetón Cenizo y muestra menos rojo en la cola que cualquiera de ellos.</p>	 <p>http://birds.audubon.org/birds/dusky-capped-flycatcher</p>
46.	<p>Familia: Tityridae Especie: <i>Pachyrhamphus aglaiae</i> Nombre común: Cabezón degollado Nombre en inglés: Rose-throated becard Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de maleza, bordes, espacios abiertos, pasturas descuidadas, bordes boscosos de ríos, construye voluminosos nidos colgantes, de uno a dos pies de diámetro. Descripción: Cabeza de apariencia grande. El macho adulto es gris, con una pequeña mancha rosa en la garganta. La hembra y el juvenil tienen la espalda café, gorra oscura, beige a blanco sucio por debajo.</p>	 <p>http://avesdeelsalvador.blogspot.com/2009/08/mosquero-cabezon-de-garganta-rosada.html</p>
47.	<p>Familia: Vireonidae Especie: <i>Vireo solitarius</i> Nombre común: Vireo anteojillo Nombre en inglés: Solitary vireo, blue-headed Vireo Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de pino o pino-encino, bosque caducifolio, crecimiento secundario. Descripción: "Anteojos" blancos, barras en las alas. Cabeza azul-gris que contrasta con la garganta blanca, espalda verde, flancos amarillos.</p>	 <p>http://www.briansmallphoto.com/blue-headed_vireo.html</p>
48.	<p>Familia: Vireonidae Especie: <i>Cyclarhis gujanensis</i> Nombre común: Juan chiviro, alegrín de cejas rojizas Nombre en inglés: Rufous-browed peppershrike Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque ribereño, bosque húmedo, desmontes parciales, bordes, los pastos con manchones de árboles. Descripción: Es un ave robusta del color de los vireos (las partes inferiores amarillentas, la espalda oliva), pero con el pico más pequeño. Con una línea rojiza cruzando la frente encima de los ojos. Las mejillas y la</p>	 <p>http://ibc.lynxeds.com/photo/rufous-browed-peppershrike-cyclarhis-</p>




	corona son grises, sexos diferentes.	gujanensis/clinging
49.	<p>Familia: Corvidae Especie: <i>Cyanocorax melanocyaneus</i> Nombre común: Chara Centroamericana Nombre en inglés: Bushy-crested Jay Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de montaña húmedos subtropicales o tropicales y los bosques antiguos degradados. Descripción: De 28 a 30 cm. La cola es larga y las plumas centrales están graduadas. Los sexos se parecen; la cabeza, el cuello, el pecho y el manto superior son negros, mientras que las partes superiores restantes son de color azul oscuro con un brillo verde o violeta. Las partes inferiores son de color azul verdoso claro, la parte inferior de las alas es gris y la parte inferior de la cola es negruzca. La cabeza lleva una corona de plumas eréctiles con aspecto de barba, el pico es negro y relativamente pequeño, los ojos son amarillos y las patas negras.</p>	 <p>https://alchetron.com/Bushy-crested-jay</p>
50.	<p>Familia: Hirundinidae Especie: <i>Stelgidopteryx serripennis</i> Nombre común: Golondrina Gorjicafé Nombre en inglés: Northern Rough-winged Swallow Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque, humedales (ríos, arroyos, cascadas, pantanos, ciénagas) y áreas rocosas (acantilados, picos de montañas). Descripción: Adultos de 13-15 cm de largo, marrones arriba con partes inferiores blancas, un pico pequeño y una cola bifurcada. Garganta blanca con un lavado de color gris pardusco, y debajo de la garganta están sus partes inferiores blancas. Las coberteras debajo de la cola de los machos son más largas y anchas que las de las hembras. Los machos también tienen púas enganchadas en la red externa de sus alas primarias externas. Las púas en las hembras son más cortas y rectas que las de los machos. Los juveniles se pueden distinguir de los adultos por sus alas de color marrón rojizo.</p>	 <p>By Dori - Own work, CC BY-SA 3.0 us, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4296668</p>
51.	<p>Familia: Aegithalidae Especie: <i>Psaltriparus minimus</i> Nombre común: Sastrecillo Nombre en inglés: Bushtit Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Áreas boscosas semi abiertas, que a menudo contienen robles y una maleza chaparral sotobosque; también habita en parques y jardines. Descripción: 11 cm de longitud y 5,3 g de peso. Es en</p>	 <p>De Walter Siegmund - Trabajo propio, CC BY 2.5,</p>




	<p>general gris-marrón, con una cabeza grande, cuello corto, cola larga y un pico corto y achaparrado. El macho tiene ojos oscuros y la hembra adulta, amarillos.</p>	<p>https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1825781</p>
<p>52.</p>	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Campylorhynchus zonatus</i> Nombre común: Matraca Tropical Nombre en inglés: Band-backed Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Prefiere las tierras bajas y las laderas de montañas desde el nivel del mar hasta 1700 m de altitud. Habita bosque abierto, matorrales, bosques de segundo crecimiento y jardines de casas. Descripción: Adulto mide 16.5 cm de largo y pesa 29 g. Tiene una corona de color marrón-gris, una nuca de color negro, y el resto de las partes superiores y la cola son fuertemente barreteados de negro, leonado y blanco. El pecho y la garganta son de color blanco manchado de negro y el vientre es de color canela. En las aves juveniles, las partes superiores son más opacos y las partes inferiores son blanquecino o beige.</p>	 <p>De Dominic Sherony - Flickr: Band-backed Wren (<i>Campylorhynchus zonatus</i>), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15369075</p>
<p>53.</p>	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Campylorhynchus rufinucha</i> Nombre común: Matraca Nuquirrufa o Corrochoncho Nombre en inglés: Rufous-naped Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques tropicales típicos de la región, también es visible en urbes cercanas a dichas áreas forestales. Descripción: Mide 17 cm de largo y pesa 36 g. Tiene una corona negra y una banda de ojos separadas por un fuerte supercilio blanco, una nuca rojiza y partes superiores de color marrón canela veteadas de blanco y negro, especialmente en la grupa. Las alas y la cola están cubiertas de negro y blanco grisáceo. Las partes inferiores son blancas. Las aves jóvenes tienen partes dorsales más opacas y partes inferiores de piel.</p>	 <p>By Joseph C Boone - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25251998</p>





54.	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Troglodytes aedon</i> Nombre común: Curruchicha Nombre en inglés: House Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Habita en pastizales, juncales, jardines de las casas, etc. Descripción: 10 cm y pesa alrededor de 12 g, tiene un canto corto y repetitivo en ocasiones y a veces puede llegar hasta ser melodioso. Tanto el macho como la hembra tienen un color arena por la cabeza y costados de las alas, rayas negras y marrones por las alas y la cola, y por el abdomen marrón muy claro. Los ejemplares jóvenes son más oscuros que los adultos.</p>	 <p>De Mike's Birds - House Wren, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30624520</p>
55.	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Cantorchilus modestus</i> Nombre común: Saltapared Sencillo Nombre en inglés: Cabanis's Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: bosque tropical y subtropical. Descripción: 5-14 cm; línea oscura que atraviesa el ojo, ceja y garganta blanca, sin marcas faciales fuertes o rayas prominentes o estrías en las alas.</p>	 <p>https://ebird.org/camerica/news/cantorchilus-modestus-ahora-tres-especies</p>
56.	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Thryomanes bewickii</i> Nombre común: Saltapared Tepetatero Nombre en inglés: Bewick's Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Matorrales, maleza, jardines, arbustos o árboles, en zonas de baja altura, incluso en matorrales de bosques de roble y pino, arboledas que rodean arroyos, chaparrales, erosiones desérticas y áreas suburbanas, áreas arboladas en las lindes de los bosques. Descripción: Línea blanca que se extiende sobre el ojo hasta la parte posterior del cuello y también tiene manchas blancas en la cola. Cuerpo esbelto con una cola larga, vientre gris o blanquecino, y marrón de marrón a marrón grisáceo. La longitud promedio es de 13 cm, pero los machos son ligeramente más grandes que las hembras, con una longitud de ala de 58.2 mm y 55.6 mm respectivamente. Tiene un peso promedio de 10-11 g.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Thryomanes_bewickii#/media/File:Bewicks_Wren.jpg</p>




57.	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Henicorhina leucophrys</i> Nombre común: Saltapared selvático pechigris Nombre en inglés: Gray-breasted Wood-Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Habita un bosque húmedo de montaña; encontrado en una amplia variedad de tipos de bosque, incluyendo pino-encino, matorrales de bambú. En lugares boscosos frecuenta el sotobosque denso y sitios oscuros y enmarañados. Descripción: Ave pequeña de entre 11-12 cm de longitud. Cola muy corta, corona marrón oscuro con cejas blancas muy conspicuas; mejillas negras con estrías blancas; parte superior marrón rojizo con alas y cola con un leve barreteado negro, garganta blanca, pecho gris, flancos y muslos marrón rufo.</p>	 <p>De Cephas - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37671734</p>
58.	<p>Familia: Troglodytidae Especie: <i>Pheugopedius maculipectus</i> Nombre común: Saltapared Pechimanchado Nombre en inglés: Spot-breasted Wren Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque tropical y subtropical, manglares y matorrales. Descripción: 12.5 - 14.0 cm. Ojos de color ámbar. Es delgada, relativamente larga, negruzca por encima, más pálida. Cara con rayas blancas y negras que contrastan con cejas blancas y franjas oscuras a través del ojo. Corona, nuca, espalda, plumas que cubren las alas de color marrón rojizo. Plumas de vuelo de alas barradas oscuras indistinta. Garganta, pecho y vientre blanquecino, manchado de negro; flancos de canela. Cola marrón, barrada negra. Piernas grisáceas. Pico, tarsos y alas relativamente más cortas.</p>	 <p>https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/spbwre1/overview</p>
59.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Sialia sialis</i> Nombre común: Azulejo Nombre en inglés: Eastern blue-bird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Zonas boscosas abiertas, plantaciones y huertos. Descripción: Mide en promedio 18 cm de longitud. El macho adulto es de color azul brillante en la parte superior, alas y cola, mientras que su garganta y pecho son de color castaño rojizo. La hembra adulta tiene alas y cola azul claro, cuello y pecho castaños y corona gris azulada. El vientre de todos los adultos es blanco.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Sialia_sialis#/media/File:Eastern_Bluebird-27527-2.jpg</p>




60.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Catharus aurantiirostris</i> Nombre común: Zorzalito Pico Naranja o Zorzal Nombre en inglés: Orange-billed Nightingale-Thrush Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Matorrales en el bosque caducifolio y el segundo crecimiento, mientras que todas las demás especies residentes en el género se encuentran en las áreas boscosas más húmedas, principalmente en las elevaciones más altas. Descripción: Mide 14 cm de largo, este zorzal ruiseñor tiene un pico de color naranja brillante, anillo para los ojos y patas. Las aves del norte tienen una parte posterior y una gorra marrón, y un pecho y una barriga blanquecinos.</p>	 <p>By Nigel Voaden from UK - Orange-billed Nightingale-Thrush, La Concordia, Mexico, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39770781</p>
61.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Catharus ustulatus</i> Nombre común: Zorzalito de Swainson Nombre en inglés: Swainson's Thrush Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Selva tropical. Descripción: Miden unos 16-18 cm de largo. Su dorso es castaño (más olivado en las subespecies orientales y más rojizo en las del Pacífico), en la parte superior del pecho, en el área auricular y el lorum (espacios entre ojos y pico), tienen manchas castañas sobre pardo amarillento claro, el anillo ocular es notoriamente pardo amarillento claro. Vientre y pecho inferior blancos. La parte inferior de las alas tiene el patrón blanco-oscuro-blanco característico del género. Las piernas son rosadas.</p>	 <p>https://www.hbw.com/ibc/photo/swainsons-thrush-catharus-ustulatus/swainsons-thrush-perched</p>
62.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Myadestes occidentalis</i> Nombre común: Clarín, Mosquero, Guardabarrancos Nombre en inglés: Brown-backed Solitaire Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque tropical y subtropical y humedales. Descripción: 20.5 a 21.5 cm de longitud total y sin dimorfismo sexual. Cabeza y partes ventrales gris a blanquecino, lores más oscuros y anillo ocular incompleto de color blanco. Plumas de las partes dorsales café olivo con las puntas pardas y más oscuro en las alas. Banda clara en la base de las remeras. Rectrices centrales grises, resto de la cola negra y rectrices externas casi blancas, patas de gris a rosado y pico negruzco.</p>	 <p>De Francesco Veronesi from Italy - Brown-backed Solitaire - Mexico_S4E8851, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39953948</p>




63.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Catharus frantzii</i> Nombre común: Zorzal Nombre en inglés: Ruddy-capped Nightingale-Thrush Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque húmedo tropical y subtropical, matorrales, pastizales y humedales. Descripción: Partes inferiores de color gris a blanquecino que contrastan con las partes superiores marrones medianas, con tonos rojizos cálidos en la corona, la nuca y el manto.</p>	 <p>De Don Faulkner - Ruddy-capped Nightingale-Thrush, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48291673</p>
64.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Turdus grayi</i> Nombre común: Zenzontle o Tordo Nombre en inglés: Clay-colored Thrush Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Cultivos de todo tipo, áreas verdes y jardines suburbanos; potreros con árboles aislados Descripción: 23 a 27 cm de longitud y tiene un peso de 74 a 76 g. El plumaje es de color marrón, y más oscuro por encima que por debajo (los especímenes de regiones más húmedas son más oscuros que los demás). Tiene rayas en la garganta. Los ojos son rojos. Los individuos juveniles son manchados.</p>	 <p>De No machine-readable author provided. Factumquintus assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=460144</p>
65.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Turdus rufitorques</i> Nombre común: Zenzontle Mexicano Nombre en inglés: Rufous-collared Robin Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque montano tropical y subtropical y pastizales montanos. Descripción: 23-25.5 cm de longitud. Las plumas cobertoras inferiores rayadas con blanco, iris café oscuro. Machos: con el pico y las patas amarillas a amarillo pálido. Cuerpo negro con el pecho y la parte posterior del cuello castaños. La garganta comúnmente color castaño con rayas negruzcas, abdomen rara vez castaño deslavado. Las hembras tienen la cabeza y las partes superiores grisáceas o café grisáceas con la parte posterior del cuello color canela grisáceo. Garganta oscura rayada con negro, pecho canela-castaño opaco a canela grisáceo. Abdomen y cobertoras inferiores gris oscuro. Patas y pico amarillos.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2016/04/turdus-rufitorques.html</p>




66.	<p>Familia: Turdidae Especie: <i>Turdus infuscatus</i> Nombre común: Zorzal negro Nombre en inglés: Black Thrush Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque húmedo montano tropical y subtropical. Descripción: El macho es todo negro, excepto por el pico y las patas amarillas, y el anillo ocular pálido, las hembras son de color marrón oscuro, y un poco más pálidas marrones por debajo y sobre la cabeza; el pico es oscuro, pero las patas son de color amarillo anaranjado.</p>	 <p>https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/blarob1/overview</p>
67.	<p>Familia: Mimidae Especie: <i>Melanotis hypoleucus</i> Nombre común: Mulato Pechiblanco Nombre en inglés: Blue-and-white Mockingbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Vive en zonas donde abundan los matorrales, zonas templadas y frías de montaña. Descripción: 25 cm de longitud. El plumaje de las partes dorsales es azul grisáceo opaco, mientras que las partes ventrales (garganta, pecho, vientre) son blancas. El ojo es rojo, rodeado por una máscara de plumas negras que se extiende desde la base del pico hasta la base del cuello. El pico es oscuro y ligeramente curvado hacia abajo.</p>	 <p>http://enciclovida.mx/especies/36160-melanotis-hypoleucus (c) Manuel Lemus Kourchenko, all rights reserved</p>
68.	<p>Familia: Ptiliogonatidae Especie: <i>Ptiliogonys cinereus</i> Nombre común: Capulinero Gris o Capulinero Nombre en inglés: Gray Silky-flycatcher Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques de pino-encino. Descripción: 18.5 - 21.0 cm. Ojos de color marrón oscuro; área alrededor del ojo blanca discontinua. Mancha blanca en la frente, arriba de la base del pico. Plumas de vuelo de alas y cola negras. Banda blanca en la base de las plumas de vuelo externas de la cola (la mitad basal de la cola se ve blanca debajo). Macho: cabeza, cresta, nuca, espalda, grupa y plumas que cubren la túnica azul grisácea. La garganta y el tórax son grises; vientre blanquecino. Hembra: Cabeza y cresta grisácea; la nuca, la espalda son de color violáceo oscuro, volviéndose grises sobre plumas que cubren la túnica erecta. Garganta, tórax y flancos opacos vináceos, plumas que cubren el color amarillo de la raíz; vientre blanquecino.</p>	 <p>https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/grsfly1/overview</p>




69.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Oreothlypis superciliosa</i> Nombre común: Chipe de pecho manchado Nombre en inglés: Crescent-chested warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Pino, pino-encino, o bosque de abeto. Descripción: La marca rojiza o castaña en forma de media luna cruzando el pecho amarillo, y la línea superciliar blanca y ancha en la cabeza gris. Algunas veces la media luna se reduce a una mancha sexos parecidos.</p>	 <p>Christopher L. Wood http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/gallery?p_p_spp=565036</p>
70.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Setophaga magnolia</i> Nombre común: Chipe de cola fajeada Nombre en inglés: Magnolia warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos, bordes, márgenes de los ríos arbolados, jardines, huertos, y claros. Descripción: Banda blanca cuadrada a través de las plumas externas de la cola (desde abajo, la cola se ve mitad blanca, mitad negra). Amarillo por debajo, con rayas en los flancos, cabeza gris, pequeño parche amarillo en la rabadilla.</p>	 <p>http://www.lilibirds.com/gallery2/v/warblers/magnolia_warbler/magnolia_warbler_1.jpg.html</p>
71.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Setophaga townsendi</i> Nombre común: Chipe negro-amarillo Nombre en inglés: Townsend's warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Pino, pino-encino, bosque de abetos o, bosques achaparrados. Descripción: Marcado patrón en la cara, con amarillo brillante rodeando las mejillas oscuras. Espalda verde, pecho amarillo, barras blancas en las alas, flancos rayados. La garganta es negra en el macho adulto, principalmente amarilla en la hembra y el juvenil.</p>	 <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Setophaga_townsendi</p>
72.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Setophaga virens</i> Nombre común: Chipe de garganta negra Nombre en inglés: Black-throated green warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques húmedos, bordes, bosques de pino-encino. Descripción: La cara amarilla contrasta con la garganta negra, espalda y corona verde musgo. Las barras blancas en las alas son obvias. La hembra y el juvenil tienen el negro de la garganta reemplazado parcialmente por blanco.</p>	 <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Setophaga_virens</p>




73.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Setophaga graciae</i> Nombre común: Chipe de Grace Nombre en inglés: Grace's warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos de pino, bordes, o de pinos con robles dispersos, en las ramas medias o altas. Descripción: Gris por encima, blanco por debajo, con garganta amarilla y corta ceja amarilla. Delgadas franjas oscuras en los flancos. la hembra y el juvenil se parecen al macho adulto pero son más opacos.</p>	 <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Setophaga_graciae</p>
74.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Setophaga cerulea</i> Nombre común: Chipe cerúleo Nombre en inglés: Cerulean Warbler Estado según UICN: Vulnerable (V) Hábitat: Bosques mixtos de pino-encino. Descripción: Adultos miden entre 11 y 12 cm Hay dimorfismo sexual y cambios con la edad. Macho: tiene la cabeza y las partes dorsales predominantemente azul cerúleo. Los costados del cuello son blancos, las mejillas pueden tener cierto tono grisáceo, y puede haber algún esbozo de línea supraocular blanca. En la espalda hay rayas negras. En alas y cola hay plumas negras en las partes distales. En cada ala hay dos rayas blancas, y en la cola también hay algunas manchas blancas. Las partes ventrales son predominantemente blancas, pero en el pecho hay un collar azul oscuro que puede o no cerrarse, y en los costados se presentan rayas azules o negras. Las hembras tienen la cabeza y las partes dorsales de color verde azulado. El supercilio es blanco. Las partes ventrales con amarillo limón con algunas manchas oscuras a los costados.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Setophaga_cerulea#/media/File:Dendroica-cerulea-002.jpg</p>
75.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Mniotilta varia</i> Nombre común: Chipe rayado Nombre en inglés: Black-and-white warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Húmedo y bosque semihúmedo, bosque de pino-encino, bordes, espacios abiertos parciales. Descripción: Franjas marcadas, incluyendo una franja blanca central en la corona, franjas negras en la espalda y los flancos. El macho adulto tiene la garganta y mejillas negras, la hembra y el juvenil son pálidos o blancos en esa parte.</p>	 <p>http://www.gschneiderphoto.com/gallery3/birds/warblers/black-and-white-warbler/black-and-white-warbler-male-perched_5963</p>




76.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Parkesia motacilla</i> Nombre común: Chipe Arroyero Nombre en inglés: Louisiana Waterthrush Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Arroyos, barrancos y pantanos arbolados. En las zonas del sur, nidifica en tierras bajas, bordes de lagunas y pantanos, o cerca de arroyos lentos o rápidos. Descripción: 14 a 17 cm, extensión alar de 23 a 25.4 cm y un peso promedio entre 16.2 a 20.6 g. En la cabeza, la corona es de color marrón con una ceja blanca. Su pico es puntiagudo y oscuro. La garganta está ligeramente rayada de blanco y negro con un rayado más pronunciado en el pecho y costados, tiene la parte inferior de la cola y los costados de gamuza, y patas color rosa brillante. Su dorso es uniformemente marrón. Ambos sexos son morfológicamente similares. Las aves jóvenes tienen gamuza en lugar de una base blanca.</p>	 <p>© Nigel Voaden https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/louwat/overview</p>
77.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Geothlypis tolmiei</i> Nombre común: Chipe de Tolmie Nombre en inglés: MacGillivray's Warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques húmedos de coníferas y bosques mixtos de clima templado húmedo, pero contrario a las otras especies de su género, también habita en áreas semiáridas, tales como matorrales y chaparrales. Descripción: 12 a 13 cm. Macho: cabeza y pecho grises, con un anillo ocular blanco interrumpido por adelante y por detrás. Los lores son negros. Hay machas negras en la garganta y el pecho. Las partes dorsales, desde la nuca hasta la cola, son de color pardo oliváceo. El resto de las partes ventrales (parte inferior del pecho, vientre y cobertoras inferiores de la cola) son amarillas, con algo de oliva en los costados. La hembra es similar al macho, pero con la cabeza y el pecho más pálidos, y la garganta blancuzca.</p>	 <p>https://www.flickr.com/photos/billbouton/16981521652</p>
78.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Cardellina pusilla</i> Nombre común: Chipe de coronilla negra Nombre en inglés: Wilson's warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque húmedo, bosque de maleza, espacios abiertos parciales, bordes, jardines frondosos. Descripción: Completamente amarillo o amarillo-verdoso, sin blanco en la cola o alas. La redonda gorra negra del macho (y de algunas hembras) es diagnóstica. El color general varía de dorado brillante</p>	




	en la costa del Pacífico a amarillo verdoso opaco en el este.	http://en.wikipedia.org/wiki/Wilson's_warbler#mediaviewer/File:Wilsonia_pusilla.jpg
79.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Myioborus miniatus</i> Nombre común: Candelita plumiza Nombre en inglés: Slate-throated Redstart Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques húmedos de montaña, bosques mixtos de pino-encino Descripción: Partes superiores son de color gris oscuro con el píleo castaño rojizo. Cola con forma de abanico y es negruzca con los laterales y la base inferior blancos. El color de sus partes inferiores son rojas.</p>	 <p>https://es.wikipedia.org/wiki/Myioborus_miniatus#/media/File:Myioborus_miniatus.jpg</p>
80.	<p>Familia: Parulidae Especie: <i>Basileuterus rufifrons</i> Nombre común: Chipe gorrirrufo Nombre en inglés: Rufous-capped Warbler Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque subtropical y tropical, matorrales y pastizales, montes en crecimiento secundario y cafetales. Descripción: Mide 13 cm. Es de color gris oliva por encima con las partes bajas de color amarillo. Su cabeza presenta coronilla y auriculares color rufo, las cuales se encuentran separadas por una línea superciliar blanca. También presenta bridas negras bordeadas en la parte baja por el área malar blanquecina. Los machos son sólo ligeramente diferente de las hembras adultas y sus colores son muy similares a los de las aves jóvenes.</p>	 <p>De Seabamirum on Flickr - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6902526</p>
81.	<p>Familia: Cardinalidae Especie: <i>Piranga rubra</i> Nombre común: Quitrique colorado Nombre en inglés: Summer tanager Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque húmedo, bosque de pino-encino, bordes, jardines, huertos, en ramas de mediana o gran altura. Descripción: El macho adulto es rojo rosado brillante todo el año. Los machos jóvenes pueden tener parches amarillos y rojos. La hembra es amarilla, menos verdosa que la hembra de la escarlata, el pálido pico largo, alas sencillas.</p>	 <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Piranga_rubra</p>

		 <p data-bbox="1057 457 1446 478">http://www.hlasek.com/piranga_rubra.html</p>
82.	<p data-bbox="250 527 509 554">Familia: Cardinalidae</p> <p data-bbox="250 562 597 590">Especie: <i>Piranga ludoviciana</i></p> <p data-bbox="250 598 683 625">Nombre común: Piranga Occidental</p> <p data-bbox="250 634 688 661">Nombre en inglés: Western Tanager</p> <p data-bbox="250 669 792 697">Estado según UICN: Preocupación menor (LC)</p> <p data-bbox="250 705 824 732">Hábitat: Bosques de coníferas y bosques mixtos.</p> <p data-bbox="250 741 906 982">Descripción: 15 a 19 cm de longitud. El macho es de cabeza roja, tornándose amarillento en la parte posterior de la misma. La nuca, el pecho, el vientre y la rabadilla son amarillos. La espalda, la cola y las alas son negras, pero estas últimas presentan dos rayas blancas con amarillo. El pico es amarillento muy claro y las patas negras.</p>	 <p data-bbox="992 919 1516 995">De http://www.naturespicsonline.com/ - http://www.naturespicsonline.com/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=973994</p>
83.	<p data-bbox="250 1043 483 1071">Familia: Thraupidae</p> <p data-bbox="250 1079 578 1106">Especie: <i>Thraupis episcopus</i></p> <p data-bbox="250 1115 656 1142">Nombre común: Tangara Azul Gris</p> <p data-bbox="250 1150 688 1178">Nombre en inglés: Blue-gray Tanager</p> <p data-bbox="250 1186 786 1213">Estado según UICN: Preocupación menor (LC)</p> <p data-bbox="250 1222 906 1318">Hábitat: Bosques abiertos, áreas cultivadas, jardines y zonas urbanas, principalmente tierras bajas de clima tropical.</p> <p data-bbox="250 1327 906 1568">Descripción: 18 cm de longitud y pesa 35 g. Los adultos tienen la cabeza y las partes inferiores del cuerpo color gris azulado claro, las partes dorsales son azules oscuras, con verde azul brillante en las alas y la cola, y los hombros con diferentes matices de azul. El pico es corto y grueso. Los dos sexos son similares, pero los inmaduros son de plumaje de color más deslavado.</p>	 <p data-bbox="927 1495 1581 1570">De The Lilac Breasted Roller from Sullivan's Island, United States - Blue-grey Tanager (<i>Thraupis episcopus</i>), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=346788</p>



84.	<p>Familia: Thraupidae Especie: <i>Thraupis abbas</i> Nombre común: Tangara Aliamarila Nombre en inglés: Yellow-winged Tanager Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques tropicales húmedos. Es también visitante de jardines, huertos y campos de cultivo. Descripción: 15 y 17 cm de longitud. No hay gran dimorfismo sexual. Son de cabeza y cuello color morado pálido, cuerpo oliváceo opaco, con manchas oscuras y azules en la espalda. Las alas y la cola son negruzcas, y en las alas hay manchas amarillas brillantes. El pico y las patas son negros. Los juveniles no tienen tonos azules ni morados, sino son de color verde olivo.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/05/thraupis-abbas-azulejo-o-tangara.html</p>
85.	<p>Familia: Emberizidae Especie: <i>Melospiza biarcuata</i> Nombre común: Rascador patillado Nombre en inglés: White-faced Ground-Sparrow Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Áreas ricas en pastos y arbustos, tales como bosques semiabiertos, plantaciones de café, setos y jardines. Descripción: 15 cm en la edad adulta y pesa 28 g. El pico es grueso y de color gris oscuro. Las partes dorsales del cuerpo son color pardo oliváceo, sin rayas. El patrón de la cabeza es diagnóstico en esta especie: tiene una gorra rojiza que se extiende desde la parte superior de la frente hasta la nuca, y un parche auricular negro que se extiende desde la nuca por debajo de la mejilla. Salvo la frente, que es negra, el resto de la cara es blanca, incluyendo cuello y garganta. El resto de las partes ventrales es fundamentalmente blanco, con algunas rayas pardas, y las plumas cobertoras inferiores de la cola son de color canela.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2016/02/melospiza-biarcuata.html</p>
86.	<p>Familia: Passerellidae Especie: <i>Pipilo maculatus</i> Nombre común: Rascador Común Nombre en inglés: Spotted Towhee Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque templado, bosque húmedo montano subtropical y tropical y matorrales. Descripción: Luce una capucha y espalda negra, con los flancos marrón oscura. Las alas tienen manchas blancas. El ojo es marrón.</p>	 <p>De http://www.naturespicsonline.com/ - http://www.naturespicsonline.com/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=973805</p>




87.	<p>Familia: Passerellidae Especie: <i>Aimophila rufescens</i> Nombre común: Zacatonero Rojizo Nombre en inglés: Rusty Sparrow Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Partes bajas y medias de montañas, en sabanas, matorrales, bosques de pino y encino con árboles esparcidos, y zonas de crecimiento secundario, siempre con abundancia de arbustos. Descripción: Mide alrededor de 18.5cm y pesa aproximadamente 36g. Posee gorra rufa y bigotera conspicua. Su rabadilla es café, tiene las alas y la cola fuscas con bordes rufos opacos. El anillo ocular es blancuzco opaco, sus mejillas de color gris oliva, los lados del cuello son grisáceos y la garganta es blanca con listas negras.</p>	 <p>https://www.hbw.com/ibc/photo/rusty-sparrow-aimophila-rufescens/low-scrub-near-lodge Chris Chafer</p>
88.	<p>Familia: Passerellidae Especie: <i>Zonotrichia capensis</i> Nombre común: Gorrión Chingolo Nombre en inglés: Rufous-collared Sparrow Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Praderas abiertas y estepas hasta bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos. Descripción: 14 y 15 cm de largo. El pico es corto y recto, de unos 15 mm. Muestra la corona y la cara grises, con una banda negra. La garganta es blanca, con un visible collar en la nuca de color canela o castaño. El vientre y el pecho son pardo claro o blanquecinos, con reflejos más oscuros y los costados grisáceos. El dorso es también pardo, manchado de negro, con las alas y la cola de tono más oscuro. Los juveniles tienen plumaje más uniforme, con jaspeado más oscuro en el pecho. Las patas están bien adaptadas a su hábito arborícola. Muestra tres dedos orientados hacia delante y uno hacia atrás.</p>	 <p>http://cerrito.gob.ar/reservalovera/?p=1805</p>
89.	<p>Familia: Passerellidae Especie: <i>Melospiza leucotis</i> Nombre común: Rascador orejiblanco Nombre en inglés: White-eared Ground-Sparrow Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos, en el sotobosque y en ecotonos. Descripción: 17 cm. Machos y hembras son similares. Los lados de la cabeza y la garganta son negros, y la corona es gris pizarra, que se torna olivácea a medida que se acerca a la nuca. Como características diagnósticas en la cabeza, tienen de color blanco una mancha auricular, un anillo ocular interrumpido, y las plumas de la zona loreal; debido a éstas últimas, que forman unas pequeñas manchas junto a los ojos, el</p>	 <p>De Dominic Sherony - Flickr: White-eared Ground-Sparrow (<i>Melospiza leucotis</i>), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15347482</p>




	<p>ave es también llamada "cuatrojos". La raya ocular, que sube desde los lados del cuello hasta el ojo, es amarilla ocrácea. El pico es negro. Las partes dorsales del cuerpo son café oliváceas; los flancos del pecho grises y el pecho blanco, con una característica mancha negra en el centro. Las partes bajas del vientre y las plumas cobertoras inferiores de la cola son pardas amarillentas. También en las alas hay matices amarillentos.</p>	
90.	<p>Familia: Thraupidae Especie: <i>Saltator coerulescens</i> Nombre común: Saltador Gris Nombre en inglés: Grayish Saltator Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos, planicies y zonas arbustivas. Descripción: 20 cm y pesa unos 52 g. La tonalidad de su plumaje depende de la edad y la subespecie a la que pertenezca, aunque por lo general son pájaros de color gris o verde grisáceo en las partes superiores, el pecho gris, el vientre crema o canela, con una lista superciliar blanca y otra lista vertical blanca en la garganta.</p>	 <p>http://avesdesantacruz.blogspot.com/2012/06/saltator-coerulescens.html</p>
91.	<p>Familia: Thraupidae Especie: <i>Saltator atriceps</i> Nombre común: Saltador Chorcha Nombre en inglés: Black-headed Saltator Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos, planicies y zonas arbustivas. Descripción: 24 cm de largo y pesa 85 g. El adulto tiene una cabeza gris con un supercilio blanquecino. Las partes superiores son de color verde amarillento, las partes inferiores son de color gris pálido, y la garganta es de bordes blancos con negro. El pico convexo grueso es negro y las patas son marrones. Las aves jóvenes son más apagadas y tienen manchas en el pecho y marcas marrones en las partes inferiores.</p>	 <p>By Kathy & sam from Beaverton OR, USA - Black-headed Saltator Uploaded by snowmanradio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18782563</p>
92.	<p>Familia: Cardinalidae Especie: <i>Cyanocompsa parellina</i> Nombre común: Azulejito Nombre en inglés: Blue Bunting Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Sotobosque de bosques tropicales densos, aunque también suele aparecer en claros y descampados. Descripción: Los machos tienen plumaje azul oscuro, brillante en la frente, mejillas y obispillo. Las hembras son de color castaño brillante, de coloración más fuerte en las partes dorsales.</p>	 <p>© Greg Lasley https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/blubun/overview</p>




93.	<p>Familia: Cardinalidae Especie: <i>Passerina caerulea</i> Nombre común: Piquigordo azul Nombre en inglés: Blue Grosbeak Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Vegetación relativamente abierta, bosques de galería, matorrales, pequeños bosques y tierras cultivadas. Descripción: 15 a 19 cm, son aves de pico grueso triangular. Los machos son de color azul oscuro, con las alas negras con dos barras color pardo rojizo; el pico color gris pálido. Las hembras son pardo brillante, más oscuras en las partes dorsales y las alas también con dos franjas rojizas. Los machos inmaduros son pardos con manchas azules.</p>	 <p>http://www.avesdecostarica.com/Passerina-caerulea.html</p>
94.	<p>Familia: Cardinalidae Especie: <i>Passerina cyanea</i> Nombre común: Colorín azul Nombre en inglés: Indigo Bunting Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques poco densos, aprovecha también las plantaciones de árboles exóticos y zonas con arbustos. Se acerca a las zonas urbanas. Descripción: 13 cm de largo. El pico es corto, de forma cónica. El macho con su plumaje de reproducción en primavera y verano es azul índigo. Cuando inverte en los países del sur, es castaño con algunas plumas azules dispersas, más abundantes en la rabadilla. La hembra y el joven son de color castaño en el dorso, por abajo es más claro con el pecho con un rayado ligero y las alas ligeramente barreadas de castaño.</p>	 <p>De Louis Agassiz Fuertes - Birds of New York (New York State Museum. Memoir 12), Albany: University of the State of New York. Plates by Fuertes later reproduced in Birds of America (1917) by Thomas Gilbert Pearson (1873-1943) et al., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=848820</p>
95.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Dives dives</i> Nombre común: Tordo Cantor o Tordo Negro Nombre en inglés: Melodious Blackbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Hábitats tropicales, y prefiere las áreas abiertas, así como campos de cultivo y poblados humanos. Descripción: 25 cm del pico a la cola. Los machos son completamente negros, incluyendo los ojos, el pico y las patas, y ligeramente iridiscentes. Las hembras son más pequeñas y su coloración tiende más al color pardo. Los inmaduros son opacos.</p>	 <p>Josep del Hoyo https://www.hbw.com/ibc/photo/melodious-blackbird-dives-dives/wild-bird-banana-leaf</p>



96.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Quiscalus mexicanus</i> Nombre común: Zanate o clarinero Nombre en inglés: Great-tailed Grackle Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Áreas agrícolas, abiertas y áreas urbanas. Descripción: Los machos miden hasta 43 cm de longitud (con una cola casi tan larga como su cuerpo), pesan 230 g, y son negros con un lustre iridiscente. Las hembras son más pequeñas; miden hasta 33 cm de longitud, pesan 125 g, y son marrones.</p>	 <p>De Patrick Coin (Patrick Coin) - Photograph taken by Patrick Coin, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1528397</p>
97.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Molothrus aeneus</i> Nombre común: Tordo Ojirrojo Nombre en inglés: Bronzed Cowbird Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Tierras de cultivo, malezas, campo semiabierto y unidades de engorde de ganado. Descripción: Cuerpo negro-café iridiscente. La cabeza más café que el cuerpo. Los ojos son rojos.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/05/molothrus-aeneus-vaquero-de-ojo-rojo-o.html</p>
98.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Icterus wagleri</i> Nombre común: Bolsero de Wagler o Chorcha Cabeza Negra Nombre en inglés: Black-vented Oriole Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques secos o bosque semiabiertos, en las colinas y las laderas de las montañas Descripción: El adulto es negro por encima y sobre la cabeza y el cuello, con una cola negra. El resto del plumaje, las partes inferiores y las coberteras de ala más pequeñas son de color amarillo anaranjado, mientras que el pico es bastante largo y algo curvado hacia abajo.</p>	 <p>https://www.naturalista.mx/taxa/9317-Icterus-wagleri</p>
99.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Icterus galbula</i> Nombre común: Bolsero Campero Nombre en inglés: Baltimore Oriole Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques abiertos, arboledas ribereñas, olmos, árboles de sombra. Se reproduce en bosque caducifolio o mixto, generalmente en bosques abiertos o bordes en lugar del bosque denso. Puede ser común en los árboles en las ciudades. Descripción: Su cola es relativamente corta. La parte alta de su mandíbula es recta. Los adultos poseen un</p>	 <p>https://www.audubon.org/field-guide/bird/baltimore-oriole</p>

	<p>pico en punta y franjas blancas en sus alas. El macho adulto es color anaranjado en su zona inferior, hombros y rabo. Todo el resto del cuerpo del macho es negro. La hembra adulta posee su zona inferior de color amarillo-marrón; en las partes superiores con alas oscuras, y pleno anaranjado en pecho y cogote.</p>	
100.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Icterus gularis</i> Nombre común: Bolsero Norteño o Chorchá Nombre en inglés: Altamira Oriole Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Expandida en tierras y colinas bajas en bosques secos abiertos, en los alrededores de bosques, en arboledas de arroyos y en árboles dispersos en campo abierto. Descripción: 18 cm. y pesa 34 g. El macho es el único bolsero anaranjado con la cabeza negra. Las hembras y los individuos juveniles son más café por encima que otros bolseros de pecho anaranjado, que carecen de barras alares o presentan la espalda listada. Las hembras por encima son oliva teñido de anaranjado. Presentan la base de las plumas de la coronilla y de la espalda negra, lo cual les proporciona una apariencia algo manchada. Las alas son negruzcas con dos barras alares blancas, la anterior con un tinte anaranjado. El pecho y las coberteras infracaudales son anaranjadas; el color se desvanece a blancuzco en la barbilla y a anaranjado pálido o grisáceo en el abdomen. La cabeza y la garganta a menudo exhibe un moteado o manchado irregular de color negro. La maxila es negra, la mandíbula plateada y las patas gris azuladas.</p>	 <p>https://www.naturalista.mx/taxa/9339-Icterus-gularis</p>
101.	<p>Familia: Icteridae Especie: <i>Amblycercus holosericeus</i> Nombre común: Zanate Piquiclaro Nombre en inglés: Yellow-billed Caciue Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques subtropicales o tropicales húmedos de tierras bajas, bosques montanos húmedos subtropicales o tropicales y bosques antiguos muy degradados. Descripción: El plumaje es completamente negro. Las patas son de color gris oscuro. El ojo es amarillo o amarillo anaranjado. El pico es amarillo con un tinte gris. Mide 23 cm (9.1 in) de largo.</p>	 <p>De https://www.flickr.com/photos/neilorlandodiazmartinez - https://www.flickr.com/photos/neilorlandodiazmartinez/14757426192/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35895740</p>

102.	<p>Familia: Fringillidae Especie: <i>Euphonia affinis</i> Nombre común: Eufonia gorjinegra Nombre en inglés: Scrub Euphonia Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: En terrenos de baja elevación tanto de clima seco como tropical, en bosques caducifolios, bosques de galería, áreas arbustivas y campos de cultivo. Descripción: 9 a 11 cm de longitud desde el pico hasta la cola. El macho es amarillo con negro, con las partes dorsales negras, así como la garganta y la parte superior del pecho; tienen una mancha amarilla en la frente. El resto del plumaje es amarillo brillante. La hembra es verde olivácea en el dorso y amarillo verdoso en garganta y vientre; el pecho es sucio, con matices verde oliva y amarillentos. El pico y las patas de ambos sexos son oscuros.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/04/euphonia-affinis.html</p>
103.	<p>Familia: Fringillidae Especie: <i>Spinus notatus</i> Nombre común: Encapuchado o Calandria Nombre en inglés: Black-headed Siskin Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Montañas húmedas tropicales o subtropicales y los bosques altamente degradados. Descripción: Cabeza y pecho superior negro. La nuca, la espalda y las plumas escapulares de color verde oliva amarillento, las plumas con manchas centrales negras (que a veces son en su mayoría ocultas y discretas). Rabo amarillo, rectrices externas negras, con medio amarillo limón basal. Alas negras, con puntas brillantes de color amarillo limón a las coberteras mayores (formando una barra amarilla en el ala) y bases a las remeras. Parte inferior (posterior a la garganta negra) de color amarillo intenso.</p>	 <p>https://www.naturalista.mx/taxa/145306-Spinus-notatus</p>
104.	<p>Familia: Fringillidae Especie: <i>Spinus psaltria</i> Nombre común: Dominoquito Dorsioscuro o Calandria Nombre en inglés: Lesser Goldfinch Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Árboles y arbustos con excepción de los del bosque denso o la selva y es frecuente encontrarlo cerca de las casas. Descripción: 10 y 11 cm. Los machos se reconocen por el amarillo brillante de su cuello, pecho y vientre y las notorias bandas blancas en las alas y cola. El color oscuro de la cabeza y parte superior incluye el exterior de los oídos y puede variar de negro brillante a pardo o aceitunado.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/08/spinus-psaltria-jilguero-menor.html</p>

105.	<p>Familia: Psittacidae Especie: <i>Psittacara holochlorus</i> Nombre común: Perica Verde Nombre en inglés: Green Parakeet Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques, parques y aclareos de forestación. Descripción: Mide 30 cm de longitud. Es mayormente verdoso y tiene pico amarillo. Al contrario de todas las demás especies del género <i>Psittacara</i>, su anillo periocular (alrededor del ojo) es muy atenuado.</p>	 <p>De Michael Woodruff - originally posted to Flickr as Green Parakeet (Aratinga holochlora), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5640698</p>
106.	<p>Familia: Furnariidae Especie: <i>Anabacerthia variegaticeps</i> Nombre común: Ramero Nombre en inglés: Scaly-throated Foliage-gleaner Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque de hoja perenne montano, localmente en bosque tropical siempreverde de tierras bajas; también alto segundo crecimiento. Descripción: 15 – 17.5 cm. 19 a 25 g. Pico gris oscuro en la parte superior y crema oscura debajo. Anillo de ojos. Corona oscura con pocas tiras pálidas. Cabeza grisácea con una ceja beige-ocre que corre detrás del ojo. Espalda café. La garganta es marrón rojiza. Pecho con rayas blancas. Vientre y lados del cuerpo de color marrón oliva. Plumas de la cola de color marrón rojizo. Patas grisáceas.</p>	 <p>https://www.pinterest.com/pin/353180795762910791/</p>
107.	<p>Familia: Furnariidae Especie: <i>Clibanornis rubiginosus</i> Nombre común: Breñero rojizo Nombre en inglés: Ruddy Foliage-gleaner Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Selva húmeda tropical montana aunque también se encuentra en las selvas de regiones bajas. Descripción: 20 cm de largo y tiene una cola relativamente larga. Su plumaje es de un color castaño rojizo uniforme, siendo algo más claro en las partes inferiores, y con tonos anaranjados en la garganta. Su pico es largo, recto y robusto, de tonos grisáceos. Ambos sexos tienen una apariencia similar y los juveniles son más claros y tienen la garganta y el pecho oscuros.</p>	 <p>PeterSheikhli https://www.birdforum.net/opus/Ruddy_Foliage-gleaner</p>

<p>108.</p>	<p>Familia: Furnariidae Especie: <i>Sclerurus mexicanus</i> Nombre común: Hojarasquero Nombre en inglés: Tawny-throated Leaftosser Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Selvas húmedas tropicales tanto de tierras bajas como las montañas. Viven en el suelo, escarbando en búsqueda de invertebrados. Descripción: 15–17 cm de largo y pesa entre 24-30 g. Su plumaje es de color castaña bastante uniforme. La cola es más oscura y el pecho, cara y obispillo son más claros y con tonos rojizos, y el píleo con tonos grisáceos. Sus iris son marrón oscuro, y sus patas son pardo negruzcas. Su pico es largo, estrecho y ligeramente curvado hacia abajo, en proporción más largo y delgado que en el resto de los miembros de Furnariidae. La parte superior del pico es negruzca y la parte inferior clara, con la punta negra.</p>	 <p>De Michael Woodruff from Spokane, Washington, USA - Tawny-throated Leaftosser, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5101133</p>
<p>109.</p>	<p>Familia: Dendrocolaptidae Especie: <i>Sittasomus griseicapillus</i> Nombre común: Trepatroncos oliváceo Nombre en inglés: Olivaceous Woodcreeper Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: En el dosel, tanto al interior, como en los bordes de los bosques y en el bosque de galería de zonas secas. Descripción: 15 cm de longitud y pesa 13 g.5 La cabeza, la corona, la garganta y la parte superior del dorso son de color verde oliváceo; el centro de la parte inferior del dorso y la cola son de color castaño rojizo; el pecho y el vientre son grises. Volando, muestra una faja amarillenta en las plumas de vuelo la cual cruza en medio de las plumas largas de las alas. El pico es delgado, pequeño y recto.</p>	 <p>Diego Oscar http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=8500</p>
<p>110.</p>	<p>Familia: Furnariidae Especie: <i>Dendrocolaptes picumnus</i> Nombre común: Trepador colorado Nombre en inglés: Black-banded Woodcreeper Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosques húmedos. Suelen ser visitantes frecuentes de los hormigueros. Descripción: Su pico es de tonalidades negruzcas. Su plumaje es marrón, más oscuro por encima, y rayado de tonalidades beige; pecho prominente beige con rayas y vientre listado de tonos ante y negruzco.</p>	 <p>http://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=15198</p>

111.	<p>Familia: Momotidae Especie: <i>Aspatha gularis</i> Nombre común: Momoto gorjiazul Nombre en inglés: Blue-throated Motmot Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Bosque montano húmedo subtropical y tropical, encino, pino y ciprés Descripción: 25 y 28 centímetros de altura. Carecen de las típicas plumas en forma de raqueta que poseen en la cola. El pico es de color y tono negruzco. El color general del ave es verde. La cola es de color azulado. La garganta es de color azul turquesa mientras que la cara es de color ocre. Posee 2 grupos de manchas características de color negro, el primer grupo está localizado en los auriculares y el segundo está en la parte frontal superior del pecho. La parte baja del estómago (cerca de la base de las patas) es de un tono turquesa difuso (lavado). Los individuos juveniles de la especie tienen la cabeza y las partes superiores más oscuras que la de los adultos y son de color verde olivo difuso.</p>	 <p>http://bellasavesdeelsalvador.blogspot.com/2015/11/aspatha-gularis.html</p>
112.	<p>Familia: Momotidae Especie: <i>Momotus lessonii</i> Nombre común: Momoto coroniazul Nombre en inglés: Lesson's Motmot Estado según UICN: Preocupación menor (LC) Hábitat: Ambientes boscosos, selvas húmedas de baja altitud, bosques más secos, quebradas boscosas, crecimientos secundarios sombríos, cercas vivas, jardines sombríos, y plantaciones de café. Descripción: 38 a 43 centímetros. Los adultos poseen los ojos de color rojo y tienen una corona de color negro, rodeada por una franja de color turquesa azulada. La máscara facial es de color negro, circundada por una franja de color turquesa. Las partes superiores son de color verde, las plumas de vuelo son de color y tono azulado y las plumas de la cola (raquetas) son de color azul con la punta de color negro. La garganta y las partes inferiores son de color y tonos verde olivo a verdoso-canela. Las mejillas son de color turquesa pálido y presenta 2 manchas en el pecho de color negro. Los individuos adultos machos de la subespecie cortan las plumas de la zona media de su cola al alcanzar la madurez sexual, dejando desnudo el raquis. Esto le da una forma de raqueta a la cola, la que mueven de lado a lado para comunicarse visualmente entre individuos.</p>	 <p>De Andy Morffew, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61980870</p>

Bibliografía

Fundación Defensores de la Naturaleza, 2006. Plan Maestro 2006 – 2010, Parque Nacional Naciones Unidas. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 53 pág.

Fundación Defensores de la Naturaleza –FDN-, 2013. Plan Maestro 2,013 – 2,017. Parque Nacional Naciones Unidas. Fundación Defensores de la Naturaleza –FDN-. Guatemala. 115 pág.

Fundación Defensores de la Naturaleza. 2018. Inventario y Actualización información de flora y fauna en el Parque Nacional Naciones Unidas. SIN PUBLICAR