

Ornithogalum

Carpentia abieque floribus in herb. Payeri. folia oblonga obtusa nec ovata

fimbriatum Ornithogalum foliis linearibus ciliatis, scapo subbiflo.

hab. ^{ro} bracteis pedunculo subaequalibus Willd. l.c.
Taurin in monte Tschatze Daye.

Ornith. umbellato affine foliis pilos. Pall. n. aut. petr. 10. p. 309.

Orn. jamum villosum umbellat. alb. Tournes. cor. 26. n.

Folia radicalia linearia acuta margine villis ciliata.

Scapus erectus vix digitalis.

Flores facie et corole ornithog. umbellati, pedunculi
bini uniflori patentiter subaequali in apice scapi.

Bractea lanceolata acuta mem. brunnea fere longi-
tudine pedunculi.

Ornithogalum

Habitat in monte video Commerfen. Herb. Ausf.

Bulbus peso duplo major. Folia radicalia, fere glomerata, digitalia, glabra. Scapi
plures, fere formos, foliis parum longiores, biflori. Pedicelli vix pollicares.
Involucrum andum diphyllum, unguiculare, acutum. Petala oblonga, ob
tusis, flava.

silvatum Ornithogalum

Habitat

herb. Rus.

Scapus pedalis, glaber. Racemus simplex, subtripollucaris. pedicelli sparsi,
vix pollicares, capillares. Flores parvi

Ornithogalum

Habitat in monte video Comneson herb. Guj.
Folia radicalia, linearia, spithamea, glabra, angusta. Scapi altitudine foliorum,
veniar. Flores terminalia alba 3-5, umbellati. Stamina filiformia. Petala
oblonga, obtusa, cania vixi. Involucrum membraceum, deplyllum, un
gularare, lanceolatum.

Cirrhobolus Ornithogalicum

Boister

Habitat herb. mus.

Folia radicalia, ensiformia, sesquipedalia, attenuata, glabra, integerrima,
fenestrata. Scapus foliis parum altior, superne ramosus. Folium lanceolatum sub
ramis. Pedunculi geminati, glabri, unguiculares, uniflori, remoti; folium
parvum ad basin pedunculorum. Flores nudantur. Petala lanceolata, un-
guiculata, valde attenuata.

Ornithogalum

Ornithogalum Cyprianum, capillares folio
Habitat in Cypria herb. mus.

habeo

Ornithogolum

Habitat in Bononia. Commeson herb. Mus.
Flores ex albidis

habes.

Ornithogalum

Act. Petrop. XVI.

Habitat herb. Musci

Caules simpliciter, simplex. Folia linearia, caule perenni breviora 3-4
superne globosa, pubulata. Petala oblonga, obtusa, filamenta aequalia

, uniflorum *Ornithogalum scapo diphylo*, pedunculo unifloro *Lin. Mant. 62.*
S.V. p. 327.

Habitat in Libano montis Sini Sophiae summo apice & glacies
Bulbus magnitudine ~~ovellae~~ ^{nucis coyli}. Scapus palmans, superne
foliis geminis suboppositis unum parum supra alterum, lanceolato
eniformia obtuse ^a Corolla magnitudine ^{ferè Tulipa sylvestris}
petalis obtusis ^{interius laciniolatis longiora, ~~venato-reticulata~~} ^{exterioribus} ^{trina obovata interna}
staminibus ^{subaequalibus} purpureis. Filamenta aequalia petalis breviora
Stylus longitudine staminum. Stigmata tria obtusa

an diversa a Tulipa biflora Pall.

2 minimum Ornithogalum sicapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis petalis
acutis ^{midatis} Lin. Fl. suec. 206. 48l. Dan t. 612.
L. V. pag.

Ornithogalum sive Panonicum luteo flore Clus. h.

Ornithogalum luteum minus Bauh. Pin. 71

Habitat in Europa cultis oleivacis 4

Differt a precedente foliis angustis duplo angustioribus. Involucrum foliis
valde attenuatis. pedunculis bifidis foliolis 2-3 petalis adveni-
suris

3 luteum Ornithogalum Scapo anguloso diphyllis, pedunculis umbellatis simplicibus
petalis obtusis lin. J. V. 327 Fl. Dan. t. 370

Bulbus Trug. Rad.

Ornithogalum luteum Bauh. Pin. 71.

Habitat in Europa cultis, macellis

Caule Tolum radicale unicum lineari canaliculatum obtusifolium
Scapo albore. caulibus gemina figura radicalium parum angustior
altero longior. Pedunculi ³ Scapi palmari. Pedunculi 3 inaequales
uniflori. Petala extus viridia intus lactea, ex lineari obtusa exteri-
ora parum longiora

4 ^{bivalve}
~~graminifolium~~ Ornithogalum scapo tereti nudo, floribus umbellatis, filamentis
subulatis

Ornithogalum bivalve Lin. Spec. pl. Ed. 1. pag 306.

Habitat in Virginia.

Radice bulbosa. Folia spithamea lineana altitudine scapi. Pedunculi umbellati
s. b. bipollicares. involucrem monophyllum, ovatum acutum
Petala lanceolata

5 *circinatum* *Ornithogalum* foliis radicalibus solitariis, caulinis tribus recurvatis canaliculatis, caule $\text{tri} \frac{1}{2}$ 4 floo pedunculis tomentosis

Ornithogalum reticulatum Pall. *it.* vol. 3. p. 727. tab. 9. fig. 2. *

Ornithogalum circinatum: hirsutia canescens, foliis lineariibus recurvatis canaliculatis: radicali solitario caulinis tribus, caule $\text{tri} \frac{1}{2}$ 4 floo *lin. - Suppl. pag. 199. * S. V. pag. 320*

Habitat in deserto limoso sicco Aethiopianensi 4

Similemum *Ornith.* minimo. *Bubbus tunicatus* fibroso reticulatis sursum ~~erecta~~ ⁱⁿ vaginam circa scapum laticam, cylindricam ~~erecta~~. *Solia* gracilia, radiale unicum *scapo* longiore *Caulina* totul *floes*, *figura* radialeum. ^{scap. membrana hyalina adpeta.} *Scap.* palmaris bi-3-4 floo *Petala* tria exteriora subulata longiora viridia margine flava interiora tenera flava, revolute viridi. filamenta petalis breviora

Tota planta flore excepto, hirsutia minima canescente *scapo* *lin*

6 bulbiferum *Ornithogalum bulbis axillantibus, caule polyphylo unifloro* Len Suppl. pag
199. * S.V. pag 328.

Ornithogalum bulbiferum Pallas d. vol. 2. p. 736. t. 9. *

Habitat in aridis locis ad Wolgam et Casium

Planta digitalis tenuissime pilosa. Folia aequant in caule linguiculata setacea
bulbi axillares magnitudine femini hirci. Flo. terminalis fere Ornith.
minoris. Petala lanceolata acuta.

~~arabum~~ Ornithogalum -

7 nivesum Ornithogalum racemo paucifloro, petalis lanceolatis, foliis filiformi-
bus canaliculatis, filamentis subulatis Hort. Kew. 1. p. 440 *

Habitat in C. bonoprei 4

Folia glabra vix digitalia. Scapus foliis brevior. Peduncululi vix semina-
riales. Bractea oblonga, acuminata, brevissima. Petala quadrilinea-
tia alba. 3 externa carina virescente. Filamenta petalis dimidiis
breviora, nivesa: aeterna sesquialteoria. Hort. Kew. l. c.

♂ umbellatum Ornithogalum corymbo paucifloro, pedunculis bracteis longioribus,
filamentis pubulatis Hot. kew. 1. p. 440

Ornithogalum Ger.

Ornithogalum s. f. vulgare Clus. hist

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium Bauh. Pin. 70

Ornithogalum umbellatum floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis basi dilatatis Lin. s. f. pag. 320.

Habitat in Germania, Gallia, oriente &

Folia linearia scapo duplo longiora, scapulis palmatis et ultra.

Pedunculi ^{corymbosi} ~~racemosi~~ conferti in ut fere corymbosi demum racemosi inferiores longiores altiores, scapo saepe longiores. Bracteis ^{obtusis}

lanceolatis, attenuatis hyalina, sesquipedaliana. Petala extus viridia margine lato candido, lanceolata, tria latera margine angustiora, obtusiora, interiora angustiora; intus nivea. filamenta petalis breviora

9 repens *Ornithogalum foliis filiformibus carnosis* Lin. Scapo ^{pubifloro, pediculis ovato oblongis} ~~paucifloro~~ ~~lin. suppl. pag.~~

~~199. l. v. pag. 320~~

~~Habitat in Cap. b. spec.~~

Ornithogalum repens foliis filiformibus carnosis, scapo paucifloro lin.

Suppl. p. 199. l. v. pag. 320.

Habitat in Cap. b. spec. 2.

Bulbus ovace congliparum minor. Folia 2 ad 3 alia, duo scapo ~~pro~~
breviora. Scapus digitalis filiformis. Flores plerumque gemini pedun-
culati, pedunculis semiangularibus. Bractea ovata foliata acuta
pedunculo brevioris. Petala ~~ex~~ ⁱⁿ dorso fulvis. purpureo fulvis

10 pilosum Ornithogalum foliis linearibus ensiformibus ciliatis, floribus racemosis
pedunculis incurvis Lin. Suppl. pag. 199. l. V. p. 320.

Habitat in Cap. b. spei

Folia palmaria striata, linearia canaliculata. Scapus pyramideus
tereti punctis minutissimis adpressis superne parum flexuosi. Racemus
subsecundis, bipollicares, ^{namque flexuosi} flores remoti, pedicelli incurvi semi-
unculabiles incurvi. Bractea subulata longitudine pedicelli.
Petala canaliculata. filamenta simplicia.

tetrandra Peplei

graminifolium. V foliis lineari-
erecto Thunb. prodr. pag. 61.
Habitat in Cap. b. Spei

non vidi

112 i lectum Ornithogalum foliis ovatis acutis ciliatis floribus racemosis Lin. Suppl.
pag. 199. S. V. pag. 320
Habitat in Cap. bono spei

non vid.

12 crenulatum ornithogalium foliis oblongis obtusis ciliatis, floribus racemosis erectis
Lin. suppl. p. 198. S. V. p. 320.
Habitat in Cap. b. p. c.

non vidi

: oratum Ov foliis ovatis integris, racemo ovato Thunb prodr
pag. 62.

Habitat in Cap. b. p. p. c.

non vid.

13 pyrenaicum Ornith. racemo longissimo, petalis linearibus obtusis, filamentis lanceola-
tis aequalibus, stylo longitudine staminum Hort. kew. 1. p. 441. Jacq. fl. austr.
vol. 2. p. 7. t. 103
Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus Bauh. Pin.

70.
Epphodelus bulbosus Ger. em. 97. Dod. pempt.

~~Phalangium longissimum specatum, filamentis latis lanceolatis Hall.~~

~~herb. 1710.~~

Ornithogalum Pyrenaicum Hudf. fl. angl. 1. p. 143

Habitat in Anglia?

Scapus levis. Pedicelli fructiferi scapo approximati. Bractea
lanceolata acuminata. Petala alba pedicello dimidio breviora
res. Filamenta petalis dimidio breviora.

14 *Fraxinodes Ornithog. racemo longissimo, petalis lanceolato-oblongis, filamentis late*
lanceolatis: alteris dimidiis brevioribus Hort. New. 1. p. 441. Jacq. fl. Austr.

Ornithogalum majus Clus. h. 1. p. 187

Ornithogalum pyrenaicum Clus. Curio post. p. 28

9 ~~*Ornithogalum pyrenaicum*~~

Habita in Europa australi 4

1 *Ornithogalum pyrenaicum: racemo longissimo, filamentis lanceolatis*
pedunculis floriferis patentibus equalibus; fructiferis saepe appresi-
mati Lin. S. V. p. 327

Ornithogalum pyrenaicum. Lin

14 narbonense Ornithogalum racem ob longo filamentis lanceolatis membranaceis,
pedunculis floriferis patentibus Lin. Am. acad. 4. p. 313* L. V. pag
327.

Ornithogalum narbonense Dod. pempt. 222.

Ornithogalum majus spicatum, flore albo Bauh. Pin. 70

Habitat in Gallia aëstivali et 4 talis agri.

Folia

Scapus pedalis lavis. Racemus spithameus, pedicelli filiformes
fructiferi stipes erecti, floriferi patentes, pollicari. Bractea sub
subulata. Petala linearia. Filamenta lanceolato-subulata aequa
lea longitudine corollae, membranacea.

japonicum - D. raiemo spicato cylindrico ^{lindl} Cingulato striato.

Thunb. fl. jap. pag. 137.

~~Mansfield~~ Kwei Simua Kempf. am. ex. v. p. 072

Habitat in Ipotria.

folia linearia plana glabra

lineare Ornithogalum scapo tereti sulcato, ^{micro}fructa simplici elongata erecta
glauca, fl. cochineato pag 206
Habitat Cantone Sinanum. 4

Bulbus oratus tunicatus. Folia radicalia, subulato linearia, stri-
ata canaliculata, glabra. Scapus 2 pedali. flores parvi violacei

non vidi ab Ornith. japonico Thunb. Diversus secundum locum

17 *actispermum Ornithogalum* foliis oblongis obtusis glabris, racemo quadripedali
Linn. Suppl. 199. S. V. p. 320.
Habitat in Cap. bono spei ?

non id.

10 Longibracteatum Ornithogalum racemo brevissimo, bracteis lanceolatis longitudine
florum, petalis obtusis, sepalis emittis subulatis Jacq. hort. t. 29. f. V. pag. 377
Jacq. coll. 2. p. 310.
Habitat

an bracteatum O. foliis ensiformibus acuminatis, bracteis flori-
bus longioribus

non vidi

16 Latifolium Ornithogalum, foliis lanceolatis ea seiformibus Lin-Suppl. pag 2007
Jacq. Coll. 2. p 310. S.V. pag. 327 40. rar. Tab 424.

Ornithogalum vel liliū alexandrinum, floribus albis innumerabili-
bus Sw. flor. 50

Ornithogalum latifolium et maximum Bauh. Pin. 70.

Habitat in Arabia, Aegypto. 4

Folia radice alia pedalis, duos pollices lata. Scapus sesquipedalis
viridis, teres. Racemus longissimus. Pedunculi pollicis transversi
longitudine, seu bracteis vix longiores. Floribus utrinque albis finis. Petala
lanceolata, patentia. Filamenta erecta, lanceolata, petalis dimidia
breviora, alba. Anthera flavo. Stylis ~~et~~ l. c.

Ornithogalum maximum Clus. hist

odoratum *O. filamentis lanceolatis, racemis longis, foliis lanceolato-*
lineariibus, superne planis humifusis Jacq. coll. 5. 7i
var. tab. 432.

non vidi

secundum O. filamentis lanicolatis, racemo brevi secundo foliis sublinea-
ribus apice fornicatis margine cartilagineo mucronatis Saeg. Coll.
51. 4c. var. tab. 433.

non vidi

4 comosum Ornith. rad. amo brevissimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis
obtusis, filamentis subulatis Lam. Acad. 4. p. 312. & S. V. pag. 327 Jacq. Colla. p. 313
- Icon rar. Ornithogali lactei species ~~florae~~ major Best. Eyt.
tab 426 Ornithogalum speciatum f. comosum flore lacteo Bauh. Pin. 70. Radd. Elyf. 2.
p. 135. fig. 5.

Habitat - - - 7

Ornithogalum pannonicum 4 tuum Claf. hist.

pyramidale Ornith. raiemo coueo, floribus numerosis a pendulis. Lin. S. V. pag. 327
Jacq. Coll. 2. p. 317 ^{7^e} var. Tab 425.

Ornithogalum lacteum maximum. Best. Eyff. serm. s. t. 14. fig. 2.

Ornithogalum angustifolium picatum maximum Bauh. Pin. 70. Rudb. Elyf.
2. p. 134. fig. 4.

Habitat in collibus cristatis &
pedicelli longi lassi frequentissimi

conicum Ornithogalum filamentis subulatis racemo conico, foliis linearibus lanceolatis utriusque attenuatis margine villosis

Ornithogalum conicum Gaëqu. coll. 3. pag. 232. t. r. 428

Habitat in Cap. b. p. r.

Bulbus ovatus magnitudine juglandis. Folia linearia lanceolata, acuta, plana, glabra, crassula, margine villis brevibus albis ciliata, plura 3-8 pollicaria. Scapus teris crassitie calami, glaber erectus foliis duplo longior. racemus multiflorus conicus. pedicelli pollicares erecti. Bracteae lanceolatae acuminatae longitudine pedicellorum albae toto sic anso tenues pms. Petala nuda subnulla lanceolata patentissima. Filamenta subulata alterna basi brevissime aunculata petalis duplo breviora Gaëqu.

gūscatum O. filamentis lanceolatis tribus catenibus - racimo oblongo
foliis linearibus cuneiformibus sparsis triplicibus brevioribus; Cap
sulis alatis trilobis Gaëqu. coll. 5. Si var tab.

429

non vid.

caudatura O. racemo longissimo, foliis lanceolato-linearibus corollis pa-
tentibus, framentibus dilatatis alternis cuneiformibus H. Kern 1 p
Ornithogalum caudatum Gaeyn. coll. 2. p. 315. 4c. var. tab. 4 23 ⁴²²

Habitat in C. b. spei?

Rubus magnitudine pugni extra terram prominet, mox semper globiferi bulbos emittit. Folia sublinearia, canaliculata, nitida crassa reflexa tripedalia, unciarum longa, apice obtusa in caudam vergetem subulata tripedalem manifestam deciduam, hinc in foliis adultis non conspicua. Scapus teres crassitie calami, tripedalis. Racemus erectus demum pedalis. Bracteis firmis, pedunculo duplo brevior. pedunculi floerati patentissimi. Petala obtusa, patentissima utraque versantia margine caetera. Filamenta omniplacae, tria alterna latera ovata Gaeyn.

undum caudatum Gaeyn. et hort. kew. sive
so albato

polyphyllum O. filamentis canaliculatis rariore brevi, foliis plurimis sub-
latis semiteretibus haec qu. coll. 5. 4c. var. tab. 430

non vidi

juaveolens Ornithogalum filamentis lanceolatis racemo brevi; foliis lineari-
canaliculatis longitudine scapi
Ornithogalum juaveolens Jacq. coll. 2. p. 316. Hb. rar. Tab. 431

Habitat in Cap. b. praes.

Totum glabrum. Bulbus subrotundus. Folia paucis acuta, sublineari, car-
nosula canaliculata longitudine scapi, flaccida. Scapus pedalis 2
vel, erectus, superne pauciflorus, purpureo fuscus. Racemus la-
tus, 5 florus. Spatha angusta lanceolata, longitudine pedunculorum.
Petala oblonga, obtusa, planiuscula patente, prima utrinque vix in
margine flavo. Filamenta omnia compressa lanceolata aequali
petalis breviora. Stigma caputatum, bifidum, hirsutum Jacq.

non vid.

tenellum. Ornithogolum filamentis subulatis sicapo filiformi lacte racemoso
bracteis pedunculo brevioribus foliis linearibus conalceulatis
Ornithogolum tenellum Gayen. coll. 2. p. 316. Ic. rar. tab. 427.

Habitat in Q. b. pres

Totum glabrum. Bulbus parvus subrotundus. Folia pauca, canaliculata,
lineana angustissima acuta, sicapo breviora. Scapus debilis, gracilis
vires, erectus, pedalis, viridifuscus, racemi lacti 8-12 flori. Bractes
subulatae, pedunculis duplo brevioribus. Pedunculi florentes patentes, imi
Petala canaliculata, intus lactea extus fuscis longitudinali vridispa
ventri. Filamenta omnia subulata Gayen.

albucoides. Or foliis lineantibus canaliculatis glabris, racemo erecto
Thunb. prod. pag 62
Habitat in Cap. 6 spec

non vidi

maculatum Ornithogalum

Ornithogalum maculatum Gaertn. coll. 2. pag. 368. tab. 68. fig. 13.

Habitat ad Cap. b. p. rei

Totum glabrum palmose. bulbis ovato-subrotundis, constans e saepe
crassis, fungosis, totum bulbum ambientibus. Folia radicalia plura
lineari-lanceolata, canaliculata, acuta, carnosula. Scapus erectus
vires, foliis brevior. Racemus pauciflorus. bractea lanceolata
concava videri acuta. Petala lanceolata, patentissima, saturate
cubeta, macula una altera in fine apicem in tubis alteris latioribus
filamenta omnia subulata petalis duplo brevior, flava Gaertn.

or Orn. maculatum foliis lanceolatis glombis secundis petalis
3bus extensoribus brevioribus fuscis maculatis Thunb. prodr.
pag 62.

Bohemium O. flonbus ax illanbus pedunculatis erectis, caulis
folioso Fuschner Abh. Privat. Bochn. 2. 1776. p. 121.

non vid.

Lappula *Albica* petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculatis
longissimis Act. Holm. p. 296. 1704. Hort. Kew. 1. p. 2436.
Habitat in Cap. bono spei

non vidi

4 arabicum Ornith. corymbo multifloro, filamentis subulatis, corolla late campanu-
lata: petalis exterioribus obsolete tridentatis Hort. kew. 1. p. 442.

Melanomphale Rencalmi spec. pag. 90

Ornithogalum arabicum Clus. h. 11. p. 186. Boff. Eyst. vern. 5. v. 12. fig. 1.

Ornithogalum umbellatum maximum Bauh. pin

Ornithogalum arabicum floribus corymbosis, pedunculis scapo humilio-
ribus filamentis submarginatis Lin. S. V. pag. 327

Habitat Alexandriae Aegypti, ad promontorium Carthagenis Tuncti, Madera ^{in arenosis}

^{fructibus} Tunicatus magnitudine ^{anani}
Scleria lancea lanceolata, ^{caulis} caule breviora,

pollicem vel ultra lata
interdum angustiora. Scapus teres, glaber, lavis, pedalis saepe bipe-
dalis in pinguioribus. Racemis brevis fastigiatus 13-15 florus.

Pedunculus com munis bipollicaris, flexuosus dentatus ad apiculum
pedicellum. Pedicelli subpollicaris crati, Bractea lanceolata
att. valde attenuata, ande, pedunculis plerumque breviora.

Petala albo flavescentia, dorso concolora, oblonga, obtusa cum mucro-
ne carnosus, plana, magnitudine tenuiori verni. Filamenta subulata
alba petalis breviora. Anthera incumbens flava. Germen obverse
conicum, nigro viridens, nitidum apice fastigiatum, basi pallidior

Stylus lineari basi viridis apice albo. ~~gemma~~ Stigma obtusum

22 Thyrsoides Ornith. Cymbis multifloris racemi formibus, ^{petalis acutis} filamentis alternis furcatis,
foliis lanceolatis ^{petalis} Hort. kew. 1. p. 242

a) floribus luteis; bracteis pedunculo brevioribus

Ornithogalum
arabicum Jacq.

Ornithogalum dubium Horst. nat. hist. 12. p. 309. t. 82. f. 3.

b) floribus albis; bracteis longitudine pedunculi

Ornithogalum racemo conico lato; pedunculis longissimis, floribus erectis
Mull. ii. 120. t. 192.

Ornithogalum thyrsoides Jacq. hort. 3. p. 17. t. 20.

Habitat in Cap. b. p. 24

a) Scapus striatus. Racemus palmatis. Pedunculi bipollicares erecti.
bractea ovata acuminis longo terminata. Petala ovata acuta

^{integra}
a) differet racemo brevior bracteis basi angustioribus longitudine
pedicellorum

flavescens Ornithogalum

Ornithogalum flavescens Jacq. Coll. 3. pag. 233

Habitat in Cap. b. ppei

Bulbus depresso-subrotundus. Folia plura, sempetalia, sessiliteran-
cata crassula, margine villoso denso ciliata. Scapus pedalis teres
calamo crassior, vix glaucus ^{multiflorus} velut, racemi subcorymbose. Pedicelli
brevissimi crassi, exiti plures 13, nitescentes, pedunculo duplo
breviores. Petala subquadrata, late lanceolata, patula, immixta flava
vix deorsum alba basi fuscoluteola subpollidiana. Filamenta petali
triplo breviora basi utrinque membrana alba alata. Stigma villo-
sum Jacq.

varietas Ornith. Thysfordi

non vidi.

Ornithogalum filamentis alternis emarginatis, racemo corymbose
solis lanceolatis margine subtilissime mucronatis floribus mucronatis
Ornithogalum minutum Gaerq. coll. 3. pag. 233. f. rar. 430

Habitat in cap. b. p. r.

Bulbus depressus subrotundus. Solca 3-4. quadripolliciana semper
laevem lata, crassula ope lentis margine vellis albis ciliata
scapus crassitie calami, 9 pollicaris, teris erigitur. Flores ^{14 ciliatis} corymbose
racemose. Bractea acuta spicualis. Pedunculi bracteis du-
plo longiores. Petala utraque mucronata ovata acuta. Filameata
subulata foveola luteo-purpurea inferne alba. Gaerq.

A flavissimum. floribus flavis Gaerq. coll. 5. f. rar. tab. 436

forte cum ornith. flavesci varietas Ornith. Thyrsoidea

non vidi

Caecum O. filamentis alternis basi leviter ~~x~~marginatis, racemo pyramida
to denso longo, foliis lanceolatis planis margine serratis. Fajou
coll. 5. ~~A~~ c. var. tab 43 et

Mexico ignotum

Coarctatum O. filamentis alternis emarginatis: racemo oblongo coarctato
foliis linearibus coarctatis saepe coll. 5. ^{tab} 46: raro pag.

426 435

non vidi

reputans Ornithogalum floribus secundis pendulis, nectario Stamineo campaniforme Lin. S. V. p. 320 Jacq. fl. Austr. vol. 4. p. 342. Flor. Dan. Tab.

Hyacinthus arvonum Ornithogaloides

Ornithogalum neapolitanum Clus. app. 2. p. 4. t. 4

+ Habitat in Italia, Helvetia Sanea. innotuit circa 15704

+ *Ornithogalum exilium* magno flore, minore innato Bauh. Pin. 70

Folia pedalia altitudine fere lineana. Racemus bif. Tripollicari, pedicelli semipollucari. Bractea lanceolata attenuata longitudine corollae. Petala ut in umbellato ad latitudiniora

25 Capense Ornith. foliis cordato-ovatis H. Scam. 73. J. V. pag. 320

Ornithogale affinis radice tuberosa, cyclamini folio, flore pallide conuleo
Breyer cent. t. 41. Rusb. Clys. 2. p. 130. fig. 14.

Ornithogaleum africanum, plantagini rosetta folio, radice tuberosa Comm. hort.
2. p. 175. t. 80.

Habitat in Cap. bono spec⁴ staminum connexa in cylindrum

Stamina connexa in cylindrum.

florum ① foliis glabris racemosis, foliis lineariibus planis
complicatis Forst. Deserv

non vidi