

*Polygonum*

glaucum q foliis lanceolatis integerrimis glaucis, caule erecto sessu  
Vicoso lin. suppl. pag. 306. & L. V. pag. 614 Curt. Bot. mag. tab 46

Habitat in Cap. b. p. 5

glaucum Pet. pedunculis <sup>4</sup> bifloris foliis lanceolatis integerrimis  
acuminatis glaucis <sup>2</sup> Bot. henn 2. p. 429. L. Heret.  
<sup>4</sup> subunifloris Geran. tab 29.

Geranium lanceolatum caule fruticoso, ramis virgatis  
foliis lanceolatis oppositis integerrimis glaucis,  
pedunculis axillaribus subunifloris. Cavan. Diss.  
pag. 235. tab 162. fig. 2.

Tota glabra glauca. Ram. declinati. folia opposita  
petioli interdum breviora crassifolia nervosa  
nervosa terminata. Stipula lanceolata. Pedunculi  
superiores, longati uni vel biflori infra medium bractea  
lanceolata attenuata. laciniis calycis acuminatis  
setatae nec superiores majores

*Oenothera* G. foliis oppositis canicollatis serrato-dentatis mollissime  
tomentosi, umbella pauciflora Lin-Suppl. p. 305. t. 5. v.  
pag. 610.  
Habitat in Cap. b. spec.

Pelony

non vid.

capillare q <sup>iniflo</sup> foliis lanceolatis serratis tomentosis incanis, pedunculis  
subbifloris

Geranium hermannioides pedunculis multifloris florum  
lineatis, foliis pennatis foliolis linearibus subserratis, caule  
fruticoso Burm. ~~quam~~ prodr. flor. capensis pag

Geranium capillare foliis oppositis pennatis: pinnulis lineari-  
bus, pedunculis axillaribus solitariis subbifloris Cavan  
desf. pag 250. tab. 97. fig. 1.

Habitat in Cap. b. spei specimen commune. Burm.

Caulis brevis rami nonnulli conferti, erecti <sup>superiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup>  
palmasi. Folia <sup>longe</sup> petiolata <sup>superiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup>  
serpula <sup>longe</sup> petiolata pedunculi laterales et terminales  
incanis villosi uti calycis <sup>longe</sup> <sup>superiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup>  
eata Calycis foliola lanceolata <sup>longe</sup> <sup>superiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup>  
fuseda <sup>longe</sup> <sup>superiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup> <sup>inferiora opposita</sup>

an mea Pelarg. tricolor. an Cavan: huius pedunculis  
figura quamvis mala satis simili

tricolorum Pelag. foliis lanceolatis <sup>oppositis</sup> serratis incisè pedunculatis  
-inflor.

Claytonium Vnicolor petalis duobus superioribus punctis promi-  
nulis luteis ad basin fixatis Curt. Botan. Mag. tab. 240

Habitat in Cap. p. p. p.

non vidi

ovale g. umbellis paucifloris. pedicellis elongatis, foliis ellipticis  
dentatis, caulibus hirsutis Hort. kew. 2. p. 429. L'Herit. Geran.  
Tab. 28.

Geranium ovale Burm. fl. cap. p. 19.

Geranium ovatum caule bene suffruticoso foliis ovatis dentatis  
pedunculis terminalibus paucifloris  
tomentosi Cavan. des. 4. p. 230. Tab. 103. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Caulis simpliciter folia radicalia frequentia longissime petiola  
ta tomentosa caulina opposita vel alterna breviter petiolata  
Omnia caetera tomentosa non tamen incana. Pedun-  
culi terminalis elongati subsinflori. Calyx ovatus tomento-  
sus. Petala superiora majora Cavan.

— stipulis lanceolatis

non ad.

betulinum G. foliis ovatis inaequaliter serratis planis, caule fruticose  
fo frutescente Lin. L.V. Burm. ger. 38.

Geranium fruticosum, betula folio, africanum Raj  
herb. suppl. 513.

Geranium frutescens, folio lato dentato, flore magno rubro  
Burm. afr. gr. 8. 33. fig. 1.

Geranium frutescens folio subrotundo dentato, flore  
purpureo Burm. afr. gr. 8. 33. fig. 2.

Habitat ad Cap. b. p. inaequaliter

betula G umbellae pauciflorae foliis oblongis serratis ~~glabris~~ lobatis  
ramis teretibus superne pubescentibus. Folio alterna pollicis

rami teretibus superne pubescentibus. Folio alterna pollicis

na crassipula ovata pubescentia glauca virens

reticuli unguiculata stipula lanceolata pedunculi

catenales et terminales folio triplo longiore involu-

cri foliola ovata <sup>ut in 180</sup> pedicelli 3-4. <sup>folioli</sup> ~~lacini~~ calycis linear-

lanceolata <sup>inter</sup> attenuata. Corolla magna

Pelargon betulinum Curt. Bot. mag. 165 tab. 148

Plur. muat. 90. t. 415. fig. 3 Berg. Cap

folia ovata armata  
pelo raris  
bambus

frase Pelargonium pedunculis bifloris foliis obovatis serratis extrorsum  
dentatis integris Involucrisque glabris  
Habitat in Cap. b. spec. 5

Rami subvillosi. Solia alterna longitudine petali; vix  
pollicari arena frase sublineata subtus nervosa lobo  
intermedio largiore. Stipula cordata acuminata viridis  
Pedunculis oppositi folii longi. Racemus calycis lanceo  
lato

affine in spo



Tricuspidatum G. Pedunculis bifloris, foliis tricuspidatis: Cobo in  
Vermedio productione subseriatis; costa subtus mucronata Hort. kew.  
2. p. 430. L'Herit. Geran. Tab 30.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Geranium scabrum caule fruticoso lignoso foliis unci formibus  
multifidis que scabri umbellis paucifloris L'Herit. Desf.  
nay 247. Tab. 100. fig. 1.

Caulis & adiac. nupescens rami subullosi. <sup>ad</sup> folia alterna  
interdum opposita petiolo <sup>marginis</sup> subaequali basi uncinata  
apice trifida lobis lateralibus sublobis <sup>multis</sup> et seriatim  
nunc remotis, nu scabriuscula nervoso venoso.  
Stipula cordata acuminata. Pedunculi oppositi folii  
longitudine foliorum. involuella sque pedicelli 2-5  
Calycis fimbria lacini pubescenti. Canicula <sup>3</sup> ad  
nata. Petala tria superiora longiora et latiora.  
Capsula ferax tomentosa

unaeformibus trifidis subseriatis

crassicaule g. umbellis multifloris, floribus reniformibus obtusatis  
caule carnosos ramoso lani Hort. kew. 2. p. 428. L Hered Geran. 7  
26 Habitat ad Cap. 6 p. 5

non vid.

*Spinosum* of caule carnosio noduloso. spinis solitariis fructis lina Mart.  
90. t. V. pag. 610.

*Geranium spinosum* et *nodosum*, foliis reflexis Burm. afr. 10. t. 31.

*Geranium* pedunculis simplicibus unifloris, foliis cuneiformi-fauci-  
fis, ramis nodosis spiniferis Burm. ger. 16. n. 2.

Habitat ad Cap. b. p. c. t.

*Geranium spinosum* caule carnosio nodoso, spinis subula-  
tis foliis cuneiformibus reflexis, pedunculis unifloris  
Cavan. des. pag. 195 tab. 75 fig. 2.

Radix simplex. Caulis erectus ramosis obvallatus undique  
nodis aut tuberculis latis glabris inaequalibus cetero  
spinosis. Spina longissima nigricans. Folia opposita  
subsessile sinuato crenata. Pedunculi uniflori  
Calyx 4 antheris pentapetalis. filamenta 10 Cavan

Spina pollicaris. Rami ceteri. Folia obovata, sessile in  
axillis spinarum. Flores solitarii. Pedunculus longitudo-  
ne spinae, sursum et versus. Calycis lacinae lanceolatae.  
herb. Royeni

~~non vid.~~

*Heterozygium* fr. umbellis multifloris, foliis suborbiculatis incis. lobatis  
dentatis, caule erecto fruticoso Hort. Kew. v. p. 424. L'Herb. Jernon  
tab. 18<sup>e</sup>  
Habitat ad Cap. b. p. 15

inquanans G. foliis orbiculato-veniformibus tomentosi crenatis integris  
pulis, caule fruticoso. L. V. Barm. ger. 46.

Geranium africanum arboreum, malva folio pingui, floe  
coccineo Dill. Clth. 1519. 125. fig. 151. 152.

Geranium africanum arboreum, malva folio plano laevio,  
floe elegantissimo hermesino Mart. Cent. 3. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. p. 4

Geranium inquanans caule fruticoso succulento, foliis cordati orbiculati sublobatis crenatis, floribus elegantibus hermesino Coron. Desf. pag 243. Tab. 106. fig. 2.

Caulis <sup>ramis</sup> crispis. ramis villosis. Solia petiolatis subrotunda a villosa  
sublobata. Petioli folios longior <sup>longior</sup> stipula ovata subrotunda

Pedunculis communis oppositifolius elongatis longis  
multis involucrium polyphyllum foliolis ovatis andis. pericly  
li uniter 24. villosi vixi uti calycis ex his. Petala  
subaequalia duo superiora parum breviora

Pet. inquanans Hort. Kew. R. p. 2424 L. Hort. Geran.

umbellis multifloris foliis orbiculato veniformibus  
angulato sublobatis crenatis villosis vixi

papilionaceum G. corollis papilionaceis alis caninaeque minutis, foliis  
angulatis caule fruticoso. L.V. Murm. ger. 49.

Geranium africanum arboreum, flore veluti di petalo eleganter  
variegato Dill. Elth. 1548. 120. fig. 155.

Geranium africanum arboreum, malis foliis mucronatis, petala  
li florum vix conspicuis Mart. cent. 15. t. 15.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Geranium papilionaceum: caule fruticoso, foliis alternis cordatis  
lobatis rugosis Cavan. disp. p. 244. tab. 112. fig. 1

Rami pilosi. Folia basi subcordata 3-5 subpalmate angulata  
<sup>incisato</sup> obtuse serrata cum acumine minuto supra pilis raris subtus  
seriata. Petioli pilosi. Stipula ovata acuta pedunculata axil  
ficula. Laxa et terminales f. interdiuina plures uti pedicelli pilosi

Pelargonium

papilionaceum  
H. Kew. 2. p. 423.  
L'Heret. Geran.

Pedicelli capillares 6-8. Bracteae pollicares stipula  
ovata ferruginea tot quot pedicelli. Laciniae calycis <sup>curvati</sup> lanceolata  
et pilosa fol. petala alba duo superiora majora d. p. o  
saturate purpureis angulatis

foliis angulatis subrotundo cordatis, umbellis multifloris  
petalis 3bus brevissimis

Zonale *G. foliis cordato-orbiculatis incisivi zona notatis, caule fruticoso*  
L. S. S. Burm. ger. 43.

*Geranium africanum arborescens, alchemilla hirsuta foliis,*  
*floribus rubicundis Comm. prod. 51. Tab. 51.*

Habitat ad Cap. b. p. 5

*Geranium zonale caule fruticoso, foliis orbiculatis in-*  
*notatis obtuse lobatis zona nigricante, floribus umbellatis*  
*Cavan. disp. pag 230 Tab. 90. fig. 2.*

Zonale *G. umbellis multifloris foliis cordato orbiculatis sublobatis*  
*dentatis*

Cauli ramose. Rami saepe ne subrepentes. Folia altern  
oblique subsqueloba vellic rari adpressa. Pedunculi opposi  
t foliis elongati. Stipula ovato-lanceolata ciliato  
marginatae. Involucrum polyphyllum foliolorato  
lanceolatis frangis pedicelli 10 bypollinari extor  
sum panem compositis glabrisuli lacuna calycis  
Planicolata attenuata vire villosa Pet. <sup>purpurea</sup> violaceo  
Albary. zonale H. hew variegata duo superiora erecto patentia reflexa  
inferiora patenter

marginatum G. cauli fere erecte, foliis rotundato lobatis, limbo albo  
marginato; ciliis pinnatis, umbellis simplicibus Cav. Desb

noy. 30.

Helictotrichi Cap. 6 pect. junctus non nisi variet. foliis variegatis.

Similis Ger. Romali et humilior. Caulis erectus ramosus

Folia alternis, pediculis brevibus lobi 5-7. crenato den-  
tata glabra. Aquile late Cav.

noy. 4us p



patulum G. (P.) folius reniformibus 3-5 lobis crenatis glabris pedunculis  
2 floris

Pelargonium patulum Jacq. coll. 4. p. 187.

Habitat ad cap. b. p. 3

Rauler fruticosi depiles bipedales, teretis glabri, crispis calami erecti  
trifiduli pallide radii, circadniali. Sepala lanceolata-oblonga  
acuminata. Corolla opposita, reniformia 3-5 lobis acute crenatis  
ta glabra venis subtus hirsutis subtus glauca varis pur-  
purascens longissime petiolata. Pedunculi aeterni  
biflori. Involucra 5 phylla lanceolata acuminata cili-  
ta glabra purpurea. Pedicelli glabri geniculati  
superne incrassati. Calycis foliola lanceolata acuminata cili-  
ta quatuor ~~la~~ reflexa. Petala cuneiformia duo super-  
ra latera emarginata pallide rosea infra medium fascia  
purpurea. Germen hirsutum Calycis

non vid.

Cucullatum G foliis cucullatis dentatis caule fruticoso L. V. p.

Maxt. 432. Berg. Cap. 174 Burm. ger. 42. Cavan. desj.  
nos. 241. Tab 106 fig. 1.  
Geranium africanum arborescens, ibi si folio rotundo, corda  
doe Herm. Leyb. 274. 275.

~~Geranium africanum arborescens, foliis cucullatis angulosis  
Dist. Elth. 155. 129. fig. 156.~~

~~Geranium africanum arborescens, ibi si folio anguloso, flo  
ribus amplis purpureis Mart. ant. 20. 20.~~

Habitat in Africa 5

Caulei crispus ramosi Rama villosi superne incani molles  
Folia petiolata alterna nervosa venosa subtutunda  
inqual ter denticulata pubescentia canescentia  
Stipule ovato acuminato. Petioli folio vix longiori  
Pedunculi axillares folio longiori, s. flori. involucri  
foliola 5que lanciolata. foliola calycis lanciolata  
incana attenuata. Corolla magna petalis 3 anfero  
nbui angustioribus. Capsula tomentosa

umbellis submultifloris, foliis reniformibus cucullatis denticulatis

Pelarg. cucullatum H. Kew

acris folium Cavan. papus forte varietas



vitifolium g. foliis lobatis ascendentibus pubescentibus, floribus capi-  
tatis, caule fruticoso L. V. Burm. ger. 40.

Geranium africanum arborescens vitis folis, odore melis-  
so Willd. Bot. 152. t. 126. fig. 153.

Habitat ad Cap. b. p. 5

~~Geranium~~ Geranium vitifolium caule fruticoso foliis oppositis lobatis rugo-  
sis pubescentibus: floribus capitatis Caran. def. p. 245.  
Tab. 118. fig. 2.

Rami pubescentes teretes. Folia opposita, crenata: crenis  
marginatis <sup>vel</sup> subullosa lobis <sup>tri</sup>lobatis. Stipula ovata  
acuta. pediculi axillares et terminales petiolo  
longior <sup>du</sup> illi villosi: foliola involucri si que  
late ovata villosa. foliola calycis marginatis flores  
plures brevissime pedicellati. Petala superiora longiora et lon-  
giora de his purpureis. Capsula tomentosa

— cordatis tri lobis lobis <sup>tri</sup>lobatis caule erecto

Pell. g. vitifolium

capitatum G. foliis lobatis undatis villosi, floribus capitatis, caule fru-  
tulosi diffuso L. V.

Tab. 105. fig. 7.

Buon. ger. 41. Caran. d. d. p. 249

Geranium africanum frutescens, malis folio lacinato odorato Herm.

Leyb. 277. T. 270.

Habitat in C. b. ppei &

Caulis nodosus, tripedalis ramosus; rami molliter villo-  
si. Folia petiolata simpliciter veosa crenata

subrotunda subsqueloba villosa subtomentosa  
stipula cordato ovata reflexa. petiolus molliter

villosus. Pedunculi oppositi foliis longis pinnatis  
sternati. Involucrum polyphyllum foliolis ovatis

flores 6. p. subsessile calycis villi longis sericis. Peta-  
la rosea. <sup>subrotunda</sup> Capsula ferruginea tomentosa

Pelarg. capitatum

- cordatis

mollibus



monstrum 9. foliis orbiculato reniformibus obsolete lobatis emplexi-  
tis crispis Hort. kew. 2. p. 425.  
Habitat — 5

Pelary non vidi

hermannifolium G. foliis lobatis crenatis subcucullatis, stipulis cordatis  
involucrisque hispido-municatis, caule furticoso Lin. Mant. 569,  
Bery. cap. 177, ~~Suppl. 2094 V.~~

Habitat ad cap. 6. p. 1

Inter exitus ramuli pubescentibus folia cernunt plura  
sa dentata indurata si aberrantia hinc