

Polygonum

ciliatum Polygonum glomerum hexandrum semidigynum, specie verdetibus, foliis lanceolatis  
~~foliis velutinis~~  
~~foliis velutinis bracteisque ciliatis sanguineis~~  
4. monat.

Habitat in Almeria meridionali s. von Rohr.

Folii: Pol: hydroquensis - Caulis herbaceus, erector, Teres; pubescens Anatus;  
purpureo-purpureo, inferne glaber, superne pilosus velli rani adpresso adpresso;  
articulatur: articuli inferiores pollicares, superiores bipollicares. Et longis

Folia <sup>recta</sup> opposita, alterna, longe 6-8 pollicaria, lanceolata, attenuata, acuta, in  
vejimento, nervosa, supra vindicta velli rani minutis adpresso, costa crenata.  
Justus pallidiora, velloso.

Ripula: tubulosa, fimbriata, pedis adpresso, pollicares vel parum ultra, in  
femore longitudine articulorum, superiores breviores, Vmaculato cilia-  
to, sedis valde longitudine fere ipsius ripula.

Spicis terminalis, erecti inter Pedunculi interdum gemini, alter longior  
a Hachyo: Verdetos, umbriato, 3-4 pollicares crassitie fere penne  
Columbinia. Pedunculi interdum gemini, alter longior interdum Hachyo:

(anserinae?) Flores compacti, plena Vici a singula bractea, pedicellati: pedi-  
celli longitudine bractea. Bracteo tubinato, extus velloso fimbriata;  
semina quinquevulares, ciliatae: ciliis albis longitudine oppus bractea  
(valde affinis Pol: barbata, differt foliis subtiliter pelosis)

*Polygonum salicinum* floribus pentadnis trigynis astillans foliis lanceolatis  
lati rugosi, seminibus calycibus duplo longioribus - Marsh. in Schrad. p. 26  
1-6. pag. 460.

an *Polygonum maximum* longissimis caulebus et foliis Tournef. var. h. h. p. 570  
Mons. herb. f. 1. p. 5991.

Habitat ad scaterringes salsas circa veterem Rhematheam O.

transversum Polygonum foliis ovatis latis truncatis, ramis pedunculisque flexuosis

Habitat in Asia orientali

Rami venae, angulati, glabri, uti tota planta. Cœla petiolata, pollicina,  
avenia, obtusa cum acuminio. Stigma passo, campanulato, altero  
latere aluminato. Racemi axillares et terminales compositi. Flores  
minuti. Stylos unedus

nomen stamnum obscur. herb. kostatii locandum

Transversum Polygonum foliis ovaliis basi truncatis. Seta petiolata, pallidior, avenia  
obtusa cum acumine. Ita

minus Polygonum floribus hexandris submonogynis, foliis linearis lanceolatis plu-  
nis, spicis piliformibus arcuatisculis, caule basi radicante Smith. & C.  
bot. pag. 416. Curtis T.C. Lond. fasc. 1. V. 20.

Persicaria pusilla repens Gerard. em. 446.

Polygonum minus Mons. L'Her. See 5. t. 29. fig. 5.

Habitat in inundatis pascuolis. O.

7 paniculatum Polygonum flonibus  
caule ramosissimo paniculato. foliis tenuisibus.

Habitat

Rami alterni, superne di chotoma <sup>in Paniculam</sup> rufi. Stipula ampla oblique  
truncata glabra. Folia glabra bipinniciana inflorescentia  
ut in ceteris ad magis diversa sed prius divaricata floribus diffin-

titur

p

alterius examinanda postea vel neque varietas Pot. denunciatur

25 actinodatum Polygonum floribus octandris trigynis, fructis articulatis paniculatis, foliis  
vaginalibus in canticis lacinia - Spec. pl. pag. 520\* S. V. p.

Habitat in Canada. O

Caulis pedalis ramis superne altis eris, subdivisus in paniculam  
floriferam. Stipula foliacea vaginata superne catervas integrae  
inveniuntur nec rufa. Solia linearia glabra. Paniculam terminant  
fructus filiformes, angustissimi, imbricato bracteis vaginalibus  
turbanatis truncatis. Et pauca fragula suntur pedunculis foliaceis  
capillaris basi articulatus, coloratus uniflorus. Corolla incarnata  
quaque partita, fundo laticore quam in P. aviculare

non vidi

<sup>2</sup> erectum Polyc. floribus octangonis trigynis astillariis; foliis ovalebus; capsule erecto  
herbaceo Lin. t. V. p. 378.  
Habitat in Philadelphia. O

non vidi

13. *Hydropeper* *Polygonum* floribus hexandris semidigynis foliis lanceolatis stipulis mutatis  
aer. I. V. 377.

*Hydropeper Dodon* pempt 607.

*Peripaea urens* f. *Hydropeper*. *Bauk.* Pl. 101.

Habita in Europa subhumidi.

Caules erecti, nudus, glaber, latius. Folia utrinque attenuata, bipinnata  
et ultra subtilis, rara lanna fabra. Stipula tubulosa truncata  
integra. Racemi compositi profertur terminales, verticillatim imbricati.

Secundum specimen perfect. Denum exam. Et defens.

20 penylvanicum Polygonum floribus octandris degynis, pedunculus hispidus foliis lanceolatis  
pedunculi marginis  
pedunculus lan. Spec. pl. pag. 519. & S. V. pag 377.

Habitat in Pennsylvania

Talies & habitat P. persicano, sed majora & strictiora omnia. Ramis ramos  
sus, angulatus. Colia acuminata, curna subtriangularis ad modum scabra  
Hipula vel rectato. Pedunculi fabri, flos rigidiusculi apice glutin  
ferrugineus. Spicis subramosis, flosculis peduncillatis. L. n. b. c.

non vidi

Capitulum folium Polygonum floribus hexangularibus digynis, populis mutatis, pedunculis fimbriis, feminis  
bus utrinque cymosis est. A. T. p. 377\* New 2. p. 30. Bustif  
Pl.

*Persicaria hydroper* L. sp. 315

*Periphanes major*, capiti foliis, calyci & floris purpureo Tournet. inf.

*Polygonum venetum* folium floribus pentadis familiis gynis, flamineis exsertis  
regulari aquantibus Lin. S. V. p. 377. & Bust. fl. Lond.  
ab aliis tenuiatis.

Habita in Gallia, Anglia &c. in vallis, præcipitatis, &c. in locis oblique monitos.  
P. l. crassipenna, angustior, vittatum, maculatum. Vaginæ pubentes exserte. Tolla ex  
vaginis, & vides. Tend. Vaginæ pubentes exserte. Tolla ex  
vaginis, & vides.

*Scandens Polyg. foliis cordatis, caule erecto scandente Lin. S. V. p. 379.*  
*Tayopyrum scandens americanum maximum Tournef. G. R. H. 511.*  
*Tayotrichum soluble magis virginianum Plak. alm. 143. t. 127. f. 7.*  
*Tayopyrum scandens f. soluble nigra major, flore et fructu membrana  
cæsi compressi Sloan. h. 1. p. 130. t. 90. fig. 1.*

*Habitat in America*

*Petrolonum boji subtilis perforata in P. scandenti, dumetorum, Convolvuli*

*Lin. Pauli, ut: tota plantæ glabra, folia palmata vel pinnatifida acuminata.  
Petrolon. folio brevior. Hypo. tuberosa non communis sulcatae inter  
gra caule angustæ vaginantes. Pedunculi axillares folio breviores. Flores  
racemo in spica brevi virga culosis, paniciflora. Bractea Turbinata den-  
tata*

Dumentorum Polygonum foliis cordatis sagittatis, caule volubili lori, floribus cantharoides  
alatis Lin. S. V. p. 379. Sc. Dan. t. 756

Tagopyrum major scandens Vaill. Panf. 52.

Tagopyrum cylindricum scandens, flore foliaceo Pont. Anth. 265.

Tagopyrum scandens altissimum dumetorum, flumenibus tribus aliquippe  
Edu Rupp. Gen 99

Habitat in Europa sylvo umbroso ♂

Differet a L. Convolvulo caule lori non scandato, angulis posticis foliorum  
rotundatis. Pedunculi fructuosis bracteis ovato cordatis

ovato-cordatis

angulis posterioribus rotundatis - bracteis

40 multi-florum Polygonum foliis cordatis, caule volubili angulato, florum panicula  
~~Lomentosa~~ ramosa Thunb. Bl. Cap. p. 169

Habitat in Japonia

Paulis inferne scandens, angulatus, hinc inde flexus loris, sili  
formis glaber. Sola petiolata, acuminata, ovata, ex labio  
inferiora sequitur pollicem latum, basi subtruncata bipolligata:  
superiora magis cordata, minora. Flores ex axillis foliorum  
et pedunculi et pedicelli capillares, divaricati. Bractea  
ovata acuta integra  
a P. dumetorum differt floribus minutis obtusis, panicula  
ramosa, racemosa patentissima

non vidi

*feliforme* Polygonum *gloribus pentandri* Degynis, fructu feliformibus, foliis ovatis  
stipulis ciliatis Thunb. Fl. Cap. p. 163. t. I. V. p.

Habitat in Taponia

Paulis erectus villosus, ramis alaternis hi�atis erexit. Solia petiolata, acuta, ci-  
cata nervosa, prolixa. Petoli basi dilatati, vaginantes. Stylo  
intrafoliatissimis, inflato, truncato, membranaceo. Flores inferne remoti  
superne approximati, minuti. Specie terminalis, feliformis, apice  
cernea, glutinosa. Bractea amplectens, barbata & florifer. intra han-  
dis trahens, pingulum florem obovoventris, lanceolata integra  
differt a *P. barbata* Cuv. affinis, floribus pentandri Degynis, foliis  
ovatis, fructu feliformibus simplicib; pinnis, stipulis breve ciliatis

Theur. l. l.

non vidi

*Lepidium* *Polygonum*

wferratum Polyg. foliis crenatis Lin. S. V. p. 370

Polygonum folio oblongo crenato Pl. Afr. 409.

Habitat in mauritania

non vidi

<sup>3</sup> vivipanum *Polygonum* caule simplicissime monostachyo: folia radicalia ovalia, caulina  
lineari lanceolata.  
*Biflora alpina f. minor* Lam: epst. 604  
*Biflora alpina media* Baum. Pl. 192.  
*Biflora alpina minor* Baum. Pl. 192.  
*Polygonum vivipanum*: caule simplicissime monostachyo, foliis lanceolatis  
haec V. p. 376. Tl. San. t. 13.

Habitat in Europa praesertim fabalpinae, duris 4 foliis vaginis ondis testi.  
<sup>zone pluvio</sup> *Paulae palmare glaber* subtilissime frustulae. Calem radicale petiolatum  
petiolae homopollia: Calem 2.3. bipinnaria. Stipula membrana  
2.3 oblique lanceata integra. Specie longitudine caulis imbricata  
bracteis lanceolata. Flores inferiores saxe in bulbis transversaliter  
partit.

2 biflora *Polygonum*. Caule simplicissimo mono stachys, foliis radicibus ovatis <sup>lanceolatis</sup> in petiolum

decurrentibus

Biflora Cam. epist. 603.

Biflora major radice minus extorta Baile. Pln. 192.

Pole

*Polygonum biflora*: caule simplicissimo, foliis ovatis in petiolum decurrenti  
Bw. Lin. S.V. Pla. 376. 8L. Lant. 421.

Habitat in Helvetia, Austria, Gallia montosis et Dania 4

Radicis erectae pedalis, striatus glaber utri tota planta. Folia radicibus longe  
petiolata superne in folium ~~difatata~~ <sup>Folio decurrente agato</sup> folia tripollieans. Petiolis

inferne fusi nidiis superne in folium tenus delatata: Caudena

Aspero vaginam ovato-lanceolata seplio, retorta, attenuata subcomplecta subtus  
estrenata ubi radice clavis clavata. Speca terminali fusa quipollieans imbricata  
cuspitibus digiti

1 fructiferae Polygonum caule fructuoso, calycini foliolis duobus reflexis Lin. S. V. pag.

Gmel. fl. Sub. 3. p. 60 t. 12. fig. 2. et 59. t. 12. fig. 1.

Lopathum orientale, fructuoso, flore pulchro Torn. hef. corol. 30.

Lopathum dauricum montanum fructuoso rami late paucis Amm. nutti. 227

Habitat in Dauria, Siberia

Tubus et ramo spissus diffusus rami recti bus glabri. folia flesilia, unguicula

na glabra caniculata utrinque acuta. Stipula hyalina ovata in petam

depinetrix. Pedunculi <sup>longiora inferiores</sup> atellari 23 capillares uniflori, latioris in

coronis

B alpinum Polygonum floribus pentadis degynis, foliis lanceolatis subte <sup>oblongo</sup>  
villoso <sup>villoso</sup> spicis paniculatis  
Persicaria alpina altera laxatilis, foliis dianoribus acutis Boce. muf. p. 100. v. 03.  
Persicaria alpina folio nigricante, floribus albis Boce. muf. 827. Spec. pedem.  
p. 41. t. 8.

Persicaria alpina Persicaria folio, non maculoso flore albo Campi. Spec. p. 29.

Polygonum caule erecto, foliis ovato lanceolatis, subhirsutis spiculis granis  
calatis Hall. bot. n. 1564 Mefc: Taur: All. Tom. 5. p. 94.

Polygonum alpinum All. fl. Ped. n. 2049. tab. 68. fig. 1.

Habita in pratis alpium 2

Paulis pedaliis exstans ramosis striatis, raro pilosis. Sola petiolata  
attenuata, base <sup>decurrente</sup> <sup>expansa</sup> subovata subbasim mollescens villosa, 3 foliis acutis  
vel minora, stipulae cæsio pilosa. In flore ferunt catenulae  
ultimus et apice ramosus. Cui dichotome ramosiss patent. Stamina 9. 7. 8. Styli 2.  
ramosus

Gmelin. tab. 3

ultimus deprecta.

perfoliatum Polygonum Colic triangularibus, caule aculeato, foliis perfoliatis folio  
fringedentibus subrotundis Lin. Spec. pl. p. 521 & Burm. Ind. g. t. 31. fig. 3 - 1. V.  
p. 370.

Tagotritio simili spicosa minor fructu. Plut. amalch. 87. t. 3. 98. fig. 1

Habitat in India

similis P. sagittata et anfolio. Caule herbaceo angulatus, adspicere aculeis numero  
si recurvatis petiolis et pedunculis. Solia basi linearata, interdum <sup>superiora</sup> hastata  
ta ~~intervallum~~ superiore sagittata auriculis angulatis, sope peltata  
calycis quam longa avenia trinervia: nervis aculeatis <sup>genera</sup> vel pinnate oppositifolii  
stipula integerrima. Pedunculi ad apicem caleli, superne stipula  
perfoliata. Racemi semipellucidi pauciflori.

1. Persicaria Polygonum floribus hexandris digynis, specie ovato oblongis, foliis lanceolatis,  
Aripulis ciliatis Lin. s. V. pag. 377. Pl. Dan. t. 102.

Pulexaria foemina Brounfeld.

Persicaria Dodon.

Persicaria mitis maculosa et non maculosa Bauch. Pl. 101.

Persicaria mitis Bauch. h. 43. p. 779.

B

B. Persicaria Hall.

Habitat in Europa cultio  
Pauli purpureans fñatur. Folia pediolata <sup>dente</sup> pubescens uti Ampelis  
et pedunculi

Drapae freminae collig. et Herbarum descriptio.

videatur num vaneta & addenda est ulterius descorbenda Specimen herbarium nile  
valeat &

33. *Polyg. foliis sagittatis* <sup>aunculis lanceolatis acutis</sup>  
*Caulis aculeato Lin. S. V. p. 398. Gmel. fib. 3. p. 65.*  
*f. 13. fig. 2.*

Planta per tenore novo belga Laet Amer. 73. t. 74.

Sagittatio pinus, angustiori folio, convolvoreli modo scandens, caule spinosum  
eis deflexis densius obfuso Plak. mant. 74. t. 394. fig. 5.

Heltine caule erecto aculeis reflexis et aperato Hort. Cliff. 151 t. 12.\*

Habitat in Virginie, Marylandia, Libano madidi

Intendum scandit.

Diversa ut apparet a dicta ha- non vidi

24 Bellardi *Polygonum* floribus octandis trigynis, foliis lanceolatis stipulis laevis  
subspicatis amorphis  
ciliatis

*Polygonum Bellardi* erectum floribus axillaribus octandis trigynis  
foliis elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis All. fl. Rep. no 2052.  
tab. 90. fig. 2. \*

Habitat in arvis.

Planta pedalis tota glabra. Caulis superne his vel semel divisi  
erectus. Folia petiolata polliciana et ultra utrinque acuta  
Rami in fasciam deflexi foliferorum defentes. Flores  
spatios pollicari remoti foliari cum foliolo ad basim per numero  
minuto flore longiore

vvundulatum Polygonum floribus ordinatis trigynis racemosis foliis lanceolatis attenuatis  
undulatis siccis vellosis. Murr. in Com. gött 1774. p. 34 t. 5. Pl. V. p. 378.  
Polygonum sibiricum: floribus ordinatis trigynis racemosis foliis orato lanceola-  
tis undulatis scabris, stipulis hirsutis Lin. Suppl. pag 238.

Habitat in Siberia

Lestaceus  
Saxos. P. divaricati. Caulis erectus bifide divaricatus glaber purpurascens. Sola  
petiolata, angusto lanceolata obtusifolia, b. f. tri-nervia lata, basi undu-  
lata, extrospicem plana. Hypo, rara velosa + pigrorum lanceana et  
et redimicula folia + oblique trinervia arida, nervosa. Interno componeatur  
cau ruminorum folie floralea setacea. Bractea ciliata.

4 virginianum Polygonum floribus pentadontis semidigynis, corollis quadripliciis  
qualibus, foliis oratis Lin. L. V. p. 377.  
Persicaria trifolia maculosa virginiana, flore albo Morif. h. 2. p. 509  
Raj. h. 103.

Habitat in virginia

Caulis sesquipedalis erectus, lata <sup>ut ploca</sup> plena summa, pelis rara adpresso. folia  
breve petiolata, loba <sup>ut ploca</sup> polycana acuta, latiora quam in  
veluti plurimi transversi paralleli, veluti <sup>ut ploca</sup> terminalis terminalis fissa interdum unius vel alter <sup>ut foliorum</sup>  
ut rugae oculo annato supermis extillis. Flores remoti pedicellati e vaginis oblique  
velli raro rad presso truncatis ferrugineis. vel 2.

37 Tataneum Polygonum foliis cordato-ligulatis, caule eremi erecto, feminisibus pub  
dentatis Lin. S.V. p. 378. Gent. pl. 3. p. 64. t. 13. fig. 1.  
Dagotrichum fibricum Act. Holm. 1744. p. 117. t. 4.  
Dagopyrum erectum Griseb. apud Amon Ruth. 242.  
Habitat in Tataria C.  
Similis Dagopyro. ad Cauli crassior. folia majora acuta nec superne attenuata in diametra longitudine ferre foliis. Racemi simplici; floribus distans. Semina majora angulis dentatis

26 Divaricatum *Polygonum* floribus octandis Virginis racemosi, foliis lanceolatis, caule  
Divaricato rotulo Lin. I. V. p. 370  
*Sagopyrum* orientale ramosum et multiflorum perenne folio Tournes.  
Corol. 39. Bust. c. cent. 2. p. 31. t. 31.  
Perenne montana, foliis longioribus angustioribus, floribus racemosi  
Amm. Ruth. 240  
Persicana caule diffuso Gmel. fil. 3. p. 50. t. 11. fig. 2. mala  
B. *Polygonum* grexi paniculatum Gmel. fil. 3. p. 57. t. 11. fig. 1.  
Habitat in Siberia 4 internodis quadriplicaria  
Caules ramosi muri decidui Tomis statui. folia per filicii basi attenuata  
Apula truncata angusta, triplacina, glabra Specie paniculata, racemosa  
ramulis racemulis remotis, volucans. Bractea membranacea floruvia  
e fragalo