

# Diagnosis preliminares de Maláquidos ibéricos nuevos (Col. Malach.)

POR

ANSELMO PARDO ALCAIDE.

## *Hypebaeus ramirezi* sp. nov.

Muy afin a *H. virgineus* Abeille, del Oranesado y región nord-oriental de Marruecos, y de la que difiere por sus antenas más cortas, no sobrepasando el tercio basal de los élitros, y de artejos proporcionalmente más cortos y robustos, por su pronoto con las márgenes laterales redondeadas, por sus élitros más mates, más finamente chagrinados y proporcionalmente más largos y más dilatados posteriormente y por sus patas menos gráciles con los fémures posteriores negros.

Long.: 2,4 mm. Anchura máx.: 1 mm.

Loc.: Cádiz, San Roque, IV-1955, V-1956, V-1957, J. Ramírez leg.

Holo-, alo- y paratipos en nuestra colección.

## *Ebaeus suarezi* sp. nov.

Próximo a *E. thoracicus* (Fourcroy), a cuyo grupo pertenece por su análoga distribución cromática y pigidio fuertemente entallado, pero del que difiere por sus antenas más gráciles con artejos proporcionalmente más largos y cilíndricos, por sus élitros un poco más deprimidos por encima y con puntuación menos definida, y sobre todo, en el macho, por presentar el ápice de estos órganos truncado y el pliegue casi perpendicular a la sutura, formando con el del otro lado un ángulo abierto de más de 180°, por su apéndice externo grueso y muy convexo, sin costilla dorsal y en posición poco oblicua en relación con el plano vertical del insecto.

Long.: 2,5 mm. Anchura máx.: 1,2 mm.

Loc.: Granada, Jubiles, VI-1953, J. Suárez, A. Cobos, A. Pardo, J. Mateu leg.

Holo-, alo- y paratipos en nuestra colección.

**Ebaeus rosali** sp. nov.

Del grupo de *E. collaris* Erichson y *E. contemptus* Pardo y muy semejante a ambos por su análoga disposición cromática y tamaño. Difiere, sin embargo, de las dos especies citadas por sus palpos maxilares con el último artejo presentando su extremidad estrechamente truncada, por sus antenas con el primer artejo no manchado de negro por encima, por sus fémures posteriores totalmente negros, por las tibias del mismo par casi por entero de este mismo color, por la mancha apical amarilla de los élitros arqueada por delante y ocupando algo más del tercio de la longitud elitral, por la depresión o pliegue de la extremidad de estos órganos poco oblicuamente dispuesta y abarcando solamente la mitad de la truncadura apical, por el apéndice interno con su extremidad superior arqueada hacia atrás, bruscamente ensanchado en su mitad inferior y presentando en su base dos crestas cónicas o tubérculos bien desarrollados, y por su apéndice externo, bastante excavado a lo largo de su borde superior y sobre el diente inferior.

Long.: 3,6 mm. Anchura máx.: 1,7 mm.

Loc.: Segovia, San Rafael, 22-VI-1953, J. Rosal leg.

Holotipo (♂) en nuestra colección; paratipo en colección Rosal.

**Attalus tristis zarcoi** ssp. nov.

Difiere de la forma típica por su cuerpo más esbelto, menos dilatado posteriormente, por su pronoto menos transversal, por su color bronceado-dorado y, en fin, por sus antenas con artejos menos transversos y menos triangulares.

Long.: 2,25 mm. Anchura máx.: 1,2 mm.

Loc.: Málaga, III-1946, A. Cobos leg. Una nutrida serie sobre flores de *Cistus albidus* Linné.

Holo-, alo- y paratipos en nuestra colección.