

什么是乙型肝炎？

乙型肝炎病毒是一种攻击肝脏的病毒。如不及时治疗，可能会导致肝衰竭和肝癌。

据估计，全世界有 2.96 亿乙型肝炎患者。但许多人对自己是否感染一无所知，因为他们感觉身体并无异样或不适。

乙型肝炎主要通过接触感染者的血液或体液，在人与人之间传播。

乙型肝炎与怀孕

若您目前怀孕，那么作为产前护理的一部分，您应抽血检查是否患有乙型肝炎。

若您感染乙型肝炎，那么在分娩时会将乙型肝炎传染给新生儿。

若您怀孕并患有乙型肝炎，那么宝宝在出生时接种一系列乙型肝炎疫苗，便可防止感染。



如需获取更多信息：

Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, 疾病控制与预防中心)
www.cdc.gov/hepatitis/hbv/

HepB Moms
www.hepbmoms.org (英文)



DOH 420-406 May 2022 Simplified Chinese

若您需要本文档的其他格式，请致电 1-800-525-0127。失聪或听障客户，请致电 711 (Washington Relay) 或发送电子邮件至 civil.rights@doh.wa.gov。

资料来源：CDC, Protect Your Baby for Life

乙型肝炎：
为保护您和宝宝，
您需要了解
一些重要事项





保护您的宝宝免于感染乙型肝炎

宝宝在出生后 24 小时内应接种第一剂乙型肝炎疫苗。若您的乙型肝炎检测呈阳性，那么宝宝在出生后 12 小时内必须注射乙肝免疫球蛋白 (HBIG)。

宝宝需要接种全部 3 剂乙型肝炎疫苗和注射 HBIG，以防止他们感染乙型肝炎。宝宝出生后 9-12 个月应接受检测，以确定宝宝是否免于感染。

接种期限	乙型肝炎孕妇患者所生婴儿应
出生时	在出生时接种乙型肝炎疫苗和乙肝免疫球蛋白 (HBIG)
1-2 个月	接种第二剂乙型肝炎疫苗
6 个月	接种第三剂乙型肝炎疫苗
9-12 个月	接受检测，以确定宝宝是否免于感染

以下是保护宝宝的其他方法：

- 即使您患有乙型肝炎，也仍可以母乳喂养宝宝。但若您在母乳喂养时，乳头破裂和出血，请与医生联系，医生会为您提供多种方案。
- 请妥善保存乙型肝炎疫苗接种记录，就诊时请随身携带。
- 您的家人也应接受乙型肝炎检测并接种疫苗。

乙型肝炎对于我的宝宝是否危险？

若新生儿感染乙型肝炎，那么他们患上终身慢性肝炎的几率高达 90%。

如不及时治疗，那么约四分之一的乙型肝炎患儿会出现严重的肝病，如肝损伤、肝炎或肝癌。

庆幸的是，只要接种非常安全有效的疫苗，即可防止新生儿感染乙型肝炎。

若您不是乙型肝炎患者

您仍可接种安全有效的疫苗，保护自己和宝宝。务必要接种全部剂次！

接种期限	婴儿应
出生时	在出生后立即接种乙型肝炎疫苗
1-2 个月	接种第二剂乙型肝炎疫苗
6 个月	接种第三剂乙型肝炎疫苗

若您患有乙型肝炎，要尤为关注自己的健康状况

您需要接受额外检测，以检查肝脏健康状况，并确认是否需要治疗。

乙型肝炎患者可接受抗病毒药物的治疗。但并非所有患者均需要治疗。

在服用任何处方药、非处方药、补充剂或维生素之前，请咨询医生，因为某些药物可能会伤害肝脏。

接种甲型肝炎疫苗对您也大有裨益。分娩后，请继续前往医生处复查，以监测感染情况。