

NOVAS OCORRÊNCIAS DE MUSGOS (BRYOPHYTA) PARA A SERRA DOS CARAJÁS-PA. Moraes, E. N. R.¹ ; Lobato, R. C. L.². ¹ Estagiária / Museu Paraense Emílio Goeldi.

2 Pesquisadora Titular / CBO MCT/Museu Paraense Emílio Goeldi (erykamoraes@bol.com.br)

Ao se realizar o estudo das amostras de musgos (Bryophyta) coletadas durante o inventário das briófitas da Serra dos Carajás, no Estado do Pará, foram identificadas, utilizando a metodologia usual de estudos taxonômicos, cerca de 89 espécies e 3 variedades de musgos. Dessas espécies, duas são novas ocorrências para a Amazônia Brasileira e Estado do Pará: *Leucomium steerei* B.H. Allen & Veling e *Fissidens weirii* Mitt. Uma outra espécie é nova ocorrência apenas para o Estado do Pará: *Phylodon truncatulum* (Müll. Hal.) W.R. Buck. Este trabalho trata dessas novas ocorrências, incluindo indicação da literatura onde as espécies estão descritas e ilustradas, comentários taxonômicos e morfológicos e distribuição geográfica. Essas novas ocorrências somam-se às verificadas no início desse trabalho, quando foram identificadas as espécies *Bryum subverticillatum* (Broth.) Ochi, *Porotrichum plicatum* Mitt., *Lepidopilum scabrisetum* (Schwägr.) Steere e *Lepidopilum stolonaceum* Müll. Hal., evidenciando a importância desse tipo de estudos para o conhecimento da flora do Estado do Pará.