


ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ




ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, MD, MsC, PhD

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΡΙΑ


ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΠΘ

OOGENESIS




SPERMATOGENESIS




Γαμετογένεση

- Παραγωγή γαμετών → Σπερματοζωάριο (σπερματογένεση)

Ωοκύτταρο (ωογένεση)



Ανατομία σπερματοζωαρίου



Φάσεις γαμετογένεσης

- Μετανάστευση βλαστικών γεννητικών κυττάρων στην αρχέγονη γονάδα με ταυτόχρονη διαφοροποίηση
- Αύξηση του αριθμού τους με **μίτωση**
- Παραγωγή απλοειδών κυττάρων με **μείωση**
- Ωρίμανση

Κοινή προέλευση


Αρχέγονο γεννητικό βλαστικό κύτταρο



Προέρχονται από το λεκιθικό ασκό και μεταναστεύουν στην αρχέγονη γονάδα έως την 6^η w.



Υφίστανται πολλαπλασιασμό




Γονάδα άρρενος: τα επιθηλιακά κύτταρα που περιβάλλουν τα γεννητικά βλαστικά κύτταρα διαφοροποιούνται στα στηρικτικά κύτταρα Sertoli.




Μίτωση


- Πρόφαση: συμπύκνωση νηματίων χρωματίνης και μετατροπή τους σε μιτωτικά χρωμοσώματα.
- Μετάφαση: πλήρης συμπύκνωση και διάταξη στο κέντρο του κυττάρου σε ζευγάρια που αποκαλούνται χρωματίδια και ευθυγραμμίζονται στους αντιθετους πόλους του κυττάρου.
- Ανάφαση: διαίρεση κεντρομεριδίου και διαχωρισμός των αδελφών χρωματίδων.
- Τελόφαση: δημιουργία πυρήνων στους δύο πόλους.
- Κυτταροκίνηση: διαχωρισμός του κυτταροπλάσματος σε δύο μεμονωμένα θυγατρικά κύτταρα.




Prophase




Metaphase




Anaphase



Telophase






Μείωση


- Ελάττωση του αριθμού χρωμοσωμάτων από διπλοειδή ($2n$) σε απλοειδή (n).
- Παρατηρείται μόνο στα γεννητικά κύτταρα.



- Σπερματογόνιο  4 σπερματοζώαρια (απλοειδείς γαμέτες)
- Ωογόνιο  1 ωάριο + 3 πολικά σωμάτια



Μείωση



1^η μειωτική διαίρεση

Αριθμός χρωμοσωμάτων από **2n => n**

Διπλοειδή => Απλοειδή

Πρωτογενές σπερματοκύτταρο => Δευτερογενές σπερματοκύτταρο

Πρωτογενές ωοκύτταρο => Δευτερογενές ωοκύτταρο



2^η μειωτική διαίρεση

Κάθε χρωμόσωμα (2 χρωματίδες) διαιρείται => κάθε χρωματίδα μετακινείται τυχαία σε διαφορετικό πόλο της μιτωτικής ατράκτου.


Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων παραμένει σταθερός (23)




- Μείωση αριθμού χρωμοσωμάτων
- Τυχαία κατανομή μητρικών και πατρικών χρωμοσωμάτων μεταξύ των γαμετών.
- Ανάμειξη μητρικών και πατρικών χρωμοσωματικών τμημάτων => ανασυνδυασμένο γενετικό υλικό

Meiosis

Definition, purpose, stages, applications with diagram



What's the difference....



Σπερματογένεση




Οι διαδικασίες μετατροπής των σπερματογονίων (διπλοειδικά κύτταρα) σε ώριμα σπερματοζωάρια (απλοειδικά κύτταρα).

- Λαμβάνει χώρα στους όρχεις (σπερματικά σωληνάρια)
- Από την εφηβεία και σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός άνδρα.




ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 64-74 μέρες (στον άνθρωπο)



Όρχεις => Λόβια => Σπερματικά σωληνάρια

1^η φάση σπερματογένεσης

ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΣΗ : Αύξηση αριθμού σπερματογονιών με επανειλημμένες μιτώσεις




2^η φάση σπερματογένεσης

Τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα ($2n$, $4c$)
(θυγατρικά κύτταρα των σπερματογονίων
τύπου Β) προχωρούν στο διπλασιασμό του
DNA και μπαίνουν στη ΜΕΙΩΣΗ.

↓
1^η μειωτική διαίρεση

Δευτερογενή σπερματοκύτταρα ($1n$, $2c$)



3η φάση σπερματογένεσης




Δευτερογενή σπερματοκύτταρα



2^η μειωτική διαίρεση

Σφαιρικές σπερματίδες (πρώιμες σπερματίδες)

σπερμιογένεση + σπερμίαση
(απώλεια κυτταροπλάσματος)

Διαφοροποίηση σε ώριμα σπερματοζωάρια (όψιμες σπερματίδες)



a**b**

Κύτταρα Sertoli:

- Στήριξη, θρέψη, προστασία των αναπτυσσόμενων σπερματογόνων κυττάρων
- Φαγοκυττάρωση υπολειμματικών σωματίων (σπερμιογένεση) και εκφυλισμένων σπερματογόνων κυττάρων
- Απελευθέρωση σπερματοζωαρίων στον αυλό του ΣΣ (σπερμίαση)

Σπερμιογένεση


Τελικό στάδιο σπερματογένεσης όπου:

- Σχηματίζεται η ακροσωμιακή καλύπτρα
- Τοποθέτηση σπερματίδας με κατεύθυνση
- Επιπέδωση και επιμήκυνση πυρήνα
- Μετακίνηση κυτταροπλάσματος προς το οπίσθιο τμήμα του κυττάρου
- Συμπύκνωση πυρήνα
- Σχηματισμός αυχένα


ΣΠΕΡΜΙΑΣΗ: απαγκίστρωση από τα κύτταρα Sertoli και απελευθέρωση στον αυλό του σπερματικού σωληναρίου.



Μετακίνηση και τελική αποθήκευση στην επιδιδυμίδα, όπου καθίστανται λειτουργικά ώριμα.



Συνοψίζοντας.....



Είδος κυττάρων	Αριθμός χρωμοσωμάτων	Γενετικό υλικό	Διαδικασία
Σπερματογόνια	46	2N	Σπερματοκύτταρη γένεση
Σπερματοκύτταρα 1 ^{ης} τάξης	46	2 N	Σπερματιδογένεση (μείωση I)
Σπερματοκύτταρα 2 ^{ης} τάξης	23	1N	Σπερματιδογένεση (μείωση II)
Σπερματίδες	23	1N	Σπερμιογένεση
Σπερματοζωάρια	23	1N	Απελευθέρωση

Όριμο σπερματοζώαριο


Κεφαλή: περιέχει τον συμπυκνωμένο πυρήνα που καλύπτεται από την ακροσωμιακή καλύπτρα.

Αυχένας: βραχύ τμήμα της ουράς που συνδέει την κεφαλή με την ουρά.

Κυρίως τμήμα ουράς: το πιο μακρύ τμήμα της ουράς. Αποτελείται από το αξόνημα, περιβαλλόμενο από τις 7 επιμήκεις ίνες και από ένα ινώδες έλυτρο (επενδυτικές κυκλοτερείς ίνες).

Μέσο τμήμα ουράς: αποτελείται από το αξόνημα, περιβαλλόμενο από τις 9 επιμήκεις ίνες και από έλυτρο σπειροειδών μιτοχονδρίων. Τα μιτοχόνδρια σταματούν στον δακτύλιο.

Τελικό τμήμα ουράς: αποτελείται μόνο από το αξόνημα.



Quiz...???




Ωογένεση...



Διαδικασία σχηματισμού από τα ωογόνια των πρωτογενών ωοκυττάρων.


6^η-9^η w: μετανάστευση αρχέγονων γεννητικών κυττάρων στην αρχέγονη γονάδα => διαφοροποίηση σε ωογόνια

- Έναρξη κατά τη διάρκεια της **εμβρυϊκής ζωής**.
- Από 9η w έως τον 6^ο m : τα ωογόνια υφίστανται μιτώσεις.
- Τα ωογόνια συνδέονται μεταξύ τους διαμέσου κυτταροπλασματικών γεφυρών ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη είσοδος μιας ομάδας ωογονίων στη μείωση.
- Ήδη από τη 12^η w της κύησης κάποια ωογόνια πολλαπλασιάζονται με μίτωση, αυξάνονται σε μέγεθος και διαφοροποιούνται σε **πρωτογενή ωοκύτταρα**.
- Μέχρι και την ήβη, όλα τα πρωτογενή ωοκύτταρα είναι μπλοκαρισμένα στη πρόφαση της 1^{ης} μειωτικής διαίρεσης. Η ολοκλήρωση της 1^{ης} μειωτικής διαίρεσης συμβαίνει με την ωθυλακιορρηξία !!!!





Ωογένεση...

- Μετά το μετασχηματισμό των πρωτογενών ωοκυττάρων από τα ωογόνια το κάθε ένα από αυτά περιβάλλεται από μια στιβάδα ατρακτοειδών κυττάρων και σχηματίζεται το **αρχέγονο ωοθυλάκιο** (16η w).
- Στον 5^ομ της εμβρυϊκής ζωής υπάρχουν περίπου 7.000.000 αρχέγονα ωοθυλάκια σε κάθε ωοθήκη.
- Η ολοκλήρωση της 1ης μείωσης γίνεται κατά την εφηβεία πριν την ωορρηξία, οπότε λαμβάνει χώρα μια άνιση διαίρεση και προκύπτει το **δευτερογενές ωοκύτταρο και 1ο πολικό σωμάτιο**. 
- **Η 2η μειωτική διαίρεση θα ολοκληρωθεί μόνο με τη γονιμοποίηση.**




Ωογένεση...




Ωογένεση...


- Ατρησία: η διαδικασία εκφύλισης των ωογονίων και των πρωτογενών ωοκυττάρων από τον 5^ο μήνα της ενδομήτριας ζωής.
- Στα νεογέννητα θήλεα: υπάρχουν περίπου 1.000.000 πρωτογενή ωοκύτταρα/ ωοθήκη.
- Η ατρησία συνεχίζεται κατά την παιδική ηλικία => Στην εφηβεία περίπου 400.000-500.000 πρωτογενή ωοκύτταρα στις δύο ωοθήκες. Από αυτά μόνο 400 καθίστανται δευτερογενή ωοκύτταρα και απελευθερώνονται κατά την ωορρηξία.
- **Αρχέγονο ωοθυλάκιο= πρωτογενές, ωοκύτταρο + πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα**
- Οι ορμόνες του γεννητικού κύκλου του θήλεος ελέγχουν την ωοθυλακιογένεση, την ωοθυλακιορρηξία και το ενδομήτριο.




Συνοψίζοντας



Normal ovary



	ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ	ΩΓΕΝΕΣΗ
Αριθμός γαμετών	Συνεχής παραγωγή	<ul style="list-style-type: none"> • Ασυνεχής παραγωγή • Συνεχής ελάττωση • Πλήρης εξάντληση κατά την εμμηνόπαυση
Αποτέλεσμα μείωσης	4 μικρά, λειτουργικά, κινητά σπερματοζωάρια	1 μεγάλο, ακίνητο ωοκύτταρο + 3 συρρικνωμένα πολικά σωμάτια
Εμβρυϊκή περίοδος	<ul style="list-style-type: none"> • Απουσία μειωτικών διαιρέσεων. • Σχηματισμός σπερματογονίων από την ήβη και μετά 	<ul style="list-style-type: none"> • Είσοδος στη μείωση και παραμονή στο στάδιο της πρόφασης. • Παραγωγή ολόκληρης της διαθέσιμης ποσότητας ωογονίων.



?????????????????