

2. CENTAUREA *Galactites*. E.P.

Von Riedlé bei St. Cruz Herb.
Jard. des plantes.

2. CENTAUREA *canariensis* W.

Enum. 928.

COMPOSITAE. CORYMBIFERAE.
DISCOIDEAE.1. ARTEMISIA *argentea*. Axeuxo.1. *ramosa* Sm.

A. ramosa foliorum laciniae teretiusculae, obtusae; folia dense tomentosa; authodia oblonga tomentosa. AnAr. *thuscula* Cav.? Lk.

300 1. ARTEMISIA *reptans* Sm.

A. reptans. Foliorum laciniae ultimae teretiusculae obtusae. Lk.

1. CONYZA *sericea*.1. *canariensis*.

C. can., ist von *C. inuloides* Ait. nicht verschieden. Lk.

1. CONYZA *saxatilis*. E.P.1. *Gouani*.

C. Gouani, scheint allerdings die wahre, welche nur in unseren Gärten jährig geworden. Lk.

Dimorphantes Gouani Cass., ein Geschlecht, das angenommen zu werden verdient. Ch.

ASTERINAE.

1. SENECKIA *palmensis* Sm. *Cineraria palmens. Nees.*
Bethencourtia palm.

Choisy. Turgayte.

Nees Horae Ber. tab. 24.

S. palmensis Sm. oder *Cineraria palmensis* Nees, scheint eine neue Gattung bilden zu müssen, welche ich *Bethencourtia palmensis* zu nennen vorschlage, zum Andenken an den ersten Eroberer der Insel Johann von Bethencourt.

Bethencourtia.

*Char. Involucrum aequale, 5 phyl-
lum 1 seriale. Flores disci 4-5 tu-
bulosi, hermaphroditi, corona 2-3
ligulati foeminei. Ovarium scabride
villosum. Pappus caducus simplex
barbellulatus. Receptaculum nu-
dum planiusculum.*

*Obs. Differt-Senecione et Cine-
raria involucro 5 phyllo 1 seriali,
a Cacalia et Kleinia floribus ra-
diatis etc.* Ch.

Die Erhebung dieser Pflanze zu einer neuen Gattung, scheint mir nicht zweckmäßig. Die Blüthen sind klein, daher die geringe Anzahl von Kelchblättchen, und einzelnen Blüthen. Hin und wieder sind doch kleine äußere Kelchblätter vorhanden, und an vielen Arten von *Senecio* fehlen auch diese, so dass die Unterscheidung von *Senecio* und *Cineraria* einer Verbesserung bedarf. Uebrigens kommt die Pflanze so sehr mit *Senecio* überein, hat auch so ganz das Ansehen der strauchartigen *Senecionen*, dass ich sie nicht trennen möchte. Lk.

1. CINERARIA *Tussilaginis.*3. *cruenta*.3. *populifolia, C. aurita*
l'Herit. M.

Sert. angl. 26.

1. *lanata*.310 2. *bracteata*.

C. bracteata Sm. *Cacalia echinata* L. *C. ramentosa* Vent. *C. fo-
liis radicalibus reniformi subrotundis sublobatis dentatis, scabris, sub-
tus non tomentosis, caulinis oblon-
gis, basi attenuatis amplexicauli-
bus, pedunculis subunifloris.* Die Blüthe groß und roth. Ähnlich *C. hybrida* W., aber unten nicht filzig. Lk.