





BIBLIOTHECA
CARCINOLOGICA
L.B. Holthuis

CAROLI A LINNÉ,

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI,

Archiatri Regii, Med. & Botan. Profess. Upsal. Acad. Paris.
Upsal. Holm. Petropol. Berolin. Imper. Londin. Angl.
Monsp. Tolos. Florent. Edimb. Bern. Soc.

S Y S T E M A
N A T U R Æ
P E R R E G N A T R I A N A T U R Æ,

Secundum Classes, Ordines, Genera, Species;
cum Characteribus, Differentiis, Synonymis,
Locis.

T O M U S P R I M U S.

EDITIO DECIMA TERTIA, AUCTA, REFORMATA.

C U R A

J O . F R I D . G M E L I N ,

Philos. & Med. Doctor. hujus & Chem. in Georgia Augusta Prof:
P. O. Acad. Cæsar. Naturæ Curiosorum & Electoral. Moguntin.
Erfordensis, necnon Societ. Reg. Scient. Goettingensis, Physicæ
Tigurin. & Metallicæ Membri.

L U G D U N I ,

Apud J. B. DELAMOLLIERE:

O JEHOVA,

Quam ampla sunt tua Opera !

Quam sapienter Ea fecisti !

Quam plena est Terra possessione Tua !

DAVID, Psalm. CII. 24.

S^Æ R^Æ M^{TIS} SUMMÆ FIDEI VIRO, ij

CELSISSIMO ILLUSTRISSIMOQUE

C O M I T I

D^{NO} C A R. G. T E S S I N,

Regis Regnique Suiogothici Senatori, Regiae Cancellariæ Præfidi,
ad Aulam Regiarum Celsitudinum Supremo Mareschallo, educationi
Seren. Princ. GUSTAVI Præfecto, Cancellario Academie
Aboensis, Ordinis S^Æ R^Æ Maj. Seraph. Equiti Aurato & Com-
mendatori, Equiti Aurato de Aquila nigra, nec non omnium
S^Æ R^Æ Maj. Suecicæ Ordinum Cancellario, Sacrum.

Cum quivis auctor speret se apud posteros gratiam
habere, et posse secum duratura nomina educere,
AUCTORI meæ fortunæ Libellum ultimo nunc offero:
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit;
ILLE mihi stipendum ab ordinibus Regni expetiit;
ILLE mihi spartam Medici classici procuravit,
ILLE mihi Munus, quo fungor, conciliavit;
ILLE mihi Titulum, quo distinguo, paravit:
ILLE me ad Serenissimos Reges introduxit;
ILLE me cuso Numismate posteritati commendavit;
ILLE meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quæ vellent calamo permisit agresti;
quare cana prius gelido desint abfinthia ponto,
quam nostro illius labatur pectore vulkus:

T A N T I MÆCENATIS:

Upsaliæ 1766,
d. 24 Maj.

Cultor devotissimus
C. A LINNÉ:
a 2

*Magnus est DEUS noster ;
& magna est potentia Ejus ,
& potentiae Ejus non est numerus.*

RATIO EDITIONIS.

SYSTEMA NATURÆ iteratis vicibus prodiit:

1. Leydæ 1735. Fol. imper. pag. 12. a me per I. F. GRONOVIUM.
Conspicuus tantum operis, & quasi Mappa Geogr.
2. Holmiæ 1740. Octavo pag. 80. a me ipso revisum.
Auctum animalium nomenclaturis, characteribus.
3. Halæ 1740. Quarto oblong. p. 70. per J. J. LANGEN.
Latino-germanice; ceterum idem cum 1.
4. Parisiis 1740. Octavo. pag. 103. t. 1. per B. JUSSIEUM.
Adiecta nomina Gallica. idem cum 2.
5. Halæ 1747. Octavo. pag. 88. per M. G. AGNETHLER.
Nomina Germanica; ceterum idem cum 2.
6. Holmiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. auctum a me ipso.
Characteres effent. Vegetabilium. Species Animal & Lapid.
7. Lipsiæ 1748. Octavo. pag. 232. t. 8. per Typographum.
Nomina Germanica; ceterum idem cum 6.
8. Holmiæ 1753. Octav. p. 13. Vegetabilia per J. J. HAARTMAN.
At regnum Lapideum Scaræ 8vo per H. M LLER.
9. Leydæ 1756. Octavo. pag. 226. per GRONOVIUM.
Paucissima de Avibus, Piscibus. idem cum 6.
10. Holmiæ 1758. Octavo. Longe auctius factum a me ipso.
11. Lipsiæ 1762 Octavo. furtim prodiit vitiosa.
Nil additum.
12. Holmensi hac propria ultima penultimaque editione.
Species Animalium omnium mihi cognitorum cum Diferentiis;
Synonymis, Locis, nominibus Trivialibus.
Methodus Animalium ex novis observatis reformata.
Piscium in primis nova methodus cum Auctorum observatis
radiis pinnarum.
Plantarum reformati characteres, emendatæ differentiæ variae.
Lapidum plures species, observationes, & omnium Nomina
Trivialia.
Observationes in Regna Naturæ novæ, cum introductione
in Naturam.

COLLECTANEA, quæ obtinere potui, disposui; in primis adju-
varunt

S. M. ADOLPHI FRIDERICI Regis Museum T. 1. Holm. 1754.
fol. Prodromus Tomi 2. Holmiæ 1764. Octavo.
Utrumque animalibus exoticis refertum.

* vij
S.Æ LOUISÆ ULRICÆ Reginæ Museum. Holmiæ 1764. Octav.
In Conchyliis & Insectis stupendum.

C. G. TESSIN Museum. Holm. 1753. Fol.
In Lapidibus & Conchyliis magnificentum.

C. DE GEER Museum :
Amphibiis, Insectis aliisque rarioribus dives.

UPSALIENSIS Museum Academiæ :
Ex Animalibus undiquaque conquisitis.

STOCKHOLMENSIS Museum Academiæ Scientiarum :
Variis pulchris naturalibus scatens.

ITINERA varia hujus caussa institui :

Iter Lapponicum (1732) ineditum.

Iter Dalekarlicum (1734) ineditum.

Iter Oelandicum (1741) Holmiæ 1745. Oð. suec.

Iter Gotlandicum (1741) Holm. cum præcedente. Oð.

Iter Westrogothicum (1746) Holm. 1747. Oð. suec.

Iter Scanicum (1749) Holm. 1751. Oð. suec.

Fauna Suecica. Holmiæ (1746) duplo auctior illa 1761. Oð.

Amœnitates academicæ. Holmiæ 1749-1763. Oð. Vol. 6. (VII.
1769. VIII. IX. cur. Schrebero Erlang. 1785.)

Discipulorum quondam meorum instituta Itinera, mihi, ab
exterorum gazophylaciis remoto, proficia.

C. TERNSTROEM in Asiam (sed periiit in Poulicandor) 1745.

P. KALMII in Pensylvaniam & Canadam. 1747.

Iter Americ. sept. Holm. 1753-1760. Oðav. suec. Vol. 3.

L. MONTINI in Lapponiam Lulensem 1749.

F. HASSELQUIST in Ægyptum & Palæstinam. 1749.

Iter Palæstinum. Holm. 1757. Oð. suecic.

O. TORENII in Malabariam & Suratte. 1750.

P. OSBECKII in Chinam & Javam. 1750.

Iter Indiae orient. Holm. 1757. Oð. suec.

P. LOEFLINGII in Hispaniam & Americanam. 1751.

Iter hispanicum. Holm. 1758. Oð. suec.

P. J. BERGII in Gotlandiam insulam. 1752.

M. KÆHLERI in Italianam & Apuliam. 1752.

D. SOLANDRI in Lapponiam Pitensem & Tornensem. 1753.

D. ROLANDRI in Surinamum & Eustatium. 1755.

A. R. MARTIN in Spitzbergam. 1758.

C. ALSTROEMER in Europam australem. 1760.

J. FALK in Gotlandium. 1760.

FINEM Operis obtinuero, si inde

5

Peregrinatores dignoscant notiora antea naturalia.
Curiosi attentiores, *Musea* intrantes, visa intelligent.
Docti nova, nec trita, *adis* suis inferant.
Scientia facilius augeatur, sepositis vulgatoribus.
Nomina magis stabantur, in primis *Trivilia & Generica*.
Economiae fundamenta sternantur.
Teleologiae primæ lineæ ducantur.

His utere L. B. donec alii plura præstantioraque sistant.

Upsaliæ 1766.

Docuisti me, DEUS, a juventute mea,
& usque nunc pronunciabo Mirabilia Tua.

R A T I O

NOVÆ HUJUS EDITIONIS.

NOTA nimis sunt atque agnita , tot tantisque malevolorum detractorum in divos quoque manes insurgentium obtrectationibus non extenuata , immortalis Viri , cuius nomen in fronte gerit hic liber , de restauranda historiæ naturalis scientia merita , ut illis celebrandis inhærere , supervacaneus videatur labor : Et ne tironem quidem naturalis scientiæ latet , quot quantaque commoda præbeat rerum naturalium studiosis catalogus , in quo uno quasi intuitu , quæcunque novimus corpora naturalia , in suas classes , ordines , genera digesta ac distributa sistuntur , quæ in aliorum Virorum operibus arbitrario ordine disposita , per numerosissima volumina dispersa , verbosissime aliquando descripta vix invenias . Sed inter laudes , quas hoc etiam B. Viri opus meretur , hæc certe minima est , in qua omne ponunt ejus meritum , qui nomenclatoris titulo eum insignientes ludibrio exponere virum tot meritis illustrem student : Altera enim est hujus operis , de qua nemo aliis ante eum jure gloriari potest , prærogativa ; descripta sunt omnia , quotquot sua ætate cognita erant , corpora naturalia , aut a sagacissimo atque indefesso Viro ipso observata , aut a discipulis numerosis in omnem terrarum orbem exeuntibus notata , aut incredibili industria ex aliorum fide dignorum Virorum mutuata vel operibus , vel narrationibus .

Omnibus numeris absolutum opus , quis æquus ab humano ingenio exspectabit ! quis sanæ mentis præstolabitur in campo tantopere immenso ! Quare hallucinantem hinc inde magnum Virum , notas aut generis aut speciei aliquando imperfectionis justo exponentem , limites utriusque & varietatis non

semper curatissime definientem, posteris, quæ emendari addique possint stabilito jam ædificio, relinquentem, quis vituperabit, aut extra officii sui regiones vagatum dicet, quum tantum tentaret opus! Adde quod plurimæ & emendationes & accessiones a dignis tanto Præceptore discipulis proficiuntur.

Quum a duodecima systematis naturæ editione quatuor jam & ultra elapsa sint lustra, conjunctis tot tantorumque naturæ scrutatorum indefessis studiis, scrutinis, itineribus, non potuit non fieri, quin quotidie fere nova detegerentur, atque adeo cresceret corporum naturalium cognitorum numerus, ut, his ad ordines & genera sua relatis, novam quasi faciem indueret naturæ systema, quod quidem nomen suo operi imponere placuit B. Linnæo,

Non inutilem ideo, nec ingratiani naturum me esse operam spero, dum bibliopolæ etiam desideriis satisfacturus, novam hanc, & posteriorum laboribus auctam egregii operis editionem sisto, parum mutatam, si faciem & ordinem species, non nisi duce principe quodam, ex Linnæi præfertim discipulis, viro, & suadente natura ipsa hinc inde alteratum, sed recentius inventis ac detectis generibus & speciebus, suo singulis loco insertis, multopere auctam, amplioribus, ex posteriorum laboribus haustis descriptionibus æque ac synonymis passim locupletatam, ex autoptarum testimoniosis & curatioribus scrutinis emendatam.

Congessi igitur & digessi, quæcumque ad hunc meum finem facere poterant, vastissimo librorum, quo Regia Munificentia hanc musarum sedem exornavit, thesauro, & amica eorum, qui huic administrando præsunt, opera, mirifice adjutus; si quis, hic meus labor est, quamvis ejus etiam partem non exiguum in historia quidem mammalium ordi-

nanda curis Ill. *Schreberi*, & *Pennanti*, potissimum B. *Erxleben*; in enarrandis avium speciebus *Lathamo*; in disponendis insectis Ill. *Fabricio*, & summe rever. *Goezio*; in redigendis ad suum locum recentius detectis testaceis summe rever. *Schaefferio*; in vermium reliquorum historia O. Fr. *Müller* ero; in plantis recensendis Car. *Linnæo* immortalis *Auctoris* filio, & præsertim conjunctissimo mihi Ill. *Murrayo*; in minerali regno *Cronstedtio*, ejusque commentatori *Werner*, *Generosiss.* a *Veltheim*, Ill. *Gerhardo* & *Kirwano*, B. denique *Bergmano* me debere, gratus profiteor.

Habes igitur hic catalogum non eorum modo corporum, quæ *Linnæo* suo tempore nota erant, sed eorum quoque, quæ post ejus fata egregiorum & illustrium ejus discipulorum, *Thunbergii*, *Sparrmanni*, *Falckii*, *Solandri*, *Dryandri*, *Forskahlii*, O. & I. Chr. *Fabricii*, O. Fr. *Müller*, *Brünnichii*, *Bjerkandri*, *Retzii*, *Fries Rotthoell*, *Schreberi*, *Murrayi*, *Ferberi*, *Pajkuhlii*, aliotum ejus vestigiis insistentium Virorum Illustrium *Pallas*, *Forsterorum*, *Jacquin*, *Sonnerat*, *Scopoli*, *Pennant*, B. *Leskii*, B. S. G. *Gmelini*, *Lepechinii*, *Georgii*, *Hablitzl*, B. *Güldenstedi*, *Kælreuteri*, *Gærtneri*, *Houttuyni*, *Storpii*, *Bowlesia*, *Molinæ*, *Sestini*, *Cetti*, *Comitis de Borch*, Equit. *Dolomieu*, *Kortis*, *Andreæ*, *Schrancii*, J. & B. Fr. *Hermannii*, *Carosi*, *Gili*, *Clavigeri*, *Bancroftii*, *Aubleti*, *Merrem*, *Gouani*, *Gottwaldi*, *Zimmermanni*, *Walbaumii*, *Boddærti*, *Blochii*, *Goetzii*, *Werner*, *Batschii*, *Broussoneti*, *Meidingeri*, *Laichartingii*, *Bergstræsseri*, *Schilleri*, *Fueßlini*, *Knochii*, *Herbstii*, *Cramerii*, *Drury*, *Seppii*, *Stollii*, *Schæfferi* & *Harreri*, *Geoffroæi*, *Fourcroy*, *Chemnizii*, *Martini*, B. *Walchii*, *Spengleri*, *Oederi*, *Veissii*, *Weberi*, I. *Milleri*, *Schmiedelii*, *Gisekii*,

Rothii, *G. Fr. Hoffmanni*, *Hedwigii*, *Curtis*, *l'Heritier*,
Gloxin, *Sagii*, *Monneti*, *Burtini*, *Sauvurii*, *Voigtii*,
Brückmanni, *Giraud Soulavie*, *Genßanii*, *Pini*, *Abild-*
gaardi, *Palazzo*, *La Peirouse*, *Wulfemi*, *Klipsteinii*,
Generosiss. de Trebra & Dietrich, *Illustriss. Com. a Ra-*
soumowski, & aliorum indefessa industria & sagacitate in-
notuerunt. Neque prætermissa sunt ea, quibus adversarii B.
Autoris, tot acribus censuris in eum investi, *Illustriss. Com.*
a Buffon, *Adanson*, *Camper*, *Laurenti*, *Hacquet*, *Medicus*
nostram hanc scientiam auxerunt. Nihil tamen superesse,
quod aut coævi aut posteri vel emendent vel addant, ut
glorier, ego quidem multum absum. Quicunque fata singu-
larum historiæ naturalis partium animo secum volvit, semelve
tentavit, constantes & perpetuas cujusdam corporis naturalis
eruere notas, quicunque luxuriosam naturæ in coloribus va-
rietatem e. g. in animalibus nostris domesticis (taceam eam,
quæ hybridæ generationi suos debet natales) novit, novit
præterea, in discernendis multis animalium præsertim avium
speciebus vix ulla dari notas, nisi a coloribus desumptas, novit,
easdem aves alio atque alio anni & ætatis (ne sexum dicam)
tempore, in alio atque alio climate soloque viventes, alio
atque alio viœ utentes, feras & domesticas, aliis atque aliis
non raro comparere formis & coloribus, novit, multa &
animalia & vegetabilia, potissimum marina & peregrina, im-
perfectius esse cognita, semel, non omni vitæ suæ tempore,
non in omnibus ætatis sexusque variationibus observata, alia
ad iconum fidem, ad solitaria, mortua, siccata, farta, in
spiritu vini asservata, variis artificiis (v. g. testacea) mu-
tata, alio aliœ modo paululum deformata & decolora exem-
pla esse descripta; facile ille videbit, ab eo perfectionis
fastigio longe adhuc abesse historiæ naturalis studium.

Quam hoc volumen sub prelo sudaret, hinc inde detecta sunt, quibus aut emendari aut augeri posset.

Ita felici omine accidit, ut zootomorum facile princeps, Ill. *Camperus* in Sirenæ Linnæi, ab *Ellifio act. anglic.* Vol. 56. nuperies delineatam, serpentibus vicitantem, in limo se occultantem incideret, & dissecandæ illius copia data, branchias utrinque tres veras membranis denticulatis discretas, dentes firmos & validos, ventriculum cordis unicum, intestina longissima & ampla deprehenderet, & ex iis concluderet, verum esse perfectumque pisces branchiostegum, proxime ceterum ad murænæ genus accedentem, quamvis pinnis pectoralibus tetractylis & ossiculis branchialibus tribus pinnatifidis a reliquis speciebus haud parum diversum.

Duas etiam pisces in oceano occidentali ad littus Bahūsiꝝ repertorum, ut videtur, novas species descriptis nov. act. Stockh. Vol. VII. trim. I. n. 9. *Euphrasen*, alteram ad insulam Kluedesholm, gobii, uncialem, nigro-punctatam, pinnæ dorsalis secundæ radiis 8-11, maculaque nigra utrinque ad basin caudæ facile discernendam, pinnæ dorsalis primæ radiis 7, pectoralium 15, ventralium coalitarum 8, analis 8, caudalis 12 conspicuam, a Ruuthensparro cognominatam; alteram in Kyrkesund obviam, cotti, supra fuscum subtus albam, scorpione minorem, capite spinoso, scabro, bicorni facile dignoscendam, membranæ branchiostegæ radiis 6, dorsalis prioris 8, posterioris 13, pectoralium 15, ventralium 4, analis 8, & caudalis 10 conspicuam, bubalis cognomine insignitam.

Detecta etiam fuit nuperius simiæ species, homini reliquis omnibus similior, a naso elegantiori nasalis dicta, cuius pleniorem descriptionem ab Ill. *Daubenton* exspectamus.

D. ban. Göttingæ, d. 16. Mart. 1788.

J. FRID. GMELIN.

I N T R O I T U S.

HOMO mundi intraturus theatrum quæritur QUIS sit : Unde ortus ? e stemmate Creationis ; Quo tendat ? ad vitam beatam ; Quid hic ? intueri naturam ; Quo munere ? CURIOSUM esse similemque quidem reliquis animantibus (quæ vorant , ludunt , pruriunt , generant , multiplicantur , dormiunt , commoda stabula quærunt , proximis sui generis inserviunt , vitam tuentur , sentiunt , percipiunt ,) sed nobiliorem , utpote qui curiosius observat quæ sensibus patent , indeque sapientius ratiocinando rite concludit , adeoque miratur pulchrum sapientis opus Artificis. O quam contenta res est Homo , nisi supra humana se erexerit ! Quid enim erat , cur in numero viventium positum se gauderet ? an ut Cibos & Potiones percolaret ? ut hoc corpus casurum peritumque farciret ? quæ tanta necessitas in fundum telluris intimæ hominem mersit , ut oblitus dierum , oblius fortunæ melioris , ab hoc se averteret ? puto certe multos ad sapientiam perventuros , nisi superbiæ magnæ fortunæ inflati , putassent se pervenisse. Sapiens utique est , qui fines respicit.

FINIS CREATIONIS EST GLORIA DEI EX OPERE
NATURÆ , PER HOMINEM SOLUM.

Tanto igitur magis nosse Naturam operæ pretium , quo nullum majus est ! neque enim quidquam habet in se hujus materiæ tractatio pulchrius , dum multa lateant futura usui , quam quod hominem Magnificentia sui detinet , nec mercede , sed Miraculo colitur ! Quota enim pars operis Tanti nostris oculis committitur , & quam multa , præter hæc , quæ vidi mus , in secretum eunt nunquam humanis oculis orientia ; neque enim omnia DEUS humanis oculis nota fecit. Multa etenim sunt , quæ esse audivimus , qualia autem sint , igno-

ramus ! quamque multa hoc primum cognovimus seculo ! & quidem multa venientis ævi populus , ignota nobis , sciet ! multa feculis tunc futuris , cum memoria nostri exoleverit , reservantur ! veniet tempus , quo ista . quæ nunc latent , in lucem dies extrahat & longioris ævi diligentia. Rerum enim Natura sacra sua non simul tradit ; initiatos nos credimus , in vestibulo ejus hæremus ; ejus arcana non promiscue , non omnibus patent ! reducta & in interiori sacrario clausa sunt ; involuta veritas in alto latet. Si in hoc juventus sobria , sui Creatoris memor , incumberet (*) , si hoc Majores docerent , & hoc Minores addiscerent , vix tamen ad fundum veniretur , in quo veritas posita est , quam nunc in summa Tellure , & levi manu quærimus. Magni omnino res est rerum Naturæ latebras dimovere , nec contentum exteriori ejus conspectu , intropicere & in divina secreta descendere ! *Senec.*

Intravi itaque densas umbrosasque Naturæ Silvas , hinc inde horrentes acutissimis & hamatis spinis , evitavi quotquot licuit plurimas , at neminem tam esse circumspectum didici , cuius non diligentia sibi ipsi aliquando excidat , ideoque ringentium Satyrorum cachinnos , meisque humeris insilientium Cercopithecorum exultationes sustinui ! incessi viam , & quem dederat cursum fortuna pereggi.

O J E H O V A !

Quam magnifica sunt Tua opera !
Vir insipiens non cognoscit ea ,
Stultus non animadvertis ea.

David.

(*) Confer. *Worm. mus. præfat.* i.

I M P E R I U M N A T U R Æ.

DEUM sempiternum , immensum , omniscium , omnipotentem exper-
gefactus a tergo transeuntem vidi & obliupui ! Legi aliquot ejus
vestigia per creata rerum , in quibus omnibus etiam in minimis ut-
fere nullis , quæ Vis ! quam Sapientia ! quam inextricabilis Per-
fatio ! Observavi *Animalia* inniti vegetabilibus , Vegetabilia
terrestribus , Terrestria telluri ; Tellurem dein ordine inconcusso
volvi circum Solem , a quo vitam mutuantur ; Solem demum circa
axis gyrari cum reliquis *Astris* , systemaque Siderum , spatio &
numero non definiendum , mediante motu in vacuo nihilo sus-
pensum teneri ab incomprehensibili Movente primo , ENTE EN-
TIUM (a) , Causa Caussarum , Custode Rectoreque universi , mun-
dani hujus operis Domino & Artifice . Vis illud FATUM vocare ,
non errabis , est ex quo suspensa sunt omnia . Vis illud NATURAM
vocare , non errabis , est ex quo nata sunt omnia . Vis illud PRO-
VIDENTIAM vocare , recte dices , est cuius consilio mundus actus
suos explicat (b) ; Totus est SENSUS , totus VISUS ; totus AUDI-
TUS , totus ANIMÆ , totus ANIMI , totus SUI ; Hujus extera
indagare non capit humanæ conjectura mentis (c) ; NUMEN ejē
credi par est , æternum , inimensi , neque genitum , neque crea-
tum (d) . Hoc sine quo nihil est , quod totum hoc fundavit & con-
didit , quodque oculos nostros & implet & effugit , cogitatione
tantum visendum est ; in sanctiore enim secessu Majestas tanta
delituit , nec ulli dat aditum nisi animo (e) .

MUNDUS complectitur omnia sub Jove , quæ in notitiam nostram
per sensus cadere possunt ; sunt hæc Astræ , Elementa , Tellusque
inenarrabili velocitate circumacta ; horum inoffensam velocitatem
procedere videmus æternæ legis imperio , nec ejē temere errantis
hunc ordinem , neque quæ temere coiverunt tanta arte pendere ,
ut terrarum gravissimum pondus sedeat (quasi) immotum , &
circum se properantis cœli fugam spelet (f) .

ASTRA sunt remotissima corpora lucida , quæ gyrantur motu per-
petuo , sunt hæc aut SIDERA , propria luce radiantia , ut *Sol* ,
remotioresque Stellæ fixæ ; aut PLANETÆ , a sideribus lucem

(a) Aristoteli . (b) Senec . quæst . II . 45 . hoc respectu , sed caute , ne effectus
sumatur pro causa . (c) Exod . XX . 4 . (d) Plin . Natur . II . 1 . 7 .
(e) Senec . VII . 31 . (f) Senec . I . 1 .

mutuantes, quorum primarii Solares : *Saturnus, Jupiter, Mars, Tellus, Venus, Mercurius*; secundarii, obsecundantes Planetis, ut *Luna Telluri*, aliisque; nec posse sine Cujode tantum opus flare; nec hunc Siderum discursum fortuiti impetus esse, nam quæ casus incitat saepe turbari & cito arietare debent (g).

ELEMENTA sunt corpora simplicissima, atmosphæram Planetarum constituentia, spatia inter Astra forte repentina:

IGNIS lucidus, resiliens, calidus, evolans, vivificans.

AER pellucidus, elasticus, siccus, obvolans, generans.

AQUA diaephana, fluida, humida, tranans, concipiens.

TERRA opaca, secca, frigida, quiescens, sterilis.

Sic tota hujus Mundi concordia ex discordibus constat (h).

TELLUS est globus planetarius, horis 24 rotatus, circum Solem quotannis in orbem actus, Elementorum atmosphæra obvelatus, rerum Naturalium stupendo cortice tectus, cuius cognoscendæ superficie studemus. Globus hic terraqueus est, cuius depresso-rem partem Aquæ inundant & Mare lente coarctandum; elatio-rem vero aquæ fugient sensim dilatandam in Continentem sicciam & habitabilem. Hæc Aquarum halitu, vi Aëris in nubes acto, irroratur, ut summi montes perennique nive Alpini Scaturigines in Fluvios perennes concurrentes eamque permeantes potum terrestri cibo addant in alimentum incolarum, dum Venti motum excitant tuis calore vivificatis corporibus. Omnia Elementorum alterni cursus sunt; quicquid alteri perit, in alterum transit; alternae sunt vices rerum (i).

NATURA lex immutabilis DEI, qua res est id, quod est, & agit, quod agere jussa est (Helmont.); Hæc opifex rerum, sui juris, docta a nullo edocta, saitus non facit; clam operatur; quod commodissimum in omnibus suis operationibus sequitur, nihil frustra, nihilque supervacaneum agit, dat singulis singula & omnibus omnia; Consuetudinem solam ardet. *Omnia adjuvabunt Naturam, ut Naturæ opera peragantur* (k).

NATURALIA sunt corpora cuncta Creatoris manu composita, Tellurem constituentia, in REGNA NATURÆ tria divisa, quorum limites concurrunt in Zoophytis.

LAPIDES corpora congesta, nec viva, nec sentientia.

VEGETABILIA corpora organisata & viva, non sentientia.

(g) *Seneca.* (h) *Helmontii definitio.* (i) *Senec. III. 10.* (k) *Senec. III. 29.*

ANIMALIA corpora *organisata & viva*, & *sentientia*, sponteque se moventia.

Non ad unam Natura forniam opus suum præstat, sed in ipsa varietate se jactat (l) *Ideoque ex aliis alias reparat natura figuræ, non uno contenta tenore valet, sed immutatas gaudet habere vires.*

REGNA Naturæ, Planetam Telluris constituentia, ideoquè tria sunt :

LAPIDEUM rude inhabitat interiora; a Salibus in Terris generatur; temere miscetur; casu modificatur.

VEGETABILE virens superficiem vestit, Radiculis bibulis terrena haurit; Foliis obvoltantibus ætherea respirat; calida metamorphosi declaratur in festivales Nuptias, generantes dispergenda intra præscriptas stationes Semina.

ANIMALE sentiens exteriora ornat; voluntarie movetur; respirat; ova generat; pellitur irata Fame, læta Venere, mortoquæ Dolore; prædando coërcet Vegetabilia Popularesque, ut omnium proportio perennet.

HOMO sapiens, creatorum operum perfectissimum, ultimum & summum, in Telluris Corrice, Majestatis Divinæ stupendis indicijs obtesto, constitutus, secundum sensus judicans artificium, admirans pulchritudinem, veneraturus Auctorem. Retrogrediendo per generationes multiplicatas vider *Creatorem*; Progrediendo per conservationem multiplicandam videt *Naturam*; ad utrumque invitant Pulchritudo, Mechanismus, Nexus, Fines, Commoda. Hic omnipotentia Divina nobilitat Terras in Vegetabilia; Vegetabilia in Animalia; hæc demum in Hominem, qui sapientiae radios reflectet versus majestatem radiantem duplicata luce. *Sic totus Mundus gloria divina plenus est* (m), *dum omnia creatæ opera Deum glorificant per hominem* (n), qui ex inerti humo, Dei manu vivificata, contemplatur auctoris sui Majestatem ex fine creationis, dignus hospes constitutus, Summi Entis præco. *Hæc contemplatio Naturæ evadit voluptatis cœlestis vestibulum*, cuius particeps *Animus in luce obimbulat & tanquam in terrestri corlo vitam degit* (o); *Nec pietas adversus Deum, nec quantitas hæc gratia debeatur, sine explicatione Naturæ intelligi potest*; *Homo enim ortus est ad contemplandum Deum, & Naturæ contemplatio est ad Dei admirationem proxima & apertissima via* (p).

(l) *Senec. VII. 27.* (m) *Esa. VI. 4.* (n) *David Ps. CXVIII.* (o) *Að. Holm.* (p) *Cicer. At mortuo Marco Aurelio milites creabantur imperatores, qui proprium nomen vix exarare noverant, dectosque pro pigris habe-*

SAPIENTIA, divinæ particula auræ, summum est attributum Hominis Sapientis, hæc juste judicat de iis, quæ sensus sunt, hi vero sunt res mere naturales circumstantes; Primus tum Sapientæ gradus est re's ipsa nosse. Notitia consistit in vera Idea objectorum, qua similia a dissimilibus distinguuntur Notis propriis, a Creatore rebus inscriptis; hanc notitiam ut cum aliis communicet, *Nomina propria*, non confundenda, singulis diversis imponat; Nomina enim si pereunt, perit & rerum cognitio. Hæc literæ elementaque erunt, quibus desitutus nemo naturam legit; quum ignorato genere proprio, nulla descriptio, quamvis accurate tradita, certum demonstret, sed plerumque fallat (q).

METHODUS, anima Scientiæ, indigitat, primo intuitu, quodcunque Corpus naturale, ut hoc corpus dicat proprium suum Nomen, & hoc nomen quæcunque de nominato corpore beneficio seculi innotuere, ut sic in summa confusione rerum apparenti, summus conspiciatur Naturæ ordo. Systema apte quinquies tantum subdividitur: sic

<i>Classis</i> ,	<i>Ordo</i> ,	<i>Genus</i> ,	<i>Species</i> ,	<i>Varietas</i> .
<i>Genus sumnum</i> ,	<i>G. intermedium</i> ,	<i>G. proximum</i> ,	<i>Species</i> ,	<i>Individuum</i> .
<i>Provinciae</i> ,	<i>Territoria</i> ,	<i>Parœciae</i> ,	<i>Pagi</i> ,	<i>Domicilium</i> .
<i>Legiones</i> ,	<i>Cohortes</i> ,	<i>Manipuli</i> ,	<i>Contubernia</i> ,	<i>Miles</i> .
<i>Nisi enim in ordines redigantur, & veluti in castrorum acies distri-</i>				
<i>buantur, tumultu & fluctuatione omnia perturbari necesse est</i> (r).				

NOMINA respondeant Methodo Systematicæ; sint itaque Nomina *Classium*, *Ordinum*, *Generum*, *Specierum*, *Varietatum*, Character *Classium*, *Ordinum Generum*, *Specierum Varietatumque Differentiæ*; nam nomina nosse oportet, qui rem scire velit, confusis enim nominibus omnia confundi necesse est (s). Primi itaque hominis actio, in aurea ista ætate, erat inspectio Creaturarum, &, secundum Genera, impositio Nominum Specierum.

SCIENTIA Naturæ innititur Cognitioni Naturalium Methodicæ & Nomenclaturæ Systematicæ tanquam filo ariadneo, secundum quod Naturæ mæandros unice tutoque permeare liceat; in his *Classis* & *Ordo* est Sapientiæ, *Genus* & *Species* Naturæ

bant, literis relictis solis Monachis intra sua claustra; hi naturæ contemplationem nauci faciebant, dein ut imperscrutabilem adspexerantur, mox ejus culores uti magos prosequabantur, a quo tempore verbum Dei naturale & revelatum contraria judicabantur, quo errore etiamnun multi exorcisti sancta simplicitate titubant. Suhm. Ad. Nidus. 1763. (q) *Cesalpinus*. (r) *Cesalpinus*. (s) *Cesalpinus*:

opus ; omnis vera cognitio est *Specialis* , solida autem *Generalis*.

Ordo alius struens est , alius est inhabitantis. Creator incipit a simplicissimis elementis Terreis , per Lapidem , Vegetabilia , Animalia , in Hominem desit. Homo autem incipiat a se ipso , definit in terram. Auctor Systematis a particularibus ad universalia adscendat ; Doctor vero contra a generalibus ad specialia descendat. Fontes enim concurrunt in rivos , hi in fluvios ; adscendat autem nauta , quousque poterit , nec tamen fontium ultimas origines attigerit. Data distincta rerum cognitione , ulterius penetrandum in Specialissimas Proprietates , Phænomena , Mysteria , Dotes , Vires , Usus ; Naturalis quam Scientia trium regnum Fundamentum sit omnis Diætæ , Medicinæ , Economiae tam privatæ , quam ipsius naturæ. Felices agricolaræ bona si sua norint !

Omnes res creatæ sunt divinæ sapientiæ & potentiarum testes , divitiae felicitatis humanæ ; ex harum usu *bonitas* Creatoris ; ex pulchritudine *Sapientia Domini* ; ex œconomia in *Conservatione* , *Proportione* , *Renovatione* , potentia *Majestatis* elucet. Earum itaque indagatio ab hominibus sibi relictis semper aestimata ; a vere eruditis & sapientibus semper exculta ; male doctis & barbaris semper inimica fuit.

Narrabo mirabilia Tua DOMINE ,
Et virtutem Terribilium Tuorum dicant ge-
nerationes.

David.

REGNUM ANIMALE.

ANIMALIA , organisatione viva , animato Medullari *sentiunt* , Nervis *percipiunt* , seque ex arbitrio *movent* motu possibili.

VITA animalis Machinæ hydraulicæ , perpetui mobilis , e Medulla a primordio continuata flagrat vestalis ignis flammula æthereo-electrica , spiraculis sustentanda , in qua incomprehensibilis arbitraria voluntas motrix residet.

VIVENTIA singula , in multiplicatione prodiga Natura , orditur a minimis , generat in fluido , incipit in ovi liquido , cum *omne vivum ex ovo*.

OVUM intra Tunicas , saepè includentes *Albumen* , continet Vitellum , cuius lateri emergenti insertum *Punctum* saliens , vegetans in Embryonem , caulescentem Funiculo umbilicali , radicatum placenta vitellina.

MATER prolificera promit ante generationem vivum compendium medullare novi animalis suique simillimi , carinam Malpighianam dictum , tanquam plumulam vegetabilium ; hoc ex genitura pollinifera Cor adsociat ramificandum in corpus ; Punctum enim saliens Ovi incubantis Avis ostendit primum Cor micans Cerebrumque cum Medulla ; corculum hoc , cessans a frigore , excitatur calito halitu , premitque Bulla aërea , sensim dilatata , liquores secundum canales fluxiles . Punctum vitalitatis itaque in viventibus est tantum a prima creatione continuata medullari vitæ ramificatio , cum ovum sit gemma medullaris matris a primordio viva , licet non sua ante proprium Cor paternum ; sic Generatio Æquivoca nulla.

MACHINA Animalis hydraulicæ , conformis Vegetabili , sed verticalis & Facultatum officinis concamerata , varie in diversis modificata :

MEDULLARIS intima , mollusca , e Bulbo baseos cerebroso elongata Caule simplicissimo , apice per se infinite progressivo , emittens ad totum fila nervea simplicissima , sibi homogenea.

INTERANEA crusta induranda , priorem vestiens , e Tubere cranii elongata in Caule vertebrarum , articulatum geniculis mobilibus , opposite artibus ramosum , cui insident Folia muscularia , determinate sparsa , apice proximo articulo etiam affixa , fibroso-carnosa , contractilia.

CORTICALIS extima , Radicata interius lacteis , e Bulbo cordis elongata in *Caulem* vasculosum duplicem paremque , similiter ramosum , infinite ramulosum , e cujus ultima dichotomia *Fruitificatio* genitalium.

FACULTATUM cameræ intra machinam animalem sunt V.

Δ ANIMALIS electrico-motoria , suprema , officina τε θερμιστικη viventis , clam agentis , volentis sentientisque , intraque bulbus organisatum ratiocinantis , se pandens , per fila electrica totum gubernat , regit.

Α TITALIS pulmonum , pneumatica , secunda , aëris principium vitale haurit pro flammula animali.

▽ NATURALIS Vasorum , hydraulica , tertia , e cordis perpetuo mobili , reciproce recipit propellitque per totum succos addendos auferendosve , ne unquam deficiant.

▽ ALIMENTARIS intestinorum , digestiva , quarta , præparat intra tubum intestinalem succos aptos pro vasis lacteis , deferendos ad vitalem corticem & ultra.

○ GENIALIS spermatica , combinatoria , infirma , ex ultimo trunci animalis naturalisque , coadunat Medullarem cum Corticali , ut inde distincta promanet machinula animalis.

ORGANA sensuum machinæ sunt physicæ , insertæ extremitati nervi , sensorio cerebri proximi , quibus divina arte percipit Animal remota.

OCULUS : *Camera obscura* , imaginem proportione , figura , colore depingens.

AURIS : *Tympanum* membranæ chorda tensæ super cochleam , a motu ætheris tremens.

NASUS : *Membrana* latissima humida contortuplicata , aëris perceptantis volatilia figens.

LINGUA : *Spongialæ* bibulæ , sparsæ , humido solutum attrahentes.

TACIUS : *Papillæ* molliusculæ , figuram impressam brevi assumentes.

His gaudent plurima Animalia , sed non omnia omnibus. Plura si Creatori addere placuissest , plura perceperissent ; uti Magnete præsentiam Ferri , Electro electricitatis phænomena. *Antennas* infectis solis concessit , nobis & que ignotas , ac illis Aures.

Indicat *Oculus* ex luce , *Auris* ex aëre appropinquantia ; percipit *Tacitus* ex unione solida præsentia : examinat *Nasus* volatilia nervis , *Lingua* solubilia fibris , assumenda : s. Grata , concessa , salutaria , s. Ingrata , vetita , noxia.

COGITANS	allicit ad <i>velle</i> gratum aut <i>nolle</i> ingratum.
GAUDIUM	puerile , sanguineum , rubrum , oleosum , spongiosum , tepidum , libere pulsans , anhelans , ridens , transpirans , promptum , <i>Vita</i> .
METUS	juvenilis , phlegmaticus , pallescens , aquosus , laxus , horrens , debile pulsans , dyspnoicus , suffocans , cacans , tremens , <i>Morbus</i> .
IRA	virilis , choleric a , lutea , spirituosa , stricta , fervens , dure pulsans , asthmatica , stertens , micturiens , agitans , <i>Medicina</i> .
MÆROR	fenilis , melancholicus , ater , acidus , rigidus , frigidus , tarde pulsans , orthopnoicus . suspirans , obstipans , quiescens , <i>Mors</i> .

Sic *Gaudium* bonis fruitur , *Metus* fuga eripit , *Ira* armis defendit ,
Mæror amissa luget.

POLITIA Naturæ manifestatur ex tribus Naturæ regnis simul : quemadmodum enim Imperantium caussa Populi non sunt nati , sed subditorum ordini servando Imperantes constituti , ita Vegetabilium caussa Animalia Phytiphaga , phytiphagorum Carnivora , & ex his Majora ob parva , Homo (qua animal) ob maxima & singula , sepe vero præcipue , sæva mercede conducta tyrannidem exercent , ut Proportio cum nitore Reipublicæ naturæ perennet . Vicissim singuli cives conspirant in Majestatem Hominis rationalis imperantis , cuius est summum Reipublicæ auctorem agnoscere . *Amanit. Acad. VI. p. 17.*

RESPUBLICA Naturæ , tanquam Aqua e Fontibus in Rivulos , Amnes , Fluvios ad Mare tranans , e numerosissima Plebe in pauciores Nobiles , paucissimosque Magnates ad Imperantem adscendit , dum Animalia minima , numero , vi potentiaque facile infinita , in usum cedant majoribus , inertioribus , præstantioribus , cum natura nunquam magis , quam in minimis tota sit .

MINISTRI Politie , propriis muniiis præfixi , tot sunt , quot animalium Species , singuli ad officia proprio commodo allecti , quum ex labore sustentationem suam reportent , ne quidquam deficiat , ubi nihil supervacancum . Ne autem alter alterius negotiis sepe immisceat , simulque lucrum alteri præripiat , sub poena capitali sancta *Lex veneni* , ipsis sensibus , *Olfacitus* in primis & *Gustus* , inscripta , ne transgressores excusabiles evaderent .

OPERATIONES Naturæ incolarum præcipuae sunt :

1. *Multiplicare* speciem , ut negotiis sufficient.

2. *Æquilibrium* inter species Animalium & Vegetabilium servare , ut proportio perennet.

Detondere quotannis Vegetabilia , ut renovetur annum theatrum.

Coercere erronea , ne expellantur legitima.

Auferre languida , mortua , immunda , conspurcata , stagnantia , acida & putrida , ut nitor aulæ fulgeat.

3. *Vindicare* se ipsos ab interitu , ne vacet administratio.

ECONOMIA Naturæ versatur circa Rerum Generationem , Conservationem , Destructionem , ut opus Creatoris illibatum persistat , ad quod tota conspirat Natura :

Generata calido sanguine , pro educatione , aliorum cura opus habent ; cumque Creator non remunerandus primi individui curam gessit , depositum hoc transeat linea descendenti ad natos , qui id parenti non reddunt.

Conservatio quotidiano alimento , sed late disperso , adeoque impigre querendo ; sic Fames dispergit per orbem ea , quæ Venus convocat.

Destructione unius fit alterius reparatio , cum deficientibus caderibus laborioso venatu sustentabitur vita ; Sic Rapina rerum omnium est , quam armis , munimentis , motu diversimodo , halituque eludant vivaciora , dum languida succumbant & vegetiora in motu festinent , ut opus naturæ perenni flore rideat.

IMPULSORES Naturæ etiam præfixi ad munia promte peragenda :
Venus blanda ad Multiplicationem convocat irritatque ,
Fames avara ad Conservationem dispergit sollicitatque ,
Dolor atrox ad Destructionem concitat repellitque ,
neque hi sine Numine.

DIVISIO Naturalis Animalium ab interna structura indicatur :

COR biloculare , biauritum ;	{ viviparis	Mammalibus.
Sanguine calido , rubro.	{ oviparis	Avibus.

COR uniloculare , uniauritum ;	{ pulmone arbitrario	Amphibiis.
Sanguine frigido , rubro.	{ branchiis externis	Piscibus.

COR uniloculare , inauritum ;	{ antennatis	Inseptis.
Sanie frigida , albida.	{ tentaculatis	Vermibus.

I. MAMMALIA.

Cor biloculare, biauritum; Sanguine calido, rubro ().*

Pulmones respirantes reciproce.

Maxillæ incumbentes, tectæ: Dentibus intrusis plerisque.

Penis intrans viviparas, lactiferas.

Sensus: Lingua, Oculi, Aures, Papillæ.

Tegmenta: Pili, pauci indicis, parcissimi aquaticis.

Fulcra: Pedes quatuor, exceptis mere aquaticis, in quibus pedes posteriores plane deficiunt. Cauda plerisque.

II. AVES.

Cor biloculare, biauritum; Sanguine calido, rubro.

Pulmones respirantes reciproce.

Maxillæ incumbentes, nudæ, exsertæ, edentulæ.

Penis subintrans absque scroto oviparas crusta calcarea.

Sensus: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque aliculis.

Tegmenta: Pennæ incumbentes, imbricatæ.

Fulcra: Pedes bini. Alæ binæ. Uropygium cordatum.

III. AMPHIBIA.

Cor uniloculare, uniauritum; Sanguine frigido, rubro.

Pulmones spirantes arbitrarie.

Maxillæ incumbentes.

Penes (multis) bini. Ova plerisque membranacea.

Sensus: Lingua, Nares, Oculi, Aures.

Tegmenta cutacea nuda.

Fulcra varia variis, quibusdam nulla.

IV. PISCES.

Cor uniloculare, uniauritum; Sanguine frigido, rubro.

Branchiæ extus comprimendæ.

(*) In omnibus animalibus, quibus sanguis non calet, a se ipso incisis ventriculum cordis unicum reperit Haller *Elementa physiolog.* T. I. p. 305-307. & mirandum tanto magis, quod crocodilo 2 ventriculos adscibat Hasselquist *Itin. Palæst.* p. 293. quod Borrichius hermetic. sapient. *Egypt.* p. 276. in eodem animali non nisi unum viderit,

Maxillæ incumbentes.

Penes (*plerisque*) nulli. Ova absque albumine.

Sensus : Lingua, Nares ?, Oculi, Aures.

Tegmenta : Squamæ imbricatæ.

Fulcra : Pinnæ natatoriæ.

V. INSECTA.

Cor uniloculare, uniauritum; *Sanie* frigida.

Spiracula : Pori laterales corporis.

Maxillæ laterales.

Penes intrantes.

Sensus : Lingua, Oculi, Antennæ in capite absque cerebro, non Aures, Nares.

Tegmenta : Cataphracta cute ossea sustentante.

Fulcra : Pedes, quibusdam Alæ.

VI. VERMES.

Cor (*plerisque*) uniloculare, inauritum; *Sanie* frigida.

Spiracula obscura.

Maxillæ multifariæ, variæ variis.

Penes varii Hermaphroditis; Androgynis.

Sensus : Tentacula, Oculi (*plerisque*). Cerebrum nullum, non Aures, nec Nares.

Tegmenta calcarea aut nulla, nisi Spinæ.

Fulcra : nulli Pedes aut Pinnæ.

* * * * *

VIVARIUM Naturæ sic alit sextuplicis formæ Animalia :

<i>Mammalia</i>	pilosa	in <i>Terra</i>	graduntur	loquentia.
-----------------	--------	-----------------	-----------	------------

<i>Aves</i>	plumosæ	in <i>Aëre</i>	volitant	cantantes.
-------------	---------	----------------	----------	------------

<i>Amphibia</i>	tunicata	in <i>Calore</i>	serpunt	fibilantia.
-----------------	----------	------------------	---------	-------------

<i>Pisces</i>	squamati	in <i>Aqua</i>	natant	poppyzantes.
---------------	----------	----------------	--------	--------------

<i>Insecta</i>	cataphracta	in <i>Siccо</i>	exsiliunt	tinnitantia.
----------------	-------------	-----------------	-----------	--------------

<i>Vermes</i>	excoriati	in <i>Humido</i>	panduntur	obmutescentes.
---------------	-----------	------------------	-----------	----------------

CLASSIS I.

MAMMALIA.

Balatu Pecorum & crebris Mugitibus amnes
Arentisque sonant ripæ collesque supini.

VIRGIL. III. 554.

MAMMALIA hæc & nulla alia mammata Animalia, ex structura, vi cœribus, organis homini proxima, pleraque Quadrupeda, nobiscum Continentem inhabitant, tanquam inter hostes atrocissimos, dum maxima pauca Pinnata intra Pelagum se subducunt.

VESTITUS Quadrupedum e Pilis flexilibus, mollissimis, distinctis, injuriæ minus obnoxiis; iisque fertilioribus in frigidis, quam æstuantibus terris. Hi vero Pili in Aculeos coaliti (Erinaceo, Hystricibus), aculei explanati Squamas (Mani), squamæ coadunatæ in Scutum (Dasypodibus); at pilorum vellus sæpe distinctum Suturis (Cani, Equo), quæ elongatæ in Jubam (Equo, Sui); Sed Aquatica nuda evasere, ne madefierent, nisi in terram exire aliquando necesse habeant. Præterea Facies sæpe Verrucis setiferis, Labia Vibrissis, Mentum Barba (Homini, Simiæ, Capræ) & Pedes Pectusque Callis, (Equo, Camelio,) non raro notata sunt.

FULCRA, motus instrumenta, pro expeditiori fuga in evitando hostem, aut assequendo prædam, TERRESTRIBUS sunt Pedes quatuor, quorum anteriores Palmis instruuntur, interdum tanquam Manus remoto pollice divisæ (Primatibus, Didelphibus); Posteriores autem Plantis, ut validius properarent, & hi vel Palmati digitis membrana connexis, ut natarent, vel Fissi digitis separatis, ut facilius current, aut Talis innixi, ut firmius persistenter (Homini, Urso): Ne vero fuga detererentur inter aspera, vel denso vellere manicati (Lepori timido, Vulpi Lagopodi, Bradypodibus), vel UNGULATI, ungulis tanquam calceolo digitum vestientibus (Belluis, Pecoribus), quibus sæpe etiam Tali succenturiatis inclusi; at vero ferociora magis UNGUICULATA unguibus digito superimpositis aristata armataque, ut prædam apprehenderent, adversarium lacerarent, terramve foderent; his unguis plerumque subulati, arcuati; paucis manuleatis ovales, complanati; at vero rapaciores Feræ unguibus armatae subulatis; sed Volantia vel manibus elongatis palmatisque æra scandunt (Ves-

pertiliones), vel membrana inter palmas plantasque expandenda velificant (Lemur, Sciurus, Mus.) Aliter AQUATICA, unguibus ungulisque destituta s. *mutica*, quibus loco pedum pinnæ pectorales, ex homoplata, humero, ulna, carpo, metacarpo & digitis conflatae (Cetis).

ARMA Mammalium præter dictos *Ungues*, nominandosque *Dentes*, in primis *Cornua* cartilaginea capiti inserta sunt; hæc vel *solida* perennia (Rhinoceroti), vel *ramosa* annua, primumque pilosa apiceque crescentia (*Cervis*), vel *cava* vaginantia basique crescentia (*Bobus*, *Capris*, *Ovibus*), quibus adversarium occurfant, penetrant, verberant; sic eludunt hostem varie vel dimicando, mordendo, lacerando, calcitrando, feriendo, vel currendo, subtiliendo, scandendo, fodiendo, urinando, natando, volitando, vel fœtendo, clamando, terrefaciendo.

CIBARIA instrumenta *Dentes* audient, qui triplices: *Primos* sæpe compressi *Incisores* pro evellendo, rodendo, conſcindendo; *Laniarii* conici longiores absque antagonista occurfante pro lace-rando; *Molares* latiores pro conterendo, & hi obtusi phytiphagi, acutiores carnivoris; at *edentula* folæ *Myrmecophagæ* & *Manes* evasere.

UMBRACULUM est *Cauda*, e vertebris dorſi multiplicatis poslice elongata, qua turpissimæ absco duntur partes; hæc paucis *nulla* (Homini, Simiis & Muribus nonnullis), abbreviata nec femoribus longior (Lepori, Satyro, Talpæ, Erinaceo), *elongata* ad pedum longitudinem & ultra (Canibus, Muribus, &c.); harum singulæ vel *Nuda* (Muribus) vel *Prehensiles* convolvendæ proque quinta manu inservientes (Simiis, Hystrici, Didelphibus), vel *Comosæ* longis fetis (Equis, Bobus), vel *Floccosæ* apice penicilliformi (Leoni mari, Dipodi Jaculo), vel *Diffractæ* utrinque pilosæ (Sciuris, Myrmecophagæ).

CUSTODES Animalium *Sensus* sunt pro conservatione individui: *Auriculæ*, exceptis aquaticis, pro Auditu præstantiore: rotundatæ, ovatæ, acutæ, acuminatæ, fissæ; erectæ, pendulæ. *Oculi* *Pupilla* orbiculari diurnis, linearis expandenda vel perpendiculari vel transversali nocturnis. *Membrana nictans* paucis. *Palpebrae mobiles* omnibus; utræque ciliatæ (Homini Simiisque), superiore tantum ciliata plerisque reliquis.

Nasus compressus, simus, resinus, aut bifidus, labiis brevior (Simiis), paulo longior (Feris plerisque), aut elongatus in *Proboscidem* (Elephantii); *Nares* ovatæ aut orbiculatæ.

Lingua simplex plerisque, denticulato-ciliata (*Canibus*), supra aculeata (*Felibus*), filiformis (*Manibus*, *Myrmecophagis*), bifida (*"hocis"*); *Labium superius* lacunosum plerisque, bifidum (*Giribus*).

GENITALIUM curiosior indagatio displicet, quamvis varia & singularis Clitoride, Nymphis, Scroto, Pene, qui tamen possit ad ordines naturales viam monstrare.

VENERE *Vaga* pruriunt pleraque, ubi Mares dimicant inter se, quo valentiores polleant pro sobole vivaciore, incantes feminas viviparas, foctum intra se excludentes, quem enixum lactant, defendant, curant in proximas nuptias, adultoremve ætatem. *Polygama* autem nonnullis, ubi Mas gynæceum ex plurimis feminis sibi associatis defendit (*Phocæ*); paucissimis vero Monogamia est, dum Mas & Femina individui socii curam gerunt foetus (*Simiae* nonnullæ, *Lemur*, *Vespertiliones*, *Prinaceus*).

MAMMÆ lactantes Feminis omnibus, etiam Maribus (excepto Equo) numero determinato pares. *Pectorales* (*Primatibus*, *Cetis*); *Abdominales* (*Didelphis*, *Phocis*); *Inguinales* (*Pecoris*, *Belluis*); *Abdominales Pectoralesque* simul (*Giribus* pluribus); *longitudinaliter* digestæ (*Suibus* aliisque), at sèpius binæ pro singulo foetu ordinario.

USUS: coluntur varia in primis *Pecora* ob *Carnes*, *Lac*, *Corium*, *Vellera*, *Pinguedinem*; ad *Onera* vero *Equus*, *Bos*, *Camelus*, *Elephas*, instituntur *Feræ* varie pro *venatu*, *muribus*, *serpentibus*; *Vivariis* asservantur rariora.

AUCTORES præcedentis seculi *GESNERUS*, *ALDROVANDUS*, *JONSTONUS*, præsentis *RAJUS*, *BRISSON*, *HOUTTUYN*, *Comes de BUFFON*, *PENNANT*, *PALLAS*, *SCHREBER*, *KLEIN*, *CETTI*, *ERXLEBEN*, *BLUMENBACH*, *CAMPER*, *SIORR*; Scientia ex ovo ordienda secundum cujuscunque *Mammalis Descriptionem*, *Dicetam*, *Economiam*, ut ex *historia* fines *Creatoris* eruantur; vide Exempla de *Cane domestico*, *Cervo* *Taiando*, *Mure Porcello*, *Sue Scrofa*, *Ove Ariete* in *Amœnit. Academ.* proposita.

ORDINES in primis a dentibus desumuntur:

M				
AM	Unguiculata	Primores nulli utrinque.	BRUTA.	2.
M	Dentes	Primores incisores 2. Laniarius o.	GLIRES.	4.
A		Primores incisores 4. Laniarius i.	PRIMATES.I.	
VIT		Primores conici(6, 2, 10) Laniarius i.	FERÆ.	3.
L	Ungulata	Primores superiores & inferiores.	BELLUÆ.	6.
A		Primores superiores nulli.	PECORA.	5.
V	Mutica. Dentes varii in variis.		CETE.	7.

I. PRIMATES.

Dentes primores incisores: superiores IV parallelī (exceptis tamen aliquot vespertilionum speciebus , quibus aut II tantum aut nulli sunt). Laniarii solitarii.

Mammæ pectorales binæ.

Pedes duo Manus sunt; Ungues (plerisque) complanati, ovales. Victus incidente fructus , paucis animalis.

II. BRUTA.

Dentes primores nulli superius aut inferius.

Pedes unguibus validis.

Incessus ineptior.

Victus ut plurimum vegetabilis, comprimendo.

III. FERÆ.

Dentes primores conici utrinque saepius VI. Laniarii longiores. Molares cuspidato-conici (non truncati).

Pedes unguiculati: Ungibus subulatis.

Victus lacerando cadavera rapinasque animalium.

IV. GLIRES.

Dentes primores incisores II superius inferiusque. Laniarii nulli.

Pedes unguiculati, cursu salientes.

Victus rodendo cortices, radices, vegetabilia, &c.

V. PECORA.

Dentes primores inferiores incisores plures; superiores nulli.

Pedes unguiculati bifurci.

Victus evellendo plantas ruminandas.

Ventriculi 4: Rumen macerans, ruminans; Reticulum cancellatum recipiens; Omasus multiplicatus consumens; Abomasus fasciatus acefscens coagulo pro sebo, ut minus alcalescat.

VI. BELLUÆ.

Dentes primores obtusi.

Pedes ungulati.

Incessus gravis.

Victus extrahendo vegetabilia.

VII. CETE.

Pedum loco Pinnæ pectorales; cauda horizontalis (plagiura) plana;
Ungues & pili nulli.

Dentes aliis cartilaginei, aliis ossi. Nasus loco fistula, in calvaria
parte anteriore & superiore.

Victus e Molluscis, Piscibus.

Locus pelagicus.

Hos a Piscibus divulsos jussi Mammalibus associari ob Cor biloculare
calidum, Pulmones respirantes, Palpebras mobiles, Aures ca-
vas, & aëris ope sonum percipientes, vertebrae colli septem,
lumbos & coccygem, Penem intrantem Feminam, Mammis lac-
tantem, idque ex lege naturæ jure meritoque.

CHARACTERES MAMMALIUM.

I. PRIMATES.

1. HOMO. *Situs erexitus. Hymen & Menstrua Feminarum.*
2. Simia. *Dentes laniarii, hinc remoti.*
3. Lemur. *Dentes primores, inferiores sex.*
4. Vespertilio. *Manus palmato-volatiles.*

II. BRUTA.

56. Rhinoceros *Cornu in fronte positum.*
5. Elephas. *Dentes laniarii & molares, Nasus proboscide elongatus.*
6. Trichechus. *Dentes laniarii superiores ; molares ex osse rugoso. Pedes compedes.*
7. Bradypus. *Dentes molares primo longiore, absque laniariis primoribusve. Corpus pilosum.*
8. Myrmecophaga. *Dentes nulli. Corpus pilosum.*
9. Manis. *Dentes nulli. Corpus squamatum.*
10. Dasypus. *Molares absque laniariis primoribusve. Corpus cætaphractum.*

III. FERÆ.

11. Phoca. *Dentes primores superiores 6 ; inferiores 4.*
12. Canis. *Dentes primores 6, 6 : superiores intermedii lobati.*
13. Felis. *Dentes primores 6, 6 : inferiores æquales. Lingua aculeata.*
14. Viverra. *Dentes primores 6, 6 : inferiores intermedii breviores.*
15. Mustela. *Dentes primores 6, 6 : inferiores conferti : duobus alternis interioribus.*
16. Ursus. *Dentes primores 6, 6 : superiores excavati. Penis osse flexuoso.*
17. Didelphis. *Dentes primores superiores 10 ; inferiores 8.*
18. Talpa. *Dentes primores superiores 6 ; inferiores 8.*
19. Sorex. *Dentes primores superiores 2 ; inferiores 4.*
20. Erinaceus. *Dentes primores superiores 2 ; inferiores 2.*

IV. GLIRES.

21. *Hystrix.* *Corpus spinis tectum.*
Cavia. *Dentes primores cuneati: Molares 4 ad utrumque latus.*
Claviculae nullæ.
23. *Castor.* *Dentes primores superiores cuneati. Molares 4 ad utrumque latus. Claviculae perfectæ.*
24. *Mus.* *Dentes primores superiores cuneati. Molares 3 ad utrumque latus. Claviculae perfectæ.*
- Arotomys.* *Dentes primores cuneati. Molares superiores 5, inferiores 4 ad utrumque latus. Claviculae perfectæ.*
25. *Sciurus.* *Dentes primores superiores cuneati, inferiores acuti. Molares superiores 5, inferiores 4 ad utrumque latus. Claviculae perfectæ. Cauda disticha. Mystacces longæ.*
26. *Myoxus.* *Mystacces longæ. Cauda rotunda apice crassior.*
Dipus. *Pedes anteriores perbreves, posteriores prælongi.*
22. *Lepus.* *Dentes primores superiores duplicati.*
Hyrox. *Dentes primores superiores lati. Cauda nulla.*

V. PECORA.

27. *Camelus.* *Ecornis. Dentes laniarii plures.*
Moschus. *Ecornis. Dentes laniarii solitarii: superioribus exsertis.*
Giraffa. *Cornua brevissima. Pedes anteriores posterioribus multo longiores.*
29. *Cervus.* *Cornua solida ramosa decidua. Dentes laniarii nulli.*
Antilope. *Cornua solida simplicia persistentia. Dentes laniarii nulli.*
30. *Capra.* *Cornua tubulosa erecta. Dentes laniarii nulli.*
Ovis. *Cornua tubulosa reclinata. Dentes laniarii nulli.*
Bos. *Cornua tubulosa porrecta. Dentes laniarii nulli.*

VI. BELLUÆ.

33. *Equus.* *Dentes primores superiores 6; inferiores 6.*
Hippopotamus. *Dentes primores superiores 4; inferiores 4.*
Tapir. *Dentes primores superiores 10; inferiores 10.*
Sus. *Dentes primores superiores 4; inferiores 6.*

VII. CETÆ.

37. *Monodon.* *Dentes in maxilla superiore 2 protensi, offei.*
Balaena. *Dentes in maxilla superiore, cornei.*
Physeter. *Dentes in maxilla tantum inferiore, offei.*
Delphinus. *Dentes in maxilla utraque, offei.*

I. PRIMATES..

Dentes primores incisores : superiores IV , paralleli.

Mammæ pectorales binæ.

I. HOMO. Nosce te ipsum. (*)

Sapiens. I. H. diurnus ; varians cultura , loco.

Ferus. Tetrapus , mutus , hirsutus.

Juvenis ursinus Lithuanus. 1661..

Juvenis lupinus Hassiacus. 1544.

Juvenis ovinus Hibernus. Tulp. obs. IV. 9..

Juvenis bovinus Bambergensis Camerar.

(*) NOSSE SE IPSUM gradus est primus sapientiæ, distinque Solonis, quondam scriptum litteris aureis supra Diana templum.

Physiologice : Te contextum Nervis , intertexum Fibris , Machina fragili, sed adolescenti in perfectissimam , facultatibus instruētam fere omnibus , pluribusque quam reliqua cuncta. Nudum in nuda humo , natali die , abiecit natura , ad vagitus flatim & ploratum , manibus , pedibusque devincientium , flens Animal ceteris imperaturum ; cui scire nihil sine doctrina : non fari , non ingredi , non vesci , non aliud naturæ sponte. Plin. Vides itaque qualen vitam nobis rerum natura permisit , quæ primum nascentium omen fletum esse voluit. Seneca. Sed miseret atque etiam pudet æslimantem , quam sit striola animalium superbissimi origo. Plin.

Tecum habita.

Diaetetice : Te sanitate & tranquillitate si noveris felicem , Cræso , Salomone , Alexandroque majorem : Te Moderatis conservandum , Nihilis destruendum , Variatis afficiendum , Insuetis frangendum , Consuetis indurandum. Te polyphagum Culina instructissima , per errores gratissima , igne vinoque horrenda. Parvo fames constat magno fastidium. Opinio immensum desiderat ; Natura exiguum & parabile , ergo ad supervacanea sudatur. Seneca. Prout riyis , ita ibis.

Cura valetudinem !

Pathologice : Te timidam usque dum creperis bullam , piloque pendulam in punto fugientis temporis Nihil enim homine imbecillus terra elit. Homer. Nulli vita fragilior , nulli tot morbi , tot curæ , tot pericula : Breve universum utique ævi tempus : Pars æqua morti similis exigitur , uero reputantur infantiae anni , qui sensu carent ; nec senectæ in pœnam vivaces ; hebescent sensus , torrent membra , præmoriuntur visus , auditus , incessus , dentes , ciborum instrumenta. Plin. Sic magna pars mortis jam præterit , quiequid ætatis retro est mors tenet. Totum denique hunc , quem videt populum , quoisque cogitas esse ; cito natura revocabit & condet ; mors omnes æque vocat ; iras Diis propitiisque moriendum. Senec. II. 59.

Memento mori !

Naturaliter : Te audacis naturæ miraculum , animalium principem , cuius causa cuncta genuit natura , esse simum animal flens , ridens , meiodum , loquens , docile , judicans , admirans , sapientissimum : sed fragile , nudum,

Juvenis Hannoveranus. 1724.

Pueri Pyrenaici. 1719.

Puella Transalana. 1717.

Puella Campanica. 1731.

Johannes Leodicensis Boerhavii.

America- α . *rufus*, *cholericus*, *rectus*.

nus. *Pilis* *nigris*, *rectis*, *crassis*; *naribus* *patulis*; *facie* *ephelitica*; *mento* *subimberbi*.

Pertinax, *contentus*, *liber*.

Pingit se *lineis* *dædaleis* *rubris*,

Regitur *confuetudine*.

Euro- β . *albus*, *sanguineus*, *torosus*.

pæsus. *Pilis* *flavescens* *tibus* *prolixis*; *oculis* *cæruleis*.

Levis, *agutus*, *inventor*,

Tegitur *vestimentis* *arctis*.

Regitur *ritibus*.

Suapte natura inerme, ad omnem fortunæ contumeliam projectum, aliena opis indigens, anxiæ mentis sollicitaque tutelæ, querulae vitæ, precarii spiritus, pertinacis spei, tardæ sapientiæ. Temporis annihilationi emortui contemptorem, præsentis vividi dilapidatorem, futuri dubii estimatorem in vita volucri, pretiosissima, irrevocabili; sic optima quæque dies miseris mortalibus ævi prima fugit; alium ad quotidianum opus laboriosa egestas vocat, aliud luxus incarcerauit, atilemque suffocat; aliud ambitio nunquam quieta sollicitat; alius divitiis, quas optaverat, metuit, & vero laborat suo; aliud solitudo, aliud vestibulum semper obsidens turba. Hic se habere dolet liberos, hic se perdidisse; lacrymæ nobis deerunt, antequam caussæ dolendi, quas detergant sola oblivia. Sed quoque nos malos nostra mala rapere; circumferre pericula, ruere in ignotos, iratos sine injuria, serarum more occidere quem non od. rimus, secundos optare ventos, quorum felicitas est ac bella perferrere: parum videlicet ad mortes nostras terra late patet. Senec. cetera animantia congregari contra diffimilia, at homini plura ex homine mala. Plin.

Innocue vivito, Numen adfaz!

Politice: Te recti loco tenere errorum publicum factum, qui te vix enixum consuetudinis larva induit, nutrit, educat, alit, regit, secundum quam honestus, fortis, sapiens, moratus, pius existimaris; cum gubernatus opinione vivas ad consuetudinem, nec ad rationem. Te, inter perituros constitutum cum nulli contigit impune nasci, beneficii loco petere, ut ultimus cervicem præbeas, dum interiùm, dulci fortuna ebrios, colligendo in crastinum Iapillos fortunæ certas, latratu in furorem ageris, aliter theoretice pios odio persequeris, quantosque tumultus excitas, non ut servias, sed cui; nugis irrevocabile tempus consumis; immortalia æternaque animo volutas, de seris nepotibus pronepotibusque disponis, novas spes oblitus conditionis tue inchoas, immemor sepulchri arcis struis, cum intrea longa conantem mors opprimit, at in agone oculos aperiens (*vivimus*) somnium primo observas; Sic vivimus ut immortales, et morimur, ut mortales. Senec.

Asiaticus. ♂. *luridus*, *melancholicus*, *rigidus*.
Pilis nigricantibus; *oculis fuscis*.
Severus, *fastuosus*, *avarus*.
Tegitur indumentis laxis.
Regitur opinionibus.

Afer. ♂. *niger*, *phlegmaticus*, *laxus*.
Pilis atris contortuplicatis, *cute holofericea*; *naso simo*;
labiis tumidis. *Feminis sinus pudoris*, *mammæ lac-*
tantes prolixæ.
Vafer, *segnis*, *negligens*.
Ungit se pingui.
Regitur arbitrio. (*)

Esto antiqua virtute & fide!

Moraliter: Te combinatum medullari animato volente justum, & corporeo af-
fectuoso volente grarum, sub larva ineptum, lascivum, sedatorem, ambi-
tiosum, prodigum, querulum, astutum, motosum, invidum, malitiosum,
avarum, transformari in attentum, castum, consideratum, modestum, so-
brium, tranquillum, sincerum, mitem, beneficum, gratiosum, suis con-
tentum. *Uni in nantum ludus*, *luxuria*, *ambitio*, *avaritia*, *vivendique cupi-*
do, *curat atque etiam post se de futuro*. *Plin.*

Benefac & latare!

Theologice: Te ultimum finem creationis;

In telluris globum, Omnipotentis magisterium, introductum; ratione sapiente,
secundum sensus concludente, mundi contemplatorem; ut ex opere agnosce-
res Creatorem omnipotentem, omnisclium, immensum & sempiternum
DEUM, cuius sub imperio quod moraliter vivas, a justissima ejus nemisi
convincaris. (*Cetera revelata a Theologis explicanda*)

Duo enim sunt, quæ in cognitionem DEI ducant, *Creatio & Scriptura*.

Augustinus.

DEUS itaque Natura cognoscendus, dein Doctrina recognoscendus.

Tertullianus.

Homo solus DEUM contemplatur, Naturæ & revelationis eundem Auditorem.
quem Te DEUS esse
jussit, & humana qua parte locatus est in re, disce.

Pers. Sat. III. 71.

Memento Creatoris Tui!

(*) Melius forsitan dispescerentur hominum species ita:
albus. . Structura ad leges pulchritudinis, quas nos quidem putamus esse,
quam maxime accommodata.

Huc spectant Europæ fere omnes; incolæ Asiarum, intra Obium, mare
Caspium, montem Imanum, & Gangen sitas; porro Africæ
Septentrionalis, & ipsi Groenlandi et Eskimos.

badius. ♀. Ex flavo fusci, pilis rarioribus, facie plana, oculis parvis.
Huc referas reliquos Asiarum incolas.

niger. ♀. Pilis crispis, naso retuso, labiis tumidis.
Huc pertinent ceteri Africæ incolæ.

Monstro- ε. solo (a) & arte (b. c.) variat :

fus. a. *Alpini parvi*, agiles, timidi.

Patagonici magni, segnes.

b. *Monorchides* ut minus fertiles : *Hottentotti*.

Imberbes plures Americæ populi.

c. *Macrocephali capite conico* : *Chinenses*.

Plagiacephali capite antice compresso : *Canadenses*.

Habitat intra Tropicos Palmis Lotophagus.

Hospitatur extra Tropicos sub novercante Cerere, carnivorus.

DESCRIPTIO : CORPUS erectum, nudum, uti quidem in lumen editur inerme, pilis raris remotissimis adspersum, subsexpedale.

CAPUT obovatum : *Pileus* longius pilosus : *Synsipits* obtuso, *Vertice* obtuso, *Occipite* gibboſo.

Facies nuda : *Frons planiuscula quadrata, temporibus compressa*, angulis ſinu intra pileum abſcendens. *Supercilia prominula pilis extrorſum in futurani imbricatis, interſtincta Glabella planiuscula*. *Palpebra superior mobilis, inferior quieta*; utraque *ciliis exstantibus subrecurvatis pectinata*: *Oculi* nullo muſculo ſuſpensorio detenti, rotundi : *Pupilla* orbiculata abſque membrana nictitante. *Genæ gibbae*, molliusculæ, coloratæ. *Malæ comprefiuſculæ*. *Buccæ laxiores*. *Nasus* prominentes, labio brevior, compreſſus, apice altior gibbosiorque : *Naribus ovatis* intus hirtis, margine cratiſſuculo. *Labium superius* ſubperpendiculare, lacuna exaratum; *labium inferius* erectiusculum, magis gibbum. *Mentum* prominentes, obtusum, gibbosum. *Os* maribus ſetis barbatum, inprimis mentum ſetis fasciculatum. *Dentes maxillæ ipſi infidentes utrinque Primores incifores*, errecti, paralleli, approximati, magis æquales, plani ac rotundi, quam quidem in aliis animalibus; *laniarii* ſolitarii, primoribus paſto longiores, breviores tamen, quam in aliis animalibus, utrinque reliquis approximati; *molares* quini, obtusiusculi, non tam alte incisi, quam in aliis animalibus. *Aures laterales* : *auriculae* rotundato-lunatae, appreſſi-

cupreus ♂. Colore cutis ad cuprum accedente.

Huc numerandi reliqui præter Groenlandos & Eskimos Americæ incolæ.

fuscus. t. Ut plurimum colore fuso, naſo lato, pilis densioribus.

Huc ſpectant insularum australium, & plurimarum indicarum incolæ.

musculæ , nudæ , supra margine fornicatæ ; infra gibbosæ , molles.

TRUNCUS constans collo , thorace , dorso , abdomine.

Collum teretiusculum , capite brevius ; *vertebræ* ejus nullo ligamento suspensorio connexæ ; *cervicis nucha* concava ; *gula* supra concava , medio subtus gibba.

Thorax antice posticeque depresso scutulus ; *pectus* planiusculus , *jugulo* excavato , *axillis* concavis barbatis , *scrobiculo* planiore . *Mammæ* duæ , pectorales , distantes , gibbæ , rotundatae ; *papilla* cylindrica , obtusa , rugosa , *areola* cincta.

Dorsum tergo planiusculo , humeris exstantibus , *interscapulo* depresso.

Abdomen gibbum , laxum ; *umbilico* excavato , *epigastrio* planiore , *hypogastrio* gibbosiore , *inguinibus* planiusculo-concavis . *Pubis* regio barbata . *Pelvis* supra dilatata , infra angustata . *Genitalia* exserta : *pene* cylindrico , scroto subrotundo , rugoso cute laxa , *futura* longitudinali per *perinæum* excurrente , s . *vulva* gibba compressiuscula , *hygiene* , *clitoride* , *nymphisque* instructa , ex qua fluxus adultis sanguinis periodicus . *Cauda* exserta nulla .

ARTUS ex *Manibus* loco pedum anteriorum , & *pedibus* posterioribus .

Manuum *Arni* divaricati crassiusculi , teretes , longitudine pedum . *Cubitus* obtuso prominulus . *Ulna* crassitie armorum , teres , introrsum planior . *Palmæ* rotundatae , dilatatae , planæ , extus couvexæ ; *vola* concava ; *digitii V* : *Pollex* remotus , brevior , crassior ; *Digitii 2, 3, 4, 5* approximati horum 5 minor reliquis , dein 2, 4, sed 3 paulo longior , medium semoris attingens . *Ungues* omnibus rotundati , obovati , plano-convexi , *lunula* pallida .

Pedum *Femora* approximata , *lumbis* musculosis , *natibus* gibbis carnosis , *genibus* antrorsum versis , obtusissimis , poplitibus subtus concavis . *Crura* longitudine femorum ; postice musculo-ventricosa , inferne angustiora , antice macra . *Calcanei talis* oblongis & (quam in aliis animalibus) latioribus , cum planta pedis ipsa junctis , insistentes , crassi , prominuli , gibbi : *malleolis* lateralibus oppositis , hemisphaericis , duriusculis . *Planta* oblongæ supra convexiusculæ , subtus planæ , transversim concavæ . *Digitii V* : omnes incurvi , subtus gibbi , approximati : *Pollex* crassior , brevior ; 2, 3 subæquales , 4, 5 decrescentes , ultimo minimo . *Ungues* ut in manibus omnes .

Differt itaque a reliquis corpore erecto nudo; at piloso capite, superciliis, ciliisque, in maturis pube, axillis, in masculo sexu mento. Mammæ 2 pectorales. Caput cerebro omnium maximo; uvula; organa loquelæ; facies abdomini paralella, nuda; nafo prominente, compresso, breviore, mento prominente. Cauda nulla. Pedes talis infistentes. Feminis hymen, & menstrua.

2. SIMIA. Dentes Primores utrinque IV, approximati.

Laniarii solitarii, longiores, hinc remoti.

Molares obtusi.

* Cauda nulla, *Simiae* veterum.

Troglodytes. 34. *S. ecaudata macrocephala torosa, dorso & humeris pilosis, reliquo corpore glabro. Blumenbach Compend. histor. natur. I. p. 65. & de generis humani varietate nativa. p. 37.*
Satyrus indicus. Tulpii observat. medic. p. 284. Tab. XIII. Chimpanzee. Scotin. v. Nov. Act. Er. Lips. m. Sept. 1739. Tab. V. p. 564.
Habitat in Angola. 1738. mense Augusto primo in Europam, Londinum scilicet, delatum animal.

Satyrus. 1. *S. ecaudata ferruginea, lacertorum pilis reversis, natibus testis. Amoenit. acad. 6. p. 68. t. 76. f. 4.*
Homo sylvestris. Edw. av. 5. p. 6. t. 213.
Orang-Utang. Camper kort Bericht wegens de Ontleding van verschedene Orang-Utangs. Amsterd. 1778. 8.
Habitat in insula Borneo.

Quæ de homine troglodyte refert Immortalis Aucto, partim fragmentis narrantur, partim ad monstruosam morbosainve hominum progeniem, partim simiis pertinent. Ad prima refero præsertim, quæ de loquela, cogitationibus, ratiociniis ejus referuntur; alterum restatur citatum Kakurlacko synonymon, tertium Bonitus allegatur & reliqua descriptio: Ad ficticiæ refero pariter luciferum sive hominem caudatum.

Simia quam similis turpissima bestia nobis, Ennius; quod Simiae Mammæ, Clitoris, Nymphæ, Uterus, Uvula, Cilia, Ungues hominis sunt; ligamentum colli suspensorium, ut illi, deficit: Mirum adeo parum differt stolidissimam Simiam a sapientissimo homine.

Corpus bipedale, sœpius erctum, undique vestitum brunneuni, pilis rarioribus rufo-fuscis, longitudine vix dorsi. Pili in lacertis reversi versus cubitum. Nates tectæ. Caput rotundum. Frons nuda. Oris margo hirtus. Cilia nigra; superiora longiora, densiora. Superciliorum loco series transversa pilorum. Nares brevissimæ subvilloſæ. Palmæ intus glabré, pollice palma breviore. Plantæ forma pedum, pollice brevissimo, reliquis digiti longioribus.

Magna huic cum homine intercedit similitudo, osse etiam hyoidco; ast præter alia cum simiis communia pollici pedum posteriorum decūt unguis, laryngis alia plane est structura, & tum musculi, tuni universa ossium compages ostendunt non natum esse bipedi ingressui animal.

Habetur hujus varicias major quinque vel sex pedum.

Great Ape. Pennant synops. of quadr. n. 64. p. 93.

Pongo. Buffon histoir. natur. Vol. XIV. p. 43.

Homo sylvestris, Orang-utang. Bont.jav. 84. t. 84.

An sexu aut ætate, vel, quod probabilius, varietate aut specie differunt, patria certissime diversæ, quæ ipsis est Angola?

Homo sylvestris, Orang-Outang. Tyson anat. of a pygmy. Lond. 1699. 4. f. 1. 2.

*Jocko. Buffon histoir. natur. Vol. XIV. p. 43. T. 1. **

Cyolock. de Visme act. angl. Vol. XIV. p. 73. T. 3.

Lar.

35. *S. ecaudata, natibus calvis, brachiis longitudine corporis. Homo Lar, brachiis longitudine corporis. Mantiss. pl. 2. p. 521. Miller on various subj. of nat. hist. t. XXVII. A. B.*

Grand Gibbon. Buffon hist. natur. T. XIV. p. 92. T. 2.

Longarmed ape. Pennant Quadr. p. 99. n. 66.

Simia longimana. Schreber Saeugthiere, I. p. 66. Tab. III. 1.

Habitat in India, mitis, segnis, frigoris pluviaeque impatiens.

Facie incarnata subnuda, & ingressu sœpius erecto magis ad hominem accedit, quam Satyrus. 4 pedum altitudinem assequitur, niger.

Habetur autem varietas fusca vix ultra 2 $\frac{1}{2}$ pedes alta.

Petit Gibbon. Buffon hist. nat. XIV. t. 3.

Schreber Saeugth. T. III. f. 2.

Sylvanus. 2. S. ecaudata, natibus calvis, capite subrotundo, brachiis brevioribus.

Simia. Gesn. quadr. 847.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Simia unguibus omnibus planis & rotundis. *Briff. quadr.*
188.

Cercopithecus. *Jonst. quadr. t. 59. f. 5.*

Pitheque. *Buffon hist. nat. Vol. I. p. 84.*

Pygmy-ape. *Pennant synopsis*, p. 98, n. 65. T. 12. f. 1.
Habitat in Africa, Zeylonia. Minatur minis, cachinno blan-

ditur, Caffrorum more salutat. Sorbilia manu haurit.
Frons ad superciliorum regionem transverse gibba. Facies
brevis plana. Pellis ursina. Scrotum tanquam intra
vulvam reconditum; vel penis intra scroti foramen; au-
tumno testiculi intumescunt. Sedes feminæ rapi instar ex-
tuberans. Lacertorum pilis subtus reverfi, uti & cervicis.
πιθηκος veterum.

Anatome. *E. N. C. d. 2. a. 7. obs. 40.*

- Inuus. 3. *S. ecaudata*, natibus calvis, capite oblongo.
Simia cynocephala, unguibus plauis & rotundatis. *Briffon*
quadr. 191.
Cynocephalus 1. & 2. Alpin. ægypt. p. 241. T. 15. f. 1.
& T. 16.
Magot. *Buffon hist. natur. XIV. p. 109. T. 8. 9.*
Barbary-ape. *Pennant synopsis. p. 100. n. 67.*
Simia Inuus. *Schreber Saeugthiere*, I. p. 71. T. V.
Habitat in Africa.
Simillima S. Sylvano & Cynocephalo, sed rostro pro-
ductiore, colore pallidiore; non miscetur cum Sylvano.
Ungues omnes rotundati.

* * *Cauda abbreviata* : Papiones, κυνοιφαλες ve-
terum.

- Nemestri- 4. *S. semicaudata* subbarbata grisea, iridibus brunneis,
na. natibus calvis.
Simia brevicaudata. *Edw. av. 5. p. 8. t. 214.*
Habitat in Sumatra.

- Apedia. 5. *S. semicaudata*, palmarum pollice approximato, un-
guibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis.
Simia cauda abrupta, unguibus compressis: pollice pal-
marum digitis adhaerente. *Amœn. acad. I. p. 278.*
Habitat in Indiis.
Magnitudo & color sciuri, subgrisea.
Pollex manuum anticarum non remotus. Ungues omnes
oblongi compressi, sed pollicum tam anteriorum, quam po-
sticorum humanissimiles. Cauda brevissima, vix pollicis

transversi. Os fuscum pilis patulis. An a S. sciurea specie distincta?

Sphinx. 6. S. semicaudata, ore vibrissato, unguibus acuminatis, natibus calvis.

Papio s. Baboon. *Gesn. quadr. 252. t. 253. Aldrov. dig. 260. Jonst. quadr. 145. t. 61. f. 1. Raj. quadr. 158. Briss. quadr. 192.*

Papion. *Buffon hist. nat. T. XIV. p 133. T. 13. 14.*

Simia Sphinx. Schreber *Saeugthiere*, I. p. 80. Tab. VI. *Habitat in Borneo, animal libidinosum, mulieribus facile vim inferens, robustum & ferox.*

Caput oblongum canis, sed obtusius. Collum longum. Cauda brevis, erecta. Nates sanguinolentæ.

Mormon. 36. S. semicaudata subbarbata nigro-fusca, malis tumidis nudis cyaneis oblique striatis, natibus calvis sanguineis.

Alstroemer Act. Holmiens. 1766. Vol. 27. p. 138.

Simia semicaudata barba, vertice fetis erectis mitram referentibus obsito, unguibus acutis. Kramer *animal. austr. p. 310.*

Mantegar. *Philosoph. Transact. n. 290.*

Chloras. *Breslauer Natur-u. Kunstgesch. XV. Vers. 177.*

Tufted ape. *Pennant synops. p. 102. n. 68. T. 12. 13. f. 2. 1. (ic. mal.)*

Simia Mormon. Schreber *Saeugthiere*, I. p. 65. T. VIII. *Habitat in India.*

Frons pilis erectis fastigiatis canis. Rostrum productum nudum. Nasus sanguineus. Bucca nuda cærulescens, oblique sulcata. Barba alba brevis. Gula flavescentes. Collum supra canum, subtus flavescentes. Dorsum griseofuscum. Abdomen exalbidum. Lumbi pilo tenuiore perlucente, cute violacea. Nates tuberosæ nudæ, sanguineæ. Sutura abdominis longitudinalis, nuda, sanguinea. Cauda abbreviata. Ungues acutiusculi, pollicum rotundati. Georgii.

Maimon. 7. S. semicaudata subbarbata, genis cæruleis striatis, natibus calvis.

Cynocephalus. *Gesn. quadr. 93. t. 93. Clus. exot. 370.*

Cynocephalus 2. *Jonst. quadr. t. 59. f. 4.*

Cercopithecus cynocephalus, anterius longis pilis, nase violaceo nudo. *Briss. quadr. 214.*

Mandrill. *Buffon hist. nat. XIV. p. 154. T. 16. 17,*

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Ribbed-nose ape. *Pennant Synops.* p. 103. n. 69.
 Simia Maimon. *Schreber Saeugthier.* I. p. 74. T. VII.
Habitat in Guinea.

*Differet a priori naſo ſimiliter cæruleſcente, & deſciente
 verticis coma.*

Porcaria. 48. *S. ſemicaudata*, capite fuillo, roſtro nudo, corpoſe fuſco-olivaceo, natibus tectis, unguibus acuminatis.
Boddaert Naturf. 22. p. 17. t. 1. 2.

*Habitat in Africa, ~~Xenopithecus~~ Aristotelis, 3 pedes
 & 6 pollices longus.*

* * * *Cauda elongata*: *Cercopitheci*, KⁿCo: *Aristotelis*:
 * buccis ſaccatis, natibus calvis.

Cynoſu- 37. *S. caudata imberbis*, facie elongata, fronte fuliginosa, *fascia ſuperciliari albida*, genitalibus masculis coloratis, unguibus convexis. *Scopoli delic. flor. et faun. inſubrica Ticin.* 1786. fol. P. I. p. 44. T. XIX.

Habitat in ---

*Statura canis mediocris; corporis longitudo fere bipedalis:
 Animal inſidum, inquietum, ſalacifimum.*

Hama- 8. *S. caudata cinerea*, auribus comosis, unguibus acutiusculis, natibus calvis.

Simia egyptiaca, cauda elongata, clunibus tuberoſis nudis. *Haffelq. it.* 189.

Simia ſupra aures comata. *Alpin. hift. nat. Æg.* p. 242. T. 17-19:

Cynocephalus. *Gefn. quadr.* p. 252. fig. p. 253.

Dog-faced ape. *Penn. synops.* p. 107. n. 72. *Tab. 14. f. 1.*
Simia Hamadryas. *Schreber Saeugth.* I. p. 82. T. X.

Habitat in Africa.

*Corpus cinereum. Cauda longitudine vix corporis. Aures longa coma utrinque dependente galericuli in modum:
 Nates calvæ ſanguinolenta.*

Veter: 9. *S. caudata barbata alba*, barba nigra.

Cercopithecus barbatus albus, barba nigra. *Briff. quadr.* p. 147.

Simia alba seu incanis pilis, barba nigra promissa. *Raj. quadr.* p. 158.

Lowando. *Buffon hift. nat.* T. XIV. p. 169.

10. *Simia lactea barbata*. *Penn. synops.* p. 110.
Habitat in Zeylona.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

32

- Silenus. 10. S. caudata barbata nigra, barba nigra prolixa.
 Cercopithecus barbatus niger, cæsarie prolixa faciem
 cingente. Briss. quadr. 209.
 Simia Callitrix magnitudine magnorum cynocephalorum.
 Alpin. æg. p. 242. t. 21.
 11. Simia Silenus caudata barbata, corpore nigro, barba
 nivea prolixa. Syst. edit. X. p. 26.
 Cercopithecus barbatus niger, barba incana promissa.
 Raj. quadr. p. 158.
 Ouanderon. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 169. T. 18.
 Lion-tailed ape. Pennant syn. p. 109. n. 73. T. 13. A. f. I.
 Simia Silenus. Schreber Saeugth. Tom. I. p. 88. sqq. Tab. XI.
 Habitat in Zeylona et reliqua India.

- Faunus. 11. S. caudata barbata, cauda apice floccosa.

- Cercopithecus barbatus infra albus, barba incana mucronata, cauda in floccum. Briss. quadr. 209.
 Cercopithecus barbatus I. Clus. exot. p. 371.
 Malbrouck. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 224. Tab. 29.
 Simia Faunus. Schreber Saeugth. I. p. 90. T. XII.
 Habitat in Bengala.
 Corpus nigricans. Pectus et abdominis anteriora alba.
 Barba incana mucronata. Ungues humani.

- Cyno-
molgus. 15. S. caudata imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcuata, natibus calvis.
 Cercopithecus cynocephalus, naribus bifidis elatis, natibus calvis. Briss. quadr. 213.
 Cercopithecus angolensis major. Raj. quadr. 155.
 Macaque. Buffon hist. nat. XIV. p. 190. t. 20.
 Hare-lipped ape. Penn. syn. p. 111. n. 74.
 Simia cynomolgos. Schreber Saeugth. I. p. 91. T. XIII.
 Habitat in Africa; vigilias noctu instituit in arboribus,
 vix a sequente diversa.

- Cynoce-
phalos. 16. S. caudata imberbis flavescens, ore producto, cauda recta, natibus calvis.
 Cercopithecus cynocephalus ex viridescentibus et flavicanis
 tibus pilis. Briss. quadr. 213.
 Cercopithecus. Jonst. quadr. t. 59. f. ult.
 Habitat in Africa.
 Simillima S. Inuo, sed caudata.

Diana. 17. S. caudata barbata, fronte barbaque fastigiata. *Az. Stokh.*
1754. p. 210. Tab. 6.

Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis inspersis,
barba alba. *Briss. quadr.* p. 148. n. 23.

Cercopithecus barbatus guineensis. *Raj. quadr.* 159.

Cercopithecus barbatus 2. *Clus. exot.* 371.

Spotted ape. *Penn. syn.* p. 112. n. 75.

Simia Diana. *Schreber Saeugth.* I. p. 94. T. XIV.

Habitat in Guinea.

Junior ludibunda dejicit omnia, peregrinos nutitando
salutat, irata maxillas, hiantiore exagitat. Adultior.
dentibus laniariis elongatis mordax & maligna evadit.
Cubile purum servat; vocata respondet grec.

Magnitudo felis majoris, nigra punctis albidis. Dorsum
postice ferrugineum. Femora subtus helvola. Gula
pectusque albu. Frons pilis erectis albis fastigiatis linea
transversa in formam lunæ crescentis. Barba fastigiata
nigra, subtus alba longiorque, insidens tuberi adiposo.
Linea alba ab ano ad genua ab exteriore latere femo
rum ducit. Cauda recta longa nigra, uti facies,
aures, abdomen, pedes.

Sabæa. 18. S. caudata imberbis flavicans, facie atra, cauda cinerea,
natibus calvis.

Cercopithecus ex cinereo flavescentis, genis longis, pilis
albis obsitis. *Briss. quadr.* p. 145. n. 17.

Cercopithecus de S. Jago. *Edw. av. V.* p. 210. t. 215.
Callitrichæ. *Buffon hist. nat.* T. XIV. p. 272. T. 37.

Green ape. *Penn. syn.* p. 112. t. 76.

Simia Sabæa. *Schreber Saeugth.* I. p. 100. t. XVIII.

Habitat in Insulis promontorii viridis, ad caput bonæ
spei, et in finitimis regionibus.

Corpus statura Diana f. Aygulæ, magnitudine cati, supra
cinereo-viridi-flavescentis; subtus gula, pectori, abdo
mine, femoribus album. Facies nuda, atra. Tempora
ex albido flavescentia pilis longioribus reversis; super
cilia nigra setosa. Cauda recta, longitudine corporis,
cana. Pedes cinerei; ungues rotundati, sed in anticis ovati.

Cephus. 19. S. caudata, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus
nigris, cauda apice ferruginea.

Cercopithecus nigricans, genis & auriculis longis pilis ex
albo flavidantibus, ore cæruleofuscante. *Briss. quadr.* 206.
Cerco-

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

33

Cercopithecus barbatus alias Guineensis: Raj. quadr. 156.

Monstac: Buffon hist. nat. T. XIV. p. 283. t. 39.

Simia Cephus. Schreber Saeugth. I. p. 102. T. XIX.

Habitat in Guinea.

Corpus statura Dianæ, fuscum, subtus cerulecente-can-dicans, Caput pilis arrectis albidis; lunula supercilio-rum alba transversa; palpebrae superiores albæ; buccæ pilis patulis; os cærulescens.

Æthiops. 38. S. caudata imberbis, capillitio erecto lunulaque frontis albis. Syß. nat. ed. X: p. 28. n. 14:
Mangabey. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 244. t. 82. 83.
White eye-lid ape. Penn. syn. p. 114. n. 77.
Simia Æthiops. Schreber Saeugth. I. p. 105. T. XX. XXI.
Habitat in Madagascar.

Aygula. 21. S. caudata subimberbis grisea, eminentia pilosa verticis reversa longitudinali. Osbeck itzr. 99.

Simia nigra magnitudinis mediæ. Edw. av. 221. t. 311.

Aigrette. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 190. t. 21.

Simia Aygula. Schreber Saeugth. I. p. 106. T. XXII.

Habitat in India, præsertim Java.

Corpus griseum lupi coloris, subtus gula, pectore, abdo-mineque albicans. Cauda corpore longior cinerea at-tenuata. Facies planiuscula, albida, nuda. Nasus de-pressus, brevissimus, ab ore remotus, lacuna labii su-perioris gemina. Bucca subbarbata, pilis jursum versis. Supercilia frontis gibba, setosa, prominentia. Pedes nigri; semipa'mati. Ungues pollicum rotundati, reliqui oblongi. Auriculæ acutiusculæ. Sutura arcuata ab aure versus oculos deorsum ad basin maxillaæ inferioris. Sutura alia cubiti longitudinale;

Varietas? mea capite rotundiore; facie minus nigra, colore corporis minus ferrugineo; ligata saltat continuo.

niditans. 23. S. caudata imberbis nigra punctis pallidis adspersa, naso albo, pollice palmarum brevissimo, natibus testis. Cercopithecus angolensis alias, toquim niger, at insperso cano nigredini per totus corpus, naso albo. Marcgr. Brasil. p. 227.

Habitat in Guinea, ludibunda, capite continuo niditans apud Profess. Botan. Burmannum Amfelodami visa.

Magnitudo fere lvani. Os breve. Facies pilosa. Orbiculae nudaæ. Irides luteæ. Pili corporis nigri, annulis

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

aliquot pallidis. Labia & mentum albida. Cauda reda cylindrica, corpore longior. Pedes & cauda nigra. Pollex palmarum non longior primo articulo indicis. Cl. Alstroemer.

- Sinica. 39. *S. caudata imberbis, capillito undique horizontaliter caput obumbante. Mantiss. plant. 2. p. 521.*
Bonnet chinois. Buff. hist. nat. T. XIV. p. 224. tom. 30.
Chineſe ape. Penn. Synops. p. 117. n. 83.
Simia sinica. Schreber Saeugth. I. p. 108. t. XXIII.
Habitat in Bengala.
Cauda corpore multo longior: Ungues pollicis rotundi, reliquorum digitorum oblongi.

- Nemæus. 40. *S. caudata imberbis, buccis barbatis, cauda alba. Mantiss. plant. 2. p. 521.*
Cercopithecus cineretis, genis longis pilis ex albo flavicantibus obslitis, torque ex castaneo purpurascente. Briffon. quadr. p. 146.
Douc. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 298. T. 41.
Cochinchina ape. Penn. syn. p. 119. n. 85.
Simia Nemæus. Schreber Saeugth. I. p. 110. t. XXIV.
Habitat in Cochinchina.
Statura bipedalis. Facies fere spadicea; aures ejusdem coloris. Frontis fascia angusta magis fusca; pili suprapositi nigri; pili faciem cingentes albidi favigidis intermixtis: Colli ad anteriora torquis ejusdem coloris ac frontis fascia. Humeri & brachia superiora nigra; manus albidae; inguina ejusdem coloris. Crura superius, ut et digitii pedum nigri. Pedes ipsi inde a genubus fusti. Ex hac specie potissimum Bezoar simae.

- Mona. 41. *S. caudata barbata, lunula superciliari elata ex albo grisea. Cercopithecus pilis ex nigro & rufo variegatis vestitus, pebus nigris, cauda cinerea Briff. quadr. p. 141.*
Mone. Buff. hist. nat. T. XIV. p. 258. t. 36.
Varied ape. Penn. syn. p. 118. n. 84.
Simia Mona. Schreber Saeugth. I. p. 97. t. XV.
Habitat in Mauritania & calidiore Afia.
Animal sesquipedale, blandum, docile, frigus ferens.

- rubra. 42. *S. caudata barbata, buccis barbatis, vertice, dorso caudaque ex rufo sanguineis.*
Pates. Buffon hist. nat. T. XIV. p. 208. t. 25. 26.

Red ape. *Penn. syn. p. 116. n. 8.*

Simia Mona. Schreber Saeugth. I. p. 98. t. XVI.

Animal sesquipedale. Fascia supra oculos nunc alba;
nunc nigra. Cauda corpore longior.

Talapoin. 43. *S. caudata barbata*, buccis barbatis, auribus, naso & pedum plantis nigris.

Talapoin. *Buffon hist. nat. T. XIV. p. 287. t. 40. Schreber Saeugth. I. p. 101. t. XVII.*

Altitudine pedem non superat. Cauda sesquipedalis.

Petauristä. 44. *S. caudata baibatá*, doiso, caudæ superiore, & pedum anteriore latere ex olivaceo nigris, facie nigra, nasi macula triquetra nivea.

Blanc-nez. *Allamand édit. de l'hist. nat. de Buffon. T. XIV. p. 141. t. 39.*

Simia Petauristä. Schreber Saeugth. I. p. 103. t. XIX. B. Habitat in Guinea.

Blandum & agile animal, 13 pollices altum, cauda 20 circiter pollices a quante.

Maura. 45. *S. caudata barbata*; buccis & universa facie, palpebris & regione ab oculis ad nasi finem protensa exceptis, bärbatá, corpore ex luteo fusco.

Middle-sized black monkey. *Edw. av. 3. p. 221. t. 311.*
Simiolus ceylonicus. Seba thes. I. p. 77. t. 48.

Negro ape. *Pennant syn. p. 115. n. 80.*

Simia Maura. Schreber Saeugth. I. p. 107. t. XXII. B. Habitat in Zeylona & Guinea.

Agile animal, dum sedet, 7 pollices altum. Cauda corpore longior.

Roloway. 46. *S. caudata barbata*, capite, dorso, manibus pedibusque extrinsecus nigris, interius una cum abdomine & corona pilotum faciem triquetram ambiente albis.

Palatine ou Roloway. *Allamand édit. de l'hist. nat. de Buffon T. XV. p. 77. t. 13.*

Habitat in Guinea.

Animal blandum sesquipedale, cauda ejusdem longitudinis.

* * * buccis non faccatis, natibus teatis.

* cauda prehensili.

Beelzebul. 12. *S. caudata bärbatá* nigra, cauda prehensili, extremo pedibusque brunneis.

Cercopithecus niger, pedibus fuscis. Briffon quadr. 194.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Guariba. Marcgr. brasili. p. 226.

Howiling baboon. Bancroft Guiana. p. 133.

Ouarine Buffon hist. nat. T. XV. p. 5.

Habitat in America meridionali.

Gregarium noctu & interdiu vagatur, continuo & satis sonoro ululatu sylvas replens, ferox.

Corpus magnitudine vulpis nigrum, pilis longis laxe vissimis nitidum. Barba rotunda nigra. Pedes & caudæ extremum fusca.

Soniculus. 13. S. caudata barbata rufa, cauda prehensili.

Cercopithecus barbatus saturate spadiceus. Briff. quadr. 206.

Cercopithecus barbatus maximus ferruginosus stentorosus, Alacuta, Singe rouge. Barrere Franc. équin. p. 150.

Arabata. Gumilla Orenoquo. 2. p. 8.

Alouate. Buffon hist. nat. T. XV. p. 5.

Habitat Carthaginem, in Cayenna, ad Amazonum flumen in sylvis. Transeuntes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum, sinuclamosa eminusque audienda salutant; vix adspici se sinunt, quin illico clament. Vicitur musæ fructibus. Jacquin.

Corpus mediocre, colore conformi rubro. Os hominis instar in anteriore facie parte mentis propendente satis magno, ut in homine.

Paniscus. 14. S. caudata imberbis atra, cauda prehensili, palmis tetractylis.

Simia fusca major, palmis tetractylis, cauda prehensili ad apicem subtus nuda. Brown. Januaic. 489.

Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, cauda inferius versus apicem pilis destituta. Briff. quadr. 211.

Coaita. Buffon hist. nat. T. XV. p. 16. t. I.

Quato. Bancroft Guiana. p. 131.

Simia Paniscus. Schreber Saeugth. I. p. 115. t. XXVI. Habitat in America meridionali. Agilis, audax, gestulationum & vindictæ amans, frigoris impatiens.

Corpus atrum, aliquando potius fuscum, magnitudine molossi. Pedes omnes, quemadmodum abdomen, graciles; hi & cauda dimidia exterior nunc brunnea, nunc cum reliquo corpore atra. Caudæ extrenitas hinc nuda, qua, quicquid a terra elevat, prehendit. Digi pedum 4-5. Hallmann; est vero pollex reliquis minor, introrsum a reliquis remotus. Ungues manuum rotundati, pedum oblongi sculi. D. Aymen. Facies nuda rubra. Auriculæ nudæ.

trepida. 20. S. caudata imberbis, capillitio erecto, manibus pedibusque cœruleis, cauda prehensili villosa.

Simia, cauda comata. Edw. av. t. 212.

Habitat in Surinamo.

Corpus fuscum subtus ferrugineum. Capitis pili erexit
nigri in capillitium hemisphæricum. Cauda pilosa.
Ungues rotundati. An sola varietas Apella?

Fatuellus. 28. S. caudata imberbis, cauda prehensili, capitis fasciculis
pilorum duobus corniculorum æmulis. Briss. quadr.
195. n. 3.

Habitat in America meridionali.

Corpus: Facies, latera, abdomen, crura anteriores
fuscæ; Vertex, medium dorſi, cauda, pedes, crura
posteriora nigra. Ungues longi obtusiusculi. Cauda
spiralis. An reapse differt ab Apella?

Apella. 29. S. caudata imberbis, cauda subprehensili, corpore fusco,
pedibus nigris, natibus tectis.

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro. Briss. quadr.
p. 137. n. 1.

Sajou. Buffon hist. nat. T. XV. p. 37. t. 4.

Simia Apella. Schreber Sæugth. I. p. 119. t. XXVIII.
Habitat in America meridionali.

Agilis, undique circumspiciens, frigoris non valde
impatiens, sono pulli meleagridis famelici. Faciei
peripheria quasi a barbitonsore rasa.

Capucina. 30. S. caudata imberbis fusca, cauda prehensili hirsuta, pileo
artubusque nigris, natibus tectis.

Simia imberbis nigra, cauda longa hirsuta, facie flavescente. Mus. Ad. Frider. p. 2. t. 2.

Cercopithecus totus niger. Briss. quadr. 139. n. 5.

Sai. Buffon hist. nat. T. XV. p. 51. t. 8.

Weeper. Pennant syn. 127. n. 94.

Simia Capucina. Schreber Sæugth. I. p. 120. t. XXIX.
Habitat in America meridionali. Tarſis incedit, non saltat,
misera & ejulans semper, clamore horrendo hostes pellit;

*Notæ primariæ Simiarum sunt Cauda recta s. prehensili; Nates calvæ s. tectæ;
Ungues rotundati s. subulati; Mentum barbatum s. imberbe; Buccæ
saccatae s. non saccatae.*

*Tedio comis arborum intexto altissimisque columnis innixa obumbrantur terres
æstuantes, inter tropicos Indiæ, ne adurantur; hoc tedum inhabitant gentes.
Simiarum cum Psittacis volucribusque aliis.*

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

stridet saepius uti cicada; irata latrat more catuli.
Caudam spiralem gerit, circumque collum saepius
conjicit. Moschum olet.

Corpus magnitudine felis domesticæ, fuscum, at caput,
pedes, caudaque nigra. Facies fronte nunc nigra nunc
incarnata. Dentes laniarii approximati. Nasus versus
oculos carinatus. Rubra varicosa nigra retractilis supra
frontem ante pileum. Cauda longa semper curvata,
pilis longioribus villosa. Pedes situ transverso ponit,
ut postici semper ante anticos collacentur.

sciurea. 31. *S. caudata imberbis*, occipite prominulo, unguibus qua-
tuor plantarum subulatis, natibus testis.

Simia imberbis, cauda longa, occipite gibbo, unguibus
plantarum quatuor oblongis. *Mus. Ad. Frider.* p. 3.

*Cercopithecus pilis ex fusco flavicaute & canticante varie-
gatis*, pedibus ex flavo rufescens. *Briff. quadr.* 197.
Simia americana parva subbarbata, caudata, ore cæruleo
nigro, unguibus oblongis. *Wagner mus. Baruth.* p. I. t. I.

Cercopithecus minor luteus. *Barrere franc. équinox.* p. 151.
Caitaia. *Marcgr. bras.* p. 227.

Saimiri. *Buffon hist. nat.* T. XV. p. 67. t. 51.

Orange ape. *Penn. syn.* p. 128. n. 95.

Simia sciurea. *Schreber Saeugth.* I. p. 121. t. XXX.

Habitat in America meridionali. *Lepidum animal quescit*
supra abdomen; alloquentis aspicit fauces, climatis
Europei impatiens.

Corpus sciuri, sedentis animalis septeni pollices altum,
griseo-virens, subtus albidum. Ulnæ & tibiæ ferru-
gineaæ. Cauda villosa, apice nigra, corpore duplo lon-
gior. Pollicum unguis rotundatus. Os fusco-cærulescens.
Supercilia setacea. Aures villis raris albidis.

Morta. 32. *S. caudata imberbis spadicea*, ore fusco, cauda nuda
squamosa.

Cercopithecus americanus minor Monkie dictus. *Seba*
mus. I. p. 22. t. 33. f. 1.

Cercopithecus dorso spadiceo, ventre glabro, cauda
murina. *Briff. quadr.* 201.

Habitat in America.

Ætate solum minore a S. sciurea differre videtur.

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

39

- Syrichta. 33. *S. caudata imberbis*, ore ciliisque vibrissatis.
Cercopithecus caudatus imberbis, ore fusco, cauda nuda
 squamosa. *Gronov. Zool. 21.*
Cercopithecus luzonicus minimus. *Pet. gaz. 21. t. 13. f. II.*
 * * cauda non prehensili.
- Pithecia. 22. *S. caudata imberbis*, vellere nigro apice albo, cauda
 nigra villosissima.
Simia minima capite albido, dorso fusco pene rufescente,
 cauda crinita. *Brown. jam. 489.*
Cercopithecus pilis nigris apice albo vestitus, cauda pilis
 longissimis nigris obsita. *Briff. quadr. 195.*
Saki Buff. hist. nat. T. XV. p. 88. t. 12.
Sakawinkee. Bancroft Guian. p. 80.
Fox-tailed ape. Penn. syn. p. 130. n. 98.
Simia Pithecia. Schreber Sacugth. I. p. 125 t. XXXII.
*Habitat in America meridionali, lepidissima, facile manu-
 scens.*
*Corpus aliquando sequispedale nigrum, pilis omnibus apice
 albis. Facies pilis brevissimis albidis. Gula & abdomen
 pilis sordide albicantibus. Ungues longi obtusi.*
- Jacchus. 24. *S. caudata*, auribus villosis patulis, cauda hirsutissima cur-
 vata, unguibus subulatis: pollicum rotundatis.
*Ceropitechus tæniis transversis alternatim fuscis & e cine-
 reo albis variegatus*, auriculis pilis albis circumdati.
Briff. quadr. 202.
*Cercopithecus brasiliensis 3. Sagouin. Clus. exot. 372.
 t. 372.*
Galeopithecus, qui Sagoin à Brasiliensibus nominatur.
Gesn. quadr. p. 369.
Cagui minor. Maregr. bras. 227.
Sanglin on *Cagui minor. Edw. av. V. p. 15. t. 218.*
*Ouistiti. Buff. hist. nat. XV. p. 96. t. 14. Pall. n. nord.
 Beytr. 2. p. 41.*
Striated ape. Penn. syn. p. 132. n. 100.
β. Cercopitechus ex albido flavescens, moschum redolens.
Briff. quadr. 197.
Cercopitechus brasiliensis primus. Clus. exot. 371.
*Habitat in Brasilia, agilis, irrequieta, scandens more sciuri,
 incurvata non prehensili cauda; rodit ligna, ut mu-
 res, edit insecta, fructus, lacticinia, panes triticeos,
 martiosque, theam, passeres, indomita, morosans, felibus
 infestissima, quibus se sub earum ventre assigit. Sonus
 stridor sibilans; odor moschi.*

MAMMALIA PRIMATES. Simia.

Corpus sciuro minus, vix o^{cto} pollices longum, griseo-cinerascens. Caput minimum atrum. Labia & frons alba, sed inter oculos flavescens. Aures antice tegit barba alba, longitudine totius auriculae, ne statu intret. Cauda corpore longior albo-annulata. Dentes primores 4: intermedii latiores paralleli; laterales acuti, minus apice distantes.

Oedipus. 25. S. caudata imberbis, capillo dependente, cauda rubra, unguibus subulatis.

Cercopitechus pilis ex fusco & rufo vestitus, facie ultra auriculas usque nigra & nuda, vertice longis pilis albis obsito. Briss. quadr. p. 150. t. 28.

Little-Lion-monkey. Edw. av. 3. p. 195. t. 195.

Cagui major Brasiliensis. Marcgr. bras. 227.

Pinche. Buff. hist. nat. T. XV. p. 114. t. 17.

Red-tailed ape. Penn. syn. 133. n. 102.

Habitat in America meridionali. Agilis & lepida gestibus leonem imitatur, S. Jaccho satis affinis magnitudine, paulo tamen minore, odore moschi. Vox muris.

Corpus parvum, sex circiter, pollicum, griseum, subitus album. Caput capillitio dependente longo albo. Facies nigra, ultra aures pilis raris albis. Verruca in utraque bucca. Irides ferruginea^e. Auriculae subrotundae, nigrae, nudae. Ungues omnes subulati, excepto pollicis palmarum brevi. Cauda corpore duplo longior, parum pilosa, basi rufa, ceterum nigra. Ani regio rubra.

Rosalia. 26. S. caudata imberbis, capite piloso, faciei circumferentia pedibusque rubris, unguibus subulatis.

Cercopitechus ex albido flavicans, faciei circumferentia saturate rufa. Briss. quadr. 200.

Cercopitechus minor dilute olivaceus, parvo capite, Acarima à Cayenne. Barrere Fr. équin. p. 151.

Marikina. Buff. T. XV. p. 108. t. 16.

Silki monkey. Penn. syn. p. 133. n. 101. t. 15.

Simia Rosalia. Schreber Sacug:h. I. p. 130. t. XXXV.

Habitat in America meridionali, lepida, & frigoris minus impatiens, quam affines.

Simiae suspectae, memores, petulantes, imitatores, gesticulatores, indociles, minantur, rident, cibos bucca macerant, pediculos venantur, tacitu excellunt, nam os ulnis gerunt, terrefactae cacant immundae, urinæ meatu s^ep^e distindo a vulva; utero etiam gerentes libidines; phytiphage.

MAMMALIA PRIMATES. Simia. Lemur.

41

Corpus ex albido flavicans. Pollices omnes unguibus rotundatis. Auriculae nudæ, sub capitibz pilis occultatæ. Briss.

argentata. 47. S. caudata imberbis exalbida, satie rubra, cauda fuscescente. Mant. pl. 2. p. 521.

Cercopitechus excinereo albus argenteus, facie auriculisque rubris splendentibus, cauda castanei coloris. Briss. quadr. p. 142. n. 12.

Mico. Buffon hist. nat. T. XV. p. 121. t. 18.

Fair ape. Penn. syn. p. 134. n. 103.

Simia argentata. Schreber Saeugth. I. p. 131. t. XXXVI.

Habitat ad Amazonum fluvium, septem pollices longa. Ungues incurvi, pollicum plantarum rotundati.

Midas.

27. S. caudata imberbis, labio superiore fisso, auribus quadratis nudis, unguibus subulatis, pedibus croceis. Mus. Ad. Frid. 2. p. 4.

Cercopitechus minimus niger leontocephalus, auribus elephantinis. Barrere Fr. equin. p. 151.

Cercopitechus niger minimus, manibus & pedibus croceis. Edw. av. 196. t. 196.

Cercopitechus niger, pedibus croceis. Gronov. zooph. 20. Cai. Raj. quadr. 155.

Tamarin. Buff. hist. nat. XV. p. 92. t. 13.

Habitat Surinami.

Magnitudo sciuri. Manus & pedes crocei. Corpus atrum.

Cauda duplo longior, nigra. Aures nudæ, amplæ, retusæ. Ungues omnes subulati s. ferini, exceptis pollicum plantarum rotundatis s. humanis.

3. LEMUR. *Dentes primores superiores IV: intermediiis remotis.*

inferiores VI longiores, porrecti, compressi, paralleli, approximati.

Laniarii solitarii, approximati.

Molares plures sublobati: antici longiores, acutiores.

tardigradus.

I. *L. ecaudatus subferrugineus. Schreber Saeugth. I. p. 134. t. XXXVIII.*

Simia unguibus indicis pedum posteriorum longis, incurvis & acutis. Briss. quadr. 190. n. 3.

MAMMALIA PRIMATES. Lemur.

Simia cynocephala unguibus indicis longis, incurvis & acutis. Briss. quadr. 191. n. 2.
Animalculum cynocephalum tardigradum dictum. Seba thes. I. p. 55. t. 35.
Cercopitechus ceylonicus seu tardigradus dictus major. Seb. thes. I. p. 75. t. 47. f. 1.
Loris. Buff. hist. nat. T. XIII. p. 210. t. 30.
Tail-leis Maucauco. Penn. syn. p. 135. t. 16. f. 1.
Habitat in Zeylona, agilis, auditu excellens, monogamus.
Statura sciuri, subferruginea, linea dorsali subfuscata; gula albidiore. Linea longitudinalis oculis interjecta alba.
Facies testacea. Auriculae urceolatae, intus bifoliatae. Pedum palmæ plantæque nudæ. Ungues rotundati: indicum planterum vero subulati. Cauda nulla. Mammæ 2 in pediore, 2 in abdomine versus pedus.

- Indri. 9. *L. ecaudatus niger.*
Indri. Sonner. it. 2. p 142. t. 88.
Habitat in Madagascar, 3½ pedes altus, junior facile circumcidandus, & ab incolis ad venatum adaptatus; vox ejulantis infantis.
Dentes canini in utraque maxilla 8, primores in superiore 2, in inferiore approximati 4; pedes pentadactyli, unguibus complanatis acutis, planterum pollice prægrandi; pilis densi, sericei, in ani regione crassi, albi; versus genitalia & in facie grisei, ceterum nigri; caudæ vestigium tamen discerneendum.
- Potto. 6. *L. caudatus subferrugineus, cauda unicolo.*
Potto. Bosman. bestiyo. van de guin. kust. II. p. 30. f. 4.
Habitat in Guinea, præter caudam priori simillimus.
- Mongoz. 2. *L. caudatus griseus cauda unicolo. Schreber. Saeugth. I. p. 132 seqq. t. XXXIX. B.*
Mongooz. Edw. av. 5. p. 12. t. 216. Walch Naturforsch. VIII. p. 26.
Woolly Maucauco. Penn. syn. p. 136. n. 105.
Corpus griseum vel potius fuscum, subtus album. Fascia oularis nigra. Manus dilute cinereæ.
 $\beta.$ corpore griseo vel fuscō, facie manibusque nigris. *Edw. av. 5. p. 13.*
 $\gamma.$ corpore griseo vel nigro, macula nigra circa oculos.
Simia-sciurus lanuginosus fuscus ex Johannæ insula, an Cercopitechus indicus Bugee dictus Raji? Petiv. gal. p. 26. t. 17. f. 5.

- ♂. corpore fusco, nafo manibusque albis.
Prosimia fusca, nafo, gutture, pedibusque albis. Briss. quadr. p. 156. n. 2.
- ♀. corpore toto fusco.
Sinius Zambus. Nieremb. hist. nat. p. 176.
Prosimia fusca. Briss. quadr. p. 156. n. 1.
- ♂. corpore griseo, facie nigra, manibus fulvis. Schreber Sacugth. I. p. 138. t. XXXIX. A.
Prosimia fusca, rufo admixto, facie nigra, pedibus fulvis.
Briss. quadr. p. 157. n. 3.
Mongous. Buffon hist. nat. XIII. p. 174. t. 26.
Habitat in insula Madagascar, S. Johanne & vicinis.
Ungues indicis plantarum subulati, longiores.
- Macaco. 3. L. caudatus niger, collari barbato. Schreber Saeugth. I. p. 142. t. XL. A.
Black Maucaco. Edw. av. 5. t. 217.
Ruffed. Maucaco. Penn. syn. p. 138. n. 107.
- ♂. corpore fusco.
Lemur cauda floccosa, corpore fusco. Gronov. zooph. 22.
- ♀. corpore albo.
Antavarre tout blanc. Cauche rel. de Madag. p. 127.
- ♂. corpore nigro & albo mixto. Schreber Saeugt. I. p. 142. t. XL. B.
Vericassi. Flacourt voy. p. 153.
Vari. Buffon hist. nat. XIII. p. 174. t. 27.
Habitat in insulis Madagascar, S. Johanne & vicinis.
Cubile purum serrat; radiis solis delectatur; dormit in loco tenebricoso; respuit ova, carnes, pisces; rugitus edit fere in slar lconis.
Plantarum unguis indicis fere subulati.
- Catta. 4. L. caudatus, cauda albo nigroque annulata. Mus. Ad. Frid. 2. p. 5. Schreber Saeugth. I. p. 143. t. XLI.
Hermann Naturf. XV. p. 159.
Prosimia cinerea, cauda cincta annulis alternatim albis & nigris. Briss. quadr. p. 222.
Simia-sciurus madagascariensis sive Maucaco. Edw. av. 4. 197. t. 197.
Mococo. Buff. hist. nat. XIII. p. 174. t. 22.
Ring-tail Maucaco. Penn. syn. 137. n. 106.
Habitat in insulis Madagascar, Franciae, S. Johanne, gregaria, mitissima, scandit omnibus pedibus, ut simia

MAMMALIA PRIMATES. Lemur.

Viditat fructibus, oleribus, radicibus; cibos tenet manibus; tardiuscula, placida & tranquilla murmurat ut felis. Oculus dexter diurnus pupilla linearie perpendiculari; sinister nocturnus pupilla orbiculata magna in mea erat; an sic natura vel fato? Ungues indicis palmarum non longiores aut subulati.

murinus. 7. *L. caudatus cinereus, cauda ferruginea. Miller on various subjects of natural history. T. XIII. A. B.*

Habitat in Madagascar.

Ungues omnes plani rotundati.

bicolor. 8. *L. caudatus, supra ex atro griseus, subtus sordide albus, macula frontali cordata sordide alba. Miller on various subjects. T. XXXII. f. A.*

Habitat in America meridionali.

Capite canem molossum refert. Ungues omnes subulati.

laniger. 10. *L. caudatus ex flavo rufescente testaceus subtus albus, cauda ex rufescente fulva unicolore.*

Maquis à bourres Sonner. it. 2. p. 142. t. 89.

Habitat in Madagascar, sine cauda novem pollices ultra pedem longus.

Pili mollissimi crassi, in regione lumborum ex rubescenti fulvi; facies nigra; auriculae minutæ; oculi magni, ex virescente grisei; dentes primores in maxilla superiori 2, in inferiore 4; cauda 9 pollices longa; pedes pentadactyli, unguibus longis, pollicum ungue rotundato.

volans. 5. *L. caudatus, membrana ambiente volitans. + Pallas Act. Ac. Sc. Petrop. 1780. P. I. Schreber Saeugth. I. p. 146. t. XLIII.*

Cato-Simius volans Camelli. Petiv. gaz. 14. t. 9. f. 8. Act. angl. 277. n. 1065.

Vespertilio admirabilis. Bont. jav. 68. t. 69.

Felis volans ternatea. Sch. mus. I. p. 93. t. 58. f. 2. 3.

Habitat in Gufurate, insulis Philippinis & Moluccis, vivens fructibus arborum, gregaria, vespertino tempore. Membrana more sciuri s. muris volantis a capite ad manus, a manibus per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudæ expansa. Ungues acuti. Mammæ pedoculares. Ex mammis videtur lemuriibus s. simiis proximum animalculum. Hujus descriptio & genericæ notæ, duni modo juniora exempla in Europam per venerint, etiamnum deficiunt.

4. VESPERTILIO. *Dentes omnes crecti, acuminati, approximati.*
Manus palmatæ volitantes membrana corpus cingente.

* *Dentibus primoribus in utraque maxilla quatuor.*

Vampyrus. I. *V. ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora divisa.*

Ternate bat. *Penn. syn. p. 359. n. 274.*

a. *colore potissimum nigro. Schreber Saeugthieré, I. p. 153. t. XLIV.*

Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiusculis. Briff. quadr. p. 153.

Vespertilio ingens. *Clus. exot. p. 94.*

Vespertilio volans. *Bont. jav. 68. t. 69.*

Canis volans ternatanus orientalis. Seb. mus. I. p. 91. t. 57. f. I. 2.

Chien volant. *Daubenton act. Paris. 1759. p. 384.*

Roussette. *Buff. hist. nat. X. p. 55. t. 14.*

β. *corpo ex atro fuscō.*

Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiusculis, colla superiore rubro. Briff. quadr. p. 154.

Chauve-Souris de l'isle Sabuda dans la nouvelle Guinée.

Dampier voy. V. p. 81. t. 5.

Great bat. *Edw. av. 4. p. 180. t. 180.*

Roussette. *Daubent. act. Paris. 1759. p. 385.*

Rougette. *Buff. hist. nat. X. p. 55. t. 17.*

γ. *corpo stramineo.*

Lesser Ternate bat. Penn. synops. p. 362. t. 31. f. 1.
Habitat in Africa occidentali, Asia meridionali, insulis oceanii indici, & australis. Noctu haurire sanguinem dormientium servorum, cristas gallorum & lacrymas palmarum fertur, phlebotomus felicissimus in pleuritide. Magnis glomeribus aliquando adhaeret arboribus.

Dentes primores obtusiusculi; laniarii superiores solitarii, antice ab inferiore dente sulcati; inferiores bini cum dente primore parvo obtuso inter utrosque; molares obtusiusculi plures. Nares vix divisa. Corpus magnitudine

Vespertilionum genus nocturnum volitat palmis expansis palmatis membranaque, laterali. Phalænis inpinis rigidans. .

MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio.

sciuri a 5-9 pollices longum, Manuum digitus primus separatus unguiculatus, secundus membranæ affixus; Plantæ fissæ unguiculatae, calcaneis postice excurrentibus insubulatam cartilaginem membranæ annexam. Membrana nictans in cantho oculi majore. Utérus simplex;

Spectrum. 2. *V. ecaudatus, naso infundibuliforme lanceolato. Schreber Saeugt. I. p. 159. t. XLV.*

Pteropus auriculis longis patulis, naso membrana antrorum inflexa aucto. Briss. quadr. 154.

Canis volans maxima aurita ex nova Hispania. Seb. mus. I. p. 92. 58. f. 1.

Andira gnacu, vespertilio cornutus. Piso brasili. p. 290.

Vampire. Buff. hist. nat. X. p. 55.

Habitat in America Australi. Rolandcr:

Nares ante infundibulum referentes, superne adscendentis in folium lancicolatum. Aures ovatae, interius lacinia subulata membranacea, longitudine auriculae. Dentes laniarii solitarii magni; molares anteriores breviores obtusiores. Alarum digiti 4, quorum 1 annexus 2dus; pollex brevis ungue arcuato. Pedes digitis 5 æquibus, unguibus arcuatis. Calcaneus exserit tendinem subulatum secundum marginem membranæ inter pedes posticos, non coeuntem cum opposto.

perspicil- 3. *V. ecaudatus, naso foliato plano acuminato. Mus. Ad-
latus. Frid. p. 7. Schreber Saeugth. I. p. 160. t. XLVI. A.
Vespertilio americanus vulgaris. Seb. mus. I. p. 90. t. 55
f. 2.*

Habitat in America Australi.

Palmae huic & sequenti digitis quinque:

Spasma. 4. *V. ecaudatus, naso foliato obtuso cordato. Schreber Saeugth.
I. p. 158. t. XLVIII.*
Vespertilio cauda nulla, naso foliato, auriculis maximis appendiculatis. Gronov. zooph. I. p. 7. n. 27.
Vespertilio subrufus, auriculis duplicibus, naso gemino. Briss. quadr. p. 161. n. 4.
Glis volans ternatanus. Seb. mus. I. p. 90. t. 56. f. 1.
Cordated bat. Penn. syn. p. 364. n. 278.
Habitat in Zeylona & insulis Moluccis.

MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio.

47

- haftatus. 6. V. ecaudatus, naso foliato trifolii figuram emulante. Schreber Saeugth. I. p. 161. t. XLVI. B.
Le Chauve-souris fer de lance. Buff. hist. nat. XIII. p. 226. t. 33.
Javelin bat. Penn. syn. 363. n. 276.
Habitat in America australi, perspicillato affinis, obscure fuscus vel niger.
- foricinus. 8. V. ecaudatus, rostro producto, naso foliato cordato. Pallas Spicileg. zoolog. III. p. 24. t. III. Schreb. Saeugth. I. p. 161. t. XLVII.
Vespertilio cauda brevissima, naso foliato acuminato, auriculis subsimplicibus rotundatis. Gron. zooph. p. 7. n. 26.
Vespertilio americanus vulgaris. Edw. av. 5. 201. t. 201. f. I.
Leaf bat. Penn. syn. 364. n. 277.
Habitat in America australi.
Cauda brevissima. Lingua papillis acutis obfita.
- leporinus. 9. V. caudatus, labio superiore bifido. Syst. nat. Ed. X. p. 26. n. 5. Schreber Saeugth. I. p. 162. t. LX.
Noctilio americanus labio inferiore varicofo. Syst. nat. Ed. XII. p. 88. n. 1.
Vespertilio americanus rufus. Briss. quadr. 227.
Vespertilio cato similis americanus. Seb. mus. I. p. 89. t. 55. f. I.
Chauve-souris de la vallée d'Ylo. Feuillé obs. I. p. 623.
Peruvian bat. Penn. syn. p. 365. n. 279.
Habitat in America meridionali, vivitans fructibus arborum, ratto magnitudine aequalis.
- ** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 4; in inferiore 6.*
- auritus. 5. V. caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite majoribus. Fn. suec. 3.
Vespertilio auribus majoribus. Frisch. av. t. 103. Edw. av. 5. t. 201. f. 3.
Vespertilio caudatus, naso simplici, auriculis maximis inappendiculatis. Gron. zooph. p. 23.
Vespertilio murini coloris, auriculis duplicitibus. Briss. quadr. 160.
Vespertilio auriculis quaternis. Johnst. av. p. 34. t. 20.
Oreillar. Buff. hist. nat. VIII. p. 118. t. 17. f. I.
Habitat in Europa. Vere distincta a sequenti species,

musinus. 6. *V. caudatus*, *naso oreque simplici*, *auriculis capite minus* *noribus.* *Fn. succ.* 2.

Vespertilio murini coloris auriculis simplicibus. *Briss. quadr.* p. 158. n. 1.

Vespertilio. *Aldrov. ornith.* p. 575. 576.

Vespertilio auribus minoribus. *Frisch. av.* t. 102. *Edw. av.* 4. t. 201. f. 2.

Chauve-souris. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 113; t. 16.

Common bat. *Penn. syn.* p. 371. n. 291.

Habitat in Europa.

Noctu volat; vivitat in primis phalænis; prædatur a strixibus; capitur arctii lappæ calycibus candelactis; de terra non evolat. Hybernat mortuus, reviviscit superatis noctibus plumbis initio florescentiaæ. Æstate fætet.

Anatome E. N. C. d. 2. a. I. obs. 48.

Noctula. 10. *V. caudatus*, *naso oreque simplici*, *auriculis ovalibus operculatis*: *operculo exili.* *Schreb. Sæugth.* I. p. 166; t. LII.

Vespertilio. *Gesn. av.* p. 694. ic.

Vespertiliones alii. *Aldrov. ornith.* p. 575. 576.

Noctule. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 128. t. 18. f. 1.

Great bat. *Penn. zool. br. ill.* t. 103.

Habitat in Gallia, Germania, Britannia, æstate fætensis;

Serotinus. 11. *V. caudatus* *flavescens*, *auriculis brevibus emarginatis;* *Schreber Sæugth.* I. p. 167. t. LIII.

Serotine. *Buff. hist. nat.* VIII. 129. t. 18. f. 2.

Habitat in Gallia & Germania.

Pipistrel- 12. *V. caudatus* *ex atro fuscus*, *fronte convexa*, *auriculis ovatis, emarginatis, capite vix longioribus.* *Schreber Sæugth.* I. p. 167. t. LIV.

Pipistrelle. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 129. t. 19. f. 1.

Habitat in Gallia rarius in Germania, vix duos pollices longus, paulisper fætens;

Barbastel- 13. *V. caudatus*, *buccis elatis pilosis, auriculis magnis inferius angulatis.* *Schreber Sæugth.* I. p. 168. t. LV.

Barbastelle. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 130. t. 19. f. 1.

Habitat in Burgundia, duos pollices longus.

hispidus. 14. *V. caudatus pilosus, naribus canaliculatis, auriculis longis angulis.* *Schreber Sæugth.* I. p. 169. t. LVI.

Campagnol volant. *Daubent. aæ. t. aris.* 1759. p. 388.

Autre

MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio.

49

Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. p. 88. t. 20 f. 1. 2.
Bearded bat. *Penn. syn.* p. 367. n. 202.
Habitat ad Senegal fluvium.

*** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 4,
in inferiore 8.*

Pictus. 15. *V. caudatus*, *naso simplici*, *auriculis infundibuliformibus*
appendiculatis. *Gronov. zooph.* p. 7. n. 25. *Pallas*
spicil. III. p. 7. *Schreber Sacugth.* I. p. 170. t. XLIX.
Vespertilio ternatanus. *Seb. mus.* I. p. 91. t. 56. f. 2. 3.
Muscardin volant. *Daubent. act. Paris.* 1759. p. 388.
Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. p. 92. t. 20. f. 3.
Striped bat. *Penn. syn.* p. 368. n. 284.
Habitat in Zeylona, ubi Kiriwonla audit.

**** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2,
in inferiore 6.*

Nigrita. 16. *V. caudatus* ex *flavescente fuscus* *capitis parte anteriore*,
pedibus caudaque nigris. *Schreber Sacugthiere*, I. p.
171. t. LVIII.
Marmotte volante. *Daubent. act. Paris.* 1759. p. 385.
Chauve-souris étrangère. *Buff. hist. nat.* X. p. 82. t. 18.
Senegal. bat. *Penn. syn.* p. 366. n. 281.
Habitat ad fluvium Senegal, quatuor pollices longus.
Adanson.

***** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2,
in inferiore 4.*

Molosus. 17. *V. caudatus*, *cauda longe ultra membranam connectentem*
protensa, labio superiore pendulo. *Pallas spicil. zool.*
III. p. 8.
Bull-dog bat. *Penn. syn.* p. 366. n. 280.
α. *major*, *supra ex cinereo fuscus, infra cinereus, & in*
medio ventre fuscus. *Schreber Sacugth.* I. p. 171. 172.
t. LIX. ic. inf.
Mulot volant. *Daubent. act. Paris.* 1759. p. 387.
Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. pag. 84. t. 19. f. 1.
β. *minor*, *supra subfuscus cinereo mixtus, infra sordide albus.*
Schreber Sacugth. I. p. 171. 172. t. LIX. f. sup.
Autre chauve-souris. *Buff. hist. nat.* X. pag. 87. t. 19. f. 2.
Habitat in insulis Americæ oppositis.

D

MAMMALIA PRIMATES. Vespertilio.

***** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 2, in inferiore 0.*

cephalo- 18. *V. caudatus*, capite magno, labiis productis, naribus spiralibus, verrucis subocularibus, auriculis parvis non operculatis. *Pallas spicil. Fas. III. p. 10. t. 1. Schreber Saeugth. I. p. 172. t. LXI.*

Habitat in Moluccis, 2½ pollices longus. Schlosser. Lingua echinata. Pili supra cinerei, infra albidi.

***** *Dentibus primoribus in maxilla superiore 0, in inferiore 4.*

lepturus. 19. *V. caudatus*, naribus tubulatis, auriculis longis obtusis operculatis, membranæ utriusque pedes connectenti annexo interius marsupio. *Schreber Saeugth. I. p. 173. t. LVII. Habitat in Surinamo. Rudolph.*

Ferrum 20. *V. caudatus*, naso ferro equino simili, auribus caput equinum. æquantibus non operculatis, cauda dimidia corporis longitudine.

Fer à cheval. Buff. hist. nat. VIII. p. 131. t. 17. f. 2^e. p. 132. t. 20.

α. major. *Schreb. Saeugth. I. p. 174. t. LXII. ic. sup.*

β. minor. *Schreb. Saeugth. I. p. 174. 175. t. LXII. ic. inf. Habitat in Gallia & Franconia, ab Ill. Daubenton de vespertilionum genere meritissimo detectus.*

***** *Dentibus primoribus plane nullis.*

novebo- 21. *V. caudatus*, cauda longa, naso brevi acuto, auribus racensis. brevibus rotundis.

New-York bat. *Pen. syn. p. 367. t. 31. f. 2.*
Habitat in America septentrionali.

***** *Dentium numero & ordine (mille quidem) ignoto.*

Iascope- 22. *V. caudatus* membrana pedes connectente latissimum rus. *Schreber Saeugth. I. t. LVIII. B.*

Iasurus. 23. *V. caudatus* labiis tumidis, cauda lata. *Schreb. Saeugth. I. t. LXII. B.*

II. BRUTA.

*Dentes primores nulli utrinque.***7. BRADYPU. S.** *Dentes Primores nulli utrinque.*

*Molares utrinque VI oblique
truncati cylindrici , ante-
riores duo longiores , am-
plio hiatu distantes.*

Corpus pilis tectum.

- dida&ty-** 1. B. pedibus tridactylis , cauda brevi. *Mus. Ad. Fr. 4.*
Ius. *Bradypus crinitus*, palmis tridactylis , unguibus arcuatis.
Brown jam. p. 489.
Tardigradus pedibus anticis & posticis tridactylis. Briss. quadr. p. 21.
Arctopithecus. Gesn. quadr. p. 869.
Ignavus. Clus. exot. p. 372. fig. p. 373.
Luyaert. Nienhof Brasil. p. 27.
Pigritia sive Haut. Nieremb. hist. nat. 163. 164.
Sloth. Edw. av. t. 220.
Ai. Buffon hist. natur. XIII. p. 34. t. 5. 6.
Pareffeux. Gautier obs. sur l'hist. nat. I. P. 2. p. 81 t. A. f. 4.
*Habitat in Americae meridionalis calidioris arboribus. Vidi-
tat foliis teneris, in primis Cecropiae ; non bibit ; imbre-
metuit. Facile scandit, tardissime & ægre incedit, vix
uno die 50 passus ; attonitus quasi caput flebit ; sonus se-
narius ascendens ; clamor horrendus, lacrymæ miserae.*
*Corpus pilosissimum griseum¹; Facies nuda; Gula flava; Au-
ricularia nulla. Cauda subovata. Pedes anteriores lon-
giores posterioribus, divaricatissimi : digitii combinati, in
singulis pedibus tres ; unguis compressi, validissimi, toti-
dem. Mammæ 2 pectorales.*

- dida&ty-** 2. B. manibus didactylis , cauda nulla. *Mus. Ad. Fr. 4.*
Ius. *Schreber Saeugt. II. p. 200. t. LXV.*
Bradypus pedibus anticis didactylis , posticis tridactylis. Briss. quadr. p. 22.
*Tardigradus Zeylanicus. Seb. mus. I. p. 54. t. 33. f. 4. &
t. 34. f. 1.*
Unan. Buffon hist. nat. XIII. p. 34. t. 1.

MAMMALIA BRUTA. Myrmecophaga.¹

Habitat in America meridionali & India. Viditat fructibus & radicibus ; olfactu debili, visu magis nocturno, quam diurno.

Corpus pilis ferrugineis undulatis. Caput rotundatum. Auriculae magnae. Ungues in palmis 2, in plantis 3. Mammæ 2 pectorales.

8. MYRMECOPHAGA. Dentes nulli.

Lingua teres extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus pilis tectum.

dida&tyla. 1. M. Palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villofa. *Mus. Ad. Fr. I. p. 8.*

Myrmecophaga rostro brevi, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis. Briss. quadr. 98.

Tamandua s. Coati americana alba. *Seb. mus. I. p. 60. t. 37. f. 3.*

Little ant-eater. *Edw. av. t. 220.*

Fourmiller. *Buffon hist. nat. X. p. 144. t. 30.*

Habitat in America australi. Talis lente incedit.

Corpus flavescentis, reliquis minus. Rostrum reliquis brevius.

tridactyla. 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villofa. *Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tridactylis, posticis pentadactylis, auriculis longis flaccidis. Briss. quadr. 27.*

Tamandua-guacu. *Seb. mus. I. p. 60. t. 37. f. 2.*

Habitat in India. Lente currit, cauda lata instar muscarii se tegit; arbores etiam scandit.

Mammæ pectorales 2, abdominales 6. Plaga lateralis nigra. Dorsum longitudinaliter jubatum. Cauda compressa, subtus nigra, pilis longioribus, supra pilis longioribus apice albis.

An vere distincta species?

jubata. 3. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda jubata. *Schreber Saeugth. II. p. 203. t. LXVII.*

Myrmecophagæ vescuntur formicis, quarum nidos ungue secant, insecta ipsa linguis acervis inserta alliciunt: Mansuecant & aii absque viatu vivunt; interdiu dormiunt, capite sua brachii recondito, nocte excent. Vellus crassissimum.

MAMMALIA BRUTA. Myrmecophaga. 53

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissimis pilis vestita. Briff. quadr. 24.

Tamandua-guacu. Marcgr. bras. 225. t. 225.

Tamanoir. Buffon hist. nat. X. p. 141. t. 29.

Great ant-eater. Penn. syn. p. 331. n. 260.

Habitat in America australi, & Africæ regno Congo.

Cauda dum dormit & contra pluviam se tueretur.

Plaga pectoralis lateralis nigra. Cauda villossissima, pilis longis planis, nec teretibus. Caro ab Americæ incolis comeditur.

tetradactyla. 4. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda calva. Schreber Saeugth. II. p. 205. t. LXVI.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda fere nuda. Briff. quadr. 26.

Tamandua-i. Buff. hist. nat. X. p. 144.

Middle ant-eater. Penn. syn. p. 332. n. 261.

Habitat in America meridionali. Noctu exit, die dormit; irata baculum prehendit, stertit posterioribus pedibus insidens.

Caudæ extremitas calva, qua se ex ramis arborum suspendere potest. Plaga pectoralis lateralis nigra.

capensis. 5. M. palmis tetradactylis, rostro longo, auriculis magnis pendulis, cauda corpore breviore ad apicem attenuata. Pallas miscell. zoolog. n. 6.

Habitat ad Caput bonæ spei, reliquis speciebus major, ut cum porco comparet Kolbe, & centum libras pondere afferat: Edit, interdiu dormit, noctu exit.

9. MANIS. Dentes nulli.

Lingua teres extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus supra squamis mobilibus osseis tectum.

pentadactyla. 1. M. pedibus pentadactylis. Ad. Stockh. 1749. p. 265. t. 6. f. 3. Schreber Saeugth. II. p. 210. t. LXIX.

Philodotus pedibus anticis & posticis pentadactylis, squamis subrotundis. Briff. quadr. 29.

Lacertus indicus squamosus. Bont. jav. p. 60.

Lacertus squamosus minor setulis adspersus. Petiv. gaz. 32. t. 20. f. 2.

MAMMALIA BRUTA. *Manis.*

- Armadilles squamatus major ceylanicus, seu diabolus ta-
jovanicus dictus. *Seb. mus. I. p. 88. t. 54. f. 1. & t.
53. f. 4.*
Myrmecophagus squamatus s. *Dæmon thebaicus. Herm.
mus. 295.*
Pangolin. Buff. hist. nat. X. p. 180. t. 34.
Short-tailed Manis. Penn. syn. p. 329. n. 259.
Habitat in Guinea, China, India & Insulis oceanii Indici.

tetradactylus. 2. *M. pedibus tetradactylis. Schreber Saeugthiere, II. p. 211.
t. LXX.*

- Philodotus pedibus tetradactylis, squamis mucronatis,
cauda longissima. Briss. quadr. 31.*
Lacertus squamosus peregrinus. Clus. exot. 374.
Lacerta indica yvanæ congener. Aldr. ovip. dig. 668. t. 667.
Scaly lizard. Grew rar. p. 46.
Long-tailed Manis. Penn. syn. p. 328. n. 258.
Platagin. Buff. hist. nat. X. p. 180. t. 34.
Habitat in India.

10. DASYPUS. *Dentes Laniarii nulli.*

*Molares breves cylindrici
utrinque 7-8.*

*Corpus cataphractum testa ossea
zonis intersecta.*

- unicinctus. 1. *D. tegmine tripartito, pedibus pentadactylis.*
*Cataphractus scutis duobus, singulis duodecim. Briss.
quadr. 43. Schreb. Saeugth. II. p. 225. t. LXXV.
LXXVI. f. 11. 12.*
Tatu s. Armadillo africanus. Seb. mus. I. p. 47. t. 30. f. 3. 4.
*Kabasson ou Tatou à douze bandes. Buff. hist. nat. X.
p. 218. t. 40.*
Twelve-banded Armadillo. Penn. quadr. p. 326. n. 256.
Habitat in Africa.

*Manis riddit formicis, vermis, lacertis; non sonora, lente incedit, sedit,
noctu rictum querit, irata squamas erigit horrende territa in globum se con-
trahit copite caudaque ventum versus adductis, ut nil conspiciri queat, nisi
squamosus globus. Caro edulis. Cauda pinguis, epulis expedita. Corpus su-
pra squamis basi striatis satisque intersticis vestitum, ut strobilus; subitus
hirtum est. Sed Cauda utrinque squamosa etiam subtus imbricata. Auriculae
nudæ rotundæ. Ungues primores medii majores, quibus contrariis incedit
Myrmecophagæ adeo affinis, ut solo vestimento differat.*

Tegmen dorſi anterius septem, poſtremum novem ſcutulorum ſeriebus conſtat.

- 18 cinctus. 9. D. cingulo ſimpli. *Syft. nat. Ed. VI. XII. I. β.*
Cataphractus ſcuto unico, cingulis 18. Briff. quadr. 37.
Tatu mustelinus. Raj. quadr. p. 225.
Cirquincon ou Tatou à dix-huit bandes. Buff. hift. nat. X. p. 220.
Weesle-headed armadillo. Grew muſ. p. 19. t. I.
Habitat in . . .
An vere a quadricinco diſtindus & ab 18 cindo Molinae hift. nat. Chil. L. IV. p. 271. qui palmas tetradactylas refert?
- tricinctus. 2. Dasypus cingulis tribus, pedibus pentadactylis. *Houtt. nat. 2. p. 280. t. 16. f. 2. Schreber Saeugth. II. p. 215. t. LXXI. A. LXXVI. I. 2.*
Cataphractus ſcutis duobus, cingulis tribus. Briff. quadr. 24.
Tatu f. Armadillo. Red. exper. 91. t. 92.
Tatu f. Armadillo orientalis. Seb. muſ. I. p. 62. t. 38. f. 2. 3.
Tatu apara. Marcgr. bras. 232.
Armadillo f. Tatou genus alterum. Cluf. exot. 109.
Armadillo. Grew muſ. 17.
Apas ou tatou à trois bandes. Buff. hift. nat. X. p. 206.
Habitat in Braſilia; viuitat melonibus, batatis, gallinis.
Lorieæ cingulum intermedium eſt anguſtissimum; ſingu-
lorum, etiam squamarum, ex quibus ſcuta conſtant, ſuperficies nodosa.
- quadri-
- cinctus. 3. D. cingulis quatuor.
Cataphractus ſcutis duobus, cingulis quatuor. Briff. quadr. 25.
Cheloniscus. Column. aquat. 2. p. 15. t. 16.
An varietas præcedentis? An diſtinctus ab hoc Dasypus quadricinctus Molinae hift. nat. Chil. L. IV. p. 270.
- ſexcinctus. 4. D. cingulis ſenis, pedibus pentadactylis. *Muſ. Ad. Fr. 7. Schreber Saeugth. II. p. 218. t. LXXI. B.*
Cataphractus ſcutis duobus, cingulis ſex. Briff. quadr. 25.
Tatu f. Armadillo prima Marcgravii. Raj. quadr. 233.

Viditan e Dasypi radicibus, melonibus, batatis, carnibus, pifeibus, inſectis, lumbris, node exeunt, interdiu quieti, fodunt, mites ſcuto, quod globi inſtar contrahunt, ab adverſariis ſe muniunt, meridionalis potiſſimum Americae incolae; feminæ ſingulis mensibus pariunt.

MAMMALIA BRUTA. *Dasyphus.*

- Tatu & Tatou-paba Brasiliensibus. *Marcgr. bras.* p. 231.
 Armadillo. *Olear. mus.* p. 7. t. 6. f. 4.
 Armadillo s. Tatou. *Clus. exot.* 330.
 Encouvert ou Tatou à six bandes. *Buff. hist. nat.* X. p. 209.
 t. 42.
Habitat in America meridionali. Edulis videtur melonibus, aliis fructibus, batatis aliisque radicibus, plantationibus infesta.
Cervix etiam scuto tecta. Penis spiralis; glande plane compressa, marginata.

- septem- 5. *D. cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis penta-*
cinctus. *Amoen. acad.* I. p. 281. *Schreber Saeugth.* II.
 p. 220. t. LXXII. LXXVI. f. 3. 4.
Tatus quadrupes peregrina. *Gesn. quadr.* 103.
Habitat in India & America meridionali.
Scutum anterius antice emarginatum. Cingula non nisi
sex mobilia,
- octocinc- 8. *D. scutis duobus, cingulis octo.* *Schreber Saeugthiere,*
tus. II. p. 222. t. LXXIII. LXXVI. f. 5. 6.
Cataphractus scutis duobus, cingulis octo. *Briss. quadr.* 27.
Aiatochtli. Hernand. mex. p. 314.
Tatouette ou Tatou à huit bandes. *Buff. hist. nat.* X. p. 212.
An hæc & mox prægressa vere distinctæ species? an differt
oætocinctus Molinæ hist. nat. Chil. L. IV. p. 271. qui plan-
tas habet pentadactylas?
- novem- 6. *D. cingulis novem, palmis tetradactylis, plantis penta-*
cinctus. *Mus. Ad. Fr.* 6. *Houtt. nat.* 2. p. 284. t. 16.
 f. 3. *Schreber Saeugth.* II. p. 223. t. LXXIV. LXXVI.
 f. 7. 10.
Cataphractus scutis duobus, cingulis novem. *Briss. quadr.* 42.
Tatus. Gesn. quadr. p. 935.
Tatu éte. Marcgr. brasili. p. 235.
Tatu s. Armadillus americanus. *Seb. mus.* I. p. 45. t. 29.
 f. 1.
Armadillo s. aiatochtli. *Nieremb. hist. nat.* p. 158. f. supr.
Pig-headed Armadillo. *Grew. mus.* p. 18.
Cachicame ou Tatou à neuf bandes. *Buff. hist. nat.* X.
 p. 215. t. 37.
Habitat in America meridionali, frequens præsertim in
Gujana. Caro esculenta.
An propria species 11 cinctus Molinæ hist. nat. Chil. L. IV.
p. 271, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis?

36. RHINOCEROS. *Cornu solidum perenne conicum, nafo insidens, cum osse non cohærens.*

- unicor- 1. R. cornu unico. *Gesn. quadr. p. 842. Albin. tab. mascul.*
nis. 4. 8. *Knorr delic. T. II. p. 110. t. K. X. Parsons philosoph. Transact. Vol. XLII. n. 523. Edw. av. t. 221. f. 2.*

Habitat inter & prope tropicos in paludosis, jam Jobo memoratus, sed nomine REEM; in pugnis animalium apud Romanos celebratis vulgatus, per longum tamen temporis spatium in Europa invisus, donec seculo decimo sexto aliqua ejus exempla in Europam devenerint: Viicitat vepreibus, spinis, in ceno se volutans, parumper manuscens, mitis, nisi laceffatur, irritatus cum fragore arbores prosternit; retro mingit & coit; unum modo pullum parit. Visus debilis, olfactus & auditus tanto præstantior.

Statura & magnitudine, pedibus brevioribus exceptis, non tamen sagacitate & docilitate ad elephantem, reliqua forma, moribus, voce grunniente proprius ad suem præfertim æthiopicum accedit. Cutis dura, ut sagittæ, globuli sclopetarii, gladii ictus inde resiliant, nuda pilis, nisi cauda & auriculis: Suturæ s. rugæ transversales α) capititis postica. β) scapularis. γ) abdominalis ante femora. δ) femoralis trans femora. Caro crassa, spongiosa, vix edulis. Lingua mollis. Cornu basi crinitum, acutum, fibrosum, & aliquando pedum longitudinem attingens. Dentes primores adulto nulli, juniori remotissimi solitarii occurantes. Ungulæ tres. Cauda attenuata, pedibus brevior.

- bicornis. 2. R. conubus duobus. *Syst. nat. Ed. X. p. 56. n. 2. Sparrmann ad Holm, 1773. trim. 4. n. 5.*

Habitat in Africa, ossibus ejus, teste nuperius Pallas, frequentissime in Russia, boreali quoque sepultis; jani Pausianæ & Martiali dictus, in numero Domitianus obvius, a Cosmo sexto seculo memoratus, vix differre videtur species, neque tamen modo sexu aut aetate.

Caro ad suillam, viscera ad equina accedunt. Cystis fellea nulla. Dentes primores nulli. Cornu alterum supra prium versus frontem.

Rarior est rhinoceros tricornis, tertio tum cornu ex alterutro priorum ex crescente.

5. ELEPHAS. Dentes Primores nulli utrinque.

Laniarii superiores elongati,
inferiores nulli.

Proboscis longissima prehensilis.
Corpus nudiusculum.

maximus. I. ELEPHAS. Briss. quadr. 45. Raj. quadr. 131. Seb. mus. I.
t. III. f. I.

Elephantus. Gesn. quadr. 377. Aldr. quadr. l. I. c. 9.
Jonst. quadr. 30. t. 7. 8. 9. Edw. av. t. 221. f. I. Buff.
hist. quadr. XI. p. I. t. I.

Habitat in Zonæ torridæ orbis antiqui paludosis ad amnes,
secundum nonnullos Behemot Jobi; edit juniores arbores,
ramos, folia, fructus hesperidum præsertim & musæ
paradisiacæ, cuius etiam lignum devorat, Cocos, Gui-
landinæ semina, frumentum, vorax, gregarius, lon-
gævus, docilis, cerebro quamvis peregrino prudens; pro-
boscidem longissimam extensilem & contractilem, acute
odorantem, ad finem unco flexili instruclam loco manus
habet; ea cibum potumque haurit hostenique pellit; ea
præcisa occiditur; murem noctuit sub somno, ob tracheæ
insertionem. Retro mingit, femina supina jacente coit,
qua per annum gradata est; pullus labiis appressis lac-
maternum sugit. Portat domos aliaque, rectore collo insi-
dente; celeri satis passu ingreditur, dexterrime natat.
In bello armatur apud Indos, apud Ronianos olim falci-
bus, a pulvere pyrio invento huic usui miuus idoneus;
vulnusculo inter exin & atlantem furiosus occiditur.

Maximum quadrupes, adeo ut exempla sint elephanti 4500
libras pondere & quantis. Corpus cinereum, rarius rubef-
cens aut album, pilis rariss. Proboscis subitus plana, api-
ce truncata. Oculi parvi. Dentes laniarii superiores
cornuum ad instar sursum exerti (Ebur) fibris crassis
insignes, adeo ut singuli non raro 150 libras pondere &
quent. Aures amplissimæ, pendulæ, dentatae, Act. angl.
277. p. 1051. Cutis crassissima callosa, tamen ita, ut
globi sclopetarii, etiam plumbei, penetrant, & musca-
rum adeo puncturas sentiat. Mamæ 2 juxta pedus.
Ungues supra apices quinque loborum pedum. Genua fle-
xilia. Collum breve.

Petti G. C. Elephantographia. Lips. 1723.
Anatome in Bibliotheca medica Dublin, 1681.

MAMMALIA BRUTA. *Trichechus*.

59

P. Gillii *nova descriptio elephanti*, ad cilmem Aeliani de homi. anim. Lugd. 1565. 8. p. 497-525.

(Fr. Serao) opuscoli di fisico argomento. Napol. 1766. 4. p. 1-62. t. 1.

Ossa elephantis creberrimae in zonis etiam temperatis ipsiusque frigidis, adeo Americæ sub terra sepulta. Pallas Nov. Comm. Acad. Scient. Petrop. Vol. XIII. & XVII., & Merk Lettres 1-3 sur les os fossiles d'éléphans & de rhinocéros, qui se trouvent en Allemagne, &c. à Darmst. 1786. 4.

Pedes vestiuntur corio calloso, quod integrum detrahi potest instar ungulæ equi, & inde sub belluis non inepte militaret; cum vero pedes appareant tanquam unguibus, 5 in anterioribus & 4 in posterioribus superinpositis, aptius judicavi, ei locum heic concedere, præprimis cum mammae in axillis brachiorum gerat.

6. TRICHECHUS. *Dentes Primores* (adulto) nulli utrinque.

Laniarii superiores solitarii.

Molares ex osse rogofo utrinque.

Corpus oblongum.

Labia geminata.

Pedes posteriores compedes coadunati in pinnam.

Rosmarus. 1. T. dentibus laniariis superioribus exsertis remotis. Houtt. nat. 2. p. 7. t. II. f. 1. Schreb. Sæugthiere, II. p. 262. t. LXXIX.

Odobenus. *Syst. nat. Ed. X.* p. 38. Briss. quadr. 48.

Rosmarus. Jonst. pisc. t. 44. Worm. mus. 289. Olear. mus. 38. t. 23. f. 3. Bonann. mus. 269. f. 27. Gesn. aquat. 211.

Equus marinus s. Hippopotamus falso dictus. Raj. quadr. 191. Ellis hudson. t. 6. f. 3.

Mors s. Mors, Rosmarus. Gesn. aq. 211.

Trichechi omnes maris involvæ, fucis, corallinis, testaceis, non carne videntur.

MAMMALIA BRUTA. *Trichechus.*

Wallroß. *Martens spitsb.* 78. t. I. f. B.

Morse. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 358. t. 54.

Habitat intra & circa polum arcticum ad ostia præsertim fluviorum. Mugit instar bovis; dormiens stertit, ad 18 pedes longus, animose contra hostes se defendit, gregarius. Dentes primores juniori animali in maxilla superiore bini exigui; laniarii remotissimi acuminati, subtiliter striati, 30 aliquando libras pondere æquantes, Ebur fibris intertextis non adeo facile flavescent, nucleo tamen in fuscum vergente; molares in utraque maxilla utrinque quatuor exiles, acuti, pone apicem fovea plana excavati. Vibrissæ culmi straminei crassitudine pellucidae. Nares lunares. Collum crassum. Pedes digitis 5, unguibus brevioribus. Ex pelle lora curruum consiciunt Russi, nuperius Galli. Pinguedo expedita. Sceletum rejectum in arenam potior pars Manumotovaco st.

Dugong. 3. T. dentibus laniariis superioribus exsertis approximatis.

Dugon. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 374. t. 74.

Indian Wallrus. *Penn. syn.* p. 338. n. 264.

Habitat in mari inter Caput bonæ spei & insulas Philippinas interjecto, rosmaro cetera satis similis; caput tamen magis acuminatum & angustius; nares ampliores & altius posita; loco dentium primorum planum inclinatum ad laniarios allidens. Dentes laniarii in maxilla inferiore nulli, in superiore approximati, extrorsum flexi; molares latiores, distantes, in superiore maxilla utrinque 4, in inferiore tres. Mammæ 2 pedorales. Caro bovillam sapit.

Manatus. 2. T. dentibus laniariis nullis. *Art. gen.* 79. *sym.* 107.

Manatus. *Rondel. pisc.* 490. *Gesn. pisc.* 213. *Hern. mex.* 323. *Briff. quadr.* 49.

Manati. *Clus. exot.* 133. *Aldr. pisc.* 728.

Manati s. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.

Lamantin. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 277. t. 57.

australis. 2. pilosus, pedibus tetradactylis unguiculatis.

Habitat in mari africano & americano, præsertim ad ostia fluviorum; quos creberrime ingreditur, parum a littore recedens; 8-17 pedes longitudine, 6-7 latitudine, 500-800 libras pondere æquans. Cutis ex atro cinerea. Dentes molares in utraque maxilla utrinque 9 quadrati, cortice vitro vestiti. Vertebræ 50.

borealis. $\beta.$ nudus, pedibus nec digitis nec unguibus instructis.

Habitat ad litus Americæ occidentale, & insularum inter Americam & Kamtschatkam positarum, frequentissime quoque ostia fluviorum intrans. Longitudine 23 pedes, pondere 8000 libras æquat; cutis dum madet fuca, excisa nigra. Loco dentium molarium in utraque maxilla utrinque os rugosum. Vertebræ 60.

Mansuecit sœpe sylvestribus americanis musicaque delectatus, veterum Delphinus; vorat indesinenter. Sociamas, femina, adultus & proles. Monogami vere coeunt, femina variis gyris primi fugiente, resupinata. Dorsum inter pascendum ex aquis eninet avibus ibi pediculos venantibus. Mugitus bovinus. Visus debilis, auditus tanto acutior. Pedes anteriores testudinum marinorum fere ad instar palniati; loco posteriorum cauda horizontalis. Auriculæ nullæ. Nares distantes regulares. Labium superius muricatum vibrissis rigidis incurvis. Mammæ 2 pedorales. V. Decham & Steller Nov. Comm. Petropol. Vol. II. p. 294. sqq. Caro sapidissima. Phocis Cetisque affinis. Quicquid veri habent cantatæ toties de sirenis fabulæ, ad hunc spectare videtur.

III. FERÆ.

Dentes primores superiores sex acutiusculi, canini solitarii.

II. PHOCA. *Dentes Primores acuti, superiores VI paralelli: exteriores maiores.*

Inferiores IV paralleli distincti æquales obtusiusculi.

Laniarii duplo longiores, acuti, robusti I, superiores ab incisoribus, inferiores a moralibus remoti.

Molares V - VI angusti tricuspidati.

Auriculæ nullæ.

Pedes postici coaliti.

Ursina. 1. Ph. capite auriculato. *Schreber Saeugthiere*, III. p. 289, t. LXXXII.

*Ursus marinus. Steller nov. act. Petrop. II. p. 331. t. 15.
Habitat in Kamtschatkæ maritimis inter Asiam & Americam proximam, primario in insula Beringii, in nova quoque Seelandia & insulis novi anni.*

Impetuofissime natant, mares polygami gregatim degunt cum uxoribus, filiis, filiabus ad 120; cœunt in littore resupinata femina; vix metuunt hominem; mordent projectum lapidem; senes elumbes quiescunt pingues; proprium lapidem pro leō habent, quem non deserunt; bella instituunt propter uxores, leōnum, æquum & justum; succubente uno, accurrit alter opem latus, mox alteri aliis, ne

Phocæ genus sordidum, curiosum, animosum, pugnax, mansuescens, polygamum, carne succulenta tenera, lardo & corio utile, aquas inhabitat, & sub aqua natat, vix incedit ob pedes anticos retractos, posicos unitos; viditat piscibus & marinis, cuius etiam generis esse videtur See-ape. Penn. quadr. 356.

duo contra unum, usque dum onines prælio involuti; mœsti lacrymas fundunt copiosissimas. Steller.

leonina. 2. Ph. capite antice cristiato, corpore fusco. Schreber Saeugth. III. p. 297. t. LXXXIII.

Leo marinus. Anson itin. 100. t. 100. Ellis hudson. t. 6. f. 4.

Loup marin. Pernetty voy. II. p. 40. t. 11. f. 1.
Habitat ad polum antarcticum & littus Chilense. Tuberculo ad rostrum basin pilosum, quod inflat in vesicam, frontem tegit, dum eludit baculi iactus. Natant gregatim; pugnant pro feminis; excubias agunt.

Mas labio s. fronte cristiata. Dentes 2. inferioris maxillæ subexserti. Oculi magni. Vibrissæ albæ, rubro annulatae. Pedes omnes palmati, digitis 5-5, unguibus pone apicem enatis; postici compedes interjecta cauda duos pollices longa, in pinnam horizontalem, digito extimo crassiore.

jubata. 4. Ph. cervice (maris) jubata. Schreber Saeugth. III. p. 300. t. LXXXIII. B.

Phoca capite postice jubato. Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 250.

Leo marinus. Steller nov. act. Petrop. II. p. 360.

Lion marin. Pernetty voy. II. p. 47. t. 10.

Habitat in parte septentrionali maris pacifici, littore occidentali Americæ, orientali insularum Falkland, Patagoniaæ, Kamtschatkæ, & potissimum circa insulas, quæ inter Kamtschatkam & Americam interjacent, & Kuriles. Color spadiceus, juniori animali magis obscurus, femineæ vivacior. Major leonina, ut pondere 160 libras, longitudine 25 pedes assequatur; mugit instar bovis.

vitulina. 3. Ph. capite inauriculato & cervice lœvi, corpore fusco. Schreber Saeugth. III. p. 303. t. LXXXIV.

Phoca s. vitulus marinus. Gesn. aquat. 702. Aldr. pisc. 722. Jonst. pisc. 44. Dodart act. 191. t. 191. Raj. quadr. 189.

Phoca oceanica. Steller. nov. Comm. Petrop. II. p. 290.

Phoque. Buff. hist. nat. XIII. p. 333. t. 45.

Vitulus maris oceanii. Rond. pisc. p. 458.

Veau marin ou loup de mer. Belon poiss. p. 25. f. 26.

Seal. Penn. br. zool. I. p. 71. t. 48.

8. botnica. Linn. faun. spec. 4. p. 2.

Naso latiore, unguibus longioribus, colore obscurore differt.

MAMMALIA FERÆ. Phoca.

- y. sibirica*, colore argenteo.
Habitat in lacubus Baikal. & Orom.
- d. caspica*, colore vario.
Habitat in mari, præsertim septentrionali, etiam pacifico,
 & caspico. *Dormiunt in lapide ex aqua eminente; par-*
riunt in glacie, per quam adscendere traduntur halitu;
non descendunt. Mammæ retrahunt duas abdominis;
inter halecum catervos saginantur; a laris provocate
expuunt pisces; idu supra nasum facillinie occiduntur.
Alias varietates, cinereani, bovis, si adoleverit, magni-
tudine, aibam vel margaritaceam, utramque in aquis
ipsis dormientem, griseam, nigram, & minorem macula-
tam refert Oedman act. Stockh. nov. ann. 1784. trim.
I. n. IO.
- Vibrissæ undulatæ. Oculi membrana nitidante instruti;*
humore crystallino globoſo. Lingua bifida. Foramen
ovale fertur apertum esse.
- Anatome. E. N. C. d. I. a. 9. obs. 98. & d. 3. a. 7. app. 15.*
- Mona-*
chus. 5. *Ph. capite inauriculato, dentibus incisoribus utriusque ma-*
xilla quatuor, palmis indivisis, plantis exunguiculatis;
Hermann act. nat. scrutat. Berol. IV. p. 456. t. XII. XIII.
Habitat in mari dalmatico.
- groenlan-* 6. *Ph. capite lœvi inauriculato, corpore griseo, lateribus*
luna nigra. Erxleben syst. mamm. p. 588.
Swartshide. Egede Groenl. fig. p. 62.
Attarsoak. Cranz Groenl. p. 163.
The harp. Penn. syn. n. 269. p. 242.
Habitat in Groenlandia & Newfoundland, nec non
circa Kamtschatkam.
- hispida.* 7. *Ph. capite lœvi inauriculato, corpore pallide fusco pilis*
surrectis hispido. Erxleben syst. mamm. p. 589. Schreber
Sacugth. III. p. 312. t. LXXXVI.
Phoca foetida. Muller zool. dan. prodr. p. VIII.
Neitsek. Cranz Groenl. p. 164.
Habitat ad littus Groenlandiae & Labrador. Ex pellibus
vestes conficiunt incolæ.
- cristata.* 8. *Ph. capite antice cristato, corpore griseo. Erxleben syst.*
mamm. p. 590.
Klap-myffen. Egede Groenl. p. 62. t. 6.
Blaudruselus. Olaffen Ijl. I. p. 283.
Neitfer-soak. Cranz Groenl. I. p. 164.
Hooded seal. Penn. syn. n. 268. p. 342.

Habitat

Habitat in parte meridionali Groenlandiæ, occidentali Islandiæ, & circa Newfoundland. Prioribus major, pelle inter pilos albos brevi, densa, nigra lana instructa.

barbata. 9. *Ph. capite lœvi inauriculato, corpore nigricante.* Müller zool. dan. prodr. p. VIII.

Utselur, Wetraselur. Oluff. Iſl. I. p. 260.

Utsuk. Cranꝝ groenl. I. p. 165.

Lachtak. Steller nov. comm. Petrop. II. p. 290.

Sea calf. Parsons að, angl. n. 469. p. 383. t. I. f. I.

Grand phoque. Buffon hist. nat. XIII. p. 333. 343.

Habitat ad Scotiam atque Groenlandiam australiorem, vulgaris circa Islandiam. Novembri atque Decembri parit pullos albos. Cutis densa, pilis nigricantibus obsita. Corpus longitudine 12 pedum.

fusilla. 10. *Ph. capite lœvi subauriculato, corpore fusco.* Schreber Sæugth. III. p. 314. t. LXXXV.

Vitulus marinus. Bellon. aquat. p. 19. f. p. 21.

Vitulus maris mediterranei. Rondel. pisç. p. 453.

Veau marin. Dampier voyag. I. p. 116.

Loup marin. Ulloa voy. II. p. 2. 26.?

Vitello marino picciolo. Aleß. quadr. IV. t. 171.

Petit phoque. Buffon hist. nat. XIII. p. 333. t. 53.

Habitat in Oceano, mari mediterraneo, ad littus Chilense, ad insulam Juan Fernandez. Φων Aristotelis, Vitulus marinus Plinii.

An hujus forte varietas Phoca porcina Molin. hist. nat. Chil. a. IV. p. 248. rostro longiore, auriculis magis prominulis, pedibus pentadactylis diversa?

12. CANIS. *Dentes Primores superiores VI; laterales longiores distantes; intermedii lobati.*

Inferiores VI; laterales lobati.

Laniarii solitarii incurvati.

Molares VI - VII. (pluresve quam in reliquis).

familiaris. I. C. cauda (sinistrorum) recurvata. Faun. suec. s. Amæn. acad. 4. p. 43. t. I. f. I.

Canis. Gesn. quadr. 91. Aldr. dig. 482. Jonst. quadr. 122. Raj. quadr. 176.

- domesti- α . auriculis erectis cauda subtus lanata.
cus. *Canis* ~~cinouge~~ f. *domesticus*. *Raj. quadr. p. 177. n. 8.*
le Chien de berger. *Buffon hist. nat. V. p. 241. t. 28.*
- pomera- β . pilis in capite longioribus , auriculis erectis , cauda sursum
nus. quam maxime curvata.
Chien-loup. *Buffon hist. nat. V. p. 242. t. 29.*
- sibiricus. γ . auriculis erectis , pilis per universum corpus longis.
Kosha. *Steller kamtschark. p. 182.*
Chien de Sibirie. *Buffon hist. nat. V. p. 242. t. 30.*
- islandi- δ . auricularum erectarum apicibus pendulis , pilis rostro
cus. brevi excepto longis.
Fiaar-hund. *Olafs. Isl. I. p. 30.*
Chien d'Islande. *Buff. hist. nat. V. p. 242. t. 31.*
- aquaticus. ϵ . pilo criso longo instar ovis.
Canis sagax ad aquas. *Aldrov. dig. p. 556.*
Canis aviarius aquaticus. *Gesn. quadr. p. 256. Raj. syn. p. 177. n. 6.*
Grand barbet. *Buffon hist. nat. p. 246. t. 37.*
Water - dog. *Penn. quadr. II. var. ♂. p. 145.*
Budel. *Ridinger Thiere*, t. 18.
- minor. ζ . minor pilo criso longo , circa auriculas longiore & recta
propendente.
Petit barbet. *Buffon hist. nat. V. p. 250. t. 38. f. 2.*
- brevipilis. η . capite minore , rotundato , rostro brevi , cauda sursum
curvata.
Canis melitensis brevioribus pilis. *Aldrov. dig. p. 541.*
Gredin. *Buffon hist. nat. V. p. 247. t. 39. f. 1.*
Pyrame (niger maculis flammeis). *Buffon hist. nat. V. t. 39 f. 2.*
King - Charles - dog (palato pilisque nigris). *Penn. quadr. p. 145. n. III. ♂.*
- extrarius. θ . auriculis longis lanatis pendulis.
Canis hispanicus, auribus demissis. *Aldrov. dig. p. 561. 562.*
Epagneul. *Buffon hist. nat. V. p. 246. t. 38. f. 1.*
- melitæus. ι . magnitudine sciuri, pilis per totum corpus mollissimis, se-
riceis , longissimis.
Canis melitenis hirsutus. *Aldr. dig. p. 542.*
Canis melitæus. *Raj. syn. quadr. p. 177. n. 9.*
Bichon. *Buffon hist. nat. V. p. 257. t. 40. f. 1.*

- leonius. ♂; minimus, pilis abdominis & caudæ brevioribus.
Chien-lion. *Buffon hist. nat.* V. p. 251. t. 40. f. 2.
- variega- ♂. auriculis parvis subpendulis, rostro exili acuto, pedibus tenuibus.
Petit danois. *Buffon hist. nat.* V. p. 247. t. 41. f. 1.
- hybridus. μ. auriculis parvis subpendulis, naso subfimo crasso.
Roquet. *Buffon hist. nat.* V. p. 253. t. 41. f. 2.
An ex ♂ & ♀ hybridus?
- fricator. ν. naso resimmo, auribus pendulis, corpore quadrato;
Doquin. *Buffon. hist. nat.* p. 252. t. 44.
Pug dog. *Penn. quadr. p.* 147. n. V. β.
Cane mufiolo. *Aleß. quadr.* III. t. 103:
a. hybridus ex ν & μ.
Artois. *Buffon. hist. nat.* V. p. 253.
b. hybridus ex ν & δ:
Chien d'Alicante. *Buffon hist. nat.* V. p. 254.
- Molossus. ζ. magnitudine lupi labiis ad latera pendulis, corpore torosō.
Canis fagax sanguinarius. *Gesn. quadr.* 251.
Dogue. *Buffon hist. nat.* V. p. 249. t. 43.
Bull - dog. *Penn. quadr. p.* 147. n. V. α.
Bärenbeißer. *Ridinger Thiere.* t. 3.
- anglicus. ο. maximus labiis ad latera pendulus, corpore torosō.
Canis bellicosus anglicus. *Aldrov. dig. p.* 559.
Canis mastivus. *Raj. quadr. p.* 176. n. I.
Mastiff. *Penn. quadr. p.* 146. n. IV. δ.
Dogue de forte race. *Buffon hist. nat.* V. p. 252. t. 45.
Englische Docke. *Ridinger Thiere,* t. I. 2.
- fagax. η. auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas.
Teutscher Jagdhund. *Ridinger Thiere, T.* V. icon. duæ ad dextram.
- gallicus. η. auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas, albicans.
Canis venaticus sagax. *Raj. quadr. p.* 174. n. 4.
Chien courant. *Buffon hist. nat.* V. p. 243. t. 32.
Hound. *Penn. quadr. p.* 144. n. II.
Franzœsischer und englischer Parforcehund. *Ridinger Thiere, T.* V. ic. duæ ad sinistr. & *T.* VI.
- scoticus. η. scoticus sagax. *Gesn. quadr. p.* 250.
Bloodhound. *Penn. quadr. p.* 144. n. II.
Canis sanguinarius. *Raj. quadr. p.* 174.
Schweishund. *Ridinger Thiere, T.* X.

venaticus. τ. Leithund. *Ridinger Thiere*, T. IV.

avicularius. ν. cauda truncata.

Canis sagax ad coturnices capiendas, pantherinus. *Aldrov.* dig. p. 535.

Canis aviarinus seu hispanicus campestris. *Raj. quadr.* p. 177. n. 5.

Spaniel. *Penn. quadr.* p. 145. n. III.

Braque & Braque de Bengale. *Buff. hist. nat.* V. p. 245. t. 33. & 34.

Hünerhund. *Ridinger Thiere*, T. XIV.

aquatilis. φ. cauda truncata, pilis longis asperis.

Barbet. *Ridinger allerley Thiere*, t. 42.

cursorius. χ. capite longo, rostro robusto, auribus parvis subpendulis, pedibus longis torosis, corpore longiore graciliore.

Curshund. *Ridinger Thiere*, t. 13.

hibernicus. ι. magnitudine ο, trunco curvato, rostro attenuato. *Schreber Sieugth.* III. p. 327. t. LXXXVII.

Canis grajus hibernicus. *Raj. quadr.* p. 176. n. 3.

Irish. greyhound. *Pennant quadr.* p. 146. n. IV. α.

turcicus. ω. magnitudine ο, trunco curvato, rostro attenuato, pilo subcrispo. *Ridinger Thiere*, t. 9.

Canis leporarius turcicus. *Aldr. dig.* p. 550?

grajus. αα. magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato.

Canis scoticus venaticus. *Gesn. quadr.* p. 249. *Aldrov. dig.* p. 545.

Canis venaticus grajus seu græcus, nonnullis scoticus. *Raj. quadr.* p. 176. n. 2.

Lévrier. *Buffon hist. nat.* V. p. 240. t. 27.

Common greyhound. *Pennant quadr.* p. 146. n. IV. β. *Windspiel.* *Ridinger Thiere*, t. 7.

hirsutus. ββ. magnitudine lupi, trunco curvato, rostro attenuato, pilo paulo longiore crispo.

Canis leporarius hirsutus. *Aldrov. dig.* p. 549.

Zotiger Windhund. *Ridinger Thiere*, t. 7. f. anter.

italicus. γγ. minor, trunco curvato, rostro attenuato.

Levron. *Buffon hist. nat.* V. p. 241.

Italian greyhound. *Pennant quadr.* p. 146. n. IV. β. I. *Kleines Windspiel.* *Ridinger Thiere*, t. 15.

ægyptius. ΔΔ nudus absque pilis.

Canis sine pilis. *Aldrov. digit.* p. 562.

Canis pilis carens minor, indian dog. *Brown jamaic.*
p. 486?

Chien turc. *Buffon hist. nat.* V. p. 248. t. 42. f. 1.
Naked dog. *Penn. quadr.* p. 147. n. V. d.

laniarius. ♂. corpore angusto, pedibus torosis, cauda robusta recta,
pilis brevibus appressis.

Mâtin. *Buffon hist. nat.* V. p. 239. t. 25.

aprinus. ♀. corpore angusto, pedibus torosis, cauda robusta recta,
pilis longis asperis.

Saufinder. *Ridinger Thiere*, t. II.

tuillus. ♂. capite rostroque robusto, truncō postice angusto, pe-
dibus longis, pilis longis asperis.

Saurüden. *Ridinger Thiere*, t. 12.

vertagus. ♂. pedibus brevibus, truncō longo sæpius variegato.

Turnspit. *Penn. quadr.* p. 145. n. II. γ.

a. pedibus rectis.

Basset à jambes droites. *Buffon hist. nat.* V. p. 245.
t. 35. f. 1.

b. pedibus curvatis.

Vertagus, a *Tumble*. *Raj. quadr.* p. 177. n. 7.

Basset à jambes tortes. *Buffon hist. nat.* p. 245. t. 35.
f. 2.

Dachschieffer, *Dachswürger*. *Ridinger Thiere*, t. 16.
c. pilis longioribus crispis.

america- nus. ♂. magnitudine t. capite parvo, auribus pendulis, dorso
curvato, cauda brevi.

Alco. *Buffon hist. nat.* XV. p. 150.

a. *Ytzucinte porcotli*, *Canis mexicana*. *Hernandez hist.*
Mexic. p. 466.

Michuacanens. *Fernand. anim. nov.* *Hisp.* p. 7.

b. *Techichi*. *Fernand. anim. nov.* *Hisp.* p. 10.

*Habitat sæpius cum homine, passim etiam spontaneus eva-
fit, an in India inquilinus?*

*Edit earnes, cadavera, vegetabilia farinosa; non perinde
olera. Digerit ossa; vomitu a gramine purgatur; cacat
supra lapidem. Potat lanibendo; mingit ad latus, cum
hospite sæpe centies; odorat anum alterius; odoratu ex-
cellit naso humido; oblique currit; incedit supra digitos;
vix sudat; calidus linguam exserit; cubitum iturus cir-
cumit locum; dormit auditu acutiore, somniat. Procis
rixantibus crudelis; menstruans catullit cum variis; mor-
det illa illos; cohæret copula junctus; gravida 63 diebus;*

MAMMALIA FERÆ. *Canis.*

parit sœpe 4. ad 8, masculis patri, similibus, feminis martri. Fidissimus omnium; hominibus cohabitat; blanditur ad domini accessum; ejus inflatum non fert; præcurrit in itinere, in bivio respicit; docilis, amissa inquirit, vigilias noctu instituit, advenas indicat, ad merces vigilat, pecora ab agris arcet, tarandos coeret, boves ovesque a feris custodit, leones detinet, feras agitat, anatibus adjitat, repit assiliens ad rete, occisa a venatore apportat, a rapina desistens; veru trahit in Gallia, rhedam in Sibiria. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; invidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis, ignotos sine injuria lacepsit. Lambendo vulnera, podagram, carcinomata lenit; ululat ad musicam; mordet projectum lapidem; insante tempestate fœtet ægrotans; tænia laborat; rabiem disseminat, denum cœcutit & se ipsum rodit; ab oleo empyreumatico caudæ adsperso clamitat; sœpe gonorrhœa inferitus; a Mahometanis expellitur. Anatomicorum vicima in sanguinis circulatione, transfusione, vasis lacteis, nervo resecto, &c. medicorum in venenorum efficacia exploranda.

Caput vertice carinatum. Labium inferius lateribus dentatis nudis occultatum. *Mystaces* ordinibus 5. s. 6. Nares extrorsum recurvato sinu lunares. Auriculæ margine baseos superiore reflexo, posteriore duplicato, antico trilobo. Verrucæ faciei pilosæ 7. Suturæ velleris 8, collares, sternea, cubitales, abdominales, oculares, lumbares, auriculares, anales. Mammæ 10: harum 4 in pectore. Pedes subpalmati.

Lupus. 2. C. cauda incurvata. *Faun. succ.* 6. *Schreber Sæugth. III.* p. 346. t. LXXXVIII.

Canis ex griseo flavescens. *Briff. quadr.* p. 170.

Lupus. *Cesn. quadr.* 634. *Aldrov. dig.* 144. *Jonston quadr.* 89. *Rai. quadr.* 173.

Loup. *Buffon hist. nat.* VII. p. 39. t. I.

Wolf. *Penn. brit. zool.* I. p. 61. t. I.

Wolf. *Ridinger wilde Thiere*, t. 21.

Canis genus vorax, morsu lacerans, arbores non scandit, cursu quamvis celer; femina plures pullos parit, mammis plerumque 10 instruta, 4 in pectore, 6 in abdomen positis. Caput vertice plano, rustro tenuiore. Truncus antice crassior. Penis nodosus est. Pedes anteriores, excepta hyena & crocuta, cui quatuor tantummodo sunt, digitis 5, posteriores 4, singulis unguibus longis, paulisper curvatis, immobilibus, eum sceli, phocæ, urso, mustelæ in utrisque pedibus sint 5.

Habitat in Americæ borealis, Afriæ, Africæ, Europæ postissimum sylvis etiam frigidioribus, ex magna Britannia inde ab anno 800 exterminatus. Catervatum incedit, pecora, equos, sues, canes occidit; in sylvis suspiciosissimus vix audet; træcum funiculum metuit, portam non subit, sed sepimentum superfilit; sonitum tubæ silentore non fert; auditu atque olfactu excellit; coit Januario; gravis per 10 hebdomadas parit pullos 5-9 cæcos; adalescit anno tertio, & 15-20 annorum etatem attingit; summa fame & frigore laceitus, in propriam speciem & hominem saevit; in eam diu tolerat; unguibus retractis incedit; collum facile flebit; noctu ululat; licheni vulpino occiditur. Fn. succ. 1129. Stroemii soendm.

391.

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 9. obs. 71. & cent. 10. app. 450-

mexica- 8. C. cauda deflexa laevi, corpore cinereo fasciis fuscis manus. culisque fulvis variegato.

Canis cinereus, maculis fulvis variegatus. Briss. quadr. 237. Quanhpecotli s. Felis montana americana. Seb. mus. I. p. 68. t. 42. f. 2.

Xoloitzcuintli, lupus mexicanus. Hernand. mex. p. 479.

Cuatlachtli, lupus indicus. Fernand. nov. Hisp. 7.

Loup de mexique. Buffon hist. nat. XV. p. 49.

Habitat in calidioribus regni Mexicanis.

Corpus cinereum, fasciis fuscis. Maculæ fulvæ in fronte, collo, peñore, ventre, cauda.

Thous. 9. C. cauda deflexa laevi, corpore subgriseo, subtus albo. Habitat in Surinamo.

Corpus griseum subtus totum album, magnitudine majoris cati. Aures concolores eretæ. Verruca supra oculos, in buccis, sub gula. Lingua lateribus ciliata,

Hyæna. 3. C. cauda recta, pilis cervicis erectis, auriculis nudis, pedibus tetradactylis. Schreber Sæugth. III. p. 371. t. XCVI. Miller on various subj. T. XIX. A.

Taxus porcinus sive hyæna veterum. Kaempfer amœnit. ex rot. p. 411. t. 407. f. 4.

Lupus marinus. Bellon. aquat. 33. t. 34. Jonston quadrup. t. 57. Gesner Thierb. p. 359.

Hyæna. Briss. quadr. p. 169.

Hyæna. Buffon hist. nat. V. p. 268. t. 25.

Striped hyæna. Penn. syn. p. 161. n. 118.

Indianischer Wolf, Ridinger allerl. Thiere, t. 37.

MAMMALIA FERÆ. Canis.

Habitat in Oriente, Persia, Africa, etiam meridionali-
Ταῦρα, Κερκύλαις, Κερκύλαις veterum, Τλαυς etiam Aris-
totelis, excavat terram degitque in antris; diutius sine
cibo vivit; in humana cadavera sœvit, quæ e tumulis
effodit, cœmeteriis infesta; quidquid irritatus ore pre-
hendit, mordicus tenet, nec vivus dimittit pertinacis-
fimus, inde venatoribus facilius eedet.

Magnitudo suis, facies apri. Pili dorſi subspithamei, erecti,
apicibus nigris. Oculi rostro propinquiores. Auriculae
nudæ. Cauda sæpius annulis nigricantibus verticillata;
crura annulis nigris variegata. Striae corporis fuscæ &
nigræ, transversales, a dorſo ad ventrem ducentæ. For-
fan ad ursi vel melis genus relegandum animal, quod
etiam, quemadmodum meles, inter anum & caudam
saccum unguine fœtido refertum habet.

Crocuta. 10. *C. cauda recta, corpore nigro maculato, pedibus tetra-*
dactylis. Erxleben hist. mamm. p. 578.

Hyæna sive *congener illi Crocuta. Ludolf Aeth. L. I. c.*
IO. n. 50.

Quumbengo. Barbot Guin. p. 486.

Jachhals vel Boshond. Bassin guin. p. 291.

Sported Hyæna. Penn. syn. quadr. p. 162. n. 119. t. 17.
f. 2.

Habitat in Guinea, Æthiopia, ad caput bonæ spei in
terrae rupiumque cœveis. Noctu prædatur oves, sepul-
tra adit voraque cadavera, ipsosque homines adoritur.
Vox terribilis.

Facies & caput supra nigra. Juba brevis nigra. Corpus
pilis brevibus, mollibus, cum artubus rubro-fuscum,
maculis rotundis nigris. Cauda brevis nigra villosa.

aureus. 7. *C. cauda recta, corpore pallide fulvo. Schreber Sæugth.*
III. p. 365. t. XCIV.

Canis flavus. Briss. quadr. p. 171.

Lupus aurcus. Kœmpfer amœnit. exot. p. 413. t. 407. f.
3. Raj. quadr. p. 174. Klein quadr. p. 70.

Vulpes indiæ orientalis. Valent. mus. 452. t. 452.

Adil. Bellon observ. p. 160.

Chacal, Adive. Buffon hist. nat. XIII. p. 255.

Chien sauvage indien. Vosmaer descript. Amst. 1773.

Schakall. S. G. Gmelin it. ruff. III. p. 80. t. 13. & Güldenstedt nov. comm. Petropol. XX. p. 449. sqq. t. X.

Habitat in Asiae regionibus calidioribus, & in Barbaria, Θεος Aristotelis & Aelianī, Λυκός ξανθός & χρυσός Opiani, Thoes Plinii.

Die latet in montibus sylvisque; noctu caturvatim ad 200 incedit, furto deditus; lente ambulat, capite dependente, at præda detecta celerrime currit; adultos homines vix invadit, pueros trucidat; edit animalia minora, aves, cibaria varia, fructus quoque horæos, radices, cadavera e terra effodienda. Coit canino more verno tempore, per mensem gravida; 5-8 pullos parit, valde manfuscat, moschum olet. Uno clamante, clamant remoti alii, ambulante sono nocturno; ululatus execrabilis, quasi ejulatus latratu interceptus. Latratu exagitare fertur feras, hoc audientes reliquæ in exercitum concurrere, prosequi miserum cervum, dum leo tigrisve ex insidiis fugientem prosiernat, prædamque voret, circumsedente venatorum corona, usque dum rex satiatus discesserit. An canis ferus?

Mesome- II. C. cauda recta, corpore ferrugineo, fascia dorsali nigra. *las.* Erxl. syst. mammal. p. 574. Schreber Sæugth. III. p. 370. t. XCV.

Jackhals. Kolbe cap. bon. sp. p. 150.

Chacal. Buffon hist. nat. XIII. p. 268.

Habitat vulgaris ad caput bonæ speci.

Facies vulpina; longitudo corporis $2\frac{3}{4}$ pedum, caudæ pendis unius.

Lycaon. I2. C. cauda recta, corpore toto nigro. Erxl. syst. mamm. p. 560. Schreber Sæugth. III. p. 353. t. LXXXIX.

Miller on various subjects, T. XIX. B.

Vulpes nigræ. Scheff. Lappon. p. 340.

Schwarze Füchse. Steller Kamtschatk. p. 124.

Loup noir. Buffon hist. nat. IX. p. 362. t. 41.

Black fox. Penn. syn. quadr. p. 152. n. 112. γ.

Lupo nero. Aleff. quadr. I. t. 24.

Habitat in Europæ, Asiae, & Americæ frigidioribus, omnium astutissimus & lupo satis similis, magnitudinis etiam inter hunc & vulpem intermediae; color totus niger, ut tamen aliquando colore subgriseo, vel argenteis pilorum apicibus variet. *Pellis pretiosissima.*

Vulpes. 4. C. cauda recta, apice albo. Schreber Sæugth. III. p. 354. t. XC.

Vulpes. Gesn. quadr. 966. Aldrov. dig. 195. Jonst. quadr. 82. Raj. quadr. 177.

MAMMALIA FERÆ Canis.

Renard. *Buffon hist. nat.* VII. p. 75. t. 6.

Fuchs. *Ridinger jagdbare Thiere*, t. 14.

Habitat in Europa, Asia, Africa, regno Chilensi Americæ, Ἀλωνξ Aristotelis & Aelianī, Κηφα Oppiani, antra fodens, animal astutissimum; sœvit in agnos, anseres, gallinas, aviculas, non accipitres fætidioresque; edit stercore animalium; pinguiscit uvis; non rapit facile in prædio, quod inhabitat; pruriens noctu clamitat; bombardas explosas odoremque pulveris pyrii fugit; pellitur fumo.

Corpus fulvum, pedibus anticis & auricularum apicibus nigris; raro album. Auriculæ erectæ. Labia alba. Ambrostaco fragrat odore supra caudæ basin.

Alopex. 5. C. cauda recta: apice nigro. Schreber *Sæugth.* III. p. 358. t. XCI.

Vulpes villo densiore & nigricante. *Gesn. quadr.* p. 967 Charbonnier. *Buffon hist. nat.* VII. p. 82.

Brant-fox. *Penn. syn.* p. 153. ♂.

Habitat in Europa, Asia, regno Chilensi Americæ.

Præcedente rarer, minor, magis obscurus, cetera satis similis.

Corfæ 13. C. cauda recta fulva, basi apiceque nigra. *Syst. nat.* XII. app. 3. p. 23. Schreber *Sæugth.* III. p. 359. t. XCI. *B.* Korsaki. *Rytschkow Orenb.* I. p. 232. Pallas *neue nord. Beytr.* I. 29.

Habitat frequentissimus in magno deserto ab Ural fluvio versus Irtim; sœvit in aves, fætet, clamitat, latrat, vulpe minor, ceterum satis similis.

Karagan. 14. C. cauda recta, corpore griseo, auriculis nigris.

Karagan & Steppenfuchse. Pallas *it.* I. p. 199. 234.

Habitat in desertis Kalmyccis & Kirgiscis.

cinereo- 15. C. cauda recta, corpore cinereo, collo lateribus fulvo argenteus. Erxleb. *syſt. mamm.* p. 567. Schreb. *Sæugth.* III. p. 360. t. XCII. A.

Habitat in America boreali, vulpe minor. Griesfuchs.

virginia- 16. C. cauda recta, corpore ex cinereo albicante. Erxleb. *syſt. mamm.* p. 567. Schreb. *Sæugth.* III. p. 361. t. XCII. B.

Canis vulpes cinerea. Briff. quadr. p. 174.

Vulpes cinereus americanus. Klein quadr. p. 71.

Grey fox. Catesb. carol. II. p. 78. t. 78.

Habitat in Carolina, & reliquis Americæ borealis calidioribus, in cavis arboribus, facile mansuescens.

MAMMALIA FERA. Canis.

75

Lagopus. 6. C. cauda recta, palmis plantisque pilosissimis. Erxl. syst. mam. p. 568.

Canis cauda recta apice concolore. Syst. nat. XII. p. 59. Schreber Saeugth. III. p. 362. t. XCIII. utraq.

Canis hieme albus, æstate ex cinereo cærulescens. Briss. quadr. p. 174.

α. Vulpes alba. Kalm. bahus. 236.

Ifatis. J. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. 1760. p. 358. Buffon hist. nat. XIII. p. 72.

The artic fox. Penn. syn. quadr. p. 155. t. 17. f. 1.

β. Vulpes cærulescens. Faun. suec. 14.

Habitat ad omne mare glaciale frequentissimus, etiam in America boreali, in ipso regno Chilensi, non in sylvis, sed in nudis montibus; degit in cuniculis; edit mures, anseres, nec nisi fame coactus baccas & testaceas. Latratus, non fuetor vulpis. Graviditas per 9 hebdomadas. Pellis egregia. An hujus vel vulpis potius varietas est? Vulpes crucigera fulvus, crucem nigram in dorso gerens. Brisson anim. p. 241. n. 6.

&

Canis (Culpæus) cauda recta elongata, apice concolore laevi. Molin. hist. nat. Chil. L. IV. p. 259?

Cerdo. 17. C. cauda recta, corpore pallido, auriculis roseis eratis prælongis. Schioeldebrand act. ac. suec. ad ann. 1777. trim. 3. art. 7. t. 6.

Habitat in magno Africæ deserto sabuloſo Saara.

Reliquis speciebus minor, curfu celerrimus scandit, locustis aliisque insectis vescitur. Canis junioris adlatrat. An revera hujus generis?

13. FELIS. Dentes primores intermedii æquales.
Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.

Ungues retractiles.

Leo:

I. F. cauda elongata, corpore helvolo. Schreber Saeugth. III. p. 376. t. XCVII. A. B.

Felis cauda elongata floccosa, thorace jubato. Syst. nat. 6. p. 4. n. 1.

Felis cauda in floccum definente. Briss. quadr. p. 194.

*Leo. Gesn. quadr. 572. Aldr. dig. 2. Jonst. quadr. 72^o.
Dodart act. 1. t. 1. & 7. t. 7. Raj. quadr. 162.*

Lion. Buffon hist. nat. IX. p. 1. t. 1. 2.

*Habitat in Africa, præsertim interiore, rarer in desertis
Persicæ, Indiæ, Japaniæ, olim quoque in reliqua calidiori
Asiae parte, Palæstina, Armenia, Thracia.
Segnis, esuriens prædatur equis & aliis majoribus
animalibus, nec nisi famelicus homine; fugatur accensu
flamma; canibus coeretur; junior mansuetus, retro
mingit. Rugitus horrendus a tracheæ annulis integris
imbricatis; dormit in aprico, esurit tertio die, tagax;
incessus latus, prædantis saliens; halitus fœtidus;
olfactus debilior; caro Afris esculenta.*

*Color luteo-rufus, nonnunquam obscurior. Caput mag-
num, rotundatum. Frons quadrata. Oculi ingentes.
Labia pendula. Cor maximum. Mas femina quarta
parte major, ut longitudo 8 pedes aliquando superet;
thorax hirsutus; capitum & collatera pilis flavescentibus
in fascium vergentibus propendentibus circiter bipeda-
libus, reliquis pilis brevibus appressis; cauda floccosa.
Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obs. 6. Bartholin. act. 1671.
n. 17. Nov. comment. Acad. Imper. Petropol. pr^o
ann. 1771. T. XVI.*

- Tigris. 2. *F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis.
Schreber Sæugth. III. p. 381. t. XCVIII.
Felis flava, maculis longis nigris variegata. Briss.
quadr. p. 145.
Tigris maculis virgatis. Ludolf. hist. æth. comm. p. 151.
Tigris. Gesn. quadr. 936. Aldr. dig. 101. Jonst. quadr.
p. 84. t. 54. Bont. jav. p. 53.
Tigre. Buffon hist. nat. IX. p. 129. t. 9.
Habitat in Asia calidiori, etiam China & Japania, in ipso
monte Ararat in silvis & dumetis, præsertim ad fluvios;
animal astutissimum, crudelissimum, robustissimum, fœ-
tidum, tremendæ velocitatis; homini pessimum, desolat
principue Indos; etiam a partu cœcuratum insitam fere-
ciam exercet, ut primum a vinculis se liberavit; mas oc-*

*Felis genus sobrium, scandit facile arbores, cursu celer, noctu potissimum specula-
tur casu delabitur in pedes contusioni vix obnoxium; glans penis ipsis muricatus
retrosum; retraditis unguibus acutissimis incedunt, iisque sœviunt; inhians
sanguinem hauiunt; visu præda caudam movent; vegetalibus ultro non re-
cuntur. Feminis multiplices mammæ 8, 4 pectorales, 4 abdominales.*

cedit proprios liberos. Vifus, qui necavit leonem. Salix ex infidili prædam adoritur.

Pulcherrima fera, maculis virgatis transversis, magnitudine fere leonis.

Anatome. E. N. C. d. I. a. 2. obs. 7. & a. 9. obs. 194.
S. G. Gmelin itin. ruff. III. p. 483.

Pardus. 3. F. cauda elongata, corpore maculis superioribus orbiculatis; inferioribus virgatis. Schreber Saeugth. III. p. 384. t. XCIX.

Felis ex albo flavicans, maculis nigris in dorso orbiculatis, in ventre longis. Briff. quadr. p. 194.

Panthera, Pardus, Pardalis, Leopardus. Gesn. quadr. p. 824. Raj. syn. p. 166.

Pardus maculis seu scutulis varius. Ludolf hift. ath. comm. p. 51.

Panthère. Buffon hift. nat. IX. p. 151. t. II. 12.

Habitat in Africa & calidiore Aegypte; caudā non mensurata 5 - 6 pedes longa, πανθηρες μεγαλοι Oppiani; homini non infesta, nisi irritetur; noctu domus ingreditur, & catos venatur; ceterum genio & prædandi more tigri similis.

Unica. 9. F. cauda elongata, corpore albido, maculis irregularibus nigris. Erxleb. syst. mamm. p. 508. Schreber Saeugth. III. p. 386. t. C.

Once. Buffon IX. p. 151. t. 13.

Habitat in Africa boreali, Persia, Hircania, Sina, Panthera Plinii, πανθηρες οιχωποι Oppiani, prioribus mitior, ut cicurata venatui adaptari possit, & minor, ut corpus ipsum 3½ pedes longitudine non superret.

Leopar- 10. F. cauda mediocri, corpore fusco maculis subcoadunatis dus. nigris. Erxl. syst. mamm. p. 509. n. 5. Schreber Saeugthiere, III. p. 387. t. CI.

Uncia. Caj. op. p. 42. Gesn. quadr. p. 825.

Léopard. Buffon hift. nat. IX. p. 151. t. 14.

Habitat in Africa, præsertim occidentali; priori vix major, & moribus similis. Caro Hottentottis edulis.

Onca. 4. F. cauda mediocri, corpore flavescente, ocellis nigris rotundato-angulatis medio flavis. Schreb. Saeugthiere, III. p. 388. t. CII.

Felis flavescens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam rotam referentibus variegata. Briff. quadr. p. 196.

Felis caudá elongata, maculis subrotundis fere æqualibus;
Brown nat. hist. of. Jamaiic. p. 485.

Pardus aut Lynx brasiliensis, *Jaguara dictus*, *Lusitanis Onza*. *Raj. syn.* p. 168.

Tlatlauhqui ocelott seu tigris mexicana. *Hernand. mex.* p. 498.

Jaguara. *Marcgraf. bras.* p. 235. *Pif. ind.* p. 103.

Tigre de la grande espèce; que les Portugais appellent tigre royal. *Perr. anim.* III. p. 287.

Habitat in omni America meridionali ad Mexico usque; in-
grim ferocitate & moribus, non animositate æquans,
quamvis omnibus præcedentibus minor; ex infidiis tribus
saltibus prædan rapit; æquo infilis supra humeros; se
triplo majorēm ausest; gustato humano sanguine non de-
fisiit; capere primo æthiopem, tum europeum, ultimo
americanum fertur; piscibus etiam rescitur; crocodili
hostis; igne jugandus.

Corpus lutescens maculis ocellaribus nigris saepe pupilla ni-
gra una alterave instrutis. Abdomen album maculis
atris, ut in pedibus, ubi minores. Cauda corpore dinu-
dio brevior, maculis nigris longis. An hujus varietas
Guigna Chilensem? s. Felis cauda elongata corpore ma-
culis omnibus orbiculatis?

Pardalis. 5. *F. cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis,*
inferioribus orbiculatis; *Schreber Scugthiere*, III. p. 390.
t. CIII.

Felis rufa, in ventre ex albo flavicans, maculis nigris, in
dorsō longis, in ventre orbiculatis variegata. *Briff. quadr.*
p. 199.

Pardus cauda brevi. *Klein quadr.* p. 78.

Tlacozelotl, Tlalocelotl, catus pardus mexicanus. *Hernand.*
mexic. p. 512.

Catus pardus s. *catus montanus americanorum*. *Raj. quadr.*
169.

Ocelot. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 239. t. 35. 36.

Mexican cat. *Penn. syn.* p. 177. n. 128.

Habitat in America calidiore, præsertim Terra firma, Ca-
lifornia & nova Hispania; viso cane arbores adscendit,
hominem metuit, ceterum ferox nec mansuescens, sinuas
eludere dicitur.

Maginitudo melis; suprafuscus, subtus albicans; lineæ pun-
ctaque nigra per totum corpus longitudinaliter sparsa, sed
pedes & abdomen tantum punctis; latera lineis latioribus

*albis & fuscis pinguntur. Aures breves margine bifidae
absque penicillis. Pedes 5 - 4. Cauda verticillato-variegata,
proportione cati. Mystaces 4 ordinum, in singulis
ordinibus setæ 3 - 5, albæ, basi nigrae, longitudine capitis.*

jubata. II. F. cauda mediocri, corpore fulvo, maculis nigris, collo
jubato. Erxl. syst. mamm. p. 510. Schreber Saeugth.
III. p. 392. t. CV.

*Felis pilis crispis vestita, maculis nigris variegata. Briffon
anim. p. 271. n. 10.*

Tygerwolf. Kolbe Vorgeb. p. 171. t. 6.f. 5.

Guépard. Buff. hist. nat. XIII. p. 249. 254.

Hunting cat. Penn. syn. p. 174. n. 125. t. 18. f. 1.

*Habitat in Africa meridionali, & India; cicurata venaturi
inservit.*

discolor. 12. F. cauda elongata, corpore potissimum nigro. Schreber
Saeugth. III. p. 393. t. CIV. B.

Felis nigra. Erxl. syst. mamm. p. 512. n. 8.

Jaguar. Maregr. bras. p. 235. Pif. ind. p. 103. Raj.
quadr. p. 169.

Once, des Marchais voy. III. p. 300.

Black tiger. Penn. syn. p. 180. n. 130. t. 18. f. 2.

Habitat in America meridionali, robusta & crudelis.

*Magnitudo vituli annui. Pili breves, colore splendido ex
fusco nigro; labium superius, palmæ et plantæ albent;
labium inferius, gula, pectus, abdomen, interior pedum
ficies albescent.*

concolor. 9. F. cauda elongata, corpore immaculato fulvo. Mantiss. pl.
II. p. 522. Schreber Saeugth. III. p. 394. t. CIV.

*Felis ex flavo rubescens, mento & infimo ventre albicantibus.
Briffon anim. p. 272. n. 11.*

Puma s. leo americanus. Hernand. mexic. p. 518.

Cuguacuara. Pif. ind. p. 103.

Cuguacuarana. Maregr. bras. p. 235. Raj. quadr. p. 169.

Panther. Laufon Carol. p. 117. Catesb. app. p. XXV.

Tigris fulvus. Barrere Fr. équinox p. 166.

Cougar. Buff. hist. nat. IX. p. 216. t. 19.

Brown cat. Penn. syn. p. 179. n. 129.

*Habitat in America a Canada ad Patagoniam usque; scandit
arbores, hominem vix adoritur, ceterum atrox & astuta;
igneni metuit.*

*Magnitudine & habitu corporis ad tigrin accedit, defectu
macularum differt.*

MAMMALIA FERÆ. *Felis.*

tigrina. 13. *F. cauda elongata, corpore fulvo nigro striato maculatoque subtus albido.* *Erxl. syst. mamm. p. 517. n. II. Schreb. Saeugth. III. p. 396. t. CVI.*

Felis ex griseo flavescens, maculis nigris variegata. *Briss. quadr. p. 193.*

Felis fera tigrina. *Barr. Fr. équin. p. 152.*

Maraguao hve Maracaja. *Marcgr. brasili. p. 233.*

Tepe Maxflaton. *Fernand. nov. Hisp. p. 9.*

Margag. *Buff. hist. nat. XIII. p. 248. t. 38.*

Cayenne cat. *Penn. syn. p. 182. n. 132.*

Habitat in America australi, non cicuranda, avibus videntans. *Vox & magnitudo cati.*

Catus. 6. *F. cauda elongata annulata.*

F. cauda elongata, auribus æqualibus. *Faun. suec. 3.*

ferus. α. *cauda elongata fusco-annulata, corpore fasciis nigricantibus, dorsibus longitudinalibus tribus, lateralibus spiritalibus.* *Schreber Saeugthiere, III. p. 397. t. CVII. A. CVII. Aa.*

Felis pilis ex fusco flavicante & albido variegatis, cauda annulis alternatim nigris, & ex sordide albo flavicantibus. *Briss. quadr. 192.*

Felis sylvestris. *Aldrov. digit. p. 582. fig. p. 583. Jonst. quadr. p. 127. t. 72.*

Catus sylvestris. *Gesn. quadr. p. 353. Klein quadr. p. 75.*

Chat sauvage. *Buffon hist. nat. VI. p. I. t. I.*

Wilde Kaze. *Ridinger wilde Thiere, t. 240.*

Wild cat. *Penn. brit. zool. I. p. 47.*

Domesti- β. minor, pilis brevioribus & crassioribus. *Schreb. Saeugth. III. p. 397. t. CVII. B. 1.*

Felis domestica. *Briss. quadr. 191.*

Felis. *Aldrov. dig. p. 564.*

Felis vel catus. *Gesn. quadr. p. 344. fig. p. 345.*

Felis domestica. *Jonst. quadr. p. 126. t. 72. Raj. quadr. p. 170.*

Chat domestique. *Buffon hist. nat. VI. t. 2.*

angoren- γ. pilis longioribus argenteis sericeis, in collo longissimis. *Schreber Saeugth. III. p. 398. t. CVII. B. 2.*

Felis pilis longissimis toto corpore vestita. *Brisson anim. p. 266. n. 4.*

Chat d'Angora. *Buffon hist. nat. VI. t. 5.*

Angora-cat. *Penn. quadr. p. 184. n. 133.*

♂. nigro:

hispani- ♂. nigro , albo , aurantioque varius.

cus. Chat d'Espagne. *Buff. hist. nat.* VI. t. 3.

Tortoise-shell Cat. *Penn. quadr.* p. 184. n. 133. β.

cæruleus. ♂. pilis omnibus ex cæruleo cinereis.

Chat des Chartreux. *Buff. hist. nat.* VI. t. 4.

Blane Kaze. *Kolbe Vorgeb.* p. 153.

Blue Cat. *Penn. quadr.* p. 184. n. 133. γ.

Ruber. ♀. facia rubra in dorso a capite incipiente.

Rothe Kaze. *Kolbe Vorgeb.* p. 153.

Habitat in Europæ & finitimæ Asiæ silvis. Moribus congenerum ; tranquilla ore molat , caudam erigit , excitata agilissima , scandit , irata fremit odore ambrosiaco ; oculi noctu lucent ; pupilla interdiu perpendiculari oblonga ; noctu tereti ampliata ; unguibus intro træctis incedit ; parce bibit ; urina maris corrosiva ; ructus sætidissimus ; sterlus fæpelit ; clamando rixandoque misere amat ; cum pullis repentinibusque ludit ; in prædam intenta caudam moveat , mürum , & in statu fero aliorum etiam minorum quadrupedum & avium levata in comedanibus ; pullos convocat ; carnes piscesque edit , calida , salsa vegetabilaque respuit ; os instantे tempestate manu lavat ; dorsum in tenebris eleætrisat ; in altum acta decidit in pedes. Pulices non habet. Coit primo vere , per 63 dies gravida , parit 3 - 6 cæcos per dies novem. Deleætatur maro , nepeta , valeriana.

Capensis. 14. F. cauda subelongata fusca nigro-maculata , corpore fulvo supra maculis virgatis infra orbicularibus , auriculis nudis macula lunata alba.

Cape-Tiger. *Penn. quadr.* p. 181. n. 131.

Nfussi. *Labat éth.* I. 177.

Felis tigrina capensis. Forster ad. angl. Vol. LXXI. P. I. n. I. t. I.

Habitat in promontorii bonæ spei montosis silvis ; moribus cato similis , viicitat leporibus , dipodibus , antilopis ; facile circumcuratur , mitis.

Manul. 15. F. cauda elongata nigro-annulata , capite punctis & fasciis duabus lateralibus nigris insignito. *Pallas itin.* III. p. 692. n. 2.

Habitat in apertis deserti tatarico-mongolici , præsertim circa fluvios Selenga & Dschida ; vescitur lepore daurico . Magnitudo vulpis.

- Serval** 16. *F. cauda subabbreviata, corpore supra fusco maculis nigris, orbitis ventreque albis.* *Erxl. syst. mamm. p. 523. n. 13.* Schreber *Saeugth. III. p. 407. t. CVIII.*
Chat-pard. Perr. anim. I. p. 108. t. 13.
Serval Buff. hist. nat. XIII. p. 233. t. 35.
Habitat in India & regno Tibetano, ut plurimum in arboribus; hominem metuit, nisi in iram acta, non circuanda.
- Chaus.** 17. *F. cauda mediocri, apicem versus annulata, apice ipso nigra, corpore reliquo ex fuscescente luteo, auriculis extus brunneis apice nigro barbatis.* *Güldenst. Nov. comm. Petrop. X. ann. 1775. p. 483. t. XIV. XV.* Schreber *Saeugthiere, III. p. 414. t. CX. B.*
Habitat in silvosis desertorum circa mare caspium sitorum, praesertim in provinciis persicis Gilan & Masanderan.
Moribus, voce, victu cato fero similis, magnitudinis inter hunc & lynxem mediae; loca culta non frequentat ferocissimum animal, raro arbores scandit, noctu per inundata & campos vagatur, pisces, mures, aves venaturum in praedam insiliens.
- Caracal.** 18. *F. cauda subabbreviata & omni corpore unicolo ex fuscescente brunneo, auriculis extus nigris apice barbatis.* Schreb. *Saeugth. III. p. 413. t. CX.*
Siyah-ghush. Charleton cx. 21. t. p. 23. Raj. quadr. p. 168. Ad. angl. LI. P. 2. p. 648. t. 14.
Lynx cauda vitulina. Klein quadr. p. 77.
Caracal. Buff. hist. nat. IX. p. 262. t. 24. & XII. p. 442.
Persian cat. Penn. quadr. p. 189. n. 137. t. 19. f. 2.
Habitat in Barbaria, Persia & India; noctu prædatur, circumatus venatui inservit. Glans laevis.
- rufa.** 19. *F. cauda abbreviata subtus & apice alba, supra nigro-fasciata, corpore rufo fusco maculato, auriculis apice barbatis,* Schreber *Saeugth. III. p. 412. t. CIX. B.*
Bay cat. Penn. quadr. p. 188. n. 136. t. 19. f. 1.
Habitat in provincia noveboracensi; cato magno duplo major.

ria singularis sit species felis the lesser leopard Pennanti & the particular beautiful kinds of cat Kaempteri, in India orientali & Japonia habuans, decidans autopas; idem valet de Gingy Congensium & felie tigima Tibetana; paruer de Colocolo Chilensem sive felie cauda elongata nigro-annulata, corpore rubeo maculata irregulibus atris flavisque. Melina hist. nat. Chil. p. 261.

- Lynx. 7. F. cauda abbreviata, obsolete annulata apice atra, capite & corpore ex albido rufo nigro maculato, auriculis apice barbatis. Schreber Saeugth. III. p. 408. t. CIX.
- Felis cauda abbreviata: apice atra, auriculis apice barbatis.*
Syst. nat. XII. I. p. 62. n. 7.
- Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato.* Fn.
Jucc. I. n. 4. It. Wyoth. 222.
- Felis auricularum apicibus pilis longissimis præditis, cauda brevi.* Briss. quadr. p. 200.
- Pinum dasypus.* Nieremb. hist. nat. p. 153.
- Lupus cervarius.* Gesn. quadr. 677.
- Lynx. Aldrov. dig. p. 90. Raj. quadr. p. 166. Jonston
quadr. p. 83. t. 71. Buff. hist. nat. IX. p. 231. t. 21.
Penn. quadr. p. 186. n. 135.
- Loup cervier. Tournef. voy. II. p. 193. t. 193.
- Luchs. Ridinger wild. Thiere, p. 22.
- β . cauda truncata, corpore albo, maculato. Fn. suec. I. p. 2.
n. 5. & II. p. 5. n. 11.
- Lynx colore albo, maculis nigris, cauda truncata.* Klein
quadr. p. 77.
- Felis alba maculis nigris variegata, cauda brevi.* Briss.
anim. p. 274. n. 14.
- Habitat in Europæ, Americæ, Asiæ borealis, etiam Japoniæ silvis densioribus, in arboribus degens; venatur cervos, niartes, aliasque mustelæ species, catos, sciurus; viicitat leporibus, sciuris, avibus, ipsisque adeo, si fame prematur, ovibus & capris stabulantibus; astutissimum animal visu & odoratu acutissimo in prædam insilit; coit Februario, & 9 hebdomadibus elapsis 3 - 4 catulos parit.*
- Magnitudo circiter vulpis, β paulo inferior. Cauda femoribus paulo brevior; Palpebra superior versus canthum majorem & inferior albicans. Macula linearis fusca pone oculos. Manus amplissimæ.

14. VIVERRA. *Dentes primores VI: intermediis brevioribus.*
laniarii utrinque I, reliquis longior.
molares plures quam tres.
Lingua retrorsum saepe aculeata.
Ungues exserti.

Ichneu- 1. V. cauda e basi incrassata sensim attenuata apice floccosa,
mon. - pollicibus remotiusculis. Schreber Saeugth. III. p. 427.
t. CXV. B.

Mustela pilis ex albido & nigro variegatis vestita. Briss.
quadr. p. 181.

Meles digitis mediis longioribus lateralibus æqualibus, un-
guibus subuniformibus. Hasselq. it. p. 191.

Ichneumon, que les Egyptiens nomment rat de Pharaon.
Belon obs. p. 95.

Ichneumon s. lutra Ægypti. Aldrov. dig. p. 298. fig. p. 301.
Ichneumon. Gesn. quadr. p. 566. Alpin. hist. Æg. p. 234.

t. 14. f. 3. Maillet descr. de l'Egypt. p. 90. t. 88. Shaw
travels T. II. t. ad p. 74. fig. sup. Penn. quadr. p. 226.

Habitat in Ægypto ad ripas Nili, quo exundante in hortos
& pagos recedit. Mansuetus; more felis in domibus mu-
res venatur; his præsertim, gallinis, vermis, insectis,
variisque amphibiis, serpentibus, ranis, lacertis, crocodi-
li ovis vivitat; mustelarum, catorum hostis, quos truci-
dat; animosum & astutum animal repit & profilit ad præ-
dam. Calcaneis incedit.

Frons plana. Labium superius prominens. Auriculae ro-
tundatae. Mystaces simplici serie in omnibus labiis late-
ralibus ad marginem. Lingua scabra. Cauda longitudi-
ne corporis. Folliculus ante aperturam ani sub æstu aper-
tus. Pili albido & griseo nigrescente verticillati. Magni-
tudo cati.

Mungo. 7. V. cauda e basi crassa sensim attenuata non floccosa, polli-
cibus remotiusculis. Schreber Saeugthiere, III. p. 430,
t. CXVI. A. CXVI. B.

Viverra ichneumon β. Syst. nat. XII. 1. p. 63.

Mustela glauca. Syst. nat. 5. Amænit. acad. II. p. 109.

Viverra ex griseo rubescens. Briss. quadr. p. 177.

Mustela s. viverra Indis Mangutia. Kaempf. amœn. exot. 574. t. 567.
 Quil vel Quiopela. Garcias arom. p. 214. Raj. quadr. 197.
 Serpenticida sive Moncus. Rumpf. herbar. amboin. aud. p. 69. t. 72. f. 2. 3.
 Indian ichneumon. Edw. av. 199. t. 199.
 Ichneumon indien. Vosmaer descript. Amst. 1772. 4.
 Ichneumon. S. G. Gmelin it. III. t. 30.
 Mango uste. Buffon hist. nat. XIII. p. 150. t. 19.
Habitat in Bengala, Persia, aliisque Asiae calidioribus platis; ichneumone minor & glauca; ceterum moribus, viatu, præda, corporis habitu similis; cum serpentibus, ipsaque naja dimicat, morsa ab his ophiorhizam affemere fertur; a vento reformidat; cicurata more canis sequitur; mundum animal, frigoris impatiens.

~~Cafra.~~ 8. V. cauda e basi crassa sensim attenuata apice atra. Schreber Saeugth. III. p. 434. n. 9.

Habitat in promontorio bonæ spei; habitu externo mustelæ putorii similis, longitudine mustelæ lutreæ æqualis. Auriculae brevissimæ, pilosæ. Myctaces simplici serie, nigrescunt. Pili nitentes, asperi, ex lutea, fuscæ & nigro mixti. Pedes nigricant.

Zenik. 27. V. tetradaëtyla, corpore griseo, fasciis 10 transversis nigris, cauda ex atro spadicea, versus apicem nigra. Zénik des Hottentots. Sonner. it. 2. p. 145. t. 92.

Habitat in terra Hottentotarum, muris amphibii magnitudine.

Palmarum ungues prælongi, fere redi; plantarum breves, uncinati; cauda gracilis; rostrum elongatum; dentes, ut quidem numerat Sonnerat, in utraque maxilla primores 2, canini 6.

~~Tetradactyla.~~ 9. V. pedibus tetradaëtylis, naso producto mobili. Schreber Saeugth. III. p. 434. t. CXVII. Miller on various subjects. T. XX.

Suriate. Buffon hist. nat. XIII. p. 72. t. 8.

Viverris corpus longum, æqualis crassitaci, pedes breves, plerumque pentadactyli, unguibus immobilibus, auriculae parvae, rostrum acutum, inter anum & genitalia rima, ducens ad folliculum unguine fætido in propriis glandulis secreto reservatum. Cursus celer; aliae calcaneis incedunt, aliae scandunt, aliae fodiunt. Feminae multiparae. An 2, 3 & 9 cum lemure flavo potius meli jungenda?

Habitat in Africa australi.

Longitudo pedalis, & una cum cauda sesquipedalis; videlicet carnibus, præcipue ovis & piscibus; pedibus anterioribus fodit; facile mansuetus, tunc mitissima.

Nafua. 2. *V. rufa, cauda albo annulata, naso producto mobili.*
Schreber Saeugth. III. p. 436. t. CXVIII.

Ursus naso producto et mobili, cauda annulatim variegata.
Briss. quadr. p. 190.

Vulpes minor, rostro superiori longiusculo, cauda annulatim ex nigro & rufa variegata. Quachy. Barr. Fr. équin.
p. 167.

Coati. Marcgr. brasiliensis. p. 228.

Coati mondi. Ad. Parisi. T. III. P. 3. p. 17. t. 37. Raj. quadr. p. 180. Houttuyn zamenstel II. p. 238. t. 15. f. 2.

Coati noctivagans. Buff. hist. nat. VIII. p. 358. t. 48.

Brazilian Weasel. Penn. quadr. p. 229. t. 22. f. 1.

Habitat in America australi, egregie fodit, quæsiturus lumbricos; videlicet etiam muribus, pomis, pane; dum irascitur, pessime færet.

Corpus magnitudine cati, statura lotoris; rufum, ut in vulpe, pilis in dorso rigidulis. Macula albida, supra, infra et pone oculum. Auriculæ parvæ, supra nigræ. Verruca supra palpebram superiorem, sub oculo, in bucca, sub gula. Gula slavegens. Nasus eductus in proboscis nigram, longissinam, undique mobilem, apice introrsum truncatam, absque lacuna subtus. Dentes primores superiores laterales majores; inferiores medii convergentes. Lingua fissuris lobata, ut folium quercus. Cauda erecta, corpore longior, fusca, annulis 10 pallidis, pilis patulis depresso, apice compressa. Pedes calcaneis incidentes tardo gressu, etiam scandentes. Digitus singulis 5, pollice non renoto. Ungues acuti compressi.

Narica. 3. *V. subfuscus, cauda concolore, naso producto mobili.* Schreber Saeugth. III. p. 438. t. CXIX.

Ursus naso producto & mobili, cauda unicolor. Briss. quadr. 190.

Coati brunus. Buff. hist. nat. VIII. t. 48.

Habitat in America australi, tam profunde fodens, ut totius animalis sola cauda promineat, cato & nafua paullo major. Edit lumbricos, panem, fructus, radices; aquam etiam intrat, & in arbores adscendit.

Vulpecu- 10. V. tota castanea , naſo prodiſto. Schreber Saeugth. la. III. p. 440. t. CXX.

Yzquiepatl ſeu vulpecula , quæ maitzium torrefactum emulatur colore. Hernandez mexic. p. 332. Raj. quadr. p. 181.

Coafe. Buffon hift. nat. XIII. p. 288. 299. t. 38.

Stifling Weefel. Penn. quadr. p. 230. n. 165.

Habitat in Virginia & uova Hispania, ſcetidiffima viſitatis vermbus , ſcarabæis , avibus. Longitudo 16 pollicum. Myſtaces nigrae. Palmæ tetradactylæ.

Quasje. 11. V. castanea subtus flavescens , naſo prodiſto , cauda annulata. Syſt. nat. X. I. p. 44.

Meles ex furarate ſpadiceo nigricans , cauda fulva annulis flavicantibus quaſi cincta. Briff. quadr. p. 185.

Ichneumon de yzquiepatl. Seb. muſ. I. p. 68. t. 42. f. 2. Tamandua mexicana , yzquiepatl ſeu vulpecula dicta. Seb. muſ. I. p. 66, t. 40. f. 2?

Habitat Surinami ; fodit , vermbus , inſectis , fructibus vescens , mansuſcens , fatida.

Putorius. 4. V. nigricans lineis quinque dorsalibus parallelis albidis. Schreber Saeugt. III. p. 442. t. CXXII.

Mustela nigra , tæniis in dorſo albis. Briff. quadr. p. 181.

Polcat. Catesb. carol. II. p. 62. t. 62.

Polcat , Skunk, Fiskattra. Kalm itin. II. p. 378.

Conepate. Buffon hift. nat. XIII. p. 288. t. 40.

Striated Weefel. Penn. quadr. p. 232. n. 166.

Habitat in America ſeptentrionali , antra ſuadiens , dic dormiens , noctu currens , lumbricis & inſectis viſitans , carnium , avium , ovorum amans ; a canibus dum urgetur , ſe contrahit , irritatus , inſtar plurimærum hujus generis ſpecierum , halitum explodit , quo nihil ſcetidius ; inceſſu tardus nec homincs nec feras metuens ; uestes ſcitore inquinatae purgantur ſepeliendo per diem. A. Kuhn.

Fodit & ſcandit , talis incedit , cati magnitudine.

Magnitudo martis. Color subtus ex albo & nigro variegatus. Pedes talis incedentes. Ungues 5-5 : anteriores compressi longi ; posteriores breviores , subtus excavati. Dentes primores ſuperiores paralleli depreſſi & quales ; inferiores 6 & quales compressi , quorum 2 interiores ; molares 5 ; laniarii ſupra & infra utrinque approximati , infra tamen magis. Caput ſubglobosum , roſtro prodiſto , naſo nudo ; myſtacum triplici ordine ; riſtu brevi ; colum breviſſimum ; palmæ breviores unguis longiſſimi ;

plantarum ungues breviores ; cauda horizontalis apice alba , pilis longissimis ; penis ossé cartilagineo.

Conepatl. 12. V. nigricans, lineis duabus albis dorsalibus per caudam productis.

Conepatl seu vulpecula puerilis. Hernand. mex. p. 232.
Habitat in nova Hispania.

Mephitis. 13. V. dorso albo , linea longitudinali alba. Schreb. Saeugth. III. p. 444. t. CXXI.

Chinch. Buffon hist. nat. XIII. p. 294. t. 39.

Skunk Weasel. Penn. quadr. p. 233. n. 167.

Habitat in America a regno Chilensi ad Canadam usque, mansuescens; fxtore horrendo se defendens, ova venatur.

Longitudo 16 pollicum. Pili longi splendidi. Cauda potissimum alba.

Zorilla. 14. V. albo nigroque variegata. Schreber Saeugth. III. p. 445. t. CXXIII.

Zorilla. Buffon hist. nat. XIII. p. 289. t. 41.

Mapurito, Mafutiliqui. Gumilla Orenoq. III. p. 240.

Habitat in America australi.

Longitudo 14 pollicum. Cauda corpore brevior postiee alba. Rostrum breve & obtusum. Pili longi.

Mapurito. 15. V. nigra , fascia nivea a fronte ad dorsum medium producta auriculis nullis.

Viverra Putorius. Muis act. Holmienf. 1769. p. 68.

Habitat in nova Hispania circa metallam Pamplonæ. interdiu dormiens , noctu vagans , cursu veloci; viicitat vermis & insectis , profunda antra fodit.

Longitudo corporis 20 , caudæ apice albitantis 9 pollicum.

Pedes pentadactyli , talis incedentes , unguibus longis.

Caput parvum. Rostrum elongatum. Lingua levius,

vittata. 16. V. nigricans , vitta alba ab humeris ad frontem producta. Schreber Saeugth. III. p. 447. t. CXXIV.

Grifon. Buffon hist. nat. ed. Allam. XV. p. 65. t. 8.

Chinch. Feuillé voy. I. 272?

Yaguane ; Maikel. Falkner Patagon. p. 158. 159?

Habitat Surinami , forsan in omni America australi.

Pedes pentadactyli. Cauda corpore brevior , pilis etiam brevioribus. Auriculæ breves.

Zeylani- 17. V. supra cinerea, fusco mista, infra albida. Schreb.
ca. Saeugthiere, III. p. 451.

Martes philippinensis. Camell. ad. angl.. XXV. p. 2204?
Habitat in Zeylona, forsitan quoque in insulis Philippinis.
Magnitudine et habitu ad martes accedit. Pedes pentadactyli,
unguis paulisper retrorsilibus. Cauda longitudine corporis,
basis paulo crassiore. Myslices albae, ordine
5 placi, labium inferius dentatum. Dentes primores su-
periores laterales longiores conici, medii obtusi, Lingua
verrucosa.

Capensis. 18. V. nigra, dorso griseo albo-marginato. Erxl. syst. mamm.
p. 493. Schreb. Saeugth. III. p. 450. t. CXXV.

Mustela subfuscata, linea longitudinali alba per utrumque
latus ducta. Brown. jamaie. p. 486. n. 1?

Stinkbinksen. Kolbe Vorgeb. I. 167.

Blaireau puant. la Caille voyag. p. 182.

Fizzler. Penn. quadr. p. 234. n. 269.

Habitat in Capite bonaë spei et Guinea, melle sylvestri
pasci fertur, factore contra hostes se defendens.

Longitudo bipedalis, caudæ octo pollicum. Auriculæ
nullæ. Pili longi et asperi. Annon guloni adjungenda?

Civetta. 19. V. cauda superius maculata, versus apicem fusca, juba
castanea, dorso cinereo fuscoque maculata. Schreber
Saeugth. III. p. 418. t. CXI.

Meles fasciis et maculis albis nigris et rufescens varie-
gata. Briss. quadr. p. 186.

La civette, qu'on nommoit anciennement hyæna. Belon
observ. 208. fig. p. 209.

Civetta. Clus. cur. post. p. 57.

Felis zibethi. Gesn. quadr. p. 836. Aldrov. dig. p. 342.
Olear. gottorf. Kunstkam. p. 7. t. 6. f. 3.

Civette. Buffon hist. nat. IX. p. 299. t. 34.

Habitat in Aethiopia, Guinea, Congo, Capite bonaë spei.
Corporis habitu catum refert, capitum forma proprius ad
mungo accedit: Sub oculis macula, in dorso numerosæ
rotundatae & angulatae maculæ castaneæ, quæ versus
crura in strias abeunt. Pedes ex atro fuscis. Dentes mo-
lares in utraque maxilla utrinque sex.

Zibetha, s. V. cauda annulata, dorso cinereo nigroque undatim striato.
Schreber Saeugth. III. p. 420. t. CXII.

Felis zibethi. Gesn. quadr. p. 837.

MAMMALIA FERÆ. Viverra.

*Animal zibethi vel hyæna veterum Bellonii. Aldrov. dig.
p. 343. Raj. quadr. p. 178.*

Animal du musc. Ad. Paris. 1731. p. 443.

Zibet. Buff. hist. nat. IX. p. 299. t. 31.

Habitat in Arabia, Malabaria, Siam, et insulis Philippinis; fera, indomita, mansueta quidem, sed facile in p. iorem ferociam revertens; irata pilos dorsi erig. t; morsu se defendit; vescitur animalibus minoribus, avibus, pisibus, radicibus adeo et fructibus; facie et scandit et currit.

Corpus gracile et oblongum, magis quam quidem civettæ; rostrum quoque longius et tenuius, supra paulisper emarginatum. Dentes primores superiores sex paralleli; intermedii paulo minores; inferiores paralleli: mediis paulo breviores; alternis in inferioribus. Laniarii solitarii, utrinque distantes. Molares acuti, denticulati, inferiores utrinque 5, superiores 6. Auticulae teclæ, breviores quam civettæ. Corporis pili cinereo nigroque undati, rigidusculi, appressi. Fedes fusci, subtus nigri. Cauda longior quam civettæ. Longitudo corporis 2 $\frac{1}{2}$ pedum. Folliculus zibethi inter anum et genitalia in utroque sexu 1, propria apertura folliculi, distincta ab ano & vulva, prominens, ambrosiaca.

Anatome. Bartholin. cent. 4. n. 1. et cent. 5. n. 49.

Castellus. P. Hyæna odorifera. Francof. 1698. 8.

herma- 20. V. cauda elongata apice atra, striis tribus dorsalibus phrodita, nigris. Schreber Saeugth. III. p. 426. n. 6.

Habitat in Barbaria.

Magnitudo inter civettam et genettam media. Rostrum ab apice ad ultra oculos, gula, mystaces, pedes nigri. Infra oculos et inter mystaces macula alba. Pili longi, ad cutem cinerei, apice nigri. Cauda corpore longior. Ungues lutei. Inter penem et anum regio calva, cutes tenera plica dupli. Pallas.

Genetta. 6. V. cauda annulata corpore fulvo-nigricante maculato. Schreber Saeugth. III. p. 423. t. CXIII.

Mustela cauda ex annulis alternatim albidis et nigris variegata. Briss. quadr. p. 186.

Genette. Belon obs. p. 73. Gesn. quadr. p. 549.

Genette. Buffon hist. nat. IX. p. 343. t. 36.

Genithkaze, Chat d'Espagne. Ridinger illuminirte Thiere. t. Q. D. S. XXVIII.

Habitat circa Constantinopolin, in Asia occidentali & Hispania, mitis & facile mansuescens, ut felis, venatur mures, olet moschum, odore tamen debiliore & fugace.

Ad Zibetham prope accedit, rostrum tamen magis acutum, pedes breviores, cauda longior. Longitudo corporis sine cauda 5 pollicum ultra pedem, cum cauda 2½ pedum. Dentes molares utrinque 6. Pili cinerel, apice spadicei aut nigri.

Fossa. 21. V. cauda annulata, corpore cinereo nigro maculato. Erxl. sys. mamm. p. 498. Schreber Saeugthiere, III. p. 424 t. CXIV.

Fossane. Buffon hist. nat. XIII. p. 163. t. XX. Penn. quadr. p. 237. n. 272. t. 22. f. 2.

Habitat in Madagascar, forsitan quoque in continente Africæ. Magnitudine & forma ad genetam accedit; neque tamen zibethum olens. Ne folliculus quidem haclenus inventus.

tigrina. 22. V. cauda annulata apice fusca, corpore cinereo fuscumaculato, stria a capite ad caudam producta nigra. Schreber Saeugthiere, III. p. 425. t. CXV.

Chat-bizaam. Vosmaer descr. d'une espèce singul. de chat africain. Amst. 1771.

Habitat in capite bonæ spei.

Magnitudo cati domestici; satis mitis; carnis præsertim avium amans; Zibethum non olet; an a fossa vere distinctiona?

caudivolvula. 23. V. flava nigro-mixta, cauda unicolor prehensilis. Schreber Saeugthiere, III. p. 453. t. CXXV. B. et 1. p. 145. t. XLII.

Yellow maucauco. Penn. quadr. p. 138. n. 108. t. 16. f. 2.

Habitat in Jamaica, mansuetus & lepidus scandit arbores. Corpus longitudine 19 circiter pollicum. Cauda vix brevior, apice prehensilis, castanea atro mixta. Pedes breves et crassi.

mellivora. 24. V. dorso cinereo, fascia laterali nigra, abdomine nigro, unguibus longis subtus cavis, fossoriis. Blumenbach Naturg. p. 97.

Ratei. Sparrmann ad. Stockh. 1777. t. IV. f. 3.

Habitat ad caput bonæ spei, viditans melle ceraque apium sylvestrium in caveis hystricis, dipodis, cuniculi, canis aurei, etc. nidulantium, quos volantes observat, aut cu-

MAMMALIA FERÆ. Viverra. Mustela.

culo indicatore duce querit. Vellus villosum, cute rufa, laxe corpus ambiente.

fasciata. 25. V. caudæ pilis longis nigris et rufescentibus, corpore griseo fasciis 6 nigris longitudinalibus vario, subtus albo. Chat sauvage à bandes noires des Indes. Sonner. it. 2. p. 193. t. 90.

Habitat in India, 2 pedes et 9 pollices longa.

Dentes primores in utraque maxilla 2, canini 1 1/4 (sec. Sonnerat) pedes pentadactyli, unguibus fortibus uncinatis; oculi vividi.

malaccen- 26. V. cauda nigro annulata elongata, corpore griseo supra- sis. nigro-guttato, maculis quatuor rotundis supra oculos, fasciis colli dorsique tribus nigris,

Civette de Malacca. Sonner. it. 2. p. 144. t. 91.

Habitat in Malacca, cati magnitudine et moribus, ferox, prædans, agilissima, ab arbore in arborem saltit, odorem moschi spargens, liquorem ejus æmulum continens, cuius virtutem aphrodisiacam et ventriculum roborantem prædicant Malaii.

Corpus margaritaceum, serie gutterum nigrarum 6, septuplii in dorso; caput supra, pedes et femora nigra; auriculæ exiguae, rotundæ; oculi nigricantes parvi; pedes pentadactyli; unguibus acutis, uncinatis, retrorsilibus; an ideo felis? Rostrum elongatum, corpus productum vetat.

15. MUSTELA. Dentes primores superiores VI erecti acutiores distincti. inferiores VI obtusiores conferti: duo interiores.

Lingua lævis.

* *plantis palmatis*, Lutrae.

Lutris. I. M. plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo breviore.

Lutra marina plantis pilosis, cauda pilosis, cauda corpore quadruplo breviore. Erxl. mamm. p. 445. Schreber Saeugth. III. p. 465. t. CXXVIII.

Lutra marina. Steller nov. comment. Petrop. Tom. II. p. 367. t. 26.

brasiliensis. ♂. L. atri coloris, macula sub gutture flava; Briss. quadr. sis. p. 202.

Lutra brasiliensis. Raj. quadr. p. 189. Klein quadr. p. 91.
Lutra nigricans, cauda depressa et plana, Barrer. Fr. équin. p. 155.

Jiya, quæ et carigueibein a Brasiliensibus. Marcgr. brasili. p. 234. Jonst. quadr. t. 66.

Saricovienne. Buffon hist. nat. XIII. p. 319.

Habitat in oceano Asiam et Americam inter medio, ♂ in
fluviiis Americæ meridionalis.

Caput depresso. Auriculæ minimæ, villoſæ, subrotundæ.
Os obtusissimum. Mysticæ copioſæ, rigidulæ: supræ
superclilia; pone oculos; pone ſinum oris; ad latera labit
inferioris; ſub gula. Dentes primores ſuperiores 6 æqua-
les; inferiores 6: duobus alternis interioribus et duobus
bilobis lateralibus. Pedes 5-5, palmati omnes. Cauda
depressa, corpoſe paulo brevior. An hujus varietas, an
propria species mustela felina, ad littus Chilense obvia,
plantis palmatis pilofis, cauda tereti elongata conspicua?
Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 252.

Lutra. ♂. M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breviore.
Fn. suec. p. 12. S. G. Gmelin it. III. p. 285. 373.

Lutra plantis nudis, cauda corpore dimidio breviore. Erxleb.
mamm. p. 448. n. 2. Schreber Saeugth. III. p. 457.
t. CXXVI. A. B.

Lutra digitis æqualibus. Faun. suec. I. n. 10.

Lutra. Gesn. quadr. p. 775. ſig. p. 776. Gesn. aquat. p.
603. Aldrov. digit. p. 292. f. 295. Jonſt. quadr. p. 150.
t. 63. Raj. quadr. p. 187.

Loutre. Buffon hist. nat. VII. p. 134. t. II. XIII. p.
323. t. 45.

Oter. Penn. quadr. p. 238. n. 173.

Fischotter. Ridinger wilde Thier. t. 28.

Multis quidem notis conueniunt lutæ cum mustelis, corpore elongato, æqualis crassitatei, pedibus brevibus, pilis nitentibus, unguibus immobilibus; in antris degunt, noctu præfertim vagantur & prædantur; aſt lutæ in aquis perpetuo degunt, ſupra et infra aquam natunt, pſicibus præfertim rident; non ſcandunt, aut incurvata corpore, et protensa cauda ſaliunt, uti mustelæ; caput ipsis eſt crassius et majus, lingua mollibus aculeis intrudat; lutæ in utraque maxilla molares dentes utrinque 5, mustelis 3 aut 4; an ideo remoyendæ a mustelis proprium genas conſtituant lutæ?

Habitat in Europæ, septentrionalis Americæ et ad Persiam usque Asiae aquis dulcibus, fluviiis, stagnis, piscinis, non in mari. Vicitat piscibus, ranis, cancris; piscinas devastat. Nidus sub terra, supra aquæ superficiem, aditu sub aqua; coit Februario; advocat feminam sono lento susurrando; parit Majo pullos 3-4. Astatum & mordax animal, ut tamen cicurari possit.

Anatome. E. N. C. d. I. a. 3. obs. 195. & dec. 2. a. 10. obs. 112. & cent. 10. app. 468.

Lutreola. 3. M. plantis palmatis hirsutis, digitis æqualibus, ore albo.

Fn. suec. 12. Lepechin it. I. p. 176. t. 12.

Lutra minor, plantis hirsutis, digitis æqualibus, ore albo. Erxleb. mamm. p. 451. n. 3. Schreb. Sæugth. III. p. 462. t. CXXVII.

Viverra fusca ore albo. *Leche Act. Holm. 1759. P. XXI. p. 292. t. II.*

Viverra Lutreola. *Pallas spicil. zool. XIV. p. 46. t. III. f. 1. Noerza. Agric. de anim. subterr. p. 39.*

Lesler otter. *Penn. quadr. p. 239. n. 174. t. 21. f. 2.*

Habitat in Germanicæ (parcius), Poloniæ, Finlandiæ, Russiæ, Sibiriæ aquosis, vicitans piscibus, ranis. Pedem longitudine vix excedit. Cum spec. I. viverris adiungi vult Pallas.

Vison. 5. M. plantis palmatis, corpore saturate castaneo unicolo. *Schreber Sæugth. III. p. 463. t. CXXVII. B.*

Mustela pilis coloris saturate castanei in toto corpore vestita. Briss. quadr. p. 178. n. 6.

Vison. *Buffon hist. nat. XIII. p. 304. t. 43.*

Minx. *Lawson Carol. p. 121.*

Mink. *Kalm. it. III. p. 22.*

Habitat in America septentrionali ad aquas; piscibus, avibus, muribus vesicatur, aliquando pagos frequentans.

* * pedibus fissis, Mustelæ.

barbara. 4. M. pedibus fissis, atra, collo subtus macula alba triloba. *Mustela maxima atra moschum redolens, Tayra. Barrere Fr. équin. p. 155.*

Guinea weefel. *Penn. quadr. p. 225. n. 161.*

Habitat in Guiana & Brasilia.

Corpus statura martis, nigrum pilis rigidioribus. Auriculae rotundæ villosæ. Area cinerascens ante oculos. Macula sub medio collo, non sub gula, albida. Mammæ 4 pone umbilicum.

*An hoc spectat Cuja Chilensem, cauda mediocri, pilis
mollibus, labio superiore subtruncato conspicua? Molina
hist. nat. Ch. p. 258.*

- Galera. 12. M. tota fusca, pedibus fissis. *Erzl. mamm.* p. 453.
*Galera subfuscus, cauda elongata, oculis nigris, auribus
subnudis appressis, the Guinea fox. Brown. jamaic.* p.
 485. t. 29. f. 1.
Vansire. Buffon hist. nat. XIII. p. 167. t. 21.
Tayra ou Galera. Buffon hist. nat. XV. p. 155.
Madagascar weefel. Penn. quadr. p. 224. n. 158.
Guinea weefel. Penn. quadr. p. 225. n. 160.
Habitat in Guinea & Madagascar.

- Canaden- 13. M. pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, pectore
fissis, macula alba. *Erzl. mamm.* p. 455. *Schreber Saeugth.*
III. p. 492. t. CXXXIV.
Pekan. Buffon hist. nat. XIII. p. 304. t. 42.
Habitat in Canada, absque cauda bipedalis.

- Foyna. 14. M. pedibus fissis, corpore fulvo nigricante, gula alba.
Erzleb. mamm. p. 458. *Schreber Saeugth.* III. p. 472.
 t. CXXIX.
*Mustela pilis in exortu albidis castaneo colore terminatis
vestita, gutture albo. Briss. quadr. p. 178.*
*Martes domestica. Gesn. quadr. p. 765. Aldrov. dig. p.
 332. Jonst. quadr. p. 156.*
Maytes, aliis Foyna. Raj. quadr. p. 200.
Fouine. Buffon hist. nat. VII. p. 161. t. 18.
Martin. Penn. quadr. p. 215. n. 154.
Marder. Ridinger kleine Thiere, t. 85.
*Habitat in Anglia, Germania, Gallia & Europa austra-
liore. Noctu vagatur, quadrupedibus minoribus, ranis,
avisibus vicitat, gallinorum et ovorum precipue amans,
fructus etiam horæos vorat, cati infensissimus hostis;
mansuetus, si junior captus fuerit; femina 3-4, adulta
ad 7 pullos parit.*

- Martes. 6. M. pedibus fissis corpore fulvo nigricante, gula flava. *Erzl.
 mamm.* p. 455. *Schreb. Saeugth.* III. p. 475. t. CXXX.
*Mustela pilis in exortu e cinereo albidis castaneo colore
terminatis vestita, gutture flavo. Briss. quadr. p. 179.*
Martes fivestris. Gesner quadr. p. 765.
Martes abietum. Raj. quadr. p. 200.
Martes. Aldr. dig. p. 331.

MAMMALIA FERÆ. Mustela.

Marte. *Buffon hist. nat.* VII. p. 186. t. 22.

Pine Martin. *Penn. quadr.* p. 216. n. 155.

Marder. *Ridinger wild. Thier.* t. 30.

Habitat in Americæ, Asiæ & Europæ septentrionalis;
rarior in Anglia, Gallia, Germania, Hungaria incul-
tis; noctu vagatur, interdiu in cavis arboribus, nidis
sciurorum, etc. degens; his præsertim, muribus, aviculis,
baccis, fructibus etiam horæis & melle viciitat, hieme
etiam columbas & gallinas venatur; coit Februario, per
9 menses gravida 7-8 pullos parit. Capite breviore, et
pedibus paulo longioribus à Foina distincta.

Zibellina. 9. M. pedibus fissis, corpore obscure fulvo, fronte exalbida,
 gutture cinereo. *Schreb. Sæugth.* III. p. 478. t. CXXXVI.

Pallas spicil. zool. XIV. p. 54. t. III. f. 2.

Mustela obscure fulva, gutture cinereo. *Briss. quadr.* p. 180.

Mustela sobella. *Gesn. quadr.* p. 768.

Mustela Zibellina. *Aldr. dig.* p. 335. *Jonst. quadr.* p. 156.

J. G. Gmelin nov. comm. Petrop. T. V. p. 338. t. 6.

Zibeline. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 309.

Sable & Fisher Weasel. *Penn. quadr.* p. 217. & 223:
 n. 156. 157:

Habitat in Asia et America septentrionali; olim quoque in
Lapponia, in Asia ad 58vum, in Americâ ad 40um,
latitudinis gradum, catis infesta; mustelis, sciuris, lepo-
ribus hieme avibus præcipue tetraonibus, autumno baccis
viciitat; noctu prædator, interdiu dormiens; coit Janua-
rio; sub finem Martii parit femina 3-5 pullos.

Próxime ad Martem accedit, a quo tamem capite magis por-

recto, auriculis longioribus, margine flavescente cinctis,
 pilis longioribus et splendidissimis, pedibus magis hirsutis,
 et cauda præsertim, quæ brevior est pedibus posticis
 extensis, differt.

Varietas alba rarissima, vix frequentior ea, quæ macula
 collari albida aut flava insignitur.

Putorius. 7. M. pedibus fissis, corpore flavo nigricante, ore auriculisque
 albis. *Schreber Sæugth.* III. p. 485. t. CXXXI. *Faun.*
suec. 16.

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis colore nigricante
 terminatis vestita, oris circumferentia alba. *Briss. quadr.*
 p. 186.

Mustela flavescente-nigricans, ore albo, collaris flavo. *Syst.*
nat. VI. p. 5. n. 3.

Putorius

M A M M A L I A F E R Æ. Mustela. 97

Putorius. *Gesn. quadr.* p. 767. *Aldr. dig.* p. 329. *fig. p. 330.*

Jonst. quadr. p. 154. t. 64. *Raj. quadr.* p. 199.

Putois. *Buffon hist. nat.* VII. p. 199. t. 23.

Polecat. *Penn. quadr.* 213. n. 152.

Iltinis. *Ridinger wild. Th.* t. 20.

Habitat inter Europæ, etiam aliquando Russiæ asiaticæ rupes, lapidum acervos, rudera, in stabulis, horreis, domibus; arboribus cavis; interdiu dormit, noctu prædatur cuniculos, mures, talpas, gallinas, alias aves; hieme ranas & pisces; ovā rapit; alvearia devastat; ano, ut 7, 9, 14, halitū sc̄etidissimo.

Capite crassiore, rostro acutiore, cauda breviore, pilorum potissimum colore a marte differt; in desertis Russiæ asiaticæ nonnunquam alba. Mas plerumque subflavus ore albido. Femina albido-subflava.

Furo. 8. M. pedibus fissis, oculis rubicundis.

Mustela corpore pallide flavo. *Erxl. mamm.* p. 465. *Schreb. Sacugth.* III. p. 488. t. CXXXIII.

Mustela viverra mas, pilis subflavis, longioribus castaneo terminatis vestita, & Mustela viverra feminâ, pilis ex albido subflavis vestita. *Briss. quadr.* p. 177.

Mustela silvestris. *Aldr. dig. fig.* p. 327. *Jonst. quadr.* p. 154.

Mustela silvestris, viverra dicta. *Raj. quadr.* p. 198.

Furo. *Gesn. quadr.* p. 762.

Furet & Furet putois. *Buffon hist. nat.* VII. p. 209. t. 26. 25.

Ferret. *Penin. quadr.* p. 214. n. 153.

Habitat in Africa, domesticâ & venatui adaptata in temperatore Europa; bis coit per annum, per sex hebdomadas gravida, 5-8 rarius 9 pullos parit.

Putorio minor, a quo etiam capite angustiore, rostro acutiore, trunco magis elongato & gracili, colore differt.

Carmatica. 15. M. pedibus fissis, corpore supra ex luteo & fusco vario.

Pallas it. I. 453. & *spic. zool.* XIV. p. 79. t. IV. f. I. *Erxleb. mamm.* p. 460. *Schreber. Sacugth.* III. p. 490. t. CXXXII.

Mustela peregrina, pedibus fissis, capite & corpore subtus aterrimis, corpore supra brunneo luteoque vario, ore fascia frontali auriculisque albis. *Güldenstädt nov. comim. Petrop.* XIV. p. 441-445. t. 10.

Mustela præcincta & Perewiaska. *Rzeczyński hist. nat. Pol.* p. 328. & 222.

Vormela (germanice Wormlein). *Gesn. quadr.* p. 768,

Habitat in Polonia, præsertim Volhynia, & desertis inter Wolgam & Tanaim sitis; voracissima muribus, dipodibus, avibus, vescitur; femina 8 mammis gaudet, vere coit, & per 8 hebdomadas grava 4-8 pullos parit.

Ad putorium accedit, a quo tamen capite angustiore, corpore magis elongato, cauda longiore, & pilis, si pedes caudamque excipias, brevioribus, distat.

sibirica. 16. M. fulva, palmis plantisque hirsutissimis fissis. Pallas it. II. 701. & spic. zool. XIV. p. 89. t. IV. f. 2. Erxleb. mamm. p. 471.

Habitat in Sibiriæ silvosis, vorax, carnes etiam & butyrum ex rusticorum culinis prædatur.

Magnitudine ad sarmaticam, moribus ad zibellinam, habitu ad ermineam proprius accedit, ab hac tamen cauda & pedibus longioribus discrepat. Cauda villosa, corpore dimidio brevior. Pili longiores & tenuiores, quam putorio & furoni.

erminea. 10. M. pedibus fissis, caudæ apice atro. Fn. suec. 17. Houttuyn nat. III. p. 206. t. 14. f. 5.

Mustela hieme alba, æstate supra rutila infra alba, caudæ apice nigro. Briss. quadr. p. 176.

æstiva. a. Mustela caudæ apice atro. Schreber Saeugth. III. p. 496. t. CXXXVII. A.

Rosalet. Buffon hist. nat. VII. p. 240. t. 31. f. 1.

Stoat. Penn. quadr. p. 212. n. 151.

Wiesel. Ridinger jagdb. Th. t. 19.

hyberna. b. Mustela candida in extrema cauda nigricans. Aldrov. dig. p. 310. Schreber Saeugth. III. p. 496. t. CXXXVII. B.

Mustela candida s. animal ermineum recentiorum. Raj. quadr. p. 198.

Hermine. Buffon hist. nat. VII. p. 240. t. 29. f. 2.

Hermelin. S. G. Gmelin it. II. p. 192. t. 23.

Habitat in Europa & frigidiore America atque Asia ad borealem Persiam & Sinam usque in domibus, lapidum acervis, fluviorum ripis, cavis arboribus, silvis, præsertim betulatis; sciuris & lemmis videtur, videtur

An ad hanc speciem spedat Mustela javanica, Seb. mus. I. p. 77. t. 48. f. 4. utrum ad hanc, an ad vulgarem Boccamale Sardorum, Cetti hist. nat. Sardin. I. t. 5. caudæ apice atro, trunco longiore ad ermineam accedens, hominem sequitur, vegetabilibus & carne recenti vescitur, mel amat, rineas infestat.

ceterum & moribus ad vulgarem, facie & habitu ad martem accedit; ab hoc tamen trunko breviore, nunquam 10 pollices æquante, cauda longiore & pollicum, pilis brevioribus & minus splendentibus distat. Corpus in borcalibus regionibus hycme album, excepta cauda, quæ dimidia extrorsum nigra. Pellis pretiosa, & olim magni aestimata.

vulgatis. II. M. pedibus fissis, corpore ex rufo fusco, subtus albo, cauda concolore. Erxl. mamm. p. 471. Schreber Sæugth. III. p. 498. t. CXXXVIII.

aetiva. α. Mustela supra rutila, infra alba. Briff. quadr. p. 175. Mustela vulgaris. Aldr. dig. p. 307. Jonst. quadr. p. 152. t. 64. Raj. quadr. p. 195. Mustela. Gesn. quadr. p. 752. Belette. Buffon hist. nat. VII. p. 225. t. 29. f. I. Common Weasel. Penn. quadr. p. 211. n. 150. Wiesel. Ridinger wilde Thier. t. 30.

nivalis. β. Mustela corpore albo, caudæ apice vix pilis ullis nigris. Syft. nat. XII. p. 69. n. II. Mustela cauda truncato-abbreviata corpori concolore. Hellenius act. Stockh. 1785. trim. 3. n. 9. t. I. Habitat in temperatiore & frigida Europa & Asia ad borealem Persiam usque, in septentrionalibus v. g. Westrobothnia, Rusia, &c. hycme albescens; erminea dimidio minor, ut vix longitudinem 7 pollicum aequalatur; edit pisces, carnes, mures, ova, fungos, non alia vegetabilia; avarissima, fetida, immunda, sticulosa, noctu prædatur, muribus pessima, quos totos relictis solis dentibus consumit, eorum foramina intrat; a fele non facile occiditur; recurrens accurrensque continuo prospicit; terrefacta epilepsia convelli fertur; cicurata lepida; vere 6-8 pluresve pullos parit.

Quiqui. 17. M. pedibus fissis, corpore fusco, rostro cuneiformi. Molina hist. nat. Chil. L. IV. p. 258. Habitat in regno Chilensi infra terram, muribus vicitans, ferox.

16. URSUS. *Dentes primores superiores VI*, intus
excavati alterni.

inferiores VI : laterales 2
longiores lobati; secun-
darii basi interiores.

laniarii solitarii.

molares V-VI : primo lania-
riis approximato.

Lingua lavis.

Membrana nictitans.

Nasus prominens.

Penis scatens osse curvato.

Arctos. I. U. fusco nigricans, cauda abrupta. *Erzl. mamm.* p. 156.
Ursus niger, cauda unicolo. *Briss. quadr.* 184.
Ursus. *Gesn. quadr.* 14. *Aldrov. dig.* 117. *Jonst. quadr.*
p. 123. t. 55. *Raj. quadr.* p. 171. *Klein quadr.* p. 82.
Black bear. *Penn. quadr.* p. 190. n. 138.
Baer. *Ridinger wilde Thier.* t. 32.

niger. α. corpore nigro minore. *Schreb. Saeugth.* III. p. 502. t. CXL.
fuscus. β. corpore fusco vel ferrugineo. *Schreb. Sacugth.* III.
p. 502. t. CXXXIX.
Ours brun des Alpes. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 248. t. 31.

albus. γ. corpore nigro pilis albis admixtis.
Ours blanc terrestre. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 248. t. 32.

variegatus. δ. corpore vermiculato.

Habitat γ & δ in Islandia, α in uliginosis silvaticis
frigidis Europæ & Asiae septentrionalis, β etiam in
alpibus pyrenaicis, fabaudicis, helveticis, carpathicis,
caucasicis, in Polonia, Græcia, Palæstina, Ægypto,
Barbaria, Zeylona, India, Japonia, Sina, Persia;
videtur α) radicibus, baccis, aliisque vegetabilibus;
β) quoque insectis, e. g. formicis, alveari-
bus apum, cadaveribus & lanena pecorum, cervo-
rum, equorumque; prædam mox inflat, reliquam in
paludibus desodit; escam lubenter lavat; manus cu-
bans continuo lambit; β fine Junii coit & initio Ju-

nuarii parit unum plerumque pullum; coit & fine Octobris, uterum gerit 112 diebus; hybernat abtemperat & melio Novembri in initium regulationis; obambulat plerumque, signis nisi laeßatur, tum agilissime erectus ambabus pugnat; sine injuria hominem non adorritur; ante pugnam pullos ascendere arbores cogit; descendit præente cauda, quam valde metuit; pediculis caret; cunctum fugere perhibetur. Pedibus posterioribus insitit; natat. Hspidus membrana nictitans cervus, Pollex reliquis dñgitis angustior. Mammæ 4. Cranium, non cerebrum, leonis minus. Tendines præstantissimi pro filis Lapponum. Caro esitata. Fel americanum epilepticis commendatum; pinguedo in cosmetica recepta.

maritimus. 5. U. albus, cauda abrupta, capite colloque elongatis. Errl. sijst. mamm. p. 160. Schreber Saugthiere, III. p. 513. t. CXL.

Ursus marinus. Pallas it. III. p. 691. & spicil. zoolog. XIV. p. 1-24. t. 1.

Ursus albus, cauda unicolore. Briss. quadr. 183.

Ursus maritimus albus major arcticus. Martens spizb, 73. t. O. f. C.

Urtus albus. Jonst. quadr. p. 126. Mus. Worm. p. 319. Klein quadr. p. 82.

Ours blanc. Buffon hist. nat. suppl. III. p. 200. t. 34.

Polar bear. Penn. quadr. p. 192. n. 139. t. 20. f. 1.

Weisse Baer. Rüdinger Baeren, t. 3.

Habitat intra polum arcticum, frequens in glacie ipsorum mari; caloris impatientissimus, piscibus, phocis, balænis, rarius, nec nisi famelicus armenis vicitat; Femina per 6-7 menses gravida Martio plerumque binos parit catulos. Mores & usus iidem, qui arcto. Caput majus, quam huic, cranium magis convexum, rostrum crassius.

americanus. 6. U. niger, gula genisque ferrugineis. Pallas spicil. zool. XIV. p. 6. 26.

Habitat, terra Chilensi & Patagonia excepta, in omni America; vegetabilibus & piscibus præfertim vicitat. Caro esitata.

Caput magis elongatum. Auriculæ longiores; pili fortiores, molles, recti, longiores, aterrimi, teneriores, magis splendentes.

Animalia sub hoc genere militantia, pedibus pentadactylis, pollice non remoto talis incedunt, scandunt, palmis quædam manuum instar utuntur.

- Meles. 2. U. cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra. *Fn. suec.*
 20. Schreber *Saeugth.* III. p. 516. t. CXLII.
 Meles unguibus anticis longissimis. *Syst. nat.* VI. p. 6.
 Meles pilis ex fordide albo & nigro variegatis vestita, capite tæniis alternatim albis & nigris variegata. *Briss. quadr.* 183.
 Meles. *Gesn. quadr.* 687. fig. p. 686.
 Taxus. *Aldr. dig.* p. 263. fig. p. 267. *Jonst. quadr.* p. 146.
 t. 63. *Raj. quadr.* 185. *Klein quadr.* 73.
 Blaireau. *Buffon hist. nat.* VII. p. 104. t. 7. 8.
 Common badger. *Penn. quadr.* p. 201. n. 142.
 Tachs. *Ridinger jagdb.* *Thier.* t. 17.

- alba. β. supra alba, infra ex albo flavicans. *Briffon quadr.* 185.
 maculata. γ. alba maculis ex flavo rubicundis & fuscis. *Ridinger allerl.* *Thier.* t. 24.
Habitat in Europa & boreali Asia ad Persiam borealem & Sinam usque, in ipsa quoque Japonia; β) in provincia Americæ Noveboracensi; γ) rarissimus, inter rimas rupium & lapidum in silvis, monogamus coit Novembri aut Decembris initio, post novem septimanas femina pariente catulos 3-5; vicitat insectis, ovis, foliis seculis, lathyrique, aliis cum vegetabilibus, quibus corrasis hybernat, admodum pinguiscit; noctu venatur cuniculos, antra fodit inhabitatque; stercus in distincto & determinato loco deponunt inhabitantes extra antrum singuli; die latet; folliculum putorium supra anum haurit hybernans. Cicurari potest.
Membrana nictitans alba totum oculum tegens. Mammæ 6,
 2 pectorales, 4 abdominales. Pedes breves pentadactyli.
 Longitudo plusquam bipedalis, β) 21 modo pollicum.
Anatome. E.N.C.d. 2. a. 5. obs. 32. & d. 3. a. 3. obs. 163.

- Labrado- 7. U. cauda apice villosa ex luteo subfuscâ, gula, pectore &
 rius. abdомine albis, palmis tetrادactylis. *Schreber Saeugth.*
 III. p. 520. t. CXLII. B.
 American badger. *Penn. quadr.* p. 202. n. 143.
 Carcajou. *Buffon hist. nat. suppl.* III. p. 242. t. 49.
Habitat in terra Labrador & ad sinum Hudsonis, mele paulo minor, pilis mollioribus longioribus. Auriculæ breves albae, nigro marginatae. Caput album, tæniis duabus nigris pone nasum per oculos producatis. Pili dorſi initio castanei, tum ex luteo fuscâ, postea nigri, epice albi. Pedes fuscâ.

Lotor. 3. U. cauda annulata, fascia per oculos transversali nigra.
Schreber Saeugth. III. p. 521. t. CXLIII.

Ursus cauda elongata. Ad. Stockh. 1747. t. 9. f. 1.
Houttuyn nat. 2. p. 237. t. 15. f. 1.

Ursus cauda annulatim variegata. Briss. quadr. p. 189.

Mapach. Fernand. anim. n. II. p. 1. Nieremb. hist. nat.
p. 175. Jonst. quadr. t. 74.

Vulpi affinis americana, Coati Brasiliensibus. Raj.
quadr. 179. Catesb. carol. app. p. 29.

Raccoon. Kalm it. 2. p. 228. 327. & 3. p. 24. Laws
carol. 121. Penn. quadr. p. 199. n. 141.

Coati. Wormi nus. 319. Major mosh. 30. Raj. quadr.
179.

Wilde zibethartige Kaze. Müller delic. nat. sel. 2. p. 99.
t. K. I. f. 2.

Habitat in Americæ præsertim borealis, etiam insularum utrinque Americæ oppositarum maritimis, ut plurimum in cavis arboribus, Mayo 2-3 pullos pariens. Edit lubenter ova, gallinas, conchas; cibum lavat, manibus ori admoveat; odoratu tacuisse excellit; mentis tenacissimus; dormit a 12 noctis ad 12 diei; pellitur setis porcinis. Luberter scandit.

Corpus cinereum, pilis ereditis, ferrugineis apice nigris,
unde inspectus umbra nigra cingitur. Caput fuscum,
fronte alba; fascia nigra trans oculos in medio
interrupta linea nigra perpendiculari interjecta.
Cauda pilis nigris annulata. Penis osse incurvato
scatet.

fuscus. 4. U. cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro fusco,
fronte plagaque laterali corporis.

Ursus castanei coloris, cauda unicolore, rostro pedibusque nigris. Brisson quadr. p. 168.

Quickhatch or Wolverene. Edw. av. 2. p. 103. t. 103.
Ellis hudson. I. p. 40. t. 4.

Wolverene. Penn. quadr. p. 195. n. 140. t. 20. f. 2.

Habitat ad sinam Hudsonis; magnitudine ad lupum,
capite ad gulonem accedit. Pili longi & asperi;
cauda castanea apice obscurior; pedes anteriores tetradactyli, posteriores pentadactyli.

Gulo. 8. U. cauda concolore, corpore rufo-fusco, medio dorso nigro. Schreber Saeugth. III. p. 525. t. CXLIV. Georgi it. p. 160. Pallas spicil. zool. XIV. p. 25. t. 2.

Mustela pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorso nigro. Syst. nat. XII. p. 67. Fn. suec. 14. Houtt. nat. II. p. 189. t. 14. f. 4. Gunner ad. Nidros. III. p. 123. t. 3. f. 5.

Gulo. Gesn. quadr. p. 554. Aldrov. dig. p. 178. Jonst. quadr. p. 131. t. 57. Scheff. Lappon. 339. Rzaczynsk. polon. 218. Klein quadr. p. 83. t. 5. Penn. quadr. p. 196. Zimmerman. spec. zool. geogr. 309.

Glouton. Buffon hist. nat. suppl. III. p. 240. t. 48.

Rosionaka. Nieremb. hist. nat. p. 188.

Jarf. Genberg ad. Stockh. 1773. p. 222. t. 7. 8.

Habitat in Americæ, Asiæ & Europæ terris quam maxime borealibus, rarius in Polonia & Curonia, rarissime in Germania, in montosis præsertim & vastissimis silvis. Coit Januario, parit ut plurimum Blajo pullum 1-3 in abditissimis silvarum; astutus & vorax vilitat leporibus, muribus, rangiferis, avibus, cedaveribus, etiam piscibus, caseo aliisque cibis; facillime scandit; homines nunquam sponte adoritur; contra canes sextore horrendo se defendit, post mortem tamen debiliore. Junior cicutari potest. Pellis egregia.

Mele Major, plus quam bipedalis, ast gracilior. Artus, quam u. a. breviores crassissimi, robustissimi, villoso, penicillato. Cauda cruribus posticis brevior villosa. Mammæ 6. Dentes primores superiores intermedii æquales utroque latere quasi lobati, extimi vero longiores conici robusti, altero latere lobati: Inferiores 6. retuso-truncati, 2 altezzi interiores, medii minores, extimi crassiores. Laniatii teretes conici, robustissimi, obtusiusculi, superiores paulo maiores, antice remoti, extus rugosi, inferiores virinque approximati. Molares superiores utrinque 5, inferiores 6: omnes lobati, primo ultimoque minuto.

Anatome. Barth. cent. 4. obs. 30.

17. DIDELOPHIS. *Dentes primores* minut*i* rotundati,
 Superiores X, interme-
 diis 2 longioribus.
 Inferiores VIII, inter-
 mediis 2 latioribus
 brevissimis.

laniarii longi.

molares denticulati.

Lingua papillis ciliata.

Folliculus (plerisque) abdominalis
mammarium.

marsupia- I. D. mammis 8 intra abdomen. Schreb. Saeugth. III. p. 536.
 lis. t. CXLV.

Philander (amboinensis) atro-spadiceus in dorso , in ven-
 tre ex albido cinereo flavicans , maculis supra oculos
 obscure fuscis. Briss. quadr. 201.

Philander maximus orientalis. Seb. mus. I. p. 64. t. 39.
 Klein quadr. p. 59.

Habitat in Surinamo.

Corpus nigrum, magnitudo cati majoris aut martis. Nares
 perpendiculares, lunares ; vibrissæ 5 ordinum longæ ;
 setæ pone oris rectum 8, sub gula 5. Auriculæ ovales,
 laxæ, atræ, apicibus albis. Dentes molares lobati ; an-
 teriores simplices ; primi minimi. Tibiæ nigræ lœves,
 pilis brevibus. Cauda longitudine corporis.

Philan-
 der. 2. D. cauda basi pilosa , auriculis pendulis, mammis qua-
 ternis. Schreber Saeugth. III. p. 541. t. CXLVII.

Philander (brasiliensis) pilis in exorbi albis , in extremi-
 tate nigricantibus vestitus. Briss. quadr. 210.

Tlaquazin f. Tai- ibi brasiliensis dicta, Seb. mus. I.
 p. 57. t. 36. f. 4.

Faras ou Ravale. Gumilla Orin. 3. p. 238.

Habitat in omni meridionali America.

Longitudo corporis 9 pollicum, caudæ fere 14 pollicum :
 Vibrissæ 6 ordinum ; margo orbitalum ferrugineus ; pe-
 des albidi ; caudæ pars nuda albida, maculis fuscis.

Opossum. 3. D. cauda semipilosa , superciliorum regione pallidiore.
 Schreber Saeugth. III. p. 537. t. CXLVI. A. B.

MAMMALIA FERÆ. *Didelphis.*

- Philander saturate spadiceus in dorso, in ventre flavus,
maculis supra oculos flavis. *Briss. quadr.* 207.
Philander. *Seb. mus.* I. p. 56. 57. t. 36. f. 1. 2. 3.
Vulpes major putoria, cauda tereti & glabra. *Acuare.*
Puant. *Barr. Fr. équin.* p. 166.
Simivulpa. *Gesn. quadr.* p. 870. *Aldrov. dig.* p. 223.
Tlaquatzin. *Hernand. mexic.* p. 330.
Tai-ibi Brasiliensibus. *Marcgr. brasil.* 223.
Carigueia. *Marcgr. brasil.* 222. *Pis. brasil.* 323. *Tyson*
act. angl. n. 239. p. 105. *Cowper act. angl.* n. 290.
p. 1565.
Opossum. *Catesb. Carol.* p. 120.
Sarigue, Opossum. *Buffon hist. nat. X.* p. 279. t. 45. 46.
Virginian Opossum. *Penn. quadr.* p. 204. t. 21. f. 1.

molucca. β. D. saturate fusca in dorso.

- Philander (orientalis) saturate fuscus in dorso, in ventre
flavicans, maculis supra oculos flavis. *Briss. quadr.* 209.
Habitat in Americae calida & temperatori parte, etiam
in insulis Antillis; β) in Zeylona, insulis philippinis
& moluccis.
Caudæ prehenfilis opè ab arbore in arborem volvitur,
lenti ceterum cursus, & tenacis vitæ; grunnit; cicu-
rari potest; femina 4-5 catulos parit, quos marsupio
condit pertinacissime. Longitudo circiter pedalis. Ca-
put longius & magis acutum, quam philandro, brevius,
quam marsupiali. Auriculæ breves rotundatae. Mammæ
5-7. Cauda corpore brevior, ad ortum pilosa. Caudæ
nuda pars albida.

- Cayopol- 6. D. cauda corpore longiore, marsupio nullo, orbitarum
lin. margine nigro. *Schreb. Sacugth.* III. p. 544. t. CXLVIII.
Philander (africanus) saturate spadiceus in dorso, in
ventre ex albido flavicans, cauda ex saturate spadiceo
maculata. *Briss. quadr.* p. 212.
Cayopollin. *Fernand. nov. Hisp.* p. 10.

Didelphides Americae potissimum, nunquam Africæ aut Europæ incolæ, in antris
silvarum, quæ ipsæ fodunt, & arboribus depunt, quas caudæ quoque prehenfilis ope
scandunt, lento satis gressu incidentes, avibus, gallinis præfertim, insectis, ver-
mibus, vegetabilibus quoque vescuntur. Pedes plerisque pentadactyli, fissi, plantarum
police remoto mutico. Penis maribus absconditus, glande bifida. Marsupium se-
minis 1-3 abdominale, quod claudi potest, duobus ossibus firmatum, quæ quoque in
maribus adjunt.

- Animal caudimanum s. cayopollin. Nieremb. hist. nat. p. 158.
 Mus africanus kayopolin dictus mas. Seb. mus. I. p. 49. t. 31. f. 3.
 Cayopollin. Buffon hist. nat. X. p. 350. t. 55.
 Mexican opossum. Penn. quadr. p. 208. n. 146.
Habitat in montosis uovæ Hispaniæ, rostro crassiore, auriculis brevioribus & angustioribus a præcedente & in sequente diversa. Dentes molares superiores utrinque 5. Cauda 11 pollicum, albida, spadicea maculata, ad ortum pilosa. Corpus 6 pollices longum.

- murina.* 4. D. cauda semipilosa, mammis senis. Amæn. ac. I. p. 179. Mus. Ad. Fr. 2. p. 8. Schreber Saugthiere, III. p. 545. t. CXLIX.
 Philander(americanus)saturate spadiceus in dorso, in ventre dilute flavus. Briss. quadr. p. 211.
 Philander mammis extra abdomen, cauda longissima tereti nuda, corpore longiore. Gronov. zoophyl. I. p. 9. n. 33.
 Mus sylvestris amaricanus mas, scalopes dictus. Seb. mus. I. p. 48. t. 31. f. I. 2.
 Marmose. Buffon hist. nat. X. p. 335. t. 52. 53.
Habitat in America australi.
Longitudo corporis perinde ac caudæ 6 pollicum. Vibrissæ 6 ordinum, capite breviore, infimo ordine albo, ferrugineæ. Dorsum convecum una cum vertice ferrugineum. Ungues acutissimi. Mammæ circiter 7, cylindricæ.

dorsigera. 5. D. cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum multicis. Schreber Saugthiere, III. p. 546. t. CL.
 Philander(surinamensis)ex rufo helvus in dorso, in ventre ex flavo albicans. Briss. quadr. p. 212.
 Genus gliris sylvestris. Merian. inf. sur. p. 66. t. 66.
 Mus seu forex silvestris americanus. Seb. mus. I. p. 49. t. 31. f. 4. 5.
 Glis silvestris americanus cum catulis suis. Seb. mus. 2. p. 90. t. 84. f. 4.
 Philandré de Surinam. Buffon hist. nat. XV. p. 157.
 Merian opossum. Penn. quadr. p. 210. n. 149.
Habitat in Surinamo, in entris infra terram effossis; femina parit 5-6 pullos, quos instante periculo in dorso gerit, caudis maternæ cirrhi instar circumvolutis.

Magnitudo Ratti; orbitæ margine fuscæ; cauda albida, maris maculis fuscæ scensibus prælonga, nuda; palmarum unguis obtusæ, plantarum acutæ. Auriculæ nitidæ, nudæ. An eadem cum murina?

cancrivo- 7. D. cauda squamosa fere calva, corpus prope æquante, plantarum ungue pollicari plano.

Crabier. *Buff. hist. nat. suppl.* III. p. 272, t. 54.

Habitat in Cayennæ paludosis, interdui in rhizophoros, cancris brachyuris vîditat, porcelli instar grunnit, pinguefcit, & cicuratur; femina in cavis arboribus 4-5 pullos parit.

Longitudo fere 17 pollicum. Pili instar lance crissi, intersitis tamen setis, quæ a medio dorso ad caudam usque juba fuscæ speciem constituant. Caput, humeri, collum, crura ex flavo rubent, latera & abdomen flavescent; pedes ex fuscæ nigri. Margo orbitalium niger. Auriculae breves, ovales, calvæ.

brachyu- 8. D. cauda pilosa & auriculis calvis brevissimis, marsupio nullo corpore rufo. Schreber *Sæugthiere*, III. p. 548.

t. CLI. *Pallas act. ac. Petrop. pro ann. 1780.* II. p. 235. t. V.

Philander obscure rufus in dorso, in ventre helvus, cauda brevi & crassa. *Briss. quadr.* p. 213.

Philander mammis extra abdomen, cauda brevi crassa pilosa. *Gronov. zoophyl.* I. p. 9. n. 35.

Muris silvestris americani femina. *Seb. mus.* I. p. 50. t. 31. f. 6.

Short-tailed opossum. *Penn. quadr.* p. 208. n. 147.

Habitat in Americae australis silvis. Femina 9-10 pullos parit.

Longitudo corporis a 3 pollicibus & 2 lineis ad 5 pollices, & 6 lineas, caudæ ab 1 pollice & 8 lineis ad 2 pollices & 4 lineas. Capite accedit ad D. Cayopollin; rostrum minus productum quam D. Oposso, minus acutum, quam D. murinæ, cui tamen reliquo corpore, marsupii desedet, vene postice infra scrotum exserendo satis similis est. Cauda a crassa basi sensim attenuata; veillus mollissimum, nitidum, per latera capit is & trunci pulcherrime rufum.

orienta- 9. D. cauda ad medium fere pilosa, prehensili, corpore longiore, folliculo abdominali, plantarum digitis duobus intermediis coadunatis. *Pallas misc. zoolog.* p. 59. *Erxleb. mamm.* p. 79. *Schreber Sæugth.* III. p. 550. t. CLII.

Surinam opossum. *Penn. quadr.* p. 209. n. 148;

Cœscoes. *Valent. ind.* 3. p. 272;

Phalanger. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 92. t. 10. II.

Habitat in insulis Moluccis, forsitan quoque in nova Hollandia. Comedendi modo & voce ad sciuorum accedit, per quam timida; feminæ 2 - 4 mammæ, tot etiam pulli. Capite magis convexo, rostro magis robusto, auriculis & pedibus brevioribus, unguibus longioribus & magis curvatis diversa.

Brunii. 10. D. cauda brevi calva, pedibus posticis longioribus tridactylis. *Schreber Saeugth.* III. p. 551. t. CLIII.

Filander. *le Brun voy.* 1. p. 347. f. 213.

Habitat in...

Capite vulpem refert, magnitudine & pilis leporem, pedibus d. podem, folliculo abdominali didelphidem.

Eigantea. 11. D. cauda longa crassa, pedibus posticis triplo fere longioribus, tridactylis. *Schreber Saeugthiere*, III. p. 552. t. CLIV.

Kanguruh. *Hawkesworth voy.* 3. p. 174. t. 51.

Habitat in nova Hollandia; salit, sedit, comedit instar dipodis, a quo tamen dentibus mire differt; hi enim sunt didelphidis. Adultum animal ovem magnitudine æquat; color ex flavescente cinereus; caput magis obtusum, quam aliis didelphidis speciebus; auriculæ longæ; truncus anterius gracilis, posterius torosus; palmarum unguis atro nitidi; plantarum digitus mediis prominens.

macro-tarsus. 12. D. cauda gracili nuda apice subfloccosa, plantarum talis elongatis ruditis ungue pollicari plano. *Schreber Saeugth.* III. p. 554. t. CLV.

Tarsier. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 87. t. 9.

Woolly Jerboa. *Penn. quadr.* p. 298. n. 225.

Habitat...

Inter lemures, dipodes, & didelphides ambiguum animal mure doméstico paulo major dentibus recedit ab omnibus aliis mammaliis; habet enim primores acutos in utraque maxillabinos, laniarium utrinque unum, superiores breves, inferiores longos; molares utrinque 6. Pedibus calvis manuum ad instar utitur. Pili crassi, molles, longi, basi ex atro cinerea, apice ferrugineo; caput rotundum; rostrum breve & acutum; auriculæ longæ, tenues, calvæ; cauda prælonga; pedes posteriores anterioribus multo longiorcs.

18. TALPA. *Dentes primores inæquales superiores VI,*
inferiores VIII.
laniarii I. superiores mayores.
molares superiores VII.
inferiores VI.

europæa. 1. T. cauda brevi, pedibus pentadactylis. *Erzl. mamm. p. 114.*
Schreber Saeugthiere, III. p. 558. t. CLVI.

/ Talpa caudata, pedibus pentadactylis. *Syst. nat. XII.*
p. 73. Fn. suec. 23.

Talpa caudata nigricans, pedibus anticis & posticis pentadactylis. *Briss. quadr. 204.*

Talpa caudata. *It. scan. 332.*

Talpa. *Gesn. quadr. 931. Aldr. dig. 45. Raj. quadr. 236.*
Taupe. Buffon hist. nat. VIII. p. 81. t. 12. suppl. III. p. 193.

t. 32. Gautier observ. I. part. 3. p. 155. t. B.

Mole. *Penn. quadr. p. 311. n. 241.*

variegata. β. pelle maculis albis varia. *Briss. quadr. 205.*

Talpa maculata oostfrisia. *Seb. mus. I. p. 68. t. 41. f. 4.*
Spotted mole. Edw. glean. 2. p. 122. t. 268.

alba. γ. pelle alba. *Briss. quadr. 205. Seb. mus. I. p. 51. t. 32.*
f. I.

flava. δ. pelle flava. *Penn. quadr. p. 311. n. 241. β.*

cinerea. ε. pelle cinerea. *Hübsch Naturf. 3. p. 98.*

T. cinerea palmis angustioribus. *Richter Abhandl. über die phys. Beschaff. von Boehmien. Prag & Dresd. 1786. 4.*
p. 82.

Habitat in omniis Europæ, borealis quoque Asiæ & Africæ
Apricis humosis, evertens prata hortosque; viditans
lumbricis & larvis, nec plantis; expellitur ricino, optime aquatione, quamvis ex locis inundatis in arbores fugiat; hybernat; pellis delicatula, pilis mollibus, subtili-

Talpæ infra terram degunt, tubos cylindricos fodunt, vermis potissimum videntant. Caput crassum rostratum. Oculi minimi teidi; auriculæ nulla. Corpus crassum. Pedes breves. Palmæ latæ, magnæ, breviores, quam plantæ, & unguibus longioribus instrudæ.

*bus, dense appressis; coit vere pene omnium longissimo,
ut videtur monogama; femina parit pullos 4-5.*

Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. obf. 51. & d. 2. a. 1. obf. 130.

Sepultura. Gleditsch oper. miscell. 3. n. 5.

Paulinus C. F. Talpa. Francof. 1689.

de la Faille Naturgesch. des Maulwurfs. Francof. 1778.

longicaudata. 3. T. cauda mediocri, pedibus pentadactylis posticis squamo-
sis. Erxleb. mamm. p. 118.

Long-tailed mole. Penn. quadr. p. 314. n. 244. t. 28.
f. 2.

Habitat in America boreali, externa facie ad europæam
accedens, differt tamen cauda longiore bipollari, &
pilo spadiceo; plantis squamosis parum pilosis, un-
guibus longioribus; corpus 4-6 pollices longum.

rubra. 4. T. cauda brevi, palmis tridactylis, plantis tetradactylis.
Erxl. mamm. p. 119.

Talpa (americana rufa) caudata ex dilute cinereo rufa, pe-
dibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis. Briff.
quadr. p. 206.

Talpa rubra americana. Seb. mus. I. p. 51. t. 32. f. 2.

Red mole. Penn. quadr. p. 315. n. 246.

Habitat in America, europææ satis similis, paulo tamen
major, cauda initio crassior.

asiatica. 2. T. ecaudata, palmis tridactylis.

Talpa aurea. Schreber Sacugth. III. p. 562. t. CLVII.

Talpa (sibirica aurea) ecaudata ex viridi aurea, pedibus
anticis tridactylis, posticis tetradactylis. Briffon quadr.
p. 206.

Talpa sibericus versicolor, Aspalax dictus. Seb. mus. I.
p. 51. t. 32. f. 4. 5.

Siberian mole. Penn. quadr. p. 313. n. 242.

Habitat in capite bonæ spei. Pallas.

Rostrum brevius, quam europææ; nares calvæ. Pili fus-
ci; ut tamen aureo nitore in virorem & rubedinem
vergant.

19. SOREX: *Dentes primores superiores II longi bifidi.*

*inferiores II - IV ; interme-
diis brevioribus.*

*laniarii utrinque plures:
molares cuspidati:*

cristatus. 1. *S. maribus carunculatis, cauda brevi.*

Radiated mole. *Penn. quadr. p. 313. n. 243. t. 28. f. 1.*
*Habitat in America boreali; facie externa & rostrum longi-
tudine ad talpam accedens, radicibus viditatem.*

*Pili breves, teneri, dense appressi, atri, palmis niveis,
plautis squamosis. Dentes primores inferiores 4, laniarii
utrinque 4. Nares singulæ caruncula stellato-palmata
radiis 10 s. 15 subulatis nudis, ut in erinaceo; cauda
subnuda concolor vix ultra 1 $\frac{1}{4}$ pollicem longa; corpus
ipsum fere 4 pollicum.*

minutus. 2: *S. rostro longissimo, cauda nulla. Schreber Saeugth. III:
p. 178. t. CLXI. B.*

*Sorex (pygmaeus) rostro longissimo, pedibus pentadactylis,
cauda nulla. Laxmann sibir. Brief. p. 72.*

Minute shrew. Penn. quadr. p. 108. n. 237.

*Habitat in Siberia, in dumetis humidiisculis sub arborum
radicibus, nido e lichenibus confecto; colligit semina;
cito currat & fodit; mordet; sonus vespertilionis.*

*Post exilium omnium mammalium minimum, 3j ponderis,
pilis tenerrimis nitidum, griseum, subtus albicans. Ca-
put magnitudine fere corporis: rostro attenuato, subtus
exarato. Moustaches oculos attingentes. Oculi parvi, re-
tracti. Auriculæ dilatatae breves nude. Pedes 5 - 5.*

aquaticus. 3. *S. Plantis palmatis, palmis caudaque breviore albisi.*
Schreber Saeugthiere, III. p. 566. t. CLVIII.

Talpa virginianus niger. Seb. mus. I. p. 51. t. 32. f. 3.
Brown mole. Penn. quadr. p. 314. n. 245.

Habitat in America boreali. P. Kalm.

*Statura cristata, vel talpæ. Pili nitidi, obscure cinerei,
apice fuscæ. Corpus 5, cauda i pollicem longum. Den-
tes primores inferiores 4.*

- Moschatus*. 6. *S. pedibus palmatis, cauda compresso-lanceolata. Pallas*
it. I. p. 156. Lepechin it. I. p. 178. t. 13. Erxl. mamm.
p. 127. Schreber Saeugth. III. p. 567. t. CLIX.
Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceolata,
pedibus palmatis. Syst. nat. XII. I. p. 79. Fn. succ.
p. II. n. 28.
Castor (mus moschiferus) cauda verticaliter plana, digitis
omnibus membrana inter se connexis. Briss. quadr. p. 92.
Mus aquaticus. Clus. exot. p. 375. Jonst. quadr. p. 169.
t. 73.
Mus aquatilis. Aldrov. dig. p. 447. fig. p. 448.
Mus aquaticus exoticus. Raj. quadr. p. 217. I. G. Gmelin
nov. comm. Petrop. IV. p. 383. fig. V. tab. 13.
Desman. Buff. hist. nat. X. p. I. t. I. Güldenstedt berlin.
Naturfr. Besch. III. p. 107. t. 2.
Long nosed beaver. Penn. quadr. p. 260. n. 192.
Bisamraze. S. G. Gmelin it. I. p. 28. t. 3. 4. Güldenstedt
Besch. der berl. naturf. Fr. III. p. 107. t. 2.
Habitat in regionibus Wolgæ & Tanai interjacentibus
inter 50 & 57^{num} latitudinis gradum ad lacus, in
quorum ripis antra sibi fodit, quorum introitus sub ipsa
aqua; vicitat acoro.
Maximo criceto major; caput talpino simile; rostrum
valde mobile, cartilagineum. Myctaces albidae 12 ordi-
nun. Oculi minimi. Auriculae nullæ. Truncus planus,
præter cutem panniculo carnosò obducens. Pellis casto-
ris. Pedes calvi, supra squamosi, cum cauda nigrican-
tes. Dentes primores inferiores 4, laniarii utrinque 6,
molares superius 4, inferius 3. Ad initium caudæ
folliculi 7-8 tela cellulosa conjuncti, fluorescentes, ex
quibus materia fluida flavescens, penetrantissimo odore
Zibethum sinuulans prodit, cuius singula animalia
scrupulum circiter continent.

- fodiens. 7. *S. cauda mediocri subnuda, corpore nigricante subtus*
cinereo, digitis ciliatis. Erxl. mamm. p. 124. Schre-
ber Saeugth. III. p. 571. t. CLXI.
Musaraneus dorso nigro ventre albo. Merret. pin.
p. 167.

Sorices capite ad talpas, reliquo habitu ad mures accidunt; sordiunt & ut plurimum
infestis verminibusque videntur; sub terra, quædam species ad aquas habitant; cor-
pus crassum, pedes pentadactyli; caput prodiguum, conico rostro termi-
natum. Oculi minimi.

MAMMALIA FERÆ. Sorex.

Musaraigne d'eau. Buffon hist. nat. VIII. p. 64. t. II. f. I.
Watershrew. Penn. quadr. p. 308. n. 236.

Habitat in Anglia, Burgaudia, Germania, Borussia, Sibiria a l fontes & rivos, araneo rario; natat; femina 10 mammis instructa vere parit 9 pullos.

Corpus tres, cauda ultra duos pollices longa; rostri apex, quam in araneo, latior; pedes longiores; dentes primores inferiores 2, laniarii $\frac{3}{2}$, molares $\frac{4}{3}$.

marinus. 4. S. cauda mediocri, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis.

Habitat in Java.

Corpus magnitudine muris musculi. Rostrum elongatum subtus canaliculatum, cinereum vibrissis longis. Auriculae rotundatae nudiusculae. Dentes primores 2 acuti, paralleli. Pedes pentadactyli, unguiculati. Cauda corpore paulo brevior, minus pilosa.

Araneus. 5. S. cauda mediocri, corpore subtus albido. Fn. suec. 24. Schreber Saeugth. III. p. 573. t. CLX.

Musaraneus supra ex fusco rufus, infra albicans. Briss. quadr. p. 126.

Mus araneus. Gesn. quadr. p. 747. Aldrov. dig. p. 44¹. fig. p. 442. Jonson p. 168. t. 66. Raj. quadr. p. 239.

Musaraigne. Buffon hist. nat. VIII. p. 57. t. 10. f. 1. Foetid shrew. Penn. quadr. p. 307. n. 235.

Habitat in omni Europa & boreali Asia, in acervis lapidum, circa pagos in terra, simetis, stabulis, horreis, humidis habitaculis, ad aquas, granis etiam viditat; moschi odore infesta praesertim catis, qui occidunt quidem, sed non comedunt; cursus lentior, quasi muri musculo; vox subtilis sibilans; vere & aestate femina parit 5-6 pullos. Longitudo nunquam tres pollices, pondus vix 3 drachmas superat. Dentes, ut in fediente.

*surina-
mensis.* 8. S. cauda corpore dimidio breviore, corpore supra spadiceo, infra ex albo cinereo flavescente.

Habitat in Surinamo.

Auriculis ad cranum, magnitudine corporis, capite, rostro, dentibus, oculis, pedibus ad fodientem proprius accedit. Cauda brevissimis pilis dense appressis tecta, supra cinerea, infra albida; os album.

MAMMALIA FERÆ. *Sorex*

- 415

pubillus. 9. *S. auriculis rotundatis, cauda brevi subdivisata. Erxleb.*
mamm. p. 122. S. G. Gmelin it. 3. p. 499. t. 75. f. 1.
Habitat in borealis Persia desertis in antris, quæ ipse
fodit.

Dentibus ad araneum accedit, cetera propius ad surinanensem,
paulo tamen major, ut 3½ pollices longitudine
æquet. Color dorſi obscure griseus, ventris cinereus.

brasiliensis. 10. *S. fuscus, dotso striis tribus nigro. Erxleb. manim. p. 127.*
Musaraneus figura muris. Marcgr. brasili. p. 229.
Musaraigne de Brésil. Buffon hist. nat. XV. p. 160.
Brazilian shrew. Penn. quadr. p. 309. n. 239.
Habitat in Brasilia, minus timida, ut ipsum catum non
timeat. Longitudo corporis 5, caudæ 2 pollices æquat.

exilis. 11. *S. minimus, cauda crassissima tereti.*

Habitat in Siberia, ad fluvium Jenisei; omnium mammalium
minimus, ut drachmam dimidiā pondere non superet;
color magis in fuscum vergit, quam in araneo.

20. ERINACEUS. *Dentes primores superiores II:*
distantes.

inferiores II. approxi-
mati.

laniarii superiores utrin-
que V.

inferiores utrinque III.
molares utrinque supra &
infra IV.

Dorſum spinis tectum.

europaeus. i. *E. auriculis rotundatis, naribus cristatis. Fn. suec. p. 8.*
n. 22. Schreber Saegthiere, III. p. 580. t. CLXII.
Erinaceus auriculis erctis. Briss. quadr. p. 128.
Erinaceus parvus nostras. Seb. mus. I. p. 78. t. 49. f. 1. 2.
Echinus terrestris. Gesn. quadr. p. 368. Aldrov. dig. p. 459.
Jonst. quadr. p. 171. t. 68. Raj. quadr. p. 231.
Hérisson. Buffon hist. nat. VIII. p. 28. t. 6.
Common Hedge-hog. Penn. quadr. p. 316. n. 247. t. 28.
f. 3.
Igel. Knorr deliq. tom. II. tab. H. f. 3.

MAMMALIA FERÆ. *Erinaceus.*

Habitat in Europæ, frigidissima tamen excepta, (etiam ad Jaici superioris ripas, in deserto Kirgisico, & aliis regionibus apricis Sibiriae australioris) dumetis & sepibus, nidificans e musco, in fruticibus hybernans, nocturnus; viditans lusonibus, vermibus, coleopteris, cancris, conchis, fructibus, aviculis, cadaveribus; muscos fudit; natat facile; monogamus incedit; meticolosus iratusque in globum decussatis spinis se contrahit; compressis pedibus ejulat; ambrosiacus; Calmuccis loco felis domesticus. Femina, 5 mammis, 3 pectoralibus, 2 abdominalibus instructa, vere coit, & initio aestatis 3-5 pullos parit. Caro non esculenta.

Longitudo 10 circiter pollicum. Rostrum acutum; labium superius fissum. Auriculae latæ, breves, pilosæ; oculi parvi & nigri. Praeputium propendens. Pili capititis ex albido fulvi, albis mixti, colli, pedum, spinis interfiti fulvi, caudæ obscuriores, gulae ex albo cinerei, pectoris & ventris iidem, sed fulvis mixti: Spinæ utroque fine ex slavecente cinereæ, medio fuscae.

inautis. 2. *E. auriculis nullis.* Briff. quadr. 184.

Erinaceus americanus albus. Seb. mus. I. p. 78. t. 49. f. 3.
Habitat in America, modo non varictas prioris.

malac- 3. *E. auriculis pendulis.* Briff. quadr. 183.

censis. *Hystrix brachyura.* Syst. nat. X. I. p. 57.

Porcus aculeatus f. Histrion malaccensis. Seb. mus. I. p. 81. t. 51. f. 1.

Habitat in Asia; ex hoc pretiosus lapis f. piedra del porco. Facies cum Briffono suadent erinacei speciem; an vere distincta hujus hystricisne species?

auritus. 4. *E. auriculis ovalibus longis, naribus cristatis.* Pallas nov. comment. Petropol. XIV. p. 573. t. 21. f. 4. S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XIV. p. 519. t. 16. Schreber Saeugthiere, III. p. 582. t. CLXIII.

Habitat ad fluviorum Wolgæ & Uralis partem inferiorem, etiam orientem versus ultra lacum Baikal, europæo maribus & habitu satis similis, paulo tamen minor, oculis paulo majoribus, mystacum 4 ordinibus, pedibus paulo longioribus & gracilioribus, cauda brevire, conica, annulata, & fere calva, pilis tenerioribus. Femina ad 7 pullos, aliquando bis per annum parit.

- Setosus.* 5. *E. auriculis brevioribus, occipite satis testo, cauda brevissima spinosa.* Schreber *Saeugth.* III. p. 583. t. CLXIV.
Tendrac. Buffon. *hist. nat.* XII. p. 438. t. 57.
Petit Tendrac de Madagascar. Sonner. it. 2. p. 146. t. 93.
Habitat in Madagascar forsitan & in India, europæ & aurito minor, ut longitudo vix 6 pollices æqueta; rostrum tamen longius, mystaces longæ; pedes breves; spinæ albidæ, medio ex castaneo rubicundæ; pili albi.
An forsitan idem cum inauri?
- Cauda-* 6. *E. cauda nulla, rostro longissimo acuto.* Schreber *Saeugth.* III. p. 584. t. CLXV. CLXV*.
Tanrec, & le jeune Tanrec. Buffon *hist. nat.* XII. p. 438. t. 56. & *suppl.* III. p. 214. t. 37.
Habitat in Madagascar, priori longior, ut 8. pollices fere æqueta. Os oculique parvi; auriculæ rotundatae, longiores tamen, quam setoso; spinis medio nigris, cetera flavescens modo teguntur vertex, occiput, collum humerique, reliqua dorfi pars setis longis, ejusdemcoloris, ut tamen albæ & nigræ intercurrant. Pili flavescentes, pedum fulvi.

IV. GLIRES.

*Dentes primores bini supra & infra approximati, a molaribus remoti.
laniarii nulli.*

21. HYSTRIX. *Dentes primores II oblique scissi,
molares VIII.*

Digiti pedum IV-V.

Corpus spinis pilisque tectum.

cristata. 1. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, cauda abbreviata. S. G. Gmelin it. III. p. 107. t. 21. Schreber Saeugth. IV. p. 599. t. CLXVII.*

Hystrix capite cristata. Briss. quadr. 125.

Hystrix orientalis cristata. Seb. mus. I. p. 79. t. 50. f. I.

Hystrix. Gesn. quadr. p. 563. Aldrov. digit. p. 471. fig. p. 474. Jonst. quadr. p. 163. t. 68. Raj. quadr. p. 206.

Porc-épic. Buffon hist. nat. XII. p. 402. t. 51. 52.

Crested porcupine. Penn. quadr. p. 262. n. 193.

Stachelschwein. Ridinger. kl. Th. t. 90.

Stachelschwein mit dem Kopfbusch aus Africa. Knorr-delic. II. tab. K. II. f. 2.

Habitat in Afrix australioris, Africæ, Hispaniæ, Italiae antris, quæ ipsa fodit, amplis, & in multas cameras partitis, unico tamen introitu; noctu vietum querit in fructibus, radicibus, herbis, buxo præsertim delectata; hostibus infestata in globum se contrahit; femina vere 2-4 pullos parit, qui facile cicurantur.

Longitudo aliquando 2 pedes superat; caput elongatum, compressum; rostrum breve obtusum; labium superius ad narcs usque fissum; oculi parvi, nigri; auriculae ovales, latæ, breves; cauda conica; pedes breves, crassi. Pili spinis intersiti cinerei; spinæ ipsæ longæ, robustæ, læves, nigro & albido annulatae, quas animal prouti longissimas illas & robustas nuchaæ setas, musculi subcutanei vi erigere & reclinare valet. Cystis fellea non raro lapidem porcinum continet. Caro ejeulenta.

prehensilis- 2. *H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili semi-puda, Schreber Saeugth. IV. p. 603. t. CLXVIII.*

Hystrix (americanus) cauda longissima tenui, medietate extrema aculeorum experie. Briss. quadr. 129.

Hystrix americanus, Cuandu Brasiliensis, Lusitanis Ourico cachiceno. Marcgr. brasili. p. 233. Jonst. quadr. p. 60. Raj. quadr. p. 208.

Hystrix minor leucophæus. Barrer. Fr. équin. p. 153.

Cuandu. Pis. Ind. p. 99.

Coendou. Buffon hist. nat. XII. p. 418. t. 54.

Brasilian Porcupine. Penn. quadrup. p. 264. t. 24. f. 1.

β. *Hystrix americanus major.* Briss. quadr. p. 131.

Hystrix longius caudatus, brevioribus aculeis. Barrer. Fr. équin. p. 153.

Cuandu major. Pis. Ind. p. 324. f. p. 325.

γ. *Hystrix (novæ Hispaniæ) aculeis apparentibus, cauda brevi & crassa.* Briss. quadr. 127.

Hoitztlacuatzin, seu Tlacuatzin spinosus, hystrix novæ Hispaniæ. Hernand. mexic. p. 322.

Hoitztlacuatzin. Nieremb. hist. nat. p. 154.

Habitat in Brasiliæ, Guianæ & novæ Hispaniæ silvis; arbores scandit, earumque fructibus, nec non aviculis vicitat; grunniit instar suis; contrahitur in globum; interdiu dormit; cicurari potest; caro edulis.

Longitudo corporis tribus sere pollicibus pedem superat; caudæ 7 pollices æquat.

dorsata. 3. *H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, dorso solo spinoso.* Schreber Sæugth. IV. p. 605. t. CLXIX.

Hystrix (Hudsonis) aculeis sub pilis occultis, cauda brevi & crassa. Briss. quadr. p. 128.

Hystrix pilosus americanus. Catesb. Carol. app. p. 30.

Cavia Hudsonis. Klein quadr. p. 51.

Porcupine from Hudson's bay. Edw. av. I. p. 52. t. 52.

Ursus. Buff. hist. nat. XII. p. 426. t. 55.

Habitat in Canada, nova Anglia, sinu Hudsonis, nova terra; fodiendo infra radices arborum degit, eas adscendit, earumque fructibus & cortice, præserium juniperi vicitat; aquam lambit canis instar, ejusque loco hieme comedit nivem.

Corpus ferrugineum. Cauda apice subtus alba. Aculei inter pilos occultiati.

macroura. 4. *H. pedibus pentadactylis, cauda longissima, aculeis clavatis.* Schreber Sæugth. IV. p. 607. t. CLXX.

Hystrix (orieutalis) cauda longissima aculeis undique obfita, in extremo paniculata. Briss. quadr. 131.

MAMMALIA GLIRES. CAVIA.

Porcus aculeatus silvestris seu hystrix orientalis singularis.
Seb. mus. I. p. 84. t. 52. f. I.

Hystrix. Bon. jav. 54.

Habitat in insulis oceanii indici in silvis.

*Auriculæ breves, calvæ; cauda longitudine corporis apice fasciculo pilorum longorum nodosorum argenteorum coronata. Corpus breve torosum. An forsan hujus varietas *Hystrix torosa*, descripta a Cl. Merrem, apud Leske Magaz. zur Naturk. und Oekonomie 1786. fasc. II. p. 197. 198.*

CAVIA. *Dentes primores II cuneati.
molares VIII.*

*Digiti plantarum III - V.
palmarum IV - V.*

Cauda abbreviata aut nulla.

Claviculæ nullæ.

- Paca. I. *C. caudata*, pedibus pentadactylis, lateribus flavescente-lineatis. *Erxl. mamm. p. 356. n. 7. Schreber Saeugth. IV. p. 609. t. CLXXI.*
Mus (Paca) cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, lateribus flavescente-lineatis. Syst. nat. XII. I. p. 81. n. 6.
Cuniculus (Paca) caudatus auritus, pilis obscure fulvis rigidis, lineis ex albo flavescentibus ad latera distinctis. Briss. quadr. p. 144. n. 4. Gronov. zooph. I. p. 4. n. 15.
Cuniculus minor palustris, fasciis albis notatus, Pak. Barr. Fr. équin. p. 152.
Mus brasiliensis magnus porcelli pilis & voce Paca dictus. Raj. quadr. p. 226.
Paca. Marcgr. bras. p. 224. Pis. ind. p. 201. Jonst. quadr. t. 63. Buffon hist. nat. X. p. 269. t. 43. suppl. III. p. 203. t. 35.
Iaubba. Bancroft Guian. p. 76.
Spotted Cavy. Penn. quadr. p. 244. n. 178.
Habitat in Guiana, Brasilia, & omni forsan calidiore America ad fluvios, ad quos antra fodit mundissima, tribus singula, per quos evadere possit, cuniculis instructa; pinguescit & junior cicurari potest; femina non nisi unum pullum parit. Caro sapida.
Longitudo circiter bipedalis; corpus supra fuscum, seriebus quinque macularum a. b. r. um fere coadunatari. mad lateri

*insignitum; collum, pedes & abdomen sordide alba; ocu-
li magni fuscæ; auriculæ ovatæ, teclæ, minus acutæ;
verruca superciliorum, temporum, gula; collum breve,
cauda non nisi 2-3 lineas longa; pedes posteriores, inter
quos mammæ 2 jacent, anterioribus longiores.*

Acuschy. 2. *C. caudata*, corpore olivaceo. *Erxl. mamm.* p. 354. *Schreb.
Sacugth. IV.* p. 612. t. CLXXI. B.

Cuniculus minor caudatus olivaceus, Akouchy. *Barr. Fr.
équin.* p. 153.

Acouchy. *Buffon hist. nat.* XV. p. 58. *Suppl. III.* p. 211.
t. 36.

Olive Cavy. *Penn. quadr.* p. 246. n. 180.

*Habitat in Guianæ silvis, Aguti similis, cuniculo semiestri
æqualis; & tum colore, tum cauda longiore ab Aguti
distinguita. Facile cicuratur; femina 1-2 pullos parit.
Caro edulis.*

Aguti. 3. *C. caudata*, corpore ex rufo fusco, abdomine flavescente.
Erxleb. mamm. p. 353. *Schreber Sacugth. IV.* p. 613.
t. CLXXII.

*Mus (Aguti) cauda abbreviata, palmis tetradactylis,
plantis tridactylis, abdomine flavescente.* *Syst. nat. XII.
I.* p. 80. n. 2.

*Cuniculus (Aguti) caudatus auritus, pilis ex rufo & fusco
mixtis rigidis vestitus.* *Briss. quadr.* p. 143. *Gronov.
zooph.* I. p. 4. n. 14.

Mus major fusco-cinerascens, cauda truncata. *Brown.
jam.* p. 484.

*Mus silvestris americanus, cuniculi magnitudine, parcelli
pilis & voce.* *Raj. quadr.* p. 226.

Cuniculus omnium vulgarissimus, Aguti vulgo. *Barr. Fr.
équin.* p. 153.

Aguti vel Acuti Brasiliensibus. *Marcgr. brasili.* p. 224. *Pis.
brasili.* p. 102. *Jonst. quadr.* t. 63.

Agouti. *Buffon hist. natur.* VIII. p. 375. t. 50. *Linn. Ad.
Holm.* 1768. p. 27.

Long nosed cavy. *Penn. quadr.* p. 245. n. 179.

leporina. B. C. caudata, corpore supra rufo subtus albo. *Erxl. mamm.*
p. 355.

*Cavies, inter mures & cuniculos quasi mediae saliendo lente currunt, non scandunt
in arboribus cavis, aut sub terra degunt, vegetaliibus visitant.*

MAMMALIA GLIRES. Cavia.

- Mus (leporinus) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis abdomine albo. *Syst. nat.* XII. 1. p. 80.
n. 3.
Cuniculus (javensis) caudatus auritus rufescens, fusco admixto. *Briss. quadr.* p. 142.
Java hare. *Catesb. carol. app.* t. 18.
Java cavy. *Penn. quadr.* p. 246. n. 181.

america- γ. Cavia.

- na. Cuniculus (americanus) caudatus auritus pilis rufis rigidis vestitus. *Briss. quadr.* p. 144.
Cuniculus americanus. *Scb. mus.* I. p. 67. t. 41. f. 2.
Habitat in Brasilia, Guiana, insulisque Antillis in arboribus cavis, aut antris, quæ ipsa fodit; interdiu viatum quaerit ex vegetabilibus, quæ colligit et asservat, pedibusque posterioribus insidens anterioribus ori admoveat; salit potius, quam currit; celeriter crescit; facile cicatur; coit per totum annum; femina 3-5 Pullos parit.
Caro eadem, quæ leporis cuniculi.
Longitudo circiter sesquipedalis. Cauda conica calva, brevissima. Pedes subpalmati.

Aperea. 4. C. ecaudata, corpore ex cinereo rufo. *Erxleb. mamm.*
p. 348.

Cuniculus (brasiliensis) ecaudatus auritus ex cinereo rufus,
Briss. quadr. p. 149. n. 8.

Cuniculus brasiliensis, Aperea dictus Marcgr. *Raj. quadr.*
p. 206.

Cuniculus indicus femina. *Aldrov. dig.* p. 393.

Aperea Brasiliensis. *Marcgr. bras.* p. 223. *Jonst. quadr.*
t. 63. *Piso brasili.* p. 103. *Buffon hist. nat.* XV. p. 160.

Rock cavy. *Penn. quadr.* p. 244. n. 177.

Habitat in Brasiliæ rupestrium antris. Caro sapida.

Color dorfi, qualis in lepore timido; auriculæ breves. Palæ tetradactylæ. Plantæ tridactylæ.

Cobaya. 5. C. ecaudata ex albo & rufo vel nigro variegata. *Schreber*
Saeugth. IV. p. 617. t. CLXXIII.

Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. *Syst. nat.* XII. p. 79. n. 1. *Mus. Ad. Fr.* p. 9.
Aman. acad. 4. p. 190. t. 2. it. *Weigeloth.* 224.

Cuniculus (indicus) ecaudatus auritus albus aut rufus aut ex utroque variegatus. *Briss. quadr.* p. 147. n. 7. *Gronov.*
zooph. I. p. 4. n. 16.

Cuniculus indicus. *Nieremb. hist. nat.* p. 160. *Aldr. dig.*
p. 390. 391. *Jonst. quadr.* p. 162. t. 63. 65.

Mus seu cuniculus americanus & guineensis, porce'li pilis
& voce, cavia cobaya brasiliensibus dictus Marcgr.
Raj. quadr. p. 223.

Mus major albo fulvoque varia, cauda nulla. Brown.
jam. p. 484.

Cavia cobaya. Marcgr. bras. 224. Pis. brasil. 102, Pal-
las spic. zool. 2. p. 17.

Guinea-pig. Edw. av. t. 294. f. 2.

Cochon d'Inde. Buffon hist. nat. VIII. p. 1. t. 1.

Restless cavy. Penn. quadr. p. 243. n. 176.

Habitat in Brasilia, hospitatur in Europa. Pipiens, loquax,
inquieta, sequax, calcitrans, attenta, comans, magli-
cans edit vegetabilia variata, potat lympham puram,
calorem amat; femina mammis duabus, parit pullos
perfectissimos, mox coit; mas bombylans juniores mas-
culos mordet paraplegicos.

Longitudo pedalium. Color varius. Pili duri, colli paulo
longiores. Corpus torosum; collum brevissimum. Au-
riculæ breves, latæ, extrinsecus calvæ. Oculi magni,
fuscæ, prominuli.

Capybara. 6. C. ecaudata, plantis tridactylis palmatis. Schreber Saeugth.
IV. p. 620. t. CLXXIV.

Sus (Hydrochaeris) plantis tridactylis, cauda nulla. Syst.
nat. XII. p. 103.

Sus maximus palustris, Cabiai, Cabionara. Barr. Fr.
équin. p. 160.

Hydrochoerus. Briss. quadr. p. 117.

Cavia Capybara. Pallas spic. zool. 2. p. 18.

Capybara brasiliensibus. Marcgr. bras. p. 230. Pis. bras.
p. 99. Jonst. quadr. t. 60. Raj. quadr. p. 126.

Capivard. Froger voy. p. 123.

Cabiai. Buffon hist. nat. XII. p. 384. t. 49.

Thicknosed tapir. Penn. quadr. p. 83. n. 61.

Habitat in Americæ australis parte occidentali, in regio-
nibus silvosis paludosis ad magnos fluvios; saccharo
aliisque vegetabilibus, piscibus quoque vescitur, quos
noctu capit; natat, pinguiscit, mitis, monogama;
femina non nisi unicum parit pullum.

Longitudo $2\frac{1}{2}$ pedibus major; caput oblongum; rostrum an-
gustum; nares nigricantes, subrotundæ; labium superius
fiatum; mystaces nigræ; oculi magni, nigri; auriculæ
breves, redæ, calvæ, nigrae; collum breve, crassum;

pedes breves; plantæ tetradactylæ; pili setosi, dorſi longissimi, plurimi utroque fine nigri, medio flavescentes.

23. CASTOR. *Dentes primores superiores truncati, angulo transverso excavati.*

inferiores apice transversi. molares utrinqne IV.

Cauda longa depreſſa squamosa. Claviculæ perfectæ.

Fiber. 1. C. cauda ovata plana calva. *Fn. suec. n. 27. Mus. Ad. Fr. I. p. 9. Schreber Saeugth. IV. p. 623. t. CLXXV.*
Castor castanei coloris, cauda horizontaliter plana. Briff. quadr. p. 133.

Castor. Gens. quadr. p. 309. aquat. p. 185. Rondel. aquat. p. 236. Aldrov. digit. p. 276. Jonſt. quadr. p. 147. t. 68. Raj. quadr. p. 209. Buff. hiſt. nat. VIII. p. 282. t. 36. Penn. quadr. p. 255. n. 190.

Fiber. *Bellon. aq. 30.*

Beaver. *Catesb. carol. app. p. 29.*

Biber. *Ridinger kl. Th. t. 84.*

5. *Castor albus, cauda horizontaliter plana. Briffon. quadr. 135.*

Habitat hodienum in Europæ, Asiac, Americae borealis, ad ripas fluviorum lacuumque solitarias silvas, vicitans corticibus forbi, salicis, potissimum populi, ligno magnoliæ glaucæ, radice acori & al. vix piscibus. Lente graditur, at dexterime natat, interdius quietus, profunde dormit, mundissimus; junior facile cicuratur, mitis; monogamus coit hieme erectus; femina 4 manubiis instructa per 4 menses gravida 2 parit pullos, rarius 3-4.

Architectura in construenda ad ripas domo superat, excepta humana, omnium animalium. Act. Stockh. 1756. p. 207.

Corpus 2½-3 pedes longum, cauda dimidio brevior, quarta sui parte corpori proxima pilosa; pedes pentadactyli, plantæ palmatae; oculi parvi, auriculæ breves crinatae; collum crassum & breve; corpus torosum, dorso convexo; pili molliores breviores ferruginei, longiores duriores, que castanei, quo magis borealem terram inhabitat, eo obscuriores, ut aliquando nigri; alias albi, aut albimac-

culis cinereis, aut albi interstis rubris, rarissime slaveſcentes. Glandulæ ſalivales inſignes, & ad dextram cardīcē alia adhuc glandula, quæ per 18 patula orificia humorem ſaum largiter in ventriculum effundit. Prope genitalia extera & anum inter binas magnasque glandulas ſeſbaceas medii hærent duo folliculi cellulosi graveolens castoreum, ſinguli circiter 3ij continentem; ruficūm & boruſſicum canadensis melius.

Marius J. Caſtorologia. Wien. 1685.

Anatome. Wepfer. Eph. N. C. d. I. a. 2. obf. 251. Sarasin acd. Parif. 1704. p. 48. Acd. Petrop. T. II. p. 415.

huido-
brius.

2. C. cauda compressa lanceolata pilosa, palmis lobatis, plantis palmatis. *Molina hiſt. nat. Chil. p. 253.*

Habitat in Chilensium fluviorum lacuumque profundissimis.

Aninofum animal pifcibus cancerisque vicitat, diu ſub aqua manet; neque architectura fibri, neque castoreum; femina 2-3 pullos parit.

Corpus circiter tripedale; caput fere quadratum; rostrum ebtusum; oculi parvi; auriculæ breves rotundæ; pili ſimiliter duplicitis generis; qui teneriores, mollitie ſuperant pilos cuniculi, ut pelliariis magni aſtimetur pellis in dorſo cinerea, in ventre albida.

24. MUS. Dentes primores ſuperiores cuneati. molares utrinque III, rarius II. Claviculæ perfectæ.

* cauda apice compressa.

- Coypus. 1. M. cauda mediocri ſubcompressa pilosa, plantis palmatis. *Molina hiſt. nat. Chil. p. 255.*

Habitat in aquis Chilensibus, luteæ facie & colore, dentium numero muri accedens, ut tamen non niſi 2 molares ad utrumque primorum latus habeat. Cauda crassa; pedes pentadactyli; auriculæ rotundæ. Femina 5-6 pullos parit.

- Zibethi-
cus. 2. M. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fiffis. *Schreber Sacugth. IV. p. 638. t. CLXXVI.*

Castor zibeticus. Syst. nat. XII. I. p. 79.

Castor (mus moschiferus canadensis) cauda verticaliter plana, digitis omnibus a ſe invicem separatis. Briff. quadr. 136.

- Rat musqué. *Sarrasin ad. Paris. 1725. p. 323. t. II. f. 1.*
 Desmans rottor. *Kalm it. 3. p. 19.*
 Ondatra. *Buffon hist. nat. X. p. I. t. I.*
 Musk beaver. *Penn. quadr. p. 259. n. 191.*

*Habitat in America boreali ad aquas lentiores, ad quarum
 ripas domus exstruit, simpliciores tamen, quam capi
 fiber; videlicet etiam conchis, aestate præsertim herbis
 fructibus, hieme radicibus, potissimum acori & nymphæ;
 monogamus coit aestate; femina 6 mammis gaudens ab
 dominalibus 3-6 pullos parit, ut nonnulli volunt, ter
 quater per annum; dexterime natat & mergitur;
 terra tamen incedens vacillat.*

*Cauda apice anicipiti ad castorem, eadem longiore ipsa quo
 magnitudine ad murem decumtanum, facie & auricula
 crinitis satis brevibus ad amphibiuni propius accedit; lon
 gitudo circiter pedalis, pondus trium librarum; cauda
 corpore paulo brevior, fusca; digitii plantarum ordinibus
 pilorum longorum alborum densis ciliati, unguibus rubi
 cundis. Pili molles ex atro fusi. Glandulae sebaceæ
 anum humore oleoso moschum aestate potissimum gravit
 olente plenæ.*

* * myosuri, cauda tereti calva.

- Pilorides.** 3. M. cauda longiuscula squamata truncato-obtusa, corpori
 albido. *Pallas glir. p. 91. n. 38.*
 Mus (albus zeylonicus) albus, cauda longissima. *Bri
 quadr. (ed. bat.) p. 122. n. 8.*
β. Castor cauda linearis tereti. *Brown. jam. p. 484.*
 Rat musqué. *Rocheb. antill. p. 140.*
 Piloris. *Buffon hist. nat. X. p. 2.*
 Musk Cavy. *Penn. quadr. p. 247. n. 183.*
*Habitat in India, β) in insulis Antillis in antris, ipse fodit, etiam in domibus, moschato odore infusibus
 Magnitudine ad cobayam accedit; auriculae magna
 calvae; cauda 4 pollicum; palmæ tetradaclyla;
 pollicis locum nodus suppleat; plantæ pentadactylæ.*

- Caraco.** 4. M. cauda longa squamosa obtusiuscula, corpore griseo,
 plantis subsemipalmatis. *Pall. glir. p. 91. n. 39. p. 321.
 t. 23. Schreber Saeugth. IV. p. 643. t. CLXXVII.*
*Habitat in Sibiria quam maxime orientali ad aquas,
 cuius ripas cuniculos fodit; egregie natat; domi
 etiam frequentat.*

Corpus 6, cauda $4\frac{1}{2}$ pollices longitudine superat; pondus 6-7 uncias æquat. Caput unguustum, elongatum; oculi auriculis propiores, quam naribus; palmæ tetradactylæ, ut verruca pollicis vices suppleat; plantæ pentadactylæ, digitis plica cutis connexis.

Color dorſi, ut in decumano, fuscus cinereo mixtus, ventris ex albido in cinereum vergens, pedum sordide albus.

decuma-
nus.

6. M. cauda longissima squamata, corpore fetoso griseo-
subtus albido. Pallas glir. p. 91. n. 40. Schreber
Sæugth. IV. p. 645. t. CLXXVIII.

Mus (norwegicus) cauda elongata, palmis tetradactylis
cum unguiculo pollicari, corpore rufo. Erxl. mamm.
p. 381. n. 1.

Mus (silvestris) cauda longissima, supra dilute fulvus,
infra albicans. Briss. quadr. p. 170. n. 3.

Mus aquaticus. Gesn. aquat. p. 732.

Surmulot. Buff. hist. nat. VIII. p. 206. t. 27.

Norway rat. Penn. brit. zool. p. 47.

Brown rat. Penn. quadr. p. 300. n. 227.

*Habitat in India & Persia, unde hoc decumum seculo in Euro-
pam devenit, ad aquarum ripas antra sibi fodiens, urbes
etiam, aquæductus, cloacas, stabula, horrea, hortos,
campos, domus frequentans, cato detestatus, lepori cuni-
culo cedens, a mugelis domatur; præter vegetabilia car-
ne quoque, gallinis, ipsisque congeneribus viicitat; auda-
cissimus; per hiemem non dormit; aquam non metuit,
& dexterrine natat; migrat gregatini; femina ter
per annum 12-15, imo 18 & 19 pullos purit. An
forsitan mus caspius Ælianii?*

*Pondus animalis ab 3vij ad libram unam; corpus adulti
longitudine vix superat 9, cauda $7\frac{1}{2}$ pollices; haec ex 200
fere annulis conflata; digiti disjunctissimi; mystaces
capite producio longiores; oculi magni nigri prominuli.*

Rattus.

12. M. cauda longissima squamosa, corpore atro subtus
canescente. Pallas glir. p. 93. n. 41. Schreber Sæugth.
IV. p. 647. t. CLXXIX.

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetra-
dactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis.
Syst. nat. XII. p. 83. Fn. suec. 2. p. 12. n. 33. Müll.
prod. p. 5. n. 31.

Mus (Rattus) cauda longissima, obscure cinereus. Briss.
quadr. p. 168. n. 1. Gronov. zooph. p. 4. n. 13.

Mus domesticus major, quem vulgo rattum vocant.
Gesn. quadr. p. 731.

Mus domesticus major sive rattus. Raj. quadr. p. 217.
Rattus. Aldrov. dig. p. 415.

Glis. Jonst. quadr. t. 66.

Sorex. Husnagel archetyp. p. 3. t. III.

Rat. Buffon hist. nat. VII. p. 278. t. 36.

Common rat. Penn. Brit. zool. I. p. 97.

Black rat. Penn. quadr. p. 299. n. 226.

Habitat in Persia & India, nunc etiam, boreali parte excepta, in Europa, ex qua per naves in Africam & Americam delata esse fertur; in Tahiti tamen frequens, rarius in reliquis maris australis insulis. Cautus & animosus, parum bibit, sed voracissimus omnia, quae occurunt, comedit, donibus pessimum animal, cibis & utensilibus infestum omnibus; ne suæ quidem ipsius speciei parcens; prædatur a bubone aliisque strigibus, a mustelis, non semper a catis. Femina 10 mammis instructa aliquoties per annum 5-6 pullos parit.

Pondus ratti aliquando ad 3vj accedit, rarissime modo 6-7 drachmas æquat. Longitudo corporis vix 8 pollices æquat; cauda æqualis 250 circiter annulis conspicua, tenuis. Color ut plurimum supra nigricans, infra cinercus; rarius supra in fuscum aut cinereum vergens, aut cinereus maculis albis, aut totius animalis albus, oculis rubris.

Muscus- lus. 13. M. cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. Fn. suec. 34.

Mus cauda longissima squamosa, corpore fusco subtus cinerascente. Pallas glir. p. 95. n. 43. Schreber Saeugth. IV. p. 654. t. CLXXXI.

Mus cauda longa nudiuscula, corpore cinereo fusco, abdomine subalbescente. Fn. suec. I. p. II. n. 31. Mus. Ad. Frid. I. p. 9.

Mus (Sorex) cauda longissima, obscure cinereus, ventre subalbescente. Briss. quadr. p. 169. n. 2. Gronov. zooph. I. p. 4. n. 19.

Mus domesticus minor, cauda longa subnuda, corpore fu- co-cinerascente, abdomine albidente. Brown. jam. p. 484.

Mus domesticus vulgaris s. minor. Raj. quadr. p. 219. Sloan. jam. 2. p. 330.

Mus domesticus minor. Aldr. dig. p. 417.

Mus domesticus. Jonst. quadr. p. 165. t. 66.

Mus,

MAMMALIA GLIRES. Mus.

129

Mus. Hufnagel archetyp. p. I. tab. 3. IO. p. 2. t. 8.
p. 4. t. 2.
Souris. Buffon hist. nat. VII. p. 309. t. 39. suppl. III.
p. 181. t. 30.

Common mouse. Penn. quadr. p. 302. n. 229.

Habitat in domibus Europæ & Asiae mediae, nunc etiam Americæ; pollyphagus consumit cibaria, cerealia, carnes, cadaveræ, quæ colligit; parum bibit; salax omni anni tempore coit, & fertilissimus, ut femina semper 5-6 pullos pariat; mitis, timidus, cursu celerrimus, vix incarcerandus; prædatur a ratto, cato, mustela, erinaceo, strige; in horreis pellitur ebulo & solano nigro. Longitudine 3*1*/₂ pollices non superante, & ungue pollicari palmarum nullo a ratto differt.

Varietas nigra, flavescens, albo-maculata, alba maculis cinereis, & nitidissima tota alba oculis rubris rorior.

Elvaticus. 17. M. cauda longa squamosa; corpore griseo lutescente subtus lateribusque abrupte albo. Pallas glir. p. 94. n. 42. Schreber Saegath. IV: p. 651. t. CLXXX.

Mus cauda mediocri, palmis tetradastylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido. Synt. nat. XII. I. p. 84. Fn. succ. 2. p. 12. n. 36.

Mus cauda longa, supra e fusco flavescens, infra ex albo cinerascens. Briss. quadr. p. 174. n. 9.

Mus (campestris major) cauda longissima, fuscus ad latera rufus. Briss. quadr. p. 171. n. 4.

Mus agrestis minor. Gejn. quadr. p. 733.

Mus domesticus medius. Raj. quadr. p. 218.

Mulot. Buff. hist. nat. VII. p. 325. t. 41.

Field-rat. Penn. quadr. p. 302. n. 230.

R. Harvest-rat. Penn. quadr. p. 302. n. 231.

Habitat in omnibus Europæ silvis, canidis, hortis, dumetis, hieme quoque in horreis & domibus; videtur cerealibus, arborumque seminibus, quæ colligit, aviculis quoque, congeneribus, & defectu aliorum propria specie; afferes durissimos saepe uno die perforat; prædatur ab accipitribus, vulpe, putorio, marte.

Mures in anbris latebrisque habitant, celerrime currunt & scandunt; nonnullæ species etiam natant; noctu præsertim viatum querunt, potissimum vegetabilem, quem palmis ori adnovent. Feminæ 8 circiter mammis gaudent, & plures simul eosque septem per annum pullos pariunt. Nonnullæ species migrant. Auriculæ breves rotundatae. Palmarum digiti plerisque modo 4, ut pollicis locum verruca suppleat.

MAMMALIA GLIRES. Mus.

*Magnitudine musculum æqueat; cauda longitudine corporis⁹
supra nigricans, infra alba; pedes splendide albi. Hu-
jus etiam datur varietas totu alba oculis rubris.*

agarius. 7. *M. cauda longa squamosa, corpore lutescente, striga dor-
sali nigra. Pallas it. I. p. 454. glir. p. 95. n. 44. & p. 341.
t. 24. A. Schreber Saeugt. IV. p. 658. t. CLXXXII.*

Mus rubeus. Schwenckf. ther. Siles. p. 114.

*Muris alia species. S. G. Gmelin it. I. p. 151. t. 29. f. 2.
Habitat in Russia a Tanai ad Jenisei fluvium, in Silesia,
rarius in Germania, gregarius & migratorius.*

*Longitudo vix 3 pollices, pondus vix 30 assequitur. Abdo-
men cum pedibus album, palmarum pollex ungue exiguo.*

minutus. 8. *M. cauda longa squamosa corpore supra ferrugineo subtus
albido. Pallas it. I. p. 454. n. 4. glir. p. 96. n. 45. & p.
345. t. 24. B. Schreb. Saeugth. IV. p. 660. t. CLXXXIII.*

*Habitat in imperio Ruffico, in Sibiria pulchrior, ut supra
eleganter slaveat, infra niveus sit.*

*Musculo dimidio minor; cauda fere bipollicaris. Femina
mare minor minusque pulchra.*

sorcinus. 10. *M. cauda mediocri subpilosa, rostro producto, auriculis
orbiculatis vestitis, velleris dorso flavicante griseo, abdo-
mine albido. Schreb. Saeugth. IV. p. 661. t. CLXXXIII. B.
Habitat Argentorati. Hermann.*

*Longitudo vix ultra 2 pollices, & 5 lineas; mystacum ordi-
nes 7. Ungues brevissimi; cauda unicolor slavescens, ci-
nereo internisto, subtus magis pilosa. Abdomen album.*

vagus. 14. *M. cauda longissima nudiuscula, corpore cinereo, fascia
dorsali nigra, auribus plicatis. Pallas glir. p. 90. n. 36.
p. 327. t. 22. f. 2. Schreber Saeugthiere, IV. p. 663.
t. CLXXXIV. f. 2.*

Mus subtilis. Pallas it. 2. p. 705. n. II. a.

*Habitat in desertis interstuvios Ural, Irtysch & Ob positis
satis frequens, in fissuris rupium, infra lapides, truncos
arborum; videlicet præsertim seminibus, minoribus etiam
animalibus; per hiemen dormit; gregatim migrat.*

*Pondus 3ij non inferius; longitudo paulo major, quam
soricino; pedes tenerrimi albidi; cauda corpore paulo
longior, supra cinerea, infra albicans prehensilis. Dentes
primores flavi; molares in superiore maxilla 2. Feminis
manimæ 8. Ungues longi.*

betulinus. 15. *M. cauda longissima nudiuscula, corpore fulvo fascia dorsali nigra, auriculis plicatis.* *Pallas glir.* p. 90. n. 35. p. 332. t. 22. f. 1. *Schreber Saeugth.* IV. p. 664. t. CLXXXIV. f. 1.

Mus subtilis. *Pallas it.* 2. p. 705. n. II. β.

Habitat solitarius in betuletis deserti Ischimenilis & Barabenisi, etiam inter fluvios Ob & Jenisei; vago satis similis moribus & facie, paulo tamen minor. Cauda supra fusca, infra albida.

pumilio. 18. *M. cauda mediocri nudiuscula, corpore ex fusco cinereo, fronte nuda & lineis quatuor dorsalibus nigris.* *Sparrmann. act. Stockh. nov. ai.* 1784. p. 239. tab. VI.

Habitat in silvis Sitzicamæ pone Caput bonæ spei; pondus 9iv.

striatus. 19. *M. cauda longiuscula subnuda, corporis striis plurimis parallelis albo-guttatis.* *Pallas glir.* p. 90. n. 37.

Mus cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore striis punctatis. *Syst. nat.* XII. 1. p. 84.

Mus cauda longa, striis corporis longitudinalibus ex punctis albis. *Mus. Ad. Frid.* 1. p. 10.

Mus (orientalis) cauda longa, rufus, lineis in dorso albicantibus margaritarum æmulis. *Briss. quadr.* p. 175. n. 10.

Mus orientalis. *Seb. mus.* 22. t. 21. f. 2.

Oriental rat. *Penn. quadr.* p. 304. n. 232.

Habitat in India, musculo dimidio minor, fuscescens, 12 seriebus punctorum alborum insignitus, infra albicans, auriculis brevitus calvis, cauda fere calva longitudine corporis. An vera propria species?

barbarus. 20. *M. cauda mediocri, corpore fusco striis decem pallidis, palmis tridactylis, plantis pentadactylis.* *Syst. nat.* XII. Tom. I. P. 2. add.

Habitat in Africa boreali, musculo minor; supra fuscus lineis decem longitudinalibus albidis, infra albicans; cauda calva annulata, longitudine corporis. An forsan ad caviam releganda?

* * * *cunicularii caudz terete, pilosa.*

axatilis. 21. *M. cauda longiuscula, auribus vellere majoribus, palmis subtetradactylis.* *Pallas glir.* p. 80. n. 19. p. 255. t. 23. II. *Schreber Saeugth.* IV. p. 667. t. CLXXXV.

Habitat in Sibiriae parte quanu maxime orientali in fissuris rupium.

Longitudine 4 pollices, pondere 9 drachmas æquat. Rostrum acutum & auriculae ovales fuscæ. Dorsum fuscum flavescente mixtum; venter albicans; pedes nigricantes; cauda sesquipolllicaris; superius fusca, inferius alba.

Cyanus. 22. M. cauda mediocri subpilosa, palmis tetradaëctylis, plantis pentadaëctylis, corpore cœruleo subtus albido. *Molina hist. nat. Chil. p. 266.*

Habitat in regno Chilensi, silvatici facie & magnitudine, sed pilis cœruleis; auriculis rotundis, per quam timidus; magnam in cævis suis, in plures cameras partitus, radicum tuberosarum penum colligit, quam incolæ crebro auferunt.

amphi. 11. M. cauda longitudine dimidia corporis, auribus vix vellebius. 11. M. cauda longitudo dimidia corporis, auribus vix velle re prominulis, pedibus subtetradactylis. *Pallas glir. p. 80. n. 20. Schreber Saeugth. IV. p. 668. t. CLXXXVI.*

Mus cauda elongata pilosa, plantispalmatis. Syst. nat. XII. p. 82. Fn. suec. 2. p. 12. n. 32.

Mus cauda mediocri, palmis tetradaëctylis cum unguiculo pollicari, corpore nigricante. Erxl. mamm. p. 386. n. 3.

Mus (aquaticus) cauda longa, pilis supra e nigro & flavescente mixtis, infra cinereis vestitus. Brigg. quadr. p. 175. n. 11.

Mus agrestis major. Gesn. quadr. p. 733.

Mus major aquaticus sive ratus aquaticus, & Mus agrestis major macrourus Gesneri. Raj. quadr. 217. & 219.

Rat d'eau. Buffon hist. nat. VII. p. 368. t. 43.

Water-rat. Penn. quadr. p. 301. n. 228.

Eine Maeuseart. S. G. Gmelin it. I. p. 151. t. 29. f. 1.

terrestris. β. M. cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadaëctylis, auriculis vellere brevioribus. *Syst. nat. XII. p. 82. n. 10. Fn. suec. 2. p. 11. n. 31.*

Mus agrestis capite grandi brachyurus. Raj. quadr. p. 218.

paludosus. γ. M. cauda mediocri pilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadaëctylis, auriculis vellere brevioribus, ater. *Mant. plant. 2. p. 522.*

niger. δ. Mus amphibius niger.

maculatus. ε. Mus amphibius macula magna alba dorsali, & linea alba pectorali.

Habitat in omni Europa & septentrionali Asia ad mare usque glaciale in aquosis praesertim ripis aquarum precipibus, in humido quoque lutoso que agrorum, pratorum, hortorum solo, radices, arborum quoque, rodit, herbarum effodit, hisque præcipue viicitat; mordax & animosus; natat & aqua mergitur. Caro Jacutis deliciosa, a quibus etiam pellis adaptatur. Femina mare minor, & magis flavescens, mammis 8, 4 pectoralibus, 4 abdominalibus instructa, coitus tempore moschum olet, & Aprili ad 8 usque pullos parit.

Pondus inter 3ij & 3iiij intermedium; longitudo corporis 6 $\frac{1}{2}$, caudæ 3 pollicum. Rostrum, prouti truncus, breve & crassum; auriculae ovatae, margine crinitæ.

alliar. 23. M. cauda unciali, auribus majusculis subpilosis, corpore cinereo subtus albido. Pallas glir. p. 80. n. 18. p. 252. t. XIV. C. Schreber Sæugth. IV. p. 671. t. CLXXXVII. Habitat in Siberia ad fluvios Jenisei, Kan & Angara, alliorum bulbis viicitans, quorum magnam penum colligit. Muri arvali affinis, ut tamen capite, mystacibus & curiculis ad musculum proprius accedat. Palmæ tetradactylæ. Cauda 1 $\frac{1}{3}$ pollicem longa, alba, sīria dorsali fusca. Corpus 4 $\frac{1}{3}$ pollices longum. Mammæ 8.

utilus. 24. M. caudæ unciali, auriculis vellere longioribus, palmis subtetradactylis, corpore supra fulvo, subtus cano. Pallas glir. p. 79. n. 17. p. 246. t. XIV. B. Schreber Sæugth. IV. p. 672. t. CLXXXVIII.

Habitat in Siberia, varietas minor forsan quoque in Germania; in antris congenerum, arboribus cavis, hieme in acervis frumenti, horreis, domibus; hicme per nivem currit; carnem amat.

Arvalis satis affinis; pedes tamen magis pilosi, albi; cauda vix ultra pollicem longa, præter striam fuscam supra flavescens, subtus alba. Corpus pondere ad 3 $\frac{1}{2}$ ad 3ij, longitudine tres pollices 7 $\frac{1}{2}$ lineas æquat.

gregalis. 25. M. cauda sesquiunciali, auriculis vellere longioribus, palmis subtetradactylis, corpore cinerascente. Pallas glir. p. 79. n. 16. p. 238. Schreber Sæugthiere, IV. p. 674. t. CLXXXIX.

Mus socialis. Georgi it. p. 162.

Habitat in Siberia orientalis siccis; sub cespite nidum, multis foraminibus pervium, & cameris pro penu radicum,

præsertim lili pomponii & alii tenuissimi condenda cinctum fudit.

Economus minor, sociali longior, ut feminæ sex linearum ultra 4 pollices longitudinem affsequantur, mari bus pollice brevioribus.

œcono- 26. *M. cauda subfœsquiunciali, auriculis nudis in vellere molli mus.*

latentibus, palmis subtetradactylis, corpore fusco. Pallas glir. p. 79. n. 15. p. 225. t. XIV. A. it. III. p. 692. n. 4.

Georgi it. p. 161. Schreber Sæugth. IV. p. 675. t. CXC.

Habitat in Siberia a fluvio Irtysch ad oceanum orientalem usque, in humidis præsertim & profundis vallibus, in quibus sub cespite nidum multiplici exitu, & ad ejus latera cameram aut plures cameras pro condenda insigni, quam colligit, radicum præsertim tuberosarum penum excavat; veris initio coit, quo tempore semina moschum olet, probabiliter pluries per annum, seminatum non nisi 2-3 pullos semel parit; gregatim migrat linea recta, & aquas in hoc itinere tranat, ab avibus, piscibus, apris, vulpibus aliisque feris turbatur; ab ipsis hominibus non penum modo sua spoliatur, sed ipsum a Jakutis animal quoque comeditur.

An huc spectat mus glareolus, a b. O. F. Müller in insula Lalandia repertus, & a Schrebero Sæugth. IV. t. CXC. B. depictus?

laniger. 27. M. cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore cinereo lanato. Molina hist. nat. Chil. p. 267.

Habitat in terræ Chilenis borealibus sub terra, mundus, docilis, mitis & facile cicurandus, vicinitat bulbis, cepæ potissimum; femina bis per annum 5-6 pullos parit. Longitudo 6 pollicum; auriculæ exiguae acutæ; rostrum breve, pili longissimi, telæ aranearum in modum teneri, ut Peruani olim lanæ optimæ in locum adhibent.

aryalis. 16. M. cauda unciali, auriculis vellere prominulis, palmis subtetradactylis, corpore fusco. Pall. glir. p. 79 n. 14. Schreb. Sæugth. IV. p. 680. t. CXCI.

Mus (gregarius) canda corpore triplo breviore subpilosa, corpore griseo subtus pedibusque albis. Syst. nat. XII. I. p. 85.

Mus (terrestris) cauda mediocri, auriculis vellere brevioribus, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo. Erxleb. mamm. p. 395. n. 7.

Mus (campestris minor) cauda brevi, pilis e nigricante & sordide luteo mixtis in dorso, & saturate cinereis in ventre vestitus. Briss. quadr. p. 176. n. 12.

Mus campaignolo. Gesn. quadr. p. 733.

Campagnol. Buff. hist. nat. VII. p. 369. t. 47.

Short-tailed rat. Penn. quadr. p. 305. n. 233.

Habitat in omnibus Europæ, ipsiusque Sibiriæ & Hircaniae dumetis, campis, pratis & hortis, præcipue ad aquas; videtur frumento, nucibus, glandibus, quas in suis antris colligit; a vulpe, putorio, mustela, cato, mure silvatico prædatur; femina aliquoties per annum semper 8-12 pullos parit. Infestatur acaris minutis.

Longitudo 3 circiter pollicum; pondus maris 3vj, femina ad 3xj. An hujus forte varietas Mus (agrestis) cauda abbreviata, corpore nigro fusco, abdomine cinerascente. Fn. succ. ed. 2. p. II. n. 30?

Socialis. 28. M. cauda semunciali, auriculis orbiculatis brevissimis, palmis subtetradactylis, corpore pallido subtus albo. Pallas glir. p. 77. n. 13. p. 218. t. XIII. B. it. 2. p. 705. n. 10. Schreb. Sæugth. IV. p. 682. t. CXCII.

Mus alius & mus microurus. S. G. Gmelin it. 2. p. 173. t. 11. & 3. p. 500. t. 57. f. 2.

Habitat frequens in sicca arena deserti inter fluvios Wolga & Ural siti; circa mare caspium & in montibus Hircaniae, par mas & femina, aliquando cum pullis in antris; tulipæ præsertim bulbis videtur, a mustelis, putoriis, lutris, cornicibus comeditur.

Pondus circiter 3vj, longitudo 5 lineis superat 3 polices.

Lagurus. 29. M. brachyurus, auriculis vellere brevioribus, palmis subtetradactylis, corpore cinereo linea longitudinali nigra. Pallas glir. p. 77. n. 12. p. 210. t. XIII. A. it. 2. p. 704. Schreb. Sæugth. IV. p. 684. t. CXCIII.

Habitat in solo arenaceo lutose desertorum flaviis Ural, Jenisei & Irtysch adjacentium, singula animalia in nido rotundo angusto; gregatim migrat; videtur potissimum iride pumila, muris quoque aliis speciebus; motu leniore, & situ, dum dormit, ad arctomyias accedit; hic me tamen non obrigescit; salax a primo vere pluries per annum coit, quo tempore femina moschum olet, quæ semper 5-6 pullos parit.

Pondus maris 3vj, longitudo $7\frac{2}{3}$ lineas ultra 3 pollices æquat; cauda maris sesquilinea longior quam femina.

torqua- 30. *M. brachyurus*, auribus vellere brevioribus, palmis pentadactylis, corpore ferrugineo vario, torque interrupta albida, linea spinali nigra. *Pallas glir.* p. 77. n. II. p. 206. t. XI. B. Schreb. *Sacugth.* IV. p. 686. t. CXCIV.
Habitat in parte quam maxime boreali montis Ural & uliginosus mari glaciali conterminis; lichene rangiferino & nivali, bulbisque polygoni vivipari vivitat; migrat. Arvali magnitudine, lemno habitu propius accedit; cauda obtusa fusca.

Lemmus. 5. M. brachyurus, auriculis vellere brevioribus, palmis pentadactylis, corpore fulvo nigroque vario subtus albo. *Pallas glir.* p. 77. n. 10. p. 186. t. XII. A. B. Schreb. *Saeugth.* IV. p. 687. t. CXCV. $\alpha.$ $\beta.$

Mus cauda abbreviata, pedibus pentadactylis, corpore fulvo nigro-vario. *Syst. nat.* XII. 1. p. 80. *Fn. suec.* p. 11. n. 29. *act.* *Stockh.* 1740. p. 75. f. 45.

Mus Lemmus. *Fabrie.* it. norw. p. 191.

Mus norwegicus, vulgo Lemming. *Raj.* *quadr.* p. 327. *Worm. mus.* p. 321.

Cuniculus (norwegicus) caudatus auritus ex flavo rufo & nigro variegatus. *Briss. quadr.* p. 145. n. 5.

Lemmus. *Gesn. quadr.* p. 731. *Olaus Magn. sept.* p. 617. Bestiola Leem dicta. *Aldrov. digit.* p. 436. *Jonst. quadr.* p. 168.

Lemming. *Pontoppid. hist. nat. Norweg.* 2. p. 58.

Leming. *Buffon hist. nat.* XIII. p. 314.

Lapland marmot. *Penn. quadr.* p. 274. n. 202. t. 25. f. 2.

Habitat in montibus nivibus Scandinaviae, & parte quam maxime boreali cæteræ montium Uralensis, ut tamen posterior ambitu corporis multo minore, unguibus pilisque multo brevioribus, & colore minus vario potissimum fulvo divergat, eo etiam, quod in antris suis penum pabuli colligat. Vivitat berulae nanæ amenitis, lichene rangiferino & aliis; mordax, sibilat, hieme sub nive currit; femina aliquoties per annum 5-6 pullos parit, quo saðo, singulis circiter 10 annis, insigni gelu præsertim immidente, universus animalium exercitus auctummo, noctu præsertim linea recta, a qua nullo obstatulo defletri se sinunt, aut versus mare, aut in planities migrat; quo in itinere iamen multa aqua submersa, feris accipitribusque occisa pereunt, & sequente æstate, pauca tamen, in montes redeunt. W. rammii historia animalis e Norvegia. Haffn. 1653. 4. hunc sifist.

Anatome. Bartholin. cent. 2. p. 301.

- hudso- 31. M. brachyurus, auriculis nullis, plantis pentadactylis,
nias, vitta dorsali ex luteo fuscescente, pectore & abdomine
albis. *Pallas glir. p. 209.* Schreber *Saeugth. IV. p. 691.*
t. CXCVI.

Habitat in terra Labrador.

*Mas semina longior, ut 5 pollices aequaliter ; color
potissimum cinereus ; cauda pilis longis rigidis sordide
albis vestita. Pedes breves.*

- mauli- 32. M. cauda mediocri pilosa, auriculis acuminatis, pedibus
nus, pentadactylis. *Molina hist. Chil. p. 268.*
*Habitat in provinciae Chilensis Maule silvis, marmotae co-
lore & longitudine pilorum affinis, duplo tamen major,
rostro elongato, mystacum ordinibus 4, pedibus pentadactylis,
cauda longiore pilosa distans. An ad arcto-
myas relegandus ?*

* * * * buccati, buccis sacculiferis.

- Acredua. 33. M. buccis sacculiferis, auriculis sinuatis, corpore griseo-
subtus albido. *Pall. glir. p. 86. n. 22. p. 257. t. XVIII.*
A. Schreber Saeugth. IV. p. 695. t. CXCVII.
Mus migratorius. *Pallas it. 2. p. 703. n. 5.*
*Habitat in districtu Sibiriae Orenburgensi ad fluvium Ural.
Longitudo corporis 4 pollices, caudae annulatae supra
fuscæ, ceterum cum pedibus albae 8 lineas æquat.*

- Cricetus. 9. M. buccis sacculiferis, corpore subtus aterrimo, cicatricibus
lumbaribus detonatis. *Pall. glir. p. 83. n. 21. Schreber
Saeugth. IV. p. 695. t. CXCVIII. A.*
Mus cauda mediocri, auriculis rotundatis, corpore subtus
nigro, lateribus rufescentibus : maculis tribus albis.
Syst. nat. XII. 1. p. 82.
Glis Cricetus. *Klein quadr. p. 56.*
Glis (Marmota Argentoratensis) ex cinereo rufus in dorso,
in ventre niger, maculis tribus ad latera albis. *Briff.
quadr. p. 166.*

Porcellus frumentarius. *Schwenckf. thr. p. 118.*

Cricetus. *Agricol. subterr. p. 486. Gesn. quadr. p. 738.
Raj. quadr. 221. Claudio E. N. C. dec. III. n. 5. p. 376.
Hamster. *Buffon hist. nat. XIII. p. 117. t. 14. Meyer Thie-
re, Norib. 1748. fol. t. 81. 82. S. G. Gmelin it. 1.
p. 33. t. 6. Sulzer Versuch einer Naturgeschichte des
Hamsters. Gotha 1773.**

German marmot. *Penn. quadr. p. 271. n. 200.*

B. Cricetus totus niger. Lepechin it. 1. p. 192. t. 15. Pallas it. 1. p. 128. Georgi it. 2. p. 851. Sulzer Naturg. des Hanfsters sig. in titul. Schreb. Saeugth. IV. t. CXCVIII. B.
Habitat in Siberia & Russia australi, Polonia, Slavonia, Hungaria, Silesia, Bohemia, & Germania transrhennana, praesertim Thuringia; Cavernas fodunt singula animalia sub terra plurimis concamerationibus, duplice foramine: uno obliquo aditu, in quo etiam sterquilinum deponunt, altero perpendiculari specula; vicitat per aestatem herbis, radicibus & fructibus, rarius carne & animalibus; colligit pro autumno hiemisque initio frumentum, fabas, pisa, viciae, lini semina, pinguis per alteram hiemis partem dormit; Aprili coit; femina 8 manumis instruenda per mensem circiter gravida aliquoties per annum, prima vice 3-4, post 6-9 pullos parit. Lente currit, nec scandit, ast celerrime fodit, pedibus posterioribus insilere potest; interdiu ut plurimum latet, mordicus se defendit, & brevi afferem sesquipolllicarem perforat; a putorio, niustelis, catis, canibus, vulpibus, accipitribus occiditur, homini ob noxas arvis illatas detestatus, ob pellem frumentique penum, rarius ob carnem aestimatus, occiditur arsenico, aut veratri pulvere cum farina & melle in pulten codo. Mas femina duplo major, ut 1 $\frac{1}{4}$ libram medicam pondere, longitudine 10 pollices aequet. Color variat, rariissimi sunt cricei toti candidi aut flavescentes, vix frequentiores albi nigris maculis, aut nigri albis in dorso maculis, aut rostro albo fronteque cinerascente, aut maxilla inferiore alba confusci. Cauda 2 $\frac{1}{2}$ pollicum, pilis longis teda; Pedes breves, anteriores tetradaedyla cum verruca pollicari ungue rotundato instruenda, posteriores pentadedyla.

arenarius. 34. M. buccis fusciliferis corpore cinereo lateribus subtusque albo, cauda pedibusque albis. Pallas glir. p. 36. n. 24. p. 265. t. XVI. A. it. 2. p. 704. n. 7. Schreb. Saeugth. IV. p. 707. t. CXCIX.

Habitat in deserto arenoso Barabæ ad fluvium Sibiriae tytch; mordax, &, noctu precipue, agilis, amat potissimum legumina astragali tragacanthoidis.
Pondus 3vij, longitudo 3 $\frac{1}{2}$ pollicum; pilis terrimi; palma tetradaedyla; mystaces capite magno longiores.

phæus. 35. M. buccis fusciliferis, corpore caudaque fusco-cinerascentibus subtus albis. Pall. glir. p. 86. n. 23. p. 261. t. XV. A. Schreber Saeugth. IV. p. 708. t. CC.
Mus alpinus. Hablitz apud. S. G. Gmelin it. IV. p. 172.

Habitat in deserto Sibiriæ prope Zarizyn, & in montibus Perīce suniamisicis, campis oryzæ confitis damnosus; hieme non dormit.

Pondus 7vj, longitudo 5 lineas ultra 3 pollices, caudæ 9-9½ lineas æquat; auriculæ & stria caudæ longitudinalis fuscescunt.

Songarus. 36. M. buccis sacculiferis, dorso ciaerco, linea spinali nigra, lateribus albo fuscoque variis, ventre albo. *Pallas glir.* p. 86. n. 25. p. 269. t. XVI. B. it. II. p. 703. n. 6. *Schreber Saeugth.* IV. p. 709. t. CCI.

Habitat in Sibiriæ deserto arenoso Baraba ad fluvium Ir-tisch, cum reliquis hujus tribus antra pro colligendo viatu fodiers.

Pondus 3v-3vß; longitudo corporis 3 pollicum, caudæ crassæ, obtusæ, pilosæ 4½ linearum; verruca pollicaris aliisque ungue; mystaces capite breviores; auriculæ longiores.

Furunculus. 37. M. buccis sacculiferis, corpore supra griseo, striga dorsali nigra, subeis albido. *Pallas glir.* p. 86. n. 26. p. 273. t. XV. A. *Schreb. Saeugth.* IV. p. 710. t. CCII.

Mus barabensis. *Pallas it.* II. p. 704. n. 8.

Furunculus myodes. *Messerschmid Mus. Petrop.* p. 343. n. 109.

Habitat in Dauria, deserto Sibiriæ Baraba ad fluvium Ob & inter fluvios Onon & Argun; astragalorum atriplicumque seminibus viditans, arenario affinis, 3 pollices longus; auriculæ magnæ, ovales, pilis nigris, margine albo; cauda pollicaris, tenuis & acuta; verruca pollicaris ungue instruða.

* * * * * subterranei, auriculis nullis, oculis minimis; cauda abbreviata aut nulla.

Talpinus. 38. M. brachyurus fuscus, dentibus primoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, palmis pentadactylis fosforiis. *Pallas glir.* p. 77. n. 9. p. 176. t. XI. A. & nov. comm. *Petrop.* I4. p. 568. t. 21. f. 3. *Schreber Saeugth.* IV. p. 711. t. CCIII.

Spalax minor. *Erxl. mamm.* p. 379.

Habitat in Russiæ temperatoris planitiæbus, in humo, quam criceti in modum perforat; singula animalia cavernam sibi fodiant; lathyri tuberosi, phlomidis tuberosæ tuberibus, tulipæ bulbis præsertim viditat; per hiemem

non dormit ; per diem visus dæilis ; coit initio Aprilis ; quo tempore zibethum olet ; femina 3 - 4 pullos parit. Muri amphibio affinis.

Pondus 3ij aliquando, longitudo 3 pollices & 9 lineas æquat.

capensis. 39. *M. brachyurus*, dentibus primoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, palmis pentadactylis, ore albo. *Pallas glir.* p. 76. n. 8. p. 172. t. VII. *Schreber Sacugth.* IV. p. 713. t. CCIV.

Hamster. Kolbe Vorgeb. d. gut. Hosn. p. 158.

Taupe du Cap de bonne-espérance. Buffon hist. nat. Amst. Suppl. V. p. 22. t. 9.

Habitat in Capite bonæ spei, hortis infestus.

Longitudo 5½ pollicum. Caput rotundatum.

maritimus. 40. *M. brachyurus* dentibus primoribus superioribus sulcatis, auriculis nullis, pedibus pentadactylis, corpore supra albido flavescente mixto, ad latera & subtus ex albo cinereo. *Schreber Sacugth.* IV. p. 715. t. CCIV. B.

Zand-moll. Mason. act. angl. Vol. 66. P. 1. p. 304.

Taupe du cap. la Caille journ. p. 299.

Taupe des dunes. Allamand apud Buffon hist. nat. Amst. suppl. V. p. 24. t. X.

Habitat in Capitis bonæ spei, collibus arenariis maritimis, quos cuniculis suis excavat; lente currit, celerius fodiit; mordax; viicit radicibus bulbisque ixiarum, antholyzorum, gladiolorum, iridum.

Capensi affinis, capite tamen magis conico; longitudo perdalis; cauda pilosa; dentes primores inferiores longiores pro arbitrio animalis removeri a se invicem possunt.

Afpalax. 41. *brachyurus*, incisoribus supra infraque cuneatis, auriculis nullis, unguibus palmarum elongatis. *Pallas glir.* p. 76. & 165. t. X. & it. III. p. 692. *Schreber Sacugth.* IV. p. 716. t. CCV.

Mus myospalax. Laxmann sibir. Brief. p. 75. act. Stockh. 1773.

Habitat in Dauria, & ultra fluvium Irtysch inter Alei & Tscharysch in humo nigra aut crena compacta, quam naribus pedibusque fodiendo cuniculos sibi longissimos patet; lili pomponii & erythronii, aliis quoque radicibus bulbisque viicitat.

Longitudo a 5 - 8½ pollices. Cauda tercs obtusa calva.

Color supra ex flavo cinerascens, subtus ex albo cinereus,

- Typhlus.* 42. *M. ecaudatus*, palinis pentadactylis, incisoribus supra infraque latis, oculis auriculisque nullis. *Pallas glir.* p. 76. n. 6. p. 154. t. VIII. *Schreber Saeugthire*, IV. p. 718. t. CCVI.
Mus oculis minutissimis, auriculis caudaque nullis, corpore rufo cinereo. *Lepechin.* it. I. p. 238. & nov. comm. *Petrop.* XIV. p. 504. t. XV. f. 1.
Spalax microphthalmus. *Güldenstaedt nov; comm.* *Petrop.* XIV. p. 409. t. 8. 9.
Spalax major. *Erxl. mamm.* p. 377.
Slepez. *S. G. Gmelin* it. I. p. 131. t. 22.
Habitat in Russia australi, in cespite humum nigram conte-
gente antrum (singula animalia sibi proprium) dentibus,
capite, pedibus, ipsoque ano fodiens; radicibus, præser-
tim chærophylli bulboſi viuit; cum loco oculorum bul-
billos tantum cute velatos habeat, cæcutit, tanto acutiore
auditu tacuque gaudens; mordicus se defendit; vere &
œstate coit; femina 2 manimis instruta 2-4 pullos parit.
Pondus 3vij superat, longitudo 8 pollices vix æquat;
pili molles, dense appressi, ferruginei cinereo admisto.
Dentes primores rugosi.

ARCTOMYS. *Dentes primores cuneati, 2 in utraque maxilla.*

molares superiores utrinque 5, inferiores 4.

Claviculæ perfectæ.

- Marmota.* I. A. capite auriculato, corpore fusco subtus rufescente. *Schreber Saeugth.* IV. p. 722. t. CCVII.
Mus capite gibbo auriculato, cauda villosa brevi, palmis tetradactylis, corpore fusco subtus rufescente. *Pallas glir.* p. 74. n. I.
Mus cauda abbreviata subpilosa, auriculis subpilosis, buccis gibbis. *Syst. nat.* XII. p. 81. n. 7.
Mus alpinus. *Gesn. quadr.* p. 743. fig. p. 744. *Aldr. dig.* p. 445. *Jonst. quadr.* t. 67. *Raj. quadr.* p. 221.
Mus montanus. *Matthiol. comm.* p. 368.
Glis (Marmota alpina) pilis e fusco & flavicante mixtus vestitus. *Briss. quadr.* p. 165. n. 6.
Glis (Marmota) corpore supra fusco-cinereo, subtus ci-
nereo-flavescente. *Erxl. mamm.* p. 358. n. I.

MAMMALIA GLIRES. Arctomys.

Glis Marmota Italica. Klein. quadr. p. 56.

Marmotte. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 219. t. 28.

Alpine Marmot. *Penn. quadr.* p. 268. n. 594.

Habitat in alpibus Sabaudicis, Helveticis, Rhæticis, Noricis, Pyrenaicis, arboribus denudatis, siccis, apricis summis; vicinitat radicibus, herbis, gramine tenerrimo, & potissimum mutellina; cicurata, quicquid offertur; parum bibit; solent amat; per tribus 5-9-12-14 habitat, custode adventum hostis per sibilum indicante, quem fugiunt omnes, & si non amplius possint, mordicus se defendunt; alias cavernas, multis cuniculis instrutas & aditibus, per quos effugit, sibi pro æstate, alias in quibus ore allatum fanum pro lecto colligit, & a fine Septembris ad Martium usque alto summo sepulta jacet, pro hieme; manibus cibum ori admoveat; talis incedit; sc̄epe erecta; facilius in planicie, quam sub terra capitur; facile cicuratur, calor amantissima, rebus cibariis, vestimentis, supellecili noxia, vix in conclavi calido somni hyberni oblita; coit Aprili & Majo; femina per 6-7 septimanas gravida 2-4 pullos parit. Am Stein.

Fondus marmotæ, auctumino ipso, 9 libras, longitudo pedem & tres pollices non excedit. Caput crassum, vertice plano, rostro crasso atque obtuso, dum sedet animal, sc̄epe erectum; maxillæ inferioris partes binæ mobiles; auriculæ pilosæ cinereæ; genæ pilis longioribus tectæ & cinctæ. Mysticæ utrinque serie 6plici; verruca nigra supra oculos setis 6, infra oculos setis 7. Corpus breve, crassum; sutura a gula ad anum. Pedes breves; palmrum pollex conicus, ungue plano obscuro; cauda recta, 6 pollicum, longis pilis vestita, apice ex atro fuscō. Caro sapida, tenera. Pinguedo & ipsa pellis monticolis usitatum remedium.

Monax. 2. A. capite auriculato, rostro cærulecente, cauda longiuscula villosa, corpore griseo. *Schreber Sæugth.* IV. p. 737. t. CCVIII.

Mus capite gibbo auriculato, rostro. cærulecente, cauda longiuscula villosa, palmis tetradactylis, corpore griseo. Pallas glir p. 74. n. 2.

Mus cauda mediocri pilosa, corpore cinereo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.
Syst. nat. Ed. XII. p. 81. n. 8.

Glis (Marmotta americana) fuscus, rostro e cinereo cærulecente. Briss. quadr. p. 164. n. 5.

Glis (Monax) corpore fusco, lateribus ventreque pallidioribus. Erxl. mamm. p. 361.

Monax. Edw. av. 2. t. 104. Buffon hist. nat. XIII. p. 136. suppl. III. p. 175. t. 28.

Maryland Marmot. Penn. quadr. p. 270. n. 198.

Habitat in America septentrionali paulo calidiori ad insulas Bahamicas, cavernas in rupibus fodit, sub arboribus cavis hybernans.

Lepore cuniculo paulo major; rostrum magis acutum, quam marmotæ; auriculæ subrotundæ; ungues longi & acuti; cauda corpore dimidio brevior, nigricans. Cl. Alstroemer.

Bobac.

3. A. capite auriculato, cauda villosa, palmarum ungue pollicari, corpore griseo subtus luteo. Schreb. Saeugth. IV. p. 738. t. CCIX.

Mus (Arctomys) capite gibbo auriculato, cauda brevi villosa, palmarum ungue pollicari, corpore griseo subtus luteo. Pallas glir. p. 75. 97. 98. t. 5.

Glis (Marmotta polonica) flavicans, capite rufescente. Briss. quadr. p. 165.

Bobak. Rzaczinski hist. nat. Pol. p. 235. Buffon hist. nat. XIII. p. 136. t. 18. Forster act. angl. Vol. 57. p. 343. Penn. quadr. p. 268.

Habitat in siccis & apricis montium planitiebus a Borys-thenis ripis per medium & temperatiorem Asiae partem ad Sinam & Camschatcam usque; cavernas quoque profundissimas sibi fodiens, in quibus 20-24 habitant; mane & meridie prodit, custode tamen sollicitate circumspiciente & socios monente; timidum animal, excepta humo pluvialis madente, solis vegetabilibus vivitat; palmis se defendit; facile cicuratur, plantis infidet, manibusque cibum ori admoveat; æstate vorax, hieme dormit. Caro esculenta; pinguedo coriariis & pellionariis adhibita.

Pondus animalis libras 14 medicas, longitudo 16 pollices vix excedit. Oculi parvi. Auriculæ ovatae; cauda annulata, apice atra, 4 pollices & 4 lineas longæ, reda. Mammæ feminæ 8.

Empetra.

4. A. capite auriculato, cauda villosa, corpore supra vario, subtus rufo. Schreber Saeugth. IV. p. 743. t. CCX.

Mus (Empetra) capite gibbo auriculato, cauda villosa brevi, palmis tetradactylis, corpore supra vario, subtus rufo. Pall. glir. p. 75. n. 4.

MAMMALIA GLIRES. Arctomyes.

Glis (canadensis) corpore griseo, ventre cruribusque aurantiis. Erxl. mamm. 363.
Quebec marmot. Penn. quadr. p. 270: n. 199. t. 24. f. 2.
Canadian marmot. Forster act. angl. LXII. p. 378.
Habitat in Canada, & reliqua boreali America, similiter sibilans; lepore cuniculo vix major, ut longitudo aliquid quando vix 11 pollices superet; cauda 2½ pollicum.

ptuinosa. 5. A. capite auriculato, cauda pedibusque nigris, dorsi laterum & abdominis pilis duris, longis, basi cinereis, medio nigris, apice albidis:
Hoary Marmot. Penn. hist. p. 398. n. 261.
Habitat in borealibus Americæ septentrionalis, habitu monacis; nasi apex niger; auriculæ ovatae; genæ albidae; vertex & unguis fuscus.

Citillus. 6. A. auriculis nullis, cauda villosa, corpore vario: Schreb: Saeugth. IV. p. 746. t. CCXI. A. B.
Mus capite gibbo, auriculis nullis, cauda brevi villosa, corpore vario. Pallas nov. comm. Petrop. XIV. p. 549. t. 21. f. 1: 2. & glir. p. 76. II9. t. VI: VI. B.
Mus cauda abbreviata, corpore cinereo, auriculis nullis: Syst. nat. XII. I. p. 80. n. 4.
Mus Suslicus. Güldenst. nov. comm. Petrop. XIV. p. 389. t. 7.
Mus noricus s. Citillus. Agric. subt. p. 485. Gesn. quadr. p. 835. Raj. quadr. p. 220. Rzacz. pol. p. 235. aud. p. 327.
Citellus: Schwenckf. Sil. p. 86. Aldr. dig. p. 436.
Cuniculus (germanicus) caudatus, auriculis nullis; cinereus. Briss. quadr. 147. n. 6.
Glis (Citellus) auriculis nullis. Erxl. mamm. 366.
Orientalischer Hamster: S. G. Gmelin it. p. 30. t. 5.
Casan Marmot & Earleso Marmot. Penn. quadr. p. 273: & 276. n. 201. & 203. t. 25. f. 1.
Zisel & Suslic. Buffon hist. natur. XV. p. 139. 144. 195. Suppl. III. p. 191. t. 31.
Habitat in Russia australi ad Camschatcamusque et insulas huic Americæque intermedias, Persiam & Sinam, rarius

Arctomyes hybernant, diurnam vitam agunt, radibus granisque viditant, quæ interdù conquirunt, scandunt, foduntque antra sub terra, in quibus habitant. Caput ipsius, gibbum, rotundatum; auriculæ breves aut nulla; corpus crassum; cauda brevis, villosa; palmæ tetradaedylæ cum pollice brevissimo; plantæ pentadactyla; cæcum ampliatum; hodie

hodie in reliqua Europa, in cunipis apertis, siccis, elatis
incultis, in solo cespitoso & lutoſo, ad vias publicas, nun-
quam in silvis & paludibus; antra ſibi, ſingula ſingulis
animalia, femina profundiora fodit, in quibus pro hiemis
initio & fine frumentacea, herbas teneriores, baccas, ra-
rius mures & aviculas colligit; parum bibit; hybernat;
a primis tamen veris auspiciis caelo ſereno interdiu vietum
quærit, quem plerumque pedibus anterioribus ori admo-
vet; ſalit; plantis infidendo dorinit; ſibilat; facillime
cicuratur, inprimis mas; femina mordacior per 20-30
dies gravida Maji initio 3-4-6-8 pullos parit; a pu-
toriis, mustelis, falconibus, ipſisque cornicibus & ardeis
prædatur. Pellis vere bona. Caro nonnullis edulis.

Magnitudo colorque perquam variat; illa nunc marmotam
affequitur, nunc murem amphibiuni vix æquat; color
plerumque ex cinereo flavus, subtus ſordide albus, ut ta-
nien aliquid undulati vel punctati interſit, cauda conco-
lore; alias ſupra canus fulvo aut flavo undulatum miſtus,
ſubtus pallide flavescentes, cauda longiori fere ſciuri; alias
(leucopictus) ſupra griseus albo-maculatus, ſubtus ex al-
bo flavescentes, orbitalium albus, caudæ brevioris, & re-
gionis a naribus ad oculos ſitæ ex flavo ſubfuscus. An
muis ponticus Aristotelis & Plinii?

Gundi. 7. A. capite auriculato, corpore teſtaceo rufefcente. Rothmann
apud Schloeger Briefiv. I. p. 339. Pall. glir. p. 98. not.
Gundi Marmot. Pen. hift. 2. p. 405. n. 264.

Habitat in Barbaria prope Massufin versus montum Atlas.
Magnitudo L. Cuniculi. Auriculæ truncatæ meatu
amplo.

25. SCIURUS. Dentes primores II, ſuperiores cu-
neati. inferiores acuti.

molares ad utrumque latus ſu-
periores V.
inferiores IV.

Claviculæ perfectæ.

Cauda diſticha.

Mystaces longæ.

* ſcandentes.

Vulgaris. 1. S. auriculis apice barbatis, cauda dorſo concolore. Erxl.
mamm. p. 411. Schreber Sæugth. IV. p. 757. t. CCXII.
K

MAMMALIA GLIRES. *Sciurus.*

- Sciurus auriculis apice barbatis ; palmis tetradaetylis ; plantis pentadaetylis. Syst. nat. XII. I. p. 86. n. I. Faun. suec. 37.*
- Sciurus palmis solis saliens. Syst. nat. VI. p. 9. Mus. Ad. Fr. I. p. 8.*
- Sciurus (vulgaris) rufus, quandoque griseo admixto. Briss. quadr. p. 150. n. I.*
- Sciurus vulgaris rubicundus. Klein. quad. p. 53.*
- Sciurus vulgaris. Raj. quadr. p. 214.*
- Sciurus. Gesn. quadrup. p. 845. Aldrov. dig. p. 396. fig. p. 398. Jonst. quadr. p. 163. t. 66. Schwenckf. theriota Sil. p. 121.*
- Ecureuil. Buffon hist. nat. VII. p. 253. t. 32.*
- Common squirrel. Penn. quadr. p. 279. n. 206.*
- Eichhoernlein. Ridinger jagdb. Th. t. 20.*
- Eichhoernchen. S. G. Gmelin it. I. p. 35. t. 7. Falck Beytr. 3. p. 311.*
- varius. β. *S. hieme cærulescens-cinereus, æstate ruber, abdomine albo. Erxl. mamm. p. 414. α.*
- Sciurus (varius) ex candido cinereus. Briss. quadr. p. 152. n. 4.*
- Sciurus varius, Varus vulgo dictus. Aldr. dig. p. 403. fig. p. 405.*
- Sciuri, qui mures pontici & a colore varii dicuntur. Jonst. quadr. p. 163.*
- Mus ponticus s. venetus, quem vulgo varium vocant. Gesn. quadr. p. 741.*
- niger. γ. *Sciurus niger. Erxl. mamm. p. 415. β.*
- albus. δ. *Sciurus totus albus, oculis rubris. Erxl. mamm. p. 416. γ.*
- Sciurus albus fibricus. Briss. quadr. p. 151. n. 2.*
- Sciurus albus. Wagn. Helv. p. 185. S. G. Gmelin it. I. p. 35. t. 8.*
- Habitat in Europæ, frequentissimus in omnis Russici imperii arboribus silvaticis.*
- Æstate ruber, abdomine albo, hieme cærulescens-cinereus. Videlit nucibus, strobilis, baccis, &c. manu cibum ori admovet ; superfluum cibum defodit ; parum bibit ; hieme nivem ; cortice lignoque insidens navigare fertur ; nidus globosus e muscis ; sedens se obumbrat cauda ; a marte prædatur ; pellis hiberna æstimata, caro edulis. Coit Mortio & Aprili ; femina per mensem gravida 3-4-7 pullos parit, bis per annum.*
- Anatome. E. N. C. Cent. 10. app. 449.*

- niger; 2. *S. niger*, auriculis imberibus. *Erxleb. mamm.* p. 417.
Schreber Saeugth. IV. p. 776. t. CCXV.
Sciurus. niger. *Syst. nat.* XII. t. p. 86. *Klein. quadr.*
 p. 53. *Briss. quadr.* p. 151. n. 3.
Quauhtechalott. tlhiltic, *Sciurus mexicanus. Hernand.*
mex. p. 582. *Fernand. nov. Hisp.* p. 8.
 Black squirrel: *Catesb. Carol.* 2. p. 73. t. 73. *Penn.*
quadr. p. 284. n. 210. t. 26. f. 2.
 Ecueuil noir. *Buffon hist. nat.* X. p. 121.
Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam
usque, gregarius, zeæ infestus, cauda breviore.
- vulpinus. 8. *S. rufus cinereo mistus magnus*, auriculis imberibus.
 Fox-squirrel. *Lamson. Carol.* p. 124.
 Cat-squirrel *Penn. hist. p. 411. n. 273. β.*
Habitat in America septentrionali, cinereo major &
rarior, cetera satis affinis; pili duriores, quam vulgaris;
caudæ auricularumque apex rufus. Schoeps.
- cinereus. 3. *S. cinereus*, ventre albo, auriculis imberibus *Erxleb.*
manim. p. 418. n. 3. *Schreber Saeugth.* IV. p. 766.
 t. CCXIII.
Sciurus virginianus cinereus major. Syst. nat. XII. t. p.
 86. *Raj. quadr.* p. 215. *Klein quadr.* p. 53.
Sciurus (virginianus) cinereus, auriculis ex albo flavican-
 tibus. *Briss. quadr.* p. 153. n. 6.
Sciurus major griseus, cauda extrema comosa, pilis diffusis.
Browne jam. p. 483.
 Grey squirrel *Catesb. Carol.* 2. p. 74. t. 74. *Penn. quadr.*
 p. 282. n. 209. t. 26. f. 3.
 Petit gris. *Buffon hist. nat.* X. p. 116. t. 25.
Habitat in Americæ septentrionalis arboribus silvaticis,
nidificat in cavis arboribus, vulgari simillimus, sed
major, ut pedem longitudine æquet, zeæ pariter ali-
quando infestus; a crotalo comeditur.
- hudso- nius. 12. *S. auriculis imberibus, dotso glauco, ventre cinereo,*
cauda breviore ex rufescente glauca nigro marginata.
Forster act. angl. Vol. LXII. p. 378. Pall. glir. p.
 377. *Schreber Saeugth.* IV. p. 777. t. CCXIV.

Sciuri plerique agiles, structuræ delicioris, facile cicurandi, scandunt in arboribus,
pauci sub terra habitant; fructibus seninibusque vescuntur; alii saliendo currunt,
alii quasi volando. Caput latum, auriculis ovalibus longius. Corpus satis cras-
sum; pedes breves, anteriores digitis 4 cum vestigio pollicis, posteriores 5;
cauda longa villosa.

MAMMALIA GLIRES. Sciurus.

Hudson's Bay squirrel. *Penn. quadr.* p. 280. n. 206. ^{a.}
t. 26. f. 1.

Habitat in pinetis frigidioris Americæ septentrionalis,
colore per omnem annum eodem.

Caroli- 13. S. ex cinereo, albo & ferrugineo mixtus, subtus albus,
nensis. cauda fusca atro mixta, albo marginata, auriculis
imberibus.

Lesser grey-squirrel. *Penn. quadr.* p. 283. n. 209. ^{a.}
Habitat in Carolina, vulgari minor, colore variabili.

persicus. 14. S. obscurus, lateribus albus, subtus flavus, auriculis im-
beribus, cauda ex atro cinerea annulo albo. *S. G.*
Gmelin it. III. p. 379. t. 43.

Habitat in alpibus Persicæ hircanicis, colore constanti,
vulgari facie moribusque similis; tarsi rubent.

anoma- 15. S. supra flavus fusco mixtus, subtus obscure fulvus, cauda
lus. concolore, auriculis imberibus rotundatis. *Schreber*
Saeugth. IV. p. 781. t. CCXV. C.

Habitat in Georgia Afriæ. Güldenstaedt.

Vulgari major, ore albo, narium apice nigro, genis
fulvis; mystacibus orbitisque fuscis; auriculis flan-
meis, intus magis albidis.

bitolor. 16. S. supra niger, infra fulvus, auriculis acutis imberibus,
palmarum ungue pollicari magno rotundato. *Sparrmann*
act. Soc. Gothenburg. I. p. 70. Schreber Saeugth. IV.
p. 781. t. CCXVI.

Javan squirrel. *Penn. hist.* p. 409. n. 269.

Habitat in insula Java, 12 pollices longus, cauda
ejusdem longitudinis; auriculae crinitæ; palmarum
ungues acuti, pollex brevissimus; plantæ nigræ.

erythræ- 17. S. supra ex flavo & fusco mixtus, infra ex sanguineo
fulvus, auriculis ciliatis, cauda ex sanguineo fulva.
Pallas glir. p. 377.

Rudly squirrel. *Penn. hist.* p. 409. n. 271.

Habitat in India, vulgari paulo major; stria caudæ lon-
gitudinalis nigricans; verruca pollicaris magna.

macrou- 18. S. cauda corpore duplo longiore grisea. *Ind. zool.* t. 1.
xus. *Erxleb. mamm. p. 420. Schreber Saeugth. IV. p. 783.*
t. CCXVII.

Sciurus zeylonicus, pilis in dorso nigricantibus, Rukkai-
dictus. Raj. quadr. p. 215.

Long-tailed squirrel. *Ind. zool.* t. I.

Ceylon squirrel. *Penn. quadr.* p. 281. n. 287.

Habitat in insula Zeylon, vulgari triplo major, supra niger, infra pallide flavus, auriculis subbarbatis, nari- bus incarnatis; genarum stria bifurca nigra; macula inter aures flava.

maximus. 19. *S. supra ex rubicundo fuscus, subtus niger, cauda nigra, auriculis subbarbatis.* Schreber *Saeugthiere*, IV. p. 784. t. CCXVII. B.

Le grand écureuil de la côte de Malabar. Sonnerat *voyag.* 2. p. 139. t. 87.

Habitat in regione Indiæ Mahé, & littore malabarico; cati magnitudine; vox sonora; vittitat succo latèco nu- cum cocos. Auriculæ eretæ parvæ; pili longi; unguis robusti nigri; verruca pollicaris brevissima, ungue in- trudæ. An vere differt a macrouro?

abessinii- 20. *S. supra ex ferrugineo niger, subtus cinereus, cauda fel- cipedali.* Thevenot *it.* 5. p. 34.

Abessinian squirrel. *Penn. hist.* p. 408. n. 268.

Habitat in Abessinia, vulgari triplo major, obscurum adhuc animal.

indicus. 21. *S. cauda longitudine corporis apice aurantia.* Erxl. *mamm.* p. 420.

Bombay squirrel. *Penn. quadr.* p. 280.

Habitat in India circa Bombay, 16 pollices longus, su- pra sordide purpureus, subtus flavus; auriculæ barbatæ.

flavus. 4. *S. auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis, corpore luteo.*

Sciurus cauda tereti, pilis brevibus, auriculis subrotun- dis. Amœn. acad. I. p. 281.

Fair squirrel. *Penn. quadr.* p. 285. n. 212.

Habitat Carthagena in America, forsan quoque in Gu- furate Indiæ.

Magnitudine dimidio minor Sc. vulgari, luteus, apici- bus pilorum albis. Pollex anticus solo fere exiguo ungue constat. Auriculæ imberbes. An vera sciuri species?

palma- rum. 5. *S. subgriseus; striis tribus flavicantibus, candaque albo nigroque lineata.* Schreber *Saeugth.* IV. p. 802. t. CCXX.

Sciurus (palmarum, Mus palmarum vulgo) coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in dorso flavicantibus. Briff. *quadr.* p. 156. n. 10.

MAMMALIA GLIRES. *Sciurus.*

Mustela africana. Clus. exot. p. 112. Nieremb. hist. nat. p. 172. Jonst. quadr. p. 153. Raj. quadr. p. 216.

Le palmiste. Buffon hist. nat. X. p. 126. t. 26.

Palm.-squirrel. Penn. quadr. p. 287. n. 215.

Habitat in Africæ & Asiæ regionibus calidioribus, nucum cocos præfertim amans.

Longitudo coryoris 2 pollicum & 10 linearum, cauda erectæ, non obumbrantis vix minor; color subitus ex cinerascente vel flavescente albus; variat aliquando striis dorsalibus 5. Auriculæ breves, latæ, subrotundæ, crinitæ.

getulus. 6. *S. fuscus,* striis quatuor albidis longitudinalibus. Schreber Saeugth. IV. p. 806. t. CCXXI.

Sciurus (getulus) coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in lateribus alternatim albis & fuscis aut nigris. Briss. quadr. p. 157. n. 11.

Sciurus getulus. Aldrov. dig. p. 405. fig. p. 406. Gesn. quadr. p. 112. Jonst. quadr. p. 163. t. 67. Raj. quadr. p. 216.

Barbaresque. Buff. hist. nat. X. p. 126. t. 27.

Barbarian squirrel. Edw. av. 4. t. 198.

Barbary squirrel. Penn. quadr. p. 287. n. 215. β.

Habitat in Barbariæ littore occidentali, præcedentis sat' similis, 5 pollices longus, cauda striata; color corporis subitus albus; unguis nigri, verrucæ pollicaris palmarum nullus.

striatus. 7. *S. flavus,* striis quinque fuscis longitudinalibus. Striped Dormouse. Penn. hist. p. 422. n. 286.

asiaticus. α. *Sciurus striatus.* Pallas glir. p. 378. Georgi it. I. p. 163. Sciurus major variegatus, Furunculus sciuroides Messerschmidii. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. 5. p. 344. t. 9.

Ecureuil Suisse. Buff. hist. nat. X. p. 126. t. 28.

Bomdoeskje. Le Bruyn it. p. 432. t. 254.

america- β. *Sciurus pallidus,* striis quatuor fuscis longitudinalibus. Mus. Ad. Frid. I. p. 8. Schreber Saeugth. IV. p. 790. t. CCXIX.

Sciurus (carolinensis) rufus, tæniis in dorso nigris, tæniis ex albo flavescentibus intermixtis. Briss. quadr. p. 155. n. 9.

Sciurus a Cl. D. Lyster observatus. Raj. quadr. p. 216.

Ground-squirrel. *Laws. Carol.* p. 124. *Catesb. Carol.* 2.
p. 75. t. 75. *Brickell N. Carol.* p. 129. *Edw. av.* 4.
t. 181. *Penn. quadr.* p. 288. n. 216.

Ecureuil Suisse. *Charlev. nov. Fr.* 3. p. 134.

Koesselvissla. *Kalm it.* 2. p. 419.

Habitat α) in omni Asia boreali ad fluvios europeos Dwina
& Kamausque, β) in America septentrionali magis orientali minusque frigida ad novam Hispaniam usque, in silvis sub terra, in qua criceti more, cum quo communies etiam habet buccas sacculiferas, cavernas sibi fodit pro habitaculo condendaque vicinus penu, concamerationibus distinctis; vicinitat feminibus variis, α) pinus cembrae potissimum, β) zea aliorumque cerealium, adeo ut segetibus infestus sit; β) difficile cicuratur.

Longitudo 6, β) 10 lineis 5 pollices superat; pondus numquam 3ij. Caput magis oblongum, quam præcedentibus; auriculae breviores, subrotundæ, calvæ; corpus magis attenuatum; pedes breviores; pili breves, aperi.

Estuans. 9. *S. griseus* subtus flavescens.

Sciurus (brasiliensis) coloris ex flavo & fusco mixti, tæniis in lateribus albis. *Briff. quadr.* p. 154. n. 7.

Sciurus brasiliensis. *Marcgr. brasili.* p. 230.

Brazilian squirrel. *Penn. quadr.* p. 286. n. 213.

Habitat in Brasilia & Guiana, 8½ pollices longus, cauda 10 pollices æquante, tereti, pilis nigris flavo annulatis; auriculae subrotundæ, imberbes.

Dschinschicus. 22. *S. testaceus*, fasciis lateralibus orbitisque albis, cauda nigra. *Sonnerat it.* 2. p. 140.

Habitat in provincia Indiæ Dschinschi; vulgari paulo major.

Variegatus. 23. *S. corpore supra nigro albo fuscoque variegato.* *Erxleb. mamm.* p. 421. *Schreber Saeguth. IV.* p. 789. t. CCXVIII. *Quauhtecallotl quapachtl aut Cozticotequallin. Fernand. nov. Hisp.* p. 9.

Coquallin. *Buff. hist. nat.* XIII. p. 109. t. 13.

Varied squirrel. *Penn. quadr.* p. 285. n. 211.

Habitat in nova Hispania, sub arborum radicibus aliisque in cavernis, in quibus etiam zea aliorumque cerealium pro hieme penum colligit.

Longitudo fere pedalis; auriculae breves, imberbes, una cum ore albæ; caput cetera nigrum aurantio mixtum; mystaces cum unguibus nigrae.

Dégus. 24. *S. fusco-flavescens*, linea humerali nigra. *Molinu hist. nat. Chil.* p. 269.

Habitat in Chili gregatim circa dumeta in cavernis, quæ consortium inter se alunt; vivit radicibus & fructibus, quorum penum colligit; non hybernat, ceterum myoxo gliri satis affinis. Caro olim edulis.

Mure rato paulo major; caput breve, rostrum acutum; auriculæ rotundatae; cauda apice floccosa, concolor.

mexica- 25. *S. cinereo-fuscus*, striis 5-7 albidis longitudinalibus. *Erxl. mamm. p. 428. n. 12.*

Sciurus (novæ Hispaniæ) obscure cinereus, tæniis in dorso albicantibus. Briff. quadr. p. 154. n. 8.

Sciurus rarissimus ex nova Hispania, tæniis albis. Sebm. mus. I. p. 76. t. 47. f. 2.

Tlamototl. Fern. an. p. 9.

Mexican squirrel. Penn. quadr. p. 286. n. 214.

Habitat in nova Hispania, 5½ pollices longus, cauda paulo longiore; auriculæ margo calvus; nas tæniis 7, femina 5.

madagaf- 29. *S. palmarum* digito medio calvo, valde elongato, plantarum pollice ungue rotundato.

Aye-Aye. *Sonner. it. 2. p. 137. t. 86.*

Habitat in occidentali parte insulæ Madagascar; caudæ longa non mensurata ultra 18 pollices longus, sub terra vivens, ignavus, timidus, soninolentus, vermitibus vicitans, quos digitorum ope ex arborum foraminibus extrahit, dubii generis, gressu moribusque bradypodi affinis, dentibus, cauda, pedibus pentadactylis sciuro propior.

Auriculæ amplæ, complanatae, nigrae, pilis longis horridæ; fasciculi pilorum supra oculos & nares, in genis & mento; lanugo ex albo fulva; pili longi nigri; facies & guttur ex albo fulvum; cauda sesquipedalis, complanata, pilis longis densis a basi ad medium albis, altera parte nigris teæda; digitæ pedum longi, unguibus palmarum omnibus, plantarum & subulatis, uncinatis.

An Sciurus gujanensis Bancrofti, ad vulgarem facie & magnitudine accedens, supra ex paido flavescente fuscus, lateribus subfuscusque albus, cauda longissima villosa maculata, & Sc. gujanensis de la Borde, mordax, facile tamen cicurandus, rufescens, ratto non major, solitarie in silvarum arboribus degens, maripæ, auræ, comæcæ seminibus vivitans, semel per annum 2 pullos pariens, propriam constituant speciem, judicent autoptæ.

*** volantes.

Volucel- 26. *S. hypochondriis extensis volitans*, cauda elongata villosa.
la. *Pallas glir. p. 353. 359. Schreb. Saeugth. IV. p. 808.*
t. CCXXII.

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetradactylis,
plantis pentadactylis, hypochondriis extensis volitans.
Syst. nat. XII. I. p. 75. n. 21. Mus. Ad. Fr. 2. p. 10.
Sciurus minimus, hypochondriis prolixis volans, ventre
albido. Brown. jam. p. 438.

Sciurus americanus volans. Raj. quadr. p. 215.

Quimichpatlan. Fern. nov. Hisp. p. 8.

Flying squirrel. *Catcsb. Carol. 2. p. 76. t. 76. 77. Edw.*
av. 4. t. 191. Penn. quadr. p. 418. n. 283.

Ecureuil volant. *de Pratz Louisiana. 2. p. 98.*

Polatouche. *Buffon hist. nat. X. t. 21.*

Habitat in temperatori & calidiori Americæ septentrionalis parte in silvarum arboribus gregatim, fructibus seminibusque vicitans, quæ respere noctuque conquirit, interdiu in nido ex foliis parato dormiens; facile & egregie cicurandus.

Corpus 5 pollices longum; caput paulo crassius; oculi maximi prominuli nigri; auriculæ subro-undæ, pellucidæ, subcalvæ, ex griseo cinereæ; mystaces nigræ, capite longiores; collum breve; pili tenerrimi, mollissimi, supra cinerci, apice flavi, subtus in medio albi, in ambitu cinerei; cauda teres, 4 pollicum. Cutis ab auribus ad brachia, & femora & caudam extensa, anterius ad brachia ad digitos usque & ad proprium officulum, calcari simile & tarso affixum firmatum, posterius ad femora ad tarsum usque; quam cutem dum extensis brachiis & femoribus tendit, in aëre suspenditur, & rectæ via quasi volando movetur; natat etiam.

hudso- 27. *S. hypochondriis prolixis volitans*, supra ex rubicundo nius. fuscus, subtus ex flavescente albido, cauda villosa plana.

Sciurus volans major. Pallas glir. p. 354.

Greater flying squirrel. *Forster act. angl. 62. p. 379.*

Severn River squirrel. *Penn. hist. p. 418. n. 282.*

Habitat in America septentrionali circa sinum Jacobi & flavidum Severn, vulgari vix major. Pili sat longi, basi ex atro cinerei, apice ex rubicundo fuscæ. Cutis tensilis, ut in Volucella, &c.

Volans. 10. *S. hypochondriis prolixis volitans*, cauda rotundata.
Schreber *Saeugth.* IV. p. 813. t. CCXXIII.

Sciurus hypochondriis prolixis volitans. Fin. succ. 2. p. 13.
n. 38. *Musc. Ad. Fr.* 1. p. 8.

Sciurus (volans) obscure cinereus cute ab anticis cruribus
ad postica membranæ in modum extensa volans, et
(sibiricus volans) dilute cinereus, cute ab anticis
cruribus ad postica extensa, volans. *Brisson quadr.*
p. 157. n. 12. et p. 159. n. 13.

Sciurus volans. Rzacz. aud. p. 316. Klein ad. angl. 1733.
t. 35. f. 1. *Seb. mus.* 1. p. 67. t. 41. f. 3. Pallas *glir.*
p. 355.

Sciurus petaurista volans. Klein *quadr.* p. 24.

Mus ponticus aut scythicus, *Sciurusve*, quem volantem
cognominant, licebit & *Sciurum latum* nominare. *Gesn.*
quadr. p. 743.

Quadrupes volatile Russiæ. *Duvernoi Conum*, Petrop. 5.
p. 218.

Polatouche. *Buffon hist. nat.* X. p. 95.

Flying squirrel. Penn. *quadr.* p. 293. n. 221.

Habitat in betuletis Sibiriæ, rarius Lapponiæ, Livoniæ,
Poloniæ, excepto coitus tempore solitarius, betulae gem-
mis, turionibus, ameuntis potissimum viicitans; interdiu
latent, ceterum hieme etiam, temperatoriæ aëre nidum ex-
muscis in arboribus cavis confectum relinquunt; membra-
nae inter femora expansæ auxilio per altitudinem 20
plurium orygarum devolvitur; sibilat; mordax; difficile
circurandus. Femina Majo 2-3, rarius 4 pullos parit.
Differt a Sc. Volucella magnitudine plus tota tertia parte
excedente, colore non in slavum iuclinante, sed supra
candidæ leucophæto subtus candidissimo, caudaque supra
vix fusco inunbrata; forma capitî breviore & magis glo-
bosâ; cauda breviore ex paucioribus vertebris composta,
vix dimidiam corporis longitudinem excedente; oculis
naso propioribus, circulo magis atro cinctis, artibus
anterioribus brevioribus, at posterioribus tibiis longior-
ibus. Pallas.

Sagitta. 11. *S. hypochondriis prolixis volitans*, cauda plano-pinnata
lanceolata.

Habitat in Java. Nordgren.

Tota statura sciuri vulgaris, palmani longus præter cau-
dæ, supra ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo-pollin-
dus. Caput ovatum. Auriçulæ ovatae obtuse vestitæ;

Mystaces longitudine capitis. Seta una in mala. Labium superius fissum, inferius breve. Dentes fusi, obtusiusculi. Pedes 4-5. Manuum calcar ectaceum, cartilagineum, longitudine ipsius ulnae intra cutem. Cutis extensa a capite ad carpum; a carpo ad genu in membranam testam concolorum ciliatam. Femora postice ciliata pilis. Pedes subtestacei; digitii omnes ultimo geniculo supra prominuli. Ungues compressi. Scrotum ovatum; magnum, vestitum. Praeputium elongatum vestitum. Cauda longitudine corporis, valde depressa, obtusa.

Petauri- 28. S. hypocondriis prolixis volans, supra saturatissime ex castaneo, subtus dilute ferrugineus, vel supra niger, subtus canus, cauda corpore longiore, villosissima, terete, nigricante, medio ferruginea. Pallas miscell. zoolog. p. 54. t. VI. f. 1. 2. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXIV.

Sciurus maximus volans s. Felis volans. Briss. anim. Lugd. B. 1762. p. 112. n. 15.

Civetta volans. Valent. Ind. 3. p. 269. 270.

Taquan. Hist. gen. des voyag. XV. l. 4. f. 9. p. 51.

Habitat in oceani indici insulis, congeneribus major, ut pedem & sex pollices longitudine æquet; caput magis globosum; mystaces unguisque nigri; feminae manum & 6 pectorales & abdominales, papilla longa, linearis.

MYOXUS. Dentes primores II. superiores cuneati.
inferiores compressi.

Mystaces longæ.

Cauda villosa teres versus apicem crassior.

Pedes æqualis longitudinis, anteriores tetradyctyli.

Glis. I. M. canus subtus albidus. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXV. Sciurus canus subtus albidus. Syst. nat. XII. 1. p. 87. Erxl. manim. p. 429.

Sciurus epilepticus, cinereus prussicus. Klein quadr. p. 54. Mus cauda pilosa, corpore supra obscure cinereo, subtus exalbido. Briss. quadr. 160.

Mus Glis. Pall. glir. p. 88. n. 33.

Glis. Gesn. quadr. 619. Aldrov. dig. p. 407. fig. p. 409. Jonst. quadr. p. 164. t. 67. Raj. quadr. p. 229.

MAMMALIA GLIRES. *Myoxus.*

Loir. *Buffon hist. nat.* VIII. p. 158. t. 24.

Fat squirrel. *Penn. quadr.* p. 289. n. 217.

Habitat in Europæ & Asiæ australis sylvis, rætere Aris-totelis, Mužo: Oppiani, glis Plinii, olim apud Romanos ob carnem sapidam in glirariis nutrita; vivit in glandibus, nucibus, pomorum seminibus; nidificat in cavis arborum, pullis 9-12; nördax; interdiu latet; autumno pingueſcit; Octobri gregatini migrat in latbras subterraneas, ibique hybernat in finem Maji usque. Pelles ob pilos mollissimos venduntur.

Longitudo corporis 6 pollicum, caudæ canæ 5; auriculæ tenues nudæ; genæ albæ; mystaces capite longiores. Mammæ 10, 6 pectorales, 4 abdominales.

Dryas. 2. M. ex griseo rufus subtus ferdide albus, linea nigra recta, utrinque per oculos ad auriculas ducta. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXV. B.

Colore, cauda breviore, magis villosa, maculæ nigrae pone auriculas defecū a Nitela diversus.

Nitela. 3. M. rufus subtus ex albo cinereus, macula nigra circa oculos & pone auriculas. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXVI. Mus (querinus) cauda elongata pilosa, macula nigra sub oculis. Syft. nat. XII. 1. p. 84. n. 15.

Mus Nitedula, Pallas glir. p. 88. n. 32.

Sciurus canus subtus albidus, macula nigra sub oculis. Erxl. mamm. p. 432. n. 15.

Glis supra obscure cinereus, infra ex albo cinerascens, macula ad oculos nigra. Briff. quadr. 161.

Mus avellanarum. Gesn. quadr. p. 833. Jonst. quadr. p. 168. t. 66.

Mus avellanarum major. Aldr. dig. p. 439. Raj. quadr. p. 419.

Lerot. *Buff. hist. nat.* VIII. p. 181. t. 25.

Garden-squirrel. *Penn. quadr.* p. 290. n. 218.

Habitat in Europæ & Sibiriæ australis præsertim hortis, quorum fructus omnis generis destruit, præsertim peregrina mala amat; nidificat in rimis murorum & cavis arboribus; coit vere, parit æstate 5-6 pullos; fortè ratti odorem spirat.

Corpus 5, cauda 4 pollices longitudine non excedit; oculi majusculi, nigri; auriculæ oblongæ.

Muscar- 4. M. rufus, gula albicante, plantarum pollicibus muticis-dinus. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXVII.

Sciurus avellanarius. Erxl. mamm. p. 433. n. 16.
 Mus (avellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo,
 gula albicante, pollicibus posticis muticis. Syst. nat.
 XII. I. p. 83. n. 14. Fn. suec. 35.
 Mus avellanarius. Pall. glir. p. 89. n. 34.
 Glis supra rufus subtus albicans. Briss. quadr. 162.
 Mus avellanarum minor. Raj. quadr. 220. Jonst. quadr.
 p. 168. Aldrov. dig. p. 439.
 Muscardin. Buffon hist. nat. VIII. p. 193. t. 26.
 Dormouse. Edw. av. 119. t. 266. Penn. quadr. p. 291.
 n. 219.
**Habitat in Europæ sepibus densis sylvisque, rarius in
 hortis. Colligit nuces, glandes, quas ereditus edit,
 superfluae defodit; nidum parat e gramine, muscis,
 foliis in cava arbore minus alta vel frutice; semina 3-4
 pullas parit; in Anglia altilis. Musculo æqualis, ut vix
 3 pollices longitudine attingat, at minus gracilis; oculi
 magni; prominuli, nigri; auriculæ breves, rotundatae,
 nudæ, tenues; cauda corpore vix longior.**

26. DIPUS. Dentes primores utrinque II.

Pedes anteriores brevissimi.

posteriores longissimi.

Cauda elongata, apice floccosa.

Jaculus. I. D. pedibus tetradactylis, palmarum unguiculo pollicari. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXVIII.

Jaculus orientalis. Erxl. manim. p. 404. n. 1.

Mus (jaculus) cauda elongata floccosa, palmis subpen-
 tadaætlylis, femoribus longissimis, brachiis brevissimis.
 Syst. nat. XII. I. p. 85. n. 20. Mus. Ad. Fr. 2. p. 9.
 Forsk. Fn. orient. p. IV.

Mus (jaculus vel ægyptius) pedibus posticis longissimis,
 cauda corpore longiore extremo villosa. Haffelq. it. Pal.
 198. ad. Stockh. 1752. p. 123. t. 4. f. 1. ad. Ups. 1750.
 p. 17. Pall. glir. p. 87. n. 27. t. XX.

Mus montanus. Moncon. ægypt. 288.

Myoxi omnes hybernant & dipodes; hi incedunt vel potius saliunt bipedes super pedum plantis, opitulante cauda elongata rigida ad 3-4 re pedum distantiæ; vescuntur solis vegetalibus, terram sordiunt subterranei; interdiu dormiunt, noctu vi-
 giles; cibum palmis ori admovent; aquam palmis digitis incurvatis hauriunt.

MAMMALIA GLIRES. Dipus.

Cuniculus pumilio saliens, cauda longissima. I. G. Gmelin
nov. comm. Petrop. 1760. Vol. 5. p. 351. t. 9. f. 1.

Cuniculus minorcau datus dauricus: *Mus.* Petrop. I. p. 344:
n. 123.

Cuniculus s. *Lepus indicus*; *Urias dictus*. *Aldrov.* quadr.
395.

Ægyptii mures alii. *Gesn.* quadr. p. 837.

Agnus filiorum Israël. *Pr.* *Alpin.* *Aeg.* p. 232.

Jerboa or *Gerboa*; & *Daman Israël*. *Shaw trav.* p. 248:
376.

Ægyptian & Siberian Gerboa. *Penn.* quadr. p. 295. 296:
n. 222. 223. t. 25. f. 3.

Gerbua. *Edw.* av. t. 219.

Gerbo. *le Brun* it. 287. t. 210.

Gerbo ou Gerboise & *Alagtaga*. *Buff. hist. nat.* XIII: p. 141:
Erdhaase. *S. G.* *Gmelin* it. I. p. 26. t. 2.

Lepus cauda elongata. *Syst. nat.* Ed. IX. n. 4.

Habitat in Ægypto, *Arabia*, *Calmuccia*, & *australi Sibiri*:
in solo *firme*, *campisque herbidis*; *quiescens plantas*
abdomini applicat, & *supra genua inflexa sedet*, *palmæ*
vero gulæ admoveat, *ita ut vix conspiciantur*; *hominem*
non valde metuit, *neque tamen penitus curatur*; *vesciatur*
radicibus, *granine*, *tritico*, *sesante*, & *certe*, *qui in*
Sibiria habitat, *scenun ante hiemem secat*, *secatumque*
in acervos rotundiuseulos coactum cuniculis importat.
Caro Calmuccis Arabibusque edulis.

Corpus ultra 7 pollices longum; *facies leporis*, *pedes*
posteriore unacum fenestribus nudis anterioribus triplo,
corpore etiam longiores. *Cauda 10 circiter pollicum*,
pallide fusca, *extremo nigro apice albo*; *mammæ 8*
remotissimæ; *pili supra pallide fusci*, *subiùs candidi*,
auriculæ pedesque carnei coloris.

Sagitta. 2. D: *plantis tridactylis*, *unguiculo pollicari nullo*. *Schreber*
Saeugth. IV. t. CCXXIX.

Mus Sagitta. *Pallas* it. 2. p. 706. *glir.* p. 87. t. XXI.

Habitat in Arabia & *ad Irrim fluvium* *in arena mobili cam-*
pisque arenosis aridissimis: *corpore modo 5 pollices cum*
11 lineis, *cauda minore flocco terminata 6 pollices*
cum 5 lineis, *artibus posterioribus 6 circiter pollices*
longa, *horum femora minus crassa* & *carnosa*, & *digitis*
subtus pilis longis hirsutissimis vestiti; *auriculæ capite*
magis globoso multo longiores.

cafer. 3. D. palmis pentadactylis, plantis tetradactylis. Schreber Saeugthiere, IV. t. CCXXX. Pallas glir. p. 87. n. 29. Yerbua capensis. I. R. Forster & Sparrmann ad. Stockh. an. 1778. 2. n. 3. & 4. t. 3. Miller on various subj. of nat. hist. t. XXXI. A. B.

Habitat in Capite bonæ spei, reliquis major 12 pollices longus, colore supra spadiceo, subtus ex slavecente albo; capite magis oblongo, rostro acutiore, auriculis longioribus, unguibus, palmarum potissimum, multo longioribus, cauda villosissima, 17 pollices longa, apice nigra distincta. Aqua in cavernas dudæ pellitur. Caro sapida.

meridiana- 4. D. palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, cauda concolore. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXXI.

Mus meridianus. Pallas it. 2; p. 702. longipes. glir. p. 88. n. 30. t. XVIII. B.

Mus (longipes) cauda elongata vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis. Syst. nat. XII. t. p. 84. n. 19.

Mus cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine corporis flavi. Mus. Ad. Fr. t. p. 9.

Jaculus palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. Erxleb. mamm. p. 409.

Torrid Jerboa. Penn. quadr. p. 297. n. 224.

Habitat in torridis regionibus, in deserto quoque arenoso, versus mare caspium, Uralem fluvium & Wolgam interjacente, ubi pterococci astragalorumque quorundam seminibus vescitur; cuniculos trifores ulnam circiter profundos fodens.

Corpus 4 pollices cum 9 lineis longutri, supra pallide fulvum aliquando subgriseum, subtus latteum postice incrassatum; caput magis oblongum, quam jaculo, rostro produciatore; auriculae insignes ovales; os pedesque albi; horum volæ villosissimæ, anteriorum pollex vix unguiculatus; posteriorum femora carnosissima; cauda vix ultra 3 pollices longa, crassa, largiter pilosa.

tamaricinus. 5. D. palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, cauda obsolete annulata. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXII.

Mus tamariscinus. Pallas it. 2. p. 202. glir. p. 88. n. 31. t. XIX.

Habitat in saltis versus mare Caspium sitis, tamaricem & nitrarium ferentibus, quorum forsitan vescitur fructibus, quorumque sub radicibus cuniculos agit profundissimos biformes.

*Elegantissimus longitudine æquat sex pollices, sexque ll-
neas; colore supra ex griseo lutescente subtus albo; oculi
majusculi, superciliis orbitisque albis; auriculae magnaæ,
ovales, nudiæ sulcæ; palmarum verruca pollicaris insig-
nis; cauda vix pollices superans, pilosa, apice sub-
floccosa.*

22. LEPUS. *Dentes primores II, superiores dupli-
cati; interioribus minoribus.*

* *caudati.*

Viscaccia. 5. L. cauda elongata setosa. *Molina hist. nat. Chil.* p. 27.
Alia species cunicularum, quem vocant Vizcacha. *Latt.
amer.* p. 407.

Viscacha. *Nieremb. hist. nat.* p. 161.

Les Viscachos. *Feuillée obs.* 3. p. 32.

*Habitat in regni Peruani & Chilensis frigidioribus, ad mon-
tium radices & in planicie, cuniculo moribus facie que,
vulpis colore & cauda, qua se adversus hostes defendit,
similis, cavernas sibi fodientes in duas contignationes par-
titas, quarum una habitaculo inservit, inferior condendo
vidui, quem noctu conquirit. Pili tenerrimi mollissimi,
ut telas ex iis contexerent sub Yncarum imperio Peruani
pileos hodienum conficiant Chilenses. Caro alba, tenera,
sapida.*

timidus. 1. L. cauda abbreviata, auriculis apice nigris, capite longo-
gioribus. *Faun. suec.* 25. *Schreber Saeugthiere*, IV.
t. CCXXXIII. A.

Lepus. *Gesn. quadr.* 69. *Aldr. digit.* 247. *Jonst. quadr.*
t. 65. *Raj. quadr.* 204.

Lepus cauda abbreviata, pedibus posticis longitudine
corporis dimidii, auriculis apice nigris. *Erzl. mamm.*
p. 325. n. I.

Lièvre. *Buffon hist. nat.* VI. p. 246. t. 38.

Common Hare. *Penn. quadr.* p. 248. n. 184.

Hare. *Ridinger jogdb.* Th. t. 13.

β. cornutus, (nisi fabulosus). *Schreber Saeugthiere*, IV.
t. CCXXXIII. B.

Lepores cornuti. *Klein quadr.* p. 52. t. 3.

*Habitat ubique in Europa, in Bulgaria frequentissimus, in
Oriente quoque, Perlia boreali, Japonia, Zeylona, per-
que totam fere Asiam, in Ægypto, Barbaria, America
boreali, ipsoque regno Chileni; noctu pascitur; ruitus*

ruminans ramulis fruticum, cortice arborum; inermis timidusque auditu & visu excellit, atque cursu valet in primis montem ascensurus, currit gyros sensim breviores, retro deviat exiliendo; capit a canibus, felibus, accipitribus; proiecō sub venatu in altum pīlo se occultat sub proximo frutice metu accipitris; mordet truncum transcendendum, cervice fragili; delectatur tympano, pulicibus obnoxius; nīna fœtida non in cubile mittenda; mas in propriam servit prolem; adolescit primo anno, & octo annos non superat; immensus parturitione per totam æstatem, superflūtatione haud rara; coit primum Februarij & Martio; semina clitoride magna instruāta, per 30-31 dies grāvida 3-4 pullos parit.

Longitudo circiter bipedalis; oculi magni extantes, membrana nictante, dormientis aperti. Mentum album; nares humidæ, motitantes; labium superius fissum; pili faciei, dorsi, & laterum basi albi, medio nigri, apice rufi; gula cum pede rufa; venter albus; cauda supra nigra, subtus alba; femora postica crassa; pedes lanati; cavitas utrinque e regione pubis.

Lagographia Waldungii W. Amberg. 1679. 4. & Paullini C. F. Vienn. 1691. 4. Anatome E. N. C. d. I. a. 2. obs. 251. & ann. 3. obs. 93. & d. 3. ann. 5. obs. 225. Bartholin. ad: Hafn. 1671. n. 136.

Variabilis. 6. L. cauda abbreviata, excepto auricularum capite breviorum apice nigro hieme totus albus. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXV. B. Pallas glir. P. I. T. IV. f. I. Lepus (albus) caudatus plane candidus. Briss. an. p. 139. n. 2. Lepus albus. Aldrov. dig. p. 349. Wagn. Helvet. 177. Lepus albissimus. Klein. quadr. p. 51. Lepus candidus. Jonst. quadr. p. 160. Alpine hare. Forster ad: angl. LXII. p. 375. Penn. quadr. p. 249. t. 23. f. I.

niger. β. caudatus plane niger. Briss. anim. p. 139. n. 3. Lepus niger. Klein. quadr. p. 52.

hybridus. γ. hieme lateribus tantum albescens. Schreb. Saeugth. IV. t. CCXXXV. C.

Habitat in alpinis & frigidioribus Europæ, Asiæ & Americae regionibus; β) rarer colorem non mutans in Russia & Siberia; γ) ex variabili & timido prognatus in Russia australi; in Siberia & Russia aliquando in campestria migrans, vere in montes revertens.

MAMMALIA GLIRES. *Lepus.*

Timido major, ut 4 pollicibus & ultra longitudine superet duos pedes; ast caro durior, minus sapida; artus breviores; cauda minor ex paucioribus vertebris composita, per totum annum penitus alba; velleris color cestivus in γ) ad timidi satis accedit; β) fuscus, niger, aliquando aterrimus nitidus, uti per integrum annum; α) in capite ex griseo rufescens, aurium dorsique fuscus, cervicis e fuso cinerascens, laterum sensim incanescens, ventris canus.

americanus. 7. L. cauda abbreviata, pedibus posticis corpore dimidio longioribus, auricularum caudæque apicibus griseis.

Erxl. mamm. p. 330. n. 2. Schoepf. Naturf. XX. p. 32.

Lepus (hudsonius) apice aurium caudæque cinereo.

Pallas glir. p. 30.

Hudson's bay quadruped. *Barrington act. angl. LXII. p. 11.*

American Hare. *Forster: act. angl. LXII. p. 376.*

Habitat in America boreali nocturnus sub arborum radibus inque cavis arboribus, nec sodiens; femina semel vel bis in anno 5-7 pullos parit.

Color idem, qui timidi; magnitudo inter variabilem & cuniculum media; pedes posteriores longiores, quam huic. Cato bona.

Tolai. 8. L. cauda abbreviata, auricularum margine summo nigro,
Pallas glir. p. 17. t. 4. f. 2. Schreb. Saeugthiere, IV. t. CCXXXIV.

Lepus (dauricus) cauda elongata, gula nigra. *Erxl. mamm. p. 335.*

Cuniculus insigniter caudatus coloris leporini. I. G.
Gnielin nov. comm. Petrop. V. p. 357. t. II. f. 2.

Tolai. *Buff. hist. nat. XV. p. 138.*

Baikal-Hare. *Penn. quadr. p. 253. n. 188.*

Habitat trans lacum Baikal Siberiae in deserto Gobensis ad Tibetum usque, major præcedentibus speciebus, astate colore fere eodem, quo variabilis, hinc tamen vis mutato paulo dilutiori; pedes, quam huic graciliores, femora posteriora longiora; cauda longior quam cuniculo & variabili, brevior autem, quam timido, hujus ad caudam area quoque illa nigra accedit. Pondus hibernum adulti 7 fere librarunt ruficarum; femina

gravidæ Aprili 8 $\frac{1}{2}$.

Leporibus pedum anteriorum digiti 5, posteriorum 4.

minimus. ♀. L. caudá abbreviata, auriculis pilosis concoloribus.
Molina hist. nat. Chil. p. 272.

Habitat in regno Chilensi, mure arvensi vix major, corpore fere conico, auriculis parvis, acutis, rostro oblongo, palnis tetradaedylis, plantis pentadaedylis, pilis tenuissimis, at brevibus, carne alba; sapida, Chilenibus domesticus; cuniculo colorum varietate, fertilitate, qua femina singulis fere mensibus 6, 7 & plures pullos parit, & hoffibus, felibus scilicet ratisque similis, sed eum abhorrens.

Cuniculus: ♂. L. cauda abbreviata, subconcolore, auriculis apice atris, cruribus posticis trunco brevioribus. *Pallas glir. p. 30. Erxleb. mamm. p. 331. n. 3. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXVI. A.*

Lepus cauda abbreviata, auticulis nudatis. Syst. nat. XII. I. p. 77. Fn. suec. 2. p. 10. n. 26.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris. Syst. nat. II. p. 46. VI. p. 9. n. 3. Mus. Ad. Fr. I. p. 9.

Lepus (Cuniculus nostras) caudatus obscure cinereus. Briss. regn. anim. p. 140. n. 4.

Cuniculus. Plin. hist. mund. VIII. c. 29. 55. 58. Agric. anim. subt. p. 16. Gesn. quadr. d. 394. Aldrov. dig. p. 382. fig. p. 385. Jonst. quadr. p. 161. t. 65. Raj. quadr. p. 205.

Lapin, Lapin sauvage. Buff. hist. nat. VI. p. 303. t. 50. Rabbet. Penn. quadr. p. 251. n. 186.

domesticus. β. C. oculis pulchre rubris.

Lapini domestique. Buffon hist. nat. VI. t. 51.

- a. colore nigro. Schreb. Saeugt. IV. t. CCXXXVI. B.
- b. colore albæ;
- c. colore variegato.

argentatus: d. pilis ex argenteo cinereis, pedibus fuscis.

Lepus caudatus dilute cinereus. Briss. regn. an. p. 191. n. 5.

Le Riche. Buffon hist. nat. VI. t. 52.

Silver-haired Rabbet. Penn. quadr. ind.

angorensis. γ. C. pilis longioribus undulatis sericeis. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXVI. C.

Lepus (Cuniculus angorensis) caudatus pilis tenuissimis & longissimis toto corpore vestitus. Briss. regn. an. p. 141. n. 6.

MAMMALIA GLIRES. Lepus.

Lapin d'Angora. *Buffon hist. nat. VI. t. 53. 54.*
Angora-Rabbit. *Penn. quadr. p. 252. n. 186. β.*

russicus. ♂. cinereus capite auriculisque fuscis, pelle dorſi gulæque faccata.

Russian rabbit. *Penn. quadr. p. 252. t. 23. f. 2.*

Habitat in temperatis & calidioribus Europæ, inque calidioribus Asiacæ & Africæ, e. g. in Madera, hospitatur quoque in frigidioribus; cuniculos agit in arenosis, interdiu latens; capitum a falconibus, mele, putorio; ad octo vel novem usque annos vivit; femina per 30-31 dies gravida, septies per annum 4-8 pullos parit, sexto vitæ mense adultos. Pellis, præsertim ♂d, & ♀, bona; caro alba passim esculenta.

Lepore timido minor, circiter sesquipedalis; auriculae capite breviores; færi color ex fusco cinereus, cauda supra nigra subtus alba.

Anatome. *Perv. obs. 10.*

capensis. 3. L. cauda longitudine capitinis, pedibus rubris.

The cape Hare. *Penn. quadr. p. 253. n. 189.*

Habitat ad Caput bonæ spei; fodiens, cauda rufa. *I. Burmannus.*

* * ecaudati.

brasiliensis. 4. L. auritus, collari albo, cauda nulla. *Pallas glir. p. 30.*
Lepus cauda nulla. *Syst. nat. IX. n. I. XII. I. p. 78. n. 4.*
Cuniculus brasiliensis. *Tapeti. Marcgr. bras. 223. Pl. bras. 102. Raj. quadr. 205.*

Tapeti. *Buffon hist. nat. XV. p. 162.*

Brasilian Hare. *Penn. quadr. p. 252. n. 187.*

Habitat in America meridionali; non fodiens, facie cuniculi, magnitudine & colore timidi.

pumilus. 10. L. ecaudatus, fusco griseo que mixtus, auribus subtriangularibus albo marginatis. *Pallas glir. p. 30-45. t. I. & 4.*
f. 3-9. & nov. comm. Petrop. XIII. p. 534. t. 14. & it.
I. p. 155. 2. p. 533. 3. p. 498. Schreber Saeugth. IV.
t. CCXXXVII. Lepechin it. I. p. 260.

Lepus cauda nulla, auriculis rotundatis. *Mant. II. p. 522.*

Lepus cauda nulla, auriculis brevibus rotundatis. *Erxleb. mamm. p. 338. n. 8.*

Habitat in Australioribus montium Uralensium promontoriis, herbidis collibus & convallibus apricis, passim quoque ad Iuliu & inter apricos montes regionis metalliferæ sub alpi-

bus altaicis sitæ, cytisi supini, robinia frutescentis, cerasi pumilæ, mali sylvestris flores, frondes, corticem potissimum amans, in locis siccis cuniculos fodiens, voce quam maxime sonora per omnem annum, excepta hieme, se prodens, mitis, & facile cicurandus; parum dormit, sed saepius potat; elumbis & quasi subfultans, non tamen celeriter incedit, noctu vigil; inter calidissima animalia; femina Maji fine parit pullos 5-6.

*Pondus nunquam 3*iv* 3*viii*, hieme vix 3*vii* 3*viii*, longitudo 6 pollices 9 lineas excedit; color vix mutatur; pilis rigidiusculis supra pallide griseis & apice nigrescentibus, ad imam latera pedesque extremos pallide lutescentibus, subtus ex canescenti albidis, ad gulam canis; caput magis oblongum, quam prægressis; truncus gracilis agitabundus, exilis; oculi surini; artus breves; vellus mollissimum, prolixum, lanugine tenerrima ex fuscescente plumbea.*

alpinus. II. L. ecaudatus rufescens, auriculis rotundatis plantisque fuscis. Pallasit. II. p. 569. & 701. t. A. glir. p. 30. & 45-59. t. 2. & 4. f. 10-12. Schreber Sæugthiere, IV. t. CCXXXVIII.

Lepus cauda nulla, auriculis elongatis, corpore lutescente. Erxl. manu. p. 337. n. 7.

Mustela daurica cauda carens corpore breviore & crassiore, pilis in dorso rufescentibus, Ochodona daurica anurinos. Catal. nus. Petrop. p. 343. n. 114. 115.

Habitat in magni jugi altaici ad ultimum usque Asie angulum, montiumque ultra Jeniseam Lenam sutorum aspermis & inaccessis scopolis, ubi inter sexa cuniculos agit, aliquando in caris arborum truncis degens, interdui, nisi celo turbido latens; vocem acutam, quasi sibilula edit; Augusto gramyna potissimum silvatica molliissima & tenerrima aliasque herbas secat, & secata Septembri in acervos fere conicos compingit, hieme nive obtecos, tramite cum antris conjunctos, venaturum equis in pabulum cessuros; capitur a mustela zibellina & fibrica, infestatur oestro leporino.

*Pondus a 3*iv* ad 1*1*/₄, longitudo a 7 pollicibus ad 9 & 7 lineas variat; facies magis stupida & fera, quam pullo; caput magis oblongum & tenuius; rostrum minus obtusum; oculi satis exigui, nigri; auriculæ magnæ; corpus mi-*

Leporibus omnibus, excepto Molinæ fitæ minimo, palmæ pentadactylæ, planæ tetracylæ.

MAMMALIA GLIRFS. *Lepus.*

nus elongatum & magis ventricosam. Mammæ 2 inguinales, 4 thoracicæ. Color subtilis magis obsoletus; gula summa cinerascens.

Ogotona. 12. *L. ecaudatus*, griseo-pallidus, auriculis ovalibus subacutis concoloribus. *Pall. glir. p. 30. 59-70. t. 3. & 4. f. 14-16. Schreber Saeugth. IV. t. CCXXXIX.*

Musleia mungalica, cauda carens, corpore breviore, Ochodon mungalica Messerschmidii. Cat. Mus. Petrop. I. p. 343. n. 112.

Habitat in montosis ultra lacum Baikal sitis, & per omne Mongolorum, præsertim Gobeenie desertum, in rupestribus quidem inter lapidum acervos in arenosis in cuniculis bi-vel triforis, quorum plures aliquando uni inserviunt; noctu potissimum vagans; voce acutissime stridula, pyri baccatae corticem, ulmique pumilæ virgulta amans, vere etiam alias in arena nascentes herbas comedit, quis autumno in acervos colligit; agilissimus vix circuatur; capitum a mystelis variis, fele manal, falconibus minoribus, picis caudatis, strigibus.

Difserit ab aliño & puillo, quibus satis similis videtur, magnitudine, pondus enim in seminis aliquando vix ʒiv, in maxillis nunquam ʒviii æquat, longitudo 6 polices 7 lineas vix excedit, a posteriore, cui similius, colore per omnem annum pallidissimo, pedibus robustioribus, apiculatum figura & fusco colore.

HYRAX. *Dentes primores superiores II lati distantes; inferiores IV contigi latos plani, bis crenati, molares magni ubique IV.*

Palmæ digitis IV.

Plantæ digitis III.

Cauda nulla.

Claviculæ nullæ.

capensis. I. *H. palmarum unguibus planis, plantarum unico subulato.* Schreb. Saeugth. IV. t. CCXL.

Cavia capensis. Syst. natur. XII. 3. p. 223. Pallas miscell. zoolog. p. 34. t. 3. & 4. f. 5-13. spicil. vol. fasc. 2. p. 16. t. 2. 3.

Cavia (capensis) ecaudata, dentibus primoribus infra quatuor. Erxl. mamm. p. 352. n. 3.

Marmotte du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. Suppl. ed. 12. Tom. V. p. 293.*

Cape cavy. *Penn. quadr. p. 247. n. 182.*

Klipdas. *Gr. a Mellin Schrift. der berl. naturf. Ges. III, p. 271. t. V.*

Habitat ad Caput bonæ spei.

*Vox acuta, auditus acris, incessus reptabundus, vix
vegetabilis; agilis, mundus, parum bibit, salit, caloris
amantissima. Pediculi & teniae. Magnitudo circiter
marmotæ, ut adulta tribus pollicibus tribusque lineis
pedem superet: Caput breve; rostro brevissimo obtuso,
occipite crassò; oculi mediocres; auriculæ ovales patulæ,
semi-absconditæ, lanuginosæ, fuscæ; artus brevissimi,
humeris femoribusque intra pellem latentibus. Corpus
breve, trunco contracto, abdomine ventricosissimo. Vellus
lanugineum intus canescens, extus griseum, ad latera
sordide ex griseo album; in dorso longitudinaliter sub-
fuscum, pilis longioribus rudioribus nigris exstantibus,
præter setulas longiores passim in vellere sparsas. Pal-
mæ quadrilobæ, loborum apice ungue plano orbiculato
notato; plantæ ex binis lobis & digito unguiculato,
compositæ.*

syriacus, 2. H. pedibus unguiculatis. Schreber Sæugth. IV.t.CCXI.B.

Habitat in Syria.

*Corpus magis elongatum, dorso setis ex acie prominentibus
notato, supra fuscum, infra exalbidum. Rostrum magis
oblongum. Ungues brevissimi.*

V, P E C O R A.

*Dentes primores superiores nulli.**inferiores VI aut VIII a molari-
bus remotissimi.**Pedes ungulati.**Mammæ inguinales.*27. CAMELUS. *Cornua nulla.**Dentes primores inferiores VI spa-
thiformes.**laniarii distantes, superio-
res III,
inferiores II.**Labium superius fissum.*

Drome-
darius. 1. C. topho dorsi unico. *Briss. quadr. 45. Raj. quadr. 143.*
Forsk. Fr. orient. p. IV.

Camelus vulgaris. Forsk. Fn. orient. p. IV.

*Camelus Dromas. Gesn. quadr. p. 171. fig. p. 172. Pr.
Alpin. æg. I. p. 223. t. I.*

Camelus. Jonston quadr. p. 95. t. 41. 42. 43.

*Dromedarius. Gesn. Thierb. p. 234. f. p. 234. Charlet.
exerc. p. 13.*

Arabian Camel. Fenn. quadr. p. 60. n. 50.

*Habitat ferus in Asia temperatae desertis, rario ad utrum-
que montium Soongoricorum latus, ad finivm Ili, mon-
tem Musart, & in Mongolia, Sibiria finitima; junior ci-
curatus & cultus in omni Oriente, Africa, ipsique insulis
Jamaica & Barbados, varietate numerofissima, nititis, nisi
oestro agitatus; pro itineribus in desertis arenosis siccicolo-
sis portandisque oneribus utilissimus; portat enim ad
1200 libras; lente festinat, nec ultra ad suetum per-
currit spatium, nec plus instituto onere recipit; famem
fert patientissime, potuque per plures dies caret, stirpibus
desertorum spinosissimis, reliquis animantibus detestatis
contentus. Pellis pretiosa; caro Arabibus in delicis;
lac potulentum.*

*Pili molliores, coloris ex rufo cinerei, in collo & topho lon-
giore; altitudo 6 $\frac{1}{2}$ pedum; caput parvum, auriculis bre-*

vibus, ore & gingivis cartilagine obductis; collum longum, gracile, curvatum; pedes bifidi, callis in anterioribus quatuor, in posterioribus duobus; cauda pedibus brevior; sternum callo unico; ventriculus secundus celulosis pro aqua pura in fistulosis desertis diutius aſſervanda Camelus Arabiæ Veterum.

bactrianus. 2. C. tophis dorſi duobus. Briff. quadr. 53. Forſter að. angl. Vol. 57. p. 343. Forsk. Fn. orient. p. IV. Raj. quadr. p. 145.

Dromedarius. Jonſt. quadr. p. 42. 43. 44. f. I.

Camelus turcicus. Pr. Alpin. æg. I. p. 223. t. 13.

Camelus. Gesn. quadr. p. 162. f. p. 163. Schwenckf. theriotr. p. 72. Aldrov. bis. 907. 839.

Chameau. Buffon hist. nat. XI. p. 211. 426. t. 22.

The bactrian Camel. Penn. quadr. p. 63. n. 51.

Trampelthier oder Dromedar. Knorr delic. nat. sel. tab. K. 6.

Habitat ferus in India boreali & versus Sinam in desertis, cultus in Oriente & Africa, præcedenti rarior, pro magnatibus, major & cursu celerior, topho postiore majore, ceterum satis affinis; occiditur buxo; coit difficillime, mense Februario, semina per integrum annum gravida parit unicum pullum, per duos annos lactandum, & tertio anno adultum caput & Camelus bactrianus veterum.

Ex hoc & Dromedario hybridis.

Glama.

3. C. dorſo lævi, topho peſtorali.

Camelus pilis brevissimis. Briff. quadr. 55.

Camelus peruvianus, Glama dictus. Raj. quadr. 145.

Pelon Ichiatl Oquitli, Ovis peruviana. Hernand mex. p. 660.

Ovis peruviana. Charlet. exerc. p. 9. Jonſt. quadr. t. 46.

Cervocamelus. Jonſt. quadr. t. 29.

Hirschcamel. Gesn. Thierb. p. 239

Лама перуанская. Marcgr. brasil. p. 243.

Llama. Laet amer. p. 405. Ulloa voy. I. p. 365. t. 24.

f. 5. Penn. quadr. p. 64. n. 52.

Lama. Buffon hist. nat. XIII. p. 16.

Habitat in montibus regni Peruani alticribus, moribus, cursu, usi, ruminatione diffcili coitu, famis fitisque tocentia, habitu extero & fabrica interna præcedentibus similis; collum longum, caput parvum inerme, auriculae mediocres, oculi magni, rotundi, nasus brevis, pedes

MAMMALIA PECORA. Camelus.

longiores, fissi, cauda brevis, pili longi, qui trahi in fila possunt; ventriculi 4, quorum secundus cellulosus; mari penis longus, tenuis, retro flexus, feminæ, quæ raro gemellos parit, vulva angusta; miltis, docilis, gressu firmo, seculo, cicuratur.

Ast differt altitudine minore, vix 4 $\frac{1}{2}$ pedibus æquali; longitudine sexpedali; pinguedine multa subcutanea, auriculis acutis melius formati, collo minus incurvato, dorso æquabiliori, cauda pulchriore, pedibus elegantioribus, setis æqualibus, cursu celeriore, pilis longioribus mollioribus, ex albo, nigro & fuscō variis, tubere pectorali, oleo fluido continue madente. Vox hinniens. Arma pedes, dentes, saliva, quam in hostes expuit; salax, jam triennis, sub finem æstatis coit fere furens; semina per quinque aut sex menses gravida, mammis binis instructa, parit pullum unicum. Portat ad 150 libras, & per tres quatuorve dies continuos tria quotidie milliaria germanica, tunc per diem quiescens, fatigatus succumbit; compressis testiculis compellitur obstinatus. Caro veræ vecinæ æmula.

Huanacus. 5. C. corpore piloso, dorso gibbo, cauda erecta. *Molina hist. nat. Chil. p. 281.*

Pernichcatl. Fernand. anim. p. 11.

Guanaco, sive Huanacu. Laet amer. p. 406. Ovalle Chile. p. 44. Cieza Peru. p. 233. Ulloa voy. I. p. 366. t. 24 f. 5. Hawkesw. secr. I. p. 148.

Habitat in montium catena, Cordilleras, hieme planities regni Peruani & Chilensis frequentans, ad Glamam quidem moribus, usū, multisq[ue] notis eternis accedens, sed nec feruus, nec cicuratus unquam cum ea coiens, de sedu præterea topi pectoralis, dorso gibbo, pedibus posterioribus brevioribus, cursu magis subfultante satis distans; supra flavus, subius exalbidus, septem circiter pedes longus, & tres pollices ultra quatuor pedes altus; cauda cervinæ; auriculæ equinis similes. Caro juniorum sapida, adultiorum paulisper dura, nisi salita.

arcucanus. 6. C. corpore lanato lœvi, rostro superne curvo, cauda pendula. *Molina hist. nat. Chil. p. 279.*

Aries moromorus. Nieremb. hist. nat. p. 182.

Sheep. Ovalle Chile. p. 44.

Sheep of Peru. Cieza Peru. 232.

Moutons. Feuillé journ. 3. p. 23.

Moutons de Perou. Frézier voy. I. p. 264. t. 22. f. A.

Habitat in regnis Chilensi & Peruano, præter collum longum & pedes altos capite, rostro, auriculis flaccidis pendulisque, oculis, cauda (breviore tamen), lana (moliore tamen), aristis satis similis. sex circiter pedes longus, & posterius, vix ultra quatuor pedes altus, nunc albus, nunc niger, nunc fuscus, nunc cinereus. Caro sapida.

Olim ad portanda onera, arandaque arva adhibitus, & ex lana vestimenta contexta, nunc pretiosiores modo telæ, sericeis nitore similes.

Vicugna. 7. C. corpore lanato laevi, rostro simo obtuso, cauda erecta.
Molina hist. nat. Chil. p. 277.

Vicuna, Vicunna, Vicunas. *Laet amer. p. 406. Nie-remb. hist. nat. p. 184. f. p. 185. Cieza Peru p. 233. Ulla voyag. I. p. 506. 525. t. 24. f. 3.*

Vicognes ou Vicunas. *Fréz. voy. I. p. 266.*

Camelus (Vigogne) pilis prolixis toto corpore vestitus.
Briss. ann. p. 57. n. 4.

Habitat in abruptis cacuminibus montium Cordilleras, præsertim in provinciis Chilensisibus, Coquimbo & Copiapo, gregarius, frigoris patientissimus, timidus, celerrimusque, funi adspicet alligatis panniculis, difficeretur cicurandus, carne sapida, lana pileis & telis idonea, ad sericeas accendentibus.

Caprae hirco habitu caudaque aliquantum similis, ast colla viginti pollices longo, capite rotundo inermi, auriculis parvis ereditis & acutis, rostro brevi, pedibus duplo altioribus, lana egregia tenerima, rosea, facilime tingenda, ab hac; corpore graciliore, rostro lanaque breviore, hac autem teneriore a Paco distincta, cum qua non coit. In ejus ventriculo bezour,

Paco. 4. C. tophis nullis, corpore lanato, rostro oblongo.

Camelus peruvianus laniger Pacos dictus. *Raj. quadr. 147. Klein. quadr. p. 42.*

Alia species Pacos dicta. *Hernand. Mex. p. 663.*

Paco. *Laet amer. p. 405. Buffon hist. nat. XIII. p. 16.*

Alpagne. *Fréz. voy. I. p. 267.*

Pacos. *Penn. quadr. p. 66. n. 53.*

Habitat in regni Peruani montibus altioribus, gregarius, præcedentibus minor, & oneribus 50-70. libras excedentibus portandis impar; caro minus bona, lana, quam vicugnae, quidem longior, sed minus tenera, supra in

*fero animali purpurea, subtus alba, in cicurato nigro,
albo rufoque variegata, ad parandas telas, semisericeas
rum similes, adhibita.*

28. MOSCHUS. *Cornua nulla.*

*Dentes primores inferiores VIII.
laniarii superiores solita-
rii exserti.*

moschifex 1. M. folliculo umbilicali. *Pallas spicil. zool. fasc. 13. t. 4-6.
rus.* Schreber *Saeugth. V. t. CCXLII.*
Moschus. *Schroeck hist. mosch. Vienn. 1682. 4. t. 4.
Brun. it. 121. t. 121.*
Animal moschiferum. *Nieremb. hist. nat. p. 184. I. G. Gnit-
lin nov. comm. Petrop. IV. p. 393. Raj. quadr. p. 127.*
*Capreolus moschi, Bisamthier. Gesn. quadr. p. 786. Thier-
p. 50. fig. p. 50. 51. Jonst. quadr. t. 29.*
*Capra moschi. Aldrov. bisalc. p. 743. f. p. 744. Jonst.
quadr. p. 78. Charlet. exerc. p. 10.*
Tragus moschiferus, moschus. *Klein quadr. p. 18.*
Tragulus (moschus) ad umbilicum folliculum moschiferum
gerens. *Briss. regn. anim. p. 97. n. 5.*
Mus. *Buff. hist. nat. XII. p. 361.*
Tibet-Musk. *Penn. quadr. p. 56. n. 46. t. 10. f. 1.*
Habitat in maximis & palmaribus Ailiæ magis orientalis
jugis alpinis, præsertim altissima totaque rupibus &
montibus inclusa regione, inter Altaicas alpes easque,
qua Tibetanos ab Iadis dirimunt, interposita, solitaria,
rupestria prærupta, convalles altis frigidisque montibus
inclusa, pineta intermontana, promontoria nivalium
cacuminum quam maxime sequens; sexto jam seculo e
Cosma dictus; saliendo, currendo, scandendo, nano
agilissimus, timidissimus & difficulter cicurandus; No-
vembri & Decembri coit, maribus mordicus pro venet
pugnantibus, mite ceterum animal. Caro edulis, ju-
niorum sapida.

Pecoribus ventriculi 4: Rumen, reticulum, omasus, abomasus; ideoque ruminantia
phytiphaga & sebifera; ungulata etiam sunt, uti sues, unguibus calceiformibus
propriis geminis, præter posticas 2 succenturiatas. Etagropila his frequens a 1^o
lis degluitis. Horum dentata dentibus laniariis carent cornibus, & cornuta cap-
laniariis, at mihi cranium capreoli cornutum cum laniariis.

Magnitudo capreoli semesiris; pondus ab 18-35 libras medicas; longitud adulti vir infra duos pedes tresque pollices, vix excepsis duos polles cum II pollicibus; caput sere capreolus elegans, vellus cervino grossius, sed levissimum, mollius, laxum, altissimum, colore pro cætate annique tempore variabilis, porosum ex fusco nigrescente, subtus canescens, rarius albido; junioribus virgines & maculis insignitum cætate increscente sensim evanidis, a pellionariis & coriariis adhibitum. Cauda brevissima. Ad præputium orificio folliculus moschiferus subovalis, hinc planus inde gibbus, orificio simplicissimo patulus, in hinnulis vacuus, in adultis sesquidrachma, imo duis drachmis ambroiacæ, in tibetanis quidem præstantioris, quam quidem in sibiricis, in quibus castoreum suboleat, unguinosa, grumosa, friabili's, obscure brunnea refertus.

indicus.

2. M. supra rufus, subtus albidus unicolor, ungulis succenturiatis, cauda longiore. Schreb. Sæugth. V. t. CCXLV.
Tragulus (indicus) pilis brevibus, supra fulvis, infra albicantibus. Briss. regn. anim. p. 95. n. 1.
Habitat in India, moschifero vix major; caput equino simile; auriculae eræctæ, oblongæ; pedes graciles.

Pygmæus. 3. M. supra fusco-rufus, subtus albus, ungulis succenturiatis nullis. Erxl. mamm. p. 322. n. 3.

Moschus pedibus humano digito angustioribus. Syst. nat. XII. p. 92.

Capra cornibus teretibus conicis obtusis curvis, latere anteriore rugoso. Syst. nat. X. p. 69.

Tragulus (guineensis) pilis longissimis obscure fulvis. Briss. regn. anim. p. 96. n. 2.

Cervus pusillus guineensis; Cerva parvula africana, rubida sine cornibus; Hinnulus seu cervus juvencus pergracilis africanus; Cervus africanus pilo rubro. Seb. mus. I. p. 70. 73. t. 43. f. 1. 2. 3. t. 45. f. 1.

Tragulus, Cervula parva africana ex Guinea, ecornis; Tragulus sive Hinnulus aut Cervus juvencus pergracilis africanus; Tragulus guineensis pilo rubro longiore. Klein quadr. p. 22.

Chevrotain des Indes orientales. Buffon hist. nat. XII. p. 315. 341. t. 42. 43. f. 1. 3 - 8.

Guinea-Musk. Penn. quadr. p. 59. n. 49.

*An hujus etiam generis animal elaphi magnitudine ex Formosa flagr without horns
N. Kuh. Eastind. p. 205?*

MAMMALIA PECORĀ. Moschus.

Habitat in India, Java, aliisque oceani indicē insulis; pollices longus, cauda pollicari, auriculis longis.

Meminna. 4. M. supra cinereo-olivaceus, subtus albus, lateribus albō maculatis, ungulis succenturiatis nullis. *Erxl. mamm. p. 322. n. 2. Schreber Saeugth. V. t. CCXLIII.*

Meminna. *Knox Ceyl. p. 21.*

Chevrotain à peau marquetée de taches blanches. *Buffon hist. nat. XII. p. 315.*

Indian Musk. *Penn. quadr. p. 59. n. 48. t. 10. f. 2.*
Habitat in Ceylona, sesquipedalis; auriculis longis, cauda brevissima.

javanicus. 5. M. supra ferrugineus subtus longitudinaliter albus, cauda longitudinalia villosa subtus & apice alba, ungulis succenturiatis exiguis. *Pallas spicil. zool. XII. p. 18. XIII. p. 28.*

Habitat in Java, cuniculi magnitudine, pedibus pygmaeis; naso auriculisque nudis; scopis genuum, sinibus in ingue & ante oculum nullis; cervix ex griseo canescens, fuscis pilis interinstis; ejusdem coloris maculae binæ subconnexæ in collo subtus albo; sub gula pili duo longi divergentes; vertex longitudinaliter nigricans.

america- 6. M. rufo-fuscus, ore nigro, gula alba. *Erxl. mamm. nus. p. 324. n. 4.*

Tragulus surinamensis. Klein: quadr. p. 22.

Tragulus (surinamensis) ex rufo luteus maculis albis variegatus. Briss: regn. an. p. 96. n. 3.

Cervula surinamensis subrubra albis maculis notata. Sebi mus. 1. p. 71. t. 44. f. 2.

Biche de Guiane. *des March. voy. 3. p. 281.*

Wirrebocetra. *Bancroft Guian. p. 123:*

Brazilian Musk. *Penn. quadr. p. 58. n. 47.*

Habitat in Guiana & Brasilia, agilis, celerrimus, timidissimus; vix capreoli magnitudine. Pili breves mollesque, capit is collique supra fusc i, colli subtus albi, corporis erurumque ex rufo fusc i. Crura posteriora anterioribus longiora; cauda brevis; auriculæ 4 pollicum. An forsitan pullus capreoli americanus?

29. CERVUS. *Cornua solida, tenua corio hirto tecata apiceque crescentia, denudata, annua, furcata.*

*Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli (interdum solitarii superius).*

Pygargus. I. C. cauda nulla, cornibus trifurcatis. *Pallas it. I. p. 97.
453. Schreber Saeugth. V. t. CCLIII.*

Cervus Aha. S. G. Gmelin it. 3. p. 496. t. 56.

Habitat summos Hircaniam & Russiam Sibiriaeque ultra Wollgam sitae montes, hieme in campestria descendens, capreolus similis sed major; vellus altissimum, subtus & in artibus lutescens, circa nasum & ad latera labii inferioris nigrum, libii apice ipso, cluniumque regione albis. Cornua basi tuberculata; auriculae intus albo villo tectae, orbitae ciliis pilisque sparsis nigris longis munitae.

Alces.

2. C. cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *Fn. suec. 39. Schreb. Saeugth. V. t. CCXLVI. A. B. Miller on various subjects of nat. hist. t. X. A.*

Cervus (Alces) cornibus ab imo ad summum palmatis. Briss. regn. anim. p. 93. n. 9.

*Alces. Caesar bell. gall. VI. c. 27. Gesn. quadr. p. I. 2.
Scheff. Lapp. p. 336. Charlet. exerc. p. 12.*

Achlis. Plin. hist. nat. VIII. c. 15.

*Alce. Plin. hist. nat. VIII. c. 15. Schwenckf. theriotr.
p. 53. Aldrov. bisulc. p. 866. f. p. 869. 870. Jonst.
quadr. t. 30. 31. Olear. mus. t. 9. f. 2. Bonann. mus.
t. 295. Mus. Worm. p. 336. Raj. quadr. p. 86. I. F.
Leopold diff. de alce. Basil. 1700. 4.*

Mosse. Laet. american. p. 68.

*Mose-Deer in America. Dudley act. angl. n. 368. p. 165.
Mose-Deer of New-England. Dale act. angl. n. 444.
p. 384.*

*Elk. Lawson carol. p. 123. Penn. quadr. p. 40. n. 35.
t. 7. f. 1. 2.*

Orignal. Charlev. nouv. Franc. 3. p. 126.

Elan. Buff. hist. nat. XII. p. 79. t. 7. 8. 9.

Habitat in Americæ, Europæ, Afriæ ad Japoniam usque borealis potissimum populetis, equi magnitudine, nutris excepto aestri tempore; unguis ferit; his crepitantibus 50

milliaria de die percurrit, corio globum plumbeum fuscum eludente. Cáró bona.

Elaphus. 3. *C. cornibus ramosis totis teretibus recurvatis.* Fn. suec. 40.
Schreb. Saeugth. V. t. CCXLVII. A. B. C. D. E.

Cervus cornibus teretibus ad latera incurvis. Briss. regn. anim. p. 86. n. 1.

Ἐλαφός. Aristot. hist. an. II. c. 7. & 18. VI. c. 29. IX. c. 6.
Aelian. anim. VI. c. XI. 13. VII. c. 39. XII. c. 18. Opian. cyneg. II. 176.

Cervus. Plin. hist. nat. VIII. c. 32. Gesn. quadr. p. 354.
Schwenckf. theriota. p. 81. Aldrov. bisulc. p. 769. fig.
p. 774. Jonst. quadrup. p. 82. t. 32. 35. Mus. Worm.
p. 338. Scheff. Lapp. p. 337. Charlet. ex. p. II. Wagn.
Helv. p. 173. Sibb. Scot. an. p. 9. Raj. quadr. p. 84.
Rzacz. Polon. p. 216.

Cerf, biche & faon de cerf. Buff. hist. nat. VI. p. 63. t. 9.
IO. 12.

Stag. Penn. quadr. p. 49. n. 38.

Edler Hirsch, Wild oder Thier. Ridinger jagdb. Th. t. 45.

Hippelaphus. $\beta.$ *C. pilis in collo longioribus major, senior.* Erxl. manum. p. 304.

Cervus (germanicus) cornibus teretibus ad latera incurvis collo infra jubato. Briss. regn. anim. p. 87. n. 2.

Τραγέλαφος. Aristot. hist. anim. II. c. 5.

Τραγέλαφος. Plin. hist. nat. VIII. c. 33.

Tragelaphus. Gesn. quadr. p. 1101. Charlet. exerc. p. 12.
Hippelaphus mas, Rosshirsch. Jonst. quadr. t. 35.
Brandhirsch & Pferdhirsch. Gesn. Thierb. p. 199. 210.

canadensis- $\gamma.$ *C. minor fuscus.* Erxl. manum. p. 304.
Cerf de Corse. Buff. hist. nat. VI. p. 95. t. 11.

canaden- $\delta.$ *C. cornibus amplissimis.* Erxl. manum. p. 305.
fis. *Cervus (canadensis) cornibus teretibus ab imo ad summum*

cute pilosa tectis. Briss. regn. an. p. 88. n. 3.

Stag. Brick. North-carol. p. 109.

Stag in Virginia. Dale ad. angl. n. 444. p. 384.

Stag of Carolina. Lawson carol. p. 123.

Stag of America. Catesb. Carol. app. p. XXVIII.

Habitat in omni Europa, & boreali America atque Asia ad Japoniam usque gregarius mare duce; bene natat; trivit annos etate vix superat; mitis cetera, Augusto & Septembri oestro surit, maribus de femina violenter pugnantibus; hæc raro cornuta, per octo menses gravida unum

unum parit hinnulum, raro gemellos; sine Februarii Martioque cornua amittit, recuperat Julio. Pellis eximia. Caro sapida.

Pulcherrimum animal 3 $\frac{1}{2}$ pedes altum, supra ex rufo-fuscum, subtus albescens, rarius totum album, junius albo-maculatum; fossa lacrymali ante oculos distinctum. Cornuum rami numero quotannis crescunt.

Anatomie. E. N. C. cent. 10 app. 448.

Graba Eleographia. Jenæ 1668. 8. I. G. Agricola cervi natura. Amberg. 1617. 4.

Tarandus. 4. C. cornibus ramosis recurvatis teretibus; summitatibus palmatis. Fn. suec. 41. Amcan. acad. 4. p. 144. t. 1. Mus. Ad. Fr. 1. p. 11. Schreber Saeugth. V. t. CCXLVIII. A. B. C. C.

Tarandus. Plin. hist. nat. VIII. c. 34. Aldrov. bisulc. p. 859: fig. p. 861. Jonst. quadr. p. 90. t. 37. Charlet. exerc. p. 12. Scheff. Lappon. p. 321: fig. p. 327.

Tarandus. Aelian. anim. II. c. 16.

Rangifer. Gesn. quadr. p. 950. Aldr. bisulc. p. 863. Jonst. quadr. t. 37. Mus. Worm. p. 337. Scheffer Lapp. p. 338. Charict. exerc. p. 12. Klein quadr. p. 23 t. 1 Raj. quadr. p. 88. Olear. mus. 16. t. 10. f. 3.

Renne. Buffon hist. nat. XII. p. 79. t. 10. 11. 12.

Rein. Penin. quadr. p. 46. n. 36. t. 8. f. 1.

Rangifer. α . C. cornuum summitatibus omnibus palmatis. Briss. regn. anim. p. 92. n. 8.

Reinthier & Tharandthier. Gesn. Tierb. p. 206. 207. 208. 209.

Rennthier. Gr. v. Mellin Schr. der berl. naturf. Ges. Vol. I. n. 1.

Groenlandicus. β . C. cornibus teretibus ab imo ad summum cute pilosa tectis, nafo piloso. Briss. regn. anim. p. 88. n. 4.

Capra groenlandica. Raj. quadr. p. 90.

Greenland Deer. Catesb. Carol. app. p. XXVIII.

Greenland-Buck. Edw. av. I. t. 51.

Caribou. γ . C. cornibus rectis, ad basim ramo unico antrosum verso. Briss. regn. anim. p. 91. n. 6.

Caribou. Charcv. nouv. Franc. 3. p. 129. Dobbs Huds. p. 20. 22.

Cervicyclide sellea carent; pedibus anterioribus calcitrant; sylvis delectantur.

Habitat in alpibus Americæ, Europæ, Asiæ, maxime septentrionalibus ad Kamtschatcam & Spitzbergen usque, tamen etiam in Russia magis australi, &, quamvis minor, in Sardinia; in Lapponia æstate alpes incolit, hieme in deserta plana descendit, vere culice pipiente, vestro & tabano tarandi ad alpes retropulsus; crepitantibus unguis, vicinitat lichene rangiferino sub nive sepulto; mas cornua amittit mox a pruritu, fine Novembris, femina pariter cornuta, cornibus tamen minoribus, ad initium, retinens cornua, dum pariat; parit autem, per 33 hebdomadas grava, circa finem Septembbris jani pruriens, medio Maii sepe gemellos; ætatem 16 annorum domesticus non superat; colitur enim frequenter in Lapponia, ad trahendum rhedam, ob lac, carnem, pellem, ex qua vela quoque conficiunt Samojedæ; casiratus cornua raro amittit ante novum annum.

Corpus magnitudine damae, domestici tres pedes altum, 4 pedes longuin, feri majus, supra fuscum, ætate sensim canescens, tandem album, subtus cum ore, perinæo & cauda album; pili densissimi, colli subtus longiores; mari præputium propendens; femina mammæ 6, quarum 2 posteriores spuriæ.

Anatome. Bartholin. act. Hafn. 1671. n. 135. Housten act. Stockh. 1774. Vol. XXV. trim. 2. n. 4.

Dama. 5. C. cornibus ramosis recurvatis compressis; summitate palmata. Fn. suec. 42. Schreber Sæugth. V. t. CCXLIX.
A. B.

Cervus (Dama vulgaris) cornuum unica & altiore summitate palmata. Briss. regn. anim. p. 91. n. 7.

Cervus palmatus, Dama, Dama-cervus. Klein quadr. p. 25.

Cervus platyceros. Raj. quadr. p. 85.

Platyceros. Plin. hist. nat. XI. c. 37.

*Ἐλαφος εὐρυκέφας & λεπτός. Oppian. cyneg. II. 293. 296.
Dama vulgaris. Gesn. quadr. p. 335. fig. p. 1100. Schwenckf. theriotr. p. 87. Aldrov. bisulc. p. 741. Jonst. quadr. p. 77. t. 31.

Dain & Daine. Buff. hist. nat. VI. p. 167. t. 27. 28.

Fallow-Deer. Penn. quadr. p. 48. n. 37.

Dann-Hirsch. Ridinger jagdb. Th. t. 7.

Damhirsch. Gesn. Thierb. p. 202. fig. p. 203. Gr. a Mellin Schr. der berl. naturf. Ges. Vol. II. n. 9.

Habitat, elapho tamen rarior, & plerumque minor, in Europa ad Persiam borealem usque, Jachmur scripture

Sacrae, rufus, fuscus, albo maculatus, rarius totus albus, gregarius, facile cicurandus; viginti annos vix superans; femina ecornis per 8 menses gravida, unum, rarius binos, vix tres hinnulos parit. Arcetur filo horizontali. It. goth. 335. Caro proba.

Anatome hermaphroditæ. Journal encyclopéd. 1776. P. II.

virginia- 8. *C. cornibus ramosis antrorsum versis parum palmatis. Penn. nus, quadr. p. 51. n. 39. t. 9. f. 2.*

Dama virginiana. Raj. quadr. p. 86.

Cervus platyceros. Sloam. jan. 2. p. 328.

Chevreuil. Du Pratz Louis. 2. p. 69.

Fallow-Deer. Lawf. Carol. p. 123. Catesb. Carol. app. p. XXVIII. Brickell North-carol. p. 109.

Habitat in Carolina & Virginia, damæ satis affinis, ast altior, cruribus & cauda longioribus, colore magis cinereo distindus; ceterum gregarius, agilis, facile cicurandus, hieme muscis arborum visitans; vermis in capite & gutture obnoxius; caro sicca; pellis eximia.

Axis.

9. *C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida, corpore albo-maculato. Erxleb. mamm. p. 312. Schreber Saeugth. V. t. CCL.*

Axis. Plin. hist. nat. VIII. c. 21. Raj. quadr. p. 89. Buff. hist. nat. XI. p. 397. t. 38. 39. Penn. quadr. p. 51. n. 40.

β. unicolor, cornuum summitate trifurcata. Penn. hist. p. 105. n. 48.

γ. cornibus insignibus albido: apice trifurcato. Penn. quadr. p. 52. n. 41.

Habitat in India, & insulis oceani indici, facile cicuratur, olfactus acerrimi; caro salita edulis.

Magnitudo damæ, color pallide rufus; cauda supra rufa subtus alba.

Porcinus. 10. C. cornibus gracilibus trifurcatis, supra fuscus, subtus cinereus. Schreb. Saeugth. V. t. CLI.

Porcine Deer. Penn. quadr. p. 52. n. 42. t. 8. f. 2.

Habitat in India, 3 pedes cum 6 pollicibus longus, 2 pedes cum 4 pollicibus altus; cornua 13 pollices longa; corpus crassissimum; cauda 8 pollicum; pedes graciles.

mexica- 11. *C. cornibus apice trifurcatis antrorsum versis, rufus. Penn. hist. of. quadr. p. 110. n. 52.*

Cervus major, corniculis brevissimis, Biche des bois. Barrer. Fr. équin. 151.

MAMMALIA PECORA. Cervus.

Teutlal maçame. Hernandez an. mexic. 324.

Baieu. Bancr. Gui. 122.

Chevreuil d'Amérique. Buffon hist. nat. VI. p. 210. 243.
t. 37.

Habitat in nova Hispania, Guiana & Brasilia.

Cornua crassa, robusta 10 pollicum; magnitudo capreoli;
junioris pellis maculata. Caput magnum; oculi magni
splendidi; caro cervina deterior.

Capreo- 6. *C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida; corpore fusco-rufo. Fn. succ. 43. Schreh. Saeugthiere, V.*

t. CCLII. A. B. Erxl mamm. p. 313.

Cervus (Capreolus) cornibus teretibus erectis. Briff. regn. an. p. 89. n. 5.

Caprea. Plin. hist. nat. VIII. c. 53. 58. X. c. 72. XI. c. 37.
Aldrov. bisulc. p. 738. Jonst. quadr. p. 77. t. 31. Raj.
quadr. p. 89.

Capreolus. Gesn. quadr. p. 324. 1098. Schwenckf. theriotr.
p. 78. Jonst. quadr. t. 33. Mus. Worm. p. 339. Wagn.

Helv. p. 173. Sibb. Scot. an. p. 9. Klein quadr. p. 24.

Dorcas. Chariet. exerc. p. 12. Racz. Polon. p. 217.

Chevreuil & Chevrette. Buff. hist. nat. VI. t. 198. t. 32. 33.

Roe. Penn. quadr. p. 53. n. 43.

Rehbock. Gesn. Thierb. p. 144. fig. p. 144. 145. Ridinger
jagdb. Th. t. 9.

Habitat parvis gregibus in Europæ Asiæque silvis minoribus montosis; agilis, cornua deponit autumno, recuperat hieme; prurit Novembris initio; femina non cornuta per 20-22 hebdomadas gravida parit Aprili gemellos.
Caro eximia.

Pedes fere 4 longus, 2 $\frac{1}{2}$ altus. Pili molles, aestate breves supra rufi apicibus griseis, hieme longiores subgrisei, dorso nigricante, subtus albi. Facies nigricans; cornua 6-8 pollicum, tri-raro quadrifurca; crura gracilia; cauda pollicaris.

Muntjac. 12. *C. cornibus teretibus pilosis retroversis trifurcatis: apice superiore uncinato. Schreb. Saeugth. V. t. CCLIV.*
Ribfaced Deer. Penn. hist. of quadr. p. 107. n. 50.

Hujus quoque generis esse videntur, an vere diversæ a recentis speciebus? Temam-
game Hernandez. mexic. p. 325. Cuguaça-Apara & Cuguaçu-ete Maregr. brasili-
235. Pis. ind. p. 97. fig. p. 98. Biche des bois & Biche des paletuviers Barr.
fr. éq. 15. Mazames & Cartacou. Buff. hist. nat. XII. p. 317. 347. t. 44.

Habitat per exiguae greges in insulis Java & Zeylon, porcini habitu, capreolo paulo minor; a cornibus costæ tres longitudinales ad oculos procedunt. Caro eximia.

Guineen- 7. C. griseus subtus nigricans. Mus. Ad. Frid. I. p. 12.
sis. Grey Deer. Penn. quadr. p. 55. n. 45.
Habitat in Guinea, an vere hujus generis?

CAMELOPARDALIS. *Cornua simplicissima pelle tecta, fasciculo pilorum nigro terminata. Dentes primores inferiores VIII spatulati extimo externe profunde bilo.*

Giraffa, I. C. Schreb. Saeugth. V. t. CCLV. Plin. hist. nat. VIII. c. 18; Oppian. cyneg. III. 461. Gesn. quadr. p. 160. Aldrov. bisulc. p. 927. fig. p. 931. Jonst. quadr. p. 98. t. 39. 45. Charlet. excrc. p. 13. Raj. quadr. p. 90. Pr. Alp. aeg. I. p. 236. t. 14.f.4. Ludolfaeth. I. c. 10. n. 33. comm. p. 149.

Cervus Camelopardalis. Syst. nat. XII. p. 92. n. 1. Hafselq. it. Pal. p. 203. act. Ups. 1750. p. 15.

Oraflus, Oraflus. Vincent. specul. doctr. I9. c. 97. Albert. de anim. p. 223.

Giraffa. Nieremb. hist. nat. p. 191.

Camelus indicus, alius camelus, camelus indicus versicolor. Jonst. quadr. t. 40.

Gyraffa. Bellon. obs. p. 118. fig. p. 119.

Giraffe, Theven. cosmogr. I. fol. 388. b. fig. fol. 389. a. Lobo abiss. I. p. 292. Buffon hist. nat. XIII. p. 1.

Giraffa. Klein quadr. p. 22. Briss. quadr. 61.

Camelpard. Gesn. Thierb. p. 236. f. p. 237. 238. Penn. quadr. p. 10. n. 12.

Habitat in regione Sennar, inter Agyptum superiorem & Aethiopiam, in Aethiopia ipsa Chic a Cosma jam visa) & Abissinia rara, rarissima in Africa magis meridionali, in sylvis frondosis, mitis, timida, celerrima, elegans; prona cubat more camelii; gramine pascitur divaricatis pedibus anterioribus, vicitans tamen potissimum arboreum foliis.

MAMMALIA PECORA. Antilope.

Magnitudo camelii mediocris ; color ex albido & rufo mixtus , maculis numerosis ferrugineis ; caput equinum , auriculis satis parvis ; collum erectum , compressum , ceterum camelii longissimum ; dorsum subconvexum , & ab occipite ad caudam usque iubatum ; cauda teres , lumborum dimidia longitudine , subfloccosa ; crura cylindrica , anteriora posterioribus multo longiora , ita ut animal anterius 17, posteriorius modo 9 pedes altitudine æquet.

ANTILOPE. *Cornua concava fursum versa teretia , annulata vel spiralia , persistentia.*

*Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli.*

- leuco- 1. A. cornibus recurvatis teretiusculis annulatis , corpore cærulescente. *Pallas misc. zool. p. 4. spicil. zool. I. p. 6.*
phæa. *XII. p. 12. Schreber Saength. V. t. CCLXXVIII.*
Blauer Bock. Kolbe Vorgeb. p. 141.
Blue Antelop. Penn. quadr. p. 24. n. 13.
Habitat ad Caput bonæ spei ; cervo dama major , subtus albus ; litura ante oculos pedesque albi ; cauda septem pollicum , apice subfloccoso , albo ; cornua 20 pollices longa , annulis 20, apice lævi.
- Lerwia. 2. A. cornibus recurvis rugosis , corpore rufescente , nucha barbata. *Pallas spicil. zool. XII. p. 12.*
Antilope (Kob) cornibus medio flexis basi annulatis , apicibus maxime approximatis. Erxl. mamm. p. 293. n. 23.
Kob. Buff. hist. nat. XII. p. 210. 267. t. 32. f. 1.
Fish-tall s. Lerwee. Shaw it. 1. p. 313.
Gambian Antelope. Penn. quadr. p. 39. n. 34
Habitat in Africa magis boreali , ad fluvios potissimum Gambia & Senegal ; cervi damae magnitudine ; fasciculo pilorum insigni in nucha , & scapis genuum anteriorum longioribus distincta. Cornua 13 pollicum , annulis 8-9, apice lævi.

- Rupica- 3. A. cornibus erectis teretibus levigatis , apice retrosum
pra. uncinatis. *Pallas misc. zool. p. 7. spic. zool. I. p. 4. XII.*
p. 12. Schreb. Saength. V. t. CCLXXIX.
Antilope (rupicapra) cornibus erectis uncinatis , corpore supra ferrugineo. Erxl. mamm. p. 268. n. 1.

Capra (Rupicapra) cornibus erectis uncinatis. Syst. nat.

XII. p. 95. n. 4.

Hircus (Rupicapra) cornibus teretibus erectis rugosis, ad apicem laevibus & uncinatis. Briss. regn. anim. p. 66. n. 4.

Aἰγαὶς. Oppian. cyneg. II. 338.

Rupicapra. Plin. hist. nat. VIII. c. 53. XI. c. 37. Gens. quadr. p. 321. fig. p. 319. Bellon. obs. p. 57. Aldrov. bis. p. 725. fig. p. 727. Jonst. quadr. p. 74. t. 27. 22. Charlet. exerc. p. 9. Wagn. Helv. p. 183. Raj. quadr. p. 78. Klein. quadr. p. 17. Scheuchz. it. alp. I. p. 155. Rzacz. Pol. 223.

Chamois. Perr. anim. I. p. 201. t. 29. Buffon hist. nat.
XII. p. 136. 177. t. 16. Penn. quadr. p. 17. n. 10.

Gems. Gens. Thierb. p. 140. Ridinger jagd. Th. t. 12. Cemas Aeliani & Herodici. Bochard hierozoic. L. III. c. 22.

Habitat in alpibus fabaudicis, valesiacis, helveticis, rhæticis, noricis, carpathicis, græcis, cretensisbus, italicis, delphinatus, pyrenaieis, caucasi, tauri, summis innacessis gregaria, in dies rurior, viditans ranorum arbustulis, herbis, radicibus, potissimum mei athamantæ, ex quibus etiam ægagropilæ. Kram. austri. 320; celerima, timida, visu, olfactu, auditu excellit, vocem sibilantem edit; hieme in speluncis rupium latens, coit Oðobrë & Novembri; & femina Martio & Aprili 2-3 pullos parit.

Magnitudo hirci, cruribus tamen longioribus; pili, æstate inprimis, breviores ex ruso fuscis, dorso linea nigricante, in fronte, vertice, gula, auricularum interna facie albi; cornua utrique sexui nigra, præter apicem rugosa; pone hæc sinus subcutaneus; labium superius subfissum; genua bartata. Cauda brevis, subtus etiam nigricans. Pellis eximia. Caro sapida.

Dama. 4. A. cornibus antrosum incurvis, corpore albo, dorso fascia que oculari fulvis. Pallas misc. zoolog. p. 5. spicil. zool. Fast. I. p. 8. XII. p. 13. n. 4. Schreber Saeugth. V. t. CCLXIV.

Dama. Plin. hist. nat. VIII. c. 53. XI. c. 37. Gens. quadr. p. 334. Aldr. bisulc. p. 729. Jonst. quadr. p. 75. t. 27. Raj. quadr. p. 83.

Nanguer ou Nanger. Buffon hist. nat. XII. p. 213. t. 32. f. 3. t. 34.

Swift Antelope. Penn. quadr. p. 30. n. 22.

Habitat ad Senegal, celerrima, facileque mansuets, 4 fere pedes longa, 2 cum 8 pollicibus alta, supra fulva,

subtus alba, pectore albo maculato; cornua utriusque sexui, 8 pollices longa; dentes primores in maxilla inferiori tantum 6.

- redunca.* 5. A. cornibus apice antrorsum recurvis, corpore rufescente subhirta. *Pallas misc. zool.* p. 5. *Spicil. zool.* I. p. 8. XII. p. 13. n. 5. *Schreber Saeugth.* V. t. CCLXV.
Kemias. Aelian. hist. nat. l. 14. c. 4.
Nagor. Buffon hist. nat. XII. p. 326. t. 46.
Red Antelope. Penn. quadr. p. 30 n. 23.
Habitat ad Senegal fluvium, tota fere pallide rufa, 4 pedes longa, 2 pedes cum 3 pollicibus alta; auriculae 5 pollices, cornua 5½ longa.

- Tragoca-* 6. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice jubata, dorso melus. gibbo, cauda longa floccosa. *Pallas misc. zool.* p. 5. *Spicil. zool.* I. p. 9. XII. p. 13. n. 6. *Schreber Saeugth.* V. t. CCLXII.
Antilope cornibus in frontem reduncis, corpore supra cinereo, fronte macula rhombea nigra. Erxl. manim. p. 279. n. 9.
Biggel. Mandelsl. it. L. p. 122.
Quadruped brought from Bengal. Parsons act. angl. n. 476. p. 465. t. 3. f. 9.
Indostan Antelope. Penn. quadr. p. 29. n. 20.
Habitat in India, camelis more procumbens, quem etiam collo emulatur; 5 circiter pedes alta. Pili in corpore & cauda breves, molles, cinerei, in cauda 22 pollices longa longiores; cornua 7 pollices longa; palearia tauri cum pilis longioribus.

- picta.* 7. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice colloque jubatis, cauda longa floccosa, pedibus albo nigroque annulatis. *Pallas Spic. zool.* XII. p. 14. n. 7. *Schreber Saeugth.* V. t. CCLXIII. A. B.
Antilope (albipes) cornibus in frontem reduncis, maculis albis supra unguis. Erxl. memm. p. 280.
White-footed Antelope. Penn. quadr. p. 29. n. 21. t. 6. f. 1. 2.
Nyl-ghau. Hunter act. angl. Vol. LXI. p. 170. Naturf. VII. p. 236. t. V.
Habitat in India, 4 circiter pedes alta; color obscure griseus, in femina ecorni magis in fuscum vergens; cornua brevia; auriculae magnæ; nigro striatae; juba nigra;

feminæ pedes supra ungulas fasciis tribus nigris & duabus albis.

Saiga.

8. A. cornibus distantibus lyratis pallido-diaphanis, naso cartilagineo ventricoso. *Pallas misc. zool.* p. 6. *spicil. zool.* XII. p. 14. n. 8. p. 21. t. I. & III. f. 6. q. 10. II. S. G. *Gmelin it. II.* p. 174. t. 12. & nov. comm. *Petrop. Vol. XVI. P. I.* p. 512. *Forster act. angl. LVII.* p. 344. *Antilope (scythica)*, cornibus rectiusculis diaphanis, corpore albido. *Pallas spic. zool. I.* p. 9. *Erxl. manum.* p. 289. *Penn. quadr. p. 35.* n. 30. *Capra (tatarica)* cornibus teretibus rectiusculis perfecte annulatis apice diaphanis, gula imberbi. *Syst. natur. XII. p. 97.* n. II. *Colus. Strabo geogr. L. VII. Gesn. quadr. p. 893.* *Jonst. quadr. t. 27.* *Suhac. Aldrov. bisulc. p. 763.* *Charlet. exerc. p. II. Rzacz. Pol. p. 224. auct. p. 320.* *Ibex imberbis. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 345.* *VII. sumni. p. 39. t. 19.* *Saiga. I. G. Gmelin it. fib. I. p. 212.* *Buffon hist. nat. XII. p. 198. t. 22. f. 2.* *Habitat in regionibus Russiæ minoris & Poloniæ, montibus Carpathicis, Danubiaibus, Caucaſeis, Cerauniis, maribus Pontico, Caspio, & Araliensi, alpibus Altaicis interpositis desertis, aridis, apricis salaginosis ad 55^{um} latitudinis gradum, auctunino præsertim, gregaria, miræ pernicitatis, brevi tamen fatigata, timida, voce ovis, olfactu acri; junior mansuſcens maxime sensibilis; sub finem Novembrie coit, tunc mas pro feminis contra hostes pugnat, & austrum versus migrat; femina ecornis, molliori etiam pilo gaudens, ante medium Maji unum ut plurimum pullum parit; eredita incedit; habitus niuis elegans; ſæpe retrograda paſcitur, herbasque a latere carpit, oſtro infeſtata, odoris balsamici; aliquando tricornis, raro unicornis; caro vix affata edulis.*

Antilopæ mediae quasi inter cervos & capras habitu cervino, cornibus caprinis, clyſti de feltea gaudent, ſinibus ſubocularibus ſatis inſignibus, inguinum cavernis pliça ſep̄tis, ſcopis genuin., oculis pulcherriñis nigris gaudent, timide, agiles, & teleſtes, corpore pedibusque ut plurimum graciliores, gregariae incedunt ſæpe ad aliquot millia; veſcuntur portiſſimum fruticulis; rarius plana & ſilvas, quam collis incolunt, in America, & Rupicapra Saiga que excepta, in Europa exules, calidiora præſertim Africæ & Afiz inhabitant. Caro ſæpius eſculente, alias ipoſchum aut hircum redolent.

Magnitudo damæ; longitudo 4 pedes excedens; nares paten-
tissimæ, osse nasali, septoque osso nullo; dentes molares
utrinque sex; collum artusque graciles; vellus æstivum
breve lœvissimum per dorsum & latera ex griseo lutescens,
artibus infra genua saturati, collo corporeque subtus.
& artibus interius album, infra oculos sensim albescens;
hybernum longius ad 2 polices subhirtum, ex griseo
pallidum, extrorsum albidum.

gutturo- 9. A. cornibus lyratis, corpore rufescente, scopis genuum
 nullis. *Pallas spic. zool. Fasc. XII. p. 14. n. 9. l.*
46. t. II. & III. f. 14-17.

Antilope. *Bellon. it. I. p. 311. 319.*

Capra flava. du Halde chin. 2. p. 253. 278. 290.

Capra gutturosa campestris hydrophobos, cornibus non
ramolis circellatim undulatis, sinu gemino leniter infle-
xis. Messerschm. mus. Petrop. I. p. 336. n. 12.

Caprea campestris gutturosa. I. G. Gmelin nov. comm.
Petrop. V. p. 347. t. 9.

Habitat in desertis Mongoliæ, omnibusque inter Tibetum
& Sinam ad austrum extensis, gregaria, colles, & pascua
sicca, aprica, rupestria amans, plantis modo dulcibus
vescens, cursu & saltu vix fatiganda, junior facile man-
suecens; multo serius Saiga prurit, femina demum Ju-
nii initio proleni pariente.

Magnitudo & forma cervicapræ; longitudo (maris) 4 pedum
& 4 pollicum; altitudo 2 pedes & 6 pollices excedens;
dentes molares ubique sex; sinus lacrimales minimi; cor-
nua rugis annularibus circiter 20; collum larynge maxi-
mum in medio colli fluctuante conspicuum; loco scoparum
in genibus pili vix elongati; cauda brevis; cavernæ in-
guinales maxime; color omni ætati idem, æstate supra
potissimum ex griseo ferrugineus, subtus albicans; muri
folliculus insignis ad præputii orificium, vacuus, ræ-
rius ceruminis specie repletus.

subguttu- 23. A cornibus lyratis, corpore supra ex cinerascente brun-
 rosa, infra niveo, fascia laterali ex albido lutescente.
Schreb. Saeugth. V. t. CCLXX. B. Güldenstedt ad. Pe-
trop. 1778. I. p. 251. t. 9-12.

Habitat in Persia inter mare caspium & nigrum, habitu
& magnitudine capreolum simulans, gregaria, arte-
misia pontica potissimum viditans; femina parit Majo;
caro sapida. Cornua ultra 13 pollices longa; apice la-

via; caput laryngis sub cute prominens; genua scopis hirta.

Pygarga. 10. A. cornibus lyratis, collo sanguineo, tergore rufo-canescente, fascia laterali saturata, clunibus albis. *Pall. spic. zool. I. p. 10. XII. p. 15. n. 10. Schreber Saeugthiere, V. t. CCLXXIII. Sparrmann ad. Stockh. 1780. 3. 4.*
Antilope Dorcas. *Pallas misc. zool. p. 6.*

White-faced Antelope. *Penn. quadr. p. 34. f. p. 28.*

Cervicapra. *Houttuyn Linn. ed. belg. Ill. t. 24. f. 1.*

Mountain-antelope. *Russell alepp. p. 54?*

Koba. *Buff. hist. nat. XII. p. 210. 267. t. 32. f. 2?*

Habitat in Africa, forsitan etiam in citeriore Asia, egregie saliens, hirco major, ut 5 pedes & 4 pollices altitudine aequet; capo sapidissima; cornua 16 pollicum, mari annulata, feminæ lœvia; auriculæ & cauda 7 pollicum; facies alba.

Dorcas. 11. A. cornibus lyratis, corpore supra fulvo, subtus albo, fascia laterali fusca. *Pallas misc. zoolog. p. 6. n. 7. spicil. zool. I. p. 11. n. 8. XII. p. 15. n. 11. Schreber Saeugth. V. t. CCLXIX. Sparrm. ad. Stockh. 1778. trim. 2. n. 4.*
Capra (Dorcas) cornibus teretibus perfecte annulatis recurvatis contortis. *Syst. nat. XII. I. p. 96. n. 10.*

Hircus (Gazella africana) cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo lœvi. *Briss. regn. anim. p. 69. n. 10.*

Gazelle. *Buffon. hist. nat. XII. p. 201. t. 23.*

Gazella africana cornibus brevioribus ab imo ad summum fere annulatis, & circa medium inflexis. *Raj. quadrup. p. 80.*

Aelian. *hist. anim. XIV. c. 4.*

Dorcas antiquorum, Tzebi biblica. *Shaw it. p. 152. 357.*
Barbarian Antelope. *Penn. quadr. p. 33. n. 26. f. in tit.*
Habitat in Africa, etiam boreali, Arabia, Syria, Diphon Moyses, cervo dænia dimidio minor; cornua 12 pollicum, annulis prope basin circiter 13; genua longis pilis hirtæ. Cauda supra nigra, subtus alba.

Kevella. 12. A. cornibus lyratis, majusculis, compressis, tergore fulvescente, strigis pallidis, fascia laterali nigrescente. *Pallas misc. zool. p. 7. n. 9. spicil. zool. I. p. 12. n. 9. XII. p. 15. n. 12. Schreber Saeugth. V. t. CCLXX.*

Ibex capensis? *Kolb. cap. I. p. 166.*

Ahu. *Kaempf. amœn. p. 408.*

MAMMALIA PECORA. Antilope¹

Kevel. *Buff. hist. nat.* XII. p. 258. t. 26.

Flathorned Antelope. *Penn. quadr.* p. 34. n. 27.

Habitat in Africa, ad fluvium Senegal, & Persia, gregaria, facile mansuescens, moschum redolens, parvus capreoli magnitudine; cornua utriusque sexui annulis 14-18; caro, ut plerorumque congenerum, sapidissima.

Corinna. 24. A. cornibus sublyratis rectiusculis tenuibus lœvigatis, corpore fulvescente subtus albo, fascia laterali capitis fusco-alba. *Pallas. misc. zool.* p. 7. n. 10. *Spic. zool.* I. p. 12. XII. p. 15. n. 12. β . Schreber *Saeugth.* V. t. CCLXXI.

Habitat in Africa, capreolo minor; cornua gracilia, 6 pollicum, rugis circularibus annulata, an femina Kevelæ, cum qua colore moschato, summaque agilitate & velocitate convenit?

Bubalis. 13. A. cornibus crassis lyrato-contortis rugosis, apice directis, capite caudaque elongatis. *Pallas spic. zool.* I. p. 12. n. 10. XII. p. 16. n. 13.

Antilope cornibus medio flexis spiralibus, faciei linea nigra. *Erxleb. mamm.* p. 291.

• Antilope Buselaphus. *Pallas misc. zool.* p. 7.

Bœcæus. *Oppian. cyneg.* II. p. 300. *Aristot. de part. anim.* L. III. c. 2.

Bubalus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 15. *Gesn. quadr.* p. 330. *Aldrov. bisulc.* p. 363. 365. 735. *Jonst. quadr.* p. 52.

Bubalus antiquorum, Yachmur biblicus. *Shaw it.* p. 151. 358.

Buselaphus Caji. *Gesn. quadr.* p. 121. *Raj. quadr.* p. 81.

Cervus Temamacama. *Seb. mus.* I. p. 69. t. 42. f. 4.

Capra Dorcas. *Houttuyn ed. Linn. belg.* p. 213. t. 24. f. 3.

Hartebeest. *Sparrmann act. Stockh.* 1779. 2. n. 4. t. 5. f. 3. sup.

Vache de Barbarie. *Act. paris.* I. p. 205. *Valent. amphith. zoot.* p. 88. t. 14.

Bubale. *Buffon hist. nat.* XII. p. 294. t. 37. 38. f. 1. 2.

Cervine Antelope. *Penn. quadr.* p. 37. n. 32.

Habitat in Africa, præsertim boreali, & Arabia; gregaria; caro tenera, sed secca.

Altitudo 4 pedum; habitus corporis inter cervinum & vacinum intermedius; caput bovillum; cornua robusta nigra ad 20 pollices longa; cauda pedalis, floccosa, asinina.

Cervi. 25: A. cornibus basi antrotsum , versus medium retrorsum versus , corpore ferrugineo , cervice jubata cauda ex albo cinereza. Sparrm. act. Stockh. 1779. I. n. 7. t. 3. Penn. hist. p. 62. n. 16.

Habitat in planitiebus Africæ pone Caput bonæ spei a magnis Namaiquas occupatis , gregarid , ferox , cornibus pugnans , habitu caudaque equinis , capite bovillo , femoribus cervintis , pilis & sinubus lacrymalibus antilopes . Altitudo 3 $\frac{1}{2}$, longitudo aliquando 6 $\frac{1}{2}$ pedes superans . Cornua nigra in utroque sexu , 5 pollicibus pedem superantia . Color obscure fuscus ; pectoris niger ; jubæ cinereus . Caro sapida .

Oryx. 14. A. cornibus rectissimis subulatis argute rugosis , corpore griseo , striga dorsali nigricante , pilo postico contrario . Pallas spic. zool. XII. p. 16. n. 14. & p. 61. Schreb. Saeugthiere , V. t. CCLVII.

Antilope (recticornis) cornibus teretibus rectissimis , basi annulatis . Erxl. mamm. p. 272. n. 3.

Antilope bezoartica . Pallas miscell. p. 8. spicil. zool. I. p. 14.

Antilope recticornis . Pallas nov. comm. Petrop. XIII. p. 468. t. 10. f. 5.

Capra (Gazella) cornibus teretibus longissimis : basi annulatis . Syst. nat. XII. I. p. 96. n. 7. Briff. quadr. 67.

Oryx. Agatharch. periapl. Plin. hist. nat. II. c. 40. VIII. c. 53. X. c. 73. Columella rust. IX. c. 1. Martial. epigr. I. 13. Macrob. saturn. l. 3.

Gazella indica , cornibus rectis longissimis nigris , prope caput tantum annulatis . Raj. quadr. p. 79.

Capra Gazella africana . Haffelq. it. p. 283.

Pata. Buff. hist. nat. XII. p. 212. t. 33. f. 3.

Ægyptian Antelope . Penn. quadr. p. 25. n. 14.

Habitat ad Caput bonæ spei , in Ægypto , Arabia , India in planis , Zebi scripturæ sacrae , magnitudine cervidamæ , subtus alba , cornibus tripedalibus , cauda pedali apice nigra .

Oreotragus. 26. A. cornibus rectissimis subulatis , basi parum rugosis , capite rufo , corpore ex flavo virescente subtus ex albo cinereo , cauda brevissima . Schreber Saeugth. V. t. CCLIX.

Habitat in Africa .

- Gazella.** 15. A. cornibus subulatis subarcuatis rugosis. *Pallas spic. zool.* XII. p. 17. n. 15.
Capra (bezoardica) cornibus teretibus arcuatis totis annulatis, gula barbata. *Syst. nat.* XII. p. 96. n. 9.
Hircus cornibus teretibus arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis. *Briss. quadr.* 69. n. 10.
Hircus bezoardicus. *Aldrov. bisulc.* p. 756. *Major Ephemer. N. Cur. Dec.* I. a. 8. p. 1. t. 1. *Mus. Bresl.* t. 10. f. 3. 4.
Valent. mus. museor. ed. germ. I. p. 193. t. 36. f. 2. 4.
Animal bezoarticum. *Raj. quadr.* 80.
Gazella. *Bell. obs.* 120. *Pr. Alp. ægypt.* p. 232. t. 14.
Bezoar-Antelope. *Penn. quadr.* p. 26. n. 15.
Animal ignotum. *Gesn. quadr.* p. 309. ic. p. 38.
Algazel. *Buff. hist. nat.* XII. p. 211. t. 33. f. 1. 2.
Habitat in India, Persia, ipsa boreali, Ægypto & Æthiopia, gregaria, colles celerime ascendens, facile circurranda, colore rufo, pede albo, fugacissima, auctumino pruriens, vere pariens. In hujus non raro, frequentius in maris & adulti abomaso bezoar genuinum orientale, virens & cærulescens, in patria sua odoratissimum, & quam maxime aromaticum.

- Leuco-** 16. A. cornibus subulatis rectis convexe annulatis, corpore lacteo. *Pallas spicil. zool.* XII. p. 17. n. 16.
Oryx. *Oppian. cyneg.* II. vers. 445.
Gazellæ indicæ cornu singulare. *Nov. comm. petrop.* XIII. p. 470. t. 10. f. 5.
Antelope Leucoryx. *Penn. hist.* p. 68. t. 20.
Habitat in insula sinus Bassorici Gow Bahrein; nivea, facie modo media parte, genis & artubus rubicundis. Nasus vaccinus; cornua longa, acuta, nigra, gracilia; cauda subfloscosa.

- Orcas.** 17. A. cornibus subulatis rectis carinato-contortis, corpore griseo. *Pallas spicil. zool. Fasc.* XII. p. 17. n. 17. *Schreber Sæugth.* V. t. CCLVI.
Antilope Oryx. *Pallas misc. zool.* p. 9. *spicil. zool. Fasc.* I. p. 15.
Mazame. *Seba nuf.* I. p. 69. t. 42. f. 3.
Africanisches Elendthier. *Kolb. Vorgeb. der gut. Hofn.* I. p. 145. t. 3. f. 1.
Coudou. *Buff. hist. nat.* XII. p. 357. t. 46. b. 47.
Indian Antelope. *Penn. quadr.* p. 26. n. 16.
Eland. *Sparrni, ad. Stockh.* 1779. 2. n. 5. t. 5. fig. inf.

Habitat in Indiæ, Congo & Africæ meridionalis alpestribus, ut plurimum gregaria, parum pernix. Caro sapidissima; ex cornibus fistulas tabacarias conficiunt Hotentottæ.

Altitudo 5-8 pedum; cornua ad 2 pedes longa, in utroque sexu ex atro fusca; corpus ex cærulecente cinereum, juba cervicis dorsique nigra; caput rubicundum; cauda subfloccosa apice nigra; sinus lacrymales nulli.

Icripta. 18. A. cornibus subulatis rectis contortis, corporis strigis albis decussatis. *Pallas misc. zool. p. 8. n. 14. spicil. zool. I. p. 15. XII. p. 18. n. 18. Schreb. Saeugth. V. t. CCLVIII.*

Guib. Buff. hist. nat. XII. p. 305. 327. t. 40. 41. f. 1.

Harnessed Antelope. Penn. quadr. p. 27. n. 17.

Habitat gregaria in campestribus & silvis, fluvio Senegal adjacentibus; color castaneus; pedum digitii albo-maculati; cauda 10, cornua 9 pollices longa.

Grimmia. 19. A. cornibus conicis compressis rectissimis rugoso-striatis, hinc detritis, fossa suboculari atra. *Pallas misc. p. 8. 10. t. I. 3. 4. f. 3. a. b. spic. zool. I. p. 38. t. 3. XII. p. 18. n. 19. Schreber Saeugth. V. t. CCLX.*

Antilope cornibus rectis basi subannulatis, inter cornua fasciculo tophoso. Erxl. mamm. p. 276. n. 7.

Moschus (Grimmia) capite fasciculo tophoso. Syft. nat. XII. I. p. 92. n. 2.

Tragulus (africanus) in medio capite fasciculum pilosum erectum gerens. Briff. regn. anim. p. 97. n. 4.

Capra (Grimmia) capite fasciculo tophoso, cavitate infra oculos. Syft. nat. II. p. 51. VI. p. 14. n. 10. X. I. p. 70. n. 10.

Capra silvestris africana. Grimm misc. nat. curios. dec. 2. a. 4. p. 131. f. 13. Raj. quadr. p. 80. Klein quadrup. p. 19.

Grimme. Buffon hist. nat. XII. p. 307. 329. t. 41. f. 2. 3.

Guinea-Antelope. Penn. quadr. p. 27. n. 18.

Habitat in Guinea, magnitudine pulli bimaculis cervi daniæ; supra cinereo fluvoque admisto fusca, subtus alba; cornua (seminæ nulla) nigra, 18 pollices longa, basi longitudine 3 pollicum leviter annulata. Cauda brevis, supra nigra.

Pygmæa. 20. A. cornibus conicis brevibus convexis basi rugosis. *Pallas spic. zool. XII. p. 18. n. 20.*

Der Hirsche ihre Koenige. Boßm. guin. p. 252.

Cervus juvencus perpusillus. Seb. mus. I. p. 70. t. 43. f. 3^j
Guevei-Cajor. Adanson apud Buffon hist. nat. XII. t. 43^j
f. 2.

Royal Antelope. Penn. quadr. p. 28. n. 19.

*Habitat in Africa torrida; agilissima, 12 pedum altitudine
 saliens, mritis, 9 pollices altitudine non superans, ex ru-
 bicundo fusca. Cornua nigra, gagatae ad instar lucida,
 2 pollices longa; feminæ nulla.*

Sylvatica. 27. A. cornibus subspiralibus annulatis carinatis, apice levibus acutis, corpore supra fusco, postice albo-maculato, infra potissimum albo. Sparrm. act. Stockh. 1780. 3. n. 7^t
t. 7. Schreb. Sæugth. V. t. CCLVII. B.

*Habitat pone Caput bonæ spei in silvis, scriptæ aliquan-
 tum affinis, sed minor, ut tres pedes altitudine vix su-
 peret, monogama, Cornua 10 $\frac{1}{2}$ - 13 pollices longa, ni-
 gra, feminæ nulla; collum dorsumque subjugatum.
 Caro esculenta:*

*Strepsi- 21. A. cornibus spiralibus carinatis subrugosis, corpore strigis
 transversis & spinali albis. Pallas misc. zool. p. 9. spic.
 zool. I. p. 17. XII. p. 19. 67. Schreber Sæugthiere, V.
 t. CCLXVII.*

*Cervus capensis. Collini act. ac. Theod. Palat. I. p. 48^j.
 Strepsiceros. Gesn. quadr. p. 295. 323. ic. 31. Jonst. quadr.
 p. 54. t. 24.*

Bos strepticeros. Aldr. bif. p. 368. f. p. 369.

*Animal anonymum. Houttuyn: syst. nat. ed. belg. III. t. 26.
 f. 1. 2.*

Condoma. Buff. hist. nat. XII. p. 301. t. 39. f. 1. 2.

Striped Antelope. Penn. quadr. p. 31. n. 24.

*Africanischer Kudu. Knorr delic. II. t. K. 5. f. 1. 4. K. 11.
 Habitat ad Caput bonæ spei, 9 pedes longa, 4 alta; cor-
 pus grælle e griseo rubens, subtus griseum; collum ju-
 batum; pectus cristatum; facies nigricans, lineis duabus
 albis; cornua pallide fusca, 3 pedes & 9 pollices longa;
 cauda 2 pedum, supra fusca, subtus alba, apice nigra;*

*Cervica-22. A. cornibus spiralibus teretibus annulatis, corpore fulve-
 pia. cente adumbrato. Pallas misc. zool. p. 9. spic. zool. I.
 p. 18. 19. t. 1. 2. XII. p. 19. n. 22. Schreber Sæugth.
 V. t. CCLXVIII.*

*Antelope cornibus spiralibus annulatis, corpore supra fusco
 subtus albo. Erxl. mamm. p. 383. n. 15.*

MAMMALIA PECORA. Antilope.

193

- Antilope, & Antilope des Indes. *Buff. hist. nat.* XII. p. 215. 217. t. 35. 36. fig. 1. 2.
 Capra (Cervicapra) cornibus teretibus dimidiato-annulatis flexuosis contortis. *Syst. nat.* II. p. 50. VI. p. 14. n. 7. X. I. p. 69. n. 8. XII. I. p. 96. n. 8.
 Hircus (Gazella) cornibus teretibus dimidiato-annulatis bis arcuatis. *Briss. quadr.* 68. n. 8.
 Capra bezoartica. *Aldrov. bis.* p. 256. *Olear. mus. gott.* p. 13. t. 9. f. 7.
 Strepliceris & Addax. *Plin. hist. nat.* XI. c. 37.
 Gazella. *Jonst. quadr.* t. 29. *Ad. Paris.* I. p. 84. *Valent. amphith. zoot.* p. 105. t. 19. *Scheuchz. bibl. sacr.* IV. t. 576.
 Gazella africana f. Antilope. *Charlet. exerc.* p. 67. *Raj. quadr.* p. 79. n. 4. *Grew. mus.* p. 24.
 Tragus Strepliceris. *Klein quadr.* p. 18.
 Lidmee arabum. *Shaw. trav.* p. 243.
 Common Antelope & brown common Antelope. *Penn. quadr.* p. 32. n. 25.
 Habitat in Africa magis boreali, & India, *cervo dama paulo minor*; cauda brevis, supra nigra, subtus alba; caput nigricans, orbitis albis, ore fulvo; cornua erecta nigra, ut plurimum fere tota annulata, apicibus 16 pollices distantia, 14 circiter pollices longa, feminæ uniparæ per 9 menses gravidæ nulla.

30. CAPRA. *Cornua concava sursum versa, erecta, compressa, scabra.*

Dentes primores inferiores VIII. laniarii nulli.

Mentum barbatum.

- Egagrus. I. C. cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Pallas spicil. zool.* XI. p. 45. t. 5. f. 2. 3. *S. G. Gmelin it.* III. p. 493.
 Capricervus. *Kaempf. amoenit. exot.* p. 398. t. 4. n. 1.
 Steinbok. *Ridinger jagdb.* Th. t. 11.
 Chèvre sauvage. *Tavernier it.* 2. 143.
 Caucasan ibex. *Penn. hist.* p. 52. n. 14.

- Hircus. β. C. cornibus carinatis arcuatis. *Syst. nat.* XII. p. 94. n. 1.
Fn. suec. 44. *Forster ad. angl.* LVII. 344.
 Hircus cornibus interius cultratis exterius rotundatis, infra carinatis arcuatis, *Briss. regn. an.* p. 62. n. 1.

MAMMALIA PECORA. Capra.

- Tragus domesticus. Klein quadr. 15.*
Capra domestica. Sloan. jam. 2. p. 328.
Hircus domesticus. Charlet. exerc. p. 9.
Caper hispanicus. Jonst. quadr. t. 26.
Capra, hircus, hædus. Plin. hist. nat. VIII. c. 50. Gesn. quadr. p. 270. 301. f. 302. 314. Aldrov. bisf. p. 619. fig. p. 635. Jonst. quadr. p. 65. t. 26. 27. Sibb. Scot. an. p. 8. Raj. quadr. p. 77. Rzucz. Pol. p. 239. Schwenckf. theriotr. p. 97. 98. 100. 101.
Τρεπον & Αἴγας. Aristotel. hist. anim. V. c. II. VI. c. 15. VIII. c. 13. IX. c. 4. Oppian. cyneg. II. 326.
Bouc & Chevre. Buff. hist. nat. V. p. 59. t. 8. 9.
Geyss & Bock. Gesn. Tierb. p. 127. fig. p. 128. 135.
Domestic goat. Penn. quadr. p. 14.

- angoren- γ. *C. pilis longissimis crisspis toto corpore vestita. Briff. regn. fis. an. p. 64. n. 2.*
Ἄιγαν τυρκα. Äelian. an. XVI. c. 30.
Capra angorensis. Hasselq. it. 206. Olear. mus. t. 10. f. 2. Forster act. angl. LVII. p. 344.
Chevre d'Angora. Tournef. it. 2. p. 185. Buffon hist. nat. V. p. 71. t. 10. II.
Angora goat. Penn. quadr. p. 15.

- mambrica. ♀. *C. cornibus reclinatis, auribus pendulis, gula barbata. Syft. nat. XII. p. 95. n. 3.*
Capra syriaca cornibus minimis erectis, parumper retrorsum incurvis, auribus longissimis pendulis. Briff. regn. an. p. 72. n. 13.
Capra indica, & Capra indica aut mambrina, aut syriaca potius. Gesn. quadr. p. 1097. 1098.
Capra auribus oblongis. Pr. Alp. ag. I. p. 229.
Capra auribus demissis. Aldr. bisulc. p. 769. f. p. 768.
Capra mambrina; indica & mambrina syriaca. Jonst. quadr. p. 81. t. 26.
Capra mambrina f. syriaca Gesneri. Raj. quadr. p. 81.
Geyssen mit hangenden Ohren. Rauwolf it. 3. p. 26.
Chevre mambrine ou chevre du Levant. Buffon hist. nat. XII. p. 152. 154.
Other kind of goats. Russel. alepp. p. 52.
Syrian Goat. Penn. quadr. p. 15. t. 5. f. I. 2.

Angorensia animalia: *Capra, Ovis, Catus, Lepus, cur lanata filis longioribus, tenericribus, mollioribus?*

depressa. ♂. *C. cornibus depresso incurvis minimis cranio incubentibus.* *Syst. nat.* XII. I. p. 95. n. 5.

Hircus (*Capra parva americana*) *cornibus depresso incurvis minimis cranio incubentibus.* *Briss. regn. an.* p. 65. n. 4.

Autre petite chevre à cornes rabattues, Bouc d'Afrique, Chevre naine. *Buff. hist. nat.* XII. p. 154. t. 18. 19.

African goat: *Penn. quadr.* p. 16.

reversa. ♀. *C. cornibus erectis apice recurvis.* *Syst. nat.* XII. I. p. 95. n. 6.

Ibex parvus americanus. *Briss. regn. an.* p. 65. n. 5.

Petite chevre à cornes droites & recourbées à la pointe; Bouc de Juda; Chevre de Juda. *Buffon hist. nat.* XII. p. 154. 186. t. 20. 21.

Whidaw. goat. *Penn. quadr.* p. 16.

Capricornus. C. *cornibus brevibus apice antrorsum versus ad latera annulatis.*

Capricorne. *Buff. hist. nat.* XII. p. 146. t. 15.

Capricorne Goat. *Penn. quadr.* p. 16.

Habitat ferus in Caucasi Taurique præsertim, in aliis etiam Persiæ, Indiæ, Japoniæ, forsitan quoque Candiaæ, Africæ, ipsiusque Europæ alpibus inferioribus, cervum agilitate, aliquantum etiam habitu simulans, varietatibus omnibus major, cornibus feminæ quidem nullis aut exiguis, at mari longe majoribus, robustis, rugosis, ex fusco cinerascentibus; cervice artubusque robustissimis; capite crasso duro; arunco insigni castaneo, sinu ante oculos minusculos antroque inguinali nullo, cauda brevissima atra; colore ex griseo vel cinereo rufescente, linea spinali nigra; vellere hirto; ventriculo bezoar continente; ♂) hospitatur per omnem Europam, & reliquas telluris partes, viuitans ramulis arborum frondibusque variis, lichenibus, ipsa cicuta, euphorbiis aliisque impune venenatis & medicatis; loca montosa amat, albo nigroque colore variat, aetatem 10-12 annorum assequitur, raro ecornis aut quadricornis; ferus iterum factus ex cicure in insula Juan Fernandez reperiri fertur; pecus infidum, petulans, bellicosum, salieus, salax; capra per 5 menses gravida & aut 2 rarius 3-4 hædos pariente; hircum olens, frigbris impatiens, arbores decorticans, corio tenaci indutum, lana caprina teclum, lacte, quoque & caseo utile. ♀) hospitatur circa Angoram, lana ad pedes dependente nivea, serici amula, camelina dicta; cornua torta ad latera protracta, ut ovis hispanicæ; auriculæ planæ lanceolatae.

tæ, declinatæ, nec erectæ canaliculatæ. ♂) habitat in Syria, hirco paulo major, cornibus nigris, pilis fulvis. ♀) habitat in Africa, culta hodienum in America meridionali hædi magnitudine, pilis longis pendulis, cornibus triangulis lunatis cressis vix digitum longis, cranio ita appressis, ut cutem fere perforent. ?) habitat in regno africano Juda, hædi anni magnitudine, pilis brevibus cervinis, cornibus vix digitum longis, cuni & coiens.

- Ibex. 2. C. cornibus supra nodosis in dorsum reclinatis, gula barbata. *Briss. regn. an. p. 64. n. 3.*
 C. cornibus lunatis rotundatis, supra rotundatis in dorsum reclinatis. *Erxl. mamm. p. 261. n. 2.*
Capra (alpina) cornibus longissimis subtriangularibus supra nodosis, in dorsum reclinatis. Girtanner apud Lichtenberg Magazin IV. 2. p. 30.
 Ibex alpium sibiricarum. *Pallas spic. zool. XI. p. 31. t. 3.*
 & V. f. 4.
 Ibex. *Plin. hist. nat. VIII. c. 53. Gesn. quadr. p. 331. & 1099. Aldrov. bis. p. 730. f. p. 732. Jonst. quadrup. p. 75. t. 25. 28. Charl. exerc. p. 10. Wagn. Helvet. p. 176. Raj. quadr. p. 77. Klein quadr. p. 16.*
Hirci feri quoddam genus. Cretæ familiare. Bell. obs. p. 20.
Bouquetin. Buff. hist. nat. XII. p. 136. t. 13.
Wild Goat. Penn. quadr. p. 13. n. 9.
 Steinbock. *Gesn. Thierb. p. 148. Knorr delic. II. t. K. 5. f. 2.*
Habitat in Camtschaticis, sibiricis, arabicis, cretensisibus, italicis, penninis, helveticis, rhæticis, noricis (in posterioribus hodienum in dies rarior) alpibus præruptis inaccessis, gregarius, agillimus, perniciissimus, saliendo dexterinus, junior cicurandus; femina 1-2 hædos pariente; ægagro major, mare tanien feminam superante, cui etiam aruncus & cornua minora, mamæ duæ.
Caput breve, rostro crasso compresso; oculi minusculi; cornua vastissima, aliquando tripedalia, 8-10 libras ponderantia, infra rotundata, magis quam Ægagro arcuata, carinata, ex griseo nigricantia. Crura gracilia; caudabrevis, subtus nuda, supra & apice atra; pili corporis longi, fulvi vel cani, in junioribus sordide grisei, dorsali linea nigricante, macula magna atra supra & infra

genua anteriora, quæ ceterum alba. Pellis tenuis. An fibricus specie diversus?

- caucasica. 3. *C. cornibus retrorsum & extrorsum arcuatis, apice denuo introsum vergentibus obsolete triquetris antice nodosis.*
Güldenstedt act. Petrop. 1779. P. 2. p. 273. t. XVI. XVII.
Habitat in Caucaſi summis jugis ſchiftosis nudis, circa summas origines ſluviorum Terek & Cuban, in Cachetia quoque & Oſletino traçtu, Novembri (nunquam cum capra domeſtīca) coiens & Aprili pariens.
Cornua mari, quam hirco longa majora per arcum 28 pollicum, feminæ tanto minora; huic ex griseo fuſca, illi ſordide nigra. Color animalis ſupra ex brunneno cervinus, subtus albidus, extremitatibus uigris, fascia spinali anguſta fuſcēſcente; pili baſi ciuerci, rigidiusculi, lanugine cinerea interpoſita; magnitudo hirci, habitus tamen latior & brevior.

31. OVIS. *Cornua concava retrorsum versa intorta rugofa.*

Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli.

- Aries. 1. *O. cornibus compressis lunatis. Fn. ſuec. 45. Amœn. acd. IV. p. 169.*
Aries laniger cauda rotunda brevi. Briff. regn. an. p. 74° n. 1.
Ovis domeſtīca, cujus mas aries dicitur, foetus agnus. Sloane jam. 2. p. 328.
Ovis domeſtīca Raj. quadr. p. 73.
Πολεῖτος. Aristot. hiſt. anim. V. c. II. VI. 19. VIII. c. 13;
IX. c. 4. Ἀelian. anim. VII. c. 27.
Pecus, Aries, Ovis, Vervex, Agnus. Plin. hiſt. nat. VIII. c. 47. 48. Geſn. quadr. p. 872. 912. 925. 927. Aldrov. biſulc. p. 370. Jonſt. quadr. p. 54. t. 22. Charlet. exerc. p. 8. Sibb. Scot. an. p. 8. Recac. Polon. p. 242. Schwenckf. theriotr. p. 56. 60.
Brebis & Belier. Buffon hiſt. nat. V. p. 1. t. 1. 2.
Ram. Penn. quadr. p. 10. n. 8.
Schaaf, Widder, Hammel, Lamb. Geſn. Thierb. p. 320.
anglica. α. O. mutica, cauda ſcrotoque ad genua uſque pendulis.
Ovis anglicana. Amœn. acd. IV. p. 174.
Hornleſs Sheep. Penn. hiſt. p. 34. C.

- rustica. β . *O. cornuta*, cauda lanaque breviore, hac rigidiore.
Ovis rustica. *Amen. ac.* IV. p. 174.
Ovis brachyura; *Ovis rusticæ*. *Pall. spic. zool.* XI. p. 59. 61.
- hispanica. γ . *O. cornuta*, cornuum spiræ extorsum tracta, lana molliore, copiosiore.
Ovis hispanica. *Amen. acad.* IV. p. 174.
- polyce- δ . *O. e Gotlandia* 248. *Pall. spic. zool.* XI. t. 4. f. 1. c.
rata. f. 2. b. t. 3. f. 5.
Ovis polycerata. *Amen. ac.* IV. p. 174.
Ovis sexcornis & *tricornis*. *Aldr. bisulc.* p. 397.
Brebis à plusieurs cornes, Bélier d'Islande, Brebis d'Islande. *Buffon hist. nat.* XI. p. 354. 387. t. 31. 32.
Many-horned Sheep. *Penn. quadr.* t. 3. f. 2. 3.
- africana. ϵ . *O. pilis brevibus*.
Ovis africana. *Amen. acad.* IV. p. 173. *Raj. quadrup.* p. 75.
Aries pilosus, pilis brevibus vestitus. *Briss. regn. an.* p. 76. n. 4.
Ovil africana, pro vellere lanoso pilis brevibus hirtis
vestita. *Sloane jam.* 2. p. 328.
Ovis æthiopica. *Charlet. exerc.* p. 9.
- guineen- ζ . *O. auribus pendulis*, palearibus laxis pilosis, occipite prominente. *Syst. nat.* XII. I. p. 98. n. 2.
Aries (*Ovis guineensis*) *pilosus*, pilis brevibus vestitus,
juba longissima, auriculis longis pendulis. *Briss. regn. an.* p. 77. n. 5.
Aries guineensis f. *angolensis*. *Marcgr. bras.* p. 234.
Jonst. quadr. t. 46. *Klein quadr.* p. 14.
Ovis guineensis f. *angolensis* *Marcgravii*. *Raj. quadr.* p. 75. *Sloane jam.* 2. p. 328.
Adim-mayp. *Marmol. afr.* I. p. 59;
Moutons. *Adens. Seneg.* p. 37.
Moutons de Guinée. *Des Marches it.* I. p. 129.
Bélier du Sénégal, Bélier des Indes, autre Bélier des Indes, Brebis des Indes. *Buffon hist. nat.* XI. p. 359.
392. t. 34-36.
Sheep of Sahara. *Shaw. it.* p. 241.
African sheep. *Penn. quadr.* p. 12.
- Iaticau- η . *O. arabica platyura*. *Russ. alepp.* 51. t. 52.
data. *Ovis nigrinus*. *Ælian. anim.* X. c. 4.
Arabiæ oves. *Aldrov. bisulc.* p. 404. f. p. 405.
Ovis turcica. *Charlet. exerc.* p. 9.

- Ovis cauda obesa. *Ludolf eth.* I. c. 10. n. 14.
 Ovss laticauda. *Raj. quadr.* p. 74.
 Aries f. ovis. ~~marus, f.~~ orientalis. *Klein quadr.* p. 14.
 Ovis laticauda, plattyeros f. arabica. *Amoen. ac.* IV. p. 173.
 Ovis laticauda. *I. G. Gmelin nov. comm.* *Petrop.* V. p. 343. t. 8.
 Aries (ovis laticauda) laniger, cauda latissima. *Briff. regn. an.* p. 75. n. 2.
 Ovis fteatopyga, Aries kirgisicus. *Pall. spic.* XI. p. 63. t. 4. f. I. 2. a. b.
 Moutons de Barbarie ou à grosse queue. *Chardin it.* 3. p. 37.
 Mouton de Barbarie, mouton d'Arabie. *Buff. hist. nat.* XI. p. 355. t. 33.
 Broad-tailed sheep. *Shaw it.* p. 241. *Penn. quadr.* p. 4. t. I.
 Schaaff, deren Schwaenz gar feist. *Rauwolf it.* 3. p. 26.
 Arabisches Schaaf. *Gesn. Thierb.* p. 326.
 Die hiesige Schaase. *Osb. Ostind.* p. 188.
 buchari- s. O. auriculis magnis pendulis, pulvinari adiposo minore.
 ca. *Pallas spic. zool.* XI. p. 78.
 longi- .. O. cauda longissima.
 cauda. Alterum genus. *Raj. quadr.* p. 74.
 - Ovis arabica. *Jonst. quadr.* t. 23.
 Aries (ovis longicauda) laniger, cauda longissima. *Briff. regn. an.* p. 76. n. 3.
 Ovis dolichura sive tscherkeffica. *Pall. spic. zool.* XI. p. 60.
 Schaaffe. *Olear. it.* p. 567.
 Ein ander arabisch Schaaff. *Gesn. Thierb.* p. 326.
 capensis. x. O. auriculis magnis pendulis, cauda magna ex adipe vix
 prominente.
 Cape-sheep. *Penn. quadr.* t. 4. f. 2.
 Hospitatur in omni tellure, sicca, salsa, aprica, calida
 amat, stupidissimum & maxime imbecille forte omnium
 quadrupedum, anno secundo jam adolescens, annorum 14
 etatemi vix superans, et ate dentes mutans, paruni bil-
 lens, balans, timidus minatur hosti calcitrando mingendoque,
 pellit eum arietando; comedit in primis festucam
 ovinam, in arvis bursam pastoris, laeditur a pruno spinosa,
 equiseto, ranunculo, flanumula, antherico ossifrago,
 kalmia, myosotide palustri, anemone nemorosa; in-

MAMMALIA PECORA. Ovis.

festatur hippobosca ovina, pediculo ovis, œstro ovis, acarο ricino, fasciola hepatica, hydatide in cerebro nidulante, laborat hinc vertigine, hepatitide, itero, phthisi, hydrope, scabie, variolis; aries unus sufficit 20 ovibus, que per 23 hebdomades gravidæ, 1, 2 raro 3 agnos pariunt. α) *vulgaris per Angliam, maxima in provincia Lincolnshire; β) vulgatissima per omnem Europam, maxime borealem, lana rigidore, breviore, minus crispa, cornibus spiraliter retortis, introrsum angulatis planis, apice complanatis, aliquando nullis; oculis subcæruleis glaucis in prominentia syncipitis ovali, pupilla oblonga, cavitate ante canthum anteriorem profunda gluten seceruente, cauda terete, genua non attingente; velleris color plerumque albus, aliquando niger aut maculatus. γ) vulgatior in Hispania, ex qua etiam in alias Europæ partes delata, cornuum spira extrorsum dilatata; δ) in Islandia terrisque borealibus crebro occurrit, neque inter numerosas nomadum tataricarum greges infrequens, cornibus 3, 4, 5, 6, intermedio, aut intermediis ereditis, exterioribus extrorsum revolutis, cauda plerumque brevi, & lana duriuscula brevi. η) in Africa, ζ) similiter in deserto Sahare & Guinea obvia, in Americam quunque translata, colore varia, magnitudine rusticani æquans, cornibus parvis, deorsum usque ad oculos incurvatis, cauda genua attingente. η) frequentissime alba, aliquando atra, brunnea, maculata, rarius cana, hospitatur inter gentes nomadicas Asiae fere omnes, præsertim Kirgisos, porro in Persia, Sina, omni Oriente, Syria, Arabia, Ægypto, caudæ loco, cuius nihil fere superest, nisi coccyx, pulvinari adipis crassissimo, 30 aliquando libras pondere superante instructa. θ) Bucharis domestica, hybrida, ut videtur, ex η & ι, cauda oblongata, depressa, pinguis, subtus nuda, apice tenui, lanato, vellere lacteo, atro, cano, & ex albo argenteo pretiosissimo, in Persia quoque, Syria, Palæstina, variisque Africæ regionibus obvia. ι) in Capite bonæ spei culta.*

- Ammon. 2. O. cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis pilosis. Erxl. mamm. p. 250. n. 2.
 Capra (Ammon) cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis pilosis, gula imberbi. Syst. nat. XII. I. p. 97. n. 12.
 Hiccius (Capra orientalis) cornibus supra rotundatis, infra planis, semicirculum referentibus. Briff. regn. an. p. 71. n. 12.

- Musmon & Ophion. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 49. XXVIII.
c. 9. & 15.
- Musmon s. Musmon. *Gesn. quadr.* p. 934.
- Tragelaphus. *Bellon obs.* p. 54.
- Musimon & Tragelaphus Bellonii. *Raj. quadr.* p. 75. 82.
- Tragelaphus, Mouflon. *Klein quadr.* p. 20.
- Kameuni Barani oder Musimons. *Steller Camtschatic.* p. 127.
- Stepnie Baranni. *I. G. Gmelin it. sibir.* I. p. 368.
- Rupicapra cornibus arietinis. *I. G. Gmelin nov. comm.*
Petrop. IV. p. 388. *summ.* p. 53. t. 8. b. f. 2. 3.
- Ovis fera sibirica, vulgo Argali dicta. *Pall. Jpic. zool.* XI.
. p. 3. t. I. 2.
- Mouflon. *Buff. hist. nat.* XI. p. 352. t. 29. *Cetti stor. nat.*
of Sard. I. t. 3.
- Siberian goat. *Penn. quadr.* p. 18. n. 11.
- Das wilde Schaaf, & der Weissars der Alten. *Gesn. Thierb.*
p. 154. 155.
- Orientalisches Schaaf. *S. G. Gmelin it.* III. p. 486. t. 55.
- Habitat parvis gregibus in apricis rupestribus & desertis
traedus alpini Afiae mediae, in Camtschatea, insulis Kar-
ilis, forte etiam in California reliquaque America occi-
dentali, certius in Barbariae, Sardiniae, Corsicae, Græ-
ciæ montibus altissimis, celerrima, agitis, fera, corni-
bus pessime feriens, arietem ferum simulans, altero anno
jam adulta, et atatem 14 annorum non superans; Martio
unum vel duos agnos pariens, carne & adipe delicata.*
- Magnitudo cervæ minoris; color æstate potissimum ex ci-
nereo fuscescens admisto griseo, subtus e cinereo albido;
hieme supra ex ferrugineo griseus, subtus e griseo albi-
cans; cauda brevissima alba, apice fuscescens; pili hie-
me sesquipollares, vere depositi; auriculæ acutæ erec-
tæ; oculi magni, iride fusca s. cærulea; cornua, tertio
jam anno progerminantia, albida, annulata, reflexa,
compressa, seminae minora, potius falcata; aliquando
nulla. Pedes posteriores anterioribus longiores.*

*Pudu.*4. *O. cornibus teretibus lœvibus divergentibus.*

*Capra (Pudu) cornibus teretibus lœvibus divergentibus,
gula imberbi. *Malina hist. nat. Chil.* p. 273.*

*Habitat gregaria in montibus Americæ Cordiglieras, nivis
ingruente in valles australes descendens, facile tum ca-
pienda & cœuranda, docilis; magnitudine hædi semestris,
habitu capræ hirci, at cornibus extrorsum incurvatis*

- parvis, feminae nullis, mento imberbi differt; color obscurus.*
- Strepſiceros. 3. O. cornibus rectis carinatis flexuoso-spiralibus.
Hircus (*Capra cretensis*) laniger cornibus teretibus erectis,
ab imo ad summum spiraliter intortis. *Briff. regn. an.*
p. 73. n. 15.
Ovis aeg. v. Oppian. cyneg. 2. p. 376.
Strepſiceros. *Plin. hist. nat. XI. t. 37. Buff. hist. nat. XI.*
p. 358.
Cretensis aries, strepſiceros nominatus. *Bellon. obs. p. 20.*
f. p. 21.
Cretenses arietes. *Aldrov. bisulc. p. 406. f. p. 407.*
Ovis cretensis. Jonst. quadr. t. 45. Besch. der berl. Naturf.
IV. p. 624. t. XX.
Ovis strepſiceros cretica Bellonii. Raj. quadr. p. 75.
Aries strepſiceros. *Klein quadr. p. 14.*
Cretan Sheep. *Penn. quadr. p. 11. t. 3.*
Wilde Straubengeyss. *Gesn. Thierb. p. 151. fig. p. 152.*
Habitat in Candia & insulis Archipelagi, frequenter culta
in Hungaria & Austria; an parens arietis, cui magni-
tudine æqualis, figura corporis similis est?

32. BOS. *Cornua concava, antrorsum versa, lunata,* *lævia.*

Dentes primores inferiores VIII.
laniarii nulli.

- Taurus. 1. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus laxis.
Fn. suec. 46.
- ferus. α. a. Ursus. *Cæf. Gall. VI. c. 28. Gesn. quadr. p. 157. Al-*
drov. bisulc. p. 347. fig. p. 348. Jonst. quadr. p. 50. t. 20.
Raj. quadr. p. 70. Klein quadr. p. 11. Bell. it. I. p. 211.
Rzacz. Pol. p. 228.
Bos ferus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15.*
Bos silvestris. *Charlet. exerc. p. 8.*
Bos (*Urus*) cornibus crassis brevibus sursum reflexis, fronte
crispa. *Briff. regn. an. p. 80. n. 3.*
Auerochs. *Gesn. Thierb. p. 299. Buff. hist. nat. XI. p.*
284. Ridinger wilde Th. t. 37.
b. Bonafus. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15. Gesn. quadr. p.*
145. Aldrov. bisulc. p. 358. f. p. 361. Jonst. quadr. p. 5x.
t. 18. 19. Charlet. rxerc. p. 8. Raj. quadrup. p. 71.
Buff. hist. nat. XI. p. 284.

Bovagor. Aristot. hist. anim. II. c. 5. 7. XI. c. 71.

Mosas. Aelian. anim. VII. c. 3.

Bos (Bonaſus) cornibus deorsum inflexis, juba supra collum longissima. *Briff. an. 84.*

Bos cornibus in se flexis, juba longissima. *Syst. nat. XII. I. p. 99.*

c. Bifon. *Plin. hist. nat. VIII. c. 15. Gesn. quadr. p. 143.*
Aldr. bif. p. 353. 357. fig. p. 355. 356. Jonſt. quadr. p. 51. t. 16. 17. Charlet. exerc. p. 8. Sibb. Scot. an. p. 7. Raj. quadr. p. 71. Rzacz. Polon. p. 214. Buff. hist. nat. XI. p. 284.

Bos cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibboſo. *Syst. nat. XII. I. p. 99. n. 3.*

Bos (Bifon albus) cornibus surfum reflexis, juba longissima, & Bos (Bifon) cornibus surfum reflexis, dorso gibboſo, juba barbaque longissima. *Briff. regn. an. p. 82. n. 5. 6.*

Bovagor. Oppian. cyneg. 2. p. 159.

Wysent. Gesn. Thierb. p. 296.

- domesti-*
cus. *B. Bos, Taurus, Vacca, Vitulus. Plin. hist. nat. VIII. c. 45.*
46. Gesn. quadr. p. 24. 25. 103. 124. Schwenckf. the-
riotr. p. 63. 65. 70. Aldr. bif. p. 13. fig. p. 36. Jonſt.
quadr. p. 13. 15. Wagn. Helv. p. 167. Sibb. Scot. an.
p. 7. Rzacz. Polon. p. 37. Sloan. jam. 2. p. 327.
- Bos domesticus. *Jonſt. quadr. p. 36. t. 14. Charlet. exerc.*
p. 8. Raj. quadr. p. 70.
- Bos (domesticus) cornibus teretibus inflexis. *Mus. Ad.*
Fr. I. p. 12.
- Bos (domesticus) cornibus laevibus teretibus, surfum
 reflexis. *Briff. regn. an. p. 78. n. 1.*
- Taurus domesticus cum vacca. *Klein quadr. p. 10.*
- Boeuf. *Buff. hist. nat. IV. p. 437. t. 14.*
- a. B. indicus major, rufus, cornibus brevissimis, gibbo
 adiposo humerali. *Penn. hist. of quadrup. p. 16. n.*
A. t. I. fig. inf.
- b. B. indicus minor, cornibus fere erectis antrosum
 versis, gibbo adiposo humerali. *Penn. hist. of quadr.*
p. 17. t. I. f. sup.
- Bos (indicus) cornibus aure brevioribus, dorso gibbo,
 juba nulla. *Syst. nat. XII. p. 99. n. 6.*
- Bos scythicus gibbosus. *Charlet. exerc. p. 8.*
- Zebu. *Buff. hist. nat. XI. p. 285. 439. t. 42.*
- Little indian Buffalo. *Edw. av. 200. t. 200.*

- c. Bos abessinicus, tophis dorsalibus, cornibus cuti adhuc rentibus pendulis. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. C.*
- d. Bos madagascariensis niveus, cameli magnitudine, auriculis pendulis, gibbosus. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. D.*
- e. Bos Tinianensis niveus, auticulis nigris. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. E.*
- f. Bos africanus niveus celer, cruribus gracilioribus, cornibus elegantioribus, unguis splendide nigris. *Penn. hist. of quadr. p. 17. n. F.*
- g. Bos europaeus. *White act. litt. & philos. Macul. I. c. 27.*
Habitat in silvis uliginosis Poloniæ, Prussiæ, Lithuaniae, montium Carpathicorum, Caucasi, Patagonie, (α. c. ταυρος Nicetæ) hospitatur ubique, pro ratione climatis, pabuli vitaque generis magis minusve a primo statu decellans, β. a. in India & insula Madagascar, b. in India, Persia, China, c. in Abessinia & insula Madagascar, d. in regno Africæ Adel & insula Madagascar, e. in insula Tinian, f. in Africa, nomine lant vel dant. g. maximus in Polonia, Holsatia, Belgio, minimus in Scotia borealis, in qua, quemadmodum etiam in Islandia & passim in Anglia uterque sexus aliquando ecornis occurrit, animosus, iracundus, furibundus cornibus hostem petlit, fronte toro, crista valida que, milissimus labore suo agris colendis, stercore laetificandis, carne, lacte, caseo, butyro, sebo, cornibus; lui magis obnoxius aliis animalibus domesticis; infestatur oestris bovis, tabanis, conope calcitrante, pediculis; laeditur a cicuta, aconito, anemone; vivit ad 14-15 annos; vacca uterum gerit per 9 menses.

- america- 2. B. cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibbosus. *Syst. nat. XII. I. p. 99. n. 3. β.*
Bos (Bison americanus) cornibus sursum reflexis, dorso gibbosio, capite pilis longissimis obsito. Briss. regn. an. p. 83. n. 7.
Taurus mexicanus. Hernand. mex. p. 587.
Tauri vaccæque Quiviræ regionis. Fernand. an. p. 10.
Armenta. Laët. amer. p. 303.
Taurus Quivirensis & tauri novi orbis. Nieremb. hist. nat. p. 181. 182.

Boves cornu ferunt, pascua depresso amant; difficile genus, cuius species vix certis limitibus circumscripere, prouti in ovis & capriæ generibus, facile varietates propriebus habentur, & vice versa.

- Bison ex Florida allatus. *Raj. quadr. p. 71. Klein quadr. p. 13.*
 Bœuf de Canada. *Charlev. nouv. Fr. 3. p. 131.*
 Bœuf sauvage. *du Pratz Louis. 2. p. 66.*
 Bison d'Amérique. *Buffon hist. nat. XI. p. 305.*
 Buſſielo. *Lawſ. Carol. p. 115. Brick. Northcar. p. 107.*
 Buffalo. *Catesb. Carol. app. p. XXVII. t. 20.*
 American Oxen or Beeves. *Dobbs Huds. p. 41.*
 American Bull. *Penn. quadr. p. 3. n. 6. t. 2. f. 2.*
 Wilde Ochsen und Kiihe. *Kalm. it. 2. p. 350. 425. 3.
p. 351.*
*Habitat gregarius in nova Hispania, & interioribus Ameri-
cae borealis partibus in uliginosis inter altas arundines;
quamvis ferox, junior tamen cicurari potest; pondus
1600 - 2900 librarum acquirit; an vere diſtincta a tauro
species, cum quo coit?*

*Cornua brevia, nigra, teretia, basi multum distantia;
gibbus magnus & altus carnosus; pectus crassum &
robustum; posteriora trunci gracilia & debilia, aestate
nuda. Cauda pedalis, floccosa. Pili capitis & gibbi
longissimi lanati, undulati, ferruginei.*

moscha-
tus. 3. *B. cornibus approximatis basi latissimis introrsum deorsum-
que, apice extrosum flexis acuminatis. Penn. hist. of
quadr. p. 27. n. 9. t. 2. f. 2.*

Bœuf musqué. *Jeremia apud Charlev. nouv. Franc. 3.
p. 131.*

Musk Ox. *Dobbs Huds. p. 18. 25.*

*Habitat in America boreali a regno novo Mexicano ad
terram Cristinos, ossibus per maris fluctus in Sibiriani
delatis, cervæ magnitudine. Cornua in apice frontis,
duos pedes longa, basi duos similiter pedes amplitudine
æquante, ad 60 libras ponderantia. Pili longissimi
ericei obscuri. Caro moschum olet.*

*grun-
niens.* 4. *B. cornibus teretibus extrosum curvatis, vellere propen-
dente, cauda undique jubata.*

Vacca grunniens villosa, cauda equina. *I. G. Gmelin
nov. comm. Petrop. V. p. 339. t. 7.*

Bubalus cauda equina. *Pallas ad. Petrop. I. p. II. p. 332,*

Bœuf velu. *le Brun it.* I. p. 120. t. 129.

Vache de tartarie. *Buff. hist. nat.* XV. p. 136.

An other species of oxen, called bubuls by the Tartars.
Bell. trav. I. p. 212.

Grunting bull. *Penn. quadr.* p. 5.

Tangutischer Büffel mit dem Pferdeschwanz. *Pallas nord.*
Beytr. I. p. I. t. I.

Habitat, hodienum rarior, in regno Tibetano, hospitatus & colitur numeroosa varietate magnitudinis, pilorum, coloris; in Sibiria, China, India, Persia, jam Ätiano, Cosmae, Guil. de Rubriquez; Marco Polo aliisque notatus; feror, potissimum vulneratus aut alio modo irritatus; æstus impatiens, colore rubrum aliosve serenos regre fert; dum irascitur, corpus concutit, caudam erigit, oculis minatur, & subito ac inopinato in hostem fertur; domesticus tamen, resedit ut plurimum cornibus onera portat & jugum, aratrum trahit & currus. Vox grunniens, vacce frequentior; coit cum vacca domesticis; an parens bubali, cum quo interna structura convernit?

Magnitudo varia, feri spectabilior; caput breve, nasus latius, labia crassæ & pendula, auriculæ amplæ, inferius acutæ, pilis asperis hirtæ; cornua brevia, gracilia, valde acuminata, basi distantia, medio inter utrumque fasciculo pilorum longo; pilis in medio frontis radiatis. Cervix jubata, juba alba, aliquando ad caudam usque protensa; caput una cum reliquo corpore nigrum, ut tamen domesticus colore quoque multum variet, pilis inferioribus longissimis, reliquis hircinis; unguæ latae; cauda lata, ad 6 pedes longa, ex pilis longis sericeis argentei vel nivei coloris couflata, Sinensisbus, Indis, Turcis magni æstimata. Ventriculo nonnunquam ineß species lapidis bezoor. Caro vix edulis, nisi vitulorum.

Bubalus. 5. B. cornibus resupinatis intortis, antice planis.

Bos (Bubalus) cornibus compressis, sursum reflexis, resupinatis, fronte crispa. *Briff. regn. an.* p. 81. n. 4.

Bos indicus. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 45.

Bos ἀγρός εἰ Ἀπαχωτοῖς. *Ariſtot. hist. an.* L. 2. c. 1.

Bubalus. *Gesn. quadr.* p. 139. *Jonſt. quadr.* t. 20. *Raj.*
quadr. p. 72.

*Buffelus. Aldr. bis. p. 365. fig. p. 366. Jonst. quadr. p. 53.
Charlet. exerc. p. 8. Klein quadr. p. 10.*

Buffalus. Pall. nov. comm. Petrop. XIII. p. 460. t. 11. 12.

*Boves inusitatæ magnitudinis, Taurelephantes. Ludolf
Æthiop. I. c. 10. n. I.*

Buffle. Buffon hist. nat. XI. p. 284. t. 25.

Buffalo. Barbert Guin. p. 209. 486. Penn. quadr. p. 7. n. 5.

Büffel. Gesn. Thierb. p. 58.

Büffelochsen. Kolbe Vorgeb. p. 143. t. 5. f. 2.

*Habitat in Asia, cultus in variis ejus Africæque provinciis;
nec non in Hungaria & Italia in quam posteriorem im-
perante Longobardis Agilulfo primum delatus, in calidis-
simis plagiis fere pilis nudus, iracundo mugitus fortis;
annulo oris regitur, onera portat, aratrum currumque
trahit, latte etiam, quamvis magis sebaceo utilis;
coit cum vacca vulgari. Tauru major, corpore crassiore,
robustiore, cute durissimo, pilis nigris aut rubris, capite
parvo, fronte crispa. Cornua nigra, crassa, paulisper
compressa, sursum reflexa, parum resupinata.*

Caffer.

6. *B. cornibus basi latissimis & approximatis, tum divarica-
tis deorsum, post sursum apice introrsum curvatis,
juba brevi. Sparrmann act. Stockh. 1779. I. n. VIII.
t. 3. f. inf.*

*Cape ox. Penn. hist. of quadr. p. 28. n. 9. Masson act.
angl. LXVI. p. 296. Forster it. I. p. 83.*

*β? Bos (Bubalus africanus) cornibus teretibus sursum re-
flexis, in fese recurvis. Briff. regn. an. p. 79. n. 2.*

*Elegans & parvus africanus bos, quem veteres Græci
bubalum appellarunt. Bellon. obs. p. 119.*

*Juvencus sylvestris. Pr. Alp. Æg. I. p. 233. t. 14. f. 2.
Africanus bos. Raj. quadr. p. 73. Aldr. bis. p. 363. fig.
p. 364. Jonst. quadr. p. 52.*

Bubalus africanus. Jonst. quadr. t. 18.

Exiguus africanus bos. Klein quadr. p. 11.

Petit bœuf de Belon. Buff. hist. nat. XI. p. 299.

Africanischer Büffel. Gesn. Thierb. p. 60.

Dwarf ox. Penn. hist. p. 30. n. 10. t. 2. f. 3.

MAMMALIA PECORA. Bot.

Habitat gregarius in Africa, præsertim in silvis pone Caput bonæ spei versus septentrionem sitis, etiam in Guinea, ferox ($\beta.$ tamen mitior), callidus & atrociissimus, ne homini quidem parcens, celer, ut tamen equum montem ascendo non asequatur, & robustus; cæno volutatur, crassior & rudior reliquis; 8 circiter pedes longus, $\frac{5}{2}$ altus, ater; cornua nigra, basi angusto canali inter medio separata, eadem 13 pollices lata; ut magnam capitis partem tegant, ultra pedem nonnunquam longa, & 25 libras pondere aliquando æquantia; auriculae pendulæ; pili pollicem circiter longi, rigidi, adultiori bovi læves, ante genua & subtus longiores, undulati; Cutis tenax, crassa; caro rufa, sed succulenta & ferina saporis.

VI. BELLUÆ.

*Dentes primores obtuse truncati.
Pedes ungulati.*

33. EQUUS. *Dentes primores superiores VI
erecto paralleli.
inferiores VI prominentiores.
laniarii solitarii inclusi utrinque remoti.
Mammæ II inguinales.*

* *pedibus bisulcis.*

- bisulcus. 6. F. *pedibus bisulcis. Molin. hist. nat. Chil. p. 284.*
*Habitat in America australi, præsertim præruptis rupibus
montium Cordilleras, pedibus ad pecora, dentibus, magni-
tudine, habitu, ad equi genus accedens, ut quasi medium
inter utrumque constituat, ferox & celer, hinnitu & au-
riculis caballo, strudura interna, figura externa, magni-
tudine, pilis, colore, rostro, oculis, collo, dorso, cau-
da, pedibus, genitalibus asino similior, ut tamen crux
nigra humeralis deſit.*

** *pedibus solidungulis.*

- Caballus. I. E. *pedibus solidungulis, canda undique setosa.*
Equus cauda undique setosa. Syst. nat. XII. I. p. 100. n. I.
*Equus auriculis brevibus erectis, juba longa. Briss. regn.
an. p. 100. n. I.*
*Istrus. Aristot. hist. an. I. c. 5. 7. II. c. 5. 8. 18. III. c. 10.
V. c. 11. VI. c. 22. VII. c. 17. VIII. c. 11. IX. c. 5. Aelian.
anim. III. c. 2. IV. c. 6. 7. 8. 11. Oppian. cyneg. I. 166.*
*Equus, Equa, Equiferus. Plin. hist. nat. VIII. c. 42. X.
c. 63. XI. c. 37. XXVIII. c. 10. 11. Gesn. quadr. p. 442.
fig. p. 443. Schwenckf. theriott. p. 89. Aldr. solidung.
p. 2. fig. p. 21. Jonst. quadrup. p. 1. t. 1-14. Charle.
exerc. p. 3. Wagn. Helv. p. 174. Sibb. Scot. an. p. 6.
Raj. quadr. p. 62. Rzacz. Polon. p. 217. 240. Sloane
januaic. II. p. 327.*
Cheval. Buff. hist. nat. IV. p. 174. t. I.

MAMMALIA BELLUÆ. Equus.

Horse. Penn. quadr. p. I. n. I.

Ross. Gesn. Thierb. p. 306. f. p. 307.

ferus.

a. *Equus ferus. Hasselq. palæst. p. 282.*

Wild horses. Bell. it. I. p. 212.

Wilde Pferde. I. G. Gmelin it. I. p. 211. III. 2. p. 510.

S. G. Gmelin it. I. p. 44. t. 9. Pallas it. I. p. 211.

Tarpany. Rytchk. Orenb. I. p. 233.

domesti-
cus.

b. *Equus domesticus. Klein quadr. p. 4.*

*Habitat gregatim ferus in campis Bessarabicis, inque deser-
tis circa Tanain, & per omnem Tatariam magnam obviis,
hospitatur ubique, per Hispanos quoque in Americam
delatus, varietate innumera; ex doméstico ferus iterum
factus reperitur hodie, potissimum in Tauria, passim
gregarius, mare duce, minor, vix domandus.*

*Animal herbivorum, rariissime carnivorum, generosum, su-
perbum, fortissimum in currendo (ut visus sit equus, qui
minuti secundi tempore 82½ pedes anglicos cucurrit) por-
tando, trahendo; aptissimum equitando, cursu furens,
silvis delectatur; posteriora curat; cauda conopes taba-
nosque abigit, alterum scalpit; pullum injuriae obnoxium
reponit; hinnitu sociam vocat. Calcitrando pugnat; su-
dans se volutat; vegetabilia edit bove proprius, semina dis-
seminat; ventriculo exiguo simplici, intestino colo cœco-
que maximo, cystide fellea nulla, non vomit; stercus in-
calescit. Equuleus hippocmane natus pedibus elongatis.
Lœditur globulo auris, acicula pedis, nisi capistro, den-
tibus sebo illitis, padi herba, phellandrii curculione? co-
nope irritante. Edit impune aconitum. Utero gerit 290
dies. Laniarios dentes anno quinto acquirit; primores
mutat anno secundo, tertio quarto. Tartaris caro escu-
lenta, lac, etiam fermentascens, potulentum, pellis in-
corium versata.*

Hemionus. 5. E. unicolor, pedibus solidungulis, cauda calva extremitate
pilosa, cruce nulla. Pallas it. III. p. 217. n. nord. Beytr.
II. p. I. t. I. nov. comm. Petrop. XIX. p. 394. t. 7.
*Habitat in desertis inter fluvium Onon & Argun interpositis
(hodienum rarius), gregarius in desertis mongolicis, po-
tissimum derserto Gobi ad Sinæ regnique Tibetanis us-
que, apricos, salsos, planos, herbosos campos amans,*

Equi pedibus poslicis calcitrant; mares mammas in penis glande habent.

silvas montesque nive candidos abhorrens, timidus providusque, cursu celerrimus, haec tenus non cicuratus, auditu & olfactu acutissimo, hinnitu magis sonoro, quam equi; infestatur lue in caballos & boves propaganda; mordendo & calcitrando pugnat; prurit Augusto; parit equa vere pullum, ut plurimum unicum. Caro Mongolis Tungusique deliciosa, pellis navium speciei adaptatur.

Magnitudine & habitu proxime accedit ad nulum, at pulchrior, auriculis caudaque ad zebram, ungulis & reliquo corpore ad asinum, artibus ad equum; differt tamen capite magno, fronte plana antrorum angustata, collo graciliore quam reliquis speciebus, & magis terete, pilis hincus sequipollicaribus, mollibus, basi pallide glaucis, cetera pallidis Isabellæ colore, dorso undulatis, aestate vix $3\frac{1}{2}$ lineas longis; verticibus multis; cauda pene vaccina. Ponderis circiter 560 libris medicis æquale, longitudo 5 pedes superans; cauda pedem & 12 pollices longa, apice floccoso nigro. Dentes 34.

Afinus. 2. E. pedibus solidungulis, cauda extremitate setosa, cruce nigra (mari) supra humeros.

Equus cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros.

Syst. nat. XII. I. p. 100. n. 2. Fn. suec. I. n. 35.

Equus auriculis longis flaccidis, juba brevi. Briff. quadr. 70.

Ane. Buff. hist. nat. IV. p. 377. t. II.

Afs. Penn. quadr. p. 3. n. 3.

Esel. Gesn. Thierb. p. 91.

Afinus. a. Afinus silvestris. Plin. hist. nat. VIII. c. 30. Klein quadr. p. 7.

Onager. Plin. hist. nat. VIII. c. 44. & 58. Ald ov. solid. p. 352. Jous. quadr. p. 20. t. 7. 8. Raj. quadr. p. 63. Pallas act. Petrop. ann. 1777. P. II. p. 258. n. nord. Beytr. II. p. 22. t. 2.

Oryx Oppian. cyneg. III. 183.

Onagrus, Onager & Afinus silvestris. Gesn. quadr. p. 19.

Afinus. Charleton exerc. p. 4.

Equus (Onager) auriculis longis, juba brevi, pelle tuberculis parvis scabra. Briff. regn. an. p. 104. n. 5.

L'âne sauvage. Marmol. Afric. I. p. 53.

Wild asses. Bell. it. I. p. 212.

Wilder Esel. Pallas neue nord. Beytr. II. p. 22. t. I.

Habliq. n. nord. Beytr. IV. p. 88.

Domesti- cæ. B. Afinus. Plin. hist. nat. VIII. c. 43. Gesn. quadr. p. 3. fig. p. 4. Schwenckf. theriotr. p. 61. Aldrov. solid. p. 295.

MAMMALIA BELLUÆ. Equus.

Jonst. quadrup. p. 16. t. 6. Sibb. Scot. an. p. 6. Raj. quadrup. p. 63. Sloan. jamaic. 2. p. 327. Klein quadr. p. 6.

Ovo. Aristotel. hist. anim. I. c. 17. II. c. 18. V. c. 11. VI. c. 23.

Ane. Tavern. it. 1. p. 344. Chardin it. 3. p. 33. Esel. Osb. Ostind. p. 35.

mulus. γ. hybridus ex asino & equa, sterilis.

Equus (Mulus) auriculis longis erectis, juba brevi. Briss. regn. anim. p. 103. n. 4.

Oeuv. Aristot. hist. anim. I. c. 7. II. c. 5. VI. c. 24.

Mula, Mulus. Plin. hist. nat. VIII. c. 44. XI. c. 37.

Mulus. Gesn. quadr. p. 793. Schwenckf. theriotr. p. 62. Aldrov. solid. p. 358. Jonst. quadr. p. 21. t. 6. Charlet. exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64. Sloan. jam. II. p. 327.

Asinus bisformis. Klein quadr. p. 6.

Grands mulets. Buff. hist. nat. IV. p. 401.

Maulesel. Gesn. Thierb. p. 108. Osb. Ostind. p. 35.

hinnus. δ. hybridus ex equo & asina, sterilis.

Tamec. Aristot. hist. an. I. c. 7.

Mula, Hinnus. Plin. hist. nat. VIII. c. 44.

Hinnus. Gesn. quadr. p. 18. Aldrov. solid. p. 358. Jonst. quadr. p. 21. Charlet. exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64.

Petits mulets. Buffon hist. nat. IV. p. 401.

Habitat gregarius in desertis magnæ Tartariæ montosis, hie me post coitum in Indiam meridionalem & Persiam migrans, circa urbem Casbin frequentissimus, olim quoque in Natolia, Syria, Arabia & Africa, hospitatur cultus & degener fere ubique, frigoris, non æque plagarum & penuriae impatiens, spinis vicitans, piger, tardus, mansuetus, stupidus, rudens, libidinosus, auriculismagnis, flaccidis, juba brevi, colore cinereo, linea dorsali & transversali scapularum nigra; at α) celerrimus, agilissimus, structuræ elegantioris & altioris, quam β), feras venans, tigridi tamen vincendæ impar, non difficulter cicurandus, visu, auditu olfactuque acutissimo pollens, aquam plantasque salinas & amaras amans, coloris candidi in argenteum splendorem vergentis, vertice tamen, colli truncique lateribus pallide luteis; juba ex nigricante fusca; linea dorsalis coseen colore æmulatur; pili equinis molliores. Caro Kirgisæ deliciosa; pellis egregium exhibit corium (chagrin), præparationis modo demum granulatum. Longitudo 4 pedum cum 10 pollicibus. β) optimus in

regionibus calidioribus, in Angliam non delatus ante regnum Elisabethæ; ad 30 annos vivit, post dies 290 parit pullum plerumque unicum; ♂) rarissime fecundus, optimus hispanicus, maximus sabaudicus, ad equum habitu & magnitudine proprius accedens. ♀) multo minor & deterior, magis rubicundus, auriculis equi, juba & cauda asini.

Zebra.

3. E. pedibus solidungulis, dilute fuscus, fasciis fuscis.
Equus fasciis fuscis versicolor. Syst. nat. XII. 1. p. 101. n. 3.
Equus (Zebra) auriculis brevibus erectis, juba brevi, lineis transversis versicolor. Briss. regn. an. p. 101. n. 2.
Equus indicus. Jonst. quadr. t. 5.
Equus brasiliensis. Jacob. mus. reg. p. 3. t. 2. f. 1. Laur. mus. reg. t. 3. f. 18.
Equus ferus genere suo, Zebra, Zecora. Klein quadr. p. 5.
Zebra. Purch. pilgr. 2. p. 1001. Charlet. exerc. p. 4. Raj. quadr. p. 64. Barbot guin. p. 486. Bancr. Guian. p. 486. Penn. quadr. p. 2. n. 2.
Male Zebra. Edw. av. t. 222.
Zebra indica. Aldrov. solidung. p. 416. fig. p. 417. Jonst. quadr. p. 21. t. 5.
Zecora. Ludolf aeth. I. c. 10. n. 35. comm. p. 150.
Zeura ou Zecora. Lobo abiss. I. p. 291.
Ane de beauté extraordinaire. Thevenot it. 2. p. 473.
Espèce de fort beaux ânes. Dampier it. 2. p. 250.
Zébre. Buff. hist. nat. XII. p. 1. t. 1.
Wilder Esel. Kolbe Vorgcb. p. 146. t. 3. f. 2.
Indianisch Maulthier. Gesn. Thierb. p. 120.
Africanisches Tygerpferd oder Eselpferd. Knorr delic. II. tab. K. 8.
Habitat in Africæ meridionalis campis gregarius, pulcher-rimus, celerrimus, malignus, indocilis, junior tamen cicurandus, cum asino coiens. Magnitudo muli; juba brevis erecta, una cum capite & corpore deorsum striata, cruribus digitisque transversim striatis; auriculae erectæ; cauda asini. Femina ejusdem penitus coloris.

- Quagga. 4. E. pedibus solidungulis, supra castaneus, fasciis fuscis, ad latera maculatus, subtus, pedibus cruribusque albus,
Quacha. Penn. hist. p. 14. n. 3.
Opuatha. Masson act. angl. LXVI. p. 297.
Zébre. Buff. hist. nat. XII. p. 1. t. 2.
Female Zebra. Edw. av. t. 223.

MAMMALIA BELLUÆ. Hippopotamus.

Habitat in Africa meridionali gregibus separatis, crassior & robustior Zebra, faciliusque cicuranda, ita ut currui trahendo adaptari queat.

34. HIPPOPOTAMUS. *Dentes primores in utraque maxilla IV.*

superiores per paria remoti.

inferiores prominentes, intermediiis longioribus.

laniarii solitarii, inferiores longissimi oblique truncati, recurvati.

Pedes margine unguiculati.

amphi-
bius.

1. *H. pedibus quadrilobis. Syst. nat. X. p. 74. Houttuyn 3.
p. 405. t. 28.*

Bchemoth. *Job. c. 40.*

Нінапіус інніс. Aristot. hist. anim. II. c. 7. 12. Aelian. anim. V. c. 53.

Hippopotamus. Plin. hist. nat. VIII. c. 25. & 26. XI. c. 12. 37. & 39. XXXII. c. 11. Bel. poiss. p. 47. fig. p. 50. & obs. p. 104. Gesn. aquat. p. 494. Column. aq. p. XXVIII. fig. p. XXX. Aldrov. dig. p. 181. 183 - 185. Jonst. quadr. p. 108. t. 49. Charlet. exerc. p. 14. Ludolf Aeth. I. c. 10. n. 1. p. 155. Raj. quadr. p. 123. Shaw it. p. 427. Klein quadrup. p. 34. t. 3. Briff. quadr. p. 122. Hasselq. palæst. p. 280. Forsk. fn. orient. p. IV. Radzivil it. hieros. 142. Sparrmann act. Stockh. 1778. IV. n. 12. Chemniq. Naturf. XXI. p. 84.

Hippopotamo. Zerenghi monogr.

*Hippopotame ou cheval marin. Theven. it. I. p. 491. Mar-
mol. afr. I. p. 51. Dampier it. 3. p. 359. Jussieu act.
Paris. 1724. p. 209. Lobo abiss. I. p. 258. Maillet æg.
2. p. 31. Adans. Seneg. p. 73. Buffon hist. nat. XII.
p. 22. t. 3. & 6. f. 1-3. Penn. quadr. p. 78. n. 59.*

*Cheropotamus & Hippopotamus. Pr. Alpin. I. V. 245.
t. 22-25.*

River-horse or Hippopotamus. Grew. mus. reg. Soc. p. 14.
t. I.

Hippopotami or River - horses, Water-elephants, Ker-
kamonon. Barbot Guin. p. 73. 117.

Seekuh. Kolbe Vorgeb. p. 168. t. 6. f. I.

Vasserochs. Knorr delic. II. tab. K. 12.

*Habitat in fluviis Africae a Nigro usque a Caput bonæ
spei, in lacubus Æthiopiarum, quos transfluit Nilus, in
Nilo quoque superiore, olim etiam in inferiore, rarer
ad osia fluviorum, jam a Cofna in Æthiopia, & Æ-
gypto observatus, polygynus, gregarius, aliquando
sex milliaribus a littore vagatus, sacchari, coecaſiæ;
orizæ, milii plantationes devastat, pabulum quaſiturus,
quod noctu fit; radicibus quoque arborum vescitur,
nunquam piscibus; cicurandus utique & nitidus, niſi ir-
ritatus aut vulneratus, quo factio navicularis adeo aquæ
innatantes hominesque in iis inclusos summa acacia
aggregatur; tarde incedit in ſiccō, & humiles aggeres
non transcendit; velocissime autem natat, & in fundo
aquæ ingreditur, ut tamen non diu infra aquam per-
manere poſſit; dormit in insulis fluviorum mediis arun-
dine obſtitis, ibique femina parit pullum unicūm, que-
tanū in aquis laetat. Vox inter mugitum bovis &
elephantis intermedia valde ſonora. Dentes albifimi
durifimi ipſo ebore duriores, nec tam facile ſlavescentes,
ut ideo ad hominum dentes resarciebantur adaptentur.
Caro eſculenta. Cutis clypeis adaptatur.*

*Magnitudo fere elephantis, ut 4000-5000 libras pondere,
17 aliquando pedes longitudine, 7 fere altitudine æquet;
capite quamvis insigni, trunco & habitu bovem, pedibus
ursum, cute tenacissima deniffima rhinocerotem, lani-
riis, cauda, posteriore truncī parte, vitæ genere ſueū
eliquantum refert; os amplifimū; auriculæ minutæ
& acutæ, pilis brevibus, tenuibus ciliatæ; oculi nar-
que exigui; labia fasciculis pilorum; dentes laniarii ali-
quando 27 pollices longi, & 9 uncias ultra 6 libras
ponderosi; dentes molares ſimiliter albifimi, ad utrum-
que latus utriusque maxillæ 6-8. Cutis obſcura, pilis
albidis rarib; in cervice paulo densioribus, tecta; cauda
circiter pedalis, calva; crura brevia; crassa; lobi pe-
dum nou annexi.*

TAPIR. *Dentes primores in utraque maxilla X.
laniarii nulli.*

*Pedes anteriores ungulis IV.
posteriores ungulis III.*

america- I. T. Briff. regn. an. p. 119. Buff. hist. nat. XI. p. 444
nus. t. 43. Penn. quadr. p. 82. n. 60.

Tapihires. Thevet cosmogr. II. fol. 937. b.

Tapiirete. Marcgr. Bras. p. 229. Pis. Ind. p. 101. Raj.
quadr. p. 126. Klein quadr. p. 36.

Hippopotamus (terrestris) pedibus posticis trifulcis. Syft.
nat. X. I. p. 74. n. 2.

Beori animal. Laët anuer. p. 328.

Danta. Nieremb. hist. nat. p. 187. Jonst. quadr. p. 216.
Cieza Peru. p. 20.

Antes. Nicah. Brasil. p. 23.

Anta. Marcgr. Bras. p. 229. Guni. Orin. I. p. 300. Buff.
hist. XI. p. 444.

Vacho montaguarde. Dampier. it. 3. p. 356.

Elan. Condam. it. p. 163.

Sus aquaticus multifulcus, Tapir, Maypoury. Barr. Fr.
eq. p. 160.

Sus aquaticus musticulus. Fermin Surin. 2. p. 80.

Hydrochærus Tapir. Erxl. mamm. p. 191. n. 1.

Wässerschwein. Knorr delic. II. tab. K. 13.

Habitat gregarius in silvis & fluvii plagarum orientalium

Americæ australis ab isthmo Darien ad Amazonum us-
que fluvium, dormit interdiu in silvis obscurissimis &
densissimis, noctu cibum quærit, & gramine, saccharo,
fructibus vicitat; mitis, facileque cicurandus, meticulo-
sus, salax, egregie natat, urinatur & in aquæ fundo
incedit; timefactus etiam aquam intrat. Caro ameri-
norum palato arridet. Animal eorum, quæ Americæ
propria sunt, maximu, vaccæ minoris magnitudine,
habitu suis; cutis tenax; vellus fuscum pilis brevibus,
junioribus albo-maculatum; auriculæ subrotundæ, ericæ,
majusculæ; oculi minuti; dentes molares supra & infra-
utrinque 5; maxilla utraque acuta; nasus (mari) elonga-
tus in proboscidem tenueri, extensilem, lateribus sulca-
tam, ultra maxillam inferiorem prominentem; collum
crassum, breve, cervice setis scsquipollicaribus jubata;
dorsum arcuatum; pedes breves, ungulis nigris cavis;
cauda brevissima nuda.

35. SUS. *Dentes primores superiores IV convergentes.*
inferiores (plerisque) VI
prominentes.

laniarii superiores II breviores.
inferiores II exserti.

Rostrum truncatum, prominens, mobile.
Pedes (ut plurimum) bisulci.

- Scrofa.
 ferus.
- i. S. dorso antice setoso, cauda pilosa. *Fn. suec.* 21. *Amoen.*
 ac. V. p. 461.
- α. S. caudatus auriculis brevibus subrotundis, cauda pilosa.
Briss. quadr. 75.
Ἐριχόνιος. Aristot. hist. an. I. c. 2.
Κεκρις. Aristot. hist. anim. II. c. 9. & II. V. c. 13. *Op-*
pian. cyneg. III. 364.
Συτόνιος. Aelian. anim. V. c. 45.
Sus. Charlet. exerc. p. 13.
Sus ferus. Plin. hist. nat. VIII. c. 51.
Sus agrestis sive aper. Raj. quadr. p. 96.
Porcus. Plin. hist. nat. XVIII. c. 35. *Jonst. quadr. t.* 48.
Klein quadr. p. 25.
Aper. Gesn. quadr. p. 1039. fig. p. 1040. *Schwenckf. ther-*
riotr. p. 54. *Aldr. bisulc.* p. 1013. fig. p. 1025. *Jonst.*
quadrup. p. 105. t. 47. 48. *Rzacz. Polon.* p. 213. aud.
 p. 305.
- Cochons sauvages, ou marrons, ou sangliers. *Des Marchr.*
 it. 3. p. 296.
- Sanglier & Marcassin. *Buff. hist. nat.* V. p. 99. t. 14.
 & 17. f. 1.
- Wild Hog. *Brown Jam.* p. 487.
- Wild Schwein. *Gesn. Thierb.* p. 336. *Ridinger. Jagdb.*
Th. t. 6.
- domesti-
 cus.
 vulgaris.
- β. S. caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa.
Briss. quadr. p. 74.
- a. Sus, Verres, Scrofa. *Plin. hist. nat.* VIII. c. 51. X. c. 63.
 & 73. XI. c. 37. & 39. *Gesn. quadr.* p. 982. fig. p. 983.
Schwenckf. theriotr. 123. *Aldr. bis.* 937. fig. p. 1006.
Jonst. quadr. p. 99. t. 47. *Sibb. Scot. an.* p. 9.
Ἐριχόνιος. Aristot. hist. an. II. c. 5. & 7. V. c. 13. VI. c. 8.
 & 28. VIII. c. 9. *Aelian. an.* III. c. 3. X. c. 16.

Sues fodunt naribus, orbiculo tendinibus affixo, radicesque evolutunt.

*Sus seu porcus domesticus. Raj. quadrup. p. 92. Sloani
jam. II. p. 328.*

Porci. Rzacz. Pol. p. 243. aud. p. 333.

*Cochon, Verrat & Cochon de lait. Buffon hist. nat. V.
p. 99. t. 16. & 17. f. 2.*

Schwein. Gefn. Thierb. p. 331.

monon-
gulus. b. S. ungula indivisa. *Aristot. hist. an. II. c. 7. Plin.
hist. nat. XI. c. 46.*

finensis. c. S. dorso subnudo, abdome ad terram usque propen-
dente. it. *Wyoth. 62. It. scan. 72.*

*Habitat in Europa australiore, Perha boreali, Japonia, a
Syria ad lacum Baical, in ipsa Africa boreali, hospitatus,
zona frigida excepta, ubique, frigus enim non fert; odo-
re pollet, naribus sordens terram; quisquiliis, scrcus,
succulenta, radices variaque spurcata, ipsamque non ra-
ro prolem vorans; multa feligens; pinguisssimum, adipi-
inter cutem & panniculum carnosum collecto, stupidum,
somnolentum, lente festinans, tempestatum prænuncium
& impatiens animal; apricatur in solo, in cœno se volu-
tat, immundum, grunniens accurrit clamanti affini ad-
versus hostem spumante ore, dentibusque immane, crotal-
lis infestum, quos sine noxa vorat; libidine subat; tar-
dum venere; pene laxo longo, mammis numerosissimis,
prole multa ad 20, quam per 4 menses utero gerit; den-
tes non amittit, & 25-30 annorum etatem assequitur.
Caro & multæ aliae partes ganeæ numerosa materies;
Infestatur pediculis, hydatidibus; laborat scrophulis,
scabie; occiditur pipere.*

α) nigro-canescens, junior striis longitudinalibus flavescen-
tibus & fuscis, lana inter setas profundius radicatas nul-
la; lardum nullum; rostrum & dentes laniarii longiores;
auriculae breviores subrotundæ; animal celerrimum pa-
rit Majo & Junio. **β. a.** in temperatoribus majus, fre-
quentissime albicans, sed & luteum, nigrum, cinereum,
rubrum, maculatum, in Tataria maiore ex argenteo ci-
zereum, auriculis longioribus, acutis, subpendulis;
β. b. Upsaliæ frequens alibi; **β. c.** in Sina insulisque
maris. indici & australis, nunc atiam passim in Europa,
cultæ varietas minor, ex albo nigroque variegata, aut
ex nigro paululum canescens, magis munda, pedibus
brevioribus, cauda brevissima, pendula; carne albidiore
& sapidiore.

Porcus.

2. S. dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero.

Sus (guineensis) caudatus, auriculis longis & acuminatis, cauda nuda. Briss. regn. anim. p. 109. n. 4.

Porcus guineensis. Marcgr. brasili. p. 230. Jonst. quadr. t. 46. Raj. quadr. p. 96. Klein quadr. p. 26.

Cochon de Guinée. Buff. hist. nat. XV. p. 146.

Guinea-Hog. Brown. jam. p. 487. Penn. quadr. p. 69.

β. Cochon de Siam. Buff. hist. nat. V. p. 99. t. 15.

Habitat in Guinea, inde in Brasiliam delatus, β. in regno Siamensi; scrofae affinis, an mera varietas? capite recto quoque corpore minor; cauda nuda; auriculae elongatae valde acuminatae; corpus rufum, pilis brevibus rubris splendentibus, longioribus circa cervicem & supra clunes.

Tajassu.

3. S. dorso cystifero, cauda nulla.

Sus (Aper mexicanus) ecaudatus, folliculum ichorosum in dorso gerens. Briss. regn. an. p. 111. n. 6.

Sues, quibus umbilicus in dorso. Aldr. bis. p. 939.

Sus minor, umbilico in dorso, Tajacu, Cochon noir. Barr. Fr. équin. p. 161.

Porcus americanus. Charlet. exerc. p. 14. Seb. mus. I. t. 111. f. 4.

Porcus moschiferus. Klein quadr. p. 25.

Quauhtla Coymatl, Quapizotl. Hernand. mex. p. 637. Coyamatl seu Quauhioyamatl. Fernand. an. p. 8.

Tajassoub, Sanglier. Thevet cosmogr. II. fol. 936. b.

Zainus. Nieremb. hist. nat. p. 170. Jonst. quadr. p. 107. t. 46. Mus. Worm. p. 340.

Tajaçu. Marcgr. brasili. p. 229. Pis. Ind. p. 98. Tyson act. angl. n. 153. p. 359. Raj. quadr. p. 97.

Javaris. Rochefort antill. p. 138.

Espèce de cochon qu'on appelle Peccary. Wafer. it. p. 222.

Sangliers appeler Pecaris. des March. it. 3. p. 296.

Javalies o Paquiras. Gumill. Orin. I. p. 293.

Pingo. Fermin Surin. 2. p. 79.

Pecari ou Tajacu. Buff. hist. nat. X. p. 21. t. 3. 4.

Picary. Bancr. Guian. p. 125.

Mexican Hog. Penn. quadr. p. 72. n. 56.

Habitat gregarius in calidissimarum Americæ regionum, novæ Hispaniæ, Panamæ, Brasiliæ, Guianiæ, et insularum Antillarum silvis montosis, ferus, facile tamen curandus, cœni non amans, neque pinguiscens, uti quidem scrofa; viditat fructibus, radicibus, serpenzibus;

*reptilibus; caro bona, modo statini a morte animalium
excindatur cystis dorsalis.*

Figura accedit ad scrofam sinensem, longitudine ad pedes; dentes laniarii superiores ore clauso vix conspiciuntur; auriculae breves erectæ, acuminatæ; oculi plani; collum breve crassum; fetæ majores, quam scrofa, aculeos erinacei accidentes, ex nigro canescentes, albo annulatae, cervicis & dorsi longissimæ; cystis versus clunes posita, liquore castoreuni fere olente referta.

africanus. 6. S. dentibus primoribus duobus. *Penn. hist. of quadr. p. 132. n. 6.*

Sanglier de cap verd. *Buffon hist. nat. XIV. p. 409. XV. p. 148.*

Habitat in Africa a capite viridi ad Caput bonæ speciei. Corpus setis longissimis tenuibus testum; caput elongatum; nasus gracilis; dentes canini lati, eboris duritie, superiores crassi, oblique truncati; molares in utraque maxilla utrinque VI, anteriores maximi; maxilla superior interior multo longior; auriculae angustæ, erectæ, acuminatæ, apice setis longissimis barbatæ; cauda gracilis floccosa, primum crurum articulum attingens.

aethiopicus. 4. S. facculo molli sub oculis. *Syst. nat. XII. 3. p. 223.
Aper aethiopicus. Pallas miscell. zool. p. 16. t. 2. spicili.
zool. II. p. 3. t. I. XI. p. 84. t. 5. f. 7.*

Engalla. *Meroll. Cong. p. 667. Sorrento it. apud Church. I. 667.*

Emgalo or Engulo. *Barbot Guin. p. 487.*

Porc sanglier. *Flacourt Madag. p. 151.*

Sanglier hideux. *Damp. it. I. p. 405.*

Sanglier du cap verd. *Buffon hist. nat. suppl. III. p. 76. t. 11.*

African wild boar. *Deslandes Martyn's mem. acad. V. 386.*

Ethiopian hog. *Penn. quadr. p. 70. n. 53.*

Habitat in Madagascar & calidissimis Africæ interioris, ferox, lanium purpureum fere olens, celer, scrofa agilior, vivacior, astutior, cum qua non coit; nondum adultus 4 pedes, & 9 pollices longus.

Corpus crassum, latum, nudiusculum, setis fasciculatis & fusco nigris, in dorso longioribus, in nucha longissimis; caput ingens; rostrum truncatum, deorsum flexum, ferrum cornuum; os parvum; loco dentium primorum, cibis caret, gingivæ anterius duræ, convexæ, læves; laniæ infra minores, supra majores, apice sursum versæ;

molares utrinque VI. auriculæ subacutæ ; oculi in summo capite , parvi , sibi auriculisque propiores , quam inferosa , sub his saccus mollis , cute laxa nigra , cum appendice duriore zygomatica utrinque. Cauda nuda.

- Babyrus-
fa. 5. S. dentibus duobus caninis fronti innatis.
Sus dentibus caninis versus frontem reclinatis. Erxl. -
mamm. p. 188. n. 5.
Sus (Aper orientalis) caudatus , dentibus caninis superioribus ab origine sursum versis arcuatis , cauda floccosa. Briss. regn. an. p. 110. n. 5.
'T; θηρακια. Aelian. anim. XVII. c. 10.
Aper in India. Plin. hist. nat. VIII. c. 52.
Aper cornutus. Calpurn. eclog. 7. v. 58.
Aper indicus orientalis , Babi Raesa dictus. Seb. mus. I.
p. 80 t. 50. f. 2.
Porcus indicus Babyroussa dictus. Raj. quadr. p. 96. Klein
quadr. p. 25.
Strange Hogs , Hogs with hornes. Purch. pilgr. II. p.
1695. V. p. 566.
Horned hog. Grew mus. reg. soc. p. 27. t. 1.
Indian hog. Penn. quadr. p. 73. n. 57. t. 11. f. 1.
Baby roussa , Babiroussa , Babyrusa , Babi-Roesa. Bont.
ind. or. p. 61. Jacob. mus. reg. p. 5. t. 2. f. 5. Laus.
mus. reg. t. 3. f. 28. Valent. Amboin. 3. p. 268. Buff.
hist. nat. XII. p. 379. t. 48.
Eberhirsch oder Hirscheber. Knorr. delic. II. t. K. 7.
Habitat in insula Java , Celebes & Buero prope Amboinam , in reliquis insulis oceanii indici hospitatur cicuratus , an Xanthopithecus Cosmæ? gregarius , olfactu acri ; herbis foliisque vivitans , bene natans & urinans ; voce scrofae similis ; carne bona ; magnitudo cervi .
Corpus gracilius , quam congeneribus , ex fusco griseum , fere lanatum , dorso tamen adspersis setis molibus ; caput oblongum angustum , oculis minutis ; auriculis parvis , ereditis , acutis ; dentes molares in utraque maxilla utrinque V ; laniarii superiores perforantes maxillam superiorem , recurvati instar duorum cornuum , inferiores magni minus recurvi ; crura longa gracilia ; cauda longa , contorta , apice floccosa .

VII. CETE.

Spiracula ad calvariæ anteriora posita;
Pedes nulli.

Pinnæ pectorales absque unguibus;
Cauda horizontalis.

37. MONODON. *Dentes duo in maxilla superiore exserti prælongi recti spirales.*

Fistula respiratoria in parte calvariaæ anteriore & superiore.

Monoce- 1. Monodon. *Art. gen. 78: syn. 108: Fn. suec. 48. Mus. Ad. Fr. 1. p. 52. Müller zool. dan. prodr. p. 6. n. 44.*
Monoceros, Unicornu marinum. Charlet. exerc. pisc. p. 47.
*Monoceros piscis e genere cetaceo. Willughb. pisc. p. 4²**
app. p. 12. t. A. f. 2. Raj. pisc. p. II.
Unicornu marinum. Mus. Worm. p. 282. 283.
Narhwal. Klein miss. pisc. II. p. 18. t. 2. f. C.
Narhwal oder Einhorn. Andersf. Isl. p. 225. Crantz
Groenl. p. 146.
Einhorn. Mart. Spizb. p. 94.
Eenhiörning ou le Narhval, Lioorne. Egede Groenl. p. 96.
Habitat in Americæ & Europæ oceano septentrionali ve-
locissime natans, ut, quamvis non rarus, raro tamem
capiatur.
Animal 20-22, si fides aliis, 40-60 pedes longum, 12
circiter latum. Cutis alba in dorso nigro-maculata, lir-
do copioso subjacente; pinna dorsalis nulla, pectorales 2
exiguæ; caput parvum; oculi per exigui; dentes, unicor-
nu nomine vulgo venientes, juniori animali 2, inter-
dum lævus, labium superius perforantes, adultiori sa-
pissime unicus. Unicornu alterum fiditum esse, mecha-
nicis & zoologicis argumentis evincit. Camper.

Cetorum species in mari rubro rariores, pauciores rite cognitæ; quibusdam pinnae
 dorsalis, omnibus pinna caudæ & pectorales, nullis anales aut ventrales, cum
 pedes in caudam coadunati.

38. BALÆNA. *Dentium loco in maxilla superiore
laminæ corneaæ.*

*Fistula respiratoria dupli orificio
externo supra caput.*

- Mystice-
tus. I. B. naribus flexuosis in medio anteriore capite , dorso
impenni. *Fn. suec.* 49. *Artic. gen.* 76. *syn.* 106.
Balæna (groenlandica) fistula dupli in fronte , maxilla
inferiore multo latiore. *Linn. mus. Ad. Frid.* I. p. 51.
Balæna dorso impenni, fistula in medio capite , dorso cau-
dam versus carinato. *Gron. zooph.* 139.
Balæna (vulgaris groenlandica) bipinnis, in dorso nigricans,
in ventre alba , dorso lævi. *Briff. regn. an.* p. 347. n. I.
Balæna major, laminas corneas in maxilla superiore habens,
fistula donata, bipinnis Sibb. & Balæna vulgaris edentula,
dorso non pinnato. *Raj. pisc.* p. 16. & 6.
Balæna vera Zorydrageri. *Klein miss. pisc.* II. p. 11.
Balæna vera Rondeletii, & Balæna Rondeletii, *Gesneri* &
aliorum. *Willughb. pisc.* p. 38. 35.
Balæna vulgo dicta sive musculus. *Rondelet. pisc.* p. 475.
Balæna vulgo dicta sive *Mysticerus Aristotelis*, *Musculus*
Plinii. Gesn. aquat. p. 132.
Balæna vulgaris. *Charlet. exerc. pisc.* p. 46.
Balæna vulgi. *Mus. Worm.* p. 281. *Jonst. pisc.* p. 216.
Aldrov. pisc. p. 688.
Balæna. *Plin. hist. nat.* IX. c. 6. 7. 13. *Schonev. ichth.*
p. 24. *Aldrov. pisc.* p. 675. *fig. p. 677-682. Sibb. Scott.*
an. p. 23.
Balæna. *Aristot. hist. an.* I. c. 5. III. c. 16. *Aelian. anim.*
V. c. 4.
Mysticerus. Aristot. hist. an. III. c. 10.
Hvalfisk. *Egede Groenl. fig.* p. 48.
Der rechte groenlaendische Wallfisch. *Anders. Isl.* p. 212.
Cranz Groenl. p. 141.
Walifisch. *Mart. Spitzb.* p. 98. t. Q. f. a. b.
8. Balæna (islandica) bipinnis ex nigro candicans , dorso
lævi. *Briff. regn. an.* p. 350. n. 2.
Balæna glacialis. *Klein miss. pisc.* II. p. 12.
Autre espèce , qu'on appelle Nord-kapper. *Egede Grøenl.*
p. 53.
Nordkaper. *Anders. Isl.* p. 219. *Cranz Groenl.* p. 145,

γ. *Balæna major*, laminas corneas in superiore maxilla habens, bipinnis, fistula carens Sibb. *Raj. pifc.* p. 16.
(nisi fistula sit.)

Habitat versus polum arcticum, potissimum circa Groenlandiam & Spitzbergen, timidum, velocissimum animal, quamvis omnium maximum, ut 50-60, imo secundum alios 70-80, aliquando 100 pedes longitudine æquet, β. tamen minor graciliorque varietas; viicitat cancro pedato & oculi raro, Argonauta arctica & Clione bitentaculata, β. medusis clupeisque. Femina, mammis 2 parvis abdominalibus gaudens, 9-10 menses grida, simplicem, raro duplarem parit prolem, ad 10 pedes longam, quam mire amat. Caro sicca, in cauda magis succulenta, mollior, edulis, parum tanien sapida. Laminæ cornæ frequentissimi usus, apice & marginè fissæ in setas, in unicò animali circiter 700, media longissima 18-20 pedibus æquali. Lardum inter cutem & carnem copiosissimum, ut ex unica balæna ejus obtineantur 70-90 dolia, ex quo tunc excoquitur oleum; has propter partes capit, captura jam Isidori & Vincentii tempore notissima, teste Guilielmo Britone, poëta seculi duodecimi, eo tempore ad littora Gallæ lucrosa & vulgata.

Caput partem tertiam corporis efficit, supra planiusculum tecti instar cum tuberculo, in quo spiracula; os longum, forma litteræ S curvatum, ad oculos usque protensum; maxilla inferior, medio præsertim, latissima; lingua mollis, maxillæ inferiori adhærens, alba, ad latera nigromaculata; oculi bovillorum magnitudine, laterales, remotissimi supra aures; cutis crassitie pollicis; epidermis calami scriptorii, nitida, raro tota nigra vel nigro & flavo varia, rarius tot alba. Angulus subacutus a media cauda subbifida secundum dorſi medium extensus, brevis. Penis vaginatus, 6-8 pedes longus.

Phyſalus. 2. *B.* fistula dupli in medio anteriore capite, dorſo extremo pinna adiposa. *Fn. suec.* 50. *Art. gen.* 77. *syn.* 107.

Balæna tripinnis, ventre lævi. *Briff. regn. an.* p. 352. n. 5.
Balæna edentula, corpore strictiore, dorſo pinnato, *Raj. pifc.* 9. *Klein miſf. pifc.* II. p. 13.

Phyſalus bellua f. *Phyſeter.* *Gefn. aquat.* p. 851.

Phyſeter. *Plin. hist. nat.* IX. c. 4. XXXII. c. 11. *Rondel. pifc.* p. 485. *Aldrov. pifc.* p. 689. *Jonſt. pifc.* p. 217. *Charlet. exerc. pifc.* p. 47. *Sibb. Scot. an.* p. 23. *Wilughb. pifc.* p. 41.

Finne-

Finne-fiske. Egede Groenl. p. 48.

Finnfisch. Mart. Spitzberg. p. 125. tab. Q. fig. c. Andersf. Isl. p. 219. Cranz Groenl. p. 145.

Habitat in oceano americano & europæo *aequalis cum mysticeto longitudinis*, sed minus pinguis, triplo vel quadruplo gracilior, oris ridu ampliore, laminis corneis brevioribus cæruleis, carne magis sapida; aquam majori vi ex fistulis ejicit, vescitur clupeis & scombris; corpus nitidum fuscum subtus album. Pinna dorsalis redita acuta, 3-4 pedes longa.

Boops. 3. B. fistula dupli in rostro, dorso extremo protuberantia cornea. Art gen. 77. syn. 107.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro acuto. Briff. regn. an. p. 355. n. 7.

Balæna tripinnis nares habens cum rostro acuto & plicis in ventre. Raj. pisc. 16.

Jubartes. Klein miss. pisc. II. p. 13.

Jupiterfisch. Andersf. Isl. p. 220. Cranz Groenl. p. 146.

Habitat in Oceano septentrionali & meridionali 46 pedes longa, circa pinnas pectorales 20 pedes in ambitu crassa, lævissima, nigra, abdomine albo, secundum longitudinem rugoso. Caput oblongum, rostro subacuto; lingua 5 pedes longa, bovillæ similis; oculi prope angulos oris siti, bovillorum magnitudine.

gibbosæ. 5. B. dorso gibbosæ, pinna dorsali nulla.

a. Balæna bipinnis, gibbis dorsalibus sex. Briff. regn. anim. p. 351. n. 4.

Balæna gibbis dorsalibus sex. Erxl. mamm. p. 610. n. 5.

Balæna gibbis vel nodis sex, balæna macra. Klein miss. pisc. II. p. 13.

Knotenfisch oder Knöbbelfisch. Andersf. Isl. p. 225. Cranz Groenl. p. 146.

ß. Balæna (novæ Angliæ) bipinnis, unico in dorso gibbo. Briff. regn. anim. p. 351. n. 3.

Balæna gibbo unico prope caudam. Klein miss. pisc. II. p. 12.

Pfiokfisch. Andersf. Isl. p. 224. Cranz Groenl. p. 146.

Habitat β. circa novam Angliam, gibbo versus caudam sita caput humanum superante; α. figura mysticeti, laminis corneis albis.

Muscu- 4. Bi fistula duplice in fronte , maxilla inferiore multo latiore
lus. Art. gen. 78. syn. 107. spec. 106.

Balæna tripinnis , ventre rugoso , rostro rotundo. Briffon
regn. an. p. 353. n. 6.

Balæna tripinnis , maxillam inferiorem rotundam & superio-
rem multo latiorem habens Sibb. Raj. syn. pisc. p. 17.
Θελάνη , Balena , Balæna , Baleine , Italis Capidolio. Bell.
aquat. p. 4. 6.

Balæna Bellonii. Aldrov. pisc. p. 676.

Habitat in mari scotico , viditans clupeis supra nigra , sub-
tus alba , 78 pedes longa , ambitu 35 pedes superante ;
maxilla inferior semicircularis , superior apice acuta ; rictus
ingens ; laminæ cornæ nigrae breves , ut longissimæ tres
pedes non excedant ; fistula pyramidalis , versus frontem
posita , septo divisa ; abdomen rugis plurimis ; dorsum
pinna adiposa.

rostrata. 6. B. ore rostrato , dorsi pinna adiposa.

Balæna (rostrata) minima rostro longissimo & acutissimo.
Müller zool. dan. prodr. p. 7. n. 48. Chemniz Besch.
der berl. Naturf. IV. 183.

Balæna ore rostrato , balæna tripinnis edentula minor ,
rostro parvo. Klein miss. pisc. II. p. 13.

Habitat in mari norwegico , Boopi satis similis , subpinguis ,
nigerrima , 25 pedes longa , celerrime natans , visu acu-
to ; maxilla inferior superiore crassior , in superiore den-
tem lateralem solitarium , laminas cornreas nullas obser-
vavit Chemniz , an ergo hujus generis ?

39. PHYSETER. Dentes in maxilla inferiore , nulli
in superiore.

Fistula in capite s. fronte summa.

Catodon. 1. Ph. dorso impinni , fistula in rostro.

Catodon fistula in rostro. Art. gen. 78. syn. 108.

Cetus (minor) bipinnis , fistula in rostro. Briff. regn. anim.
p. 361. n. 4.

Balæna minor, in inferiore maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso Sibb. *Raj. pisc.* p. 15.

Habitat in Oceano septentrionali, 24 circiter pedes longus; capite rotundo, rictu parvo; fistula nasum referente in rostro.

macroce- 2. Ph. dorso impinni, fistula in cervice.

Phalus. Catodon fistula in cervice. *Fn. suec.* 53. *Art. gen.* 73. *Syn.* 108.

a. Cetus bipinnis supra niger infra albicans, fistula in cervice. *Briss. regn. an.* p. 357. n. 1:

Catodon fistula in nucha, dorso topho instructo, the Spermaceti Whale. *Brown. jam.* p. 459.

Cete Pot Walfish Batavis maris accolis dictum, & Balæna major, in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala, bipinnis Sibb. *Raj. pisc.* p. 11. 15.

Balæna. *Jonst. pisc.* p. 215. t. 41. 42. *Willughb. pisc.* t. A. 1. f. 3.

Aliud cete admirabile. *Clus. exot.* p. 131:

Cete Clusio descriptum, Pot-Walfisch Batavis maris accolis dictum. *Willughb. pisc.* p. 41.

Cete Clusii. *Klein miss. pisc.* II. p. 14.

Cetus dentatus. *Mus. Worm.* p. 280. *Charlet. exerc. pisc.* p. 47. *Sibb. Scot. an.* p. 23.

Cachetot. *Klein miss. pisc.* II. p. 14. *Egede Groenl.* p. 54. *Andersf. Iсл.* p. 232. *Cranz Groenl.* p. 148.

2. Cetus (albicans) bipinnis ex albo flavescens, fistula in cervice, dorso laevi. *Briss. regn. anim.* p. 359. n. 2.

Balæna albicans, Weissfisch Martensii & Zorgdrageri. *Klein miss. pisc.* II. p. 12.

Albus piscis cetaceus. *Raj. pisc.* p. 11.

Poisson blanc, Hviid-fiske. *Egede Groenl.* p. 55.

Weissfisch. *Mart. Spitzb.* p. 94.

3. Cetus (novæ Angliæ) bipinnis, fistula in cervice, dorso gibbosof. *Briss. regn. an.* p. 360. n. 3.

Dudleji Balæna. *Klein miss. pisc.* II. p. 15.

MAMMALIA CETE. Physteter.

*Habitat α) in oceano Europæo, β) in freto Davis, γ)
circa novam Angliam; α) ad & ultra 60 pedes longus,
36 pedes in anibitu crassus, supra niger infra albus;
caput crassissimum, maxilla inferiore minore cum den-
tibus 46 duplii serie 2-3 pollices ex gingiva exsertis,
a totidem alveolis in maxilla superiori exceptis. Mam-
mæ retractiles. Vixit potissimum sepia octopodia.*

*Ex hujs capite sperma ceti, propriæ cavitati ossæ, cute
communi obtectæ inclusum; ex intestinis ægri debilis-
que ambra grisea, qua non est, nisi ejus scybala, præ-
ter naturam indurata. Schwediauer act. angl. ann. 1783.
P. I. n. 15.*

*β. figura mysticeti, capite tamen acutiore; 15-16 pedes
modo longus, ex albo flavescens; dentibus parumper
incurvis, compressis, apice rotundatis.*

*γ. ex cinereo nigricans 60-70 pedes longus, 30-40 in
anibitu crassus, gibbere dorsali pedem crasso, capite
prægrandi, oculis exiguis; maxilla inferior superiore
multo angustior dentibus plurimis munita, superior to-
tidem alveolis.*

microps. 3. Ph. dorso pinna longa, maxilla superiore longiore. *Art.
gen. 74. syn. 104.*

*α. Cetus tripinnis, dentibus acutis arcuatis falciformibus.
Briff. regn. an. p. 363. n. 6.*

Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata,
dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinnam in
dorso habens Sibb. Raj. pisc. p. 15.

Balæna major, in inferiore tantum mandibula dentata,
dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinnam in
dorso habens. Klein miss. pisc. II. p. 15.

Dritte Species der Cachelotte. *Anders. Isl. p. 248.*

*β. Cetus tripinnis, dentibus acutis, rectis. Briff. regn.
anim. p. 362. n. 9.*

Zweyte Species der Cachelotte. *Anders. Isl. p. 246.*

*Habitat in oceano septentrionali; caput maximum; maxilla
superior tot alveolis exarata, quo dentibus armata infer-
rior, oculi exigui; cutis lævissima. α) ad 70 pedes lon-
gus ex fuso nigricans, phocænas exagitat sæpe usque in*

ipsam terram. Dentes 42 rotundi, parumper compressi, falcis instar curvati, medio crassiores; fistula paululum sub rostri medio; pinna dorsalis sat longa acuminata, ut spinam fere referat.

B) 80-100 pedes longus, supra nigricans, subtus albicans, gibbere altissimo in parte dorsi superiore, & pinna caudam versus posita; caput dimidia fere corporis longitudine; oculi splendentes, flavicantes; lingua parva, acuta; dentes crassi, redi, apice acuti, quasi ferræ.

Turcio. 4. Ph. dorsi pinna altissima, apice dentium plano. *Art. Gen.* 74. *syn. 104.*

Cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus. *Briffon reg. anim.* p. 364. n. 7.

Balaena macrocephala tripinnis, quæ in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos & in planum desinentes. *Sibb. Raj. pisc.* p. 16.

Mular Nierembergii. Klein miss. pisc. II. p. 15.

Habitat in oceano septentrionali, 100 pedes longus & longior, pinna dorsi longissima, acuta, erecta, ut navis malum quasi referat, fistula in fronte posita, dentibus minus inflexis & apice planis; ceterum micropisimilis.

40. DELPHINUS. *Dentes in maxilla utraque.*

Fistula in calvariæ parte anteriore & superiore.

Phocæ- I. D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso, *Fn. suec.* 51. *Art. gen.* 75. *syn. 104.*

Delphinus (Phocæna) pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro brevi obtuso. *Briff. regn. an.* p. 371. n. 2. *Bloch Fisch. Deutschl.* 2. p. 119. t. 92.

Turcio. Plin. hist. nat. IX. c. 9. *Bellon. aq.* p. 15. *Rondelet pisc.* p. 474. *Schonev. ichth.* p. 77. *Klein miss. pisc.* II. p. 26. t. 2. A. B. 3. B.

**ongira*, *Turcio, Marsouin. Bellon. aq.* p. 16.

Phocæna. Rondelet pisc. p. 473. *Gesn. aq.* p. 837. *Aldrov. pisc.* p. 719. fig. p. 720. *Jonst. pisc.* p. 221. t. 41. *Char-* P. 3.

*let. exerc. pisc. p. 48. Sibb. Scot. an. p. 23. Willughb.
pisc. p. 31. t. A. I. fig. 2. Rej. pisc. p. 13. Rzacz. Pol.
aud. p. 245. Klein miss. pisc. I. p. 24.*

Meerschwein oder Tunin. *Mart. Spitzb. p. 92. Anders.
Isl. p. 253. Cranz Groenl. p. 151.*

Niser ou le Marsouin. *Eged. Groenl. p. 60.*

Delphin oder Nisen. *Gunner. ad. Nidros. II. p. 237. t. 4.*

*Habitat in oceano Europæo & mari Balthico, 5-8 pedes
longus, supra ex nigro cœrulescens, subtus albus; caput
obtususculum; oculi perexigui; pone hos foraminulum
auditorium, interque eos spiraculum lunatum, situ an-
trorum verso; dentes parvi acuti, in utraque maxilla
46; penis foramen lineare pone umbilicum sive sub
pinna dorsali; anus medius inter penem & caudam
subbisurcam.*

*Dolphis. 2. D. corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto.
Art. gen. 76. syn. 105.*

*Dolphinus pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro
longo acuto. Briss. regn. an. p. 369. n. 1.*

*Aegus. Arist. hist. an. I. c. 5. II. c. 9. III. c. 1. 7. 16.
IV. c. 9. 10. IX. c. 74. Aelian. an. I. c. 18. II. c. 6. V.
c. 6. VIII. c. 3. X. c. 8. XI. c. 12. 22. XII. c. 6. 45.*

*Dolphinus. Plin. hist. natur. IX. c. 7. 8. XI. c. 37. Bellon.
aquat. p. 7. fig. p. 9. 10. Rondel pisc. p. 459. Gosa.
aquat. p. 380. fig. p. 381. Aldr. pisc. p. 701. 702. 704.
Jonst. pisc. p. 218. t. 43. Mus. Worm. p. 288. Charet.
excrc. pisc. p. 47. Willughb. pisc. p. 28. t. A. I. fig. 1.
Rej. pisc. p. 12. Rzacz. Pol. aud. p. 233. Klein miss.
pisc. II. p. 24. t. 3. f. A.*

Porcus marinus. Sibb. Scot. an. p. 23.

Delphin. Anders. Isl. p. 254. Cranz Groenl. p. 152.

*Habitat in oceano Europæo, & mari pacifico, adhaerens
sæpius balænis, ut exsiliant; supra niger, subtus albus;
major phocæna, minor orca, ita ut longitudine 9-10
pedes, crassitie, si diametrum metaris, 2 pedes æquat,
phocæna hinc gracilior: rostrum longius & magis acutum,
supra cinctum fascia lata transversa; dentes subulati;*

MAMMALIA CETE. *Delphinus.*

231

oris scissura magna ad thoracem usque; genitalia inter umbilicum & anum media; renes conglomerati.

Orca. 3. D. rostro sursum repando, dentibus latis serratis. *Mantiss.* M. 2. p. 523. *Fn. succ.* 52. *Art. gen.* 76. *syn.* 106. *Gunn. act.* *Nidros.* 4. p. 110.

Delphinus (Orca) pinna in dorso una, dentibus obtusis.
Briff. regn. an. p. 373. n. 4.

Balaena minor utraque maxilla dentata Sibb. *Raj. pisc.* p. 15.

Orca. *Plin. hist. nat.* IX. c. 6, XXXII. c. 11. *Bellon. aquat.* p. 16. *fig.* p. 18. *Rondel. pisc.* p. 483. *Gesn. aquat.* p. 748. *Schonev. ichth.* p. 53. *Aldrov. pisc.* p. 697. *fig.* p. 698. *Jonst. pisc.* p. 217. *Charlet. exerc. pisc.* p. 47. *Wil-lughb. pisc.* p. 40. *Raj. pisc.* p. 10. *Klein. miss. pisc.* II. p. 22. t. I. f. I. *Steller Camtschatec.* p. 104.

Wagnhyalur vel Hualhund; *Mus. Wormi.* p. 279.

Butskopf. Mart. Spitzb. p. 93. *Andersf. Isl.* p. 252. *Cranz Groenl.* p. 151.

Buts-kopper. Egede Groenl. p. 56.

B. *Delphinus pinna in dorso una gladii recurvi æmula, dentibus acutis, rostro quasi truncato.* *Briff. regn. an.* p. 372. n. 3.

Delphinus (Orca) dorsi pinna altissima, dentibus subconicis parum incurvis. *Müll. zool. Danic. prodr.* p. 8. n. 57.

Schwerdtfisch. *Andersf. Isl.* p. 255. *Cranz Groenl.* 152.

Noch ein ander Art grosse Fische. *Mart. Spitzb.* p. 94.

Habitat in oceano Europeo, mari atlantico, ad polum antarcticum, in freto Davis, maximus congenerum, ut 24-25 pedes longitudine, 12-13 latitudine æquet, supraniger subtus albus, cum phocis, quas pinnæ dorsalis ope a lapidibus detrudit, continuum bellum gerens, has & balænas turmatim aggrediens, & una cum pleuronectis maximis occidens & devorans. Maxilla inferior superiore multo major; rostrum sumum; dentes obtusi 40; oculi parvi; spiraculum planum biloculare. Pinna s. spina dorsalis β) ensiformis, cute communè vestita, basi latior, sape sexpedalis.

- Leucas. 4. D. rostro conico obtuso, deorsum inclinato, pinna dorsali null. *Pall. it. III. p. 84. t. IV.*
 D. pinna in dorso nulla. *Briss. regn. an. p. 374. n. 5.*
 Beluga. *Penn. quadr. p. 357.*
 Bieluga. *Steller Camtschatec. p. 106.*
 Wittfisch oder Weissfisch. *Andersf. Isl. p. 251.*
 Weisfisch. *Cranz Groenl. p. 150.*

Habitat ad polum arcticum, rarius in fluvios ascendens, gregarius, glaberrimus, lubricus, aibus, junior tamen parumper nigricans, 18 pedes nunquam excendens longitudine, medio crassior, versus utrumque finem magis attenuatus, celerrime natans. Caput oblongum, parvum; oculi exigui, rotundi, prominuli; spiraculum in fronte, in palato per septum divisum; dentes in utraque maxilla utrinque 9 breves, & satis obtusi. Pinnæ pectorales pingues, ossibus digitalibus. Cauda cartilaginea, biloba. Mammæ feminae 2 laete albo refertæ; penis mari triuncialis brachii crassitie absque cartilagine aut osse.

C L A S S I S II.

A V E S.

*Ipsi lætitia voces ad fidera mittunt
Intonſi montes, ipſæ jam carmina rupes,
Ipſa ſonant arbuſta.*

VIRGIL. ecl. V. 62.

AEREÆ vocales Volucres pulcherrimæ, *Mandibulis protractis nudis*, *Corpore pennis imbricato*. *Alis duabus pennatis volitantes bipedes* dignoscuntur.

AVES levissimæ modici ponderis & magnitudinis, teftæ pennis plumisque, deflituræ *Auriculis*, *Labiis*, *Scroto*, *Dentibus*, *Utero*, *Vefica urinaria*, *Epiglottide*, *Fornice*, *Corpore calloſo*, *Diaphragmato*.

PENNÆ avibus propriæ imbricatum in quincuncem dispositæ, interſtinctæ *Plumis*, diſtinctæ a *Remigibus Redrictibusque*, omnes ſu- pra convexæ, ſubtus concavæ: latere exteriore anguſtiores; inte- tiore latiores; anteriore laxiores; posteriore ſtrictiores; ſcilicet e baseos cylindro tubuloſo referto aëriſero vase lymphaticis ſimili, *Rachi elongatæ*, bifariam radiis parallelis approximatis diſtinctis itidem pinnatis ancipites.

Colore ludunt, ſed variant ætate, ſexu, tempeſtate, climate; conſtantiores *Remiges* & *Redrictices*, quæ attente notandæ (*).

Nuda cutis utrinque ad colli latera a capite versus interſcapulium, ab axillis per latera pectoris fere ad inguina & ad femora poſtica.

OVA his animalibus coniunua (p. 8. n. 4.) numero diversis vario, ſed majora pro mora exclusionis ſiccæ, ſemper putamine calcareo obtefta, incubatu calido excludenda Parentis, in *Nido* artificioso. *Trachea* multis muſculis munita, annulis conſtat mere cartilagineis, in nonnullis avibus ipſa adeo branchia.

Receptacula aërea per totum corpus diſpersa, ad volatum cantumque ſumme neceſſaria cum pulmonibus aut ore commercium alentia, ut pro arbitrio aëre vel impleri vel evanari poſſint; huc ſpectat tela cellulosa abdominalis ſubaxillaris aliaque ſubcutanea, potiſſimum vero (exceptis ſcolopacibus, fulicis, & anſeribus) oſſa intus cava &

(*) *Aft. Stockh.* 1740. p. 370. t. 1. f. 10. II.

medullæ expertia, femoris, brachii, sterni, eosæ, coxae, humeri, claviculæ, dorsi quoque spina, in paucioribus cranium aut maxilla inferior, in quæ posteriora per os aut tubum Eustachii intrat aer.

DIVIDITUR Avium corpus in Caput, Truncum, Artus.

Caput tegitur supra *Pileo* e *Vertice*, *Fronte* & *Occipite* unitis, cingens rostrum antice *Capisira*, in quo *Lora* e lineis duabus nudis a rostro ad oculos ducta; *Orbitæ* ambient oculos, supra quos *Supercilia*; inter oculos & aures *Tempora*; inter oculos vero & gulam *Gencæ* sunt.

Rostrum in variis varium: *Rectum*, *Incurvum*, *Recurvatum*, *Teres*, *Compressum*, *Depressum*, *Conicum*, *Subulatum*, *Cylindrium*, *Angulatum*, *Cultratum*, *Fornicatum*, *Uncinatum*.

Mandibulæ nudæ edentulæ, quibusdam pone apicem *emarginatae*, paucis *serratae*, exorrectæ in *Rostrum* cornuum, *Naribus* pertusum, superioris basi quibusdam *Cera* nuda vescita, *Vibrissæ* pectinationi ciliatis ad fauoris exterioris margines.

Lingua carnosa, cartilaginea, emarginata, lacera, pennacea, ciliata, integra s. acuta.

Oculi laterales *Palpebris* Membranaque nictitante detergendi; lente crystallina mobilissima, in loculis nigris, plicatis, conicis recondita. *Superciliorum* loco interdum linea picta, rarius carunculata.

Aures truncatae absque auriculis, quarum loco pennæ strigibus longæ.

Barba *Mystacca* ad mandibulas inferiores, mobilis *Momotæ*, *Pendulino*; in ipso pectore pendula *Meleagridi* adulto; at *Capistrum* reversum tegit basin rostri *Corvis*, *Picis*, *Strigibus*.

Crista pennacea pilei *Frontalis*, *Verticalis*, *Occipitalis*, *Erecta*, *Recurvata*, *Deflexa*, *Plicatilis*, *Compressa*; *Carunculæ* vero carnosæ nudæque *Frontis*, *Verticis*, *Nuchæ*, *Superciliorum*, *Gulæ*, *Juguli*, sunt ornamenta capitis in variis.

Collum elongatum, erectiusculum, teres, supra incipit *Nucha*, continuatur *Cervice*; infra vero incipit *Gula*, continuatur *Jugulo*.

TRUNCUS ovatus constans *Dorso* coadunato macro, subtus supra *Sternum* magnum carinatum musculosissimo *Pedore*, *Claviculis* coadunatis in *Furcam*, *Abdomine* minore, postice sub *uropygio* perforato *Ano*, genitalibus communi, & terminato *Crisso*.

ARTUS sunt *Brachiales Alæ*, veri *Pedes*, *Caudale Uropigiun*:

ALÆ compressæ, *Ossium* articulis mobiles, testæ *Pennis*, demum *Teclribus* primis secundisque, postice ciliatæ *Remigibus*; explicantur hæ in forniciatum ventilabrum volitanti; complicantur slabulanti primis secundibus secundarias, ut hæ latere anteriere

depingant specificum *speculum nitidum Anatum*; nec deficiunt, nisi in *Impennibus pelagicis* (*Diomedea demersa*, *Alca impenni*) vel volatui ineptis (*Struthione*, *Dido*).

OSSA α . *Brachii* 1 elongatum. β . *Cubiti* 2 elongata. γ . *Carpi* 2 brevissima. δ . *Metacarpi* 2 connexa mediocria. ε . *Digiti* 2 attenuata, altero majore biarticulato, compressio; altero minuto. ζ . *Pollicis* vero 1 minutum, insidens basi anteriori metacarpi, raro *spina evadens* (*Parris*, *Charadrío*, *Struthioni*) adjacentem *spina cetacea*.

REMIGES Primores X: quorum 1 - 4 *Digiti*; 5 - 10 *Metacarpi*; Secundarii 10 - 20 s. 28 *Cubiti*, nulli vero *Brachii*; at *Alula* spuria pennis 3 s. 5 *Pollici* infidet.

PEDES ex Femore, Tibia, Digits, Unguis.

FEMORA ex Osse Femoris Crurisque binis altero cetaceo, carnosa, pennis tecta, præterquam cruribus denudatis in vadantibus Grallis; ceterum plerisque æquilibrio supposita, nisi in *Compedibus* ambulare netciis, quibus intra commune abdōminis tegmen recondita (*Alcis*, *Colymbis*); nonnullis *Armillæ* supra genua cingunt coloratæ.

TIBIAE ex osse Tarsi elongato, macres, angustæ, tendinosæ, nudæ, rariusve *villæ plumbosæve*, paucis postice *Spina calcarea*, in primis masculis.

DIGITI e Metatarsi phalangibus, plerumque IV, quorum unus posticus breviorque, intermedius anterior vero longior, sed *Scansoriis* digiti antici 2, posticique 2; *Cursoriæ* vero postico destituantur *tridactylæ* (*Charadrius*, *Hæmatopus*, *Otis*, *Cafuarius*), rarissime *didaçtylæ* (*Struthio Camelus*). Sunt vero Digihi distincti *Fissipedibus* plerisque; vel intermedius adnatus laterali *Gressoriis*; vel anteriores intertexti membrana integra *Natatoris*; quæ siffa in *Lobatis*, vel basi tantum intertexta *Semipalmatis* vadantibus, vel articulus membranula marginali *Pinnatis*.

UNGUES acuti, quibusdam obtusi, paucis marginati, paucissimis muticis nulli.

UROPYGIUM sessile, cordatum, glandula gemina caudæ brevi adposita tumidum, supra pertusum *Poro oleifero*, cincto Penicillo, ambitu ciliatum Rectricibus Caudæ:

RECTRICES sœpe XII (1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1,); plures (18) Gallinis; pauciores (10) Picis (*Pico*, *Certhia*, *Cuculo*, *Yungi*, *Bucero*, *Ramphasto*, *Trochilo*).

CAUDA inde vel Pedibus brevior *brachyuris*, vell longior *macrouris*, ex Re|ictibus æqualibus integra, vel ad latera per gradus brevioribus *cuneata*, aut lateralibus longioribus *forficata*, in quibus omnibus Re|ictibus complicatis subeunt laterales intermediz.

VOLATILES hæ, Telluris vigiles libidinosique musici, cantu tamen aut amorum interprete, aut adscitio; pleræque *Diurnæ*; paucæ *Nocturnæ* (e. g. *Striges*, *Caprimulgi*), quarum variae noctu cantant (*Luscinia*, *Turdi*) & mane (*Tetraones*, *Gallinacei*), pleræque inermes sunt, cum Alarum remigibus se facile in æthera recipiant ab hostibus terrestribus, & Caudæ re|ictibus aëreos diverso volatu eludant, nisi in terra negotiari necesse sit, quibus odor vel ingratius hostes arcet, vel abolitus occultat; dum aliae speculantur hostem appropinquantem indicantque aliis: *Lanius*, *Yunx*, *Parra*, *Hematopus*, *Meleagris*, *Hirundo purpurea*, &c.

ARMA paucis, præter *Rostrum* & *Ungues* plerisque.

Cornua Meleagridi cornuta, *Palamedæ*.

Calcaria Pavoni, *Phasiano*, *Tetraoni*.

Spinæ (pollicares) Struthioni Camelio, *Parra*,

Charadrio spinoso, *Palamedæ*.

VENERE monogama junguntur pleræque Aves, *polygania* pauciores, ut *Gallinæ*, *Anates*. Illæ utriusque sexus conjunctis viribus struant nidum sæpe artificiosissimum (pendulum, natantem, concameratum, argillosum, foraminosum, nullumve) uteri succedaneum, incubant sedulæ ovis (1 *Alca*, 2 *Colymbus*, 3 *Larus*, 4 *Corvus*, 5-8 *Hirundo*, pluribus *Anates*, *Gallinæ*), pullos famelicæ alunt (ostendendo, porrigendo, regurgitando), fovent, curant, pro aris & focis defendunt, *) duni in his orientur mares. Nuptias celebrant vestitu, musica, ludibus pleræque.

MIGRATIONES annuas inter septentrionales æstivas & australes hy bernas plagas æcticæ Telluris plures instituunt internuncii hi naturæ, ne hyeme demergerentur boreales omnes insectivoræ. Sic migrant plurimi *Passeres* in primis *tenuirostres*, ob defectum infectorum; *Grallæ* ob denegatum glacie aditum vermis & amphibiis; *Anseres* ob congelatas aquas includentes pisces, &c. Revocant vero easdem Dies æstatis longiores, ciborum copia, defiores vestitus, nuptiæ paratae. Pauciores hybernant.

HABITANT aliae intra *Tropicos*, ut *Phaëton*; intra *Polos*, ut *Procellaria glacialis*; aliae alibi, ad *Africæ* promontorium australe *Procellaria capensis*; in *India Paradisea*, *Pavones*; in *Africa Struthio I.*

*) *Mef. Deuteron.* XXII. 6. 7.

Pelecanus i. in *America* Palamedea, Psophia. In *Pelago* impen-
nes compedes; in *Mari Procellariæ*; in *Lacubus Colymbi*; in *Flu-
viis Mergi*; in *Cataraðis Cinclus*; in *Littoribus Charadrii*; in
Paludibus Scolopaces, *Tringæ*; in *Campis Otis*, *in sylvis Lanius*
infæstus; in *Arboribus Passeres*; in *Rupibus Bulo*; in *Pagis*
Pica, *Hirundo*; in *Alpibus Turdus roseus*, *Emberiza nivalis*, &c.

VICTUS cuique suus. Aliæ Carnivoræ: vorant *Cadavera Accipitres*,
Corvi; *Pisces Anseres*; *Inseða Passeres tenuirostres*, & *trochili*;
larvas cochleasque cornix; *larvas Cerambycum Pici*; *Lepidopte-
rorum Cuculus*; *Ricinos Crotophaga*; *Oestros Buphaga*; *Oniscos*
Cinclus; *Phryganeas Hirundines*; *Conchas Hæmatopus*; *Caneros*
Myæteria, *Cancroma*; *Squillas Recurvirostra*, *Lumbricos Crex*.
Aliæ Phytiphagæ: visitant *Plantis Anseres*; *Pomis Psittaci*;
Nucibus Caryocatactes; *Nucleis Coccothraustes*; *Strobilis Cur-
virostra*, *Enucleator*.

OPERA, nec sine fructu, peragunt sua singulæ: sedentes *Accipitres*
Cadavera auferunt, ut vivis parcant; incidentes *Picæ Quisqui-*
lias impuras verminofalsque devorant; natantes *Anseres Aquar-*
rum nimios hospites minuunt; vadantes *Grallæ inquirunt* in
Paludum animalcula; currentes *Gallinæ decidua grana legunt*;
salientes Passeres arbustorum herbarumque Semina insectaque car-
punt; eoque varia semina *Piscium*, *Insectorum*, *Plantarumque*
sæpius in remotissima loca deferunt naturæ disseminatores. Con-
quiruntur Venatu; *Falconaria*; *Aucupio*; instituuntur *Faltones*
ad venatum, *Parræ ad pastoritiam*, *Pelecani ad piscaturam*,
Passeres ad musicam. Mansuescunt *Gallinæ*, *Anates*, *Passeres*
que varii. In Ornithone f. aviario coluntur ob *carnes*, *ova*, *plu-*
mias, *pennas*, *pluritudinem*, *sonum*.

HISTORIA Avium absolutius Descriptione, Habitatione, Volatu,
Migratione, Nuptiis, Nidificatione, Ovatione, Incubatione,
Educatione, Viðu.

GENERUM Charæteres desumendi a *Rostro*, *Lingua*, *Naribus*, *Ce-
ra*, *Caruncula*, reliquisque partibus denudatis.

ORNITHOLOGI eminentiores in Veteres & Recentiores dispescuntur.

VETERUM *Bellonius* 1557 & *Gesnerus* 1555 patres artis; horum
aves colligit & auxit 1599 *Aldrovandus*, Brasilienses novas ad-
dente *Marcgravio* 1648; has omnes digeslit & auxit *Willughby*
cum suo *Rajo* 1713, iconesque varias dedit *Marsiglius* 1726.

RECENTIORES vivis *Coloribus* nova luce illustrarunt artem, Europæas
Albinus 1731, Europæ meridionalis (1772-1782) *Bernini*, Sar-
das (1776) *Cetti*, Germanicas *Frischius* 1734, belgicas (1770-1778)

Nozemannus & *Seppii*, suecicas nonnullas *Tengmalmi*, borussicas
Bockius, britannicas *Hages* 1775, has &que ac indicas 1768-1777.
Pennantus, rariorū novarumque avium Centuriam unām *Ca-*
tesby 1731, tres & ultra centurias pulcherrimas *Edwards* 1743;
centurias novem & ultra (ab anno 1775) *Daubentonius*, pau-
ciōres Jof. Fr. Nob. a *Jacquin* 1784, Bl. *Merrem* 1784-1786, &
in musei *Carlsoniani* descriptione *Sparrmannus* 1786; ova va-
riarum avium descripta a *Günthero* pinxit *Wirsingius* (1703).

Avium anatome & physiologia multa debet *Reaumurio*, *Hewfor-*
nio, *Campero*, *Huntero*, *Blumenbachio*, *Merrem*, *Blockio*, *Vieq*
d'Aizyr, *Pallas*, *Güldenstaedtio*, *Silberschlagio*, *Malacarne*.

SYSTEMATICAM in formam aves reducere tentavit de suecicis *Fauna*
mea 1746, *Systemaque Naturae* 1758; omnes collegit & digerit
Brissoniis 1760, cui integrum exercitū & notarum & novarum
obrulere labores & museum magni *Reauniurii*. Nuperius idem
teutarunt 1781 *Pennant* & 1785 *Latham*.

ASSERVANTUR vel in *spiritu vini* integræ, vel siccatae; vel exuviis
integris *fardis* aut dimidiatis *gypso* fixato repletis, methodo
Schæfferi.

ORDINUM Characteres.

I. ACCIPITRES.

ROSTRUM (*Uncus trahens*) subincurvatum. *Mandibula* superiorē pone apicem utrinque dilatata s. dente armata : *Naribus* patulis. PEDES insidentes, breves, robusti : *Digitis* sub geniculis verrucosis, *Unguis* arcuatis acutissimis.

CORPUS Capite Colloque musculosis; *Cute* tenaci. Impurum.

VICTUS : Lanena Rapinaque e cadaveribus.

NIDUS in altis ; *Ova* circiter 4; *Femina* præstantior. Monogamia. Analogi *Feris*.

II. PIGEÆ.

ROSTRUM (*Cuneus farriens*) cultratum dorso conyexo.

PEDES ambulantes, breves, validiusculi.

CORPUS tenaciusculum impurum.

VICTUS e Quisquiliis.

NIDUS in Arboribus ; *Mas* alehs feminam incubantem. Monogamia.

Analogæ *Primatibus*.

III. ANSERES.

ROSTRUM (*Cribrum colans*) lave, epidermide tectum, apice auctum.

PEDES natatorii digitis membrana palmatis : *Tibiis* compressis, brevibus.

CORPUS pingue, *Cute* tenaci, Plumis præstantioribus. Rancecens.

VICTUS in Aquis ex Plantis, Piscibus, &c.

NIDUS sœpius terrestris. *Mater* rarius porrigit pullis ; frequentius Polygamia.

Analogi *Belluis*.

IV. GRALLÆ.

ROSTRUM (*Bacillus tentans*) subcylindricum.

PEDES vadantes *Femoribus* seminudis,

CORPUS compressum pelle tenuissima ; Cauda brevi ; Sapidum
 VICTUS in Paludibus ex animalculis.
 NIDUS in terra sæpius ; Nuptiis variis.
 Analogæ Brutis.

V. GALLINÆ.

ROSTRUM (*Harpa colligens*) convexum : Mandibula superiore
 fornicata supra inferiorem ; Naribus membrana cartilaginea
 fornicatis.
 PEDES cursorii Digitis subtus scabris.
 CORPUS sebaceum , musculosum. Purum.
 VICTUS in Terra e Granis in ingluvie macerandis. Pulveratrices.
 NIDUS in Terra absque arte ; Ovis numerosis. Pullis cibus mon-
 strandus. Polygamia.
 Analogæ Pecoribus.

VI. PASSERES.

ROSTRUM (*Forceps excipiens*) conico-acuminatum.
 PEDES salientes , teneri , fissi.
 CORPUS tenellum ; *Granivoris* Purum , *Insectivoris* Impurum.
 VICTUS in arboribus e Seminibus aut Insectis.
 NIDUS artificiosus ; Pullis cibus inculcandus. Monogamia.
 Cantus.
 Analogi Gliribus.

CHARACTERES AVIUM.

I. ACCIPITRES.

41. VULTUS. Rostrum aduncum. Caput denudatum.
 42. FALCO. Rostrum aduncum basi Cera tectum.
 43. STRIX. Rostrum aduncum capistro reverso.
 44. LANIUS. Rostrum rectiusculum, emarginatum.

II. PICÆ:

* Pedibus ambulatoriis.

65. TROCHILUS. Rostrum incurvatum, apice tubuloso.
 65. CERTHIA. Rostrum incurvatum, acuminatum.
 64. UPUPA. Rostrum incurvatum, obtusiusculum.
GLAUCOPIS. Rostrum incurvatum, forniciatum. Lingua serrata, ciliata.
 48. BUPHAGA. Rostrum rectum, quadrangulare.
 60. SITTA. Rostrum rectum, apice cuneato.
 52. ORIOLUS. Rostrum rectum, conicum acutissimum.
 51. CORACIAS. Rostrum cultratum, apice incurvo.
 53. GRACULA. Rostrum cultratum, æquale, basi calva.
 50. CORVUS. Rostrum cultratum, capistro reverso.
 64 PARADISEA. Rostrum subcultratum, capistro holosericeo.

* * Pedibus scandoriis.

- RAMPHASTOS. Rostrum serratum. Lingua pennacea.
 55. TROGON. Rostrum serratum, apice aduncum.
 45. PSITTACUS. Rostrum cera obductum. Lingua carnosa.
 49. CROTOPHAGA. Rostrum rugosum, margine angulatum.
 59. PICUS. Rostrum angulatum. Lingua lumbriciformis.
 53. YUNX. Rostrum laxe. Lingua lumbriciformis.
 57. CUCULUS. Rostrum laxe. Nares marginatae.
 56. BUCCO. Rostrum laxe, emarginatum, aduncum;

Nares capistri pennis recumbentibus obiectæ in Corvo, Pico, Buccone, Strige, Mandibula ferrata in Ramphastio; Bucco, Trogone.

* * * *Pedibus gressorii.*

47. BUCEROS. Rostrum serratum, fronte ossea.
62. ALCEDO. Rostrum trigonum, rectum.
63. MEROPS. Rostrum incurvatum, compressusculum.
61. TODUS. Rostrum lineare, depresso, rectum.

III. ANSERES.

* *Rostro denticulato.*

67. ANAS. Rostrum unguiculatum, denticulis membranaceis.
68. MERGUS. Rostrum unguiculatum, denticulis subulatis.
74. PHAETON. Rostrum cultratum.
73. PLOTUS. Rostrum subulatum.

* * *Rostro edentulo.*

78. RHYNCOPS. Rostrum mandibula superiore breviore.
71. DIOMEDEA. Rostrum mandibula inferiore truncata.
- APtenodyta. Rostrum rectum, angustum ad latera sulcatum.
69. ALCA. Rostrum rugis lateralibus transversis.
70. PROCELLARIA. Rostrum naribus superincumbentibus, subcylindricis.
72. PELECANUS. Rostrum cinctum facie nuda.
76. LARUS. Rostrum sub apice subtus gibbum.
77. STERNA. Rostrum subulatum, apice compressum.
75. COLOMBUS. Rostrum subulatum, lateribus compressusculum.

IV. GRALLÆ.

* *Pedibus tetradactylis.*

79. PHœNICOPTERUS. Rostrum infracitum, denticulatum. Pedes palmati.
80. PLATAEA. Rostrum depresso, spatulatum.
81. PALAMEDEA. Rostrum apice uncinatum, acutum.
82. MYCTERIA. Rostrum mandibula inferiore crassiore subadscendens.
85. TANTALUS. Rostrum arcuatum, sacco gulari.
84. ARDEA. Rostrum rectum acutiusculum.
- CORRIRA. Rostrum rectum, angustum.

89. RECURVIROSTRA. Rostrum *subulato-attenuatum, depresso, recurvum.*
86. SCOLOPAX. Rostrum *rectum; teretiusculum, obtusiusculum.*
87. TRINGA. Rostrum *teretiusculum obtusum. Pollex vix insistens.*
91. FULICA. Rostrum *basis fronte calva.*
92. PARRA. Rostrum *basis fronte carunculis mobilibus.*
93. RALLUS. Rostrum *sibcarinatum. Corpus compressiusculum.*
- VAGINALIS. Rostrum *craffum, subconvexum, non undibulæ superioris apice vaginæ corneæ inclusum.*
94. PSOPHIA. Rostrum *subfornicatum. Nares ovatae.*
83. CANCROMA. Rostrum *ventricosum.*
- SCOPUS. Rostrum *craffum, compressum. Nares lineares, obliquæ.*
- GLAREOLA. Rostrum *breve, rectum, apice uncinatum. Nares lineares, obliquæ.*
- * * *Pedibus cursoriis s. tridactylis.*
90. HÆMATOPUS. Rostrum *compressiusculum, apice cuneo-*
88. CHARADRICUS. Rostrum *teretiusculum, obtusum.*

V. GALLINÆ.

95. OTIS. Rostrum *subfornicatum. Lingua emarginata.*
96. STRUTHIO. Rostrum *conicum. Alæ non volitantes.*
97. DIDUS. Rostrum *medio coarctatum, rugosum, facie nuda.*
98. PAVO. Rostrum *nudum. Vertex pennis revolutis.*
99. MELEAGRIS. Facies *nuda carunculis verrucosa.*
- PENELOPE. Caput *pennatum; rostrum denudatum.*
100. CRAX. Rostrum *basi cera obductum.*
101. PHASIANUS. Genæ *nudæ læves. Mas calcaratus.*
102. NUMIDA. Carunculæ *binæ, ad basin mandibularum.*
103. TETRAO. Supercilia *nudo, papillosa.*

VI. PASSERES:

* *Craffirostres.*

109. LOXIA. Rostrum *conico-ovatum.*

COLIJUS. Rostrum *craffum, supra convexum, subtus angustatum.*

112. FRINGILLA. Rostrum conicum, acutum.

PHYTOTOMA. Rostrum conicum, rectum, serratum.

110. EMBERIZA. Rostrum subconicum, mandibula inferiore latior^{re}, coarcata.

* * Curvirostres, mandibulæ superioris apice incurvato.

118. CAPRIMULGUS Rostrum incurvum, depresso, ciliatum. N^a
res tubulosæ.

117. HIRUNDO. Rostrum incurvum, depresso.

115. PIPRA. Rostrum incurvum, subulatum.

*** Emarginatirostres, mandibula superiore pone apicem
emarginata.

107. TURDUS. Rostrum emarginatum, subulatum, basi compressum.

108. AMPELIS. Rostrum emarginatum, subulatum, basi compressum.

111. TANAGRA. Rostrum emarginatum, subulatum, basi conoideum.

113. MUSCICAPA. Rostrum emarginatum, subulatum, basi ciliatum.

**** Simplicirostres, rostro recto integro attenuato.

116. PARUS. Rostrum subulatum. Lingua truncata. Capitulum
reversum.

114. MOTACILLA. Rostrum subulatum. Lingua incisa. Unguis posticus modicus.

105. ALAUDA. Rostrum subulatum. Lingua bifida. Unguis posticus elongatus.

106. STURNUS. Rostrum subulatum, apice depresso marginato.

104. COLUMBA. Rostrum subornicatum. Nares gibbosæ, membrana oblitterata.

I. ACCIPITRES.

Rostrum e mandibula superiore angulum utrinque exserens.

41. VULTUR. *Rostrum rectum, apice aduncum.*
Caput impenne, antice nuda cute.
Lingua bifida.
Collum retractile.

Gryphus. 1. V. maximus, caruncula verticali, longitudine capitis, gula nuda.
 Vultur Gryps Gryphus. Klein av. 45.
 Cuntur. Laët amer. 401. Raj. av. II.
 Condor. Fréz. it. III. Condam. it. 175. Briff. ornith. I. p. 473. n. 12. Buff. ois. I. p. 184. Molin. chil. p. 236.
 Condur. Latham syn. of birds. I. I. p. 4.
Habitat in America australi, nidificans ad montes præruptissimos sub rupibus prominulis, ova bina alba ponens; famelicus uvibus, hædis, imo vitulis prædatur, & sunt, qui pueros decennes ab ripuisse, binas aves vaccami dilacerasse & vorasse tradunt; in terram devolans susurro attonitos & surdos fere reddit homines.
Avis maxima, femina tamen major, quæ crista quoque cervicali, colore fuscō, torque nullo a mare differt.
Alæ maxima, intra quarum extremitates pedes 9-12-13-16; Remex longitudine pedum 2½, crassitie sesqui-pollicis; corpus nigrum, dorso albo; collum torquatum pennis longoribus albis; gula rubens; caput fuscæ lanugine tectum; oculi nigri, iride spadicea; rostrum nigrum, apice albido. Pedes nigri, unguibus rectiusculis; cauda parva.

benga-
lenfis. 2. V. fuscus, capite colloque anterius denudato dilute castaneo, rostro plumbeo, apice nigro. Latham syn. of birds. I. I. p. 19. n. 16. t. I.

Vultures voracissimi cadavera potius appetunt, imo putrescentia. vix nisi famelicæ viva animalia, audaces, tardius volant, nisi cereum altitudinem attigerint, & gregatim; usq; ad pollut acutissimo; ex septentrionali Europa & Asia, & si Anram exceperis, ex boreali quoque America exules. Vix disjunctæ specierum varietatumque, imo generis ipsius. sequente hinc.

AVES ACCIPITRES. Vultur.

Habitat in regno Bengalensi, 2 pedes cum 6 pollicibus longus. Caput collumque posterius lanugine fusca tectum; pedes ex atro fuscis, unguibus nigris. Ingluvies supra pedes pendet.

Papa. 3. *V. naribus carunculatis, vertice colloque denudato.*
Vultur. Albin. av. 2. p. 4 t. 4.

Cozcaquauhtli. Hernand. mex. 319. Raj. av. 361.

King of the Vultures. Edw. av. 2. t. 2.

Rex vulturum. Briss. av. I. p. 470. t. 36.

Roi des vautours. Buff. hist. natur. des ois. I. p. 169. t. 6. planch. enlum. 428.

Habitat in America australi, insulisque oceanii americanii; rictus serpentibus, lacertis, ratis, &c. cadaveribus, hinc satens; alte volat.

Magnitudo gallopavonis feminæ. Caput collique p.^{ris} superior quasi excoriata; area oculorum nuda, crocea. Vitta nigricante lanugine ab occidente caput cingit. Corpus e rufescente album. Remiges ex cinerascente nigri. Pedes cum rostri apice rubri. Cera aurantia, & post hanc carunculae dentatae.

Mona-
chus. 4. *V. vertice gibbofo, corpore nigro.*
Crested black Vulture. Edv. av. t. 290.

Vultur arabicus. Briss. av. app. 29.

Habitat in Arabia, melanaëto major.

Caput cum collo lanugine cinerea tectum; orbita albii; rostrum apice nigrum, cera pedesque cetrulescentes, unguibus nigris; humeri pennis laxis cinereis, coronati, intra quas dormiens avis caput retrahit.

Aura. 5. *V. fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo.*

Tzopilotl s. Aura. Hernand. mex. 331.

Urubu, Tzopilotl or Aura. Willoughb. orn. 68.

Urubu Brasiliensis. Marcgr. brasili. 207.

Gallinazo. Ulloa it. I. p. 60. 201.

Turkey Buzzard. Catesb. Car. I. p. 6. t. 6.

Carriion crow. Sloan. jam. 2. p. 294. t. 254. Raj. av. p. 180.

Vultur brasiliensis. Raj. av. p. 10. Briss. av. I. p. 468.

Vultur pullus, capite implumi, cute crassa rugosa, ultra aperturas nasales laxata. Brown. jam. 471.

Vautour du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 175. pl. enlum. n. 187.* *)

Carrion Vulture. *Arct. zool. II. 191. Latham syn. I. 1. p. 9. n. 5.*

Jota.

β. *V. niger*, remigibus fuscis, rostro cineraceo. *Molin. hist. nat. Chil. p. 235.*

Habitat in America, etiam boreali, insulisque adjacentibus, insulis quoque novi anni.

Privilegio munitus in America cadavera serpentesque vorans, eaque simul cum canibus, quasi germanis fratribus, summa concordia dilacerans; saepe carnes e culina furans, ceterum haud difficulter cicurandus; foetidum stercoris humani odorem spirat, caputisque materiam adhuc foetidiorem evomit; noctu gregarie dormit in summis arborum cacuminibus: Jacquin.

Magnitudo circiter gallopavonis, quamvis varia. Corpus nigrum e purpureo & viridi micans. Irides ex croceo cærulecentes. Pedes carnei. Caput rufescens.

β. *similiter foetidissimus, iners vix nisi laceffitus vocifatur voce muris, nidum inter rupes aut in terra struit ex foliis pennisque, & ova cludit bina alba, quasi infumata. Junior totus albus, senim autem nigreficit, ut tamen rostrum, apice excepto, alteat, reniges, pedes & irides fusca sint.*

Cinereus. 6. V. fusco-nigricans, remigibus & rectricibus in cinereum, vergentibus, pedibus pennis fuscis vestitis. Briff. ornith. I. p. 130. n. 1.

Vultur cinereus. Raj. syn. p. 9. n. 1.

Vautour ou grand Vautour. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 158. t. 5. planch. enlum. n. 425.

Cinereous or ash-coloured Vulture. Will. orn. p. 66. n. 1. Latham syn. p. 14. n. 8.

Habitat in Europa, frequens in montibus altis, sex pollicibus longitudinem tripedalem superans.

Caput, guttur, collique pars superior fusca teguntur lanagine; sub gutture prominent pennulae longæ pilorum æmulæ, ut barbam efficiant. Digitæ flavi, unguibus nigris. An percnopteri varietas?

*) Prodierunt quidem hæ tabulæ cura Daubentonii junioris, sed consilio Buffoni, hinc ejus nomine semper allegata, ovemadmodum alterum quoque de avibus opus, quumvis magna ejus pars B. G. in de Montbeillard debeatur.

- fusca.* 8. *V. fuscus*, remigibus ex fusco nigricantibus, primariis apice albis fusco maculatis, rectricibus ex griseo fuscis, pedibus nudis. *Brij. ornith.* p. 131. n. 2.
Avoltojo Griffone. *Cetti Ucc. di Sard.* 3. *G.* 3.
Vautour de Malte. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 161. pl. enlum. n. 427.
Habitat in Europa, potissimum in insula Malta.
Magnitudine inter phasianum colchicum & gallopavonem intermedia. Caput fusca lanugine tectum; cervix pennis angustis; rostrum nigrum; pedes flavescentes, unguibus obscuris. An specie differt a pernuptero?
- niger.* 9. *V. niger*, remigibus rectricibusque fuscis, pedum pennis nigris. *Brij. ornith.* p. 131. n. 4.
Vultur niger. *Raj. syn.* p. 9. n. 2.
Avoltojo nero. *Cetti Ucc. di Sard.* 9. *G.* 9.
Swarthy Vulture. *Chart. ex.* p. 71. n. 4.
Black Vulture *Will. orn.* p. 66. *Lath. syn.* p. 16. n. 10.
Habitat in Agypto & Sardinia, magnus.
Caput lanugine fusca tectum, colli pers proxima plane nuda, & cum orbitis pedibusque ad digitos iisque lanatis alba. Lingua levius non ferrata. Rostrum bipollicare initio rectum, apice longius uncinato, naribus rotundis 3 lineas diametro & quantibus. An mera varietas pernupteri?
- leucoce-* 10. *V. plumis niveis*, remigibus rectricibusque nigris, torque plumarum albo.
Vultur leuccephalus. *Brij. ornith.* p. 134. n. 9.
Vultur altus. *Raj. syn.* p. 10.
Petit Vautour. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 164.
Vautour de Norwege. *Buff. pl. enlum.* n. 449.
White Vulture & Cinereous Vulture. *Willoughb. ornith.* p. 67. n. 6. & 66. n. 1.
Habitat in Sardinia & Norwegia, nigro minor, ut vix aliquot pollicibus tres pedes longitudine superet, cauda aliisque mediocribus; borealis varietas fere tota nivea, capite colloque tamen impennibus rubicundis, rostro flavo, pundo nigro notato; unguibus nigris; in sarda varietate penna, rectricibus remigibusque exceptis, ex cinereo, fusco & griseo mixta, caput & finicima pars colli lanugine alba

Vultures communes quoque in Candia, Cypro, reliquisque Archipelagi & maris Mediterranei insulis, paucis speciebus rursum diffinitis; petes praefatae ab incolis pectori & ventriculi regioni appositae digeruntur, & ante prandium portantur.

vestita. Squamæ digitæ medii a primo inde articulo II.
An mera percnopteri aut fulvi potius varietas?

fulvus.

II. V. superne ex griseo rufescens, capite, collo & torque albis, remigibus recticibusque nigris. *Briss. ornith. p. 133. n. 7. Hablizl apud S. G. Gmelin it. IV. p. 179. & Pallas n. nord. Beytr. IV. p. 58.*

Vultur fulvus bætico congener. *Raj. syn. p. 10. n. 7.*

Griffon. *Euff. hist. nat. des ois. I. p. 151.*

Vulture. *Albin. av. III. p. 1. t. 1.*

Fulvous Vulture. *Will. orn. p. 67. n. 7. Lath. syn. I. I. p. 17. n. II.*

Habitat in montibus Persiae quoque alpibus sunamisicis, falcone fulvo major; Caput & collum albæ lanugine tectum; rostrum cinereum, basi cute nigra tectum; irides obscure flavæ; colli infima pars multiplici serie pennarum longorum, acutarum, setacearum ex albo rufescencium cincta; in medio pectoris sovea lanugine alba vestita, & pennis longis angustis rufescientibus cincta. Pennæ subtus basi albæ, apice rufæ. Pedes plumbei, ultra femoris medium intus lanugine densa alba, extus pennis longis rufescientibus tecti, ungulis nigris.

Percnopterus 7. V. remigibus nigris, margine exteriore (præter extimas) canis.

Vultur (percnopterus) capite nudo, gula plumosa. *Hasselq. it. 209.*

Falco montanus ægyptiacus. *Hasselq. act. Stockh. 1751. p. 196.*

Vultur aquilina. *Alb. av. 2. p. 3. t. 3.*

Vulturine Eagle of Aldrovand. *Will. orn. p. 64. t. 4. & Vultur ægyptius. Briss. p. 131. n. 3.*

Vultur sacer ægyptius. *Aldr. av. I. p. 378. t. 379.*

Sacre Egyptien. *Belon hist. d'ois. p. 110. t. pag. III.*

Sacre d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 167.*

Habitat in Ægypto, Palestina, Syria, Caramania, Persia.

Purgat Caii terram a cadaverum factore, stipendiis alleatus. *Hasselq. Palæstinae ægri desererentur ob murium copiam, nisi haec aves catervatim advolarent. Bellon. Olim hunc capitale occidere Ægyptiis. Herodot.*

Mes totus albus. Remigibus atris, margine exteriore canis, exceptis duobus primis unicoloribus. Femina tota fusca. Remigibus quatuor extimus concoloribus. Rostrum atrum cera flava. *Hasselq. Nares perpetuo stillant. Raj. Pedes nudi.*

- cristatus.* 12. *V. cristatus*, ex rutilo nigricans, pectore magis ad rufum inc inante, pedibus nudis. *Briss. ornith.* p. 132. n. 6.
Vultur leporinus Gesneri. *Raj. syn.* p. 10. n. 4.
Vautour à aigrettes. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 159.
Hare Vulture. *Will. orn.* p. 67. n. 4. *Latham syn.* I. I. p. 17. n. 12.
Habitat in densis & desertis silvis, in arboribus altissimis nidificans, celeriter ingrediens, & tum cursu, tum volatu aves, pisces, lepores, cuniculos, ipsas vulpes & hinc nulos persequens. *Stans cristam*, quasi cornua ex capite prominentia in volante are non conspicua, erigit.
*Ala*rum apices sex pedum intervallo distant; pedes flavi; unguies & rostrum nigrescent; cauda longa & recta; an hujus, an sequentis generis, decidant autopiae.

- barbarus.* 13. *V. ex atro fuscus*, subitus albus in fuscum inclinans, pedibus lanatis, digitis plumbeis, unguibus fuscis.
Vultur barbatus. *Briss. ornith.* p. 137. n. 13.
Bearded Vulture. *Edw. av.* 106. t. 106. *Lath. syn.* I. I. p. II. n. 6.
Habitat in Africa, praesertim Barbaria, *falconis fulvi magnitudine*.
Rostrum ex purpurascente carneum; mandibula inferior fasciculo plumarum nigrarum pendularum barbata; supercilia rubra; irides flavæ; capitis maxima pars lanugine alba vestita, fronte tamen, genis, & oculorum area nigra; cervix pennis angustis acuminatis, longis, albitantibus tecla.

42. FALCO. Rostrum aduncum, basi cera instructum. Caput pennis arte tectum. Lingua bifida.

* *Femoribus longissimis.*

- serpenta-* 33. *F. ater occipite cristato, rectricum apice albo*, duabus riuis. *intermediis longissimis*. I. *F. Miller ill. of nat. hist.* t. XXVIII. A. B.
Sagittarius. *Vosmaer monogr.* t. 8.
Secrétaire. *Sonner. it.* p. 87. t. 50.
Messager du Cap de bonne espérance. *Buff. planch. enl.* n. 721.
Secretary or Sagittarius. *Az. angl.* LXI. p. 175. *Latham synops.* I. I. p. 20. n. 17. t. 2.

Habitat in interiori Africa, & insulis Philippinis, gliribus & amphibiis visitans, facile curandus.

Femorum longitudine ad gralias accedit, ceteris notis ad hoc genus spectat; altitudo tripedalis; rostrum nigrum aquilæ; cera alba; area oculorum nuda aurantia; irides pallide cinereæ; cauda rotundata; femora fuscescentia, unguibus brevibus, nigris, uncinatis, non valde acutis. Crista erigi & deprimi potest.

* * *Gypaëti, rostro apice demuni adunco, basi setis porrectis barbato.*

Harpyja. 34. F. capite pennis elongatis cristato, subtus varius.

Vultur capite tecto pennis elongatis cristato. *Syst. nat. XII.*

1. p. 121. n. 2.

Aquila brasiliensis cristata. Briss. av. I. p. 446.

Aquilæ cristatæ genus. Raj. av. 161.

Yzquauhtli. Hern. mex. p. 34. Raj. av. p. 161.

Urutapranæ. Marcgr. brasil. 203. t. 204. Raj. av. p. 7.

Crested Eagle. Will. orn. p. 63. t. 4.

Crested Vulture. Latham syn. I. I. p. 6. n. 2.

Habitat in nova Hispania & America australi. Fertur unico iæru cranium hominis findere, quem sæpius adoritur; eretus consideret; penas occipitis sæpius erigit in formam coronæ.

Magnitudo arietis. Color subtus ex nigro, candido & fulvo mixtus, in collo, dorso, cauda & crista surrecta niger. Oculi membraña nitidante. Sub ingluvie pennæ albæ, quas iratus denudat usque ad pedum digitos. Alæ & cauda subtus albo & nigro punctata, in modum tigridis.

Jacquini. 35. F. pennis capitis elongatis plurimis, pedibus nudis, corpore subtus niveo.

Vultur (coronatus) capite tecto pennis elongatis plurimis, pedibus nudis. *Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voeg. p. 15. n. XI.*

Habitat in montibus novæ Granadæ, junior curandus, Harpyjæ affinis.

Duni eretus sedet, $2\frac{1}{2}$ pedum altitudinem monstrat: Dorsum, alæ, colli maxima pars, & rostrum nigrescunt; caput ex rufescente cinereuni coronatum corona concolore peniarum plurium semipedalium sere decumbentium, quas avis irata erigit; cauda longa albida, tæniis transversis nigris. Pedes digitique flavi, unguibus nigris.

- ambus-** 36. F. pallide fulvus, capistro nudo, cera ampla, pedibus cœrulecentibus.
 Tawny Vulture. *Brown. Illust. p. 2. t. 1. Lath. syn. I. I. p. 19. n. 15.*
- Habitat in insulis Falkland, 4 pollices ultra 2 pedes longus.*
Rostrum breve, crassum, obscurum; cera setis hispida;
mandibula inferior fasciculo pennarum tenuium longarum barbata; tectrices remigum ex pallide fulvo & fusco mixtae; cauda sordide alba, fusco fasciata. Ungues longi, leviter curvati.
- angolen-** 37. F. albus, cera cœrulecente, orbitis carneis & nudis, tectricibus alarum primariis, caudæque basi nigris.
 Angola-Vulture. *Penn. tour in Wales. p. 228. t. 19. Lath. syn. I. I. p. 18. n. 14.*
- Habitat in Angola.*
Rostrum albicans, longum, parum aduncum; irides stramineæ; tectrices alarum primariae extimæ albo punctatae; caudæ apex albus; pedes sordide albi & squamosi.
- barbatus.** 38. F. albido-rutilus, dorso fusco, tænia nigra supra & infra oculos.
 Vultur (barbatus) albidus, dorso fusco, gula barbata, rostro incarnato, capite linea nigra cincto. *Syst. natur. XII. I. p. 123. n. 6.*
- Gypætos grandis. *Storr Alpenr. I. p. 69.*
 Percnopterus f. gypætos. *Aldr. orn. I. p. 216. t. 217. 219. Gesn. av. 199. Will. orn. 33. t. 4. Raj. av. 8. Alb. av. 2. p. 2.*
- Vultur alpinus. *Briss. av. I. p. 464.*
 Laemmergeyer. *Andreas Brief. aus der Schweiz, p. 195. t. 12.*
- β.** Vultur aureus. *Gesn. av. 783. t. 781. Aldrov. av. I. p. 277. t. 276. Briss. ornith. p. 132. n. 5. Hablitzlapud Pallas n. nord. Beytr. IV. 64. & S. G. Gmelin it. IV. p. 185.*
 Vultur boeticus. *Aldrov. ornith. I. 273. t. 274. Will. orn. 35. Raj. av. 10.*
- Vultur fulvus Gesneri. *Raj. av. p. 10. n. 5.*
 Golden vulture. *Latham syn. p. 18. n. 13.*
- γ.** Falco (magnus) cera cœrulecente, pedibus & corpore subtus castaneis albo mixtis, cauda cinerea. *S. G. Gmelin it. III. p. 365 t. 38.*
- Habitat gregibus parvis in alpibus helveticis, rhæticis, noricis, β et γ perfidis, Nescher sacrae scripturæ ex sententia Oedipagi.*

Chrysaëto major, ut 4 pedes longitudine æquet, & distantia apicis alarum exparsarum 9 pollicibus 8 pedes superet. Rostrum rectiusculum unco utrinque bisulco, cinereum, rubicundo mistum, ad latera cinctum & subtus munitum setis rigidis nigris; nares magnæ, ovales, similibus setis tectæ. Remiges 28, splendide cinereæ; rectrices 12, melio cinereæ. Pedes ad digitos usque hirsuti; unguis nigri, robusti, minus curvati, quam aquilis.

Nidificat in antris rupium inaccessarum, ova 3-4 ponens; videtur animalibus alpinis, ut ipsas rupicapras, capras, agnos prædetur, & ipsi adeo hontini dormienti infestus esse dicatur; neque tamen cadavera ipsa recessuit. Habitum externo, gregario volatu, cadaverum appetitu ad vulturem, reliquo vidu, capite & collo, audacia ad aquilas accedit.

Albicilla. 39. F. cera pedibusque flavis, rectricibus albis: intermediis apice nigris.

Vultur albicilla. *Syst. nat. XII. I. p. 123. n. 8. Fn. suec. 55. Brünnich orn. 12.*

Aquila Albicilla. *Briss. av. I. p. 427.*

Pygargus, Albicilla, Hitundinaria. *Bell. av. 15. Gesn. av. 205. Raj. av. 7. n. 5.*

Grand Pygargue. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 99. pl. enlum. n. 411.*

White-tailed Eagle. *Will. orn. p. 61.*

Cinereous Eagle. *Brit. zool. I. p. 170. t. 18. Lath. syn. I. I. p. 33. n. 8.*

Braunfahler Adler. *Frisch t. 70.*

Habitat in Europa, præsertim Scotia, & insulis adjacentibus; serit pisces maximos, iisque videtur auceps:

Magnitudo Gallopavonis; longitudine 2 pedum cum 9 pollicibus; caput & collum pallide cinereum; irides & rostrum pallide flavæ; hoc basi elongatum; frons inter oculos & nares nuda; setulis tantum adspersa, cæruleoscens. Corpus & alæ cinereæ, fusco intermixta. Cauda alba. Pedes infra genua lanati, splendide flavi. Ungues nigri.

*** Aquilæ, majores pedibus plerumque hirsutis.

coronatus. I. F. cera ferruginea, pedibus lanatis albis nigro punctatis, pectore rufo, lateribus nigro fasciatis.

Aquila africana cristata. *Briss. av. I. p. 448.*

Crowned Eagle. *Edw. av. 3. p. 31. t. 224. Lath. syn. p. 27. n. 1.*

AVES ACCIPITRES. Falco.

Habitat in Guinea, minor europæis.

Subtus albus, maculis nigris rotundis; pennæ in vertice capitis longæ, ut cristæ ad instar erigi & deprimi possint; rostrum ferrugineum; irides aurantia; area oculorum cum fronte albida. Cauda supra obscure cinerea, nigra fasciata; digitæ aurantii; ungues nigri.

- Che- 40. F. cera rosea, pedibus flavis corpore ferrugineo, capite
riway. albido, vertice cristato ferrugineo. *Jacquin Beytr. p. 17.
n. XII. t. 4.*

Habitat in insula Amba, ad litus Verazuelæ sita.

*Crista pennis longioribus constans, quas tamen avis non
erigere videtur. Orbitæ albidae; oculi flavi; rostrum
cærulescens; remiges longissimæ nigrescentes. Cauda
alis longior, pariter potissimum nigrescens; uropygium
album; ungues nigri.*

- Tharus. 41. F. cera pedibusque luteis, corpore albo - nigrescente,
vertice cristato. *Molin. hist. nat. Chil. p. 234.*

*Habitat in Chili frequentissimus, nidum in altissimis ar-
boribus ex surculis, lana, pilis, plumis struens, ova
ponens, videtans cadaveribus, & avibus domesticis.*

*Magnitudo capi grandioris. Capitis corona ex pennis
nigris, quarum exteriores longiores; rostrum albidum.
Remiges rectricumque apices nigri. Pedes squamati,
unguis robustis; mas albidus nigro inaculatus; fe-
mina paulo minor, grisea.*

- Melanaë- 2. F. cera lutea, pedibusque semilanatis, corpore e ferru-
tos. gineo nigricante, striis flavis.

Melanaëtos s. aquila valeria. *Gesn. av. 203. Aldr. orn. I.
p. 197. t. 199. 200. Raj. av. 7. n. 4. Alb. av. 2. p. 2.
t. 2. Briss. av. I. p. 434.*

Aigle commune. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 86. pl.
enlum. n. 409.*

Black Eagle. *Will. orn. p. 61. scđ. 3. t. 2. Latham sy. I.
I. p. 28. n. 2.*

Habitat in Europa.

*Longitudo 2 pedum & 10 pollicum; rostrum ex corneo in
cæruleum colorem vergens; irides castaneæ; caudæ pars
exterior alba, nigricantibus maculis, apex nigricans;
crura sordide alba; digitæ luteæ; ungues nigri.*

Glauco- 42. F. cera & pedibus semilanatis citrinis, dorso & pectore fuscō, capite & cervice ex flavicante albīs, striis fuscīs, remigībus nigrīs. *Merrem Beytr. II. p. 25. t. 7.*

Habitat in monte Dransberg prope Goet'ingam.

Longitudo i pedis, 9 pollicum, 3 linearum; rostrum glau-
cum; nares magnae, ovatae, pone has setae nigrae; os
interius & lingua rosea, haec carnosā margine magis cor-
nea, apice vix bifida; irides canae, flavo permixtæ; frons
lunulis fuscis insignita. Crura brevia, pennis molliori-
bus tecta; pedes antice semilanati; unguis nigris.
Cauda supra ex rubicundo fusca, subtus sordide alba,
utrinque tenuis 6 nigris.

leucoce- **phalus.** 3. F. cera lutea pedibusque semilanatis, corpore fuscō, capite
caudaque albīs.

Aquila leucocephalos. Briss. av. I. p. 423.

Pygargue. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 99. pl. enlum. n. 411.

*Bald Eagle. Catesb. Carol. I. p. I. t. I. Lath. syn. p. 29.
n. 3.*

White headed Eagle. Arct. zool. II. p. 196. n. 89.

*Habitat in Europæ & Americæ silvis acerofisis, porcīs, agnīs,
piscibus viđitans, quos posteriores ab haliaëto captos huic
aufert; nidus amplius, fœtens, in insula Beringii rupi-
bus innixus, ovis duobus.*

Longitudo 3 pedum cum 3 pollicibus, pondus librarii 9.
Rostrum luteum; irides, caput, collum, cauda carent;
digiti flavent; unguis nigrat; reliquani corpus
chocoladum colore emulatur.

Ossifragus. 4. F. cera lutea pedibusque semilanatis, corpore ferrugineo,
rectricibus latere interiore albīs.

Aquila ossifraga. Briss. ornith. I. p. 125. n. 9.

*Ossifraga. Gesn. av. 263. Aldr. ornith. I. p. 222. t. 225.
228. Brünn. orn. 13.*

Haliaëtus s. Ossifraga. Raj. av. p. 7. n. 3.

*Cypaëri, vultures inter & aquilas quasi medii, cadavera appetunt & viva venantur
animalia; aquilæ & falcones nobiliore habitu cadavera abhorrent; illæ capiunt
aves, lepores, sciuros, anseres, serpentes, pisces; hi potissimum aves; altissime
volant, ut s̄pē vix videantur; hærent quasi suspensi in aere; visu excellunt; so-
litarii degunt, nisi tempore copulae; jaculi iystar caunt prosequenda prædam; si-
mem diu tolerant; pine ingeſto moruntur, ætate sexuque variant; pacificuntur
indicias cum avibus in primis domesticis, quamdiu cuculus circulat, ut hæ serian-
tur sub nidificatione, incubatione, pallitie. Succus gastricus acidus, acer.*

Orfraie ou Ossifrage, Grand aigle de mer. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 112. t. 3. *pl. enlum.* n. 112. p. 455.
 Sea Eagle or Osprey. *Br. zool.* I. p. 167. t. 17. *Arct. zool.* 2. p. 194. n. 86. *Will. orn.* p. 59. t. 1. *Lath. syn.* I. p. 30. n. 4.
Habitat in Europa & boreali America, in botanica quoque insula, pisibus potissimum vivitans, quos ipse caput.
Chrysaëto affinis, pedibus tamen vix infra genua lanatis.
Magnitudo Gallopavonis: Pennæ basi albæ, medio ferrugineæ, apice nigrae. Remiges nigricantes; secundaria latere tenuiore albicantes. Rectrices latere interiori albæ, rhachi nivea. Tectrices caudæ fere albæ. Pedes lutelæ.
Femina obscure ferruginea.

Chrysaë- 5. F. cera lutea, pedibusque lanatis luteo-ferrugineis, corpore fusco-ferrugineo vario, cauda nigra basi cinereo-undulata. *Fn. suec.* 54.

Chrysaëtos s. *Aquila aurea. Briss. av.* I. p. 431. *Aquila germana. Gesn. av.* 168. *Aquila chrysaëtos. Raj. av.* 6. n. 1. *Aldr. orn.* I. p. 111. II4. II5.

Grand aigle. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 76. *pl. enl.* n. 410. *Golden Eagle. Brit. zool.* I. p. 161. t. 16. *Alb. av.* II. t. 1. *Will. orn.* p. 58. t. 1. *Lath. syn.* p. 31. n. 5.

Habitat in Europa & Sibiriæ deserto Uralensi, sereno calore altissima petens, instante tempestate terræ propior. *Pondus 12 librarum, longitudo 3 pedum, latitudo 7 pedum & 4 pollicum. Pedes ad digitos usque pennis tecti.*

fulvus. 6. F. cera flava, pedibusque lanatis fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba.

Aquila. Briss. av. I. p. 419. *Aldr. orn.* I. p. 17. *Dodart. ad. 3.* p. 89. t. 49.

Aquila fulva s. Chrysaëtos, cauda annulo albo cincta. Raj. av. 6. n. 2.

Aigle commun. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 86. *pl. enlum.* n. 409.

Golden Eagle, with a white ring about it's tail. Will. orn. p. 59.

Black Eagle. Brit. zool. I. p. 165. *Arct. zool.* 2. p. 195. n. 87.

Ring-tailed Eagle. Latham syn. I. I. p. 32. n. 6.

canaden- 8. F. cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba apice fusco. *Syst. nat.* X. p. 88.

White tailed Eagle. Edw. av. I. t. I. *Voy. huds.* 3. p. 54. t. 2. *Hab.*

Habitat in Europa, America & Asia septentrionali in rupibus altissimis nidificans, & docilis, ut variæ Tatarorum tribus, Marco Polo jam notante, capiendis leporibus, antilopis, vulpibus, ipsisque lupis adaptent, qui etiam reætrices arcubus suis accommodant.

Frons inter oculos & nares nuda. Pectus pondis trigonis maculatum; pedes ad digitos usque pennis hirsuti. An fetheria Melanaëti?

leucogaf- 43. F. albus, dorso, alis; caudaque obscure fuscis, caudæ apice albo, pedibus flavis.

White-bellied Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7. a.*

Longitudo 2 pedum cum 9 pollicibus. Rostrum amplum; ex fuscescente luteum; ungues nigri.

Japonen- 44. F. cera obscura, pedibus luteis; corpore fusco. sis.

Japonese Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7. b.*

Habitat in insulis Japani, pedeni & II pollices longus. Rostrum angustum, basi cæruleum, apice nigricans, subitus slavescens; frons bubali colore; reliqui capitis & corporis pennæ fuscæ, apice ferrugineæ; gula alba, nigro striata, lunula nigro cincta; pectoris ventrisque pennæ margine ex slavicante albo; ungues magni, nigri.

Plancus. 45 F. cera, area oculorum pedibusque aurantiis, occipitis crista nigra, pectore & corpore supra griseo nigro-undulato, subtus nigro, cauda alba, fasciis transversis nigris.

I. F. Miller Illuſtr. t. 17. Cook it. II. p. 184. t. 32.

Plaintif Eagle. *Latham syn. I. I. p. 34. n. 9.*

Habitat in terra del Fuogo, 25 pollices longus; alæ fuscæ; caudæ apex, rostrum unguisque nigri.

America- 46. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, collo & pectore obscure cinereis, genarum fascia transversa, dorso, ventre, alis, caudaque nigris.

Black-cheeked Eagle. *Lath. syn. I. I. p. 35. n. 10. Ard. zool. 2. p. 196. n. 88.*

Habitat in America septentrionali, fulvum magnitudine aquans. Rostrum cæruleum.

albus.

47. F. totus albus.

Aquila alba. Briff. orn. p. 123. n. 3.

Aquila alba cygnea. Klein av. p. 42. n. 7.

White Eagle. Charl. onom. p. 63. n. 9. Latham syn. I. I. p. 36. n. 12.

AVES ACCIPITRES. Falco.

*Habitat in alpibus, & Rheni ripis, Chrysaeti magnitudine;
an mera varietas?*

candidus. 48. F. albus, alarum apice nigro.

White Eagle. *Arct. zool.* 2. p. 197. *du Pratz Louis.* 2.
p. 75.

Louisiane white Eagle. *Lath. syn.* I. I. p. 36. n. 13.

*Habitat in Louisiana, incolis magni aestimata, qui pennis
ejus symbolum pacis exornant, praecedente paulo minor.*

nævius. 49. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore ferrugineo
infra alas albo-maculato.

Aquila nævia. *Briss. orn.* p. 122. n. 4.

Petit aigle. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 91.

Rough-footed Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 6. *Lath. syn.*
I. I. p. 37. n. 14.

Steinadler. *Frisch Vög.* t. 71.

Habitat in Europâ, gliribus præsertim viettans.

Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum cum $7\frac{1}{2}$ pollici-
bus; irides flavæ; tectrices caudæ secundarie albae;
ungues nigri.

macula- 50. F. cera pedibusque lanatis luteis, corpore supra ferru-
gineo, subtus fusco.

Morphno congener. *Raj. av.* p. 7. n. 7. *Will. orn.* p. 63.

Spotted Eagle. *Latham syn.* I. I. p. 38. n. 15.

Longitudo bipedalis. Rostrum magnum & unguis nigri;
irides cinereæ; pennæ scapularum & tectrices alarum
apice macula ovali albicante insignitæ, dorsi maculis
coloris bubalini; venter similibus lineis striatus.

albicaud- 51. F. cera pedibusque nudis luteis, capite & collo ex cinereo
dus. in castaneum vergente, corpore supra obscure ferrugineo,
subtus ferrugineo & nigricante, cauda alba.

Aquila Albicilla minor. *Briss. ornith.* p. 124. n. 6.

Petit Pygargue. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 99.

Pygargue of Aldrovand. *Will. orn.* p. 62.

Fawn-killing Eagle. *Charl. onom.* p. 63. n. 4.

Lesser white-tailed Eagle. *Lath. syn.* I. I. p. 39. n. 16.

Erne. *Gesn. av.* p. 205.

Habitat in Europa.

Magnitudo galli grandis; longitudo 2 pedum & 2 pollicum;
rostrum & irides flavicant; pennarum apices nigricanti;
ungues nigri,

gallicus. 52. F. rostro cinereo, pedibus nudis flavicantibus, corpore ex griseo fusco, subtus (mari) albido maculis rufescente-fuscis.

Aquila Pygargus. Briss. orn. p. 127. n. II.

Pygargus. Johnst. av. p. 4. t. 2.

Jean le blanc. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 124. t. 4. pl. enlum. n. 413. Lath. syn. p. 39. n. 17.

Habitat in Gallia, rario in reliqua Europa, muribus, ratis, ranis viditans, in terra, rarius in arboribus nidificans, 3 ut plurimum ova grisea ponens.

Melanaëto vix minor, 2 pedes & pollicem longus. Irides flavæ. Restrictæ albæ striis transversis fuscis, margine & apice fuscæ. Ungues cinerei.

australis. 53. F. fuscus, cera flava, cauda nigra, apice punctis sordide albicantibus.

Statenland Eagle. Latham syn. I. 1. p. 40 n. 19.

Habitat in Statenland; vox gallinæ; magnitudo & longitudo Planci. Forster.

tiger. 54. F. cera pedibusque lanatis luteis, capite, cervice, ventre & tectricibus alarum ferrugineis, gula, pectore, dorso remigibusque nigris.

Black-backed Eagle. Brown. Ill. p. 4. t. 2. Latham syn. p. 42. n. 22.

Magnitudo Chrysaëti; rostrum & unguis nigri; cauda basi ad medium usque alba; reliqua parte dymidio nigra.

leucoryphos. 55. F. cera ex livido cinerea, pedibus pallide albicantibus semilanatis, corpore subalbulofo fusco, verticis macula trigona & gula albis.

Aquila leucorypha. Pallas it. I. p. 454.

White-crowned Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 42. n. 23.

Habitat in australioribus ripis fluvii Ural, haliaeëto vix major, habituque simili. Lingua rotundata integra. Irides ex fusco griseæ, alæ obsolete nigræ, remigibus interius albis; cauda longiuscula, rigida, æqualis; unguis maximus, nigri.

Mogilnik. 56.. F. cera lutea, pedibus lanatis & reliquo corpore obscure ferrugineis, dorso albo admisto.

Aquila Mogilnik. S. G. Gmelin Nov. comm. Petrop. XV. p. 445. t. XI. b.

Russian Eagle. Lath. syn. I. 1. p. 43. n. 24.

Habitat in desertis ad Tanain sitis, fulvo minör, 2 pedes & 3 pollices longus, muribus & aviculis viettans.
Rostrum, pupilla, unguis, remiges nigrae; palpebrae paleo-lide cæruleæ; irides luridæ; cauda æqualis; rectrices nigrae, fasciis obsolete griseis, apice rufæ.

eristatus. 57. F. capite crissato, dorso, gula alisque nigris, ventre albo, cauda fasciis 4 cinereis parallelis.

Crested Falcon. Dillon it. per Hisp. p. 80. t. 3.

Caracca Falcon. Latham syn. I. I. p. 81. n. 64.

Magnitudo Gallopavohis; mandibula inferior potius reæta.

lagopus. 58. F. cera pedumque lanatorum digitis nudis luteis, corpore nigro albo-maculato, rectricibus albis, versus apicem nigris. Brünnich orn. bor. p. 4.

Falco norwegicus. Leemius de Lapp. p. 236.

Graa falk. Að. nidrós. IV. p. 417. t. 13.

Rough-legged Falcon. Brit. zool. app. t. I. Að. zool. 2. p. 200. n. 92. Lath. syn. I. I. p. 75. n. 54.

Habitat in Europa Americaque septentrionali; 2 pedes 2 que pollices longus. Caput, collum & pectus ex flavo-vicante alba, striis passim oblongis, fuscis.

ferox. 59. F. cera viridi, corpore supra fusco, dorso, abdomine & uropygio niveo, maculis castaneis vario, rectricibus æqualibus fuscis, fasciis quatuor obsoletis. S. G. Gmelin nov. Comm. Petr. XV. p. 442. t. X.

Fierce Eagle. Lath. syn. I. I. p. 33. n. 7.

Habitat Astracaniae, rapacissimus; nec ipsa cadavera respuens.

Longitudo 2 pedum, & 1 pollicis; rostrum ex plumbis nigrum; palpebrae cæruleæ; irides flavæ; caput & collum ferruginea, admixto albido; remiges 26 nigrae, subtus candidæ, versus apicem griseæ; rectrices 12 æquales, subtus albae; unguis acutus.

mariti- 60. F. cera pedibusque flavis, corpore caudæque apice albo-cruribus colore ex rubicundo & albo mixto. v. Wurm's apud Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der Phys. IV. 2. 6.

Habitat in Javæ maritimis, cadaveribus piscibusque viettatis, 4 pedes cum 2 pollicibus longus, 1 pedem, 2 pollices altus; rostrum flavum;

gyp- 61 F. cera pedibusque semilanatis flavis supra cinereus, subitus ferrugineus; alis supra fuscis; cauda forficata, fusco fasciata, longitudine corporis.

Habitat in Ægypto, hieme frequens, cubitum longus.
Rostrum flavum; remiges versus apicem nigrae; alæ subitus ex grisea fuscæ; cauda longitudine corporis, cinerea; unguis nigri.

Milvus. 12. F. cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo, capite albidiore. *Fn. suec.* 57.

Milvus regalis. Briss. av. I. p. 414. t. 33.

Milvus. Gesn. av. 610. Aldrov. orn. 392. t. 368. Raj. av. 17. Günther Nest. u. Eyer. t. 25.

Milan royal. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 197. t. 7. pl. enlum. n. 422.

Kite or Glead. Brit. zool. n. 53. Will. orn. p. 74. t. 6. Albin. av. I. p. 4. t. 4. Hayes brit. birds t. 5. Lath. syn. I. I. p. 61. n. 43.

Hünergeyer. v. Würmb apud Lichtenberg neuestes aus der Physik und Naturgeschichte, IV. 2. p. 6.

β. Milvus vertice & gula castaneis. *S. G. Gmelin it. I. p. 147.*

γ. Accipiter Korschun. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV.*

p. 444. t. II. a.

♂. Milvus jaicensis, teccriticibus dorsi violaceis, pennarum singularum apice stigmate albo notato. *Lepcchin it. II. p. 180. t. 2.*

Habitat in Europa, Asia, Africa, quisquiliis vorans & pullos, gallinaceos; pacatissime volans, tempestates præfagit, supra nubes volitan. serenitatem aeris, clamore pluvias; ponit ova terna subrotunda albida, maculis sordide luteis varia; migrat trans pontum euxinum in Asiam; ultimo Aprilis die per 14 dies tot pontum euxinum prætervolantes vidit, ut homines numero superarent, Belloni it. 108.

Longitudo bipedalis, γ) in desertis ad Tanain obvii, 21½ modo pollicum, δ) I pedis & 10 pollicum; irides flavæ; cauda 12 pollicum; unguis nigri; crura pennis tecta; pulmones pulchri. γ) rostrum ex plumbeo nigrum, cæræ color in virorem vergens; area oculorum alba; capitis latera dilute fusca; caput reliquum cum gula & jugulo eleganter castaneum; remiges restringique nigrae apice vinaceæ. δ) ad fluvium Ural obvii pennæ apice albae, remiges striis maculisque alternis albis & cerasini coloris notatae, a medio ad apicem ex nigro in viridem aut cæruleum colorem vergentes; rectrices apice striis 2. angustis flava & alba.

- ater. 62. F. cera pedibusque flavis, supra ex fusco niger, capite & subtus albidus, cauda forficata.
Milvus niger. Briss. ornith. p. 117. n. 34.
Milan noir. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 203. pl. enlum. n. 472.
Black Gled. Sibb. Scot. ill. II. 3. p. 15.
Black kite. Lath. syn. I. 1. p. 62. n. 44.
Braunermauldgeyer. Kramer elench. p. 326. n. 5.
Habitat in Europa, milvo minor; cauda perum forficata; c:ura gracilia; unguis nigri.
- austria- 63. F. cera pedibusque semilanatis flavis, corpore supra castaneo, subtus testaceo fusco maculato, cauda forficata.
Austrian Kite. Lath. synops. I. 1. p. 62. n. 45.
Bräuner Geyer. Kramer elench. 327. n. 6.
Habitat in Austriae silvis, avibus viditans & vespertilionibus.
Magnitudo circiter milvi; rostrum flavum puncto nigro; oris anguli' flavi; irides & unguis nigri; palatum cæruleum; frons & gula albida fusco-maculata; caput, pectus & alæ castaneæ; cauda parva, fasciis nigritantibus, pennis apice albis.
- brasiliens. 64. F. pedibus flavis, corpore rufo, punctis albis & flavis vario, cauda ex albo & fusco varia.
Circus brasiliensis. Briss. ornith. p. 116. n. 31.
Milvus brasiliensis. Raj. av. p. 17. n. 6.
Caracara. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 222.
Brazilian Kite. Will. orn. p. 76. n. 9. Latham syn. p. 63. n. 47.
Habitat in Brasilia, gallinis infestus.
Magnitudo milvi; rostrum & unguis longi acutissimi nigritant; oculi cum iridibus flavent; pectus & abdomen nonnunquam carent; cauda 9 pollices longa.
- furcatus. 25. F. cera obscura, pedibus flavescentibus, corpore supra fusco subtus albido, cauda forficata longissima.
Milvus carolinensis. Briss. ornith. p. 118. n. 36.
Falco peruvianus, cauda furcata. Klein. av. p. 51. n. 14.
Hirundo maxima peruviana, avis prædatoris calcaribus instruta. Feuill. it. 2. p. 33.
Milan de la Caroline. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 221.
Swallow-tailed Hawk. Catesb. carol. I. p. 4. t. 4.
Swallow-tailed Falcon. Arct. zool. p. 210. n. 108. t.
X. Lath. syn. p. 60. n. 42.

Habitat in Carolina & Peru, viditans lacertis, serpentinis, insectis, quae volando potissimum capit; milvo minor, tamen bipedalis.

Rostrum basi setis circumseptum; irides rubrae; caput collumque nivea; dorsum splendore purpureo & viridi.

Forskah- 121. F. cera pedibusque semilanatis flavis, supra cinereus,
lili. subtus ferrugineus, alis supra fuscis, cauda forficata
fusco-fasciata longitudine corporis. *Forsk. Fn. arab. p. I.*

Habitat in Ægypto, hieme frequens, cubitalis.

Haliaë- 26. F. cera pedibusque cœrulais, corpore supra fusco, subtus
tos. albo, capite albido. *Fn. suec. 63.*

Haliaëtos f. aquila marina. Briss. ornith. p. 126. n. 10.

Haliaëtos. Aldrov. orn. I. p. 188. 190.

Morphnos. Aldrov. orn. I. p. 211. Raj. av. p. 7. n. 6.

Balbuzard. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 103. t. 2. planch.

enl. n. 414.

Bald Buzzard. Will. orn. p. 69. t. 6.

Fisk Gjœ. Leems 234.

Osprey. Brit. zool. I. n. 46. Arct. zool. 2. p. 199. n. 91.

Lath. syn. I. I. p. 45. n. 26.

arundina- β. F. cera cinerea, pedibus pallidis, corpore supra griseo-
ceus. infra albido, cauda æquali. S. G. Gmelin it. II. p. 163.

caroli- γ. F. cauda fusca concolore, vertice nigro, aut fusco albo-
nensis. variegato, ventre albo.

Falco pescator Antillarum & carolinensis. Briss. orn.
p. 105. n. 14. & 15.

Piscator. Raj. av. p. 19. n. 2.

Faucon pécheur de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois.
I. p. 142.

Fishing Hawk. Catesb. Carol. I. t. 2.

cayen- δ. F. corpore ex ferrugineo fusco, linea alba a mandibula
nensis. superiore per utrumque oculum ad occiput similiter al-
bum ducta. *Lath. syn. I. I. p. 47. n. 26. B.*

*Habitat in Europa, America & Sibiria, in insula quoque
maris pacifici Isle of Pines, inter arundines degens &
nidificans, viditans anatibus & piscibus, potissimum
majoribus, quos capiendo submergit.*

*Longitudo circiter 11 pollicum ultra pedem. Area fusca
descendit ab utroque oculo per latera colli ad alas.*

- Antilla- 65. F. fuscus, vertice nigro, ventre albo.
rum. Falco Antillarum. Briss. ornith. p. 104. n. 13.
Mans fenny. Raj. av. p. 19. n. 1. du Tartre hist. des
antill. 2. p. 252. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 144. Lath.
syn. I. I. p. 47. n. 27.
*Habitat in Antillis; habitu & pennis ad aquilas spectat,
falconibus tamen vix major; avibus & amphibiis viat-
tans. Pedes & unguis duplo maiores & validiores,
quam falconibus.*
- Sizensis. 66. F. cera pedibusque luteis, corpore supra fusco, subtus
flavicante.
Chinese Eagle. Lath. syn. I. I. p. 35. n. 11. t. 3.
Habitat in India.
Rostrum unguisque magni nigri; irides fuscæ; vertex
obscurus; alarum tænia media valde obscura.
- * * * * Falcones, minores, pedibus nudis.
- orienta- 67. F. pedibus plumbeis, stria superciliari ferruginea, capite
lis. & corpore supra obscurè fusco, subtus ex ferrugineo
fuscō, cauda albo-maculata.
Oriental Hawk. Lath. syn. I. I. p. 32. n. 7. c.
*Habitat in Japonia; 17 pollices longus; rostro ampio un-
guibusque nigris; mandibula inferior lutea; caput
magis obscurum reliquo corpore; pennæ stria media
nigra; tectrices alarum secundariae albo maculatae;
cauda 8 pollices longa.*
- indicus. 68. F. cera pedibusque luteis fronte & uropygio albis, cor-
pore supra ex rufescente, ventre ex ferrugineo fusco,
albido striato, cauda fusca, fasciis quinque nigris.
Javan Hawk. Lath. syn. I. I. p. 32. n. 7. d.
Habitat in Java, 17 pollices longus.
Rostrum basi flavum, apice nigrum; tectrices alarum infe-
riores sordide ex rufescente albae, ferrugineo undulatae;
remiges striis transversis apicibusque nigris; tectricos
caudæ albo-punctatae. Gula & pectus ex rufescente
fuscæ. Ungues nigri.
- novæ 69. F. albus, cera pedibusque luteis, ungue posteriore ante-
Holland- rioribus duplo longiore.
dise. New-Holland white Eagle. Lath. syn. I. I. p. 40. n. 18.
*Habitat in nova Hollandia, 20 pollices longus; orbitis
flavis. Forster.*

- Urubi-tinga. 70. F. cera pedibusque flavis, corpore fusco, alis nigricantibus cinereo mistis, cauda alba apice nigra albo punctata. *Aquila brasiliensis.* Briss. orn. p. 128. n. 12. Urubitinga. Will. orn. p. 64. Raj. av. p. 8. n. 9. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 141. Brasilian Eagle. Latham syn. I. I. p. 41. n. 20. Habitat in Brasilia, anseris semestris magnitudine. Rostrum crassum, nigrum; oculi magni.
- Pondice- tianus. 71. F. cera cærulescente, pedibus luteis, corpore castaneo, capite collo & pectore albis, linea longitudinali pennarum media fusca. *Aquila ponticeriana.* Briss. orn. p. 129. n. 15. Aigle de Pondichery. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 136. pl. enlum. n. 416. Pondichary - Eagle. Lath. syn. I. I. p. 41. n. 21. Habitat in India, incolis sacer, pedem cum 7 pollicibus longus. Rostrum cinereum, apice flavum; remiges sex priores parte media exteriore nigricantes; unguis nigri.
- Æquino- tialis. 72. F. pedibus luteis, capite, collo dorsoque ex atro fuscis, pectore rufo, alarum testicibus & humeris colore succoladæ, cauda nigra, rectricibus, exceptis duabus intermediis, signo albo V notatis. Æquinoctial Eagle. Latham syn. I. I. p. 43. n. 25. Habitat in Cayenna, 21 pollices longus; rostrum unguisque pallidi, illius apex niger.
- Buteo. 15. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido, maculis fuscis. Fr. suec. 60. Scop. ann. I. p. 15. n. 4. Buteo vulgaris. Gefn. av. 46. Aldr. orn. I. p. 369. 370. Raj. av. p. 16. Buteo. Briss. orn. p. 116. n. 32. Buse. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 206 t. 8. pl. enlum. n. 419. Buzzard. Brit. zool. I. p. 188. n. 54. t. 25. Ard. zool. 2. p. 207. n. 3. Common Buzzard. Will. orn. p. 70. Alb. av. I. t. I. Latham. syn. I. I. p. 48. n. 28. Habitat in Europa, avibus, reptilibus, mammalibus minibus, insectis viditans; 8 pollicibus pedem longitudine superans, colore varius; rostrum plumbeum; irides obscuræ; unguis nigri.

- gallina-* 72. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fusco, subtus rufso maculis ovalibus fuscis, cauda fusca fasciata.
Circus major, gros Buzzard. *Briss. ornith.* p. 114. n. 28.
Hünerhabicht, Hünergeyer. *Frisch. av.* t. 72.
- nævius. β.* *Falco minor*, alis magis variegatis. *Briss. ornith.* p. 116. n. 28. A.
Habitat in Europa, 8-11 pollicibus pedem longitudine superans: Rostrum unguisque nigri; irides croceæ.
- jamai-* 74. F. cera pedibusque luteis, corpore ex fuscescente bubalino, subtus pallidiore maculato, vertice obsoleto.
Cream-coloured Buzzard. *Lath. syn.* I. I. p. 49. n. 30.
Habitat, rario rati in Jamaica, speciosa avis.
 Rostrum unguisque nigri; irides slave; dorsi pennæ & rectrices rachi medioque fuscæ; pedes breves.
- borealis.* 75. F. cera pedibusque pallide flavis, corpore supra fusco, subtus albo, cauda obsolete ferruginea versus apicem stria transversa nigra.
American Buzzard. *Lath. syn.* I. I. p. 50. n. 31.
Red-tailed Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 205. n. 100.
Habitat in America boreali, potissimum Carolina, buteoni æqualis.
 Rostrum unguisque nigri; gula alba fusco admixta; jugulum & pectus dorso pallidiora; uropygium album.
- Leveria-* 76. F. pedibus flavis, capite fusco & albo alternatim striatus, corpore supra fusco, subtus albo, alis obscure fuscis.
Leverian Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 206. n. 101.
Habitat in Carolina, buteoni æqualis.
 Rostrum obscurum; pennæ apice macula insigni alba notata; rectrices tenuis & albis, & totidem obscuris, media obscuris & cinereis.
- rufus.* 77. F. pedibus flavis, corpore rufso, supra in fuscum verente, cauda cinerea.
Circus rufus. *Briss. orn.* p. 115. n. 30.
Harpage. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 217. pl. enl. n. 460.
Harpy. *Lath. syn.* I. I. p. 51. n. 32.
Fischgeyer, Brandgeyer. *Frisch. av.* t. 78.
Habitat in Galliae & Germaniae humilioribus, praesertim fluviorum ripis, pisces vivos ex aqua prædans.
Longitudo pedis & 8 pollicum; unguis rostrumque nigritant; irides croceæ.

AVES ACCIPITRES. Falco.

267

Variegata-78. F. pedibus flavis, capite colloque albidis ferrugineo-maculatis, corpore supra fusco, subtus albo, cauda obscure fusca striis obsoletis decussantibus.

Speckled Buzzard. *Lath. syn. I. I. p. 97. n. 83.*

Habitat in America boreali.

Habitus buteonis; longitudo 12 pollices excedens; rostrum obscurum; unguis nigri; an vere differt a sequente?

albidus. 79. F. pedibus flavis, corpore albo maculis magnis fuscis, cauda obscura striis punctisque albis.

Buzzardet. *Arch. zool. 2. p. 211. n. 109.*

Habitus buteonis, cruribus tamen longioribus. Longitudo 15 pollicum; maculae subtus rariores; tectrices minores fuscæ.

Apivorus. 28. F. cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cinereo, caudæ fascia cinerea apice albo. *Fn. suec. 65.*

Buteo apivorus. Raj. av. 16. Briss. av. I. p. 410.

Bondrœ. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 208. pl. enlum. n. 420.

Honey Buzzard. Brit. zool. I. n. 26. Will. orn. p. 72.

t. 3. Albin. av. I. p. 2. t. 2. Lath. syn. I. I. p. 52. n. 33.

Habitat in Europa, viditans muribus, aviculis, reptilibus, infestis, praesertim apibus.

Aeruginosus. 29. F. cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis. *Fn. suec. 66.*

Circus palustris. Briss. ornith. p. 115. n. 29.

Circus. Gesn. av. 49. Aldrov. orn. I. p. 351.

Milvus aeruginosus. Aldrov. orn. I. p. 395. Raj. av. 17. Nozeman nierdel. Vogel, t. 8. 9.

Busard. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 218. t. 10. pl. enlum. n. 424.

Moor Buzzard. Brit. zool. I. n. 57. t. 27. Will. orn. p. 75. t. 7. Lath. syn. I. I. p. 53. n. 34.

Habitat in Europa in paludibus nidificans, avibus aquaticis, piscibus, cuniculis viditans.

Javanicus. 80. F. cera nigra, medio lutea, pedibus luteis, capite, collo & pectori castaneis, dorso fulco. *v. Wurm apud Lichtenberg Magaz. IV. 2. 8.*

Habitat in maritimis Java, piscibus viditans.

Cinereus. 81. F. cera pedibusque cœruleoventibus, linea supraoculari alba fusco-maculata, corpore supra ex cinereo-fusco albido admisto.

AVES ACCIPITRES. Falco.

- Falco freti Hudsonis. *Briss. orn. p. 103. n. 10.*
 Faucon de la Baie d'Hudson. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 223.*
 Ashcoloured Buzzard. *Edw. av. t. 53. Latham syn. I. p. 55. n. 35.*
Habitat in freto Hudsonis, tetraonibus viditans.
Magnitudo gallinæ mediocris; cauda supra ex cinereo fuscæ, tæniis transversis griseis, subtus cinerea, tæniis albis, Irides flavæ. An mera buteonis varietas?

- lineatus 82. F. cera pedibusque flavis, corpore supra obscure fuscæ, subtus rufo lineis albis & pallide ferrugineis, rectricibus obscure fuscis, apice striisque duabus transversis folidide albis.
 Barred-breasted Buzzard. *Latham syn. I. I. p. 56. n. 36.*
 Red-shouldered Falcon. *Arct. zool. 2. p. 206. n. 102.*
Habitat in insula Longa, 20-22 pollices longus.
 Rostrum cæruleum; unguis nigri; caput & collum ex flavicante alba, lineis obscuris striata.

- obsole- 83. F. corpore obscure fuscæ, subtus leviter albo-maculatis, tūs. rectricibus mediis obsoleto fuscis.
 Plain Falcon. *Arct. zool. 2. p. 208. n. 104.*
Habitat in freto Hudsonis bipedalis, rostrum nigrum.

- rufico- 7. F. cera, palpebris, pedibusque luteis, corpore cinereo alboque undulato, collari albo. *Fn. suec. 56.*
 Collared Falcon. *Arct. zool. 2. p. 222. G. Lath. syn. I. I. p. 56. n. 37.*
Habitat in Suecia, Sibiria, Groenlandia, gallinæ magnitudine.
 Rostrum plumbeum; corpus subtus album, maculis exiguis cordatis fuscis; cauda tæniis 12-13 alternatim albis & fuscis; unguis nigri.

- novæ 84. F. cera pedibusque luteis, corpore ex atro fuscæ, subtus rufo-maculato, cauda alisque griseo-maculatis.
 New-Zealand Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 57. n. 38. t. 4.*
Habitat in nova Seelandia, vulturi affinis, 18 pollices, femina 23 pollices longa; rostrum cæruleum, apice nigrum; irides nudæque orbitæ cæruleæ, feminæ flavæ; huic collum & abdomen lineis albidis, cauda tæniis transversis albis notata;

- Palumba-30.* F. cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fuscō-
rius, restringebus fasciis pallidis, superciliis albis. *Fn. suec.* 67.
Accipiter palumbarius. *Gesn. av.* 51. *Aldr. orn.* I. p. 342.
t. 343. *Raj. av.* 18. n. 1.
Asterias. *Aldr. orn.* I. p. 336. t. 340. 341.
Astur. *Briss. orn.* p. 91. n. 3.
Autour. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 230. t. 12. pl. enlumi-
n. 418. 461.
Foshawk. *Brit. zool.* I. n. 52. *Arct. zool.* 2. p. 204. n. 99.
Albin. av. 2. p. 8. t. 8. *Will. orn.* p. 85. t. 3. 5. *Luth.*
syn. I. I. p. 58. n. 39.
Grosser gesperberter Falk, grosser gepfeilter Falk. *Frisch.*
av. t. 82. (mas). 81. (fem). *Falck it.* III. t. 21.
Habitat in Europa, Calmuccia, America boreali, gallinis
infestus, & ad venatum volucrum adaptandus; 10
pollicibus & ultra pedem longitudine excedens.
Rostrum cæruleum, apice nigrum; irides flavæ; caput
fuscum; corpus subtus totum album nigro-undulatum;
cauda cinerea longa, apice alba; unguis nigri.

cayen-
densis. 85 F. pedibus cæruleis, capite & collo ex cærulecente
albis, dorso alisque obscure cinereis, jugulo, pectori
& abdome albicantibus.

Cayenne Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 59. n. 40.

Habitat in Cayenna.

Rostrum cæruleum; unguis & remiges primariae nigrae;
secundariae nigro-lineatae; caudæ apex albus, tæniae
4-5 alternatim albae & nigrae.

mactron-
rus. 85 C. cera pedibusque luteis, rostro nigricante, corpore su-
pra cinereo subtus albo, remigibus interioribus cinereis
apice albis. *S. G. Gmelin it.* I. p. 48. nov. comm. *Petrop.*
XV. p. 439. t. 8. 9. *Lepechin it.* I. p. 260.

Long-tailed Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 59. n. 41.

Habitat in Russia lanarii magnitudine, 7 pollicibus pedem
longitudine superans; cauda feret 9 pollicum; rostrum
nigrum, basi viride.

*Falconaria ars, scilicet ars falcones columba & elanio capiendi, ad aucupium & ven-
tum antiloparum, ardcarum, avicularum, &c. instituendi, tataris nonnullis gen-
tibus familiaris, in Europa propriis artificibus commissa, in luxuriam magnatum,
transit in scientiam; omnes feret falcones possunt ita instrui; v. d' Espanon Fal-
conaria. Francof, 1617. 41*

gentilis. 13. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. *Fn. suec.* 58. *Scop. ann.* I. p. 15.

Falco gentilis. *Gesn. av.* 71. *Aldr. orn.* I. p. 481. *Raj. av.* 13. *Briff. av.* I. p. 339.

Gentle Falcon. *Brit. zool.* n. 50. t. 21. 22. *Ard. zool.* 2. p. 203. n. 98. *Albin. av.* 2. p. 4. t. 6. *Will. orn.* 46. *Lath. synops.* I. I. p. 64. n. 48.

Habitat in alpibus Europeis, America boreali, ad Volgam, viicitans tetraonibus, palumbario major; rostrum plumbeum; irides flavæ; caput subfuscum, maculis oblongis nigris; cauda albo punctata; ungues nigri.

communis. 86. F. fuscus, pennarum margine rufo, cauda tenuis transversis saturioribus, rostro ex cinereo cærulecente, cera, iridibus pedibusque luteis.

Falco. *Briff. orn.* p. 92. n. 4.

Faucon. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 249.

Schwarzbrauner Falk. *Frisch. av.* t. 74.

hornotinus. ♂. F. in cinereum vergens. *Briff. orn.* p. 93. n. 4. A.
Faucon fors. *Buff. hist. nat. des ois.* I. t. 15. pl. enlum. n. 470.

Gearling Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 65. n. 49. A.
Annus falco.

gibbosus. ♀. F. gibbosus. *Raj. av.* p. 14. n. 6. *Briff. orn.* p. 93. n. 4. B.
Faucon haggard ou bosse. *Buff. hist. nat. des ois.* I. t. 16. pl. enlum. n. 471.

Haggard Falcon. *Will. orn.* p. 80. *Latham syn.* I. I. p. 66. n. 49. B.

Senex avis.

leucocephalus. ♂. Falco. *Briff. orn.* p. 93. n. 4. C.

phalus. White-headed Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 66. n. 49. C.
Rauh-fuss geyer; gelbtrauner Geyer. *Frisch. av.* t. 75.

albus. ♂. F. albus, *Raj. av.* p. 14. n. 7. *Briff. orn.* p. 94. n. 4. D.
White Falcon. *Will. orn.* p. 80. n. 7. *Lath. syn.* I. I. p. 66. n. 49. D.

Weifer Falk, weiser Geyer. *Frisch. av.* t. 80.

ater. ♀. F. niger. *Briff. orn.* p. 94. n. 4. E.

Falco columbarius Nebbi dictus. *Raj. av.* p. 161.

Faucon passager. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 263. pl. enlum. n. 469.

Black hawk or Falcon. *Edw. av.* I. t. 4.

AVES ACCIPITRES. Falco.

271

Black Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 67. n. 49. E.

Schwarzbrauner Habicht. *Frisch. av.* t. 83.

vævius.

η. F. maculatus. *Briss. orn.* p. 95. n. 4. F.

Spotted Falcon. *Edw. av.* I. t. 3.

Spotted-winged Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 68. n. 49. F.

fusca.

ε. F. corpore supra fusco maculis obscurioribus, subtus
albo maculis fuscis.

Falco fuscus. *Briff. orn.* p. 95. n. 4. G.

Brown Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 68. n. 49. G.

Braunfahler Geyer. *Frisch. av.* t. 76.

tuber.

ι. F. maculis nigris & rubris. *Briss. orn.* p. 96. n. 4. H.

Falco rubens. *Raj. av.* p. 14. n. 10.

Red Falcon. *Will. orn.* p. 81. n. 10. *Lath. syn.* I. I.
p. 69. n. 49. H.

indicus.

κ. F. corpore subtus ex rubescente fulvo.

Falco ruber indicus. *Briss. orn.* p. 96. n. 4. I.

Falco rubri indici Aldrovandi. *Raj. av.* p. 14. n. 11.
Will. orn. p. 81. n. 9.

Red Indian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 69. n. 49. I.

italicus.

λ. F. pectore luteo, maculis ferrugineis, alis versus apicem
albo-maculatis.

Falco italicus. *Jonst. av.* p. 19. *Briss. orn.* p. 97. n. 4. K.

Italian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 70. n. 49. K.

arcticus.

μ. F. islandus. *Briss. orn.* p. 97. n. 4. L.

Arctic Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 70. n. 49. L.

Habitat in Europa, ε) etiam in Sina, η) in fretto Hudsonis,
κ) in India venatui aptissimus.

islandus.

87. F. cera pedibusque slavis, corpore fusco, subtus albo
maculis cordatis nigris, cauda albo fasciata. *Brünn.*
orn. bor. p. 2. n. 9.

albus.

β. F. albus, supra maculis exiguis cordatis nigris, caudæ
albæ rectricibus duabus intermediis obsolete nigro fas-
ciatis. *Brünn. orn. bor.* p. 2. n. 7.

macula-

γ. F. albus, maculis cordatis magnis, rectricibus albis,
singulis nigro-fasciatis. *Brünn. orn. bor.* p. 2. n. 8.

Habitat in Islandia, 9 pollicibus pedem longitudine exce-
dens; caput album, ferrugineo admisto; dorsum obscurum
singulis pennis albidis, fusco-fasciatis, & albo margi-
natis; cauda rotundata, fasciis circiter 14 alternis
fuscis & albis; unguis nigri, posterior proctus longus.

barbarus. 8. F. cera pedibusque luteis, corpore cærulecente fuscō que maculato, pectore immaculato, cauda fasciata.
Falco barbaricus. Briss. orn. p. 99. n. 6. A.

Falco tunetanus. Aldr. av. I. p. 483. Raj. av. 14. n. 9. Barbery Falcon. Will. orn. p. 81. Alb. av. 3. p. 2. t. 2. Lath. syn. I. I. p. 72. n. 51.

Habitat in Barbaria, magnitudine & colore ad Lanarium accedens, 17 pollices longus. Rostrum nigrum; irides flavæ; alæ vix maculatae; pectus ex flavicante album in cæruleum vergens; abdomen maculis oblongis nigris; cauda fasciis 7 transversis fuscis. An mera peregrini varietas?

peregrini- 88. F. cera pedibusque luteis, corpore supra cinereo fuscō fasciato, subtus ex rufo albo, tæniis nigricantibus, cauda albo-punctata.

Falco peregrinus. Raj. av. p. 13. n. 1. Briss. orn. p. 98. n. 6.

Faucon pelerin. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 249. Périgrine Falcon. Brit. zool. n. 48. t. 20. Arct. zool. n. 203. Will. orn. p. 76. t. 8 Latham syn. I. I. p. 73. n. 52.

tataricus. 8. F. alis supra rufis, digitis prælongis. Briss. orn. p. 100. n. 6. B.

Faucon de Tartarie ou Barbarie. Bel. hist. des ois. p. 116. Tatarian Falcon. Lath. syn. I. I. p. 73. n. 52. A.

Habitat in Europâ & boreali Asia & America. Migratorius; an non nisi ætate deformis gentilis?

verraco- 89. cera flava, capite & corpore supra albo, maculis ex rufo fuscente dilute fuscis, subtus albo, pectore ferrugineo parumper maculato.

Spotted Falcon. Brit. zool. n. 55. t. 26. Latham syn. I. I. p. 74. n. 53.

Habitat in Anglia, buteonis magnitudine. Rostrum nigrum; alæ fasciis cinereis; cauda dilutius & obscurius fuscis;

pennatus. 90. F. cera pedibusque luteis, corpore supra ex nigricante fusco, & fordide griseo variegato, subtus ex flavo fusco lineis longitudinalibus nigricantibus, pedibus ad digitos usque pennatis.

Faucon pata. Briss. orn. VI. app. p. 22. t. 1.

Booted Falcon. Lath. syn. I. I. p. 75. n. 55.

Magni-

Magnitudo *Gyrfalconis*; longitudo *pedis*, & $7\frac{1}{4}$ *pollicunt*; rostrum *nigricans*; palpebræ *luteæ*; caput & cervix ex *fulvo grisea*, *lineis nigricanibus*; cauda fascia, *versus apicem nigricans*, *apice grisea*, ad latera albo-maculata. Ungues *nigri*.

- spadiceus.* 91. F. cera flava, corpore spadiceo ferrugineo admixto, inferiorius ad latera albo, pedibus ad digitos usque pennatis. *Falco spadiceus* or Chocolate Falcon. *Forster act. angl. LXII.* p. 281. & *amer. catal.* p. 9. Chocolate-colored Falcon. *Arct. zool. 2.* p. 201. n. 94. t. IX. Bay-Falcon & Placentia Falcon. *Lath. syn. I. 1.* p. 54. n. 34. A. & *76.* n. 57.
- β.* F. uropygio albo. White-rumped Bay-Falcon. *Lath. syn. I. 1.* p. 54. n. 34. B. Habitat in freto Hudsonis, & nova terra, viālitans anatibus, quibus in rupibus inhiat. Longitudo *pedis* & *10 pollicum*; rostrum *nigrum*; rectrices duæ intermediae *nigræ* & *cinereæ*, ceteræ extus *obscureæ*, intus albo & nigro variæ. Digitæ breves.
- S. Johan-* 92. F. cera pedibusque pennatis flavis, corpore fusco, supra lineis obliquis nigris & sordide albis, subtus pañim maculis albis & flavicantibus, cauda fasciata apice alba. S. John's Falcon. *Arct. zool. 2.* p. 200. n. 93. t. IX. *Lath. syn. p. 77.* n. 58. Habitat in freto Hudsonis & nova terra; pedem & 9 pollices longus. Digitæ breves.
- facer.* 93. F. cera pedibusque cæruleis, dorso, pectore & tectricibus alarum primoribus fusco-maculatis, cauda maculis reniformibus. Falco sacer. *Briff. orn.* p. 98. n. 4. M. Raj. av. p. 13. n. 2. Sacre. *Buff. hist. nat. des ois.* 1. p. 246. t. 14. *Will. orn. p. 77.* *Lath. syn. I. 1.* p. 77. n. 59. *β.* Falco sacer. *Forster. act. angl. LXII.* p. 382. Sacre. *Arct. zool. 2.* p. 202. n. 96. American Sacre. *Lath. syn. I. 1.* p. 78. n. 59. A. Habitat β) in freto Hudsonis, nova terra, Tataria, heic ad venatum institutus; frigoris patientissimus, ardeam albam potissimum venatur; Aprili & Mayo in locis desertis ova plerumque 2 ponens, bipedalis; caput obscure fuscum; pennæ abdominis albæ, medio fusco maculatae; tectrices alarum, remigesque primaria lineis transversis albis;

AVES ACCIPITRES. Falco.

*cauda fuscæ, ad latera maculis ovalibus transversis
rubris. Pedes ad digitos fere pennati.*

- novæ terræ. 94. F. cera pedibusque flavis, occipite ferrugineo, corpore supra fusco, subtus ferrugineo, cauda lineis dilutius & saturatius fuscis varia.
New foundland Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 201. n. 95.
Lath. syn. I. I. p. 79. n. 60.
Habitat in novaterra, 20 pollices longus; pedes semipennati.
- stellaris. 95. F. pedibus cæruleis, corpore nigricante maculis radiatis, subtus ex albo & nigro mixto. *Briss. orn.* p. 103. n. 11.
Blae-footed Falcon. *Will. orn.* p. 82. c. 11.
Starry Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 79. n. 61.*
Magnitudo habitusque peregrini; alæ tanien breviores;
cauda longior; irides aureæ.
- hyemalis. 96. F. cera flava, capite dorsoque ex atro fuscis, cervice albostriata, pectore & abdomine albis, maculis cordatis.
Winter Falcon. *Arct. zool.* 2. p. 209. n. 107.
β. Northern Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 79. n. 62.*
Habitat hieme in provincia Noveboracenfi, pygargi magnitudine. Tectrices alarum obscuræ, margine sordide albo, extimæ aurantio; cauda lineis fuscis & nigris apice alba; rostrum nigrum; pedes longi, graciles.
- cirrhatus. 97. F. cera pedibusque pennatis luteis, capitis crista retrorsum pendula, corpore supra nigro, subtus albo & nigro striato.
Falco indicus cristatus. *Briss. orn.* p. 104. n. 12.
Falco indicus cirrhatus. *Raj. av.* p. 14. n. 12.
Faucon huppé des Indes. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 27¹.
n. 4.
Crested Indian Falcon. *Wil. orn.* p. 82. n. 12. *Lath. syn. I. I. p. 80. n. 63.*
Habitat in India, palumbarii circiter magnitudine; rostrum obscure cæruleum; irides flavæ; cervix fulva; cauda fasciis transversis nigris & cinereis; unguis nigri.
- melano-leucos. 98. F. pedibus luteis, capite, collo, dorso, humeris, & remigibus nigris, reliquo corpore, tectricibus alarum & cauda albis.
Black and white Indian Falcon. *Penn. ind. zool.* t. 3.
Lath. syn. I. I. p. 81. n. 65.
Habitat in Zeylon, 16 pollices longus; rostrum, unguis, tectrices alarum medie plures nigricant; irides flaventes;
orbite albo maculatae.

ceylanen- 99. F. cera flava , corpore lacteo , occipitis pennis duabus sis. dependentibus.

Ceylonie crested Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 82. n. 66.
Habitat in Zeylon ; rostrum obscurum.

griseus. 100. F. cera pedibusque flavis , corpore supra obscure griseo ; subtus albo , maculis oblongis nigris , rectricibus longis , intermediis duabus concoloribus , reliquis maculatis.

Grey Falcon. *Brit. zool.* n. 49. *Lath. syn.* I. I. p. 82. n. 67.
Habitat in Anglia , corvi magnitudine.

Rostrum cærulescens ; irides rubræ ; caput anterius obscure fuscum , posterius album , ad latera cum gulis bubalium ; remiges albo-maculatae.

Gyrfalco. 27. F. cera cærulea , pedibus luteis , corpore fusco , subtus fasciis cinereis , caudæ lateribus albis. *Fn. suec.* 64.

Brown Jerfalcon. *Lath. syn.* I. I. p. 82. n. 68.

Habitat in Europa , gruibus , ardeis , columbis infestus . Variat pedibus cæruleis & flavis.

candi- 101. F. cera pedibusque ex cærulecente cinereis , corpore albo fuscō-maculato.

Gyrfalco. *Aldrov. orn.* I. p. 471. t. 473. *Raj. av.* 13. n. 3.

Gerafault. *Briss. orn.* I. p. 370. n. 19. t. 30. f. 2. *Buff. hist. nat. des oiseaux.* I. p. 239. t. 13. pl. enlum. n. 215. 446. 462.

Gerfalcon. *Will. orn.* p. 78. n. 3.

Gyrfalcon. *Brit. zool.* n. 47. *Arch. zool.* 2. p. 221.

White Jerfalcon. *Lath. syn.* I. I. p. 83. n. 69.

islandi- 3. Gerafault d'Islande: *Briss. orn.* I. p. 373. t. 31.
eus. Iceland Jerfalcon. *Lath. syn.* I. I. p. 84. n. 69. A.
Habitat in Islandia & Scotia boreali , palumbarii magnitudine ; rostrum ex cæruleo cinereum , apice nigricans ; unguis plumbeus ; irides & orbitæ cæruleæ , (β. irides lateæ). β. Corpus supra fuscum , dorſi & alarum maculæ albæ , subtus album nigro maculatum. Pedes flavi.

sufflator. 17. F. cera pedibusque luteis , corpore fusco albido , oculorum operculis olleis.

: Surinam Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 85. n. 70.

Habitat in Surinamo & Cayenna ; iratus aut territus caput inflat ad magritudinem corporis. Rolander.

Corpus supra fuscum , plumis basi albis , subtus luteo , albo fuscoque maculatum , uti etiam rectrices. Nares longe catneos intercalari.

- cachin- 18. F. cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fusco
nans. albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente.
Laughing Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 85. n. 71.
Habitat in America meridionali; hominem observans ca-
chinnos edit. Rolander.
Corpus supra dorsum, alas, uropygium fuscum; sed alba
sunt collum, gula, pectus, abdomen, alæ subtus. Cauda
fasciis luteis nigrisque.
- Lanarius. 24. F. cera lutea, pedibus rostroque cæruleis, corpore subtus
maculis nigris longitudinalibus. *Fn. suec.* 62.
Lanarius. *Gesn. av.* 76. *Aldr. orn.* I. p. 488. *Raj. av.*
p. 15. n. 13. *Briss. orn.* p. 105. n. 16.
Lanier. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 243.
Lanneret. *Albin. av.* 2. p. 7. t. 7.
Lanner. *Brit. zool.* n. 51. t. 23. *Arct. zool.* 2. p. 225.
Will. orn. p. 82. n. 13.
Brown Lanner. *Lath. syn.* I. I. p. 86. n. 72.
Habitat in Europa, desertis Uralensi, Baraba aliisque
tataricis, migratorius; nidificans in arboribus humi-
libus, venatui apissimus.
- Tænia alba cingit frontem supra oculos. Pedes breves,*
&, prouti nonnunquam cera, cærulentes; pectus al-
bum, flavo tinctum, maculis fuscis; remiges primariae
& cauda obscura; hæc utrinque, illæ intus maculis
ovalibus ferrugineis.
- albicans. 102. F. cera pedibusque luteis, corpore subtus albicante,
remigibus nigricantibus.
Lanarius albicans. *Briss. orn.* p. 107. n. 18.
Lanarius. *Aldrov. orn.* I. p. 380. fig. p. 181.
White Lanner. *Lath. syn.* I. I. p. 87. n. 73.
β. Lanarius rectricibus duabus intermediis griseis, reliquis
maculatis albis.
Lanarius. *Aldrov. orn.* I. p. 380. fig. p. 183.
Habitat in Europa, an vere distinctus a lanario?
- cyaneus. 10. F. cera alba, pedibus fulvis, corpore cæruleo-canescente;
arcu superciliari albo gulam cingente.
Lanarius cinereus. *Briss. orn.* p. 106. n. 17.
Oiseau S. Martin. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 212. *planch.*
entum. n. 459.
Blue Hawk. *Edw. av.* 5. p. 33. t. 225.
Hen-harrier. *Erit. zool.* n. 58. t. 28. *Lath. syn.* I. I. p. 83.
n. 74. *Hayes brit. Birds t.* I.
Grau-weisse Geyer. *Frisch av.* t. 79. 80.

Habitat in Europa & Africa, 17 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides, aliquando etiam cera, luteæ; occiput album, maculis dilute fuscis; pectus & abdomen similiter alba, prius obscure striatum; rectrices 2 intermediae utrinque, reliquæ extus griseæ, intus albæ, obscure striatae.

Pygar- 11. F. cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pal-
gus. lido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba.

Scop. ann. I. p. 14.

Faleo torquatus. Briss. av. I. p. 345.

Subbuteo. Gesn. av. 48.

Pygargus. Alb. av. 2. p. 5. t. 5. & 3. p. 3. t. 3. Will. orn. I. 7. Raj. av. 17. n. 5.

Soubuse. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 215. t. 9. planch. enl. n. 443. 480.

Ring tail. Brit. zool. n. 59. Arct. zool. 2. p. 209. n. 106. Will. orn. p. 72. Lath. syn. I. I. p. 89. n. 75. Hayes brit. Birds t. 2.

Habitat in Europa, & temperatori Sibiria, 7½ pollicibus pedem longitudine superans; rostrum pallidum; irides flavæ; cauda longiuscula, obscure fasciata, albo punctata; mas subtus maculis transversis, femina longitudinalibus.

hudso- 19. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, superciliis albis;
nius. speculo alarum cærulecente.

Accipiter freti Hudsonis. Briss. av. 6. app. 18.

Ringtail Hawk. Edw. av. 107. t. 107.

Hudson's bay Ringtail. Lath. syn. I. I. p. 91. n. 76.

Habitat ad fretum Hudsonis, pedem & 9½ pollices longus. Rostrum unguisque nigri; corpus subtus album, maculis ex rufo fuscis; rectrices 2 intermediae subfuscæ, extimæ albæ, reliquæ ex cærulecente cinereæ, singulæ striis transversis fuscis.

*Buffoni. 103. F. cera cærulea, pedibus luteis, corpore supra spadiceo,
subtus ex rufescente bubalino, superciliis flavis, caudæ
fasciis pallide & obscure fuscis.*

Cayenne Ringtail. Lath. syn. I. I. p. 91. n. 76. A.

Habitat in Cayenna, bipedalis.

*Rostrum unguis que nigri; pennæ primariae intus obscure,
extus ex cinereo cæruleæ, fasciis fuscis, in secundariis
magis obsoletis; remiges apice albæ.*

uligino- 104. F. cera pedibusque aurantiis, corpore supra fusco, subtus sp̄endide ferrugineo, caudæ tæniis quatuor nigris.

Marsh Hawk. Arct. zool. 2, p. 208. n. 105. Edw. av. 4^t. 291. Lath. syn. I. I. p. 90. n. 75. A.

Habitat in Jamaica, Pensylvania, heic æstate in locis uliginosis aviculas, reptilia, serpentes venans, hieme discedens, bipedalis.

Fostrum cærulescens; orbitæ aurantiæ; irides castaneæ; linea nigra ab angulo rostri pone oculos ducta; supra hanc alba genas cingens & ad cervicem pergens; caput, collum & pectoris superior pars ex nigro & ferrugineo varia; tectrices claram fuscæ; pedes crassi, breves, robusti; II, 19, 103 & 104 per quam inter se affines.

Litho- 105. F. cera lutea, corpore supra cinereo, subtus rufo maculæ longitudinalibus fuscis, cauda cinerea, versus apicem nigrante, apice alba.

Lithofalco. Briss. orn. p. 101. n. 8.

Lithofalco & Dendrosfalco. Raj. av. p. 18. n. 8.

Rochier. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 286. pl. enlum. n. 447.

Stone-or Treefalcon. Will. orn. p. 80. Latham syn. I. I. p. 93. n. 77.

Tinnunculi magnitudine, 12 $\frac{1}{4}$ pollices longus; fostrum ex cærulecente cinereum; irides luteæ; reñtrices 2 intermediae unicolores, reliquæ nigro-fasciatæ.

monta- 106. F. pedibus luteis, corpore supra ex fusco cinereo, gula juguloque albido maculatis, caudæ basi cinerea, medio nigrante, apice albo.

Falco montanus. Raj. av. p. 13. n. 4. Briss. orn. p. 101. n. 9.

Mountain Falcon. Will. orn. p. 78. Lath. syn. I. I. p. 93. n. 78.

β . Falco montanus cinereus. Briss. orn. p. 102. n. 9. A.
Falco montanus secundus Aldrovandi. Will. orn. t. 9.
Peregrino minor, cauda breviore; β) pedeni & 9 pollices longus; fostrum nigrum; irides β) flavæ; unguis nigrit; corpus β) subtus niveum; colli maculæ nunc ferrugineæ; nunc nigrae; aliquando collum & pectus tota nigra; adulti caput nigrum. An varietas Lithofalconis?

Tinnun- 16. F. cera pedibusque flavis, dorso rufo punctis nigris, culus. pectore striis fuscis, cauda rotundata. Fn. suec. 61. Scop. ann. I. p. 16.

Tinnunculus s. Cenchris. Gejn. av. 54. Aldr. orn. I. p. 356.

t. 358. 359. Raj. av. p. 16. n. 16. Briff. av. I. p. 393.
n. 27.

Cresserelle. Buffon hist. nat. des ois. I. p. 280. t. 18.
planch. enlum. n. 401. 471.
Kestrel, Kestril, Stannel, or Wind-hover. Brit. zool. n.
60. Arct. zool. 2. p. 226. M. Will. orn. p. 84. t. 5.
Lath. syn. I. I. p. 94. n. 78. Hayes brit. birds. t. IV.
Rother Falk, & Rothelgeyer. Frisch. av. t. 84. 85.

griseus. β. Tinnunculus pennis griseis. S. G. Gmelin it. p. 49. t. 10.

alauda- γ. Accipiter alaudarius. Briff. orn. p. 110. n. 22.
rius. Maeuse-Falk. Frisch. av. t. 88.

*Habitat in Euroꝝ & Sibiriaꝝ, potissimum turribus, avi-
culis, muribus, inseclis viettans; advenit ex mi-
gratione primo die germinationis f. veris, una cum mo-
tacilla alba. Olim ad capiendas perdices aliasque
minores aves instrudus.*

Caudæ fascia lata nigra versus apicem; rectrices, interme-
diis exceptis, apice albæ; mari corona capitinis & cauda
dilute griseæ; dorsum & alæ, ex purpurascente rufæ,
nigro maculatæ; femina longe ponderostiori caput
rufescens, corona nigro-striata, dorsum, cauda, tec-
tricesque alarum ferrugineæ, nigro-lineataæ.

bohemi- 107. F. pedibus flavescensibus, corpore supra cinereo, subtus
candido, remigibus quinque exterioribus extus nigris,
orbitis albis.

Maeuse-habicht, Missylauce. Jof. Mayer. bohem. Abb. 6.
p. 313.

*Habitat in Bohemiaꝝ montosis, muribus viettans, vespere
demum conspicuus, vix ultra pedem longus.*

Rostrum versus oris angulos flavescens; irides flavæ;
cauda acuta, longa; pedes crassiusculi, infra genua
plumosi; unguis nigri teretiusculi.

Fiscator. 108. F. pedibus fuscis, capite ferrugineo; pennis elongatis,
corpore supra cinereo, subtus ex flavicante pallide albo,
cauda supra dilute fusca, subtus ex cæruleofuscante cinerea.

Faucon pêcheur. Dampier it. 3. p. 318.

Faucon pêcheur de Sénegal ou Tanas. Buffon hist. nat.
des ois. I. p. 275. pl. enlum. p. 478.

Dificillime in hoc genere pluribusque aliis definiendi limites specierum & varietatum
cum ætas, sexus, clima, vite genus, generatio hybrida pennarum ipsiusque
çræ colorem mutet.

Fishing Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 95. n. 80.*

Habitat in terra Senegal, piscibus viditans, quos non integros deglutit.

Rostrum iridesque flavæ; margo pennarum superiorum ex ferrugineo fuscus; inferiorum medium macula fusca.

badius. 109. F. pedibus pallidis, capite & corpore supra fusco, subtus albo, lunulis flavis, cauda dilute fusca, lineis 4 obscurioribus.

Brown Hawk. Brown. *Illustr. p. 6. t. 3. Lath. syn. I. I. p. 96. n. 81.*

Habitat in Zeylon, 13 pollices longus.

Rostrum cæruleum, apice nigro; irides flavæ; testrices alarum margine albo; humeri maculis albis; unguis nigri.

aquili- 110. F. cera pedibusque flavis, corpore supra cæruleo, subtus ex rubicundo albo, collo ex purpurascente rufo.

Petit Aigle d'Amérique. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 142. pl. enlum. n. 417.*

Red-throated Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 97. n. 82.*

Habitat in America australi, 16-18 pollices longus.

Rostrum cæruleum; orbitæ flavæ; irides aurantiae; unguis nigri.

fuscus, III. F. cera cinerea, pedibus flavis, corpore nigro-undulato, supra ex cinereo fusco, subtus albicante. *I. F. Miller illustr. t. XVIII.*

American. brown Hawk. *Lath. syn. I. I. p. 98. n. 84.*

Habitat in America, Nisi magnitudine & facie; rostrum dilute plumbeum; vertex & latera capitis striis longitudinalibus albis; abdomen ex rufescente fuscis, in femina numerosioribus; cauda ex cinereo fusca, striis tribus transversis obscure fuscis, apice pallido; unguis nigri.

Nisus. 31. F. cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus. *Fn. succ. 68. Scop. ann. I. p. 17.*

Accipiter. *Briss. orn. p. 89. n. 1.*

Accipiter fringillarius. *Gesn. av. 51. Aldr. orn. I. p. 344. t. 346. 347. Bell. av. 19. b. Raj. av. 18.*

Moscheutes. *Aldr. orn. 345.*

Epervier. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 225. t. II. planch. enlum. n. 412. 466. 467.*

Sparrow Hawk. *Brit zool. n. 62. Arct. zool. 2. p. 226. N.*

Alb. av. 3. p. 4. t. 4. & I. p. 5. t. 5. Will. orn. p. 86.

Lath. syn. I. I. p. 99. n. 85. Hayes brit. birds. t. III.

Sperber. *Frisch. av. t. 90. 91. 92. Günther Nester u. Eyer. t. 6.*

macula- β . *Accipiter maculatus. Briss. orn. p. 90. A.*
tus. Spotted Sparrowhawk. *Lat. syn. I. I. p. 100. n. 85. A.*

lacteus. γ . *Accipiter corpore toto lacteo unicolo. White Sparrow Hawk. Lath. syn. I. I. p. 100. n. 85. B.*
Habitat in Europa, etiam maxime boreali, & Madera, audax, gallinis, perdricibus, columbis passeribusque maxime infestus; venatur egregie alaudas; hinc ejus usus in aucupiis.

Mas 12, femina 15 pollices longa; rostrum cærulescens; caput, dorsum, testrices alarum, & cauda in aliis ex obscurō cærulecente cinerea, in aliis obscure fusca, pennis margine ferrugineis; mari in colorem columbinum vergentia, β) albo maculata; gula, pectus & abdomen ex albido flava, mari obscuriora, undis obscure fuscis, vel aurantiis, in femina magis abruptis & numerosioribus; in β) fusca, maculis paucis albis; caudæ apex albus, tænia ζ late nigrae, β) subtus alternatim albæ & fuscæ.

dubius. 112. F. cera pedibusque flavis, capite obscuro striis ferrugineis, corpore supra fusco, subtus sordide albo, striis fuscis, cauda obscure cinerea, tæniis 4 nigris.

Dubious Falcon. *Arct. zool. 2. p. 213. n. 112.*

Habitat in Noveboraco & Carolina, Niso valde affinis, 10 pollices longus.

Rostrum obscurum; irides flavæ; testrices claram marginem ferrugineo; remiges primariæ obscure cinereæ, nigro lineatae.

obscu- 113. F. cera pedibusque flavis, occipite & cervice albo maculatis, corpore supra obscure fusco, subtus albido nigro-lineato, cauda obscure fusca fasciata, albo-punctata.

Dusky Falcon. *Arct. zool. 2. p. 213. n. 113.*

Habitat in Noveboraco, præcedente minor.

Rostrum cærulescens; caput obscure fuscum; testrices alarum marginem leviter ferrugineo; remiges primariæ obscuræ; cauda brevis, tæniis 4 obscuris, totidemque angustioribus albis.

colum- 21. F. cera pedibusque luteis, corpore fusco subtus albido, barius. cauda fusca fasciis quatuor linearibus albis.

Accipiter Carolinensis. Briss. orn. p. 110. n. 21.

Février des pigeons. *Buffon hist. nat. des ois. I. p. 238.*
Pigeon Hawk. *Arct. zool. 2. p. 212. n. III. Catesb. Cat. rol. I. p. 3. t. 3. Lath. syn. I. I. p. 101. n. 86.*

*Habitat in America septentrionali, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus,
migratorius, aviculis viaticans.*

*Rostrum albicans, apice nigro; irides luteæ; corpus sub-
tus ex flavicante album, striis fuscis; unguis nigri.*

superci- 22. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, corpore fusco albido
fuscus. undulato, remigibus ferrugineis nigro fasciatis.

Gujana Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 102. n. 87.*

Habitat in Surinamo, Guiana.

Magnitudo *Picæ*; habitus *Nisi*; corpus supra fuscum,
subtus totum etiam in femoribus confertim nigro undu-
latum; remiges secundariæ margine posteriore albido;
cauda nigra, fasciis duabus latis & apice cinereis; crissum
album strigis aliquot nigris; uropygium albo nigroque
varium; supercilia subtus nuda, prominula; lora setis
nigris patentibus; rostrum & unguis nigri; tectrices
alarum inferiores albæ lineolis tenuissimis nigris.

vesperti- 23. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, crasso femoribusque
nus. ferrugineis. *S. G. Gmelin it. I. p. 67. II. p. 163. Leper-
chin it. I. p. 230.*

Ingrian Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 102. n. 88.*

*Habitat in Ingria & omni Russia, etiam Sibiria, Kobet
& Derbnitschok diæsus, vespere & noctu volitans, in
cacumine arborum nidificans, aut picam ex nido expel-
lens; coturnices præsertim yenans.*

Magnitudo columbae; corpus ex fusco cærulescens; venter
ex albo cærulescens; caput fuscum; rostrum flavum,
apice fuscum; rectrices 12 supra & subtus fuscæ; remiges
ex albo cærulecentes; primores 1-7 apice nigricantes;
pedes nudi. *G. de Demidoff.*

vesperti- 114. F. cera, pedibus palpebrisque luteis, femoribus nigris,
noctes. collo, pectore & ventre fuscescens albo-maculatis.
Falck it. 3. p. 329.

*Habitat in Permia, Sibiræ provincia Isettensi & Basch-
kiria, vespertino dimidio minor, ut vix drachma pondus
duarum unciarum superet.*

magni- 115. F. cera pedibusque flavis, corpore supra fuscum, subtus
noctis. albo ferrugineo striato, cauda fasciis nigris & albis.

Épervier à gros bec de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. I.*
p. 237. pl. enlum. n. 464.
Great-billed Falcon. *Lath. syn. I. I. p. 103. n. 89.*
Habitat in Cayenna, Niso major, pedibus tamen brevioribus, rostro longiore & crassiore nigro; irides aurantiæ; pennarum corpus supra, pedibusque tegentium fuscum margo ferrugineus; unguis nigri.

- Subbuteo. 14. F. cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis. *Fn. suec. 59.*
Dendrofalco. Raj. av. p. 14. n. 8. Briss. av. I. p. 375.
Subbuteo. Aldrov. orn. I. p. 374. Alb. av. I. p. 6. t. 6.
Raj. av. p. 15. n. 14.
Hobreau. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 277. t. 17. pl. enlum.*
n. 431. 432.
Hobby. *Brit zool. n. 61. Arct. zool. 2. p. 227. O. Will. orn. p. 83. Lath. syn. I. I. p. 103. n. 90.*
Habitat in Europa & Sibiria, alaudis infestus, quæ cum ita exhorre dicuntur, ut in sinum hominis se recipiant; hinc claudis capiendis olim adhibitus, migratorius 12 pollices longus.
Rostrum caeruleum; orbitæ flavæ; irides castaneæ, rarius flavæ; genæ lunula nigra notatae; rectrices laterales fasciis nigricantibus; unguis nigri.

- Aurantius. 116. F. rostro pedibusque plumbeis, corpore supra obscure fusco lineis angustis albidis decussantibus, gulæ pennis albidis angustis longissimis, jugulo & pectore aurantiis, abdomine caudaque fuscis interrupte striatis.
Orange-breasted Hobby. Lath. syn. I. I. p. 105. n. 91.
Habitat in Surinam, Subbuteonis magnitudine, 15 pollices longus.
Rostrum $\frac{3}{4}$ pollicis longum, basi albicans, cervix, vertex & rectrices alarum uniculares; jugulum maculis rotundatis albis; abdomen lineis coloris bubalini striatum; rectrices caudæ inferiores ferrugineæ; cauda basi versus albo lineata; pedes longi, graciles; unguis nigri.

- Plumbeus. 117. F. cera obscura, pedibus luteis, corpore cinereo, dorso parte superiori ex plumbeo atro, rectricibus intus maculis tribus albis.
Spotted-tailed Hobby. Lath. syn. I. I. p. 106. n. 92.
Habitat in Cayenna, Nisi magnitudine.
Rostrum & unguis nigri; caput collumque cinereum; pedes breves.

Æsalon. 118. F. cera pedibusque flavis, capite ferrugineo, corpore supra ex cærulefcente cinereo, maculis striisque ferrugineis, subtus ex flavicante albo, maculis oblongis.

Æsalon. Briss. orn. p. 111. n. 23.

Æsalon Bellonii & Aldrovandi. Raj. av. p. 15. n. 15.

Merlin. Brit. zool. n. 63. Will. orn. p. 85. t. 3. Latham syn. I. I. p. 106. n. 93.

Kleinster Rothfalk. Frisch. av. t. 89.

noveboracensis. β. Æsalon fronte cinerea, vertice, dorso & tectricibus alarum castaneis, temporum macula triangulari alba nigro marginata, cauda castanea striis transversis nigris, subtus albidis & nigris.

New-York Merlin. Lath. syn. I. I. p. 107. n. 93. A.

caribœa- γ. Æsalon supra rufus, subtus albus, utrinque maculis nigris, rum.

Æsalon Antillarum. Briss. orn. p. 111. n. 24.

Esmerillon Gry Gry. du Tertre hist. nat. des ois. 2. p. 253. Raj. av. p. 19. n. 3.

Falcona- δ. Æsalon habitu subbuteonis, cetera lithofalconi similiors. riorum. Esmerillon des Fauconniers. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 288. t. 19.

Esmerillon. Buff. planch. enlum. n. 468.

Habitat in Europa, β) in Noveboraco, γ) in insulis Caribœis, migratorius, olim venatui adhibitus; 12½, β) 9 pollices longus.

Rostrum magis minusve in cæruleum vergens; irides obscuræ; cauda striis transversis 8-15 alternis obscuris & rubentibus; unguis niger.

Sparre- 20. F. cera lutea, capite fusco, vertice abdomineque rubro, rius, alis cærulefcientibus.

Æsalon carolinensis. Briss. av. I. p. 386. t. 32. f. I.

Falco minor rufescens. Brown. jani. p. 471.

Emerillon de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 291. planch. enlum. n. 465.

Little Hawk. Catesb. Carol. I. p. 5. t. 5.

Little Falcon. Ard. zool. 2. p. 211. n. 110. Latham syn. I. I. p. 110. n. 94.

Habitat in Virginia, Carolina & S. Domingo.

Magnitudo Æsalonis, seminæ paulo major; rostrum & iris des flavescentes; caput ex cærulefcente cinereum; vertex & corpus supra ex aurantio fusca striis transversis nigris, quæ similiter in tectricibus alarum; cauda ex rubro fusca;

nigro-punctata; pedes lutei. Feminae caput cingitur maculis 7 nigricantibus.

domini- 119. F. cera pedibusque luteis, capite cinereo, corpore supra ex rubro fusco, subtus sordide albo; utrinque nigro-maculato, rectricibus 8 intermediis castaneis, versus apicem nigris, apice albis.

Emerillon de S. Domingue. *Briss. ornith.* I. p. 389. n. 26. t. 32. f. 2.

St. Domingo Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. III. n. 95.

Habitat in insula S. Domingo.

Rostrum flavum, apice nigro; irides flavæ; rectrices extimus mari extus & apice albæ, intus castaneæ macula transversa nigra, versus apicem; feminæ extus albæ, maculis 5 nigris, intus castaneæ, secundæ castaneæ prope apicem albidæ, macula nigra; unguis nigri.

Minutus. 32. F. cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, rectricibus fuscis nigro fasciatis.

Accipiter minor. Briss. av. I. p. 315. t. 30. f. 1.

Habitat in Melita, magnitudine turdi, 11½ pollices longus. Rostrum & unguis nigri; corpus supra fuscum, rufo varium; subtus striis ex rufo fuscis transversis; pectus aliquando maculis lanceolatis notatum.

Ceruleus- 9. F. cera, palpebris, pedibus subtusque luteis, dorso nigro-ceruleo, temporibus linea alba inclusa.

Faucon de Bengale. *Briss. orn. app.* p. 20. n. 38.

Little black and orange Indian Hawk. *Edw. av.* 108. t. 108. Bengal Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 112. n. 97.

Habitat in Bengala, minimus sui generis, neque ultra 6½ pollices longus.

Rostrum nigricans; synciput candidum; area oculorum nuda, flava; genæ albæ, linea nigra; cauda nigra; rectrices 2 intermediae unicolores; reliquæ intus striis transversis albis; unguis nigricans.

regulus. 120. F. cera virescente, pedibus obscure flavis, torque ferrugineo, corpore supra plumbeo, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis. *Pall. it.* 2. p. 707.

Siberian Falcon. *Lath. syn.* I. I. p. 113. n. 98.

Habitat, rarius tamen, in Siberia, alaudis viicitans, precedente minor, ut vix semilibram pondere aquet; rostrum & habitu Tinnunculi.

Irides fuscæ ; vertex fuscus, lineis nigricantibus ; alarum margo albus, subtus varius ; rectrices versus apicem plumbeæ, fasciis subtus obsoletis, margine nigro, apice albo.

43. STRIX. Rostrum aduncum (absque cera).

Nares oblongæ pennis setaceis recumbentibus obiectæ.

Caput grande; auribus oculisque magnis.
Lingua bifida.

* Auriculatæ, pennis auricularum instar existantium.

Bubo.

1. St. corpore rufo. Fn. suec. 69. Scop. ann. I. p. 18.

Bubo. Bell. av. 25. a. Gesn. av. 234. Aldr. orn. I. p. 502.
Briss. av. I. p. 477. n. I. Raj. av. p. 24. n. I.

Duc ou Grand Duc. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 322. t.
22. planch. enlum. n. 435.

Great Horn-Owl, or Eagle-owl. Alb. av. 2. p. 9. t. 9.
Will. orn. p. 99. t. 12.

Eagle-owl. Brit. zool. n. 64. t. 29.

Great eared Owl. Lath. syn. I. I. p. 116. n. I.

Schuffut. Frisch. av. t. 93.

β. Bubo atheniensis.

Bubo italicus. Briss. orn. p. 140. n. I. A.

Black winged Horn-owl. Alb. av. 3. t. 6.

Eagle-owl. Will. orn. p. 99. n. 2.

Great-horned Owl from Athens. Edw. av. 37. t. 227.

γ. Bubo pedibus audis. Briss. orn. p. 141. n. I. B.

Great Horn-Owl. Will. orn. p. 100. n. 3.

δ. Bubo magellanicus.

Jacurutu. Marcgr. bras. p. 199.

Hibou des terres magellaniques. Buff. pl. enlum. n. 385.

Habitat in Europæ, etiam Calmucciæ, δ) in America australis ruderibus, montibus, cavernis, rupibus. Minervæ avis, unde noctuas Athenas mittere; venatur lepores, cuniculos, talpas, rattos, mures, rarius vespertiliones & amphibia.

Magnitudo aquilæ; irides flavæ; caput corpusque lineis & maculis nigris, fuscis, cinereis, ferrugineis eleganter varium; alæ longæ; cauda brevis, lineis transversis obscuris; pedes testacei, (excepto γ) ad digitos pennati; unguis magni, valde adunci, obscuri.

Virginia- 13. St. corpore supra fusco lineis subtilibus rufis cinereisque na. vario, subtus pallide cinereo, striis transversis fuscis, jugulo & lateribus pectoris ex aurantio fuscis striatis.
Bubo virginianus. Briss. orn. p. 141. n. 2.
Horned Owl. Ellis Hudson'sb. p. 40. t. 2.
Great horned Owl from Virginia. Edw. av. 2. t. 60.
Eagle Owl. Arct. zool. 2. p. 228. n. 114.
Virginian Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 119. n. 2.
Habitat in omni America, in Astracania ad Camischatcam usque, & polo arctico proprius; noctu vocem edens ingratismanu, funestum Americae inquiline omen.
Bubone paulo minor; an ejus varietas? Pennae auricularum magna; rostrum nigrum; irides aureæ; alæ & cauda tæniis fuscis; pedes ad digitos usque plumis cinereis vestiti; unguis cornet.

Scandia- ea. 2. St. corpore albido. *Fn. suec. 70.*
Bubo lapponicus. Briss. orn. p. 142. n. 3.
Scandinavian Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 120. n. 3.
Habitat in alpibus Lapponiae; magnitudine gallopavonis, nigris maculis insignita; an pariter varietas Bubonis?

Zeylo- nenfis. 14. St. corpore supra ex rufescente fusco, subtus ex flavicante albo, circulis faciei ex rufescente fuscis, nigro-striatis.
Ceylonese Eagle Owl. Lath. syn. I. I. p. 120. n. 4.
Great Ceylonese Horned-owl. Brown's illustr. zool. p. 8. t. 4.
Habitat in insula Zeylan, 11 pollicibus pedem longitudine superans.
Rostrum corneum; irides flavæ; auriculæ breves, acutæ; remiges primores & cauda lineis transversis nigris, albis & pallide rufis; pedes seminudi.

Afro. 3. St. corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis quinque albis.
Scops carolinienfis. Briss. av. I. p. 497.
Little Owl. Catesb. Carol. I. p. 7. t. 7.

Strix differt a falcone, ut phalæna a papilione; altera enim diurna altera nocturna est. Noctu pleræque prædantur aviculis, muribus, vespertilionibus; petes plerisque lanati, ne frigescant, digito excuso retrosum tradili; aures amplæ, membrana vestita, qua retrotracta tubam Eustachianam auris humanæ simulat; oculi magni noctu lucentes, ut tum acutius videant; die pleræque cœcutiunt, passibus opprimo exposita; remigum exteriorum una alterare serrata; unguis uncinati, acuti.

Red Owl. Arct. zool. 2. p. 231. n. 117. t. XI.

Red Eared Owl. Lath. syn. I. I. p. 123. n. 8.

Habitat in Noveboraco ad Carolinam usque, 10¹ pollices longa.

Corpus supra striis, subtus maculis nigris oblongis; remiges primariae lineis nigris, rufis & albis; cauda rufa, obscure lineata; pedes ad ungues usque pennati.

mexica- 15. St. corpore ex fusco & nigro vario.

na. Afio mexicanus. Briff. orn. p. 146. n. 9.

Tecolotl. Raj. av. p. 160.

Mexican Eared Owl. Lath. syn. I. I. p. 123. n. 7.

Habitat in nova Hispania. Oculi magni aurei.

america- 16. St. capite & corpore supra cinereo, subtus ferrugineo,

na. uropygio albo, nigro maculato, alis caudaque ferruginea lineis transversis cinereis & griseis.

Afio americanus. Briff. orn. p. 145. n. 7.

Bubo ocro-cinereus pectore maculoso. Feuill. journ. des obs. ed. 1725. p. 59.

Habitat in America australi, Oti magnitudine, an ejus varietas?

Rostrum luteum; irides aureæ; orbitæ cinereæ; pedes flavi; ungues nigri.

Otus. 4. St. auricularum pennis Senis. Fn. suec. 71. Scop. ann. I. p. 18.

Afio. Briff. av. I. p. 486.

Otus f. Afio. Bell. av. 25. 6. Gesn. av. 223. Alar. orn. I. p. 525. Raj. av. 25.

Hibou, appelé Canot. Charlev. nouv. Fr. 3. p. 5. 6.

Moyen Duc ou le Hibon. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 342. t. 22. pl. enlum. 29.

Horn-owl. Will. orn. p. 100. Albin. av. 2. t. 10.

Long-eared Owl. Brit. zool. n. 65. Arct. zool. 2. p. 229. n. 115. Lath. syn. I. I. p. 121. n. 5.

Rothes Kaeuzlein. Frisch. av. t. 99.

Habitat in America, Europa, Asia borealibus, ad Astracaniam usque, & in ipsa Ægypto, valde sonora, non migratoria, in arboribus nudificans, & ova 4 alba Aprili ponens.

Pennæ auricularum longissimæ flavæ & nigrae; irides flavæ; dorsum testricesque alarum obscure fusca, grisea & ex flavicante ferruginea; pectus & abdomen pallide flava striata; cauda cinereo & obscurius lineata. Longitudo 14 pollicum.

17. St.

- brachyo- 17. St. auricularum penna brevi, corpore supra fusco, pennis
margine flavis, subtus pallide flavo, longitudinaliter
striato. *Forster act. angl.* LXII. p. 384. n. 2.
Short-eared Owl. *Brit. zool.* n. 66. t. 31. *Arct. zool.* 2.
p. 229. n. 116. *Lath. syn.* I. I. p. 124. n. 9.
Chouette ou grande Chevêche. *Buff. hist. nat. des ois.* I.
p. 372. t. 27. pl. enlum. n. 438.
Habitat in America & Europa, potissimum boreali, Sibiria,
14 pollices longa, muribus vicitans, quibus invigilat,
audax. Cauda obscure fusca; rectrices intermediae
circulo flavo.
- brasilia- 18. St. corpore supra pallide ex ferrugineo fusco albo ma-
culato, subtus albido maculis ex ferrugineo fuscis.
Afio brasiliensis. *Briss. orn.* p. 145. n. 8.
Cabure ou Caboure. *Will. orn.* p. 107. n. 8. *Buffon hist.*
nat. des ois. I. p. 383.
Noctua Brasiliensis Cabure dicta. *Raj. av.* p. 26. n. 7.
Brazilian Eared owl. *Lath. syn.* I. I. p. 125. n. 10.
Habitat in Brasilia, turdi magnitudine; rostrum, irides,
pedes breves cum digitis flavicant.
- nævia. 19. St. corpore griseo, subtus pallidiore, utrinque maculis
ferrugineis & nigris, capitis pectorisque pennis nigro-
punctatis.
Mottled Owl. *Arct. zool.* 2. p. 231. n. 118. t. XI. *Lath.*
syn. I. I. p. 126. n. 11.
Habitat in Noveboraco, Majo pariens, 11 pollices longa.
Facies alba, fusco maculata; humeri tectricesque alarum
maculis magnis albis.
- indica. 20. St. dorso obscuro, tectricibus alarum griseis nigro lineatis,
pestore bubalino, maculis exiguis sagittatis nigris.
Little Hawk Owl of Ceylon. *Penn. ind. zool.* t. 3.
Indian Eared Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 127. n. 12.
Habitat in insula Zeylon, 7 pollices longa.
Rostrum obscurum, setis longis cinatum; caput obscure
fuscum; orbitæ pallide cinereæ; pedes seminudi, subtus
ex rufescente flavi.
- Zorza. 21. St. auricularum pennis 8-9. *Cetti ucc. di Sardegna.* p. 60.
Habitat in Italia, Sardinia, solitaria, non migrans, 7
pollices longa, ululans.
Rostrum ex virescente flavi; digitæ nudi.

- carnioli- 22. St. corpore ex cinereo albicante, maculis striisque transversis nigris tantibus variegato. *Scop. ann. I. p. 19.*
ca.
- Strix capite subauritio, corpore ex nigro, albo & fusco tenuissime undulatim mixtis variegato. *Kramer elench. p. 323. n. 3.*
- Habitat in silvis Carnioliae frigidioris, in rupium fissuris cavisque arboribus nidificans, ova alba 4-2 ponens; pulli scarabeo maja li nutriuntur.
- Habitus passerinus; auriculae in cadavere vix conspicuae; irides flavae; cauda fuscescens maculata; remiges primae uno latere albido maculatae.
- deminu- 23. St. minor, corpore rufo. *Pall. it. 2. p. 707. n. 14.*
ta. Yaickan Eagle Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 128. n. 14.*
- Habitat in lucis campestribus & montanis ad fluvium montesque Uralenses; buboni colore strigulaque similis, ast multo minor, ut vix libram pondere aquet.
- pulchella. 24. St. minima, corpore toto griseo, fusco, ferrugineo alboque vario. *Pall. it. 1. p. 466. nov. comm. Petrop. XV. p. 490. t. XXVI. f. 1. Lepech. it. 2. t. 4.*
- Siberian eared Owl. *Lath. syn. I. 1. p. 130. n. 16. t. 5. f. 1.*
- Habitat circa Catharinopolin Sibiriae, & reliquo australi Wolgae littore; ultra 9 pollices longa.
- Rostrum, pedes, unguesque sordidi; irides flavae; dorsum sordide cinereum; alae maculis albis oblongis; cauda rufescens, fasciis & punctulis fuscis.
- Scops. 5. St. auricularum penna solitaria.
- Scops. *Briff. av. I. p. 495. t. 37. f. 1. Aldr. orn. I. 8. c. 4.*
Raj. av. p. 25. n. 3. Lath. syn. I. 1. p. 129. n. 15.
- Scops ou petit Duc. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 353. t. 24. pl. enlum. n. 436.*
- Little Horn-owl. *Will. orn. p. 101. t. 12.*
- Horn-oder Ohreule. *Günth. Neft. u. Eyer, t. 40.*
- Habitat in Europa, ex Anglia tamen exul, $7\frac{1}{4}$ pollices longa, cum muribus agrestibus aliquando bella gerens.
- Auricularum pennae a morte vix conspicue; color proactute multum variat, ex griseo, rufo, fusco & nigricante mixtus; pedes pariter fusco-maculati; digitii unguesque fusi.

* * non auriculatae.

- Nyctea. 25. St. corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis. *Fa. suec.* 76. *Scop. ann.* I. p. 20.
Strix alba freti Hudsonis. Briss. av. I. p. 522.
Hibou blanc d'Islande. Anders. hist. I. p. 85. t. I.
Harfang. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 387. *planch. enlum.* n. 458.
Great white Owl. Edw. av. 61. t. 61.
Snowy Owl. Arct. zool. 2. p. 233. n. 121. *Lath. syn.* I. I. p. 132. n. 17.
Habitat in America, Europa, Asia, potissimum borealibus, interdiu volando velocissime ardeas venatur, lepores, mures, aliquando cadaveribus contenta ululans, buboni fere aequalis, bipedalis.
Hyeme evadit saepius inimaculata nivea.
- Teng-
malmi. 44. St. corpore griseo, maculis pisiformibus albis, iridibus flavis. *Tengmalmi act. Stockh. ann.* 1783. *trim.* I.
Habitat in Uplandia Sueciæ, merulæ magnitudine.
- nebulosa. 25. St. capite, collo, pectore, dorso & testricibus alatum fuscis albo-maculatis, abdomine & criso sordide albis fuscostriatis, cauda fuso & albido fasciata, apice albida. *Forster act. angl.* LXII. p. 424.
Grey Owl. Ad. angl. LXII. p. 386.
Barred Owl. Arct. zool. 2. p. 234. n. 122. t. XI. *Latham syn.* I. I. p. 133. n. 18.
Habitat in freto Hudsonis & Noveboraco, leporibus, ardeis, muribus viditans, bipedalis; rostro iridibusque flavis.
- cinerea. 26. St. capite, cervice, & testricibus alarum fuliginosis, lineis sordide albis, pectore & abdomine albidis, maculis magnis oblongis obscure fuscis.
Sooty Owl. Arct. zool. 2. p. 232. n. 120.
Cinereous Owl. Lath. syn. I. I. p. 134. n. 19.
Habitat in freto Hudsonis, per paria volens, muribus & leporibus viditans, Maji medio in pinu nidificans, & ova 2 obscure maculata ponens; bipedali.
Rostrum albidum; irides flavæ; cauda striis obliquis fuscis & sordide albis; pars cutis a gula ad crizum denudata.
- Wapacu-
thu. 27. St. dorso & testricibus caudæ albis, obscure maculatis, pectore & abdomine sordide albis, lineis rufescensibus decussantibus. *Arct. zool.* 2. p. 231. n. 119.

AVES ACCIPITRES. Strix.

*Habitat in silvis circa fretum Hudsonis, esculenta, muri-
bus & aviculis viditans, in terra secca ex musco nidum
struens, bipedalis.*

*Junior albet; rostrum & unguis nigra, incurvata; irides
flavæ; spatium inter oculos, genas & gularis album;
capitis pennarum apex niger; humeri & tectrices ala-
rum albent, maculis rufescentibus.*

cunicula- 28. St. corpore supra fusco subtus albo, pedibus tuberculatis
ria. pilosis. *Molina hist. nat. Chil. p. 233. Klein av. p. 57.
n. 9. Feuill. obs. phys. ed. 1714. p. 562.*

Noctua coquimbana. *Briss. orn. p. 155. n. 11.
Coquimbo Owl. Lath. syn. I. I. p. 145. n. 33.*

*Habitat in Chili, interdiu aliquando cum femina volans,
insectis & amphibiis viditans, ova 4 alba flavoque va-
ria in cuniculos longos ponens, columbae magnitudine.
Irides flavæ; corpus supra albo-maculatum.*

Aluco. 7. St. capite ferrugineo, iridibus atris, remigibus primo-
ribus serratis. *It. ocl. 69. Scop. ann. I. p. 20. n. 4.
Tengmalm nov. act. Stockh. ann. 1782. 2. n. 8.*

Strix cinerea. Raj. av. p. 26. n. 3.

*Ulula. Gesn. av. 773. Aldr. orn. I. p. 540. Briss. av. I.
p. 507.*

*Hulotte. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 358. pl. enlum. n. 44^I.
Aldrovandus former Aluco. Will. orn. p. 104. t. 13.*

Aluco Owl. Lath. syn. I. I. p. 134. n. 20.

Grabeule. Frisch. av. t. 94.

*Habitat in Europa, Calmuccis sacra, aestate in silvarum
arboribus cavis, hieme hominum habitationes accedens,
viditans muribus, ova 4 sordide grisea in nudo buteonis,
tinnunculi, cornicis, picæ ponens.*

*Longitudo 15 pollicum; rostrum ex flavicante album aut
virens; corpus supra obscure ferrugineum maculis nigris
& albidis; subtus album, maculis nigris transversis &
longitudinalibus; pedes albi, maculis exiguis nigris.*

sylvestris. 29. St. capillitio eleganti, iridibus glaucis, corpore albo
fuscoque vario. *Scop. ann. I. p. 21. n. 13.*

Austrian Owl. Lath. syn. I. I. p. 136. n. 21.

*Habitat in Carniola, galli habitu; & mediae magnitudi-
nis; a basi unius auris per frontem transit ad basin al-
terius radius plumosus albicans.*

- alba.* 30. St. corpore supra rufo griseo maculato, subtus albo, remigibus rectricibusque rufis, his apice albis. *Scop. ann.* I. p. 21. n. 14.
White austrian owl. *Lath. syn.* I. I. p. 136. n. 22.
Habitat in Foro Julii, gallinæ fere habitu, rostro albo, capillitii margine rufo.
- Noctua.* 31. St. iridibus fuscis, corpore pallide rufo, maculis fuscis longitudinalibus. *Scop. ann.* I. p. 22. n. 15.
Rufous austrian Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 136. n. 23.
Habitat in Carnioliae silvis, columbae habitu.
- rufa.* 32. St. iridibus cœruleofuscis, corpore ferrugineo fusco-maculato. *Scop. ann.* I. p. 22. n. 16.
Ferruginous austrian Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 137. n. 24.
Habitat in Idriæ silvis, præcedentis habitu.
- solonien-*
fis. 33. St. corpore supra ex atro fusco, fulvo admisto, subtus albo, cauda alba versus apicem lineis nigricantibus decussantibus.
Ulula five noctua minor dorso ferrugineo, ventre albido.
Salerne orn. p. 56.
Solognese Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 137. n. 25.
Habitat in Gallie provincia Solonensi, 15 pollices longa; vertex circulusque pennarum faciei exterior rufo alboque varius; digitæ cornei.
- flammea.* 8. St. corpore luteo punctis albis, subtus albido punctis nigricantibus.
Strix capite lavi, corpore luteo. *Fn. suec.* 73.
Aluco. Briss. orn. p. 147. n. 2.
Aluco minor. Aldrov. orn. I. p. 536. 538. *Raj. av.* p. 25.
A. I. Brünn. orn. 17.
Ululæ genus alterum. Gesn. av. 775.
Tuidara. Marcgr. bras. p. 205.
Fëraie ou Fresaie. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 366. t. 26.
planch. enlum. n. 440. 474.
Common Barn or White Owl. Will. orn. p. 104. t. 13.
White Owl. Brit. zool. n. 67. *Arct. zool.* 2. p. 235. n. 124.
Albin. av. 2. t. 11. Lath. syn. I. I. p. 138. n. 26.
Schlaefereule, Perleule. Frisch. av. t. 97.
Habitat in Europa & America, borealiceri quoque Asia, Mongolia sacra, 14 pollices longa; rostrum album; irides obscuræ; rectrices intus albæ, extus obscure lineatae.

Stridula. 9. St. corpore ferrugineo, remige tertia longiore. *Fn. suec.* 77. *Scop. ann.* I. p. 22. n. 12.

Strix. *Gesn. av.* 738. *Aldrov. orn.* 561. t. 563. *Raj. av.* p. 25. *Briss. av.* I. p. 500.

Chat huant. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 362. t. 25. *planch. enlum.* 437.

Brown Owl. *Albin. av.* I. t. 9.

Common brown or Joy Owl. *Will. orn.* p. 102. t. 14. *Tawny Owl.* *Brit. zool.* n. 68. *Arct. zool.* 2. p. 237. *B. Lath. syn.* I. I. p. 139. n. 27.

Braune oder Stockeule, gelbliche oder braune Eule. *Frisch. av.* t. 96. 95.

Habitat in Europæ & Tatariae australioris desertis, 19 uncias ponderans.

Caput ferrugineum, cum reliquo corpore supra maculis punctisque obscurioribus; pectus & abdomen flavicant, albo intermixto, subtus striis obscuris; cauda maculis lineisque pallide ferrugineis & nigris.

Ulula. 10. St. corpore supra fusco albo-maculato, rectricibus fasciis linearibus albis. *Fn. Suec.* 78. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 33. 34.

Noctua major. *Briss. av.* I. p. 511.

Noctua saxatilis. *Gesn. av.* 622. *Aldr. orn.* I. p. 545. *Chouette ou grande Chevêche.* *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 372. t. 27. *planch. enlum.* 438.

Grey Owl. *Will. orn.* p. 103.

Great brown Owl. *Alb. av.* 3. t. 7.

Brown Owl. *Brit. zool.* n. 69. *Arct. zool.* p. 236. n. 125. *Lath. syn.* I. I. p. 140. n. 28.

Steincule. *Frisch. av.* t. 98.

β. *Noctua minor aucuparia.* *Nozem. nederl. Vogel.* t. 37.

Habitat in Europa & nova terra, 14 pollices longa.

Irides castaneæ; caput, alæ & dorsum maculis nigris, humeri rectricesque alurum albis; pectus pallide cinereum, striis obscuris.

funerea. II. St. corpore fusco, iridibus flavis. *Fn. suec.* 75.

Chat huant de Canada. *Briss. orn.* I. p. 518. n. 6. t. 37. f. 2.

Chouette ou grande Chevêche de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 391. n. 5.

Canada Owl. *Lath. syn.* I. I. p. 142. n. 29.

Habitat in Europa & America septentrionali.

Corpus supra fuscum, maculis albis; caput supra atrum punctis albis; rostrum supra album; pectus & abdomen albida fasciis linearibus transversis; remiges 5 primiores interiores ad marginem exteriorem non maculatae; rectrices fasciis angustis albidis; intermediis viz apice albetibus.

hudsonia. 34. St. corporis pennis supra fuscis margine albis, subtus albis, lineis transversis nigris, rostro iridibusque aurantiis.

Strix freti Hudsonis. *Briss. orn. p. 151. n. 7.*

Caparacoch. *Euff. hist. nat. des ois. I. p. 385. n. 2.*

Little Hawk Owl. *Edw. av. 2. t. 62.*

Hawk Owl. *Ard. zool. 2. p. 234. n. 123. Lath. syn. I. I. p. 143. n. 30.*

Habitat in freto Hudsonis, interdiu prædans, Niso vix major.

Vertex fuscus albo maculatus; facies alba, fuscointermisto, nigro marginata; uropygium fuscum, fasciis pallidis; cauda alæque longæ; an varietas funereæ?

uralensis. 35. St. corpore albido, maculis in singulatum pennarum medio longitudinalibus fuscis. *Lepech. it. 2. t. 3. Pall. it. I. p. 455.*

Chouette à longue queue de Sibirie. *Buff. planch. enl. 463.*

Ural Owl. *Lath. syn. I. I. p. 148. n. 37.*

Habitat in montibus Uralentibus.

Rostrum cereum; irides palpebræque nigrae; orbitæ cinereæ; uropygium album; cauda longa, cuneiformis; an varietas funereæ?

accipitri- 36. St. corpore supra lutescente, subtus ex lutescente albo, na. lituris utrinque longitudinalibus nigricantibus subtus guttatis, iridibus citrinis. *Pall. it. I. p. 455. n. 6. S. G. Gmelin it. 2. p. 163. t. 9.*

Caspian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 147. n. 36.*

Habitat ad mare Caspium, ululæ magnitudine.

Rostrum nigrum; alæ juba & crissum alba; remiges extus lutescentes, intus albae, nigro tessellatæ; cauda alia brevior rotundata, nigricans, lateribus albida, fasciata. An varietas funereæ?

javanica. 37. St. corpore cinereo hinc inde rufescente, maculis albis & nigris, subtus sorde albo hinc inde rufescente, maculis nigris. *de Wurm apud Lichtenberg Magaz. IV. 2. 10.*

Habitat in Java.

- novæ 38. St. iridibus flavis , corpore supra fusco albo-maculato ,
Seelan- subtus fulvo.
diæ. New Zealand Owl. *Lath. syn. I. I. p. 149. n. 39.*
Habitat in nova Seelandia, passerinæ magnitudine; rostro
corneo apice nigro. Forster.
- cayen- 39. St. corpore rufo striato , transversim fusco undulato ,
nenfis. iridibus flavis.
Chat huant de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 39¹.*
pl. enlum. n. 442.
Cayenne Owl. *Lath. syn. I. I. p. 146. n. 35.*
Habitat in Cayenna, magnitudine stridula; rostrum
corneum; ungues nigri.
- domini- 40. St. corpore subtus rufo , pectori parumper maculato.
censis. Chouette ou grande Chevêche de S. Domingue. *Buff. hist.*
nat. des ois. I. p. 392. n. 6.
S. Domingo Owl. *Lath. syn. I. I. p. 146. n. 34.*
Habitat in insula S. Dominici, ululæ perquam affinis,
rostro tamen majore, robustiore, magis adunco distincta.
- Tolchi- 41. St. iridibus pallide flavis , corpore supra nigro , pallide
quatli. flavo , albo , & fulvo vario , subtus albo.
Chouette du Mexique. *Briss. orn. I. p. 524. n. 10.*
Tolchiquatli. *Raj. av. p. 160.*
New Spain Owl. *Lath. syn. I. I. p. 145. n. 32.*
Habitat in nova Hispania.
Rostrum, ungues, tectrices alarum inferiores nigra.
- Chichic- 42. St. corpore fulvo , albo fusco & nigro vario , oculis nigris,
tli. palpebris cæruleis.
Chat huant du Mexique. *Briss. orn. I. p. 523. n. 9.*
Chichictli. *Raj. av. p. 160.*
Mexican Owl. *Lath. syn. I. I. p. 144. n. 31.*
Habitat in nova Hispania, gallinæ magnitudine.
- acadica. 43. St. corpore supra spadiceo albo-maculato , subtus sordide
albo ferrugineo intermixto.
Acadian Owl. *Lath. syn. I. I. p. 149. n. 38. t. V. f. 2.*
Habitat in America septentrionali, 7 pollices longa.
Rostrum fuscum ; irides flavæ ; vertex pallide maculatus ;
orbitæ cinereæ ; digiti fusi.
- passerina. 12. St. remigibus maculis albis quinque ordinum. *Fn. suec. 79.*
Scop. ann. I. p. 22. n. 17.
Noctua minor. *Briss. av. I. p. 514. Raj. av. p. 26. n. 6.*

Noctua minima. *Gesn. av. 620. Aldrov. orn. I. p. 543.*
t. 544.

Chevêche ou petite Chouette. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 377. t. 28. planch. enlum. n. 439.*

Little Owl. *Brit. zool. n. 70. Ard. zool. 2. p. 236. n. 126. Albin. av. 2. t. 12. Will. orn. p. 105. t. 13. Edw. av. 39. t. 228. Lath. syn. I. I. p. 150. n. 40.*

Kleinste Kaeuzlein. *Frisch. av. t. 100.*

B. Noctua minor. *S. G. Gmelin nov. comm. Petrop. XV. p. 447. t. XII.*

Habitat in Europa & boreali America, solitaria, viditans vespertilionibus, muribus, gryllis, in coniferis nidificans, ova bina ponens, 7-8 pollices, β. fere pedem longa.

Rostrum ex albicante fuscum; caput, dorsum, testricelique alarum dilute fusca maculis albis; pectus albicans, ferrugineo varium.

44. LANIUS. *Rostrum rectiusculum, dente utrinque versus apicem, basi nudum.*

Lingua lacera.

forficatus. 1. *L. cauda forficata, crista frontali erecta, corpore nigro-viridante.*

Drongo. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 586.

Gobe-mouche huppé de Madagascar. Buff. planch. enlum. n. 189.

Muscicapa madagascariensis nigra major cristata. Briss. av. 2. p. 383. n. 16. t. 37. f. 4.

Fork-tailed crested Shrike. Lath. syn. I. I. p. 158. n. 1. Habitat in Capite bonæ spei, Madagascar, Sina, non semper cristata, 10 pollices longa; cauda longa.

cæruleus. 2. *L. cauda forficata, corpore nigro-cærulecente, abdomine albo.*

Lanius bengalensis, cauda bifurca. Briss. av. 2. p. 89.

Fingah. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 108.

Fork-tailed Indian Butcher-Bird. Edw. av. t. 56.

Fork-tailed Shrike. Lath. syn. I. I. p. 158. n. 2.

Habitat in Bengala, cornices persequens, 7½ pollices longus. Pectus obscure cinereum.

castaneus. 3. *L. cauda cuneiformi, rectricibus intermediis apice, extimis totis ferrugineis, corpore supra castaneo, subtus albo.*

Chernut backed Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 159. n. 3.
Longitudo 11 *pollicum*; rostrum, alæ, pedesque *nigra*;
frons ex aro fusca; vertex, occiput, nucha, *cervix cinerea*.

cristatus. 3. L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente
 subtus fulvo fuscoque undulato.

Lanius bengalensis rufus. *Briss. av.* 2. p. 173.

Crested red or rousset-coloured Butcher bird. *Edw. av.*
 t. 54.

Crested red Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 134. n. 18.

Habitat in Bengala, 6½ pollices longus, non semper cristatus.
Rostrum cornuum; *pone oculos lunula nigra*; *cauda supra rufa*, *subtus grisea*; *pedes cum unguibus nigri*.

canaden- 4. L. cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente
 fisi. subtus albido.

Lanius canadensis. *Briss. av.* 2. p. 171. t. 18. f. 3.

Pie-griesche huppé de Canada. *Buff. hist. nat. des ois.* I.
 p. 316. pl. enlum. n. 479. f. 2.

Crested Shrike. *Arđ. zool.* 2. p. 239. n. 129. *Lath. syn.*
 I. I. p. 182. n. 35.

Habitat in Canada, 6½ pollices longus; rostrum unguisque
nigri; crista rubens; genæ obscuræ, maculis albis;
jugulum pectusque ex flavicante rubent; abdomen *cinereum*;
rectrices alarum nigrae margine albo, cauda *nigra*,
albo-punctata.

Ludovi- 6. L. cauda cuneiformi cinereus, remigibus nigris basi rectri-
 cianus. cibusque apice albis.

Lanius canadensis. *Briss. av.* 2. p. 162. t. 15. f. 2.

Pie-griesche de la Louisiane. *Buff. planch. enlum.* n. 397.
 Louihane Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 162. n. 5.

Habitat in Ludovicia, excubitori & collurioni affinis.
Fascia sub oculis nigra; rectrices medie 6, 6 totæ *nigrae*,
reliquæ basi apiceque albæ; remiges secundarizæ apice
albæ.

Nengeta. 7. L. cauda cuneiformi apice alba, corpore cinereo subtus
 albido.

Cotinga cinerea. *Briss. av.* 2. p. 353.

Laniis accedunt ad accipitres laniana, ad picos moribus, ad passerem statuta, adeo-
que tanquam inter hos medii; digitus medius articulo primo connexus.

Guiraru Nhengeta. *Marcgr. Brasil.* 209.
Guiraru Nheengeta brasiliensis. *Raj. av. p.* 166. n. 5.

Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 459.

Guirarou or american Chat. *Will. orn. t.* 235.

Grey Pye of Brasil. *Edw. av. t.* 318.

Grey Shrike. *Lath. syn. I. I. p.* 183. n. 36.

β . Cotinga gris de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* 699.

Variété du Guirarou. *Buff. hist. nat. des ois.* 4. p. 461.

Habitat in Brasiliæ, Surinami, Gujanæ, Russiæ, Sibiræ potissimum aquosæ gregarius, 9 pollices longus. Irides sapphirinæ; alæ & cauda nigricant.

curvirostris. 8. L. cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigibus primoribus quinque macula alba.

Collurio madagascariensis. *Briff. av. 2. p.* 191. t. 19. f. I.

Ecorcheur de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 228.

Vanga ou Becarde à ventre blanc. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 312.

Hookbilled Shrike. *Lath. syn. I. I. p.* 171. n. 19.

Habitat in Madagascar, fructibus vicitans, 10 pollices longus. Mandibula inferioris apex reflexus, uti superioris; occiput ex nigro virescens; testrices olarum majores oblique albo punctatae. Rectrices medietate interiore cinereæ, exteriore nigrae, apice albo; pedes plumbei; unguis rigorantes.

collaris. 9. L. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, remigibus primoribus basi albis.

Lanius Capitis bonæ spei, *Briff. av. 2. p.* 182. t. 15. f. I.
Pie-grièche du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum.* n. 477. f. I.

Collared Shrike. *Lath. syn. I. I. p.* 163. n. 7.

Habitat ad Caput bonæ spei, excubitoris magnitudine, 12. sere pollices longus. Rostrum & caput nigricant; rectrices, intermediis 4 exceptis, apice albæ.

lacionensis. 10. L. cauda cuneiformi, macula aurium nigra, rectricibus rufescens apice fusco-fasciatis.

Lanius lucionensis. *Briff. av. 2. p.* 169. t. 18. f. I.

Luzonian Shrike. *Lath. syn. I. I. p.* 172. n. 21.

Habitat in insula Luzonia, 7½ pollices longus.

Rostrum & corpus supra ex griseo fuscum, subtus & ad latera ex rufescente album lineatum.

- Exeubitor. II. L. cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. *Fn. succ.* 80. *Scop. ann.* I. p. 23. n. 18. *Brünnich orn.* 21. 22. *Nozeman nederl.* *Vog.* t. 63. *Lanius cinereus.* *Briss. av.* 2. p. 141. *Lanius cinereus major.* *Gesn. av.* 579. *Aldr. orn.* I. p. 384. t. 386. *Raj. av.* 18. *Ampelis cærulescens*, alis caudaque nigricantibus. *Fn. succ.* I. n. 181. *Castrica palombina.* *Olin. uccell.* t. 41. *Pie-griesche grise.* *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 296. t. 20. *pl. enlum.* 445. *Greater Butcher-bird or Mattages.* *Will. orn.* p. 87. t. 10. *Albin. av.* 2. t. 13. *Great Shrike.* *Brit. zool.* I. n. 71. t. 33. *Ard. zool.* 2. p. 238. n. 127. *Catesb. Carol. app.* p. 36. *Great cinereous Shrike.* *Lath. syn.* I. I. p. 160. n. 4. *Neuntoeder.* *Brisch. av.* t. 60. *albus.* *β.* L. corpore albo, pedibus flavicantibus, rostro unguibusque nigricantibus. *major.* *γ.* L. teætricibus alarum minoribus, humerisque rufescitibus. *Lanius cinereus major.* *Briss. orn.* p. 198. n. 2. *Gesner's great Butcher-bird.* *Will. orn.* p. 83. *Groeser Neuntoeder.* *Frisch. av.* t. 59. *Habitat in Europa & boreali America, in silvis, inter primas veris aves; nidum ex gramine sicco & plumis frustis, 7 ova cærulecentia fusco-maculata ponit; prædam transfigit; accipitres adventantes observat, & aviculis indicare dicitur.* *Rostrum pedesque nigra; vertex cum cervice canus; genæ albæ, linea nigra; corpus subtus album, arcubus pallide fuscis; teætrices alarum minores nigrae; rectrices nigrae &, exceptis intermedius 2, apice albo.* *Collurio.* 12. L. cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo. *Fn. succ.* 81. *Scop. ann.* I. p. 24. n. 19. *Nozemi. nederl.* *Vogel.* t. 65. *Günther Nest. u. Eyer.* t. 23. *Lanius minor rufus seu 3ius Aldrovandi.* *Raj. av.* p. 18. A. 4. *Merulae congener alia.* *Raj. av.* p. 67. n. 13. *Will. orn.* p. 195. n. 3. *Collurio.* *Briss. av.* 2. p. 152. *Écorcheur.* *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 304. t. 21. *planch. enlum.* n. 31. f. 2.

Lesser Butcher bird, called in Yorkshire Flusher. *Will. orn.* p. 88. *Alb. av.* 2. t. 14.
Red backed Shrike. *Brit. zool.* I. n. 72. *Ar. zool.* 2. p. 240. n. 131. *Lath. syn.* I. I. p. 167. n. 15.

varius. 18. *Collurio varius.* *Briff. orn.* p. 201. n. 5.
Lesser variegated Butcher bird. *Will. orn.* p. 189.
Variegated Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 168. n. 16.

rufus. 19. *Lanius rufus.* *Briff. orn.* p. 199. n. 3.
Lanius minor cineraascens. *Raj. av.* p. 19. A. 6.
Ampelis dorso griseo, macula ad oculos longitudinali.
Fn. suec. I. n. 180. t. 2.
Ampelis tertia. *Kram. elench.* p. 363.
Pie-griesche rousse. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 103.
pl. enlum. n. 9. f. 2. & n. 31. f. 1.
An other Sort of Butcher bird. *Will. orn.* p. 89. §. 4.
Wood Chat. *Brit. zool.* n. 73. *Latham syn.* I. I. p. 169.
n. 17.

senega-
lensis. 20. *Pie-griesche rousse du Sénégal.* *Buffon planch. enlum.*
n. 477. f. 2.

malano-
cephalus. 21. *Pie-griesche à tête noire du Sénégal.* *Buffon pl. enlum.*
n. 474.

*Habitat in Europa, ♂. & ♀. ad Senegal fluvium, in dumetis
& sepibus nidum struens, in quo ova 6 alba versus finem
latioreni circulo ex rufescente fusco notata ponit; vidit
infeditis & aviculis; scarabaeos & gryllos pruno spinosa
perforat; cerebra avicularum effodit; sonos quoscunque
imitari gestiens, 7½ pollices longus.*

antigua-
nus. 22. *L. cauda longa cuneiformi, corpore supra ex flavicante
rufo, subtus albo, capite, rostro, alis, pedibus cauda-
que supra nigris.*

Pie-griesche d'Antigue. *Sonnerat it.* p. 114. t. 70.

Antiguan Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 171. n. 20.

*Habitat in insula Philippina, Panay, collurionis magni-
tudine. Rostri magni mandibula superior longissima,
valde adunca; alæ breves; rectrices 2 intermedie totæ
nigræ; reliquæ subtus rufescentes, apice rufo.*

niger. 23. *L. niger, cauda subcuneiformi.*
Black Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 187. n. 38.
*Habitat in Jamaica, 7 pollices longus, rostro pollicari,
Tyranni rostro multum simili,*

- Leveria- 31. L. cauda longa cuneiformi apice alba, rostro, capite, collo, pectoris medio, alis, pedibusque nigris, reliquis partibus albis.
Magpie Shrike. Lath. syn. I. I. p. 192. n. 49.
Turdi magnitudine; picæ habitu & facie. Longitudo 10 pollicum; tectrices alarum majores, remigesque secundariae marginे albo; rectrices 2 intermediae $4\frac{1}{2}$, reliquæ 2 pollices longæ.
- atricapil- 32. L. cauda cuneiformi, & vertice, cervice, humeris alisque lus. nigris, corpore supra murino, subtus ex cæruleo-cinereo. *Merrem Beytr. II. p. 30. t. X.*
Habitat in Surinamo, carduelis magnitudine, longitudinem 5 pollicum vix superans; alæ breves; tectrices alarum remigesque secundariae margine albo; rectrices, exceptis duabus intermediis, apice albo.
- pomera- 33. L. supra niger, subtus albus, occipite dorsoque collis saturate ferrugineis nigro circumdati, alarum maculis utrinque duabus uropygioque albis. *Sparmann. mus. Carlsson. n. I. t. I.*
Habitat in Pomerania; rostrum, pedes, alæque nigrae; remiges tamen 8 primariae basi albæ; rectrices 2 inferiores & extimæ albæ; his proximæ 2 vel 3 apice, nec non a basi ad medium fere albicant.
- Tyran- 13. L. cinereus, subtus albus, vertice nigro, stria longitudinali fulva.
Muscicapa Tyrannus. Briss. av. 2. p. 391.
Tyran. Buffon pl. enlum. n. 537.
Tiriri ou Pipiri. Buffon hist. nat. des ois. 4. p. 572.
Kleiner americanischer Neuntoeder. Frisch. av. t. 62.
Tyrant Shrike. Lath. syn. I. I. p. 184. n. 37.
Tyrant Fly-catcher. Arð. zool. 2. p. 384. n. 263.
- domini- β. *Tyrannus dominicensis. Briss. orn. 2. p. 394. n. 19.*
 censis. *t. 18. f. 2.*
Saint Domingo Tyrant. Lath. syn. I. I. p. 185. n. 37. A.
- carolinen- γ. *Tyran de la Caroline. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 577.*
 sis. *Gobe-mouche de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 676.*
Tyrant of Carolina. Catesb. carol. I. p. 55. t. 55. Lath. syn. I. I. p. 186. n. 37. B.
- ludovicia- δ. *Tyran de la Louisiane. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579.*
 nus. *Gobe-mouche de la Louisiane. Buff. pl. enlum. n. 676.*

AVES ACCIPITRES. Lanius.

303

Louisiana Tyrant. Arct. zool. 2. p. 385. n. 264. Lath. syn.
I. I. p. 186. n. 37. C.

Habitat in America septentrionali, $\beta.$ insula S. Domiuici & Jamaica, turdi magnitudine, 8 circiter pollices longus, in cavis arborum nidificans; ferox & audax, ita ut plures simul aquilam ipsam adoriantur, & pellant, femina incubantc..

Rostrum & pedes cum unguibus ex nigricante fusca; irides fuscae; capitis stria verticalis longitudinalis e pennis fulvis apice nigricantibus; cauda fusca, margine rufa. $\beta.$ pectus cinereum; $\delta.$ rostrum nigrum; pedes & corpus supra plumbum; testrices majores alarum remigesque marginc albo; cauda extus & apice alba.

Schach. 14. L. lutescens fronte alisque nigris.

Lanius A-scack. Osb. it. 227.

Chinese Shrike. Lath. syn. I. I. p. 173. n. 22.

Habitat in Sina. P. Osbek.

Magnitudo Tyranni; caput & collum supra griseum; collum subtus ex testaceo albidum; dorsum & abdomen pallide testacea; remiges nigræ, primores basi alba, secundariæ apice albicantes.

Pitan-gua. 15. L. niger, subtus flavus, vertice stria fulva, fascia oculari alba.

Tyrannus brasiliensis. Briff. av. 2. p. 401. t. 36. f. 5.

Pitangua guacu. Marcgr. bras. 216. Kaj. av. 165.

Pitanga guacu or Bemtere. Will. orn. p. 198.

Bentaveo ou Cuiriri. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 579. t. 27.

Tyran du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 212.

Brasilian Shrike. Lath. syn. I. I. p. 187. n. 39.

Habitat in Brasilia, 9 pollices longus.

Ponc & infra oculos macula fusca; gula alba; pennæ corpus supra tegentes margine flavo; alæ subtus flavæ; cauda fusca, margine rufa, subtus olivacea.

17. L. rufus, subtus albus, capite nigro-virescente.

Lanius madagascariensis rufus. Brigg. av. 2. p. 178. t. 18. f. 4.

Pie-griesche rousse de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 298. f. 2.

Schet-bé. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 313.

Rufous Shrike. Lath. syn. I. I. p. 180. n. 31.

Habitat in Madagascar; 8 fere pollices longus.

Rostrum plumbeum ; pedes cum unguibus cornelii ; cauda rufa, margine fusco ; collum ex virescente nigrum, feminæ anterius griseum.

barbarus. 18. *L. niger*, subtus ruber, vertice femoribusque fulvis.

Lanius senegalensis ruber. Briss. av. 2. p. 185. t. 17. f. 2.

Gonolak. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 314.

Pie-griesche du Sénégâl. Buff. pl. enlum. n. 56.

Habitat in Senegal, 9 fere pollices longus.

Rostrum, alæ, cauda, pedes & unguis nigra; caput, cervice, vix, crissum, & teñrices alarum inferiores flava.

sulphura- 19. *L. fuscus*, subtus slavus, capite nigricante: fascia ambiante albida.

Lanius cayanensis luteus. Briss. av. 2. p. 176. t. 16. f. 4.

Pie-griesche jaune de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 296.

Becarde à ventre jaune. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 312.

Yellow-bellied Shrike. Lath. syn. I. I. p. 188. n. 40.

Habitat in Cayenna, 9 fere pollices longus.

Gula jugulumque alba; pedes grisei; unguis & rostrum nigricantes; alæ & cauda fuscæ, margine rufo.

cayanus. 20. *L. cinereus*, capite remigibus rectricibusque primoribus nigris.

Lanius cayanensis cinereus. Briss. av. 2. p. 158. t. 14. f. 1.

Pie-griesche grise de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 304.

Becarde. Buff. hist. nat. des ois. I. p. 311.

Cayenne Shrike. Lath. syn. I. I. p. 181. n. 41.

nævius. β. *Lanius cayennensis nævius. Buff. av. 2. p. 160. t. 14. f. 2.*

Pie-griesche tachetée de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 377.

Habitat in Cayenna, 8½ pollices longus.

Rostrum basi rubrum, apice nigrum; pedes cinerei; unguis nigri; β. per singularum pennarum longitudinem medianam stria nigra.

senega- 21. *L. griseus*, subtus albidus, vertice fascia que oculari nigris rectricibus nigris apice albis.

Lanius senegalensis cinereus. Briss. av. 2. p. 167. t. 17. f. 1.

Pie-griesche grise de Sénégâl. Buff. pl. enlum. n. 297. f. 1.

Senegal Shrike. Lath. syn. I. I. p. 162. n. 6.

Habitat in Senegal, 9 fere pollices longus.

Remiges latere exteriore rufæ. Rectrices 6: 6 fasciis oblongo-fusca, apice concolores.

22. 1.

madagaf- 22. *L. cinereus* subtus albidus, loris nigris, rectricibus ru-
cariensis. feientibus.

Lanius madagascariensis minor. *Briff. av. 2. p. 264. t. 16.*
f. I. 2.

Cali-calic & Bruja. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 315.*

Petite pie-grieché de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 299.*
f. I. 2.

Madagascar Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 174. n. 24.*

Habitat in Madagascar, vix 5 pollices longus, passeris
magnitudine.

Macula nigra utrinque inter nares & oculos; alarum tec-
trices superiores rufæ; rectrices maximam partem rufæ.
Mas gula juguloque nigro.

Emeria. 23. *L. griseus* subtus albus temporibus uropygioque rubris,
Lanius bengalensis fuscus *Briff. av. 2. p. 175. n. 14.*

Muscicapa Emeria. *Syst. nat. X. I. p. 236. n. 7.*

Rouge-quene. *Buff. hist. nat. des ois. I. p. 309.*

Bengal Redstart. *Albin. av. 3. p. 24. t. 56.*

Indian Redstart. *Edw. av. 4. t. 190.*

Bengal Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 175. n. 25.*

Habitat in Bengala, 5½ pollices longus.

Rostrum ex cinereo fuscum; irides albidae; vertex & occi-
put nigra; abdomen & caudæ rectrices superiores rubra;
ad utrumque colli latus maculae 4 nigrae curvæ; cauda
pallide fusca; pedes cum unguibus nigri.

bicolor. 27. *L. cœruleus* subtus albus, capistro nigro. *Mant. 1771.*
p. 124.

Lanius madagascariensis cœruleus. *Briff. av. 2. p. 197.*
t. 16. f. 3.

Loxia madagascariina. *Syst. nat. XII. I. p. 306. n. 42.*

Pie-grieché bleue de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 32.*
f. 2. n. 298. f. I.

Blue Shrike. *Lath. syn. I. I. p. 178. n. 29.*

Habitat in Madagascar, viditans insectis, 6½ pollices longus.

Rostrum, caput, margo remigum, rectrices 2 intermediae,
margo 4 proximarum exterior cœrulea; penae rostrum
cingentes, reniges, basi excepta, rectrices extimæ, pe-
des & unguis nigra; femina subtus sordide alba.

leucorhyn- 23. *L. corpore supra nigricante, subtus albido, rostro, pec-*
chus. tore, abdomine & uropygio albis.

Lanius manillensis. *Briff. av. 2. p. 180. n. 17. t. 18. f. 2.*

AVES ACCIPITRES. Lanius.

Pie-griesche de Manille. *Buff. pl. enlum.* n. 9. f. 1.
 Longraien. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 310.
 White-bellied Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 181. n. 33.
Habitat in Manilla, 7 pollices longus.
Alæ, cauda, pedes & unguis nigricant.

ferrugi- 34. L. copore supra ex fusco nigro, jugulo & pectore for-
 neus. dide albis, abdomine ferrugineo.

Ferruginous bellied shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 163. n. 8.
Habitat ad Caput bonæ spei, 9 pollices longus.
*Rostrum plumbeum; cauda obscure fusca unicolor; pedes
 nigri.*

tabuensis. 35. L. corpore supra olivaceo, gula & pectore cinereis,
 abdomine ex flavicante fusco, cauda pedibusque fuscis.
 Tabuan Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 164. n. 9.
*Habitat in insulis amicis maris australis, 9 fere pollices
 longus.*

Rostrum fuscum; vertex ex virescente, tempora ex oliva-
 ceo fusca; alæ margine exteriore nigrae; remiges se-
 cundariæ ex atro fusca margin'e fordide albo.

pacificus. 36. L. niger, capite colloque in virescentem colorem vergen-
 tibus, abdomine & cauda magis obscuris.

Pacific Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 164. n. 10.

Habitat in insulis maris australis, 11 pollices longus.
*Rostrum obscurum, $\frac{1}{4}$ pollicem longum; capitis collique
 pennæ valvae angustæ; cauda 3 pollices longa; digitæ ad
 ortum discreti, mediæ longissimæ.*

Septen- 37. L. rostro nigro, pedibus plumbeis, corpore supra fusco,
 trionalis. gula & pectore cinereis, abdomine crissloque fuscescen-
 tibus.

Northern Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 165. n. 11.

Habitat in America septentrionali, fere 8 pollices longus.
*Nares rotundaæ, parvæ; ad basin mandibulæ superioris
 setæ 5-6 nigrae; rectrices 4 internaudiæ fusca unico-
 lores, reliquaæ intus apice albæ, omnes 2 pollices lon-
 gæ; pedes breves; unguis robusti, fusi.*

viridis. 38. L. capite, alis & corpore supra obscure viridibus, hoc
 subtus albo, cauda nigra.

Lanius madagascariensis minor viridis. *Briff. av.* 2. p. 195.
 n. 25. t. 15. f. 2.

Tcha-chert. *Buff. hist. nat. des ois.* I. p. 310.

Pie-griesche de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 32. f. 2.
 Green Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 179. n. 30.
Habitat in Madagascar, 6 fere pollices longus.
Alæ longæ; rectrices 2 intermedie obscure virides, reli-
quæ margine exteriori; pedes unguesque nigri.

leucoce- 39. L. albus, corpore supra ex virescente nigro, cauda supra
 phalos. ex virescente atro, subtus nigro, rostro, pedibus & un-
 guibus plumbeis.

Lanius madagascariensis major viridis. *Briff. av.* 2. n. 24.
 t. 19. f. 2.

Grande pie-griesche verdâtre de Madagascar. *Buffon pl.*
enlum. n. 374.

Tcha-chert-be. *Buffon hist. nat. des ois.* I. p. 314.

White-headed Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 180. n. 32.

Habitat in Madagascar, ruso affinis, 8 pollices longus.

domini -40. L. niger, abdomine & uropygio albis:

canus: Pie-griesche Dominicaine. *Sonnerat it.* p. 55. t. 26.

Habitat in insulis philippinis, velocissime volans, audax;
. corvis potissimum injestus; an mera leucorhynchi varie-
tas? pajere major.

Rostrum cinereum, robustum, conicum, basi setis munitum.

Panayen- 41. L. rostro Pedibusque nigris, capite, gula, jugulo, pec-
 fis: tore & abdomine rubris, cervice, alis caudaque fuscis.

Pie-griesche rouge de l'île de Panay. *Sonnerat it.* p. 114.
 t. 70.

Habitat in insula Panay, collurionis magnitudine; irides
igneæ.

albus: 42. L. albus, rostro, cauda, pedibus, & plurima alarum
 parte nigris.

Pie-griesche blanche de l'île de Panay. *Sonnerat it.* p. 115.
 t. 72.

Habitat in insula Panay, collurione ruso duplo major;
remiges majores fascia alba.

varius. 43. L. corpore supra ex cinereo fusco, gula & pectori ex
 bubali colore flavo, abdomine, uropygio & criso for-
 dide ex fuscescente albo, interscapuliis albis, cauda ali-
 que fuscis.

White-shouldered Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 190. n. 43.

Habitat in Brasilia. Pennant.

Rostrum pedesque nigri; frons genæque maculis pallidioribus.

- nævius. 44. L. corpore supra nigro, subtus cinereo, tectricibus alarum singulis macula oblonga alba.
Spotted Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 190. n. 45.
Habitat in Cayenna, dolio similis, sed minor.
Rostrum pedesque nigri; paucæ pennæ ad exortum dorso apice albo; reniges margine albo; rectrices apice albo.
- obscurus. 45. L. corpore supra obscure atro, subtus albo, supercilio albo, pedibus fuscis.
Dusky Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 191. n. 46.
Nævio æqualis; rostrum corneum; alæ cum cauda obscuriores; pedes fusti.
- fuscus. 46. L. corpore supra fusco, subtus albo, area inter rostrum oculosque, apice remigum secundariarum, margineque primiarum flavicantibus.
Brown Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 191. n. 47.
Magnitudo Pipræ; rostrum corneum, apice nigrum; pedes nigri.
- tuber. 47. L. ruber, alis caudaque ocellatis apice nigris.
Red Lanius or Butcher bird of Surinam. *Bancr. Gujan.* p. 154.
Red Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 192. n. 48.
Habitat in Surinamo.
- america- 48. L. niger, remigum primorum macula, genis gulaque nus. albis, pectore & abdomine cinereis.
Black-crowned Shrike. *Arct. zool.* 2. p. 238. n. 128.
Habitat in America septentrionali, Excubitore minor, ludoviciano affinis.
Cauda longa; rectrices intermediae totæ nigræ; reliquæ apice albo, albedine versus exteriora nigredinem sensim fere delente.
- minor. 49. L. cinereus, gula alba, pectore & abdomine roseis, fronte, linea oculari caudaque nigris.
Pie-griesche d'Italie. *Buffon hist. nat. des ois.* p. 298. pl. enlum. n. 32.
Habitat in Italia, Hispania, Russia, negetæ affinis.
Remiges nigræ; primariae macula ad basin, secundariae apice albo; rectrices extimæ albae.

Natka.

50. L. cauda rotundata, vertice & corpore supra nigro, hoc subtus albo, torque albo.

Natka Shrike. *Arct. zool.* 2. p. 239. n. 130.

Habitat in sinu Natka Americæ septentrionalis ultra 7 pollices longus.

Rostrum pedetque nigri; supra oculos linea alba ad nucham protensa; infra hanc alianigra; tectrices alarum minores nigrae, maiores albæ; remiges primarie obscure, margine ex flavicante fuscæ; secundarie nigrae, margine & apice albæ; rectrices nigrae, 4 extimæ apice albo. Latham.

melanocephalos. 51. L. rostro, capite, gulaque nigris, corpore olivaceo subtus pallidiore, cauda fascia lata nigra, apice flava.

Black-headed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 165. n. 12. t. VI.

Habitat in insulis Sandwich maris australis, 6 circiter pollices longus; pedes obscuri.

brachyurus. 52. L. capite supra e ferrugineo griseo superciliis albidis, fascia nigra per oculos ad aures ducta, corpore supra ex griseo cinereo, subtus ex lutescente albido, cauda rotundata. *Pall. it.* 3. p. 693. n. 5.

Short tailed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 166. n. 13.

Habitat rario in Dauriæ rupestribus, collurionis magnitudine.

Uropygium subferrugineum; gula & crissum sere alba; alæ nigricantes, tectricum apice griseo; rectrices 10 ex griseo fuscæ, præter medias apice albæ.

phoenicurus. 53. L. fascia per oculos nigricante, corpore supra ex griseo rufescente, subtus ex lutescente albido, cauda longa rotundata & uropygio intense rufis. *Pall. it.* 3. p. 693. n. 6.

Rufous tailed Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 166. n. 14.

Habitat in rupestribus ad Ononem, Collurionis magnitudine & facie.

doliatus. 16. L. cauda rotundata, corpore albo nigroque confertim subfasciato. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 12.

Lanius cayennensis striatus. Briff. av. 2. p. 187. n. 21. t. 29. f. 3.

Pie-grièche rayée de Cayenne. *Buff. planch. enlum.* n. 297. f. 2.

AVES ACCIPITRES. Lanius.

Black and white' Butcher-bird. *Edw. av.* 5. p. 35. t. 226.
Pied Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 190. n. 44.

Habitat in Cayenna, $6\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum olfatum; pedes & unguis fuscus; singulæ pennæ fasciis albis & nigris; capitis longiores alba apice nigra, quas dum erigit, crestatus apparat; aæ cum cauda nigra, maculis transversis albis.

jocosus. 24. L. cauda rotundata, corpore griseo, palpebra inferiore purpurea, ano sanguineo. *Aman. acad.* 4. p. 238.

Merula sinensis cristata minor. Briß. av. 2. p. 255. t. 21. f. 2.

Jocose Shrike. *Lath. syn.* I. 1. p. 175. n. 26.

Habitat in Sina, alaudæ magnitudine, $7\frac{1}{2}$ pollices longus. Osbeck.

Vertex niger; tempora, gula & jugulum alba; abdomen albicans; cauda fuscæ, rectrices 4 exteriore apice albo; pedes cum unguibus nigri; rostrum magis rectum, quam in reliquis, sed utrinque intra apicem emarginatum.

infaustus. 25. L. dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus cinereis fascia nigricante, cauda rotundata.

Corvus infaustus. Fn. suec. 93. Brünn. orn. p. 10.

Corvus russicus. S. G. Gmelin it. 1. p. 50.

Merula saxatilis. Gesn. av. 732. *Raj. av.* p. 68. n. 3. *Briß. av.* 2. p. 238.

Merle de roche. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 351. t. 23. pl. enlum. n. 562.

Codirostro maggiore. Olin. acc. t. 47.

Greater Redstart. Alb. av. 3. p. 51. t. 55. *Will. orn.* p. 197. t. 36.

Rock Shrike. Lath. syn. I. 1. p. 176. n. 27.

minor. 26. *Turdus saxatilis. Syst. nat.* XII. 1. p. 294. n. 14.

Merula saxatilis minor. Briß. av. 2. p. 240.

Petrocosiphos. Gesn. av. 767.

Blaukoepfige rothe Amsel. Frisch. av. t. 32.

Habitat in omnibus Europæ, regionis quoque Uralensis silvis desertis, alpinis, turdis corvisque satis affinis; nonibus tamen lanii, protervus, comedentes peregrinatores saepe adiens, carnesque disjectas rapiens, ceterum vermis & insectis vicitans, pullosque nutriendis; nidum in rupium

cavernis inaccessis struens, in eoque 3 - 4 ova ponens;
cantu grato. Longitudo fere 8 pollicum, β. minor.
Rostrum fere pollicare, nigricans, utrinque emarginatum;
pedes & alæ similiter nigricant; cauda 3 pollices longa,
re&tricibus 2 intermediis fuscis, reliquis rufis; caput &
collum obscure (in β. ex cærulescente) cinerea, maculis
exiguis rufis & fuscis; superior dorsi pars obscure fuscæ
(in β. nigricans, rufo & ex cærulescente cinereo mista),
inferior cinerea (in β. & alba); pectus & abdomen
aurantia, maculis parvis albis fuscisque; pennarum
radii laxi. An turdi species, forte saxatilis?

faustus. 26. L. griseus, subtus ferrugineus, lineola alba pone
 oculos, cauda rotundata. *Amœn. acad.* 4. p. 241.

White wreathed Shrike. *Lath. syn.* I. I. p. 178. n. 28.
Habitat in Sina, turdi pilaris magnitudine.

Rostrum cum pedibus pallidum; alæ rotundatae; remiges
 subfuscæ, marginibus griseis, lincis obsoletis fuscis decus-
 santiibus; cauda fusca, similiter lineata.

I I. P I C Æ.

Rostrum subcompressum convexum.

45. PSITTACUS. *Rostrum aduncum : mandibula superiori mobili, cera (in multis) instrueta.*

Nares in rostri basi rotundæ.

Lingua carnosa obtusa integræ.

Pedes scandorii.

* *Macrourī, cauda cuneiformi.*

Macao. I. *Ps. ruber, remigibus supra cæruleis, subtus rufis, pennis scapularibus cæruleo & viridi variis, genis nudis rugosis.* Scop. ann. I. p. 26.

Ara brahiniensis. Briff. av. 4. p. 184. t. 19. f. 1.

Psittacus maximus alter. Aldr. orn. I. p. 665. t. 666.
Raj. av. p. 29. n. 2.

Ara premier. Fermin Surin. 2. p. 173.

Ara rouge. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 179. pl. enlum.
n. 12.

Maccaw. *Albin.* av. I. p. II. t. II. Will. orn. p. 73.
Red and blue Maccaw. *Edw.* av. 158. t. 158. *Bancr. Guj.*
p. 156. *Lath. syn.* I. I. p. 199. n. 1.

Habitat in America meridionali, ulnami longe superans.
Nidificat in sylvis palmiferis, quarum fructibus potissimum vicitat, in arboribus caris, bina ova ponens,
magnitudine columbinorum, facie ovorum perdicis;
bis in anno pruriunt, mare & femina alternatim incubante;
junior facile cicurandus, non item adultior;
caro comeditur, quamvis dura & insipida.

Corpus magnitudine gallinæ, coccineum; rostri mandibula superior alba, inferior nigra; tempora alba; remiges potissimum exteriores cæruleæ, tectricibus pluribus luteis; cauda longissima, rubra, rectricibus lateralibus cæruleis.

Psittacis omnibus proprium, quod eis lingua latior, quam ceteris avibus. Plin.

Aracanga. 52. Ps. dilute coccineus, pennis scapularibus luteis viridi terminatis, remigibus supra cæruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

Ara jamaicensis. Briss. av. 4. p. 183. n. 2.

Psittacus erythroxanthus. Gesn. av. 721. Aldr. orn. I. p. 683.

Aracanga. Marcgr. bras. 206. Raj. av. p. 29. n. 3.

Petit Ara rouge. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 180. pl. enlum. n. 641.

Maccaw from Jamaica. Alb. av. 2. t. 17. Brown jam. p. 472.

Maccaw called Aracanga. Will. orn. p. 111.

Red and yellow Maccaw. Bancr. Gujan. p. 156. Lath. syn. I. I. p. 201. n. 2.

Habitat in Guiana, Brasilia, Jamaica, præcedenti æqualis.

Rectrices supra coccineæ, violaceo admixto, infra obscure rubræ; 2 intermediae utrinque in prima medietate obscure rubræ.

militaris. 2. Ps. viridis, alis cæruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis lineis plumosis.

Largest Guiana Parrot. Bancr. Guj. p. 158.

Great green Maccaw. Edw. av. t. 313.

Military Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 202. n. 3.

Rostrum nigrum; uropygium, rectricumque apices cærulei.

Ararauna. 3. Ps. supra cæruleus subtus luteus, genis nudis: lineis plumosis.

Ara brasiliensis cyano-crocea. Briss. av. 4. p. 193. t. 20.

Psittacus maximus cyano-croceus. Aldr. orn. I. p. 664. Raj. av. p. 28. I. p. 181. 5. Sloan. jam. 2. p. 296.

Ara bleu. Férni. Surinam. 2. p. 174. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 191. pl. enlum. n. 36.

Ararauna. Marcgr. bras. 206. Alb. av. 3. p. 10. t. 10. & 2. p. 16. t. 17.

Aldrov. blue and yellow Maccaw & brasilian Ararauna.

Will. orn. p. 110. n. 1. & 111. n. 4. t. 15.

Blue and yellow Maccaw. Edw. av. 159. t. 159. Latham syn. I. I. p. 204. n. 4.

Psittaci capite magno, vertice plano, monogami per paria incedunt pedibus brevibus, garruli, dociles, longævi; videntur imprimis nucibus, glandibus, cucurbitæ, carthami seminibus, in patria jæpe edules; scandunt rostro, irati pennas erigunt; inter aves simu; ex regionibus borealibus exulant, ad 34° latitudinis ubi; 25° utrinque ab æquatore distantiæ frequentissimi.

- cæruleus. β . Psittacus maximus cæruleus varius, cauda produc^{ta}
Brown. jam. p. 272.
- Ara jamaicensis cyaneo-crocea. Briss. av. 4. p. 191. n. 3.
Blue Maccaw. All. av. 3. t. 10. Lath. syn. I. I. p. 205.
n. 4. A.
- Habitat in Jamaica, Guiana, Brasilia, Surinamo, æqualis
cum præcedentibus magnitudini.
- Cærulea supra collum, dorsum, alas, caudam, subtus
collo, pectori, abdomine; cauda lutea feminæ, rubra
mari; nigra rostrum & gula; palpebræ serratae papillæ
nigris; tempora nuda alba, lineata (non in β) punctis
plumosis cæruleo-nigris.
- Makawu- 53. Ps. supra obscure viridis, capite viridi cæruleo ad-
anna. misto, gula, jugulo & pectoris parte superiore rufel-
centibus, pectoris parte inferiore & abdomine viridibus,
uropygio ex inbro fusco.
- Perruche ara. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 277.
- Perruche ara de Cayenne. Buffon pl. enlum. n. 864. Barresi
Fr. equin. p. 145.
- Parrot Maccaw. Lath. syn. I. I. p. 205. n. 5.
- Habitat in Cayenna & Guiana, migratorius, 18 pollices
longus.
- Genæ nudæ; cauda 9 pollices longa, alæque supra obscure
subtus ex flavescente virides.
- ater. 54. Ps. niger cum splendore viridi, rostro oculisque ruben-
tibus, pedibus flavis.
- Ara noir. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 202.
- Ararauna ou Machao. de Laët descr. des ind. orient. p. 490.
Black Maccaw. Latham syn. I. I. p. 206. n. 6.
- Habitat in Gujanæ partibus interioribus incultis, in rupium
montiumque aridorum & sterilium cacumine.
- obscurus. 4. Ps. fuscus, genis nudis rubris, vertice cinereo-nigref-
cente vario, cauda cinerea. Haffelq. it. 236.
- Obscure Parrot. Latham syn. I. I. p. 206. n. 7.
- Habitat in Afica, picæ magnitudine.
- Rostrum & capistrum, pedes & unguis nigra; orbitæ alba;
irides flavæ; cervix & alæ supra nigrae; abdomen
cinereum.
- nobilis. 5. Ps. viridis, genis nudis, humeris coccineis. Mus. Ad.
Frid. 2. p. 13.
- Noble Parrot. Lath. syn. I. I. p. 207. n. 8.

*Habitat in Surinamo, turturis magnitudine.
Facies nuda, alba.*

severus. 6. *Pf. viridis*, genis nudis, remigibus rectricibusque cæruleis
subtus purpurascens. *Mus. Ad. Fr. I. p. 13. Scop.*
ann. I. p. 27. n. 23.

Ara brasiliensis viridis. *Briss. av. 4. p. 198. n. 6.*

Maracana. *Marcgr. bras. 207. Will. orn. p. 112. n. 5. 6.*
Raj. av. p. 29. n. 5. Sloan. jam. 2. p. 297.

Ara vert. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 194. t. 8.*

Ara vert du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 383.*

Brasilian green Maccaw. *Edw. av. 41. t. 229. Lath. syn.*
I. I. p. 203. n. 9.

β. *Ara brasiliensis erythrochlora.* *Briss. av. 4. p. 198. n. 7.*
Habitat in Jamaica, Cujana, Brasilia, & circiter politicibus
pedem longitudine superans.

Rostrum, ungues, & genarum linear nigra; irides aureæ;
pennæ virides, in β. obscurius; frons ex castaneo pâr-
purascens, in β. fusca, vertex cæruleus, in β. magis in
viridem vergens; cauda supra viridis, versus apicem cæ-
rulea; pedes fuscæ.

Eupatricia. 7. *Pf. viridis*, genis nudis, humeris coccineis, rostro purpu-
rafcente.

Psittaca ginginiana. *Briss. av. 4. p. 343. n. 64. t. 29. f. 1.*

Perruche de Gingi. *Buff. pl. enlum. n. 239.*

Grande perrache à ailes rougeâtres. *Buff. hist. nat. des*
ois. 6. p. 156.

Ginci Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 209. n. 10.*

Hab. ut in regno Giugi Indiæ, 21 pollices longus.

Orbitæ nudæ rubicundæ; corpus supra ex olivaceo profun-
de viride, subtus pallide virens flavescente admisto;
gula jugulumque cinerascens; cauda & alæ, exceptis
rectricibus superioribus rubris, virides; pedes rubentes;
ungues nigri.

japonicus. 8. *Pf. viridis*, subtus rectricibusque lateralibus ruber, remi-
gibus cæruleis.

Psittacus erythrocchorus macrourus. *Aldr. orn. I. p. 678.*
t. 681. Raj. av. p. 34. n. 3.

Psittaca japonensis. *Briss. av. 4. p. 362. n. 71.*

Perruche verte & rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 159.*
Red and yellow or pale green Parrot of Aldrovandus.
Will. orn. p. 116.

Japoneſe Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 209. n. 11.*

*Habitat in Japonia, non tamen boreali, quæ psittaci caret.
Cauda corpore longior, rectricibus 2 intermediis viridibus
scapis atrois, reliquis rubris scapis nigris; rostrum & iri-
des rubent; macula ante & pone oculum, & intercap-
tum caruleum, gula ex ferrugineo rubra; corpus sub-
tus lincis longitudinalibus nigris; pedes & unguis nigri.*

- amboi- 9. *Ps. coccineus, dorso cœruleo, alis macula viridi.
Psittaca amboinenis coccinea. Briss. av. 4. p. 378. t. 28. f. 2.
Lori Perruche tricotor. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 138.
Perruche rouge d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 240.
Amboina red Parrot. Lath. syn. I. I. p. 210. n. 12.
Habitat in Amboina, 15½ pollices longus.
Rostrum, pedes & unguis rubri, illud apice nigrum;
rectrices candæ inferiores medio violaceæ, rectrices 2
intermediae ex violaceo fusce 9½ pollices, extimæ binæ
vix 6 pollices longæ, margine interiori rubro.*

- cyanoce- 10. *Ps. viridis, capite gulaque cœruleis.
Psittaca cyanocephala. Briss. av. 4. p. 359. t. 19. f. 2.
Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 145.
Perruche à tête bleue des Indes orientales. Buff. pl. enlum.
n. 192.
Blue-headed Parrot. Lath. syn. I. I. p. 211. n. 13.
Habitat in India, 11½ pollices longus.
Mandibula superior flava, apice cinereofuscata, inferior cintata
rufescens; area oculorum nuda flavicans; corpus subtus
ex viridi flavicans; gula violacea in cœruleum vergens;
colli latera lutea; alæ subtus cinereæ; cauda subtus et
flavante cinerea; pedes cœruleofuscatae; unguis griseus.*

- hæmato- 50. *Ps. corpore supra viridi, jugulo & pectori aurantio-
tus. pennarum margine cœruleo, abdomine caudaque viri-
dibus. Mant. 1771. p. 574.
Psittaca amboinenis varia. Briss. av. 4. p. 364. n. 72.
Perruche à face bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.
Perruche d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 61.
Red breasted Parakeet. Edw. glean. t. 232.
Red breasted Parrot. Lath. syn. I. I. p. 212. n. 14.*

- molucca- β. *Perruche des Moluques. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 150.
nus. pl. enlum. n. 743.*

- novæ γ. Blue-bellied Parrot. Brown Illust. p. 14. t. 7.
Hollan- Habitat in Amboina, γ. in nova Hollandia; II, β. 10.
die. γ. 15 pollices longus.

Rostrum ex flavicante, β. ex rubicundo album, γ. rubicundum, cera flavicante; capistrum & pars verticis, β. totum caput, γ. caput collumque cærulea; occipite tamen virecente; pectus β. & γ. rubrum flavo admisto; abdomen γ. cæruleum, β. macula cærulea notatum.

Stricapil-lus. 55. *Pf. supra cæruleus, gula, jugulo pectoraque rubris, abdomine crisoque viridibus, vertice nigro, torque viridi & rubro.*

Ara moluccensis varia. Briss. av. 4. p. 197. n. 5.

Psittacus orientalis exquisitus Loeri dictus. Seb. thes. I. p. 63. f. 4.

Psittacus capite nigro, collaris viridi. Klein av. p. 25. n. 16.

Grande perruche à bandeau noir. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 158.

Habitat in Moluccis, 14 pollices longus.

Alæ, testricesque caudæ superiores cæruleæ, inferiores virides rubro variae; cauda supra viridis, subtus rubra margine nigro.

Tabuenfis. 56. *Pf. capite, collo, pectora & abdomine purpureis, dorso & testricibus alarum viridibus, lunula cervicem terminante, remigibus primariis caudæque maxima parte cæruleis.*

Tabuan Parrot. Lath. syn. I. I. p. 214. n. 16. t. 7.

Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.

Rostrum nigrum, mandibulæ inferioris basis pennis viridibus cincta; alæ spuriae cæruleæ; remiges secundariae virides margine cæruleo; rectrices 2 intermediae 8 pollices longæ cæruleæ, margine & apice viridi; reliquæ cæruleæ scapis nigris; pedes obscuri.

Papuenfis. 57. *Pf. capite, collo & pectora rubris, occipitis macula cærulea lunulisque duabus nigris, alis dorsique parte viridibus, cetera dorsi parte, abdomine & caudæ apice rubris.*

Petit Lori Papon. Sonnerat it. p. 175. t. III.

Papuan Lory. Lath. syn. I. I. p. 215. n. 17.

β. Psittacus tænia abdominalis transversa nigra margine viridi.

γ. Psittacus coccineus, cauda breviore, dorsi parte posteriore ex cæruleo atra, macula inter alas lutea.

δ. Pf. abdominalis medio viridi.

Habitat in Papua, 16 pollices longus.

Rostrum rubrum; alæ breves; dorsum posterius stria longitudinali media cærulea; ad utrumque alarum latus macula oblonga lutea; caudæ $\frac{2}{3}$ virides, reliquæ luteum; pedes rubri.

- borneus. 11. Ps. ruber, remigibus restricibusque apice viridibus,
alis macula cærulea, orbitis fulcis.
Psittaca coccinea bonarum fortunarum insulæ. Briff. av. 4.
p. 373. n. 77.
Lori perruche rouge Nr. 1. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 137.
Longtailed Scarlet Lory. Edw. av. 173. t. 173. Lath.
syn. I. p. 216. n. 18.
Habitat in India, 9 $\frac{1}{2}$ pol'lices longus.
Rostrum aurantium; orbitæ nudæ; remiges punctis cæruleis & viridibus; rectrices 2 extimæ in colore viride inclinant; rectrices caudæ inferiores rubræ, margine cæruleo.
- indicus. 58. Ps. coccineus, fusco & violaceo variegatus, capite & collo superioribus, pectore & tænia pone oculos violaceis, rectricum majorum apice dilute fusco, minorum rectricibusque ex fusco violaceis.
Psittaca indica coccinea. Briff. av. 4. p. 376. t. 25. f. 2.
Lori perruche violet & rouge Nr. 2. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 138.
Peruche des Indes orientales. Buffon pl. enlum. n. 143.
Indian Lory. Lath. syn. I. I. p. 217. n. 19.
Habitat in Amboina, 11 sere pollices longus.
Rostrum rubicundum, apice nigro; pedes & unguis fusco
- élégans. 59. Ps. capite, collo & corpore subtus rubro, supra fusco interscapulis pallide cæruleis rubro mixtis, cauda ex viridante fusca, apice albicante.
Beautiful Lory: Lath. syn. I. I. p. 217. n. 20.
β. Ps. alis, cauda & corpore supra viridibus. Lath. syn. I. I. p. 218.
Longitudo 15 (β : 12) pollicum; rostrum ex flavicante fusco, β. plumbeum, apice flavo.
- guebienensis. 60. Ps. splendide ruber, remigibus nigris transversim fasciat, cauda ex rubro fusca.
Petit Lory de Guéby. Sonner. it. p. 174. t. 109.
Lori rouge & violet. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 125.
Lori de Gueby. Buffon pl. en um. n. 684.
Gueby Lory. Lath. syn. I. I. p. 219. n. 21.
Habitat in insula Gueby, amasono dimidio minor 9 $\frac{1}{2}$ pol'lices longus.
Rostrum & irides igneæ; fascia alarum rubra; annulus purpureus a cervice ad pectus progrediens.

- Janthi-
nus. 61. Ps. capite & corpore supra rubro, subtus violaceo, hu-
meris cæruleis, cauda alisque viridibus & rubris.
Perroquet violet. *Ferm. Surin.* 2: p. 175.
Habitat in Amazonie littore.
Rostrum *nigrum*; irides *aureæ*.
- Variega-
tus. 62. Ps. coccineus, nucha, dorsi initio, pectore & abdomine
purpureo-cæruleis, alis supra rubris, subtus flavis,
cauda viridi.
Variegated Lory. *Lath. syn.* I. I. p. 220. n. 22.
Habitat in India, 10-11 pollices longus.
Rostrum *obscurum*; color *abdominis posterioris in vires-*
cente-nigrum vergens; rectrices *basí intus rubicundæ*,
versus apicem extus cæruleæ.
- Guineæ.
Novæ
Guineæ. 63. Ps. niger cum splendore cæruleo, cauda subtus rubra,
orbitis nudis fuscis.
Lori noir de la nouvelle Guinée. *Sonner. it.* p. 175. t. III.
Forrest it. p. 133.
Black Lory. *Lath. syn.* I. I. p. 221. n. 23.
Habitat in nova Guinea.
Rostrum pedesque *nigricantes*; irides *circulis duobus*,
altero cæruleo, altero minori ex rubro fusco.
- Javanicus. 64. Ps. coccineus, orbitis nudis argenteis, capite cristato,
gula grisea, jngulo & pectore roseis, humeris & alis ex
rubro & viridi mixtis, rectricibus duabus intermediis
coccineis, reliquis roseis viridi-mixtis apice cæruleo.
Psittaca javensis cristata coccinea. *Briff. av.* 4. p. 381. n. 80.
Psittacus parvus Bontii. *Raj. av.* p. 34. n. 5.
Perruche huppée. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 160.
Bontius's small Parrakeet. *Will. orn.* p. 120. n. 7.
Crested red Parrakeet. *Lath. syn.* I. I. p. 223. n. 25.
Habitat in Java, alaudæ magnitudine.
Rostrum *griseum*; cera *albicans*; oculi *nigri*.
- Jandaya. 65. Ps. supra viridis, subtus flavius, capite colloque flavis.
Psittacula brasiliensis lutea. *Briff. av.* 4. p. 399. n. 91.
Jandaya. *Will. orn.* p. 116. S. 4. n. 5. *Raj. av.* p. 34.
n. 5. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 262.
Yellow-headed Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 224. n. 26.
Habitat in Brasilia.
Rostrum, pedes & unguis *nigri*; orbitæ *nudæ*, *albæ*;
irides *aureæ*; abdominis pars posterior *viridis*.

Solstitialia- 12. Ps. luteus, alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris, lis.

Psittacus aurantius. I. F. Miller illustr. t. V. A.

Psittaca angolensis lutea. Briss. av. 4. p. 371. n. 76.

Perruche jaune. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 147.

Perroquet from Angola. Albin. av. 3. t. 13.

Angola Yellow Parrot. Lath. syn. I. I. p. 224. n. 27.

Habitat in Angola, turturis magnitudine, $11\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum ex virecente, cera pallide cinerea; irides flavæ; dorsum maculis ex flavo viridibus; tectrices alarum a corpore remotissimæ margine cœruleo; rectrices 6 intermediae utrinque ex flavicante virides; pedes & ungues rubicundi.

Guarou- 66. Ps. flavus, remigibus majoribus viridibus.

ba. Psittaca brasiliensis lutea. Briss. av. 4. p. 369. n. 74.

Quijubatui. Raj. av. p. 35. Will. orn. p. 117.

Quarouba ou Perruche jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 272.

Perruche jaune de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 525.

Brasilian yellow Parrot. Lath. syn. I. I. p. 225. n. 28.

mexica- β . Psittaca mexicana lutea. Briss. av. 4. p. 374. n. 75.

nus. Avis Cocho Psittaci mexicanæ species. Seb. thes. I. t. 64. f. 4.

Habitat in Brasilia & Amazonia, β . in nova Hispania, $11\frac{1}{2}$ pollices longus, solitarius, & rarer, facile quidem curandus, sed lingua minus docili.

Rostrum griseum; oculi nigri; cauda longissima; in β . rostrum rubens; caput pallide, collum ex aurantio rubrum; tectrices alarum superiores ex viridi, rubro & aurantio variae.

caroli- 13. Ps. viridis, capite, collo genibusque luteis. Scop. ann. I. nenüs. p. 19. n. 25.

Psittaca carolinensis. Briss. av. 4. p. 350. n. 67.

Perroquet n°. 7. Ferm. Surin. 2. p. 176.

Perruche à tête jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 274.

Perruche de la Caroline. Buff. planch. enlum. n. 499.

Papegay à tête aurore. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 247.

Caroline Parrot. Arct. zool. 2. p. 242. n. 132. Catesb. Col. I. p. 11. t. II. Lath. syn. I. I. p. 227. n. 29.

Habitat in Guiana, moris maturantibus in Carolinam & Virginiam migrans, gregarius, pomariis valde infestus; in arboribus cavis sotii humilioris spongiosi nidum truens,

ϵ . ova ut plurimum 2 subrotunda nivea ponens; facile cicurandus, non tamen loquax.
Rostrum ex flavicante album; pedes albi.

Alexander. 14. Ps. viridis, collari pectoralque rubro, gula nigra. *Aman. acad.* 4. p. 236. *Mus. Ad. Frid.* 2. p. 14. *Scop. ann.* 1. p. 29. n. 26.

Psittacus (cubicularius), cauda cuneiformi, digito interiore postico mutico. *Hasselq. it.* 235.

Psittacus torquatus macrourus antiquorum. *Aldr. av.* 1. p. 678. *Raj. av.* p. 33. n. 1.

Psittaca torquata. *Briss. av.* 4. p. 323. n. 55.

Perrocello. *Olin. acell.* 24. t. 24.

Grande Perruche à collier d'un rouge vif. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 141.

Perruche à collier des îles Maldives. *Buff. planch. enlum.* n. 642.

Ring Parrakeet. *Will. orn.* p. 115. *Edw. av.* t. 292. f. 1.

Alexandrine Parrakeet. *Lath. syn.* 1. 1. p. 234. n. 37.

β . Psittacus torque roseo.

Perruche à collier couleur de rose. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 152. *planch. enlum.* n. 551.

γ . Psittacus torque purpureo.

Psittaca indica torquata. *Briss. av.* 4. p. 326. n. 56.

Bracelet Parrakeet from the Eastindies. *Albin. av.* 2. t. 18.

δ . Psittacus torque dupli.

Psittaca borbonica torquata. *Briss. av.* 4. p. 328. n. 57. t. 27. f. 1.

Perruche à double collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 143.

Perruche à collier de l'ile de Bourbon. *Buff. planch. enlum.* n. 215.

ϵ . Psittacus capite cyaneo.

Psittaca cyanocephalos. *Briss. av. app.* p. 129.

Perruche à tête d'azur. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 148.

Blue headed Parrakeet. *Edw. av.* t. 292.

ζ . Psittacus javanius. *Osbeck it.* 1. p. 156.

Habitat in Asia australi, insulisque maris indici, δ , etiam in Africa, β . in sole Africa, columbae plerumque magnitudine, primus innotuit expeditione Alexandri Magni.

Rostrum magis minusve rubrum; in β . mandibula superiore aurantia, inferiore nigra; in γ . mandibula superiore aurantia, inferiore nigra; in ζ . inferiore flava; cera in hoc nigra; irides luteæ; orbitæ nudæ incarnatae, in ζ . fusæ; caput in ϵ . cyaneum, in ζ . ex pallide cæruleo &

pallide flavo mistum; occiput in β. in violaceum vergens; vertex in γ. ex cærulecente viridis; tempora in ζ. nigricant; gula in ε. cyanea, in η. pallide rubra; jugulum & pectus in γ. & η. pallide rosea; in δ. stria lutea; alæ macula purpurascente; in η. tectrices alarum superiores macula flava, remiges subtus cinereæ, margine cæruleæ; in η. alæ subtus dilute cinereæ, rectricibus & luteis. Cauda margine cæruleo, subtus pallide flava; in δ. subtus ex flavo cinerea; in ε. supra cærulea, subtus flava, in η. flavicans. Pedes obscuri; in β. & ε. cinerei; in η. ex virente grisei.

pertinax. 15. *Pf. viridis, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescens centibus. Mus. Ad. Frid. I. p. 14.*

Psittaca illiniaca. Briss. av. 4. p. 353. n. 68.

Tui-aputejuba. Marcgr. bras. 206. Raj. av. p. 34. n. 2. Tui species secunda. Raj. av. p. 181. n. 6. Will. orn. p. 116.

Apujetuba. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 269. t. 13.

Perruche Illinoise. Buff. pl. enlumi. n. 528.

Yellow-faced Parrakeet. Edw. av. 49. t. 234.

Illinois Perrot. Arct. zool. 2. p. 243. n. 133. Lath. syn. I. I. p. 228. n. 30.

Kleiner langschwaenzigergrüner Papagay. Frisch. av. t. 54.

Habitat in America, gregatim in septentrionalem migrans, castaneis, pisis, &c. vicitans, & nidum in habitaculis termitum struens; agilis, voce parum articulata, 13 circiter pollices longus. Caro esculenta.

Rostrum cinereum; irides, frons, aliquando & occiput aurantia; remiges primariae margine extremo cæruleæ; pectus & abdomen ex flavicante virent.

Leveria. 67. *Pf. pallide viridis, capite colloque flavis, uropygio puni-nus. ceo, remigibus rectricumque apice cæruleis.*

Crimson vented Parrot. Lath. syn. I. I. p. 229. n. 31. Habitat in Asia australi, satis grandis.

Imaragdi. 68. *Pf. splendide viridis, abdomine posteriore, uropygio & cauda ex ferrugineo castaneis.*

Perruche émeraude. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 262.

Perruche des terres magellaniques. Buff. pl. enlumi. n. 85.

Emerald Parrot. Lath. syn. I. I. p. 230. n. 32.

Habitat in freto Magellani? 13 pollices longus,

Rostrum & pedes obscuri; cauda apice viridis.

canicu- 16. Ps. viridis, fronte rubra, occipite remigibusque extimis
laris, cæruleis, orbitis fulvis.

Psittaca brasiliensis. Briss. av. 4. p. 339. n. 62.

Perruche à front rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p.
268. pl. enlum. n. 767.

Red and blue headed Parrakeet. Edw. av. 4. t. 175.
Lath. syn. I. I. p. 242. n. 40.

Habitat in Americæ calidioribus, majoris turdi magni-
tudine.

Corpus subtilis ex virescente luteum; rostrum nigricans;
oculi nigri; pedes rufescentes; remiges latere exte-
riore virescentes; cauda elongata.

rugino- 17. Ps. viridis, vertice, remigibusque primoribus cæruleis;
fus. orbitis cinereis.

Psittaca martinica. Briss. av. 4. p. 356. n. 69.

Perruche à gorge brune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 257.
Brown-throated Parrakeet. Bancr. Gaj. p. 162. Edw. av.
4. t. 177. Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41.

Habitat in America insulisque adjacentibus, 10 pollices
longitudine excedens.

Rostrum, cera & pedes cum unguibus cinereæ; irides ex
flavante badiæ; corpus subtilis ex flavante viride;
capitulum, genæ, gula & jugulum ex griseo fusca,
flavo admisto; cauda corpore brevior, subtilis flavicans.

rufirof- 18. Ps. viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice cæ-
ruleofuscibus, orbitis incarnatis. Mus. Ad. Fr. 2. p. 13.
tris.

Psittaca. Briss. av. 4. p. 319. n. 54.

Tui Nr. I. Raj. av. p. 34. Wil. orn. p. 116.

Perruche. Buffon planche enlum. n. 550.

Sinvialo. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 265.

Small green longtailed Parrakeet. Brown. Jam. 472.

Long tailed green Parrakeet. Edw. av. 4. t. 175. Lathant
syn. I. I. p. 230. n. 33.

Gujanen- β. Psittaca aquarium Lupiarum insulæ. Briss. av. 4. p. 330.
sis. n. 58.

Green Parrot of Guiana. Bancr. Gaj. p. 161.

Habitat in America australi, 12 pollices longitudine supe-
rans, β. turdi magnitudine; gregarius, facile cicuran-
dus, docilis, loquacissimus.

Pedes cum unguibus incarnati; in β. etiam rostrum; irides
aurantiæ, in β. extus rubicundæ, interius cinereæ;
orbitæ quoque cinereæ; pedes & unguis albidi.

ornatus. 19. Ps. luteo-vitidis, occipite, gula pectoreque rubris, vestice auribusque cæruleis orbitis cinereis.

Psittaca indica varia. Briss. av. 4. p. 366. n. 73.

Perruche Lori. Buffon hist. nat. des ois. 6 p. 145.

Perruche variée des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 552.

Lory Parrakeet. Edw. av. 4. p. 174. t. 174. Latham syn.

I. I. p. 223. n. 24.

Habitat in India, 8 pollices longus.

Rostrum pallide aurantium; cera subfuscā; irides aurantiæ; vertex & macula pone & supra oculos ex alto cærulea; cauda subtus rubicunda; pedes & unguis cinerei.

Jaguil- 69. Ps. viridis, remigibus apice fuscis, orbitis fulvis. Molina
ma. hist. nat. Chil. p. 228.

Habitat in regno Chilensi, æstate in montibus Cordilleras,
turturis magnitudine, sōnorū, gregibus numerosissimis,
fertilissimus, gemmas arborum herbasque vorans, campis
infestissimus; cato sapidissima tenera.

gujanen-70. Ps. viridis, genis rubro-maculatis, tectricibus alarum mi-
noribus coccineis, majoribus flavis, remigibus infra
luteis, margine versus apicem nigricante.

Psittaca gujanensis. Briss. av. 4. p. 331. n. 59. t. 28. f. 1.

Perruche pavouane. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 255.

Perruche de la Gujane. Buff. pl. enlum. n. 167. 407.

Pavouane Parrot. Lath. syn. I. I. p. 232. n. 34.

Habitat in Gujana & insulis Caribæis, pedem longus, seros.

Cera rostrumque albicans; apex hujus cinereus; pedes
grisei; unguis nigricantes.

margina- 71. Ps. viridis, tectricibus alarum nigris, minorum marginē
tus. ex flavicante fusco, majorum cæruleo.

Perruche de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 80. t. 44.

Varied-winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 233. n. 35.

Habitat in insula Luzonia.

Capislrum splendide virens; rostrum magnum incarnatum;
irides albæ; vertex cæruleus; corpus supra gra-
mineum, subtus ex flavicante viride; pedes nigricantes.

Sonne- 72. Ps. viridis, torque cæruleo, macula ad alarum exortum
ti. rubra.

Perruche à collier de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 80.
t. 43.

Blue collared Parrot. Lath. syn. I. I. p. 234. n. 36.

Habitat in insula Luzonia.

Rostrum & irides rubræ ; caput, collum & abdomen ex griseo viridia ; alæ & dorsum graminea ; rectrices 2 intermediae gramineæ , ceteræ ex griseo virides ; pedes ex nigricante grisei.

Pondice- 73. *Ps. viridis*, fronte striaque a mandibula utrinque ad gulam nigris, facie alba & cærulecente, pectore ex purpureo cæruleo, cauda subtus straminea.

Peiruche à Moustaches. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 149.*
Perruche de Pondichery. *Buff. pl. enlum. n. 517.*

Moustacho Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 238. n. 38.*

barbatus. β . *Ps. capite a basi rostri ad oculos castaneo, linea a naribus ad oculos fusca, gulæ deorsum ducta nigra, nucha rubra.*

Bearded Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 238. n. 38. A.*

Habitat in regione Pondichery, II pollices longus.

Teætrices alarum slavo variae ; in β . remiges margine cæruleo, rostrum rubrum, vertex viridis, pedes obscuri-

erythro- 74. *Ps. viridis*, capite rubro, cæruleo admisto, gula nigra, cephalus. torque nigro & pallide viridi.

Blossom headed Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 239. n. 39.*

Psittaca ginginiana erythrocephalos. Briss. av. 4. p. 346. n. 65. t. 29. f. 2.

Perruche à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 144.*

Perruche à tête rouge de Gingi. *Buff. pl. enlum. n. 264.*

benga- β . *Ps. vertice genisque roseis, occipite rectricibusque duabus intermediis supra totis, reliquis margine cæruleis.*

Psittaca bengalensis. Briss. av. 4. p. 348. n. 66.

Petite perruche à tête couleur de rose à longs brins. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 154.

Perruche de Mahé. *Buff. pl. enlum. n. 888.*

Perruche à tête rouge de l'île de Luçon. *Sonner. it. p. 79. t. 42.*

Parrakeet from Bengal. *Albin. av. 3. p. 7. t. 14.*

Rose-headedring Parrakeet. *Edw. glean. t. 233. Latham syn. I. I. p. 239. n. 39. A.*

borneus. γ . *Ps. capite, gula, jugulo, pectore, & abdominis parte anteriore florum persicoram in modum rubris.*

Bornean Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 240. n. 39. B.*

malac- δ . *Ps. colore magis in flavum vergente, area oculorum & occipite roseis.*

Grande perruche à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 155.*

Perruche de Malac. *Buff. pl. enlum. n. 887.*

Malacca Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 241. n. 39. C.*

*Habitat in India, insulisque oceanii indici, II, β. 10,
γ. 12, δ. 16 pollices longus.*

*Rostrum rubens, mandibula inferiore in γ. & β. nigra, su-
periore in hac posteriori varietate lutea; cera in β. sub-
fusca, in γ. una cum orbitis cinerea; in hac etiam fron-
tis macula viridis, & linea nigra ab altero oculo ad alte-
rum ducta; in δ. torques nullus; corpus subtus, in δ.
etiam supra e. viridi in flavum vergens; teñtrices alarum
macula rubra; cauda interiori margine, in β. subtus fla-
va, in δ. in cæruleum inclinans. Pedes & ungues cinerei.*

plum- 75. *Ps. viridis, rostro, pedibus orbitisque plumbeis, fronte,
beus.* genis gulaque fuscis, rectricum margine & apice cæruleis.

Brown fronted Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 243. n. 41. A.*
*Longitudo 11½ pollicum; irides castaneæ; vertex cærulef-
cens; remiges margine cæruleæ; an varietas æruginosæ?*

oliva- 76. *Ps. olivaceus, occipitis macula cærulescente, alis ex-
ceus.* cæruleo, viridi & aurantio variis.

Perruche aux ailes chamarrées. *Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 151.*

Perroquet de l'île de Luçon. *Buff. pl. enlum. n. 287.*
Lace-winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 244. n. 42.*

Habitat in insula Luzonia, ultra 11 pollices longus.
*Rostrum rubrum; alarum medium cæruleum; cauda ⅓ lon-
gitudinis totius corporis; alæ complicatae ad medium
caudæ usque; pedes obscuri.*

virescens. 77. *Ps. virescens, teñtricibus alarum minoribus basi intusque
albis, extus & apice flavis, remigibus quiuque primis
intus nigris, margine albo, septem proximis albis,
margine & apice flavis.*

Psittaca cayenensis. Briss. av. 4. p. 334. n. 60. t. 27. f. 2.
Perruche à ailes variées. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 259.*

Petite perruche verte de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 359.*
Yellow winged Parrakeet. *Lath. syn. I. I. p. 244. n. 43.*

*Habitat in Cayenna numerosissimus, non timidus, docilis,
erythrinae coralliodendri floribus se delectans, 8 pollices
longitudine superans.*

*Rostrum cum cera albido; teñtrices alarum a corpore re-
motissimæ ex virecente cæruleæ; subtus corpori proxi-
mae sulphureæ, exteriores ex cærulecente virides; re-*

*miges plurimæ extus & apice flavæ, intus ex flavicantib;
albae; 4 corpori proximæ virides; rectrices marginæ
interiore flavigentes.*

versicolor. 78. Ps. viridis, capite gulaque fuscis, hac fulvo undulata;
alis cæruleis plica flammea, abdomine ex purpurascente
dilute cæruleo, venis fuscis.

Perruche à gorge variée. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 259.
Perruche à gorge tachetée de Cayenne. *Buffon pl. enlum.*
n. 144.

Perruche Nr. 2. *Fermin Surin.* 2. p. 177.

Waved-breasted Parrakeet. *Lath. syn.* I. 1. p. 245. n. 44.
Habitat in Cayenna & Surinamo, virescens et aequalis.

Rostrum, pedes & unguis nigra; irides flammeæ; capis-
trum supra schisti, subtus cæli colore; cauda linea lon-
gitudinali ex purpurascente dilute cærulea (lilac),
subtus ex rubro fusca.

incarna- 79. Ps. viridis, rostro, pedibus & unguibus incarnatis,
tus. cera orbitisque albida, gula teætricibusque alarum
rubris.

Psittaca indica. *Briss. av.* 4. p. 341. n. 63.

Perruche à gorge ronge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 157.
Little redwinged Parrakeet. *Edw. glaz.* t. 236. *Latham*
syn. I. 1. p. 246. n. 46.

Habitat in India, 8½ pollices longus.

Irides castaneæ; cauda 4½ pollices longa.

murinus: 80. Ps. olivaceus, facie, gula & pectore murinis, remi-
gibus viridibus.

Perruche. *Pernatt. it. Malouin.* I. p. 312.

Perruche souris. *Buffon hist. nat. des ois.* 6. p. 148.

Perruche à poitrine grise. *Buffon pl. enlum.* n. 768.

*Habitat in Montevideo, mansuetus & docilis, 10 pollices
longus.*

Rostrum & pedes grisei; cauda 5 pollicum.

cornutus. 81. Ps. viridis, capite coccineo, pennis duabus elongatis
exstantibus, torque & uropygio stramineis, remigant
rectricumque marginæ exteriore cæruleo.

Horned Parrot. *Latham syn.* I. 1. p. 248. n. 48. t. 8.

Habitat in nova Caledonia, 11 pollices longus.

Rostrum & pedes ex atro cærulei; tempora aurantia; irides
aureæ; pennæ 2 verticis exstantes 1½ pollices longæ;
rectrices alarum intus & apice obscuræ; cauda subtus atra.

caledoni- 82. Ps. olivaceus, vertice ex virescente flavo, rectricibus
cus. apice albicantibus, 4 extimis margine exteriori pallide
cæruleis.

Caledonian Parrot. Latham syn. I. I. p. 248. n. 49.
Habitat in nova Caledonia, 12 pollices longus.

Rostrum cærulescens, apice pallido; capistrum supra rubrum, subtus cæruleum; corpus supra magis in viridem, subtus magis in flavum colorem vergens; pedes ex atro cærulei; an femina cornuti?

novæ. 83. Ps. viridis, fronte purpurea, vertice badio, stria a basi rot-
Seelan- tri per oculos ducta rubra, rectricibus cærulescentibus,
diæ. intermediarum duarum margine viridi, uropygio rubro.

Red rumped Parrot. Latham syn. I. I. p. 249. n. 50.
Habitat in nova Seelandia, 15 pollices longus.

Rostrum profunde cæruleum apice nigrum; in cervice pennæ nonnullæ pallide flavæ, in dorſi medio ex pallide ferrugineo fuscæ; tempora pallide viridia; abdomen ex cincere viride; remiges primariæ fuscæ, margine cærulescente, secundariæ & alæ spuriæ obscuræ margine viridi & apice pallide ferrugineo; pedes nigri.

novæ 84. Ps. olivaceus, capite cristato & gula flavis, macula pone
Hollan- oculos rubra, falcia alarum obliqua alba.
diæ. Crested Parrakeet. Latham syn. I. I. p. 250. n. 51.

Habitat in nova Hollandia, 12 pollices longus.

Rostrum pallidum; crista pennis 6 gracilibus, quarum 2 pollices 3 fere longæ, reliquæ breviores; pedes obscuri; feminæ caput & corpus magis in badium vergunt; uropygio & cauda lineis transversis griseis picta.

Ulietanus. 85. Ps. olivaceus, capite ex atro fusco, uropygio obscure
rubro, alis candaque obscuris.

Society Parrot. Latham syn. I. I. p. 250. n. 52.
Habitat in Ulietca, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum ex atro cæruleum, apice nigrum; pennæ margine obscuro, subtus magis in flavum vergentes; pedes nigri.

multico- 86. Ps. viridis, capite, gula & abdomine cæruleis, pedore
lor. anteriore rubro, posteriore & cauda subtus lutea,
torque albo.

White collared Parrot. Gener. of birds. p. 59. t. 2. Latham
syn. I. I. p. 251. n. 53.

Habitat in insulis oceanii indici; rostrum rubrum.

aureus. 87. Ps. viridis, cera orbitisque ex cæruleo incarnatis, vertice aureo, tectricibus alarum fascia obliqua cærulea. Psittaca brasiliensis. Briss. av. 4. p. 337. n. 61.

Perruche couronnée d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 271. Golden-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 235. Latham syn. I. I. p. 251. n. 54.

Habitat in Brasilia.

Rostrum nigrum; irides aurantiæ; gula ex flavicante viridis, rubro admisto, pedes rubicundi; unguis nigricantes.

lineatus. 48. Ps. viridis, remigibus subtus fuscis, margine interiore pallidis.

Magnitudo turturis; color subtus magis in flavum vergens; alæ subtus lineis pallidis longitudinalibus tenuissimis; cauda corpore longior.

Pacificus. 88. Ps. viridis fronte & macula pone oculos & utrumque ad uropygium rubra, alarum margine exteriore cæruleo, cauda subtus cinerea.

Pacific Parrakeet. Latham syn. I. I. p. 252. n. 56.

β . Ps. macula ad uropygium nulla,

γ . Ps. uropygio rubro.

δ . Ps. vertice flavo.

Habitat in insulis maris pacifici, 12 pollices longus.

Rostrum argenteum, apice nigro; pedes fusti; unguis nigri.

Palma- 89. Ps. viridis, rostro pedibusque rubris, remigum apice & rium. margine atro.

Palm Parrot. Latham syn. I. I. p. 253. n. 57.

Habitat in insula Tanna, palmas frequentans, 8 pollices longus.

Color subtus magis pallidus, in abdomine & caudæ apice in flavum vergens.

australis. 90. Ps. viridis, vertice cæruleo pennis elongatis cristato, gula & abdomine medio rubris, femoribus purpureis.

Blue crested Parrakeet. Latham syn. I. I. p. 254. n. 58.

Habitat in insulis Sandwich, 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Rostrum aurantium; frons pallide viridis; tectrices 2 intermediae virides, apice flavo; reliquæ flavicantes, margine & apice viridi; pedes obscuri; unguis nigri.

taitianus. 91. Ps. cæruleus, capitis pennis elongatis, gula juguloque albis, rostro pedibusque rubris.

Arimanion. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 175.

Petite Perruche de l'île de Taiti. *Buffon planch. enlum. n. 455. f. 2.*

Otaheitian blue Parrakeet. *Latham syn. I. I. p. 255. n. 59.*
Habitat in insula Taiti, sonorus, frequens, musæ fructibus vivitans, longitudine 5 pollices parum excedens.

pygmæus. 92. Ps. viridis, pennarum apice ex virescente flavo, remigibus intus obscuris.

Pygmy Parrakeet. *Latham syn. I. I. p. 256. n. 60.*
Habitat in insulis maris australis, 6 pollices longus.
Rostrum albicans; cera obscura; pedes plumbei.

agilis. 20. Ps. viridis, tectricibus remigum primorum cærulescens fulvis, cauda vix elongata subtus rubra, orbitis cinereis.

Psittacus cayenensis. *Briff. av. 4. p. 237. n. 23.*

Criq. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 228.*

Criq de Cayenne. *Buffon pl. enlum. n. 839.*

Little green Parrot. *Edw. av. 4. t. 168.*

Agile Parrot. *Latham syn. I. I. p. 297. n. 101.*

Habitat in America, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus, coccothraustæ magnitudine.

Rostrum & pedes cinerea; irides badiæ; remiges intus & apice nigrae; rectrices 2 intermediae virides; 3 proximæ intus $\frac{3}{4}$ longitudinis rubrae.

* * Brachyuri, cauda æquali.

coronatus. 21. Ps. viridis, crista plicatili rubra apice cærulea.

Cockatoo of Guiana. *Bancr. Guj. p. 160.*

Crowned Cockatoo. *Latham syn. I. I. p. 259. n. 65.*

Habitat in Surinamo & Guiana, cristati magnitudine.

Frons flava; crista coccinea, apice lucide cæruleo; rectrices extimæ latere exteriori cæruleæ; crissum rubrum, pennarum apice cæruleo.

aterrimus. 93. Ps. niger, crista magna dilutiore, genis rubris nudis.

Kakatoës noir. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 97.*

Great black Cockatoo. *Edw. glean. t. 316.*

Black Cockatoo. *Latham syn. I. I. p. 260. n. 66.*

Habitat in nova Hollandia. Magnitudine Macao.

Rostrum obscure fuscum; pedes ex fusco nigri.

fulphureus. 94. Ps. albus, crista plicatili acuminata, & macula infra oculos sulphureis.

Cacatua lutéo-cristata. *Briff. av. 4. p. 206. n. 9.*

Kakatoës à huppe jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 93.*
pl. enlum. n. 14.

Crested Parrot or Cockatoo. *Albin. av. 3. t. 12.*

Lesser white Cockatoo. *Edw. glean. t. 317. Lath. syn. I. I. p. 258. n. 64.*

Habitat in insulis Moluccis, 14½ pollices longus.

Rostrum & cera nigricant; irides rubent; color subtus in sulphureum inclinans; pedes nigri.

Philippi- 95. *Pf. albus, crista sulphurea plicatili apice alba, orbitis ex
 parum. flavicante rubris, rectricibus caudæ inferioribus rubris
 albo punctatis.*

Cacatua minor. *Briff. av. 4. p. 212. n. 11. t. 22. f. 1.*

Petit Kakatoës à bec couleur de chair. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 96.*

Petit Kakatoës des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 191.*

Red-vented Cockatoo. *Brown illust. p. 10. t. 5. Latham syn. I. I. p. 258. n. 63.*

Habitat in insulis Philippinis, 13½ pollices longus.

*Rostrum album, basi ut plurimum cinereum; cera grisea;
 orbitæ ex flavicante rubræ; crista pennæ longissimæ
 sesquipolligares; inferiorum aliquæ pallide rubræ; rectri-
 ces 2 intermediae albæ, laterales intus ad medium usque
 sulphureæ; pedes & unguis plumbei.*

Moluc- 96. *Pf. albus in colorem dilute roseum inclinans, crista subtus
 ceas. rubra, rectricibus lateralibus intus a basi ad medium
 usque sulphureis.*

Cacatua rubro cristata. *Briff. av. 4. p. 209. n. 10.*

Kakatoës à huppe rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 95.*
pl. enlum. n. 498.

Greater Cockatoo. *Edw. av. 4. t. 160.*

Great red-crested Cockatoo. *Lath. syn. I. I. p. 257. n. 62.*

Habitat in insulis Moluccis, 17½ pollices longus.

*Rostrum ex cæruleo nigrum; cera & unguis nigra; orbitæ
 griseæ; irides rubræ; crista 6½ pollices longa; pedes
 plumbei.*

Cristatus. 22. *Pf. albus, crista plicatili flava.*

Cacatua. *Briff. av. 4. p. 204. n. 8. t. 21.*

Psittacus albus cristatus. *Aldrov. orn. l. 11. c. 4. Raj. av.
 p. 30. n. 1.*

Kakatoës à huppe blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 92.*

Kakatoës des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 263.*

White crested Parrot of Aldrovandus. *Albin. av. 3. p. 12^t.*
t. 12. Will. orn. p. 112. t. 15.

Great white Cockatoo. *Lath. syn. I. I. p. 256. n. 61.*
Habitat in insulis Moluccis, 18 pollices longus.

Rostrum, cera, irides, pedes & unguis nigra; orbitæ nu-
 dæ & albae; reniges & laterales rectrices a basi ad me-
 dium intus sulphureæ; cervicis pennæ laxæ & fluctuan-
 tes; crista 5 pollices longa, uti 92-96 upupæ flicatilis,
 tegens verticis calvitiem pennis duplii serie, sed alter-
 natim connivente imbricatis, quas erigit affectu quois
 excitatus.

erythro- 23. *Ps. cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis,*
leucus. *Psittacus erythroleucus. Aldrov. orn. I. p. 675. Raj. av.*
p. 31. n. 7.

Cacatua alis & cauda rubris. *Briff. av. 4. p. 214. n. 12.*
 Kakatoës à ailes & queue rouges. *Buff. hist. nat. des ois.*
6. p. 96.

Red and white Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 8. Lath. syn.*
I. I. p. 260. n. 67.

Magnitudo gallinæ; longitudo 17 pollicum; rostrum &
 unguis nigræ; dorsi pars inferior punicea; pedes
 nigricantes.

eritha- 24. *Ps. canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea. Mus.*
cus. *Ad. Frid. I. p. 14. Scop. ann. I. p. 31. n. 30.*
Psittacus guineensis cinereus. Briff. av. 4. p. 310. n. 49.
Psittacus cinereus f. subcæruleus. Aldr. orn. I. p. 675. t. 67^b.
Raj. av. p. 31. n. 8.

Perroquet cendré ou Jaco. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 100.*
pl. enlum. n. 311.

Ash-coloured Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 7. Albin. av. I.*
t. 12. Lath. syn. I. I. p. 261. n. 68.

Grauer Papagay mit rothem Schwanz. *Frisch. av. t. 51.*

β. *Psittacus alis rubris. Briff. av. 4. p. 313. n. 49. A.*

γ. *Psittacus rubro-varius. Briff. av. 4. p. 313. n. 49. B.*
 Ash-coloured and red Parrot. *Edw. av. 4. t. 163.*

δ. *Psittacus ruber, capite cinereo, genis nudis, remigibus*
piimariis ex cinereo fuscis. Scopol. ann. I. p. 32. n. 31.

Habitat in Africa occidentali, 20 pollices longus, loquax
varias modulatur gutture voces, scurrili strepitu, quicquid & audit, ait.

Rostrum nigrum; cera alba; irides ex flavicante albae;
 pedes cinerei; unguis nigricantes.

cinereus. 97. Ps. totus ex cærulecente cinereus.

Psittacus brasiliensis cinereus. Briss. av. 4. p. 313. n. 50.

Maracana. Will. orn. p. 112. n. 5.

Maracana Brasiliensis, prima Maregravii. Raj. av. p. 29. n. 4.

Cinereous Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 263. n. 69.

Habitat in Guinea, erithaco major.

meridio- 98. Ps. supra ex virescente cinereus, subtus spadiceus, orbitis, nalis.

vertice, occipite & cervice cinereis, pennarum apice fusco.

Southern brown Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 264. n. 70.

Habitat in nova Seelandia, 16 pollices longus.

Rostrum ex cæruleo nigrum; pedes nigri.

mascari- 49. Ps. cinereus capistro subtus nigro, orbitis nudis rubicundis, rectricibus lateralibus basi albicantibus. Mantiss.

1771. p. 524. Briss. av. 4. p. 315. n. 52.

Mascarin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 120. t. 5. pl. enlum. n. 35.

Mascarine Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 265. n. 72.

Habitat in Mascarin, 13½ pollices longus.

Rostrum, cera & pedes rubicunda; vertex & cervix pallidiores; unguis grisei.

fuscus. 99. Ps. totus ex cinereo fuscus. Briss. av. 4. p. 314. n. 51.

Brown Parrot. Lat. syn. I. 1. p. 266. n. 73.

Longitudo 13½ pollicum.

garulus. 25. Ps. ruber, orbitis, cinereis, genis alisque viridibus, rectricibus medietate postica cæruleis. Mus. Ad. Frid. 2. p. 14.

Psittacus ruber, remigibus rectricibusque introrsum purpureis. It. wgoth. 137.

Lorius ceramensis. Briss. av. 4. p. 215. n. 13.

Lory. Raj. av. p. 151. n. 5.

Purple Parrot. Charlet. exerc. p. 75. n. 16.

Scarlet Parrakeeto with green and black Wings. Will. orn. p. 117.

Lory de Ceram. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. var. 2.

Ceram Lory. Lath. syn. I. 1. p. 269. n. 76.

Ganz rother Papagay. Frisch. av. t. 45.

auroræ. β. Ps. coccineus, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis, medietate postica virescentibus. Syft. nat. 10. n. 22.

Psittacus coccineus orientalis, alis ex viridi & nigro variis.

Raj. av. p. 31. n. 9.

Noira variété. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 129. n. 1.

moluc- γ. Psittacus humeris luteo-maculatis. Briss. av. 4. p. 219¹
censis. n. 14. t. 23. f. 1.

Lori Noira. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 127.

Lori des Moluques. Buffon pl. enlumi. n. 216.

Scarlet Lori. Edw. av. 4. t. 172. Lath. syn. I. 1. p.
270. n. 76. B.

♂. Psittacus teetrichibus alarum plurimis cæruleo punctatis.
Habitat in insulis Moluccis, 10 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum aurantium; cera cinerea; irides flavæ; pedes
fuscæ, in β. nigri; unguis nigri; teetriches alarum mi-
nores & inferiores ex flavo & viridi variæ; β. virides;
γ. primo flavæ, tum virides, dein virides flavo punctatae;
alæ spuriæ violaceæ; remiges majores, obscure virides
intus coccineæ, apice cinereæ; in β. nigrae, extro-
sum virides, subtus obscure; in γ. obscure virides, in
cæruleum vergentes. Rectrices 2 intermediae basi virides,
tum rubræ punctis viridibus, proximæ $\frac{2}{3}$ longitudo inis
rubræ, tum virides, reliqua basi coccineæ, tum viola-
ceæ punctis obscure viridibus; in β. exterior pars
caudæ flava, apex ex flavo viridis; in γ. rectrices
omnes subtus ex rubro flavae.

domicel- 26. Ps. ruber, pileo violaceo, alis viridibus, humeris geni-
busque cæruleis, orbitis fuscis.
la.

Lorius orientalis indicus. Briss. av. 4. p. 22. n. 15. t. 24. f. 1.

Lory des Indes orientales. Buff. pl. enlumi. n. 84.

Lori à collier. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 130.

Second black-cap Lory. Edw. av. 4. t. 171.

Purple-capped Lory. Lath. syn. I. 1. p. 271. n. 77.

β. Psittacus pileo cæruleo.

Lorius torquatus indicus. Briss. av. 4. p. 130. n. 18.

Lori à collier. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 131.

Lori mâle des Indes orientales. Buff. pl. enlumi. n. 119.

Laurey from the Brasils. Albin. av. I. t. 13.

Habitat in insulis Moluccis & nova Guinea, docilis,
diffinide loquens, 11 fere pollices longus.

Rostrum rubrum, in β. flavicans; cera cinerea; orbitæ
β. nigrae; irides flavæ; lunula ad pedus, β. torques
flavus, β. dorso, uropygio & abdome ex albo & roseo
misti; β. cauda purpurea, teetrichibus ejus ex albo &
rubro variis; β. remiges cæruleæ, minores cum teetrichi-
bus ex flavicante virides; pedes subatri; unguis nigri.

- Lory. 27. Ps. purpureus, pileo violaceo, alis viridibus, pectore, genibus caudaque cæruleis, orbitis subincarnatis.
Lorius philippensis. Briff. av. 4. p. 225. n. 16. t. 234 f. 2.
Lori tricolor. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 132.
Lory des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 168.
Firit black cap Lori. Edw. av. 4. t. 170.
Black-capped Lori. Lath. syn. I. I. p. 273. n. 78.
Habitat in insula Yolo & reliquis Philippinis, 10 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum & irides aurantia; cera cinerea; rectrices partim rubrae, partim virides, exteriores margine extremo violaceæ; pedes nigricantes.
- Puniceus. 100. Ps. saturate coccineus, subtus violacens, teætricibus alarum minoribus & inferioribus, remigibusque intus & subtus ex nigricante fuscis.
Lorius amboinensis. Briff. av. 4. p. 231. n. 19.
Lory d'Amboine. Buff. pl. enlum. n. 518.
Lori Cramoisi. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 133.
Blue breasted Parrot. Brown's illustr. t. 6.
Crimson Lori. Lath. syn. I. I. p. 273. n. 79.
Habitat in Amboina, 11 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum rubrum, aliquando nigrum; cera orbitæque nigricantes; irides aurantiæ; rectrices apice sordidæ rubrae aut aurantiæ; pedes fusci; unguis nigri.
- Ruber. 101. Ps. ruber, arca oculorum remigibusque nigris, alarum macula & teætricibus caudæ inferioribus cyaneis, caudæ apice badio.
Lori de Gilolo. Sonnier. it. p. 177. t. 112.
Lori rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 134.
Lori de la Chine. Buff. pl. enlum. n. 519.
Molucca Lori. Lath. syn. I. I. p. 274. n. 80.
Ps. humeris, ab domine, criffo, remigum secundariarum & teætricum alarum majorum apicibus cæruleis.
Habitat in Moluccis insulis & nova Guinea, 9-10 pollices longus.
- Grandis. 102. Ps. ruber, subtus ex rubro, cæruleo, violaceo & viridi mistus, nucha violacea, alis cyaneis, caudæ apice flavo.
Purpur-roode Lori. Vosmaer Monogr. 1769. p. 10 t. 7.
Lori de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 683.
Grand Lori. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 135. Lath. syn. I. I. p. 275. n. 81.

. psittacus corpore supra ex fusco & viridi vario, subtus cæruleo, alarum margine & tectricibus alarum inferioribus cæruleis, cauda badia.

Habitat in Zeylona, 13 pollices longus. Rostrum nigrum.

guineen- 103. Ps. capite colloque coccineis, superciliis & pectore flavescentibus, alis ex luteo virentibus apice cæruleis, abdomine, uropygio caudaque tubus canis, apice coccineis. *Miller illustr. t. XXIX.*

Yellow-breasted Lory. *Lath. syn. I. I. p. 276. n. 82.*

Habitat in Guinea, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; cera, gula, & orbitæ albæ; unguis nigri.

paragua- 104. Ps. coccineus, capite, cervice, criffo, cauda, humeris alisque nigris.

Lorius brasiliensis. Briff. av. 4 p. 229. n. 17.

Paragua. *Raj. av. p. 33. n. 4. Will. orn. p. 115. n. 9.*
Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 248.

Paraguan Lory. *Lath. syn. I. I. p. 277. n. 83.*

Habitat in Brasilia? Rostrum cinereum; irides rubræ.

niger. 29. Ps. cauda elongata æquali, corpore cærulecente nigro, rostro orbitisque albidis.

Psittacus madagascariensis niger. Briff. av. 4. p. 317. n. 53.
Vasa ou Perroquet noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 119.

t. 4.

Perroquet noir de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 500.*

Black Parrot of Madagascar. *Edw. av. I. t. 5.*

Black Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 264. n. 71.*

Habitat in Madagascar, 13½ pollices longus.

Rostrum rubicundum; irides fuscæ; pedes carnei; unguis nigri.

cæruleo- 28. Ps. cæruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertex flavo, remigibus rectricibusque rubris.
cephalus.

Psittacus gujanensis cæruleus. Briff. av. 4. p. 304. n. 46.

Psittacus versicolor s. erythrocyanus. Aldr. orn. I. p. 675.

Raj. av. p. 31. n. 6.

Crik rouge & bleu. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 226.*

Red and blue Parrot. *Will. orn. p. 114. n. 6. Lath. syn.*

I. I. p. 277. n. 84.

Habitat in Guiana, 9 pollices longus.

Rostrum nigricans; orbitæ nudæ, albidæ; irides flavæ; pedes ex rubro grisei.

varius. 105. *Ps. ex fusco & cyaneo varius, genis, gula juguloque albicantibus, remigibus rectricibusque obscure fuscis, latere exteriore cyaneis.* Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 48.

Habitat in America australi, parum ultra 5 pollices longus; rostro pedibusque flavescens, unguibus nigris.

violaceus. 106. *Ps. violaceus viridi & nigro admisto varius, dorso ex fusco viridi, remigibus majoribus nigris, reliquis ex luteo, viridi & rubro variis, tectricum macula rosea.* Psittacus aquarum Lupiarum insulæ. Briss. av. 4. p. 302. n. 44.

Crick à tête violette. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 233.

Perroquet de la Guadeloupe. du Tertre antill. 2. p. 250. fig. p. 246.

Ruff-necked Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 268. n. 75.

Habitat in insula aquarum Lupiarum.

Rostrum & orbitæ incarnata.

fringilla- 107. *Ps. viridis, capite cyaneo, genis, gula, jugulo & maculaque abdominis ex lacteo ianguineis, abdomine violaceo.* Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien. I. 2. p. 47.

Habitat in America australi, fringillæ magnitudine, 6 pollices longitudine superans. Rectrices latere interiori & apice; rostrum & pedes pallide lutea; unguis subfuscus.

chloræus. 108. *Ps. viridis, subtus cinereus, orbitis incarnatis.* Molina hist. nat. Chil. p. 228.

Habitat in Chili, moribus & vicetu cum Jaquilma conveniens.

finensis. 109. *Ps. viridis, alarum tectricibus inferioribus rubris, majoribus nonnullis & margine cæruleis, cauda subtus fulca.* Psittacus finensis. Briss. av. 4. p. 291. n. 39.

Perroquet de la Chine. Buff. pl. entom. n. 514.

Perroquet vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 116.

Grand Perroquet vert de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 174. t. 108.

Green and red Parrot from China. Edw. glean. t. 231. Lath. syn. I. 1. p. 278. n. 85.

Habitat in Sina australi, Amboina, nova Guinea, gallinæ magnitudine.

Cera nulla; orbitæ non nudæ; mandibula inferior nigra, superior rubra, apice flavicans; irides aurantiæ; pedes & unguis nigri.

macro- 110. *Ps. viridis subtus in flavum vergens, alis ex cyaneo & rhynchos. viridi mixtis tectricibus nigris.*

Perroquet à bec couleur de sang. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 122.*

Perroquet de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enlum. n. 713;*
Great billed Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 278. n. 86.*

Habitat in nova Guinea, 14 pollices longus.
Rostrum magnum, sanguineum.

grami- 111. *Ps. viridis, subtus olivaceus, fronte & vertice cæruleis,*
neus. cauda subtus flava.

Grand Perroquet vert à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 122.*

Perroquet d'Amboine. *Buff. pl. enlum. n. 862.*

Amboina Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 279. n. 87.*

Habitat in Amboina, 16 pollices longus. Pedes plumbei.

leucoce- 30. *Ps. viridis, remigibus cæruleis, fronte alba, orbitis niveis,*
phalus. Psittacus martinicanus. Briss. av. 4. p. 242. n. 26.

Amazone à tête blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 212.
t. 9.

Perroquet à front blanc du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 335.*

White-headed Parrot. *Edw. av. 4. t. 166.*

White-fronted Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 279. n. 88.*

β. *Psittacus martinicanus gutture rubro. Briss. av. 4. p. 244.*
n. 27.

Psittacus leucocephalus. Aldr. orn. I. p. 670. Raj. av. p. 31.
n. 5. p. 181. n. 7.

Amazone à tête blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 221.
var.

Perroquet de la Martinique. *Buff. pl. enlum. n. 549.*

White-headet Parrot. *Will. orn. p. 113. n. 5. Lath. syn.*
I. 1. p. 280. n. 88. A.

γ. *Psittacus capite a fronte ad verticem albo, ceterum pallide*
cæruleo.

White crowned Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 281. n. 88. B.*

δ. *Psittacus martinicanus cyanocephalus. Briss. av. 4. p.*
251. n. 29.

Papagai à ventre pourpre. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 242.*

Papagai à ventre pourpre de la Martinique. *Buff. pl. enlum.*
n. 548.

Ash crowned Parrot. *Latham syn. I. 1. p. 281. n. 88. C.*

Habitat in insula Martinica, & etiam in Jamaica, & in

nova Hispania.

Corpus magnitudine columbae, viride, pennarum margine
fusco aut rubro; caput supra & ad latera cæruleum, in

$\beta.$ postice viride; gula tota rubra, in $\gamma.$ & $\delta.$ viridæ; remiges nigræ latere exteriore denudato cæruleæ; rectrices & quales virides, basi rubræ, apice flavescentes; at I, I latere exteriore cæruleo, 6, 6 unicolores; abdomen postice non raro ferrugineuni.

Ochrocephalus- 112. Ps. viridis, vertice flavo, tectricibus alarum rubris, remigibus ex viridi, nigro, violaceo & rubro variis, tectricibus duabus extimis basi intus rubris.

Psittacus amazonicus brasiliensis. Briss. av. 4. p. 272. n. 35. t. 26. f. 1.

Amazone à tête jaune. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 208. Yellow-headed Amazon Parrot. Latham syn. I. I. p. 282. n. 89.

$\beta.$ Amazone à tête jaune, var. 1. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 209. Perroquet vert & rouge de Cayenne. Buff. planch. enlumi. n. 312.

$\gamma.$ Psittacus poikilorhynchos Aldrovandi. Raj. av. p. 30. n. 3. Psittacus amazonicus poikilorhynchos. Briss. av. 4. p. 270. n. 34.

Amazone à tête jaune; var. 2. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 210.

Aldrovandus his Parrot, with a parti-coloured bill. Will. orn. p. 113.

Habitat in America australi, $\gamma.$ ad 18 pollices longus. Rostrum cinereum, basi rubrum; in $\beta.$ rubens; in $\gamma.$ mandibula superior supra ex cærulescente viridis, lateribus ochracea, apice macula alba, inferior plumbea, medio flava; irides flavæ; vertex in $\beta.$ macula tantum flava; pedes plumbrei; ungues nigri.

barba- 113. Ps. viridis; orbitis & fronte cinereis, vertice, genis, gula, jugulo, alarumque tectricibus minoribus flavis, majoribus cæruleis, remigibus primariis multis extus violaceis, reliquis a basi ad medium rubris, cetera cæruleis. Ashfronted Parrot. Lath. syn. I. I. p. 284. n. 90.

Habitat in Barbados, columbae magnitudine.

Rostrum corneum; pedes cinerei; ungues nigri.

lucionen- 31. Ps. viridis, occipite uropygioque cæruleis, alis nigro, sis. cæruleo rubroque notatis.

Psittacus lucionensis. Briss. av. 4. p. 295. n. 41. t. 22. f. 2. Manilla Green Parrot. Lath. syn. I. I. p. 296. n. 93.

*Habitat in insula Luzonia, columbae magnitudine, 12¹/₂
pollices longus.*

*Rostrum coccineum, apice album; cera rubens; pedes
cinerei; unguis nigricans.*

festivus. 32. *Ps. viridis luteo-submaculatus, fronte cærulea, humeris
sanguineis, orbitis incarnatis.*

Psittacus amazonicus. Briff. av. 4. p. 256. n. 31.

Ajuru-curau. Raj. av. p. 32. n. 1. Marcgr. bras. 205.

Aouron-couraou. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 215.

Perroquet Amazone. Buff. planch. enlum. n. 547.

Marcgravius middle-sized Parrot, 1st species. Will. orn. p. 115.

Common Amazons Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 284. n. 91.

*β. Psittacus jamaicensis icterocephalus. Briff. av. 4. p. 233¹/₂
n. 20.*

Psittacus viridis melanorhynchos. Aldrov. av. I. II. c. 7¹/₂

Raj. av. p. 30. n. 4.

Aourou-couraou, var. 1. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 216.

*Black-billed green Parrot of Aldrovandus. Will. orn. p.
113. n. 4.*

*Jamaica-Parrot. Brown. jam. p. 473. Lath. syn. I. 1.
. p. 285. n. 91. A.*

γ. Psittacus amazonicus jamaicensis. Briff. av. 4. p. 276. n. 36.

*Psittacus viridis alarum costa superne rubente. Raj. av. p.
30. n. 2. p. 181. n. 6.*

Aourou-couraou, var. 2. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 217.

*Common green Parrot with the ridge of the wing. red.
Will. orn. p. 113. n. 2.*

*Main Parrot. Brown. jam. p. 472. Lath. syn. I. 1. p. 285.
n. 91. B.*

*δ. Psittacus brasiliensis cyanocephalus. Briff. av. 4. p. 234¹/₂
n. 21.*

Aourou-couraou, var. 3. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 219.

*Ajuru-curuca. Raj. av. p. 33. n. 3. Will. orn. p. 115.
sect. 9.*

Blue-topped Parrot. Lath. syn. I. 1. p. 286. n. 91. C.

*ε. Psittacus amazonicus varius. Briff. av. 4. p. 281. n. 37¹/₂
t. 26. f. 2.*

Ajurucurau 2. Marcgr. bras. 205.

Aourou-couraou, var. 4. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 219.

*Psittacus major, seu mediæ magnitudinis, Marcgr. 2¹/₂
species. Raj. av. p. 33. n. 2.*

Second species of Marcgrave. Will. orn. p. 115. f. 9.

Great green Parrot from the Westindies. Edw. av. 4^t. 162¹/₂.

Habitat in America australi.

Corpus magnitudine columbae, dorso adsperso pennis fulvis; facies flava; frons cærulea; vertex albidus, in ♂. cæruleus, macula flava; rectrices apice pallidiores; 1, 2, 3, basi interiori rubrae; at 1 latere ctiam exteriore cærulea; humeri fulvi vel sanguinei; remiges primores nigræ apice cærulescentes latere interiore nigræ, exteriore virides; secundariae anteriores latere exteriore versus basin rubrae; rostrum, saltet apice nigrum, e. cinereum.

amazo-
nius.

33. Ps. subvirens, fronte flava, temporibus fulvis.

*Psittacus amazonicus fronte lutea. Briss. av. 4. p. 261. n. 32.
Aourou-couraou, var. 5. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 221.
Brasilian yellow-fronted Parrot. Latham syn. I. I. p. 287. n. 91. E.*

Habitat in Brasilia & Amazonum terra, æstivo valde affinis, forte varietas, sed duplo major. Remiges exteriore cæruleæ, medio rubrae; rectrices extimæ medio exteriore cæruleæ; laterales interiori latere rubrae.

luteus,

114. Ps. viridis, vertice cyaneo, humeris flavis, tectricibus alarum majoribus macula aurantia.

*Yellow shouldered Parrot. Lath. syn. I. I. p. 288. n. 92.
Habitat in America meridionali, 11 pollices longus.*

ochro-
pterus.

115. Ps. viridis, fronte orbitisque albidi, vertice, genis, gula, jugulo, tectricibusque alarum remotioribus flavis. *Psittacus amazonicus, gutture luteo. Briss. av. 4. p. 287. n. 38.*

*Crick à tête & gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 222.
Yellow-headed Creature. Bancr. Gujan. p. 159.*

*Yellow-winged Parrot. Lath. syn. I. I. p. 289. n. 93.
Habitat in America australi, 13 pollices longus, minus docilis.*

Rostrum albidum; pennæ corporis superiores margine nigro; rectrices alarum minores corpori proximæ rubrae, margine flavo; remiges nigræ, nonnullæ margine cæruleo & viridi; mediae 4 basi intus rubrae; rectrices 4 intermediae apice flavicantes; proximæ tres basi ad medium usque rubrae; extimæ margine exteriori cæruleæ, pedes cinerei.

Pulveru-
fentus.

116. Ps. viridis & supra quasi farina conspersus, capitis mancula flava, alarum rubra.

Meunier ou Crick poudré. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 225.

AVES PICÆ. Psittacus.

Meunier de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 861.*

Meally green Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 291. n. 94.*

Habitat in Cayenna, distinæ garriens, americanorum maximus.

Rostrum ex albido corneum; pennæ faciei subtus margin'e obsoleto fusco; remiges extrorsum nigrae.

havanen- 117. *Ps. viridis, fronte, gula & jugulo ex cipereo cæruleis, pectoris macula magna rubia, orbitis cipereis.*

Psittacus amazonicus gutture cæruleo. Briff. av. 4. p. 266. n. 33. t. 25. f. 1.

Crick à face bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 227.*

Perroquet de la Havane. *Buff. pl. enlum. n. 360.*

Blue-fronted Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 291. n. 95.*

Habitat Havanæ, 12 pollices longus.

Pennæ supra apice nigro, subtus cærulescente; remiges maiores nigrae; pedes grisei.

paradisi. 34. *Ps. luteus, gula, ventre, rectricumque basi rubris.*

Psittacus luteus insulæ Cubæ. Briff. av. 4. p. 308. n. 48.

Papagai de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 237.*

Perroquet de Cuba. *Buff. pl. enlum. n. 336.*

Cuba Parrot. *Brown. jam. p. 473.*

Parrot of Paradise of Cuba. *Catesb. carol. I. t. 10.*

Paradis Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 300. n. 105.*

Habitat in Cuba, 12 $\frac{1}{2}$ pollices circiter longus.

Rostrum, pedes nudæque orbitæ alba; irides rubræ; remiges maiores albæ; rectrices 2 intermedie totæ, reliquæ extrema tertia parte flavæ, ceterum rubræ.

aurora. 50. *Ps. flavus, axillis, alarum marginibus, remigibusque majoribus extrorsum in medio rubris. Mant. 1771. p. 524.*

Psittacus luteus. Briff. av. 4. p. 306. n. 47.

Perroquet jaune. *Salern. orn. p. 69. n. 9. t. 7. f. 2. Buff. pl. enlum. n. 13.*

Amazone jaune. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 214. t. 10.*

Aurora-Parrot. *Lath. syn. I. I. p. 301. n. 106.*

Habitat in Brasilia, æstivo æqualis, 12 pollices longus.

Rostrum, cera, pedes & unguis alba; palpebræ & irides rubræ; cauda rotundata; rectrices 4 extiniæ a basi ad medium intus rubræ.

pafferi- 47. *Ps. luteo-virens, macula alarum alisque subtus cæruleis, nus.*

Mus. Ad. Frid. I. p. 14. 2. p. 16.

Psittacula brasiliensis. Briff. av. 4. p. 384. n. 81.

Tuiete. *Raj. av. p. 34. n. 6. Will. orn. p. 116. c. 14. n. 6.*
Été ou Toui-été. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 283.

Least green and blue Parrakeet. *Edw. glean. t. 235.*
 Short tailed yellowish green Parroquet. *Bancr. Gujan. p. 162.*

Little blue and green Parrakeet. *Latham. syn. I. 1. p. 319. n. 127.*

Habitat in Brasilia & Gujana, passeris magnitudine, 4 pollices longus.

Rostrum, cera, orbitæ, pedes & unguis aurantia; remiges subtus, & tectrices alarum primariæ cæruleæ.

Cyanoly- 118. Ps. luteo - virens, collari cæruleo, uropygio rubro.
 flos. *Molin. hist. nat. Chil. p. 227.*

Habitat in regno Chilensi, columba paulo major, segetibus valde infesta; in abyssis præcipitibus nidificans, & ova plerumque bina alba, columbinis æqualia ponens, docilis & mansuetus; caro esculenta, junioris sapidissima.

Sordidus. 40. Ps. subfuscus, gula cærulea, alis caudaque viridibus rostro crisoque rubris.

Psittacus novæ Hispaniæ. *Briff. av. 4. p. 303. n. 45.*

Papagai brun. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 246.*

Dusky Parrot. *Edw. av. 4. t. 167. Lath. syn. I. 1. p. 304. n. 110.*

Habitat in nova Hispania, collarii magnitudine.

Cera nigricans; orbitæ nudæ, pallide cinereæ; irides badiæ; tempora, occiput, uropygium, & cauda supra virescentia; tectrices caudæ inferiores rubræ; pedes plumbei; unguis nigri.

domini- 119. Ps. viridis, frontis fascia rubra, cervicis dorsique lunulæ nigris, remigibus cæruleis.

Papagai à bandeau rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 241.*

Perroquet de S. Domingue. *Buff. pl. enlum. n. 792.*

Red banded Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 300. n. 104.*

Habitat in insula S. Dominici, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
 Rostrum pallide incarnatum; pedes cinerei.

Erythro- 120. Ps. viridis, orbitis nigricantibus, dorso medio nigro inferiore parte cærulea, tectricibus alarum rubris.
 pterus.

Crimson winged Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 299. n. 103.*
 Longitudo 10 pollicum; rostrum rubrum; cera & pedes sordida; cauda paulo longior.

festivus. 35. *Ps. viridis*, fronte purpurascente, superciliis gulaque cæruleis, dorso sanguinéo.

Tavoua. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 240.

Perroquet tahué de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 840.

Festive Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 298. n. 102.

Habitat in Guiana, agilissimus, sed ferox & ingratus, columbae magnitudine, 11 pollices longus.

Rostrum plumbeum, apice nigro; cera ex griseo nigra; irides croceæ; pedes cinerei; unguis nigri.

robustus. 121. *Ps. viridis*, capite cinerascente, alarum tectricibus sordide nigris margine viridibus, remigibus rectricibusque fuscis, alarum macula rubra.

Robust Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 296. n. 106.

Magnitudo columbae; longitudo 12 pollicum; rostrum magnum, album; capistrum supra nigricans; verticis pennæ per medium sordide striatae; pedes robusti.

magnus. 122. *Ps. viridis*, remigibus majoribus cæruleis, minoribus subtus rubris.

Grand Perroquet vert de la nouvelle Guinée. *Sonnert.* it. p. 74. t. 108.

New-Guinea Green Parrot. *Lath. syn.* I. I. p. 296. n. 99.

Habitat in nova Guinea æstivi magnitudine.

Mandibula superior colore auripigmenti; inferior nigra; irides flammeæ; Viredo graminea.

Taraba. 123. *Ps. viridis*, capite, gula, jugulo, pectore & tectricibus alarum minoribus rubris.

Psittacus brasiliensis erythrocephalus. *Briff. av.* 4. p. 240. n. 24.

Tarabe. *Raj. av.* p. 33. n. 5. *Will. orn.* p. 114. n. 9.

Tarabé ou Amazone à tête rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 211.

Habitat in Brasilia.

Rostrum pedesque cinerea; unguis nigri.

brasiliensis- 36. *Ps. viridis*, facie rubra, temporibus cæruleis, orbitis cinereis.

Psittacus brasiliensis, fronte rubra. *Briff. av.* 4. p. 254. n. 30.

Crick à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 232. var. 3.

Brazilian green Parrot. *Edw. av.* 4. t. 161. *Bancr. Guj.* p. 160. *Lath. syn.* I. I. p. 294. n. 96. C.

Habitat in Brasilia, columbae magnitudine; an varietas. autumnalis?

*Color viridis flavo contaminatus ; ruber infra flexuram
alæ & in exteriore latere rectricum 2, 2 ; cæruleus in
latere exteriore remigum rectricumque primorum.*

^autumn- 37. Ps. viridis, fronte remigumque macula coccineis, vertice
nalis. remigibusque primoribus cæruleis.

Psittacus americanus. Briss. av. 4. p. 293. n. 40.

Crick à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 232. var. 2.

Lesser green Parrot. Edw. av. 4. t. 164. Bancr. Guj. p. 160.
Autumnal Parrot. Lath. syn. I. I. p. 293. n. 96. B.

β . Psittacus fronte gulaque cæruleis.

Crick à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 230.

Blue faced green Parrot. Edw. glean. t. 230. Lath. syn.
I. I. p. 293. n. 96.

Blue headed Creature. Bancr. Gujan. p. 158.

γ . Psittacus capite ex rubro & albido vario.

Crick à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 231.
var. I.

Cocco. Fernand. hist. nov. Hisp. p. 38.

Habitat in Guiana.

Magnitudo columbae ; oculorum regio cærulea ; alarum
rectrices primores cæruleæ basi rubrae ; remiges posteriores
virides, rectrices supra virides, apice flavescentes,
extimo latere exteriore cæruleo ; subtus flavae, basi ru-
fescentes, medio macula viridi.

^accipitri- 38. Ps. viridis, capite griseo, collo pectoraque subviolaceo
nus. vario, remigibus rectricibusque apice cæruleis.

Psittacus varius indicus. Briss. av. 4. p. 300. n. 43.

Psittacus elegans. Clus. exot. 365. Raj. av. p. 32. n. II.

Perroquet varié. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 117.

Hawk-headed Parrot. Edw. av. 4. t. 165. Lath. syn. I.
I. p. 266. n. 74.

β . Psittacus capitis pennis albis longis angustis nigro striatis.

Papagai maillé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 239. t. 12.

Perroquet mailié. Buff. pl. enlum. n. 526.

Habitat in India, β . nunc in Guiana domesticus ; irrita-
tus pennas capitis erigit.

Magnitudo columbae ; longitudo $12\frac{1}{2}$ pollicum ; rostrum
cum cera nigricans ; orbitæ nudæ nigricantes ; irides
ex flavo badiæ ; pedes cum unguibus plumbei.

^menstruus. 29. Ps. viridis, capite cærulecente, criffo rubro. Scop.
ann. I. p. 33.

Psittacus gujanensis cyanocephalus. Briss. av. 4. p. 247. n. 28.

AVES PICÆ. Psittacus.

Papagai à tête & gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6.*
p. 243.

Perroquet à tête bleue de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 384.*
Blue-headed Parrot. *Edw. glean. t. 314. Lath. syn. I. 1.*
p. 301. n. 107.

Habitat in Guiana, parum docilis, voce monedula. D.
Bierchen.

Corpus magnitudine turturis; caput collumque cærulescens
pennis fuscis apice cæruleis; dorsum & alæ virides; tec-
trices alarum ex flavescente virides; remiges virides, in-
teriori margine fuscæ; abdomen virens, pennarum apice
cærulecentie; rectrices virides apice cærulecentes, sed
1, 2, 3 interiore latere a basi ad medium sanguineæ,
exteriori latere totæ cæruleæ; crissum rubrum, apice
pennarum ex flavescente cæruleo; rostrum corneum,
mandibula superiore lateribus fulva; oculi nigri; or-
bitæ ex cæruleo canescentes.

purpu- 124. Ps. supra ex atro fuscus, subtus purpureus, vertice ge-
reus. nisque nigris, orbitis cæruleis, torque fordide punctato;
remigibus rectricibusque cæruleis.

Perroquet violet. *Barrer. Fr. équin. p. 144.*

Papagai violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 244.*

Perroquet varié de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 408.*

Little dusky Parrot. *Edw. glean. t. 315. Lath. syn. I. 1.*
p. 302. n. 108.

Habitat in Surinamo, columbae domesticæ magnitudine,
parum docilis.

Rostrum fordidum, macula ad utrumque latus aurantia;
rectrices laterales latere interiore rubicundæ, apice cæ-
ruleæ; pedes fordidi.

melano- 41. Ps. viridis subtus luteus, pileo nigro, pectore albo, or-
cephalus. bitis incarnatis. *Mus. Ad. Frid. 2. p. 15.*

Psittacus mexicanus, pectore albo. *Briss. av. 4. p. 297. n. 42.*
Psittacus atricapillus. I. *Fr. Miller illustr. t. 4. A.*

Maipouri. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 250.*

Petite perruche Maipouri de Cayenne. *Buff. pl. enlum.*
n. 527.

White breasted Parrot. *Edw. av. 4. p. 169. Lath. syn. I.*
I. p. 305. n. 112.

Habitat in nova Hispania, Guiana & Caraccas in silvis,
turturis magnitudine, indocilis, & nisi pullus vix cœu-
rendus; volando parvis gregibus sibilans, crassior &
brevior reliquis speciebus.

Rostrum & cera incarnata ; genæ flavæ ; cervix aurantia ; remiges majores exteriore latere cœruleæ , interiori & subtus nigrae , minorum primæ virides , margine flavo , reliquæ virides ; cauda rotundata ; pedes ex cinereo fuscæ ; unguis nigricantes .

Pileatus. 125. *Ps. viridis , capite nigro , orbitis albis , humerorum macula cyanæa , caudæ apice cœruleo .*

Caica. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 253.*

Perruche à tête noire de Cayenne. *Buff. pl. entom. n. 744.*
Hooded Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 306. n. 113.*

Habitat in Cayenna , 8 $\frac{1}{2}$ pollices longus , reliquis speciebus crassior , migratorius .

Rostrum & pedes rubri ; gula flavicans ; rectrices 2 intermedie totæ virides .

Indovici-
clanus. 126. *Ps. thalassinus , capite fulvo , versus rostrum in ruborem vergente .*

Papagai à tête aurore. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 247.*
du Praz it. 2. p. 128.

Orange-headed Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 304. n. 111.*
Habitat in Louisiana , bromelicæ , liriodendri seminibus vicitans , magnis gregibus volans , ferus , valde sonorus ; cicuratus parum , parumque docilis .

Collarius. 42. *Ps. viridis , gula rubente .*

Psittacus minor , collo miniaceo . Raj. av. p. 181. n. 8.
Psittacus jamaicensis , gutture rubro . Briff. av. p. 241. n. 25.

Xaxabes. *Ovied. l. 4. c. 4.*

Saflebé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 245.*

Common Parrot of Jamaica. *Sloan. jam. p. 297. n. 9.*

Red-throated Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 303. n. 109.*

Habitat in Jamaica , columba magnitudine .

Jugulum rubrum ; remiges nigrae , margine viridi .

Senega-
lus. 43. *Ps. viridis subtus luteus , capite cinereo , orbitis nigris nudis .*
Psittacula senegalensis . Brijst. av. 4. p. 400. n. 92. t. 24. f. 2.
Perroquet à tête grise. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 123. pl. entom. n. 288.*

Senegal Parrot. *Lath. syn. I. 1. p. 307. n. 114.*

Habitat frequens ad Senegal fluvii littora arenosa , voce ingrata & acuta ; quini senive volant , in arborum cæminibus quietescentes .

Longitudo 8 $\frac{1}{2}$ pollicum ; rostrum cinereum ; cera nigricans ; irides flavæ ; remiges & alæ spuriæ cinereæ , margine

AVES PICÆ. Psittacus.

*exteriore viridi; rectrices cinereæ, margine & apice
virides; pedes ex rubicundo cinerei.*

Tuipara. 127. Ps. pallide viridis, frontis lunula rubra, alarum macula media flava,

Tuipara Tupinambis. *Raj. av. p. 35. n. 7. Will. orn. p. 117.
Psittacula brasiliensis erythrocephalos. Briss. av. 4. p. 383.
n. 82.*

Red-fronted Parrot, *Lath. syn. I. 1. p. 308. n. 115.*

Habitat in Brasilia, alaudæ magnitudine.

Rostrum incarnatum; cauda brevissima; pedes & unguis grisei.

chryso- 44. Ps. viridis, alis macula cærulea fulvaque, orbitis nudis pterus. albis.

Psittacula alis deauratis. *Briss. av. app. p. 130. n. 97.
Perruche aux ailes d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 170.
Golden-winged Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath.
syn. I. 1. p. 309. n. 116.*

Habitat in India, alauda vix major.

Rostrum album; remiges primores & marginé exteriori cæruleæ, interiori fuscæ; reliquæ supra aurantiæ, subtus luteæ.

pullarius. 45. Ps. viridis, fronte rubra, canda fulva, fascia nigra, orbitis cinereis. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 15. Scop. ann. I.
p. 33. n. 34.*

Psittacus minimus. *Clus. exot. 365.*

Psittacus pusillus viridis æthiopicus Clusii. *Raj. av. p. 31.
n. 10.*

Psittacus minor vericolor. *Seb. mus. 2. p. 40. t. 40. f. 1.*

Psittacula guineensis. *Briss. av. 4. p. 387. n. 85.*

Perruche à tête rouge, ou moineau de Guinée. *Buff. hist.
nat. des ois. 6. p. 165. t. 7.*

Petite perruche mâle de Guinée. *Buff. planch. enlum. n. 60.*

Little red-headed Parrakeet, or Guinea Sparrow. *Albin.
av. 3. t. 15. Edw. glean. t. 237.*

Red-headed Guinea-Parrakeet. *Latham syn. I. 1. p. 309.
n. 117.*

Kleinster grüner Papagay mit rother Stirn und Kehle. *Frisch. av. t. 54.*

Habitat in Guinea frequens; in Æthiopia, India, & insula Java, morum alienorum, non perinde vocis dexterimus imitator, sua speciei amansissimus; alaudæ magnitudine, 5½ pollices longus.

Rostrum rubrum; cera cinerea; irides cærulentes; gula rubra; uropygium cæruleum; rectrices 2 intermediae totæ, reliquæ apice virides; pedes & unguis grisei.

indicus. 128. *Ps. viridis*, orbitis pallide incarnatis, vertice rubro vel aurantio, uropygii parte postica rubra, remigibus intus, cauda subtus ex cærulecente viridibus.

Psittacula indica. Briss. av. 4. p. 390. n. 86.

Smallest red and green Indian Parrot. Edw. av. I. t. 6. Red and green Indian Parrot. Lath. syn. I. I. p. 311. n. 118. Habitat in India, alaudæ magnitudine.

Rostrum aurantium; rectrices caudæ superiores rubræ; pedes & unguis incarnati.

Palgulus. 46. *Ps. viridis*, uropygio pectoreque coccineis, vertice (maris) cæruleo. Amœn. ac. 4. p. 236. Mus. Ad. Frid. 16. Osb. it. 101.

Avicula cechini. Ald. orn. I. 20. p. 560.

Psittacula malaccensis. Briss. av. 4. p. 386. n. 84?

Perruche à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 163.

Petite perruche de Pérou. Buff. pl. enlum. n. 190. f. 2.

Petite perruche de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 76. t. 33. fig. inf.

Sapphire-crowned Parrakeet. Edw. glean. t. 293. f. 2. Lath. syn. I. I. p. 312. n. 119. A.

β. *Psittacula Philippensis.* Briss. av. 4. p. 392. n. 87. t. 30. f. I.

Perruche des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 520. f. I. 2.

Coulacissi. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 169.

Philippine Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 311. n. 119.

Habitat in insulis Philippinis, forsitan etiam aliis oceanici indici, 5 modo pollices longus, & adhuc minor. Pede altero suspensus dormit; coquus succo recenti se delectans.

Remiges subtus cæruleæ, excepto margine exteriore; rectrices subtus cærulentes; jugulum sanguineum, qui tamen color, prouti cæruleus verticis, in femina deest.

β. *Rostrum rubrum; caput ex flavo viride; occipitis fascia transversa aurantia; rectrices caudæ rubræ; remiges nigricantes margine profunde viridi; cauda rotundata; pedes & unguis rubri.*

Anaca. 129. *Ps. viridis*, subtus ex rufo fuscus, vertice badio, dorso macula caudaque pallide fusca, alarum margine rubro.

Psittacula brasiliensis fusca. Briss. av. 4. p. 403. n. 93.

Anaca Brasiliensis. Raj. av. p. 35. n. 8. Will. orn.

p. 117. c. 4. n. 8.

Anaca. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 265.
 Chestnut-crowned Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 314. n. 120.
Habitat in Brâilia & Guiana, alaudæ magnitudine.
Rostrum & orbitæ fusca; tectrices caudæ inferiore et
rufa fusca; remiges majores apice thalassinæ; pedes &
ungues nigricantes.

purpu- 130. Ps. viridis, vertice & cervice cinereis, uropygio alarum
 ratus. marginè spuriarnique apice cæruleis; cauda purpurea
 nigro-marginata.

Purple tailed Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 315. n. 121.
Habitat in Cayenna, 8 pollices longus.
Rostrum flavescens; dorsi pars inferior cærulea; humeri
fusci; cauda vix rotundata; tectrices caudæ prælongæ;
tectrices 2 intermediae virides, nigro-punctatæ; pedes
cinerai; unguis flavicantes.

canus. 131. Ps. viridis; capite, gula, juguloque ex viridi griseis,
 caudæ rotundatae fascia lata nigra.

Psittacula madagascariensis. Brij. av. 4. p. 394. n. 88.
 t. 30. f. 2.

Perruche à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 171.
 Petite perruche de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 791. f. 2.
 Grey-headed Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 315. n. 122.
Habitat in insulis Madagascar & S. Mauriti, 5 $\frac{1}{4}$ pollices
longus.

Rostrum griseum; pedes & unguis cani; feminæ caput
 viride.

mela- 132. Ps. pallide viridis, dorso, tectricibus alarum, cauda
 nopterus. fascia remigibusque primariis nigris, secundariis fla-
 vescientibus cæruleo-punctatis.

Perruche aux ailes variees. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 172.
 Petite perruche de Batavia. Buff. pl. enlum. n. 791. f. 1.
 Petite perruche de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 78. t. 41.
 Black-winged Parrakeet. Brown illuſtr. t. 8. Latham
 syn. I. I. p. 316. n. 123.

Habitat in Jawa & Luzonia, 6 pollices longus.
 Rostrum & pedes ferruginei; color subitus in caruſcentem
 vergens; caudæ pars superior purpurascens; rectrices
 2 intermediae unicoloræ; tectrices caudæ inferiores
 rectricibus æquales.

capen- 133. Ps. viridis, remigibus nonnullis cæruleis, rostro pedi-
 fisi butque rubentibus.

Perruche aux ailes bleues. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 173.
Petite perruche au Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum.*
n. 455. f. 1.

Blue-winged Parrakeet. *Lath. syn.* I. 1. p. 317. n. 124.
Habitat in Capite bonæ spei.

torqua-
tus,

I34. *Pf. viridis*, occipitis fascia flava transversim nigro striata.
Petite perruche à collier de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 77.
t. 39.

Perruche à collier. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 173.
Collared Parrakeet. *Lath. syn.* I. 1. p. 317. n. 125.

Habitat in insulis Philippinis, loqui nescius.

Rostrum; irides & pedes ex nigricante grisea. Feminæ
occiput cyaneum, striis transversis nigris.

minor.

I35. *Pf. viridis*, vertice coccineo, pectorcætuleo, remigibus majoribus nigris.

Perruche à ailes noires. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 174.

Petites perruches de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 77. t. 4.
Luzonian Parrakeet. *Lath. syn.* I. 1. p. 318. n. 126.

Habitat in insula Luzonia; pede altero suspensus dormit,
succum recentem ex coco promanantem liguriens.

Rostrum, irides & pedes flava; abdominis color in flavican-

tem vergens; testrices caudæ superiores rubræ; feminæ

capitulum & pectus rubrum; cervix macula flava.

Tovi.

I36. *Pf. viridis*, juguli macula pallide aurantia, alarum fascia

lata castanea cum splendore aureo viridi.

Psittacula gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 396. n. 89. t. 30.

f. 3.

Tovi à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 280.

Petite perruche à gorge jaune d'Amérique. *Buff. pl. enlum.*
n. 190. f. 1.

Magnitudo alaudæ cristatæ; longitudo 6 $\frac{3}{4}$ pollicum; pedes

grisci.

Tirica.

I37. *Pf. viridis*, rostro incarnato, pedibus & unguibus cæru-

lescentibus.

Psittacula brasiliensis. *Briss. av.* 4. p. 382. n. 81.

Tui-Tirica. *Raj. av.* p. 34. n. 3. *Will. orn.* p. 116. c. 4.

f. 4. n. 3.

Tirica. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 281.

Petite Jaseuse. *Buff. pl. enlum.* n. 837.

Green Parrakeet. Brown. *jam.* p. 473. *Latham syn.* I. 1.

p. 320. n. 129.

Sosove; 138. Ps. viridis, alarum & tectricum caudæ macula dilute flava.

Sosové. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 280:

Petite perruche de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 456. f. 2.

Cayenne Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 320. n. 130.

Habitat in Guiana, facile cicurandus, & eximie garrulus.
Rostrum & pedes grisea.

Tui. 139. Ps. viridis, fronte aurantia; orbitis flavis.

Psittacula brasiliensis icterocephalos. Briss. av. 4. p. 398.
n. 90.

Tui species 4. Raj. av. p. 34.

Tovi à tête d'or. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 284,

Petite perroche de l'île de S. Thomas. Buff. planch.
enlum. n. 456. f. 1.

Tui of the Brasiliens, 4th species. Will. orn. p. 116. f. 4.

Gold-headed Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 321: n. 134.

Habitat in Brasilia, sturni magnitudine.

Rostrum nigrum; oculi magni & nigricantes.

erythro- 140. Ps. viridis, capite cristato, alis caudaque rubris:
chlorus. Psittacula cristata. Briss. av. 4. p. 404. n. 94.

Psittacus erythrocchloros cristatus Aldrovandi. Raj. av. p.
34. n. 4.

Crested red and green Parrot of Aldrovandus. Will. ornith.
p. 116. f. 3.

Crested red and green Parrakeet. Latham syn. I. I. p. 321.
n. 132.

Irides rubræ; crista pro arbitrio mobilis, pennis sex con-
stans, tribus majoribus.

mexica- 141. Ps. viridis; fronte cristata, tectricibus alarum & cauda
nus. purpureis, orbitis cæruleis, gula flava, cervice rubra.

Psittacula mexicana cristata. Briss. av. 4. p. 405. n. 95.

Avis de cocho, psittaci species mexicana vario colore.

Seb. mus. I. p. 94. t. 39. f. 2.

Crested mexican Parrakeet. Lath. syn. I. I. p. 322. n. 133.

Habitat in nova Hispania, 7 pollices longus.

Rostrum flavum; remigum margo albus; pedes & unguis
cinerei.

46. RAMPHASTOS. *Rostrum maximum, inane, convexum, extrorsum ferratum : mandibula utraque apice incurva.*

Nares pone rostri basin, longæ, angustæ.

Lingua pennacea.

Pedes scandorii (plerisque).

Viridis. 1. *R. viridis abdomine flavo, uropygio rubro.*

Tucana cayennensis viridis. *Briff. av. 4. p. 423. n. 8. t. 33. f. 2.*

Toucan vert de Cayenne. *Buffon pl. enlum. n. 727. 728.*
Green Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 331. n. 9.*

Habitat in Cayenna, 14 pollices longus.

Mandibularum dentes albi; inferior nigra, basi & circa nares rubra; superior supra flava, ad latera rubra, linea media nigra; orbitæ nudæ iridesque flavæ; pedes plumbei; unguis nigri; cauda cuneata, subtus in cinereum vergens; caput, gula & jugulum mari nigra, femineæ badia, fascia nigra angusta transversa terminata.

Pavoninus. 9. *R. viridis, pennis rubris & pavoninis hinc inde interspersis.*

Tucana mexicana viridis. *Briff. av. 4. p. 423. n. 7.*

Xochitenacatl. *Fern. hist. n. Hisp. p. 51. c. 187.*

Hochicat. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 125.*

Pavonine Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 331. n. 8.*

Habitat in novæ Hispaniæ calidioribus maritimis, piscibus vidiitare fertur, dicolori magnitudine.

Rostrum ex flavo & nigro varium; pedes & unguis nigri.

Piperivorus. 2. *R. viridis, antice niger, crisco femoribusque rubris.*

Tucana cayennensis torquata. *Briff. av. 4. p. 429. n. 10. t. 32. f. 2.*

Koulik. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 128.*

Genus hoc in sola America australi intra tropicos obvium, frigoris impatiens, fructibus praesertim palmarum vidiitat, facile ciceratur; in patria rarvis generibus, numero octono vel denario voluntat, in arborum cavis a picis relicitis vidiificat, binaz ova ponens, numerosum.

AVES PICÆ. Ramphastos.

Toucan à Collier de Cayenne, & Toucan à ventre gris de Cayenne. *Buffon pl. enlum. n. 577. & 729.*

Green Toucan. *Edw. glean. t. 330.*

Piperine Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 334. n. II.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum nigrum, basi rubrum; orbitæ incarnatae aut cærulecentes; tempora macula aurantia; cervicis lunula aurantia; remiges fuscae, margine viridi; cauda cuneiformis, subtus fusca, apice badia; tectrices caudæ inferiores rubræ; pedes plumbæ; unguis nigri. Femina subtus grisea, cervice fusca.

Aracari. 3. R. viridis, fascia abdominali, criso uropygioque rubris, abdomine flavo.

Ramphastos rostro nigro, mandibula superiore lateribus alba, basi triloba. *Syst. nat. I. p. 104.*

Tucana brasiliensis viridis. *Briss. av. 4. p. 426. n. 9. t. 33. f. 2.*

Aracari. *Marcgr. bras. 217. Raj. av. p. 44. n. 2. Will. orn. p. 140. t. 22. Lath. syn. I. I. p. 332. n. 10.*

Grigii. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 126.*

Toucan vert du Brésil. *Buff. pl. enlum. n. 166.*

Habitat in Brasilia, Surinamo, Cayenna, ultra 16 pollices longus.

Rostri mandibula superior dorso & apice nigra, lateribus albicans, basi triloba ad nares, arcu albo ad radicem; inferior nigra. Caput, alæ & cauda nigra; pectus & abdomen lutea coccineaque, cum macula nigra subrotunda in medio pectore, similiisque macula transversalis ad initium ventris. Uropygium coccineum; femora rufa. Jacquin.

torqua- 10. R. supra niger, subtus albicans, abdomine viridi, postice rubro, torque rubro.

Tucana mexicana torquata. *Briss. av. 4. p. 421. n. 6.*

Cochitenacatl. *Fern. hist. nov. Hisp. p. 46. c. I. 60.*

Cochicat. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 124.*

Collared Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 330. n. 7.*

Habitat in novæ Hispaniae maritimis, 18 pollices longus; pectoribus viditare fertur.

Rostri mandibula superior albicans, inferior nigra; irides ex rubicundo lutea; caput collumque nigra; tectrices caudæ inferiores rubræ; femora purpurea; pedes ex virecente cinerei; unguis nigri.

Piscivorus. 4. R. nigricans, fascia abdominali crissoque rubris, uropygio albo.

Tucana brasiliensis gutture albo. *Briss. av. 4. p. 413. n. 3.*

Picus americanus. Hern. mex. 697.

Xochitenacatl terra. *Raj. av. p. 178. n. 6.*

Toucan à gorge blanche de Cayenne, appelée Tocan. *Buffon pl. enlum. 262.*

Toucan or brasiliian Pye. *Edw. av. 2. t. 64. Bancr. Guj. p. 163.*

Brasilian Toucan. *Latham syn. I. I. p. 327. n. 4.*

Habitat in America australi, 21 pollices longus.

Rostrum luteum, apicis macula coccinea, mandibula inferior cærulea; pedes cærulei; nigra pilcus, dorsum, alæ, cauda, venter, femora; albida tempora, gula, pedus, uropygium; rubra fascia pectoralis & crissum.

Erythro- 11. R. nigricans, genis, gula, & jugulo albis, tectricibus rhynchos. caudæ superioribus sulphureis, inferioribus & pectoris lunula rubris.

Tucana cayennensis gutture albo. *Briss. av. 4. p. 416. n. 4. t. 31. f. 2.*

Red-beaked Toucan. *Edw. glean. t. 238. Lath. syn. I. I. p. 328. n. 5.*

Habitat in America australi, præcedentis magnitudine.

Rostrum basi dorsoque flavum, mandibulæ superioris apice inferiorisque fundo rubris, naribus nigro-marginatis; orbitæ cærulecentes; pedes plumbei; unguis nigri.

Tucanus. 5. R. nigricans, fascia abdominali, crisso uropygioque flavis.

Ramphastos rostro rubro, carina obtusa albida. *Syst. nat. I. p. 103.*

Tucana. *Marcgr. bras. 217.*

Tucana brasiliensis gutture luteo. *Briss. av. 4. p. 419. n. 5. t. 32. f. 1.*

Toucan surinamensis niger ex albo, flavo, rubro mixtus. *Pet. gaz. t. 44. f. 13.*

Toucan à gorge jaune du Brésil. *Buffon pl. enlum. n. 307. Yellow-breasted Tucan. Edw. glean. t. 329. Latham syn. I. I. p. 326. n. 3.*

Habitat in America australi, 19 pollices longus.

Genæ, gula & cervix aurantiæ; fascia abdominalis & crissum in rubrum colorem vergunt; uropygium sulphureum; rostrum nigrum, basi griseum; pedes & unguis plumbei.

- picatus. 6. R. nigricans, pectore luteo, crisso rectricumque apicibus rubris, uropygio nigro.
Ramphastos rostro rubro apice nigro, carina compressa.
Syst. nat. I. p. 103.
Tucana. *Briss. av.* 4. p. 408. n. I.
Pica brasiliensis. *Gesn. av.* 800. *Aldr. orn.* I. p. 801.
Raj. av. p. 44. n. I.
Brazilian Pye or Toucan. *Albin. av.* 2. t. 25. *Will. orn.* p. 128. t. 20.
Toucan à ventre rouge. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 122.
Preacher Toucan. *Latham syn.* I. I. p. 329. n. 6.
Habitat in Guiana & Brasilia, 8½ pollicibus pedem longitudine excedens.
Rostrum ex flavicanti viride, apice rubicundum; abdomen rubrum; cauda apice rubro-punctata.
- dicolorus. 7. R. nigricans, pectore, abdomine, crisso uropygioque rubris, gula lutea.
Tucana cayennensis, gutture luteo. *Briss. av.* 4. p. 411.
n. 2. t. 31. f. I.
Toucan à gorge jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 118.
Toucan à gorge jaune de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 269.
Yellow-throated Toucan. *Latham syn.* I. I. p. 325. n. 2.
Habitat in Cayenna, 17 pollices longus.
Rostrum olivaceum, basi nigrum, mandibularum margine rubro; genæ sulphureæ; jugulum aurantium, margine sulphureo.
- Toco. 12. R. nigricans, gula, jugulo & uropygio albis, orbitis, pectoris circulo crisoque rubris.
Toucan de Cayenne, appelé Toco. *Buff. pl. enlum.* n. 82.
Toco. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 117. *Latham syn.* I. I. p. 325. n. I. t. 9.
Habitat in Cayenna, 9-10 pollices longus.
Rostrum ex rubicundo flavum basi nigrum, mandibulae superioris apice nigro.
- luteus. 13. R. ex flavicante albus, striis colli lateralibus duabus nigris, cauda & alis ex albo & nigro variis, tectricibus alarum minoribus flavis.
Tucana lutea. *Briss. av.* 4. p. 432. n. II.
Alia Xochitenacatl. *Nieremb. hist. nat.* p. 207. *Johnst. av.* p. 119.
Aracari à bec noir. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 130.

An other sort of Xochitenacatl, Toucan or Brasilian Pye.

Will. orn. p. 386.

Blackbilled Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 335. n. 12.*

Habitat in nova Hispania, columbae magnitudine.

Rostrum nigrum; irides flavæ; pedes fuscæ; unguis flavicantes.

cæruleus.

14. R. cæruleus, cinereo admisto.

Tucana cærulea. *Briss. av. 4. p. 433. n. 12.*

Xochitenacatl. *Nieremb. hist. nat. p. 209. Fern. hist. p. 47. c. 146. Johnst. av. p. 126. 157. t. 56.*

Blue Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 335. n. 13.*

Habitat in novæ Hispaniæ maritimis, columbae magnitudine.

Rostrum corpore ipso longius; oculi nigri; irides fulvæ.

dubius.

15. R. gula cærulea.

Blue throated Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 336. n. 14.*

albus.

16. R. totus albus.

White Toucan. *Lath. syn. I. I. p. 336. n. 15.*

Momota. 8. R. pedibus gressorii.

Momot. *Will. orn. p. 386. t. 24. Raj. av. p. 164. Briss. av. 4. p. 465. t. 35. f. 3.*

Guira Guainumbi. *Marcgr. bras. 193. Raj. av. p. 49. n. 4.*

Houtou ou Momot. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 430. t. 20.*

Momot du Brésil. *Buff. pl. enluni. n. 370.*

Brazilian sawbilled Roller. *Edw. glean. t. 328.*

Brazilian Motmot. *Lath. syn. I. I. p. 338. n. I. t. 10.*

β. Momotus varius. *Briss. av. 4. p. 469. n. 2.*

Yayaquitotl. *Raj. av. p. 167. n. 19.*

Yayaquitotl or longtailed Bird. *Will. orn. p. 386.*

Variegated Motmot. *Lath. syn. I. I. p. 340. n. I. A.*

Habitat in Americæ australis densis silvis, solitarius, in terra, aut focea a Dasyode relicta nidum struens ex gramine sicco, & bina ova ponens; vicitans infestis, & carne cruda, cuius frustula in aqua macerat, rostro prehensa violentis ierbibus verberat. Vox rauca, tremula, debilis. Jacquin.

Corpus magnitudine merulæ sesquipedale, splendide olivaceum, subtus ferrugineum, in β. ex viridi, fulvo, cœruleo, & cinereo mixtum. Caput majusculum vertice cœruleo medio nigro; mystaces ad angulos oris longiores mobiles; remiges cœruleas; cauda cuneiformis, II½ pollicata.

longa, tectricibus 2 intermedialis longioribus in medio non-nunquam nudis; rostrum mediocre, vix 2 pollices longum, atrum; pedes nigri, digito uno postico; unguis aduncus. Differt a precedentibus rostro minore, pedibusque non-sensoriis; an ideo generis distincti? Vetare videntur lingua pennacea, rostrique serræ.

47. BUCEROS. *Rostrum convexum, curvatum, cultratum, magnum, extrorsum ferratum: Frontis calvaria nuda, ossco-gibbosa.*

Nares pone rostri basin.

Lingua acuta, brevis.

Pedes gressorii.

Bicornis. 1. B. fronte ossea plana antrorsum bicorni. *Amer. acad.* 4^o p. 237.

Hydrocorax philippensis. Briss. av. 4. p. 568. n. 2.

Rhinoceros avis prima varietas. Will. orn. t. 17. f. 1. Calao. Pet. gaz. 43. t. 28. f. 6. & t. 31. f. 1. Edw. av. 2^o p. 151. t. 281. f. D.

Philippine Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 345. n. 3.

β. Calao vel Cayao. *Ad. angl. vol. 23. p. 1394.*

Habitat in insulis Philippinis magnitudine gallinæ niger, subtus albus; remigum macula alba; cauda longiuscula nigra; rectrices 10, extimæ 4 utrinque albæ; pedes virescentes.

β. Rostro cinnabarino, abdomine nigro, dorso & uropygio ex fusco cinereis, voce porci aut vituli, Indis adoratus, fructibus videntur, quos integros deglutit, & exterioribus partibus concoctis, nucleos illæsos eruditat.

abyssini- 5. B. niger, fronte ossea prominentia antrorsum semicirculares, orbitis, gula jugulique parte nudis ex violaceo-fuscis, remigibus majoribus albis.

Calao d'Abyfinie. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 155.

Grand Calao d'Abyfinie. Buff. pl. enlum. n. 779.

Abyssinian Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 347. n. 4.

Aves hujus generis in antiquo orbe easdem regiones occupant; quam superioris in America, vidu quoque, uti quidem videtur, iis similes.

Habitat in Abyssinia, curvo similis, duobus pollicibus pedes tres longitudine superans. Rostrum 9 pollicum.

africanus. 6. *B. niger, rostro unicorni, cornu rectiusculo acuminato.*

Hydrocorax africanus. Briss. av. 4. p. 570. n. 3.

Rhinoceros avis secunda varietas. Will. orn. t. 17. Mus.

Beßler. t. 9. n. 7.

Brac ou Calao d'Afrique. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 154.

Trompette de Brac ou oiseau trompette. Labat Afr. occid.

4. p. 160. 161.

African Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 348. n. 5.

Habitat in Africa, gallópevoni magnitudine.

Rostrum partim rubrum, partim flavum, margine mandibularum nigro.

malaba- 7. *B. niger subtus albus, prominentia frontis supra rotundata ricus.*

frontem versus acuta, pone oculos protensa.

Beaks of curious Birds. Edw. glean. t. 281. f. D.

Calao de Malabar. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 149. t. 8. pl. enlum. n. 873?

Pied Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 349. n. 6. t. II.

Habitat in India, 2 pedes & 6 pollices ad 3 pedes usque longus, pica ad instar ambulans, laetucans, carnem crudam, nubes, aviculas devorans.

Rostrum mandibula utraque deorsum incurvata, apice acuta; prominentia superioris 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa, plurimam partem nigra, medio & prominentiae & rostri sordide ex flavicanti albo; crissum, remiges, rectricesque extiores apice alba.

Hydro- 2. *B. fronte ossea plana antrorsum mutica, abdomine fulvo.*

Hydrocorax. Briss. av. 4. p. 556. n. 1. t. 45.

Corvi marini genus. Clusi. exot. 106.

Corvus indicus. Bont. jav. 62. Will. orn. 86. t. 17. Raj. av. p. 40. n. 7.

Corbeau indien. Salern. ornith. p. 91. n. 8. t. 9. f. 3.

Calao des Moluques. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 41. 7. p. 147. pl. enlum. n. 283.

Bontius's Indian Raven. Will. orn. p. 126. n. 7.

Indian Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 351. n. 7.

Habitat in Moluccis frequenter cicuratus & occidentis muribus & ratis adhibitus; sylvestris nuce myristica vescitur; hinc caro deliciosa aromatica.

Ongitudo 2 pedum & 4 pollicum. Prominentia rostri cinea- rea, posterius albicans; vertex nigricans; gressus & gula

nigræ; hæc arcu sordide griseo terminata; occiput & cervix pallide castanea; dorsum, humeri, uropygium, tectrices alarum caudæque fusca; pectus & abdomen nigranticia, hoc posse flavicans; cauda ex cinereo sordide alba; pedes ex griseo fusci; unguis nigri.

Rhinoce-3. B. cornu mandibulari frontis recurvato.

ros. Hydrocorax indicus. Briss. av. 4. p. 371. n. 4.

Rhinoceros. Bont. Jav. 63. t. 64. Olear. mus. t. 15. f. 4.
Worm. mus. 293. Aldr. orn. 1. p. 84. Bejler. mus. t.
20. Lath. syn. I. 1. p. 342. n. 1.

Corvus indicus cornutus seu Rhinoceros avis Bontii.
Raj. av. p. 40. n. 8.

Horned Indian Raven or Rhinoceros-Bird. Will. orn. p.
127. t. 17. Edw. glean. t. 281. f. B.

Calao Rhinoceros. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 161.
Bec de l'oiseau Rhinoceros. Buff. pl. enlum. 934.

Habitat in India, insulæque oceani Indici, tripedalis,
rattis, muribus, carne, cadaveribus vicitans, venatores
concomitans, exenta intestina ingurgitatura,
gallo pavonis fere magnitudine.

Rostrum 10 pollices longum ex albante flavum; mandibula
superior basi rubra, inferior nigra; cornu 8 pollices longum, ex albo & nigro varium; corpus nigrum, subtus
& posse sordide album; cauda 12 pollices longa; tectrices inferiores albæ & nigræ; rectrices basi & apice albæ,
in medio nigrae; pedes & unguis obscure grisei.

galeatus. 8. B. rostro rectiusculo, prominentia fere quadrata, posterius
rotundata, anterius plana.

Calao à casque rond. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 159. pl.
enlum. n. 933.

Helmet Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 343. n. 2. Edw. glean.
t. 281. f. C.

Rostrum 8 pollices longum, plurimam partem rubrum.

panayan-9. B. ex virescente niger, subtus ex rubro fuscus, prominens.
mandibula superioris supra acuta, & ad latera plana.

Calao à bec ciselé de l'île de Panay. Sonner. it. p. 122.
t. 82. 83.

Calao de l'île de Panay. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 145.
pl. enlum. n. 780. 781.

Panayan Hornbill. Lath. syn. I. 1. p. 353. n. 8.

Habitat in insula Panay, coracis magnitudine.

Rostrum longissimum, arcuatum, fuscum, lateribus transversim rugosum, sulcis aurantiis; orbitæ nudæ fuscæ; irides albidae, caput collumque feminæ alba, macula magna triangulari ex virescenti nigra; rectrices 10, a basi ultra medium ex rufo lutea, apice nigra; pedes plumbati.

manilensis. 10. *B. supra ex nigricante fuscus, subtus sordide albus, rostro non ferrato: prominentia exigua.*

Calao de Manille. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 144. pl. enlum. n. 891.

Manilla Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 354. n. 9.

Habitat in insula Manilla.

Rostrum minus curvatum, apice magis acuto; caput columque alba, fusco-undulata; temporum macula nigra; caudæ fascia media rufa.

nasutus. 4. *B. fronte laevi, rectricibus basi apiceque albis.*

Crotophaga. Forskal Faun. arab. p. 2. n. 4.

Hydrocorax senegalensis melanorhynchos. Briff. av. 4. p. 573. n. 5. t. 46. f. 1.

Tock. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 141.

Calao à bec noir du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 890.

Blackbilled Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 355. n. 10.

B. Hydrocorax senegalensis erythrorhynchos. Briff. av. 4. p. 575. t. 46. f. 2.

Calao à bec rouge de Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 260.

Habitat ad fluvium Senegal, & in aliis calidioribus antiqui orbis; fructibus vicitans; junior facile cicutandus, magnitudine picæ.

Rostrum deorsum curvatum cum pedibus nigrum, adultiori rubrum; corpus supra sordide griseum, pennarum apice albido, subtus sordide album; genarum stria similiter sordide alba; rectrices 2 intermediae sordide griseæ; reliquæ 10 ad medium usque & apice albæ, ceterum nigricantes; unguis nigri.

albus. 11. B. niveus, rostro pedibusque nigris.

White Toucan. Hawkesw. it. I. p. 123.

White Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 357. n. II.

Captus inter insulas Tinian & Pulotimoen, anseris magnitudine.

Rostrum angustum, & pedem longum.

obscu- 12. B. rostri prominentia supra rotundata septem vel octo lobis.
rus. Wreathed Hornbill. Lath. syn. I. I. p. 358. n. 12.
Indian Raven. Witt. orn. I. 78.
Rostrum 5 6 pollices longum, prominentia policem altius
mandibularum margo non ferratus.

48. BUPHAGA. *Rostrum rectum subquadrangula-*
lare: mandibulis gibbis inter-
gris, extrorsum gibbosioribus.
Pedes ambulatorii.

africana. I. Buphaga. Briss. av. 2. p. 457. n. I. t. 42. f. 2.
Pic-boeuf. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 175. t. 14 pl.
entum. n. 293.
African Beef-eater. Lath. syn. I. I. p. 359. n. I. t. 12.
Habitat ad fluvium Senegal; dorso boum infidens ex-
trahit ostrorum larvas; alaudæ cristate magnitudine
8 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Corpus supra ex griseo fuscum, subtus & uropygio flavi-
cans; rostrum nunc flavicans apice rubro, runc nigrum,
10 lineas longum; cauda cuneiformis; rectrices 12
acutæ, ex griseo fuscæ, lateralibus interius rufissi;
pedes & unguis fuscæ.

49. CROTOPHAGA. *Rostrum compressum, semi-*
ovatum, arcuatum, dor-
sato-carinatum: mandi-
bula superiore margine
utrinque angulata.
Nares perviaæ.

Ani. I. Cr. minor, pedibus scansoriis.
Crotophagus. Briss. av. 4. p. 177. t. 18. f. 2.
Crotophagus ater, rostro breviore compresso arcuato
cultrato. Brown. jam. 474.
Monedula tota nigra major garrula, mandibula superior
arcuata. Sloan. jam. 2. p. 298. t. 256. f. I.
Ani. Marcgr. bras. 193. Will. orn. p. 120. Raj. av. p.
35. n. 10. & p. 185. n. 129.
Cacalotol. Raj. av. p. 168. n. 27.

Ani des savanes. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 420.
 Petit bout de petun. *Buff. pl. enlum.* n. 102. f. 2.
 Razor-billed Blackbird. *Catesb. car. app.* t. 3.
 Lesser Ani. *Lath. syn.* I. 1. p. 360. n. 1. t. 13.
Habitat in America australi, insulisque Americam spectantibus gregaria; nidificant in eodem nido amplissimo saepe 50; singulæ feminæ sibi propinquæ suis ovis, quæ bis in anno pariunt, marini coloris, versus utrumque finem maculata, incubant, quæ solitè tegunt. Videntur fructibus, seminibus, vermicibus, insectis, potissimum gryllis, imprimis vero acaris ricinis in bobus copiosissimi, ideoque accendentibus hisce boves se prosternere feruntur, ut rincos evellant, qui alias nimium multiplicarentur.

Longitudo 13½ pollicum; corpus nigrum; cauda longa, cuneiformis, rectricibus 10 constans; mandibula superior apice incurvata; nares ovatae; lingua carnosa, integra; pedes nigri.

^{major.} 3. Cr. major, pedibus scandoriis.

Crotaphagus major. Briss. av. 4. p. 180. t. 18. f. 2.
Grand Bout de Petun. Buff. pl. enlum. n. 102. f. 1.
Ani des palétuviers. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 423.
t. 19. Salern. orn. p. 73. n. 10.

Greater Ani. Lath. syn. I. 1. p. 362. n. 2.

Habitat in Cayeuna, facile curanda, & psittaci more docilis; 18 pollices longa, ceterum præcedenti similis.

^{ambula-} 2. Cr. pedibus ambulatoriis.

^{toria.} *Walking Ani. Lath. syn. I. 1. p. 363. n. 3.*
Habitat in Surinamo, præcedenti, si pedes excipias, summilla; rectrices 10.

CLAUUCOPIS. *Rostrum incurvatum, fornicatum, mandibula inferiore breviore subtus ad basin carunculata.*

Nares depressæ, membrana subcartilaginea semitectæ.

Lingua subcartilaginea apice incisa & ciliata.

Pedes ambulatorii.

^{cineræa.} 1. Glaukopis.

Cinereous Wattle-bird. Latham syn. I. 1. p. 364. n. 1.
t. 14.

Habitat in nova Seelandia, picæ magnitudine, 15 pollicis longa; in terra ambulans, rarius arboribus insidens, baccis, insectis, aviculis quoque vicitans, sibilans & murmurans. Caro sapidissima. Forster.

Rostrum nigrum, prouti totum corpus una cum pedibus; caruncula primo cœrulea, post aurantia; irides egregie cœruleæ; cauda longa, cuneiformis, rectricibus constans; pedes longi; unguis posterior reliquis longior.

50. CORVUS. *Rostrum convexum, cultratum. Nares pennis setaceis recumbentibus obtectæ.*

Lingua cartilaginea bifida. Pedes ambulatorii.

hotten- 1. C. virescenti-ater, cauda æquali, mystacibus longissimis.
tottus. Monedula Capitis bonæ spei. Briff. av. 2. p. 33. n. 10.
& f. 2.

Choucas moustache. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 79.
Choucas du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum. n. 22.
Habitat ad Caput bonæ spei, 11 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Supra nares mystaces nigrae tres pollices longæ, breviors & rigidæ in angulis oris; pennæ cervicis angustiori & longiores reliquis, laxæ, & quasi fluitantes.

Corax. 2. C. ater, dorso atro-cœrulecente, cauda subrotundata.
Faun. groenl. p. 62. n. 38.

Corvus maximus. Scop. ann. I. p. 34. n. 45.
Corvus. Gesn. av. 334. Aldrov. orn. I. p. 684. t. 63.
Jonſt. av. 38. t. 16. Raj. av. p. 39. n. I. Briff. av. p. 8. n. 1.

Corbeau. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 13. t. 2. pl. enlum. n. 495.

Raven. Arct. zool. 2. p. 245. n. 134. Brit. zool. I. p. 213.
n. 74. Alb. av. 2. p. 19. t. 20. Will. orn. p. 121.
18. Leth. syn. I. I. p. 367. n. 1.

Rabe. Friesch. av. t. 63.

β. Corvus varius. Briff. av. 2. p. 12. n. I. A.
Cacalotl. Fernand. hist. nov. Hisp. p. 48.

γ. Corvus albus. Briff. av. 2. p. 12. n. I. B. Schwenckf. 1790.
Siles. p. 245.

δ. Corvus feroensis ex albo & nigro mixtus. Brünnich ornith. bor. p. 8.

Habitat in omni Europa, Sibiria, Camtschatea, America boreali ad novam usque Hispaniam, duos ut plurimum pedes duosque pollices longus, vicitat cida veribus, aviculis vivis, agnis infirmis, famelicus adeo pellibus siccis & excrementis, ovis, piscibus, testaceis, baccis, feris in regionibus potissimum magis borealis, convivalis, surto deditus, clamitans, loqui addiscit; nidificat in aliis arboribus aut rupibus; coit Martio, parit Aprili 5-6 ova, ex cærulecente viridia fuscumaculata, quibus mas interdui, femina noctu incubat; longævus, olfactu acerrimo præditus. Caro Groenlandis edulis, pellis in vestimentis adhibita, alæ scopulis, remiges fissæ piscatui.

Rostrum paulisper curvatum, dente utrinque exiguo.

clericus. 20. C. totus niger, mento albo, rostri basi cinerea. Sparrmann mis. Carlson. t. 2.

Habitat in Svecia, rarissimus, an vere distincta a corace species?

Color in maxima corporis parte fuliginosus; remigum, & rectricum supra in violaceum vergens.

australis. 21. C. totus niger, menti pennis laxioribus, remigibus ex fuscescenti nigris.

South-sea Raven. Lath. syn. I. I. p. 369. n. 2.

Habitat in insulis amicis maris australis, 19 pollices longus.

Cauda 8 pollices longa.

Corone. 3. C. atro-cærulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis. Fn. suec. 86. Scop. ann. I. p. 35. n. 36.

Cornix. Gesn. av. 320. t. 321. Aldr. orn. I. p. 734. t. 736. Raj. av. p. 39. n. 2. Briff. av. 2. p. 12. n. 2.

Corneille. Buff. lijl. nat. des ois. 3. p. 45. t. 3. pl. enlum. n. 483.

Carrión Crow. Brit. zool. I. n. 75. t. 34. Arct. zool. 2. p. 246. n. 135. Albin. av. 2. t. 21. Will. orn. p. 122. t. 18. Lath. syn. I. I. p. 370. n. 3.

β. Cornix varia. Briff. av. 2. p. 15 n. 2. A.

Corvus varius. Brünn. orn. bor. p. 8. n. 8.

Bunte Kraehe, schekige Kraehe. Frisch. av. t. 66.

γ. Cornix alba. Briff. av. p. 15. n. 2. B.

Habitat in Europa, Sibiria, boreali America, insulis Philippinis, nova Guinea, nova Hollandia, nova Caledonia, Madera, corace minor, 18 pollices longa; cadaveribus & vivis adeo animalibus minoribus & debilioribus vicitans, sed fructibus etiam, seminibusque,

hinc segetibus aliquando infesta; in silvarum arboribus nidificat, & 5-6 ova parit, coracinis similia.
Tota ex atro cærulejcents, coracis modo dorsum; femina minus splendida; fauces, prouti etiam thoracis, nigrae; trachea propriis musculis instruta, subtus ad dichotomiani antice 4, postice 2.

frugilegus. 4. C. ater, fronte cinerascente, cauda subrotundata.
Faun. suec. 87. *It. oel.* 67.

Cornix frugilega. *Aldrov. orn.* I. p. 751. t. 753. *Raj. av.* p. 39. n. A. 3. *Briss. av.* 2. p. 16. n. 3.

Freux ou Frayonne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 55. pl. *enluni.* n. 484.

Rook. *Brit. zool.* I. n. 76. *Arct. zool.* 2. p. 250. n. A. *Albin. av.* 2. p. 21. t. 22. *Will. orn.* p. 123. t. 18. *Lath. syn.* I. I. p. 372. n. 4.

Schwarze Kraehe. *Frisch. av.* t. 64.

Habitat in Europa & occidentali Sibiria, magnis gregibus mane potissimum & vespere volitans; plures pernodant in arbore, unde facile capiuntur, valde sonori; vermis, larvis, potissimum scarabæorum, sed seminibus etiam visitant, hinc agris infestis; Martio jam nidificare incipiunt, ovaque pariunt cornicinis similia. Juniorum caro sapida. Nigredini internixtus splendor purpureus; caudæ supra viridis; rostrum magis redum, gracilius, debilius, quam præcedentii, 2½ pollices longum, basi albicans, naribus nudatis.

Cornix. 5. C. cinerascens, capite, jugulo, alis caudaque nigris. *Fn. suec.* 88. *Scop. ann.* I. p. 35. n. 37.

Cornix cinerea. *Briss. av.* 2. p. 19. n. 4.

Cornix cinerea frugilega. *Gesn. av.* 332. *Aldrov. orn.* I. p. 754. t. 755. *Raj. av.* p. 39. n. A. 4.

Corneille mantelée. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 61. t. 4 pl. *enlum.* n. 76.

Royston Crow. *Albin. av.* 2. p. 22. t. 23. *Will. orn.* p. 124 t. 77.

Hooded Crow. *Brit. zool.* I. n. 77. *Arct. zool.* 2. p. 251. n. B. *Flor. scot.* I. p. 20. t. 2. *Lath. syn.* I. I. p. 374 n. 5.

Plurimæ corvi species in omni climate obviae, perquam sonoræ, in arboribus nidificant, & 6 ova pariunt; vietus plurimis ex animali & vegetabili mixtus.

Nebelkraehe. Frisch. av. t. 65.

Graue Krau, Krauveitl. Kram. elench. p. 333.

Habitat in Europa & Asia, Alberto magno jan diða, Odobri ex subalpinis in planities descendens, gregaria, cadaveribus, quisquiliis, vivis quoque animalibus minoribus, avibus, testaceis, ranis, cochleis, infestis horumque larvis, rarius baccis seminibusque viditans; in Suecia relegata, at injuste, quum purget prata a larvis phalænæ calamitosæ graminumque radicibus subjacentibus tipularum larvis; ventis adversa consideret; lepide capitur cuncullo papyraceo in nive.

Magnitudo frugilegi; longitudo 22 pollicum.

dauricus. 22. C. ater, vertice ex cœruleo atro, cervice, jugulo & abdomine albis. Pall. it. 3. p. 694. n. 8.

Corneille du Sénégal. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 67. pl. enlum. n. 327.

Chinese black Raven with white neck. Osb. it. I. p. 377.

White-breasted Crow. Fryer it. p. 21. Latham syn. I. I. p. 376. n. 6. t. 15.

B. Corvus totus niger, cervice juguloque fuscis.

Habitat in Sina, Mongolia, Persia, ad lacum Bajkal, fluviumque Lena, in insula Ivanna, & ad fluvium, Senegal, gregaria, monedula facie & magnitudine, 12. pollices & ultra longus; infestis fructibusque viditans.

Cauda & alæ nitore virescente.

caledoni- 23. C. cinereus, rostro, palpebris, cauda pedibusque nigris. eus. New caledonian Crow. Latham syn. I. I. p. 377. n. 7.

Habitat in nova Caledonia, 15 circiter pollices longus.

Cauda 5 pollices, rostrum 14 lineas longum; irides flavescentes.

jamaicai- 24. C. totus niger.

censis. Cornix jamaicensis. Briss. av. 2. p. 22. n. 5.

Corneille de la Jamaïque. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 67.

Chattering Crow or Cacao Walk. Raj. av. p. 181. Sloan. jamaic. 2. p. 298. Lath. syn. I. I. p. 377. n. 8.

Habitat in Jamaicæ montanis, perpetuo garrulus, baccis & scarabæis viditans. 18 pollices longus.

Monedu- 6. C. fuscus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris.

la. Fn. suec. 89. Scop. ann. I. p. 36. n. 38.

Graculus f. monedula. Geßn. av. p. 520. t. 521.

- Monedula f. Lupus. *Aldr. orn.* I. p. 770. t. 771. *Raj.*
av. p. 40. A. 5. *Briss. av.* 2. p. 24. n. 6. *Günther*
Neft. u. Eyer t. II. f. inf.
 Choucas. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 69. *pl. enlumi.* n. 523.
 Jackdaw. *Brit. zool.* I. n. 81. t. 34. *Arct. zool.* 2. p. 251.
 C. Alb. *av.* I. t. 14. *Will. orn.* p. 125. t. 19. *Lath. syn.*
 I. I. p. 378. t. 9.
 Dohle, graue Dohle. *Frisch. av.* t. 67. *Kram. elench.* p. 334.
 β. Monedula torquata. *Briss. av.* 2. p. 27. n. 6. A.
 Helvetian Daw. *Charlet. ex.* p. 75. n. 7. *onom.* p. 68.
 n. 7. *Johnst. av.* t. 16.
 γ. Monedula candida. *Briss. av.* 2. p. 27. n. 6. B. *Schwenckf.*
 av. *Sil.* p. 305. *Racz.* *auct. hist.* *Pol.* p. 396.
 δ. Monedula nigra. *Briss. av.* 2. p. 28. n. 7.
 Choucas noir. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 69. *planch.*
 enlumi. n. 522.
 Chough. *Charlet. ex.* & *onom.* p. 67. n. 3. *Sibbald Scot.*
 ill. p. 2. l. 3. p. 15.
 Schwarze Dohle. *Frisch. av.* t. 68.
 ε. Monedula nigerrima, rostro pedibusque miniatis. S. G.
 Gmelin it. 3. p. 365. t. 39.
 ζ. Monedula alis albis, rostro subcurvo.
 η. Monedula rostro forcicato.
 θ. Monedula fuscescens, humeris albis.

*Habitat in Europæ, & occidentalis Sibiriae, & in Perſia
 agris, hieme in turribus antiquis summis gregaria, furto
 pariter dedita, facile cicuranda, ova parit pallidiora,
 minora, minusque maculata, quam cornices.*

Longitudo 13 circiter pollicum; irides albæ.

- glanda- 7. C. telectricibus alarum cæruleis, lineis transversis albis
 rius. nigrisque, corpore ferrugineo variegato. *Faun. suec.* 90.
 Scop. ann. I. p. 36. n. 39.
 Garrulus. *Briss. av.* 2. p. 47. n. 1. *Nozeman nederl.*
 Vogel. t. I.
 Pica glandaria. *Gesn. av.* 700. *Aldr. orn.* I. p. 788. t.
 789. *Raj. av.* p. 41. A. 2.
 Ghiandaja. *Olin. uccell.* p. 35.
 Jeay. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 107. t. 8. *planch.*
 enlumi. n. 481.
 Jay. *Brit. zool.* I. n. 79. *Arct. zool.* 2. p. 252. E. *Albin.*
 av. I. p. 16. t. 16. *Will. orn.* p. 130. t. 19. *Lath.*
 syn. I. I. p. 37. n. 19. *Hayes brit. birds* t. 7. *Holz-*

Holzschreyer, Eichenheher, Nussheher. *Frisch. av. t. 55.*

Kram. el. p. 335. Günth. Neft. u. Eyer, t. 38.

B. Garrulus albus. *Briss. av. 2. p. 51. n. 1. A.*

Habitat in Europa, & ad montes Uralenses Sibiriae, in silvis, inquietus, facile curandus & docilis, nidum ex bacillis, radicum fibris, tenerioribusque ramis struens, & ova pariens columbinis aequalia, ex cinereo-olivacea, maculis pallide fuscis; colligit nuces, glandes, alios fructus, superfluos defodit seritque, viciuat etiam segete, aviculis, ovis.

Longitudo 13 pollicum; macula utrinque ad os nigra; capitinis pennae prælongæ.

- argyro-** 25. **C. niger,** pectore cyaneo, oculis argenteis, cauda apice phthal- alba, rostro pedibusque nigris. *Jacquin Beytr. zur Gesch. mus.* *der Voeg. p. 1.*

Habitat Carthagena in America, glandarii magnitudine, in silvis densissimis, vocem claram, sibilantem, non ingratis edens, infedis, fructibus & seminibus ieditans; curatur quoque carne cruda & cocta.

Alæ extrinsecus, & macula utrinque supra infraque oculos cyanea.

- dubius.** 26. **C. fusco-ferrugineus,** vertice temporibusque nigris, basi collo & ab domine flavescens, rostro, oculis pedibusque nigris. *Jacquin Beytr. zur Gesch. der Voeg., p. 2.*

Habitat Carthagena in America.

Lineæ 2 albæ a basi rostri trans oculos ad occiput, ubi convergunt.

- cristatus** 8. **C. teetrichibus alarum lineis transversis nigris,** corpore cæruleo, collaris nigro.

Garrulus canadensis cæruleus. *Briss. av. 2. p. 54. n. 2. t. 4. f. 2.*

Pica glandaria cærulea cristata. *Robert ic. 1676. t. 14.*

Geay bleu de Canada. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 120. pl. enlum. n. 529.*

Blue Jay. *Arct. zool. 2. p. 249. n. 138. Catesb. car. I. p. 15. t. 15. Edw. glean. 60. t. 239. f. 1. Latham syn. I. I. p. 386. n. 20.*

Habitat in America septentrionali, glandario similis, sed multo minor, 11 pollices longus, gregarius, in uliginosis nidificans, cantu gratissimo; viciuat famelicus vermis & serpentibus, alias nucibus castaneis, potissimum

zœæ seminibus, hinc agris, hac consitis infestissimus;
Majo parit ova olivacea, maculis ferrugineis.

Capitis crista cœrulea, stria nigra a rectro ultra oculos producda; genæ cum gula & abdomine albæ; pectus ex erinarceo rubrum; dorsum pallide purpureum; testrices alarunæ, & remiges secundariæ cœruleæ, hæ etiam una cum testricum ordine albo-punctatæ; cauda longa cuneiformis nigro & cœruleo lineata apice alba; pedes nigri.

Stelleri. 27. C. corpore supra nigro, subtus, alis, caudaque longæ cuneiformi cœruleis, capite cristato.

Steller's Crow. Arct. zool. 2. p. 249. n. 139. Lath. syn. I. I. p. 387. n. 21.

Habitat in sinu Natka Americæ borealis, 15 pollices longus.
 Testrices alarum minores remigesque primariae intus sordidae; remiges secundariæ testricesque intermediae nigro lineatae.

cayanus. 9. C. subviolaceus subtus candidus, jugulo fronteque nigris, cauda apice alba.

Garrulus cayanensis, tribus utrinque maculis in capite albis. Briss. av. p. 52. n. 2. t. 4. f. I.

Geay de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 373.

Blanche-coiffe ou Geay de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 118.

Cayenne Jay. Lath. syn. I. I. p. 389. n. 22.

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum, pedes & unguis grisea; capistrum, genæ & nucha nigra; cauda rotundata violacea.

Caryoca- 10. C. fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris; rectricibus apice albis: intermediis apice detritis. Fn. suec. 91. Scop. ann. I. p. 37. n. 40.

Corvus cinereus, cauda alisque nigris. Fn. suec. I. n. 75.
 Caryocatactes. Gesn. av. 245. Will. orn. 90. t. 20. Raj.

av. p. 42. Nozem. nederl. Vogel. t. 3.

Merula faxatilis. Aldr. ornith. 2. p. 630.

Nucifraga. Briss. av. 2. p. 59. n. I. t. I. f. I.

Cassie-noix. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 122. t. 9. planch. enlum. n. 50.

Nut-cracker. Brit. zool. 2. app. p. 625. t. 3. Arct. zool 2. p. 252. D.

Waldstarl, Steinheher. Kranz. el. p. 334.

Tannenheher. Frisch. av. t. 56.

Nuskraehe. Schrank. Naturf. XVIII. p. 67.

Habitat in Europa & Sibiria ad Camtschateam usque, in pinetis potissimum, colligit editque infæda, bacca, nucis, præsertim pini pineæ; in cavis arborum nitidificans, moribus picæ similis, 13 pollices longus.

Corpus maculis triangularibus albis; crissum album; vertex caudæque testiculus non maculatus. Pennæ narium aliquando deficientes; lingua bicuspidata.

Balicassius. II. C. virescenti ater, cauda forficata.

Corvus splendide nigro-viridans. Buff. av. 2. p. 31. n. 9. t. 2. f. I.

Choucas des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 603.*

Balicasse des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 83. Habitat in insulis Philippinis, eximie cantans.*

Rostrum, pedes & unguis nigra; cauda fere 4 pollices longa.

Guineæ. novæ 28. C. fronte, capistro, caudaque nigris, capite, collo, dorso & pectoris parte superioré obscure cinereis, inferiore, abdomine, crasso & uropygio albis transversim nigro-striatis.

Choucas de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 80. pl. enlum. n. 629.*

New Guinea Crow. *Lath. syn. I. 1. p. 381. n. 13.*

Habitat in nova Guinea, pedem longus.

Rostrum nigricans; stria nigra per & pone oculos duæ; pedes breves, sordidi.

Papuensis. 29. C. cinereus abdomine albo, remigibus ex nigricante fuscis.

Choucas de la nouvelle Guinée: *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 81. pl. enlum. n. 630.*

Papuan Crow. *Lath. syn. I. 1. p. 382. n. 14.*

Habitat in nova Guinea, 11 pollices longus.

Rostrum fere pollicare, flavicans, dorso mandibulae superioris angulato; pedes parvi cinerei; unguis brevis.

Nudus. 30. C. niger, pileo ex mollioribus plumis contexto, collo rarius plumis contexto.

Colnud de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 82. planch. enlum. n. 609.*

Bare-necked Crow. *Lath. syn. I. 2. p. 382. n. 15.*

Habitat in Cayenna, monedulae magnitudine.

Rostrum basi latum, sordide cæruleum; alarum pennæ nonnullæ dilute griseæ.

calvus. 31. *C. ex ferrugineo fuscus, fronte & vertice calvis.*

Choucas chauve. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 80. pl. enlum. n. 521.*

Bald Crow. *Latham syn. I. 1. p. 383. n. 16.*

Habitat in Cayenna, 13 pollices longus.

Rostrum paulisper curvatum, sordide nigrum; pedes sordidi; color subtus & in testicibus caudæ superioribus dilutior.

pacificus. 32. *C. cinereus, subtus in spadiceum vergens, occipite, cere, alis caudaque nigris, alarum caudæque apice albo.*

Pacific Crow. *Lath. syn. I. 1. p. 383. n. 17.*

Habitat in insulis maris australis 10½ pollices longus.

Rostrum, pedes & unguis nigra; frons & gula pallida; rectrices 2 intermediae totæ nigrae.

tropicus. 33. *C. niger, crasso punctis sordide albis, cauda rotundata.*

Tropic Crow. *Lath. syn. I. 1. p. 384. n. 18.*

Habitat in insula O-why-hee maris australis 12½ pollices longus.

Rostrum 1½ pollicem longum, basi latum; color superbus splendidus, alarum & caudæ in virecentem vergens; pedes & unguis nigri.

erythro- 34. *C. corpore supra fusco subtus albicante, cauda cuneiformi,*

rhynchos. *remigibus basi dilute violaceis, medio nigris, apice albis.*

Geay de la Chine à bec rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 115. pl. enlum. n. 622.*

Red-billed Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 390. n. 24.*

Habitat in Sina, glandario major.

Rostrum pedesque rubri; frons, jugulum & pectus aterrima; occiput & cervix dilute grisea; unguis albicantes, longi, adunci, apice nigri.

finensis. 35. *C. supra ex rufo rubens, vertice fusco, superciliis albis, cauda fusca cuneiformi tænia versus apicem nigra, maculisque ad apicem rectricum sordide albis subrotundis.*

Chinese Jay. *Lath. syn. I. 1. p. 390. n. 35.*

Habitat in Sina, glandarii magnitudine & habitu.

Rostrum pedesque plumbi; linea trans & pone oculos duæ nigra; macula ex cærulecente & albo mixta circulo nigro inclusa ad aures; mentum album; remiges secundariae fuscae.

Sibiricus. 36. C. supra cinereus, subtus ex ferrugineo aurantius, remigibus rectricibus 2 intermediis cinereis, reliquis rectricibus aurantiis.

Geay de Sibérie. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 118. pl. enlum. n. 608.

Siberian Jay. Lath. syn. I. 1. p. 391. n. 26.

Habitat in Sibiria, 10 pollic. s longus.

Rostrum sordidum; frons, genæ, mentum, & jugulum pallida; vertex ex subfuscō niger, subcristatus; uropygium ex ferrugineo aurantium; pedes cinerei.

peruviana. 37. C. supra dilute viridis, subtus dilute flavus, vertice albo, fasciculo gulæ jugulique nigro, rectricibus tribus utrinque exterioribus flavis.

Geay du Pérou. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 116. n. 2. pl. enlum. n. 625.

Peruvian Jay. Lath. syn. I. 1. p. 391. n. 27.

Habitat in Peru.

Rostrum sordidum, basi linea cærulea circumscriptum; cauda cuneiformis.

flavus. 38. C. supra ex virescente fuscus, subtus flavus, mento & superciliis albis, alis caudaque ex rubescente fuscis.

Garlu ou Geay à ventre jaune de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 119. pl. enlum. n. 249.

Yellow-bellied Jay. Lath. syn. I. 1. p. 392. n. 28.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum nigrum; vertex strria media, longitudinali aurea; pedes graciles, breves, plumbei.

afer. 12. C. violaceo-niger, cauda cuneiformi.

Habitat in Africa; nonne idem cum senegalensi?

cyanus. 39. C. cinereus, vertice splendide atro, alis caudaque cyaneis, rectricibus longissimis, intermediis apice albis. Pall. it. 3. p. 694. n. 7.

Blue Crow. Lath. syn. I. 1. p. 394. n. 30.

Habitat in Dauuria, in quam gregarius adventat Aprili, timidus, astutus, clamosus, in arbustis & salicetis nidificans, habitu moribusque picæ similis, magnitudine lanii infastis. Corpus subtus magis albidum.

Pica. 13. C. albo nigroque varius, cauda cuneiformi. Fn. suec. 92.

Scop. ann. I. p. 33. n. 41.

Pica. Nozemian ned. crt. Vogel. t. 2.

Pica varia s. caudata. *Gesn.* av. 695. *Aldr. orn.* I. p. 784.
t. 785. *Jonst.* av. 44. t. 17. *Briss.* av. 2. p. 35. n. 1.

Pie. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 85. t. 7. pl. enlum. 488.

Magpye or Piapet. *Brit. zool.* I. n. 18. *Arct. zool.* 2. p. 247.
n. 136. *Hayes brit. birds.* t. 8. *Raj. av.* p. 41. t. 1.

Will. orn. p. 127. t. 19. *Albin. av.* I. t. 15.

β. Pica candida. *Briss.* av. 2. p. 39. n. 1. A. t. 3. f. 1.

Habitat in Europa & boreali America atqu? Afia ad Japon
usque, in Madera insula, ad pagos, in turribus, inter
hostes offensos, sylvarum osor, junior facile cicurandus,
& tum perquam docilis; viclus animalis & vegetabilis,
quisquiliæ, ova, pulli gallinarum anserunque; nidus
artificio?us, introitu unico; ova virescentia, maculis
creberrimis nigris. Migrat.

Longitudo 18 pollicum; nigro colori splendor viridis &
purpureus; cauda valde longa.

fenega- 14. C. nigro-violaceus, cauda cuneiformi, artubus nigris.
ensis. *Pica senegalensis.* *Briss. av.* 2. p. 40. n. 2. t. 3. f. 2.

Pie du Sénégâl. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 97. pl. enlum.
n. 538.

African Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 394. n. 31.

Habitat ad fluvium Senegal, picæ magnitudine, 14
pollices longus.

Color subtus fordide niger; rostrum nigrum; remiges
rectricesque fuscæ, margine ex violaceo nigro.

caribæus. 40. C. supra ferrugineus, subtus albus, capite, collo,
caudaque cuneiformi albo-striata cæruleis, torque
maculaque occipitali albis.

Galgulus antillarum. *Briss. av.* 2. p. 8. n. 6.

Pica Antillarum, & Pica perifica Aldrovandi? *Raj.* 24.
p. 152. & p. 4. n. 6.

Pie des Antilles. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 101. 129.

Habitat in insulis Antillis, picæ magnitudine.

Rostrum pedesque rubri; macula occipitis (in mare) lineis
transversis nigris; uropygium rectricesque caudæ super-
iores flavæ; remiges ex cæruleo virides, rectrices
alarum minores cajaneæ, medie virides, majores cæ-
ruleæ, (in femina virides) scapis marginibusque albidis.

africa- 41. C. supra fuscus, subtus fordide cinerascens, capite subcri-
nus. stato colloque purpureis, cauda cuneiformi apice alba.

African Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 396. n. 33.

Habitat in Africa, pedem & 10 pollices longus.

Rostrum pedesque rubri; occipitis pennæ apice griseo;
remiges exteriori margine cœrulecentes.

mexica- 42. C. totus ex cœruleo ater.

nus. Pica mexicana major. *Briff. av. 2. p. 43. n. 4.*

Hoitzanatl. Raj. av. p. 162.

Criard. *Pernett. it. mal. I. p. 185.*

Hocisana. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 103.*

Mexican Crow. *Lath. syn. I. I. p. 396. n. 34.*

Habitat in nova Hispania, ad oppida, perpetim sonorus,
monodelæ magnitudine.

Rostrum, pedes & unguis nigri.

surina- 43. C. viridis, occipite remigumque primiarum apice
 menis. cyaneis, macula cervicis & pone aures pallide viri-
 dibus, cauda fœdita.

Surinam Daw. Brown. illustr. t. 10.

Surinam Crow. Lath. syn. I. I. p. 397. n. 35.

Habitat in Surinamo, corones magnitudine.

Color profundus variabilis; rostrum, remigesque primariae
fœdita; pedes incernati.

Zanoe. 44. C. nigricans, capite colloque subfulvis, cauda longa.

Pica mexicana minor. *Briff. av. 2. p. 44. n. 5.*

Tzanahoei, seu Pica mexicana Hernand. *Raj. av. p. 162.*

Zanoe. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 106.*

Lesser mexican Crow. *Lath. syn. I. I. p. 397. n. 36.*

Habitat in nova Hispania, picæ magnitudine, eique mo-
ribus, astutia, garrulitate, docilitate similis.

Rostrum, pedes & unguis nigra.

brachyu- 15. C. viridis, subtus lineisque capitatis fulvescentibus, alis
 rus, macula alba.

Merula viridis moluccensis. *Briff. av. 2. p. 316. n. 56.*
t. 32. f. 1.

Pica indica vulgaris. Raj. av. p. 195. t. I. f. 10.

Breve de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 414.*

Merle de Bengale. *Buff. pl. enlum. n. 258.*

Short-tailed Crow. *Lath. syn. I. I. p. 398. n. 37.*

β. Corvus philippensis.

Merula viridis moluccensis. *Briff. av. 2. p. 319. n. 57.*
t. 32. f. 2.

Breve des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 413. n. I.*

Merle des Philippines. *Buff. pl. enlum. n. 259.*

γ. *Corvus bengalensis.*

Breve. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 413. n. 2.*

Madras Jay. *Raj. av. p. 195.*

Bengal Quail. *Alb. av. I. t. 31.*

Short-tailed Pye. *Edw. glean. t. 324.*

δ. *Corvus madagascariensis.*

Breve de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 414. n. 4.*

Merle des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 257.*

Habitat in insulis oceanii Indici, 6-7 pollices longus.

Rostrum fuscum; caput nigruin, in γ. tæniis nigris, albis & ex aurantio fuscis alternantibus; anguli oris aurantii; irides albidæ; gula, remiges & cauda nigræ, hæ apice viridi; pedes aurantii; unguis sordide rubri.

canaden- 16. C. fuscus, fronte flavicante subtus rectricumque apicibus albus.

Garrulus canadensis fuscus. Briss. av. 2. p. 54. n. 3. t. 4. f. 2.

Geay brun de Canada. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 117. pl. enlum. n. 530.*

Cinereous Crow. *Arct. zool. 2. p. 248. n. 137. Latham syn. I. I. p. 389. n. 23.*

Habitat in America boreali, & occidentalis potissimum ejus partis silvis, hieme ad habitatcula hominum, audax, furto deditus, per paria volitans, vix cicurandus, pernum pro hieme colligens, algis, vermis, carne vicitans, nidificans primo vere in pinibus, ovaque cœrulea pariens, incolis detestatus, ad 11 pollices longus.

Rostrum robustum nigrum; nares fasciculo pennarum albidarum teatæ; genæ ex rufescente sordide albae; verticis pennæ longæ & nigræ; alæ, cauda longa, cuneiformis, & pedes nigrae.

Pyrrho- 17. C. nigricans, rostro luteo, pedibus nigris.

corax.

Pyrrhocorax. Gesn. av. 527. Aldrov. av. I. p. 769. t. 16. Briss. av. 2. p. 30. n. 8. t. I. f. 2.

Choucas des Alpes. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 76. t. 6. pl. enlum. n. 531.*

Alpine Crow. *Lath. syn. I. I. p. 183. n. 11.*

Choagh. *Hayes brit. Birds. v. 6.*

Habitat in aripibus Helveticis, 15 pollices longus; voce austra ingrata; seminibus vitudans, hinc segetibus infestus; caro sapida.

Ungues nigri, pedes aliquando flavi; rostrum, prouti tribus inaequentibus, subulatum curvum, longius.

Graculus. 18. *C. violaceo-nigricans*, rostro pedibusque rubris. *S. G.*
Gmelin it. 3. t. 39.

Gracula pyrrhocorax. *Scop. ann.* I. p. 42. n. 46.

Monedula Pyrrhocorax. *Hässelq.* it. p. 238. n. 19.

Coracias. *Aldr. orn.* I. p. 766. t. 368. *Briss. av.* 2. p. 3.
 n. I. t. I. f. I. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. I. t. I.
 pl. enlum. n. 255.

Coracias s. *Pyrrhocorax*. *Raj. av.* p. 40. n. 6.

Graculi tertium genus. *Gesn. av.* 522.

Cornish Chough. *Alb. av.* 2 t. 24. *Borlas. Cornw.* p. 249.
 t. 24. *Will. ornith.* p. 126. t. 19.

Red-legged Crow. *Brit. zool.* I. n. 80. *Latham syn.* I. I.
 p. 401. n. 39.

Habitat in alpibus Helveticis & Noricis, Anglia,
 Scotia, Ægypto, Candia, Persia, *inquietus*, *clamitans*,
vorax, *intimidus*, *furto deditus*, *moribus*
monedulae, *gregarius*, *in circulo volitans*, *in rupibus*
nidificans, *ova pariens* 4-5 *alba maculis flavis*,
vicitans baccis juniperi, *locustis*, *battis*.

Magnitudo monedulae; *longitudo* 16 *pollicum*; *iridum*
circulus exterior rubens; *interior griseus*; *palpebrae*
rubrae; *ungues magni*; *adunci*, *nigri*.

australis. 45. *C. supra niger*, *subtus cinereus*, rostro rubro, tecri-
 cibus alarum albo maculatis, cauda rotundata.

Cayenne red-billed Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 403.
 n. 40.

Habitat in Cayenna, *turdi viscivori magnitudine*, 11
pollices longus.

Rostrum sesquipollicare; *setæ narium nigrae*; *pedes*
sordidi; *ungues nigri*.

Eremita. 19. *C. virescens*, capite flavescente, occipite subcristato,
 rostro pedibusque rubris.

Upupa Eremita. *Syst. nat.* X. I. p. 118. n. 3.

Coracias cristata. *Briss. av.* 2. p. 6. n. 2.

Corvus sylvaticus. *Gesn. av.* 351. *Aldr. orn.* 3. p. 267.
 270.

Coracias huppé ou Sonneur. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 9.
Gesner's Wood Crow. *Will. orn.* p. 396.

Wood Crow from Switzerland. *Albin. av.* 3. t. 16.

Hermit Crow. *Lath. syn.* I. I. p. 403. n. 41.

Habitat in alpibus Helveticis, Apenninis, Noricis, *gallinæ*
magnitudine, *altissime volans*, *gregarius*, *migratorius*,

*in rupibus, turribus, & antiquis ædificiis nidificans,
2-3 ova pariens, junior facillime cicurandus. Caro scipida.
Color niger, cum splendore viridi; caput striis rubris;
cauda brevis.*

51. CORACIAS. *Rostrum cultratum apice incurvatum, basi pennis denudatum.
Lingua cartilaginea bifida.
Pedes ambulatorii.*

Garrula. 1. *C. cærulea*, dorso rubro, remigibus nigris. *Fn. suec.* 94
Scop. ann. I. p. 40. n. 44.

*Cornix cærulea. Gesn. av. 335. Aldr. ornith. I. p. 790.
t. 791. 792. Günth. Neft. u. Eyer t. 14.*

Galgulus. Briss. av. 2. p. 64. n. I. t. 5. f. 2.

Garrulus argenteoratensis. Raj. av. p. 41. n. 3.

Rollier. Buffon pl. en!um. n. 468.

Rollier d'Europe. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 135. t. 70.

*Roller. Brit. zool. app. p. 624. t. 2. Arct. zool. 2. p. 253. G.
Raj. av. p. 42. Wille orn. p. 131. t. 20. Edw. av. t. 107.*

Blauer Raker, Birkheher. Frisch. av. t. 57.

*Habitat in Africa, Syria, Sibiria & Europa, gregaria,
sonora, migratoria, timida, in arboribus, præsertim
betula, rarius in argilla nidificans, ova pariens dilute
virentia, maculis innumeris obscuris, viditans scar-
bæis, vermibus, ranis, glandibus, frugibus; caro multis
deliciosa.*

Magnitudo corvi glandarii.

*Pone cures macula utrinque calva; remiges primariae subitus
cæruleæ; rectrices intermediae sordide virides, ceteræ
cæruleæ, exteriori margine nigro-punctatae; pedes
flavicantes.*

indica. 2. *C. cærulea antice testacea, pileo viridi.*

Blue Jay from the East-indies. Edw. glean. t. 326.

Indian Roller. Latham syn. I. I. p. 412. n. 7.

Habitat in Zeylon, garrulæ similis, 11 pollices longa.

*Rostrum nigrum, sesquipolllicare; vertex ex cæruleo viridis;
cervix dorsique pars superior testacea; tempora & gula
albo-striata; alæ ex viridi & cæruleo mixtae; rectrices
exteriores media sui parte thalassina.*

*Coraciæ genus per eum nem terrarum obtem dispersum; pedibus brevibus ab affinitate
dislinendum.*

- caffra.* 3. *C. cærulea*, remigibus margine exteriore luteis.
Cape-Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 412. n. 8.
Habitat in Aethiopia. I. *Burmann.*
Femina ex cærulecente nigra.
- abyssinica.* 7. *C. viridis*, genis albis, humeris, uropygio & remigibus majoribus cæruleis, dorso remigibusque secundariis ex aurantio fuscis.
Rollier d'Abyssinie. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 143. *planch. enlum.* n. 626.
Abyssinian Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 408. n. 2.
Habitat in Abyssinia.
- senega-* 8. *C. supra* ex rubente fusca, subtus, capite, cauda, alarumque parte superiore ex cærulecente thalassinis, facie alba, humeris remigibusque cæruleis.
Rollier du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 143. *planch. enlum.* n. 326.
Swallow-tailed Indian Roller. *Edw. glean.* t. 327.
Senegal Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 408. n. 3.
Habitat ad fluvium Senegal, & in Zeylon, corvi glandarii magnitudine.
Rostrum nigrum; cauda furcata; pedes ex rubente incarnati.
- madagas-* 9. *C. ex ferrugineo purpurascente fusca*, uropygio, crisco & cauda ex cæruleo viridibus, hac versus apicem fascia purpurascente, apice ipso, remigibusque supra ex atro cæruleis.
Rollier de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 148.
Rolle de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 501.
Madagascar Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 413. n. 11.
Habitat in Madagascar, cyaneæ magnitudine.
Rostrum breve, flavum; oculi magni; remiges interiori margine nigræ; pedes ex rubente fuscæ.
- orienta-* 4. *C. viridis*, jugulo cæruleo striato, rectricibus apice nigris.
Galgulus indicus. *Briss. av.* 2. p. 75. n. 4. t. 7. f. 2.
Rollier des Indes. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 147. *pl. enlum.* n. 619.
Oriental Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 411. n. 6.
Habitat in India, corvi glandarii magnitudine, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum flavicans, basi latius, apice magis aduncum, quam reliquis specibus; corpus supra ex viridi in fuscum, subtus ex cæruleo in viridem vergens; caput & cervix fusca;

remiges ex cæruleo & nigro mixtæ, macula in medio magna pallide cærulea; rectrices basi virides, 2 intermediae nigræ, reliquæ cæruleæ; pedes flavicantes, unguis niger.

benga-
lensis.

5. C. subfulva, subtus cærulescens, collo subtus violaceo pallido striato, cauda integra.

Corvus bengalenlis. Syri. nat. X. I. p. 106. n. 6.
Galbulus mindanoensis. Briss. av. 2. p. 69. n. 2. t. 6. f. 1.
*Cuit ou Roliier de Mindanao. Buff. hist. nat. des ois. 3
p. 144. pl. enlum. n. 285.*

Bengal Pye. Albin. av. I. t. 17.

Bengal Roliier. Latham syn. I. I. p. 410. n. 5.

Habitat in Bengal, & insula Mindanao, 12½ pollices longa.
Rostrum unguisque nigricantes; vertex viridis; colon fulvo violaceus admixtus; dorso pars inferior cum uropygio cærulea; testus rufum, in violaceum colorem vergens; rectrices a. arum minores, caudæque superiores ex atro cærulea; alarum majores remotioreque ex cæruleo virides, mediae ex cæruleo & viridi mixtae, proximæ virides; remiges 5 primariae ex atro cærulea; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquæ ex cæruleo virides, basi & apice cæruleæ; pedes grisei.

caudata. 6. C. subfulva, subtus cærulescens, collo subtus violaceo pallido striato, testicibus extimis longissimis.

Galbulus angolensis. Briss. av. 2. p. 72. n. 3. t. 7. f. 1.
*Roliier d'Angola. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 144. pl.
enlum. n. 83.*

Long-tailed Roller. Lath. syn. I. I. p. 409. n. 4.

Habitat in Angola, corvi glandarii magnitudine, 15½ pollices longa.

Rostrum & unguis nigricant; occiput & cervix virent; dorsi pars inferior, cum uropygio & testicibus alarum cærulea; rectrices caudæ superiores ex cæruleo virides; abdomen, femora, testrices alarum & caudæ inferiores, & ad medium usque remiges thalassina; rectrices 2 intermediae obscure virides, reliquæ ex cæruleo virides, pars ext. marum supra ceteras producita ex atro cærulea; pedes grisei.

cærulea. 10. C. supra ex cæruleo pallide viridis, subtus ferruginea, alarum apice nigro.

Blue Roller. Lath. syn. I. I. p. 412. n. 9.

Longitudo 8 pollicum; rostrum solidum.

cyanæa. 11. C. tota splendide cyanæa.

Ultramarine Roller. *Lath. syn.* I. I. p. 413. n. 10.
Longitudo 8 *pollicum*; rostrum *sordidum*.

cayen-
nensis. 12. C. ex fuscescente viridis, subtus sordide alba, superciliis
albis, gulæ stria utrinque nigra, cauda cuneiformi.
Griverd ou Rolle de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3.
p. 134. pl. enlum. n. 616.
Cayenne Roller. *Lath. syn.* I. I. p. 415. n. 15.
Habitat in Cayenna, 9 pollices longa.
Rostrum *robustum*, *rubens*, *versus apicem paulisper cur-*
vatum; pedes pallide *grisei*, *longiores*, *quam in reli-*
quis speciebus.

mexicana. 13. C. ex rufo grisea, subtus & alis dilute griseis, flammeo
admixto.
Galgulus mexicanus. *Briff. av.* 2. p. 83. n. 8.
Merula mexicana. *Seb. mus.* I. t. 64. f. 5.
Rollier du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 148.
Mexican Roller. *Lath. syn.* I. I. p. 413. n. 12.
Habitat in nova Hispania, turdo multo major.

atriata. 14. C. ex cæruleo atra, striis ex virescente cæruleis, rostro,
cauda pedibusque nigris.
Blue striped Roller. *Lath. syn.* I. I. p. 414. n. 13. t. 16.
Habitat in nova Caledonia, 8 pollices longa.
Irides *ruberæ*; femina non *striata* ex *cinereo grisea*; remi-
gibus teætricibusque *alarum nigris*, *margine cinereo.*

varia. 15. C. nigra, subtus, dorsi parte inferiore, uropygio & tec-
tricibus caudæ superioribus alba, cauda æquali nigra
apice alba.
Cassican de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois.*
7. p. 134. t. 7. pl. enlum. n. 628.
Pied Roller. *Lath. syn.* I. I. p. 415. n. 16.
Habitat in nova Guinea? 13 *pollices longa*, *dubii generis.*
Rostrum $2\frac{1}{2}$ *pollicum*, *cærulescens*; teætrices *alarum ex*
albo & nigro variae; secundariorum *aliae nigræ*, *aliae*
albæ; remiges *majores alarumque margo exterior ni-*
gra; teætrices *2 intermediae totæ nigræ*; pedes *plum-*
bei; unguis *robusti*, *acuti*, *nigri*.

finensis. 16. C. viridis, subtus ex flavicante alba, cauda cuneiformi,
apice alba.
Galgulus finensis. *Briff. av.* 2. p. 77. n. 5. t. 6. f. 2.

Rolle de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 132.

Rollier de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 620.

Chinese Roller. *Lath. syn.* I. 1. p. 414. n. 14.

Habitat in Sina, rario, corvi glandiarii magnitudine, 11½ pollices longa.

Rostrum, irides, pedes & unguis rubent; stria nigra per oculos ducta; femora grisea; testrices alarum, remigia que olivaceæ; harum nonnullæ apice albo.

docilis. 17. C. alba cum rubicundo intersperso, subtus hædia pedibus luteis, rectricibus nigris, apice albis. *S. G. Gmelin it.* 3. p. 378. t. 42.

Habitat in Asia australi, monedulae magnitudine, docilis, imitabunda.

Rostrum luteum; remiges 9 priores ad medium usque albae, reliqua parte nigræ, ceteræ totæ nigræ; unguis incarnatus.

52. ORIOLUS. Rostrum conicum, convexum, acutissimum rectum: mandibula superiore paulo longiore, obsolete emarginata.

Lingua bifida acuta.

Pedes ambulatorii.

Galbula. 1. O. luteus, lotis artnibusque nigris, rectricibus exterioribus postice flavis. *Aā. Stockh.* 1750. 127. t. 3. f. 5.

Coracias Oriolus. *Fn. suec.* 95. *Scop. ann.* I. p. 41. n. 45. *Forsk. Fn. arab.* p. 7.

Oriolus. *Gesn. av.* 713. *Briff. av.* 2. p. 320. n. 58. *Norzeiman nederl. Vogel.* t. II.

Chlorion. *Gesn. av.* 261.

Galbula s. Picus nidum suspendens. *Raj. av.* p. 58. n. 5.

Loriot. *Buff. hist. nat. des ois.* 2. p. 554. t. 17. *pl. enlum.* n. 26.

Yellow Bird from Bengal. *Alb. av.* 3. t. 19.

Witwall. *Will. orn.* p. 189.

Golden Thrush. *Edw. av.* t. 185.

Oriole. *Brit. zool. app.* n. 4. t. 4.

Golden Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 449. n. 43.

Kirschvogel. *Günth. Neft. u. Eyer,* t. 47.

8. Icterus maderaspatanus nævius. *Briff. av.* 2. p. 91. n. 5.

Mottled Jay. *Raj. av.* p. 195. n. 9. t. 1. f. 7.

Yellow Starlin from Bengal. *Albin.* av. 2. t. 41.

Yellow Indian Starling. *Edw.* av. t. 186.

γ. *Oriolus indicus.* *Briss.* av. 2. p. 328. n. 60.

Chloris indicus. *Aldr.* av. 1. fig. p. 862. *Johnst.* av. t. 41.

Loriot des Indes. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 264.

Habitat in Europa, Asia, Africa, migratorius, viditans cerasis, uvis, sicubus, insectis; nidus e foliis urceolatus in ramificationibus arborum; ova 4-5 sordide alba; maculis exiguis obscure fuscis; caro sapida; vox acuta.

Longitudo 9 $\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum & irides rubent; in β. corpus maculis nigris conspersum; lora artusque in feminæ ex virescente fusca; alæ hinc inde maculis flavis, magnaque in medio, feminæ sordidæ, in γ. maculis cæruleofuscis interbus insignitæ; in β. tectrices alarum remigesque nigricantes; rectrices 2 intermedie apice demuni, reliquæ a medio inde flavæ; feminæ cauda sordide viridis, rectribus 2 interneditis ex flavicante albis, in β. nigricans, in γ. tænia in medio cæruleofuscata; pedes plumbei; unguis nigri; in β. caput collumque nigra; tectrices caudæ nigro-maculatae.

chinensis. 2. *O. luteus, artibus nigris apice luteis, fascia occipitis nigra.*

Oriolus cochinensis. *Briss.* av. 2. p. 326. n. 59. t. 33. f. 1.

Coulavan. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 262.

Couliavan de la Cochinchine. *Buff. pl. enlum.* n. 570.

Habitat in Cochinchina, nonne varietas Galbulæ?

Rostrum flavum; pedes nigri; fascia occipitis ab oculo per occiput ad oculum ducta.

melanoccephalus. 3. *O. luteus, capite, remigibus, apicibusque rectricum intermedianarum nigris.*

Sturnus luteolus. *Syst. nat.* X. 1. p. 167.

Oriolus bengalensis. *Briss.* av. 2. p. 329. n. 61.

Pica maderaspatana sturni iustar maculata. *Raj.* av. p. 175. t. 1. f. 7.

Loriot de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 262. *planch. enlum.* n. 79.

Black headed Indian Icterus. *Edw.* av. t. 77. *Alb.* av. 2. p. 41. t. 41.

*Habitat in regione Maderaspatana, 8½ pollices longa,
Galbulæ varietas.*

*Irides badiæ; gula & pedes nigri; alæ striis longitudi-
nibus flavis insignitæ.*

radiatus. 21. *O. fulvus, capite, gula juguloque nigris albo punctatis,
alarum tectricibus remigibusque nigris margine albo.*
Oriolus capite striato. Briss. av. 2. p. 332. n. 62.
Merula bicolor Aldrovandi. Raj. av. p. 67. n. 11.
Loriot à tête rayée. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 265.
Aldrovandus brasiliæ Merula. Will. orn. p. 193. §. 5.
Striped-headed Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 453. n. 44.
Corpus subtilis pallidius; pedes *flavi;* unguis *rubicundus.*

Picus. 22. *O. rufus, capite, collo & pectori albo maculatis, cauda
rotundata.*
Talapiot. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl. enlum. n. 60.
Climbing Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 453. n. 45.
*Habitat in Gujanæ arboribus, quas pici instar conscendit, in-
secatque pone corticem latentiz extrahit, 7 pollices longus.*
Rostrum ex flavicante griseum; abdominis color in fuscum
vergens; pedes nigricantes.

Icterus. 4. *O. fulvus, capite, jugulo, dorso, remigibus tectricibusque
nigris, macula alarum alba.* Scop. ann. I. p. 39. n. 40.
Oriolus. Briss. av. 2. p. 86. n. 1. t. 8. f. 1.
Coracias Xanthornus. Scop. ann. I. p. 39. n. 42.
Guira-Tangeima. Marcgr. bras. 192. Raj. av. p. 45. n. 6.
Will. orn. p. 141.
Troupiale. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 203. t. 16. planch.
enlum. n. 532.

Banana Bird from Jamaica. Alb. av. 2. t. 40.
Large Banana Bird from Jamaica. Brown. jam. p. 447.
Yellow. and black Pie. Raj. av. p. 181. n. 10. Sloan. Jam.
p. 301. t. 259. f. 4. Catesb. carol. app. t. 5.

Icteric Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 424. n. 6.
*Habitat in America calidiore, insulisque Caribæis, agilis
& audax, chrysalides potissimum persequitur, nedium struit
cylindricum, ab extremo arboris ramo pendulum, in
America frequenter ad necanda insecta domesticus, cum
perquam docilis, 9½ pollices longus.*

*Rostrum ut plurimum nigrum, basi fuscum, orbitæ nivæ
cærulecentes; irides flavicantes; alarum fasciæ duæ
oblique albæ; pedes aliis nigri; aliis plumbei, aliis
ex griseo albi.*

- novæ Hispanæ 23. O. flavus, capite, gula, remigibus caudaque nigris, tectricibus alarum majoribus apice flavo, minoribus totis nigris.
Icterus mexicanus. Briss. av. 2. p. 88. n. 2.
Avis americana de Acoichichi nigro-lutea. Seb. mus. I. t. 54. f. 4.
Acoichi de Seba. Buffon hist. nat. des ois. 3. p. 206.
Mexican Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 425. n. 8.
Habitat in nova Hispania, Ideri magnitudine.
Rostrum longum, flavum.
- annula- 24. O. flavus, capite colloque nigris, tectricibus alarum majoribus remigibusque nigricantibus flavicante marginatis, cauda nigricante annulata.
Icterus cauda annulata. Briss. av. 2. p. 89. n. 3.
Avis Ocotzinitzan, columbae magnitudine. Seb. mus. I. p. 97. t. 63. f. 3.
Arc-en-queue. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 207.
Habitat in America, columbae magnitudine.
Rostrum flavum; pedes grisei.
- brasiliæ- 25. O. flavus, pectore maculato, capite dorsoque dilute fuscis maculatis, abdomine albo, cauda aliquaque fuscis, his apice albidis.
Icterus brasiliensis. Briss. av. 2. p. 93. n. 8.
Small yellow and brown Bird. Sloan. jam. p. 309. n. 43.
Brasilian Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 426. n. 9.
Habitat in Jamicæ dumetis, 4 pollices longus.
Rostrum $\frac{1}{2}$ pollicem longum; orbitæ flavæ; pedes fuscæ; unguis flavi.
- Japacani. 26. O. ex nigro & dilute fusco, subtus exalbo & flavo varius, lineis tr. nivatis, nigris, capite caudaque nigricantibus.
Japacani. Raj. av. p. 84. n. 12. Will. orn. p. 240. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 208. Lath. syn. I. 2. p. 426. n. 10.
Braziliano duplo major; rostrum nigrum; irides aurcae; pedes sordidi; unguis acuti & nigri.
- Costo- 27. O. niger, subtus caudaque ex croceo & nigro varius.
Icterus novæ Hispanæ. Briss. av. 2. p. 95. n. 10.
Xochioli & Costototl. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 210.
New Spain Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 427. n. 11.
Habitat in nova Hispania, sturni magnitudine.
Aix subtus cinereæ; junior avis tota flava, exceptis alarum apicibus nigris.

griseus. 28. O. ex nigro & flavo varius, dorso, femoribus & abdomine cinereis.

Icterus cinereus novæ Hispaniæ. Briss. av. 2. p. 96. n. 11.
Tocolin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 213.

Grey Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 427. n. 12.

Habitat in novæ Hispaniæ sylvis, sturni magnitudine, non canorus; caeo Japida.

phœnicius. 5. O. niger, alarum teetricibus fulvis.

Icterus pterophœnicus. Briss. av. 2. p. 97. n. 12.
Pterophœnicus Indiarum. Nieremb. nat. 225.

Acolchichi. Hern. mex. 14. Raj. av. p. 166. n. 6.
Commandeur. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 214.

Troupiales à ailes rouges. Buff. pl. enlum. n. 402.

Scarlet-feathered Indian Bird. Will. orn. p. 391.

Red-winged Starling. Catesb. Carol. I. t. 13. Alb. av. I. t. 13.

Red-winged Oriole. Arct. zool. 2. p. 255. n. 140. Lath. syn. I. 2. p. 428. n. 13.

Habitat gregibus numerosissimis in America a Novaboraco ad novam Hispaniam usque, sturni magnitudine, 8-9 pollices longus, oryzæ segetes devastans, insectis ceterum vivitans, & vermis, qui ea ave extirpata tanto letius vivunt & multiplicantur. Nidum struit densum pendulum inter arundines ea altitudine, ut fluctus avellere non possint; ova parit alba striis raris & irregularibus nigris.

Tota avis nigra, exceptis iridibus albis, alarumque teetricibus fulvis vel rubris.

america-29. O. niger, mento, jugulo, pectore alarumque angulus, superiore rubris.

Merula indica, pectore cinnabarinio, an Jacapu Marcgr.?
Raj. av. p. 67. n. 10.

Troupiale de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218.
pl. enlum. p. 236. f. 2.

Red-breasted Indian Blackbird. Will. orn. p. 194. n. 7.

Mocking bird of Guiana. Bancr. Guj. p. 177.

Red-breasted Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 430. n. 34.

Habitat in Guiana & Cayenna, 7 pollices longus, gratus canorus, imitabundus, nido cylindrico longo pendulo.

oryzivo-30. O. niger, capitis, colli pectorisque splendore purpureo-rubus.

Rice Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 423. n. 5.

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum sesquipollicare, basi convexum & protuberans.

- Iudovi- 31. O. ex nigro & albo varius, capite, collo, abdomine &
tianus. uropygio albis, alis caudaque cuneiformi violaceis
marginae albo.
Cassique de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 242.*
pl. enlum. n. 646.
White-headed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260. n. 148. Lath.*
syn. I. 2. p. 422. n. 4.
Habitat in America boreali, potissimum Louisiana, 10
pollices longus.
Rostrum nigrum, pollicare, pedes plumbrei.
- hudso- 32. O. sordidus, capite, gula, tectricibus alarum nonnullis
nius. inferioribus, remigibus primoribus, femoribus, pectoris-
que striis albis.
Hudsonian white-headed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 260.*
n. 148.
Habitat in sinu Hudsonis, 8 $\frac{1}{2}$ pollices longus, rarer.
- cristatus. 33. O. aterrimus, vertice pennis aliquot elongatis subcristato.
Xanthornus maximus. *Pall. spicil. zool. 6. p. 3. t. I.*
Cassique huppé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p.*
245. pl. enlum. 344.
Crested Oriole. *Latham syn. I. 2. p. 421. n. 3.*
β. Xanthornus olivaceus, subtus badius. *Lath. syn. I. 2.*
p. 421. n. 3. A.
γ. Cassique vert de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 240.*
pl. enlum. n. 328.
Grüner Citronvogel. *Naturf. IV. p. 1. t. 1.*
*Habitat in Surinamo & Cayenna, 18. β. 20. γ. 14 polli-
ces longus.*
Rostrum majuscum sordide flavum, in β. apice aurantium,
in γ. totum rubrum, basi versus frontem denudata, gib-
bosa, rotundata & convexa; nares laterales subrotundæ,
parvulae in fulco obsoleto, ante tophum plumaceum horri-
dulum lateraliter in rostrum excurrentem positæ denu-
datae; lingua angusta canaliculata, profunde in 2 laci-
nias acute fissæ; pili ad oris angulos vel tenerrimi, vel
nulli; cauda rotundata, rectricibus 2 intermediis nigris,
in β. badiis, reliquis citrinis; in γ. corpus antice cum
tectricibus alarum viride, posifice badium; remiges pedes-
que nigrae.

- hæmor- 6. O. niger, uropygio coccineo, *Briss. av. 2. p. 98. n. 13.*
thous. *t. 8. f. 2.*
Cassique rouge de Brésil ou Jupuba. *Buff. hist. nat. des*
ois. 3. p. 238. pl. enlum. n. 482.

Red-rumped Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 420. n. 2.

β . Cassique brun. *Ornith. de Salern.* p. 112.

Habitat in Brasilia, Cayenna, & in Guiana, 11 pollices longus.

Rostrum sulphureum; in β . corpus ex atro fuscum, uropygium vinaceum.

perficus. 7. O. niger, dorso postico, maculaque tectricum alarum basique rectricum luteis.

Cassicus luteus. *Briß. av.* 2. p. 100. n. 14. t. 9. f. I.

Cassique jaune du Brésil. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 235. pl. enium. n. 184.

Pica persica. *Bell. ex.* 292. *Aldr. orn.* I. p. 793. t. 795. *Will. orn.* 90. *Raj. av.* 42.

β . Jupujuba. *Marcgr. bras.* 193.

Jupujuba s. Japu. *Raj. av.* p. 46. n. 7.

Brasilian Jupujuba, or Japu of Marcgrave. *Will. orn.* p. 142.

7. Black and yellow Daw of Brasil. *Edw. av.* p. 319.

Habitat in calidioribus Americae australis; nidus alembici forma prope pagos ex arboris extremis ramis pendens (ex una non unquam 400) ex stramine, setis, pilis, totlandia usneoidae contextus, ter non raro per annum pariens.

- Rostrum flavescens; lingua β . cærulea; irides cæruleæ; pedes & unguis nigri; in γ . nigredini purpureus splendor affulget; in β . rectrices subtus flavae, altera parte nigrae, supra nigrae; extimæ basi flavae.

mexica- 8. O. nigricans, subtus capiteque luteus.

nus. *Iclerus fuscus novæ Hispaniæ. Briß. av.* 2. p. 105. n. 17. *Troupiale à calotte noire. Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 222. *Troupiale jaune à calotte noire de Cayenne. Buff. pl. enium.* n. 533.

Black-crowned Oriol. *Lath. syn.* I. 2. p. 431. n. 17.

Habitat in nova Hispania & Cayenna, 19 fere pollices longus. Rostrum, pedes & unguis flavicant; collum flavum; vertex ex atro fuscus; cauda & alæ nigrae.

tuber. 34. O. miniatus, alis, abdomine & cauda nigerrimis.

Troupiale rouge d'Antigue. Sonner. it. p. 113. t. 63.

Red Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 431. n. 16.

Habitat in Antigua insulæ Panay.

Rostrum pedesque nigricant.

gujanen- 9. O. nigricans, marginibus pennarum griseis, pectoralibus, que subtus rubris.

Icterus gujanensis. Briss. av. 2. p. 107. n. 18. t. II. f. I.
Troupiale de la Gujane. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 218.
pl. enlum. n. 536.

Gujana Oriole. Latham. syn. I. 2. p. 430. n. 15.

Habitat in Guiana, ultra 7 pollices longus.

Pennarum margo, caudæque striæ griseæ; corpus a mento
ad abdonem rubrum; pedes & unguis fuscæ.

flavus. 35. O. aureus, dorso postico, alis, caudaque nigris.

Troupiale jaune d'Antigue. Sonner. it. p. 113. t. 69.

Antiguan yellow Oriole. Lath. syn. I. 2. p. 432. n. 18.

Habitat in Antigua insulæ Panay, & America australi.

Rostrum & pedes nigricant; irides rubent.

Baltimo- 10. O. nigricans, subtus fascia que alarum fulvus.

re. Icterus minor. Briss. av. 2. p. 109. n. 19. t. 12. f. I.

Baltimore. Arct. zool. 2. p. 257. n. 142. t. 12. Catesb.
Carol. I. t. 48. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 231. pl.
enlumi. n. 506. f. I. Lath. syn. I. 2. p. 433. n. 19.

Habitat in America boreali, ante hiemem discedens, 7
pollices longus; nidum struit marsupii forma apice pa-
tulum foramine laterali hiantem ex bifurcatura ranco-
rum liriodendri, platani, &c. penduluni.

Rostrum plumbeum; tectrices alarum majores nigræ apice
albo; remiges primores sordidæ, margine albo; tectrices
2 intermediae nigræ, reliquæ parte inferiori nigræ,
reliqua aurantia.

Feminæ caput & dorsum olivaceum subfuscō marginatum;
corpus subtus, caudæque tectrices flavæ; cauda ipsa
sordida, margine flavo.

spurius. 11. O. niger, subtus fulvus, fascia alarum alba.

Icterus minor spurius. Briss. av. 2. p. 111. n. 20. t. 10. f. 3.
Baltimore Bastard. Arct. zool. 2. p. 258. n. 143. Buff. hist.
nat. des ois. 3. p. 233. pl. enlumi. n. 506. f. 2. Latham.
syn. I. 2. p. 433. n. 20. Catesb. Carol. I. t. 49.

Habitat in America boreali, præcedentis magnitudine,
paucotanien brevior; nido ex arbore malo pendulo; ovis 5.
Dorsi pars inferior tectricesque caudæ fulvæ; alarum mi-
nores dilute badiæ, majores nigræ, margine sordide
albo; remiges sordidæ margine albo; cauda nigra cu-
neiformis.

Feminæ caput cervixque olivacea, gula nigra; tectrices
alarum remigesque sordidæ margine albo; corpus subtus
ex virecente flavyum; cauda sordida, margine flavo.

- textor.** 36. *O. flavius*, capite fusco cum splendore aureo, remigibus rectricibusque nigris antibus margine aurantio.
Cap-morc. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 226.
Troupiale mâle & femelle du Sénégal. *Buff. planch. enlum.* n. 375. 376.
Weever-Oriole. *Lath. syn. I. 2.* p. 435. n. 21.
Habitat ad fluviū Senegal, voce acuta, galbulæ magnitudine; uterque sexus nidum struit.
Rostrum cornuum; caput aliquando per hincem flavum; cervix nonnunquam fusca, alæ caudaque sordidæ flavo marginatæ, & abdomina cum senioribus albicans; irides aurantiae; pedes rubescentes.
- Bonana.** 12. *O. fulvus*, capite pectoreque castaneis, dorso, remigibus rectricibusque nigris.
Icterus minor nidum suspendens. *Sloane jam.* 2. p. 299. t. 257. f. 1.
Xanthornus. *Briss. av.* 2. p. 115. n. 22. t. 12. f. 2.
Xochitototl. *Hern. mex.* 40. *Raj. av.* p. 167. n. 12.
Carouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 243. *planch. enlum.* n. 535. f. 1.
Bonana Bird. *Brown. jam.* p. 477. *Lath. syn. I. 2.* p. 436. n. 22.
Habitat in insulis Americæ meridionali obversis, 7 pollices longus; nîdus intertextus e feliorum fibrillis quartam globi partem efformans sub folio musæ, quod parietem ejus constituit.
Rostrum, dorsi pars superior, remiges & cauda nigra; collum castaneum; uropygium punctis castaneis insignitum; pedes & unguis grisei.
- nidipen-** 37. *O. capistro* & torque nigris, vertice, collo, dorso caudaque ex rubicundo fuscis, pectore & abdomine ex fusco flavis.
Icterus minor, nidum suspendens, watchy Picket, spanish Nightingale, american Hangnest. *Raj. av.* p. 184. *Sloan. jam.* p. 300. n. 17. t. 258. f. 3.
Hangnest Oriole. *Lath. syn. I. 2.* p. 437. n. 23.
Habitat in Jamaicæ silvis, voce suavi, nido ex arborum altarum extremis ramis pendulo.
Rostrum album; alæ obscurius fuscae, albo internisto.
- varius.** 38. *O. niger*, subtus, uropygio, & rectricibus alarum minoribus ferrugineus.
Carouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 607. f. 1.

Bastard Baltimore female. *Catesb. carol.* I. t. 49. f. inf.
Chesnat and black Baltimore. *Lath. syn.* I. 2. p. 437. n. 24.
Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.
Rostrum & pedes ex cæruleo atra; remigum secundiarum
margo exterior ferdide albus.

Xanthor- 13. O. luteus, gula remigibus rectricibusque nigris.
nus. Xanthornus mexicanus. *Briff. av.* 2. p. 118. n. 23. t. II. f. 2.
Avis Ayoquantotl. *Hern. mex.* 54. *Seb. mus.* 2. p. 102.
t. 96. f. 5. *Raj. av.* p. 171.
Carouge du Mexique. *Buff. pl. enlum.* n. 5. f. 1.
Petit Cul-jaune de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 247.
Lesser Bonana Bird. *Edw. glean.* t. 243. *Lath. syn.* I. 2.
p. 439. n. 25.
Habitat in Jamaica & nova Hispania, 7½ pollices longus.
Rostrum nigricans; rectrices alarum nigræ, plurimæ
marginæ, remiges intus, basin versus albæ; pedes &
ungues nigri.

domini- 14. O. niger, corpore postico, rectricibus alarum maculaque
censis. luteis.
Xanthornus dominicensis. *Briff. av.* 2. p. 121. n. 25. t. 12.
f. 3.
Carouge de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 247.
pl. enlum. n. 5. f. 2.
S. Domingo Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 439. n. 26.
Habitat in nova Hispania, insulæque Jamaica & S. Domini-
ci, 8 pollices longus; cantus galbulæ; nidus ab extremis
ramis arborum ad aquas plantatarum positus peræ forma
multilocularis. Utrum femina Xanthorni, an cum aya-
nense & chrysocephalo in unam speciem conjugendus?

Jamacaii. 39. O. flavus, capite, jugulo, humeri macula, alis, cauda-
que nigra.
Xanthornus brasiliensis. *Briff. av.* p. 120. n. 24.
Jamacaii. *Raj. av.* p. 75. *Will. orn.* p. 137. t. 42. *Salern.*
orn. p. 221. n. 4. t. 16 f. 5.
Brazilian Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 439. n. 27.
Habitat in Brasilia, niduni filis affigens murali folio, 10
fere pollices longus.
Rostrum nigrum, basi cæruleum; rectrices alarum macula
media albâ; pedes fusci.

cayanan. 15. O. niger, macula alarum lutea.
lis. Xanthornus cayanensis. *Briff. av.* 2. p. 123. n. 26. t. 9. f. 2.

AVES PICÆ. Oriolus.

Carouge de l'ile de S. Thomas. *Buffon hist. nat. des ois 3. p. 248. pl. enlum. n. 535. f. 2.*

Yellow-winged Pye. *Edw. glean. t. 322.*

Yellow-winged Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 440. n. 28.*

Habitat in Cayenna & insula S. Thomæ, 8 pollices longus.

Rostrum nigrum ; cauda rotundata.

leucopte- 40. O. niger, macula alarum alba.

rufus. White-winged Oriole. Lath. syn. I. 1. p. 440. n. 29.

$\beta.$ White-backed Oriole. *Arct. zool. 2. p. 257. n. 141.*

White backed Maik-thieves. *Kalm. it. 2. p. 274.*

Habitat in Cayenna, $\beta.$ ad Noveboracum usque, cayanensis magnitudine.

Rostrum pedesque nigra.

icteroce- 16. O. niger, capite colloque luteis.

phalus. Xanthornus icterocephalus cayanensis. Briff. av. 2. p. 124. n. 27. t. 12. f. 4.

Cornix atra, capite collo pectoraque flavis. *Nov. Comit. Petr. II. p. 435. t. 15. f. 7.*

Coiffes jaunes. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 217. 250.*

Carouge de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 343.*

Yellow-headed Starling. *Edw. glean. t. 323.*

Yellow-headed Oriole. *Lath. syn. I. 2. p. 441. n. 30.*

Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.

Rostrum nigricans ; pedes & unguis fuscus.

melan- 17. O. griseus nigro-punctatus, fascia oculorum atra. cholicus. *Fringilla melanocholica. Syft. nat. X. 1. p. 180. n. 7.*

Xanthornus nævius. Briff. av. 2. p. 126. n. 29.

Shomburger. *Edw. av. t. 85. Lath. syn. I. 2. p. 441. n. 31.*

$\beta.$ Troupiale racheté de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 223. pl. enlum. n. 448. f. 1. 2.*

Habitat in nova Hispania, $\beta.$ in Cayenna, alaudæ magnitudine, 6 pollices longus.

Rostrum cum pedibus incarnatum ; irides badiæ, s. aurantiæ ; pennæ singulæ macula media nigricante ; remiges & cauda nigricantes margine ex rufofusco ; genæ & gula nigra, hæc in $\beta.$ alba.

capensis. 18. O. fusco-olivaceus subtus luteus.

Xanthornus Capitis bonæ spei. Briff. av. 2. p. 128. n. 30.

Carouge du Cap de bonne espérance. *Buff. planch. enlum. n. 607. f. 2.*

Carouge olive de la Louisiane. *Buff. hist. nat. des ois.* 3.
p. 251.

Olive Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 260. n. 149. *Latham syn.*
I. 2. p. 444. n. 35.

Habitat ad Caput bonæ spei, & in Louisiana, 7 pollices
longus.

Rostrum, pedes & unguis *fusca*, verticis color in *griseum*,
gulæ jugulique in aurantium vergens, teætrices *alarum*
fuscae, margine & apice *olivaceis*, remiges *fuscae* mar-
gine *olivaceo*.

cæruleus. 41. O. niger aut cinereus, capite, alis caudaque cæruleis.

Xanthornus cæruleus. *Briff. av.* 2. p. 125. n. 28.

Small blue Jay. *Raj. av.* p. 95. n. 11. t. I. f. II.

Blue Oriole. *Latham syn.* I. 2. p. 444. n. 36.

Habitat in regione Maderaspatana. Rostrum *rufum*.

viridis. 42. O. viridis, superciliis, genis, gulaque, flavis, teætricum
alarum nonnullarum apice albo.

Yellow-throated Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 261. n. 150.

Habitat in sinu Hudsonis, 9 pollices longus.

ferrugineus. 43. O. niger, pennarum marginæ ferruginæ, capite & cervice
ex nigricante purpurascens, abdome folido.

Rusty Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 260. n. 146.

Habitat in Noveboraco, 7-8 pollices longus.

Rostrum & pedes folidi; area oculorum nigra; alarum
caudæque splendor virescens.

fuscus. 44. O. niger, capite ex ferrugineo fusco, cauda folidata.

Brown headed Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 259. n. 145.

Habitat in Noveboraco, gregarius.

niger. 45. O. totus niger.

Icterus niger. *Briff. av.* 2. p. 103. n. 15. t. 10. f. 1.

Troupiale noir. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 320. pl.
enlum. n. 534.

Black Oriole. *Arct. zool.* 2. p. 259. n. 144. *Latham syn.*

I. 2. p. 445. n. 37.

Habitat in America boreali, 10 fere pollices longus, greg-
arius, vermis & scarabæis vivitans, incubationis
tempore suavissime cantans; nidum in arboribus struit,
8 circiter pedibus supra terram elatum, & ova 5 parit
obscuri coloris, maculis nigris notata.

Femina coloris ex virecente fusi; subtus & capite in cine-
reum coloreni vergens.

- minor. 46. *O. niger*, capitis nigredini cæruleo colore intermixto.
 Petit Troupiale noir. *Buffon hist. nat. des ois.* 3. p. 221.
 Troupiale de la Caroline. *Buff. pl. enlum.* n. 606. f. 1.
 Lesser black Oriole. *Latham syn.* I. 2. p. 446. n. 38.
Habitat in America, 6 pollices longus, fasciæ cicurandæ.
Feminæ etiam in alis & cauda color cæruleus intermixtus.
- olivaceus. 47. *O. olivaceus*, capite, gula, jugulo, & pectore fuscis, alis nigris.
 Troupiale olive de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 3.
 p. 225. *pl. enlum.* n. 606. f. 2.
Cayenne Olive Oriole. *Latham syn.* I. 2. p. 447. n. 39.
Habitat in Cayenna.
 Rostrum & pedes nigra.
- Aunalaf. 48. *O. fuscus*, macula suboculari mentoque albis, jugulo & chkenfis. pectore ex ferrugineo fuscis.
Aoonalaschken Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 447. n. 40.
Habitat in Aunalaſchka, 8 pollices longus.
 Rostrum & pedes fusca.
- caudacu- 49. *O. varius*, rectricibus angustis acuminatis.
 tus. Sharp-tailed Oriole. *Arch-zool.* 2. p. 261. n. 151. *Latham*
syn. I. 2. p. 448. n. 41. t. 17.
Habitat in Noveboraco, alaudæ magnitudine.
 Rostrum obscurum; vertex fuscus & cinereus; genæ fuscæ; pectus, femora & crissum pallide flavescens, maculis fuscis; abdomen album; dorsum ex cinereo, nigro & albo varium; remiges testiculæque alarum fuscæ, tæ margine ferrugineo; cauda obscure olivacea, fasciis obsoletis; pedes pallidæ fuscæ.
- siaenfis. 50. *O. albus*, capite, collo, pectore, & superiore dorsi parte cinereis, remigibus chalybeis, cauda rotundata ex chalybeo & albo mixta.
 Kink. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 253. *Latham syn.* I. 2.
 p. 448. n. 42.
 Kinck de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 617.
Habitat in Sina.
 Rostrum ex rubicundo fuscum; pedes incarnati.
- aureus. 19. *O. flavo-fulvus*, capistro, gula, rectricibus primariis
 restringimque extremitate nigris.
 Icterus indicus. *Briff. av. app.* p. 37. n. 31.
 Paradisea flavo-fulva. *Mus. Ad. Frid.* I. p. 15.

Rollier de Paradis. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 149.
 Golden Bird of Paradise. *Edw. av.* t. 112. *Lath. syn.* I.
 2. p. 483. n. 8.
Habitat in India, 8 pollices longus.
Rostrum fuscum.

- viridis.* 51. O. olivaceus, subtus in viridem vergens, alarum apice & testricibus inferioribus flavis, superioribus & majoribus fuscis flavo marginatis, cauda rotundata.
Icterus minor viridis. *Briss. av.* 2. p. 113. n. 21. t. 2. f. 2.
Troupiale de S. Domingue, appelé le Siffleur. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 230. *pl. enlum.* n. 236. f. 1.
Whistler-Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 443. n. 34.
Habitat in insula S. Dominici, 7 fere pollices longus.
Rostrum cornuum; pedes & unguis grisei.

- furcatus.* 52. O. niger, dorso, uropygio, remigibus, caudaque furcata in cæruleum vegentibus, testricibus caudæ inferioribus albis.
Icterus cauda bifida. *Briss. av.* 2. p. 105. n. 16.
Fork-tailed Oriole. *Lath. syn.* I. 2. p. 443. n. 33.
Habitat in nova Hispania.
Rostrum flavum; cauda longa; pedes cum unguibus nigri.

- chrysocephalus.* 20. O. niger, pileo testricibus alarum caudæque luteis.
Xanthornus icterocephalus americanus. *Briss. av. app.* p. 38. t. 2. f. 2.
Goldkoepfige gelbschulterichte Atzel. *Merrem Beytr.* I.
 p. 14. t. 3.
Habitat in America, ultra 8 pollices longus, alaudæ magnitudine.
Occiput & femora aurea; rostrum nigrum; pedes cum unguibus ex nigro fusi.

53. GRACULA. *Rostrum convexo-cultratum*, basi nudiusculum.

Lingua integra, auctiuscula, carnosa.

Pedes ambulatorii.

- religiosa.* 1. Gr. nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda flava.
Mainatus. *Briss. av.* 2. p. 305. n. 49. t. 28. f. 2.
Corvus javanensis. *Osb. it.* 102.

Sturnus indicus. Bont. jav. 67. Raj. av. p. 68. n. 2.
Mainate. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 416. t. 25.

Mainate des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 268.
Bontius indian Stare. Will. orn. p. 145. t. 38.

Minor from the Eastindies. Albin. av. 2. p. 35. t. 38.
Lesser Minor or Mino. Edw. av. I. t. 17.

Minor Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 455. n. 1.

β. Mainatus major. Bruf. av. 2. p. 308. n. 50.

Grand Mainate. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 419.

Greater Minor or Mino. Edw. av. I. t. 17.

Habitat in India, insulisque oceani Indici, 10½ pollices longa, β. major, mansueta, fructibus, cerasis, uvis, &c. vittans, in cædibus loquacissima, præstantior psittaco, egregie sibiанс.

Rostrum rubrum apice flavum; pedes fulvi; penæ capitis (exceptis intermediis) brevissimæ, holosericeæ, fascia nuda infra oculos fere ad nucham; remiges 2-8 fascia alba.

calva. 2. Gr. subcinerea, capite utrinque nudo.

Merula calva. Bruf. av. 2. p. 280. n. 36. t. 26. f. 2.

Merle chauve des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 200.

Goulin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 420.

Iting, Tabaduru, vel Gulin (Palalacæ species). Camel. Að. angl. 23. p. 1397. n. 43.

Bald Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 497. n. 2.

Habitat in Philippinis, vorax, vittans fructibus, in casis arborum, potissimum cocos nidificans.

Rostrum pedesque fusca; latera cæpiis, dum irascitur avis, coccinea; linea verticis plumosa nigra.

fœtida 3. Gr. nigra, remigibus extus cærulecentibus, fascia collari nuda.

Fetid Grakle. Lath. syn. I. 2. p. 460. n. 4.

Habitat in America. Rölander.

Magnitudo picæ; caput plumis ereditis brevissimis quasi holosericeum; rostrum fere cuculi; nares ovatae nudæ; lingua acuta; alæ compositis remigibus extus cærulecentes absque alba macula; rectrices æquales.

*Barita. 4. Gr. subgrisea, humeris cæruleis, remigibus extus viridibus, Monedula tota nigra. Sloan. jam. 2. p. 299. t. 257. f. 2.
Raj. av. p. 185. n. 28.*

Graculæ omnes extra Europam habitant, rostro crasso, ad latera compresso; ad basin ejus nares exiles; unguis adunci, acuti; digitorum anteriorum medius ^{ad} cum exteriore connexus.

Boat-tailed Grackle. *Arct. zool.* 2. p. 264. n. 154. *Lath.*
syn. I. 2. p. 460. n. 5. t. 18.

*Habitat in insulis Antillis, & calidiori Americæ borealis
parte, hic inseclis & zea, ibi mufarum fructibus viditans,
quos devastat.* Rolander.

*Rostrum breviusculum, cultratum, nigricans, basi nudum,
subtus albicans; alæ complicatis remigibus virides;
explicatae remiges intus nigrae; cauda rotundata,
viridis dum complicata, & supra concava.*

crista-
tella.

5. *Gr. nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice
albis, rostro flavo.*

Merula sinensis cristata. *Briff. av.* 2. p. 253. n. 21.

Merle huppé de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 367.
pl. enlum. 507.

Chinese Starling or Blackbird. *Edw. av.* 1. t. 19.

Crested Grackle. *Lath. syn.* I. 2. p. 464. n. 7.

*Habitat in Sina, oryza, vermibus, inseclis viditans,
egregie loquax & sibilans, 8½ pollices longa.*

*Color nigricans, in cæruleum vergens; irides aurantiae;
frontis pennæ elongatae, cristæ in modum erigendæ;
remiges majores a basi ad medium usque albæ, ceterum
ex atro cæruleæ; pedes flavi.*

Saularis. 6. *Gr. nigro-cærulescens, abdomine, macula alarum,
rectricibusque lateralibus albis.*

Lanius bengalenis niger. *Briff. av.* 2. p. 184. & *suppl.*
p. 41. n. 19.

Saularis maderaspatañus. *Raj. av.* p. 197. t. 2. f. 19. 20.
Pie - griesche noire de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois.*
1. p. 299.

Bengal Magpie or Dial-bird. *Alb. av.* 3. p. 17. t. 17. 18.

Little Indian Pie. *Edw. av.* t. 181.

Dial Grackle. *Lath. syn.* I. 2. p. 465. n. 8.

Habitat in Bengala, turdi viscivori magnitudine.

Femina supra quidem nigra, jugulo tamen & pectore fusca.

Quiscal. 7. *Gr. nigro-violacea, cauda rotundata.*

Fica jamaicensis. *Briff. av.* 2. p. 41. n. 3.

Pie de la Jamaique. *Buff. hist. nat. des ois.* 3. p. 97. n. 2.

Purple Jackdaw. *Catesb. carol.* 1. p. 12. t. 12.

Barbado's Blackbird. *Brown. jam.* p. 476.

Purple Grackle. *Arct. zool.* 2. p. 263. n. 153. *Lath. syn.*
1. 2. p. 462. n. 6.

Tequixquiacatzanatl. *Fern. Mex.* 21.

Maisdieb. *Kaln. it.* 3. p. 33.

Habitat in America septentrionali ad novam Hispaniam & Jamaicam usque, migratoria, suaviter cantans, in arboribus abditarum ut plurimum regionum nidificans, ova pariens 5-6, cæruleo-sentia, maculis striisque nigris insignita, famelica quidem oryzæ, hordeo, avena, tritico viçitans, lubentius tamen quæzania aquatica & zea mays, qua confitos agros devastat, hinc Virginianis invisa avis, aqua & igne interdicta, sed injuste, destruit enim bruchos pisi, & prata infestantes vermes, ita ut ea fere extirpata omne gramen comedunt viderent 1750 Pensylvaniæ incolæ. Caro parum sapida.

Longitudo $13\frac{1}{2}$, feminæ $11\frac{1}{2}$ pollicum. Rostrum & pedes nigra; irides argenteæ; cauda longa, cuneiformis, una cum alis purpurea; femina tota, præcipue dorso, alis, caudaque obscura.

Atthis. 8. Gr. viridi-cærulea, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.

Corvus (ægyptius) viridi-maculatus, dorso medio cæruleo.
Hasselq. it. 140. n. 20.

Egyptian Grakle. *Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 9.*

Habitat in Ægypto, infœdis viçitans, alaudæ magnitudine, 4 pollices longa.

longiro- 9. Gr. brunnea, subtus ochroleuca, capite & collo atris-
stra. fascia collari nuda rugosa, alarum area alba, cauda cuneiformi nigra, tectricibus ferrugineis. *Pall. spicil. b. p. 5. t. 2. f. 2.*

Longbilled Grakle. *Lath. syn. I. 2. p. 466. n. 10.*

β. Oriolus nobilis, edle Atzel. *Merrem Beytr. I. p. 8. t. 2.*
Habitat in America australi, β. in insulis Sandwich ultra 8 pollices longa.

Rostrum nigrum, longius, quam reliquis speciebus, naribus in medio positis; lingua profunde bifida, marginibus laceris; irides obscuræ; remiges primariae basi oblique albae; pedes longi robusti nigri; habitus gracilis.

β. Sturni magnitudine; rostri basi nullis setis cinæda; naribus semilunaribus; colore splendide nigro, pennarum quorundam humeralium, & tectricum caudæ inferiorum flavo, tectricum eximiarum albo, basi extus lutea differit.

Turcina. 10. Gr. cana, verticis macula, dorsoque inter alas violaceo-atro, caudæ alarumque nitore viridi, harum striga gemina alba. *Pall. it.* 3. p. 695.

Habitat in Dauuriae australioris salicetis circa Ononem & Argunum, Speciosa, habitu, nido, ovorumque colore sturni æmula.

Femina decolor, sordide cinerea, dorso fuscō, alis caudaque sine splendore atris.

cayen- 11. Gr. striata, supra rufa, subtus flavicans, capite & gula menis. ex rufo & albo variis, cauda cuneiformi acuminata alisque rufis unicoloribus.

Picucule de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 82. pl. enlum. n. 621.

Climbing Grackle. Lath. syn. I. 2. p. 467. n. 11.

Habitat in Gujanæ interioribus, pici instar arbores adscendens, 10 pollices longa.

Rostrum nigrum, 2 fere pollicum, paulisper incurvatum; pedes 1 $\frac{1}{4}$ pollicem longi, cum unguibus nigri.

caruncu- 12. Gr. cinerea, cauda remigibusque atris, vertice mentoque lata. carunculatis.

Tringa carunculata capensis. Walch Naturf. II. p. 9. t. 2. 17. p. 14.

Cockscomb Star. Lath. syn. II. 1. p. 9. n. 7.

Habitat ad Caput bonæ spei? 6 pollices longa.

54. PARADISEA. *Rostrum capistri plumis tomentosis tectum.*

Pennæ hypochondriorum longiores.

Rectrices duæ superiores singulares denudatæ.

Apoda. 1. P. pennis hypochondriorum corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis setaceis.

Manucodiata. Briss. av. 2. p. 130. n. 1. t. 13. f. 1. Raj. av. p. 20. n. 1. p. 21. n. 3. 5. 6. 7. p. 22. n. 8. 9. Marcgr. brasili. 201.

Paradisea lutea, cauda, pectore abdomineque brunneis, gula azurea. It. Wgoch. 139. Mus. Ad. Frid. I. p. 15.

Oiseau de Paradis. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 151. t. 12. pl. enlum. n. 254.

Paradisea avis. *Clus. exot.* 360. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 1.
Seb. mus. 1. p. 24. t. 13. f. 1. *Hern. mex.* 317. t. 318.
Worm. mus. 294. f. 294. *Bradl. nat. t.* 12. f. 1. 2. *Cal-*
ceol. mus. 669. t. 673. *Besl. mus.* 32. t. 9. f. 1.

Birds of Paradise. *Will. orn.* p. 91. n. 1. p. 92. n. 3. 5.
 6. 7. p. 93. n. 8. 9. t. 11.

Greater Bird of Paradise. *Albin. av.* 3. t. 9. *Edw. av.*
 110. *Lath. syn.* I. 2. p. 471. n. 1.

Great Bird of Paradise from Aroo. *Forr. it.* p. 135.

β. Smaller Bird of Paradise from Papua. *Forr. it.* p. 137.

*Habitat in insulis Molluccis, & reliquis novæ Guineæ
 vicinis, anni tempore humidio in novam Guineam re-
 vertens; gregatim volat, duce præeunte, sturnorum in
 morem clamitans, audax, ornamenti & mercaturæ in
 India materies, apoda perperam dicta veteribus.*

*Femina rectricibus modo 2 intermediis brevioribus; sunt
 hæ apice attenuatae, nude rectæ; cauda perperam dicta
 sunt pennæ elongatae dorſi & hypocondriorum.*

*β. minor, in arboribus altis nidificat, maris collo & roſto
 longioribus.*

tegia. 2. P. rectricibus duabus intermediis filiformibus, apice luna-
 to-pennaceis. *Mus. Ad. Fr.* 1. p. 15.

Rex avium paradisæarum. *Pet. gaz.* I. t. 53. f. 2. *Clus.*
exot. 362. t. 362. *Olear. mus.* 24. t. 13. f. 2. *Raj.*
av. p. 22. n. 10. Seb. mus. I. t. 38. f. 5.

Manucodiata miuor. *Briff. av.* 2. p. 136. n. 2. t. 13. f. 2.
 Manucode. *Buff. hist. nat. des oſ.* 3. p. 163. t. 13. pl.
 enlumi. n. 496.

Roi des oiseaux de Paradis. *Sonner. it.* p. 156. t. 95.
 Supposed King of the greater birds of Paradise. *Will.*
orn. p. 96. t. 77. Edw. av. t. 111.

King's Bird. *Forr. it.* p. 141. n. 7.
 ing paradise Bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 475. n. 2.
*Habitat in Aroo reliquiæque oceani Indici insulis, humili
 anni tempore novam Guineam repetens, alaudæ magnis*

Aves hujus generis in nova Guinea potissimum habitant, ex hac sicco anni tempore
 in vicinas insulas migrant, paucos modo gradus ab æquatore distantes; *Indiæ*
 (Seb. mus. I. t. 60. j. I. 2. 3.) e pſittacis aliisque vendidit ſæpc musets *Indiæ*
 Sinenſium. Nares exiguae, penitus tenuiæ; cauda rectricibus 10, 2 intermedie
 tusi & apice modo barbatæ; pedes magni robusti, digitorum anteriorum media
 primo articulo exteriori connexus.

tudior

tudine, 5 pollices circiter longa, præcedente rario; *solitaria*, baccas rubras appetens.

Purpurea, pectorali cærulecente; cirri caudæ longissimi; pennæ sub alis reliquis longiores, quanvis cauda breviores & truncatæ.

tristis.

3. *P. area* nuda pone oculos triangulari, capite colloque fuscis. *Merula philippensis*. Briss. av. 2. p. 278. n. 35. t. 26. f. 1. Martin. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 423. pl. enlum. n. 219. *Paradise Grakle*. Lath. syn. I. 2. p. 458. n. 3.

Habitat in insulis Philippinis, omnivora, vorax, cæstris boum dorso infixis, gryllis, aliis insectis, his deficienibus ipsis columbarum pullis, ratis, fructibus, daedylis, uvis, frumento vicitans, bis in anno nidum in bifurcationibus palmarum struens, ova 4 pariens, junior facile cicuranda, docilis & imitabunda.

Magnitudo monedula; longitudo 9 $\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum & pedes flavi; corpus subfuscum; remiges primores a basi ad medium albæ; rectrices, exceptis intermediis, apice albæ. Ob rostri basi plumbis tomentosis tectam hinc generi, ceterum graculis magis affinis.

magnifica- 4: *P. suprà spadiceus, gula viridi lunulis aureis, cervicis ca.* fasciculo pennarum flavarum.

Magnifique de la nouvelle Guinée, ou Manucode à Bouquets. Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 166.

Oiseau de Paradis, surnommé le Magnifique. Buff. planch. enlum. n. 631. Sonner. it. p. 163. t. 98.

Magnificent Paradise Bird. Latham syn. I. 2. p. 477. n. 3. t. 19.

Habitat in nova Guinea, monedula magnitudine, 9 pollices longa.

Remiges primores fuscæ; secundariae profunde flavæ; remiges intermediæ longissimæ, barba brevissima; pedes & rostrum flava; hoc apice & basi nigrum.

nigra.

5. *P. nigra*, subitus obsoleto viridis, occipite, nucha, cervice, & media abdominis fascia letius viridibus aureo-lunulatis, arcu aureo cum lunulis rubris ab angulo oxis ad gulari protenso.

Goget Paradise Bird. Lath. syn. I. 2. p. 478. n. 4. t. 20.

Habitat in insulis oceanii Indici, monedula magnitudine: Rectrices 12 inæquales; 2 intermediae 22, extiniæ 5 modis pollices longæ.

- superba. 6. *P. subcristata viridi aurea*, subtus lète viridis, gula violacea, alis nigris, caudæ splendore cæruleofuscante. Manucode noir de la nouvelle Guinée, dit le Superbe. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 169. pl. enlum. n. 632.* Oiseau de Paradis à gorge violet, surnommé le Superbe. *Sonner. it. p. 157. t. 1. 96.*
- Superb Paradise Lird. Lath. syn. I. 2. p. 479. n. 5.*
Habitat in nova Guinea.
Rostrum nigrum; pedes fuscæ; sub alis fasciculus plumarum nigrarum tomentosarum in dorso conspicuus.
- aurea. 7. *P. cristata nigra*, verticis, genarum & gulæ nitore violaceo, jugulo, pectore, maculaque cervicis viridi-aureis. Sifilet ou Manucode à six filets. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 171. pl. enlum. n. 633.*
- Oiseau Paradis à gorge dorée. *Sonner. it. p. 158. t. 97.*
Gold-breasted Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 481. n. 6.*
Habitat in nova Guinea, turturis magnitudine.
Rostrum & pedes nigricant; irides flavent; crista pene erecta, pennis aliquot dimidia parte albis, reliquis totis nigris; ad utrumque capitis latus tres pennæ præter apicem imberbes, adeo longæ, ut primam caudæ cuneiformis quartam partem attingant.
- Viridis. 8. *P. thalassina*, dorso, abdomine, uropygio caudaque chalybeis. Calybé de la nouvelle Guinée. *Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 173. pl. enlum. n. 634.*
- Oiseau de Paradis vert. *Sonner. it. p. 164. t. 99.*
Blue green Paradise Bird. *Lath. syn. I. 2. p. 482. n. 7.*
Habitat in nova Guinea, 16 pollices longæ.
Rostrum crassum, nigrum; plumæ capitis tomentosæ.
- alba. 9. *P. tota alba*. *Penn. ind. zool. n. 5.*
β. *Paradisea anterius nigra*, posterius alba. *Penn. ind. zool. n. 5. β.*
Habitat rarissima in insulis Papuanis.

55. TROGON. *Rostrum capite brevius, cultratum, aduncum, margine mandibularum ferratum.*

Pedes scandorii.

- strigilatus. 1. *Tr. cinereus*, alis strigis albis. *Trogon cayanensis cinereus. Briff. av. 4. p. 165. n. 1. t. 16. f. 1. Ger. orn. 2. p. 53. t. 188.*

- Couroucou de la Gujane. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 293. *pl. enlum.* n. 763.
 Cinereous Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 489. n. 3.
Habitat in Gujana, Cayenna, monedula paulo major,
 $12\frac{1}{2}$ pollices longus.
 Rostrum, pedes & ungues obscure cinerea; abdomen &
 testrices caudæ inferiores aurantia; cauda nigricans.

- Curucui. 2. Tr. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra.
 Trogon brasiliensis viridis. *Briss. av.* 4. p. 173. n. 4.
 Picis congener Cuiucui. *Klein av.* p. 28.
 Curucui Brasiliensis. *Marcgr. bras.* p. 211. *Will. orn.*
 p. 296. t. 22. *Raj. av.* p. 45. n. 4. *Jonst. av.* p. 216. t. 60.
 Tzitzcan. *Fern. nov. Hisp. c.* 43. p. 23. *Nieremb. hist.*
 nat. 230. *Will. orn.* 303. *Raj. av.* 163.
 Couroucou à ventre rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
 p. 207. t. 14.
 Couroucou à ventre rouge de Cayenne. *Buff. pl. enl.* n. 452.
 Red-bellied Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 485. n. 1.
 Rothbauchichter Kuruku. *Merrem Beytr.* 2. p. 37. t. 9.
 ♂. Tr. testricibus alarum fuscis, area nuda infra oculos nulla.
 Avis anonyma tertia. *Marcgr. bras.* p. 219.
 ♀. Tr. abdomine flavo.
 Ptilatus flammeus viridis & cinereus, rostro ferrato.
Feuill. suit. de journ. p. 20.
 Green yellow-bellied Cuckow. *Edw. glean.* t. 331.
 Grüner Kuckuk mit dem gelben Bauch. *Seligm. aust.*
Voegel. 9. t. 21.
 ♂. Tr. cinereus intermixto viridi-aureo, cauda longa.
 Couroucou gris à longue queue de Cayenne. *Buff. hist.*
nat. des ois. 6. p. 283. *pl. enlum.* n. 737.
Habitat in nova Hispania, Brasilia, Peru, & in Cayenna,
solitarius in denissimis silvis, non cicurandus; in cavis
arboribus bis in anno 3-4 ova alba, columbinis æqualia
pariens, pullosque prodeentes vermis & insectis nu-
triens; pica paulo minor, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rectrices laterales fasciis albis nigrisque; intermediae
apice nigrae.

Aves hujus generis in calidio modo climate obviæ solitariae degunt in densarum
 humidarumque silvarum arboribus, harumque ramis inferioribus; brevissima
 volant, insectisque videntur; corpus produdum, pedes breves; cauda longissi-
 ma, ex 12 rectricibus consistens.

- viridis. 3. Tr. viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra, fascia pettorali viridi-aurea.
Trogon cayanensis vitidis. *Briß. av.* 4. p. 168. n. 2. t. 17. f. 1.
 Couroucou à ventre jaune. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 291.
 Couroucou de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 195.
 Yellow-bellied Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 488. n. 2.
 β. *Trogon cayanensis* viridis, ventre candido. *Briß. av.*
 4. p. 170. n. 3.
 Couroucou vert à ventre blanc de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 293.
Habitat in Cayenna, 11 ½ pollices longus.
- rufus. 4. Tr. rufus, abdomine, crisco, femoribusque flavis, tectricibus alarum nigro & griseo striatis, remigibus rectricumque mediarum apicibus nigris.
 Couroucou à queue rousse de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 293. *pl. enlum.* n. 736.
 Rufous Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 490. n. 4. t. 21.
Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.
Remigum margo obscurus; rectrices utrinque 3 extiores striis transversis nigris & albis, apice albo; abdomen pedesque obscura.
- violaceus. 5. Tr. violaceus, superciliis flavis, dorso uropygioque viridi-aureis, alis fuscis, rectricibus intermediis ex cæruleofcente viridibus apice nigris.
 Lanius capite, collo pectoraque e violaceo nigricantibus, digitis duobus anticis totidemque posticis. *Koelreuter nov. act. Petrop.* II. p. 436. n. 7. t. 16. f. 8.
 Couroucou à chaperon violet. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 294.
 Violet-headed Curucui. *Lath. syn.* I. 2. p. 491. n. 5.
Longitudo 9 ½ pollicum; rostrum plumbeum, apice albidum, versus frontem nigricans; tectrices caudæ si periores viridi-aureæ; rectrices 2, 2, partim ex cærulecenti virides, partim nigræ, tres extimæ nigræ, lineis & apicibus albis.
- macula- 6. Tr. fuscescens, lineis obscuris, vertice viridi, alarum marginibus, caudæque obscuræ lineis, remigum secundiarum & tectricum alarum apicibus albis.
 Spotted Curucui. *Brown. illustr.* t. 13. *Lath. syn.* I. 2. p. 491. n. 6.
Habitat in Zeylon.
Rostrum fuscum.

fasciatus. 7. Tr. fascia pectorali alba.

Fasciated Curucui. Ind. zool. t. 5. Lath. syn. I. 2. p. 492. n. 7.

Trogon ceylonensis. Briss. av. 4. n. 7?

Band-Kuruku. Walch Naturf. 17. p. 17.

Habitat in Zeylonæ arboribus emortuis, in altis arboribus nidificans.

Rostrum nigrum, crassum, paulisper arcuatum, basi setis circumseptum; orbitæ nudæ, cæruleæ; irides flavæ; caput collumque nigra; abdomen ex rubente aurantium; dorum lomentaceum; tectrices caudæ griseæ; tectrices alarum cum humeris albo & nigro undulatæ; remiges & pedes obscuri; cauda prælonga, inæqualis, apice nigra.

56. BUCCO. Rostrum cultratum, lateraliter compressum, apice utrinque emarginato, incurvato, rictu infra oculos protenso.

Nares pennis recumbentibus obtectæ.
Pedes scansorii.

Tamatia. 2. B. ex rufo fuscus, subtus ex rufo albus, nigro maculatus, gula aurantia, torque dimidiato.

Tamatia. Raj. av. p. 65. n. 6. Will. ornith. p. 190. t. 59. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 94.

Barbu à ventre tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 746. Spotted bellied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 494. n. 1.

Habitat in Cayenna & Brasilia solitarius, in locis abditis, in primis silvis, visitans insectis, carne insipida; 6 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

Caput prægrande; rostrum nigrum; vertex & frons rufescunt; pone oculos area magna nigra; pedes nigri.

Cayennensis. 3. B. niger, subtus ochroleucus, fronte gulaque rubris. Bucco Cayennensis. Briss. av. 4. p. 95. n. 2. t. 7. f. 1.

Tamatia à tête & gorge rouges. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 96.

Barbu de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 206. f. 1.

Cayenne Barber. Lath. syn. I. 2. p. 495. n. 2.

Bucco Cayanensis nævius. Briss. av. 4. p. 97. n. 3. t. 7. f. 4.

Barbu de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.

Yellow Woodpecker with black spots. Edw. glean. t. 333.

*Habitat in Cayenna, Guiana, insula S. Dominici,
alaudæ cristatæ magnitudine 7 pollices longa.
B. subtus flavus, maculis nigris.*

- capensis.* 1. *B. rufus fascia humerali fulva, pectorali nigra.*
Bucco. Briss. av. 4. p. 92. n. 1. t. 6. f. 2.
Tamatia à collier. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 97. t. 4.
Barbu à collier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 395.
Collared Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 497. n. 3.
Habitat in Guiana, rarer, 7 $\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum corneum; pedes & unguis cinerei.
- elegans.* 4. *B. viridis, capite gulaque rubris cæruleo marginatis,
remigibus fuscis, jugulo & pectore flavo, hoc rubro-
maculato, abdomine ochroleuco viridi-maculato.*
Bucco Maynauensis. Briss. av. 4. p. 102. n. 5. t. 7. f. 3.
Beau Tamatia. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 98.
Barbu de Maynas. Buff. pl. enlum. n. 330.
Beautiful Barbet. Lath. syn. I. 1. p. 498. n. 4.
*Habitat in provincia Maynas ad Amazonum fluvium,
reliquis speciebus agilior, passus magnitudine, 6 fere
pollices longus.*
*Rostrum, pedes & unguis cinerei; illius apex ochroleucus;
ab angulo oris stria utrinque cærulea; cauda cuneiformis,
rectricibus 10; remigum margo viridis.*
- macro-*
rhynchos. 5. *B. niger, fronte rectricum apice subtusque albus, fascia
pectorali nigra.*
Tamatia noir & blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 99.
*Le plus grand Barbu à gros bec de Cayenne. Buff. planch.
enlum. n. 689.*
Greater pied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 498. n. 5.
Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum prægrande; pedes obscuri.
- melano-*
leucos. 6. *B. niger humerorum macula, stria pone oculos, caudæ
apice & subtus albus, fascia pectorali nigra.*
Tamatia noir & blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 99.
*Le plus petit barbu à poitrine noire de Cayenne. Buff.
pl. enlum. n. 688.*
Lesser pied Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 499. n. 6.

*Aves hujus generis, in Africa, potissimum in Asia & America calidiori inquilina,
stupidae; rostrum robustum, rectrusiculum, setis fere peritus obtectum; rectrices
plerumque 10 debiles.*

Habitat in Cayenna, 5 pollices longus.

Rostrum magnum, apice bifidum; fronti candor intermisus; gula & colli latera alba; hypochondriis nigredo adpersa; pedes obscuri.

philippi- 7. *B. viridis, vertice (maris) fasciaque pectorali rubris; nentii. area oculorum, gula, jugulo subtusque flavus.*

Bucco philippensis. Briss. av. 4. p. 99. n. 4. t. 7. f. 2.

Barbu à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 102. t. 5.

Barbu des Philippines. Buff. pl. enlum. n. 331.

Yellow-throated Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 500. n. 7.

Habitat in insulis Philippinis, passeris magnitudine; 5½ pollices longus.

Rostrum & unguis fusca; color subtus ferride flavus, striis, longitudinalibus obscure viridibus; pedes flavicantes. Feminæ area oculorum, jugulum & pedes ex flavicante alba; neque in pectore neque in capite rubor ullus.

diger. 8. *B. niger, subtus albus, stria supraoculari flava utrinque ad collum producta, torque albo.*

Barbu de l'île de Luçon. Sonner. it. p. 68 t. 34.

Barbu à gorge noire. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 103.

Black threatened Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 501. n. 8.

β. Bucco Capitis bonæ spei.

Barbu à plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 104.

Barbu du Cap de bonne espérance. Buff. planch. enlum. n. 688. f. 1.

Habitat in insulis Philippinis, β. in Capite bonæ spei.

Pennæ laterales colli dorsique macula flava; tectrices alarum 4 fimbria alba, 1 fimbria flava; reliquæ infra hanc ad apicem flavo-maculatae; remiges nigræ, margine flavo; rectrices præter 4 intermedias fimbria flava; pedes rostrumque nigra.

β. supra ex fusco & flavo mixtus; uropygium splendide flavescens; cauda fusca, margine flavo.

parvus. 9. *B. ex nigricante fuscus, subtus albus fusco-maculatus, gula flava.*

Petit Barbu. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 105.

Barbu du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 746. f. 2.

Little Barbet. Lath. syn. I. 2. p. 503. n. 9.

Habitat ad fluvium Senegal, 4 pollices longus.

Rostrum fuscum; stria alba ab angulis oris infra oculos; pedes incarnati; color supra nitore fulvo, in aliis caudaque viridi.

- grandis, 10. B. viridis, tectricibus caudæ inferioribus rubris.
 Grand Barbu. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 106.
 Grand barbu de la Chine. *Buff. pl. enlum.* n. 871.
 Grand Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 503. n. 10.
Habitat in Sina, 11 pollices longus.
Rostrum albicans, apice nigrum; color capitis & juguli in cœruleum, cervicis & dorſi in badium vergens; pedes obscure flavi.
- viridis, 11. B. viridis, capite & collo ex griseo fuscis, area oculorum alba.
 Barbu vert. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 107.
 Barbu de Mahé. *Buff. pl. enlum.* n. 870.
 Green Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 504. n. 11.
Habitat in India, 6½ pollices longus.
Rostrum albicans; remiges majores fuscæ; pedes obscuri.
- Lathami. 12. B. olivaceus, remigibus caudaque obscuris, facie mentoque ex subfuscō rufescente.
 Buff faced Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 504. n. 12. t. 22.
Longitudo 6 pollicum, rostrum pallidum; pedes cum unguibus flavi.
- fusca, 13. B. fusca, macula pectoris magna triangulari alba.
 White breasted Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 505. n. 13.
Habitat in Cayenna, alaudæ magnitudine, 7 pollices longus.
Rostrum ex subfusco atrum, basi flavum; cauda cuneiformis.
- rubrica- 14. B. vertice gulaque coccineis, dorso, tectricibus alarum, pillus. & cauda viridibus, abdomine albo, pectore flavo stria transversa nigra, altera rubra.
 Red-crowned Barbet. *Brown's Illustr.* p. 30 t. 14. *Lath. syn.* I. 2. p. 505. n. 14.
Habitat in insula Zeylon, 5½ pollices longus.
Rostrum obscurum; linea nigra supra utrumque oculum ad genas; supra humeros utrinque area magna albicans; rectrices exteriores obscuræ; pedes rubicundi.
- Zeylanica- 15. B. viridis, genis nudis flavis, capite colloque pallide fuscis. Yellow-cheeked Barbet. *Brown's Illustr.* p. 34. t. 15. *Lath. syn.* I. 2. p. 506. n. 15.
Habitat in insula Zeylon, præcedentis magnitudine.
Rostrum rubrum; pedes pallide flavi.

dubius. 16. *B. niger*, subtus ruber, fascia pectorali crissaque nigris.
Barbican. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 132.
Baibican des côtes de Barbarie. *Buff. pl. enlum.* n. 602.
Doubtfull Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 506. n. 16.
Habitat in maritimis Barbaricæ, 9 pollices longus, inter
Raniphaſton & Bucconenu ambiguis, huic tamen patria,
lingua carnosa, setisque basin roſtri obſidentibus propior.
Roſtrum rubens; pedes breves, ex rubente fuſci.

cinereus. 17. *B. niger*, subtus cinereus, roſtro miniato, cauda
rotundata.
Wax billed Barbet. *Lath. syn.* I. 2. p. 507. n. 17.
Habitat in Cayenna, 11½ pollices longus.
Tectrices alarum corpori proximæ ex nigro & albo varia;
pedes obſcuri.

57. CUCULUS. *Roſtrum teretiusculum.*
Nares margine prominulæ.
Lingua sagittata, plana, integra.
Pedes scansorii.

cancorus. 1. *C.* cauda rotundata nigricante albo-punctata. *Fn. succ.*
96. Scop. ann. 1. p. 44. n. 48. Nozem. nederl. Vogel. t. 16.
Cuculus. *Gesn. av.* 363. *Aldrov. ornith.* I. p. 409. 415.
t. 414. 416. Bell. av. 22. *Briff. av.* 4. p. 105. n. 1.
Cuculo. *Olin. ucell.* p. 38.
Coucou. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 305. *pl. enlum.*
n. 811.
Cuckow. *Brit. zool.* I. n. 82. t. 36. *Arch. zool.* 2. p. 266.
n. A. Raj. av. p. 23. *Will. orn.* p. 97. t. 10. 77.
A. bin. av. 1. t. 8. *Hayes brit. Birds* t. 17. 18. *Lath.*
syn. I. 2. p. 509. n. 1.
Kuckuk. *Frisch. av.* t. 40. 41. *Kram. el.* p. 337. *Bloch*
Besch. der berl. Naturf. 4. p. 582. t. XVIII. f. 1.
β. Cucus rufus. *Briff. av.* 4. p. 110. n. 1. A.
γ. Cuculus griseo-undulatus, rectricibus intermediis ordine
punctorum alborum duplii notatus, rostro, orbitis
pedibusque sulphureis. *Beske Schr. der berl. naturf.*
Ges. 7. f. 452.
Habitat in Europa & septentrionali Asia, 14 pollices
longus, paſſeribus & insectis eorumque larvis viſitans,
non raro migratorius; more aliarum avium ventricu-
lum ante intestina positum habens.

Incubare ipse impotens, ova sordide alba, maculis chalybeis & ferrugineis notata bina vel unum in alienis nidis parit, in primis in motacillarum, quæ incubant, & nutriendunt enim pullum mensibus astatim pulcherrimis frondescientiæ, florescentiæ, grossificationis, dum cuculus aridis insidens arborum ramis famelicus semper cuculans advocat nutricem.

Capensis. 23. C. virente fuscus, subtus albus nigro lineatus, genis, gula, jugulo, cauda & tectricibus alarum superioribus rufis, rectricum apice albo.

Coucou du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 353. pl. enlum. n. 390.*

Cape Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 513. n. 2.*

Habitat in Capite bonaë spei, canoro minor.

Rostrum & pedes fusca; irides flavæ.

Orientalis. 2. C. cauda rotundata, corpore nigro-virente nitente, rostro fusco.

Cuculus indicus niger. *Briff. av. 4. p. 142. n. 18. t. 10. f. 1.*

Coucou noir des Indes. *Buff. pl. enlum. n. 274. f. 1.*

Coukeel. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 1.*

Eastern black Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 518. n. 10.*

β. C. corpore nigro-cærulecente, rostro nigro.

Coukeel. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 383. n. 2.*

Habitat in India, 16, β. 14 pollices longus.

Pedes ex griseo fusi; unguis nigri.

Mindanen- sis. 3. C. cauda rotundata, corpore viridi aureo albomaculato, subtus albo nigricanteque undulato.

Cuculus mindanensis nævius. *Briff. av. 4. p. 130. n. 12. t. 12. f. 1.*

Coucou varié de Mindanao. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 373. pl. enlumi. n. 277.*

Mindanao Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 515. n. 5.*

Habitat in insulis Philippinis, præsertim Mindanao, 143 pollices longus.

Cula jugulumque fusca, maculis albis; remiges fusca; barba exteriori maculis rufis, interiori albis notata; cauda fusco-aurea, fasciis transversis rufis; rectricum quarundam apex albus. Pedes cum unguibus grisei.

Vetula. 4. C. cauda cuneiformi, corpore subfuscō, subtus testaceo, ciliis rubris.

Cuculus jamaicensis longirostris. *Briff. av. 4. p. 116. n. 5. t. 17. f. 2.*

Cuculus cinereus rostro longiore. *Feuillée* per. p. 416.
Picus major leucophæus s. canescens, pluviae avis & senex
dictus. *Raj. av.* p. 182. n. 13.

Cacco. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 402.

Coucou à long bec de la Jamaïque. *Buff. pl. enlum.* n. 772.
Other sort of Old man or Rain-Bird. *Sloan. jam.* p. 313.
n. 53. t. 258. f. 2.

Long billed Rain Cuckow. *Latham syn. I. 2.* p. 535. n. 32.
Habitat in Jamaicæ silvis & dumetis, mansuetus, pluvia
instante clamitans, breviter volans, picæ instar
incedens, seminibus, vermis, scarabæis, serpentibus
minoribus, ranis, lacertis, aviculis, ratis viditans,
15 pollices longus.

Rostrum sesquipollice longius, mandibula superiore nigra,
inferiore albicincte; vertex fuscus; palpebrae pandis
coccineis; gula jugulumque alba; rectrices 2 inter-
media ex cinereo olivaceæ; reliquæ nigrae, apice albo;
pedes ex cæruleo atri.

Pluvialis. 24. C. ex cinereo olivaceus, subitus rufus, gula juguloque
albis.

Cuculus jamaicensis. *Briss. av.* 4. p. 114. n. 4.

Coucou dit le Vieillard ou l'oiseau de pluie. *Buff. hist. nat.*
des ois. 6. p. 398.

Old man or Rainbird. *Raj. av.* p. 182. n. 12. *Sloan. jam.*
p. 312. n. 52. t. 258. f. 1. *Brown. jam.* p. 476.

Rain Cuckow. *Lath. syn. I. 2.* p. 536. n. 33.
Habitat in Jamaica, vetulæ affinis, 16-17 pollices longus.
Rectrices extimæ margine albo.

minor. 25. C. ex cinereo olivaceus, subitus rufescens, mento albo.
Petit vieillard. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 401.
Coucou des Paletuviers de Cayenne. *Buff. pl. enlum.* n. 813.
Mangrove Cuckow. *Lath. syn. I. 2.* p. 537. n. 34.
Habitat in Cayenna, 12 pollices longus, infectis potissimum
coleopteris viditans, ceterum pluviali similis.

Glandarius. 5. C. cauda cuneiformi, capite subcristato, fascia oculari nigra.
Cuculus Andalusix. *Briss. av.* 4. p. 126. n. 10.
Grand Coucou tacheté. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 361.
Great spotted Cuckow. *Edw. av. t.* 57. *Latham syn. I. 2.*
p. 513. n. 3.
Habitat in Andalusia, picæ magnitudine.
Rostrum nigrum; crista ex cærulecente cinerea; humeri,
rectrices alarum superiores & caudæ fuscæ, maculis

exiguis albis & paluide cinereis ; remiges fuscæ ; cauda nigricans , apice albo.

ferratus. 26. C. niger , speculo alarum albo. *Sparrmann mus. Carlsson* n. 3.

Habitat ad Caput bonæ spei , ex virescente & cærulecenti splendore niger.

Macula ciaram superne & infra serrata ; cauda corpore longior.

tahitius. 27. C. fuscus , subtus albus fusco striatus , superciliis albis , remigibus ferrugineo maculatis.

Coucou brun vaué de noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 37^b. Ara Weeroa. Cook it. 4. p. 272.

Society Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 514. n. 4.

Habitat in insulis Societatis , picæ magnitudine , 19 pollices longus.

Rostri mandibula superior nigricans , inferior pallida ; irides pallide flavæ ; cridum album ; cauda cuneiformis , lineis transversis ex ferrugineo fuscis , apicibus albis ; pedes virescentes.

senega- 6. C. cauda cuneiformi , corpore griseo subtus albo , pileo lensis. recticibusque nigricantibus.

Cuculus senegalensis. Briss. av. 4. p. 120. n. 7. t. 8. f. 1.

Coucou du Sénégal. Buff. pl. entom. n. 332.

Rufalbin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 370.

Strait-heeled Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 525. n. 18.
Habitat ad fluvium Senegal ; canoro major , 15 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum nigrum ; uropygium & testrices caudæ superiores fuscæ , juriis profundioribus ; remiges rufæ , apice subfuscæ ; pedes & unguis grisei ; posteriorum internus rectus , longior.

benga- 28. C. ferruginens albo lineatus , subtus ex flavicante fuscus , lensis. cauda cuneiformi.

Lark-heeled Cuckow. Brown. illustr. p. 26. t. 13. Lath. syn. I. 2. p. 525. n. 19.

Habitat in Bengala , alauda major.

Rostrum obscurum ; remiges ex rubente fuscæ , & præter 1 & 2 nigro lineatæ ; testrices exteriores obscuræ apice fuscæ , reliquæ lineis nigris & angustioribus fuscis notatae ; pedes nigri , unguis posteriorum interior longus rectus.

- honora- 7. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante albo maculato, subtus albo cinereoque fasciato.
Cuculus malabaricus nævius. Briss. av. 4. p. 136. n. 15.
t. 15. A. f. 2.
Cuil. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 375.
Coucou tacheté de Malabar. Buff. pl. enlum. n. 294.
Sacred Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 526. n. 20.
Habitat in Malabaria, reptilibus vidiitans, hinc forte incolis sacratus, canoro minor, 11 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Remiges & cauda cinereæ, transversim albo maculatae;
pedes & unguis pallide cinerei.
- Puncta- 8. C. cauda cuneiformi, corpore nigricante rufo-punctato, subtus rufo strigis nigris, rectricibus rufo-fasciatis.
Cuculus indicus nævius. Briss. av. 4. p. 134. n. 14. t. 10.
f. 2.
Coucou brun piqueté de roux. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 377.
Coucou tacheté des Indes orientales. Buff. pl. enlum. n. 771.
Rufous spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 8.
Habitat in India & insulis Philippinis, canoro major,
16 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum corneum; a basi ejus ad aures infra oculos fascia rufa; pedes ex griseo fusci; unguis nigricantes.
- Panaya- 29. C. ex atro fuscus, maculis ex rufo flavis, subtus rufus, striis transversis nigris, gula nigra, cauda æquali.
Coucou tacheté de l'ile de Panay. Sonner. it. p. 120. t. 78.
Panayan spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 517. n. 9.
Habitat in insula Panay, punctato satis similis, canoro major.
Rostrum nigrum; irides flavæ; maculæ capitis, colli, dorſi, gula, tectricum alaruni ex rufo flavæ oblongæ, remigum transversæ flavicantes, nigris admixtis; cauda ex rufo flava, nigro cancellata; pedes plumbei.
- nævius. 9. C. cauda cuneiformi, corpore fusco ferrugineoque, jugulo strigis fuscis, rectricibus apice rufescensibus.
Cuculus cayananus nævius. Briss. av. 4. p. 128. n. 11.
t. 9. f. 1.
Coucou brun varié de roux. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 411.
Coucou tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 812.
Spotted Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 38.
β. Cuculus gula grisea, rectricibus lateralibus apice, & abdomine albis.

Habitat in Cayenna, &c. etiam in Gujanæ, coturnices venans, 12 fere pollices longus.

Mandibula superior dorso nigra, lateribus rufa, inferior tota rufa; corpus subtus ex rufo album; verticis pennis longæ, fuscæ, apice rufæ; cervix ex rufo grisea; remiges ex griseo fuscæ, margine & apice rufæ; pedes cinerei; uigues ex griseo fuscæ.

punctu- 30. *C. cauda cuneiformi, corpore fusco pennarum apice rufatus.* feidente, subtus tordide albo.

Punctated Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 541. n. 39.*

Habitat in Cayenna, 9 pollices longus.

Rostrum nigrum, pollicem longum; pedes satis longi.

ridibun- 31. *C. fuivus, gula, jugulo, &c pectore cinereis, abdomine, dus.* femoribus & tectricibus caudæ inferioribus nigris.

Cuculus mexicanus. Briff. av. 4. p. 119. n. 6.

Quapactol ou Rieur. Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 408. n. 4.

Laughing Bird or Quapactototl. Raj. av. p. 174. Will. orn. p. 187.

Laugl iug Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 539. n. 37.*

Habitat in nova Hispania; vox hominis ridentis, incolas terrens.

Longitudo 16 pollicum; rostrum ex cærulecente atrum; irides albæ; cauda dimidia corporis longitudine.

Guira. 32. *C. cristatus ex flavicante albus, cauda aliisque fuscis, capite in medio fusco ad latera flavicante, collo in medio flavicante, ad latera fusco.*

Cuculus cristatus brasiliensis. Briff. av. 4. p. 144. n. 19.

Guira cantara. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 407.

Guira acantagara. Raj. av. p. 45. n. 5. Will. orn. 140. n. 9. t. 22.

Habitat in Brasiliæ silvis, valde clamosus, picæ magnitudine, 14½ pollices longus.

Rostrum obscure flavum, pollicem longum; irides fuscæ; cauda apice alba; pedes thalassini.

america- 10. *C. cauda cuneiformi, corpore supra cinereo subtus albo, mandibula inferiore lutea.*

Cuculus carolinianus. Briff. av. 4. p. 112. n. 5.

Vieillard à ailes rousses. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 400.

Coucou de la Caroline. Buff. planch. enlumi. n. 816.

Caroline Cuckow. Arct. zool. 2. p. 265. n. 155. Catesby.

Carol. I. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 537. n. 35.

Habitat in America septentrionali, migratorius, *Majo adveniens*, autumno discedens; nidum ut plurimum in malis ex baculis radicibusque struens, & 4 ova ex cærulecente alba pariens, 12 pollices longus.

Remiges primariæ extrinsecus fuscæ interius aurantiæ; rectrices, exceptis 2 intermediis, apice albæ; pedes obscuri.

Coclopa - 11. C. cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.

Cuculus bengalensis nævius. *Priss. av. 4. p. 132. n. 13.*
Boutfallick. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 372.

Brown and Spotted Indian Cuckow. *Edw. av. t. 59.*

Indian Spotted Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 6.*

Habitat in Bengala, *turdo vix major*, 14 pollices longus.
Rostrum & pedes ex luteo sordide virent; remiges & hunieri striis transversis fuscis & rufis; cauda rufescens, tæniis obliquis fuscis.

Macula - 33. C. cauda cuneiformi, corpore supra ex virescente griseo maculis albis, subtus ex fusco alboque vario.

Coucou tacheté de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 378. pl. enlum. n. 764.*

Chincle Spotted Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 516. n. 7.*

Habitat in Sina, 14 pollices longus.

Rostrum supra nigricans, subtus flavum; caput collumque nigricantia, maculis circa oculos albis; nitor supra uscœ aureus; pedes flavicantes.

Niger. 12. C. cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo.

Cuculus bengalensis niger. *Briss. av. 4. p. 141. n. 17.*

Couckeel. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 384. n. 3.*

Black Indian Cuckow. *Edw. av. t. 58.*

Habitat in Bengala, 9 pollices longus; an mera orientalis varietas?

Nitor viridis & violaceus; pedes ex rubicundo fusi; unguis nigricantes.

ater. 34. C. cauda cuneiformi, corpore splendide nigro, capite pennis elongatis cristato, remigum quinque primarum basi alba.

Crested black Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 519. n. 11.*

Habitat in Promontorio bonæ spei, an forte idem cum serrato?

- melano - 35. C. niger, subtus albus, cauda cuneiformi, apice alba,
leucus: macula alarum alba, capite subcristato.
Jacobin huppé de Coromandel. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
p. 380. *pl. enlum.* n. 872.
Coromandel Crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2.* p. 520. n. 12.
Habitat in Coromandel, 11 pollices longus.
Pedes fuscæ.
- pisanus. 36. C. cauda cuneiformi, corpore supra ex albo & nigro vario,
subtus albo, capite nigro cristato, gula & pectori rufis.
Cuculus ex albo & nigro mixtus. *Orn. ital.* p. 81. t. 1.
Coucou huppé noir & blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 362.
Pisan Cuckow. *Lathami syn. I. 2.* p. 520. n. 13.
Habitat Pisis, semel tantum deprehensus, ova 4 pariens,
canoro paulo major.
Rostrum ex virescente fuscum; tectrices caudæ inferiores
rufæ; remiges rufæ, rectrices nigræ, utræque apice
albae; pedes virides.
- madagaf- 37. C. olivaceus fusco undulatus, subtus fulvus, gula olivacea
cariensis. flavo temperata.
Coucou verdâtre de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 6.
p. 364. *pl. enlum.* n. 815.
Great Madagascar Cuckow. *Lath. syn. I. 2.* p. 521. n. 14.
β. Cuculus area capitis cærulecente sulcata circulo nigro
cincta.
Habitat in Madagascar, 21 ½ pollices longus.
Rostrum nigrum; irides aurantiae; abdominis pars posterior,
& caudæ tectrices inferiores fuscae; femora cinereæ;
cauda 10 pollices longa; rectricum laterale aliquæ
apice albo; pedes ex flavicante fuscæ.
- domini- 13. C. cauda cuneiformi, corpore griseo fusco subtus exalbido,
rectribus lateralibus tribus apice albis.
Cuculus dominicensis. *Briss. av.* 4. p. 110. n. 2. t. 9. f. 2.
Cendrillard. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 413.
St. Domingo Cuckow. *Lath. syn. I. 2.* p. 541. n. 40.
β. Cuculus subtus candidus.
Habitat in Guiana, insula S. Dominici & Louisiana, turdi
magnitudine, 10 ½ pollices longus.
Remiges rufæ, apice & marginæ ex griseo fusco; rectrices
præter 2 intermedias nigræ apice albo, extimæ marginæ
quoque albo; rostrum, pedes & ungues ex griseo fuscæ.

- Cayanus. 14. C. cauda cuneiformi, corpore castaneo purpurascente
subtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.
Cuculus cayanensis. Briss. av. 4. p. 122. n. 8. t. 8. f. 2.
Coucou piaye. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 414.
Coucou de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 211.
Cayenne Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 542. n. 41.
 β. Cuculus cayanensis minor. Briss. av. 4. p. 124. n. 9.
t. 16. f. 2.
 γ. Cuculus rostro rubro, capite cinereo, gula & pectori
rufis, abdomine ex cineo nigro.
Habitat in Cayenna, ad ripas, mansuetus, viditans
insectis, 16 fere, β. $10\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum, pedes & unguis ex griseo fusca; remiges apice
fuscæ; rectrices castaneæ, versus apicem nigræ, apice
albae; cauda 10 pollices longa.
- tranquill- 38. C. niger, subtus in cinereum vergens, cauda cunei-
formi, teñicum alarum superiorum margine albo.
Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 416.
pl. enlum. n. 512.
Cayenne black Cuckow. Latham syn. I. 2. p. 543. n. 42.
Habitat in Cayenna, solitarius, reliquis speciebus minus
inquietus, 11 pollices longus.
Rostrum & irides rubent.
- tenebro- 39. C. niger, abdomine & femoribus ferrugineis, uropygio
sus, crissoque albis, cauda æquali. Pall. n. nord. Beytr. 3.
p. 3. t. 1. f. 1.
Petit Coucou noir de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 6.
p. 417. pl. enlum. n. 505.
White-rumped black Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 544. n. 43.
Habitat in Cayennæ arborum ad aquas crescentium ramis
solitarius, immotus, viditans insectis; nidificat in
cavis arborum aut terræ, $8\frac{1}{4}$ pollices longus.
Rostrum obscurum subulatum; nares setis circiter 10 cinctæ,
ridus setis circiter 8; fascia inter pectus & abdomen
aurantia; pedes flavi, breves; trogoni affinis.
- Pyrrhococ- 40. C. niger; subtus albus, vertice genarumque parte cocci-
phalus. n. circulo albo cinctis, caudæ prælongæ apice albo.
Red-headed Cuckow. Ind. zool. t. 6. Latham syn. I. 2.
p. 544. n. 44.
Habitat in Zeylon, fructibus viditans, 16 pollices longus.
Rostrum arcuatum, ex virecente flavum; caput collumque
maculis exilibus albis; pedes cærulescentes.

- cæruleus.** 15. *C. cauda rotundata*, corpore cæruleo.
Cuculus madagascariensis cæruleus. *Briss. av.* 4. p. 157.
n. 26. t. 13. f. 1.
Tait-son. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 191. *t. 18.*
Coucou bleu de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 295. *f. 2.*
Blue Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 531. *n. 29.*
Habitat in Madagascar, canori magnitudine, 17 pollices longus.
Rostrum, pedes & unguis nigra; remiges & cauda nitore viridi & violaceo.
- sinensis.** 16. *C. cauda cuneiformi longa*, corpore cæruleo subtus albo, rectricum apicibus macula alba.
Cuculus sinensis cæruleus. *Briss. av.* 4. p. 157. *n. 27.*
t. 14. A. f. 2.
San-hia de la Chine. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 389.
Chinese Cuckow. *Latam syn.* I. 2. p. 530. *n. 28.*
Habitat in Sina, 13 pollices longus.
Rostrum, irides, pedes & unguis rubent; vertex albus; punctis cæruleis; reliquum caput & gula nigricans; area alba rotunda ad genas.
- afer.** 41. *C. viridi-æneus*, subtus splendide griseus, capite colloque cinereis, vertice nigricanti-æneo, cauda æquali viridi-aurea, subtus nigra.
Cuculus madagascariensis major. *Briss. av.* 4. p. 160.
n. 28. t. 15. f. 1.
Grand Coucou de Madagascar. *Buff. pl. enlum.* n. 587.
Vauou-driou. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 395.
African Cuckow. *Latham syn.* I. 2. p. 532. *n. 30.*
 β . *Cuculus fuscus* subtus rufescens, capitis collique striis transversis fuscis rufisque.
Grand Coucou de Madagascar. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 396.
Habitat in Madagascar, columbae majoris magnitudine; 15 pollices longus.
Rostrum rectum, 2 pollices longum, nigricans; ab eo ad oculum utrinque linea nigra; remiges majores nigricantes, minores obsolete virides; pedes rubicundi; unguis nigri.
- indicator.** 42. *C. ex ferrugineo griseus*, subtus albus, palpebris nudis nigris, humerorum macula flava, cauda cuneiformi ferruginea. *Mill. illust.* t. XXIV. *f. A.*
Coucou indicateur. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 392. *n. 22.*

Honey Guide. *Sparrmann act. angl.* 67. p. 38. t. 1.

Honey Cuckow. *Lath. syn.* I. 2. p. 533. n. 31.

Habitat in interiore Africa, mellis causa apium sylvestriunt, alvearia exquirens, & voce sua hominibus indicans, nondum lagenæ formæ, ex gracilibus coriicis filamentis struit, incolis magni cæsiuatus, ut trucidare nefas sit, 6 pollices longus.

Rostrum basi fuscum, apice luteum, setis basin cingentibus; femorum pennæ albæ, stria longitudinali nigra; remiges supra fuscæ, subtus ex griseo fuscæ; rectrices 1, 1 angustissimæ, ferrugineaæ, 2, 2 fuliginosaæ margine interiori albidae, 3, 3 albæ, apice fuscæ, macula nigra ad interiorem rhachin notatae; reliquæ similes, macula tamen nigra sensim disparente.

Persa.

17. C. cauda æquali, capite cristato, corpore viridi cærulecente, remigibus sanguineis.

Cuculus guineensis cristatus viridis. Briss. av. 4. p. 152. n. 24.

Crown Bird from Mexico. *Albin. av. 2. p. 19. t. 19.*

Touraco. *Edw. av. 1. t. 7. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 300. t. 15. Lath. syn. I. 2. p. 545. n. 46.*

Touraco de Guinée. *Buff. pl. enlum. n. 601.*

Habitat in variis Africæ partibus, vegetabilibus, potissimum fructibus vidiitans, picæ magnitudine, trogoni per quam aijinis.

Rostrum obscure rubrum, breve, subconicum, margine, mandibulæ præsertim superioris, ferratum; lingua cartilaginea, plana, acuta; nares pennis recumbentibus teñæ; irides badiæ; palpebrae carunculis rubris cinctæ; crista mobilis apice rubens fere conica; pennæ molles, quasi sericeæ; fascia ocularis nigra; linea alba supra & infra oculos; humeri, dorsi pars inferior, uropygium, cauda, teñices caudæ superiores alarumque majores ex cærulecente purpurea; abdominis pars infima & latera, femora, teñicesque caudæ inferiores nigricant; pedes cum unguibus cinerei, posticorum digitorum exterior vix retroversus cum anteriore plica cutanea cohærens.

brasiliensis 18. C. cauda subæquali, capite cristato, corpore rubro, remigibus flavescentibus.

Cuculus brasiliensis cristatus ruber. Briss. av. 4. p. 154. n. 25.

Cuculus brasiliensis venustissime pictus. Seb. mus. I. p. 102. t. 66. f. 2.

Couroucoucou. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 298.*
 Red-crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 545. n. 45.*
Habitat in Brasilia, pyrrhocephalo paulo minor, 10 pollices longus.

Rostrum dilute rubrum; crista nigro-varia; abdominis rubori flavedo intermista; remiges & cauda flavæ cum tinctura nigra.

cristatus. 19. C. cauda rotundata, capite cristato, corpore cinereo-virescente nitente.

Cuculus madagascariensis cristatus. *Briff. av. 4. p. 149. n. 22. t. 12. f. 2.*

Coucou huppé de Madagascar. *Buff. pl. enlum n. 589.*

Coua. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 365. n. 4. t. 16.*

Madagascar crested Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 522. n. 15.*

Habitat in Madagascar, corvi glandariae magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum & pedes nigra; irides aurantiæ; pectus vinaceum; abdomen albidum cum tinctura rufa; remiges & cauda virescentes, subtus cinereæ; rectrices exteriores apice albæ

ægyptius. 43. C. fuscus, subtus ex rufo albus, capite & cervice obscure, cauda cuneiformi splendide viridi, remigibus rufis.

Houhou d'Egypte. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 367.*
 Egyptian Cuckow. *Lath. syn. I. 2. p. 522. n. 16.*

β. Cuculus splendide niger, alis rufis.

Coucou des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 369. pl. enlum. n. 824.*

γ. Cuculus alis spadiceis.

Coucou vert d'Antigue. *Sönnher. it. p. 181. t. 80.*

Habitat in Ægypto β. in insulis Philippinis, γ. in Antigua solitarius, aut geminus in dumetis ad aquas positis, vicitans loculis, 14-15 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides splendide rubræ, in γ. nigræ; caput & cervix, in β. quoque gula, jugulum, pectus & abdomen obscure viridia, in hoc in atrum vergentia; rectrices alarum superiores rufæ in viridem vergentes; remiges 3 ultimæ totæ rufæ, reliquæ apice splendide viridi; pedes nigricantes.

radiatus. 44. C. ex fusco ater, subtus flavus nigro-lineatus, gula genisque vinaceis, vertice ex nigricante griseo.

Coucou brun & jaune à ventre rayé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 379.*

Coucou à ventre rayé de l'île de Panay. Sonner. it. p. 120.

t. 79.

Panayan Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 21.

Habitat in insula Panay, canori magnitudine.

Rostrum nigrum; irides aurantiæ; remigum pars inferior albo-maculata; cauda nigra lineis & apice albis, æqualis; pedes rubicundi.

flavus. 45. C. testaceus, subtus flavescens, vertice gulaque dilute griseis, cauda cuneiformi nigra albo-lineata.

Petit coucou à tête grise & ventre jaune. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 382. n. 15.

Coucou petit de l'île de Panay. Buff. pl. enlum. n. 814. Sonner. it. p. 122. t. 81.

Yellow bellied Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 22.

Habitat in insula Panay, ultra 8 pollices longus.

Rostrum pedesque flavescunt, apice illius nigro; irides flavæ.

auratus. 46. C. cauda cuneiformi, corpore supra viridi-aureo, subtus albo, capitis strigis quinque, tectricum alarum, remigum secundariarum tectricumque apicibus albis.

Coucou vert doré & blanc. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 385. Coucou vert du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum. n. 657.

Gilded Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 527. n. 23.

Habitat ad Caput bonæ spei, 7 pollices longus.

Rostrum ex virescente fuscum; pedes grisei.

lucidus. 47. C. supra viridis, subtus albus, utrinque viridi-aureo-lunulatus, remigibus caudaque fuscis.

Shining Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 528. n. 24. t. 23.

Habitat in nova Seelandia, præcedenti a finis, 7 pollices longus.

Rostrum pedesque cœrulecentes; irides badiæ; tectrices caudæ inferiores albæ.

coromandelensis. 20. C. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus albo, torque candido.

Cuculus coromandelanensis cristatus. Briss. av. 4. p. 147. n. 21. t. 11. A. f. 1.

Coucou huppé de Coromandel. Buff. pl. enlum. n. 274.

Coucou huppé à collier. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 388.

Collared Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 529. n. 26.

Habitat in Coromandel, 12½ pollices longus.

AVES PICÆ. Cuculus.

Rostrum & pedes cinerea ; irides flavicantes ; caput cristatum , macula ad utrumque latus parva rotunda grisee ; gula & femora nigricantia ; remiges primariae rufæ ; secundariae nigricantes , margine rufo ; cauda nigricans.

- cornutus.* 21. *C. cauda cuneiformi, capite crista bifida, corpore fuliginoso.*
Cuculus brasiliensis cornutus. Briss. av. 4. p. 145. n. 20.
Atingacu camucu. Marcgr. bras. p. 256. Will. orn. p. 146.
t. 38. Raj. av. p. 165. n. 5.
Atingacu du Brésil. Buffon hist. nat. des ois. 4. p. 409.
Horned Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 530. n. 27.
Habitat in Brasilia , 12. pollices longus.
Rostrum ex virente flavum ; irides sanguineæ ; crista cornu cernula mobilis ; corpus subtus cum pedibus & unguibus cinereum ; cauda apice alba.

- paradi-* 22. *C. caudæ rectricibus extimis binis longissimis apice dilatatis , capite cristato , corpore viridi.*
Cuculus siamensis cristatus viridis. Briss. av. 4. p. 141.
n. 23. t. 14. A. f. 1.
Coucou à longs brins. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 387.
Paradise Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 529. n. 25.
Habitat in Siam , corvi glandarii magnitudine , 17 pollices longus.
Rostrum nigricans ; irides cæruleæ ; pedes & unguis grisei.

- Tolu. 48. *C. nigricans , uropygio & abdomine ex virescente nigris , humeris remigibusque castaneis , cauda cuneiformi atro-viridi , subtus nigra.*
Cuculus madagascariensis. Briss. av. 4. p. 138. n. 16. t. 13.
f. 2.
Coucou de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 369.
t. 17.
Coucou de Madagascar , appelé Toulou. Buff. planch. enlum. n. 295. f. 1.
Long-heeled Cuckow. Lath. syn. I. 2. p. 524. n. 17.
Habitat in Madagascar 14 $\frac{1}{4}$ pollices longus , ægyptio valde affinis.
Rostrum fuscum ; pennæ superiores longiusculæ , angustæ , rigidæ , stria per longiludinem ex rufo alba notatae ; rectrices alarum castaneæ , scapis purpurascensibus ; remiges apice fuso ; pedes & unguis nigri ; digitorum posteriorum interior altero longior.

58. YUNX. *Rostrum teretiusculum acuminatum,*
debilius paulisper incurvum.

Nares concavæ denudatæ.

Lingua teres lumbriciformis longissima
apice mucronata.

Rectrices decem flexiles.

Pedes scandorii.

Torquil- 1. Y. ex albo , griseo , nigro , & ferrugineo varia. *Fn. suec.*
la. 97. *t.* 1. *f.* 97. *Bell. av.* 76. *α.* *Gesn. av.* 573. *Aldr. orn.* 1. *p.* 863. *t.* 866. *Johnst. av.* *t.* 42. *Raj. av.* *p.* 44. *A.* 8. *Rudb. lapp.* 66. *t.* 66. *Briff. av.* 4. *p.* 4. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *Scop. ann.* 1. *n.* 50.

Cuculus subgriseus maculatus , rectricibus nigris fasciis undulatis. *Fn. suec.* 1. *p.* 78. *t.* 1. *f.* 78.

Torcol. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 84. *t.* 3. *planch. enlum.* *n.* 698.

Wryneck. *Brit. zool.* *n.* 83. *Ard. zool.* 2. *p.* 267. *Albin. av.* 1. *t.* 21. *Will. orn.* *p.* 138. *t.* 22. *Lath. syn.* 1. 2. *p.* 548. *t.* 24. *Hayes brit. birds t.* X.

Drehhals. *Frisch. av.* *t.* 33.

β. Yunx supra maculis transversis , subtus striis longitudinalibus flavis.

Jyngi congener. *Aldr. orn.* 1. *p.* 868. *t.* 869. *Will. orn.* *t.* 22.

Torquilla striata. *Briff. av.* 4. *p.* 7.

Habitat in Europæ & Sibiriae , Persiæ & Indiæ truncis arborum putrescentibus , ex quibus larvas extrahit , his formicisque potissimum vicitans , migratoria ; collum contorquendo circumspiciens ; ova parit eburnei candoris 8 - 10.

Magnitudo alaudæ ; longitudo 7 pollicum ; corpus supra ex griseo , nigro , albo & ferrugineo varium ; cauda grisea , maculis nigris , fasciis 4 latis nigris.

minutif- 2. Y. supra ex atro cinerea , subtus sordide alba.
fima. *Picus minutissimus.* *Pallas n. nord.* *Beytr.* 3. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 2.

Picus cayennensis minor. *Briff. av.* 4. *p.* 83. *n.* 32.

Petit pic de Cayenne. *Ferm. Surin.* 2. *p.* 170. *Buff. planch.* *enlum.* *n.* 786. *f.* 1.

Très-petit pic de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. *p.* 37. *Minute Woodpecker.* *Lath. syn.* 1. 2. *p.* 596. *n.* 48.

Habitat in Cayenna, $3\frac{1}{2}$ pollices circiter longus, certiæ familiaris magnitudine.

Rostrum nigricans, basi flavum; caput nigrum albo-guttatum; mari ad frontem area miniata; genæ ex nigricante cinereæ; alæ extus nigricantes, intus cinereæ; rectrices 1, 1 rachi interna albæ, margine angusto subfuscō; 2, 2 totæ nigrae; reliquæ ad apicem fere fascia obliqua alba; pedes nigri, robusti.

59. **PICUS.** *Rostrum polyedrum, rectum, apice cuneato.*

Nares pennis setaceis recumbentibus obtectæ.

Lingua teres, lumbriciformis, longissima, ossea, missilis, mucronata, apice retrorsum aculeata setis.

Rectrices 10 duræ rigidæ acuminatæ.
Pedes scansorii.

Martius. I. P. niger, pileo coccineo. *Fn. suec.* 98. *Scop. ann.* I. p. 46.
n. 51.

Picus niger. *Briss. av.* 4. p. 21. n. 6.

Picus niger maximus. *Gesn. av.* 708. *Aldr. orn.* I. p. 843.
t. 844. *Raj. av.* p. 42. n. 1.

Pic noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 41. t. 2. pl. enlum.
n. 596. *orn. de Salern.* t. 10. f. 2.

Greatest black Woodpecker. *Arct. zool.* 2. p. 276. *A. Will. orn.* p. 135. t. 21. *Albin. av.* 2. t. 27. *Lath. syn.* I. 2.
p. 552. n. 1.

Schwarzspecht. *Frisch. av.* t. 34.

Habitat in Europæ, Sibiriæ & regni Chilensis populis, nidos magnos & profundos struens, ovaque pariens 2-3. candida; 17-18 pollices longus, formicis aliisque insectis, eorumque larvis vivitans.

Femina occipite modo rubra.

Lignæ- 22. P. pileo coccineo, corpore albo cæruleo que vittato. *Molina hist. nat. Chil.* p. 209.

Habitat in regni Chilensis arboribus, quas tum emortuas. tum vegetas rostro robusto perforat adeo, ut nidum in fossis foraminibus struat; hinc arboribus pomiferis infestus.

Principia- 2. P. niger, crista coccinea, linea utrinque collari, remigibusque secundariis albis.

Picus niger carolinensis. Briss. av. 4. p. 26. n. 9.

Picus imbrifactus. Nieremb. nat. p. 223. Will. orn. 301.

Quatotomomi. Raj. av. p. 162. Will. orn. p. 390.

Grand pic noir à bec blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 46.

Pic noir huppé de la Caroline. Buff. pl. enlum. n. 690.

Largest white-billed Woodpecker. Catesb. car. I. t. 16.

White-billed Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 268. n. 156.

Lath. syn. I. 2. p. 553. n. 2.

Habitat in America a nova Jersey ad Brasiliam usque, cornicis magnitudine, 16 pollices longus; foramina spiralia excavata.

Rostrum eburneum, 3 pollices longum; irides flavæ; crista occipitis conica; dorsi pars inferior alba.

Pileatus. 3. P. niger, crista rubra, temporibus alisque maculis albis.

Picus virginianus pileatus. Briss. av. 4. p. 29. n. 10.

Pic noir à huppe rouge. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 48.

Pic noir huppé de la Louisiane. Buff. pl. enlum. 718.

Larger red-crested Woodpecker. Catesb. car. I. p. 17. t. 17.

Pileated Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 269. n. 157. Lath. syn. I. 2. p. 554. n. 3.

Habitat in America septentrionalis silvis, quæ spicas rostro destruens, 6 ova pariens, ex quibus Junio exireunt pulli.

Longitudo 18 pollicum; rostrum 2 pollices longum, mandibula superiore obscura, inferiore albida; irides aureæ; crista linea fuscescente cincta; tænia nigra ab oculis ad occiput ducta; infra hanc linea fuscescens ab ortu rostri per collum ad alarum initium; mentum & gula alba; pedes obscuri. Feminæ frons fusca.

Lineatus. 4. P. niger, crista coccinea, linea a rostro utrinque collari ad medium dorsum alba.

Picus niger cayahensis cristatus. Briss. av. 4. p. 31. n. 11. t. I. f. 2.

Ipecu. Marcgr. bras. 207.

Picus varius brasiliensis, Ipecu dictus. Raj. av. p. 43. n. 7.

Pici, Alberto M. jam satis noti, & memorati, arbores, potissimum ægrotantes & emortuas, aliquando tamen etiam sanas concidunt, injedæ larvasque infectorum, lignum intus rodentes, arboremque destruendos, r. stro fecante, sono stridulo terrefaciente, auditu percipiente, lingua cuta hastata intrante extrahunt (act. angl. 350. p. 509.) inuste prescriptu & fulvis expulsi.

AVES PICÆ. Picus.

Ouantou ou pic noir huppé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 50. pl. enlumi. n. 717.

Pic noir ou charpentier. *Fermin Surin.* 2. p. 170.

Brasilian Woodpecker, called Ipecu. *Will. orn. p. 138.* t. 22.

Lineated Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 556.* n. 4.

Habitat in Cayenna, magnitudine viridis, 14 fere pollices longus.

Rostrum sesquipollicare, corneum; mandibula inferior striæ coccinea; caput coccineum; genæ cinerascentes; gula, abdomen, & crissum ex ruflo alba, striis transversis nigris; cauda cuneiformis; pedes & ungues grisei.

rubicol- 23. P. fuscus, subtus fulvus, capite cristato colloque sanguineis, lis.

Pic à cou rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 53.

Grand pic huppé à tête rouge de Cayenne. *Buf. pl. enlumi.* n. 612.

Red-necked Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 558.* n. 5.

Habitat in Cayenna, 16 pollices longus.

Rostrum pallidum; crista occipitalis; pedes plumbei.

melano- 24. P. niger, subtus lineo collari utrinque, nucha & uropygio albus, crista posterius ex luteo fuscescente.

Buff-crested Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 558.* n. 6. t. 25.

Habitat in Surinamo, 12½ pollices longus.

Pectus & abdomen sordide album, lineis transversis nigris.

hirundi- 5. P. niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis. naceus.

Picus niger novæ Angliæ. *Briff. av. 4. p. 24.* n. 7.

Petit pic noir, var. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 54.

Lesser black Woodpecker. *Albin. av. 3. t. 23.* *Lath. syn. I. 2. p. 559.* n. 7.

β. P. pectoris area rubra, abdomine ex nigro & griseo variò. Petit pic noir. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 54.

Petit pic noir de Cayenne. *Buff. pl. enlumi.* n. 694. f. 2.

γ. Picus verticis area rubra, oculorum alba, occipite aureo. *Habitat in America septentrionali, β. & γ. in Cayenna, hirundinis circiter magnitudine.*

Rostrum fuscum; irides albidæ; alarum anguli, & abdominis postrema pars alba; pedes flavicantes; in β. supra oculos intermisus candor; dorsi pars inferior, & uropygium alba; femina neque rubri, neque flavi aliquid monstrat; in universum pectus area sanguinea; crissum albo & nigro lineatum; remiges nonnullæ secundarie apice albo - punctatae.

- Pafferinus. 6. P. olivaceo-flavicans, subtus fusco candidanteque fasciatus.
Picus dominicensis minor. *Briff. av. 4. p. 75. n. 29. t. 4.*
f. 2.
Petit pic olive de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 7.*
p. 29.
Passerine Woodpecker. *Latham syn. I. 2. 588. n. 37.*
Habitat in insula S. Dominici, alaudæ magnitudine, 6 pol-
lices longus.
Rostrum, pedes & unguis grisei; vertex ruber; tempora ex
rufso grisea; testrices alarum maiores plurimæ macula
ochroleuca; remigum majorum margo interior fuscus,
albido dentatus.
- striatus. 25. P. niger, olivaceo striatus, subtus olivaceus, fronte, ge-
nis, gula, jugulo, & pectore griseis, vertice, occipite,
uropygio & testricibus caudæ superioribus rubris.
Picus dominicensis striatus. *Briff. av. 4. p. 65. n. 25. t. 4.*
f. 1.
Pic rayé de S. Domingue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 27.*
pl. enlum. n. 281.
Rayed Woodpecker. *Latham syn. I. 2. p. 587. n. 36.*
- β. Picus vertice nigro.
Picus dominicensis striatus minor. *Briff. av. 4. p. 67.*
n. 26. t. 3. f. 2.
Pic rayé à tête noire de S. Domingue. *Buff. pl. enlumi.*
n. 614.
Habitat in insula S. Dominici, 9 fere pollices longus.
Rostrum corneum; remiges nigricantes, rhachi exteriore
flavo, interiori albido-maculatae, pedes & unguis nigri-
cantes.
- Melano- 26. P. ex nigro & flavo varius, crista aurea, cauda nigra.
chloros. Picus varius americanus cristatus. *Briff. av. 4. p. 34. n. 12.*
Grand pic rayé de Cayenne. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 30.*
pl. enlum. n. 719.
Gold-crested Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 589. n. 38.*
Habitat in Cayenna, magnitudine viridis.
Rostrum obscurum; genæ rubicundæ; inter basin rostrum
& oculos area purpurea; corpus nigro & flavo undu-
latum, striatum, & potissimum subtus maculatum.
- flavescens. 27. P. niger, crista, genis, cervice, gula, testricibus cau-
dæ superioribus & alarum interioribus, strigisque ala-
rum & dorsi transversis flavis.

Yellow-crested Woodpecker. *Brown. Illusfr. t. 12. Lath.*
syn. I. 2. p. 509. n. 39.

Habitat in Brasilia, monedulae magnitudine.

Crista longa, laxa, pendula; pedes obscure virides.

cayennen-28. *P. olivaceus, pennis versus apicem macula nigra nos-
 fisis. tatis, vertice, gula, caudaque nigris, occipite rubro,
 genis albidis, abdomine flavicante.*

Picus striatus cayennensis. Briss. av. 4. p. 69. n. 27.

*Petit pic rayé de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 31.
 Pic rayé de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 613.*

Cayenne Woodpecker. Laiham syn. I. 2. p. 590. n. 40.

Habitat in Cayenna, 7½ pollices longus.

*Rostrum nigricans; gula albo-maculata; femora & tectrices
 caudæ inferiores maculis rarioribus nigris; humeri tec-
 tricesque alarum striis transversis nigricantibus; remiges
 nigricantes, scapis flavis; rectrices 2 extimæ scapis fla-
 vis, lineis nigris & rufis; pedes grisei.*

exalbidus. 29. *P. exalbidus cristatus, tænia mandibulæ inferioris lon-
 gitudinali rubra, alis fuscis rufisque, cauda nigra.*

Picus cayennensis albus. Briss. av. 4. p. 81. n. 31.

Charpentier jaune. Firmin Surin. 2. p. 171.

*Pic jaune de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 32.
 planch. enlum. n. 509.*

Yellow Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 591. n. 41.

*Habitat in Cayenna, viridi minor, 9 pollices longus, 3 ova
 alba fere globosa pariens, ex quibus Aprili excurrent pulli.*

*Rostrum ochroleucum; occiput cristatum; color sordide
 albus, nonnunquam flavescens; tænia rubra feminæ
 nulla; tectrices alarum fuscæ, margine flavicante;
 pedes & unguis grisei.*

cinnamo-30. *P. cinnamomeus, maculis rarioribus ochroleucis, crista &
 mensa.*

*dorsi parte inferiore obscure flavicante, gula utrinque
 macula lata sanguinea, rostro, cauda pedibusque nigris.*

Pic mordoré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 34.

Pic jaune tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 524.

*Ferruginous Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 271. n. 159.
 t. 13. Lath. syn. I. 2. p. 592. n. 42.*

*Habitat in Cayenna, Guiana, Carolina australi, viri-
 dis magnitudine, 11 pollices longus.*

Feminæ rubor nullus.

maltico- 31. P. cristatus rufus, subtus pallide ferrugineus, capite, lor. gula & cervice aurantiis, nucha, jugulo, pectore alarumque maculis nigris.

Pic à cravate noire. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 35.*
 Pic à cravate noire de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 863.*
 Black-breasted Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 593. n. 43.*
Habitat in Gayenna & Guiana, viridis magnitudine.
 Rostrum pallidum; caudæ apex maculæque nigra; pedes plumbei.

erythro- 7. P. capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine cephalus. albo. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 21.*

Picus erythrocephalus virginiensis. *Briss. av. 4. p. 53. n. 19. t. 3. f. 1.*

Picus capite toto rubro. *Kalm it. 3. p. 43.*
 Pic noir à domino rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 55.*
 Pic de Virginie. *Buff. pl. enlum. n. 117.*

Red-headed Woodpecker. *Ard. zool 2. p. 271. n. 160.*
Catesb. Car. I. t. 20. Latham syn. I. 2. p. 561. n. 8.
Habitat in America septentrionali, migratorius, glandibus, zea, pomisque vietians, hinc per quam infestus, ideo olim lege, nunc tamen abrogata proscriptus; prius & altius reliquis speciebus nidificans, 9½ pollices longas.
 Rostrum plumbeum; dorsum nigrum; remiges secundariæ albæ, fasciis duabus nigris transversis; pedes nigri; feminæ caput fuscum.

tuber. 31. P. capite, collo & pectore rubris, dorso alisque nigris, abdomine ochroleuco.

Red breasted Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 562. n. 9.*

Habitat in Cayenna, erythrocephalo paulo minor.
 Rostrum cornuum; a naribus ad vel infra oculos linea fuscens; teñtrices alarum minores complures albo punctatae, maiores nonnullæ exteriori rachi albæ, inferiores ex albo & nigro variae; remiges nigræ albo maculatae.

obscurus. 32. P. obscurus, exalbido striatus & undulatus, subtus albus, remigibus primoribus nigris, secundariis albis versus apicem nigro fasciatis.

White-rumped Woodpecker. *Latham syn. I. 2. p. 563. n. 10.*
Habitat in insula longa (Long Island), 9 pollices longus.
 Rostrum cornuum; teñtrices alarum maiores nigræ; pedes nigri; uropygium album.

- fasciatus.* 33. *P. niger*, facie, vertice & fascia mandibulæ inferioris rubris, orbitis albis, temporibus & abdomine albo & nigro striatis.
Striped bellied Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 563. n. 11.
- auratus.* 8. *P. supra aurantius*, nucha, uropygio rectricibusque nigris.
Picus Capitis bonæ spei. *Briff. av.* 4. p. 78. n. 10. t. 6. f. 1.
Orange Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 585. n. 32.
Habitat ad Caput bonæ spei, 10 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum, pedes & unguis *plumbeus*; vertex & occiput *niger*; pone oculos utrinque ad occiput, & a naribus infra oculos ad utrumque colli latus *stria alba*; genæ, gula jugulumque *sordide grisea*; dorsi pars inferior *nigricans*; pectus & abdomen *sordide alba*; remiges *fusca*, nonnullæ *albo maculatae*.
- senegensis.* 34. *P. supra aureus*, subtus *griseo* & exalbido undulatus, vertice rubro, fronte temporibusque *fusca*, *rectricibus* alarum & uropygio *virescentibus*, *rectricibus nigris*, exterioribus *flavo maculatis*.
Petit pic rayé du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 25.
Petit pic du Sénégal. *Buff. pl. enlum.* n. 345. f. 2.
Gold backed Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 586. n. 33.
Habitat ad fluvium Senegal, passere non major.
Rostrum & pedes *obscuri*.
- capensis.* 35. *P. griseus*, dorso, collo & pectore *olivaceis*, remigibus obcuris, uropygio & *rectricibus caudæ superioribus rubris*, *rectricibus nigris*.
Pic à tête grise du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 26. *pl. enlum.* n. 786. f. 2.
Cape Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 786. n. 34.
Habitat ad Caput bonæ spei, alauda minor.
Rostrum & pedes *plumbea*.
- auratus.* 9. *P. griseo nigroque transversim striatus*, gula pectoreque *nigris*, nucha rubra, uropygio albo. *Forster act. angl.* V. 62. p. 387.
Picus canadensis striatus. *Briff. av.* 4. p. 70. n. 28.
Cuculus auratus. *Syst. nat.* X. I. p. 112.
Picus major alis aureis. *Kalm it.* 3. p. 42.
Pic rayé de Canada. *Buff. pl. enlum.* n. 693.
Pic aux ailes dorées. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 39.
Gold-winged Woodpecker. *Arch. zool.* 2. p. 270. n. 158.
Catesb. Car. I. t. 18. *Lath. syn.* I. 2. p. 597. n. 49.

Habitat in America septentrionali, viridi vix minor, 11 pollices longus, in sinu Hudsonis migratorius, heic in arboribus cavis ova 4-6 pariens & vermicibus insectisque visitans; alias in terra nidificans, neque arbores descendens, insectis, horum tamen defecu baccis etiam ipsoque gramine visitans, carne sapida.

Rostrum cuculi nigrum; vertex cinereus; occiput & genæ rubra; pectoris pars superior lunula nigra notatum; reliquum pectus cum abdomine albido, nigromaculatum; dorsum cum testricibus alarum pallide fuscum, lineis nigris; remiges primores cinereæ, scapis & infra aureæ; uropygium album, nigromaculatum; cauda nigra, marginato albo, scapis aureis; pedes obscuri; feminæ gula cinerea.

- cafer.** 36. *P. supra fuscus, subtus vinaceus nigro-guttatus, alis subtus, scapisque remigum & rectricum miniatis.*
Habitat ad Caput bonæ spei, aurato multum similis, sed minor.
Rostrum fuscum, ad utrumque latus stria rubra notatum; cauda acuta, rectricibus apice bifurcata.

- olivaceus.** 37. *P. olivaceus, collo subtus, pectore & uropygio pallide rubris, gula, jugulo, remigibus & crasso obscure fuscis; cauda supra nigra.*

Crimson-breasted Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 599. n. 50.*

Habitat ad Caput bonæ spei, 10½ pollices longus.

Rostrum aurati, nigrum; scapi rentigum rectricumque flavantes; rectrices subtus ex olivaceo flavæ, apice bifurcæ; pedes nigri.

- carolinus.** 10. *P. pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectribus mediis albis nigro-punctatis.*

Picus varius jamaicensis. Briss. av. 4. p. 59. n. 23.

Picus ventre rubro. Kalm it. 3. p. 43.

Epeiche ou Pic varié de la Jamaïque: Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 72.

Pic varié femelle de la Jamaïque. Buff. planch. enlum: n. 597.

Jamaica Woodpecker. Sloan. Jam. p. 299. n. 15. t. 255: n. 2. Edw. glean. 5. t. 244.

Red bellied Woodpecker. Catesb. Carol. I. t. 19. f. 2.

Carolina Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 272. n. 161.

- *Picus fronte genisque pallide fuscescentibus, ventre pallido ex flavicanre fuscō.*

27. *Picus maculæ gulæ & subocularibus rubris.*
Epeiche ou Pic rayé de la Louisiane. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 73. pl. enlum. n. 692.
Habitat in America septentrionali, & Antillæ majoribus, majore major, 10½ pollices longus.
Rostrum, cauda, pedes & unguis nigra; irides badiæ; vertex in semina ex rufo albus; genæ ochroleucæ, gula & jugulum olivacea, colore versus abdomen sensim in rubrum abeunte; pars abdominis inferior lineis transversis fuscis notata.

- undatus. 28. *P. testaceus nigro-undulatus, temporibus sanguineis.*
Red-cheeked Woodpecker. Edw. glean. t. 332. Latham syn. I. 2. p. 594. n. 44.
Habitat in Guiana & Surinamo, 9 pollices longus.
Rostrum fuscocinctus; pedes obscuri.

- rufus. 38. *P. rufus nigro undulatus.*
Pic roux. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 36.
Pic roux de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 694. f. 1.
Rufous Woodpecker. Latham syn. I. 2. p. 594. n. 45.
Habitat in Cayenna & Guiana, vix torquillæ magnitudine.
Rostrum pallidum; alæ & cauda obscuriores; dorsum pallidius; pedes plumbei.

- chlorocephalus. 39. *P. olivaceus subtus albo-maculatus, collo & capite subcristato flavis, vertice rubro.*
Petit pic à gorge jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 37.
Pic à gorge jaune de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 784.
Yellow headed Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 595. n. 46.
Habitat in Guiana, torquillæ magnitudine.
Rostrum & pedes plumbei; ad angulos oris stria rubra.

- miniatus. 40. *P. cristatus ruber, subtus albus, jugulo roseo, rostro caudaque cæruleis, tectricibus caudæ viridibus.*
Red-winged Woodpecker. Ind. zool. t. 4. Lath. syn. I. 2. p. 595. n. 47.
Habitat in Java, 9 pollices longus.
Menti macula flava; remiges nigræ, maculis magnis albis; pedes obscuri.

- Pitiu. 41. *P. fuscus, albo guttatus, cauda brevi. Molina hist. nat. Chil. p. 209.*
Habitat in Chili, columbae habitu, non in cavis arboribus, sed ad ripas, montiumque declivia nidificans, ova plerumque 4 fariens; caro incolis estimata.

- viridis. 12. *P. viridis*, vertice coccineo. *Fn. suec.* 99. *Scop. ann.* 1.
p. 47. n. 52.
Picus viridis. *Gesn. av.* 710. *Aldr. orn.* 1. p. 848. t. 849.
Raj. av. p. 42. A. 2. *Briss. av.* 4. p. 9. n. 1. *Nozem.*
nederl. Vogel. t. 23.
Pic vert. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 7. t. 1. pl. enlum.
n. 371. 879.
Woodspite, *Rainfowl*, *Highhoe*, *Hewhole*. *Will. orn.* p.
135. t. 21.
Green Woodpecker. *Brit. zool.* n. 84. *Arct. zool.* 2. p.
277. B. *Albin. av.* 1. t. 18. *Latham syn.* 1. 2. p. 577.
n. 25. *Hayes brit. Birds* t. X.
Grünspecht. *Frisch av.* t. 35. *Günth. Nest. u. Eyer.* t. 5.
f. inf.
 β . *Pic vert*. *Fermin Surin.* 2. p. 169.
Habitat in Europa, 13 pollices longus, foraminibus
exadissime rotundis arborem pertundens ad partem
emortuam usque, ova 5-6 virescentia nigro-maculata
pariens, apibus in silvis delecedatur.
Rostrum obscurum, 2 pollices longum; iridum circulus
interior rubicundus, exterior albus; tempora nigri-
cantia; remiges obscuræ, maculis albidis; cauda obscuro
& virescente cancellata, apice nigra; pedes ex vires-
cente cinerei.
- benga- 13. *P. viridis*, crista rubra, nucha nigra, subtus anticeque
lenfis. albus nigro-maculatus.
Picus viridis bengalensis. *Briss. av.* 4. p. 14. n. 2.
Pic vert de Bengale. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 23.
planch. enlum. n. 695.
Bengal Woodpecker. *Alb. av.* 3. p. 21. t. 22. *Lath. syn.*
I. 2. p. 580. n. 26.
Spotted Indian Woodpecker. *Edw. av.* 4. t. 182.
 β . *Zeylonischer Specht*. *Naturf.* 13. p. 14. t. 1. 17. p. 16.
 γ . *Pic grivelé ou grand pic de l'île de Luçon*. *Sonner. it.*
p. 73. t. 37.
Palalaca ou pic vert tacheté des Philippines. *Buff. hist.*
nat. des ois. 7. p. 21.
Pic vert des Philippines. *Buff. pl. enlum.* n. 691.
Habitat in Bengala, β . *in Zeylon*, γ . *in insula Luzonia*,
viridi minor, γ . *æqualis*.
Rostrum pedesque nigricant; irides γ . *rubent*; vertex *niger*
maculis albis, *in* β . *numerofioribus*, *in* γ . *caput cum*
crista & collo, dorso & alis splendide fuscum viridi inter-
E e

AVES PICÆ. Picus.

misto; gula & jugulum ex nigro alboque varia; pectus abdominisque pars superior alba, pennarum margine fuscō; inferior cum crissō alba, in β. gula & pectus fuscā, maculis anomalis albīs; in γ. gula, jugulum, pectus & abdomen alba, pennarum margine nigro; dorsū pars superior flava, in β. nigra; inferior viridis, in β. una cum tectricibus alarum rubra; alae virides dilutius maculatæ, tectricibus inferioribus & minoribus superioribus fuscis albo maculatis; in β. remiges majores fuscæ, albo-maculatæ; alias nigræ strigis albīs; cauda ex virente nigra, in β. fuscā, in γ. ex atro fuscā, fascia alba, tectricibus superioribus rubris.

goenîs. 42. P. viridis, subtus albidus, vertice & occipite cristato rubris, cauda tæniaque ab oculis ad alas ducta nigris, alis aureis.

Pic vert de Goa. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 22. pl. enlum. n. 696.

Goa Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 582. n. 27.

Habitat in Goa, bengalensi affinis, viridi minor.

Rostrum nigrum; occiput linea alba circumscriptum; tectrices alarum minores nigrae; remiges minores ex nigro & albo variæ; pennæ subtus nigro marginatæ; pedes plumbei.

manil- 43. P. fordide viridis, vertice griseo-maculato, remigibus lensis. caudaque nigricantibus, tectricibus caudæ superioribus rubris.

Pic vert de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 73. t. 36.

Manilla green Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 583. n. 28;

Habitat in insula Luzonia, goensi minor.

Rostrum pedesque nigricant.

Goertan. 44. P. supra ex griseo-fuscus, subtus ex flavicante griseus, alauum maculis fordide albīs, vertice & uropygio rubris. Goertan ou pic vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 25.

Pic appelé Goertan du Sénégal. *Buff. pl. enlum.* n. 320.

Crimson-rumped Woodpecker. *Latham syn.* I. 2. p. 583. n. 29.

Habitat ad fluvium Sénegal, viridi multo minor.

Rostrum cum pedibus plumbeum.

canus. 45. P. cinereus fronte obsoleta rubro maculata, dorso humeris & tectricibus alarum & caudæ viridibus uropygio flavo, remigibus caudaque fuscis, gula albida.

Picus viridis norwegicus. Briff. av. 4. p. 18. n. 4.
Grey-headed green Woodpecker. Edw. av. 2. p. 65. Lath.
syn. I. 2. p. 583. n. 30.
Habitat in Norwegia, Ruslia, Sibiria & Helvetia, magnitu-
dine viridis, Tungusis edulis.
Rostrum basi flavicans; remiges maculis flavicantibus,
cauda lineis obscuris notata; pedes & unguis nigri.

Perficus. 46. P. luteus, supra, remigum apicibus & oculorum areis
ferrugineus.

Picus luteus perficus. Briff. av. 4. p. 20. n. 5.

Picus luteus cyanopus perficus. Raj. av. p. 44. n. 9.

Persian Woodpecker. Will. orn. p. 141. Lath. syn. I. 2.
p. 584. n. 31.

Habitat in Persia, viridis circiter magnitudine, capite
tamen colloque crassioribus, rostro longiore, ferrugineo;
pedes cærulescentes; unguis nigri.

Semirostris. 14. P. maxilla superiore breviore. Mus. Ad. Fr. I. p. 16.

Halbilled Woodpecker. Lath. syn. I. 2. p. 586. n. 35.

Habitat in India, rostro forsitan lusu naturæ mutilato,
Martii magnitudine.

Rostrum pallidum; caput fuscum, singulis pennis apice
flavicantibus; corpus supra fuscum in cinereum vergens,
subitus album; cauda alæque fusca; remigum margo
exterior albo-maculatus.

Pubescens. 15. P. dorso longitudinali villoso, rectrice extima alba
maculis quatuor nigris.

Picus varius virginianus minor. Briff. av. 4. p. 50. n. 18.

Epeiche ou pic varié de Virginie. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 76.

Smallest Woodpecker. Catesb. Carol. I. p. 21. t. 21. f. 1.

Downy Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 264. n. 165.

Little Woodpecker Lath. syn. I. 2. p. 573. n. 19.

Habitat in America septentrionali, numerosissimus, audax
gregatim invadit arbores, quas innumeris foraminibus
pertundit, & trucidat, hinc, pomaritis potissimum, in-
festissimus, passeris magnitudine, villoso cetera multum
similis, sed minor.

Mas occipite rubro.

Villosus. 16. P. dorso longitudinali subvilloso, retribus extimis totis
albis. Kalm. it. 3. p. 43.

Picus varius virginianus. Briff. av. 4. p. 48. n. 17.

AVES PICÆ Picus.

Epeiche ou Pic chevelu de Virginie. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 75.

Pic varié mâle de Virginie. *Buff. pl. enlum. n. 754.*

Hairy Woodpecker. *Arct. zool. 2. p. 263. n. 164. Catesb.*
Car. I. t. 19. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 572. n. 18.

Habitat in America septentrionali a sinu Hudsonis ad Carolinam frequentissimus, pomariis similiter infestissimus, c. 9-12 fere pollices longus.

Rostrum corneum; caput nigrum, occipitis fascia, in mæc, transversa rubra, genæ lineis duabus albis, totidemque nigris; corpus subtus album; dorsum nigrum; alæ nigrae, maculis albis in series dispositis; rectrices 2 intermediae totæ nigrae, 2 extimæ totæ albæ, reliqua nigrae strüs albis decussantibus.

major. 17. P. albo nigroque varius, crisco occipiteque rubro. *Fn. suec. 100. Scop. ann. I. p. 47. n. 53. Kram. el. p. 335. n. 3.*

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus utrinque albescentibus. *Fn. suec. I. n. 81.*

Picus albo-nigroque varius major. *Nozem. nederl. Vogel. t. 22.*

Picus varius major. *Raj. av. p. 43. A. 4. Briss. av. 4. p. 34. n. 13.*

Epeiche ou Pic varié. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 57. pl. enlum. n. 196. & 595.*

Greater spotted Woodpecker or Witwall. *Brit. zool. n. 85. t. E. Arct. zool. 2. p. 272. n. 162. Albin. av. I. t. 14. Will. orn. p. 137. t. 21. Hayes brit. birds. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 564. n. 12.*

Buntspecht. *Frissch. av. t. 36.*

Habitat in Europa, septentrionali America & Sibiria orientali, 9 pollices longus.

Frons ex rufesciente lutescens; vertex niger; occiput semine pariter nigrum; dorsum nigrum; humeri albi; alæ & canda lineis nigris & albis; pectus & abdomen alba, in flavicantem colorem vergentia.

medius. 18. P. albo nigroque varius, crisco pileoque rubris. *Fn. suec. 101. Scop. ann. I. p. 48. n. 34.*

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus apice albo variegatis. *Fn. suec. I. n. 82.*

Picus major. *Aldr. orn. I. p. 845. t. 846.*

Picus varius ex albo & nigro. *Gesn. av. 709.*

Picus varius minor. *Raj. av.* p. 43. *Briff. av.* 4. p. 38. n. 14. t. 2. f. 1.

Pic varié à tête rouge. *Buff. pl. enlum.* n. 611.

Middle Spotted Woodpecker. *Brit. zool.* n. 86. t. 37. *Ard. zool.* 2. p. 278. *D. Lath. syn.* I. 2. p. 565. n. 13.

Habitat in Europa, majori satis similis, sed minor, & 8 $\frac{1}{2}$ pollices longus.

minor. 19. P. albo nigroque varius, vertice rubro, crisco testaceo. *Fn. suec.* 102. *Scop. ann.* I. 49. n. 55.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus seminigris. *Fn. suec.* 83. *Hasselq. it.* 242.

Picus varius tertius. *Raj. av.* p. 43. n. 6.

Picus aliis minor s. graminis. *Gesn. av.* 709.

Picus varius minor. *Aldr. orn.* I. p. 847. *Raj. av.* p. 43. n. 5. *Briff. av.* 4. p. 41. n. 15.

Perit Epeiche. *Buffon hist. nat. des ois.* 7. p. 62. *planch. enlum.* n. 598.

Lesser spotted Woodpecker. *Brit. zool.* n. 89. t. 37. *Brit. zool.* 2. p. 278. *E. Will. orn.* 138. t. 31. *Albin. av.* I. t. 20. *Lath. syn.* I. 2. p. 566. n. 14.

Kleiner Buntspecht. *Frisch. av.* t. 37.

Habitat in Europa & Asia, ipsa adeo australi, hujus generis minimus, ut 5 $\frac{1}{2}$ modo pollices longitudine aequet, ceterum medio satis similis.

Dorsum lineis albis & nigris; alæ areis latis albis.

tricolor. 47. P. niger striis transversis albis, pectore & abdomine rubris; *Picus varius mexicanus major, & picus varius mexicanus minor.* *Briff. av.* 4. p. 57. & 59. n. 21. 22.

Quauchochopitli, seu avicula ligna excavans. *Fern. hist. n. Hisp. c.* 94. *Raj. av.* p. 163.

Epeiche du Mexique. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 70.

Varied Woodpecker. *Lath. syn.* I. 2. p. 568. n. 15.

Habitat in nova Hispania, magnitudine medii.

canaden- 48. P. albus, vertice, dorso, humeris & rectricibus durabus intermediis nigris, reliquis & alis ex albo & nigro variis, *Picus varius canadensis.* *Briff. av.* 4. p. 45. n. 16. t. 2. f. 2.

Quauhtotopotli alter. *Fern. hist. n. Hisp. c.* 165. p. 47. *Raj. av.* p. 162.

Epeiche du Canada, première espèce. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 69.

Pic du Canada. *Buff. pl. enlum.* n. 345. f. 1.

- Canada Spotted Woodpecker. *Arch. zool. 2. p. 273. n. 163.*
Lath. syn. I. 2. p. 569. n. 16.
- Habitat in Canada, majoris magnitudine.
- Tænia alba caput circunscribens; altera nigra albo marginata ab oculis per cervicem; humeralibus intermixtae paucæ pennæ albæ.*
- varius. 20. P. albo nigroque varius, vertice rubro, criffo albo fusco-fasciato.
- Picus varius carolinus. *Briss. av. 4. p. 62. n. 24.*
 Pic varié de la Caroline. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 77. pl. enlum. n. 785.*
- Yellow-bellied Woodpecker. *Arch. zool. 2. p. 275. n. 166.*
Cat. Carol. I. t. 21. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 574. n. 20.
- Habitat in America septentrionali numerosissimus, & fructibus infestissimus, 9 pollices longus.
- Feminæ rubor nullus; maris vertex linea nigra circumseptus; mentum rubrum; pectus & abdomen flavicans; illud nigro-maculatum; tectrices alarum nigrae, lineis duabus transversis albis; remiges primariae ex albo & nigro varia; cauda nigra.
- flavipes. 49. P. niger subtus albus, pedibus flavis.
- Yellow-legged Woodpecker. *Arch. zool. 2. p. 275. n. 167.*
 Magnitudo p. minoris; occiput nigrum; alarum margo superior albus.
- bicolor. 50. P. ex griseo & albo varius, capitis cristati lateribus albis, remigibus fuscis albo maculatis.
- Epeiche ou Pic varié de la Encénada. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 74. pl. enlum. n. 748. f. 1.*
- Encenada Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 575. n. 21.*
 Pico minore paucio major; rostrum plumbum, uti & pedes; irides albæ; corpus supra transversim, subtus perpendiculariter variunt; femina tota fusca, crista carens.
- Cardinal-51. P. niger, subtus albus nigro-maculatus, vertice & occipite rubris.
- Pic Cardinal de l'île de Luçon. *Sommer. it. p. 72. t. 35.*
 Grand pic varié de l'île de Luçon. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 67.*
- Cardinal Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 576. n. 22.*
 Habitat in insula Luzonia, viridis magnitudine.
- Pedes & rostrum nigricant; mandibulæ superioris basis pennis griseis cincta; ad utrumque capitis latus pone oculos

per collum ad alas stria alba; pennæ colli inferiores, dorsique superiores albo-marginatæ; alæ maculis albis; remigum rectricumque scapi flavi.

Nubicus. 52. P. ex albo, rufo & fusco varius, vertice nigro albo-maculato, occipite rubro subcristato, pectorale albido nigro-guttato, cauda rufo fuscoque lineata.

Epeiche de Nubie ondée & tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 66.*

Pic tacheté de Nubie. *Buff. pl. enlum. n. 667.*

Habitat in Nubia, majore minor, 7½ pollices longus.

Rostrum nigrum; irides pallide fuscae; frons subfuscæ; mentum & crissum albidum; pedes glauci.

Meluc- 53. P. fusco-ater albo-undulatus, subtus albidus fusco sagittatus, remigibus rectricibusque fuscis albo-maculatis.

Petit epeiche brun des Moluques. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 68.*

Petit pic des Moluques. *Buff. pl. enlum. n. 748. f. 2.*
Brown Woodpecker. *Lath. syn. I. 2. p. 577. n. 24.*

Habitat in insulis Moluccis, minoris magnitudine.

Rostrum & pedes obscura; genæ albæ; infra oculos macula fusca.

tridactylus- 21. P. albo nigroque varius, pedibus tridactylis. *Fn. suec. lus. 103. Ad. Stockh. 1740. p. 222. Scop. ann. I. p. 49.*

n. 56. Forster ad. angl. 62. p. 388.

Picus tridactylus anomalos. Mus. petrop. 368.

Threetoed Woodpecker. Arct. zool. 2. p. 275. n. 168. Edw. av. 3. t. 114. Lath. syn. I. 2. p. 600. n. 51.

B. *Picus varius cayanensis. Briss. av. 4. p. 54. n. 20.*

Epeiche ou pic varié ondée. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 78.*

Pic tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 553.

Woodpecker with three toes. Bancr. Guj. p. 164.

Habitat in America, Europa & Sibiria, rarius in australi, 11 pollices longus.

Vertex europæ aureus, americano ruber; irides glaucae; genæ lineis longitudinalibus 3 nigris, 2 albis; occiput dorsumque nigra; hoc superius albo maculatum; alæ caudaque nigrae; remiges primariae & rectrices extimæ maculis albis; corpus subtus album; pedes obscuri.

60. SITTA. *Rostrum* subulatum teretiusculum;
rectum, porrectum, integerimum, mandibula superiore paulo
longiore, apice compresso.

Lingua emarginato-lacera, brevis,
apice cornea.

Nares exiguæ vibrissis tectæ.

Pedes ambulatorii.

europæ. I. S. rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem
albis. *Fn. suec.* 104. *Scop. ann.* 1. p. 50. n. 57. *Kram.
elench.* p. 362.

Sitta s. *Picus cinereus*. *Gesn. av.* 711. *Aldr. orn.* 1. p. 852.
t. 853. *Raj. av.* p. 47. A. 4. *Briff. av.* 3. p. 588. n. 1.
t. 29. f. 3.

Sittelle ou Torcheapot. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 460.
t. 20., pl. enlum. n. 623. f. 1.

Woodcracher. *Piot. Oxfordsh.* p. 175.

Nutbreaker. *Albin. av.* 2. t. 28.

Nuthatch or Nutjobber. *Brit. zool.* 1. n. 89. t. 38.

European Nuthatch. *Lath. syn.* I. 2. p. 648. n. 1.

Blauspecht. *Frish. av.* t. 39.

β: Sitta minor. *Briff. av.* 3. p. 592.

Petit torchepot. *Belon ois.* p. 305.

Petite Sittelle. *Buffon hist. nat. des ois.* 5. p. 470.

γ. Sitta carolinensis. *Briff. av.* 3. p. 596. n. 4.

Sittelle à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 473. var. 5.

Smaller Loggerhead. *Brown jam.* p. 475.

Nuthatch. *Catesb. Carol.* I. t. 22.

Blackheaded Nuthatch. *Arct. zool.* 2. p. 281. n. 171.

δ. Sitta carolinensis minor. *Briff. av.* 3. p. 598. n. 4.

Petite Sittelle à tête brune. *Buff. hist. nat. des ois.* 5.
p. 474. var. 6.

Loggerhead. *Sloane jam.* p. 301. t. 259. f. 2.

Small Nuthatch. *Catesb. Carol.* I. t. 22.

Less Nuthatch. *Arct. zool.* 2. p. 282. n. 172.

ε. Sitta subtilis alba, capite colloque fuliginoso, dorso nigro.
Befoke Schr. der naturf. Berl. *Ges.* 7. p. 455.

Habitat in Europæ, Russiæ asiaticæ, γ. & δ. Americæ sep-
tentriionalis temperatoris arborum truncis, hieme habita-
tulis hortisque appropinquans, caudam motacillæ instar

mötitanus, solitarius, moribus ceterum picis multum similiis, coleoptera & larvas insectorum sub cortice arborum latentes effodiens, nuces rostro perforans & comedens, nigrum struens reperto congruo foramine arboris, aliquando a pico relicto, illudque limo obliniens pro capacitate introitus; ova pariens 6-7 sordide alba rufo maculata, fidissima matr̄; junioris caro sapida; noctu cantillans. Longitudo 6 fere pollicum; feminæ paulo minor; corpus ex cano cœruleo; subtus album; linea atra per oculos & aures, hypochondria & femora ferruginea; uropygium ex albo & ferrugineo varium; rectrix I fascia alba; 2 macula alba, 3 & 4 apice albo, 5 dorso concolor.
β. minor, per paria conspicua, pugnax; γ. capite colloquo nigris, δ. fuscis potissimum distinctæ.

canaden- 2. *S. superciliis albis.*

sis. *Sitta canadensis. Briss. av. 3. p. 592. n. 2. t. 29. f. 4.*
Sittelle du Canada. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 471.
Torchepot du Canada. Buff. pl. enlum. n. 623. f. 2.
Canada Nuthatch. Arct. zool. 2. p. 281. n. 170. Latham syn. I. 2. p. 651. n. 2.

Habitat in America, Asia, Europa septentrionali, non migrans, europæ magnitudine, cuius forsitan varietas. Vertex, cervix & humeri nigra; dorsum & uropygium glauca; genæ, pectus & abdomen alba, remiges primariae obscuræ, margine griseo; rectrices duæ intermediae griseæ; reliquæ nigrae, macula ad apicem alba; crillum ferrugineum.

jamai- 3. *S. pileo nigro.*

cenfis. *Sitta jamaicensis. Briss. av. 3. p. 394. n. 3.*
Sitta major, capite nigro. Raj. av. p. 185. n. 33.
Sitta f. Picus cinereus major capite nigro. Sloan. jam. 2. p. 300. t. 259. f. 1.

Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 472.
Loggerhead. Brown jam. p. 475.

Jamaica Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 652. n. 3.

β. Sitta jamaicensis minor. Briss. av. 3. p. 596.
Perite Sittelle à huppe noire. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 473.
Least Loggerhead. Brown jam. p. 475.
Habitat in Jamaicæ dumetis, stupida, 5½ polliccs longa, β. minor.

Corpus supra cinereum, subtus album; remiges nigricantes, margine cinereo; cauda nigricans, lineis transversis albis; rostrum, pedes & ungues nigrae.

- major. 4. *S. subtus albida*, capite dorsoque griseis, gula alba, remigibus caudaque nigris margine aurantiis.
Sitta s. picus cinereus major, rostro curvo. *Raj. av. p. 186.*
n. 34.
 Grande Sittelle à bec crochu. *Buff. hist. nat. des ois. 5.*
p. 475.
 An other sort of Loggerhead. *Sloane jam. p. 301. n. 19.*
 Great Nuthatch. *Lath. syn. I. 2. p. 653. n. 4.*
Habitat in Jamaica, vermis, cimicibus e. c. viditans,
7 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum medio crassius, apice aduncum.
- nævia. 5. *S. supra plumbea*, subtus glauca, gula alba, tectricibus alarum supra albo-punctatis.
Sittelle grivelée. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 476.
Wall-creeper of Surinam. Edw. glean. t. 346.
Spotted Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 654. n. 5.
Habitat in Surinamo, 6 pollices longa.
Caput ex cærulescenie plumbeum; tectrices alarum interiores obscuræ albo-marginatae; pennæ inferiores linea media longitudinali alba in punctum terminata; pedes obscure fuscæ.
- surinamensis. 6. *S. subtus sordide alba*, capite colloque ex rufio castaneis, dorso medio albo, alis caudaque nigris, tectricum alarum rectricumque apicibus, & remigum secundiarum margine albis.
Surinam Nuthatch. Latham syn. I. 2. p. 654. n. 6. t. 28.
Habitat in Surinamo, hujus generis minima, 3 $\frac{1}{2}$ pollices longa.
Rostrum paulisper incurvum, obscure fuscum; occiput & cervix maculis oblongis nigris notata.
- caffra. 7. *S. corpore subtus flavo*, superne flavo nigroque vario, pedibus nigris. *Sparrm. mus. Carlsson. t. 4.*
Habitat ad Caput bonæ spei.
Rostrum rectiusculum, subdepressum, mandibula superiore convexiuscula, subtriangularis; color subtus lutescens; tectrices supra nigricantes, subtus olivaceæ, apice flavicantes; unguis lutescens.
- sinensis. 8. *S. palpebra inferiore purpurea. Osb. it. 2. p. 12.*
Chinese Nuthatch. Lath. syn. I. 2. p. 655. n. 7.
Habitat in Sina, saepius cicuratus, eryzæ seminibus viditans.

Caput cum rostro nigrum cristatum; dorsum obscure ferrugineum, glauco colore internitente; abdomen & pectus alba, gulam versus nigra; prope oculos macula exigua coccinea & proxima huic area magna nivea; a temporibus ad gulam linea nigra; mentum & gula alba, limitibus nigris; uropygium flavum; rectrices alarum ferrugineæ; rectrices nigricantes, apice albæ.

61. TODUS. *Rostrum subulatum depresso sculum, obtusum, rectum, basi setis patulis.*

Lingua ---

Pedes gressorii.

viridis.

1. *T. viridis, pectore rubro.*

Todus. Briss. av. 4. p. 528. n. 1. t. 41. f. 2.

Rubecula viridis elegantissima. Sloane jam. 2. p. 306. t. 263. f. 1. Raj. av. p. 187. n. 40.

Todier de l'Amérique septentrionale. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 225. t. 11.

Todier de S. Domingue. Buff. pl. enlum. n. 585. f. 1. 2.

Green Sparrow or green Hummingbird. Brown. jam. p. 476. Edw. av. 3. t. 121.

Green Tody. Gcn. of birds p. 61. t. 6. f. 1.

Habitat in calidiori America, insulisque vicinis, solitarius, stupidus, mollioribus insectis viciitans, 4 pollices longus.

Mandibula superior fusca, inferior aurantia; irides castaneæ; corpus subtus ochroleucum; gulae macula rubra; pedes & unguis grisei. Mari corpus supra cærulescens, abdomen albuni, pectus roseum.

cinereus. 2. *T. cinereus subtus luteus.*

Todus cinereus. Briss. av. app. p. 134. Pall. spic. 6. t. 3. A. Tic-tic ou Todier de l'Amérique méridionale. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 223.

Todier de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 585. f. 3.

Grey and yellow Fly-catcher. Edw. glean. t. 262.

Cinereous Tody. Lathami syn. 1. 2. p. 658. n. 2.

Habitat in Surinami & Gujanæ locis apertis, insectis viciitans, viridi paulo major.

Todi genus in calidiori præfertim America habitat, muscicapæ satis affine, cui tamen anteriorum digitorum medius ab ortu inde discretus.

Rostrum obscurum, basi rubens; frons atra; rectrices alarum superiores & remiges ex atro fuscæ marginæ luteo; cauda subcuneata; rectrices 2 intermedie nigrae, reliquæ fuscæ, apice (in mare) albo; pedes incarnati.

- fuscus. 3. *T. ferrugineus subtus olivaceus albo-maculatus, tectricibus alarum fascia obscura notatis.*
Brown Tody. Gener. of Birds, p. 62. t. 6. f. 2. Lath. syn. I. 2. p. 659. n. 3.
Habitat in calidiori America, viridi minor.
- cæruleus. 4. *T. cæruleus, gula alba, temporibus, gula & abdomine aurantiis.*
Todier bleu à ventre orangé. Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 229.
Todier de Juda. Buff. pl. enlum. n. 783. Salern. orn. p. 126. n. 16.
Blue Tody. Lath. syn. I. 2. p. 659. n. 4.
Habitat in America, viridis magnitudine, $3\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum & pedes incarnata; infra oculum area purpurascens.
- varius. 5. *T. ex cæruleo, nigro & viridi varius, rostro, capite, gula, cervice, pedibus, unguibus & cauda nigris, caudæ margine tectricibus alarum superioribus viridibus.*
Todus varius. Briff. av. 4. p. 531. n. 2.
Ispida indica. Aldr. av. 3. p. 520.
Todier varié. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 229.
Habitat in India, reguli magnitudine.
- leucocephalus. 6. *T. ater, capite subcristato gulaque lacteis. Pall. spicil. 6. p. 19. t. 3. f. 2.*
White-headed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 660. n. 6. t. XXIX.
Habitat in America, phœnicuri magnitudine.
Rostrum nigricans; mandibula inferior alba, apice nigricans; alæ breves; remiges interius & subtus, apicibusque obsoletæ, fuscescentes; cauda brevis, æqualis.
- brachyurus. 7. *T. niveus, vertice, cervice, dorso caudaque brevi nigris.*
Pall. spic. 6. p. 18. 19.
Short-tailed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 660. n. 7.
Habitat in America, præcedentis habitu & magnitudine.
- plumbeus. 8. *T. supra ex plumbeo canus, subtus lacteus, remigibus tectricibusque nigris. Pall. spicil. 6. p. 17.*
Plumbeous Tody. Latham syn. I. 2. p. 661. n. 8.

Habitat in Surinamo, reguli magnitudine, cinerei rostro. Remigum & tectorum secundiarum, rectricumque laterarium margo albus; color verticem versus sensim nigricans.

- obscu- 9. *T. supra ex fusco niger, subtus folidissime albus.*
rus. Dusky Tody. *Arch. zool. 2. p. 283. n. 173. Lath. syn. I. 2.*
p. 661. n. 9.
Habitat in insula Rhode, lusciniæ magnitudine, insectis
viditans, arbores emortuas frequentans, cantu suavi.
Remiges & tectorices margine griseæ; cauda æqualis.
- regius. 10. *T. ex atro fuscus, subtus rufescens, crista spadicea apice*
nigro-maculata, mento, superciliis & pectore albis.
Roi des Gobe-mouches. *Buff. hist. nat. des ois. 4. p. 552.*
Tyran huppé de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 289.*
King Tody. *Latham. syn. I. 2. p. 662. n. 10.*
Habitat in Cayenna, 7 pollices longus.
Rostrum obscure fuscum; crista verticis transversa, 4-5 or-
dinibus pennarum apice rotundatarum constans; tectorices
alarum ex rubicundo fuscæ; remiges obscuræ; pectus
lineis transversis nigricantibus; pedes incarnati.
- paradi- 11. *T. capite cristato nigro, corpore albo, cauda cuneata,*
fæus. *rectricibus intermediis longissimis.*
Muscicapa paradisi. *Syst. nat. XII. 1. p. 324. n. 1.*
Corvus paradisi. *Syst. nat. X. 1. p. 107.*
Pica Papoensis, Icterus maderaspatarum cristatus, &
Muscicapa cristata alba Capitis bonæ spei. *Briff. av. 2.*
p. 45. n. 6. p. 92. n. 7. p. 414. n. 20. t. 41. f. 2.
Manucoditota cristata ex albo nigroque varia. *Raj. av.*
195. t. 2. f. 13.
Avis paradisi. *Seb. mus. 1. p. 85. t. 52. f. 3.*
Verdiole, & Moucherolle huppée à tête couleur d'acier poli.
Buff. hist. nat. des ois. 3. p. 105., 4. p. 558.
Gobe-mouche blanc huppé du Cap de bonne espérance. *Buff.*
pl. enlum. t. 234. f. 2.
Pied bird of paradise. *Edw. av. t. 113.*
Paradise Fly-catcher. *Lath. syn. II. 1. p. 345. n. 44.*
- β. Todus alis caudaque helvolis.
Muscicapa cristata Capitis bonæ spei. *Briff. av. 2. p. 418.*
n. 31. t. 41. f. 1.
- γ. Todus subtus albus, pectore ex cæruleofcente cinereo.
Crested long-tailed Pie. *Edw. glean. t. 325.*

1. *Todus cristatus brasilianus.*
Muscicapa brasiliensis cristata. Briss. av. 2. p. 416. n. 30.
Avis paradisiaca brasiliensis, seu Curiri Acamaky cristata.
Seb. mus. 2. t. 87. f. 2.
Habitat in Africa & insula Madagascar, muscis vittans,
alaudæ magnitudine, 7 plerumque pollices longitudine
superans.
2. *Caput aurosum, crista declinata; corpus album, rachi*
pennarum nigra; remiges nigræ utroque margine albæ;
rectrices niveæ, rachi & margine exteriore nigræ.
- ferrugi- 12. *T. ex ferrugineo niger, subtus ferrugineus, cauda fusca,*
neus. temporibus obscuræ & albo variis.
Ferrugineous bellied Tody. Lath. syn. I. 2. p. 662. n. 11.
Habitat in Cayenna, 7 $\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum nigrum; nares ovatæ; supercilia pallida; remiges
cum pedibus obscuræ.
- novus. 13. *T. fuscus, subtus albus, jugulo & pectore fusco macula-*
tis, unguibus flavis.
White-chinned Tody. Lath. syn. I. 2. p. 663. n. 12.
Longitudo 9 pollicum; nares ovales; cauda rotundata;
pedes fusi.
- platyrhyn- 14. *T. ex fusco lutescens, subtus luteus, gula albicans, ver-*
chos. tice plumbeo, alis caudaque fuscis, rostro maximo.
Pall. spicil 6. p. 19. t. 3. C.
Broad-billed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 13.
Magnitudo Lusciniae; rostrum semiovale, acutum, pla-
natum; naribus late excavatis albicanibus; pedes cum
unguis flavescentes.
- macro- 15. *T. niger, mento, genarum lateribus, abdōmine, criso,*
thynchos. uropygoque rubris.
Great-billed Tody. Lath. syn. I. 2. p. 664. n. 14. t. 30.
Magnitudo præcedentis, longitudo 8 pollicum; rostrum basi
latum, ceterum præcedentis; ex atro cæruleum apice,
mandibularumque marginibus albidis; rectrices caudæ
superiores rubræ; scapularium pennarum sex albæ,
acuminatæ, supra alas pendulæ.

- cristatus. 16. *T. crista coccinea, corpore fusco albo-maculato. Naturf.*
17. p. 21. n. 5. t. 1.
Habitat in Guinea.

Pennæ crista apice nigro-marginatae; rostrum depressum, tenue, lanceolatum, obtusum; nares exiguae, parum testaceae; corpus supra obscurum ex griseo fusco; rectrices alarum adsperso albo; remiges nigricantes; gula ex albido cinerea; pectus & abdomen fuscum & obscure cinereo undulata; rectrices fuscae, subtus dilutius, 2 intermediae nigricantes.

62. ALCEDO. Rostrum trigonum, crassum, rectum, longum, acuminatum.

Lingua carnosa, brevissima, plana, acuta.

Pedes gressorii plerisque.

cristata. 1. A brachyura subcristata cœrulea, subtus rufa, crista nigro-undulata.

Alcedo amboinensis cristata. Seb. mus. I. t. 63. f. 4.

Ispida philippensis cristata. Brij. av. 4. p. 483. n. 6. t. 37. f. 3.

Petit Martin-pêcheur huppé des Philippines. Buff. pl. zool. enlum. n. 756. f. 1.

Vinchi. Buffon List. nat. des ois. 7. p. 205.

Crested Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 632. n. 22.

2. Ispida indica cristata. Brij. av. 4. p. 506. n. 17.

Alcedo cristata orientalis elegantissime picta. Seb. mus. I. p. 104. t. 67. f. 4.

Habitat in Amboina & insulis Philippinis, 5 pollices circiter longa.

Rostrum nigrum; crista virens; ad utrumque collilatus stria cœrulea ab oculo incipiens; humeri, testrices alarum superiores, remigum minorum, rectricumque margines, & rectrices 2 intermediae totæ violacea; genæ rufæ; gula ex rufo alba; remiges fuscae; pedes cum unguibus rubicundi. In Germania visam referunt Sander & Goeze. Naturf. 13. p. 182. & 15. p. 157.

orientalis. 16. A. viridis subtus rufa, vertice, gula, fascia oculari, remigibusque cœruleis.

Ispida indica. Brij. av. 4. p. 479. n. 4. t. 37. f. 1. A. Eastern Kingsfisher. Latham syn. I. 2. p. 633. n. 23.

Habitat in India, 4½ pollices longa.

Rostrum rubrum; supra oculos stria alba; infra area rufa; rectricum margo exterior viridis; pedes & unguis nigri.

- inda. 2. A. brachyura virens subtus fulva, fascia pectorali nebulosa.
Spotted Kingfisher. *Edw. glean.* t. 335. *Lath. syn.* I. 2.
p. 642. n. 32.
Habitat in Guiana, 7 pollices longa.
*Rostrum nigrum; linea supra infraque oculos fulva; alæ
albo punctatae; pedes rubri.*
- surina- 17. A. brachyura cærulea, subtus albicans, pectorale rufo,
mensis. vertice ex virescente atro: maculis transversis viridibus.
Martin-pêcheur. Fermin surin. 2. p. 181.
Surinam Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 642. n. 33.
*Habitat in Guiana, in foveis prope aquas nidificans, 5-6
ova pariens, & piscibus vivitans.*
*Rostrum nigrum; rictus croceus; dorsum lineis obsoletis
nigris; menti mediique abdominis candori admixtus
rubor; pennarum pectoris apex dilute cæruleus.*
- Ispida. 3. A. brachyura supra cyanea, subtus fulva, loris rufis.
Scop. ann. I. p. 55. n. 64.
Ispida supra cærulea subtus ferruginea. Mus. Ad. Fr. I.
p. 16.
*Ispida. Gesn. av. 571. Raj. av. p. 48. n. A. I. Olin. 4^e
39. Aldr. orn. 3. p. 518. t. 520. Briss. av. 4. p. 47¹
n. I.*
Alcyon. Gesn. av. 85. Aldr. orn. 3. p. 497.
Martin-pêcheur ou Alcyon. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 64. pl. enlum. n. 77.
European Kingfisher. Brit. zool. I. p. 246. t. 38. *Ard.
zool.* 2. p. 284. A.
Common Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 626. n. 16.
Kingfisher. Allin. av. I. t. 54. Will. orn. p. 146. t. 24.
- β. Ispida senegalensis. *Briss. av.* 4. p. 485. n. 7. t. 39. f. 1.
Baboucard. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 193.
*Habitat in Africa, Asia & Europa, frigoris patientissima.
ova 7 aut plura in fovea ad aquam posita pariens, pisces
integros devorans, quorum reliquias indigestas glomera-
tim evomit; gentium borealium filtrum; 7 pollices longa.*
*Rostrum nigrum; vertex testiculusque alarum virides, 7
culis cæruleis; cauda elegantiissime cærula; pedes rubri.*

Genus hoc per omnem terrarum orbem dispersum, aquas potissimum habitat, piscibus
vivitans, quos mira arte capit, integros destruit, & partium indecisa
glomeris evomit; alis, quamvis plenius brevibus, celeriter volat; color corporeus
cum varietatibus dominans; nares exiguae, in plurimis speciebus teste.

Erithaca. 3. A. brachyura, dorso cæruleo, abdomine luteo; capite uropygio que purpureis; gula nuchaque albis.

Ispida bengalensis torquata. Briss. av. 4. p. 503. n. 15.
Martin-pêcheur à front jaune. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 195.

Bengal Kingfisher. Alb. av. 3. p. 28. t. 29.

Red-headed Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 629. n. 17.

3. Alcedo minor, capite & cervice ex aurantio rubris.

Red-headed Kingsfisher. Gener. of birds. p. 61. t. 5.

Habitat in Bengala, ispidæ magnitudine, ultra 6 pollices longa.

Rostrum pedesque rubri.

Purpu- rea. 18. A. subtus rufescente-aurea, capite, uropygio caudaque rufo-aureis, dorso testricibusque alarum ex cæruleo atris, remigibus nigris, gula alba.

Martin-pêcheur pourpré. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 199.

Martin-pêcheur de Pondichery. Buff. pl. enlum. n. 773. f. 2.

Purple Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 18.

Habitat in India, erithacæ magnitudine.

Rostrum pedesque rubri; pone oculos versus dorsum procedens linea purpurea, cæruleo terminata.

madagaf- cariensis. 5. A. subbrachyura rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.

Ispida madagascariensis. Briss. av. 4. p. 508. n. 18. t. 38. f. 1.

Martin-pêcheur de Madagascar. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 199.

Martin-pêcheur roux. Buff. pl. enlum. n. 773. f. 1.

Rufous Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 630. n. 19.

Habitat in Madagascar, 5 $\frac{1}{4}$ pollices longa.

Rostrum pedesque rubri; corpus subtus ex rufo album; cauda nigricans, rediculum margo exterior, & 2 intermediae totæ rufæ.

cæruleocephala. 19. A. cærulea, subtus rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.

Martin-pêcheur à tête bleue. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 178.

Petit Martin-pêcheur du Sénégal. Buff. pl. enlum. n. 356. f. inf.

Blue headed Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 20.

Habitat in Madagascar, 4 pollices longa.

Rostrum pedesque rubri; vertex splendide cæruleus, dilatius undulatus.

- benga- 20. A. ex cæruleo viridis, subtus rufa, cauda remigibusque
lenis. fuscis, capite striis transversis cæruleis notato.
Ispida bengalensis. Briss. av. 4. p. 475. n. 2.
Martin-pêcheur de Bengale. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 201.
Little indian Kingfisher. Edw. av. 1. t. II. f. inj.
Indian Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 631. n. 21.
β. Ispida bengalensis minor. Briss. av. 4. p. 477. n. 3.
Little indian Kingfisher. Edw. av. 1. t. II. f. sup.
Habitat in Bengala, 4½ pollices longa, β. minor.
Rostrum nigrum, mandibulæ inferiores basi incarnata;
fascia ocularis rufa; hujus loco in β. maculæ duas
rufæ, altera ad basin mandibulae superioris, altera pone
aures; testrices clarum superiores ex cæruleo virides,
apice cæruleæ; remigum caudæque margo ex cæruleo
viridis, in β. concolor.
- superci- 6. A. submacroura viridis, subtus alba, fascia viridi,
liosa. superciliis fulvis.
Ispida americana viridis. Briss. av. 4. p. 490. n. 9.
Martin-pêcheur vert & orange. Buff. hist. nat. des ois. 7.
p. 218.
Martin-pêcheur petit vert de Cayenne. Buff. pl. enlum.
n. 756. f. 2. 3.
Little green and orange Kingsfisher. Edw. glean. t. 245.
Supercilious Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 643. n. 34.
Habitat in America, 6 pollices longa.
Rostrum nigricans, mandibulæ superioris basi rubicundæ;
gula, jugulum, testrices alarum interiores & hypo-
chondria aurantia; remiges ex atro fuscæ utrinque
fulvo-maculatae; rectrices 2 intermediae totæ virides,
reliquæ intus albo maculatae; pedes incarnati.
- leuco- 21. A. ex cæruleo viridis, subtus flavescentes, capite & cervice
thy ncha. spadiceis, remigibus cinereis, cauda supra cærulea,
subtus cinerea.
Ispida americana cærulea. Briss. av. 4. p. 505. n. 16.
Alcedo americana s. Apiastra. Seb. mus. I. t. 53. f. 3.
Martin-pêcheur à bec blanc. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 200.
White-billed Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 644. n. 35.
Habitat in America, vix 5 pollices longa.
Rostrum albidum; testrices alarum a corpore remotissime
cinereæ.
- brasiliens- 22. A. ex rufo, badio, fuscæ & albo varia, subtus alba, remi-
gis, fuscis majoribus caudæque rufis; maculis transversis albis.

Ispida brasiliensis. Briss. av. 4 p. 510. n. 19.

Gip-gip. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 217.

Brasilian Kingfisher. Lath. syn. I. 2. p. 641. n. 31.

Habitat in Brasilia, iſpidae magnitudine.

Rostrum oculique nigri; fascia ocularis, pedes & unguis fusi.

america- 23. A. ex nigricante viridis, subtus alba, viridi maculata, na. pectoris jugulique area rufa.

Martin-pêcheur vert & blanc de Cayenne. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 216. pl. enlum. n. 591. f. 1. 2.

White and green Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 641. n. 30.

Habitat in Cayenna, 6 pollices longa.

Rostrum nigrum; ab ejus basi linea alba infra oculos ad occiput producta; alæ maculis nonnullis albis; pedes rubri; feminæ nulla area rufa.

bicolor. 24. A. viridis, subtus ex rufo aurea, fascia pectoris nigro & albo undulata, alis caudaque albo maculatis.

Martin-pêcheur vert & roux. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 215.

Martin-pêcheur vert & roux de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 592. f. 1. 2.

Rufous and green Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 640. n. 29.

Habitat in Cayenna, iſpidae magni udine, 8 pollices longa.

Rostrum nigrum; a naribus ad oculos stria rufa, torquis diniidiatus rufus, feminæ nullus, nec fascia pectoralis; pedes rubicundi.

macu- 25. A. fusca flavescenti-maculata, subtus alba fusco-macu- lata, gula flava.

Ispida brasiliensis nævia. Briss. av. 4. p. 524. n. 25.

Matuiti. Raj. av. p. 165. n. 3. Will. orn. p. 199. t. 38.

Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 212.

Brasilian iſpotted Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 640. n. 28.

Habitat in Brasilia, ſturni magnitudine.

Rostrum rubrum, mandibula ſuperiore paulisper longiore; pedes & unguis cinerei.

Alcyon. 7. A. macroura cristata cærulescens, abdomine albo, pectore ferrugineo, macula alba ante poneque oculos.

Ispida cristata carolinensis. Briss. av. 4. p. 512. n. 21.

Alcyon. Raj. av. p. 184. n. 14.

Kingfisher. Catesb. carol. I. t. 69.

Belted Kingsfisher. Arđ. zool. 2. p. 279. n. 169. Latham syn. I. 2. p. 637. n. 27.

β Ispida ludoviciana.

Martin-pêcheur de la Louisiane. *Buff. pl. enlum.* n. 715.

Crab catcher. *Sloane. jam. 2. p. 313.* n. 54. t. 55. f. 3.

γ . Ispida dominicensis cristata. *Briss. av. 4. p. 415.* n. 22.

Martin-pêcheur huppé de S. Domingue. *Buff. pl. enlum.* n. 593.

Jaguacati. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 210.*

American Kingfisher. *Edw. av. 3. t. 115.*

δ . Ispida brasiliensis cristata. *Briss. av. 4. p. 511.* n. 20.

Jaguacati guacu. *Marcgr. bras. 194. Raj. av. p. 49.* n. 2.

Will. orn. p. 147. n. 2. t. 24.

Habitat in America a sinu Hudsonis ad novam Hispaniam usque, β . in Louisiana & Jamaica, γ . in insula S. Dominici, vere versus sinum Hudsonis migrans, δ . in Guiana & Brasilia, piscibus, aliquando etiam lacertis viditans, ad ripas altiores ridens, foramine profundo horizontali, ova 4 alba pariens, ex quibus Junio prodeunt pulli; caro rancida; longitudo 13 pollicum.

Rostrum nigrum, in β . ex atro fuscum; in γ . mandibulae inferioris basi rubicunda; caput in β . plumbeum, in γ . cum superiore corporis parte splendide ferrugineum; torquis albus; in β . mentum, gula jugulumque alba; pectoris fascia transversa ferruginea, in γ . punctata; testrices alarum, remiges rectricesque apice albæ; in β . remiges secundariae cuni rectricibus, in γ . & δ . remiges omnes albo maculatae; remiges primariae nigrae, maculis transversis albis; in δ . remiges rectriceisque nigrae; pedes & unguis fusi; in β . pedes rubri, abdomine ferrugineo; in γ . pedes rubri, unguis nigri; in δ . pedes & unguis nigri.

torquata. 8. A. macroura subcristata cano-cærulescens, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.

Ispida mexicana cristata. *Briss. av. 4. p. 518.* n. 23. t. 41. f. 1.

Achalalacta. Piscium vorax. *Hernand. mex. 13. Will. orn. p. 390. Raj. av. p. 126.*

Alati. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 208.*

Martin-pêcheur huppé du Mexique. *Buff. pl. enlum.* n. 284.

Cinereous Kingfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 636.* n. 26.

Habitat in Martinica & Mexico, picæ magnitudine, 15 $\frac{1}{2}$ polices longa.

Rostrum ex atro fuscum basi rubens. Pedes rubri.

cayen- 26. A. cærulea subtus alba, fascia infra occiput transversa nigra.
nen- Ispida cayennensis. *Briss. av. 4. p. 492.* n. 10.

Taparara. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 207.

Cayenne Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 635. n. 25.

Habitat in Cayenna & Guiana, numerosa, solitaria, in riparum antris ova pariens, sternu vix minor, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Mandibula superior nigra, inferior rubra; uropygium cyaneum; remigum caudæque margo cæruleus; pedes rubri.

atrica-pilla. 27. A. ex violaceo cærulea, subtus alba, capite, cervice, humeris, alarumque apicibus nigris, abdomine rufescente.

Martin-pêcheur à coiffé noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 189.

Martin-pêcheur de la Chine. *Buff. planch. enlum.* n. 673.

Black-capped Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 624. n. 15.

β . *Alcedo luzonica.*

Martin-pêcheur de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 65. t. 31.

Alcedo australis, supra nigra, subtus alba, abdomine ferrugineo.

Habitat in Sina, $\beta.$ in insula Luzonia, 10 pollices longa. Rostrum pedesque rubri.

tuta. 28. A. macroura, supra olivacea, subtus alba, superciliis albis, torque ex virescente nigro.

Respected Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 624. n. 14.

Habitat in insula Tahiti, incolis sacra, 8 $\frac{1}{2}$ pollices longa. Rostrum nigrum, mandibula inferiore alba; pedes nigri.

venerata. 29. A. fusca, subtus pallida, cauda rotundata, remigum, rectricum, reétricumque margine viridi.

Veuerated Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 623. n. 13.

Habitat in insula amica, Apye, incolis sacra, 9 pollices longa.

Rostrum nigrum, mandibula inferioris bâsi alba; remigum rectricumque scapi badii; pedes obscuri.

sacra. 30. A. ex dilute cæruleo viridis, subtus alba, superciliis pallide ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

Sacred Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 621. n. 12.

β . *Alcedo superciliis albis.*

γ . *Alcedo vertice ex virescente nigro, subtus & nucha pallide ferruginea.* *Lath. syn.* I. 2. t. 27.

δ . *Alcedo capite nigro, vertice cæruleo, superciliis, cervice & abdomine lutescentibus, alis caudaque cæruleis.*

ϵ . *Alcedo torque albo.*

Martin-pêcheur à collier blanc des Philippines. *Sonner. it.* p. 67. t. 33. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 192.

Habitat in insulis Societatis, ♂. in nova Seelandia, & in insulis Philippinis, incolis sacra, ispida major, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum plumbeum, in ε. nigrum, mandibula inferiore subtus alba, in ε. basi flavicante; infra oculos striga angusta ex aurantio ferruginea, infraque hanc in nucha altera cærulea, in β. & γ. nigra; colli laterumque pectoris pennæ albæ in β. cinereo, in γ. obscuro marginatæ; mentum in γ. album; in δ. gula collumque alba; crissum in δ. nigrum; remigum caudæque margo exterior cæruleus; uropygium in γ. pallide cyanum; pedes nigri, in γ. obscuri, in δ. fuscii, in ε. nigricantes.

chloroce- 31. A. viridis, collo albo, torque nigro, alis caudaque thalassinis.

Martin-pêcheur à tête verte. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 190.

Martin-pêcheur à tête verte du Cap de bonne espérance.

Buff. pl. enlum. n. 783.

Green-headed Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 11.*

Habitat in insula Molucca Bouro, 9 pollices longa.

Rostrum, cauda subtus, pedesque nigricant.

cærulez. 32. A. cærulea, subtus rufa, superciliis & torque albis.

Ispida indica torquata. *Briff. av. 4. p. 481. n. 5. t. 37. f. 2.* A.

White collared Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 620. n. 10.*

Habitat in India, ispida major, 7 fere pollices longa.

Rostrum griseum, apicem versus nigricans; sub oculo macula rufa; gula pallide rufescens; uropygium caudæque teatrices superiores egregie virent; pedes grisei; ungues nigricantes.

fusca. 33. A. cristata olivacea subtus exalbida obscure striata, temporibus & occipite fordidè albis, cauda rotundata ferrugineo & chalybeo lineata apice alba.

Le plus grand Martin-pêcheur. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 181.

Grand martin-pêcheur de la nouvelle Guinée. *Buff. pl. enl. n. 663. Sonner. it. p. 171. t. 106.*

Great brown Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 609. n. 1.*

Habitat in nova Guinea, hujus generis maxima, 18 pollices longa.

Rostrum mandibula superior nigra, inferior alba, basi nigra; crista feminæ nulla, maris constans pennis angustis fuscis dilutius striatis; feminæ vertex, utriusque sexus genæ collique latera ex atro fusca; feminæ torque albus, &

dorsum integrum olivaceum; mari hujus pars inferior cum uropygio pallide thalassina; ejusdem coloris macula in tectricum alarum media; remiges in femina ex vidente fuscæ, in mare margine exteriore cæruleæ, intus & apice nigrae, basi in nonnullis alba; pedes flavi, feminæ ex atro fuscæ; unguis nigri.

capensis. 9. A. macroura cinereo-cærulea, subtus fulva, pectore testaceo, rostro rubro.

Ispida Capitis bonaæ speci. Briss. av. 4. p. 488. n. 8. t. 36. f. 3.
Martin-pêcheur du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enl. n. 590.

Martin-pêcheur à gros bec. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 184.
Habitat ad Caput bonaæ speci, 14 pollices longa.

Rostrum apice nigricans; caput cinereum in fulvum vergens; corpus supra ex cæruleo viride, dorso parte superiore in cinereum vergente; pedes & unguis rubri.

maxima. 34. A. subcristata ex plumbeo nigra albo-punctata, gula alba, jugulo nigro, pectore & abdomine sanguineis. Pall. spicil. 6. p. 15.

Oiseau. Bosman it. guin. p. 273. f. n. 13.

Great african Kingsfisher. Lath. syn. I. 2. p. 611. n. 3.
β. Alcedo ex nigricante grisea albo-maculata, subtus rufa, postice alba.

Martin-pêcheur huppé. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 188. pl. enlum. n. 679.

Habitat in Africa, cornicis magnitudine.

Rostrum atrum, naribus linearibus; verticis nuchaque plumæ in cristam elongatæ; latera colli litura potissimum alba notata; feminæ pars colli & jugulum ex testaceo ferruginea; pectus & abdomen alba, lineolis transversis nigris, laerti alarum albi. guttis rarissimis notati; remiges nigrae apice punctatisque in seriem dispositis albis; rectrices nigrae apice albo, geminaque guttarum albarum serie; pedes nigerrimi.

senega- 10. A. macroura cyanea subtus alba, capite cauo, tectricibus alarum nigris.
lensis.

Ispida senegalensis major. Briss. av. 4. p. 494. n. 11.
t. 40. f. 1.

Alcedo semicerulea. Forsk. Fn. arab. p. 2. n. 5.

Martin-pêcheur à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 194.

Martin-pêcheur à tête grise du Sénégal. Buff. pl. enl. n. 594.

β. Alcedo ex cæruleo viridis, subtus ex fulvescente siava.

Martin-pêcheur Crabier. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 183.*
pl. enlumi. n. 334.

Crab-eating Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 618. n. 9.*
γ. *Alcedo capite colloque obscure albis.*

δ. *Alcedo supra cærulea, subtus ex rufo flava, gula alba.*
Martin-pêcheur bleu & noir du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 194.*

Martin-pêcheur du Sénégal. *Buff. pl. enl. n. 356. f. 1.*
Habitat in Africa & Arabia, potissimum ad fluvium Senegal,

γ. in S. Jago & Abyssinia, 9, β. 12, δ. 7. pollices longa.
Rostri mandibula superior rubra, inferior nigra, in β.
utrumque ferruginea, in γ. rubra, in δ. rufa; caput
collumque cana, genarum macula nigra, in δ. cærulea;
in β. pone utrumque oculum stria & in alarum testri-
cibus area nigra; remiges nigræ, basi intus albæ,
margine exteriore ex cæruleo virides; in γ. alæ nigræ
fascia transversa media cærulea, intus ferruginea
albidæ & obscuræ; pectus & abdomen in γ. ferru-
ginea; rectrices nigræ, margine exteriore ex cæruleo
virides, in β. totæ ex cæruleo virides, in δ. cæruleæ,
in γ. supra cæruleæ, subtus obscuræ; pedes nigri,
in β. ferruginei, in γ. & δ. rubri.

leucoce- 35. A. ex cæruleo viridis, capite, collo & subtus alba,
phala. remigibus fuscis.

Martin-pêcheur à tête & cou couleur de paille. *Buffon*
hist. nat. des ois. 7. p. 190.

Martin-pêcheur de Java. *Buffon pl. enlumi. n. 757.*

White-headed Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 617. n. 8.*
Habitat in Java, 12 pollices longa.

Candor in stramineum colorem vergens; vertex striis
nigris; dorsum ex cæruleo viride; cauda & alæ ex
viridi profunde cæruleæ; remigum margo cæruleus.

flavicans. 36. A. subtus flavicans, capite dorsoque viridibus, rostro
rubro, canda cærulea.

Habitat in insula Celebes, Ten-rou-joulon incolis didas.

smyrnen- II. A. macroura ferruginea, alis, cauda, dorsoque viri-
dibus. *Scop. ann. I. p. 55. n. 65.*

Ispida smyrnenis. *Briff. av. 4. p. 499. n. 13.*

Smyrna Kingsfisher. *Albin. av. 3. t. 37. Lath. syn. I. 2.*
p. 615. n. 7.

β. Ispida madagascariensis cærulea. *Briff. av. 4. p. 496.*
n. 12. t. 38. f. 2.

Martin-pêcheur bleu & roux. *Buffon hist. nat. des ois. 7.*
p. 182.

Grand-Martin-pêcheur de Madagascar. *Buff. pl. enl. n. 232.*

Great Gambia Kingfisher. *Edw. av. 1. t. 8.*

7. *Ispida major bengalensis. Briff. av. 4. p. 501. n. 14.*

Martin-pêcheur de la côte de Maabar. *Buff. pl. enl. n. 894.*
Great Bengal Kingfisher. *Albin. av. 3. t. 28.*

Habitat circa Sniyrnam, β. ad Gambiam & in Mada-

gascar, γ. in Bengala, 8½ β. 10, γ. 10½ pollices longa.

Rostrum rubrum; irides albidae, in γ. flavæ; gula alva,

in β. ochroleuca; fascia pectoralis, in γ. jugulum quo-

que, pectus & abdominis anterior pars alba; tectrices

alarum corpori proximæ in β. violaceæ, exteriores,

remiges 10 primariæ media parte extus. reliquæ barba

tota exteriore, & cauda supra thalassina, hæc subtus

nigra; in γ. tectrices alarum partim cœruleæ, partim

ferrugineæ; remiges primariæ intus & subtus nigri-

cantes; pedes rubri, in γ. cum unguibus aurantiæ;

alias unguis nigricantes, in β. fuscæ.

novæ 37. A. nigra, albo-maculata.

Guinææ. Martin-pêcheur de la nouvelle Guinée. *Sonner. it. p. 171.*

t. 107.

New Guinea Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 614. n. 6.*

Habitat in nova Guinea.

Rostrum, irides, pedesque nigricant; maculæ irregulares,

in capite, dorso, alis, & cauda rotundæ; in collo & ab-

domine oblongæ; ad utrumque colli latus binæ amplæ.

Egyptia. 38. A. fusca maculis ferrugineis, subtus albida maculis

cinereis. Hajselq. it. p. 245. n. 23.

Egyptian Kingsfisher. *Latham syn. I. 2. p. 613. n. 5.*

Habitat in Ægypto, in sycomoro & phænicio nidificans,

ranis, piscibus, insectis vidiitans.

Rostrum nigricans; gula ferrugineo alba; tectrices

caudæ superiores totæ albæ; cauda æqualis cineraf-

cens; pedes virscentes; unguis nigricantes.

Semicœru-41. A. brachyura, dorso postico, cauda medioque alarum

œruleis, humeris nigris, capite pectoralique cinereo,

ventre ferrugineo. Forsk. I n. arab. p. 2.

Habitat circa Yemen Arabiæ, pici minoris magnitudine,

spithamam circiter longa.

Rostrum pedesque miniati.

Rudis. 12. A. macroura nigra albido varia, subtus alba.

Ispida ex albo & atro varia. Briff. av. 4. p. 520. n. 24.

t. 39. f. 2.

Martin-pêcheur pie. *Buffon hist. nat. des ois. 7. p. 185.*
Martin-pêcheur huppé du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum. n. 716.*

Black and white Kingsfisher. *Edw. av. 1. t. 9. Lath. syn. I. 2. p. 612. n. 4.*

Habitat in Asia & Africa, 11 pollices longa.

Rostrum & pedes cum unguibus nigri; supercilia alba; penæ capitis & cervicis nigrae albo-marginalæ; remiges majores apice nigrae; cauda alba, fascia versus apicem nigra; rectrices 2 extimæ maculis 2 semicircularibus nigris.

Dea. 13. A. rectricibus duabus, longissimis medio attenuatis, corpore nigro-cærulescente, alis virecentibus.

Ispida ternatana. *Briff. av. 4. p. 525. n. 26. t. 40. f. 2.*

Avis paradisiaca ternatana. *Seb. mus. 1. p. 74. t. 46. f. 3.*

Martin-pêcheur des Moluques. *Salern. orn. p. 126. n. 10.*

Martin-pêcheur de Ternate. *Buff. pl. enlum. n. 116.*

Martin-pêcheur à longs brins. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 196.*

Ternate Kingsfisher. *Lath. syn. I. 2. p. 634. n. 24.*

Habitat in insula Ternate, sturni magnitudine, ultra 13 pollices longa.

Rostrum aurantium; caput, cervix & alæ splendide cærulea; dorsum & humeri fuscæ, margine cæruleo; uropygium corpusque subtus album in roseum vergens; rectrices intermedio cæruleæ, basi & apice roseæ, reliquæ ex roseo albae, exteriori margine fuso; pedes & unguis rubicundi.

paradisea. 14. A. rectricibus intermediis duabus longissimis, corpore viridi-aureo, pedibus scansoriis.

Galbula longicauda. *Briff. av. 4. p. 89. n. 2. t. 5. f. 2.*

Jacamar à longue queue. *Buff. hist. nat. des ois. 7. p. 22. pl. enlum. n. 271.*

Swallow-tailed Kingsfisher. *Edw. av. 1. t. 10.*

Paradise Jacamar. *Lath. syn. I. 2. p. 603. n. 3.*

Habitat in Surinamo, insecdis vicitans, per paria volans, alaudæ magnitudine, 11 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum quadrangulare, acuminatum, cum pedibus ad digitos usque plumosum nigrum; caput ex violaceo fuscum; gula, jugulum, rectricesque alarum inscriores alba; rectrices 2 intermedio 6, reliquæ unum pollicem longæ.

grandis. 39. A cupreo-aurea, subtus ferruginea, capite artubusque viridi aureis, pedibus scansoriis. *Pall. jijicit. 6. p. 10.*

Great Jacamar. *Lath. syn.* I. 2. p. 605. n. 2.

Magnitudo pici viridis; rostrum tetraëdrum, planilaterrum, naribus nudis; digitæ anteriores fissæ; cauda cuneiformis, corpore longior.

Galbula. 15. A. cauda cuneiformi, corpore viridi-aureo, subtus rufo, pedibus scansoriis.

Galbula. *Briss. av.* 4. p. 86. n. 1. t. 5. f. 1.

Jacamaciri. *Marcgr. bras.* 202. *Raj. av.* p. 44. n. 3. *Will. orn.* p. 139. t. 22. *Edw. glean.* t. 334.

Jacamar. *Buff. hist. nat. des ois.* 7. p. 220. t. 10. pl. enlum. n. 238.

Cupreous Jacamar. *Gener. of birds*, p. 60. t. 3.

Green Jacamar. *Lath. syn.* I. 2. p. 603. n. 1.

B. Galbula cauda longiore. *Lath. syn.* I. 2. t. 26.

Habitat in Gujanæ & Brasiliæ silvis humidis densioribus frequens, & solitaria, viettans insectis, velociter, sed breviter volans, voce brevi, suavi, edulis, alaudæ fere magnitudine, & vix 9 pollices longa.

Rostrum quadrangulare, 2 pollicum, acuminatum, nigrum, naribus ad basin ovatis; irides glaucae; mentum album, nonnunquam flavicans; corpus subtus in β. dilute ferrugineum; pedes breves, debiles, plumosæ, ex virescente flavi, unguibus nigris.

tridactyl- 40. A. pedibus tridactylis. *Mantiss.* 1771. p. 524. *Pall. spic. la.* 6. p. 10. t. 2. f. 1. *Vosm. monogr. Amstel.* 1768. t. 1.

Martin-pêcheur de l'île de Luçon. *Sonner. it.* p. 66. t. 32.

Three-toed Kingsfisher. *Lath. syn.* I. 2. p. 645. n. 36.

Habitat in Surinamo & India, insulisque oceani indici, ispidæ magnitudine, 4 circiter pollices longa.

Rostrum tetraëdrum cum pedibus ochroleucum; corpus subtus album; in aliis veriæ ferrugineus, cinctu violaceo; macula temporum aurorea, infra hanc alia longitudinalis alba; genæ ochroleucæ; gula nivea; remiges ex ferrugineo nigrae, margine interiore ferrugineæ, apice auroreae; cauda ferruginea; in aliis corpus supra ex rufò ferrugineum, vertice tanac, uropygio, & pennarum dorsali nonnullarum apice violæ in modum tintæ; pectus ferrugineum; in aliis caput & corpus supra colore floruri syringæ; alæ ex cæruleo atræ, remigum margine cæruleo; pedes rubicundi.

63. MEROPS. *Rostrum curvatum, tetraedrum, compressum, carinatum, acutum.*
Nares exiguæ ad basin rostri.
Lingua gracilis apice (plerumque) laciniata.
Pedes gressorii.

Apiaster. 1. M. dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-cærulescente, rectricibus duabus longioribus, gula lutea.
Mus. Ad Fr. 2. p. 21. Scop. ann. I. p. 54. n. 63.
Merops. Bell. av. 16. Gesn. av. 599. Aldr. orn. I. p. 871. t. 872. & 873. Chzrl. onom. 87. t. 87. Raj. av. p. 49. n. 3.
Merops galilæus. Hasselq. it. 247. n. 24. Forsk. Fn. arab. p. I. n. 3.
 Apiaster. *Briss. av. 4. p. 532. n. 1.*
Ispida cauda molli. Kram. el. p. 337.
 Guêpier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 480. t. 23. pl. enlum. n. 938.*
 Bee-eater. *Alb. av. 2. t. 44. Will. orn. p. 147. t. 24.*
 Common Bee-eater. *Latham syn. I. 2. p. 667. n. 1.*
 β. Schaeghaghi. *Forsk. Fn. arab. p. I.*
Habitat in Europa & Afia, cicadis, culicibus, muscis, apibus præsertim, insectorum defecitu seminibus vicitans, gregaria, nidum struit in cavernis subterraneis ad aquas ex muscis, & 5-7 ova alba parit, 10 pollices longa.
Rostrum nigrum; irides rubrae; frons ex cæruleo virens; vertex, occiput & cervix badia; a rostro ad occiput stria nigra; cauda cuneiformis, thalassina, rectricum margine intus cinereo; pedes spadicei, unguibus ex rubicundo nigris.

viridis. 2. M. virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque cæruleis, rectricibus duabus elongatis.
Merops viridis supra ferruginea. Amæn. acad. 4. p. 237.
Ispida viridis supra ferruginea. Osb. it. p. 96.
 Apiaster madagascariensis torquatus. *Briss. av. 4. p. 549. n. 8. t. 42. f. 2.*
 Guêpier à collier de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 740.*
 Guêpier vert à gorge bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 497.*
 Indian Bee-eater. *Gen. of birds p. 60. t. 7. Edw. av. 4. t. 183. Lath. syn. I. 2. p. 670. n. 2.*
 β. Apiaster bengalensis torquatus. *Briss. av. 4. p. 552. n. 9.*
 Bengal Bee-eater. *Albin. av. 3. t. 30.*

- γ. *Merops aegyptius*. *Forsk. Fn. arab.* p. 1. n. 2.
 δ. *Apiaster philippensis minor*. *Briss. av.* 4. p. 555. n. 10.
 t. 43. *f. 2.*
*Habitat in Bengala & Java, γ. in Ægypto, δ. in insulis
 Philippinis, passeris magnitudine, sere 10 pollices longus.
 β. ultra 11 pollices, δ. 7½.*
*Rostrum nigrum; gula in γ. flava, caudaque æqualis;
 fascia pectoralis in δ. cœrulea, & cauda pariter æqualis;
 pedes fuscæ, in γ. incarnati.*

- ^{cōngē-}
^{ner.} 3. *M. flavescens*, uropygio virescente, remigibus apice rubris,
 rectricibus basi luteis.
*Merops alter. Gesn. av. 601. t. 602. Aldr. orn. I. p. 875.
 t. 876. Raj. av. p. 49. n. 4.*
Apiaster icterocephalus. Briss. av. 4. p. 537. n. 2.
*Guêpier à tête jaune. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 510.
 Other Bee-eater of Aldrovandus. Will. orn. p. 148.
 Yellow-headed Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 672. n. 3.
Habitat in Europa australi, apiastro paulo minor.
*Tænia ocularis nigra; dorsum & humeri badia; tectrices
 alarum minores cœrulecentes, majorcs flavæ; remiges
 nigrae; pedes flavi.**

- <sup>superci-
liosus.</sup> 4. *M. viridis*, linea frontis supra infraque oculos alba, gula
 flavicante, rectricibus duabus elongatis.
Apiaster madagascariensis. Briss. av. 4. p. 546. n. 7. t. 42. f. I.
Guêpier de Madagascar. Buff. pl. enlum. n. 259.
Paricich. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 495.
Supercilious Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 673. n. 4.
 β. *Merops persica. Pall. it. 2. p. 708. n. 16. t. D.*
*Habitat in Madagascar, β. migratorius ad mare caspium,
 ultra 11 pollices longus, β. apiastri magnitudine.*
*Rostrum & oculorum area nigra; vertex ex virescente
 badius; pedes fuscæ; unguis nigri; in β. frons cyanea,
 lora nigra; area sub collo magna ex sanguineo rufa.*

- <sup>Philippi-
nus.</sup> 5. *M. viridis*, subtus flavescens, uropygio cœruleo, cauda
 æquale.
*Apiaster philippensis major. Briss. av. 4. p. 560. n. 12.
 t. 43. f. I.*
Grand guêpier des philippines. Buff. pl. enlum. n. 57.
Guêpier vert à queue d'azur. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 404.
Philippine Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 674. n. 5.
*Habitat in insulis Philippinis, apiastro minor, ultra 8½
 pollices longus.*
Rostrum nigrum, linea ocularis nigra; pedes & unguis fuscæ.

- cinereus. 6. M. rubro flavoque variegatus, subtus flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis rubris.
Apiaster mexicanus. Briff. av. 4. p. 541.
Avicula de Quaubcilui. Seb. Mus. I. p. 50. t. 31. f. 10.
Guêpier à tête grise. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 491.
Cinereous Bee-eater. Latham syn. I. 2. p. 675. n. 6.
Habitat in nova Hispania, alaudæ magnitudine, 9¹/₂ pollices longus.
Rostrum viride; caput, remiges & rectrices exteriores cinerea.
- cafer. 7. M. griseus, crisco flavo, cauda longissima.
Merops fuscus, ani regione flava. Koelreuter n. comm. ac. Petrop. II. p. 429. t. 14. f. 1.
Guêpier gris d'Ethiopie. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 492.
Habitat in Aethiopia.
Inter pulchre delineatas icones animalium ultra 150, quas misit amicissimus I. Burmannus, visa est hæc avis. An idem cum promerope?
- flavicans. 8. M. albidus, capite albo & fulvo vario, pectore rubicundo, dorso flavo, uropygio, alis, caudaque rufis, rectricibus 2 intermediis longissimis.
Apiaster flavicans. Briff. av. 4. p. 539. n. 3.
Manucodiata secunda Aldrovandi. Raj. av. p. 21. n. 2.
Guêpier à tête jaune & blanche. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 490.
Aldrovandus's second bird of Paradise. Will. orn. p. 91. t. 11.
Yellow Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 676. n. 7.
Apiastro major, 20 pollices longus; rostrum breve, ex flavicante virens; lingua longa, acuta; oculi sticti; palpebrae rubrae; rectrices 2 intermediæ 8 pollicibus reliquis longiores.
- brasiliensis. 9. M. rutilus, supra ex fusco & nigro varius, cauda remigibusque pallide cæruleis.
Apiaster brasiliensis. Briff. av. 4. p. 540. n. 4.
Pica brasiliensis. Seb. Mus. I. t. 66. f. 1.
Merops rouge & bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 479.
Brasilian Bee-eater. Latham syn. I. 2. p. 676. n. 8.
Habitat in Brasilia, apicistro magnitudine, 9 pollices longus.
Rostrum, alæ subtus & pedes cum unguibus flavi; tectrices alarum minores obscure rubrae.
- badius. 10. M. ex cæruleo viridis, capite, cervice, humerisque badiis, rectricibus supra cæruleis, subtus ex griseo fuscis, intermediis duabus longioribus acuminatis.

*Apiaster ex Franciæ insula. Briss. av. 4. p. 543. n. 6. t.
44. f. 2.*

Guêpier de l'île de France. *Buff. pl. enlum. n. 252.*

Guêpier marron & bleu. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 493.*
Chełnut Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 677. n. 9.*

β. Merops alis caudaque badii.

Guêpier marron & bleu du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois.
6. p. 494.*

Guêpier à longue queue du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 314.*

*Habitat in Franciæ Insula, β. ad fluvium Senegal, 10-12
pollices longus.*

*Falacia infraocularis fusca; rectrices alarum superiores virides, subtus fulvæ, in β. badiæ; remiges subtus griseæ,
4 intime totæ virides, 13 medianarum apice nigreæ;
rectrices margine interiori griseæ; 2 intermedie 2
pollicibus & ultra longiores, in β. nigrae; rostrum
nigrum; pedes rubicundi; unguis nigricantes.*

*Chrysoce- II. M. viridi-aureus, subtus ex cæruleo viridis, capite &
phalæ. cervice fuivis, gula flava, rectricibus deabus intermediis
longioribus.*

Grand guêpier vert & bleu à gorge jaune. *Buff. hist. nat.
des ois. 6. p. 502.*

*Yellow-throated Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 678. n. 10.
Longitudo 10 pollicum; frons & supercilia ex cæruleo
viridia; rectrices caudæ superiores virides.*

*Angolen- 12. M. viridis aureo-nitens, fascia oculari cinerea nigro
maculata, alis caudaque cuneiformi subtus cinereis,
gula flava, jugulo badio.*

*Apiaster angolensis. Briss. av. 4. p. 558. n. 11. t. 44. f. 1. A.
Petit guêpier vert & bleu à queue étagée. Buff. hist. nat.
des ois. 6. p. 503.*

Angola Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 679. n. 11.

Habitat in Angola, 5½ pollices longus.

*Rostrum & unguis nigri; pedes cinerei; color subtus in
cæruleum vergens.*

*Erythro- 13. M. viridis, subtus flavicans, capite & cervice rubris,
cephalus. gula flava, alis caudaque æquali subtus cinereis.*

*Apiaster indicus erythrocephalus. Briss. av. 4. p. 563. n.
13. t. 44. f. 3. A.*

Guêpier à tête rouge. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 508.

Red-headed Bee-eater. Lath. syn. I. 2. p. 679. n. 12.

Habitat in India, 6 pollices longus.

Rostrum nigrum; irides rubræ; fascia ocularis nigra; rectrices 2 intermediae remigesque margine cinereæ; pedes cinerei; unguis nigricantis.

nubicus. 14. M. ex cœruleo viridis subtus ruber, dorso, alis caudaque furcata lateritiis.

Guêpier rouge à tête bleue. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 506.*

Guêpier de Nubie. *Buff. pl. enlum. n. 649.*

Blue headed Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 680. n. 13.*

Habitat in Nubia, apiastro vix minor, 10 pollices longus.

Rostrum nigrum; remiges majores apice ex cœrulecente cinereæ, secundarie ex atro fuscæ; pedes dilute cinerei.

erythro-pterus. 15. M. olivaceus subtus ex albidus, gula flava, alis caudaque rubris apice nigris.

Guêpier rouge & vert du Sénégal. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 507.*

Petit guêpier du Sénégal. *Buff. pl. enlum. n. 318.*

Redwinged Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 681. n. 14. t. 31.*

Habitat ad fluvium Senegal, 6 polliccs longus.

Rostrum pedesque nigri.

cayennensis. 16. M. viridis, alis caudaque apice nigra rufis.

Guêpier vert à ailes & queue rousses. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 509.*

Guêpier à queue & ailes rousses de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 454.*

Cayenne Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 681. n. 15.*

Habitat in Cayenna.

Rostrum nigrum; remiges basi albæ, & prouti rectrices, ad latera nigrae; pedes ex flavescente solito longiores.

surinamensis. 17. M. varius, occipite rubente, cervice ex virente flavo, remigibus virentibus, nigro & cœruleo variis.

Guêpier. *Fermin surin. 2. p. 184.*

Surinam Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 682. n. 16.*

Habitat in Surinamo.

Irides spadiceæ; unguis nigri.

novæ Seelan-dicæ. 18. M. ex virescente splendide niger, tectricibus alarum majoribus & fasciculo pennarum crisparum ad utrumque colli latus albis, tectricibus caudæ æqualis cœruleis.

New Zealand Creeper. *Brown. zool. illustr. p. 18. t. 9. Cook it. I. p. 48.*

Poë Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 682. n. 17.*

Habi-

Habitat in nova Seelandia, 11 pollices longus; incolis sacer, egregie cantans, carne delicata.

Pedes & unguis nigri; os interius cum lingua flavum; hæc apice nigra, setis horrida; pennæ colli laxæ, longæ, aliquantum crispatae, stria per medianam scapi longitudinem alba.

niger. 19. M. niger, fasciculo plumatum magno pone alas, crissaque flavis, cauda cuneiformi, rectricibus duabus extimis extus & apice albis.

Yellow-tufted Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 18.*
Habitat in insula O-why-hi & vicinis, alaudæ magnitudine, 14 pollices longus, frequens; flavæ pennæ ornamenti loco inserviunt incolis.

Nares membrana tectæ; lingua apice filamentosa; pennæ capitis gulæque breves, rectricesque acuminatae; duæ intermediæ 7, extimæ 2 pollices longæ.

rufus. 20. M. rufus, remigibus fuscis exteriore margine rufis.

Fournier. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 476.*

Fournier des Buenos Ayres. *Buff. pl. enlum. n. 739.*

Rufous Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 683. n. 19.*

Habitat in Bonariis, 8½ pollices longus.

Corpus subtus in flavum vergens; cauda 3 pollicum; digitæ pedum ab ortu inde separati, uti promeropis; unguis digitæ posterioris reliquis major.

moluc- 21. M. griseus, orbitis nudis, genis nigris, cauda subæquali.
cenfis. Polochion. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 477.*

Molucca Bee-eater. *Lath. syn. I. 2. p. 684. n. 20.*

Habitat in insula Bouro, ex Moluccis una, cuculi canori circiter magnitudine, 14 pollices longus.

Rostrum nigricans, 2 pollicum, naribus in ejus medio per viis, postice membrana tectis; lingua rostri longitudine, penicillo pilorum terminata; occipiti candor admixtus; gulæ pennæ nonnullæ apice argenteæ; rectrices 2½ pollices longæ, extimis paulo brevioribus; pedes obscuri; digitus exterior basi cum medio connexus; posterioris unguis reliquis multo major.

Meropes in America rariores, infestis, nonnulli apibus vespisque potissimum vivit, alcedines in tantu fluendo nidum, voce plerique ingrata. Upupa a promerope vix differt, nisi crista.

64. UPUPA. *Rostrum arcuatum, longum, gracile, convexum, subcompressum, obtusum.*

Nares exiles ad basin rostri.

Lingua obtusa, integerrima, triquetra, brevissima.

Pedes ambulatorii.

Erops. 1. U. cristata variegata. *Fn. suec. 105. Scop. ann. I. p. 53. n. 62.*

Upupa. *Bell. av. 72. a. Gefn. av. 776. Aldrov. orn. 2. p. 702. Jonst. av. t. 42. Raj. av. p. 48. A. 6. Kram. cl. p. 337. Charl. onom. 63. t. 63. Briss. av. 2. p. 455. n. I. t. 43. f. I. Nozem. nederl. Vog. t. 66.*

Huppe ou Puput. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 439. pl. enlum. n. 52.*

Bubbola. *Olin. ucc. p. 36.*

Ter-choous or Messanger-bird. *Pocock it. I. p. 209.*

Hoop or Hoopoe. *Brit. zool. I. n. 90. Arct. zool. 2. p. 283. A. Will. ornith. p. 145. Albin. av. 2. t. 42. 43. Edw. glean. t. 345.*

Wiedhopf. *Frisch av. t. 43. Günth. Nest. u. Eyer, t. 27. Habitat in Europa, Asia & Africa, solitaria, migratoria, viditans insectis, putroris amans, in cavis arborum, vel murorum, ipsa tellure, bis vel ter per annum ovapariens 2-7 cinerea, perdricis ovis paulo minora, sed longiora; non nisi terrefacta crislam erigit, 12 pollices longa.*

Crista pallide aurantia, apice nigra; dorsum & alæ lineis nigris albisque; collum ex rubente fuscum; pectus & abdomen alba; rectrices 10 nigræ, lunula in medio alba; pedes nigri.

capensis. 4. U. cristata fusca, subtus alba, alarum macula alba.

Huppe noire & blanche du Cap de bonne espérance. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 463.*

Huppe du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enlum. n. 697.*
Madagascar Hoopoe. *Lath. syn. I. 2. p. 690. n. 2.*

Habitat in insularum Madagascar & Bourbon, nec non Capitis bonæ spei densis silvis, 16 pollices longa.

Rostrum flavicans; lingua apice filamentosa; palatum tuberculis plenum; crista minor, quam epopi, acuminata, alba; rectrices 12, 2 intermediae reliquis parvulum brevior-

res; pedes & unguis flavicantes; posterioris digitus unguis magnus, valde uncinatus.

- Prome-
rops. 2. U. rectricibus sex, intermediis longissimis. *Mill. illustr.*
t. VI. A.
Promerops superne fuscus, inferne albus, pectore rufescente. *Briff. av. 2. p. 461. n. 1. t. 43. f. 2.*
Promerops gris à ventre tacheté. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 469.*
Promerops du Cap de bonne espérance. *Buff. pl. enl. n. 637.*
Cape promerops. *Lath. syn. I. 2. p. 692. n. 5.*
Habitat frequens ad Caput bonæ sp̄ei, alaudæ circiter magnitudine, 17 pollices longa.
Rostrum, pedes & unguis nigra; uropygium & rectrices caudæ superiores olivaceæ, inferiores flavæ; gula alba; jugulum & pectus rufescens; abdomen alatum, in mare una cum pectore maculatum; rectrices 12, intermediæ, 6 12½ pollices, extimæ 2 tantum longæ.
- mexica-
na. 5. U. grisea, thalassino & purpurascente admisto, subtus flava, remigibus majoribus cæruleis, rectricibus quatuor intermediis longioribus.
Promerops mexicanus. *Briff. av. 2. p. 453. n. 2.*
Avis Ani mexicana cauda longissima. *Seb. mus. I. p. 73. t. 45. f. 3.*
Promerops à ailes bleues. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 467.*
Mexican Promerops. *Latham syn. I. 2. p. 691. n. 4.*
Habitat in novæ Hispaniæ montibus altioribus, muscis, apibus, aliis insectis larvisque vittatis, 18½ pollices longa.
Rostrum nigricans, ad latera flavicans; supra oculos macula flava; cauda 12½ pollices longa ex nigricante grisea, viridi & purpureo tincta intermixta.
- paradisea. 3. U. castanea cristata, rectricibus duabus longissimis.
Promerops indicus cristatus. *Briff. av. 2. p. 464. n. 3.*
Avis paradisiaca cristata orientalis rarissima. *Seb. mus. I. p. 48. t. 30. f. 5.*
Promerope. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 465.*
Crested Promerops. *Lath. syn. I. 2. p. 691. n. 3.*
Habitat in India, rarer, sturni magnitudine, 19 pollices longa.
Rostrum, pedes & unguis plumbeus; caput & collum egregie nigra; verticis pennæ 2 pollicum in cristam elongatae; dorsum, uropygium, humeri, alæ & cauda pallide badia;

AVES PICÆ. Upupa.

pectus, abdomen & testiculae caudæ inferiores pallidè cinereæ; rectrices 2 intermediae 14, reliquæ 3 pollices longæ.

- fusca. 6. U. fusca, subtus grisea albo nigroque striata, vertice chalybeo, gula juguloque nigris, rectricibus duabus intermediais longissimis.

Promerops brun de la nouvelle Guinée. Sonner. it. p. 164. t. 100.

Promerops brun à ventre tayé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 471. t. 22.

Promerops de la nouvelle Guinée. Buff. pl. enlum. n. 638. New Guinea brown Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 694. n. 6.

Habitat in nova Guinea, 22 pollices longa.

Rostrum, irides & pedes nigra; feminæ caput collumque fusca, occipiti, dorso, alisque viror admistus; rectrices 12, intermediae duæ 13, extimæ brevissimæ 4 pollices longæ.

- magna. 7. U. nigra, capite, cervice & pectori, pennarumq[ue] humeralium, subalarium & ad caudæ latus positarum falcatarum parte exteriore viridi-aureis, cauda longissima.

Grand Promerops de la nouvelle Guinée. Sonn. it. p. 166. t. 101. Buff. planch. enlum. n. 639.

Grand Promerops à paremens frisés. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.

Grand Promerops. Lath. syn. I. 2. p. 695. n. 7. t. 32.

Habitat in nova Guinea, 4 fere pedes longa.

Rostrum 3 pollicum, & pedes nigri; nigredini supra violaceus, ad alas cœruleus tinctus adspersus; rectrices 12, binæ intermediae 21 pollices, extimæ 5 modo longæ.

- aurantia. 8. U. fulva, capite colloque aureis, cauda æquali.

Promerops barbadensis. Briss. av. 2. p. 466. n. 4.

Avis paradisiaca americana elegantissima. Seb. mus. I. p. 102. t. 66. f. 3.

Promerops orangé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 474.

Orange Promerops. Latham syn. I. 2. 697. n. 8.

β. Promerops mexicanus luteus. Briss. av. 2. p. 467. n. 5.

Cochitlolotl. Fern. hist. n. Hisp. c. 161. Raj. av. p. 168.

Promerops orangé (fem.). Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 472.

Habitat in Barbados, & in novæ Hispaniæ calidioribus, vermibus & seminibus visitans, sturni magnitudine, 9½ pollices longa.

Rostrum aureum, basi plumis rubris cinctum, in β. nigrum; remiges majores ex rubro aurantiæ; in β. alæ, collum & caput ex cinereo nigroque varia; pedes flavi, in β. cinerei, unguibus nigris.

65. CERTHIA. *Rostrum arcuatum, tenué, subtrigonum, acutum.*

Lingua acuta.

Pedes ambulatorii.

familia- 1. *C. grisea*, subtus alba, remigibus fuscis: decem macula-
ris. *Fn. suec.* 106. *Scop. ann.* I. p. 52. n. 59.

Certhia. Gesn. av. 251. *Aldrov. orn.* I. p. 869. t. 870.
Bell. av. 98. a. *Raj. av.* p. 47. n. 5. *Briss. av.* 3. p. 603. n. I. *Nozem. nederl. Vogel.* t. 30. *Günth. Nejt. u. Eyer,* t. II. f. sup.

Ispida cauda rigida. Kram. el. p. 337. n. 2.

Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 481. t. 21. f. I.
pl. enlum. n. 681. f. I.

Creeper. Brit. zool. n. 91. t. 39. *Arct. zool.* 2. p. 285.
n. 174. *Will. orn.* p. 144. t. 23. *Albin. av.* 3. t. 25.
Lath. syn. I. 2. p. 701. n. I.

6. *Certhia major.*

Grand Grimpereau. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 486.

Grauspecht. Frisch av. t. 39.

Habitat in Europæ & septentrionalis Afriæ atque Americæ arboribus reptans, ex rimis corticis mustelisque adhaerentibus insecta, eorumque ova & larvas exquirens, quibus vivit; primo vere nidificat, & 20 ova parit.

Caput collumque fuscum, striis nigris; utopygium mustelinum; rectrices alarum ex fusco & nigro variae; remiges obscuræ, margine albo, lineis ferrugineis, 4-14 macula alba notatae; pectus & abdomen argentea; cauda prælonga mustelina; rectrices acuminatae.

viridis. 26. *C. supra virens, subtus pallide luteo viridique varia, remigum fuscarum margine exteriore viridi. Scop. ann.* I. p. 52. n. 60.

Certhiæ genus per omnem tellurem dispersum, infelix potissimum viditat; naribus exiguis rectricibus 12, pezibus majoribus, dige^rto posteriori magno, unguibus mucinatis & longis conspicuum; plurimis speciebus lingua acuta, aliis apice complanata, aliis ciliata, paucis tubulis.

Green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 702. n. 2.*
Satura familiaris; stria cærulea a basi rostri utrinque descendens; gulæ macula rufa; pedes nigri.

pacifica. 27. *C. nigra*, subtus obscura, humeris, dorso inferiore, uropygio crisoque flavis, tectricibus alarum inferioribus niveis.

Great hook-billed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 703. n. 3.*
Habitat in insulis amicis maris australis, 8 pollices longa; rostrum valde curvatum fuscum, basi pallidius; tectrices caudæ superiores & nonnullæ alarum interiores flavæ; alæ spuriae ochroleucæ; pedes ex atro fusi.

obscura. 28. *C. olivacea*, remigibus caudaque æquali viridi-marginata obscuris.

Hookbilled green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 703. n. 4. t. 33. f. 1.*

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis ad vestimenta eorum plumosa adhibita, 7 pollices longa.

Rostrum ex fuso atrum, semicirculi ad instar curvatum; nares membrana tectæ; inter oculos maresque stria fusca; abdominis color in flavum paulisper vergens; pedes obscure fusi, genubus albis; digitæ posterioris unguis prælongus.

coccinea. 29. *C. coccinea*, alis caudaque nigris. *Forster Goett. Magaz. I. 6. p. 346. Blumenb. Naturg. ed. 2. p. 190.*

Hookbilled red Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 704. n. 5.*

Carmosinother Honisauger. *Merrem Beytr. I. p. 16. t. 4.*

Habitat in insulis Sandwich, ab incolis similiter ad vestimenta plumosa adhibita, longitudine vix 6 pollices adæquans; magnitudine passeris.

Rostrum capite longius, acinacis modo curvatum, albidum; pedes cum unguibus longis albicantes; tectrices breves, acuminatæ; alarum margo & pennarum gularium radix alba.

falcata. 30. *C. viridis*, subtus caudaque violacea, remigibus, abdomine & criso pallide fuscis.

Sickle billed Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 705. n. 6.*

Longitudo 5½ pollicum; rostrum obscurum, falcatum; capitis nitor violaceus; tectrices alarum majores pedesque pallide fuscæ; ungues nigri.

Sovi-
manga. 31. *C. viridis subtus flavescens, uropygio olivaceo, pectore
fusco: fasciis duabus transversis altera cærulea, altera
badia, cauda nigra.*

*Certhia madagascariensis violacea. Briss. av. 3. p. 638. n. 18.
t. 32. f. 2. 3.*

Sovi-manga. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 494.
Violet Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 705. n. 7.*

*Habitat in Madagascar, reguli magnitudine, 4 pollices
longa.*

*Rostrum, cum pedibus & unguibus nigrum, lingua apice
bisida paulo brevius; femina subtus flava, supra olivacea;
mari teætrices alarum subtus ochroleucae; dorsum infe-
rius caudæque teætrices superiores olivacea, inferiores cum
macula humerorum flavæ; rectrices margine virides.*

manille- 32. *C. viridis, cæruleo & violaceo nitens, subtus ex oliva-
ceo grisea, collo ex. viridi, cæruleo, violaceo, flavo
fasciatim vario remigibus fuscis.*

Habitat in Manilla, 4 pollicibus brevior.

*Inter humeros duæ maculæ flavæ; teætrices alarum supe-
riores fuscæ.*

burboni- 33. *C. ex virente fusca, subtus griseo varia, uropygio flavo,
ca. remigibus caudaque nigricantibus.*

*Sovi-manga de l'île de Bourbon. Buff. hist. nat. des ois. 5.
p. 516.*

*Grimpereau de l'île de Bourbon. Buff. pl. enlum. n. 681.
f. 2.*

Yellow-rumped Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 736. n. 41.

Habitat in insula Bourbon, 5 pollices circiter longa.

Rostrum & pedes nigri; hypochondria rufa.

fannio. 34. *C. olivacea, vertice subviolaceo, genarum macula alba,
remigibus caudaque subfurcata fuscis.*

Mocking Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 735. n. 39.

*Habitat in nova Seelandia, 7½ pollices longa, voce grata
varia, imitabunda; capite a purpureo antherali polline
florum, quibus immiscet avis, nonnunquam purpureo.*

*Rostrum obscurum; nares magnæ, membrana teætræ; irides
fuscæ; corpus supra magis in viridem, subtus in flavum
colorem vergens; remigum secundiarium recticulumque
margo olivaceus; pedes obscure glauci, unguibus nigris,
posteriore longiore.*

aurantia. 35. C. viridis subtus flavicans, jugulo aurantio, remigibus caudaque nigris.

Orange breasted Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 734. n. 38.

Habitat in Africa, 4 pollices longa. Smeathman.
Rostrum *nigrum*; pedes *obscuri*.

flavipes. 36. C. viridis subtus cærulea, alis caudaque nigris.

Blue-throated Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 734. n. 37.

Habitat in Cayenna, 4 $\frac{1}{4}$ pollices longa.

Rostrum & unguis *nigri*; abdomen *pallidius cæruleum*;
lateribus colli intermissus color ochroleucus; pedes *flavi*.

ochrochlo- 37. C. viridis, genis, gula & abdomine flavis, pectoro & ra.
hypochondriis ex flavicante viridibus cærulecentemaculatis.

Yellow-cheeked Creeper. *Gen. of birds* p. 60. t. 3. f. 2.

Lath. syn. I. 2. p. 734. n. 36.

Habitat in Surinam, familiariter dinudio minor.

Cardinalis. 38. C. niger, capite, collo, pectoro & linea per medium dorsi longitudinem rubris, cauda æquali.

Cardinal Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 733. n. 35. t. 33. f. 2.

Habitat frequens in cultis insulæ Tainæ, neclarque e floribus fugere fertur; familiaris magnitudine.

Rostrum *nigrum*, basi *albicans*; lingua *longa*; extensis, altera media parte ciliata; stria *nigra* a rostro ad oculos; irides *spadiceæ*; pedes *plumbei*; unguis *nigri*.

caruncu- 39. C. olivacea, mento gulaque aurantiis, pectoro ferrugineo, latâ. abdomine cinerascente, caruncula ad basin mandibulæ inferioris flavicante.

Wattled Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 732. n. 34.

Habitat in insula maris australis Tonga Tabu, 7 $\frac{1}{4}$ pollices longa.

Lingua *rostro longior*, in quatuor quasi filamenta partita; caruncula fasciculo pluniarum *flavarum cincta*; irides *cineræ*; pedes ex *glaucō atri*; unguis *nigri*.

fusca. 40. C. fusca, gula & pectoro fusco alboque lineatis.

Brown Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 732. n. 33.

Habitat in terra maris australis, 6 pollices longa.

Rostrum medium macula pallide aurantia; pennæ ad collum latera marginè albo; abdomen pallidius; cauda æqualis; pedes *nigri*; unguis *nigri*, *longi*, *adunci*.

- muraria. 2. *C. cinerea*, macula alarum fulva. *S. G.* Gmelin it. 3.
t. 19. f. 2. *Scop. ann.* 1. p. 51. n. 58.
Certhia muralis. *Briss. av.* 3. p. 607. n. 2. t. 30. f. 1.
Picus murarius. *Gesn. av.* 712. *Aldr. orn.* 1. p. 851. t. 852.
Raj. av. p. 46. n. 1. *Kram. elench.* p. 336. n. 6.
Grimpereau de muraille. *Buffon hist. nat. des ois.* 5.
p. 487. t. 22. *pl. enluni*, n. 372. f. 1. 2.
Wallcreeper or Spider catcher. *Will. orn.* p. 143. t. 23.
Edw. glean. t. 361. *Lath. syn.* 1. 2. p. 730. n. 32.
Mauerspecht. *Goetz Naturf.* 17. p. 40.
Habitat in Europæ australioris turribus, arcibus, muris,
reptans, solitaria, autumno migrans, viātitans insectis
potissimum arancis, volatu vago & incerto, voce acuta;
nidificat aliquando in craniis; moribus familiariter affinis,
passeris magnitudine, 6½ pollices longa.
Rostrum subulatum, cultratum, capite longius; collum sub-
tus albidum; remiges nigræ: 1, 2 latere tenuiore macu-
lis duabus albis; macula alarum rosea et rectricibus & re-
migum latere interior; rectrices albicantes; unguis va-
lidi præsertim posterior. Feminæ gula jugulumque alba.
- pusilla, 3. *C. fusca*, subtus alba, superciliis candidis, rectricibus
fuscis: extimus apice albis.
Certhia indica. *Briss. av.* 3. p. 621. n. 9.
Sovi-manga brun & blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 498.
Little brown and white Creeper. *Edw. av.* 1. t. 26.
Habitat in India, familiariter dimidio minor, 3½ pollices
longa; ansperatae varietas?
A rostro ad oculum utrinque stria nigra; remigum nuargo
aeneus.
- capensis. 4. *C. fusca*, rectricibus nigricantibus: extima exterius albo
fimbriata.
Certhia Capitis bonæ spei. *Briss. av.* 3. p. 618. n. 7.
- melanura. β. *C. capite dorsoque violaceis, pectore & abdomine viref-*
centibus, alis fuscis, cauda nigra subbifida, tibiis di-
gitisque atris. Sparrmann nus. carls. t. 5.
Habitat ad Caput bonæ spei, reguli magnitudine, 4 polli-
cibus longior.
Rostrum, cauda & pedes nigricant.
- olivacea. 5. *C. olivacea*, subtus fusca, orbitis albicantibus.
Certhia olivacea madagascariensis. *Briss. av.* 3. p. 625. n. 11.
Sovi-manga olive à gorge pourpre. *Buff. hist. nat. des*
ois. 5. p. 507.

Grimpereau olive de Madagascar. *Buff. pl. enlum. n. 375^f. I.*

Olive Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 713. n. 14.*

Habitat in Madagascar, familiari minor, 4 pollices longa. Rostrum nigrum; rectrices extimæ apice albæ; reliqua cum remigibus fuscæ, tinctu olivaceo; pedes pallide fusi.

carrucaria. 6. C. olivacea subtus flavescens, rectricibus æqualibus.

Certhia philippensis. *Briff. av. 3. p. 615. n. 5. t. 30. f. 3.*
Grimpereau gris des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 5^r. p. 508. pl. enlum. n. 576. f. 2.*

Grey Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 714. n. 15.*

Habitat in insulis Philippinis, 4½ pollices longa.

Rostrum validius, quam congeneribus, cum pedibus ungibusque nigrum; lingua apice bifeta; stria a mento ad pectus, rectricesque alarum superiores violaceæ; remiges fuscæ; rectrices nigræ, margine chalybeo, apice albido.

jugularis. 7. C. subgrisea, subtus lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.

Certhia philippensis minor. *Briff. av. 3. p. 616. n. 6. t. 33. f. 5.*

Petit grimpereau des Philippines. *Buff. hist. nat. des ois. 5^r. p. 509. planch. enlum. n. 576. f. 3.*

Habitat in insulis Philippinis, præcedente minor, 3½ pollices longa; an varietas præcedentis?

Rostrum, pedes & unguis nigricantes.

cærulea. 8. C. cærulea, fascia oculari, gula, remigibus rectricibusque nigris. *Mus. Ad. Fr. 2. p. 22. Scop. ann. I. p. 53. n. 61.*

Certhia cayanensis cærulea. *Briff. av. 3. p. 626. n. 12. t. 31. f. 4.*

Avis Hoitzilin, papilio vocata. *Seb. mus. I. t. 61. f. 5.*

Variété de Guitguit noir & bleu. *Buff. hist. nat. des ois. 5^r. p. 531.*

Certhia of Guiana. *Bancr. guj. p. 164.*

Blue Creeper. *Edw. av. I. t. 21. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 725. n. 27.*

Habitat in Cayenna, nidum retortæ forma ex culmis grammum struens, & subtus hiantem ex debilium ramusculorum apice suspendens; 4 pollices longa.

brasiliæ. 41. C. nigra, vertice viridi-aureo, uropygio, gula, juguloque violaceis, pectore ex purpureo badio.

Certhia brasiliensis violacea. Briss. av. 3. p. 661. n. 30.
t. 32. f. 4.

Guit-guit noir & violet. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 541.
Black and violet Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 730. n. 31.
Habitat in Brasilia, reguli cristati magnitudine, $3\frac{1}{3}$ pol-
lices longa.

Dorsum inferius, tectrices alarum minores, & caudæ
superiores, margo caudæ violacea; femora badia.

variega- 42. C. cæruleo, nigro, flavo & albo undulata, subtus crocea,
ta. vertice rubro, occipite cæruleo.

Certhia americana varia. Briss. av. 3. p. 665. n. 32.
Avicula americana, variis coloribus picta. Seb. mus. 2.
t. 3. f. 3.

Guit-guit varié. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 540.
Variegated Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 729. n. 30.
Habitat in America, 5 pollices longa.
Genæ & area infraocularis ex cæruleo & albo mixta.

cayana. 9. C. viridis nitida, subtus albo-striata, rectricibus viridi-
bus : lateralibus interius nigricantibus.

Certhia viridis Cayennensis. Briss. av. 3. p. 636. n. 17.
t. 33. f. 2.

Certhia corpore supino viridi, gula lutea. Nov. comm.
Petrop. 2. p. 430. t. 14. f. 2.

Guit-guit vert tacheté. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 538.
Grimpereau vert tacheté de Cayenne. Buff. pl. enlumi. n.
682. f. 2.

Cayenne Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 728. t. 29.

Habitat in Cayenna, familiaris magnitudine, ultra 4
pollices longa.

Rostrum nigrum ; mandibulæ inferioris linea utrinque ;
genæ albæ ; macula prope oculos & gula (mari) rufæ ;
tectrices caudæ inferiores flavicantes, remiges nigri-
cantes, margine exteriore viridi, interiore griseo ;
pedes cum unguibus cinerei.

chaly- 10. C. viridis nitens, pectore rubro : fascia antica chalybea.
bea, Certhia torquata Capitis bonæ spei. Briss. av. 3. p. 643.
n. 20. t. 32. f. 1.

Sovi-manga à collier. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 502.
Grimpereau du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum.
n. 246. f. 3.

Purple indian Creeper. Edw. glean. t. 265.

Collared Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 709. n. 10.

AVES PICÆ. Certhia.

Habitat ad Caput bonæ spei, egregie cantans, insectis & florum nectare vidiitans, 4½ pollices longa; an mas capensis?

Rostrum, pedes & unguis nigri; rectrices caudæ superiores viridi-aureæ; inferiores cum abdomine cinereæ; remiges griseæ; rectrices nigricantes apice griseæ, 10 medianæ margine exteriore viridi-aeneæ, interiore cinereæ.

afr. II. C. viridis, abdomine albo, pectore rubro, uropygio cœruleo.

Sovi-manga vert à gorge rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* p. 5. 514.

Red-breasted green Creeper. *Edw. glean.* t. 347.

African Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 717. n. 18.

β. C. abdomine cinereo, fasciculo plumarum flavarum subalari, lingua apice bifida.

γ. C. mento, gutture & pectore ex purpureo cœruleis, fascia pectorali rubra.

Habitat ad Caput bonæ spei, cantu lusciniæ, 4½ pollices longa.

Rostrum obscurum; corporis nitor aureo-aeneus; remiges majores & cauda obscure fuscæ; pedes nigri.

Spiza. 12. C. viridis, capite remigibusque nigricantibus.

Motacilla Spiza. Syst. nat. X. 1. p. 188. n. 27.

Certhia americana viridis atricapilla. Briss. av. 3. p. 634. n. 16.

Avicula americana altera. Seb. mus. 2. t. 3. f. 4.

Guit-guit vert & bleu à tête noire. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 534.

Black-headed Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 726. n. 28.

β. *Certhia brasiliensis viridis atricapilla. Briss. av.* 3. p. 633. n. 15.

Guitguit vert & bleu à tête noire, var. 1. *Buff. hist. nat. des ois.* 5. p. 535.

Grimpereau à tête noire du Brésil. *Buff. pl. enlum.* n. 578. f. 2.

Green black-cap Flycatcher. *Bancr. Guj.* p. 182. *Edw. av.* 1. t. 25. f. 1.

Schwarzplattige Spielart des hochbeinigen Bienenfressers. *Merr. Beytr.* 1. t. 5.

γ. *Certhia brasiliensis viridis. Briss. av.* 3. p. 631. n. 14.

Grimpereau vert du Brésil. *Buff. pl. enlum.* n. 578. f. 1.

Guit-guit vert & bleu à gorge blanche. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 536.*

Blue headed green Fly-catcher. *Edw. av. I. t. 25. f. 2.*

♂. C. tota viridis.

Guit-guit tout vert. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 527.*

Grimpereau vert de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 682. f. 1.*

Allgreen Creeper. *Edw. glean. t. 348.*

Habitat in America meridionali, 5ⁱ pollices longa, rostro, naribus, pedibus micropi affinis.

Caput & gula nigra; in ♂. gula viridis; in ♀. vertex cœruleus, gula alba; ♂. tota viridis.

Spérata. 13. C. purpurea subtus coccinea, capite, gula, uropygioque purpureis.

Certhia philippensis purpurea. *Briss. av. 3. p. 655. n. 27. t. 31. f. 2. 3.*

Sovi-manga marron-pourpré à poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 497.*

Grimpereaux des Philippines. *Buff. pl. enl. n. 246. f. 1. 2.*
Red-breasted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 706. n. 8.*

β. C. gula violacea.

Grimpereau troisième de l'île de Luçon. *Sonner. it. p. 63. t. 30. D.*

Sovi-manga à gorge violette & poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 499.*

Habitat in insulis philippinis, 4 pollices longa, canit lusciniæ.

Rostrum nigrum, basi albicans, lingua surcata brevius; abdominis pars posterior ex flavicante olivacea; tectrices alarum minores violaceæ & viridi-aureæ, mediae fuscæ apice badiæ, majores cum remigibus fuscæ margine rufæ; cauda nigra, nitore chalybeo, margine exteriore violaceo aureo-nitente; pedes cum unguibus fisci; femina supra & infra olivacea.

In β. caput pallide virens; dorsum cum tectricibus alarum spadiceum; uropygium cum cauda chalybeum; caudæ tectrices inferiores virides.

Senega- 14. C. nigro-violacea, vertice gulaque viridi-aureis, pectori coccineo.

Certhia senegalensis violacea. *Briss. av. 3. p. 660. n. 29. t. 34. f. 2.*

Sovi-manga violet à poitrine rouge. *Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 500.*

Senegal Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 709. n. 9.*

*Habitat ad fluvium Senegal, 5 pollices longæ.
Rostrum nigrum; juguli, pectorisque pennæ basi nigrae,
medio viridi-aureæ, apice coccineæ; alæ & cauda fuscæ;
pedes cum unguibus nigricantes.*

- purpu- 43. C. tota purpurea.
rea. *Certhia virginiana purpurea. Briss. av. 3. p. 654. n. 26.
Avis virginiana phœnica de Atototl dicta. Seb. mius. I.
t. 72. f. 7.
Oiseau pourpré à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des ois.
5. p. 526.
Purple Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 723. n. 25.
Habitat in Virginia, 4½ pollices longa, egregie cantans.*
- guttura- 45. C. nigricans, gutture viridi-nitente, pectore purpureo-
lis. *Certhia brasiliensis nigricans. Briss. av. 3. p. 659. n. 28. t.
23. f. 3.
Grimpereau brun du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 578. f. 3.
Oiseau brun à bec de grimpereau. Buff. hist. nat. des
ois. 5. p. 525.
Green-faced Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 723. n. 24.
Habitat in Brasilia, ultra 5 pollices longa.
Rostrum pedesque nigri; frons viridi-aurea; pectoris
pennæ basi ex atro fuscæ, medio ex violaceo virides,
apice rubræ; rectrices alarum minores purpureæ.*
- Pinus. 16. C. flava supra olivacea, alis cæruleis fasciis duabus albis.
*Parus americanus. Briss. av. 3. p. 576. n. 15.
Figuier des sapins. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 296.
Pine-Warbler. Arct. zool. 2. p. 412. n. 318. Lath. syn.
II. 2. p. 483. n. 107.
Pine-creeper. Catesb. carol. I. p. 46. t. 46. Edw. glean.
t. 277. f. 2.
Habitat æstate in Americæ septentrionalis, Carolinæ
præsertim & Pensilvaniæ pinetis, 4½ pollices longa.
Coronæ nigra; pedes cum rostro fuscæ; abdomen & crissum
albūm; rectrices fuscae, extimæ extus albæ. Femina
tota fusca.*
- cruenta- 17. C. nigro-cærulescens, subtus alba, vertice, cervice,
ta. dorso uropygioque rubris.
*Certhia bengalenfis. Briss. av. 3. p. 663. n. 31.
Sovi-manga rouge, noir & blanc. Buff. hist. nat. des ois.
5. p. 514.*

Black, white and red Indian Creeper. *Edw. av. 2. t. 81.*
 Red-spotted Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 735. n. 40.*
Habitat in Bengala, 3 $\frac{1}{4}$ pollices longa.
Rostrum pedesque nigri.

flaveola. 18. *C. nigra subtus lutea, superciliis exalbidis, rectricibus extimis apice albis.*

Certhia f. faccharivora jamaicensis. Briss. av. 6. app. p. 117. n. 33.

Sucrier. *Buffon hist. nat. des ois. 5. p. 542.*

Black and yellow Creeper. *Edw. av. 3. t. 122. Lath. syn. I. 2. p. 737. n. 42.*

B. Certhia martinicana f. faccharivora. Briss. av. 3. p. 611. n. 3. t. 34. f. 5.

Luscinia f. Philomela e fusco & luteo varia. Sloan. jam. 2. p. 307. t. 259. Raj. av. p. 187. n. 45.

Yellow bellied Creeper. *Edw. glean. t. 362. f. 3.*

γ. Certhia bahamensis. Briss. av. 3. p. 620. n. 8.

Bahama Titmouse. *Catesb. Car. I. t. 59.*

Bahama Creeper. *Arct. zool. 2. p. 285. n. 175.*

Habitat in insulis Americæ mediæ vicinis, reguli circiter magnitudine, infelix visitans, succumque ex facchari cannis fugens.

langui- 44. *C. sanguinea, remigibus caudaque nigris, abdomine obscuræa.*

Crimson Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 739. n. 43.*

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa.

Rostrum obscurum; remigum secundiarum margo badius; rectrices acuminatae, scapis albis; pedes nigri.

virens. 45. *C. olivacea, remigum rectricumque margine flavo.*

Olive-green Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 740. n. 44.*

Habitat in insulis Sandwich, 5 pollices longa; an femina sanguinæ?

Rostrum pedesque obscuri.

rubra. 46. *C. rubra, alis caudaque nigris, criffo albo.*

Scarlet Creeper. *Lath. syn. I. 2. p. 740. n. 45.*

Habitat in insula maris australis, vix 4 pollices longa.

Rostro, pedibus & unguibus nigris, abdominis parte inferiore alba distincta a coccinea; an satis?

- cinna- 47. C. Cinnamomea subtus albá.
 momea. Cinnamom Creeper. *Latham syn.* I. 2. p. 740. n. 46.
 Rostrum nigrum; cauda c. familiaris; pedes obscuri; longitudo 5 pollicum.
- macassa- 48. C. viridi-aurea; subtus ex nigricante fusca.
 riensis. Polytmus indicus. *Briff. av.* 3. p. 675. n. 6.
 Avis Tsicæ indica orientalis. *Seb. mus.* I. p. 100. t. 63. f. 3.
 Macassar Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 741. n. 47.
Habitat in insulis Bally & Macassar, 4½ pollices longa.
 Rostrum albidum; cauda viridi-aurea; pedes cum ungibus nigri.
- Indica: 49. C. cærulea, gutture albido.
 Polytmus cæruleus indicus. *Briff. av.* 3. p. 682. n. 10.
 Avis colubri orientalis. *Seb. mus.* 2. p. 20. t. 19. f. 2.
 Indian Creeper. *Latham syn.* I. 2. p. 741. n. 48.
Habitat in India, 4½ pollices longa.
 Rostrum pedesque nigri.
- amboi- 50. C. cinerea, subtus viridis, capite colloque flavis, pectore
 nensis. rubro, alis nigris.
 Polytmus amboinensis. *Briff. av.* 3. p. 685. n. 12.
 Avis amboineris, Tsicæ vel Kakopit dicta. *Seb. mus.* 2.
 p. 62. t. 62. f. 2.
 Amboinan Creeper. *Latham syn.* I. 2. p. 741. n. 49.
Habitat in Amboina, 2¾ pollices longa.
 Rostrum flavicans.
- mexica- 51. C. rubra, gutture viridi, remigum apice cærulecente,
 na. Trochilus coccineus. *Syst. nat.* VI. p. 29. n. 76. 3.
 Certhia rubra mexicana. *Briff. av.* 3. p. 651. n. 24.
 Avicula mexicana s. Hoitzillin. *Seb. mus.* I. p. 70. n. 6.
 Oiseau rouge à bec de grimpereau. *Buffon hist. nat. des ois.*
 5. p. 522.
 Red Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 721. n. 23.
- β. Certhia mexicana rubra atricapilla. *Briff. av.* 3. p. 653.
 n. 25.
 Avicula de tatac ex nova Hispania. *Seb. mus.* I. p. 74. t.
 70. f. 8.
 Colius. *Moehring gen. av.* 16. p. 36.
 Grimpereau rouge à tête noire du Mexique. *Buff. hist.*
nat. des ois. 5. p. 524.
Habitat in nova Hispania, 4⅓ pollices longa.

Rostrum, femora, pedes & unguis flava; in β. caput nigrum; rectrices alarum superiores aureæ.

cinerea. 52. *C. cinerea*, uropygio & tectricibus alarum viridibus, remigibus fuscis, abdomine flavicante, crasso albo, cauda nigra.

Cinereous Creeper. *Lath. syn.* I. 2. p. 721. n. 22.

Habitat ad Caput bonæ sphei, 9 pollices longa.

Rostrum linguæ æquale, & pedes nigri; mandibulæ inferior utrinque stria flavicante; dorsi pars inferior viridis; pectoris & abdominis medio viror admixtus; cauda cuneiformis; rectrices 2 intermediæ 2 $\frac{1}{4}$ pollicibus reliquis longiores.

pulchella. 19. *C. rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi-nitente, pectore rubro.*

Certhia longicauda senegalensis. Briss. av. 3. p. 645. n. 21. t. 34. f. 3.

Avicula amboinenensis discolor. Seb. mus. 2. t. 7. f. 2.

Sovi-manga vert doré changeant à longue queue. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 519.

Grimpereau à longue queue du Sénégal. Buff. pl. enl. n. 670. f. 1.

Beautiful Creeper. Latham syn. I. 2. p. 715. n. 20.

Habitat ad Senegal fluvium, 7 $\frac{1}{4}$ pollices longa.

Rostrum, pedes & rectrices nigricantes, hæ margine aureæ; 2 intermediæ 2 $\frac{1}{2}$ pollicibus reliquis apice rotundatis longiores; abdomini candor admixtus; remiges cum tectricibus alarum majoribus fuscæ.

famosa. 20. *C. rectricibus intermediis 2 longissimis, corpore viridi-nitente, axillis luteis, loris nigris.*

Certhia longicauda Capitis bonæ spei. Briss. av. 3. p. 647. n. 22. t. 34. f. 1.

Trochilus afer. Syst. nat. X. 1. p. 119. n. 2.

Grand Sovi-manga vert à longue queue. Buffon hist. nat. des ois. 5. p. 521.

Grimpereau à longue queue du Cap de bonne espérance. Buff. pl. enlum. n. 83. f. 1.

Famous Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 720. n. 21.

Habitat ad Caput bonæ sppei, 9 pollices longa.

Rostrum, pedes cum unguibus, & cauda nigra; rectrices 2 intermediæ 2 $\frac{1}{2}$ pollicibus longiores, & utrumque reliquo margine tantum exteriore viridi-aureæ; tectrices alarum majores, remigesque nigricantes, margine

virides. Femina ex virente fuscæ, subtus flavicans; uropygio viridi, alis caudaque ex atro fuscis.

philippi- 21. C. restricibus intermediis 2 longissimis, corpore subgriseo, virescente, subtus albo-flavescens.

Certhia Philippensis. Briff. av. 2. p. 613. n. 4. t. 30. f. 2.

Grimpereau des Philipines. Buff. pl. enlum. n. 576. f. 1.

Grimpereau second de l'île de Luçon. Sonner. it. t. 30. B.

Philippine Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 711; n. 12.

Habitat in insulis Philippinis, 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum & pedes cum unguibus nigri; lingua tubulosa, furcata; remiges fuscæ, margine pallidiori; restrices 2 intermediae nigrae cureo-nitentes; ceteræ nigricantes apice albæ.

violacea. 22. C. restricibus intermediis 2 longissimis, corpore violaceo nitente, pectori abdome que luteis.

Certhia longicauda minor Capitis bonæ spei. Briff. av. 3. p. 649. n. 23. t. 33. f. 6.

Sovi-manga à longue queue & à capuchon violet. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 517.

Petit grimpereau à longue queue du Cap de bonne espérance. Buffon pl. enlum. n. 670. f. 2.

Violet-headed Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 718. n. 19.

Habitat ad Caput bonæ spei, ultra 6 pollices longa; nidum struens artificiosum laxum ex materiis sericeis, currucariae affinis, at rostro longiori.

Rostrum, pedes & unguis nigricantes; dorsum inferius, uropygium & testrices caudæ superiores olivacea; alarum inferiores griseæ, superiores majores cum remigibus fuscæ; cauda cuneiformis ex atro fuscæ.

zeyloni- 23. C. pileo viridi, dorso ferrugineo, abdomine flavo, ca. gula uropygioque azureis.

Certhia Philippensis olivacea. Briff. av. 3. p. 623. n. 10. t. 34. f. 4.

Grimpereau olive des Philippines. Buff. pl. enl. n. 576. f. 4.

Sovi-manga olive à gorge pourpre. Buffon hist. nat. des ois. 5. p. 506.

Grimpereau premier de l'île de Luçon. Sonner. it. t. 30. A.

β. C. viridis subtus alba, mento, gula, pectori, dorso aliisque fuscis, cauda nigra.

Habitat in insulis Philippinis, 4, β. 4 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum subulatum, nigrum, longitudine capitis; dorsum ex ferrugineo-olivaceum; remiges fuscæ, apicis marginé

pallido; rectrices æquales, nigricantes: extimis 1, 2 apicis marginæ albido; pedes nigri.

cyanæa. 24. *C. cærulea*, fascia oculari, humeris, alis caudaque nigris, pedibus fuscis.

Certhia brasiliensis cærulea. Briss. av. 3. p. 628. n. 13. t. 31. f. 5.

Avicula de Guit-guit ex insula Cuba. Seb. mus. I. p. 96. t. 60. f. 5.

Guitacoereba. Marcgr. bras. 212. Raj. av. p. 83. n. 11. Will. orn. p. 239. c. 20.

Guit-guit noir & bleu. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 529.

Grimpereau du Brésil. Buff. pl. enl. n. 83. f. 2.

Black and blue Creeper. Edw. glean. t. 264. f. 1. Lath. syn. I. 2. p. 724. n. 26.

Habitat in Brasilia & Cayenna, 4½ pollices longa.

Rostrum, occiput & ungues nigra; lingua rostri longitudine, ciliata; vertex beryllinus; remigum latus interius & rectrices alarum inferiores sulphurea; feminae alæ subtus ex flavicante cinerea.

Lotenia. 25. *C. cœrulea*, fascia pectorali rubro-aurea; loris atris.

Certhia madagascariensis viridis. Briss. av. 3. p. 641. n. 19. t. 33. f. 4. 5.

Angalà-Dian. Buff. hist. nat. des ois. 5. p. 510.

Grimpereau vert de Madagascar. Buff. pl. enl. n. 575. f. 2. 3.

Loten's Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 715. n. 16.

Habitat in Madagascar & Zeylon. I. G. LOTEN p. m.

Gubernator Zeylon. qui hortum botanicum primus in India condidit, & tot rariss avibus me aliquo dotavit. Nidum struit forma calycis ex lanugine plantarum, 5-6 ova parvæ, ab araneæ specie aliquando expulsa, 5½ pollices longa, colore varians.

Rostrum subulatum nigrum, capite duplo longius; lingua apice compressa; caput, collum, dorsum, uropygium, rectrices caudæ superiores, alias cœruleo-nitentia, alias viridi-aurea; pectus, abdomen & crissum splendide nigra, in femina sordide alba, nigromaculata, rarius abdomen fuscum; fascia pectoralis ignita vel violacea; rectrices æquales, remigesque nigrae; rectrices alarum minores violaceæ, mediae viridi-aureæ, majores nigrae, margine exteriori viridi-aureæ.

omnico- 53. *C. viridis*, ovis generis coloribus intermixta.

lor. *Avis zeylonica omnicolor.* Seb. mus. I. t. 69. f. 5.

Falcinellus omnicolor zeylanicus. Klein ord. av. p. 107. n. 8.

Greengold Creeper. Lath. syn. I. 2. p. 716. n. 17.

Habitat in Zeylon, 8 fere pollices longa, ab araneæ majori specie infestata.

Nitor aureus; rostrum 1 1/2, cauda 2 1/4 pollices longa.

caffra 54. C. fusca, pectore abdomineque pallidis, rectricibus intermediis longioribus. *Mantiss. pl. alt. p. 525.*

Habitat ad Caput bonæ spei, turdi magnitudine, & rostro duplo longiori.

Rostrum nigrum, parum compressum, nonnihil incurvum; gula pallida, pilis nigris hirsuta, vropygium ex flavescente virescens; crissum flavissimum; cauda nigra, cuneata, longitudine corporis; rectricibus quatuor mediis triplo longioribus, intermediis 2 longissimis; remiges nigrae.

66. TROCHILUS. *Rostrum subulato-filiforme, apice tubulato, capite longius: mandibula superior vaginans inferiorem.*

Lingua filiformis, filis duobus coalitis tubulosa.

Pedes ambulatorii.

* *curvirostres.*

paradiseus. 1. Tr. ruber, alis cœruleis, capite cristato, rectricibus intermediis longissimis..

Polytmus mexicanus longicaudus ruber cristatus Briss. av. 3. p. 692. n. 16.

Mellivora avis cristata cum duobus pennis longis in cauda. Seb. mus. 1. p. 67. t. 61. f. 4.

Colibri huppé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 54.

Paradise Humming Bird. Lath. syn. I. 2. p. 745. n. 1.

Habitat in nova Hispania, 8 1/2 pollices longa.

Rostrum pedesque nigri; remiges testricesque alarum cœruleæ.

galeritus. 23. Tr. viridi-aureus, remigibus rectricibusque fuscis, crista purpurea. *Mol. hist. nat. Chil. p. 219.*

Habitat in regno Chilensi.

Corpus subtilis colore auroræ; collum dorsumque viridia; tota avis auri nitore resplendet.

exilis. 24. Tr. ex virescente fuscus, coccineo nitens, remigibus caudaque nigris, crista basi viridi apice aurea.

Hummingbird of a black colour. Bancr. G. j. p. 165.

Little Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 764. n. 29.

Habitat in Guiana, 1 $\frac{1}{2}$ pollices longa, & vix 50 grana pondere æquant.

Rostrum nigrum.

Pella. 2. Tr. ruber, rectricibus intermediis longissimis, capite fusco, gula aurata uropygioque viridi.

Polytmus surinamensis longicaudus ruber. *Briff. av.* 3. p. 690. n. 15.

Grand Colibri. *Fermin Surin.* 2. p. 195.

Colibri topaze. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 46.

Colibri de Cayenne, dit le Topaz. *Buff. pl. enlum.* n. 599. f. 1.

Long-tailed red Hummingbird. *Edw. av.* 1. t. 32.

Topaz Hummingbird. *Latham syn.* I. 2. p. 746. n. 2.

Habitat in Surinamo, 6 pollices circiter longus.

Rostrum, caput & cervix nigra; pectus roseum; dorsum teætricesque alarum ex aurantio rubent; remiges & intermediæ rectrices purpureæ; reliquæ aurantiæ; femina fere tota viridi-aurea.

supercili- 3. Tr. fuscus nitens, rectricibus intermediis longis, abdomine liosus, subincarnato, superciliis albis.

Polytmus cayanensis longicaudus. *Briff. av.* 3. p. 686. n. 13. t. 35. f. 5.

Brin blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 49.

Colibri à longue queue de Cayenne. *Buff. pl. enl.* n. 600. f. 3.

Supercilious Hummingbird. *Lath. syn.* I. 2. p. 747. n. 3. *Habitat in Cayenna*, 6 pollices non adsequens.

Rectrices 2 intermediæ pollice reliquis longiores, media parte fusco nitentes, altera albæ; reliquæ basi fuscæ, altera parte nigræ, apice nigro, albo marginato; pedes & unguis fusi.

cyanu- 25. Tr. viridis, subtus cinereus, fronte, gutture, rectricibus que duabus intermediis longioribus cæruleis.

Trochili, aviculae omnium minime, in sola America, & si duas excipias, quæ versus septentrionaliter migrant, sola meridionali obviæ, pedibus rastroque debilibus, nimbis minutis, lingua emissili, rectricibus caudæ 10, coloribus nitidissimis conspicuæ; audaces & pugnaces, volando velocissimæ, suspensa in aere vicem capiunt, nectar e floribus fugentes, insæcta quoque deglutientes, quorum quippe reliquias in ventriculo invenit CL. Brandis; alarum motu magis fororæ, quam vox, gragaria, nidum hemisphaericum ex lanugine tharsi eleganter struant, & ab arborum ramis inter folia latenter suspendunt; era & alba, pisi magnitudine parvunt, quibus mas & femina alternativim incubant; juniores ab araneis infestatae, in Americæ incolis piñaris adhibitæ; aqua e siphonis explosa humectatae captantur; hibernare traduntur.

Polytmus mexicanus longicaudus. Briss. av. 3. p. 688. n. 14.
Avis Yayauquitotl. Seb. mus. I. p. 84. t. 51. f. 7.
Blue tailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 749. n. 5.
Brin bleu. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 51.
Habitat in nova Hispania, ficedulæ magnitudine, 8 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum flavicans; rectrices, quo extiores, eo breviores;
intermediæ extimus ultra 2 pollices longiores; pedes
flavi.

Polytmus. 4. *Tr. virescens, rectricibus lateralibus longissimis, pileo*
rectricibusque fuscis.

Polytmus viridans, aureo varie splendens, pennis binis
uropygii longissimis. Brown. jam. 475.

Mellifuga jamaicensis atricapilla, cauda bifurca. Briss. av.
3. p. 729. n. 19.

Oiseau-mouche à longue queue noire. Buff. hist. nat. des
ois. 6. p. 39.

Longtailed Hummingbird. Alb. av. 3. t. 49.

Longtailed black cap Hummingbird. Edw. av. I. t. 34.
Bancr. Guj. p. 169.

Black capped Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 748. n. 4.

Habitat in Jamaica & America australi, 9 $\frac{1}{2}$ pollices longa.

Rostrum flavum, apice nigrum; irides flavæ; cervix nigra;
alarum margo albus; rectrices alarum, remigesque ex
violaceo fuscae; cauda bifurca, rectricibus inæqualibus,
nigricantibus; pedes nigri.

Forktailed. 5. *Tr. viridis, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectri-*
cibusque cæruleis.

Polytmus major nigricans aureo varie splendens, pennis
binis uropygii longissimis. Brown. jam. p. 475.

Mellifuga jamaicensis, cauda bifurca. Briss. av. 3. p. 728. n. 18.

Oiseau-mouche à longue queue, or, vert & bleu. Buff.
hist. nat. des ois. 6. p. 38.

Long tailed green Hummingbird. Edw. av. I. t. 33.

Forktailed Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 750. n. 6.
Habitat in Jamaica, ultra 7 pollices longus.

Rostrum, pedesque nigri; corpus subtus album; remiges
ex violaceo fuscae, 3 corpori proximæ viridi-aureæ;
rectrices extimus 3 pollicibus longiores, reliquæ, quo
interiores, eo breviores.

turcatus. 26. *Tr. viridi-aureus, rectricibus extimus longioribus, dorso*
superiore, pectore & rectricibus alarum minoribus splen-
dide violaceis, aliis caudaque nigris.

- Mellisuga jamaicensis violacea, cauda bifurca. *Briff. av.*
 3. p. 732. n. 20. t. 37. f. 6.
 Oiseau-mouche violet à queue fourchue. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 37.
 Lesser fork-tailed Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 751. n. 7.*
Habitat in Jamaica, Brasilia & Cayenna, 4 pollices longus.
Rostrum nigrum; rectrices extimæ 1½ pollices longæ;
pedes cum unguibus nigricantes.

- macrourus- 27. Tr. viridi-aureus, capite & gutture violaceis, abdominis
 area alba, cauda bifurca chalybea.
 Mellisuga cayennensis, cauda bifurca. *Briff. av.* 3. p. 726.
 n. 17. t. 36. f. 9.
 Mellivora avis maxima. *Sloan. jam.* 2. p. 309. t. 264. f. 4.
Raj. av. p. 83. n. 3.
 Guainumbi. *Marcgr. bras.* 197. *Raj. av. p. 187. n. 41.*
Will. orn. p. 231. n. 3.
 Oiseau-mouche à longue queue couleur d'acier bruni. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 36.
 Cayenne forktailed Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 751. n. 8.*
Habitat in Jamaica, 6 pollices longus.
Rostrum pedesque nigri; rectrices extimæ 3¼, intermediae
 $1\frac{1}{4}$ *pollices longæ.*

- purpura- 28. Tr. viridis, vertice, alis caudaque bifurca purpureis,
 tus. torque cæruleo.
 Purple-crowned Honey-sucker. *Gen. of birds. p. 63. t. 8. f. 2.*
 Purple crowned Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 764. n. 27.*

- auratus. 29. Tr. viridi-aureus, mento, gutture & pectore rubro-aureis,
 abdome nigro.
 Garnet-throated Hummingbird. *Latham syn. I. 2. p. 752.*
 n. 9. t. 34.
 β. Tr. genis, nucha gulaque rubro-aureis, capite & corpore
 nigris viridi-nitentibus.
 Grenat. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 48.
 Longitudo 4¼, in β. 5 pollicum; rostrum pedesque nigri;
 feminæ mentum, guttur & pectus viridi-aurea.

- leucurus. 6. Tr. viridi-aureus, rectricibus æqualibus albis, collari rubro
 Polytmus surinamensis. *Briff. av.* 3. p. 674. n. 5.
 Collier rouge. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 59.
 Colibri à collier de Surinam. *Buff. pl. enl.* n. 600. f. 4.
 White-tailed Hummingbird. *Edw. glean.* t. 256. *Lath.*
syn. I. 2. p. 757. n. 17.

Habitat in Surinam, 4½ pollices longa.

Rostrum & pedes nigri; corpus subtus ex griseo album;
alæ obscure purpureæ; rectrices 8 exteriores albae,
extimæ 2 apice nigricantes.

- grami- 30. Tr. viridi-aureus, subtus albus, gutture smaragdino,
 neus. pectore nigro, cauda purpurea.
 Haufse col vert. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 58.*
 Black-breasted Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 16.*
 Feminæ in pectore areæ duæ albæ.

- viola- 31. Tr. violaceus, alis caudaque viridi-aureis.
 ceus. *Polytmus cayennensis violaceus. Briff. av. 3. p. 683. n. 11.*
t. 35. f. 3.
 Colibri violet. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 57.*
 Colibri violet de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 600. f. 2.*
 Violet Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 756. n. 15.*
Habitat in Cayenna, 4½ pollices longus.
 Rostrum pedeque nigri.

- macula- 32. Tr. viridi-aureus, subtus albus, colli lateribus rufis,
 tus. maculis colli viridi, pectoris nigra, caudæ subtus
 violaceis, albis & fuscis.
 Colibri à cravate verte. *Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 56.*
 Colibri à gorge verte de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 671. f. 1.*
 Green-throated Humming bird. *Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 14.*
 Magnitudo punctulati.

- puncta- 33. Tr. viridi-aureus, gutture & tectricibus alarum albo-
 latus. maculatis, remigibus ex violaceo fuscis, cauda ex
 virescente fusca apice alba.
Polytmus punctulatus. Briff. av. 3. p. 669. n. 2.
Hoizitziltototl. Fern. hist. mex. p. 705.
Zitzil ou colibri piqueté. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 50.
Spotted Hummingbird. Lath. syn. I. 2. p. 755. n. 13.
Habitat in nova Hispania, 5½-6 pollices longus.
 Rostrum & pedes cum unguibus nigri.

- albus. 34. Tr. viridi-aureus, subtus, ad latera colli, & rectricum
 6 exteriorum apices albus, cauda violacea.
 Colibri à queue violette. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 55.*
 Colibri à queue violette de Cayenne. *Buff. planch. enlum.*
n. 671. f. 2.
 Violet tailed Hummingbird. *Lath. syn. I. 2. p. 754. n. 11.*
Habitat in Cayenna, 6 pollices longus.
 Remiges ex violaceo fuscæ; pedes obscuri.

- jugula- 7. Tr. cærulescens, rectricibus æqualibus, collo subtus
ris. sanguineo.
Colibri à gorge carmin. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 56.
Red-breasted Humming-bird. Edw. glean. t. 266. f. 1.
Lath. syn. I. 2. p. 753. n. 10.
Habitat in Surinamo, $4\frac{1}{2}$ pollices longus.
Rostrum, vertex, occiput, abdomen, femora, cauda nigra;
pennarum margine cæruleo; tempora splendide rubra;
alæ virides nitore aureo; uropygium cæruleum; pedes
breves nigricantes.
- auran- 35. Tr. fuscus, capite aurantio, gula & pectore flavis, alis
tius. purpureis, cauda ferruginea.
Orange-headed Honey-sucker. Gen. of birds, p. 63. t. 8. f. 3.
Orange headed Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 764. n. 28.
- flavi- 36. Tr. viridis, fronte flava, remigibus primariis caudaque nigris.
frons. Yellow fronted Honey-sucker. Gen. of birds, p. 62. t. 8. f. 1.
Yellow-fronted Humming-bird. Latham syn. I. 2. p. 763.
n. 26.
- Thau- 8. Tr. viridis nitens, rectricibus æqualibus albo-fimbriatis:
mantias. extima exterius alba.
Polytmus. Briss. av. 2. p. 667. n. 1.
Avicula americana, Colubris. Seb. mus. I. t. 59. f. 5.
Guainumbi 6 species. Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 83.
n. 6. Will. orn. p. 232. n. 6.
Colibri. Buff. pl. enluni. n. 600. f. 1.
Petit Colibri. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 64.
Admirable Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 763. n. 25.
Habitat in America meridionali, parum ultra $2\frac{1}{2}$ pollices
longus.
Rostrum mandibula superior cum pedibus & unguibus nigra;
inferior alba; alæ fuscæ; in abdomine inferiore macula
alba; rectrices 2 intermedie totæ viridi-aureæ.
- domini- 9. Tr. viridis nitens, subtus subcinereus, rectricibus medio
cus. ferrugineis, apice albis.
Polytmus dominicensis. Briss. av. 3. p. 672. n. 4. t. 35. f. 4.
Vert perlé. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 62.
St. Domingo Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 762. n. 24.
Habitat in insula S. Domingi, vix ultra 4 pollices longus.
Rostrum pedesque fusi; color subtus margaritaceus; alæ
fuscæ, tinctu violaceo admisto; cauda subtus colore
chalybis politi.

- venustissimi*- 37 Tr. ruber dorso cæruleo , alis nigris.
fimus. Polytmus mexicanus cyaneus. *Briff. av.* 3. p. 681. n. 9.
Avicula mexicana cyaneo colore venustissima. *Seb. misf.*
I. p. 102. t. 65. f. 3.
Gros Colibri du Tertre antill. 2. p. 263.
Colibri bleu. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 61.
Crimson-headed blue Humming-bird. *Latham syn.* I. 2.
p. 762. n. 23.
Habitat in nova Hispania , regulo dimidiò minor.

margaritaceus. 38. Tr. viridi-aureus , subtus margaritaceus , cauda basi chalybea , medio ex purpurço fusca , apice alba : fascia ex atro fusca.

Plastron blanc. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 61.
Colibri de St. Domingue. *Buff. pl. enlum.* n. 680. f. 1.
Grey-necked Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 761. n. 22.
Habitat in insula S. Dominici , 4 pollices longus.

hirsutus. 39. Tr. viridi-aureus , subtus ex rufo albus , remigibus ex vio-
 laceofuscis , cauda nigricante apice alba , pedibus hirsutis.
Polytmus brasiliensis. *Briff. av.* 6. p. 670. n. 3.

Guainumbi 4ta species. *Marcgr. bras.* p. 197.
Guainumbi minor , rostro incurvo. *Raj. av.* p. 83. n. 4.
Will. orn. p. 232. n. 4.

Colibri à ventre rouillétre. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 63.
Rufous-bellied Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 760. n. 21.
*β. Trochilus subtus rufus , rectricibus obscuris , exterioribus
 altera parte rufis.*
Habitat in Brasilia , 3½ - 4 pollices longus.
*Rostri mandibula superior nigra ; inferior flava apice nigra ;
 pedes ad digitos usque pennati ochroleuci ; digitii nigri.*

multicolor. 40. Tr. fuscus subtus miniatus , vertice , mento , pectore &
 dorso medio viridibus , fascia oculari cærulea , cauda
 æquali.

Harlequin Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 760. n. 20.
*Longitudo 4½ pollicum ; fascia a rostro per oculos ad
 nucham usque , parte inferiore nigro marginata.*

cineraceus. 41. Tr. viridis nitens subtus cinereus , remigibus fuscis , caudæ
 rotundatae rectricibus 2 intermediis totis viridibus ,
 proximis duabus nigris , reliquis altera parte chalybeis ,
 altera albis.

Ash bellied Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 759. n. 19.
Longitudo 6 pollicum ; rostrum pedesque nigri.

Mango. 10. Tr. viridis nitens, rectricibus subæqualibus ferrugineis, abdomine atro.

Polytmus jamaicensis. Briss. av. 3. p. 679. n. 8. 35. f. 1,
Guainumbi 5 species. Marcgr. bras. 197.

Guainumbi minor, rostro nigro. Raj. av. p. 83. n. 5. Will.
orn. p. 252. n. 5.

Plastron noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 59.

Colibri de la Jamaïque & Colibri du Mexique. Buff. pl.
enlum. n. 680. f. 3. 2.

Mango Humming-bird. Alb. av. 3. t. 49. b. Lath. syn.
I. 2. p. 758. n. 18.

β . *Mellivora avis maxima*. Raj. av. p. 187. n. 43. Sloan.
jam. 2. p. 308. t. 264. f. 3.

Habitat in nova Hispania, Brasilia, insulisque S. Dominici
& Jamaïca, 4 pollices & ultra longus, nidum ex
gnissypio struens.

Corpus subtus nigrum; colore hoc per intermediate lineam
cæruleam a viredine separato; crissum album; remiges
ex violaceo fuscæ; rectrices 2 intermediæ, pedesque
nigri: Aliquando guttur album.

In β . corpus supra ex nigricante virens, pennis ad apicem
æneo-marginatis; mentum, guttur & pectus splendide
purpurea, stria media nigra; abdomen obscurum; cris-
sum utrinque fasciculo pennarum albarum stipatum; re-
ctrices 2 intermediæ obscure virides; reliquæ purpu-
reæ, apice nigrae.

holoseri. II. Tr. viridis, rectricibus æqualibus supra nigris, fascia
ceus. peectorali cærulea, abdomine nigro.

Polytmus mexicanus. Briss. av. 3. p. 676. n. 7. t. 35. f. 2.

Avis auricoma mexicana. Seb. mus. I. t. 99. f. 4.

Colibri vert & noir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 53.

Black-bellied green Humming-bird. Edw. av. I. t. 36.

Black-bellied american Humming-bird. Bancroft Guj.
p. 169.

Black-beilled Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 754. n. 12.

Habitat in nova Hispania & Guiana, 4 $\frac{1}{4}$ pollices longus.

Rostrum, cauda, pedesque nigri; caput, collum, & supra
corpus viridi-aurea; abdominis fascia alba, aut utrin-
que areæ duæ albæ.

gularis. 42. Tr. flavescens, gula uropygioque cæruleis, abdomine
albo, alis caudaque nigris. Miller illust. t. 20. A.
Habitat in India?

- fulvus. 43. Tr. fulvus, remigibus restricibusque atris subtus fuscœ centibus. *Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien.* I. p. 76.
Habitat in America meridionali, crassitie fringillæ, ultra 5 pollices longus.
Rostrum pedesque cornei; cauda 2 circiter pollices longa, restricibus 12 constans, an ideo cum sequente ad certiora forsan genus spectat?
- varius. 44. Tr. viridi-aureus, subtus ex fusco albicant, fascia pectoralis dupli ex viridi cyanea & sanguinea. *Maerter phys. Arb. der eintr. Fr. zu Wien,* I. 1. p. 75.
Habitat in America meridionali, pollicis humani crassitie, 4 ½ pollices circiter longus.
Rostrum pedesque nigri; remiges pallide fuscæ; rectrices caudæ superiores ex viridi cyaneæ; rectrices 12, 1 ¼ pollices longæ, fuscæ viridi adumbratæ, omnium, exceptis intermediis, apice albido.
- * * rectirostres.
- capeensis. 66. Tr. viridis, rectricibus intermediis longis, rectricibus alarum cæruleis. *Mantiss. pl. alt. 2. p. 525.*
Habitat ad Caput bonæ spei, hirundinis rusticæ magnitudine, sericeo nitens.
Remiges rectriceisque nigræ; haec æquales, præter intermedias triplo longiores, margine baseos sericeo-viridi; crissum nigrum cyaneo maculatum.
- Colubris. 12. Tr. viridi-aureus, rectricibus nigris: lateralibus tribus ferrugineis apice albis, gula flammea.
Mellisuga carolinensis, gutture rubro. Briss. av. 3. p. 716. n. 13. t. 36. f. 6. 5.
Tomineo mariana virescens, gutture flammeo. Pet. gaz. t. 3. f. 8.
Passer muscatus. Gesn. av. 655.
Guainumbi 1. Marcgr. bras. 196. Will. orn. 165. Raj. av. p. 82. n. 1.
Rubis. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 13.
Humming-bird. Catesb. Carol. I. p. 65. t. 65.
Red-throated Humming-bird. Edw. av. I. t. 38. Lath. syn. I. 2. p. 769. n. 35.
Red-throated Honey-sucker. Arct. zool. 2. p. 286. n. 176.
- Tomineo. 3. Tr. rectricibus subæqualibus basi ferrugineis apice albis, corpore supra fusco subtus albido. *Muf. Ad. Fr. 2. p. 23.*
Ourissia s. Tomineo. Clus. exot. 96.

Habitat in America, etiam septentrionali, ad Canadam usque, hieme tamen appropinquante in meridionalem redux, 3½ pollices longus.

Rostrum nigrum, ¾ pollices longum; mentum & gula coccinea, cum nitore vivacissimo aureo, in femina alba.

fimbriatus. 45. Tr. viridi-aureus, subtus griseus, cauda chalybea apice grisea, pectoris peunis albo fimbriatis.

Mellisuga cayennensis gutture nævio. Briff. av. 3. p. 706. n. 7. t. 36. f. 2.

Oiseau-mouche à gorge tachetée. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.

Oiseau-mouche tacheté de Cayenne. Buff. planch. enlum. n. 276. f. 2.

Spotted-necked Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 772. n. 36.

β. Tr. subtus albus, pectoris pennis griseo-marginatis, cauda tota ex virecente nigra.

Habitat in Cayenna, 4 pollices longus.

Rostrum mandibula superior nigra, inferior albicans, apice nigra; rectrices 2 intermediae splendore æneo; pedes cum unguibus nigri.

rubineus. 46. Tr. viridi-aureus, gula rubro-aurea, alis caudaque rufis.

Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil. Buff. pl. enlum. n. 276. f. 4.

Rubis émeraude. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 31.

Mellisuga brasiliensis gutture rubro. Briff. av. 3. p. 720. n. 14. t. 37. f. 4.

Ruby-throated Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 768. n. 34.

Habitat in Brasilia & Guiana, 4 ½ pollices longus.

Rostrum, pedes & unguis nigri; rectrices alarum majores, remigesque margine ex violaceo fusca; rectrices margine ex viridi-aureo fusca; intermediae reliquis breviores.

auritus. 47. Tr. viridi-aureus, subtus albus, fascia infraoculari nigra, fasciculis (in mare) utrinque infra aures duobus pennarum violacearum, pedibus hirsutis.

Mellisuga cayennensis major. Briff. av. 3. p. 722. n. 15. t. 37. f. 3.

Oiseau-mouche à oreilles. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 32.

Violet-eared Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 767. n. 33.

β. Tr. fascia infraoculari purpurea, prope aures terminata area magna, infra quam macula alia ex viridi cærulea.

Habitat in Cayenna, 4 ½ fere pollices longus.

Rostrum pedeisque nigri, femora fusca; rectrices 4 intermediae nigrae, in cæruleum vergentes, reliqua alba;

pennæ fasciculorum 5-6, reliquis molliores & duplo longiores.

Ouriffia. 13. *Tr. viridi-auratus*, rectricibus subæqualibus fusco-aureis, remigibus nigris, abdомine cæruleo.

Mellisuga surinamensis, pectore cæruleo. *Briff. av.* 3. p. 711. n. 10.

Eméraude-amethyste. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 27.

Oiseau-mouche à poitrine bleue de Surinam. *Buff. pl. enl.* n. 227. f. 3.

Green and blue Humming-bird. *Edw. av.* I. t. 35. f. 2. *Lath. syn.* I. 2. p. 767. n. 32.

β. *Tr. viridis*, subtus cæruleus, menti macula aurantia, remigibus caudaque obscuris.

Habitat in Surinamo, vix 4 pollices longus.

Rostrum, pedes & unguis nigri; pectus, dorsi & abdominis pars superior cærulea; abdominis pars inferior, alæ & cauda fuscæ.

moschatus. 14. *Tr. viridi-aureus*, rectricibus æqualibus ferrugineis: extimis apice fuscis, remigibus nigris. *Syst. nat.* X. I. p. 120. n. 8. 12. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 24.

Mellisuga brasiliensis, gutture topazino. *Briff. av.* 3. p. 699. n. 3. t. 37. f. 1.

Avis Colubri Thaumantias. *Seb. mus.* I. p. 61. t. 37. f. 4.

Guainumbi 8 species. *Marcgr. bras.* 197. *Will. orn.* p. 232. n. 8. *Raj. av.* p. 83. n. 8.

Colibri Nr. 3. Fermin Surin. 2: p. 196.

Rubis-topaze. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 19.

Oiseau-mouche à gorge topaze du Brésil. *Buff. pl. enlum.* n. 227. f. 2.

Trochilus with a ferruginous tail. *Bancr. Guj.* p. 168.

Ruby-necked Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 779. n. 46.

Habitat in Guiana, Brasilia, Surinamo, Curaçao; 4 lineas ultra 3 pollices longus.

Rostrum, pedes & unguis nigricant; vertex & occiput colore rubini; guttur topazii; corpus subtus fuscum, qui tinctus etiam supra admistus; femina subtus ex griseo albicans, area ad peccus & jugulum aurea.

mellifugus. 15. *Tr. viridi-aureus*, rectricibus æqualibus cæruleis, remigibus atro-cærulescentibus, tibiis pennatis. *Mus. Ad. Fr.* 2. p. 23.

Mellisuga cayanensis. *Briff. av.* 3. p. 704. n. 6. t. 36. f. 3.

Colubri s. Florisuga. *Seb. mus.* 2. p. 42. t. 41. f. 2. 4.

Guainumbi 9 species. *Marcgr. bras.* 197. *Will. orn.* p. 232. n. 9. *Raj. av.* p. 83. n. 9.
Vert-doré. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 29.
Oiseau-mouche de Cayenne. Buffon pl. enl. n. 276. f. 3.
Habitat in Cayenna, 2 pollices & 10 lineas longus.
Rostrum, digitæ & ungues nigri; rectrices caudæ inferiores & crura ex griseo fusca; tibiae fusca.

Pegasus. 16. Tr. rectricibus basi virescentibus, corpore virescente aureo, subtus subgriseo, tibiis pennatis.

Mellisuga cayanensis, ventre griseo. Briss. av. 3. p. 709. n. 9. t. 36. f. 4.

Grey-bellied Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 778. n. 44.
Habitat in Cayenna; an varietas leucogastræ?

Rostrum, digitæ & ungues nigri; rectrices æquales nigro-purpureæ, lateralium apice griseo.

leucogaster. 48. Tr. viridi-aureus, subtus albus, cruribus fuscis, cauda nigra.

Mellisuga cayennensis ventre albo. Briss. av. 3. p. 707. n. 8. t. 36. f. 7.

Guainumbi 1 species. Marcgr. bras. 197. *Raj. av.* p. 82. n. 1. & p. 187. n. 49. *Will. orn.* p. 231. n. 1.

Cravate dorée. Buffon hist. nat. des ois. 6. p. 25.

Oiseau-mouche à cravate dorée de Cayenne. Buffon pl. enlum. n. 672. f. 3.

Gold-throated Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 777. n. 43.

Longitudo 3 $\frac{1}{4}$ pollicum; rostri mandibula superior nigra, inferior alba, apice nigra; cauda nitore chalybis; pedes & ungues nigri.

Strigatus. 49. Tr. fuscus, subtus albus: stria longitudinali viridi-aurea, pileo fusco, remigibus nigris, caudæ basi cinnamonomea, apice obscuro.

Brown-crowned Humming-bird. Latham syn. I. 2. p. 776. n. 42.

Habitat in insula Tobago, 3-4 pollices longus.

Rostrum & pedes nigri; nonnunquam stria longitudinalis fusca aut obscura; rectrices duæ intermediae ex cæruleo atræ; reliquæ rufæ, extrema tertia parte atræ, apice supra albæ.

obscurus. 50. Tr. cæruleus, vertice obscuro, mento & gutture viridi-nitentibus, dorso medio virescente, uropygio, aliis caudaque purpureis.

Dusky-crowned Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 776. n. 41.

Longitudo 4 $\frac{1}{2}$ pollicum; rostrum obscurum; testrices alarum ex purpurascente cæruleæ; dorsi pars inferior obscura purpuræ; pedes nigri.

bicolor. 51. Tr. smaragdino-aureus, capite gulaque cyaneis. *Colibri Nr. 2. Fermin surin. 2. p. 195.*

Saphir-émeraude. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 26.

Sapphire-and Emerald-Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 775. n. 40.

Habitat in Guadaloupe, mediae magnitudinis.

sapphiri- 52. Tr. viridi-aureus, jugulo & pectore sapphirinis, aliis nus. & testricibus caudæ superioribus fuscis, inferioribus, cauda ipsa & gula rufis.

Saphir. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 26.

Sapphire Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 775. n. 39.

β . Tr. pectore sapphirino, ventre albo, cauda ex cæruleo atra.

Habitat in Guiana.

Rostrum album, apice nigrum; abdominis pars inferior alba.

niger. 17. Tr. testricibus subæqualibus, corpore nigro subtus aurato, crasso albo, tibiis pennatis. *Mus. Ad. Fr. I. p. 18.*

Mellisuga dominicensis. Briss. av. 3. p. 702. n. 5. t. 36. f. 8.

Black Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 774. n. 38.

Habitat in insula S. Dominici, 2 $\frac{1}{4}$ pollices longus, aenigma mellisugi?

Rostrum, digitis & unguis nigri; corpus subtus ex albicante griseum; gula maculis minutis fuscis; cauda chalybea.

cyanoce- 53. Tr. viridi-aureus, capite, remigibus testricibusque cærophalus. leis, abdomine rubro. *Molin. hist. nat. Chil. p. 218.*

Habitat in Chili, nucis juglandis magnitudine.

Rostrum albidum; alis caudæque corpore triplo longiori admixta purpura.

amethyst- 54. Tr. viridi-aureus, subtus ex cinerascente & fusco varius, tinus. gutture amethystino, cauda furcata.

Petit oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne. Buff. pl. enlum. n. 672. f. 1.

Amethyste. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 16.

Amethystin. Humming-bird. Lath. syn. I. 2. p. 787. n. 59.

Habitat in Cayenna, colubris magnitudine.

Alæ breves.

viridissi- 55. Tr. viridi-aureus, abdome albo, cauda chalybea. mus. *Or-vert. Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 17.*

All-green Humming-bird. *Edw. glean.* t. 360. f. 1.
Lath. syn. I. 2. p. 786. n. 58.
Habitat in insula Tobago, 2 pollices longus.

- glauco- 56. Tr. viridi-aureus, fronte cœrulea, crïsso albo, re-
pis. migibus ex violaceo fuscis, pèdibus pennatis, cauda
chalybea subfurcata.
Mellisuga brasiliensis cauda bifurca. *Briss. av.* 3. p. 724.
n. 16. t. 36. f. 5.
Guainumbi major. *Raj. av.* p. 82. n. 2.
Marcgrave's second Humming-bird. *Will. orn.* p. 231.
n. 2.
Blue-fronted Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 786.
n. 57.
Habitat in Brasilia, 4½ pollices longus.
Rostrum nigrum; crura, tibiæ, & digitæ fusca.
- rufus. 57. Tr. rufus subtus exalbidus, vertice viridi-aureo;
guttare & pectore coccineo-aureis, remigibus ex
purpurascente fuscis.
Ruffed Honey-sucker. *Arct. zool.* 2. p. 290. n. 177.
Russnecked Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 783.
n. 56. t. 35.
Habitat in sinu Americæ Natka, 3½ pollices longus.
*Rostrum pedesque nigri; colli pennæ laterales nonnullæ
elongatæ mobiles, rectrices alarum obscure virescentes;
rectrices splendide rufæ acuminatæ: linea media lon-
gitudinali & apice nigris; cauda cunctata.*
*Feminæ corpus supra viridi-aureum; gula maculis modo
coccineis.*
- ornatus. 58. Tr. viridi-aureus, subtus nitente-fuscus, fascia uro-
pygii alba, crista (in mare) verticis & fasciculo pen-
narum infra aures utrinque rufo.
Hupecol. *Buff. hist. nat. des ois.* 6. p. 18.
Oiseau-mouche, dit Hupecol de Cayenne. *Buff. pl.
enlum.* n. 640. f. 3.
Tufted-necked Humming-bird. *Lath. syn.* I. 2. p. 784.
n. 55.
Habitat in Cayenna, *colubri potius minor.*
*Abdomen inferius album; guttur viridi-aureum; crista
capitis longa; pennæ fasciculorum angustæ, mobiles,
inæquales, ultra dimidium pollicem non longæ, ad
apicem macula viridi nitente notatæ.*

- puni- 59. Tr. pallide fuscus , crista cærulea.
ceus. Crested brown Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 784.*
n. 54.
Magnitudo cristati ; alæ & cauda obscuriores.
- cristatus. 18. Tr. viridis , alis fuscis , abdomine fusco cinereo ,
crista cærulecente , tibiis pennatis.
Mellisuga cristata. *Briff. av. 3. p. 714. n. 12. t. 37. f. 2.*
Oiseau-mouche huppé. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 22.*
Oiseau-mouche huppé de Cayenne. *Buff. pl. enlum. n. 227. f. 1.*
Green strait-billed Humming-bird. *Bancr. Guj. p. 168.*
Crested Humming-bird. *Edw. av. 1. t. 37.*
Crested green Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 783.*
n. 53.
Habitat in Cayenna , 3 pollices longus.
Rostrum & digiti nigri ; cauda ex violaceo nigra.
- longi- 60. Tr. viridi-aureus , gula smaragdina , alis rectricibus-
caudus. que fuscis , intermediis duabus longissimis.
Oiseau-mouche à raquettes. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 23.*
Racket-tailed Humming-bird. *Latham syn. I. 2. p. 782.*
n. 52.
*Longitudo 2' pollicum ; rectrices 2 intermediae 10 lineis
longiorcs , parte eminentia nuda , apice demum barbata.*
- Carbunc- 61. Tr. niger , capite , collo & pectore rubris , alis fuscis ,
ulus. cauda rufo-aurea.
Escarboucle. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 28.*
Carbuncle Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 782. n. 51.*
Habitat in Cayenna , rarus , paulo major.
Rostrum ad medium usque pennis tectum.
- cyanome- 62. Tr. ex albo & cæruleo varius , gula & pectore rubris.
las. Black and blue Humming-bird. *Bancr. Guj. p. 167.*
Lath. syn. I. 2. p. 782. n. 50.
*Habitat in Terra firma & insulis Caribæis , exili duplo
major.*
Remiges rectricesque magnæ , splendide nigræ.
- gujanen- 63. Tr. viridis , crista capitis & pectore rubris , remigibus
sis. rectricibusque ex viridi , rubro & purpureo variis.
Small green and crimson Humming-bird. *Bancr. Guj. p. 168.*
Gujana Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 781. n. 49.*

Habitat frequens in Guiana, 2 pollices longus.
Kostrum oculique splendidi nigri.

Tobaci. 64. Tr. viridi-nitens, fascia abdominalis femoribusque albis, crisslo pallide fusco, remigibus caudaque subfurcata ex cæruleo atris.

Tobago Humming-bird. *Lath. syn. I. 2. p. 781. n. 48.*

Habitat in insula Tobago, 4 pollices longus.

Rostrum obscurum, mandibula inferiore flava; pedes fuscæ.

elatus. 19. Tr. virescente aureus, rectricibus æqualibus ferrugineis apice nigris, pileo rubro cinctato.

Mellisuga americana, gutture topazino. *Briss. av. 3. p. 697. n. 2.*

Oiseau-mouche à gorge topaze de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 630. f. 1.*

Ruby-crested Humming-bird. *Edw. glean. t. 344. Lath. syn. I. 2. p. 720. n. 27.*

Habitat in Terra firma, Guiana, Cayenna, Tobago.
 Rostrum pedesque nigra; caput nigrum, pilei pennis in crisslam sanguineam elongatis; corpus olivaceum, subtus rufum, linea longitudinali alba; gula viridiorum; remiges purpurascentes; cauda rufa, terminata fascia nigra.

mellivo- 20. Tr. rectricibus nigris: lateralibus albis, capite cæruleo, dorso viridi, abdomine albo.

Mellisuga furinamensis torquata. *Briss. av. 3. p. 715. n. 11.*

Oiseau-mouche à collier, dit la Jacobine! *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 34.*

Oiseau-mouche, dit la Jacobine de Cayenne. *Buff. planch. enlum. n. 640. f. 2.*

White-bellied Humming bird. *Edw. av. I. t. 35. f. 1. Latham syn. I. 2. p. 765. n. 31.*

Habitat in Surinamo, ultra 4 pollices longus.

Rostrum & pedes cum unguibus nigri; collum cæruleonitens, cervicis annulus albus; remiges ex violaceo fuscae; cauda subfurcata; rectrices omnes apice nigre.

campy- 65. Tr. viridi-aureus subtus griseus, rectricibus lateralibus fuscis apice albis, remigum 3-4 scapis medio incurvis.

lopterus. Oiseau-mouche à larges tuyaux. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 35.*

AVES PICÆ. Trochilus.

- Oiseau-mouche à larges tuyaux de Cayenne. *Buff. pl. enl. n. 672. f. 2.*
- Brond-shafted Humming-bird. *Latham syn. I. 2. p. 765. n. 30.*
- Habitat in Cayenna, rarior, 4½ pollices longus.*
- ruber.* 21. Tr. rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo fusco submaculato.
- Mellisuga surinamensis. Briff. av. 3. p. 701. n. 4.*
- Oiseau-mouche pourpre. *Buff. Hist. nat. des ois. 6. p. 24.*
- Little brown Humming-bird. *Edw. av. I. t. 32. Bancr. Guj. p. 168. Lath. syn. I. 2. p. 778. n. 45.*
- Habitat in Surinamo & Gujana, ultra 3 pollices longus.*
- Corpus subius pallide badiuni, maculis ad pectus nigricantibus; temporum fascia longitudinalis fusca; pedes cum unguibus, rostrique mandibula superior nigra, inferior carnea, apice nigra.*
- mini-* 22. Tr. rectricibus lateralibus margine exteriore albis, corpore viridi nitente subtus albido.
- Mellisuga. Briff. av. 3. p. 695. n. 1. t. 36. f. 1.*
- Guainumbi 7 species. *Marcgr. bras. 197. Raj. av. p. 87. n. 44. Will. orn. 132.*
- Guainumbi minor, corpore toto cinereo. *Raj. av. p. 83. n. 7.*
- Le plus petit oiseau-mouche. *Buff. hist. nat. des ois. 6. p. 11. t. 1.*
- Le plus petit oiseau-mouche de l'Amérique. *Buff. pl. enlum. n. 276. f. 1.*
- Least Humming-bird. *Sloan. jam. 2. p. 307. n. 38. t. 264. f. 1. Edw. av. 105. t. 105. f. inf. Brown jam. p. 475. Latham syn. I. 2. p. 788. n. 60.*
- Habitat in America meridionali, insulisque vicinis, onium notarum avis minima, ut longitudine 1½ pollicem, pondere 20-25 grana æquet; exempli 6 granorum mentionem facit Beireis.*
- Rostrum nigrum; alæ ex violaceo fusca; rectrices ex cærulecente atræ, nitentes; 1, 1 totæ griseæ; 2, 2 a medio ad apicem griseæ; pedes cum unguibus fusi. Femina supra sordide fusca cum splendore vidi, subtus sordide alba.*









