



| | |
|-----------------|---|
| ชื่อไทย | มะม่วงป่า |
| ชื่อท้องถิ่น | มะม่วงกะล่อน (ประจวบคีรีขันธ์) มะม่วงขี้ไต (ภาคใต้) มะม่วงเทพรส (ราชบุรี) |
| ชื่อวิทยาศาสตร์ | <i>Mangifera caloneura</i> Kurz |
| วงศ์ | ANACARDIACEAE |

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะต้น ไม้ยืนต้น ไม้ผลัดใบ ขนาดกลาง สูง 20 - 25 เมตร ต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่อง เปลือกนอกสีน้ำตาลปนเทา แตกแบบสีเหลี่ยม เปลือกในสีเหลืองป่นทิ้งไว้จะเป็นสีน้ำตาลดำ

ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับหรือเวียนสลับ ใบรูปหอกขอบขนาน ฐานมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม กว้าง 3.5 - 8 เซนติเมตร ยาว 4.5 - 22 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง ใบอ่อนสีม่วงแดง

ลักษณะดอก ช่อดอกแบบแยกแขนง ช่อดอกตั้งขึ้นคล้ายช่อฉัตร ออกตามปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงอย่างละ 5 กลีบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่มีสมบูรณ์เพศ (เกสรฝ่อ) เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 5 อัน ดอกมีกลิ่นหอม

ลักษณะผล ผลแบบเมล็ดเดี่ยวแข็ง มีเนื้อผลมาก ผลดิบมีสีเขียว และมีสีเหลืองเมื่อผลแก่ มีลักษณะแบน สีขาวหรือเหลือง

ระยะเวลาออกดอกติดผล

ออกดอกเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ติดผลหลังออกดอก

เขตการกระจายพันธุ์

ในประเทศไทยสามารถพบได้ตามป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ และป่าดิบแล้ง

การใช้ประโยชน์

เนื้อไม้: ใช้ทำฟืน ทำโครงสร้างส่วนต่างๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน

เปลือก: เปลือกด้านในใช้เป็นสีย้อมผ้า

ใบ: ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสดได้

ผล: ผลดิบและผลสุก สามารถนำมารับประทานได้

แหล่งข้อมูล: กรมป่าไม้