


Myriapoda - stonožkovci

- hlava a homonomně segmentovaný trup (10 – 177 článků)
- 1 pár končetin na každém článku
- vzdušnice ektodermálního původu, na povrch stigmata, uvnitř chitinová výstelka intima
- vlhkomilné druhy

Chilopoda - stonožky

- půdní, endogeičtí, predátoři - kroužkovci, hmyz, pavouci
- trup homonomně segmentovaný (velikost 1 - 25 cm)
- na hlavě 1 pár tykadel, kusadla a 2 páry čelistí, 2 skupiny jednoduchých oček
- první končetiny trupu tvoří mohutné čelistní nožky (**maxillipedy**) s jedovou žlázou
- předposlední pár - **vlečné nožky** se smysl. receptory,
- poslední **gonopody**



Geophilus (zemnivka)
bez očí, tělo nitkovité



Scolopendra cingulata (stonoha pásovaná) Jižní Evropa, až 14 cm, bolestivě kouše (jedovatá)

Clinopodes flavidus (zemnivka žlutavá) slepá, půdní

Lithobius sp. (stonožka)

u nás cca 20 těžko odlišitelných druhů, střídání krátkých a dlouhých článků



Sympyla - stonoženky

- drobní, půdní, bez pigmentu a bez očí
- žíví se odumřelou i živou fytomasou
- 2. pář čelistí splývá **jako u hmyzu** ve spodní pysk
- trup s 12 články s končetinami, poslední pář končetin je změněn v nečleněné přívěsky se snovacími žlázami



Scutigerella immaculata (stonoženka bílá)


běžná pod kameny a v humusu



Paupropoda - drobnušky

- drobní, půdní, vysávají mycelia nižších hub
- trojvětevná tykadla, bez očí
- pouze 1 pár kusadel a nepárové **gnatocilarium** (= zadní okraj ústní dutiny), čelisti chybí
- hřbetní štítky splývají po 2, tělo s 9 - 11 články s končetinami
- bez dýchací a cévní soustavy

Tömöswaryho orgán
pravděpodobně
chemoreceptor



Paupopus huxleyi (drobnuška bledá)



Diplopoda - mnohonožky

- půdní epigeické druhy, často podkorní
- válcovité tělo nebo dorzovernárně zploštělé
- pouze pář kusadel, opět vytvořeno **gnatocilarium**
- tykadla jednoduchá, nevětvená
- krční článek bez končetin
- následující 3 čl. nesou po jednom páru
- zbývajících 6-150 čl. (tzv. zadečková část trupu) splývá po dvou v **diplosegmenty** – potom nesou 2 páry končetin



Polyxenus lagurus (chlupule podkorní)

2 mm, nesklerotizované měkké tělo



Glomeris pustulata (svinule lesní) schopnost dokonalé volvace, spíše na otevřených stanovištích





Polydesmus complanatus (plochule křehká)

v opadance vlhkých listnatých lesů,
dorzoventrálně zploštělé tělo, trupové články
mají postranní křídélka

čeled' **Julidae** - protáhlé dlouhé tělo kruhového průřezu,
telson většinou s ocáskem





Pancrustacea

Myriapoda

Pentastomida

Branchiura

Branchiopoda

Malacostraca

Copepoda

Mystacocarida

Remipedia

Cephalocarida

Ostracoda

Tantulocarida

Cirripedia


Hexapoda

„Crustacea“


PENTASTOMIDA - jazyčnatky

- červovité tělo; parazité dýchacích orgánů masožravců
- 5 výběžků – ústa a dva páry končetin

Linguatula serrata (jazyčnatka tasemnicová) 10 cm, v nosní a lebeční dutině psovitých šelem, larvální stádia zajíci a králíci




„CRUSTACEA“ - korýši



„Crustacea“



- tělo je kryto kutikulou někdy inkrustovanou CaCO₃ – krunýř
- vodní (moře, sladkovodní), suchozemští jen někteří (např. Isopoda); volně žijící i parazitičtí
- hlava: 1. článek-akron a 5 článků nesoucích antenuly a antény (tykadla), mandibuly (kusadla) a 2 páry maxil (čelisti); může být kryta carapaxem
- hruď (thorax): 3 čl., nesou maxilipedy (čelistní nožky), dál končetiny kráčivé nebo dýchací
- zadeček (abdomen) nese končetiny jen u rakovců (Malacostraca) – pleon, srůstem článků zadečku s posledním článkem může vzniknout pleotelson
- končetiny: a) jednovětné k lezení
b) dvouvětné

„Crustacea“ - korýši



- TS: trubicovitá, do střeva ústí hepatopankreas
- VS: metanefridia 2 páry: u báze tykadel na 2. článku antén (antenální) a na 2. článku maxil (maxilární)
- DS: žábry - epipoditové přívěsky na končetinách, nebo tenkostěnnou vnitřní vrstvou karapaxu, suchozemští dýchání vzdušnicovými plícemi
- CS: otevřená, u Decapoda srdce
- NS: původně žebříčková s nadhlavnovým gangliem a segmentálně uspořádanými páry ganglií na břišních provazcích, u rakovců mozkový ganglion
- smyslové orgány: složené oči a střední nepárové oko

- rozmnožování: **gonochoristé**, někdy partenogenetické larvy, vývoj přímý nebo přes larvu
- nauplius s naupliovým očkem a 3 páry končetin: antenuly, anteny a mandibuly
- zoea (u rakovců) s dlouhým, článkovaným pleonem a krátkým, neúplně článkovaným thoraxem




BRANCHIURA - kapřivci

- ploché terčovité tělo s tykadly přeměněnými v příchytné háčky, mandibuly přeměněny v bodavé ústrojí (stilet) a oba páry maxil v přísavky
- ektoparaziti ryb

Argulus foliaceus (kapřivec plochý)



video



BRANCHIOPODA - lumenonožci

- drobní sladkovodní - periodické tůně, slané vody ve vnitrozemí
- hrudní nožky lumenité - nesou žábry a filtruji potravu
- zadeček bez končetin s furkou
- larva nauplius



ANOSTRACA - žábronožky


NOTOSTRACA - listonožky

CONCHOSTRACA - škeblovky

CLADOCERA - perlonožky

ANOSTRACA - žábronožky

- periodické tůně
- laterálně zploštělé tělo (plavou hřbetem dolů), na hlavě oči na stopkách, mezi nimi naupliové očko, na zadečku furka
- hrudní nožky slouží k plavání, dýchání, filtrace potravy
- antény samců jsou zvětšené a slouží k uchopení samičky při kopulaci
- larva nauplius; vajíčka snesou i víceleté vyschnutí



Zástupci:

Eubranchipus grubii (žábronožka sněžní) →



video




Branchipus schaefferi (žábronožka letní)

Artemia salina (žábronožka solná)

NOTOSTRACA - listonožky

- periodické tůně
- tělo je dorzovertrálně zploštělé, na hřbetní straně kryté kožním záhybem tvořícím **hlavohrudní štít**
- mají 11 párů hrudních lumenitých končetin, na zadečku **furka**
- potrava - dravci, mrchožrouti, detritofágové

Lepidurus apus
(listonoh jarní)




Triops cancriformis
(listonoh letní)



CONCHOSTRACA - škeblovky

- periodické tůně
- tělo je zploštělé, uložené v dvouchlopňové skořápce, na bříše je otevřená
- na hlavě složené oči a naupliové očko
- pohyb pomocí mohutných antén těsně nad dnem, trhaný
- potrava drobné organizmy, zbytky rostlin, detrit
- larva nauplius

Limnadia lenticularis (škeblovka velká)
Cyzicus tetracerus (škeblovka oválná)



CLADOCERA - perlouchky

- tělo je laterálně zploštělé, dvouchlopňová skořápka nekryje hlavu, 1 složené oko + 1 naupliové očko
- pohyb veslovitý - dlouhé antény, antenuly zakrnělé s chemoreceptory
- potrava filtrací sestonu z vody (hrudní končetiny)
- dýchání epipodity
- zadeček s furkou
- heterogonie: partenogenetické samičky - haploidní vajíčka - samci - kopulace - vajíčka v ochranném obalu - ephippium - partenogenetické samičky
- vývoj většinou přímý bez larvy





video

Daphnia pulex hrotnatka obecná – menší stojaté vody

Daphnia magna hrotnatka veká – u dna

Bosmina longirostris nosatička obecná – dlouhé chobotky z antenul

Leptodora kindtii ramenatka velká – v letním planktonu rybníků a jezer, hrudní končetiny směřují dopředu k uchopení kořisti




MALACOSTRACA - rakovci

inkrustovaný krunýř

hlava (6 čl.), hrud' (8 čl.) a zadeček (7 čl.)

cévní a nervová soustava dobře vyvinutá, vylučovací
soustava maxilární nebo antenální žlázy, larva zoea →



NEBALIACEA – nebálie

reliktní skupina mořských korýšů, tělo kryté
dvojchlopňovým karapaxem



STOMATOPODA - ústonožci

draví korýši, 2. pár hrudních nožek upraven jako lapací
(jako kudlanky), Středozemní moře

Squilla mantis strašek kudlankový

BATHYNELLACEA – bezkrunýřky

slepí korýši v intersticiálních prostorách

Bathynella natans bezkrunýřka slepá, délka 1 mm, ve
zvodněných štěrkopíscích



ISOPODA – stejnonožci

- tělo klenuté, dorzovertrálně zploštělé hlava srůstá s hrudními články
- hrudní nožky kráčivé, nerozeklané; zadečkové dvouvětevné, lupínkovité k dýchání
- maxilární žlázy
- bez larvy
- mořští, sladkovodní a suchozemští



Asellus aquaticus (beruška vodní)


Oniscus asellus (stínka zední)

Porcellio scaber (stínka obecná)

zadečkové nožky přeměněny ve vzdušnicové plíce

Armadillidium vulgare (svinka obecná)

suchomilná, schopnost volvace



Armadillidium vulgare

AMPHIPODA – různonožci

- tělo laterálně zploštělé
- hrudní nožky 2. a 3. páru na konci rozšířené s drápkem; další hrudní kráčivé,
- na zadečku 3 páry dvouvětných obrvených plovacích nožek, 3 páry skádacích
- antenální žlázy
- bez larvy

Gammarus fossarum (blešivec potoční)

Gammarus roeselii (blešivec hřebenatý)

Stygobromus ambulans (srostlorep kráčivý)



tůně na J. Moravě

Niphargus aquilex (blešivec studniční)

bílý, slepý, podzemní vody



DECAPODA – desetinožci

- cephalothorax krytý **karapaxem**
- 3 páry hr. nožek **maxilipedy**
- 5 párů jednovětevných kráčivých **pereiopody**
- 3 páry mohou být klepítkovité
- larva zoea
- pohyb pomocí posledních 4 párů pereiopod, u krabů do strany

- **ASTACIDEA** - raci
- tělo sklerotizované, 3 páry hrud. končetin za čel. nožkami s klepety, oči na stopkách



video



Pontastacus leptodactylus – rak bahenní, klepeta dlouhá, štíhlá a hladká; z tehdejší Haliče přivezen jako náhrada za raka říčního, snáší vyšší znečištění



Astacus astacus – rak říční, klepeta krátká a na ostří se zuby, koncem 19. st. v Evropě téměř vymřel na račí mor (parazitická plíseň *Aphanomyces astaci*), čisté a chladné toky



Austropotamobius torrentium – rak kamenáč, jihoevropský druh, u nás na severní hranici, velmi vzácný, podobný raku říčnímu, ale je menší a má tupější rostrum

Orconectes limosus – rak pruhovaný, původem severoamerický druh zavlečený do Evropy, odolný vůči račímu moru (choroba původem také z Ameriky) a přenáší je na populace našich raků



CARIDEA (krevety)

zadečkové nožky plovací, bez inkrustace
tělního pokryvu

Palaemon squilla kreveta baltická,
Crangon crangon garnát obecný



PALINURA (langusty)

Bez klepet na hrudních končetinách.

Palinurus elephas langusta evropská 45 cm,
chutné maso abdomenu.



ANOMURA (poustevníčci)

Pagurus poustevníček spirálovitě stočený
zadeček vkládá do ulit plžů, klepeta
asymetrická.

[VIDEO](#)

BRACHYURA (krabi)

zkrácený trojúhelníkovitý zadeček, zahnutý
pod hlavohruď


Carcinus maenas krab obecný – Atlantické a
Středozemní moře, běžný

Eriocheir sinensis krab čínský Labe s lodní
dopravou, na klepetech plstovitě povlaky
Potamon fluviatile sladkovodní druh



COPEPODA - klanonožci

- tělo válcovité nebo kyjovité
- pohyb pomocí rozeklaných hrudních nožek
- velké antenuly, na hlavohrudi naupliové očko
- larva nauplius; plankton, detrit, paraziticky



Cyclopoida – buchlinky (A):

pohyb 4 páry hrudních nožek, pohyb skoky, v přestávkách klesají s roztaženými antenulami.

Calanoida – vznášivky (B) :

rotačním pohybem všech hlavových přívěsků jeden vaječný váček

Harpacticoida – plazivky (C) :

4 páry krátkých hrudních nožek, v intersticiálu

Parazité:


Ergasilus sieboldi (chlopek obecný) - přichycuje se anténami na žábra ryb.

Lernaea cyprinacea (červok kapří) na pokožce kaprovitých




OSTRACODA - lasturnatky

- u nás cca 100 druhů
- dvouchlopňová skořápka ledvinovitého pružným vazem
- pohyb 2 páry tykadel + hrudní nožky, lezou
- všežraví - zbytky rostlin, živočichů, detrit, živé organismy
- nauplius



Candonia candida (lasturnatka)


Notodromas monacha lasturnatka hladinová




CIRRIPEDIA (svijonožci)

- mořští přisedlí korýši, larva nauplius - metanauplius - cyprisová larva.
- *Lepas anatifera* vilejší stvolnatý hlava se změnila v masitou stopku, v horní části má stočené hrudní nožky, dole na stopce cementové žlázky
- *Balanus tintinnabulum* svijonožec přílepkový tělo ukryté v krunýři ve skořápce
- *Sacculina carcinis* kořenohlavec krabí endoparazit krabů







Hexapoda - šestinozí

- tělo je členěno na hlavu, 3 článková hrud' (thorax) se 3 páry končetin, zadeček (abdomen) bez končetin (6 -11 článků)
- monofyletická Hexapoda se dělí na 2 sesterské skupiny: **Entognatha** (skrytočelistní) a **Ectognatha** (jevnočelistní)

Entognatha - skrytočelistní

- mandibuly a maxily vnořené do hlavové schránky
- složené oči jsou redukovány na dvě skupiny omatidií
- téměř všechny články tykadel jsou opatřeny svalovinou
- většinou půdní

Protura - hmyzenky



- drobní, půda a mech, bez tykadel, bez očí a pigmentu
- ústní orgány bodavě savé (mycelium hub), první pár končetin nahrazuje tykadla

Acerontomon doderoi (hmyzenka půdní)
ve smíšených lesích



Collembola - chvostoskoci

- epigeické druhy: pestře zbarveny, dlouhá tykadla, oči, furka
- endogeické druhy: nepigmentované, bez očí, furka redukována
- zadeček ze 6 čl.: na 1. čl. je ventrální tubus
na 3. čl. retinaculum
na 4. čl. furka



Podura aquatica (mákovka vodní)

černé zbarvení, na hladině a u břehů stojatých vod

Sminthurus (podrepka) kulovité tělo, louky



Tetrodontophora bielanensis (larvěnka obrovská) robustní, žije v humusu či mechu vlhkých lesů

Campodeina - štětinatky

- saprofágové a fytofágové v půdě
- na hlavě mnohočlánková tykadla
- tělo bez pigmentu, na zadečku 2 vícečlánkové štěty - cerci



Campodea (štětinatka)

Japygina - škvorovky

- draví, zoofágové, loví chvostoskoky
- bez očí, dlouhá mnohočlánková tykadla
- štěty na konci těla klíšťkovité

Catajapyx confusus

(škvorovka jižní)

