

Kérdés: akkor most J4390 emphysema volt a diagnózis, (17/37. lap, narancssárga színnel kiemelve!) vagy empyema, (OMSZ is ezt igazolta le, a mentős betegszállítás megrendelésekor!) vagy J8610 Pyothorax(szakértői anyagon pirossal aláhúzva)?

Ahány zárójelentés, annyi variáció!

Továbbá melyik irat tartalmát tekinti a Korányi Intézet igaznak?

- a.) A 2015. 10.06-i zárójelentésben foglaltakat, vagy
- b.) A 2015. 10.13-án kelt zárójelentésben foglaltakat?

A tartalmuk ugyanis lényegi eltéréseket mutatnak!

Felperes a csatolt internetes szakanyagok alapján értelmezi az empyema kérdéskörét:

Az empyema thoracisnak 3 stádiuma van.

1. stadium: exsudatív folyamat, 24-72 óra. A gyulladt pleuralemezek és az erek fokozott permeabilitásával tiszta mellüri folyadékgyülem alakul ki alacsony fehérvérsejt számmal.
2. stadium: fibrinopurulens exsudatum: 7-10 nap-fibrin rakódik le a pleuraürben, szeptumos, rekeszek alakulnak ki. A folyadék sűrűbb, zavaros, fehérvérsejtszám növekszik, gennyessé válik. A bakteriális jelenlétre utaló anaerob anyagcserefolyamatokat az izzadmányban a pH és a glukózsztintcsökkenésével párosuló magas LDH aktivitás jelzi.
3. stadium: organizálódó, (szervülő) fázis, 2-4 hét.....a merev fibrosus burok gátolja a tüdő tágulását, csökkenti a légzőfunkciót és nehezíti a fertőzés gyógyulását.

Etiológia:

1. elhanyagolódott pleuropneumonia,bakteriális-vírusos felülfertőzéssel.
2.
3.
4.
5.
6.
7.szerzett immunhiányos állapotot, Leggyakoribb kórokozók a Gram-pozitív gennykeltők, Gramnegatív-,anaerob baktériumok....**HOSPITALIZÁLT BETEGEN KIALAKULT EMPYEMÁK ESETEIBEN NOSOCOMIÁLIS KÓROKOZÓK IS MEGJELENNEK-.....Staphylococcus aureus,....MRSA....**

Tünetek:

- akut szakban: a septicus-toxikus tünetek
- krónikus szakban:....süllyedésük magas....akut tünetekkel kísért relapsus bármikor bekövetkezhet.

Terápia:

1. stadium: a genny lebocsátása mellüri drenázssal, szívókezelés, a pleuraür öblítése, mosása –célzott antibiotikus terápia....

Itt álljunk meg!

Az első stadium tehát 24-72 óra!

Az első stádiumban a tünetek akut szakban : a septicus-toxikus tünetek.

Az első stádiumban a terápia: a genny lebocsátása mellüri drenázssal, szívókezelés stb.