

PHARM NEWS

จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 6/2565
พฤษภาคม 2565




หน่วยเภสัชสนเทศ งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Bemiparin sodium (HIBOR®)



3,500 IU ANTI XA/0.2 ML



7,500 IU ANTI XA/0.3 ML

Low Molecular Weight Heparin

NED

SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGES

ชื่อยา

Onset

Peak**

Duration***

Hibor® 3,500* IU/0.2 mL

ไม่มีข้อมูล

2-3 ชั่วโมง

ถึงประมาณ 12 ชั่วโมง

Hibor® 7,500* IU/0.3 mL

ไม่มีข้อมูล

3-4 ชั่วโมง

ถึงประมาณ 20-24 ชั่วโมง

Indication

bemiparin sodium **3,500 IU** anti-Xa

ป้องกัน การเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด (thromboembolic disease)

ป้องกัน การเกิดลิ่มเลือดใน extracorporeal circulation ในระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

bemiparin sodium **7,500 IU** anti-Xa

ใช้รักษา deep vein thrombosis (DVT) **ที่มีและไม่มี** ลิ่มเลือดอุดตันในปอด (pulmonary embolism)



Bemiparin sodium (HIBOR®)

ข้อห้ามใช้



ห้ามใช้ยา ในผู้ที่มีประวัติแพ้ **bemiparin sodium, heparin** หรือ **ผลิตภัณฑ์ที่มาจากหมู** (ยานี้ได้จากเนื้อเยื่อชั้น **mucosa** ของลำไส้หมู)



ห้ามใช้ยาในผู้ที่มีประวัติภาวะ **เกล็ดเลือดต่ำ** หลังจากใช้ **heparin** ทั้งในกรณี ที่ตรวจสอบยืนยันแล้วหรือสงสัยว่าจะใช้




ห้ามใช้ยาในผู้ป่วย **ตับ** และ **ตับอ่อน** บกพร่องชนิดรุนแรง



ผู้ที่มีการ **บาดเจ็บ** หรือมีการ **ผ่าตัด** ในสมอง **ตา** หรือ **หู** ในช่วง **2 เดือน** ที่ผ่านมา



ห้ามใช้ยาในผู้ที่มี **เลือดออก** หรือ มีความเสี่ยงที่จะเกิด **เลือดออก** เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ **แข็งตัวของเลือด** ผิดปกติ



ควรใช้อย่างระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาที่มีผลเพิ่มระดับโปแตสเซียมในเลือด (เนื่องจาก **bemiparin** ลดการหลั่ง **aldosterone** ทำให้เกิดภาวะโปแตสเซียม ในเลือดสูง)

Hyper K !!



ตรวจวัดระดับเกล็ดเลือดก่อนให้ **bemiparin** แล้วตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอทุก **3-4 วัน** ในระหว่างใช้ยาและเมื่อสิ้นสุดการใช้ยา

ขนาดการใช้ยาในผู้ที่มีการทำงานของตับ/ไตบกพร่อง:



ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ ในการปรับขนาดยา ในผู้ที่มีการทำงานของตับ/ไตบกพร่อง