

Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia) through an online tool focused on common names of plants

doi: 10.1590/0102-33062018abb0337



Nombres comunes de plantas Bogotá
All Web Site Data

Report from Google analytics about website audience

Oct 30, 2017 - Sep 18, 2018

All Users
100.00%

Audience Overview



| Country | Users | % Users |
|-------------------|-------|---------|
| 1. Colombia | 3,577 | 94.38% |
| 2. United States | 52 | 1.37% |
| 3. Peru | 19 | 0.50% |
| 4. Mexico | 13 | 0.34% |
| 5. Chile | 12 | 0.32% |
| 6. France | 12 | 0.32% |
| 7. Spain | 10 | 0.26% |
| 8. United Kingdom | 10 | 0.26% |
| 9. Argentina | 8 | 0.21% |
| 10. Brazil | 8 | 0.21% |

Demographics: Age




Figure S1. Google analytics report about website audience.



Table S1. Growth form categories, adapted from Font Quer (1953) and Moreno (1984).

| Category of growth form | Definition |
|-------------------------|--|
| Terrestrial herb | Non-woody plant growing on the ground. |
| Aquatic herb | Non-woody plant either floating or submerged in the water, or associated to puddles. |
| Epiphyte herb | Non-woody plant growing on the surface of other plants |
| Subshrub | Small shrub-like plant with woody growth limited to the base of the stem, close to the ground. |
| Shrub | Woody plant branching from the base of the stem, under 5m of height. |
| Tree | Woody plant reaching at least 5 m in height, branching away from its base. |
| Vine | Plant lacking supporting tissues, with climbing stems using external supports to reach heights and get access sunlight. |
| Fern | Non-seed producing vascular plant with non-woody growth, growing on the ground and presenting spore mediated reproduction. |
| Arborescent fern | Non-seed producing vascular plant presenting spore mediated reproduction, with supporting tissues strong enough to enable it to reach heights comparable to that of trees. |
| Palm | Plant of considerable height with a solitary (hard and strongly supporting but non-woody) shoot ending in a crown of leaves. Referring to most of the plants in the <i>Arecaceae</i> family. |

Table S2. Use categories, adapted from the classification of Pérez & Matiz (2017).

| Category of use | Definition |
|-----------------|--|
| Food | Plants from which a substance such as an edible, spice, stimulant or aromatic substance is used or extracted. |
| Agroecological | Plants that are used in the management of sustainable agricultural systems such as live fences, allelopathic, pesticides or fertilizers. |
| Environmental | Plants used in ecological restoration and in the protection of watersheds. |
| Craft | Plants from which parts or substances are used in the manufacture of fabrics, jewelry and costume jewelry, carving, plating or as a traditional dye. |
| Medicinal | Plants that are used complete or in sections, in various preparations to treat health conditions |
| Fuel | Plants from which parts or materials are extracted to produce energy such as firewood and coal. |
| Wood | Plants from which some part of the wood is used for joinery, carpentry, pulp extraction for paper, poles or tool handles. |
| Technological | Plants with parts that are used in the development of tools. |
| Cultural | Plants, complete or in sections, or from which substances are extracted, that are used as psychotropic, esoteric, mythological, religious or ceremonial. |
| Ornamental | Plants that are used complete or some of their parts in gardening, lawns or flower arrangements. |
| Livestock | Plants that are used complete or some of their parts as fodder, shelter or as veterinary medicine. |
| Industrial | Plants from which parts or materials are extracted, which are then subjected to some technical process. |
| Other | Plants whose use does not fit in any of the previous categories. |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. List of combinations with habitat, origin taxa, etymology data and uses category in alphabetical order of species. Etymological origin: P=Popular, Sc=Scientific, Un= Unknown, G=Genetic. Habitat: Ch= Conservated hábitat, Rh= Rural hábitat, Uh= Urban hábitat. Growth form: T= Tree, Et= Epiphytic tree, S=Shrub, Es= Epiphytic shrub, Ss= Subshrub, Th= Terrestrial herb, Eh= Epiphytic herb, Aq= Aquatic, Cp=Creeper, Af= Arborescent fern, Hf= Herbaceous fern, Ef= Epiphytic fern, P= Palm. Use categories: N= native, E= non-native, Ag= agroecological, Te= technological, Or= ornamental, Me= medicinal, Wo= wood, In= industrial, Cu= cultural, Fu= fuel, Fo= food, En= environmental, Cr= craft, Li= livestock, O= other.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te |
| <i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav. | Native | Chirlobirlo | Un | S | | | x | x | x | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav. | Native | Duraznillo | P | S | | | x | x | x | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav. | Native | Palo blanco | P | S | | | x | x | x | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Abatia parviflora</i> Ruiz & Pav. | Native | Velitas | P | S | | | x | x | x | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Abelia × grandiflora</i> (André) Rehder | Europe | Abelia | Sc | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abelia × grandiflora</i> (André) Rehder | Europe | Lengua de Cordero | Un | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abutilon</i> sp. | N/A | Abutilón | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abutilon</i> sp. | N/A | Campanitas | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abutilon</i> sp. | N/A | Farolito | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abutilon insigne</i> Planch. | South America | Abutilón | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abutilon insigne</i> Planch. | South America | Abutilón blanco | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Abutilon insigne</i> Planch. | South America | Farolito | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia</i> sp. | N/A | Acacia | G | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia</i> sp. | N/A | Acacia cedro | G | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia baileyana</i> F.Muell. | Oceania | Acacia gris | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia baileyana</i> F.Muell. | Oceania | Acacia morada | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia decurrens</i> Willd. | Oceania | Acacia | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia decurrens</i> Willd. | Oceania | Acacia gris | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia decurrens</i> Willd. | Oceania | Acacia negra | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd. | Oceania | Acacia de hoja angosta | G | T | S | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia melanoxylon</i> R.Br. | Oceania | Acacia japonesa | G | T | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia melanoxylon</i> R.Br. | Oceania | Acacia morada | G | T | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia melanoxylon</i> R.Br. | Oceania | Acacia negra | G | T | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acacia retinodes</i> Schltld. | Oceania | Acacia | G | T | S | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acaena cylindristachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Matapiojos | Un | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Acaena cylindristachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Quin felpa | Un | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Acaena elongata</i> L. | Native | | G | Ss | Th | | x | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Acalypha chamaedrifolia</i> (Lam.) Müll.Arg. | North America | Gusanito | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acalypha hispida</i> Burm.f. | Oceania | Rabo de Gato | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acalypha hispida</i> Burm.f. | Oceania | Rabo de Mono | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acanthus mollis</i> L. | Europe, Africa, Asia | Acanto | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret | South America | Feijoa | Sc | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x |
| <i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret | South America | Freijoa | Sc | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Europe, Asia, North America | Achilea | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Europe, Asia, North America | Cama de pobre | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Europe, Asia, North America | Camaepobre | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Europe, Asia, North America | Colchón de Pobre | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Europe, Asia, North America | Milenrama | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | |
| <i>Achyrocline</i> sp. | N/A | Viravira | G | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Achyrocline bogotensis</i> (Kunth) DC. | Native | Viravira | G | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Achyrocline lehmannii</i> Hieron | Native | Viravira | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC. | Native | Viravira | G | S | Ss | Th | | x | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Acmella mutisii</i> (Kunth) Cass. | Native | Chisacá | G | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| <i>Acmella mutisii</i> (Kunth) Cass. | Native | Chisacá casera | G | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| <i>Acmella mutisii</i> (Kunth) Cass. | Native | Chisacá guaca | G | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| <i>Acmella mutisii</i> (Kunth) Cass. | Native | Chisacá marranera | G | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| <i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K.Jansen | Native | Acmelia | Sc | Th | | | | x | | x | | | x | | | | | x | | | | |
| <i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K.Jansen | Native | Chisacá | G | Th | | | | x | | x | | | x | | | | | x | | | | |
| <i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R.K.Jansen | Native | Guacas | G | Th | | | | x | | x | | | x | | | | | x | | | | |
| <i>Acrocomia</i> sp. | N/A | Corozo | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Adiantum</i> sp. | N/A | Cilantrillo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Adiantum</i> sp. | N/A | Helecho cilantrillo | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Adonia merrillii</i> (Becc.) Becc. | Asia | Pa de Manila | G | T | S | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aechmea gamosepala</i> Wittm. | South America | Fosforito | P | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aechmea pineliana</i> (Brongn. ex Planch.) Baker | South America | Cepillo | P | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aeonium</i> sp. | N/A | Chupahuevo | Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aeonium</i> sp. | N/A | Repolla | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aeonium arboreum</i> Webb & Berthel. | Africa | Chupagüevo | Un | S | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |
| <i>Aeonium canariense</i> (L.) Webb & Berthel. | Africa | Aeonium | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aeonium canariense</i> (L.) Webb & Berthel. | Africa | Rueditas | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agapanthus praecox</i> Willd. | Africa | Agapanto | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agapanthus praecox</i> Willd. | Africa | Agapanto blanco | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agave</i> sp. | N/A | Agave | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agave americana</i> L. | North America, Central America | Agave | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agave americana</i> L. | North America, Central America | Aloe americano | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agave americana</i> L. | North America, Central America | Fique | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agave americana</i> L. | North America, Central America | Maguey | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Agave americana</i> L. | North America, Central America | Pita | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Allophylus mollis</i> (Kunth) Radlk. | Native | Amarillo | P | T | Ss | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Alnus acuminata</i> Kunth | Native | Aliso | G | T | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | | x |
| <i>Alnus acuminata</i> Kunth | Native | Chaquiro | G | T | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | | x |
| <i>Alnus acuminata</i> Kunth | Native | Fresno | G | T | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | | x |
| <i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don | Asia, Oceania | Ocumo morado | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aloe arborescens</i> Mill. | Africa | Sábila de Jardín | G | S | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aloe arborescens</i> Mill. | Africa | Sabililla | G | S | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aloe arborescens</i> Mill. | Africa | Sabilón | G | S | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f. | Asia | Sábila | G | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Aloysia citriodora</i> Palau | South America | Cidrón | G | S | Th | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Alpinia purpurata</i> (Vieill.) K.Schum. | Oceania | Paraíso rojo | Un | Th | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Alstroemeria</i> sp. | N/A | Astromelia | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Alstroemeria aurea</i> Graham | South America | Astromelia | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) G.Nicholson | South America | Té de Jardín | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) Sm. | Central America, South America | Hierba del dolor | P | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Amaranthus</i> sp. | N/A | Amaranto | G | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Abanico | P | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Amaranto | G | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Bledo | G | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Bledo blanco | G | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Borla | P | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Borlas | P | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus caudatus</i> L. | South America | Moco de Pavo | P | S | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus hybridus</i> L. | Native | Amaranto | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus spinosus</i> L. | Native | Amaranto | G | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Amaranthus spinosus</i> L. | Native | Bledo | G | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Ambrosia peruviana</i> Willd. | Native | Altamisa | G | Th | | | | x | | | | | | x | | | | | | | x | x |
| <i>Anemone coronaria</i> L. | Europe, Africa, Asia | Coronaria | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anethum graveolens</i> L. | Europe, Africa, Asia | Eneldo | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Anigozanthos</i> sp. | N/A | Anigosanto | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anigozanthos</i> sp. | N/A | Anigosanto amarillo | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anigozanthos</i> sp. | N/A | Anigosanto rojo | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anigozanthos</i> sp. | N/A | Pie de Canguro | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anigozanthos flavidus</i> DC. | Oceania | Anigozantos | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anigozanthos flavidus</i> DC. | Oceania | Pata de Canguro | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis | South America | Insulina | P | Cp | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Anthurium</i> sp. | N/A | Anturio | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Anthurium andraeanum</i> André | Native | Anturio | Sc | Eh | Th | Cp | | | x | | | | | | | | | | | | x | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Bidens pilosa</i> L. | Central America, South America | Cadillo | G | Th | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bidens pilosa</i> L. | Central America, South America | Chipaca | G | Th | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bidens pilosa</i> L. | Central America, South America | Chispaca | G | Th | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bidens pilosa</i> L. | Central America, South America | Romerillo | Un | Th | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bidens rubifolia</i> Kunth. | Native | Chipaca | G | Th | Cp | | | | | | | | x | | | | x | | | | | |
| <i>Bidens rubifolia</i> Kunth. | Native | Pacunga | G | Th | Cp | | | | | | | | x | | | | x | | | | | |
| <i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. | Native | Cariseco | P | T | | | | | x | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. | Native | Manzano | P | T | | | | | x | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Billia rosea</i> (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. | Native | Treshojas | P | T | | | | | x | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Bismarckia nobilis</i> Hildebr. & H.Wendl. | Africa | Pa de Bismark | G | T | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Bocconia frutescens</i> L. | Native | Curarador | P | S | | | x | x | x | | | x | | | | | | x | | | | x |
| <i>Bocconia frutescens</i> L. | Native | Sarno | P | S | | | x | x | x | | | x | | | | | | x | | | | x |
| <i>Bocconia frutescens</i> L. | Native | Trompeto | Un | S | | | x | x | x | | | x | | | | | | x | | | | x |
| <i>Bocconia integrifolia</i> Bonpl. | Native | Árbol de Sarno | P | T | | | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bocconia integrifolia</i> Bonpl. | Native | Sarno | P | T | | | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bocconia integrifolia</i> Bonpl. | Native | Trompeto | Un | T | | | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Bomarea</i> sp. | N/A | Rompeplatos | Un | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Bomarea multiflora</i> (L.f.) Mirb. | Native | Colorado | P | Cp | | | x | | | | | | | x | | | | x | x | | | |
| <i>Bomarea multiflora</i> (L.f.) Mirb. | Native | Enredadera | P | Cp | | | x | | | | | | | x | | | | x | x | | | |
| <i>Bomarea multiflora</i> (L.f.) Mirb. | Native | Yerba colorada | Un | Cp | | | x | | | | | | | x | | | | x | x | | | |
| <i>Bomarea patacocensis</i> Herb. | Native | Rompeplatos | Un | Cp | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Bomarea pauciflora</i> (Kunth) Herb. | Native | Pecoso | P | Cp | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bomarea setacea</i> (Ruiz & Pav.) Herb. | Native | Pecosa | P | Cp | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Borago officinalis</i> L. | Europe | Borraja | G | Ss | Th | | | | x | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Botrychium</i> sp. | N/A | Helecho macho | G | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea</i> sp. | N/A | Buganvil | Sc | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea</i> sp. | N/A | Buganvil morado | Sc | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea</i> sp. | N/A | Veranera | P | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy | South America | Buganvil | Sc | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy | South America | Buganvilla | Sc | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy | South America | Pompadur | Un | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy | South America | Trinitaria | P | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy | South America | Veranera | P | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | South America | Buganvilla | Sc | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | South America | Trinitaria | P | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | South America | Veranera | P | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Brachyotum ledifolium</i> (Desr.) Triana | Native | Zarcillejo | P | S | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Bucquetia glutinosa</i> (L.f.) DC. | Native | Saltón | Un | T | S | | x | x | x | | | x | | x | | | x | x | | | | x |
| <i>Bucquetia glutinosa</i> (L.f.) DC. | Native | Sietecuceros | P | T | S | | x | x | x | | | x | | x | | | x | x | | | | x |
| <i>Buddleja americana</i> L. | Native | Alma negra | Un | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Buddleja bullata</i> Kunth | Native | Alma negra | Un | T | S | | x | | | | | x | | x | | | | | | | | |
| <i>Buddleja bullata</i> Kunth | Native | Salvio | P | T | S | | x | | | | | x | | x | | | | | | | | |
| <i>Buddleja davidii</i> Franch. | Asia | Lila | P | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Buddleja davidii</i> Franch. | Asia | Salvio morado | P | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Buxus microphylla</i> Siebold & Zucc. | Asia | Buxus | Sc | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Buxus sempervirens</i> L. | Europe | Boj | G | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cactaceae</i> sp. | N/A | Cauto | G | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent. | Native | Caladio | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Calamagrostis</i> sp. | N/A | Paja | Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calamagrostis</i> sp. | N/A | Paja páramo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calamagrostis effusa</i> (Kunth) Steud. | Native | Günche | P | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calamagrostis effusa</i> (Kunth) Steud. | Native | Paja de Ratón | P | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calamagrostis effusa</i> (Kunth) Steud. | Native | Pajas | P | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calathea ovata</i> (Nees & Mart.) Lindl. | South America | Calatea | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl. | South America | Calatea | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl. | South America | Medallón | Un | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl. | South America | Papel de Música | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Calceolaria perfoliata</i> L.f. | Native | Choroticos | G | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calendula officinalis</i> L. | Europe, Africa, Asia | Caléndula | Sc | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Calendula officinalis</i> L. | Europe, Africa, Asia | Canéndula | Sc | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Caliphuria subdentata</i> Baker | Native | Billete | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Caliphuria subdentata</i> Baker | Native | Dólar | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Calliandra pittieri</i> Standl. | Native | Carbonero blanco | P | T | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Calliandra pittieri</i> Standl. | Native | Carbonero rosado | P | T | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Calliandra trinervia</i> Benth. | Native | Carbonero rojo | P | T | S | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | x |
| <i>Callianthe striata</i> (Lindl.) Donnell | South America | Abutilón | Sc | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Callianthe striata</i> (Lindl.) Donnell | South America | Abutilón amarillo | Sc | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Callianthe striata</i> (Lindl.) Donnell | South America | Abutilón rojo | Sc | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Callianthe striata</i> (Lindl.) Donnell | South America | Farolito japonés | P | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Callianthe vexillarium</i> (E.Morren) Donnell | South America | Abutilón | Sc | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Callianthe vexillarium</i> (E.Morren) Donnell | South America | Abutilón farolito | Sc | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Callianthe vexillarium</i> (E.Morren) Donnell | South America | Calzón de Payaso | P | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Callianthe vexillarium</i> (E.Morren) Donnell | South America | Campanitas | P | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Callitropsis macrocarpa</i> (Gordon) D.P.Little | North America | Ciprés de Monterrey | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Calycolpus moritzianus</i> (O.Berg) Burret | Native | Guayabillo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Camellia</i> sp. | N/A | Camelia | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te |
| <i>Chrysanthemum</i> sp. | N/A | Crisantemo | Sc | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Chrysanthemum</i> sp. | N/A | Margarita | Un | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Chrysanthemum</i> sp. | N/A | Margaritón | Un | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Chrysanthemum</i> sp. | N/A | Pompón | P | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Chrysothemis pulchella</i> (Sims) Decne. | Native | Hierba de Miel | Un | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Chusquea</i> sp. | N/A | Chusque | G | | | | | | x | | | x | | | | | | x | | | x |
| <i>Chusquea scandens</i> Kunth | Native | Chusque | G | S | Cp | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x |
| <i>Chusquea serrulata</i> Pilg. | Native | Chusque | G | S | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Chusquea tessellata</i> Munro | Native | Chusque | G | S | Ss | | x | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Chusquea tessellata</i> Munro | Native | Chusque de Páramo | G | S | Ss | | x | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Cinchona</i> sp. | N/A | Quina | G | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Cinnamomum verum</i> J.Presl | Asia | Canelo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | Europe, Africa, Asia | Cardo | G | Th | | | | x | x | x | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | Europe, Africa, Asia | Cardo mariano | Sc | Th | | | | x | x | x | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Cissus alata</i> Jacq. | Native | Agraz | G | Cp | | | | | x | | x | | | | | | | | x | | |
| <i>Cissus alata</i> Jacq. | Native | Uva | P | Cp | | | | | x | | x | | | | | | | | x | | |
| <i>Citharexylum</i> sp. | N/A | Cajeto de monte | G | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Citharexylum</i> sp. | N/A | Cajeto montano | G | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Citharexylum montanum</i> Moldenke | Native | Cajeto | G | T | | | | | x | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Citharexylum subflavescens</i> S.F.Blake | Native | Cajeto | G | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x |
| <i>Citharexylum subflavescens</i> S.F.Blake | Native | Caregato | Un | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x |
| <i>Citharexylum subflavescens</i> S.F.Blake | Native | Garagay | Un | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x |
| <i>Citharexylum subflavescens</i> S.F.Blake | Native | Urapo | Un | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x |
| <i>Citharexylum subflavescens</i> S.F.Blake | Native | Uruapo | Un | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | x |
| <i>Citharexylum sulcatum</i> Moldenke | Native | Tinto | P | T | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Citrus aurantium</i> L. | Asia | Limón | Sc | T | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck | Asia | Limón | G | T | | | | | | | x | | | | | | | | x | | |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco | Asia | Mandarina | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco | Asia | Mandarino | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | Asia | Naranja | G | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck | Asia | Naranja | G | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Clethra fagifolia</i> Kunth | Native | Auyamo | G | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Clethra fimbriata</i> Kunth | Native | Auyamo | G | S | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Clethra fimbriata</i> Kunth | Native | Cape | G | S | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Clethra fimbriata</i> Kunth | Native | Manzano | P | S | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Clethra lanata</i> M.Martens & Galeotti | Native | Manzano | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse | Africa | Clivia | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse | Africa | Clivia roja | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Clivia miniata</i> (Lindl.) Bosse | Africa | Lirio | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Clusia</i> sp. | N/A | Caucha | G | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Clusia</i> sp. | N/A | Gaque | G | | | | | x | | | | | x | | | | | x | x | | | |
| <i>Clusia alata</i> Planch. & Triana | Native | Chagualo | P | T | Et | S | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Clusia cerroana</i> Steyerem. | Native | Gaque | G | T | Et | | | x | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Clusia multiflora</i> Kunth | Native | Cape | G | T | Et | S | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Clusia multiflora</i> Kunth | Native | Caucho | G | T | Et | S | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Clusia multiflora</i> Kunth | Native | Chagualo | P | T | Et | S | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Clusia multiflora</i> Kunth | Native | Gaque | G | T | Et | S | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Clusia orthoneura</i> Standl. | Native | Clusia | Sc | T | Et | S | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Clusia stenophylla</i> Standl. | Native | Guaque | G | T | Et | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cobaea scandens</i> Cav. | Central America | Campanas de Catedral | P | Cp | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cobaea scandens</i> Cav. | Central America | Funeral | P | Cp | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cocos nucifera</i> L. | Native | Coco | Sc | P | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A.Juss. | Asia, Oceania | Croto | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A.Juss. | Asia, Oceania | Croto amarillo | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A.Juss. | Asia, Oceania | Croton | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | Africa | Café | G | T | S | | | | | x | | x | | | | | | | | x | | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | Africa | Cafeto | G | T | S | | | | | x | | x | | | | | | | | x | | |
| <i>Coleonema album</i> (Thunb.) Bartl. & H.L.Wendl. | Africa | Diosme | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott | Asia | Bore | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Columnnea</i> sp. | N/A | Tiburón | P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Commelina</i> sp. | N/A | Sanalotodo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Commelina</i> sp. | N/A | Sueldaconsuelda | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Conium maculatum</i> L. | Europe, Africa, Asia | Apio de Monte | Sc | Th | | | | x | | x | | | | | | x | | | | x | | |
| <i>Conium maculatum</i> L. | Europe, Africa, Asia | Cicuta | G | Th | | | | x | | x | | | | | | x | | | | x | | |
| <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur | Europe | Espuela de Caballero | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist | South America | Venadillo | Un | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev. | Oceania | Caña de la India | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Coriandrum sativum</i> L. | Africa, Asia | Cilantro | G | Th | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x | | |
| <i>Coriaria ruscifolia</i> L. | Native | Curtidera | P | S | | | | x | x | | | x | | | | x | | | | x | | x |
| <i>Coriaria ruscifolia</i> L. | Native | Helecho | P | S | | | | x | x | | | x | | | | x | | | | x | | x |
| <i>Coriaria ruscifolia</i> L. | Native | Matarratón | P | S | | | | x | x | | | x | | | | x | | | | x | | x |
| <i>Coriaria ruscifolia</i> L. | Native | Reventadera | P | S | | | | x | x | | | x | | | | x | | | | x | | x |
| <i>Coriaria ruscifolia</i> L. | Native | Tinta | P | S | | | | x | x | | | x | | | | x | | | | x | | x |
| <i>Coriaria ruscifolia</i> L. | Native | Tinto | P | S | | | | x | x | | | x | | | | x | | | | x | | x |
| <i>Cortaderia nitida</i> (Kunth) Pilg. | Native | Carrizo | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cortaderia nitida</i> (Kunth) Pilg. | Native | Cortadera | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | South America | Cortadera | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | South America | Hierba de las Pampas | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | |
| <i>Cucumis sativus</i> L. | Asia | Pepino de guiso | G | Cp | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne | South America | Ahuyama | G | Cp | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne | South America | Auyama | G | Cp | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cucurbita pepo</i> L. | North America, Central America | Calabacín | G | Cp | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cucurbita pepo</i> L. | North America, Central America | Calabacín amarillo | G | Cp | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cucurbita pepo</i> L. | North America, Central America | Calabaza | G | Cp | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cuphea</i> sp. | N/A | Moradita | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cuphea dipetala</i> (L.f.) Koehne | Native | Cigarrillo | P | S | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cuphea dipetala</i> (L.f.) Koehne | Native | Zarcillejo | P | S | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth | Central America | Diosma | P | S | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth | Central America | Moradita | P | S | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cuphea ignea</i> A.DC. | Central America | Cigarrillo | P | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cuphea ignea</i> A.DC. | Central America | Fosforito | P | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cuphea ignea</i> A.DC. | Central America | Tabaquito | P | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | Europe | Ciprés | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | Europe | Ciprés italiano | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | Europe | Pino | P | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cyathea bicrenata</i> Liebm. | Native | Helecho arbóreo | G | Af | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin | Native | Boba | P | Af | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin | Native | Helecho arbóreo | G | Af | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin | Native | Helecho arborescente | G | Af | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin | Native | Pa boba | G | Af | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cyathea caracasana</i> (Klotzsch) Domin | Native | Sarro | Un | Af | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cycas revoluta</i> Thunb. | Asia | Pa funeraria | G | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cycas rumphii</i> Miq. | Asia | Pa funeral | G | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyclamen persicum</i> Mill. | Asia | Ciclamen | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyclamen persicum</i> Mill. | Asia | Violeta de los Alpes | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyclanthera brachystachya</i> (DC.) Cogn. | Native | Pepino común | G | Cp | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad. | Native | Pepino | G | Cp | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad. | Native | Pepino grande | G | Cp | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn. et al. | Europe | Hiedra de Tiestos | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn. et al. | Europe | Yedra | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf | Asia | Limonaria | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| <i>Cynara cardunculus</i> L. | Europe, Africa, Asia | Alcachofa | G | Th | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyperus imbricatus</i> Retz. | Native | Paragüita | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyperus papyrus</i> L. | Africa | Papiro | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Cyperus xanthostachyus</i> Steud. | Native | Cortadera | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Diplostephium</i> sp. | N/A | Romero | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium</i> sp. | N/A | Romero blanco | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium alveolatum</i> Cuatrec. | Native | Blanquillo | P | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium ochraceum</i> (Kunth) Nees | Native | Chilco blanco | G | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium ochraceum</i> (Kunth) Nees | Native | Palo blanco | P | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium phyllicoides</i> (Kunth) Wedd. | Native | Amarguero | P | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium phyllicoides</i> (Kunth) Wedd. | Native | Blanco | P | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium phyllicoides</i> (Kunth) Wedd. | Native | Romero | P | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium revolutum</i> S.F.Blake | Native | Romero | P | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium revolutum</i> S.F.Blake | Native | Romero blanco | P | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium revolutum</i> S.F.Blake | Native | Romero de Páramo | P | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diplostephium rosmarinifolium</i> (Benth.) Wedd. | Native | Romero | P | T | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | x | | | | | |
| <i>Diplostephium rosmarinifolium</i> (Benth.) Wedd. | Native | Romero de Monte | P | T | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | x | | | | | |
| <i>Diplostephium rosmarinifolium</i> (Benth.) Wedd. | Native | Romero de Páramo | P | T | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | x | | | | | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L. | Europe | Cardo | G | Th | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | x | |
| <i>Disterigma alaternoides</i> (Kunth) Nied. | Native | Totiadera | P | S | Es | Cp | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | Native | Ayuelo | Un | S | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | Native | Chámano | Un | S | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | Native | Hayo | G | S | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. | Native | Hayuelo | G | S | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Draba sericea</i> Santana & J.O.Rangel | Native | Lítamo real | Un | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Dracaena</i> sp. | N/A | Dracena | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Dracaena</i> sp. | N/A | Mata de la Prosperidad | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Dracaena braunii</i> Engl. | Africa | Dracena | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | Africa | Palo de Brasil | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. | Africa | Palo de la Felicidad | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Dracaena reflexa</i> Lam. | Africa | Drago de Madagascar | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Drimys granadensis</i> L.f. | Native | Ají | G | T | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Drimys granadensis</i> L.f. | Native | Ají de Páramo | G | T | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Drimys granadensis</i> L.f. | Native | Canelo de Monte | G | T | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Drimys granadensis</i> L.f. | Native | Canelo de Páramo | G | T | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Drimys granadensis</i> L.f. | Native | Palo de ají | P | T | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Duranta</i> sp. | N/A | Duranta | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Duranta erecta</i> L. | Native | Duranta amarilla | Sc | S | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Duranta mutisii</i> L.f. | Native | Cucas | Un | T | S | Cp | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Duranta mutisii</i> L.f. | Native | Espino | P | T | S | Cp | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Duranta mutisii</i> L.f. | Native | Espino garbanzo | P | T | S | Cp | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Duranta mutisii</i> L.f. | Native | Garbancillo | P | T | S | Cp | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Duranta mutisii</i> L.f. | Native | Garbanzo | P | T | S | Cp | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | x | |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | |
| <i>Erythrina rubrinervia</i> Kunth | Native | Peonio | P | T | S | | x | | x | | | x | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Erythrina rubrinervia</i> Kunth | Native | Siriguai | Un | T | S | | x | | x | | | x | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Escallonia</i> sp. | N/A | Manglar sabanero | Un | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia</i> sp. | N/A | Mangle | Un | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia</i> sp. | N/A | Rodamonte | Un | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia</i> sp. | N/A | Tíbar | G | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia</i> sp. | N/A | Tobo | Un | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia discolor</i> Vent. | Native | Tíbar | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Escallonia myrtilloides</i> L.f. | Native | Centavo | Un | T | S | | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia myrtilloides</i> L.f. | Native | Pagoda | P | T | S | | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia myrtilloides</i> L.f. | Native | Rodamonte | Un | T | S | | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia myrtilloides</i> L.f. | Native | Sombrerito | P | T | S | | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia myrtilloides</i> L.f. | Native | Tíbar | G | T | S | | x | x | x | x | | x | | x | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. | Native | Chilco | Un | T | S | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. | Native | Pagoda | P | T | S | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. | Native | Rodamonte | Un | T | S | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. | Native | Tíbar | G | T | S | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Escallonia paniculata</i> (Ruiz & Pav.) Schult. | Native | Tobo | Un | T | S | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | Native | Loqueto | Un | T | S | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | Native | Macle | Un | T | S | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | Native | Magle | Un | T | S | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | Native | Mangle de clima frío | Un | T | S | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Escallonia pendula</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | Native | Mangle de tierra fría | Un | T | S | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham. | North America | Amapola | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham. | North America | Amapola californiana | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham. | North America | Raso | P | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Espeletia</i> sp. | N/A | Frailejón | P | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | x |
| <i>Espeletia</i> sp. | N/A | Frailejona | P | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | x |
| <i>Espeletia argentea</i> Humb. & Bonpl. | Native | Frailejón | P | S | Th | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Espeletia grandiflora</i> Humb. & Bonpl. | Native | Frailejón | P | S | Th | | x | x | x | | | | x | | | | | | | x | | | x |
| <i>Espeletia grandiflora</i> Humb. & Bonpl. | Native | Frailejón mayor | P | S | Th | | x | x | x | | | | x | | | | | | | x | | | x |
| <i>Espeletia killipii</i> Cuatrec. | Native | Frailejón | P | S | Th | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Espeletiopsis corymbosa</i> (Humb. & Bonpl.) Cuatrec. | Native | Guacharaco | Un | S | Th | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Etlingeria elatior</i> (Jack) R.M.Sm. | Asia | Bastón del Emperador | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | N/A | Eucalipto | Sc | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | | x |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | N/A | Ocalipto | Sc | | | | | | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | | x |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. | Oceania | Eucalipto | Sc | T | | | | | x | x | | | | x | | | | x | x | | | | x |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. | Oceania | Eucalipto macho | Sc | T | | | | | x | x | | | | x | | | | x | x | | | | x |
| <i>Eucalyptus cinerea</i> Benth. | Oceania | Eucalipto | Sc | T | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te |
| <i>Eucalyptus cinerea</i> Benth. | Oceania | Eucalipto azul | Sc | T | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Eucalyptus cinerea</i> Benth. | Oceania | Eucalipto plateado | Sc | T | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Eucalyptus cinerea</i> Benth. | Oceania | Eucalipto rosado | Sc | T | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Eucalyptus cinerea</i> Benth. | Oceania | Ocalita | Sc | T | | | | | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. | Oceania | Eucalipto | Sc | T | | | | | x | x | | | | x | | | x | x | | | x |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. | Oceania | Eucalipto común | Sc | T | | | | | x | x | | | | x | | | x | x | | | x |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. | Oceania | Ocal | Sc | T | | | | | x | x | | | | x | | | x | x | | | x |
| <i>Eucalyptus pulverulenta</i> Sims | Oceania | Eucalipto | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Eucalyptus pulverulenta</i> Sims | Oceania | Eucalipto plateado | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Eucalyptus pulverulenta</i> Sims | Oceania | Ocalita | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. & Linden | Native | Billete | P | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. & Linden | Native | Eucare | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. & Linden | Native | Lirio Amazonas | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. & Linden | Native | Lirio amazónico | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Eucharis amazonica</i> Linden ex Planch. | South America | Billete | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. | Asia | Bonetero del Japón | P | T | S | Cp | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euonymus japonicus</i> Thunb. | Asia | Euonimo | Sc | T | S | Cp | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | Native | Cruz | Un | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | Native | Lechero de Cerca | P | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | Native | Liberal | P | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia cotinifolia</i> L. | Native | Manzanillo rojo | P | T | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy | Central America, South America | Lechero blanco | P | S | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy | Central America, South America | Pascuita | P | S | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia milii</i> Des Moul. | Africa | Corona de Cristo | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia milii</i> Des Moul. | Africa | Corona de Espinas | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia milii</i> Des Moul. | Africa | Espina Cristo | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia milii</i> Des Moul. | Africa | Tú y yo | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Árbol de Navidad | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Estrella de Navidad | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Flor de Pascua | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Papagayo | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Paraguas japonés | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Poinsetia | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Ponsetia | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Sombrilla japonesa | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch | Central America | Sombrillita china | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia tithymaloides</i> L. | Native | Ponopinito | Un | Th | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Euphorbia tithymaloides</i> L. | Native | Zapatico de la Reina | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | x | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te |
| <i>Geissanthus andinus</i> Mez | Native | Espadero | Un | T | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Geissanthus andinus</i> Mez | Native | Trementina | Un | T | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Geissanthus bogotensis</i> Mez | Native | Cucharero | P | T | S | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Geissanthus bogotensis</i> Mez | Native | Espadero | Un | T | S | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S.Johnson | Europe, Africa, Asia | Retamo liso | P | S | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Geonoma solitaria</i> (Engel) A.W.Hill | Native | Pa | G | P | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Geranium</i> sp. | N/A | Centella | Un | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Geranium</i> sp. | N/A | Geranio | Sc | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Geranium holosericeum</i> Spreng. | Native | Alfileres | P | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Geranium lindenianum</i> Turcz. | Native | Hierba del Dedo | Un | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gerbera jamesonii</i> Hook.f. | Africa | Gerbera | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gladiolus</i> sp. | N/A | Gladiolo | Sc | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gladiolus</i> sp. | N/A | Graviolo | Sc | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gladiolus communis</i> L. | Europe | Gladiolos | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gladiolus hortulanus</i> L.H. Bailey | North America | Gladiolo | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gnaphalium</i> sp. | N/A | Viravira | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gomphichis cundinamarcae</i> Renz | Native | Gompichis | Sc | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena</i> sp. | N/A | Confeti blanco | P | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Amarantina | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Amaranto globoso | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Amaranto redondo | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Amaranto rosado | G | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Globito | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Perpetua | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Siempreviva | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gomphrena globosa</i> L. | Central America, South America | Suspiro | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Gratiola bogotensis</i> Pennell | Native | Graciola de Pantano | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Gratiola bogotensis</i> Pennell | Native | Gratiola de pantano | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Greigia</i> sp. | N/A | Piñuela | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Greigia stenolepis</i> L.B.Sm. | Native | Piñuela | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Grevillea robusta</i> R.Br. | Oceania | Grevilia | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Grevillea robusta</i> R.Br. | Oceania | Grevillea | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Grevillea robusta</i> R.Br. | Oceania | Pino de Oro | P | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Grevillea robusta</i> R.Br. | Oceania | Roble australiano | P | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz. | Asia | Corazón herido | P | S | Cp | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz. | Asia | Paragüita china | P | S | Cp | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Hordeum vulgare</i> L. | Asia | Cebada | G | Th | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Howea forsteriana</i> (F.Muell.) Becc. | Oceania | Kentia | Sc | P | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Hoya carnosa</i> (L.f.) R.Br. | Asia | Flor de Cera | P | Cp | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. | Asia | Hortensia | Sc | S | Th | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Hydrocotyle</i> sp. | N/A | Sombrerito | P | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Hydrocotyle bonplandii</i> A.Rich. | Native | Hoja de Agua | P | Th | | | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Hydrocotyle bonplandii</i> A.Rich. | Native | Sombrerito | P | Th | | | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Hydrocotyle bonplandii</i> A.Rich. | Native | Sombrillita de Agua | P | Th | | | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f. | Native | Sombrillita | P | Th | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f. | Native | Sombrillita de Agua | P | Th | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hydrocotyle umbellata</i> L. | Native | Sombrillita de Agua | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hypericum</i> sp. | N/A | Chite | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hypericum juniperinum</i> Kunth | Native | Cargarrocío | P | S | Ss | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Hypericum juniperinum</i> Kunth | Native | Chite | G | S | Ss | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Hypericum laricifolium</i> Juss. | Native | Chite | G | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hypericum mexicanum</i> L. | Native | Chite | G | S | Ss | | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Hypericum mexicanum</i> L. | Native | Lunaria | Un | S | Ss | | x | x | | | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Hypericum myricariifolium</i> Hieron. | Native | Chite | G | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hypericum patulum</i> Thunb. | Asia | Abedul | G | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Hypericum patulum</i> Thunb. | Asia | Corazoncillo | P | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Hypericum patulum</i> Thunb. | Asia | Hipérico | Sc | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Hypericum prostratum</i> Cuatrec. | Native | Chite | G | S | Ss | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hypericum strictum</i> Kunth | Native | Chite | G | S | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hypochaeris sessiliflora</i> Kunth | Native | Chicoria | G | Th | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Hypoestes phyllostachya</i> Baker | Africa | Abrecaminos | P | Th | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Hypoestes phyllostachya</i> Baker | Africa | Estrancadera | P | Th | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Hyptis atrorubens</i> Poit. | Native | Mastranto | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Iberis amara</i> L. | Europe | Carraspique | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Iberis umbellata</i> L. | Europe | Alisú | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Iberis umbellata</i> L. | Europe | Carraspique | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Iberis umbellata</i> L. | Europe | Lila | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Ilex</i> sp. | N/A | Mulato | Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Ilex kunthiana</i> Triana | Native | Palo | P | T | S | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| <i>Ilex kunthiana</i> Triana | Native | Palo blanco | P | T | S | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| <i>Ilex kunthiana</i> Triana | Native | Té de Bogotá | P | T | S | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| <i>Impatiens</i> sp. | N/A | Bellahelena | Un | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Impatiens</i> sp. | N/A | Bellahelena porcelana | Un | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te |
| <i>Juglans neotropica</i> Diels | Native | Nogal | G | T | | | | | x | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Juglans neotropica</i> Diels | Native | Nogal negro | G | T | | | | | x | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Juncus</i> sp. | N/A | Junco | Sc | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Juncus densiflorus</i> Kunth | Native | Junco | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Juncus effusus</i> L. | Native | Junco | Sc | Th | | | x | x | x | | | x | | | | | | | | | x |
| <i>Juncus effusus</i> L. | Native | Junco bogotano | Sc | Th | | | x | x | x | | | x | | | | | | | | | x |
| <i>Juncus ramboi</i> Barros | Native | Junco | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Jungia coarctata</i> Hieron. | Native | Mano de León | P | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Jungia paniculata</i> (DC.) A.Gray | Native | Manolión | P | Ss | Th | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Justicia</i> sp. | N/A | Penicilina | P | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm. | Central America | Camarón | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm. | Central America | Camarón rojo | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm. | Central America | Camarón rosado | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L.B.Sm. | Central America | Guargüerón | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe</i> sp. | N/A | Chupahuevo | Un | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe</i> sp. | N/A | Colombiana | Un | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe</i> sp. | N/A | Hojasanta | P | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe beharensis</i> Drake | Africa | Kalanchoe | Sc | S | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe beharensis</i> Drake | Africa | Oreja de Mula | P | S | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln. | Africa | Calanchoe | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln. | Africa | Coralito | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln. | Africa | Coralito amarillo | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln. | Africa | Coralito rojo | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln. | Africa | Kalanchoe | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe delagoensis</i> Eckl. & Zeyh. | Africa | Calanchoe | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe gastonis-bonnierii</i> Raym.-Hamet & H.Perrier | Africa | Calanchoe | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe gastonis-bonnierii</i> Raym.-Hamet & H.Perrier | Africa | Kalanchoe | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers. | Africa | Kalanchoe | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken | Africa | Candelabro | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken | Africa | Llama amarilla | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken | Africa | Llama roja | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken | Africa | Llamas | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kohleria</i> sp. | N/A | Caracola | P | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Kohleria</i> sp. | N/A | Terciopelo | P | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lachemilla galioides</i> (Benth.) Rothm. | Native | Plegadera | P | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lachemilla hispidula</i> (L.M.Perry) Rothm. | Native | Plegadera | P | Th | | | x | | | | | | | | | | x | | x | | |
| <i>Lachemilla nivalis</i> (Kunth) Rothm. | Native | Guardarroció | P | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lachemilla orbiculata</i> (Ruiz & Pav.) Rydb. | Native | Plegadera | P | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lachemilla pectinata</i> (Kunth) Rothm. | Native | Plegadera | P | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Lactuca sativa</i> L. | Europe, Africa, Asia | Lechuga | Sc | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lactuca sativa</i> L. | Europe, Africa, Asia | Lechuga batavia | P | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lactuca sativa</i> L. | Europe, Africa, Asia | Lechuga crespá | Sc | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lactuca sativa</i> L. | Europe, Africa, Asia | Lechuga morada | Sc | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lactuca sativa</i> L. | Europe, Africa, Asia | Lechuga verde | Sc | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Ladenbergia macrocarpa</i> (Vahl) Klotzsch | Native | Falsa quina | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lafoensia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) DC. | Native | Guayacán | G | T | | | | | x | | | x | x | | | | | x | | | x | | x | |
| <i>Lafoensia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) DC. | Native | Guayacán amarillo | G | T | | | | | x | | | x | x | | | | | x | | | x | | x | |
| <i>Lafoensia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) DC. | Native | Guayacán de Manzales | G | T | | | | | x | | | x | x | | | | | x | | | x | | x | |
| <i>Lafoensia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) DC. | Native | Pelincú | Un | T | | | | | x | | | x | x | | | | | x | | | x | | x | |
| <i>Lafoensia acuminata</i> (Ruiz & Pav.) DC. | Native | Trompito | P | T | | | | | | | | x | x | | | | | x | | | x | | x | |
| <i>Lagerstroemia indica</i> L. | Asia | Astromelia | Sc | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lamiastrum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek | Europe, Asia | Lamiastrum | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lampranthus</i> sp. | N/A | Bellasonce | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lampranthus</i> sp. | N/A | Bellasonce | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N.E.Br. | Africa | Bellasonce | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N.E.Br. | Africa | Clavel chino | G | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N.E.Br. | Africa | Rayito de sol | P | Ss | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lantana camara</i> L. | Native | Cinconegritos | P | S | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lantana camara</i> L. | Native | Lantana | Sc | S | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lantana camara</i> L. | Native | Sanguinaria | P | S | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lantana camara</i> L. | Native | Venturosa | P | S | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lantana camara</i> L. | Native | Yerbamora | P | S | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Launaea intybacea</i> (Jacq.) Beauverd | Native | Cerraja | Un | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Lauraceae</i> sp. | N/A | Laurel | G | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Laurus nobilis</i> L. | Europe, Africa, Asia | Laurel | G | T | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Leandra</i> sp. | N/A | Leandra | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ledenbergia peruviana</i> O.C.Schmidt | South America | Chorrito de luz | P | T | S | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Ledenbergia seguieroides</i> Klotzsch ex Moq. | South America | Milflores | P | S | | | | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Lepechinia salviiifolia</i> (Kunth) Epling | Native | Salvia | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lepechinia salviiifolia</i> (Kunth) Epling | Native | Salvio | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lepechinia schiedeana</i> (Schltdl.) Vatke | Native | Salvia | P | Ss | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Lepechinia schiedeana</i> (Schltdl.) Vatke | Native | Salvia de Páramo | P | Ss | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Lepidium bipinnatifidum</i> Desv. | Native | Mastuerzo | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Lepidium costaricense</i> Thell. | Central America | Mastranto | G | Th | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst. | Oceania | Leptospermo | Sc | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Leptospermum scoparium</i> J.R.Forst. & G.Forst. | Oceania | Mirto neozelandés | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | Central America | Acacia blanca | G | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit | Central America | Leucaena | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Lycianthes lycioides</i> (L.) Hassl. | Native | Curubo | G | S | Ss | Th | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Lycianthes lycioides</i> (L.) Hassl. | Native | Gurrubo | G | S | Ss | Th | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Lycopodium</i> sp. | N/A | Caminadera | P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Camarero | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Camaroná | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Chaquilulo | Un | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Comadera | Un | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Manzanita | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uva | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uva camarón | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uva de Monte | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uva silvestre | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uvito | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uvo | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macleanea rupestris</i> (Kunth) A.C.Sm. | Native | Uvo camarón | P | S | Es | Cp | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | |
| <i>Macrocarpaea glabra</i> (L.f.) Gilg | Native | Zarcillejo | P | T | S | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Magnolia caricaefragrans</i> (Lozano) Govaerts | Native | Hojarasco | Un | T | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Magnolia grandiflora</i> L. | North America | Magnolia blanca | Sc | T | | | x | | x | | | x | | | x | | | | | x | | | | |
| <i>Magnolia grandiflora</i> L. | North America | Magnolío | Sc | T | | | x | | x | | | x | | | x | | | | | x | | | | |
| <i>Malus pumila</i> Mill. | Asia | Manzana de Agua | P | T | S | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Malus pumila</i> Mill. | Asia | Manzano | G | T | S | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Malva</i> sp. | N/A | Malva | Sc | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Malva</i> sp. | N/A | Malva lisa | Sc | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | | x | | | |
| <i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel. | Europe | Malvisco | G | Ss | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel. | Europe | Malvisco blanco | G | Ss | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Malva parviflora</i> L. | Europe, Asia | Malva | Sc | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Malva sylvestris</i> L. | Europe | Malva | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | |
| <i>Malva sylvestris</i> L. | Europe | Malva silvestre | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | |
| <i>Malva sylvestris</i> L. | Europe | Malvarrosa | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | Central America | Malvito | G | S | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Mammillaria</i> sp. | N/A | Cactus | G | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Maranta leuconeura</i> E.Morren | South America | Piel de Sapa | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze | Native | Nigua | P | Ss | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Marrubium vulgare</i> L. | Europe | Marrubio | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Marsilea ancylopoda</i> A.Braun | Native | Trébol de Agua | P | Aq | Hf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Marsilea mollis</i> B.L.Rob. & Fernald | Native | Trébol de Agua | P | Aq | Hf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Masdevallia coccinea</i> Lindl. | Native | Orquídea | Sc | Eh | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Masdevallia coriacea</i> Lindl. | Native | Orquídea | Sc | Eh | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Matricaria recutita</i> L. | Europe | Manzanilla | P | Th | | | | x | x | | x | | | | x | | | | x | x | | | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Matricaria recutita</i> L. | Europe | Manzanilla Castilla | P | Th | | | | x | x | | x | | | | x | | x | x | | | | |
| <i>Matricaria recutita</i> L. | Europe | Manzanilla dulce | P | Th | | | | x | x | | x | | | | x | | x | x | | | | |
| <i>Matricaria recutita</i> L. | Europe | Manzanilla pequeña | P | Th | | | | x | x | | x | | | | x | | x | x | | | | |
| <i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br. | Europe | Alelí | G | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Medicago sativa</i> L. | Asia | Alfalja | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Melaleuca</i> sp. | N/A | Calistemo | Sc | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Melaleuca citrina</i> (Curtis) Dum.Cours. | Oceania | Calistemo | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca citrina</i> (Curtis) Dum.Cours. | Oceania | Churrusco | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca citrina</i> (Curtis) Dum.Cours. | Oceania | Eucalipto | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca citrina</i> (Curtis) Dum.Cours. | Oceania | Eucalipto de Flor | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca citrina</i> (Curtis) Dum.Cours. | Oceania | Eucalipto lavabotella | Sc | S | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca viminalis</i> (Gaertn.) Byrnes | Oceania | Calistemo | Sc | S | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca viminalis</i> (Gaertn.) Byrnes | Oceania | Calistemo llorón | Sc | S | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melaleuca viminalis</i> (Gaertn.) Byrnes | Oceania | Churrusco | P | S | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Melia azedarach</i> L. | Asia | Paraíso | Un | S | | | | | | | | x | | | | | x | | | x | | |
| <i>Meliosma bogotana</i> Steyerf. | Native | Sonajero | Un | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Melissa officinalis</i> L. | Europe | Toronjil | P | Th | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha</i> sp. | N/A | Menta | Sc | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | |
| <i>Mentha</i> sp. | N/A | Sígueme | P | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | |
| <i>Mentha</i> sp. | N/A | Yerbabuena | P | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | |
| <i>Mentha</i> sp. | N/A | Yerbabuena blanca | P | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | |
| <i>Mentha</i> sp. | N/A | Yerbabuena menta | P | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | |
| <i>Mentha</i> sp. | N/A | Yerbabuena negra | P | | | | | | | | x | | | | x | | | | | x | | |
| <i>Mentha × piperita</i> L. | Europe | Hierbabuena | P | Th | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha × piperita</i> L. | Europe | Menta | Sc | Th | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha × piperita</i> L. | Europe | Yerbabuena | P | Th | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha pulegium</i> L. | Europe | Menta | Sc | Th | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha pulegium</i> L. | Europe | Poleo | G | Th | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha spicata</i> L. | Europe | Hierbabuena | P | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha spicata</i> L. | Europe | Yerbabuena | P | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. | Europe | Menta | Sc | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. | Europe | Yerbabuena silvestre | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Meriania nobilis</i> Triana | Native | Amarrabollo | P | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Meriania nobilis</i> Triana | Native | Amarrabollos | P | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Meriania nobilis</i> Triana | Native | Marrabollos | P | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Metrosideros</i> sp. | N/A | Metrosidero | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Metrosideros excelsa</i> Gaertn. | Oceania | Árbol de Hierro | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Metrosideros excelsa</i> Gaertn. | Oceania | Metrosidero | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Mezobromelia hospitalis</i> (L.B.Sm.) J.R.Grant | Native | Guiche | G | Eh | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Mezobromelia hospitalis</i> (L.B.Sm.) J.R.Grant | Native | Quiche | G | Eh | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia</i> sp. | N/A | Tuno | Un | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia</i> sp. | N/A | Tuno esmeraldo | Un | | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia alborosea</i> L.Uribe | Native | Tuno | Un | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia biappendiculata</i> (Naudin) L.Uribe | Native | Tuno | Un | T | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia cataractae</i> Triana | Native | Esterillo | Un | T | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia cundinamarcensis</i> Wurdack | Native | Tuno | Un | T | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia elaeoides</i> Naudin | Native | Tuno | Un | T | S | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia ligustrina</i> (Sm.) Triana | Native | Tuno | Un | T | S | | | x | | x | | | | x | | | | | | | | | x | |
| <i>Miconia salicifolia</i> (Naudin) Naudin | Native | Tuno | Un | T | S | Ss | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Miconia squamulosa</i> Triana | Native | Tuno | Un | T | S | Th | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Miconia squamulosa</i> Triana | Native | Tuno esmeraldo | Un | T | S | Th | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Miconia stipularis</i> Naudin | Native | Tuno | Un | T | S | Cp | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Minthostachys mollis</i> (Benth.) Griseb. | Native | Muña | Un | Ss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Mirabilis jalapa</i> L. | Central America | Buenas tardes | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Mirabilis jalapa</i> L. | Central America | Dondiego de Noche | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb. | Asia, Oceania | Pa | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb. | Asia, Oceania | Pa canoa | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Monnina</i> sp. | N/A | Monina | Sc | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Monnina</i> sp. | N/A | Tinto | P | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Monnina aestuans</i> (L.f.) DC. | Native | Tintillo | P | S | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Monnina aestuans</i> (L.f.) DC. | Native | Tinto | P | S | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Monnina padifolia</i> (Bonpl.) Freire-Fierro | Native | Tintillo | P | Ss | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Monnina pulchra</i> Chodat | Native | Tinto | P | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Monochaetum myrtoideum</i> Naudin | Native | Angelito | Un | S | Ss | | | x | | x | x | | | x | | | | | | | | | x | x |
| <i>Monochaetum myrtoideum</i> Naudin | Native | Saltón | Un | S | Ss | | | x | | x | x | | | x | | | | | | | | | x | x |
| <i>Monstera</i> sp. | N/A | Balazos | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Monstera deliciosa</i> Liebm. | Central America | Balazo | P | Th | Cp | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Montanoa quadrangularis</i> Sch.Bip. | Native | Arboloco | Un | T | S | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | x |
| <i>Morella parvifolia</i> (Benth.) Parra-Os. | Native | Laurel | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morella parvifolia</i> (Benth.) Parra-Os. | Native | Laurel de Cera | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morella parvifolia</i> (Benth.) Parra-Os. | Native | Laurel de cera hojimenudo | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morella parvifolia</i> (Benth.) Parra-Os. | Native | Laurel de Monte | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morella pubescens</i> (Willd.) Wilbur | Native | Laurel | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morella pubescens</i> (Willd.) Wilbur | Native | Laurel de Cera | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morella pubescens</i> (Willd.) Wilbur | Native | Laurel de cera hojiancho | P | T | S | | | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x | x |
| <i>Morus alba</i> L. | Asia | Morera | P | T | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | |
| <i>Muehlenbeckia tamnifolia</i> (Kunth) Meisn. | Native | Bejuco chivo | G | Cp | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Muehlenbeckia tamnifolia</i> (Kunth) Meisn. | Native | Bejuco colorado | G | Cp | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | | |
| <i>Musa × paradisiaca</i> L. | Asia | Plátano | G | Th | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Musa × paradisiaca</i> L. | Asia | Plátano habano | G | Th | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Musa velutina</i> H.Wendl. & Drude | Asia | Camburcito rosado | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Musa velutina</i> H.Wendl. & Drude | Asia | Platanitos | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Mutisia clematis</i> L.f. | Native | Clavelino | P | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Mutisia clematis</i> L.f. | Native | Clavellino | P | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myrcia cucullata</i> O.Berg | Native | Arrayán | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrcia popayanensis</i> Hieron. | Native | Arrayán | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrcia popayanensis</i> Hieron. | Native | Arrayán colorado | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrcia popayanensis</i> Hieron. | Native | Endrino | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrcianthes</i> sp. | N/A | Guayabo arrayán | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myrcianthes leucoxylla</i> (Ortega) McVaugh | Native | Arrayán | G | T | S | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes leucoxylla</i> (Ortega) McVaugh | Native | Arrayán blanco | G | T | S | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes leucoxylla</i> (Ortega) McVaugh | Native | Guayabo de Castilla | G | T | S | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes orthostemon</i> (O.Berg) Grifo | Native | Arrayán | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Myrcianthes orthostemon</i> (O.Berg) Grifo | Native | Arrayán blanco | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Arrayán | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Arrayán blanco | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Arrayán de los Andes | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Arrayán guayabo | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Arrayán negro | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Guayabo | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Guayabo macho | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrcianthes rhopaloides</i> (Kunth) McVaugh | Native | Hueso | Un | T | | | | x | x | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | x |
| <i>Myrsine</i> sp. | N/A | Aguaquín | Un | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myrsine</i> sp. | N/A | Cucharo | P | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) Roem. & Schult. | Native | Cucharo | P | T | S | Ss | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) Roem. & Schult. | Native | Escolín | Un | T | S | Ss | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) Roem. & Schult. | Native | Espadero | Un | T | S | Ss | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) Roem. & Schult. | Native | Mantecoso | Un | T | S | Ss | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Myrsine dependens</i> (Ruiz & Pav.) Spreng. | Native | Cucharillo | P | T | S | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myrsine latifolia</i> (Ruiz & Pav.) Spreng. | Native | Cucharo | P | T | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Myrtus communis</i> L. | Europe, Africa, Asia | Mirto | G | S | Ss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Nasturtium officinale</i> R.Br. | Europe, Asia | Berros | G | Th | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Nectandra</i> sp. | N/A | Amarillo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nectandra acutifolia</i> (Ruiz & Pav.) Mez | Native | Laurel | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nectandra globosa</i> (Aubl.) Mez | Native | Amarillo | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nectandra laurel</i> Nees | Native | Aguacatillo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nematanthus gregarius</i> D.L. Denham | South America | Pescadito | P | Ss | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia) through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Nematanthus gregarius</i> D.L. Denham | South America | Pescaditos | P | Ss | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia</i> sp. | N/A | Neoregelia | Sc | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia ampullacea</i> (E.Morren) L.B.Sm. | South America | Bromelia atigrada | Sc | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia ampullacea</i> (E.Morren) L.B.Sm. | South America | Canasticos | Un | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L.B.Sm. | South America | Carolina | Sc | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia carolinae</i> var. <i>tricolor</i> M.B.Foster | South America | Flandria | Sc | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia carolinae</i> var. <i>tricolor</i> M.B.Foster | South America | Tricolor | Sc | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia carolinae</i> var. <i>tricolor</i> M.B.Foster | South America | Vandurme | Sc | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neoregelia pendula</i> L.B.Sm. | South America | Canasticos | Un | Eh | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nephrolepis</i> sp. | N/A | Helecho | G | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nephrolepis</i> sp. | N/A | Helecho peine | G | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl | Unknown | Helecho | G | Hf | Ef | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl | Unknown | Helecho peine | G | Hf | Ef | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nephrolepis pendula</i> (Raddi) J.Sm. | Native | Helecho | G | Hf | Ef | | | | | x | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nerium oleander</i> L. | Europe, Asia | Adelfa | G | S | Ss | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nertera granadensis</i> (L.f.) Druce | Native | Coralito | P | Th | Cp | | x | x | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Neurolepis aperta</i> (Munro) Pilg. | Native | Cerbatana | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Neurolepis elata</i> (Kunth) Pilg. | Native | Cerbatana | P | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Nicotiana alata</i> Link & Otto | South America | Tabaco ornamental | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nicotiana tabacum</i> L. | Native | Tabaco | G | Cp | | | | | x | x | | | | x | | | | x | x | | | |
| <i>Nigella damascena</i> L. | Europe | Espuela de Caballero | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger | Native | Calaguala | G | Hf | Ef | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Niphogeton</i> sp. | N/A | Apio de Monte | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Niphogeton dissecta</i> (Benth.) J.F.Macbr. | Native | Apio de Monte | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Niphogeton glaucescens</i> (Kunth) J.F.Macbr. | Native | Apio de Monte | Sc | Ss | Th | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Niphogeton glaucescens</i> (Kunth) J.F.Macbr. | Native | Apio silvestre | Sc | Ss | Th | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Niphogeton ternata</i> (Schult.) Mathias & Constance | Native | Apio de Monte | Sc | Ss | Th | | x | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Niphogeton ternata</i> (Schult.) Mathias & Constance | Native | Apio de Páramo | Sc | Ss | Th | | x | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Niphogeton ternata</i> (Schult.) Mathias & Constance | Native | Perejil de Monte | P | Ss | Th | | x | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Noticastrum marginatum</i> (Kunth) Cuatrec. | Native | Tabera | Un | Th | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Nymphaea</i> sp. | N/A | Loto | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Nymphaea</i> sp. | N/A | Nenúfar | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Ocimum basilicum</i> L. | Africa, Asia | Albaca | G | Th | | | | | x | | | | | x | | | | x | | | | |
| <i>Ocimum basilicum</i> L. | Africa, Asia | Albahaca | G | Th | | | | | x | | | | | x | | | | x | | | | |
| <i>Ocimum basilicum</i> L. | Africa, Asia | Albahaca morada | G | Th | | | | | x | | | | | x | | | | x | | | | |
| <i>Ocimum tenuiflorum</i> L. | Africa, Asia | Albahaca morada | G | Ss | Th | | | | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Ocotea calophylla</i> Mez | Native | Amarillo | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Ocotea calophylla</i> Mez | Native | Ocoteas | G | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Ocotea heterochroma</i> Mez & Sodiro | Native | Laurel | G | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | |
| <i>Ocotea heterochroma</i> Mez & Sodiro | Native | Ocoteas | G | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Olea Europea</i> L. | Europe, Africa, Asia | Olivo | G | T | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Olea Europea</i> L. | Europe, Africa, Asia | Olivo europeo | G | T | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oncidium luteopurpureum</i> (Lindl.) Beer | Native | Flor de Bogotá | P | Eh | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oncidium luteopurpureum</i> (Lindl.) Beer | Native | Orquídea | Sc | Eh | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. | Central America | Higo | G | S | | | | | | | x | x | | | | | x | | x | x | | | |
| <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. | Central America | Higo de tuna | G | S | | | | | | | x | x | | | | | x | | x | x | | | |
| <i>Oreobolus goeppingeri</i> Suess. | Native | Cortadera | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oreomyrrhis andicola</i> (Kunth) Hook.f. | Native | Apio | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oreomyrrhis andicola</i> (Kunth) Hook.f. | Native | Apio miniatura | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oreopanax</i> sp. | N/A | Mano de Oso | P | | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Oreopanax bogotensis</i> Cuatrec. | Native | Dedos | P | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax bogotensis</i> Cuatrec. | Native | Higuerón | Un | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax bogotensis</i> Cuatrec. | Native | Mano de Oso | P | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax bogotensis</i> Cuatrec. | Native | Pata de Indio | Un | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch. | Native | Aralia | Sc | T | Et | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax incisus</i> (Schult.) Decne. & Planch. | Native | Higuerón | Un | T | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax incisus</i> (Schult.) Decne. & Planch. | Native | Mano de Oso | P | T | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax incisus</i> (Schult.) Decne. & Planch. | Native | Manuelión | P | T | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | x |
| <i>Oreopanax mutisianus</i> (Kunth) Decne. & Planch. | Native | Mano de Oso | P | T | S | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Origanum majorana</i> L. | Europe, Asia | Mejorana | G | Ss | Th | | | | x | x | | x | | | | x | | | | x | x | | |
| <i>Origanum vulgare</i> L. | Europe, Asia | Orégano | G | Th | | | | | x | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq. | Africa | Estrella de Belén | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Ornithogalum thyrsoides</i> Jacq. | Africa | Flor de Belén | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Orthrosanthus chimboracensis</i> (Kunth) Baker | Native | Espadilla | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Orthrosanthus chimboracensis</i> (Kunth) Baker | Native | Esterillo | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Orthrosanthus chimboracensis</i> (Kunth) Baker | Native | Estrellita | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Oryza sativa</i> L. | Asia | Arroz | G | Th | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Osteospermum fruticosum</i> (L.) Norl. | Africa | Margarita | Un | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Osteospermum fruticosum</i> (L.) Norl. | Africa | Margarita injerto | Un | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Otholobium mexicanum</i> (L.f.) J.W.Grimes | Native | Otolobium | Sc | S | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Otholobium mexicanum</i> (L.f.) J.W.Grimes | Native | Rúchica | G | S | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Otholobium mexicanum</i> (L.f.) J.W.Grimes | Native | Trinitaria | P | S | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oxalis</i> sp. | N/A | Acedera | G | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Oxalis</i> sp. | N/A | Cedera | P | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Oxalis</i> sp. | N/A | Chulco | G | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Oxalis</i> sp. | N/A | Platanito | P | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Oxalis</i> sp. | N/A | Trébol | P | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Oxalis</i> sp. | N/A | Trébol morado | P | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | |
| <i>Oxalis latifolia</i> Kunth | Native | Trébol | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Oxalis medicaginea</i> Kunth | Native | Chulco | G | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Oxalis medicaginea</i> Kunth | Native | Vinagrera | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Cubia | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Hibia | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Huisisai | Un | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Ibia | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Ibias | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Oca | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Papa roja | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Quiba | G | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Oxalis tuberosa</i> Molina | Native | Timbo | Un | Th | | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Pachystachys lutea</i> Nees | South America | Camarón | P | S | Ss | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Pachystachys lutea</i> Nees | South America | Camarón amarillo | P | S | Ss | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Paepalanthus alpinus</i> Körn. | Native | Quiche | G | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paepalanthus andicola</i> Körn. | Native | Quice de Páramo | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paepalanthus karstenii</i> Ruhland | Native | Colchón | Un | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Palicourea lineariflora</i> Wernham | Native | Tominejero | P | T | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Papaver somniferum</i> L. | Europe, Africa, Asia | Amapola | G | Th | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Parajubaea cocoides</i> Burret | Native | Pa coquito | G | P | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen | Oceania | Acacia bracinga | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen | Oceania | Acacia negra | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen | Oceania | Acacia sabanera | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. | Native | Palitaria | Sc | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Paspalum bonplandianum</i> Flüggé | Native | Pasto | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Paspalum bonplandianum</i> Flüggé | Native | Poa peluda | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora</i> sp. | N/A | Curuba | G | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Passiflora</i> sp. | N/A | Curuba de Indio | G | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Passiflora</i> sp. | N/A | Curuba de Monte | G | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Passiflora</i> sp. | N/A | Curuba dulce | G | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Passiflora crispolanata</i> L.Uribe | Native | Curuba | G | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora cuatrecasasii</i> Killip | Native | Granadilla de Monte | G | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora cumbalensis</i> (H.Karst.) Harms | Native | Curuba | G | Cp | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora cumbalensis</i> (H.Karst.) Harms | Native | Curuba bogotana | G | Cp | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora cumbalensis</i> (H.Karst.) Harms | Native | Curuba de Bogotá | G | Cp | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora edulis</i> Sims | Native | Gulupa | G | Cp | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora edulis</i> var. <i>edulis</i> | Native | Gulupa | G | Cp | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Passiflora ligularis</i> Juss. | Native | Granadilla | G | Cp | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Passiflora longipes</i> Juss. | Native | Curuba de Monte | G | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Passiflora manicata</i> (Juss.) Pers. | Native | Curuba | G | Cp | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| <i>Passiflora mixta</i> L.f. | Native | Curuba | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Passiflora mixta</i> L.f. | Native | Curuba de Indio | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Passiflora mixta</i> L.f. | Native | Curuba de Monte | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Passiflora mixta</i> L.f. | Native | Curuba india | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Passiflora mixta</i> L.f. | Native | Curubo | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Passiflora pinnatistipula</i> Cav. | South America | Curuba | G | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | |
| <i>Passiflora pinnatistipula</i> Cav. | South America | Granadilla de Quijos | G | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | |
| <i>Passiflora pinnatistipula</i> Cav. | South America | Gulupa | G | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | |
| <i>Passiflora pinnatistipula</i> Cav. | South America | Tacso | Un | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | |
| <i>Passiflora popenovii</i> Killip | Native | Granadilla de Quijos | G | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | |
| <i>Passiflora tarminiana</i> Coppens & V.E.Barney | Native | Curuba | G | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Passiflora tarminiana</i> Coppens & V.E.Barney | Native | Curuba india | G | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Passiflora tarminiana</i> Coppens & V.E.Barney | Native | Tumbo | Un | Cp | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Passiflora tripartita</i> (Juss.) Poir. | Native | Curuba | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora tripartita</i> (Juss.) Poir. | Native | Curuba silvestre | G | Cp | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels. & P.Jørg. | Native | Curuba | G | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Passiflora tripartita</i> var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels. & P.Jørg. | Native | Curuba de Castilla | G | Cp | | | | | | | x | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Pecluma</i> sp. | N/A | Helecho peine | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium</i> sp. | N/A | Geranio | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hér. | Africa | Geranio | Sc | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. | Africa | Aroma | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. | Africa | Sorcilicio | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium odoratissimum</i> (L.) L'Hér. | Africa | Citronela | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hér. | Africa | Geranio péndulo | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Hér. | Africa | Hoja de Hiedra | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium zonale</i> (L.) Aiton | Africa | Geranio | Sc | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium zonale</i> (L.) Aiton | Africa | Novio | P | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium zonale</i> (L.) Aiton | Africa | Novio rojo | P | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium zonale</i> (L.) Aiton | Africa | Novio rosado | P | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pelargonium zonale</i> (L.) Aiton | Africa | Novios | P | Th | | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pentacalia</i> sp. | N/A | Panque | Un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pentacalia abietina</i> (Wedd.) Cuatrec. | Native | Romero de Monte | P | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pentacalia andicola</i> (Turcz.) Cuatrec. | Native | Amargoso | P | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pentacalia andicola</i> (Turcz.) Cuatrec. | Native | Palo blanco | P | S | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pentacalia ledifolia</i> (Kunth) Cuatrec. | Native | Guasguín | G | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pentacalia ledifolia</i> (Kunth) Cuatrec. | Native | Romero | P | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Pentacalia ledifolia</i> (Kunth) Cuatrec. | Native | Romero cimarrón | P | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud | Africa | Pa canaria | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud | Africa | Pa de Canarias | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud | Africa | Pa Fénix | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix dactylifera</i> L. | Asia | Dátil | G | P | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix reclinata</i> Jacq. | Africa | Pa de Senegal | G | T | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | Asia | Pa | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | Asia | Pa fénix roebeleni | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | Asia | Pa Pasto | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien | Asia | Pa roebeleni | G | P | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst. | Oceania | Economía | P | Th | | | | | x | | | | | | | | x | | | | x | |
| <i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst. | Oceania | Formio | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | x | | | | x | |
| <i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst. | Oceania | Lino de Nueva Zelanda | P | Th | | | | | x | | | | | | | | x | | | | x | |
| <i>Phyllanthus salviifolius</i> Kunth | Native | Cedrillo | P | T | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phyllanthus salviifolius</i> Kunth | Native | Cedrito de clima frío | P | T | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phyllanthus salviifolius</i> Kunth | Native | Yuco | P | T | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phyllostachys</i> sp. | N/A | Bambú verde | G | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C.Rivière | Asia | Bambú pequeño | G | T | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Physalis peruviana</i> L. | Native | Aguimanto | G | Ss | Th | | x | x | x | | x | x | | | | | | x | x | | | |
| <i>Physalis peruviana</i> L. | Native | Uchuva | G | Ss | Th | | x | x | x | | x | x | | | | | | x | x | | | |
| <i>Physalis peruviana</i> L. | Native | Uvilla | P | Ss | Th | | x | x | x | | x | x | | | | | | x | x | | | |
| <i>Physalis peruviana</i> L. | Native | Uvillo | P | Ss | Th | | x | x | x | | x | x | | | | | | x | x | | | |
| <i>Phytelephas macrocarpa</i> Ruiz & Pav. | Native | Tagua | G | P | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Phytolacca</i> sp. | N/A | Guaba | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Phytolacca bogotensis</i> Kunth | Native | Guaba | G | Th | | | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | x | | x | |
| <i>Phytolacca dioica</i> L. | Native | Ombú | G | T | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Pilea</i> sp. | N/A | Palitaria | Sc | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin | Asia | Pilea | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Pinus</i> sp. | N/A | Pino | G | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | x |
| <i>Pinus</i> sp. | N/A | Pino candelabro | G | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | x |
| <i>Pinus patula</i> Schltdl. & Cham. | Central America | Pino | G | T | | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | | x | x |
| <i>Pinus patula</i> Schltdl. & Cham. | Central America | Pino barbas de Chivo | G | T | | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | | x | x |
| <i>Pinus patula</i> Schltdl. & Cham. | Central America | Pino candelabro | G | T | | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | | x | x |
| <i>Pinus patula</i> Schltdl. & Cham. | Central America | Pino pátula | G | T | | | | x | x | | | | x | | | | | x | x | | x | x |
| <i>Pinus radiata</i> D.Don | North America | Candelabro | P | T | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Pinus radiata</i> D.Don | North America | Pino candelabro | G | T | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Pinus radiata</i> D.Don | North America | Pino de Monterrey | Sc | T | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Pinus radiata</i> D.Don | North America | Pino insigne | G | T | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Piper</i> sp. | N/A | Cordoncillo | P | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Piper artanthe</i> C.DC. | Native | Cordoncillo | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | |
| <i>Poaceae</i> sp. | N/A | Pasto | G | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don | Native | Chaquiuro | G | T | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don | Native | Pino chaquiuro | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don | Native | Pino colombiano | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don | Native | Pino hayuelo | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polianthes tuberosa</i> L. | Central America | Jacinto | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polianthes tuberosa</i> L. | Central America | Nardo | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polygala</i> sp. | N/A | Polígala | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polygonum</i> sp. | N/A | Barbasco rojo | G | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Polygonum acuminatum</i> Kunth | Native | Barbasco | G | Ss | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Polygonum acuminatum</i> Kunth | Native | Barbasco de Pulgas | G | Ss | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Polygonum capitatum</i> D.Don | Asia | Barbasco | G | Th | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polygonum capitatum</i> D.Don | Asia | Confeti | P | Th | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polygonum nepalense</i> Meisn. | Asia | Gualola | Un | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Polygonum nepalense</i> Meisn. | Asia | Pasto colorado | P | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Polygonum punctatum</i> Elliott | Native | Barbasco | G | Th | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Polygonum segetum</i> Kunth | Native | Barbasco | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Polylepis quadrijuga</i> Bitter | Native | Colorado | P | T | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Polypodium</i> sp. | N/A | Calaguala | G | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Polypodium</i> sp. | N/A | Helecho | G | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Polyscias guilfoylei</i> (W.Bull.) L.H.Bailey | Asia, Oceania | Espuma de Mar | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Polyscias scutellaria</i> (Burm.f.) Fosberg | Asia, Oceania | Millonaria | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Populus deltoides</i> Marshall | North America | Álamo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Populus nigra</i> L. | Europe | Álamo negro | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Portulaca oleracea</i> L. | North America | Verdolaga | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult. | Native | Guayabo de Mico | G | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult. | Native | Posoqueria | Sc | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl. | Native | Prescotia | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Primula × polyantha</i> Mill. | Europe, Asia | Primavera | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Primula obconica</i> Hance | Asia | Primula | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Primulaceae</i> sp. | N/A | Corozo | Un | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pritchardia pacifica</i> Seem. & H.Wendl. | Oceania | Abanico | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prumnopitys montana</i> (Willd.) de Laub. | Native | Pino hayuelo | P | T | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prunus</i> sp. | N/A | Cerezo | G | | | | | x | x | | x | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prunus</i> sp. | N/A | Ciruelo | G | | | | | x | x | | x | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prunus buxifolia</i> Koehne | Native | Cerezo de Monte | G | T | S | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prunus domestica</i> L. | Europe, Africa, Asia | Ciruelo | G | T | S | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | Asia | Durazno | G | T | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | Asia | Durazno común | G | T | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | Asia | Melocotón | G | T | S | | | x | x | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Prunus serotina</i> Ehrh. | Central America, South America | Capulí | G | T | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | | x |
| <i>Prunus serotina</i> Ehrh. | Central America, South America | Cerezo | G | T | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | | x |
| <i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> (Spreng.) McVaugh | Central America, South America | Capulí | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> (Spreng.) McVaugh | Central America, South America | Cerezo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Prunus serotina</i> subsp. <i>capuli</i> (Spreng.) McVaugh | Central America, South America | Cerezo criollo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Psidium</i> sp. | N/A | Guayabo | G | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Psidium</i> sp. | N/A | Guayabo del Perú | G | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Psidium cattleianum</i> Sabine | South America | Guayaba del Perú | G | T | S | | | | | | | x | | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Psoralea pinnata</i> L. | Africa | Pino azul | P | S | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Ptychosperma macarthurii</i> (H.J.Veitch) Hook.f. | Oceania | Pa McArthur | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Punica granatum</i> L. | Asia | Granada | G | T | S | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Punica granatum</i> L. | Asia | Granado | G | T | S | | | | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Puya</i> sp. | N/A | Cardón | G | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | x |
| <i>Puya</i> sp. | N/A | Puya | G | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | x |
| <i>Puya nitida</i> Mez | Native | Puya | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Puya santosii</i> Cuatrec. | Native | Cardón | G | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Puya trianae</i> Baker | Native | Puya | G | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid. | Asia | Holly espinoso | G | T | | | | | x | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid. | Asia | Mortiño | Un | T | | | | | x | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid. | Asia | Mortiño extranjero | Un | T | | | | | x | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers | South America | Tango | Un | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Pyrus communis</i> L. | Europe, Asia | Pera | G | T | S | | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Pyrus communis</i> L. | Europe, Asia | Pero | G | T | S | | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Quercus humboldtii</i> Bonpl. | Native | Roble | G | T | | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | x | x |
| <i>Ranunculus praemorsus</i> DC. | Native | Centella | Un | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Europe | Alpiste | G | Th | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Europe | Berros | G | Th | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Europe | Mostaza | P | Th | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Europe | Rábano | G | Th | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | Asia | Rábano | G | Th | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | Asia | Rábano blanco | G | Th | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | Asia | Rábano daicón | G | Th | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | Asia | Rábano forrajero | G | Th | | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn. | Africa | Pa del Viajero | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) C.N.Page | Native | Pino colombiano | P | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) C.N.Page | Native | Pino de Montaña | P | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) C.N.Page | Native | Pino de Pacho | P | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Retrophyllum rospigliosii</i> (Pilg.) C.N.Page | Native | Pino romerón | P | T | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Rhamnus</i> sp. | N/A | Amargoso | P | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Rhamnus goudotiana</i> Triana & Planch. | Native | Ojo de Perdiz | P | T | S | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rhapis excelsa</i> (Thumb.) Henry | Asia | Pa rafis | G | S | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rhodiola pachyclados</i> (Aitch. & Hemsl.) H. Ohba | Asia | Sedum clara de huevo | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rhododendron</i> sp. | N/A | Azalea biflora | G | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | Asia | Azalea | G | S | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | Asia | Azalea doble | G | S | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | Asia | Biflora | P | S | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Rhynchospora</i> sp. | N/A | Cortadera | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rhynchospora macrochaeta</i> Boeckeler | Native | Cortadera | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeckeler | Native | Tote | G | Th | | | | | x | | | x | | | | | | x | | | | |
| <i>Rhynchospora ruiziana</i> Boeckeler | Native | Cortadera | P | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ricinus communis</i> L. | Africa | Higuerilla | G | S | | | | x | | x | | | | | | | x | x | x | x | | |
| <i>Ricinus communis</i> L. | Africa | Higuerillo | G | S | | | | x | | x | | | | | | | x | x | x | x | | |
| <i>Rosa</i> sp. | N/A | Rosa | G | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rosa</i> sp. | N/A | Rosas de Castilla | G | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rosa</i> sp. | N/A | Roso | G | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rosa</i> sp. | N/A | Rosa blanca | G | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rosa chinensis</i> Jacq. | Asia | Rosa | G | S | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | Europe, Asia | Romerillo | G | S | Ss | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | Europe, Asia | Romero | G | S | Ss | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F.Cook | Caribbean | Pa real | G | P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Rubus</i> sp. | N/A | Mora | P | | | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus</i> sp. | N/A | Mora de Castilla | P | | | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus</i> sp. | N/A | Mora de Monte | P | | | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus</i> sp. | N/A | Mora silvestre | P | | | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus</i> sp. | N/A | Morón | P | | | | | | x | x | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus acanthophyllos</i> Focke | Native | Mora de Monte | P | Ss | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rubus acanthophyllos</i> Focke | Native | Zarzamora | P | Ss | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rubus bogotensis</i> Kunth | Native | Mora de Perro | P | Ss | | | | x | x | | | x | x | | | | | | x | | | |
| <i>Rubus bogotensis</i> Kunth | Native | Mora de Piedra | P | Ss | | | | x | x | | | x | x | | | | | | x | | | |
| <i>Rubus bogotensis</i> Kunth | Native | Mora de Zorro | P | Ss | | | | x | x | | | x | x | | | | | | x | | | |
| <i>Rubus bogotensis</i> Kunth | Native | Mora silvestre | P | Ss | | | | x | x | | | x | x | | | | | | x | | | |
| <i>Rubus bogotensis</i> Kunth | Native | Zarzamora | P | Ss | | | | x | x | | | x | x | | | | | | x | | | |
| <i>Rubus glaucus</i> Benth. | Native | Mora | P | S | Ss | | | | x | | | x | | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus glaucus</i> Benth. | Native | Mora de Castilla | P | S | Ss | | | | x | | | x | | | | | | | x | x | | |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Rubus glaucus</i> Benth. | Native | Morón | P | S | Ss | | | x | | | x | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Rubus idaeus</i> L. | Europe, Asia | Frambuesa | G | Ss | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rubus megalococcus</i> Focke | Native | Mora | P | Ss | | | | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rubus megalococcus</i> Focke | Native | Morita | P | Ss | | | | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rubus megalococcus</i> Focke | Native | Morita de monte | P | Ss | | | | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rubus nubigenus</i> Kunth | Native | Morón | P | S | Ss | | | x | | | x | | | | | | | x | | | | |
| <i>Rubus robustus</i> C.Presl. | Native | Mora silvestre | P | Ss | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rumex</i> sp. | N/A | Arracachuelo | G | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Rumex</i> sp. | N/A | Cardillo | Un | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Rumex</i> sp. | N/A | Lengua de Vaca | P | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Rumex</i> sp. | N/A | Romaza | G | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Rumex acetosella</i> L. | Europe, Africa, Asia | Yerba envidia | Un | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rumex crispus</i> L. | Europe | Lengua de Vaca | P | Th | | | | x | x | x | | | | | | | | x | | | | x |
| <i>Rumex crispus</i> L. | Europe | Romaza | G | Th | | | | x | x | x | | | | | | | | x | | | | x |
| <i>Rumex tolimensis</i> Wedd. | Native | Bijuacal | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rumex tolimensis</i> Wedd. | Native | Bijuacá | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Russelia equisetiformis</i> Schltld. & Cham. | Central America | Lágrimas de Cristo | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Ruta graveolens</i> L. | Europe, Africa, Asia | Ruda | G | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Ruta graveolens</i> L. | Europe, Africa, Asia | Ruda macho | G | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Sabal mauritiformis</i> (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl. | Native | Pa amarga | G | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Saintpaulia ionantha</i> H.Wendl. | Africa | Violeta africana | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salix</i> sp. | N/A | Mimbres | G | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x |
| <i>Salix humboldtiana</i> Willd. | Native | Sauce | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | | |
| <i>Salix humboldtiana</i> Willd. | Native | Sauce llorón | G | T | | | | x | x | | | x | x | | | | | x | x | | | |
| <i>Salvia</i> sp. | N/A | Salvia | G | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia</i> sp. | N/A | Salvia chiquita | P | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia</i> sp. | N/A | Salvia grande | G | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia</i> sp. | N/A | Salvi6n | G | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia amethystina</i> Sm. | Native | Bretonia | G | Ss | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia amethystina</i> Sm. | Native | Salvia | G | Ss | Th | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia bogotensis</i> Benth. | Native | Salvia chiquita | P | S | Ss | | | | | | | | | x | | | | | | | | x |
| <i>Salvia hispanica</i> L. | Central America | Chía | G | Th | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia leucantha</i> Cav. | Central America | Capa de Rey | P | Ss | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia leucantha</i> Cav. | Central America | Terciopelo | P | Ss | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia officinalis</i> L. | Europe | Salvia | G | Ss | Th | | | x | | | x | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia palifolia</i> Kunth | Native | Mastranto | G | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Salvia palifolia</i> Kunth | Native | Salvia | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Salvia scutellarioides</i> Kunth | Native | Mastranto | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Salvia scutellarioides</i> Kunth | Native | Oreja de burro | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Corneta negra | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | x | x | | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Corneta roja | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Corneta roja con blanco | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Corneto | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Criolla | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Criolla común | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Criolla morada | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Criolla negra | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa bandera | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa criolla | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa de año | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa paramuna | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa pastusa | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa sabanera | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Papa única | G | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Solanum tuberosum</i> L. | South America | Turma | P | Th | | | | x | | | x | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy | Europe, Africa, Asia | Centavito | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy | Europe, Africa, Asia | Lágrima de Bebé | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy | Europe, Africa, Asia | Lágrimas de Bebé | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy | Europe, Africa, Asia | Llanto de Bebé | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Sonchus</i> sp. | N/A | Cerraja | Un | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | Europe, Asia | Cerraja | Un | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | Europe, Asia | Cerraja áspera | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L. | Europe, Asia | Cerraja | Un | Th | | | | x | | | x | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L. | Europe, Asia | Cerrajagla | Un | Th | | | | x | | | x | | | | | | x | | x | | | | |
| <i>Sparrmannia africana</i> L.f. | Africa | Alcaparro extranjero | G | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Sparrmannia africana</i> L.f. | Africa | Algodón extranjero | G | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Sparrmannia africana</i> L.f. | Africa | Algodoncillo | G | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Sparrmannia africana</i> L.f. | Africa | Tilo | P | S | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | |
| <i>Spathiphyllum</i> sp. | N/A | Garza | P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Spathiphyllum cannifolium</i> (Sims) Schott | South America | Cala blanca | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel | Native | Anturio blanco | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel | Native | Cala blanca pequeña | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Spathiphyllum wallisii</i> Regel | Native | Espatifilo | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Spergula arvensis</i> L. | Europe, Africa, Asia | Miona | Un | Th | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Spinacia oleracea</i> L. | Asia | Espinaca | G | Th | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Spiraea cantoniensis</i> Lour. | Asia | Buqué de Novia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Spondias purpurea</i> L. | Native | Ciruelo | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. | Native | Espartillo | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stachys byzantina</i> K.Koch | Asia | Estachis | Sc | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Stachys byzantina</i> K.Koch | Asia | Lanuda | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Stachys byzantina</i> K.Koch | Asia | Orejas de Conejo | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. | Europe, Asia | Bretónica | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Stelis pulchella</i> Kunth | Native | Pleurotalis | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Stellaria cuspidata</i> Schldtl. | Native | Calichana | Un | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stenorrhynchos speciosum</i> (Jacq.) Rich. | Native | Orquídea pecosa | Sc | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Stevia</i> sp. | N/A | Estevia | Sc | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stevia lucida</i> Lag. | Native | Chilca | G | S | Ss | Th | x | | | x | | | | x | | | | | | | x | | | |
| <i>Stevia lucida</i> Lag. | Native | Chilca blanca | G | S | Ss | Th | x | | | x | | | | x | | | | | | | x | | | |
| <i>Stevia lucida</i> Lag. | Native | Jarilla | Un | S | Ss | Th | x | | | x | | | | x | | | | | | | x | | | |
| <i>Stevia lucida</i> Lag. | Native | Jarilla blanca | Un | S | Ss | Th | x | | | x | | | | x | | | | | | | x | | | |
| <i>Strelitzia nicolai</i> Regel & K.Koch | Africa | Ave de paraíso gigante | P | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Strelitzia reginae</i> Banks | Africa | Ave del Paraíso | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Campanilla | P | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Estretosolen | Sc | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Mermelada | P | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Mermelado | P | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Mielecita | P | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Tamariz | Un | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Streptosolen jamesonii</i> (Benth.) Miers | South America | Trompetilla | P | S | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Styloceras laurifolium</i> (Willd.) Kunth | Native | Cachito | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Styloceras laurifolium</i> (Willd.) Kunth | Native | Cachitos | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Styrax trichocalyx</i> Perkins | Native | Estoraque | G | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | South America | Pa reina | G | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Syagrus sancona</i> (Kunth) H.Karst. | Native | Sancona | Un | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Symphytum officinale</i> L. | Europe, Asia | Confrey | G | Th | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Symphytum officinale</i> L. | Europe, Asia | Consuelda mayor | P | Th | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | | x | | |
| <i>Symplocos theiformis</i> (L.f.) Oken | Native | Palo blanco | P | S | | | | x | | x | | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Symplocos theiformis</i> (L.f.) Oken | Native | Té de Bogotá | P | S | | | | x | | x | | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Symplocos theiformis</i> (L.f.) Oken | Native | Té de Mutis | P | S | | | | x | | x | | x | x | | | | | | | | | x | x | |
| <i>Syngonium</i> sp. | N/A | Careconejo | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Syngonium podophyllum</i> Schott | Native | Carne de Perro | Un | Eh | Th | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston | Asia | Pomaroso | P | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn. | Oceania | Arrayán extranjero | G | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn. | Oceania | Eugenia | Sc | T | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Tabebuia</i> sp. | N/A | Amarillo | P | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Tagetes</i> sp. | N/A | Asnayuyo | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|----|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill. | Native | Mayo | Un | T | S | | | x | x | | | | | x | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill. | Native | Peladillo | P | T | S | | | x | x | | | | | x | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill. | Native | Sietecueros | P | T | S | | | x | x | | | | | x | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill. | Native | Sietecueros real | P | T | S | | | x | x | | | | | x | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn. | South America | Mayo | Un | T | S | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn. | South America | Sietecueros | P | T | S | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn. | South America | Sietecueros brasileiro | P | T | S | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC.) Cogn. | South America | Sietecueros nazareno | P | T | S | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tigridia pavonia</i> (L.f.) DC. | Central America | Buenas tardes | Un | Th | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tigridia pavonia</i> (L.f.) DC. | Central America | Maravilla | Un | Th | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia</i> sp. | N/A | Quiche | G | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tillandsia andreana</i> André | Native | Tillandsia | Sc | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia archeri</i> L.B.Sm. | Native | Quiche | G | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Tillandsia argentea</i> C. Koch | Central America | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia biflora</i> Ruiz & Pav. | Native | Quiche | G | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | x |
| <i>Tillandsia bulbosa</i> Hook. | Native | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia cacticola</i> L.B. Sm. | South America | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia caput-medusae</i> E. Morren | Central America | Meduse | P | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia caput-medusae</i> E. Morren | Central America | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia deppeana</i> Steud. | Central America | Guiche | G | Eh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tillandsia deppeana</i> Steud. | Central America | Quiche | G | Eh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tillandsia fendleri</i> Griseb. | Native | Cenizo | P | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tillandsia fendleri</i> Griseb. | Native | Quiche | G | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tillandsia fendleri</i> Griseb. | Native | Tres puntas | P | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | x |
| <i>Tillandsia gardneri</i> Lindl. | Native | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia ionantha</i> Planch | Central America | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia pastensis</i> André | Native | Guiche | G | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia pastensis</i> André | Native | Quiche | G | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L. | Native | Barbas | P | Eh | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Tillandsia tricolor</i> Schtdl. & Cham. | Central America | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L. | Native | Barbas de Viejo | P | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L. | Native | Barbaviejo | P | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L. | Native | Melena | P | Eh | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tillandsia xerographica</i> Rohweder | Central America | Tillandsia | Sc | Eh | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray | Central America | Botón de Oro | P | S | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray | Central America | Rayo de Sol | P | S | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tolmiea menziesii</i> (Pursh) Torr. & A.Gray | North America | Madre soltera | Un | Th | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tolmiea menziesii</i> (Pursh) Torr. & A.Gray | North America | Milhoja | P | Th | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Tovomita parviflora</i> Cuatrec. | Native | Sorquín | Un | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---|---|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | |
| <i>Tradescantia</i> sp. | N/A | Sueldaconsueda | P | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| <i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. | South America | Cinta | P | Th | | | | | x | | | x | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Tradescantia fluminensis</i> Vell. | South America | Sueldaconsueda | P | Th | | | | | x | | | x | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt | Central America | Codillo | Un | Th | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Tradescantia pallida</i> (Rose) D.R.Hunt | Central America | Sueldaconsueda | P | Th | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| <i>Tradescantia zebrina</i> Bosse | Central America, South America | Panameña | Un | Th | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Trichanthera gigantea</i> (Humb. & Bonpl.) Nees | Native | Nacedero | P | T | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Europe | Carretón cadillo | P | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Europe | Trébol amarillo | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Europe | Trébol bejuco | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Europe | Trébol | G | Th | | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Europe | Trébol blanco | P | Th | | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Europe | Trébol rosado | G | Th | | | | x | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Europe | Carretón | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Europe | Trébol | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Europe | Trébol de potrero | G | Th | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Trimezia martinicensis</i> (Jacq.) Herb. | Native | Espadilla de Loma | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Triticum aestivum</i> L. | Asia | Trigo | G | Th | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Tropaeolum majus</i> L. | South America | Cachaco de Muladar | P | Cp | | | | x | | x | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum majus</i> L. | South America | Capuchina | P | Cp | | | | x | | x | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum majus</i> L. | South America | Cubia | G | Cp | | | | x | | x | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum majus</i> L. | South America | Espuelas de Galán | P | Cp | | | | x | | x | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubia | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubio | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubio ahuyamo | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubio amarillo | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubio blanco | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubio ejercito | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubio negro | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubios | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubios amarillos | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubios blancos | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Cubios morados | G | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tropaeolum tuberosum</i> Ruiz & Pav. | Native | Nabo | P | Cp | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | |
| <i>Tulbaghia simmleri</i> Beauverd | Africa | Tulbagia | Sc | Th | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Tulbaghia violacea</i> Harv. | Africa | Ajo de Rico | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Tulbaghia violacea</i> Harv. | Africa | Ajo de Sociedad | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <i>Typha latifolia</i> L. | Native | Enea | G | Aq | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | x | |



Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O | | | | | | |
| <i>Typha latifolia</i> L. | Native | Junco plano | P | Aq | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <i>Ugni myricoides</i> (Kunth) O.Berg | Native | Arrayancillo | G | S | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ugni myricoides</i> (Kunth) O.Berg | Native | Nigua | P | S | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ulex Europeus</i> L. | Europe, Africa, Asia | Aulaga | G | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ulex Europeus</i> L. | Europe, Africa, Asia | Retamo | G | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ulex Europeus</i> L. | Europe, Africa, Asia | Retamo espinoso | G | S | Th | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Chugua | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Chugua amarilla | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Chugua roja | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Chugua verde | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Chuguas | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Olluco | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Ruba | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ullucus tuberosus</i> Caldas | Native | Ulluco | G | Th | Cp | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urochloa</i> sp. | N/A | Braquiaria | Sc | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica</i> sp. | N/A | Ortiga | G | | | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica</i> sp. | N/A | Ortiga negra | G | | | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Europe, Asia | Ortiga | G | Th | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Europe, Asia | Ortiga blanca | G | Th | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica leptophylla</i> Kunth | Native | Ortiga | G | S | Th | Cp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica urens</i> L. | Europe | Ortiga | G | Th | | | | x | x | x | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinium floribundum</i> Kunth | Native | Agracejo | P | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinium floribundum</i> Kunth | Native | Agraz | G | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinium floribundum</i> Kunth | Native | Reventadera | P | S | | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinium meridionale</i> Sw. | Native | Agracejo | P | S | | | | | | | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinium meridionale</i> Sw. | Native | Agraz | G | S | | | | | | | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinium meridionale</i> Sw. | Native | Mortiño | Un | S | | | | | | | x | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <i>Valeriana</i> sp. | N/A | Valeriana | Sc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Valeriana officinalis</i> L. | Europe | Valeriana | Sc | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Valeriana pilosa</i> Ruiz & Pav. | Native | Valeriana | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Valeriana pilosa</i> Ruiz & Pav. | Native | Valeriana de Páramo | Sc | Th | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vallea stipularis</i> L.f. | Native | Campano | P | T | S | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vallea stipularis</i> L.f. | Native | Chaque | G | T | S | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vallea stipularis</i> L.f. | Native | Raque | G | T | S | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vallea stipularis</i> L.f. | Native | Rosalino | P | T | S | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vallea stipularis</i> L.f. | Native | Sanjuanito | Un | T | S | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Cuerinegro | P | T | S | Ss | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Friegaplatos | P | T | S | Ss | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Guácimo | G | T | S | Ss | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S3. Cont.

| Species | Origin taxa | Common name | Etymological origin | Growth form | | | Habitat | | | Use categories | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------|-------------|----|----|---------|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Ch | Rh | Uh | Ag | Fo | En | Cr | Fu | Cu | In | Wo | Me | Or | Lv | Te | O |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Mulato | Un | T | S | Ss | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Palo amargo | P | T | S | Ss | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Palo negro | P | T | S | Ss | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Salvio | P | T | S | Ss | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Varronia cylindrostachya</i> Ruiz & Pav. | Native | Salvio negro | P | T | S | Ss | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Chamburu | Un | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Papaya Arequipeña | G | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Papaya de Monte | G | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Papaya lechosa | P | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Papayo | P | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Papayuela | P | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Vasconcellea pubescens</i> A.DC. | Native | Papayuelo | P | T | | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | x | | | |
| <i>Verbena</i> sp. | N/A | Verbena | Sc | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Verbena</i> sp. | N/A | Verbena negra | Sc | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Verbena litoralis</i> Kunth | Native | Verbena | Sc | S | Ss | Th | x | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Verbena litoralis</i> Kunth | Native | Verbena amarilla | Sc | S | Ss | Th | x | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Verbena litoralis</i> Kunth | Native | Verbena negra | Sc | S | Ss | Th | x | | x | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Verbesina</i> sp. | N/A | Tabaquillo | P | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Verbesina crassiramea</i> S.F.Blake | Native | Tabaquillo | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Viburnum</i> sp. | N/A | Garrocho | Un | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Viburnum lasiophyllum</i> Benth. | Native | Jucua | Un | T | S | | | x | | | | | | | | | | x | | | | |
| <i>Viburnum tinoides</i> L.f. | Native | Chucua | G | T | S | Cp | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viburnum tinoides</i> L.f. | Native | Chuque | Un | T | S | Cp | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viburnum tinoides</i> L.f. | Native | Garrocho | Un | T | S | Cp | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viburnum tinoides</i> L.f. | Native | Juco | Un | T | S | Cp | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viburnum tinoides</i> L.f. | Native | Ruque | G | T | S | Cp | x | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vicia andicola</i> Kunth | Native | Vicia | Sc | Th | Cp | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <i>Vicia faba</i> L. | Asia | Haba | G | Th | Cp | | | x | | x | x | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vinca major</i> L. | Europe, Africa | Cortejo | P | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vinca major</i> L. | Europe, Africa | Doncella | Un | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vinca major</i> L. | Europe, Africa | Vinca | Sc | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vinca major</i> L. | Europe, Africa | Vinca variegada | Sc | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vinca major</i> L. | Europe, Africa | Vinca verde | Sc | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vinca major</i> L. | Europe, Africa | Viudita | P | Th | Cp | | | | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viola odorata</i> L. | Europe, Asia | Mastranto | P | Th | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viola odorata</i> L. | Europe, Asia | Violeta | G | Th | | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viola tricolor</i> L. | Europe, Asia | Pensamiento | P | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Viola tricolor</i> L. | Europe, Asia | Pensamientos | Un | Th | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | |
| <i>Vitis vinifera</i> L. | Asia | Uva | G | Cp | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |



Table S4. Sources used to investigate origin of taxa, hábitat, uses, etymologies and other attributes of plants with common names in Bogotá D.C. C=Combination, TO=Taxa origin, CH=Conserved habitat, RH=Rural habitat, UH=Urban hábitat, H=Height, U=Uses, NO=Name origin, NS=Name story, E=Etymology. Source type: A= Article, Ar=Attribute resource, B= Book, D=Data base, Im=Informative material, I=Informant, L=Literature, Tr= Technical report, Wr=Web resource.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| <i>Acca sellowiana</i> (O.Berg) Burret. (2016). Recuperado el 25 de octubre de 2017, a partir de https://www.gbif.org/species/5418629 | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Alstroemeria aurea</i> . Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a436 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| <i>Alternanthera ficoidea</i> . Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a485 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| <i>Calathea zebrina</i> . Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=282666&isprofile=0& | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Calendula officinalis</i> L. (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?8457 | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Crotalaria agatiflora</i> . (n.d). Plant Finder. (2016). Recuperado el 9 de diciembre de 2016, a partir de https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/crotalaria_agatiflora.htm | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Delosperma cooperi</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b464 | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Episcia cupreata</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b552 | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Eucharis amazonica</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=275747&isprofile=0& | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Fragaria × ananassa</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=255945&isprofile=0& | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. (2016). Recuperado el 23 de mayo de 2017, a partir de http://www.gbif.org/species/2781103 | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Hypericum patulum</i> in Flora of China @ efloras.org. (s/f). Recuperado el 9 de diciembre de 2016, a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200014235 | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Hypoestes phyllostachya</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a515 | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N.E.Br. (2016). Recuperado el 23 de mayo de 2017, a partir de http://www.gbif.org/species/3705230 | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Neoregelia carolinae</i> f. <i>tricolor</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=291611&isprofile=0& | Ar | | x | | | | x | | | | |
| <i>Nicotiana alata</i> - Plant Finder. Recuperado el 9 de diciembre de 2016, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a597 | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Platyterium</i> . (2006). Recuperado el 23 de mayo de 2017, a partir de https://www.anbg.gov.au/gnp/interns-2006/platyterium-superbum.html | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Plectranthus forsteri</i> "Marginatus" - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=c856 | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Pyrostegia venusta</i> (flame vine) :: Plants & Fungi at Kew. (s/f). Recuperado el 9 de diciembre de 2016, a partir de http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/pyrostegia-venusta-flame-vine | Ar | | x | | | | | | | | |
| <i>Schlumbergera truncata</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b669 | Ar | | | | | | x | | | | |
| <i>Vriesea splendens</i> - Plant Finder. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b572 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Abdulla, P. (1972). Meliaceae. En E. Nasir & S. Ali (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 17, p. 8). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Departament of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151184?selectedversion=NBD24561109 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Academia Colombiana de la Lengua. (2012). Breve diccionario de colombianismos (4ta Edición). Bogotá, Colombia. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Acevedo-Rodríguez, P., & Strong, M. T. (2012). Catalogue of Seed Plants of the West Indies. Smithsonian Contributions to Botany, (98), 1–1192. | Ar | | x | | | | | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Acosta-Castellanos, S. (2007). Betulaceae. En R. Medina Lemos, J. G. Sanchez Ken, A. Garcia Mendoza, & S. Arias Montes (Eds.), Flora del Valle de Tehuacán - Cuicatlán (Vol. 54, pp. 1–20). México: Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Acuerdo 109 de 2003 Concejo de Bogotá D.C. (2003). Recuperado el 26 de marzo de 2017, a partir de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11016 | Ar | | | | | | | | x | x | |
| Acuña, L. A. (1983). Diccionario de Bogotanismos: Instituto colombiano de cultura hispánica. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Aedo Pérez, C., Castroviejo, S., Herrero Nieto, A., Romero Zarco, C., Sáez Goñalons, llorenç, & Salgueiro González, F. J. (1999). Leguminosae. En Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. II, p. 622). Editorial CSIC - CSIC Press. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Aedo, C., Alonso, J. L. F., & Navarro, C. (2009). <i>Geranium holosericeum</i> (Geraniaceae) revisited. <i>Brittonia</i> , 61(3), 225–236. https://doi.org/10.1007/s12228-009-9076-x | Ar | | | | | | x | | | | |
| Agudelo-H., C. A. (2008). Amaranthaceae. (J. Betancur, G. Galeano, & J. Aguirre, Eds.) (Vol. 23). Bogotá, Colombia: Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Ali, S. I., & Wali Khan, S. (2009). Asparagaceae. En Flora of Pakistan (Vol. 217, p. 23). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Departament of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151184?selectedversion=NBD24561109 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Almeida, J. D. de, & Freitas, H. (2006). Exotic naturalized flora of continental Portugal – A reassessment. <i>Botanica Complutensis</i> , 30, 117–130. https://doi.org/10.5209/BOCM.7115 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Al-Shehbaz, I. A., & Fuentes-Soriano, S. (2011). Brassicaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Al-Shehbaz, I. A., & Fuentes-Soriano, S. (2011). Caryophyllaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Álvarez, G. (2011). Informe Técnico Contrato 322-2011. Realizar la evaluación sobre y el uso y transformación de plantas medicinales por parte de grupos comunitarios inmersos en el proyecto de agricultura urbana del Jardín Botánico, en el contexto de las condiciones urbanas de los territorios ambientales del D.C. (pp. 12–20). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Anders, V. (2001, 2017). Etimologías de Chile. Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://etimologias.dechile.net/ | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Anderson, E. F. (2001). The Cactus Family. Portland, Oregon: Timber Press. Recuperado a partir de http://www.timberpress.com/books/cactus_family/anderson/9780881924985 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Anderson, N. O. (2007). Flower Breeding and Genetics: Issues, Challenges and Opportunities for the 21st Century. Netherlands: Springer Science & Business Media. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Anjen, L., Bojian, B., Grabovskaya-Borodina, A. E., Hong, S., McNeill, J., Mosyakin, S. L., ... Soltis, D. E. (2003). Polygonaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), Flora of China (Vol. 5, pp. 277–350). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Apaza, V., Cáceres, G., Estrada, R., & Pinedo, R. (2013). Catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú (Primera edición). Lima: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Representación de la FAO en el Perú - Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Apiaceae. (2016). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000273?projectid=3 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Aquino, J. (2015). Entrevista a José Aquino, vereda Peñalisa, Sumapaz - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Araujo, A. O., & Chautems, A. (2010). Gesneriaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), Catálogo de plantas e fungos do Brasil (Vol. 2, pp. 1107–1114). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/x5x7v | Ar | | x | | | | | | | | |
| Argus, G. W., Eckenwalder, J. E., & Kiger, R. W. (2010). Salicaceae. En Flora of North America (Vol. 7, pp. 3–163). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=10787 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Arias-Álvarez, B. T. (2006). Nombres vulgares de las plantas en la Península Ibérica e Islas Baleares (Maestría). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Recuperado a partir de https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2345 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Asteraceae in Flora of North America @ efloras.org. (s/f). Recuperado el 18 de agosto de 2017, a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=10074 | Ar | | x | | | | x | | | | |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Australian Biological Resources. (2005a). Poaceae 3. En K. Mallett (Ed.), Flora of Australia (Vol. 44B, p. 512). Melbourne, Australia: Csiro Publishing. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Australian Biological Resources. (2005b). Proteaceae 3. En A. Wilson (Ed.), Flora of Australia (Vol. 17B, p. 444). Melbourne, Australia: Csiro Publishing. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Australian National Botanic Gardens. (s/f). <i>Anigozanthos flavidus</i> - Growing Native Plants. Recuperado el 9 de diciembre de 2016, a partir de https://www.anbg.gov.au/gnp/interns-2006/anigozanthos-flavidus.html | Ar | | x | | | | | | | | |
| Australian National Botanic Gardens: <i>Anigozanthos</i> . (2016). Recuperado el 23 de mayo de 2017, a partir de http://www.anbg.gov.au/anigozanthos/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Avila, F., Funk, V. A., Diazgranados, M., Díaz-Piedrahita, S., & Vargas, O. (2015). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia: <i>Bidens pilosa</i> L. Recuperado el 24 de abril de 2017, a partir de http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/resultados/especie/Bidens%20pilosa/ | Ar | | x | | | | | | | | |
| Ávila, L. (2016). Entrevista a Luis Ávila, Subdirección Científica JBB Nodo Las Mercedes, localidad de Suba - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | x | x | | | x | | | |
| Ballard, R. (1986). <i>Bidens pilosa</i> Complex (Asteraceae) in North and Central America. American Journal of Botany, 73(10), 1452–1465. https://doi.org/10.2307/2443850 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Balso blanco - <i>Heliocarpus americanus</i> . (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=573&Itemid=30 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Bao, B., Borsh, T., & Clemants, S. E. (2003). Amaranthaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 5, pp. 415–429). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10031 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Barrera-Cataño, J. I., Aguilar-Garavito, M., & Rondón-Camacho, D. C. (2008). Experiencias de restauración ecológica en Colombia: entre la sucesión y los disturbios. Pontificia Universidad Javeriana. | Ar | | | | | | | x | | | |
| Barrie, F. R. (2011). Rosaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2, p. 110). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Barrie, F. R. (2013). Crassulaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Barringer, K. (1991). A revision of <i>Epidendrum</i> subgenus <i>Epidanthus</i> (Orchidaceae). Brittonia, 43(4), 240–252. https://doi.org/10.2307/2807285 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Bautista, C. (2016). Entrevista a Carmenza Bautista, Programa Agricultura Urbana Nodo Cantarrana, localidad de Usme - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | | | x | | | |
| Baxter, A. J. (2005). Regeneration and Transformation of <i>Impatiens walleriana</i> Using Cotyledonary Node Culture (Msc.). Virginia Tech. Recuperado a partir de https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/30931 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Becerra, R. D. (2016). Entrevista a Rubén Dario Becerra de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá en el Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Begoniaceae. (2014). Recuperado el 26 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000131?projectid=3 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Bello, A., Stirton, C. H., & Stajsic, V. (2015). Naturalised species of <i>Psoralea</i> (Fabaceae: Psoraleeae) in Australia. Muelleria, 33, 97–107. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Bello, M. A., & Forero, E. (2005). Revisión del género <i>Calliandra</i> (Leguminosae: Mimosoideae: Ingeae) en Colombia. En E. Forero & C. Romero (Eds.), Estudios en Leguminosas Colombianas (pp. 39–110). Colombia: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Benedí-Gonzalez, C. (1997). Buxaceae. En Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. VIII, p. 300). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Benedí-Gonzalez, C. (2000). Punicaceae. En Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares (Vol. VIII, p. 375). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Benitez de Rojas, C., & D'Arcy, W. G. (1998). The Genera <i>Cestrum</i> and <i>Sessea</i> (Solanales: Cestreae) in Venezuela. Annals of the Missouri Botanical Garden, 85(2), 273–351. https://doi.org/10.2307/2992010 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Berg, C. C., Franco Rosselli, P., & Davidson, D. W. (2005). <i>Cecropia</i> . Flora Neotropica, 94, 1–230. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Bermudez, J. A. (1925). A través de la antigua Santafe. Bogotá: Editorial de Cromos Luis Tamayo & Co. | L | x | | | | | | x | | | |
| Bernal, H. (2015, julio 16). Entrevista a Henry Bernal, barrio Villa Mayor - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo | I | x | | | | x | | x | | | |
| Bernal, M. (2016). Entrevista a Mauricio Bernal, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | I | x | | | | | | x | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Bernal, R. (2015a). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia: <i>Abelia × grandiflora</i> (André) Rehder. Recuperado el 9 de abril de 2017, a partir de http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/en/resultados/especie/Abelia%20x%20grandiflora/ | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Bernal, R. (2015b). Catálogo de plantas y líquenes de Colombia: <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss. Recuperado el 24 de abril de 2017, a partir de http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/resultados/especie/Petroselinum%20crispum%20 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Bernal, R., Galeano, G., Rodríguez, A., Sarmiento, H., & Gutiérrez, M. (2016). Nombres Comunes Plantas de Colombia. Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/ | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co | Ar | | x | | | | | | | x | x |
| Betancur, J. B. (1997). Flora del Llano. Cristina Uribe Ediciones. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Bhargava, A., Shukla, S., & Ohri, D. (2006). <i>Chenopodium quinoa</i> - An Indian perspective. Industrial Crops and Products, 23(1), 73–87. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2005.04.002 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Biblioteca digital del Jardín Botánico de Madrid. (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/index.php | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Biosca, F. M. (1985). Enciclopedia universal ilustrada. Madrid, España: Cantábrica. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Blanca, G., Cabezudo, B., Cueto, M., Morales, C., & Salazar, C. (2011). Claves de la flora vascular de Andalucía Oriental. Granada: Editorial Universidad de Granada. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Bojnanský, V., & Fargašová, A. (2007). Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora: The Carpathian Mountains Region. The Netherlands: Springer Science & Business Media. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Boland, D. J., & McDonald, M. W. (2006). Forest Trees of Australia. Australia: Csiro Publishing. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Bossard, C. C., Randall, J. M., & Hoshovsky, M. C. (2000). Invasive Plants of California's Wildlands. Los Angeles, California: University of California Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Boufford, D. E. (1997). Urticaceae. En Flora of North America (Vol. 3, p. 616). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Boyce, P. (1995). <i>Anthurium warocqueanum</i> . Curtis's Botanical Magazine, 12(3), 127–130. https://doi.org/10.1111/j.1467-8748.1995.tb00501.x | Ar | | | | | | x | | | | |
| Boyd-Bowman, P. (2015). Léxico hispanoamericano 1943-1993. Recuperado el 9 de abril de 2017, a partir de https://textred.spanport.lss.wisc.edu/lexico_hispanoamericano/index.html | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Boyle, T. H. (1997). The Genetics of Self-Incompatibility in the Genus <i>Schlumbergera</i> (Cactaceae). Journal of Heredity, 88(3), 209–214. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Braga, J. M. A. (2010). Marantaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), Catálogo de plantas e fungos do Brasil (Vol. 2, pp. 1227–1235). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/x5x7v | Ar | | x | | | | | | | | |
| Brickell, C. (2011). American Horticultural Society Encyclopedia of Plants and Flowers. New York, United States of America: Penguin. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Brink, M., & Belay, G. (2006). Cereals and pulses (Vol. 1). Wageningen, Netherlands: Plant Resources of Tropical Africa. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Bromeliaceae. (2015). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000361?projectid=3&langid=66#Desc | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Bromeliads in Australia - <i>Tillandsia cacticola</i> . (2014). Recuperado el 9 de abril de 2017, a partir de http://www.bromeliad.org.au/pictures/Tillandsia/cacticola.htm | Ar | | | | | | x | | | | |
| Brouillet, L. (2016). Begoniaceae in Flora of North America @ efloras.org. Recuperado el 26 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000131?projectid=3#Desc | Ar | | | | | | x | | | | |
| Buitrago, J. M. (2015, julio 16). Entrevista a Juan Manuel Buitrago, barrio Villa Mayor - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Bunting, G. S. (1995a). Araceae. En Flora of the Venezuelan Guayana (Vol. 2, pp. 427–485). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Bunting, G. S. (1995b). Araceae. En Flora of the Venezuelan Guayana (Vol. 2, pp. 427–485). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Cabezas-Fuentes, F. J., Morales Valverde, R., & Quintanar Sánchez, A. (2010). Labiatae. En Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. XII, p. 594). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Cadena, M. A. (2015, agosto 29). Entrevista a Marco Antonio Cadena, barrio San Jorge Central - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | | | x | | | |
| Caicedo, A. L., & Schaal, B. A. (2004). Population structure and phylogeography of <i>Solanum pimpinellifolium</i> inferred from a nuclear gene. Molecular Ecology, 13(7), 1871–1882. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2004.02191.x | Ar | | x | | | | | | | | |
| Calderón de Rzedowski, G. (1998). Cannaceae. En J. Rzedowski Rotter & G. Calderón de Rzedowski (Eds.), Flora del Bajío y Regiones adyacentes (Vol. 64, pp. 1–6). Michoacán, México: Instituto de Ecología, AC & Centro Regional del Bajío. | Ar | | | | | | | | | x | x |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Calderón, C. (2016). Entrevista a Claudia Calderón de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá en el Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Calderón, M. (2016). Entrevista a Manuela Calderón, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| Calderón, M. (2016). Entrevista a María Calderón, barrio Ciudadela Colsubsidio. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Camargo, P. (2016). Entrevista a Pedro Camargo de la Línea interacciones bióticas y abióticas. Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Cárdenas, M. B. (2015). Entrevista a María Bélen Cárdenas, vereda Santa Rosa, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Cárdenas, R. E. (2016). Entrevista a Raúl Ernesto Cárdenas de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá en el Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Carranza, M. M. (2004). Antología. Universidad Externado de Colombia. | L | x | | | | | | | | | |
| Carruthers, V. (2005). The Wildlife of Southern Africa: A Field Guide to the Animals and Plants of the Region. South Africa: Struik. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Carvajal Rojas, L., Puentes Camacho, D. M., & Valero Garay, M. J. (2008). Catálogo ilustrado de especies del piedemonte llanero en el Departamento del Meta. Bogotá, Colombia: PETROMINERALES. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Carvalho, F.A. (2013). Caricaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Castañeda, M. (2015, mayo 29). Entrevista a Myriam Castañeda, barrio Castilla - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Castroviejo, S. (Ed.). (1990). Chenopodiaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. II, p. 900). Madrid, España: Real Jardín Botánico, CSIC. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Castroviejo, S., Benedí Gonzalez, C., & Rico Hernández, E. (Eds.). (2009). Plantaginaceae-Scrophulariaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares (Vol. XIII, p. 728). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Castroviejo, S., Devesa Alcaráz, J. A., Gonzalo, R., & Herrero Nieto, A. (Eds.). (2007). Rubiaceae-Dipsacaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. XV, p. 399). Madrid, España: Real Jardín Botánico, CSIC. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Castroviejo, S., Gómez Campo, C., Morales Valverde, R., Nieto Feliner, G., Rico Hernández, E., & Talavera Lozano, S. (Eds.). (1993). Brassicaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. X, p. 794). Madrid, España: Real Jardín Botánico, CSIC. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Castroviejo-Bolibar, S. (2003). Crassulaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares (Vol. V). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Catálogo de especies de la biodiversidad de Colombia. (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.biodiversidad.co/ | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Cecilia, S. (2015, marzo 22). Entrevista a Cecilia Santamaría, barrio Las Dos Avenidas - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Censo del Arbolado Urbano Bogotá D.C., - CAU 2005 - 2007, FASES I - IV SEPTIEMBRE 2005 SEPTIEMBRE 2007. (2007). Recuperado el 17 de agosto de 2017, a partir de https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/32/study-description | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Cepeda, J. (2016). Entrevista a Juliana Cepeda, Colectivo Savias & Sabias, Universidad Nacional de Colombia - Interacción grupos focales. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Chapman, A. R., Conn, B. J., Court, A. B., Cowan, R. S., George, A. S., Keith, D. A., ... Tindale, M. D. (s/f). Flora of Australia Online - <i>Acacia</i> . Recuperado el 30 de noviembre de 2016, a partir de http://www.anbg.gov.au/abrs/online-resources/flora/stddisplay.xsql?pnid=40829 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Cheers, G. (2003). Botánica. Guía ilustrada de plantas. Barcelona: Könemann - Tandem Verlag GmbH. | Ar | | x | | | | x | | | x | x |
| Chen, Y., Akiyama, S., & Ohba, H. (2007). <i>Impatiens</i> (Balsaminaceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 12, pp. 43-114). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10092 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Chernetsky, M. (2011). Problems in nomenclature and systematics in the subfamily Kalanchoideae (Crassulaceae) over the years. <i>Acta Agrobotanica</i> , 64(4), 67-74. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Christenhusz, M. J. M. (2009). Hydrangeaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Christenhusz, M. J. M. (2011a). Musaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 7, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Christenhusz, M. J. M. (2011b). Plantaginaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 5, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Christenhusz, M. J. M. (2011c). Scrophulariaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 5, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Cifuentes, C. (2015). Entrevista a Carlos Cifuentes, corregimiento Nazareth, Sumapaz - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Cifuentes, C. (2016). Entrevista a Carlos Cifuentes del Parque Ecológico Chaqué, Hospital Nazareth. Nodo Sumapaz. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Clark, L. (1986). Systematics of <i>Chusquea</i> section <i>Chusquea</i> , section <i>Swallenochloa</i> , section <i>Verticillatae</i> , and section <i>Serpentes</i> (Poaceae: Bambusoideae). Iowa State University. Recuperado a partir de http://lib.dr.iastate.edu/rtd/7988 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Clay, H. F., Hubbard, J. C., & Golt, R. (1987a). The Hawai'i Garden - Tropical Exotics. Honolulu: University of Hawaii Press. | Ar | | | | | | x | | | x | x |
| Clay, H. F., Hubbard, J. C., & Golt, R. (1987b). The Hawai'i Garden: Tropical Shrubs. Honolulu: University of Hawaii Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| COAMOD. (2015). Taller con Corporación de Adultos Mayores de Mochuelo Bajo, Localidad de ciudad Bolívar. | Iv | x | | | | | | | | | |
| Codd, L. E. (1975). <i>Plectranthus</i> (Labiatae) and allied genera in Southern Africa. <i>Bothalia</i> , 11(4), 371-442. https://doi.org/10.4102/abc.v11i4.1482 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| COL000054264 - <i>Desmodium molliculum</i> (Kunth) DC. - Fabaceae. (s/f). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/detail/20961/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Colecciones en línea. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://ciencias.bogota.unal.edu.co/icn/colecciones-en-linea/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Commelinaceae. (2016). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000348?projectid=3&langid=66 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Coombes, A. J. (2012). The A to Z of Plant Names: A Quick Reference Guide to 4000 Garden Plants. Timber Press. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Cope, T. (1983). Poaceae. En Flora of Pakistan (Vol. 59, p. 29). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151184?selectedversion=NBD24561109 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Cordovez-Moure, J. M. (1936). De la vida de antaño. Bogotá, Colombia: Editorial Minerva. Recuperado a partir de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/vida-social-y-costumbres/de-la-vida-de-antano | L | x | | | | | | | | | |
| Coromines, J. (2008). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, España: Gredos. Recuperado a partir de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=381790 | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá. (2013). Manual de identidad corporativa CORPOBOYACÁ 2013. Recuperado a partir de https://www.contratos.gov.co/consultas/VerDocumentoPublic?ruta=/cloud/cloud2/2014/DA/132035000/14-15-3195179/DA_PROCESO_14-15-3195179_132035000_12929494.pdf . | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Cortés, A. E. (2015). Entrevista a Ana Elvira Cortés, vereda Curubital - Salida complementaria de colectas para Documento Huertas Programa 5. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Cortés-Gutiérrez, L. M. (2011). Almanaque Agroecológico Los Verjones - Cultivos y saberes campesinos que alimentan la tradición de Bogotá. Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de patrimonio cultural. | B | x | | | | | | | | | |
| Cortés-Gutiérrez, L. M. (2012). Almanaque Agroecológico Usme - Despensa rural de Bogotá. Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de patrimonio cultural. | B | x | | | | | | | | | |
| Corzo Barragán, D. C., & Torres Cárcamo, M. E. (2013). Técnicas de aprovechamiento de especies vegetales presentes en las áreas rurales del Distrito Capital. Bogotá, Colombia: Jardín Botánico José Celestino Mutis. | B | x | | | x | | | x | | | |
| Corzo, D. (2012). Informe Técnico Contrato 308-2012. Desarrollar dos (2) protocolos de transformación secundaria que puedan utilizarse a nivel industrial, medicinal o alimenticio, de especies vegetales nativas de áreas rurales del Distrito Capital. (p. 11). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Corzo, D. (2016). Entrevista a Diana Corzo, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | x | | | |
| Crespo Villalba, M. B., Herrero Nieto, A., & Quintanar Sánchez, A. (2013). Iridaceae. En Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. (Vol. XX, p. 654). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Croat, T. B. (1981). A Revision of <i>Syngonium</i> (Araceae). <i>Annals of the Missouri Botanical Garden</i> , 68(4), 565-651. https://doi.org/10.2307/2398892 | Ar | | | | | | x | | | | |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Cuatrecasas, J. (1967). Revisión de las especies colombianas del género <i>Baccharis</i> . Bogotá, Colombia: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Cuatrecasas, J. (1970). Brunelliaceae. <i>Flora Neotropica</i> , 2, 1–188. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Cubero, J. I. (1974). On the evolution of <i>Vicia faba</i> L. <i>Theoretical and Applied Genetics</i> , 45(2), 47–51. https://doi.org/10.1007/BF00283475 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Daniel, H. (1937). <i>Flora del Capiro</i> (38a ed., Vol. 22). Medellín, Colombia: Bedout. Recuperado a partir de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/handle/10495/424 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Daniel, T. F., & Acosta Castellanos, S. (2003). Acanthaceae. En J. Rzedowski Rotter & G. Calderón de Rzedowski (Eds.), <i>Flora del Bajío y Regiones adyacentes</i> (Vol. 117, pp. 1–177). Michoacán, México: Instituto de Ecología, AC & Centro Regional del Bajío. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Davalliaceae. (2009). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000435?projectId=3&langid=66 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Davidse, G., Sousa Sánchez, M., Knapp, S. D., & Chiang Cabrera, F. (2016). Cycadaceae a Connaraceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| De Corredor, E. (2015, agosto 29). Entrevista a Elizabeth De Corredor, barrio San Jorge Central - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | | x | | | x | | x | | | |
| De Cuervo, F. (2015, marzo 22). Entrevista a Fanny De Cuervo, barrio Las Dos Avenidas - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | | x | | | | | x | | | |
| Decker, D. S. (1988). Origin(s), evolution, and systematics of <i>Cucurbita pepo</i> (Cucurbitaceae). <i>Economic Botany</i> , 42(1), 4–15. https://doi.org/10.1007/BF02859022 | Ar | | x | | | | | | | | |
| DeFilipps, R. A. (1992). Ornamental garden plants of the Guianas: an historical perspective of selected garden plants from Guyana, Surinam and French Guiana. Recuperado a partir de http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US9186890 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Degani, C., Rowland, L. J., Saunders, J. A., Hokanson, S. C., & Ogden, E. L. (2001). A comparison of genetic relationship measures in strawberry (<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duch.) based on AFLPs, RAPDs, and pedigree data. <i>Euphytica</i> , 117(1), 1–12. https://doi.org/10.1023/A:1004008408435 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Del Cañizo, J. A. (2011). <i>Palmeras</i> (3a ed.). Mexico, Ciudad de Mexico: Mundi-Prensa Libros. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Delin, W., & Larsen, K. (2000). Zingiberaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 24, pp. 322–377). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Dequan, L., & Gilbert, M. G. (2003). Nyctaginaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 5, pp. 430–434). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Desfontaines, R. L. (2013). <i>Flora atlantica: Sive historia plantarum quae in Atlante, agro Tunetano et Algeriensi crescunt</i> (Vol. 2). United States of America: Cambridge University Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Devesa-Alcaráz, J. A. (2007). Caprifoliaceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. XV, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Di Domenico, F., Lucchese, F., & Magri, D. (2012). <i>Buxus</i> in Europe: Late Quaternary dynamics and modern vulnerability. <i>Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics</i> , 14(5), 354–362. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2012.07.001 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Di Leo Lira, P., van Baren, C. M., López, S., Molina, A., Heit, C., Viturro, C., ... Bandoni, A. (2013). Northwestern Argentina: A Center of Genetic Diversity of Lemon Verbena (<i>Aloysia citriodora</i> Paláu, Verbenaceae). <i>Chemistry & Biodiversity</i> , 10(2), 251–261. https://doi.org/10.1002/cbdv.201100416 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Díaz Espinosa, A. M., Díaz Triana, J. E., Vargas Ríos, Orlando, & Universidad Nacional de Colombia (Eds.). (2012). <i>Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá</i> . Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Díaz, S. (2015). Entrevista a Sara Díaz, vereda Mochuelo Alto, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | | x | | | | | x | | | |
| Díaz, T. (2016). Entrevista a Teresa Díaz del programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo Sumapaz. | I | | x | | | | | x | | | |
| Díaz-Piedrahíta, S. (1987). El uso popular de las plantas a la luz de los documentos de la Expedición Botánica. Bogotá: Editorial Gente Nueva. | B | | x | | | | | x | | | |
| Díaz-Piedrahíta, S. (2012). Las hojas de las plantas como envolturas de alimentos. Bogotá, Colombia: Ministerio de Cultura. | B | | x | | x | | | | | x | x |
| Dickson, E. E. (2014). <i>Malus</i> (Rosaceae). En <i>Flora of North America</i> (Vol. 9, p. 690). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Dirección de Regulación Planeación Estandarización y Normalización – DIRPEN. (2006). <i>Manual del censista y auxiliar censo del árbol urbano de Bogotá</i> . Recuperado a partir de https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/32/download/286 | Wr | | x | | | x | | x | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Dividivi - <i>Caesalpinia spinosa</i> . (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=491&Itemid=30 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Don, G. (1834). A General History of the <i>Dichlamydeous</i> Plants. J.G. and F. Rivington. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Dowe, J. L. (2010). Australian Palms: Biogeography, Ecology and Systematics. Csiro Publishing. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Dowe, J. L., & Hodel, D. R. (1992). A Revision of <i>Archontophoenix</i> H.Wendl. & Drude (Arecaceae). <i>Austrobaileya</i> , 4(2), 227–244. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Dowling JR., C. F. (1991). The spineless <i>Yucca</i> deserves more attention as an ornamental and food plant (Vol. 104). | Ar | | x | | | | | | | | |
| Dugand, A. (1942). Nuevas especies colombianas del género <i>Ficus</i> . <i>Caldasia</i> , 0(4), 25–74. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Ecuador. Ministerio de Educación, Chango Anancolla, M., & Potosí C., F. (Eds.). (2009). Runakay kamukuna Yachakukunapa shimiyuk kamu: runa shimi - mishu shimi, Kichwa - castellano, mishu shimi - runa shimi, castellano kichwa. Quito: Ministerio de Educación. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Ediciones SM. (2006). Diccionario Clave: Diccionario de uso del español actual (Edición: Pap/Cdr). Madrid; Paris: SM. | Ar | | x | | | x | | x | | | |
| eFloras Results for <i>Pelargonium graveolens</i> . (s/f). Recuperado el 9 de diciembre de 2016, a partir de http://apps.kew.org/efloras/namedetail.do;jsessionid=C6401D0CB39A3F492DE897C2C11FB34D?flora=fz&qry=key&taxon=1180&keyid=313# | Ar | | x | | | | | | | | |
| Eggl, U. (2012). Illustrated Handbook of Succulent Plants: Crassulaceae. Alemania: Springer Science & Business Media. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Eggl, U., & Newton, L. E. (2004). Etymological Dictionary of Succulent Plant Names (1a ed.). Berlin: Springer Science & Business Media. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Eliás, M. (2016). Entrevista a Micán Eliás del Parque Ecológico Chaquén, Hospital Nazareth. Nodo Sumapaz. | I | x | | | | | | x | | | |
| Eljach-Mosquera, S. M. (2009). Etnobotánica de la granadilla de quijos (<i>Passiflora popenovii</i>) en el municipio de Timbio, departamento del Cauca, Colombia (Pregado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recuperado a partir de http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/8567 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| E-monocot: <i>Aglaonema costatum</i> N.E.Br. (2012). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:4625 | Ar | | | | | | x | | | | |
| E-monocot: <i>Anthurium andraeanum</i> Linden ex André. (2012). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:10633 | Ar | | | | | | x | | | | |
| E-monocot: <i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott. (2012). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:61779 | Ar | | | | | | x | | | | |
| E-monocot: <i>Neoregelia pendula</i> L.B.Sm. (2012). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:255405 | Ar | | x | | | | | | | | |
| E-monocot: <i>Vriesea ospinae</i> var. <i>gruberi</i> H.Luther. (2012). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:271991 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Espejo-Serna, A., López-Ferrari, A. R., Ramírez-morillo, I., Holst, B. K., Luther, H. E., & Till, W. (2004). Checklist of Mexican Bromeliaceae with Notes on Species Distribution and Levels of Endemism. <i>Selbyana</i> , 25(1), 33–86. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Espinell, R. (2014, marzo 27). La varita milagrosa de San José. <i>El Tiempo</i> . Recuperado a partir de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1588739 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Esteva, F., & Steyermark, J. A. (1987). Las Bromeliaceae de Venezuela: nativas y cultivadas. Caracas, Venezuela: Armitano. | Ar | | x | | | | x | | | x | x |
| Fang, Z., Gonzales, A. M., Durbin, M. L., Meyer, K. K. T., Miller, B. H., Volz, K. M., ... Morrell, P. L. (2013). Tracing the geographic origins of weedy <i>Ipomoea purpurea</i> in the southeastern United States. <i>The Journal of Heredity</i> , 104(5), 666–677. https://doi.org/10.1093/jhered/est046 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Fernández Alonso, J. L., & Groenendijk, J. P. (2004). A new specie of <i>Zephyranthes</i> Herb. s.l. (Amaryllidaceae, Hippeastreae) with notes on the genus in Colombia. <i>Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales</i> , 28(107), 177–186. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Fernández Piedra, M. del P., Quintanar Sánchez, A., Talavera Lozano, S., & Salgueiro González, F. J. (2012). Boraginaceae. En <i>Flora Iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> (Vol. XI, p. 672). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | | | | | x | | | | |
| Ferriol, M., Picó, B., & Nuez, F. (2004). Morphological and Molecular Diversity of a Collection of <i>Cucurbita maxima</i> Landraces. <i>Journal of the American Society for Horticultural Science</i> , 129(1), 60–69. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Figliuolo, G., Candido, V., Logozzo, G., Miccolis, V., & Zeuli, P. L. S. (2001). Genetic evaluation of cultivated garlic germplasm (<i>Allium sativum</i> L. and <i>A. ampeloprasum</i> L.). <i>Euphytica</i> , 121(3), 325–334. https://doi.org/10.1023/A:1012069532157 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Flora de Bogotá y Colecciones de referencia. (2018a). Flora de Bogotá (en construcción). Subdirección científica - Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | D | x | | x | | | | | | | |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Flora de Bogotá y Colecciones de referencia. (2017b). Flora no nativa de Bogotá (en construcción). Subdirección científica - Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | Ar | | x | | | | | | | | |
| Flora of North America Editorial Committee. (2006). Flora of North America: North of Mexico (Vol. 21). Oxford University Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| FloraBase - The Western Australian Flora: <i>Agapanthus praecox</i> subsp. <i>orientalis</i> F.M.Leight. (2015). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de https://florabase.dpaw.wa.gov.au/browse/profile/18380 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Folta, K. M., & Gardiner, S. E. (2009). Genetics and Genomics of Rosaceae. Springer Science & Business Media. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Forzza, R. C., Costa, A., Siqueira Filho, J. A., & Martinelli, G. (2010). Bromeliaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), Catálogo de plantas e fungos do Brasil (Vol. 1, pp. 778–816). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/z3529 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Fowler, S. V., Barreto, R., Dodd, S., Macedo, D. M., & Paynter, Q. (2013). Tradescantia <i>fluminensis</i> , an exotic weed affecting native forest regeneration in New Zealand: Ecological surveys, safety tests and releases of four biocontrol agents from Brazil. <i>Biological Control</i> , 64(3), 323–329. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2012.11.013 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Freeman, C. C., & Reveal, J. L. (2005). Polygonaceae. En Flora of North America (Vol. 5, p. 656). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Freitag, H., Hedge, I. C., Jafri, S. M. H., Kothe-Heinrich, G., Omer, S., & Uotila, P. (2001). Chenopodiaceae. En S. I. Ali & M. Qaiser (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 204, p. 217). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Karachi, Pakistan : University of Karachi. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Frixxel, P. A. (2000). Malvaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 3, p. 162). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Fu, N., Wang, Q., & Shen, H.-L. (2013). De Novo Assembly, Gene Annotation and Marker Development Using Illumina Paired-End Transcriptome Sequences in Celery (<i>Apium graveolens</i> L.). <i>PLoS ONE</i> , 8(2), e57686. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057686 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Gaertner, M., Breeyen, A. D., Hui, C., & Richardson, D. M. (2009). Impacts of alien plant invasions on species richness in Mediterranean-type ecosystems: a meta-analysis. <i>Progress in Physical Geography</i> , 33(3), 319–338. https://doi.org/10.1177/0309133309341607 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Galeano, G., & Bernal, R. (2005). Palmas. En E. Calderón, G. Galeano, & N. García (Eds.), Libro rojo de plantas de Colombia. Volumen 2: palmas, frailejones y zamias (Vol. 2, pp. 59–224). Bogotá, D.C: Instituto Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Galeano, G., & Bernal, R. (2010). Palmas de Colombia: guía de campo. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias Naturales. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Gallego Cidoncha, M. J., Herrero Nieto, A., & Talavera Lozano, S. (Eds.). (2010). Commelinaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares (Vol. XVII, pp. 118–119). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Gallego Cidoncha, M. J., Quintanar Sanchez, A., & Talavera Lozano, S. (Eds.). (2012). Solanaceae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares (Vol. XI, pp. 224–228). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Gallego, D. A. G. (2016). Alternancia consonántica CH ~ RR y sufijos clasificadores -CA, -QUE, -CHA, -CHE. Criterios para la identificación de préstamos Muiscas. <i>Lingüística y Literatura</i> , (69), 79–97. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Galvis, G. (2016). Entrevista a Gladys Galvis, Concejo de mujeres muiscas de Suba, área de influencia Nodo Las Mercedes, localidad de Suba - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | | x | | | | | x | | | |
| Gamba, E. (2015). Entrevista a Eberardo Gamba, corregimiento de Betania, Sumapaz - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | | x | | | | | x | | | |
| Gaona, J. (2009). Informe Técnico Contrato 727-2009. Realizar el estudio de biocomercio de cinco (5) especies vegetales nativas altoandinas del proyecto 318 en la Localidad de Chapinero y Apoye las Actividades de transferencia de tecnología (pp. 31–32). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | | x | | | | | x | | | |
| García, J. (2006). Informe Técnico Contrato 265-2006. Desarrollar un proceso participativo de reintroducción in situ y seguimiento de especies vegetales con potencial de uso por parte de la comunidad que permita aportar en la construcción social del territorio rural de la localidad de Ciudad Bolívar (pp. 16–18). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | | x | | | | | x | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| García, N. (2015, agosto 29). Entrevista a Neisy García, barrio San Jorge Central - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| García, R. (2015). Entrevista a Renán García, vereda Curubital - Salida complementaria de colectas para Documento Huertas Programa 5. | I | x | | | | | | | | | |
| García-Barriga, H. (1992b). Flora medicinal de Colombia: botánica médica. Bogotá: Tercer Mundo. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| García-Mendoza, A. J. (2011). Agavaceae. En Flora del valle de Tehuacán-Cuicatlán. 88, 88, (Vol. 88, pp. 1–102). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Gargiullo, M., Magnuson, B., & Kimball, L. (2008). A Field Guide to Plants of Costa Rica. New York: Oxford University Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Gentry, A. (2009). Bignoniaceae. (E. Forero, J. Betancur, G. Galeano, & J. Aguirre, Eds.) (Vol. 25). Bogotá, Colombia: Instituto de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Colombia. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Germishuizen, G., & Meyer, N. L. (Eds.). (2003). Plants of Southern Africa: An Annotated Checklist (Vol. 14). Pretoria: National Botanical Institute. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Gerrit, D., Sánchez, M. S., & Chater, A. O. (1994). Alismataceae a Cyperaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 6, p. 566). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Ghafoor, A. (1973). Portulacaceae. En Flora of Pakistan (Vol. 51, p. 8). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de https://books.google.com.co/books?id=NrGXQgAACAAJ&dq=Portulacaceae+flora+of+pakistan&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiTwqSIp9TSAhUB8mMKHS-rBdsQ6AEIGDAA | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Ghafoor, A. (1985). Moraceae. En E. Nasir & S. Ali (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 171, p. 54). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151074?versionId=28063043 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Ghafoor, A., & Kukkonen, Ilkka. (2002). Asteraceae (I). En Flora of Pakistan (Vol. 207, p. 172). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de https://books.google.com.co/books?id=zgl3QwAACAAJ&dq=Asteraceae+(I)+flora+of+pakistan&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiy-fGdp9TSAhUCzmMKHR_fDD0Q6AEILDAD | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Giraldo-Gallego, D. Andrea. (2014). Influencia léxica del Muisca en el español actual clasificada en campos semánticos. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (24), 145–162. https://doi.org/10.19053/0121053X.2764 | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Gixhari, B., Pavelková, M., Ismaili, H., Vrapı, H., & Jaupi, A. (2014). Genetic Diversity of Albanian Pea (<i>Pisum sativum</i> L.) Landraces Assessed by Morphological Traits and Molecular Markers. Czech journal of genetics and plant breeding, 50(2), 177–184. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Gledhill, D. (2008). The Names of Plants (44a ed.). Cambridge University Press. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Glen, H. F. (2002). Cultivated Plants of Southern Africa: Botanical Names, Common Names, Origins, Literature. Johannesburg, South Africa: Jacana Media. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Gómez-Aldana, D. F. (s/f). Diccionario - Muysc cubun - Lengua Muisca. Recuperado el 26 de marzo de 2017, a partir de http://muysca.cubun.org/Categor%C3%ADa:Diccionario | Ar | | | | | | | | x | | x |
| González, C. (2016). Entrevista a Carmen González, Red de agricultores urbanos de Suba, área de influencia Nodo Las Mercedes, localidad de Suba - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | | | x | | | |
| Grace, O. M., Buerki, S., Symonds, M. R., Forest, F., & van Wyk, A. E. (2015). Evolutionary history and leaf succulence as explanations for medicinal use in aloes and the global popularity of <i>Aloe vera</i> . BMC Evolutionary Biology, 15, 29. https://doi.org/10.1186/s12862-015-0291-7 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Graf, A. B. (1978). Tropica: Color encyclopedia of exotic plants and trees from the tropics and subtropics (1a ed.). Rutherford, USA: Roehrs Co. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Grandtner, M. M., & Chevrette, J. (2013). Dictionary of Trees, Volume 2: South America: Nomenclature, Taxonomy and Ecology. Academic Press. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Grayum, M. H., Hammel, B. E., Herrera, C., & Zamora Villalobos, N. (2003). Manual de plantas de Costa Rica. Volúmen III: Monocotiledóneas (Vol. 93). St. Louis, Mo. : Missouri Botanical Garden., Recuperado a partir de http://archive.org/details/mobot31753003149553 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Green, P. S. (1994). A Revision of <i>Chionanthus</i> (Oleaceae) in S. America and the Description of <i>Priogymnanthus</i> , gen. nov. Kew Bulletin, 49(2), 261–286. https://doi.org/10.2307/4110264 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Grohmann, F. (1981). Oleaceae. En S. Ali & E. Nasir (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 59, p. 27). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/version/28066227 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Grupo de Operarios Nodo Usme-Uval (Jardín Botánico). (2016). Entrevista a Grupo de Operarios Nodo Usme-Uval (Jardín Botánico) - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | x | | | x | | | |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Grupo de restauración ecológica Subdirección Científica JBB. (2016). Entrevista a Grupo de Restauración Ecológica Subdirección Científica JBB. Nodo Cantarrana - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Guetat, A., Vilatersana, R., Neffati, M., & Boussaid, M. (2010). Genetic diversity in Tunisian rosy garlic populations (<i>Allium roseum</i> L.) as evidenced by chloroplastic DNA analysis: Sequence variation of non-coding region and intergenic spacers. <i>Biochemical Systematics and Ecology</i> , 38, 502–509. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Guillot Ortiz, D., Laguna Lumbreras, E., & Rosselló, J. A. (2009). La familia Aloaceae en la flora alóctona valenciana (Vol. 6). José Luis Benito Alonso. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Gut, B. (2008). <i>Trees in Patagonia</i> . Suiza, Alemania: Springer Science & Business Media. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Gutiérrez, M. (2010a). Informe Técnico Contrato 563-2010. Anexo: Cartilla Botánica (Descripción de especies). Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | x | | | x | | | |
| Gutiérrez, M. (2010b). Informe Técnico Contrato 698-2010 (p. 46). Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | x | | | | | | |
| Gutiérrez, M. (2012). Informe Técnico Contrato 312-2012 (p. 51). Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | x | | | | | | |
| Haining, Q., Graham, S., & Gilbert, M. G. (2007). Lythraceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 13, pp. 274–289). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Harper, D. (2001, 2017). Online Etymology Dictionary. Recuperado el 26 de marzo de 2017, a partir de http://www.etymonline.com/index.php | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Hartmann, H. E. K. (2002). <i>Illustrated Handbook of Succulent Plants: Aizoaceae F-Z</i> . Alemania: Springer Science & Business Media. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Hassan-Ud, D. (1980). Rutaceae. En E. Nasir, S. Ali, & S. A. Ghazanfar (Eds.), <i>Flora of Pakistan</i> (Vol. 132, p. 29). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=10781 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Hedge, I. C. (1990). Labiatae. En E. Nasir & S. Ali (Eds.), <i>Flora of Pakistan</i> (Vol. 192, p. 310). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151184?selectedversion=NBD24561109 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Heim, E. (2014). <i>Flora of Arequipa, Peru: A Field Guide for Nature Lovers</i> . BoD – Books on Demand. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Heim, E. (2015). <i>Flora and Vegetation of Bali Indonesia: An Illustrated Field Guide</i> . BoD – Books on Demand. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Helgason, T. (1997). Altingiaceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Helme, N. A., & Trinder-Smith, T. H. (2006). The endemic flora of the Cape Peninsula, South Africa. <i>South African Journal of Botany</i> , 72(2), 205–210. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2005.07.004 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Henderson, A. (2009). <i>Palms of Southern Asia</i> . En <i>princeton field guides</i> (p. 198). United Kingdom, Princeton University Press and The New York Botanical Garden: Princeton University Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Heng, L., & Boyce, P. C. (2010). <i>Alocasia</i> (Araceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 23, pp. 75–79). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Heng, L., Guanghua, Z., Boyce, P. C., Murata, J., Hettterscheid, W. L. A., Bogner, J., & Jacobsen, N. (2010). Araceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 23, pp. 1–79). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Herbario - Universidad de Panamá. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://herbario.up.ac.pa/Herbario/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Herbario JBB en línea. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://coleccion.jbb.gov.co/herbario/especimen/simple | Ar | | | | | | x | | | | |
| Herbario JBB en línea.: <i>Elleanthus wagneri</i> - JBB14240. Recuperado el 25 de octubre de 2017, a partir de http://coleccion.jbb.gov.co/herbario/especimen/22188 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Herbario Virtual Austral Americano. (2017). Recuperado el 9 de abril de 2017, a partir de https://herbariovaa.org/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Hernández, E. (2000). Propuestas etimológicas para palabras de origen indioamericano (DRAE, 21.ª ed.). <i>Boletín de la Real Academia Española</i> , 80(281), 361–396. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Hernández, H. M., Reyes-Agüero, J. A., & Aguirre-Rivera, J. R. (2005). Systematic notes and a detailed description of <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) mill. (cactaceae). <i>Agrociencia</i> , 39(4), 395–408. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Hernández, M. (2016). Entrevista a Marlen Hernández, Nodo Cantarrana, localidad de Usme - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | | | x | | | |
| Herrera, H. (2015, mayo 29). Entrevista a Hilma Herrera, barrio Castilla - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Herrero Nieto, A., Jury, S. L., & Nieto Feliner, G. (Eds.). (2003). Umbelliferae. En Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares (Vol. X, p. 544). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Higuera, Y. (2011). Informe Técnico Contrato 402-2011. Apoyo al desarrollo del estudio en ecofisiología de seis especies vegetales nativas de áreas rurales del Distrito Capital (p. 3). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | x | | | | | | |
| Hill, K. (2016). Eucalyptus pulverulenta Sims. Recuperado el 23 de mayo de 2017, a partir de http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=sp&name=Eucalyptus-pulverulenta | Ar | | | | | | x | | | | |
| Hinkle, A. E. (2007). Population structure of Pacific <i>Cordyline fruticosa</i> (Laxmanniaceae) with implications for human settlement of Polynesia. American Journal of Botany, 94(7), 828–839. https://doi.org/10.3732/ajb.94.5.828 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Holotype of <i>Peperomia polybotrya</i> Kunth [family PIPERACEAE] on JSTOR. Recuperado el 25 de octubre de 2017, a partir de http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.p00669281?searchUri=filter%3Dname%26so%3Dps_group_by_genus_species%2Basc%26Query%3DPeperomia%2Bpolybotrya | Ar | | | | | | x | | | | |
| Holotype of <i>Selaginella calceolata</i> Jermy [family SELAGINELLACEAE] on JSTOR. Recuperado el 25 de octubre de 2017, a partir de http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.col000006187 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Howis, S., Barker, N. P., & Mucina, L. (2009). Globally grown, but poorly known: species limits and biogeography of <i>Gazania</i> Gaertn. (Asteraceae) inferred from chloroplast and nuclear DNA sequence data. Taxon, 58(3), 871–882. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Hsi-wen, L., & Hedge, I. C. (1994). Lamiaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), Flora of China (Vol. 17, pp. 50–299). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10476 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Hudson, G., & Leslau, W. (1996). Essays on Gurage Language and Culture: Dedicated to Wolf Leslau on the Occasion of His 90th Birthday, November 14th, 1996. Otto Harrassowitz Verlag. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Huertas, B. (2015). Entrevista a Beatriz Huertas, vereda Olarte, Usme - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Hurtado-Martínez, L. (2016). Entrevista a Leonel Hurtado Martínez del convenio JBB-EAAB en el Nodo de Biodiversidad Tibanica. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Hutchinson, J. (1920). <i>Bocconia</i> and <i>Macleaya</i> . Bulletin of Miscellaneous Information (Royal Botanic Gardens, Kew), 1920(8), 275–282. https://doi.org/10.2307/4120232 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Ageratina ampla</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_46/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_46_029.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Ageratina asclepiadea</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_46/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_46_033.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Bucquetia glutinosa</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_31/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_31_069.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Diplostegium ochraceum</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_47/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_47_081.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Diplostegium revolutum</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_47/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_47_085.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Fuchsia hirtella</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_32/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_32_031.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Jungia paniculata</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_50/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_50_054.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Iconografía Mutisiana - <i>Pentalia pulchella</i> . (2016). Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_49/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_49_110.pdf | Ar | | | | | | x | | | | |
| Infante-Betancour, J., Jara-Muñoz, A., & Rivera-Díaz, O. (s/f). Árboles y arbustos más frecuentes de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | Wr | x | | | | x | | x | | | |
| Iridaceae. (2015). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000375?projectid=3&langid=66 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Isotype of <i>Cyperus lechleri</i> Steud. [family CYPERACEAE] on JSTOR. Recuperado el 25 de octubre de 2017, a partir de http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.goet003077?searchUri=filter%3Dname%26so%3Dps_group_by_genus_species%2Basc%26Query%3DCyperus%2Bxanthostachyus | Ar | | | | | | x | | | | |
| Jacques, E. de L. (2010). Begoniaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), Catálogo de plantas e fungos do Brasil (Vol. 1, pp. 751–758). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/z3529 | Ar | | x | | | | | | | | |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Jahn, A. (1927). Los aborígenes del occidente de Venezuela: su historia, etnografía y afinidades lingüísticas. Lit. y tip. del Comercio. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. (2016). Sistema de información para la gestión del arbolado urbano de Bogotá (Documento interno). Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Wr | x | | | | x | | x | | | |
| Jiarui, C., & Stevenson, D. W. (1999). Cycadaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 4, pp. 1–7). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Jiarui, C., Qi, L., Friis, I., Wilmot-Dear, C. M., & Monro, A. K. (2003). Urticaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 5, pp. 76–189). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Jiemei, X., Kamelin, R. V., Wu, Z. Y., & Raven, P. H. (2000). <i>Allium</i> (Liliaceae). En Flora of China (Vol. 24, pp. 93–131). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10507 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Jinshuang, M., Zhixiang, Z., Quanru, L., Hua, P., & Funston, A. M. (2008). Celastraceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 11, pp. 1–54). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10170 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Jintang, P., Cui, G., Shumei, H., Zhaofen, W., Shuying, J., Lingdi, L., ... Soltis, D. E. (2001). Saxifragaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), Flora of China (Vol. 8, pp. 72–111). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Jouanan, J. (1932). Vida de la bienaventurada Mariana de Jesús, llamada la Azucena de Quito (2. ed. ilustrada). Quito: "La Prensa católica", Editorial Ecuatoriana. Recuperado a partir de https://catalog.hathitrust.org/Record/101539515 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Kavalali, G. M. (2003). Urtica therapeutic and nutritional aspects of stinging nettles. London: Taylor & Francis. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Keng, H., Chin, S. C., & Tan, H. T. W. (1998). The Concise Flora of Singapore: Monocotyledons (Vol. 2). Singapore, Republica de Singapore: NUS Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Khan, G. A., Sajid, M., & Amanullah. (2007). Response of <i>Dhalia pinnata</i> to different levels of nitrogen alone and in combination with constant doses of phosphorus and potassium. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 25–32. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Khan, I. A. (2007). Citrus Genetics, Breeding and Biotechnology. CABI. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Khaw, S. H. (2001). The genus <i>Etilingera</i> (Zingiberaceae) in Peninsular Malaysia including a new species. Gardens' Bulletin, 53, 191–239. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Killip, E. P., & Smith, A. C. (1929). The Genus <i>Viburnum</i> in Northwestern South America. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 56(5), 265–274. https://doi.org/10.2307/2480649 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Kirk, T. K. (2009). Tropical Trees of Florida and the Virgin Islands: A Guide to Identification, Characteristics and Uses. Florida, United States of America: Pineapple Press Inc. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Koenig, O. (2005). Encyclopédie visuelle des plantes d'intérieur. France: Editions Artemis. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Köhler, E. (2009). Neotropical Buxaceae. En W. Milliken, B. Klitgaard, & A. Barakat (Eds.), Neotropikey - Interactive key and information resources for flowering plants of the Neotropics. Recuperado a partir de http://www.kew.org/science/tropamerica/neotropikey/families/Buxaceae.htm | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Kramer, F. L. (1957). The pepper tree, <i>Schinus molle</i> L. Economic Botany, 11(4), 322–326. https://doi.org/10.1007/BF02903811 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Kurian, A., & Sankar, M. A. (2007). Commercially grown medicinal crops. En K. V. Peter (Ed.), Medicinal Plants (pp. 49–289). New Delhi, India: New India Publishing. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Landrein, S., Borosova, R., & Osborne, J. (s/f). Rosaceae in Flora of Pakistan @ efloras.org. Recuperado el 17 de agosto de 2017, a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=10776 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Landrum, L. R. (2010). A Revision of <i>Calycolpus</i> (Myrtaceae). Systematic Botany, 35(2), 368–389. https://doi.org/10.1600/036364410791638342 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Leary, J. K., Hue, N. V., Singleton, P. W., & Borthakur, D. (2006). The major features of an infestation by the invasive weed legume gorse (<i>Ulex europaeus</i>) on volcanic soils in Hawaii. Biology and Fertility of Soils, 42(3), 215–223. https://doi.org/10.1007/s00374-005-0018-9 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Lewis-Jones, L. J., Thorpe, J. P., & Wallis, G. P. (1982). Genetic divergence in four species of the genus <i>Raphanus</i> : Implications for the ancestry of the domestic radish <i>R. sativus</i> . Biological Journal of the Linnean Society, 18(1), 35–48. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1982.tb02032.x | Ar | | x | | | | | | | | |
| Ligo, F., Yongfu, Y., & Farjon, A. (1999). Cupressaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), Flora of China (Vol. 4, pp. 642–648). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Liguo, F., Yongfu, Y., & Mill, R. R. (1999). Taxodiaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 4, pp. 54–61). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Liliaceae. (2015). Recuperado el 26 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000374?projectid=3 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Lim, T. K. (2014). Edible Medicinal and Non Medicinal Plants (1a ed., Vol. 8). Netherlands: Springer Netherlands. Recuperado a partir de http://www.springer.com/la/book/9789401787475 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Lingdi, L., Cuizhi, G., Chaoluan, L., Alexander, C., Bartholomew, B., Brach, A., ... Spongberg, S. A. (2003). Rosaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 17, pp. 46–434). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10776 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Listyani, N. (2013). Tropical Flowers: Dancing in the wind. Novita Listyani. | Ar | | | | | | x | | | | |
| López González, G. L. (2006). Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares: especies silvestres y las principales cultivadas (Vol. 1). Mundi-Prensa Libros. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| López, L. (2015, agosto 29). Entrevista a Leonor López, barrio San Jorge Central - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Lott, D., & García-Mendoza, A. (1994). Agavaceae. En Flora Mesoamericana (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 6, pp. 35–47). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Lozano-Contreras, G. (1983). Magnoliaceae. (P. Pinto, Ed.). Bogotá, Colombia: Imprenta nacional. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Lu, D., & Gilbert, M. G. (2003). <i>Anredera</i> (Basellaceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 5, pp. 445–446). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10096 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Luteyn, J. L. (1983). Ericaceae: Part I. <i>Cavendishia</i> . Flora Neotropica, 35, 1–289. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Lythraceae. (2015). Recuperado el 26 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000191?projectid=3 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Macbride, J. F. (James F. (1936). Flora of Peru (Vol. 13). Chicago, Estados Unidos: Field Museum of Natural History. Recuperado a partir de http://archive.org/details/floraofperufimacb | Ar | | | | | | x | | | | |
| Madrigal, B., & Blair, S. (2005). Plantas antimaláricas de Tumaco: Costa Pacífica colombiana. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Mahecha Vega, G. E. (2015). Jardinería urbana de Bogotá: Guía ilustrada. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | B | x | | | | x | | x | | | |
| Mahecha Vega, G. E., Ovalle-Escobar, A., Camelo-Salamanca, D., Rozo-Fernández, A., & Barrero-Barrero, D. (Eds.). (2012). Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y montañas (2da ed.). Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. | B | | | | | | x | | x | x | x |
| Mahecha Vega, G. E., Sánchez Hurtado, F., Chaparro Guerra, J. A., Cadena Carreño, H. G., Tovar Corzo, G., Villota Ojeda, L. A., ... Quintero, M. A. (2010). Arbolado urbano de Bogotá identificación, descripción y bases para su manejo. Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | L | x | | | | x | | x | | | |
| Malik, K. A. (1984). Palmae. En E. Nasir & S. Ali (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 153, p. 33). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151074?versionId=28063043 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Mancipe, C. (2016). Entrevista a Carolina Mancipe, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| Mandrián, S., Zapata, F., Aponte, A., Bello, M. A., & González, F. (2001). Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza, Colombia. Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de https://chingaza.uniandes.edu.co/chingaza/ | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Manning, J. C., & Goldblatt, P. (2012). Plants of the Greater Cape Floristic Region: 1 The core Cape flora. Pretoria: South African National Biodiversity Institute, SANBI. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Mari Mut, J. A. (2016). Etimología de los géneros de plantas en Puerto Rico. Recuperado a partir de http://edicionesdigitales.info/etimologia/etimologia.pdf | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Marín, E. (2010). Informe Técnico Contrato 562-2010. Generar un (1) contenido técnico enmarcado en el proyecto 318 con base en la información obtenida en la comunidad campesina de la cuenca alta del río Teusacá y realizar actividades de supervisión de las líneas de etnoecología, transferencia y biocomercio del proyecto 318 (pp. 19–25). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | | | | |
| Martínez, L. (2016). Entrevista a Liliana Martínez, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| Martínez, L. F. (2002). Guía ambiental para el subsector fique. (Ministerio del Medio Ambiente & Sociedad de Agricultores de Colombia, Eds.). MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. | Ar | | | | | | | | | x | x |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Marulanda, M. L., López, A. M., & Uribe, M. (2012). Genetic Diversity and Transferability of Rubus Microsatellite Markers to South American Rubus Species. En M. Caliskan (Ed.), <i>The Molecular Basis of Plant Genetic Diversity</i> (pp. 151–164). Recuperado a partir de http://www.intechopen.com/books/the-molecular-basis-of-plant-genetic-diversity/genetic-diversity-and-transferability-of-rubus-microsatellite-markers-to-south-american-rubus-specie | Ar | | x | | | | | | | | |
| Mathias, M. E. (1985). <i>Flowering Plants in the Landscape</i> . California: University of California Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Matiz, C. (2016). Entrevista a Catalina Matiz, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| McMullen, C. K. (1999). <i>Flowering Plants of the Galápagos</i> . New York, United States of America: Cornell University Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Meerow, A. W., & Dehgan, B. (1984). Re-Establishment and Lectotypification of <i>Eucharis amazonica</i> Linden ex Planchon (Amaryllidaceae). <i>Taxon</i> , 33(3), 416–422. https://doi.org/10.2307/1220981 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Mei-Cheng, C., Lian-qing, Q., & Green, P. S. (1996). Oleaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 15, pp. 272–319). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10534 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Meier, W. (2006). Contribución al conocimiento de <i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross y <i>P. capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross, Especies invasoras en el Parque Nacional El Ávila, Venezuela. <i>Acta Botánica Venezolánica</i> , 29(1), 1–15. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Melastomataceae. (2016). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000202?projectid=3&langid=66#Desc | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Mendoza, J. (2015, agosto 29). Entrevista a José Mendoza, barrio Villa Mayor - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Meneguzzi, N. G., Torres, L. E., Galdeano, E., Guzmán, F. A., Nome, S. F., & Conci, L. R. (2008). Molecular characterization of a phytoplasma of the ash yellows group (16Sr VII-B) occurring in <i>Artemisia annua</i> and <i>Conyza bonariensis</i> weeds. <i>Agriscientia</i> , 25(1), 07-15. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Meneses, R. (2015, agosto 25). Entrevista a Rosalba Meneses, vereda Mochuelo Bajo - Salida de campo localidad de Ciudad Bolívar. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Mercedes, J. R. (2006). <i>Guía Técnica Cultivo del Bambú</i> . Santo Domingo, República Dominicana: Centro para el Desarrollo Agropecuario e Forestal, Inc. (CEDAF). | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Merriam-Webster dictionary. Recuperado el 26 de marzo de 2017, a partir de https://www.merriam-webster.com/ | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Mesa, L. (2007b). Informe Técnico Contrato 183-2007. Anexo: Producto 4. Consolidación del documento de caracterización del uso de plantas en las comunidades rurales del Distrito Capital. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Mesa, L. (2010). Informe Técnico Contrato 183-2007. Anexo: Producto 1. Desarrollar el estudio etnobotánico de 10 especies andinas de acuerdo con las prioridades de trabajo dentro del proyecto de uso sostenible de la flora del distrito y la región. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | | | | |
| Micán-Romero, M. J. (2015a). Entrevista a Garciliano Ardila, vereda Chisacá, Usme - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Micán-Romero, M. J. (2015b). Entrevista a María Jesús Micán Romero, vereda Peñalisa, Sumapaz - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Miller, A., & Schaal, B. (2005). Domestication of a Mesoamerican cultivated fruit tree, <i>Spondias purpurea</i> . <i>ResearchGate</i> , 102(36), 12801–6. https://doi.org/10.1073/pnas.0505447102 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Miller, J. S. (2015). Boraginaceae. Recuperado el 26 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000289?projectid=3&langid=66#Desc | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Min, T., Songyun, L., & Bartholomew, X. (2007). <i>Camellia</i> (Theaceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 12, pp. 366–478). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10882 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Mingyuan, F., Ruizheng, F., Mingyou, H., Linzhen, H., Hanbi, Y., & Chamberlain, D. F. (2005). Rhododendron (Apiaceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 14, pp. 260–455). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=128386 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Mohlenbrock, R. H. (2008). Acanthaceae to Myricaceae: Water Willows to Wax Myrtles. United States of America: SIU Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Molau, U. (1988). Scrophulariaceae Part I. Calceolarieae. <i>Flora Neotropica</i> , 47, 1–325. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Molina, N. (2006). Estudio etnobotánico del manejo, uso y comercialización de plantas arvenses comestibles en las plazas de mercado de Bogotá, D.C. Colombia. <i>Pérez Arbelaezia</i> , 17, 37–52. | Article | x | | | | | | x | | | |
| Moliner, M. (1998). <i>Diccionario de uso del español</i> . Madrid: Gredos. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Mondragón, E. P., Fernández-Hilario, R., & Yomona, A. D. (2013). La flora del distrito de Huarango, San Ignacio - Cajamarca. <i>Xilema</i> , 26(1), 63–71. | Ar | | | | | | x | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Montes Giraldo, J. J. (1978). Fitónimos de sustrato en el español del altiplano cundiboyacense y dialectos muisca. <i>Thesaurus : boletín del Instituto Caro y Cuervo</i> , 33(1), 41–54. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Montes Giraldo, J. J. (1997). El español de Colombia y las lenguas indígenas. En X. Pachón, F. Correa, & E. Benavides (Eds.), <i>Lenguas amerindias: condiciones sociolingüísticas en Colombia</i> (pp. 25–84). Instituto Caro y Cuervo. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Moraes, M., Øllgaard, B., Kvist, L. P., Borchsenius, F., & Balslev, H. (Eds.). (2006). <i>Botánica Económica de Los Andes Centrales</i> . La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Morales, J. F. (2005). Estudios en las Apocynaceae Neotropicales XIX: La Familia Apocynaceae S. Str. (Apocynoideae, Rauvolfioideae) de Costa Rica. <i>Darwiniana</i> , 43(1/4), 90–191. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Moreno, E. (2015, marzo 22). Entrevista a Elizabeth Moreno, barrio Las Dos Avenidas - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Morris, P. (2015). Honoring Nature's Healers: Bioregional Ethnobotanical Study of Wild Medicinal Plants of Kathleen, FL in the Greater Green Swamp. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Morton, J. F. (1987). Feijoa. En <i>Fruits of Warm Climates</i> (pp. 367–370). Center for New Crops & Plant Products, Department of Horticulture and Landscape Architecture, Purdue University. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Moscone, E. A., Scaldaferrro, M. A., Grabile, M., Cecchini, N. M., Sánchez García, Y., Jarret, R., ... Ehrendorfer, F. (2007). The evolution of Chili Peppers (Capsicum - SOLANACEAE): A Cytogenetic perspective. <i>Acta Horticulturae</i> , (745), 137–170. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2007.745.5 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Moya, A. (2015). Entrevista a Andrés Moya, parque Chaqué, Sumapaz - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Moya, A. (2016). Entrevista a Andrea Moya del programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo Sumapaz. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Munir, A. A. (1995). A taxonomic revision of the genus <i>Duranta</i> L. (VERBENACEAE) in Australia. <i>Journal of the Adelaide Botanic Garden</i> , 16(1), 1–16. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Munz, P. A. (1943). A revision of the genus <i>Fuchsia</i> (Onagraceae). <i>Proceedings of the California Academy of Sciences</i> , 25(4), 1–138. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Muñoz Garmendía, F., & Castroviejo, S. (1998). Rosaceae. En <i>Flora Iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> (Vol. VI, p. 594). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Muñoz Garmendía, F., Navarro Aranda, C., & Quintanar Sánchez, A. (2015). Geraniaceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 9, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Muñoz, A. (2015). Entrevista a Anaís Muñoz, vereda Santa Bárbara, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Muñoz-Schick, M., Moreira-Muñoz, A., & Moreira Espinoza, S. (2012). Origen del nombre de los géneros de plantas vasculares nativas de Chile y su representatividad en Chile y el mundo. <i>Gayana. Botánica</i> , 69(2), 309–359. https://doi.org/10.4067/S0717-66432012000200011 | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Mutis, J. C. (1963b). <i>Otholobium</i> . En <i>Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada - Fabáceas</i> (Vol. 20, p. 79). Madrid, España: Ediciones Cultura Hispánica. Recuperado a partir de http://bibdigital.rjb.csic.es/Imágenes/Ff(8)MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_20_01/MUT_Fl_Exp_Bot_N_Gra_20_01_152.pdf | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Mutis, J. C. (1983). <i>Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada</i> . Tomo XXXI - Melastomataceae. Recuperado a partir de http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/121002 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Mutis, J. C., & Hernández de Alba, G. (1957a). <i>Diario de observaciones de José Celestino Mutis: 1760-1790</i> (Segunda Edición, Vol. I). Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. | L | x | | | | | | | | | |
| Mutis, J. C., & Hernández de Alba, G. (1957b). <i>Diario de observaciones de José Celestino Mutis: 1760-1790</i> (Segunda Edición, Vol. II). Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. | L | x | | | | | | | | | |
| Myrtaceae. (2016). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000198?projectid=3 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Naranjo, M. (2015). Entrevista a Miguel Naranjo, vereda El Destino, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Naranjo, M. (2015). Entrevista a Myriam Naranjo, vereda Santa Bárbara, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Narave-Flores, H. (1997). Pinaceae. En <i>Flora de Veracruz</i> (Vol. 98, p. 53). Xalapa, Veracruz, Mexico: Instituto de Ecología A.C. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Narváez, E. de. (1928). <i>Los Mochuelos: Recuerdos de 1876-1877</i> . Bogotá: Editorial Minerva. | L | x | | | | | | | | | |
| Nasir, E. (1980). Amaryllidaceae. En S. Ali & E. Nasir (Eds.), <i>Flora of Pakistan</i> (Vol. 134, p. 7). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23150857?selectedversion=NBD24561060 | Ar | | x | | | | | | | | |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Nasir, Y. J. (1978). Araceae. En E. Nasir & S. Ali (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 120, p. 17). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/version/28062800 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Neotropical Herbarium Specimens. (2016). Recuperado el 24 de mayo de 2017, a partir de http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/index.php | Ar | | | | | | x | | | | |
| NN. (2015b, julio 24). Entrevista a residente del sector, barrio Villa Mayor - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Nooteboom, H. P. (1994). Notes on Davalliaceae II. A revision of the genus <i>Davallia</i> . Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants, 39(1/2), 151–214. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Núñez-López, C. E. (2011). Variedades colombianas de papa. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Agronomía. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Obermeyer, A. A. (1978). <i>Ornithogalum</i> : a revision of the southern African species. <i>Bothalia</i> , 12(3), 323–376. https://doi.org/10.4102/abc.v12i3.1793 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Observación directa | Ar | | | | | | x | x | x | x | x |
| Ogle, D. G., & Peterson, J. S. (2016). SMALL BURNET: <i>Sanguisorba minor</i> Scop. United States Department of Agriculture. Recuperado a partir de https://plants.usda.gov/plantguide/pdf/pg_sami3.pdf | Ar | | x | | | | | | | | |
| Olaya-Álvarez, A. M. (2005). Desarrollo de un estudio acerca de las especies exóticas e invasoras más comercializadoras en los viveros registrados ubicados en la Sabana de Bogotá y municipios que comprenden la vía a Ibagué (Tolima), estableciendo origen y procedencias más frecuentes. Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Oleaceae. (2016). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000297?projectid=3 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Ordóñez-Caicedo, C. (2012). Gran libro de la cocina colombiana. Bogotá: Ministerio de Cultura. | L | x | | | | | | | | | |
| Orozco, N. (2016). Entrevista a Nubia Orozco, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| Ortiz, A. N. (2016). Entrevista a Alba Nubia Ortiz, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | x | | | |
| Ortiz, D. G. (2009). Flora Ornamental Española: Aspectos Históricos y Principales Especies (Vol. 8). José Luis Benito Alons. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Osiecki, M. W. (2000). USPP11724 P. Washington, DC. Recuperado a partir de http://www.google.com/patents/USPP11724 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Ospina, B. (2016). Entrevista a Ospina Blancanieves, Concejo de mujeres muiscas de Suba, área de influencia Nodo Las Mercedes, localidad de Suba - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Parra-O., C. (2014). Sinopsis de la familia Myrtaceae y clave para la identificación de los géneros nativos e introducidos en Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 38(148), 261–277. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Patiño, M. (2016). Entrevista a Miguel Patiño de la Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá en el Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales. | I | x | | | | | | x | | | |
| Patiño, V. M. (2002). Historia y dispersión de los frutales nativos del neotrópico. Cali, Colombia: CIAT. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Pedraza-Peñalosa, P., Betancur, J., & Franco-Rosselli, P. (2005). Chisacá, un recorrido por los páramos andinos (Segunda edición). Bogotá, Colombia: Instituto de Ciencias Naturales e Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Recuperado a partir de http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/31380 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Pennington, T. D., Styles, B. T., & Taylor, D. A. H. (1981). Meliaceae with accounts of Swietenioideae and Chemotaxonomy (Vol. 28). Lawrence, Kan.: The New York Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Peñaloza, B. (2015). Entrevista a Bernardo Peñaloza, vereda Curubital - Salida complementaria de colectas para Documento Huertas Programa 5. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Pérez, D. (2016). Entrevista a Dario Pérez, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | x | | | |
| Pérez-Arbeláez, E. (1996). Plantas útiles de Colombia (5a ed.). Fondo FEN Colombia. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Perez-Calix, E. (2008). Crassulaceae. En J. Rzedowski Rotter & G. Calderón de Rzedowski (Eds.), Flora del Bajío y Regiones adyacentes (Vol. 156, pp. 1–143). Michoacán, México: Instituto de Ecología, AC & Centro Regional del Bajío. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Pico, A. (2015). Bromelias y quiches de interés comercial en el Distrito Capital. (Plegable). Subdirección Científica. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Im | x | | | | x | | x | x | x | x |
| Pico, A. (2016). Otras bromelias y quiches comercializados en el Distrito Capital (Plegable). Subdirección Científica. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Im | x | | | | x | | x | | x | x |
| Pico, A., & Barrera, A. C. de. (2003). Cambios en el patrón de desarrollo floral de <i>Neoregelia</i> "Flandria" (Bromeliaceae) analizados mediante Cadenas de Markov. Acta Biológica Colombiana, 8(1), 47–57. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Pineda-Forero, M., Gutiérrez-Osorio, M., & García, A. X. (2011). Las maticas de mi región. Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | B | x | | | x | | | x | | | |
| Ping-tao, L., Gilbert, M. G., & Stevens, W. D. (1995). Asclepiadaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), Flora of China (Vol. 16, pp. 189–270). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10066 | Ar | | x | | | | | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Pinilla, N. (2015, mayo 29). Entrevista a Nancy Pinilla, barrio Castilla - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Pino, A. (2011). Informe Técnico Contrato 245-2011. Realizar la valoración agronómica de tres (3) especies priorizadas en el proyecto 318 en dos zonas bioclimáticas del Distrito Capital y hacer seguimiento al proceso de edición de las guías técnicas de las especies <i>Vasconcellea cundinamarcensis</i> , <i>Solanum quitoense</i> var. <i>septentrionale</i> y <i>Capsicum pubescens</i> . Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Pinzón, L. F. (2016). Entrevista a Luisa Fernanda Pinzón, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| Piña-Escutia, J. L., Vázquez-García, L. M., & Arzate-Fernández, A. M. (2011). Marker Assisted Characterization in <i>Tigridia pavonia</i> (L.f) DC. En I. Abdurakhmonov, Plant breeding (Vol. 10, p. 21). Zagreb, Croatia: InTech. Recuperado a partir de http://www.intechopen.com/books/plant-breeding/marker-assisted-characterization-in-tigridia-pavonia-l-f-dc | Ar | | x | | | | | | | | |
| PlantFiles: <i>Vriesea erythrodactylon</i> . (2016). Recuperado el 24 de abril de 2017, a partir de http://davesgarden.com/guides/pf/go/202070/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Plazas, E. (2011). Informe Técnico Contrato 255-2011. Análisis fitoquímicos preliminares y de actividad biológica de seis especies nativas de las áreas rurales del Distrito Capital (pp. 19–40). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Plowman, T., Knapp, S., & Press, J. R. (1998). A revision of the South American species of <i>Brunfelsia</i> (Solanaceae). <i>Fieldiana. Botany</i> , 39, 1–135. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Poaceae. (2015). Recuperado el 27 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000357?projectid=3 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Polhill, R. M. (1982). <i>Crotalaria</i> in Africa and Madagascar. Netherlands: CRC Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Polunin, O. (1969). <i>Flowers of Europe: a field guide</i> . Londres: Oxford U.P. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Pombo, R. (2012). <i>Poemas infantiles y otros poemas</i> . Bogotá: Universidad Externado de Colombia - Decanatura Cultural. | L | x | | | | | | | | | |
| Pool, A., & Knapp, S. (2009). Lamiaceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 4, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Portilla-Melo, O. A. (s/f). El léxico de origen quechua en el español del Departamento de Nariño. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Profice, S. R., Kameyama, C., Côrtes, A. L. A., Braz, D. M., Indriunas, A., Vilar, T., ... Wasshausen, D. (2010). Acanthaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), <i>Catálogo de plantas e fungos do Brasil</i> (Vol. 1, pp. 570–584). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/z3529 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Pruski, J. F. (2011). Asteraceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 5, p. 1582). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Qibai, X., & Lowry II, P. P. (2007). Araliaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 13, pp. 435–491). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Qiner, Y., & Landrein, S. (2011). Linnaeaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 19, pp. 642–648). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Quanru, L., & Watson, M. F. (2008). Oxalidaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 11, pp. 1–6). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Quattrocchi, U. (2012). <i>CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology</i> . CRC Press. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Quecá, B. (2011). Informe Técnico Contrato 407-2011. Manejo de poscosecha de tomillo, cidrón y papayuela en el marco del proyecto de agricultura urbana del Jardín Botánico José Celestino Mutis (p. 65). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Quero, H. J. (1992). <i>Las palmas silvestres de la Péninsula de Yucatán</i> . Mexico, Ciudad de Mexico: Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Radcliffe, S. (1986). <i>Acalypha</i> . En <i>Flora of Pakistan</i> (Vol. 172). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=100064 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Ramdhani, S., Barker, N. P., & Bajjnath, H. (2009). Rampant non-monophyly of species in <i>Kniphofia</i> Moench (Asphodelaceae) suggests a recent Afromontane radiation. <i>Taxon</i> , 58(4), 1141–1152. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Ramírez-Segura, O. (2013). <i>Biología reproductiva y síndrome de polinización de tres especies simpátricas de Cestrum</i> (Solanaceae) (Thesis). Universidad Autónoma de Querétaro, México. | Ar | | | | | | | | | x | x |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Ramiro Fonnegra, & Jiménez, S. L. (2007). Plantas medicinales aprobadas en Colombia (2a ed.). Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Rață, G., Petroman, C., Petroman, I., & Matiut, A. (2010). Words of Latin Origin in the English of Botany, 9(3), 47–57. | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española. Madrid, España: Real Academia Española. | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Real Academia Española. (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.rae.es/ | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Reflora - Virtual Herbarium. (2016). Recuperado el 23 de mayo de 2017, a partir de http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.do | Ar | | | | | | x | | | | |
| Restrepo-Manrique, C. (2005). La alimentación en la vida cotidiana del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, 1653-1773. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. | L | x | | | | | | | | | |
| Retief, E., & Reyneke, W. F. (1984). The genus <i>Thunbergia</i> in southern Africa. <i>Bothalia</i> , 15(1/2), 107–116. https://doi.org/10.4102/abc.v15i1/2.1109 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Reynolds, S. T., & Forster, P. I. (2006). A taxonomic revision of <i>Ixora</i> L. (Rubiaceae: Ixoroideae) in Australia. <i>Austrobaileya</i> , 7(2), 253–278. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Rico, E., Crespo, M. B., Quintanar, A., Herrero, A., & Aedo, C. (Eds.). (2013). Liliaceae-Agavaceae. En <i>Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> (Vol. XX, p. 651). Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Rinderle, S. J., Goldstein, I. J., Matta, K. L., & Ratcliffe, R. M. (1989). Isolation and characterization of amaranthin, a lectin present in the seeds of <i>Amaranthus caudatus</i> , that recognizes the T- (or cryptic T)-antigen. <i>Journal of Biological Chemistry</i> , 264(27), 16123–16131. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Ríos-Katto, C. I. (2001). Guía para el cultivo y aprovechamiento del nacedaro, naranjillo o cajeto. Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Rivero D'Armas, I. (2015). El habla del Venezolano. Caracas, Venezuela: Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Robertson, K. R., & Clemants, S. E. (1993). Amaranthaceae. En <i>Flora of North America</i> (Vol. 4, p. 584). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Robinson, W. (1878). <i>Hardy Flowers</i> . Londres: Macmillan & Co. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Rodrigues Paiva, J. A. (Ed.). (2005). Malvaceae. En <i>Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> (Vol. III, p. 657). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Rodrigues Paiva, J. A., Herrero Nieto, A., & Aedo Perez, C. (Eds.). (2001). Acanthaceae. En <i>Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> (Vol. XIV, p. 300). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Rodríguez, A. (2016). Registro Multimedia en las colecciones del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Rodríguez, D. (2015, mayo 27). Entrevista a Daniel Rodríguez, barrio Castilla - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Rodríguez, M. (2016). Entrevista a María Rodríguez, Nodo Cantarrana, localidad de Usme - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | | | x | | | |
| Rodríguez, N. (2015, marzo 22). Entrevista a Nidia Rodríguez, barrio Las Dos Avenidas - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | Iv | x | | | | x | | x | | | |
| Rodríguez-Alberich, G., & Real Academia Española. (2016). <i>Dirae - Diccionario Inverso de la Real Academia Española</i> . Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://dirae.es/ | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Rojas, L. (2016). Entrevista a Lina Rojas, Herbario HFAB. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia - Interacción grupos focales. | I | x | | | | | | x | | | |
| Romero, M. (2016). Entrevista a María Romero, Nodo Cantarrana, localidad de Usme - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Rozo-Gauta, J. (1998). <i>Alimentación y medicina entre los muiscas</i> . Santafé de Bogotá, Colombia: Ediciones Naidí. | B | x | | | | | | | | | |
| Ruíz, N. (2016). Entrevista a Nidia Ruíz, Nodo Cantarrana, localidad de Usme - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | | | | x | | | |
| Rzedowski, G. C. de, & Rzedowski, J. (2001). Flora fanerogámica del Valle de México. Instituto de Ecología, A.C. y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Recuperado a partir de http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300082731 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Sachs, R. M. (1956). Floral Initiation in <i>Cestrum nocturnum</i> . I. A Long-Short Day Plant. <i>Plant Physiology</i> , 31(3), 185–192. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Salamanca, D. (2015, agosto 29). Entrevista a Diana Salamanca, barrio Villa Mayor - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Salvo, G., Bacchetta, G., Ghahremaninejad, F., & Conti, E. (2008). Phylogenetic relationships of Ruteae (Rutaceae): New evidence from the chloroplast genome and comparisons with non-molecular data. <i>Molecular Phylogenetics and Evolution</i> , 49(3), 736–748. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2008.09.004 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Sánchez, K. (2016). Entrevista a Karen Sánchez del programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo Sumapaz. | I | x | | | x | | | x | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Sánchez-Vindas, P. E. (1990). Myrtaceae. En Flora de Veracruz (Vol. 62, p. 49). Xalapa, Veracruz, Mexico: Instituto de Ecología A.C. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Sandino-Groot, W. (1881). Historia de las Plantas Medicinales de Colombia ó Exposición razonada de las principales especies vegetales, tanto indígenas, como exóticas cultivadas en el país. Bogotá: Imprenta de Colunje I Vallarino. | B | x | | | | | | | | | |
| Santacruz, L. (2016). Registro Multimedia en las colecciones del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Santos, C. (2016). Entrevista a Catalina Santos, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | x | | | |
| Sarmiento, L. (2010). Informe Técnico Contrato 558-2010. Direccional en campo las actividades operativas para la implementación de los modelos de restauración ecológica, rehabilitación y/o recuperación de las áreas alteradas asignadas, en cumplimiento de la meta de intervención del Proyecto 638 (pp. 16–18). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | Tr | x | | | | | | x | | | |
| Sarwar, G. R., & Qaiser, M. (2012). Distribution pattern, ecology and endemism of family Crassulaceae in Pakistan and Kashmir. Pakistan Journal of Botany, 44(6), 2055–2061. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Scalon, V. R. (2010). Escalloniaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), Catálogo de plantas e fungos do Brasil (Vol. 2, pp. 962–963). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/x5x7v | Ar | | x | | | | | | | | |
| Schlumberger, B. O., & Renner, S. S. (2012). Molecular phylogenetics of <i>Echinopsis</i> (Cactaceae): Polyphyly at all levels and convergent evolution of pollination modes and growth forms. American Journal of Botany, 99(8), 1335–1349. https://doi.org/10.3732/ajb.1100288 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Schmidt, M. G. (1980). Growing California Native Plants. United States of America: University of California Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Schneider, M. (1955). El Género <i>Gomphichis</i> . Caldasia, 7(33), 247–257 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Secretaría Distrital de Ambiente. (2015). Techos Verdes y Jardines Verticales. Guía Práctica. Recuperado a partir de http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/techos-verdes-y-jardines-verticales | Wr | x | | | | x | | x | | | |
| Segeren, W., & Maas, P. J. M. (1971). The Genus <i>Canna</i> in Northern South America. Acta Botanica Neerlandica, 20(6), 663–680. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1971.tb00210.x | Ar | | | | | | x | | | | |
| Shan-Huah W., Chang-Fu H., & Rejmánek M. (2004). Catalogue of the Naturalized Flora of Taiwan. Taiwania, 49(1), 16–31. https://doi.org/10.6165/tai.2004.49(1).16 | Ar | | x | | | | | | | | |
| She, M., Fading, P., Zehui, P., Watson, M. F., Cannon, J. F. M., Holmes-Smith, I., ... Pimenov, M. G. (2005). Apiaceae (Umbelliferae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 14, pp. 1–205). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10052 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Sheat, B., & Schofield, G. (1995). Complete Gardening in Southern Africa. South Africa: Struik Publishers. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Shengji, P., Sanyang, C., Lixiu, G., & Henderson, A. (2010). Areaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 23, pp. 132–157). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Shiget, M. (1990). Folk In-Situ Conservation of <i>Ensete ventricosum</i> (Welw.) E.E. Cheesman]: Toward the Interpretation of Indigenous Agricultural Science of the Ari, Sonthwestern Ethiopia. African Study Monographs, 10(3), 93–107. https://doi.org/10.14989/68056 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Shouliang, C., Dezhu, L., Guanghua, Z., Zhenlan, W., Shenglian, L., Liang, L., ... Ammann, K. H. (2006). Poaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 22, pp. 1–752). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Sierra-Guerrero, M. C., & Amarillo-Suárez, Á. R. (2014). Catálogo de la vegetación en jardines domésticos de Bogotá, Colombia. Biota Colombiana, 15(1), 10–46. | Article | x | | | | x | | x | | | |
| Silva, G. G. de. (1998). Breve diccionario etimológico de la lengua española. Fondo de Cultura Económica. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Singh, T. P., & Singh, S. (2012). Plant Species Diversity and Endemism at Dihang Dibang Biosphere Reserve and its surroundings, Eastern Himalaya Biodiversity Hotspot. Asian Journal of Biodiversity, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.7828/ajob.v3i1.81 | Ar | | x | | | | | | | | |
| SINIC - Sistema Nacional de Información Cultural. (s/f). Mitos y Leyendas - CUNDINAMARCA. Recuperado el 26 de marzo de 2017, a partir de http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IDDep=25&COLTEM=212 | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Small, E. (2011). Top 100 Exotic Food Plants. United States of America: CRC Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Smith, A. W. (1963). A Gardener's Handbook of Plant Names: Their Meanings and Origins. New York: Dover Corporation. | Ar | | | | | | | | x | x | x |



Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Smith, R. M. (1990). <i>Alpinia</i> (Zingiberaceae): A Proposed New Infrageneric Classification. <i>Edinburgh Journal of Botany</i> , 47(1), 1–75. https://doi.org/10.1017/S0960428600003140 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Sobral, M., Proença, C., Souza, M., Mazine, F., & Lucas, E. (2010). Myrtaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), <i>Catálogo de plantas e fungos do Brasil</i> (Vol. 2, pp. 1301–1330). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/x5x7v | Ar | | x | | | | | | | | |
| Soca, R. (2010). La fascinante historia de las palabras. Rey+Naranja. Recuperado a partir de https://www.librerianacional.com/pagina=producto&libro=255901 | Ar | | | | | | | | x | x | x |
| Soriano-Martín, C. (2005). Salicaceae. En <i>Flora Ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> (2a ed., Vol. III, p. 657). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | | | | | x | | | | |
| Stehmann, J. R., Mentz, L. A., Agra, M. de F., Vignoli-Silva, M., & Giacomini, L. (2010). Solanaceae. En R. C. Forzza, J. F. A. Baumgratz, C. E. M. Bicudo, A. A. Carvalho Jr., A. Costa, D. P. Costa, ... D. Zappi (Eds.), <i>Catálogo de plantas e fungos do Brasil</i> (Vol. 2, pp. 1633–1649). JBRJ. Recuperado a partir de http://books.scielo.org/id/x5x7v | Ar | | x | | | | | | | | |
| Stevens, W. D., & Morales, J. F. (2016). Apocynaceae. Recuperado el 26 de abril de 2017, a partir de http://www.tropicos.org/Name/42000278?projectid=3&langid=66 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Suárez, A. (1921). <i>El alma del Pasado</i> (Novela Bogotana). Bogotá: Imprenta de Eustacio Ramos. | L | x | | | | | | | | | |
| Suárez, A. (2015, agosto 29). Entrevista a Amparo Suárez, barrio San Jorge Central - Salida de campo localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Suárez, L. (2015, julio 8). Entrevista a Luis Suárez, Parque Central Bavaria - Salida de campo localidad de Santa Fe. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Taiyan, Z., Lianli, L., Guang, Y., & Al-Shehbaz, I. A. (2001). Brassicaceae (Cruciferae). En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 8, pp. 1–193). China & United States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10120 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Tao, C., Hua, Z., Jiarui, C., Taylor, C. M., Ehrendorfer, F., Lantz, H., ... Puff, C. (2011). Rubiaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), <i>Flora of China</i> (Vol. 19, pp. 57–368). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Tautiva, N. (2016). Entrevista a Nelly Tautiva, área de influencia Nodo Uval, localidad de Usme - Interacción personal vinculado a nodos de biodiversidad. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Taylor, C. M., Steyermark, J. A., Delprete, P. G., Vincentini, A., & Cortés, R. (2004). Rubiaceae. En <i>Flora of the Venezuelan Guayana</i> (Vol. 8, p. 874). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| The Plant List. (2013). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.theplantlist.org/ | Ar | | | | | | | | | x | x |
| Thieret, J. W. (1993). Pinaceae. En <i>Flora of North America</i> (Vol. 2, p. 476). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Thiselton-Dyer, W. T. (1877). <i>Flora of Tropical Africa</i> (Vol. 7). Ashford, Inglaterra: L. Reeve and Company. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Thompson, G. D. (2012). Molecular ecology of two invasive legumes (<i>Acacia saligna</i> and <i>Paraserianthes lophantha</i>) (Thesis). Stellenbosch University, South Africa. Recuperado a partir de http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/71943 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Thompson, I. R. (2007). A taxonomic treatment of tribe Anthemideae (Asteraceae) in Australia. <i>Muelleria</i> , 25, 21–58. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Thornton-Wood, S. (2011). Papaveraceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2, p. Por buscar). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Thouvenot, M. (2014). Diccionario náhuatl - español. Recuperado el 26 de marzo de 2017, a partir de http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario/nahuatl.html | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Torres, J. (2015, agosto 25). Entrevista a Javier Torres, vereda Mochuelo Bajo - Salida de campo localidad de Ciudad Bolívar. | I | x | | | x | | | x | | | |
| Torres, L. (2015). Entrevista a Liborio Torres, vereda Las Auras, Sumapaz - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Torres, M. E. (2016). Entrevista a María Eugenia Torres, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | | | | |
| Torres, S. (2015, mayo 29). Entrevista a Susana Torres, barrio Castilla - Salida de campo localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | I | x | | | | x | | x | | | |
| Townsend, C. C. (1974). Amaranthaceae. En E. Nasir (Ed.), <i>Flora of Pakistan</i> (Vol. 71, p. 49). Karachi, Pakistan: University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/work/23151184?selectedversion=NBD24561109 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Turner, B. L., & Mendenhall, M. G. (1993). A Revision of <i>Malvaviscus</i> (Malvaceae). <i>Annals of the Missouri Botanical Garden</i> , 80(2), 439–457. https://doi.org/10.2307/2399792 | Ar | | x | | | | | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|---|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Type of <i>Masdevallia coccinea</i> Linden ex Lindl. [family ORCHIDACEAE] on JSTOR. (s/f). Recuperado el 25 de octubre de 2017, a partir de http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.k000880309?searchUri=filter%3Dname%26so%3Dps_group_by_genus_species%2Basc%26Query%3DMasdevallia%2Bcoccinea | Ar | | | | | | x | | | | |
| Typhaceae in Flora of North America @ efloras.org. (s/f). Recuperado el 18 de agosto de 2017, a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=10926 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Ud-Din, H.-, & Ghazanfar, S. A. (1980). Rutaceae. En E. Nasir & S. Ali (Eds.), Flora of Pakistan (Vol. 132, p. 27). Karachi, Pakistan : University of Karachi: Department of Botany, University of Karachi. Recuperado a partir de http://trove.nla.gov.au/version/28062800 | Ar | | | | | | x | | | | |
| Uffj: Flora da Serra Negra – Minas Gerais. (2016). Recuperado el 25 de abril de 2017, a partir de http://www.uffj.br/floraserranegra/ | Ar | | | | | | x | | | | |
| Uribe-Uribe, L. (1948). <i>Sertula Florae Colombiae</i> , I. Caldasia, 5(21), 77–83. | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Valencia, J. (2016). Entrevista a Janice Valencia, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | I | x | | | | | | x | | | |
| Van der Werff, H. (2009). Lauraceae. En <i>Flora Mesoamericana</i> (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología; Missouri Botanical Garden; The Natural History Museum (London), Vol. 2, p. 248). St. Louis, Missouri, United States of America: Missouri Botanical Garden. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Vanegas, D. (2015). Entrevista a Dario Vanegas, vereda Santa Bárbara, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Vaquero, E. (2016). Entrevista a Esperanza Vaquero del programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo Sumapaz. | I | x | | | | | | x | | | |
| Vargas, O. (2006). En busca del bosque perdido: una experiencia de restauración ecológica en predios del embalse de Chisacá Localidad de Usme, Bogotá. Bogotá, Colombia: Grupo de restauración ecológica, Universidad Nacional de Colombia. | Ar | | | | | | | x | | | |
| Vargas, O. (Ed.). (2007). <i>Guía Metodológica para la Restauración Ecológica del bosque altoandino</i> . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado a partir de https://www.researchgate.net/publication/259482462_Guia_Metodologica_para_la_Restauracion_Ecologica_del_bosque_altoandino | Ar | | | | | | | x | | | |
| Vargas, W. G. (2002). <i>Guía ilustrada de las plantas de las montañas del Quindío y los Andes Centrales</i> . Manizales, Colombia: Universidad de Caldas. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Veiga Blanco, T., Galetto, L., & Machado, I. C. (2013). Nectar regulation in <i>Euphorbia tithymaloides</i> L., a hummingbird-pollinated Euphorbiaceae. <i>Plant Biology</i> , 15(5), 910–918. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.2012.00695.x | Ar | | | | | | x | | | | |
| Veldkamp, J. F. (2014). A revision of <i>Cenchrus</i> incl. <i>Pennisetum</i> (Gramineae) in Malesia with some general nomenclatural notes. <i>Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants</i> , 59(1), 59–75. https://doi.org/10.3767/000651914X684376 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Venegas, M. (2015). Entrevista a Marcos Venegas, vereda Santa Bárbara, Ciudad Bolívar - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | x | | | | | | x | | | |
| Vermeulen, N., & Rosenfeld, R. (1999). <i>Encyclopedia of House Plants</i> . Netherlands: Taylor & Francis. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Villamizar, C. (2016). Entrevista a Catalina Villamizar, Humitos sagrados Baqata - Interacción grupos focales. | I | x | | | | x | | | | | |
| Villar-Pérez, L. (1986). Lauraceae. En <i>Flora ibérica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares</i> . (Vol. I, p. 900). Madrid, España: Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Villavicencio Nieto, M. Á., & Pérez Escandón, B. E. (2005). <i>Guía de la flora útil de la Huasteca y la zona Otomí-Tepehua</i> , Hidalgo I. Pachuca, México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Vivrette, N. J., Bleck, J. E., & Ferren Jr., W. R. (2003). <i>Aptenia cordifolia</i> . En <i>Flora of North America</i> (Vol. 4, pp. 83–84). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=220000996 | Ar | | | | | | | | x | x | |
| Volschenk, B., van der Walt, J. J. A., & Vorster, P. J. (1982). The subspecies of <i>Pelargonium cucullatum</i> (Geraniaceae). <i>Bothalia</i> , 14(1), 45–51. https://doi.org/10.4102/abc.v14i1.1134 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Waard, J. F.-D. (1966). <i>Flora of Suriname</i> . (A. A. Pülle & J. Lanjouw, Eds.) (Vol. 1). Brill Archive. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Walter, A., & Lebot, V. (2007). <i>Gardens of Oceania</i> . Australia: Australian Centre for International agricultural research. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Walters, S. M. (2000). <i>The European Garden Flora: A Manual for the Identification of Plants Cultivated in Europe</i> . (J. Cullen, J. C. M. Alexander, C. D. Brickell, J. R. Edmondson, P. S. Green, V. H. Heywood, ... P. F. Yeo, Eds.) (4a ed., Vol. 6). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Watson, F. D., & Eckenwalder, J. E. (1993). Cupressaceae. En <i>Flora of North America</i> (Vol. 2, p. 475). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | x | | | | x | | | | |



Table 4. Cont.

| Source | Source type | C | TO | CH | RH | UH | H | U | NO | NS | E |
|--|-------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---|
| Webb, C. J. (1987). Checklist of dicotyledons naturalised in New Zealand 18. Asteraceae (Compositae) subfamily Asteroideae. New Zealand Journal of Botany, 25(4), 489–501. https://doi.org/10.1080/0028825X.1987.10410081 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Wehi, P. M., & Clarkson, B. D. (2007). Biological flora of New Zealand 10. Phormium tenax, harakeke, New Zealand flax. New Zealand Journal of Botany, 45(4), 521–544. https://doi.org/10.1080/00288250709509737 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Wiersema, J. H., & León, B. (1999). World Economic Plants: A Standard Reference. CRC Press. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Wiersema, J. H., & León, B. (2016). World Economic Plants: A Standard Reference (2nd Edition). CRC Press. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Wilfret, G. J. (1993). “Morning Mist” <i>Gladiolus</i> . HortScience, 28(7), 752–753. | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Wongsuwan, P., & Picheansoonthon, C. (2011). Taxonomic Revision of the Genus <i>Hedychium</i> J. König (Zingiberaceae) in Thailand (Part I). The Journal of the Royal Institute of Thailand, III, 126–149. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Wu, S.-H., Sun, H.-T., Teng, Y.-C., Rejmánek, M., & Chaw, S.-M. (2010). Patterns of plant invasions in China: Taxonomic, biogeographic, climatic approaches and anthropogenic effects. Biological Invasions, 12(7), 2179–2206. https://doi.org/10.1007/s10530-009-9620-3 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Xinqi, C., Songyun, L., Jiemei, X., & Tamura, M. N. (2000). Liliaceae. En Z. Y. Wu & P. H. Raven (Eds.), Flora of China (Vol. 24, pp. 73–263). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Xiwen, L., Jie, L., Puhua, H., Fa'nan, W., Hongbin, C., & Werff, H. van der. (2003). Lauraceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 7, pp. 102–254). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Xiwen, L., Jie, L., Robson, N. K. B., & Stevens, P. F. (2007). Clusiaceae (GUTTIFERAE). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 13, pp. 1–47). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Xycol: La nomenclature scientifique et vernaculaire des ligneux. (2016). Recuperado el 25 de mayo de 2017, a partir de http://www.xycol.net/index.php | Ar | | | | | | x | | | | |
| Ya, T., Gilbert, M. G., & Dorr, L. J. (2007). Hibiscus (Malvaceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 12, pp. 286–294). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10534 | Ar | | x | | | | x | | | | |
| Yela-M., K. H. (2014). Suaza El pueblo del sombrero y la orquídea (Primera). Recuperado a partir de http://www.autoreseditores.com/libro/3912/kenneth-harrison-yela-mora-suaza-el-pueblo-del-sombrero-y-la-orquidea.html | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Yousheng, C., Qiner, Y., Ohba, H., & Nikitin, V. V. (2007). Violaceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 13, pp. 72–111). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Zambrano, I. (2015). Entrevista a Inelda Zambrano, vereda Las Margaritas, Usme - Salida Etnobotánica Bogotá-Región. | I | | x | | | | | x | | | |
| Zamudio, S., & Carranza, E. (1994). Cupressaceae. En J. Rzedowski Rotter & G. Calderón de Rzedowski (Eds.), Flora del Bajío y Regiones adyacentes (Vol. 29, pp. 1–20). Michoacán, México: Instituto de Ecología, AC & Centro Regional del Bajío. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Zarate-Pedroche, S. (1987). Taxonomic identity of <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit, with a new combination. Phytologia, 63(4), 304–306. | Ar | | x | | | | | | | | |
| Zhekun, Z., & Bartholomew, B. (2003). Araceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 5, pp. 74–75). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Zhekun, Z., & Gilbert, M. G. (2003). Moraceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 5, pp. 21–73). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Zhengping, W., & Stapleton, C. (2006). <i>Phyllostachys aurea</i> (Poaceae). En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 22, pp. 167–168). China & Unites States of America: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. Recuperado a partir de http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200025882 | Ar | | | | | | | | x | | x |
| Zhu, S., Yilin, C., Yousheng, C., Yourun, L., Shangwu, L., Xuejun, G., ... Gottschlich, G. (2011). Asteraceae. En Z. Y. Wu, P. H. Raven, & D. Y. Hong (Eds.), Flora of China (Vol. 20–21, pp. 1–894). Beijing & St. Louis: Science Press & Missouri Botanical Garden Press. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Zona, S., & Clemants, S. E. (2000). Areaceae. En Flora of North America (Vol. 22, p. 384). New York & Oxford, United States of America: Flora of North America Editorial Committee, eds. | Ar | | | | | | x | | | | |
| Zonneveld, B. J. M. (2012). Genome sizes of all 19 <i>Araucaria</i> species are correlated with their geographical distribution. Plant Systematics and Evolution, 298(7), 1249–1255. https://doi.org/10.1007/s00606-012-0631-7 | Ar | | x | | | | | | | | |
| Zubair, M. (2010). Genetic and environmental effects on polyphenols in <i>Plantago major</i> (Paper No. 2010:1). Balsgård: Swedish University of Agricultural Sciences. Recuperado a partir de http://pub.epsilon.slu.se/5468/ | Ar | | x | | | | | | | | |



**Describing and diffusing the ethnobotanical knowledge of Bogotá D.C. (Colombia)
through an online tool focused on common names of plants**

Table S5. Interviewed informants and their locations. Area type: R= Rural area, U= Urban area.

| ID | Informant | Area type |
|----|---|-----------|
| 1 | Aquino, J. (2015). José Aquino, vereda Peñalisa, localidad de Sumapaz. | R |
| 2 | Ávila, L. (2016). Luis Ávila, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá, Nodo de biodiversidad Las Mercedes, localidad de Suba. | U |
| 3 | Bautista, C. (2016). Carmenza Bautista, Subdirección Técnica Operativa, Jardín Botánico de Bogotá, Nodo de biodiversidad Cantarrana, localidad de Usme. | U |
| 4 | Becerra, R. D. (2016). Rubén Darío Becerra, Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá, Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales. | U |
| 5 | Bernal, H. (2015). Henry Bernal, barrio Villa, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 6 | Bernal, M. (2016). Mauricio Bernal, Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. | U |
| 7 | Buitrago, J. M. (2015). Juan Manuel Buitrago, barrio Villa Mayor, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 8 | Cadena, M. A. (2015). Marco Antonio Cadena, barrio San Jorge Central, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 9 | Calderón, C. (2016). Claudia Calderón Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá, Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales, localidad San Cristóbal. | U |
| 10 | Calderón, M. (2016). Manuela Calderón, Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 11 | Calderón, M. (2016). María Calderón, barrio Ciudadela Colsubsidio, localidad de Engativá. | U |
| 12 | Camargo, P. (2016). Pedro Camargo, Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. | U |
| 13 | Cárdenas, M. B. (2015). María Bélen Cárdenas, vereda Santa Rosa, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 14 | Cárdenas, R. E. (2016). Raúl Ernesto Cárdenas, Subdirección Técnica Operativa del Jardín Botánico de Bogotá, Nodo de Biodiversidad Cerros Orientales, localidad San Cristóbal. | U |
| 15 | Castañeda, M. (2015). Myriam Castañeda, barrio Castilla, localidad de Kennedy. | U |
| 16 | Cecilia, S. (2015). Cecilia Santamaría, barrio Las Dos Avenidas, localidad de Kennedy. | U |
| 17 | Cepeda, J. (2016). Juliana Cepeda, Colectivo Savias & Sabias, Universidad Nacional de Colombia - Interacción grupos focales. | U |
| 18 | Cifuentes, C. (2015). Carlos Cifuentes, corregimiento Nazareth, localidad de Sumapaz. | R |
| 19 | Cifuentes, C. (2016). Carlos Cifuentes, Parque Ecológico Chaqué, Hospital Nazareth, Nodo de biodiversidad Sumapaz, localidad de Sumapaz. | R |
| 20 | COAMOD. (2015). Taller con Corporación de Adultos Mayores de Mochuelo Bajo, Localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 21 | Cortés, A. E. (2015). Ana Elvira Cortés, vereda Curubital, localidad de Usme. | R |
| 22 | Corzo, D. (2016). Diana Corzo, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 23 | De Corredor, E. (2015). Elizabeth De Corredor, barrio San Jorge Central, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 24 | De Cuervo, F. (2015). Fanny De Cuervo, barrio Las Dos, localidad de Kennedy. | U |
| 25 | Díaz, S. (2015). Sara Díaz, vereda Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 26 | Díaz, T. (2016). Teresa Díaz del programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo de biodiversidad Sumapaz, Localidad de Sumapaz | U |
| 27 | Elías, M. (2016). Micán Elías, Parque Ecológico Chaqué, Hospital Nazareth, Nodo de biodiversidad Sumapaz, Localidad de Sumapaz. | R |
| 28 | Galvis, G. (2016). Gladys Galvis, Concejo de mujeres muiscas de Suba, área de influencia Nodo de biodiversidad Las Mercedes, localidad de Suba. | U |
| 29 | Gamba, E. (2015). Eberardo Gamba, corregimiento de Betania, localidad de Sumapaz. | R |
| 30 | García, N. (2015). Neisy García, barrio San Jorge Central, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 31 | García, R. (2015). Renán García, vereda Curubital, localidad de Usme. | R |
| 32 | González, C. (2016). Carmen González, Red de agricultores urbanos de Suba, área de influencia Nodo de biodiversidad Las Mercedes, localidad de Suba. | U |
| 33 | Grupo de Operarios Nodo Usme-Uval (Jardín Botánico). (2016). Grupo de Operarios Nodo de biodiversidad Usme-Uval, localidad de Usme. | R |
| 34 | Grupo de restauración ecológica Subdirección Científica JBB. (2016). Grupo de Restauración Ecológica Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá. Nodo de biodiversidad Cantarrana, localidad de Usme. | U |
| 35 | Hernández, M. (2016). Marlen Hernández, Nodo de biodiversidad Cantarrana, localidad de Usme. | U |
| 36 | Herrera, H. (2015). Hilma Herrera, barrio Castilla, localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | U |
| 37 | Huertas, B. (2015). Beatriz Huertas, vereda Olarte, localidad Usme. | R |
| 38 | Hurtado-Martínez, L. (2016). Leonel Hurtado Martínez, convenio JBB-EAAB, Nodo de biodiversidad Tibanica, localidad de Bosa. | U |
| 39 | López, L. (2015). Leonor López, barrio San Jorge Central, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 40 | Mancipe, C. (2016). Carolina Mancipe, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 41 | Martínez, L. (2016). Liliana Martínez, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 42 | Matiz, C. (2016). Catalina Matiz, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 43 | Mendoza, J. (2015). José Mendoza, barrio Villa Mayor, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 44 | Meneses, R. (2015). Rosalba Meneses, vereda Mochuelo Bajo, localidad de Ciudad Bolívar. | R |



Table S5. Cont.

| ID | Informant | Area type |
|----|---|-----------|
| 45 | Ardila, G. (2015). Garciliano Ardila, vereda Chisacá, localidad de Usme. | R |
| 46 | Micán-Romero, M. J. (2015b). María Jesús Micán Romero, vereda Peñalisa, localidad de Sumapaz. | R |
| 47 | Moreno, E. (2015). Elizabeth Moreno, barrio Las Dos Avenidas, localidad de Kennedy. | U |
| 48 | Moya, A. (2015). Andrés Moya, Parque Ecológico Chaquén, Hospital Nazareth, Nodo de biodiversidad Sumapaz, Localidad de Sumapaz. | R |
| 49 | Moya, A. (2016). Andrea Moya del programa Ecoterapia, Hospital Nazareth, Nodo de biodiversidad Sumapaz, Localidad de Sumapaz. | U |
| 50 | Muñoz, A. (2015). Anaís Muñoz, vereda Santa Bárbara, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 51 | Naranjo, M. (2015). Miguel Naranjo, vereda El Destino, localidad de Usme. | R |
| 52 | Naranjo, M. (2015). Myriam Naranjo, vereda Santa Bárbara, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 53 | NN. (2015). Residente del sector, barrio Villa, localidad de Antonio Nariño, UPZ Restrepo. | U |
| 54 | Orozco, N. (2016). Nubia Orozco, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 55 | Ortiz, A. N. (2016). Alba Nubia Ortiz, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 56 | Ospina, B. (2016). Ospina Blancanieves, Concejo de mujeres muiscas de Suba, área de influencia Nodo de biodiversidad Las Mercedes, localidad de Suba. | U |
| 57 | Patiño, M. (2016). Miguel Patiño, Subdirección Técnica Operativa, Jardín Botánico de Bogotá, Nodo de biodiversidad cerros Orientales, localidad de San Cristóbal. | U |
| 58 | Peñaloza, B. (2015). Bernardo Peñaloza, vereda Curubital, localidad de Usme. | R |
| 59 | Pérez, D. (2016). Dario Pérez, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 60 | Pinilla, N. (2015). Nancy Pinilla, barrio Castilla, localidad de Kennedy. | U |
| 61 | Pinzón, L. F. (2016). Luisa Fernanda Pinzón, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 62 | Rodríguez, D. (2015). Daniel Rodríguez, barrio Castilla, localidad de Kennedy. | U |
| 63 | Rodríguez, M. (2016). María Rodríguez, Nodo de biodiversidad Cantarrana, localidad de Usme. | U |
| 64 | Rodríguez, N. (2015). Nidia Rodríguez, barrio Las Dos Avenidas, localidad de Kennedy. | U |
| 65 | Rojas, L. (2016). Lina Rojas, Herbario HFAB. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. | U |
| 66 | Romero, M. (2016). María Romero, Nodo de biodiversidad Cantarrana, localidad de Usme. | U |
| 67 | Ruiz, N. (2016). Nidia Ruiz, Nodo de biodiversidad Cantarrana, localidad de Usme. | U |
| 68 | Salamanca, D. (2015). Diana Salamanca, barrio Villa Mayor, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 69 | Sánchez, K. (2016). Karen Sánchez, programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo de biodiversidad Sumapaz, localidad de Sumapaz. | U |
| 70 | Santos, C. (2016). Catalina Santos, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 71 | Suárez, A. (2015). Amparo Suárez, barrio San Jorge Central, localidad de Antonio Nariño. | U |
| 72 | Suárez, L. (2015, julio 8). Luis Suárez, Parque Central Bavaria, localidad de Santa Fe. | U |
| 73 | Tautiva, N. (2016). Nelly Tautiva, área de influencia Nodo Uval, localidad de Usme. | R |
| 74 | Torres, J. (2015, agosto 25). Javier Torres, vereda Mochuelo Bajo, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 75 | Torres, L. (2015). Liborio Torres, vereda Las Auras, localidad de Sumapaz. | R |
| 76 | Torres, M. E. (2016). María Eugenia Torres, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 77 | Torres, S. (2015, mayo 29). Susana Torres, barrio Castilla, localidad de Kennedy, UPZ Castilla. | U |
| 78 | Valencia, J. (2016). Janice Valencia, Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. | U |
| 79 | Vanegas, D. (2015). Dario Vanegas, vereda Santa Bárbara, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 80 | Vaquero, E. (2016). Esperanza Vaquero, programa Ecoterapia, Hospital Nazareth. Nodo de biodiversidad Sumapaz, localidad de Sumapaz. | U |
| 81 | Venegas, M. (2015). Marcos Venegas, vereda Santa Bárbara, localidad de Ciudad Bolívar. | R |
| 82 | Villamizar, C. (2016). Catalina Villamizar, Humitos sagrados Baqata - Interacción grupos focales. | U |
| 83 | Zambrano, I. (2015). Inelda Zambrano, vereda Las Margaritas, localidad de Usme. | R |

References

Font Quer P. 1953. Diccionario de botánica. Barcelona, Labor S.A.
Moreno NP. 1984. Glosario botánico ilustrado. México, Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. México.

Pérez D, Matiz LC. 2017. Uso de las plantas por comunidades campesinas en la ruralidad de Bogotá D.C., Colombia. *Caldasia* 39: 68-78.

