

# *Dracontioides Engl.*

Luana Silva Braucks Calazans

Universidade Federal do Espírito Santo - Vitória; luanasbcalazans@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Dracontioides*, *Dracontioides desciscens*, *Dracontioides salvianii*.

## COMO CITAR

Calazans, L.S.B. 2020. *Dracontioides* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB4997>.

## DESCRIÇÃO

Ervas perenes, inermes, rizomatosas, helófitas ou psamofitas, solitárias ou agrupadas. Rizoma subterrâneo ereto, esparsamente ramificado, coberto por pequenos tubérculos. Folhas frequentemente eretas, simples, completas; pecíolo liso a marmorado; bainha 1/3 a 1/2 do comprimento do pecíolo; lâmina ovóide a sagitada, fenestrada ou não fenestrada, cartácea ou subcoriácea; divisão anterior ovada a lanceolada, 2-4 pares de nervuras laterais primárias; divisões posteriores inconspícuas a muito desenvolvidas, lanceoladas, 0-2 nervuras basioscópicas, 0-2 nervuras acrosópicas. Inflorescência solitária, terminal; pedúnculo menor que o pecíolo; espata cartácea a subcoriácea, formando um tubo na região basal e com lâmina fornicada na região apical, marcescente, verde a castanho-avermelhada; espádice sésil a curto-estipitado, mais curto que a espata, desenvolvimento basipetalar. Flores bissexuadas, perigoniadas, 4 tépalas; estames 4, livres, exertos durante a antese, anteras 2-loculares, poricidas; gineceu ovóide a cônico, 1-2-locular, lóculos 1-2-ovulados, placentação axial, estilete mais longo que as tépalas, estigma abreviado. Infrutescência pêndula, espata marcescente; bagas obovóides, 1-5-sementes, verdes a arroxeadas; sementes reniformes, albuminosas, testa espessada, dura, verrucosa a cristada, castanha.

## COMENTÁRIO

Gênero exclusivamente neotropical, restrito ao leste do Brasil, ocorrendo em formações costeiras associadas a solos arenosos entre os estados de Sergipe e do Espírito Santo.

### Forma de Vida

Ervá

### Substrato

Aquática, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

### Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

### Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Alagoas)

### CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Plantas helófitas, normalmente ocorrendo agrupadas; lâminas foliares usualmente fenestradas, ocasionalmente não fenestradas, cartáceas; divisões posteriores longas (28-30 cm) .. ***Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.**

1'. Plantas psamófitas, solitárias; lâminas foliares não fenestradas, subcoriáceas; divisões posteriores curtas (até 3 cm) .. ***Dracontioides salvianii* E.G. Gonç.**

### BIBLIOGRAFIA

Gonçalves, E.G. 2005. A revision of genus *Dracontioides* Engl. (Araceae), including a new species from Bahia, Brazil. *Aroideana* 28: 21-31.

# *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.

## Tem como sinônimo

basônimo *Urospatha desciscens* Schott

## DESCRIÇÃO

**Folha: compr. (cm) do pecíolo(s)** 45 a(s) 90; **lâmina(s)** não fenestrada(s)/fenestrada(s); **consistência da lâmina(s)** cartácea(s); **forma da divisão anterior(es)** ovada(s); **compr. (cm) da divisão posterior(es)** 28 a(s) 30. **Inflorescência: compr. (cm) do pedúnculo(s)** 26 a(s) 73; **compr. (cm) da espata(s)** 8 a(s) 17. **Flor: número de lóculo(s)** 2.

## COMENTÁRIO

Espécie helófito que ocorre entre o Sergipe e o Espírito Santo, em áreas úmidas costeiras (brejosas). Frequentemente ocorre formando densos agrupamentos de indivíduos.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Aquática

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Sergipe)

Sudeste (Espírito Santo)

### Possíveis ocorrências

Nordeste (Alagoas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

C. Farney, 2641, RB, 290033,  (RB00477696), Bahia

H.C. Lima, 1896, RB, 289352,  (RB00472116), Espírito Santo

M. Nadruz, 1148, RB, 319513,  (RB00472120), Espírito Santo

M.O.O. Pellegrini, 454, RB,   (RB01132585), Sergipe

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.



Figura 2: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.



Figura 3: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.



Figura 4: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.



Figura 5: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.



Figura 6: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.



Figura 7: *Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.

### BIBLIOGRAFIA

Gonçalves, E.G. 2005. A revision of genus *Dracontioides* Engl. (Araceae), including a new species from Bahia, Brazil. *Aroideana* 28: 21-31.

# *Dracontioides salvianii* E.G.Gonç.

## DESCRIÇÃO

**Folha:** compr. (cm) do pecíolo(s) 10 a(s) 30; lâmina(s) não fenestrada(s); consistência da lâmina(s) subcoriácea(s); forma da divisão anterior(es) lanceada(s) a(s) oblonga(s); compr. (cm) da divisão posterior(es) até 3. **Inflorescência:** compr. (cm) do pedúnculo(s) 12 a(s) 15; compr. (cm) da espata(s) 5.5 a(s) 6.5. **Flor:** número de lóculo(s) 1 a(s) 2.

## COMENTÁRIO

Espécie psamófila que ocorre no estado da Bahia, em restingas. Segundo o autor (Gonçalves 2005), parece ser uma espécie neotênica.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia)

## MATERIAL TESTEMUNHO

E. Pereira, 9600, HB, Bahia

E.R. Salviani, 1843, UB, 201280,  (UB0031829), Bahia, **Typus**

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES




Figura 1: *Dracontioides salvianii* E.G.Gonç.