

Lathyrus L.

João Ricardo Vieira Iganci

Universidade Federal de Pelotas; joaoiganci@gmail.com

Silvia Teresinha Sfoggia Miotto

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; stsmiotto@bol.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Lathyrus*, *Lathyrus acutifolius*, *Lathyrus annuus*, *Lathyrus aphaca*, *Lathyrus cicera*, *Lathyrus crassipes*, *Lathyrus elegans*, *Lathyrus hasslerianus*, *Lathyrus hookeri*, *Lathyrus ibicuiensis*, *Lathyrus latifolius*, *Lathyrus linearifolius*, *Lathyrus macropus*, *Lathyrus macrostachys*, *Lathyrus nervosus*, *Lathyrus nitens*, *Lathyrus ochrus*, *Lathyrus odoratus*, *Lathyrus palustris*, *Lathyrus paraguariensis*, *Lathyrus paranensis*, *Lathyrus parodii*, *Lathyrus pratensis*, *Lathyrus pubescens*, *Lathyrus pusillus*, *Lathyrus sativus*, *Lathyrus subulatus*, *Lathyrus sylvestris*, *Lathyrus tingitanus*.

COMO CITAR

Iganci, J.R.V., Miotto, S.T.S. 2020. *Lathyrus* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB101087>.

DESCRIÇÃO

Ervas ou subarbustos perenes ou anuais, eretos ou trepadeiras. Ramos com ou sem alas. Folhas paripinadas com um par de folíolos, gavinhas de setáceas até muito ramificadas. Folíolos paralelinérveos ou curvinérveos, estípulas sagitadas ou semissagitadas. Racemos axilares, de uni a plurifloros. Flores azuis, violáceas ou purpúreas, raramente brancas ou amarelas. Estames pseudomonadelfos, anteras basifixas e dorsifixas alternadas. Estilete em ângulo reto com o ovário, espatulado, com a face adaxial pubescente no terço superior, estigma linear ou bipartido. Legumes com deiscência elástica, multiseeminados.

Forma de Vida

Ervá, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Ceará)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

Possíveis ocorrências

Sul (Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave para identificação das espécies de *Lathyrus* ocorrentes no Brasil

1. Estípulas semissagitadas ou de ovadas a lanceoladas; estigma bipartido.
2. Estípulas de ovadas a lanceoladas. *L. ibicuiensis*
- 2'. Estípulas semissagitadas.
3. Folíolos de lanceolados a oblongos.
4. Gavinhas de setáceas a trífidas. *L. acutifolius*
- 4'. Gavinhas muito ramificadas. *L. pubescens*
- 3'. Folíolos lineares.
5. Racemos com (1-2) 3 (4) flores. *L. subulatus*
- 5'. Racemos com (8) 9-19 flores.
6. Ramos alados. *L. nitens*
- 6'. Ramos sem alas. *L. linearifolius*
- 1'. Estípulas sagitadas; estigma linear.
7. Ramos sem alas.
8. Folíolos sem venação proeminente; flores amarelas; legumes estipitados. *L. hasslerianus*
- 8'. Folíolos com venação proeminente; flores azuis, violáceas ou roxas; legumes não estipitados.
9. Flores com 1,3-1,6 cm compr.; folíolos de linear-elípticos a linear-lanceolados (relação compr./larg.= 7,1-8,7:1). *L. paraguariensis*
- 9'. Flores com 1,7-2,3 cm compr.; folíolos de elípticos a elíptico-lanceolados ou largo-elípticos (relação compr./larg.= 1,4-3,3:1).
10. Racemos com 11-20 flores. *L. elegans*
- 10'. Racemos com 5-13 flores. *L. nervosus*
- 7'. Ramos alados em direção ao ápice.
11. Racemos com (1) 2 (3) flores, com 1,1-1,5 cm compr. *L. crassipes*
- 11'. Racemos com 3-14 flores, com 1,4-2,9 cm compr.
12. Racemos com 3-6 flores, com 2,1-2,9 cm compr. *L. paranensis*
- 12'. Racemos com 6-14 flores, com 1,4-2,4 cm compr.
13. Flores com 1,4-1,5 cm compr.; legumes com 3,2-4 cm compr. *L. parodii*
- 13'. Flores com 1,7-2,4 cm compr.; legumes com 5,3-7 cm compr.
14. Folíolos de estreito-elípticos a lanceolados, com 1-1,7(2) cm larg. *L. hookeri*
- 14'. Folíolos de linear-elípticos a linear-lanceolados, com 0,4-1,1 cm larg. *L. macrostachys*

Lathyrus acutifolius Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) ausente(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** estípula(s) semi sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** bipartido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folíolos com (0,43) 0,6-1,17 cm de largura; flores com 1,6-2,2 cm compr.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Rambo, s.n., PACA, 27271

Lathyrus annuus L.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Nordeste (Ceará)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fr. Allemão, s.n., R, 64629, ,  (R000064629), Ceará

Lathyrus aphaca L.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO


Cultivada, não é endêmica do Brasil



Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.T.S.Miotto, 1359, ICN,   (ICN00022930), Rio Grande do Sul

S.T.S.Miotto, 1357, ICN,   (ICN00022931), Rio Grande do Sul

Lathyrus cicera L.

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus dubius* Ten.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.315.

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus berteroanus* Colla ex Savi

heterotípico *Lathyrus stipularis* C.Presl.

DESCRIÇÃO

Caulo: ramificação(ões) abundante(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** **estípula(s)** sagitada(s)/semi sagitada(s)/ovada(s)/lanceolada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s). **Inflorescência:** **racemo(s)** até 6 flor(es). **Flor:** **cor** de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas anuais. Lacínias do cálice de igual comprimento e retas, todas muito maiores do que o tubo calicino. Flores 1-3.

COMENTÁRIO

Habitat em ambientes secos a úmidos.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Miotto, S.T.S., 1196, ICN

Lathyrus elegans Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) esparsa(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** estípula(s) sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** trifida(s)/com mais de 3 ramificação(ções). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lacínia inferior do cálice menor ou igual ao comprimento do tubo calicino. Racemos com (11)12-18(20) flores.

COMENTÁRIO

Habitat predominante em ambientes úmidos.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

G. Hatschbach, 22757, MBM

Lathyrus hasslerianus Burkart

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) abundante(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** estípula(s) sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s)/oval(ais); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s)/com mais de 3 ramificação(ções). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor amarela; **estigma(s)** linear(es).

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., s.n., ICN, 114292

Lathyrus hookeri G. Don

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn.

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) abundante(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** **estípula(s)** sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** trifida(s)/com mais de 3 ramificação(ões). **Inflorescência:** **racemo(s)** mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flores 1,7-1,9 cm compr.; legumes 5,3-5,8 cm compr.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

B. Rambo, s.n., ICN, 14732

Lathyrus ibicuiensis M.L. Abruzzi de Oliveira

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) abundante(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** estípula(s) ovada(s)/lanceolada(s); **folíolo(s)** elíptico(s); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s). **Inflorescência:** racemo(s) até 6 flor(es)/mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

M.L.Abruzzi, 1798, HAS, Rio Grande do Sul, **Typus**

Lathyrus latifolius L.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição GeográficaOcorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHOS.T.S.Miotto, s.n., ICN,  (ICN00023009), Rio Grande do Sul**BIBLIOGRAFIA**

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.559.

Lathyrus linearifolius Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) ausente(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** estípula(s) semi sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** bipartido(s).

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 82, ICN

Lathyrus macropus Gillies ex Hook. & Arn.

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.349.

Lathyrus macrostachys Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) esparsa(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** **estípula(s)** sagitada(s)/lanceolada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s)/com mais de 3 ramificação(ões). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Pampa

Tipos de Vegetação

Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Miotto, S.T.S., 649, ICN

Lathyrus nervosus Lam.

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus armitageanus* Knowles & Westcott

heterotípico *Lathyrus magellanicus* D. Don

heterotípico *Lathyrus trigonus* Vogel

DESCRIÇÃO

Caulo: ramificação(ões) esparsa(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** estípula(s) sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** trifida(s)/com mais de 3 ramificação(ões). **Inflorescência:** racemo(s) até 6 flor(es)/mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Lacínia inferior do cálice maior que o comprimento do tubo calicino. Racemos com (5)6-11(13) flores.

COMENTÁRIO

Habitat predominante em ambientes secos.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 12, ICN

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Lathyrus nervosus* Lam.

Lathyrus nitens Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) ausente(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** estípula(s) semi sagitada(s); **folíolo(s)** lanceolado(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** bipartido(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folíolos com 0,1-0,7 cm de largura; flores com 1-1,5 cm compr.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 179, ICN

Lathyrus ochrus (L.) DC.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

S.T.S.Miotto, 1356, ICN, Rio Grande do Sul

Lathyrus odoratus L.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição GeográficaOcorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Alunos, s.n., ESA (ESA002274), São Paulo

L.Capellari Jr., 224, LUSC, 6072, ☒ (LUSC003543), ESA, 4988, ☒ (ESA004988), São Paulo

C.Brunus, s.n., MBM (MBM259111), Paraná

Alunos - Mischan et al., s.n., ESA (ESA002275), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.559.

Lathyrus palustris L.

Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

BIBLIOGRAFIA

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.351.

Lathyrus paraguariensis Hassl.

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) ausente(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** **estípula(s)** sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** trifida(s)/com mais de 3 ramificação(ções). **Inflorescência:** **racemo(s)** mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 90, ICN

Lathyrus paranensis Burkart

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus magellanicus* Arechav.

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) abundante(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** estípula(s) sagitada(s)/ovada(s)/lanceolada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/lanceolado(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s)/com mais de 3 ramificação(ões). **Inflorescência:** racemo(s) até 6 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas anuais. Lacínias do cálice desiguais, as duas superiores menores e com ápices convergentes. Flores (3)4-5(6).

COMENTÁRIO

Habitat em ambientes alagadiços.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Minas Gerais)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Waechter, J.L., 1912, ICN

Lathyrus parodii Burkart

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ões) abundante(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** **estípula(s)** sagitada(s)/lanceolada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/linear(es); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s)/com mais de 3 ramificação(ões). **Inflorescência:** **racemo(s)** até 6 flor(es)/mais de 8 flor(es). **Flor:** **cor** de azulada à roxa; **estigma(s)** linear(es).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Plantas perenes. Lacínias do cálice desiguais, as duas superiores menores e com ápices convergentes. Flores 6-14, 1,4-1,5 cm compr.; legumes 3,2-3,9 cm compr.

COMENTÁRIO

Habitat em ambientes alagadiços.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 165, ICN

Lathyrus pratensis L.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

T.S.M.Grandi, s.n., BHCB, 5400, Minas Gerais

Lathyrus pubescens Hook. & Arn.

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus petiolaris* Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) abundante(s); **ramo(s)** alado(s). **Folha:** estípula(s) semi sagitada(s); **folíolo(s)** elíptico(s)/ lanceolado(s); **venação** proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s)/trífida(s)/com mais de 3 ramificação(ções). **Inflorescência:** racemo(s) mais de 8 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** bipartido(s).

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 146, ICN

Lathyrus pusillus Elliott

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus montevidensis* Vogel

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

J.Eugenio Leite, 253, SP, 46569, 📍 (SP027179), Rio Grande do Sul
N.R.Bastos, s.n., PACA, 109690, Santa Catarina

Lathyrus sativus L.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição GeográficaOcorrências confirmadas

Sudeste (São Paulo)


Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

Possíveis ocorrências

Sul (Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

V.L.Guerini, 11, HCF (HCF000015613), Paraná

J.M.Souza, s.n., ICN,  (ICN00023303), Rio Grande do Sul

E.Kok, 125, SP, 45343,  (SP027176), São Paulo

BIBLIOGRAFIA

Van Wyk, B.E. Food plants of the world: an illustrated guide. Timber Press, Inc., Portland, USA, 2005. 480p. (p.224).

Lathyrus subulatus Lam.

Tem como sinônimo

heterotípico *Lathyrus debilis* Vogel

DESCRIÇÃO

Caule: ramificação(ções) abundante(s); **ramo(s)** sem ala(s). **Folha:** estípula(s) semi sagitada(s); **folíolo(s)** subulado(s); **venação** não proeminente(s); **gavinha(s)** setácea(s). **Inflorescência:** racemo(s) até 6 flor(es). **Flor:** cor de azulada à roxa; **estigma(s)** bipartido(s).

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Neubert, E.E., 05, ICN

Lathyrus sylvestris L.

Tem como sinônimo

homotípico *Lathyrus sylvestris* L.

Forma de Vida

Erva, Liana/volúvel/trepadeira, Subarbusto



Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

A Puttemans, s.n., SP, 19078, RBR, 17816,  (RBR00017816), São Paulo
S.T.S.Miotto, STS, 1361, ICN, 096565,  (ICN00023353), Rio Grande do Sul

BIBLIOGRAFIA

Corrêa, M.P. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura Imprensa Oficial/Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 1926-1931. 1984. v.2. p.225-227.

Lathyrus tingitanus L.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Cultivada, não é endêmica do Brasil

MATERIAL TESTEMUNHO

I.L.Barreto, s.n., BLA, 17520,  (BLA017520), Rio Grande do Sul