



# Istologia e anatomia vegetale





# FUSTO NELLE MONOCOTILEDONI


Casi particolari:

- il CULMO delle Graminaceae (Poaceae) et al.
- lo STIPITE delle Palme





# il CULMO delle Graminaceae (Poaceae) et al.





Foglie di monocotiledoni: si notino le nervature parallele









**Nodi:** fusto pieno

**Meristemi intercalari**  
(residui): gruppi di cellule meristematiche che derivano dal meristema apicale, generalmente poco numerose, che mantengono la capacità di dividersi e sono localizzati tra i tessuti definitivi dell'organismo.

Determinano la crescita internodale (in altezza) del culmo delle Poacee






# Poaceae di grandi dimensioni: i bambù

I **bambù** sono piante sempreverdi, originarie delle regioni tropicali e sub-tropicali, per lo più dell'Estremo Oriente (Cina e Giappone), che crescono spontanee anche in Africa, Oceania e America. Appartengono alla famiglia delle Poaceae (Graminaceae), con più di 75 generi e oltre 1200 specie. Molte specie raggiungono la maturità dopo 5 anni, e molte sono monocarpiche.






Sono tra le piante con il ritmo di crescita più rapido al mondo: sino a 120 cm nell'arco di 24 ore.




Alcune specie giganti possono arrivare sino a 15-20 metri; la più alta di tutte, *Dendrocalamus giganteus*, può raggiungere i 40 metri in altezza, con un diametro medio di 30 cm alla base del culmo (il fusto cavo).



# MONOCOTILEDONI PSEUDO- ARBOREE



## Disposizione dei fasci conduttori: **atactostele**



Disposizione dei fasci conduttori nelle Monocotiledoni. **A**, sezione all'altezza di un internodo nel mais; fasci conduttori L distribuiti in tutta la sezione, i più grossi verso il centro, i più piccoli perifericamente, polo xilematico orientato sempre verso l'interno; P parenchima fondamentale, SK sclerenchima ipodermico. **B**, sezione longitudinale del caule; a-e basi fogliari successive; la sezione è fatta in maniera da attraversare le parti mediane delle foglie 1-3 (filotassi disticali) (A da Rothert e Rostafinski; B, da H. Schenck).






Alcune palme raggiungono altezze considerevoli, con «fusti» (detti «stipiti») alti anche 50 metri.

Ciò avviene senza accrescimento secondario in spessore, grazie ad un accrescimento diametrico di tipo primario, che porta ad una dilatazione importante della zona posta immediatamente sotto il meristema apicale.


Tale crescita può determinare la formazione di un apice depresso di forma discoidale, del diametro di diversi decimetri, pari cioè al diametro dello «stipite» che si manterrà tale negli anni, indifferente al passare degli anni. Non c'è accrescimento secondario in spessore, tanto più che in genere non ci sono ramificazioni laterali.







I primi stadi dello sviluppo di una palma. Inizialmente il fusto cresce fortemente in spessore, ma pochissimo in lunghezza. L'aumento di spessore si verifica dal basso verso l'alto: l'opposto di quello che accade nelle altre piante. A un certo punto il fusto comincia a crescere fortemente in lunghezza, ma non aumenta più di spessore.









## ANATOMIA DELLA RADICE







- 1) assorbimento di acqua e soluti;
- 2) ancoraggio;
- 3) accumulo di sostanze di riserva (tra cui la stessa acqua);
- 4) laboratorio chimico.



## ALLORRIZICO, fittonante


## OMORRIZICO, fascicolato





# Apice radicale



**statoliti:** cellule con grossi granuli di amido lungo asse longitudinale della cuffia (percezione gravità)










Posizione della cellula iniziale nell'apice della radice delle pteridofite.

Nella maggior parte delle pteridofite l'apice meristemato sia del fusto che della radice possiede un'unica cellula iniziale di forma approssimativamente tetraedrica. Nel fusto la cellula apicale si divide secondo piani paralleli alle tre facce rivolte verso l'interno dell'organo, nella radice secondo piani paralleli a tutte e quattro le facce. Le cellule derivate dalle divisioni secondo piani paralleli alla faccia distale (rivolte verso il basso) danno origine alla cuffia.






I quattro piani di divisione dell'iniziale apicale.






# Struttura primaria della radice







resti della  
rizodermide



esoderma





La zona corticale è composta da tessuto parenchimatico, con ampi spazi intercellulari, in genere abbondanti sostanze di riserva accumulate in amilo-, proteo- o cromoplasti, e vacuolo sviluppato (soprattutto nelle radici che servono per accumulare acqua)








Il cilindro centrale è delimitato dall'endodermide (zona corticale)

- tessuti di trasporto: fascio radiale
- parenchima (in posizione periferica): periciclo







Sezione trasversale radice di Monocotiledone (struttura primaria)

Le cellule dell'endodermide presentano ispessimento delle pareti radiali e tangenziali interne (ispessimenti a U)

Numerose arche xilematiche e floematiche.





# Radici laterali



**Figura 11.1**

Seme germinante di fava (*Vicia faba*) con una evidente radice principale e numerose radici laterali (osservazione di S. Mazzuca).






Le radici laterali si formano nella zona di struttura primaria grazie alla proliferazione del periciclo






arca xilematica






## Struttura secondaria della radice


Accrescimento secondario in spessore della radice:  
solo gimnosperme e angiosperme dicotiledoni




1. Struttura primaria: fascio radiale (actinostelico) aperto



2. Si forma un anello cambiale continuo di forma irregolare, sinuosa




3.





Situazione più avanzata.


4.











**125** Radice di abete rosso (*Pinus excelsa* Lam.) Link. (am. Pinaceae).  
 Sezione trasversale, x 100 (155)





# METAMORFOSI DELLA RADICE


(RISERVA)

FOTOSINTESI

SCAMBI GASSOSI




La zona corticale è composta da tessuto parenchimatico, con ampi spazi intercellulari, in genere abbondanti sostanze di riserva accumulate in amilo-, proteo- o cromoplasti, e vacuolo sviluppato (soprattutto nelle radici che servono per accumulare acqua).







A differenza di un tubero (modificazione del fusto), la **radice tuberiforme** non può generare una nuova pianta perché non ha gemme.





radice a fittone ingrossata  
per funzione di riserva  
(radice tuberizzata o  
tuberiforme)






Radici particolari per la  
conservazione  
dell'acqua: il **VELAMEN**  
delle orchidee epifite






Radici aeree avventizie






Orchids9.Blogspot.com

Sono composte da tessuto tegumentale permeabile pluristratificato formato da cellule morte, che funziona come una spugna. Sono in grado di assorbire l'acqua depositata dalle piogge o dalla rugiada.



# Radici particolari... per non soffocare...




**M**olte piante legnose che vivono in paludi o in zone intertidali mostrano modifiche della parte del sistema radicale che sporge sopra il livello dell'acqua o rimane esposta durante la bassa marea. Tali radici posseggono una costituzione anatomica specializzata e vengono in genere descritte come pneumatofori ("portatori di aria") o più precisamente come pneumatottrize. Esse assumono una grande varietà di forme e si sviluppano in modi diversi. Sono ben dotate di lenticelle e di spazi areiferi interni che sono in continuità con quelli delle parti sommerse e permettono così gli scambi gassosi di queste ultime.



- Superficie con numerose lenticelle
- Parenchima corticale: aerenchima







I pneumatofori si presentano sotto forma di radici a trampolo o tabulari (101). Si sviluppano anche come rami laterali che crescono verticalmente verso l'alto, a partire da radici superficiali ad andamento orizzontale (radici a piolo, 104), e che possono, o meno, ispessirsi (105a). In alcuni casi tali radici a piolo sono sorrette da radici a trampolo.

In alternativa una radice superficiale ad andamento orizzontale forma un'ansa verso l'alto che si porta sopra il livello dell'acqua per poi ripiegarsi nuovamente verso il basso.

