

- Senecio Balsamitae* Muhl. Weert (Kl.).
Picris echioides var. *humifusa* Th. Rotterdam (N. K. A. 1919 p. 102. Kl.).
 „ *hieracioides* fl. *pallid.* Ambij (de W.).
Hypochoeris radicata fl. *pallid.* Nuth (de W.).
Hieracium Bauhini Besser. Aangevoerd. Hoensbroek (de W.).

H. HEUKELS.

Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1920.

- Equisetum maximum* var. *conforme* Wirtg. Geulle (Kl. en W.).
Cystopteris fragilis f. *anthriscifolia*. Raren. en f. *cynapiifolia*. Epen (N. K. A. 1919 p. 327. Pinksterexc. 1919).
Polygonatum verticillatum. Kerperbosch (N. K. A. 1919 p. 330. Pinksterexc. 1919).
Juncus Tenageia var. *filiiformis*. Weende (Un. 1920), Vlagtwedde (J. D. Dorgelo).
Potamogeton gramineus graminifolius f. *lacustris*. Oisterwijk (J. Heimans).
 „ *pectinatus* f. *zosteraceus*. Goes (Kl.).
Najas marina. Weurt in de Waal (Ke. en R.).
Carex glauca var. *silvatica*. Dordrecht (Kl.).
Cyperus vegetus. Merwedekanaal bij Utrecht (St.).
Panicum lineare var. *prostratum*. Nijmegen (Ke. en R.).
 „ *capillare*. Weert (Kl.).
Phalaris brachystachys. Rotterdam (N. K. A. 1919 p. 77. Kl.).
 „ *paradoxa* var. *praemorsa*. Rotterdam (N. K. A. 1919 p. 77. Kl.).
 „ *angusta*. Deventer, West-Knollendam, Weert (Kl.).
Mibora minima. Kweekerij Groenekanschedijk Utrecht (J. E. W. Ihle).
Koeleria gracilis f. *subpubiculmis* en f. *pubiculmis*. Kunrade. (N. K. A. 1919 p. 327, 328. Pinksterexc. 1919).
Aira flexuosa var. *Legei*. Epen (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
 „ „ var. *montana*. Eperheide-Slenaken (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
Avena fatua var. *pilosissima* en var. *intermedia*. Kunrade (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
Avena pubescens var. *flavescens*. Raren (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
 „ *sterilis macrocarpa* f. *scabriuscula*. West Knollendam (Kl.).
Trisetum flavescens var. *glabratum*. Epen (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
Dactylis Aschersoniana. Bolnes (Kl. en Z. J. de Lange).
 „ *glomerata* var. *pendula* en var. *flavescens*. Wolfshaag (N. K. A. 1919 p. 328, 329. Pinksterexc. 1919).
Poa nemoralis f. *agrostoides*. Valkenburg (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
 „ *Chaixii*. Bolnes (Kl. en Z. J. de Lange).
Glyceria plicata var. *aristulata*. Vijlerbosch (N. K. A. 1919 p. 328. Pinksterexc. 1919).
Festuca rubra s. sp. *commutata* var. *subcaespitosa*. Bolnes (Kl. en Z. J. de Lange).
 „ „ var. *nemoralis*. Slenaken, Gronsveld (N. K. A. 1919 p. 329. Pinksterexc. 1919).
Brachypodium pinnatum m. *bracteatum*. Valkenburg, Kunrade (N. K. A. 1919 p. 329. Pinksterexc. 1919).
Bromus secalinus var. *vulgaris* f. *velutina*. Kunrade (N. K. A. 1919 p. 329. Pinksterexc. 1919).
Bromus villosus var. *maximus*. Rotterdam (N. K. A. 1919 p. 77. Kl.).
Triticum spelta. Kunrade (N. K. A. 1919 p. 329. Pinksterexc. 1919).
Lolium remotum en m. *compositum*. Zwijndrecht (Kl.).
Orchis morio albiflora. Goes (Kl.).

- Orchis latifolius* × *maculatus*. Cotessen (Si.), Wijnandsrade, Hoensbroek, Epen (de W.).
 „ *incarnatus* × *latifolius*. Overal in Z. Limb. tusschen de stamouders (de W.).
 „ *incarnatus* × *maculatus*. Brunssum (de W.).
 „ *maculatus* var. *helodes*. Brunssum (de W.).
 „ *latifolius albiflorus*. Bunde (P. Brouns).
 „ *incarnatus albiflorus*. Klimmen (de W.).
Coeloglossum viride. Petten (Si.).
Epipactis palustris var. *purpurea*. Bergen aan Zee (Si.).
 „ *latifolia* var. *purpurea*. Gulpen, Eis-Wittem (de W.).
Rumex Schreberi (R. Hydrolapathum × obtusifolius). Naarden (Da.).
 „ *Steinii* (R. obtusifolius × palustris). Sneek (Da.).
 „ *abortivus* (R. obtusifolius × conglomeratus). Franeker (Da.).
 „ *Schulzei* (R. crispus × conglomeratus). St. Jacobi parochie (Da.), Kapelle (Z. Bev.) (M. L. Eversdijk), Tjummarum (E. Bouma).
 „ *odontocarpus*. Aangevoerd. Sittard (de W.).
 „ *pulcher*. Aangevoerd. Sittard (de W.).
 „ *Sagorski* (R. crispus × sanguineus) Kapelle (Z. Bev.) (M. L. Eversdijk).
Polygonum orientale. Fort Ruigenhoek Utrecht (St.).
 „ *cuspidatum*. Verwilderd. Ubbergen (Ke. en R.).
Chenopodium capitatum. Neethof te Velsen (Dames C. en L. van Baars).
 „ *Botrys*. Aangevoerd. Sittard (de W.).
 „ *multifidum*. Rotterdam (Kl.).
 „ *leptophyllum*. Weert, West Knollendam (Kl.).
 „ *Berlandieri*. Aangevoerd. Hulsberg (de W.).
 „ *hircinum* var. *subtrilobum*. Rotterdam (Kl.).
 „ *album* var. *glomerulosum*. Sittard, Maastricht (de W.).
 „ „ var. *pseudopulifolium*. Hulsberg (de W.).
Monolepis trifida. Rotterdam (Kl.).
Corispermum hyssopifolium var. *leptopterum*. Weurtsche en Ooische waard, Lent (Ke. en R.)
Atriplex hortense. Deventer (Kl.).
Amarantus hybridus pseudoretroflexus. Rotterdam (Kl.).
 „ *gracilis* (?). Rotterdam (Kl.).
Sagina subulata. Borger (Dr.) (St.).
Silene antirrhina. Deventer (Kl.).
Glaucium corniculatum. Paaschberg bij Terborg bij een molen (Mej. J. Heering).
Corydalis solida fl. alb. Overbunde (P. Brouns).
Fumaria capreolata. Hoorn (A. Richel), Soestdijk (St.).
Nasturtium amphibium met doorgroeide bloemen. Amsterdam (L. Dorsman Czn.).
Brassica Rapa var. *silvestris* f. *campestris*. Weert (Kl.).
Sinapis Cheiranthus. Winterswijk bij een molen (J. Koornneef).
Lepidium latifolium bij een havenpier te Elburg (H. A. F. Borgman).
 „ *graminifolium*. Ooische Waard, Weert (Ke. en R.).
 „ *bonariense*. West Knollendam, Deventer (Kl.).
 „ *densiflorum typicum microcarpum*. West Knollendam (Kl.).
Impatiens parviflora. Vleuten (St.), Bussum (Si.).
Althaea hirsuta. Vogelenzang (Si.), Schiedam (E. G. Dorgelo).
Geranium nodosum. Bolnes (Kl. en Z. J. de Lange).
Euphorbia rythisperma. Rotterdam (Kl. en W.).
Helosciadium leptophyllum. Weert (Kl.), Rotterdam (Kl. en W.).
Ammi Visnaga. West Knollendam (Kl.).
Pimpinella Saxifraga var. *laciniata*. Westduinen bij den Haag (J. L. van Soest).

- Coriandrum sativum*. Weurtsche waard (Ke. en R.).
Oenothera laciniata en de var. *integrifolia*. Weert (Kl.).
 „ *argentinae*. Weert, Rotterdam, West Knollendam, Deventer (Kl.).
Lythrum hyssopifolia. Weert (Kl.).
Amelanchier vulgaris. Meersen (J. Paguier).
Rubus inseraticus. Ravensbosch (de W.).
 „ *saltuum*. Geulhem (de W.).
Potentilla procumbens × *Tormentilla*. Malden (J. J.), Heerenveen (Kl.).
 „ *procumbens* × *reptans*. Malden (J. J.), Heerenveen (Kl.).
 „ *fragariastrum*. Heumen-Mook (J. J.), Heumen, Berg en Dal (Ke. en K.).
Prunus serotina. Colmonderbosch (Z. Limb.) (Kl.).
Medicago murex var. *aculeata*. Rotterdam (N. K. A. 1919 p. 77. Kl.).
Trifolium vesiculosum. Deventer (Kl.).
 „ *pratense* var. *pedunculatum* Ser. (?) Groningen (A. F. M. Reijnders).
 „ *resupinatum*. Sittard (Kl.).
 „ *hybridum* m. *fasciata*. Sittard (Kl.).
 „ *incarnatum* fl. *alb.* en fl. *ros.* Houthem (Mej. C. Cool).
 „ *parviflorum*. Sittard (Kl. en W.).
Astragalus Onobrychis. Wormerveer (Kl.).
Vicia sepium f. *ericalyx*. Zuid Limburg algemeen (N. K. A. 1919 p. 332. Pinksterexc. 1919).
Vicia tenuifolia. Aangevoerd. Schinnen (de W.).
Lathyrus silvester. Bloemendaal (Duinlustpark) (H. Heukels).
Erica cinerea. Maldense heide (J. J.).
Rhododendron ponticum. Verwilderd. Oranjewoud bij Heerenveen (W. G. Kloos).
Cuscuta Epithymum fl. *alb.* Sellingen (Un. 1920).
Anagallis arvensis var. *verticillata* en met vergroende bloemen. Sittard (Kl.).
Amsinckia lycopsidioides. Vogelenzang (Si.).
Solanum triflorum. Rotterdam (Kl.).
Nicotiana rustica. Weurtsche en Ooische waard (Ke. en R.).
Verbascum blattarioides. Vogelenzang (Si.).
Scrophularia Scopoli. Deventer (Kl.).
Linaria vulgaris albiflora. Bunde, m. *peloria*. Bunde, Sittard, *tricalcarata*. Sittard (alle de W.).
 „ *striata*. Denekamp (v. d. Kamp).
Veronica officinalis fl. *ros.* Beekhuizen (J. L. van Soest).
Lamium maculatum fl. *alb.* Hees, Weert, Winsen, Overasselt. fl. *ros.* Beuningen, Overasselt (J. J.).
Satureja hortensis. Weurtsche waard (Ke. en R.).
Galeopsis Ladanum angustifolia albiflora. Weert (Kl.).
 „ *Ladanum* × *ochroleuca*. Weert (Kl.).
Stachys annuus. Utrecht (St.).
Brunella vulgaris fl. *ros.* Roswinkel (Un. 1920).
Ajuga reptans fl. *alb.* Onderste bosch. fl. *carneis*. Savelsche bosch (N. K. A. 1919 p. 332. Pinksterexc. 1919).
Plantago Purshii. Deventer (Kl.).
Campanula persicifolia dasycarpa. Z. Limburg vrij veel (Kl.).
Knautia arvensis fl. *alb.* Schimmert, Caberg, Hulsberg (de W.).
Succisa pratensis var. *pinnatifida*. Ter Apel-Roswinkel (Un. 1920).
Aster Tripolium discoides. Rokanje (Z. J. de Lange).
Callistephus chinensis. Bergen (N. H.) verw. (Kl.).
Ambrosia trifida. Bergen (N. H.) (Kl.).

- Galinsoga parviflora*. Bussum (Si.), Ooische waard, Weurt (Ke. en R.), Soest (1917, J. Koornneef), Soestdijk (St.), den Dolder (J. D. Dorgelo).
Hemizonia pungens. Weert (N. K. A. 1919 p. 99. Ver Straeten).
Calliopsis tinctoria. Weert (Kl.).
Matricaria discoidea. Utrecht, den Haag (St.).
Chrysanthemum Leucanthemum var. discoideum. Vaals (H. Kemp).
 „ *macrophyllum*. Verwilderd. Hulsberg, Wijnandsrade, Kerkrade (de W.).
 „ *vulgare* met petroleumgeur. Spanbeek (de W.).
Lappa minor fl. alb. Ter Apel (Un. 1920).
Centaurea Scabiosa albiflora. Eis-Wittem (de W.).
 „ *mehitensis var. Apula*. Deventer (Kl.).
Lactuca saligna. Ooische waard, Weurt (Ke. en R.).
 „ *Scariola*. Weurtsche waard en ruigte aan den Weurtschen weg (Ke. en R.), Nijmegen (Ooi) (F. W. Went).
Sonchus arvensis uliginosus. Bergen-Egmond (Kl.) (in de zeeduinen algemeen).
Crepis setosa. Deventer (Kl.).
 „ *taraxacifolia*. Zwijndrecht (Kl.).
Hieracium aurantiacum. Aan spoorbaan Leeuwarden-Tjietjerk (A. S. C. Schweers).
 H. HEUKELS.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Raadselachtige Ringer. — Gedurende de laatste maanden werden door mij vele kleine zangvogels gevangen en na geringd te zijn, direct in vrijheid gesteld. (Ringproeven voor 's Rijks Museum te Leiden).

Onder deze vogels waren verscheidene koolmeezen en daaronder bevonden zich exemplaren reeds voorzien van een nummer (o. a. No. 3—6—11—17—23) zonder verdere aanduiding van herkomst.

De constructie en het aanleggen der ringen lieten meerendeels te wenschen over, en het ware zaak om den onbekenden ringer daar opmerkzaam op te maken.

Reden, waarom ik hierbij uwe tusschenkomst inroep om bijv. in de „vragenrubriek” de onbekende ringer in de gelegenheid te stellen zich bij U bekend te maken, opdat hij bovendien daardoor in de gelegenheid komt, om de tijdelijke verblijfplaats van zijn geringde exemplaren te weten te komen. Dat zal hem, dunkt mij, toch boven alles interesseren.

's-Gravenhage, 257 Bezuidenhout.

W. A. M. JANSSEN.

Merelonderzoek in 1921. — Op dezelfde wijze als in '20 vraagt ondergetekende ook in '21 medewerking voor bovengenoemd onderzoek. De grens voor de huis-merels wordt echter tot 70 M. (= 100 pas) van onze woningen uitgezet.

Bovendien vraagt hij — ter vergelijking — opgaven omtrent dezelfde verschijnselen bij Zanglijster en Vink. Ook deze dus te onderscheiden in bewoners van buiten- en huisdomicilies.

Van belang schijnt nu vooral het aantal eieren van het *volle* legsel.

Het opzenden van dode vogels met opgave van hun vermoedelijk domicilie is aan te bevelen. Bovendien opgave van mogelijke kleurafwijkingen.

G. NOLDA.

Dit onderzoek wordt met dat van den heer TOLLENAAR gecombineerd. Opzending van waarnemingen kan aan beide adressen geschieden. Aldaar zijn ook nadere inlichtingen te verkrijgen