

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**

Resolución de 27 de enero de 2017 (B.O.A. número 30, de 14 de febrero de 2017)

**CATEGORÍA:**

**ENFERMERO/A**

**EJERCICIO:**

**MODELO A**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.
- En el Modelo de Ejercicio A: Para el caso de anulación de alguna de las preguntas, el orden de sustitución por las preguntas de reserva será de la 101 a la 110 (101, 102, 103...).
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- **IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna, estarán exentos de contestar a las preguntas número 1 a 16 inclusive.**
- El tiempo de realización de este ejercicio es de: **2:00 HORAS** para el turno **LIBRE** y **1:45 HORAS** para **PROMOCIÓN INTERNA**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE EXAMEN" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**
- **ES IMPRESCINDIBLE QUE EN LA "HOJA DE EXAMEN" INDIQUE EL MODELO DE EJERCICIO QUE LE HA CORRESPONDIDO (A). SU INCUMPLIMIENTO SERÁ MOTIVO DE ANULACIÓN DEL EXAMEN.**
- **TODOS LOS MÓVILES DEBERÁN ESTAR APAGADOS. SU INCUMPLIMIENTO SERÁ MOTIVO DE EXPULSIÓN.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL





- 1.- Una persona que resida en la comarca de La Litera y precise acudir a la consulta de Medicina Interna ¿cuál será su hospital de referencia?
- Hospital San Jorge de Huesca.
  - Hospital Obispo Polanco de Teruel.
  - Hospital Royo Villanova de Zaragoza.
  - Hospital de Barbastro.
- 2.- Según se establece en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se expedirá un nombramiento de sustitución:
- Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.
  - Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
  - Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los periodos de vacaciones.
  - Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios.
- 3.- De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el responsable del tratamiento de los datos tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de:
- Un mes.
  - 10 días.
  - 15 días.
  - 20 días.
- 4.- El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece que la Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social es una competencia:
- Exclusiva.
  - Ejecutiva.
  - Compartida.
  - Básica.
- 5.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el contenido mínimo de la historia clínica NO incluye:
- La hoja de interconsulta.
  - La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.
  - El informe social.
  - La aplicación terapéutica de enfermería.
- 6.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, NO tiene la consideración de profesión sanitaria:
- Óptica y Optometría.
  - Terapia Ocupacional.
  - Trabajo social.
  - Logopedia.



- 7.- Según la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, los Servicios Sanitarios garantizan una prestación integral y coordinada, y se ordenarán según el contenido funcional que lleven a cabo, en las estructuras operativas siguientes, EXCEPTO:
- Salud Pública.
  - Atención Primaria.
  - Atención Especializada.
  - Atención a la demanda.
- 8.- Indique la respuesta correcta en relación con la economía aragonesa:
- El porcentaje de parados superó el 20% a finales de 2017.
  - El índice de paro en Aragón es mayor que la media española.
  - La fabricación de automóviles es el principal producto de la industria aragonesa.
  - El Producto Interior Bruto per cápita en Aragón es menor que la media española.
- 9.- Según la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, los profesionales sanitarios se consideran autoridad pública en las siguientes situaciones, EXCEPTO:
- En el desempeño de las funciones que tengan asignadas.
  - En el desempeño profesional inherente al ejercicio de su función.
  - En el desempeño profesional inherente al ejercicio de su responsabilidad.
  - En el desempeño profesional fuera del ámbito sanitario no ejerciendo sus funciones.
- 10.- De conformidad con La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto será retribuido mediante:
- Complemento de destino.
  - Complemento de productividad.
  - Complemento específico.
  - Complemento de atención continuada.
- 11.- ¿Cuál de los siguientes centros de trabajo NO se encuentra asignado a la Unidad Básica de Prevención Sector Zaragoza I?
- Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia.
  - Centro Médico de Especialidades "Grande Covian".
  - Centro de Salud de Luna.
  - Centro de Salud de Mequinzenza.
- 12.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál de las siguientes prestaciones NO corresponde a Atención Primaria?
- La asistencia sanitaria a demanda, urgente y programada.
  - Prescripción y realización de técnicas y procedimientos diagnósticos.
  - Las actividades en prevención, promoción de la salud, atención familiar y comunitaria.
  - La asistencia especializada en hospital de día, médico-quirúrgica.



**13.- De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes principios NO forma parte del Código de Conducta de los empleados públicos?:**

- a) Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
- b) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
- c) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
- d) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

**14.- Dentro de la atención sanitaria especializada comprendida en el artículo 7 del Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del sistema de Salud de Aragón, NO se halla incluida:**

- a) La atención paliativa a enfermos terminales.
- b) La atención a la salud mental, en régimen ambulatorio, de internamiento y domiciliario.
- c) La atención a la salud bucodental en adultos.
- d) La asistencia y cuidados de rehabilitación.

**15.- En la vigente Constitución Española, el reconocimiento del derecho a la protección de la salud, viene recogido:**

- a) En el Título I, Capítulo Primero.
- b) En el Título I, Capítulo Segundo.
- c) En el Título I, Capítulo Tercero.
- d) En el Título I, Capítulo Cuarto.

**16.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo:**

- a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
- c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
- d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso.

**17.- ¿Cuál es la definición de historia clínica?:**

- a) Conjunto de datos sanitarios.
- b) Conjunto de datos básicos relacionados con la salud del paciente.
- c) Conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
- d) Conjunto de informes clínicos y continuidad de cuidados de un paciente a lo largo del proceso asistencial.



- 18.- Según los datos que presenta el estudio de la Unión Europea, sobre el perfil sanitario de España 2017, los factores de riesgo por comportamiento, son determinantes importantes para la salud en España. Señale la respuesta correcta:
- No hay un impacto positivo de las políticas de control del tabaco entre los jóvenes de 15 años.
  - El consumo excesivo de alcohol es relativamente más bajo entre los adultos, pero alto en adolescentes con un porcentaje cercano a la media de la Unión Europea (25%).
  - No existe diferencia sustancial en las tasas de obesidad según el nivel de educación siendo nuestras tasas de sobrepeso y obesidad más bajas que la media de la Unión Europea.
  - Las tasas de actividad física entre los adultos españoles son de las más altas de la Unión Europea.
- 19.- Dentro de la valoración del patrón de M. Gordon "Actividad Ejercicio" se está interesado en medir las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿qué escala o índice se utilizaría?
- La escala de Lawton y Brody.
  - La escala de Karnofsky.
  - El índice de Barthel.
  - El índice de Malt.
- 20.- Un niño de 5 años se considera que está obeso cuando la relación entre su peso y talla (IMC) se encuentra:
- IMC > percentil 95 para edad y sexo.
  - IMC > percentil 75 para edad y sexo.
  - IMC  $\geq$  35.
  - IMC  $\geq$  30.
- 21.- Dentro de las organizaciones sanitarias existen tres tipos de proceso en función del impacto más o menos directo sobre el usuario final:
- Estratégicos, clave y de soporte.
  - Estratégicos, asistenciales y de soporte.
  - De desarrollo, clave y de control.
  - Ninguna de las anteriores es cierta.
- 22.- Respecto a los modelos conceptuales enfermeros:
- Son modelos a escala o reproducciones específicas y concretas de algo que pueden examinarse y manipularse de forma minuciosa.
  - No representan de forma exacta los objetos de la vida real, sino que hacen sustituciones de conceptos.
  - Son representaciones exactas de objetos de la vida real.
  - Representan imágenes y patrones de pensamiento.
- 23.- Dentro de las actividades que corresponden a la intervención enfermera "Alimentación enteral por sonda" (NIC 1056), NO se incluye:
- Antes de cada alimentación intermitente, comprobar si hay residuos.
  - Observar si hay presencia de sonidos intestinales cada cuatro a ocho horas, si procede.
  - Fomentar frecuentes cambios de posición.
  - Observar si hay signos de edema o deshidratación.



- 24.- La situación donde se produce una extensión de los miembros superiores, flexión de los miembros inferiores, con respiración apnéica y miosis intensa arreactiva, se denomina:
- Obnubilación.
  - Estupor.
  - Coma.
  - Letargia.
- 25.- Indique de qué modelo de aprendizaje en educación y promoción de la salud, son característicos los factores predisponentes, facilitadores y reforzantes:
- Modelo de Gagne.
  - Modelo de etapas del cambio.
  - Modelo PRECEDE-PROCEDE.
  - Modelo de etapas.
- 26.- La presencia de pirosis durante el embarazo se asocia con todos los factores siguientes, EXCEPTO:
- Aumento de concentración de progesterona.
  - Cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono.
  - Relajación del esfínter del cardias.
  - Desplazamiento del estómago por aumento del tamaño del útero.
- 27.- Entre las manifestaciones que presentan los enfermos de Alzheimer, NO se encuentra:
- Negativismo.
  - Labilidad emocional.
  - Perseveraciones verbales.
  - Parpadeo compulsivo.
- 28.- Indique cuál de los siguientes NO es considerado un método anticonceptivo de barrera:
- Preservativo masculino.
  - Parche transdérmico.
  - Preservativo femenino.
  - Diafragma.
- 29.- Se realiza un estudio sobre una enfermedad autoinmune con una muestra aleatoria de Aragón ( $n=69$ ) y se obtiene que de 38 hombres 12 tienen la enfermedad y que de 31 mujeres 9 están enfermas. Se quiere conocer la relación entre el sexo (hombre-mujer) y dicha enfermedad autoinmune. ¿Qué prueba estadística de las siguientes se debe usar?:
- Regresión lineal.
  - t de student.
  - ANOVA.
  - $\chi^2$  (Chi cuadrado).



- 30.- En relación con los parámetros de desarrollo y crecimiento del niño sano, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) Las mediciones seriadas y su tendencia son más valiosas que un dato aislado. ✓
  - b) Deberán ser valorados por el pediatra los niños cuyo peso, estatura y perímetro craneal se encuentran fuera de los límites indicados (entre P3 y P75) para la edad y el sexo. ✓
  - c) En niños con síndrome de Down y Turner se emplearán gráficas de crecimiento específicas.
  - d) En los recién nacidos pretérmino se recomienda aplicar, en las gráficas de crecimiento, la edad corregida hasta los 2 años de edad. ✓
- 31.- Una de las complicaciones más frecuentes en la administración de quimioterapia a través de un acceso venoso central tipo reservorio (PORT-A-CATH) es la obstrucción, si esta se produce, para intentar solucionar la misma se debe:
- a) Indicar al paciente que mantenga la posición, preferentemente en decúbito supino.
  - b) Indicar al paciente que cambie de posición, si es posible acostarlo con los pies elevados y girar la cabeza.
  - c) Indicar al paciente que mantenga la posición, preferentemente en decúbito lateral.
  - d) Ninguna de las anteriores.
- 32.- ¿Cuál de las siguientes opciones podrías reconocer como parte de manifestaciones de un cuadro de abstinencia de alcohol?:
- a) Coma, desorientación y vigilancia excesiva.
  - b) Aumento de la temperatura, letargo e hipotermia.
  - c) Habla excesiva, hiperactividad y pérdida del estado de alerta.
  - d) Temblor, sudoración y elevación de la presión arterial.
- 33.- ¿Cuál de las siguientes NO es una medida promovida por la OMS para la reducción de la obesidad infantil?:
- a) Establecer un impuesto eficaz sobre las bebidas azucaradas.
  - b) Elaborar perfiles de nutrientes para identificar los alimentos y bebidas no saludables.
  - c) Poner en marcha un sistema mundial normalizado de etiquetado de nutrientes.
  - d) Incrementar el acceso a alimentos no saludables en grupos de población desfavorecidos.
- 34.- En un plan de cuidados de enfermería dirigido a la atención de las personas con "desequilibrio nutricional por defecto" (00002). ¿Cuál de las siguientes intervenciones NO priorizaría?
- a) Manejo de la nutrición.
  - b) Ayuda para ganar peso.
  - c) Manejo de los trastornos de la alimentación.
  - d) Clasificación de valores.
- 35.- ¿Cuál de estas metodologías NO corresponde a una investigación cualitativa?
- a) Metodología de la teoría fundamentada.
  - b) Metodología estadística.
  - c) Metodología fenomenológica.
  - d) Metodología etnográfica.



**36.- Ante una situación de maltrato infantil detectada que requiere la adopción de medidas urgentes de protección para el menor, ¿cuál de los siguientes factores NO se incluyen en el análisis?:**

- a) Que la salud o seguridad básicas del menor se encuentren en peligro.
- b) La gravedad e inmediatez de la situación.
- c) La determinación de maltrato infantil por la autoridad judicial con competencia en la materia.
- d) La indefensión del menor, es decir, que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o proteger al menor.

**37.- La transmisión del virus del Zika NO puede darse:**

- a) Por Transmisión digestiva.
- b) Por Transmisión vertical.
- c) Por Transmisión sexual.
- d) Por Transmisión sanguínea.

**38.- La codificación del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de un hospital, debe realizarse:**

- a) Con un protocolo "ad hoc".
- b) Exclusivamente con el informe de alta.
- c) Con la historia clínica completa, que se utiliza sistemáticamente.
- d) Pueden usarse indistintamente cualquiera de estos documentos para la codificación clínica.

**39.- Siguiendo la evolución histórica del PAE, ¿de cuántas etapas constaba según Helen Yura y Mary Walsh?**

- a) De cinco etapas: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.
- b) De cuatro etapas: Valoración, Planificación, Ejecución y Evaluación.
- c) De tres etapas: Análisis, Síntesis y Ejecución.
- d) Ninguna es correcta.

**40.- Dentro de las actividades para construir una cultura de seguridad del paciente en las organizaciones sanitarias y planteado por el Sistema Nacional de Salud, es necesario:**

- a) Crear un modelo centrado en el paciente.
- b) Desplegar la gestión de riesgos en las Unidades y Servicios.
- c) Actuar de forma reactiva.
- d) Centrarse en el Principio de las Causas Múltiples y no en el Principio de las Causas Básicas.

**41.- En cuanto a la obesidad, señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se manifiesta por un exceso de peso y volumen corporales.
- b) En las personas adultas, la OMS define el Sobrepeso como un IMC igual o superior a 30, y la Obesidad como un IMC igual o superior a 25.
- c) La obesidad se considera una enfermedad crónica, pero también un importante factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades responsables de una elevada morbilidad en la edad adulta.
- d) La obesidad no está clasificada en el DSM-IV-TR como un trastorno primariamente psiquiátrico, ya que se considera una condición médica multidimensional y con manifestaciones clínicas muy variadas que sólo en ocasiones tienen valor psicopatológico.



- 42.- En un paciente en tratamiento con hemodiálisis, ante la presencia de signos y síntomas como: dolor torácico, dolor de espalda, opresión retroesternal y disnea, aumento de la pigmentación de la piel y una coloración rojo claro o vinosa del circuito extracorpóreo, hemos de sospechar que se ha producido:
- Extravasación sanguínea.
  - Pericarditis.
  - Hemólisis.
  - Síndrome de agua dura.
- 43.- ¿Cuál de los siguientes NO es una recomendación de enfermería adecuada a un paciente con Parkinson?:
- Resaltar la importancia de un programa de ejercicios diarios (caminar, bicicleta fija, nadar, jardinería), para conservar la movilidad articular.
  - Estimular la ingestión de alimentos con un contenido moderado de fibra, pues el paciente con parkinsonismo tiene problemas graves de estreñimiento.
  - Recomendar al paciente que practique leer en voz alta frente a un espejo, exagerando los símbolos y enunciando deliberadamente.
  - Permitir expresar las ideas de forma extensa, utilizando frases largas que permitan expresar mejor sus ideas.
- 44.- En la realización de la extracción de hemocultivos:
- La sangre venosa es mejor que la arterial para la determinación de bacterias en sangre.
  - Se debe asegurar la zona de punción palpando hasta después de poner el antiséptico.
  - La tasa de contaminación de los frascos de hemocultivo disminuye si se cambia la aguja antes de introducir la sangre en los mismos.
  - Se debe evitar hablar o toser mientras se realiza la extracción. ✓
- 45.- Entre los factores de riesgo más importantes asociados al desprendimiento de retina NO se encuentra:
- Diabetes.
  - Hipermetropía.
  - Maniobras de Valsalva. ✓
  - Edad.
- 46.- En relación a las acciones llevadas a cabo por los Sistemas de Salud, en materia de Salud Pública, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?:
- La protección de la salud está basada principalmente en actuaciones dirigidas al control sanitario del medio ambiente.
  - La educación para la salud se ocupa fundamentalmente del control de alimentos para su consumo responsable. F
  - Las estrategias de prevención primaria van dirigidas a individuos enfermos para la recuperación de su nivel de salud. F
  - La prevención primordial tiene como objetivo evitar consecuencias de intervenciones innecesarias, como la sobremedicalización. F
- 47.- Las siguientes situaciones clínicas pueden dificultar o complicar el diagnóstico clínico de muerte encefálica, EXCEPTO:
- Pacientes con graves destrozos del macizo craneofacial.
  - Intolerancia al test de apnea.
  - Hipotermia (temperatura corporal inferior o igual a 32 °C).
  - Intoxicación o tratamiento previo con dosis elevadas de fármacos o sustancias estimulantes del sistema nervioso central.



- 48.- En relación con la valoración funcional de una persona anciana, NO está indicada una de las siguientes escalas:
- Test de Pfeiffer.
  - Escala de Lawton y Brody.
  - Índice de Barthel.
  - Índice de Katz.
- 49.- En el campo de la aplicación de la educación para la salud, ¿cuál NO es un modelo de intervención?
- Modelo biomédico, asistencial o tradicional.
  - Modelo preventivo o crítico.
  - Modelo comunitario.
  - Modelo intercultural.
- 50.- En el paciente con diagnóstico de EPOC, dentro de las complicaciones potenciales que se exponen, señale la INCORRECTA:
- Desnutrición secundaria a hipoxemia.
  - Mucositis relacionado con el tratamiento farmacológico.
  - Hipertermia relacionada con infección.
  - Intolerancia a la actividad.
- 51.- Referente al consentimiento informado para un procedimiento de cirugía mayor ambulatoria (CMA), este debe ser:
- Libre, consciente y voluntario.
  - Irrevocable cuando el paciente está incluido en la lista de espera.
  - Verbal al ser un proceso ambulatorio.
  - Todas son ciertas.
- 52.- Ventajas de la cirugía ambulatoria:
- No modifica la ansiedad del paciente.
  - Aumenta la estancia hospitalaria.
  - No precisa acompañamiento del paciente a lo largo del proceso.
  - Disminuye las listas de espera.
- 53.- Las limitaciones que pueden tener las técnicas de Metaanálisis por su propia metodología se conocen como:
- Sesgos de selección y publicación.
  - Sesgos de información y validación.
  - Sesgos del investigador y de respuesta.
  - Sesgos estadísticos.
- 54.- En el NOC: "Desarrollo infantil: 1 mes (0120)", NO se incluye la valoración de:
- Reflejo de Moro.
  - Reflejo de Babinski.
  - Manos frecuentemente abiertas.
  - Los ojos siguen la línea media.
- 55.- Según el Programa de Atención a Pacientes Crónicos Dependientes de Aragón NO es cierto qué:
- Para la valoración de las actividades básicas de la vida diaria, recomienda el Índice de Barthel.
  - Para valorar la sobrecarga del cuidador recomienda utilizar el test de Lobo.
  - Para la valoración cognitiva recomienda utilizar test breves como el test de Pfeiffer.
  - Para la valoración de la situación psicosocial recomienda utilizar el cuestionario de Barber.



56.- En la valoración integral del paciente con deterioro y tratamiento de la integridad cutánea, señale la respuesta FALSA:

- a) Se deben utilizar escalas validadas como la escala EMINA, BRADEN o NORTON.
- b) Se deben utilizar ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) sólo en las zonas de riesgo de úlcera por presión (UPP).
- c) Se deben ofrecer suplementos nutricionales con complejos ricos en proteínas en personas en riesgo de déficit nutricional y riesgo de úlcera por presión (UPP).
- d) Se deben realizar masajes en las prominencias óseas.

57.- De todas las etapas del PAE, ¿con cuál guarda una relación más estrecha la etapa de evaluación?

- a) Ejecución.
- b) Planificación.
- c) Diagnóstico.
- d) Valoración.

58.- En el cribado de Cáncer de cérvix es cierto que:

- a) El inicio del cribado es a los 20 años.
- b) El final del cribado debe de ser a los 80 años.
- c) Entre los 25 y 30 años debe de hacerse citología cervico-vaginal cada 3 años.
- d) Entre los 25 y 30 años debe de hacerse citología cervico-vaginal cada 1 año.

59.- Entre las contraindicaciones clásicas de la nutrición enteral NO se encuentra:

- a) Hiperemesis persistente no controlada farmacológicamente.
- b) Trastornos neuromotores que impiden la deglución o el tránsito.
- c) Obstrucción intestinal.
- d) Pancreatitis.

60.- Para la elaboración de un programa de educación sanitaria, es necesario:

- a) Establecer prioridades sin definir plazos.
- b) Que exista un equipo de responsables para el seguimiento del programa educativo.
- c) Que en la enseñanza de técnicas, es suficiente con realizar una única demostración práctica.
- d) Que las actividades educativas se realicen siempre en grupo.

61.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades se puede prevenir con una vacuna de virus atenuados?

- a) Rubeola.
- b) Tos Ferina.
- c) Encefalitis japonesa.
- d) Hepatitis B.

62.- La puntuación del Test de Apgar es una prueba rápida de evaluación de la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, en el primer minuto, ¿qué valor se consideraría normal?

- a) Cinco.
- b) Ocho.
- c) Cuatro.
- d) Doce.



**63.- La escala de Glasgow para la valoración del nivel de conciencia incluye:**

- a) Valoración de las pupilas y respuesta motora.
- b) Valoración del dolor y respuesta verbal.
- c) Valoración de los pares craneales.
- d) Valoración de la apertura del ojo, respuesta motora y respuesta verbal.

**64.- El mercado sanitario tiene una característica que le diferencia del resto de mercados:**

- a) La incertidumbre entre la oferta y la demanda.
- b) La dificultad en la toma de decisiones.
- c) El número de clientes.
- d) La creciente oferta de servicios.

**65.- Si se valora a un paciente que se encuentra en atención domiciliaria mediante el índice de Katz, se evalúa:**

- a) Su riesgo de úlceras por presión.
- b) Su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria básica.
- c) Su capacidad cognitiva.
- d) Su grado de depresión.

**66.- Con el objetivo de diseñar un modelo de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales en el ámbito del Sistema Nacional de Salud se llevó a cabo el:**

- a) Proyecto SENECA.
- b) Proyecto EURIPIDES.
- c) Proyecto GALENO.
- d) Proyecto APOLO.

**67.- ¿Cómo está estructurada la clasificación de los diagnósticos en la Taxonomía II de NANDA Internacional?:**

- a) Dominios, clases y diagnósticos.
- b) Campos, clases y diagnósticos.
- c) Diagnósticos, dominios y campos.
- d) Dominios, campos y clases.

**68.- Tras la inserción de un catéter periférico, la Guía de práctica clínica sobre terapia intravenosa con dispositivos no permanentes en adultos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aconseja con una recomendación fuerte, cubrir el catéter con:**

- a) Apósito de gasa estéril.
- b) Apósito de membrana semitransparente.
- c) Venda de gasa estéril.
- d) Apósito con clorhexidina.

**69.- Dentro de la Taxonomía NANDA-I en la clase "Confort físico", ¿qué sería el Discomfort?.**

- a) NIC.
- b) NOC.
- c) Diagnóstico de Enfermería.
- d) Ninguna de las anteriores.



- 70.- Con respecto al proceso de esterilización de material NO es cierto:**
- La esterilización húmeda es la exposición a vapor saturado con agua a 121°C durante 30 minutos, o a 134°C 13 minutos en autoclave.
  - La esterilización en seco se considera a menudo más fiable que el proceso húmedo, particularmente para los dispositivos médicos huecos.
  - El formaldehído para esterilización se ha retirado del mercado paulatinamente en muchos países por razones de seguridad y por preocupación por la emisión de gas con efectos de invernadero.
  - La prueba de Bowie-Dick debe registrarse en todos los procesos de esterilización.
- 71.- El modelo de atención domiciliaria en el cual determinados profesionales del Equipo de Atención Primaria se encargan de toda la atención domiciliaria, se denomina:**
- Modelo sectorizado.
  - Modelo dispensarizado.
  - Modelo integrado.
  - Modelo emergente.
- 72.- En el Servicio Aragonés de Salud, las revisiones del niño sano en Atención Primaria se estratifican en los siguientes grupos etarios:**
- 0-36 meses, 4-9 años y 10-14 años.
  - 0-36 meses, 4-6 años y 7-14 años.
  - 0-36 meses, 4-9 años y 10-16 años.
  - 0-23 meses, 2-5 años y 6-14 años.
- 73.- ¿Que síntoma es patognomónico de la pericarditis aguda?:**
- Dolor torácico.
  - Roce pericárdico.
  - Fiebre.
  - Disnea.
- 74.- ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos NO corresponde al grupo de anticonceptivos hormonales?.**
- Píldora.
  - Parche cutáneo.
  - DIU de cobre.
  - Implante subcutáneo.
- 75.- El criterio fundamental para elegir una intervención en un plan de atención enfermero, es que sea:**
- Las intervenciones son siempre independientes.
  - Que mida el estado del paciente.
  - Que las recomendaciones estén estandarizadas.
  - Alcanzable con los recursos disponibles.
- 76.- Una madre lactante tiene una ingurgitación mamaria, NO se recomendaría:**
- Disminuir la frecuencia de las tomas.
  - Extraer la leche manualmente o con extractor eléctrico.
  - Aplicar compresas de agua fría para calmar el dolor.
  - Aplicar compresas tibias o ducha de agua tibia antes de las tomas.



77.- ¿En qué orden debe retirarse un equipo de protección personal al salir de una habitación donde hay un paciente infeccioso?

- a) Las calzas, la bata y los guantes enrollando de dentro hacia afuera.
- b) La bata, los guantes y las calzas antes de salir de la habitación.
- c) El gorro, la protección facial, lavarse las manos y las calzas antes de salir de la habitación.
- d) Las calzas, la protección facial, la bata, los guantes y lavarse las manos.

78.- En la consulta de deshabitación tabáquica, el test de Richmond valora:

- a) El nivel de motivación para dejar de fumar.
- b) El grado de disnea.
- c) El volumen de aire exhalado en el primer segundo.
- d) El volumen de aire inhalado en el primer segundo.

79.- Según el modelo de relaciones interpersonales de Hildegard Peplau, la relación entre el profesional de enfermería y el paciente evoluciona en cuatro fases siguiendo el siguiente orden:

- a) 1º identificación, 2º autoconcepto, 3º dominio de su rol y 4º resolución.
- b) 1º orientación, 2º apoyo, 3º actuación y 4º enseñanza.
- c) 1º orientación, 2º identificación, 3º explotación y 4º resolución.
- d) 1º actuación, 2º orientación, 3º enseñanza y 4º resolución.

80.- Los cuidados a un neonato con tetralogía de Fallot incluirán:

- a) Valoración periódica de la glucemia mediante una pequeña muestra de sangre del talón del neonato.
- b) Revisar la concentración de vitamina K en el recién nacido.
- c) Explicar a los padres que el trastorno puede originar episodios de distrés respiratorio, durante los cuales el neonato podría adquirir un aspecto pálido o cianótico.
- d) Cuidados de la piel, alternando baños con agua y baños con agua y jabón suave.

81.- Sobre la inserción, cuidados, uso y mantenimiento de la vía intraósea para los profesionales de los equipos de urgencias y emergencias es cierto que:

- a) Las referencias anatómicas para su inserción son difíciles de identificar.
- b) Tiene la capacidad similar a cualquier vena periférica, al permitir la administración de cualquier tipo de fármacos, hemoderivados y la infusión de grandes cantidades de líquidos.
- c) La solución administrada alcanza la circulación sistémica a partir de los 3 minutos de infusión.
- d) Ninguna es correcta.

82.- Cuando se dice que el PAE es flexible, se refiere a que:

- a) Se adapta a todas las necesidades de la persona.
- b) Se basa en el logro de objetivos.
- c) Se puede aplicar a cualquier especialidad de enfermería.
- d) Permite identificar las respuestas del paciente.

83.- ¿Cuál de las siguientes medidas NO está indicada en los cuidados de la mucosa bucal en los pacientes en situación paliativa o terminal?

- a) Cepillado después de las comidas y enjuague bucal.
- b) Humidificación de los labios ante signos de sangrado.
- c) Soluciones de clorhexidina 0.2% para enjuagues.
- d) Soluciones alcohólicas después de las comidas.



84.- El pensamiento erróneo, alteración de la realidad, inquebrantabilidad y certeza de lo que se piensa, es:

- a) Una alucinación.
- b) Un delirio.
- c) Una depresión.
- d) Una ilusión.

85.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

- a) La prevalencia se define como la proporción de sujetos en una población con una determinada característica, normalmente enfermedad, en un momento o periodo de tiempo.
- b) La prevalencia tiene solamente en cuenta los casos nuevos de una enfermedad que surgen en una población en un momento o periodo de tiempo.
- c) Las medidas de prevalencia consideran todos los casos de enfermedad existentes en una población en un momento o periodo de tiempo.
- d) La prevalencia puede expresarse en términos de probabilidad indicando en este caso la probabilidad de estar enfermo (o poseer una característica) en un momento o periodo de tiempo.

86.- En el Cribado del cáncer colorrectal (CCR) es cierto que:

- a) La detección de sangre oculta en heces cada 2 años entre los 40 y los 50 años de edad se ha demostrado como una estrategia efectiva en nuestro medio.
- b) La dieta rica en vitamina D en dosis elevadas (1.000-2.000 U/día) se asocia con la reducción de riesgo de CCR en la población de riesgo medio.
- c) En la población de riesgo medio, la administración de ácido acetil salicílico (AAS) no se asocia de forma consistente con la reducción de CCR.
- d) Los individuos con historia familiar de CCR deberían iniciar el cribado mediante colonoscopia a partir de los 30 años de edad, o 5 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado más joven.

87.- NO es una intervención sugerida en el NOC: "Conocimiento: régimen terapéutico (1813)":

- a) Enseñanza: dieta prescrita.
- b) Enseñanza: medicamentos prescritos.
- c) Apoyo a la familia.
- d) Enseñanza: ejercicio prescrito.

88.- ¿Cuál de las siguientes consideraciones es la CORRECTA para identificar los rasgos que diferencian la alimentación en la diabetes?.

- a) Aumento en la ingesta de monosacáridos - distribución de hidratos de carbono - regularidad en el descanso.
- b) Aumento de la ingesta de lípidos - equilibrio monosacáridos y disacáridos - regularidad de horario.
- c) Dieta equilibrada - restricción de monosacáridos y disacáridos - distribución de hidratos de carbono - regularidad horaria.
- d) Dieta hiperprotéica - restricción de hidratos de carbono - restricción de monosacáridos y disacáridos. X



- 89.- Según la clasificación de Edmons, en un paciente diabético que presenta una úlcera neuropática ¿Cuál de los siguientes signos/síntomas estará presente?
- Úlcera dolorosa.
  - Pulsos ausentes.
  - Localización en dedos del pie.
  - Piel seca y caliente.
- 90.- Cuando en un niño se identifica ausencia o retraso importante en la atención médica de los problemas físicos o enfermedades o ausencia de cuidados médicos rutinarios, es un indicador de:
- Maltrato psicológico. ✓
  - Incapacidad parental de control de la conducta.
  - Maltrato físico.
  - Negligencia física.
- 91.- Según el calendario de vacunación de la Comunidad Autónoma de Aragón ¿a qué edad se debe vacunar a los niños de la triple vírica?
- 2 meses y 12 meses.
  - 12 meses y 3 años.
  - 12 meses y 6 años.
  - 4 meses y 3 años.
- 92.- Entre las pautas generales de actuación en el tratamiento anticoagulante oral con acenocumarol, controlado por personal sanitario, se encuentran las siguientes EXCEPTO:
- Marcar el objetivo de mantener INR dentro de los límites normales (rango terapéutico) establecido para cada paciente.
  - Se recomienda calcular las dosis en miligramos a la semana y repartir las pastillas en razón a la dosis semanal deseada.
  - Si INR es  $>3$ , suspender el tratamiento ese día y hacer controles al día siguiente.
  - Se debe procurar administrar fármacos sin interacciones. ✓
- 93.- En cuanto a las recomendaciones básicas para la utilización de productos en curas húmedas, señale la respuesta FALSA.
- Cuando el exudado de la lesión esté en torno a 1-2 cm del borde del apósito es el momento adecuado para cambiarlo.
  - Si la lesión tiene una elevada carga bacteriana o signos claros de infección, la limpieza y desbridamiento debe hacerse a diario.
  - Para evitar que se formen abscesos o cierres en falso de la lesión, será necesario rellenar parcialmente entre la mitad y tres cuartas partes las cavidades y tunelizaciones.
  - Realizar la valoración de la úlcera de manera sistemática una vez al día.
- 94.- La norma informativa sobre productos desinfectantes de 29/03/2011 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios clasifica los desinfectantes en 3 grupos, señale la respuesta INCORRECTA:
- Biocidas: Antisépticos para piel sana, incluidos los desinfectantes de ambientes y superficies utilizados en los ámbitos clínicos o quirúrgicos.
  - Productos sanitarios: productos que se destinan únicamente a la desinfección de productos sanitarios.
  - Medicamentos: desinfectantes que se destinan a aplicarse en piel dañada.
  - Germicida: Agente o sustancia que destruye gérmenes patógenos. ✓



- 95.- **NO es una contraindicación absoluta para la donación de órganos:**
- Edad avanzada.
  - Serología positiva para VIH.
  - Patología infecto-contagiosa de origen desconocido.
  - Existencia o historia previa de neoplasia maligna.
- 96.- **Según E. Adam, respecto a los componentes de los modelos conceptuales enfermeros, señale la respuesta INCORRECTA:**
- Las asunciones constituyen el "por qué" del modelo y generalmente incluyen los valores y creencias sobre la naturaleza del ser humano, la salud y las metas profesionales desde la perspectiva de su autora.
  - Las proposiciones constituyen el "cómo" del modelo conceptual, y ofrecen el apoyo teórico y científico del mismo.
  - Los elementos son el "qué" del modelo, son su núcleo y al mismo tiempo le dan sentido a las intervenciones enfermeras.
  - La identidad disciplinar engloba la filosofía e ideología de la autora.
- 97.- **Según la Jerarquía de Principios o principialismo jerarquizado, el primer nivel incluye:**
- Ética de máximos.
  - Principio de Maleficencia.
  - Principio de Beneficencia.
  - Principio de Justicia.
- 98.- **Cuál de los siguientes fármacos NO se puede administrar por vía endotraqueal?**
- La lidocaína.
  - La adrenalina.
  - La atropina.
  - El bicarbonato sódico.
- 99.- **En los procesos de recuperación rápida tras una intervención quirúrgica de prótesis de rodilla o fast track de rodilla, señale la aseveración FALSA:**
- La recuperación rápida es un proceso quirúrgico que pretende conseguir la máxima autonomía del paciente mediante la educación, el control del dolor y la movilización precoz.
  - El instrumento fundamental para la recuperación rápida es conseguir la implicación del paciente mediante el empoderamiento, es decir, por medio de la educación preoperatoria del paciente, que contribuirá a reducir la ansiedad y facilitará que se involucre en su propia recuperación.
  - El concepto de «cirugía de recuperación rápida» fue introducido en 1997 por Khelet y significó el inicio del modelo Fast Track o de Rapid Recovery (RR).
  - La artroplastia total de rodilla (ATR) es una cirugía consistente en la sustitución artificial de la articulación, debido a una lesión traumática o bien a un proceso degenerativo o de artrosis, con un dolor importante asociado que ayuda a la recuperación del paciente.
- 100.- **De conformidad con el Plan de cuidados de enfermería en el paciente EPOC y con el diagnóstico enfermero de "Conocimientos Deficientes (00126)". ¿Cuál de las siguientes intervenciones NO es prioritaria?**
- Enseñanza proceso de la enfermedad.
  - Enseñanza del procedimiento/tratamiento Oxigenoterapia.
  - Manejo de la medicación.
  - Apoyo en la toma de decisiones.



- 101.- La guía que permite analizar la calidad de los apartados de los informes en los estudios observacionales es:
- STROBE.
  - PRISMA.
  - CONSORT.
  - COREQ.
- 102.- ¿Cuál de las siguientes áreas del aparato gastro-intestinal está en especial riesgo de sufrir isquemia?
- El duodeno.
  - El recto.
  - La flexión esplénica.
  - El estómago.
- 103.- Dentro de la valoración del paciente oncológico en situación de cuidados paliativos, indica cuál de las siguientes escalas se recomienda para valorar la calidad de vida del paciente:
- Test de Richmond.
  - Cuestionario de Malt.
  - Escala de Lawton y Brody.
  - Escala de Karnofsky.
- 104.- La administración conjunta de fármacos hipnóticos intravenosos y opiáceos favorece que se alcance los objetivos de hipnosis (sedación, inconsciencia) con mayor rapidez y menores concentraciones de cada uno de los fármacos. Esta interacción entre ambos constituye un ejemplo de:
- Agonismo.
  - Antagonismo.
  - Sinergismo.
  - Argirismo.
- 105.- En relación a los Patrones funcionales de M. Gordon, se puede afirmar que:
- La utilización de éstos permite una valoración enfermera sistemática y premeditada.
  - Constituyen un modelo conceptual.
  - Solo permiten recoger datos de la situación actual de la persona.
  - La valoración de cada uno de los patrones debe evaluarse independiente de los demás.
- 106.- Respecto al Síndrome Compartimental Agudo, señale la respuesta FALSA:
- El dolor desaparece con el reposo y no deja secuelas en el tejido afectado.
  - La causa más frecuente son las fracturas.
  - En el examen físico se observa cianosis, disminución de la movilidad y disminución del pulso de la arteria principal del compartimento afectado.
  - Se produce tensión en la zona, hinchazón y alteraciones sensitivas distales.
- 107.- Existen múltiples factores de riesgo relacionados con el cáncer de vejiga, todos SALVO:
- Tabaco.
  - Virus del papiloma humano (VPH).
  - Cistitis crónica.
  - Infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB).



**108.- ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio?**

- a) Obesidad.
- b) Multiparidad.
- c) Edad avanzada.
- d) Menopausia tardía.

**109.- La definición de Reacción Adversa a un Medicamento (RAM) del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de uso Humano (SEFV-H):**

- a) Se puede considerar como toda respuesta intencionada a un medicamento.
- b) No incluye efectos nocivos relacionados con errores de medicación.
- c) No incluye efectos nocivos relacionados al margen de los términos de la autorización de comercialización, incluidos el uso equivocado, la sobredosis y el abuso del medicamento.
- d) Efecto secundario, efecto adverso, efecto indeseable, efecto colateral, etc., son sinónimos de RAM.

**110.-Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo del pie diabético:**

- a) Deformidades en el pie.
- b) Callos plantares.
- c) Mala visión.
- d) Mala audición.