

Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL)

Teil 4: Taxa beschrieben von D.F.L. von Schlechtendal

Uwe BRAUN & Anna-Katharina WITTIG

Zusammenfassung: BRAUN, U. & WITTIG, A.-K. 2003: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 4: Taxa beschrieben von D.F.L. von Schlechtendal. *Schlechtendalia* **10**: 15–65.

1.208 von D.F.L. von Schlechtendal beschriebene Arten und subspezifische Taxa werden aufgelistet und es wird angegeben, ob Typusmaterial der jeweiligen Sippen im Herbarium der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL) vorhanden ist oder nicht. Typusmaterial von 748 Taxa ist in HAL vorhanden. Bibliographische Daten, Details zu den Typuskollektionen und HAL-Inventarnummern werden angegeben. Eine Übersicht der HAL-Typen ist auch über eine Datenbank im Internet abrufbar (<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>).

Abstract: BRAUN, U. & WITTIG, A.-K. 2003: Type collections of the herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (HAL). Part 4: Taxa described by D.F.L. von Schlechtendal. *Schlechtendalia* **10**: 15–65.

1.208 species and subspecific taxa described by D.F.L. von Schlechtendal are listed, and it is noted if type specimens of the taxa concerned are deposited at the Herbarium of the Martin-Luther-University Halle (HAL) or not. Type specimens of 748 taxa are preserved at HAL. Bibliographic data, details of the type collections and the HAL accession numbers are given. A survey of the type collections of HAL is also available from a database via internet (<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>).

Einleitung

D.F.L. von Schlechtendal (1794–1866) ist einer der bedeutendsten Botaniker Deutschlands des 19. Jahrhunderts, der etwa 1200 Arten und andere subspezifische Taxa beschrieben hat. Von 1819 bis 1833 war Schlechtendal am „Königlichen Herbarium zu Berlin“ tätig, das 1818 von H.F. Link gegründet worden war. 1833 wurde Schlechtendal zum Professor für Botanik und zum Direktor des Botanischen Gartens an der Universität Halle berufen (HEKLAU 1998), wo er bis zu seinem Ableben im Jahr 1866 aktiv war. Sein großes Herbarium von etwa 70.000 Kollektionen wurde später durch die Universität angekauft und stellt den wichtigsten Teil der historischen Sammlungen von HAL dar. Zahlreiche Typuskollektionen von Arten und anderen subspezifischen Taxa, die Schlechtendal beschrieben hatte, sind heute im Herbarium HAL deponiert, was besonders für Taxa gilt, die zwischen 1833 und 1866 veröffentlicht worden sind. Aber auch viele Typen von Taxa aus seiner Berliner Zeit zwischen 1819 und 1833 sind in Halle (HAL) vorhanden, da Schlechtendal eine Vielzahl von Dubletten des “Königlichen Herbariums zu Berlin” erhalten hatte, die er nach Halle mitnehmen konnte.

Auf Grundlage eines alten Katalogs mit Namen aller Taxa, die Schlechtendal allein

oder mit anderen Botanikern zusammen beschrieben hatte, wurde eine systematische Suche nach Typuskollektionen dieser Sippen in HAL durchgeführt. Die Namen aller von Schlechtendal beschriebenen Arten, bibliografische Daten, Angaben zu den Typuskollektionen und die HAL-Inventarnummern wurden in eine Datenbank eingegeben, die auch über das Internet zugänglich sein wird („<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>” unter „Herbarium”). Subspezifische Taxa (Varietäten und Formen) wurden nur teilweise berücksichtigt. In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen in gedruckter Form vorgelegt. Es werden Details zu den jeweiligen Typen angegeben, falls sie vorhanden sind, oder es wird vermerkt, dass in HAL kein Typusmaterial deponiert ist („not at HAL”). Die Liste enthält die Namen von 1208 Taxa (1164 Arten und 44 Varietäten und Formen). Typen von 748 Taxa sind in HAL vorhanden.

Der genaue Status der jeweiligen Typen (Holo-, Iso-, Lecto-, Syntypus, etc.) wird nur angegeben, falls er bekannt ist und von einem Spezialisten oder Monographen geprüft worden ist. Sonst werden die Kollektionen nur allgemein „Typus” genannt. Weiterhin wird vermerkt, falls eine Kollektion (HAL-Nummer) aus mehreren Bögen besteht („2 sheets, 3 sheets, etc.“).

Die vorliegende Liste enthält auch alle schon früher veröffentlichten Angaben zu Typen von D.F.L. v. Schlechtendal aus Teillisten auf systematischer Grundlage (BRAUN 1998, 2000; HOFFMANN 1998, 2000; KESTING & HOFFMANN 2000). Anmerkungen in der Liste werden in Englisch gemacht.

Introduction

D.F.L. von Schlechtendal (1794–1866) is one of the most important German botanists of the 19th century. He described about 1.200 species and other subspecific taxa. Between 1819 and 1833, Schlechtendal worked at the “Royal Herbarium Berlin” which was founded in 1818 by H.F. Link. In 1833, he was appointed as a professor of botany and director of the botanical garden in the University Halle (HEKLAU 1998), where he worked up to his end in 1866. His large private herbarium with about 70.000 specimens was purchased by the University Halle. Schlechtendal’s herbarium is the most important part of the historic collections of HAL. Numerous type specimens of the species and subspecific taxa described by Schlechtendal are deposited at HAL, above all of those taxa introduced between 1833 and 1866. However, numerous types of taxa described between 1819 and 1833 in Berlin are also deposited at HAL, since Schlechtendal obtained a large number of duplicates from the “Royal Herbarium Berlin” which he transferred to Halle.

Based on an old catalogue with names of new species and other new taxa introduced by Schlechtendal alone or together with other botanists, a systematic search for types of these taxa deposited at HAL has recently been carried out. The names of all species, bibliographic data, details of the type collections and the HAL accession numbers have been put into a database of HAL types which is also accessible via internet (“<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>” under “Herbarium”). Subspecific taxa (varieties and formae) have been only partly taken into consideration. In this paper, a printed version of the results of these studies is given. It is either

noted that the type material of the taxon concerned is not deposited at HAL (“not at HAL”) or, if present, details to the type collection are given. This list contains names of 1208 taxa (1164 species and 44 varieties and formae). Types of 747 taxa are deposited at HAL.

The exact status of the particular types (holo-, iso-, lecto-, syntype, etc.) is only given as far as known, i.e., if the status has been proven by a specialist or monographer. Otherwise the general term “type” is used.

All data dealing with types of taxa introduced by D.F.L. v. Schlechtendal from previously published lists, based on particular systematic groups, are also included in the present comprehensive list (BRAUN 1998, 2000; HOFFMANN 1998, 2000; KESTING & HOFFMANN 2000). Notes in the list are given in English.

List of taxa

Abutilon ellipticum Schltld., Linnaea 11: 368, 1837. Not at HAL.

Abutilon erosum Schltld., Linnaea 11: 367, 1837. Mexico: ad Tlalpujahua, Keerl.
Typus: HAL 98382.

Abutilon floribundum Schltld., Linnaea 11: 366, 1837. Mexico: ad Tlalpujahua, Keerl.
Typus: HAL 98381.

Abutilon racemosum Schltld., Linnaea 11: 367, 1837. Mexico: ad Tlalpujahua, Keerl.
Typus: HAL 98380.

Acacia aurita Schltld., Linnaea 12: 572, 1838. Mexico: in rupestribus Malpays de Naulingo, reg. temp. calidioris, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 36642 (2 sheets).

Acacia callistemon Schltld., Linnaea 12: 568, 1838. Mexico: prope Reglam, C. Ehrenberg, 1831–40. Typus: HAL 70149.

Acacia carbonaria Schltld., Linnaea 12: 571, 1838. Mexico: inter Veracruz et Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 41313.

Acacia cuspidata Schltld., Linnaea 12: 573, 1838. Not at HAL.

Acacia cyclophylla Schltld., Linnaea 20: 663, 1847. Australia: am steinigem Osthange des Berglandes nach dem Murreyscrub. Kleiner Strauch, H. Behr, 1844/45.
Typus: HAL 41267.

Acacia diversifolia Schltld., Linnaea 12: 570, 1838. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 41283. Mexico: in sylvis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 41284.

Acacia elegans Schltld., Linnaea 12: 569, 1838. Mexico: prope Reglam, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 41288.

Acacia glabrata Schltld., Linnaea 12: 569, 1838. Mexico: prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. Typus: HAL 41236.

Acacia hirsuta Schltld., Linnaea 12: 572, 1838. Mexico: prope Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 41607 (2 Bögen).

Acacia humilis Schltld., Linnaea 12: 567, 1838. Mexico: prope Reglam in pratis, C. Ehrenberg, Sept./Oct. 1831–39. Holotypus: HAL 41176.

Acacia mammifera Schltld., Linnaea 12: 563, 1838. Mexico: Barranca de Acholoya, C. Ehrenberg, Nov. 1837. Typus: HAL 71840 (2 sheets).

- Acacia metrosiderifolia* Schltld., Linnaea 12: 567, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 41078.
- Acacia platyacantha* Schltld., Linnaea 12: 565, 1838. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 41036.
- Acacia pubescens* Schltld., Linnaea 12: 565, 1838. Mexico: Regla, C. Ehrenberg, 1831–40. Typus: HAL 98632 (2 sheets).
- Acacia pulverulenta* Schltld., Linnaea 12: 571, 1838. Mexico: ad ripam fluminis Misantlensis prope San Antonio, regionis calidae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 21527 (3 sheets).
- Acacia retinodes* Schltld., Linnaea 20: 664, 1847. Australia: H. Behr, Jan. 1844/45. Holotypus: HAL 41017.
- Acacia sphaerocephala* Schltld. & Buché, Linnaea 5: 594, 1830. Mexico: prope Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Lectotypus: HAL 40983. Mexico: in calidioribus prope la Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 40984.
- Acacia stipellata* Schltld., Linnaea 12: 574, 1838. Not at HAL.
- Acaena behriana* Schltld., Linnaea 20: 660, 1847. Australia: Auf höher gelegenen Grasland häufig im Gebiet des Gawler river, H. Behr. Lectotypus: HAL 22041.
- Acaena microcephala* Schltld., Linnaea 28: 463, 1856. Not at HAL.
- Acalypha rhombifolia* Schltld., Linnaea 7: 382, 1832. Not at HAL.
- Acalypha schiedeana* Schltld., Linnaea 7: 384, 1832. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 72241.
- Achetaria sprengelii* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 567, 1827. Not at HAL.
- Acrostichum vestitum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 605, 1830. Mexico: in truncis arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81876.
- Adelia barbinervis* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 362, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98600 A/B (2 sheets).
- Adenandra brachyphylla* Schltld., Linnaea 6: 199, 1831. Not at HAL.
- Adenandra uniflora* var. (α) *isophylla* Schltld., Linnaea 6: 197, 1831. South Africa: steinige Gegenden der 3. Höhe auf der östlichen Seite des Tafelberges, C.F. Ecklon, Jan. 1823–28. Typus: HAL 30348.
- Aegiphila bachiata* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 371, 1831. Mexico: prope Estero, F. Deppe & C.J.W. Schiede. Typus: HAL 97778 (2 sheets).
- Aeschynomene elegans* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 583, 1830. Mexico: in collibus apricis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98428. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 98429.
- Aeschynomene fascicularis* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 584, 1830. Mexico: inter la Laguna verde et Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98430.
- Agave polyanthoides* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 55, 1831. Not at HAL.
- Agathosma eckloniana* Schltld., Linnaea 6: 207, 1831. Not at HAL.
- Agathosma erecta* var. *pilosa* Schltld., Linnaea 6: 204, 1831. South Africa: Prom. bon. spei, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98627 A, B.
- Agathosma ericoides* Schltld., Linnaea 6: 206, 1831. South Africa: Uitenhagen, C.L. Zeyher & C.F. Ecklon, Nov. 1825. Typus: HAL 98626 (2 Bögen).
- Agathosma gnidioides* Schltld., Linnaea 6: 206, 1831. Not at HAL.

- Agathosma joubertiana* Schltld., Linnaea 6: 207, 1831. Not at HAL.
- Agathosma montana* Schltld., Linnaea 6: 207, 1831. Not at HAL.
- Agathosma pilifera* Schltld., Linnaea 6: 206, 1831. South Africa: Uitenhagen, C.L. Zeyher & C.F. Ecklon. Typus: HAL 24851.
- Agathosma sedifolia* Schltld., Linnaea 6: 206, 1831. Not at HAL.
- Agathosma thymifolia* Schltld., Linnaea 6: 205, 1831. Not at HAL.
- Agathosma minuta* Schltld., Linnaea 6: 206, 1831. South Africa: Karsrivier von de Bruin bis Potberg, C.L. Zeyher & C.F. Ecklon, 3–9 Oct. 1826. Typus: HAL 29905.
- Alchemilla hirsuta* (var.) *alpestris* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 572, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 43471.
- Alchemilla hirsuta* (var.) *campestris* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 572, 1830. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 43489.
- Alchemilla venusta* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 573, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 43579.
- Alchemilla vulcanica* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 573, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Holotypus: HAL 43580.
- Alectoroctonum ovatum* Schltld., Linnaea 19: 252, 1846. Mexico: in sepibus Papantlae; in sylvis prope Actopan, C.J.W. Schiede, Jan./Mar. 1829, Holotypus: HAL 71001 (2 sheets).
- Alisma grandiflorum* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 152, 1827. Not at HAL.
- Alloctopus sabazoides* Schltld., Linnaea 9: 590, 1835. Mexico: prope San Miguel del Soldado et la Joya, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 70344. This is the same sheet as for the type of *Sabazia sarmentosa* Less.
- Alstroemeria gloriosa* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 51, 1831. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45484.
- Althaea kurdica* Schltld., Linnaea 17: 127, 1843. In faucibus regionum altiorum saxosarum montis Gara in Kurdistania, Th. Kotschy, Aug. 1841. Synypi: HAL 98608 (2 sheets), HAL 98407.
- Alyssum imbricatum* Schltld. ex DC., Syst. 2: 308, 1821. Siberia, P.S. Pallas, 1768–1774. Typus: HAL 86107.
- Amaranthus crassipes* Schltld., Linnaea 6: 757, 1831. Ad rivulus insulae St. Thomae, C. Ehrenberg, 1826–28. Holotypus: HAL 76208.
- Ammannia catholica* Cham. & Schltld. (var.) *philippensis* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 378, 1827. Tierra alta Luconiae, A. v. Chamisso, 17 Dec. 1817 ad 29 Jan. 1818. Typus: HAL 98155.
- Ampelopsis pubescens* Schltld., Linnaea 10: 251, 1836. Mexico: Cerrania de Zoncuantla, conf. Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 71859.
- Amphilophium molle* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 120, 1830. Mexico: in dumetis prope Vera-Cruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 98437.
- Anacyclus radiatus* (var.) *sulfureus* Schltld., [Ind. Sem. Hort. Hal., 1838], not seen, and Linnaea 13: Litt. 96, 1839. Not at HAL.
- Anagallis filiformis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 225, 1826. Brazil: prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98444.
- Anchietea sellowiana* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 148, 1827. Not at HAL.

- Andromeda eucalyptoides* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 518, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98591 (2 Sheets).
- Andromeda meriifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 522, 1826. Not at HAL.
- Andromeda nummularia* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 520, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98441.
- Andromeda pulchra* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 521, 1826. Not at HAL.
- Andromeda redowskii* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 517, 1826. In Asia (Siberia) boreali Redowskii. Typus: HAL 98442.
- Androsace arctica* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 220, 1826. Not at HAL.
- Anguria aculeolata* Schltld., Linnaea 24: 748, 1851. Not at HAL.
- Anguria affinis* Schltld., Linnaea 24: 760, 1851. Not at HAL.
- Anguria arrabidae* Schltld., Linnaea 24: 736, 1851. Not at HAL.
- Anguria dentata* Schltld., Linnaea 24: 713, 1851. Not at HAL.
- Anguria gaudichaudiana* Schltld., Linnaea 24: 753, 1851. Not at HAL.
- Anguria jacquiniana* Schltld., Linnaea 24: 709, 1851. Not at HAL.
- Anguria kegeliana* Schltld., Linnaea 24: 776, 1851. Not at HAL.
- Anguria kunthiana* Schltld., Linnaea 24: 762, 1851. Not at HAL.
- Anguria laciniosa* Schltld., Linnaea 24: 755, 1851. Not at HAL.
- Anguria leptantha* Schltld., Linnaea 24: 779, 1851. Not at HAL.
- Anguria meyeniana* Schltld., Linnaea 24: 750, 1851. Not at HAL.
- Anguria obtusiloba* Schltld., Linnaea 24: 744, 1851. Not at HAL.
- Anguria ottoniana* Schltld., Linnaea 24: 758, 1851. Not at HAL.
- Anguria plumieriana* Schltld., Linnaea 24: 709, 1851. Not at HAL.
- Anguria polyphyllus* Schltld., Linnaea 24: 712, 1851. Not at HAL.
- Anguria schomburgkiana* Schltld., Linnaea 24: 765, 1851. Not at HAL.
- Anguria sellowiana* Schltld., Linnaea 24: 746, 1851. Not at HAL.
- Anguria wagneriana* Schltld., Linnaea 24: 785, 1851. Not at HAL.
- Annesorhiza capensis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 399, 1826. South Africa: Promontorio bonae spei (ad latera montis tabularis, montis leonis et ad nemus Rondebosch ad Paerdebund), Mundt & Maire, 1815–31. Isotypus: HAL 98510.
- Annona globiflora* Schltld., Linnaea 10: 235, 1835/36. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 76425.
- Anoda pubescens* Schltld., Linnaea 11: 218, 1837. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 98399.
- Anotis lechleriana* Schltld., Linnaea 28: 488, 1856. Not at HAL.
- Aphelandra deppeana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 96, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, Sept. 1828. Typus: HAL 98541.
- Aphelandra schiedeana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 95, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98543. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98542.
- Arabis drabaeformis* Schltld., Linnaea 28: 471, 1856. Chile: Cord. v. Ramco in galeros, W. Lechler, Dec. 1854. Typus: HAL 96245.
- Arabis owaihiensis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 17, 1826. USA (Hawaii): Sandwich Islands: in montibus insulae O-Wahu, A. v. Chamisso, 1816/17. Holotypus: HAL 85354.

- Aralia echinops* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 174, 1830. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 98470. Mexico: in sylvis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 97774 (2 sheets).
- Ardisia escallioides* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 393, 1831. Mexico: Flore albo in sylvis Papatlae (florifera et fructifera), C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 897224.
- Ardisia melanostigma* Schldtl., Linnaea 8: 526, 1833/34. Mexico: in sylvis inter San Salvador et Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 95759.
- Arenaria cerviana* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 52, 1826. Not at HAL.
- Arenaria elegans* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 57, 1826. Ad Sinum St. Laurentii, A. v. Chamisso, 1816/17. Typus: HAL 98410.
- Arenaria laricina* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 57, 1826. Not at HAL.
- Arenaria leptophylla* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 233, 1830. Not at HAL.
- Arenaria redowskii* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 58, 1826. Not at HAL.
- Argyrophanes behrii* Schldtl., Linnaea 20: 596, 1847. Australia: im Pine forest-Walde zwischen dem Gawler- und Lightriver, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 91213.
- Asclepias oenotheroides* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 123, 1830. Mexico: in arenosis prope Veracruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 98551.
- Aspidium inaequale* Schldtl., Adumbr. pl. 1: 23, 1825. Not at HAL.
- Aspidium nobile* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 610, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 61440 (2 sheets).
- Asplenium aspidioides* Schldtl., Adumbr. pl. 1: 24, 1825. South Africa: Prom. bon. sp., Mundt & Maire. Typus: HAL 81874.
- Asplenium castaneum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 611, 1830. Mexico: in monte Orizaba in Spelunca, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 81873.
- Asplenium lacerum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 612, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81872 (2 sheets).
- Astephanus mucronatus* Schldtl., Linnaea 8: 518, 1834. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Holotypus: HAL 82965 (2 sheets).
- Aster behrii* Schldtl., Linnaea 21: 446, 1848. Not at HAL.
- Asteriscium chilense* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 354, 1826. Chile: in arenosis siccis circa Talcaguano, A. v. Chamisso, Feb. 1816. Typus: HAL 26829.
- Atragene wenderothii* Schldtl., Linnaea 11: 650, 1837. G.W.F. Wenderoth. Lectotypus: HAL 79942.
- Axanthes philippensis* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 193, 1829. Not at HAL.
- Baccharis lancifolia* Schldtl., Linnaea 9: 266, 1834. Mexico: in regione Jalapensi, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 98212.
- Badula mameicilla* Schldtl., Linnaea 26: 671, 1855. Not at HAL.
- Baeckea ericoides* Schldtl., Bot. Zeitung 4: 724, 1846. Sumatra, litus, F. Junghuhn. Holotypus: HAL 72108.
- Begonia heracleifolia* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 603, 1830. Not HAL.
- Begonia nelumbiifolia* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 604, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 39824.

- Berberis schiedeana* Schltld., Bot. Zeitung 12: 654, 1854. Not at HAL.
- Berzelia cordifolia* Schltld., Linnaea 6: 185/5, 1831. Not at HAL.
- Berzelia intermedia* Schltld., Linnaea 6: 188, 1831. Not at HAL.
- Berzelia rubra* Schltld., Linnaea 6: 189, 1831. Not at HAL.
- Betula arguta* Schltld., Linnaea 7: 139, 1832. Not at HAL.
- Beyrichia ocymoides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 21, 1828. Brazil: Prov. Rio de Janeiro, C. Beyrich, Oct. Typus: HAL 98479.
- Bignonia acutistipula* Schltld., Linnaea 26: 375, 1854. Not at HAL.
- Bignonia patellifera* Schltld., Linnaea 8: 516, 1834. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98587 (2 sheets.).
- Bignonia rugosa* Schltld., Linnaea 26: 656, 1855. Not at HAL.
- Bignonia verrucifera* Schltld., Linnaea 26: 655, 1855. Not at HAL.
- Blechnum confluens* Schltld., Linnaea 5: 613, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Typus: HAL 81871 (2 sheets).
- Bolivaria integrifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 208, 1826. Brazil: prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97788 (2 sheets).
- Bolivaria pinnatifida* Schltld., Linnaea 26: 474, 1855. Not at HAL.
- Bolivaria trifida* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 209, 1826. Not at HAL.
- Bonnaya brachycarpa* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 568, 1827. Not at HAL.
- Borreria angustifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 330, 1828. Not at HAL.
- Borreria aralioides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 339, 1828. Not at HAL.
- Borreria asclepiadea* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 320, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98347.
- Borreria brachystemonoides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 314, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98348.
- Borreria centranthoides* Cham. & Schltld. (b) *angustifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 329, 1829. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98349.
- Borreria equisetoides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 338, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, Nov. 1814–31. Typus: HAL 98351.
- Borreria eryngioides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 316, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98352.
- Borreria eupatorioides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 327, 1828. Not at HAL.
- Borreria globularioides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 312, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98354.
- Borreria kohautiana* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 311, 1828. Senegal: F. Kohaut & J. Schmidt, 5 Oct. 1822. Typus: HAL 98365.
- Borreria laxa* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 337, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98355.
- Borreria procera* Schltld., Linnaea 9: 593, 1835. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 98358.
- Borreria saponariaefolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 325, 1828. Not at HAL.
- Borreria satirejaefolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 313, 1828. Not at HAL.
- Borreria scabiosoides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 318, 1828. Not at HAL.
- Borreria sideritis* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 321, 1828. Not at HAL.

- Borreria valerianoides*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 3: 335, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98359.
- Borreria verbenoides*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 3: 331, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 98356, 98357.
- Borreria virgata*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 3: 324, 1828. Not at HAL.
- Bouvardia houtteana*** Schltld., *Fl. Serres*, Ser. 1, 10: 149, 1854–55. Cult. in horto van Houttei; Gandavensi, L. v. Houtte. Typus: HAL 24693.
- Bouvardia microphylla*** Schltld., *Linnaea* 26: 112, 1854. Mexico: C.J.W. Schiede. Typus: HAL 21736.
- Bouvardia myrtifolia*** Schltld., *Linnaea* 26: 121, 1854. Mexico: Hacienda de Cocoyotle, C.J.W. Schiede, Sept. Typus: HAL 21737.
- Bouvardia rosea*** Schltld., *Linnaea* 26: 116, 1854. Mexico: prope S. José del Oro, reg. frig., C.J.W. Schiede, Jun. 1831. Syntypus: HAL 21738. Mexico: prope S. Francisco Jetecala, C.J.W. Schiede, Jun. Syntypus: HAL 21739. Mexico: C.J.W. Schiede. Lectotypus: HAL 21740.
- Bouvardia schiedeana*** Schltld., *Linnaea* 26: 123, 1854. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 24688.
- Bouvardia tenuiflora*** Schltld., *Linnaea* 26: 97, 1854. Cult. in Horto Botanico Halensi, D.F.L. v. Schlechtendal. Typus: HAL 24687.
- Bouvardia viminalis*** Schltld., *Linnaea* 26: 120, 1854. Mexico: C.J.W. Schiede. Holotypus: HAL 21741.
- Bouvardia viperalis*** Schltld., *Linnaea* 26: 114, 1854. Mexico: prope Jenancingo, C.J.W. Schiede, May 1835. Holotypus: HAL 21742.
- Bowlesia grandifolia*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 1: 382, 1826. Not at HAL.
- Brandesia mexicana*** Schltld., *Linnaea* 7: 392, 1832. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98009. Mexico: in sylvaticis prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 97826.
- Brongniartia magnibracteata*** Schltld., *Linnaea* 12: 338, 1838. Mexico: in Barranca prope S. Bartolo, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 98425.
- Brongniartia sericea*** Schltld., *Linnaea* 12: 336, 1838. Mexico: Regla, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 098426.
- Brunia passerinoides*** Schltld., *Linnaea* 6: 190, 1831. South Africa: Caledon, C.L. Zeyher. Feb. Holotypus: HAL 22118.
- Bryonia convolvulifolia*** Schltld., *Linnaea* 26: 640, 1855. Not at HAL.
- Bubon aphyllus*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 1: 389, 1826. Not at HAL.
- Buchlomimus lobelioides*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 2: 589, 1827. Not at HAL.
- Buchnera amethystina*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 2: 588, 1827. Not at HAL.
- Buchnera juncea*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 2: 590, 1827. Not at HAL.
- Buchnera lavandulacea*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 2: 589, 1827. Not at HAL.
- Buddleja brachiata*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 2: 599, 1827. Not at HAL.
- Buddleja cuneata*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 8: 17, 1833. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 95995.
- Buddleja decurrens*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 5: 105, 1830. Mexico: San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 96004 (2 sheets).
- Buddleja elegans*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 2: 594, 1827. Not at HAL.

- Buddleja grandiflora* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 596, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 95998.
- Buddleja neemda* (var.) *philippensis* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 598, 1827. Not at HAL.
- Buddleja sphaerantha* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 104, 1830. Mexico: Llanos de Porte, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 96003 (2 sheets).
- Buddleja stachyoides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 597, 1837. Not at HAL.
- Bumelia ferox* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 392, 1831. Mexico: prope Tecolutam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98443.
- Bunchosia biocellata* Schltld., Linnaea 10: 241, 1836. Mexico. Syntypus: HAL 98387. Mexico: Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98603 (2 sheets).
- Bunchosia strigosa* Schltld., Linnaea 10: 242, 1836. Not at HAL.
- Bupleurum brevicaule* Schltld., Linnaea 17: 124, 1843. Syria: in areis graminosis rupium prope Aleppo, Th. Kotschy. Holotypus: HAL 98514.
- Bupleurum mundtii* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 384, 1826. Not at HAL.
- Burneya forsteri* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 189, 1829. Not at HAL.
- Burneya gaudichaudii* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 190, 1829. Not at HAL.
- Caladenia behrii* Schltld., Linnaea 20: 569, 1847. Not at HAL.
- Caladenia tentaculata* Schltld., Linnaea 20: 571, 1847. Not at HAL.
- Calamus metzianus* Schltld., Linnaea 26: 727, 1854. Not at HAL.
- Calandrinia micrantha* Schltld., Ind. Sem. Hort. Bot. Hal.: 9, 1838 and Linnaea 13: Litt.-Ber. 97, 1839. Not at HAL.
- Calea zacatechichi* Schltld., Linnaea 9: 589, 1835 “1834”. Mexico: in collibus apricis pr. Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 42244. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 42246.
- Calocephalus chrysanthes* Schltld., Linnaea 20: 592, 1847. Australia: vom Grubenland bei Bethanien, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 69484.
- Caltha limbata* Schltld., Linnaea 27: 556, 1856. Not at HAL.
- Calycothrix behriana* Schltld., Linnaea 20: 650, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, Nov. Holotypus: HAL 48919.
- Calycothrix scabra* (var.) *minor* Schltld., Linnaea 20: 650, 1847. Australia: im Pine forest-Wald zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr. Holotypus: HAL 48918.
- Camphoromyrtus behrii* Schltld., Linnaea 20: 651, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, 10 Jan. 1845. Holotypus: HAL 74924.
- Canthium mundtianum* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 131, 1829. Not at HAL.
- Canthium thunbergianum* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 130, 1829. Not at HAL.
- Capraria saxifragaefolia* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 105, 1830. Mexico: prope Veracruz, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jul. 1828. Typus: HAL 98480.
- Cardamine flaccida* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 21, 1826. Chile: Talcahuano, in diar. deest, E.F. Poeppig, 1827–29. Syntypi: HAL 84865, 84866.
- Cardamine purpurea* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 20, 1826. Insulis St. Laurentii. Holotypus: HAL 85360.
- Cardiopetalum calophyllum* Schltld., Linnaea 9: 328, 1834. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1815–31. Holotypus: HAL 59852.

- Carex incrassata* Schltld., Linnaea 10: 119, 1835. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1815–31. Holotypus: HAL 63546.
- Carex sellowiana* Schltld., Linnaea 10: 117, 1835. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1815–31. Holotypus: HAL 63547.
- Carex viridis* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 30, 1831. Mexico: F. Deppe & C.J.W. Schiede. Typus: HAL 63548.
- Carolinea macrocarpa* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 423, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. Typus: HAL 98398.
- Cascarilla gavanensis* Schltld., Linnaea 26: 730, 1855. Not at HAL.
- Casearia obovata* Schltld., Linnaea 13: 434, 1839. Mexico: in sylvis prope la Hacienda de la Orduña, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 41943.
- Casearia parviflora* (var.) *microphyla* Schltld., Linnaea 4: 90, 1829. Antillen, St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826–28. Syntypus: HAL 41976.
- Cassia astroides* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 597, 1830. Mexico: Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 98432.
- Cassia cinerea* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 599, 1830. Mexico: inter Tecoluta et Villa Rica, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98433.
- Cassia kunthiana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 598, 1830. Mexico: in collibus prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98434. Mexico: prope el Estero, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 98431.
- Cassia vogeliana* Schltld., Linnaea 12: 342, 1838. Not at HAL.
- Cassytha dispar* Schltld., Linnaea 20: 578, 1847. Australia: an sandigen Orten, H. Behr. Typus: HAL 42852.
- Cassytha pubescens* Schltld., Linnaea 20: 577, 1847. Australia: an kalkig-sandigen Orten (sandplains) bei Benthaniem, H. Behr, Jan. Typus: HAL 42844.
- Castilleja arvensis* Cham. & Schltld., Linnaea 5: 103, 1830. Mexico: prope Jalapam, rarius, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 96091. Mexico: inter segetes inter San Andres et Serro colorado, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 96090. Mexico: Parce prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 96089.
- Ceanothus glandulosus* Schltld., Linnaea 15: 474, 1841. Mexico: prope las Trojes, C.J.W. Schiede, Oct. 1830. Typus: HAL 50708 (5 sheets).
- Celastrus polygamus* Schltld., Linnaea 4: 87, 1829. Not at HAL.
- Celtis schiedeana* Schltld., Linnaea 7: 140, 1832. Mexico: prope la Banderilla, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 97799 (2 sheets).
- Cephaelis beskeana* Schltld., Linnaea 28: 533, 1856. Brazil: prov. Rio Janeiro: in arenosis montium prope Novo Friburgo, Beske. Typus: HAL 98314.
- Cephaelis humboldtiana* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 136, 1827. Not at HAL.
- Cephaelis nuda* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 135, 1829. Brazil: prov. Rio de Janeiro, F. Sellow, Aug. 1814–31. Typus: HAL 98313.
- Cephaelis polycephala* Schltld., Linnaea 28: 532, 1856. Not at HAL.
- Cephaelis ruelliaefolia* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 134, 1829. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98312.
- Cephalanthus sarandi* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 611, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97791 (2 sheets).

- Cerastium apricum* Schltld., Linnaea 12: 208, 1838. Mexico: in graminosis apricis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May–Aug. Typus: HAL 98171.
- Cerastium beeringianum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 62, 1826. South Africa: ad Sinus bonae spei, A. v. Chamisso, 12 Aug. 1816. Typus: HAL 98404.
- Cerastium furcatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 61, 1826. Inter plantas Redowskianus. Typus: HAL 98403.
- Cerastium orithales* Schltld., Linnaea 12: 209, 1838. Not at HAL.
- Cerastium vulcanicum* Schltld., Linnaea 12: 208, 1838. Mexico: in regiona subnivali montis Orizabae, C.J.W. Schiede, Sept. Typus: HAL 3868.
- Cerasus brasiliensis* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 542, 1827. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98146.
- Cestrum amictum* Schltld., Linnaea 7: 64, 1832. Not at HAL.
- Cestrum confertiflorum* Schltld., Linnaea 19: 263, 1846. Mexico: Angangueco, C.J.W. Schiede, Nov. 1829. Syntypus: HAL 75348. Mexico: Angangueco, C.J.W. Schiede, Oct. 1830. Syntypus: HAL 75349 (2 sheets).
- Cestrum dumetorum* Schltld., Linnaea 7: 61, 1832. Mexico: prope Veracruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Syntypus: HAL 75354 (2 sheets). Mexico: Sao Pablo, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Syntypus: HAL 75355.
- Cestrum euanthes* Schltld., Linnaea 7: 60, 1832. Not at HAL.
- Cestrum fasciculatum* (var.) *gracile* Schltld., Linnaea 19: 261, 1845. Mexico: prope el Banco, C. Ehrenberg. Jan. 1839. Typus: HAL 75344.
- Cestrum hirtellum* Schltld., Linnaea 7: 62, 1832. Mexico: Jalapa; prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 75237 (2 sheets).
- Cestrum laevigatum* Schltld., Linnaea 7: 58, 1832. Brazil: prope Rio de Janeiro, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75296.
- Cestrum laevigatum* Schltld. (b) *pauperculum* Schltld., Linnaea 7: 59, 1832. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75295.
- Cestrum lancifolium* Schltld., Linnaea 19: 267, 1846. Mexico: prope San Toro, C. Ehrenberg, Dec. 1838. Typus: HAL 75362.
- Cestrum multiflorum* Schltld., Linnaea 7: 59, 1832. Not at HAL.
- Cestrum oblongifolium* Schltld., Linnaea 19: 266, 1846. Mexico: in Barranco, C. Ehrenberg, Dec. 1838. Typus: HAL 75366.
- Cestrum porphyroneuron* Schltld., Linnaea 25: 199, 1852. Not at HAL.
- Cestrum psychotrifolium* Schltld., Linnaea 19: 265, 1846. Mexico: prope Angangueco, C.J.W. Schiede, Nov. 1829. Typus: HAL 75363.
- Cestrum vestioides* Schltld., Linnaea 7: 65, 1832. Not at HAL.
- Chaetogastra geitneriana* Schltld., Linnaea 27: 523, 1856. Not at HAL.
- Cheilanthes bergiana* Schltld., Adumbr. pl. 1: 51, 1825. Not at HAL.
- Cheiranthus asper* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 14, 1826. Not at HAL.
- Cherleria dicranoides* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 63, 1826. Ad Sinum St. Laurentii, A. v. Chamisso, 1816/17. Typus: HAL 98411.
- Chiococca phaenostemon* Schltld., Linnaea 9: 594, 1835. Not at HAL
- Chironia frutescens* (a) *hirsuta* & (b) *glabra* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 190, 1826. Not at HAL.

- Chomelia obtusa* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 185, 1829. Not at HAL.
- Chomelia pubescens* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 187, 1829. Not at HAL.
- Cibotium schiedeii* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 616, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 81870 (2 sheets).
- Cinchona lechleriana* Schldtl., Linnaea 26: 728, 1855. Not at HAL.
- Cipura punctulata* Schldtl., Linnaea 18: 410, 1845. Not at HAL.
- Cissus elliptica* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 221, 1830. Mexico: prope Veracruz in dumetis, C.J.W. Schiede, Jul. 1828, Isotypi: HAL 71905 (2 sheets) and HAL 71903.
- Citharexylum lucidum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 97, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 65144. Mexico: Hacienda de la Laguna, Beske, Sept. 1828. Syntypus: HAL 65145.
- Cleome houtteana* Schldtl., Linnaea 24: 669, 1851. Typus: HAL 98611-98613 (3 sheets). Three sheets ex herb. Schlechtendal without additional data. Types?
- Cliffortia filicaulis* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 33, 1827. South Africa: Prom. bon. spei: prope Tulbagh, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98623 (2 sheets).
- Cliffortia serpyllifolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 34, 1827. South Africa: Prom. bon. spei: ad Cango, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98147.
- Clitoria schiedeana* Schldtl., Linnaea 12: 284, 1838. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus: HAL 36864. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 34078 (2 sheets).
- Cluacena lhotzkiana* Schldtl., Linnaea 8: 184, 1833. Not at HAL.
- Clusia hoffmannseggiana* Schldtl., Linnaea 8: 185, 1833. Not at HAL.
- Clusia leucantha* Schldtl., Linnaea 8: 186, 1833. Not at HAL.
- Clusia sellowiana* Schldtl., Linnaea 8: 183, 1833. Not at HAL.
- Cnidium suffruticosum* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 387, 1826. Not at HAL.
- Coccocypselum aureum* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 139, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum campanuliflorum* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 140, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum ciliatum* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 414, 1831. Not at HAL.
- Coccocypselum erythrocephalum* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 145, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum nummulariifolium* Schldtl., Linnaea 9: 599, 1835. Not at HAL.
- Coccocypselum ovatum* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 141, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum pedunculare* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 142, 1829. Not at HAL.
- Cochlearia arctica* Schldtl. in DC., Syst. 2: 367, 1821. Russia: Siberia: in arcticis ad Obum Sibirica, P.S. Pallas, 1768–1774. Typus: HAL 26702.
- Cochlearia siliquosa* Schldtl., in DC., Syst. 2: 369, 1821. Russia: Siberia: in Unalashkae locis saxosis, P.S. Pallas, 1768–1774. Typus: HAL 26767.
- Cochlearia spatulata* Schldtl. in DC., Syst. 2: 369, 1821. Insula St. Georgii, A. v. Chamisso, Jun. 1817. Typus: HAL 26755.
- Coffea kaduana* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 33, 1829. Not at HAL.
- Coffea luconiensis* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 32, 1829. Not at HAL.
- Coffea mariniana* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 35, 1829. Not at HAL.
- Coffea obovata* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 412, 1831. Not at HAL.

- Cologania obovata* Schldtl., Linnaea 12: 287, 1838. Not at HAL.
- Colquhounia mollis* Schldtl., Linnaea 24: 681, 1851. Not at HAL.
- Ceanothus celtidifolius* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 602, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 21507 (3 sheets). Mexico: in sylvis Jalapae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Syntypus: HAL 21506. [≡ *Colubrina celtidifolia* (Schldl. & Cham.) Schldtl., Linnaea 15: 471, 1841].
- Colubrina ehrenbergii* Schldtl., Linnaea 15: 469, 1841. Mexico: inter Amajaque et el Puente de Dios, C. Ehrenberg, Dec. 1838. Lectotypus: HAL 21746 (2 sheets). Mexico: inter las Ajuntas at las Verdosas, C. Ehrenberg, Jan. 1840. Syntypus: HAL 21747.
- Columnnea schiedeana* Schldtl., Linnaea 8: 249, 1833. Mexico: in arboribus vetustis Misantlam, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Syntypus: HAL 82525 (2 sheets). Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 82770.
- Commelina carnea* Schldtl., Ind. Sem. Hort. Hal.: Adn. 9, 1839. Not at HAL.
- Commelina intermedia* Schldtl., Linnaea 24: 655, 1851. Not at HAL.
- Commelina procurrens* Schldtl., Linnaea 24: 656, 1851. Not at HAL.
- Commelina rosea* Schldtl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 7, 1838. Not at HAL.
- Commelina variabilis* Schldtl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 7, 1838. Not at HAL.
- Conanthera albiflora* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 50, 1831. Not at HAL.
- Condalia mexicana* Schldtl., Linnaea 15: 471, 1841. Mexico: prope Zimapan, C.J.W. Schiede, Jun. 1830. Syntypi: HAL 21743, 21744.
- Conospermum patens* Schldtl., Linnaea 20: 587, 1847. Australia: Adelaide, im Pine forest-Walde zwischen dem Gawler-Light-river, H. Behr. Typus: HAL 10365.
- Convolvulus ampelopsifolius* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 118, 1830. Mexico: in dumetis prope Veracruz, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 98221.
- Convolvulus apocynoides* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 117, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, Sept./Oct. 1828. Typus: HAL 098217.
- Convolvulus frankeanus* Schldtl., Linnaea 9: 513, 1835. Brazil: prope Rio de Janeiro, comm. MR Frank. Typus: HAL 98085.
- Convolvulus lapathifolia* Schldtl., Linnaea 19: 736, 1847. Mexico: F.E. Leibold, no. 54, 1839–44. Typus: HAL 37707.
- Convolvulus melanostictus* Schldtl., Linnaea 6: 737, 1831. Antillen, St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826–1828. Typus: HAL 37540.
- Convolvulus polyanthus* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 117, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 98218.
- Convolvulus tuba* Schldtl., Linnaea 6: 735, 1831. Antillen, St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826–1828. Typus: HAL 37520.
- Convolvulus variabilis* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 116, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 37741.
- Cordia ambigua* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 115, 1830. Mexico: in sepibus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 48905.
- Cornus grandis* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 171, 1830. Not at HAL.
- Corydalis ambigua* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 558, 1826. Ad portum Petropauli Camtschatcae, P.S. Pallas, 1816. Typus: HAL 98614.
- Corydalis cracca* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 567, 1826. Not at HAL.
- Cotoneaster marginatus* Schldtl., Linnaea 27: 541, 1856. Cult. in Hort. Bot. Berol.

Lectotypus: HAL 11879.

Cotoneaster orbicularis Schltld., Linnaea 27: 544, 1856. Arabice: Schohatt, in montis St. Catharinae praeruptis, W. Schimper, 19 May & 11 Aug. 1835. Typus: HAL 11880 (2 sheets).

Crotalaria bracteata Schltld. & Cham., Linnaea 5: 575, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98144.

Crotalaria bupleurifolia Schltld. & Cham., Linnaea 5: 575, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98143.

Croton conspurcatus Schltld., Linnaea 7: 380, 1832. Mexico: in dumetis prope Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 70989 (2 sheets).

Croton draco Schltld. & Cham., Linnaea 6: 360, 1831. Mexico: in sylvaticis Papantlam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 98599 (3 sheets).

Croton ehrenbergii Schltld., Linnaea 19: 248, 1846. Mexico: prope Mineral del Monte in Cuesta blanca, alt. 8–9000 ped., C. Ehrenberg, 1831–39. Lectotypus: HAL 48874. Mexico: inter Actopan et Pachuca, C. Ehrenberg, 1831–40. Paratypus: HAL 48875. Mexico: inter Actopan et Izmiquilpan, C. Ehrenberg, Jan. 1840. Paratypus: HAL 48873.

Croton hypoleucus Schltld., Linnaea 19: 246, 1846. Mexico: inter Zimapam et S. José del Oro, C.J.W. Schiede, Jun. Typus: HAL 98598 (2 sheets).

Croton repens Schltld., Linnaea 19: 237, 1846. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 98379. Mexico: temperiertes Mexico, F.E. Leibold. Syntypi: HAL 98377, 98378

Croton repandus Schltld., Linnaea 19: 237, 1846. Mexico: steile steinige Hänge im Berglande bei der Tonunda, F.E. Leibold. Typus: HAL 98376.

Croton soliman Schltld. & Cham., Linnaea 6: 361, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98597 (2 sheets).

Croton pseudochina Schltld. & Cham., Linnaea 5: 84, 1830. Mexico: prope Plan del Rio, Tierra caliente, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Holotypus: HAL 48871.

Croton pseudochina Schltld. & Cham. (var.) *minor* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 359, 1831. Mexico: inter Laguna Verde et Actopan, C.J.W. Schiede, 1828–29. Typus: HAL 48840 (2 sheets, lecto- and isoelectotype). Mexico: prope Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Isoelectotypus: HAL 48879. Mexico: prope Plan del Rio, reg. calidae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Paratypus: HAL 48878.

Croton schiedeanus Schltld., Linnaea 19: 243, 1846. Mexico: inter Nautlam et Misantlam, reg. calidae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 48877.

Croton sericeus Schltld. & Cham., Linnaea 5: 85, 1830. Mexico: Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Holotypus: HAL 48872.

Croton sylvaticus Schltld., Linnaea 19: 240, 1846. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Holotypus: HAL 48880.

Crusea brachyphylla Schltld. & Cham., Linnaea 5: 165, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 19579.

Cryptandra campanulata Schltld., Linnaea 20: 639, 1847. Australia: vom steinigen Ostabhänge des Gebirges gegen den Murray-Scrub, H. Behr, Jul. 1844/45. Typus: HAL 98383.

Cryptandra leucophracta Schltld., Linnaea 20: 640, 1847. Australia: auf der Sandplaine genannten sandig-kalkigen Gegend, H. Behr, Jan. 1844/45. Typus: HAL 98601 (2 sheets).

- Cupaniopsis calaminthaefolia* Schltld., Linnaea 12: 274, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 16110.
- Cupaniopsis calophylla* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 361, 1827. Not at HAL.
- Cuphaea balsamona* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 363, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis: Estrella de Maxade, F. Sellow, Apr. 1823. Syntypus: HAL 16113.
- Cuphaea calaminthaefolia* Schltld., Linnaea 12: 274, 1838. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 16107. Mexico: prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 16108. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 16109.
- Cuphaea ericoides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 366, 1827. Not at HAL.
- Cuphaea glutinosa* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 369, 1827. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98166, 98368
- Cuphaea ingrata* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 371, 1827. Brazil: Brasilia aequinoct., Sellow & Beyrich, 1814–31. Syntypus: HAL 98369. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 98370.
- Cuphaea ligustrina* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 359, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98371.
- Cuphaea linarioides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 367, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98390.
- Cuphaea lysimachioides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 374, 1827. Brazil: Brasilia aequinoct. ac. meridi (ex gr. Estrella das Tombas), F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98391.
- Cuphaea mimuloides* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 570, 1830. Mexico: in humidis prope Mesachica, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Holotypus: HAL 16104.
- Cuphaea origanifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 373, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98392.
- Cuphaea salicifolia* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 569, 1830. Mexico: ad rivulos et ripas fluminis Misantlensis prope Misantlam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Mar. 1829. Lectotypus: HAL 15204 (2 sheets). Mexico: ad rivulos prope Papanlam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Syntypus: HAL 16097.
- Cuphaea thymoides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 368, 1827. Not at HAL.
- Cuphaea tuberosa* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 372, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98393.
- Curtia gentianoides* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 210, 1826. Not at HAL.
- Cuscuta citricola* Schltld., Linnaea 22: 808, 1849. Not at HAL.
- Cuscuta jalapensis* Schltld., Linnaea 8: 515, 1833. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 98483.
- Cyathea mexicana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 616, 1830. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 75280. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Syntypus: HAL 81869 (2 sheets).
- Cyathodes tameiameiae* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 539, 1826. Not at HAL.
- Cybianthus parviflorus* Schltld., Linnaea 26: 672, 1855. Not at HAL.
- Cynoglossum mexicanum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 114, 1830. Mexico: in monte Macultepec, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 95748 (2 sheets).
- Cyperus ciliatus* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 25, 1831. Mexico: inter St. Fe et Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 53220.

- Cyperus fossarum* Schltld., Linnaea 31: 316, 1861–62. Not at HAL.
- Cyperus ischnos* Schltld., Bot. Zeitung 7: 99, 1849. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 53189. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 53192.
- Cyrtocarpa copalillo* Schltld., Linnaea 16: 485, 1842. Not at HAL.
- Dalea ehrenbergii* Schltld., Linnaea 12: 290, 1838. Mexico: prope Grande, C. Ehrenberg. Typus: HAL 98418.
- Dalea comosa* Schltld., Linnaea 12: 289, 1838. Mexico: Mineral del Monte, Cuesta blanca, C. Ehrenberg, Nov./Dec. 1841–40. Typus: HAL 80011.
- Dalea laxiflora* Schltld., Linnaea 12: 293, 1838. Not at HAL.
- Dalea leucostoma* Schltld., Linnaea 12: 294, 1838. Mexico: prope Regla, C. Ehrenberg, Oct. Typus: HAL 98419.
- Dalea pyramidalis* Schltld., Linnaea 12: 290, 1838. Not at HAL.
- Dalea thymoides* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 580, 1830. Mexico: inter la Hacienda Tenestepeque et Hacienda Quantotolapa, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 98422.
- Dalea uncifera* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 580, 1830. Mexico: in apricis prope Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Syntypus: HAL 98610 (2 sheets). Mexico: in patris inter Mesachica et Malipique, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 98421.
- Dalea verbenacea* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 579, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98416.
- Dalea verbenacea* Schltld. & Cham. (var. *sericea*) Schltld. & Cham., Linnaea 5: 579, 1830. Mexico: prope Jalapam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98414. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98415.
- Dampiera rosmarinifolia* Schltld., Linnaea 20: 603, 1847. Australia: in Schrubgegenden, H. Behr, Oct./Nov. 1845. Typus: HAL 43163.
- Davallia divaricata* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 617, 1830. Mexico: Cuesta grande de Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Typus: HAL 81868 (2 sheets).
- Davilla sellowiana* Schltld., Linnaea 8: 178, 1833. Not at HAL.
- Davilla tintinnabulata* Schltld., Linnaea 8: 178, 1833. Not at HAL.
- Declieuxia herbacea* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 11, 1829. Not at HAL.
- Deherainia nervosa* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 197, 1826. Not at HAL.
- Deianira erubescens* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 196, 1826. Not at HAL.
- Deianira pallescens* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 196, 1826. Not at HAL.
- Deppea erythrorhiza* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 168, 1830. Mexico: in umbrosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Holotypus: HAL 64236 (2 sheets).
- Deppea grandiflora* Schltld., Linnaea 19: 748, 1847. Mexico: Mexico temperata, F.E. Leibold, 1839–44. Typus: HAL 64237.
- Desmodium adhaesivum* Schltld., Linnaea 12: 314, 1838. Mexico: Mineral del Monte, Huasca, Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 51025.
- Desmodium affine* Schltld., Linnaea 12: 312, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 51030. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 51031.

- Desmodium diversifolium* Schltld., Linnaea 12: 313, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 51029.
- Desmodium elegans* Schltld., Linnaea 12: 320, 1838. Not at HAL.
- Desmodium lupulinum* Schltld., Linnaea 12: 317, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 51037.
- Desmodium orbiculare* Schltld., Linnaea 12: 311, 1838. Mexico: in solo calcareo ad aquas calidas prope Grande, Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typi: HAL 51039, 51040.
- Desmodium plicatum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 585, 1830. Mexico: in patris inter Misantlam et Colipam, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 51034 (2 sheets).
- Desmodium polystachyum* Schltld., Linnaea 12: 321, 1838. Mexico: Hacienda de la Orduna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 51294 (2 sheets).
- Desmodium prehensile* Schltld., Linnaea 12: 315, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 51017.
- Desmodium psilophyllum* Schltld., Linnaea 12: 310, 1838. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 51036.
- Desmodium retinens* Schltld., Linnaea 12: 311, 1838. Mexico: prope Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 51035.
- Desmodium sericophyllum* Schltld., Linnaea 12: 317, 1838. Mexico: in sylvis prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 50828.
- Desmodium strobilaceum* Schltld., Linnaea 12: 316, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 51018.
- Desmodium sessile* Schltld., Linnaea 12: 319, 1838. Mexico: prope Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 50827.
- Dichoglottis australis* Schltld., Linnaea 20: 631, 1847. Australia: auf Sandboden bei Bethanien, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98405.
- Dichorisandra marginata* Schltld., Linnaea 26: 454, 1855. Not at HAL.
- Dichoromena radicans* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 28, 1831. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Holotypus: HAL 63549.
- Dillwynia scabra* Schltld., Linnaea 20: 666, 1847. Australia: in der Barossa-Range, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 52291.
- Diodia anthospermoides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 343, 1828. Not at HAL.
- Diodia dasycephala* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 348, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98296
- Diodia palustris* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 347, 1828. Not at HAL.
- Diodia polymorpha* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 344, 1828. Not at HAL.
- Dioscorea brachycarpa* Schltld., Linnaea 17: 609, 1844. Mexico: Regla, C. Ehrenberg, Sept. 1835. Typus: HAL 62132.
- Dioscorea convolvulacea* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 49, 1831. Mexico: prope Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 62124.
- Dioscorea deppei* Schiede ex Schltld., Bot. Zeitung 1: 890, 1843. Mexico: in sylvis Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Synypus: HAL 62137 A (4 sheets). Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 62137 B (2 sheets).
- Dioscorea grandifolia* Schltld., Linnaea 17: 602, 1844. Mexico: in sylvis inter Acatlan et Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 62133. Mexico: in sylvis inter Acatlan et Naulingo, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 62134.

- Dioscorea laxiflora* Schltldl., Linnaea 17: 606, 1844, non *D. laxiflora* Mart. ex Griseb., 1842 [= *Dioscorea remotiflora* Kunth], Mexico: in Barranca septentrionem versus a baleneis calidis ad Atotonilco el Grande, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 62125 (2 sheets).
- Dioscorea nana* Schltldl., Linnaea 18: 112, 1844. Mexico: in planitie Toluca, reg. frigida, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 62130, non *Dioscorea nana* Poepp.
- Dioscorea pallens* Schltldl., Linnaea 17: 610, 1844. Mexico: Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 62131.
- Dioscorea tenuiflora* Schltldl., Linnaea 17: 608, 1844. Mexico: locus natatis ignotus, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 62123.
- Diosma vulgaris* Schltldl., Linnaea 6: 200, 1831. South Africa: Prom. bon. spei, K.H. Bergius, 1815–17. Typus: HAL 90919.
- Dipterocalyx scaberrimus* Schltldl., Linnaea 26: 647, 1855. Not at HAL.
- Discocapnos mundtii* Cham. & Schltldl., Linnaea 1: 569, 1826. Not at HAL.
- Disoscorea deppei* Schiede ex Schltldl., Bot. Zeitung 1: 890, 1843. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug./Sept. 1829. Typus: HAL 62137 C.
- Ditaxis lancifolia* Schltldl., Linnaea 26: 635, 1855. Not at HAL.
- Diuris behrii* Schltldl., Linnaea 20: 572, 1847. Not at HAL.
- Dodecatheon frigidum* Cham. & Schltldl., Linnaea 1: 222, 1826. Sinus St. Laurentii, A. v. Chamisso, 1816/17. Typus: HAL 98445.
- Dodonaea brasiliensis* Schltldl., Linnaea 18: 51, 1844. Brazil: in arenosis prope Ilheos, K.F.P. Martius, 1817–20. Syntypi: HAL 34072 (2 sheets), 36819.
- Dodonaea ehrenbergii* Schltldl., Linnaea 18: 52, 1844. S. Domingo, C. Ehrenberg, 1828–31. Holotypus: HAL 36817.
- Dodonaea kohautiana* Schltldl., Linnaea 18: 52, 1844. Senegal: F.W. Sieber. Typus: HAL 36825.
- Dodonaea schiedeana* Schltldl., Linnaea 18: 49, 1844. Mexico: C.J.W. Schiede, Mar. 1828–36. Typus: HAL 34073 (2 sheets).
- Dolichos mexicanus* Schltldl., Linnaea 12: 329, 1838. Mexico: in dumetis Misantlae, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 75279.
- Dolichos rhynchosoides* Schltldl., Linnaea 27: 531, 1856. Not at HAL
- Doratolepis tetrachaeta* Schltldl., Linnaea 20: 593, 1847. Not at HAL.
- Draba henneana* Schltldl., Linnaea 10: 100, 1835. Labrador, E. Wenk. Holotypus: HAL 84109.
- Draba laevigata* Cham. & Schltldl., Linnaea 1: 25, 1826. Insulis St. Laurentii, A. v. Chamisso, Jun. 1817. Holotypus: HAL 84110.
- Drosera hiliaris* Cham. & Schltldl., Linnaea 1: 548, 1826. Not at HAL.
- Drymaria gracilis* Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 232, 1830. Mexico: Jalapa, F. Deppe, Aug. Typus: HAL 98420. [Cult. in Horto bot. Berol.].
- Drymaria grandiflora* Schltldl., Linnaea 12: 205, 1838. Not at HAL.
- Drymaria palustris* Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 232, 1830. Not at HAL.
- Drymaria ramosissima* Schltldl., Linnaea 12: 206, 1838. Mexico: Hegewisch; Mühlpfordt. Typus: HAL 98412.
- Drymaria villosa* Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 232, 1830. Not at HAL.
- Echeveria bifida* Schltldl., Linnaea 13: 411, 1839. Not at HAL.

- Echeveria mucronata* Schltld., Linnaea 13: 411, 1839. Not at HAL.
- Echveria pubescens* Schltld., Linnaea 13: 411, 1839. Not at HAL.
- Echeveria racemosa* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 554, 1830. Not at HAL.
- Echiostachys chlorantha* Schltld., Linnaea 26: 663, 1855. Not at HAL.
- Echites bignoniaeflora* Schltld., Linnaea 26: 372, 1854. Not at HAL.
- Echites ehrenbergii* Schltld., Linnaea 26: 666, 1855. San Domingo, C. Ehrenberg, 1828–31. Typus: HAL 83854.
- Elaeagnus alingaro* Schltld. in DC., Prodr. 14: 615, 1857. Not at HAL.
- Elaeagnus arborea* var. (b) *dendroidea* Schltld. in DC., Prodr. 14: 612, 1857 [= *Elaeagnus dendroidea* (Schltld.) Schltld., Linnaea 30: 362, 1859/60]. Herb. Schlechtendal (without locality, without collector). Typus: HAL 98200.
- Elaeagnus cumingii* Schltld., Linnaea 30: 375, 1859/60. Not at HAL.
- Elaeagnus gaudichaudiana* Schltld., in DC., Prodr. 14: 612, 1857. Small fragment (ex herb. de Candolle). Typus: HAL 98201.
- Elaeagnus kologa* Schltld. in DC., Prodr. 14: 611, 1857. Collection without any additional data (ex herb. de Candolle?). Type: HAL 98202.
- Elaeagnus oxycarpa* Schltld., Linnaea 30: 344, 1859/60. Not at HAL.
- Elaeagnus perrottetii* Schltld., Linnaea 30: 375, 1859/60. Not at HAL.
- Elaeagnus thwaitesii* Schltld. in DC., Prodr. 14: 611, 1857. Not at HAL.
- Elaeagnus wallichiana* Schltld. in DC., Prodr. 14: 612, 1857. Not at HAL.
- Elaphrium bicolor* Willd. ex Schltld., Linnaea 17: 625, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, 1835. Synypi: HAL 95927 (2 sheets), 95928 (2 sheets).
- Elaphrium cuneatum* Schltld., Linnaea 17: 629, 1843. Mexico: prope Zamalitzlahuaca, C.J.W. Schiede, Aug./Sept. 1834/35. Typus: HAL 95929 (2 sheets).
- Elaphrium grandifolium* Schltld., Linnaea 17: 249, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Typus: HAL 95936.
- Elaphrium lancifolium* Schltld., Linnaea 17: 247, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Sept. 1835. Typus: HAL 95938.
- Elaphrium lancifolium* Schltld. (var.) b, Linnaea 17: 247, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Typus: HAL 95937.
- Elaphrium ovalifolium* Schltld., Linnaea 17: 248, 1843. Mexico: C.J.W. Schiede. Typus: HAL 95939.
- Elaphrium simplicifolium* Schltld., Linnaea 16: 532, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Typus: HAL 95940.
- Elaterium ribiflorum* Schltld., Linnaea 7: 388, 1832. Not at HAL.
- Elaterium trilobatum* Schltld., Linnaea 26: 639, 1855. Not at HAL.
- Epilobium repens* Schltld., Linnaea 12: 267, 1838. Mexico: ad radices montis Orizabae, ad aquaeductum prope el Palinque, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Holotypus: HAL 3867.
- Equisetum myriochaetum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 623, 1830. Mexico: in sylvaticis humidis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Feb. 1829. Typus: HAL 81867 (2 sheets).
- Eragrostis pilosa* (var.) *nutans* Schltld., Linnaea 27: 478, 1856. Not at HAL.
- Eragrostis megastachya* (var.) *verrucosa* Schltld., Linnaea 27: 477, 1856. Not at HAL.
- Eranthemum leuconeurum* Schltld., Linnaea 27: 500, 1856. Not at HAL.

- Erigeron trifidus* Schltld., Linnaea 27: 518, 1856. Not at HAL.
- Erigeron solidaginoides* Schltld., Linnaea 25: 213, 1852. Not at HAL.
- Eryngium canaliculatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 338, 1826. Not at HAL.
- Eryngium ciliatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 349, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Cisplatina et Rio grande do Sul, in campis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25176.
- Eryngium deppeanum* Cham. & Schltld., Linnaea 5: 207, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Holotypus: HAL 25194 (2 sheets).
- Eryngium elegans* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 348, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo et Rio Grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25177.
- Eryngium eriophorum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 342, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25178.
- Eryngium floribundum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 345, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25180.
- Eryngium junceum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 341, 1826. Brazil: Brasilia aequinoct., F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25181.
- Eryngium luzulaefolium* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 340, 1826. Not at HAL.
- Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 336, 1826. Not at HAL.
- Eryngium pristis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 337, 1826. Not at HAL.
- Eryngium sanguisorba* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 339, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Rio Grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25186.
- Eryngium schideanum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 206, 1830. Not at HAL.
- Eryngium serra* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 346, 1826. Not at HAL.
- Eryngium uncinatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 347, 1826. Not at HAL.
- Erythraea divaricata* Schltld., Bot. Zeitung 13: 920, 1855. Mexico: ad Huatusco, W. Schaffner. Holotypus: HAL 34834.
- Erythraea stricta* Schltld., Bot. Zeitung 13: 918, 1855. Mexico: prope Huatusco, W. Schaffner. Typus: HAL 34829.
- Erythraea tetramera* Schltld., Bot. Zeitung 13: 919, 1855. Mexico: Cuernavaca, W. Schaffner, Jul. 1853. Typus: HAL 84830.
- Escallonia chlorophylla* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 542, 1826. Not at HAL.
- Escallonia floribundus* (b) *montevidensis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 543, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98446.
- Escobedia laevis* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 108, 1830. Mexico: in dumetis apricis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98534.
- Escobedia linearis* Schltld., Linnaea 8: 246, 1833. Mexico: in graminosis prope Hacienda de la Laguna, Jul. 1829. Typus: HAL 97783 (2 sheets).
- Esenbeckia choisyoides* Schltld., Linnaea 27: 529, 1856. Mexico: Jalacingo, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98375. Mexico: frequentissima colitur hortis pagi S. Angel, Clavel, May 1831. Syntypus: HAL 98595 (2 sheets).
- Eucalyptus fabrorum* Schltld., Linnaea 20: 656, 1847. Australia: Montes Barossae, H. Behr, 1844/45. Holotypus: HAL 89676.
- Eucalyptus rostrata* Schltld., Linnaea 20: 655, 1847. Australia: Südaustralien, Montibus Barossae, H. Behr, 16 Mar. Holotypus: HAL 89675, nom. illeg., non *E. rostrata* Cav. 1797.

- Eugenia macrocarpa* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 560, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 81698 (3 sheets).
- Eugenia schiedeana* Schltld., Linnaea 13: 418, 1839. Not at HAL.
- Euphorbia campestris* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 84, 1830. Mexico: in planitie inter Tlachichuca et Tepetitlan, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 71081.
- Euphorbia lancifolia* Schltld., Linnaea 7: 143, 1832. Mexico: in sylvis umbrosis Misantlae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 43178.
- Euphorbia scotatum* Schltld., Linnaea 19: 250, 1846. Not at HAL.
- Euryanthe schiedeana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 225, 1830. Not at HAL.
- Eutaxia empetrifolia* Schltld., Linnaea 20: 667, 1847. Australia: an trockenem sandigen Orten bei Bethanien, H. Behr, 1844/45. Holotypus: HAL 52292.
- Evolvulus albiflorus* Schltld., Linnaea 26: 654, 1855. Not at HAL.
- Evolvulus cardiophyllus* Schltld., Linnaea 26: 653, 1855. Not at HAL.
- Excoecaria riparia* Schltld., Linnaea 7: 386, 1832. Mexico: frutex monoicus ad ripas rivulorum prope Zoncuanla et Jalapa, C.J.W. Schiede, Jun./Jul. 1929. Typus: HAL 98100.
- Exocarpus dasystachys* Schltld., Linnaea 20: 580, 1847. Australia: Südaustralien, am Ufer des Murrey, H. Behr, May, ca. 1845. Typus: HAL 91221.
- Exostemma formosum* Cham. & Schltld. (a) *leprosum* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 179, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97786 (2 sheets).
- Exostemma formosum* Cham. & Schltld. (b) *laeve* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 179, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97787 (2 sheets).
- Fedia orientalis* Schltld., Linnaea 17: 126, 1843. Syria: in lapidosis collinum pr. Aleppo, Th. Kotschy, 19 Apr. 1841. Typus: HAL 6940 (2 sheets).
- Ferula angulata* Schltld., Linnaea 17: 125, 1843. Kurdistan: in hiabitus saxosis altiorum regionum m. Gara et Th. Kotschy, Pl. alepp. kurd. moss. 403. Ed. Hohenacker 1843, Th. Kotschy, 6 Aug. 1841/1843. Syntypus: HAL 36377 A/B (2 sheets).
- Ferula angulata* Schltld., Linnaea 17: 125, 1843. Not at HAL.
- Fragaria californica* Schltld. & Cham., Linnaea 2: 20, 1827. Not at HAL.
- Fragaria mexicana* Schltld., Linnaea 13: 265, 1839. Mexico: in dumetis pr. San Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 60500. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg. Syntypus: HAL 60502. Mexico: prope Jalapam, raro, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 60498. Mexico: prope Atotonilco el chico, C.J.W. Schiede, Jun. 1830. Syntypus: HAL 60499. Mexico: in umbrosis prope la Encarnacion, C.J.W. Schiede, Jun. 1830. Syntypus: HAL 60501.
- Fragaria nilgerrensis* Schltld. ex J. Gray, Ann. Sci. Nat. Sér. IV, 8: 206, 1857. India orientalis (M. Nilagiri). In montibus Nilagiri (= Nilghiri) in colis: Nellamulli (= Nella Maully), fructus edulis. Sispara, F. Metz, Feb. 1854. Isolectotypus: HAL 81671.
- Fragosa biloba* Schltld., Linnaea 28: 478, 1856. Ex herb. Lechler. Holotypus: HAL 26845.
- Francisceae macrophylla* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 601, 1827. Not at HAL.
- Francisceae pauciflora* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 600, 1827. Not at HAL.
- Frankenia grandiflora* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 35, 1826. Not at HAL.

- Frankenia krebsii* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 36, 1826. South Africa: Prom. bon. spei, F.L. Krebs, 1829. Typus: HAL 98413.
- Fraxinus schiedeana* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 391, 1831. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, in calidioribus, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 64916.
- Friedlandia amoena* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 350, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, ubi ad Chapada et Barbacenam, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98372.
- Friedlandia buxifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 351, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98373.
- Friedlandia hirtella* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 352, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98635.
- Friedlandia hirsuta* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 352, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98374.
- Friedlandia stachyoides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 353, 1827. Not at HAL.
- Fuirena hexachaeta* Schltld., Linnaea 19: 68, 1846. Mexico: in paludibus vallis Tolucensis prope la Ventilla, C.J.W. Schiede, Sept. 1830. Holotypus: HAL 63545.
- Fumaria lichtensteinii* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 568, 1826. Not at HAL.
- Galactia brevistyla* Schltld., Linnaea 12: 288, 1838. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 71483.
- Galactia brevistyla* Schltld. (b) *strigosa* Schltld., Linnaea 12: 289, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna., C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 71480.
- Galium cotinoides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 227, 1828. Chile: in vicinia portus Talcahuano ad sepes, A. v. Chamisso. Holotypus: HAL 43125.
- Galium humile* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 226, 1828. Not at HAL.
- Galium jalapense* Schltld., Linnaea 9: 591, 1835. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 43116.
- Galium obtipum* Schltld. (f.) *latifolium* Schltld., Linnaea 9: 592, 1835. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 91210.
- Galium obtipum* Schltld. (f.) *angustifolia* Schltld., Linnaea 9: 592, 1835. Mexico: prope San Miguel del Soldado, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 43085.
- Galium jalapense* Schltld., Linnaea 9: 591, 1835. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 43115. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 43116.
- Gardenia ferox* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 198, 1829. Not at HAL.
- Gardenia formosa* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 200, 1829. Not at HAL.
- Gardenia schiedeana* Schltld., Linnaea 9: 601, 1835. Mexico: prope Actopan, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 98547.
- Gardenia sellowiana* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 197, 1829. Not at HAL.
- Gaudichaudia albida* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 217, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 74279.
- Gaultheria acuminata* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 126, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus: HAL 45637 (2 sheets).
- Gaultheria acuminata* Schltld. & Cham. (var.) *lancifolia* Schltld., Linnaea 19: 741, 1847. Mexico: temperiertes Mexico, F.E. Leibold, n. 14, 1839–44. Holotypus: HAL 47335.

- Gaultheria ciliata* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 126, 1830. Mexico: in monte Orizaba cum Solano tuberoso, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Holotypus: HAL 28582.
- Gaultheria ferruginea* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 524, 1826. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Lectotypus: HAL 43326.
- Gaylussacia incana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 536, 1826. Not at HAL.
- Gaylussacia pinifoliae* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 536, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98451.
- Gaylussacia pseudo-gaultheria* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 535, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 98449, 98450
- Gaylussacia pseudo-vaccinium* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 530, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98448.
- Gaylussacia rhododendron* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 533, 1826. Not at HAL.
- Gaylussacia rugosa* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 534, 1826. Not at HAL.
- Gaylussacia salicifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 532, 1826. Not at HAL.
- Gentiana aleutica* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 175, 1826. Not at HAL.
- Gentiana stelleriana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 188, 1826. Not at HAL.
- Gentiana rurikiana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 176, 1826. Sinus Escholzii et Sinus Laurentii, A. v. Chamisso. Typus: HAL 83665.
- Geochorda cuneata* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 11, 1828. Not at HAL.
- Geranium schiedeanum* Schltld., Linnaea 10: 253, 1836. Mexico: pr. La Joya, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 76344.
- Gerardia brachyphylla* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 15, 1828. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98536.
- Gerardia caesarea* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 17, 1828. Not at HAL.
- Gerardia communis* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 12, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, Feb. 1814–31. Typus: HAL 98539.
- Gerardia dasyantha* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 104, 1830. Mexico: Tierra fria, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98535.
- Gerardia genistifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 15, 1828. Not at HAL.
- Gerardia gnidioides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 16, 1828. Not at HAL.
- Gerardia linarioides* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 13, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98538.
- Gerontogea biflora* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 155, 1829. Not at HAL.
- Gerontogea deppeana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 169, 1830. Mexico: San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 65134 (2 sheets).
- Gerontogea microtheca* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 169, 1830. Mexico: Barranca de Tioselo, in umbrosis, C.J.W. Schiede, Sept. Holotypus: HAL 65136.
- Gerontogea racemosa* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 154, 1829. Not at HAL.
- Gesneria deppeana* Cham. & Schltld., Linnaea 5: 110, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 96235.
- Gladiolus boucheanus* Schltld., Linnaea 7: 488, 1832. Not at HAL.
- Glossostylis aspera* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 23, 1828. Not at HAL.
- Gongylocarpus rubricaulis* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 558, 1830. Mexico: circa Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98152.
- Gonolobus chloranthus* Schltld., Linnaea 8: 520, 1834. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede,

de, May 1829. Typus: HAL 98552.

Gonolobus fraternus Schltldl., Linnaea 8: 521, 1834. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98553.

Gonolobus nigrescens Schltldl., Linnaea 8: 522, 1834. Mexico: in calidioribus circa Hacienda de la Lagnuna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98555.

Gonolobus velutinus Schltldl., Linnaea 8: 521, 1834. Mexico: prope Loncuantla (Jalapa), C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 98554.

Gonzalagunia dicocca Cham. & Schltldl., Linnaea 4: 194, 1829. Not at HAL.

Gonzalagunia parviflora Schltldl. & Cham., Linnaea 6: 414, 1831. Not at HAL.

Goodenia albiflora Schltldl., Linnaea 20: 599, 1847. Not at HAL

Goodenia pinnatifida Schltldl., Linnaea 21: 459, 1848. Australia: H. Behr. Holotypus: HAL 18290.

Goodenia primulacea Schltldl., Linnaea 20: 601, 1847. Australia: in sandigen Boden bei Bethanien und anderen Orten, H. Behr, 1847. Typus: HAL 18291.

Grabowskia boerhaaviaefolia Schltldl., Linnaea 7: 72, 1832. Not at HAL.

Grevillea behrii Schltldl., Linnaea 20: 585, 1847. Australia: Adelaide, im Walde Pine forest bei Gawlertown, H. Behr, Oct./Nov. 1844. Typus: HAL 40155.

Grevillea lavandulacea Schltldl., Linnaea 20: 586, 1847. Australia: bei Adelaide im Walde Pine forest zwischen dem Gawler- und Lightriver, H. Behr, 1844/45. Lectotypus: HAL 40153. Isolectotypus: HAL 40154.

Guatteria candolleana Schltldl., Linnaea 9: 325, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 98455 (?). Label without locality and collector.

Guatteria hilariana Schltldl. (a) *angustifolia* Schltldl., Linnaea 9: 324, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 76469.

Guatteria hilariana Schltldl. (b) *latifolia* Schltldl., Linnaea 9: 324, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 76468.

Guatteria martiana Schltldl., Linnaea 9: 326, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypi: HAL 76471 (only fruits), 76473 (only leaves).

Guatteria pohliana Schltldl., Linnaea 9: 321, 1834. Not at HAL.

Guatteria sellowiana Schltldl., Linnaea 9: 323, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 76478.

Guettarda viburnoides Cham. & Schltldl., Linnaea 4: 182, 1828. Not at HAL.

Guettarda uruquensis Cham. & Schltldl., Linnaea 4: 183, 1829. Not at HAL.

Gymnandra gmelinii Cham. & Schltldl., Linnaea 2: 561, 1827, nom. superfl.

Gymnandra pallasii Cham. & Schltldl., Linnaea 2: 564, 1827, nom. superfl.

Gymnandra stelleri Cham. & Schltldl., Linnaea 2: 563, 1827, nom. superfl.

Gymnogramma lotta Schltldl., Adumbr. pl. 1: 15, 1825. Not at HAL.

Halgania strigosa Schltldl., Linnaea 20: 614, 1847. Australia: bei Bethanien auf sandigem Boden, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 40928.

Halgania tuberculosa Schltldl., Linnaea 20: 615, 1847. Australia: bei Bethanien, niedriger Strauch, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 40960.

Hampea integerrima Schltldl., Linnaea 11: 372, 1837. Mexico: prope Josocola, C.J.W. Schiede, May 1829. Lectotypus: HAL 18028. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 18139 (3 sheets).

Hedera alaris Schltldl., Linnaea 9: 605, 1834. Not at HAL.

- Hedyotis angustifolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 153, 1829. Not at HAL.
- Hedyotis serpyllacea* Schldtl., Linnaea 9: 599, 1835. Mexico: inter la Joya et San Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 65141.
- Heeria elegans* Schldtl., Linnaea 13: 432, 1839. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Holotypus: HAL 33208.
- Heimia myrtifolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 347, 1827. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 98157. Ex Hort. bot. Berol. 1827. Syntypus: HAL 98156.
- Helichrysum erosum* Schldtl., Linnaea 20: 595, 1847. Australia: H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98323.
- Helipterum corymbiflorum* Schldtl., Linnaea 21: 448, 1848. Australia: H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98324.
- Herpestis chrysantha* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 577, 1827. Not at HAL.
- Herpestis flagellaris* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 575, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98475.
- Herpestis flagellaris* Cham. & Schldtl. (b) *veronicaefolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 575, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98476.
- Herpestis lanigera* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 573, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98472.
- Herpestis monosticta* Schldtl., Linnaea 24: 695, 1851. Not at HAL.
- Herpestis serpylloides* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 574, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98473.
- Herpestis tenella* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 576, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98477.
- Herpestis tomentosa* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 106, 1830. Mexico: in arenosis prope Vera-Cruz, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jul. 1828/29. Typus: HAL 98478.
- Heteromorpha arborescens* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 385, 1826. South Africa: in regionibus occidentalibus Promontorii bonae spei ad Gamka et Cango fluvios Aprili mense et in terra Auteniquarum Januario mense, Mundt & Maire. Typi: HAL 98488–98490.
- Hibbertia glandulosa* Schldtl., Linnaea 20: 636, 1847. Australia: Bethanien, Scrubgegend, H. Behr, Sept. Typus: HAL 28044.
- Hillia brasiliensis* Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 201, 1829. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98546.
- Hirtella corymbosa* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 545, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98145.
- Hirtella floribunda* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 548, 1827. Not at HAL.
- Hisingera puberula* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 363, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98607 (2 sheets).
- Hoitzia nepetaefolia* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 385, 1831. Mexico: in pratis inter Misantlam et Colipam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 98484.
- Horkelia californica* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 26, 1827. Not at HAL.
- Hosta grandiflora* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 97, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. Typus: HAL 98485.
- Hydrocotyle asterias* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 361, 1826. Brazil: Brasilia tropica,

F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25147.

Hydrocotyle barbarossa Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 360, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle calliodus Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 371, 1826. South Africa: Prom. bon spei, montibus Tradouw, Mundt & Maire. Holotypus: HAL 97780 (2 sheets).

Hydrocotyle centella Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 375, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 363, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 364, 1826. Brazil: in provinciis Cisplatina et Rio grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Paratypus: HAL 25143.

Hydrocotyle mexicana Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 208, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 25141.

Hydrocotyle modesta Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 358, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, provincia Cisplatina prope Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25148.

Hydrocotyle montana Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 374, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle quinqueloba var. *glabra* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 360, 1826. Brazil: Brasilia aequinoct., F. Sellow, 1814–31. Paratypus: HAL 25126.

Hydrocotyle vulgaris (var.) *communis* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 356, 1826. Insula St. Catharina, A. v. Chamisso, Dec. 1815. Typus: HAL 25114.

Hydrotaenia ehrenbergii Schldtl., Linnaea 18: 666, 1845. Not at HAL (description only based on living material).

Hymenophyllum jalapense Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 619, 1830. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1829. Typus: HAL 81866 (2 sheets).

Hymenophyllum millefolium Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 620, 1830. Mexico: Cuesta grande de Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jan. 1829. Typus: HAL 81864.

Hymenophyllum pulchellum Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 618, 1830. Mexico: ad rupes umbrosas prope Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Nov. 1829. Typus: HAL 81863 (2 sheets).

Hyoscyamus pinnatifidus Schldtl., Linnaea 17: 127, 1843. Syria: in agris pr. Aleppum, raro, Th. Kotschy, 29 Apr. 1841. Typus: HAL 71958.

Hypericum anagaloides Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 127, 1828. Not at HAL.

Hypericum caespitosum Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 126, 1828. Chile: in Chile austr. montos. graminos. Talcahuano ad Antuco, E.F. Poeppig, Dec. 1827–29. Typus: HAL 14490.

Hypericum campestre Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 122, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, ad fluvium Rio Negro aliisque pluribus locis, F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 14522, 14523.

Hypericum caprifoliatum Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 125, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 14527.

Hypericum collinum Cham. & Schldtl., Linnaea 5: 219, 1830. Mexico: prope Jalapam, Serro colorado, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828/29. Syntypi: HAL 14513–14515.

Hypericum myrianthum Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 123, 1828. Brazil: Brasilia

meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 14757–14759.

Hypericum pratense Schltld. & Cham., Linnaea 5: 218, 1830. Mexico: in humidis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 96345.

Hypericum philonotis Schltld. & Cham., Linnaea 5: 219, 1830. Mexico: in humidis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 33807.

Hypericum tamariscinum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 124, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, in provincia Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 15024.

Hypopterygium astringens Schltld., Linnaea 17: 635, 1843 (≡ *Juliania adstringens* Schltld., l.c.: 636). Not at HAL.

Hypoxis vaginata Schltld., Linnaea 20: 568, 1847. Not at HAL.

Hyptis lilacina Schltld. & Cham., Linnaea 5: 101, 1830. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98583.

Hyptis procumbens Schltld. & Cham., Linnaea 5: 101, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna in umbrosis, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98584.

Ichthyosma wehdemanni Schltld., Linnaea 2: 671, 1827. Not at HAL.

Icica copal Schltld., Linnaea 5: 601, 1830. Mexico: Misantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Mar. Typus: HAL 98633 (3 sheets).

Indigofera acutifolia Schltld., Linnaea 12: 282, 1838. Mexico: ad aquas calidas pr. Grande, C. Ehrenberg, 1831–39. Holotypus: HAL 65293.

Indigofera hippocrepoides Schltld., Linnaea 12: 283, 1838. Mexico: Atotonilco el Chico, C. Ehrenberg, 1831–39. Holotypus: HAL 65294.

Indigofera lotoides Schltld., Linnaea 12: 282, 1838, nom. illeg. [≡ *Indigofera ehrenbergiana* Steud.]. Mexico: Mineral del Monte ad pedem rupis Aquilae, C. Ehrenberg, Sept./Oct. 1831–39. Holotypus: HAL 65295.

Indigofera ornithopodioides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 577, 1830. Mexico: in graminosis prope Vera-Cruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Holotypus: HAL 65289.

Inga canescens Schltld. & Cham., Linnaea 5: 592, 1830. Mexico: inter Marantial et Puente del Rey, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 41004.

Inga cognata Schltld., Linnaea 12: 560, 1838. Mexico: inter Colipam et littora maris, reg. calid., C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Holotypus: HAL 71728 (2 sheets).

Inga flexuosa Schltld., Linnaea 12: 559, 1838. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 98634 (3 sheets).

Inga jinicuil Schltld., Linnaea 12: 559, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98630 (2 sheets). Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98631 (2 sheets).

Inga leptoloba Schltld., Linnaea 12: 560, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98629 (3 sheets).

Inga pennatula Schltld. & Cham., Linnaea 5: 593, 1830. Mexico: in apricis Jalapam et in calidioribus prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug./Sept. 1828. Typus: HAL 64955 (2 sheets).

Ionidium lobelioides Schltld., Linnaea 12: 203, 1838. Not at HAL.

Ipomoea funis Schltld. & Cham., Linnaea 5: 118, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam atque in dumetis prope San Andres, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 98219 (2 sheets).

Isochilus majos Schltld. & Cham., Linnaea 6: 60, 1831. Mexico: in arboribus Jalapam,

F. Deppe & C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 79366 (2 sheets).

Isolepis multicaulis Schldtl., Linnaea 20: 562, 1847. Australia: auf Torfboden in einem felsigen Thal der Barossa Range, H. Behr, 1844/45. Holotypus: HAL 63543.

Ixodia alata Schldtl., Linnaea 20: 593, 1847. Australia: steile steinige Hänge im Berglande bei der Tonunda, H. Behr, Nov./Dec. 1844/45. Typus: HAL 98098.

Ixophorus schiedeana Schldtl., Linnaea 31: 421, 1861. Not at HAL.

Jaltomata edulis Schldtl., Ind. Sem. Hort. Hal: 7, 1838 [= *Saracha jaltomata* Schldtl.], Germany: cult. in Horto Botanico Halensi, D.F.L. v. Schlechtendal, ca. 1838. Typus: HAL 33675 (cultivated, seeds from Mexico).

Jasminum dianthifolium Van Houtte ex Schldtl., Linnaea 27: 513, 1856. Not at HAL.

Juncus radicans Schldtl., Linnaea 18: 442, 1845. Mexico: ad rivulos Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypi: HAL 64679 (3 Bögen), 71562. Mexico: in aquis lentis fluentibus Jalapae, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 71563. Mexico: Jalacingo, C.J.W. Schiede, Nov. 1828. Typus: HAL 70988.

Juniperus flaccida Schldtl., Linnaea 12: 495, 1838. Not at HAL.

Juniperus mexicana Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 77, 1830. Not at HAL.

Juniperus tetragona Schldtl., Linnaea 12: 495, 1838. Not at HAL.

Jussieua persicariaefolia Schldtl., Linnaea 12: 271, 1838. Mexico: in humidis umbrosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 69536.

Justicia aurea Schldtl., Linnaea 7: 393, 1832. Not at HAL.

Justicia callistachya Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 370, 1831. Not at HAL.

Justicia fulvicoma Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 369, 1831. Mexico: in dumetis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 71937.

Justicia haematoides Schldtl., Linnaea 7: 394, 1832. Not at HAL.

Justicia heterophylla Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 95, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 71938.

Justicia spicigera Schldtl., Linnaea 7: 395, 1832. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 98439.

Kadua acuminata Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 163, 1828. Not at HAL.

Kadua affinis Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 164, 1829. Not at HAL.

Kadua cookiana Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 158, 1829. In Insula O-Waihi, Karakaoa, A. v. Chamisso, 1815–18. Typus: HAL 76737.

Kadua cordata Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 160, 1829. Not at HAL.

Kadua menziesiana Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 160, 1829. Not at HAL.

Kadua romanzoffiensis Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 162, 1829. Insula coralligena Romanzoffii, A. v. Chamisso, 1815–18. Typus: HAL 76410.

Kardanoglyphos nana Schldtl., Linnaea 28: 472, 1856. Peru: Agapata, W. Lechler, Aug. 1854. Holotypus: HAL 85363.

Karwinskia affinis Schldtl., Linnaea 15: 460, 1841. Mexico: in solo calcareo aridissimo a balneis calidis pr. Grande boream versus, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 50608.

Karwinskia mollis Schldtl., Linnaea 15: 461, 1841. Mexico: Barranca de Sta. Maria, in reg. temp., C.J.W. Schiede, Jun. 1831. Typus: HAL 21792 (4 sheets).

Karwinskia sessilifolia Schldtl., Linnaea 15: 461, 1841. Mexico: ad Hacienda de S.

Gabriel, C.J.W. Schiede, Nov. 1836. Typus: HAL 50607 (3 sheets).

Karwinskia subcordata Schltld., Linnaea 15: 462, 1841. Mexico: inter Izmiquilpan et Zimapan, C.J.W. Schiede, Jun. Typus: HAL 50602 (3 sheets).

Klugia azurea Schltld., Linnaea 8: 248, 1833. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 98436.

Kohautia senegalensis Cham. & Schltld., Linnaea 4: 156, 1829. Not at HAL.

Lacis foeniculacea Schltld. & Cham., Linnaea 6: 42, 1831. Not at HAL.

Lamourouxia cordata Schltld. & Cham., Linnaea 5: 103, 1830. Mexico: inter Tenestepeque et Quantotolapa, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98537.

Lasiocephalus ovatus Schltld., Mag. Ges. Nat. Freunde Berlin 8: 309, 1814. Not at HAL.

Lasiocephalus lingulatus Schltld., Mag. Ges. Nat. Freunde Berlin 8: 309, 1814. Not at HAL.

Laurus longipes Schltld., Linnaea 7: 390, 1832. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 97803.

Leiphaimos parasitica Schltld. & Cham., Linnaea 6: 387, 1831. Mexico: in arbore putrido sylvae Papantlensis, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 42202.

Lepidium owaihiense Cham. & Schltld., Linnaea 1: 32, 1826. USA (Hawaii): in insulis Sandwich, O-Wahu, A. v. Chamisso, 1816. Holotypus: HAL 84102.

Leptospermum myrsinoides Schltld., Linnaea 20: 653, 1847. Australia: zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 89664.

Licania humilis Cham. & Schltld., Linnaea 2: 549, 1827. Not at HAL.

Licania turiuva Cham. & Schltld., Linnaea 2: 550, 1827. Not at HAL.

Lichtensteinia lacera Cham. & Schltld., Linnaea 1: 395, 1826. South Africa: Prom. bon. spei. Typus: HAL 97779 (3 sheets).

Lichtensteinia pyrethrifolia Cham. & Schltld., Linnaea 1: 397, 1826. Not at HAL.

Lichtensteinia trifida Cham. & Schltld., Linnaea 1: 396, 1826. Not at HAL.

Ligusticum gmelini Cham. & Schltld., Linnaea 1: 391, 1826. Insula Chamissonis, A. v. Chamisso, Aug. 1816. Typus: HAL 98529.

Linostachys padifolia Schltld., Linnaea 19: 235, 1846. [= *Acalypha schlechtendaliana* Muell.-Arg.]. Not at HAL

Linosyris mexicana Schltld., Ind. Sem. Hort. Hal.: 9, 1839 and Linnaea 14: Litt.-Ber. 128, 1840. Not at HAL

Linum schiedeanum Schltld. & Cham., Linnaea 5: 234, 1830. Mexico: loci diversi specimen mixtum, C.J.W. Schiede, 1828/29. Syntypus: HAL 71002 (2 sheets).

Linum tenellum Schltld. & Cham., Linnaea 5: 235, 1830. Mexico: prope Jalapam in sylvaticis, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 71003. Mexico: in graminosis et dumetis apricis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 70984.

Lippia myriocephala Schltld. & Cham., Linnaea 5: 98, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Typus: HAL 98261.

Lisianthus nigrescens Schltld. & Cham., Linnaea 6: 388, 1831. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Holotypus: HAL 22070.

Lisianthus pedunculatus Cham. & Schltld., Linnaea 1: 199, 1826. Brazil: in regionibus inferioribus, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 21500.

Lisianthus saponarioides Schltld. & Cham., Linnaea 6: 389, 1831. Mexico: ad margines sylvarum Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Holotypus: HAL 22068.

Isoyopus: HAL 22069.

Lisianthus speciosus Cham. & Schltld., Linnaea 1: 198, 1826. Brazil: in regionibus inferioribus, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 22052.

Lobelia grandidentatus Schltld., Linnaea 9: 262, 1834. Not at HAL.

Lobopogon ericoides Schltld., Linnaea 20: 620, 1847. Not at HAL.

Loasa rhoeadifolia Schltld., Linnaea 14: 382, 1841. Not at HAL.

Logania linifolia Schltld., Linnaea 20: 605, 1847. Australia: an felsigen Stellen, H. Behr. Typus: HAL 69877.

Lopezia albiflora Schltld., Linnaea 24: 696, 1851. Not at HAL.

Lopezia trichota Schltld., Linnaea 12: 273, 1838. Mexico: Mineral del Monte, Cuesta blanca in porphyriticis, C. Ehrenberg, Aug. 1836. Typus: HAL 28104.

Loranthus buxifolius Cham. & Schltld., Linnaea 3: 207, 1828. Chile: circa Talcaguano, A. v. Chamisso, 1816. Typus: HAL 98586.

Loranthus deppeanus Schltld. & Cham., Linnaea 5: 172, 1830. Mexico: in arboribus parasiticus prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 97773 (2 sheets).

Loranthus elegans Cham. & Schltld., Linnaea 3: 209, 1828. South Africa: Prom. bon. spei, F.L. Krebs, 1829. Typus: HAL 98469.

Loranthus flagellaris Cham. & Schltld., Linnaea 3: 213, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98468.

Loranthus formosus Cham. & Schltld., Linnaea 3: 211, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98467.

Loranthus oleaeifolius Cham. & Schltld., Linnaea 3: 209, 1828. Not at HAL.

Loranthus philippensis Cham. & Schltld., Linnaea 3: 204, 1828. Philippines: Tierra alta Luconiae, A. v. Chamisso, 1817/18. Typus: HAL 98466.

Loranthus podopterus Cham. & Schltld., Linnaea 3: 218, 1828. Not at HAL.

Loranthus quercicola Schltld. & Cham., Linnaea 5: 173, 1830. Mexico: in ramis Quercuum aliarumque arborum parasiticus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98465.

Loranthus radicans Cham. & Schltld., Linnaea 3: 217, 1828. Not at HAL.

Loranthus retusus Cham. & Schltld., Linnaea 3: 215, 1828. Not at HAL.

Loranthus salicifolius Cham. & Schltld., Linnaea 3: 216, 1828. Not at HAL.

Loranthus schiedeanus Schltld. & Cham., Linnaea 5: 172, 1830. Mexico: prope Jalapam, F. Deppe & C.J.W. Schiede. Typus: HAL 98456 (2 sheets).

Loranthus thyrsiflorus Cham. & Schltld., Linnaea 3: 214, 1828. Not at HAL.

Lotus coccineus Schltld., Linnaea 21: 452, 1848. Australia: auf sandigen Äckern bei Bethanien, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 69717.

Loudonia behrii Schltld., Linnaea 20: 648, 1847. Australia: auf unfruchtbarem Sandboden, gesellschaftlich, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 98153.

Lupinus campestris Schltld. & Cham., Linnaea 5: 589, 1830. Mexico: in los Llanos inter Perote et Tlachichuca, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 5–6 Sept. 1828. Typus: HAL 33811.

Lupinus ehrenbergii Schltld., Linnaea 12: 334, 1839. Mexico: Mineral del Monte (Real del Monte), C. Ehrenberg, 1831–1839. Typus: HAL 33812.

Lupinus leptophyllus Schltld. & Cham., Linnaea 5: 589, 1830. Mexico: inter Tlachichuca et Tepetitlan, in Llanos, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 6. Sept. 1828.

Typus: HAL 33813.

Lupinus uncinatus Schltld., Linnaea 12: 333, 1838. Mexico: Mineral del Monte (Real del Monte), C. Ehrenberg, 1831–1839. Typus: HAL 33817.

Lupinus vaginatus Schltld. & Cham., Linnaea 5: 590, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 7–9 Sept. 1828. Typus: HAL 3881 (2 sheets).

Lychnis pulchra Schltld. & Cham., Linnaea 5: 234, 1830. Not at HAL.

Lycium cestroides Schltld., Linnaea 7: 70, 1832. Not at HAL.

Lycium ciliatum Schltld., Linnaea 7: 69, 1832. Not at HAL.

Lycopodium nitens Schltld. & Cham., Linnaea 5: 623, 1830. Mexico: in arboribus vetustis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1829. Typus: HAL 81862.

Lycopodium pithyoides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 623, 1830. Not at HAL.

Lycopodium rubrum Cham. & Schltld., Linnaea 8: 389, 1833. Brazil: F. Sellow, Nov. 1831. Typus: HAL 81861.

Lycopodium pumilum Schltld., Adumbr. pl. 1: 6, 1825, nom. superfl.

Lyncea hispida Schltld. & Cham., Linnaea 5: 109, 1830. Mexico: in sylvaticis prope Hacienda de la Laguna, Sept. 1828. Typus: HAL 97784 (2 sheets).

Lythrum puniceifolium Cham. & Schltld., Linnaea 2: 356, 1827. Not at HAL.

Machaerophorus matthioides Schltld., Linnaea 28: 469, 1856. Peru: in rupestr. Cord. de Tuno, W. Lechler, May 1854. Holotypus: HAL 85367.

Machaonia spinosa Cham. & Schltld., Linnaea 4: 2, 1829. Not at HAL.

Magnolia schiedeana Schltld., Bot. Zeitung 22: 144, 1864. Not at HAL.

Malaxis majanthemifolia Schltld. & Cham., Linnaea 6: 59, 1831. Not at HAL.

Malva behriana Schltld., Linnaea 20: 633, 1847. Australia: im Thale des Murray-Flusses, H. Behr, Jul. 1844/45. Typus: HAL 98406.

Malva geranioides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 226, 1830. Mexico: Llanos de Porte, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 43666.

Malva ribifolia Schltld., Linnaea 11: 351, 1837. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 43664.

Malvaviscus sepium Schltld., Linnaea 5: 227, 1830. Mexico: in sepibus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 98400.

Manettia ciliata Cham. & Schltld., Linnaea 4: 176, 1829. Not at HAL.

Manettia fimbriata Cham. & Schltld., Linnaea 4: 173, 1829. Not at HAL.

Manettia glabra Cham. & Schltld., Linnaea 4: 169, 1829. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98544.

Manettia gracilis Cham. & Schltld., Linnaea 4: 169, 1829. Not at HAL.

Manettia pseudodiodia Cham. & Schltld., Linnaea 4: 174, 1829. Not at HAL.

Manettia pubescens Cham. & Schltld., Linnaea 4: 170, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98545.

Manettia villosa Cham. & Schltld., Linnaea 4: 172, 1829. Not at HAL.

Margaranthus solanacea Schltld., Index Sem. Hort. Hal.: 8, 1838 and Linnaea 13: Litt.-Ber. 99, 1839. Germany: cult. in Horto Botanico Halensi, D.F.L. v. Schlechtendal, 1838. Typus: HAL 33693 [e seminis in Mexico locis calidioribus, coll. C. Ehrenberg].

Mariscus bracteosus Schltld., Linnaea 25: 164, 1852. Not at HAL.

Mariscus schaffnerianus Schltld., Linnaea 26: 379, 1854. Not at HAL.

- Martynia triloba*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 5: 121, 1830. Mexico: prope Veracruz, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jul. 1828. Typus: HAL 43262.
- Melaleuca curvifolia*** Schltld., *Linnaea* 20: 654, 1847. Australia: am Lightriver, H. Behr, Feb. 1844/45. Typus: HAL 98163.
- Melanthium bergii*** Schltld., *Linnaea* 1: 83, 1826. Not at HAL.
- Melanthium marginatum*** Schltld., *Linnaea* 1: 84, 1826. Not at HAL.
- Melastoma anisochitron*** Schltld., *Linnaea* 13: 427, 1839. Not at HAL.
- Melastoma cornoides*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 5: 563, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828 and Apr. 1829. Typus: HAL 65112.
- Melastoma glaberrimum*** Schltld., *Linnaea* 13: 421, 1839. Mexico: inter Tioselo et Jicochimalco vel in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May/Aug. 1829–36. Typus: HAL 65110 (2 sheets).
- Melastoma glaucocarpum*** Schltld., *Linnaea* 13: 421, 1839. Not at HAL.
- Melastoma globuliflorum*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 5: 564, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, 5 Aug. 1828–36. Typus: HAL 65105 (2 sheets).
- Melastoma laxiflorum*** Schltld., *Linnaea* 13: 426, 1839. Not at HAL.
- Melastoma lineatum*** Schltld., *Linnaea* 13: 423, 1839. Not at HAL.
- Melastoma petiolare*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 5: 562, 1830. Not at HAL.
- Melastoma scorpioides*** Schltld., *Linnaea* 5: 564, 1830. Not at HAL.
- Melastoma sylvaticum*** Schltld., *Linnaea* 13: 422, 1839. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May 1828/29. Typus: HAL 65109.
- Metastelma suaveolens*** Schltld., *Linnaea* 26: 667, 1855. Not at HAL.
- Meyenia corymbosa*** Schltld., *Linnaea* 8: 252, 1833. Mexico: prope Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 75351.
- Meyenia fasciculata*** Schltld., *Linnaea* 8: 251, 1833. C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 75356 (2 sheets).
- Microtis frutetorum*** Schltld., *Linnaea* 20: 568, 1847. Not at HAL.
- Millingtonia alba*** Schltld., *Linnaea* 16: 395, 1842. Not at HAL.
- Mimosa pumila*** Schltld., *Linnaea* 12: 557, 1838. Mexico: in solo calcareo ad Reglam occid. versus, C. Ehrenberg, 1836. Holotypus: HAL 64731.
- Mimosa racemosa*** Schltld., *Linnaea* 12: 557, 1838. Not at HAL.
- Mimosa tricephala*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 5: 591, 1830. Mexico: inter Laguna Verde et Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Holotypus: HAL 64977.
- Misanteca capitata*** Schltld. & Cham., *Linnaea* 6: 367, 1831. Mexico: in sylvis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 1828/29. Typus: HAL 98333.
- Mitracarpum humboldtianum*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 3: 358, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98320.
- Mitracarpum sellowianum*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 3: 361, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo et Rio Grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98318.
- Mitracarpum torresianum*** Cham. & Schltld., *Linnaea* 3: 360, 1828. In Insula Guajan ex insulis Marianis, A. v. Chamisso, Nov. 1817. Typus: HAL 98316.
- Mitrospora wagneriana*** Schltld., *Linnaea* 26: 129, 1854. Not at HAL.
- Monnina angustifolia*** Schltld., *Linnaea* 14: 380, 1840. Not at HAL.

- Monnina euonymoides* Schltld., Linnaea 14: 380, 1840. Not at HAL.
- Monnina sylvatica* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 231, 1830. Mexico: in sylvis Jalapae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Oct. Typus: HAL 98386.
- Moronobea globulifera* Schltld., Linnaea 8: 190, 1833. Not at HAL.
- Moronobea montana* Schltld., Linnaea 8: 189, 1833. Not at HAL.
- Myoporum punctulatum* Schltld., Linnaea 20: 613, 1847. Not at HAL.
- Myosotis hispida* Schltld., Linnaea 31: 338, 1861. Not at HAL.
- Myrcia aromatica* Schltld., Linnaea 13: 415, 1839. Not at HAL.
- Myrcia rufidula* Schltld., Linnaea 13: 416, 1839. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Holotypus: HAL 89813 (3 sheets).
- Myrsine myricoides* Schltld., Linnaea 8: 525, 1833/34. Mexico: Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 89723 (5 sheets).
- Myrtus capuli* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 561, 1830. [*Eugenia capuli* a *micrantha* Berg]. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 79362.
- Myrtus tabasco* Willd. ex Schltld. & Cham., Linnaea 5: 559, 1830. Not at HAL.
- Myrtus trunciflora* Schltld., Linnaea 5: 561, 1830. Mexico: inter Mesachica et Mapilque, Dec. 1828 et Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 89744/1+2 (2 sheets).
- Nasturtium impatiens* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 212, 1830. Mexico: in spelunca regionis subnivalis montis Orizabae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 996.
- Nasturtium orizabae* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 212, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 11429.
- Nertera alsinoides* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 413, 1831. Mexico: Cuesta grande de Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Typus: HAL 69875.
- Nicolsonia villosa* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 584, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 51032.
- Nicotiana mexicana* Schltld., Ind. Sem. Hort. Hal., 1840 and Linnaea 15: Litt.-Ber. 95, 1841. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 98482.
- Niphogeton andicola* Schltld., Linnaea 28: 481, 1856. Peru: Agapata ad limites niv. atern. summ. Cordillier., W. Lechler, Jun. 1854. Typus: HAL 26884.
- Nortenia thouarsii* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 18, 1828. Not at HAL.
- Oenothera cuprea* Schltld., Linnaea 12: 269, 1838. Mexico: in prato elatiore montis Orizabae cum Veratro frigido, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 43418.
- Oenothera littoralis* Schltld., Linnaea 12: 268, 1838. Mexico: ad litora maris arenosa inter Tecolutam et Nautlam, C.J.W. Schiede (non C. Ehrenberg), Feb. 1829. Typus: HAL 43355.
- Okenia hypogaea* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 92, 1830. Not at HAL.
- Opercularia scabrada* Schltld., Linnaea 20: 604, 1847. Australia: an steinigten Orten in Scrubgegenden, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98342.
- Ophioglossum bergianum* Schltld., Adumbr. pl. 1: 10, 1825. Not at HAL.
- Ophioglossum moluccanum* Schltld., Adumbr. pl. 1: 9, 1825. Not at HAL.
- Ophioglossum capense* Schltld. (a) *regulare* Schltld., Adumbr. pl. 1: 9, 1825. [= *Ophioglossum regulare* (Schltld.) C. Christ]. Not at HAL.
- Ophioglossum capense* Schltld. (b) *nudicaule* Schltld., Adumbr. pl. 1: 9, 1825. South Africa: Cap. bon. sp., Mundt & Maire. Typus: HAL 81860.

- Orplismenus gracilis* Schltld., Linnaea 24: 649, 1851. Not at HAL.
- Orchis latifolia* (var.) *beeringeriana* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 26, 1828. Kamtschatka, A. v. Chamisso. Typus: HAL 63527.
- Oreas involucrata* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 30, 1826. Unalashka Aleutorum, A. v. Chamisso, 1816–17. Lectotypus: HAL 84097.
- Orobanche rossica* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 132, 1828. Not at HAL.
- Oxalis acuminata* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 224, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 98149. Mexico: F. Deppe & C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 98150.
- Oxalis ehrenbergii* Schltld. in Otto & Dietr., Allgem. Gartenzeitung 6: 313, 1838. Not at HAL.
- Oxalis herpestica* Schltld., Linnaea 27: 525, 1855. Not at HAL.
- Palicourea blanchetiana* Schltld., Linnaea 28: 531, 1856. Brazil: J.S. Blanchet, 1828–56. Syntypi: HAL 98305–98306.
- Palicourea breviflora* Schltld., Linnaea 28: 530, 1856. Brazil: Bueck. Typus: HAL 98307.
- Palicourea divaricata* Schltld., Linnaea 28: 529, 1856. Brazil: J.S. Blanchet, 1825–56. Typus: HAL 98308.
- Palicourea fastigiata* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 16, 1829. Not at HAL.
- Palicourea nicotianaefolia* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 18, 1829. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98300.
- Palicourea tetraphylla* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 17, 1829. Not at HAL.
- Palicourea velutina* Schltld., Linnaea 28: 528, 1856. Brazil: Blanchet, no. 3240, J.S. Blanchet, 1828–56. Syntypus: HAL 98309. Brazil: Blanchet, no. 3768, J.S. Blanchet, 1828–56. Syntypus: HAL 98310.
- Panax macrocarpus* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 404, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98435.
- Panax vinosus* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 403, 1828. Not at HAL.
- Panicum bipustulatum* Schltld., Linnaea 26: 135, 1854. Not at HAL.
- Panicum oliganthum* Schltld., Linnaea 26: 137, 1854. Not at HAL.
- Panicum zenkowskii* Rupr. ex Schltld., Linnaea 27: 477, 1856. Not at HAL.
- Parnassia kotzebuei* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 549, 1826. Not at HAL.
- Paronychia polycnemoides* Schltld., Linnaea 13: 407, 1839. Not at HAL.
- Paspalum campestre* Schltld., Linnaea 26: 131, 1854. Not at HAL.
- Paspalum gracilis* Schltld., Linnaea 26: 134, 1854. Not at HAL.
- Paspalum savannarum* Schltld., Linnaea 26: 132, 1854. Not at HAL.
- Paspalum wagneriana* Schltld., Linnaea 26: 133, 1854. Not at HAL.
- Paspalum lividum* Trin. ex Schltld., Linnaea 26: 383, 1852. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 4839.
- Passiflora acerifolia* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 89, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 47803.
- Passiflora sexocellata* Schltld., Linnaea 27: 521, 1856. Not at HAL.
- Passiflora sicyoides* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 88, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 47795 (2 sheets).
- Paullinia clavigera* Schltld., Linnaea 10: 239, 1836. Not at HAL.
- Paullinia costata* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 216, 1830. Not at HAL.
- Pavonia lanceolata* Schltld., Linnaea 11: 356, 1837. Mexico: Cuesta grande de

- Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 98401.
- Pavonia rosea* Schldtl., Linnaea 11: 355, 1837. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98606 (2 sheets).
- Pedicularis orizabae* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 103, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 56871.
- Pedilanthus calcaratus* Schldtl., Linnaea 19: 255, 1846. Not at HAL.
- Pedilanthus cymbiferus* Schldtl., Linnaea 19: 253, 1847. Mexico: tropisches Mexico, F.E. Leibold, 1839. Typus: HAL 81732.
- Pentataphrus behrii* Schldtl., Linnaea 20: 618, 1847. Australia: an sandigen und steinigen Orten, H. Behr, Aug. 1845. Typus: HAL 60107.
- Peperomia asarifolia* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 75, 1830. Mexico: ad rupes humidias, C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 98182.
- Peperomia dendrophila* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 74, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98179. Mexico: in arboribus Jalapae, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98180. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98181.
- Peperomia deppiana* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 75, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 98183.
- Perilomia cordifolia* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 374, 1831. Mexico: in sylvis umbrosis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Mar. 1828/29. Typus: HAL 98256.
- Perilomia fruticosa* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 102, 1830. Mexico: Jalapae in dumetis, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828/29. Typus: HAL 98257.
- Persea amplexicaulis* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 90, 1830. Mexico: Serro colorado. Typus: HAL 98198.
- Persea drymifolia* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 365, 1831. Mexico: Papantla, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 97802.
- Peucedanum virgatum* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 392, 1826. South Africa: in Promontorii bonae spei montibus Tradouw, Mundt & Maire, 1815-31. Typus: HAL 97781 (2 sheets).
- Phaseolus anisotrichus* Schldtl., Linnaea 12: 326, 1838. Mexico: ad Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 55313. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus: HAL 55314. Mexico: prope Papantlam, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Syntypus: HAL 55315.
- Phaseolus glaber* Schldtl., Linnaea 12: 327, 1838. Mexico: in dumetis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 54633. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 54634.
- Phaseolus obvallatus* Schldtl., Linnaea 12: 328, 1838. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1831-39. Lectotypus: HAL 55316.
- Phaseolus parviflorus* Schldtl., Linnaea 12: 325, 1838. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834-36. Typus: HAL 64946.
- Phaseolus schideanus* Schldtl., Linnaea 12: 323, 1838. Mexico: in graminosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 64947 (2 sheets). Mexico: in versuris prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 64948.
- Philadelphus affinis* Schldtl., Linnaea 13: 419, 1839. Mexico: Barranca de la Haci-

enda del Carmen, C. Ehrenberg, Aug. 1837. Typus: HAL 98151.

Philadelphus mexicanus Schltld., Linnaea 13: 418, 1839. Mexico: colitur Jalapae et in sepibus sponte quasi crescit, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 98628 (2 sheets).

Physalis glutinosa Schltld., Linnaea 19: 310, 1846. Mexico: distr. Mineral del Monte, Cuesta blanca. In humosa terra inter rupes porphyriticas ferratas, C. Ehrenberg, Jul. 1836. Typus: HAL 42219 (2 sheets).

Physalis maurelloides Schltld., Linnaea 27: 508, 1856. Not at HAL.

Physalis nicandroides Schltld., Linnaea 19: 311, 1846. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 42228. Mexico: pr. Reglam, C. Ehrenberg, Sept. 1835. Syntypus: HAL 42229.

Physalis viscosa (b) *sinuato-dentata* Schltld., Linnaea 19: 309, 1846. Mexico: C. Ehrenberg. Typus: HAL 42235.

Pilea peplidifolia Schltld., Linnaea 27: 496, 1856. '*Pilea muscosa* hort., ex patre', 1832. Syntypus: HAL 98190. Brazil: Mart., Herb. Fl. Bras. 952. Syntypus: HAL 98189. Mexico: Papantla et prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. Syntypus: HAL 98188.

Pimelea behrii Schltld., Linnaea 20: 583, 1847. Australia: zwischen dem Gawler- und Lightriver, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 39386.

Pimelea dichotoma Schltld., Linnaea 20: 581, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (sandplains), bei Benthaniens, H. Behr, Nov. 1844. Typus: HAL 36762.

Pimelea myrtifolia Schltld., Linnaea 20: 582, 1847. Australia: an sandigen Orten, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 39383.

Pimelea preisii Schltld., Linnaea 20: 581, 1847, nom. illeg [= *P. schlechtendaliana* Meisner]. Australia: auf Sandboden, H. Behr, Oct./Nov. 1844. Typus: HAL 39385.

Pimelea viminea Schltld., Linnaea 20: 583, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (sandplains), bei Benthaniens, H. Behr, Jan. 1845. Typus: HAL 39384.

Pinguicula caudata Schltld., Linnaea 7: 393, 1832. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 73476.

Pinguicula lilacina Schltld. & Cham., Linnaea 5: 94, 1830. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 42200.

Pinus ayacahuite C. Ehrenberg ex Schltld., Linnaea 12: 492, 1838. Not at HAL.

Pinus leiophylla Schltld. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Mexico: inter Cruz blanca et Jalacingo, reg. frig., C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 64903.

Pinus patula Schltld. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Mexico: inter Cruz blanca et Jalacingo et Halpays de la Joya, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Nov. 1828. Lectotypus: HAL 33087 (1/4). Isolectotypi: HAL 33087 (2/4-4/4).

Pinus teocote Schltld. & Cham., Linnaea 5: 76, 1830. Mexico: ad radices et in adscensu montis Orizabae, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 64906.

Piper dendrophila Schltld., Linnaea 7: 138, 1832. Not at HAL.

Piper melastomoides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 74, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, Aug. 1828. Syntypus: HAL 97797 (2 sheets). Mexico: Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 97798 (2 sheets).

Piper schiedeana Schltld., Linnaea 7: 138, 1832. Not at HAL.

Piper tiliaefolium Schltld. & Cham., Linnaea 6: 352, 1831. Mexico: in sylvis Misantlae, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 97796 (3 sheets).

- Pitcairnia kegeliana* Schldtl., Linnaea 24: 664, 1851. Not at HAL.
- Plantago camtschatica* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 165, 1826. Not at HAL.
- Plantago cariacea* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 171, 1826. Not at HAL.
- Plantago macrocarpa* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 166, 1826. Not at HAL.
- Plantago princeps* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 167, 1826. Not at HAL.
- Plantago truncata* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 170, 1826. Not at HAL.
- Plantago tumida* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 168, 1826. Not at HAL.
- Plumeria xanthostoma* Schldtl., Linnaea 8: 523, 1834. Mexico: Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 83850.
- Poa nemoralis* (var.) *depauperata* Schldtl., Linnaea 24: 651, 1851. Not at HAL.
- Polycarpaea cuspidata* Schldtl., Linnaea 13: 408, 1839. Not at HAL.
- Polygala pulchella* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 230, 1830. Not at HAL.
- Polygala strigulosa* Schldtl., Linnaea 14: 160, 1840. Not at HAL.
- Polygonum adenophyllum* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 48, 1828. South Africa: Cape, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98304.
- Polygonum aviculare* (var.) *montevidense* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 50, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, in littore prope Montevideo, F. Sellow, 1814–20. Typus: HAL 53997.
- Polygonum diospyrifolium* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 47, 1828. Brazil: in Brasiliae tropicae, provincia Rio de Janeiro in palustribus prope Novum Friburgicum, H.K. Beyrich, Jan. 1822/23. Typus: HAL 98321.
- Polygonum meisnerianum* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 40, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1814–28. Typus: HAL 53995.
- Polygonum paronychia* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 51, 1828. USA: California, San Francisco, A. v. Chamisso, 1816. Typus: HAL 98322.
- Polygonum stypticum* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 53, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, in arenosis humidusculis ad fluvium Rio Negro, F. Sellow, 1814–28. Typus: HAL 53996.
- Polygonum virgatum* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 45, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–28. Typus: HAL 53998.
- Polypodium bergianum* Schldtl., Adumbr. pl. 1: 20, 1825. Not at HAL.
- Polypodium fallax* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 609, 1830. Mexico: in truncis arborum Misantlae, regionis subcalidae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Feb. 1829. Typus: HAL 81858.
- Polypodium fraternum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 608, 1830. Mexico: in truncis arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81855 (2 sheets).
- Polypodium furfuraceum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 607, 1830. Mexico: ad truncos arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81856 (2 sheets).
- Polypodium plebejum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 607, 1830. Mexico: in truncis arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81853 (2 sheets).
- Polypodium puperulum* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 607, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede & F. Deppe, 1828. Typus: HAL 81852.
- Potamogeton americanus* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 226, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton denticulatus* Mohl ex Schldtl., Bot. Zeitung 14: 783, 1856. Not at HAL.

- Potamogeton gaudichaudii* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 197, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton intermedius* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 221, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton mascarensis* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 228, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton nuttallii* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 226, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton owaihiensis* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 228, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton occidentalis* Sieber ex Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 224, 1827. Martini-que: Sieber, Fl. martin. 275, Sieber. Isolectotypus: HAL 63363
- Potamogeton pensylvanicus* Willd. ex Schltdl., Linnaea 2: 227, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton polygonus* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 184, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–28. Isolectotypus: HAL 63528.
- Potamogeton proteus* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 197, 1827, nom. superfl.
- Potamogeton syriacus* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 227, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton thunbergii* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 221, 1827. South Africa: Prom. b. spei, Hartebeestkraal prope Brackri, Mundt & Maire. Lectotypus: HAL 63539.
- Potamogeton trichoides* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 175, 1827. Not at HAL.
- Potentilla ehrenbergiana* Schltdl., Linnaea 13: 261, 1839. Mexico: Mineral del Monte, Huajalote, C. Ehrenberg, 1831–40. Typus: HAL 98624 (2 sheets).
- Potentilla elegans* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 22, 1827. Ex plantis Redowskianis Kamtschaticis, A. v. Chamisso, 7 Aug. 1816/17. Typus: HAL 98246.
- Potentilla fusca* Schltdl., Linnaea 13: 262, 1839. Mexico: in pratis alpestribus Cumbre de las papas, C.J.W. Schiede, Jun. 1831. Typus: HAL 98159.
- Potentilla hiemalis* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 572, 1830. Mexico: Cruz blanca, C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 98148.
- Potentilla nivea* (var.) *lapponica* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 21, 1827. Not at HAL.
- Potentilla nivea* (var.) *vulgaris* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 21, 1827. Not at HAL.
- Pothos podophyllus* Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 22, 1831. Mexico: in sylvis umbrosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1829. Holotypus: HAL 79368 (2 sheets).
- Prostanthera behriana* Schltdl., Linnaea 20: 610, 1847. Australia: im felsigen Querthale der Tonunda, H. Behr, Nov. Holotypus: HAL 29918.
- Prunus laurifolius* Schltdl., Linnaea 13: 91 et 404, 1839. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, regionis temperatae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Syntypus: HAL 60495. Mexico: sine loc., C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 60494 (3 sheets).
- Prunus samydoides* Schltdl., Linnaea 13: 92 et 404, 1839. Mexico: Cerrania de Zoncoantla, confinio Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 60496 (2 sheets). Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 60497 (2 sheets).
- Psoralea australasica* Schltdl., Linnaea 20: 668, 1847. Australia: überall bei Bethanien, meist am Wasser, H. Behr, Dec. Holotypus: HAL 42501.
- Psychotria ciliolata* Schltdl., Linnaea 28: 519, 1856. Brazil: G.W. Freyreiss & F. Sellow, 1815–18. Typus: HAL 76160.
- Psychotria costato-venosa* Schltdl., Linnaea 28: 497, 1856. Not at HAL.
- Psychotria cujabensis* Schltdl., Linnaea 28: 507, 1856. Brazil: Prov. Matto-Grosso prope Cujaba, J. Lhotsky, 1830–32. Typus: HAL 75848.
- Psychotria cuspidata* (var.) *freireisiana* Schltdl., Linnaea 28: 507, 1854. Brazil: G.W.

- Freyreiss & F. Sellow, 1815–18. Typus: HAL 76144.
- Psychotria grandiflora* Schltld., Linnaea 9: 595, 1835. Mexico: Jalapa prope la Laguna, C.J.W. Schiede, May/Aug. 1829. Typus: HAL 76151.
- Psychotria formosa* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 24, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75289.
- Psychotria jambosoides* Schltld., Linnaea 28: 518, 1856. Brazil: G.W. Freyreiss & F. Sellow, 1815–18. Typus: HAL 75854.
- Psychotria justicioides* Schltld., Linnaea 9: 596, 1835. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 75852.
- Psychotria leiocarpa* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 23, 1829. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 76155.
- Psychotria lhotzkyana* Schltld., Linnaea 28: 505, 1856. Brazil: in sylva Crocovado, H.K. Beyrich, 1830–32. Typus: HAL 76130.
- Psychotria neurotricha* Schltld., Linnaea 28: 520, 1856. E.F. Poeppig, no. 1353. Typus: HAL 75851.
- Psychotria nitidula* Schltld., Linnaea 4: 25, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75853.
- Psychotria nonatelioides* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 26, 1829. Not at HAL.
- Psychotria philippensis* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 21, 1829. Not at HAL.
- Psychotria pubigera* Schltld., Linnaea 28: 514, 1856. Not at HAL.
- Psychotria syringaeiflora* Schltld., Linnaea 28: 516, 1856. Brazil: J.S. Blanchet, 1828–56. Typus: HAL 75850.
- Psychotria urophylla* Schltld., Linnaea 28: 522, 1856. E.F. Poeppig, no. 1578. Typus: HAL 75849.
- Pteris pulchra* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 614, 1830. Mexico: inter Misantlam et Colipam, regionis subcalidae. C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 81851 (3 sheets).
- Ptilotus erubescens* Schltld., Linnaea 20: 575, 1847. Australia: auf trockenem Hügeln bei Gawlertown, H. Behr, Oct. 1844/45. Typus: HAL 98187.
- Pyrus sambucifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 36, 1827. Russia: Kamtschatka ad portum St. Petri et Pauli (Expedition Lüttk.). Typus: HAL 98162.
- Quercus calophylla* Schltld. & Cham., Linnaea 5, 1830. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 60349.
- Quercus germana* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 78, 1830. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 60343.
- Quercus leucifolia* Schltld. & Cham., Linnaea 5, 1830. Not at HAL.
- Quercus oleoides* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 79, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Holotypus: HAL 60354.
- Quercus polymorpha* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 78, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Holotypus: HAL 60344.
- Ranunculus aquatilis* var. *capillaceus* Schltld., in DC., Prodr. 1: 26, 1824. USA, Alaska, Unalashka, 1817, A. v. Chamisso. Typus: HAL 98417.
- Ranunculus cicutarius* Schltld., Animad. Ran. 1: 25, 1814. Not at HAL.
- Ranunculus eschscholzii* Schltld., Animad. Ran. 2: 16, 1820. Not at HAL.
- Ranunculus chamissonis* Schltld., Animad. Ran. 1: 12, 1819. In sinu St. Laurentii, A. v. Chamisso. Typus: HAL 63558.
- Ranunculus halophilus* Schltld., Animad. Ran. 1: 23, 1819. Russia: Siberia, Pallas.

Typus: HAL 63559.

- Ranunculus hookeri*** Schltld., Linnaea 5: 210, 425. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 63556.
- Ranunculus hornemanni*** Schltld., Animad. Ran. 2: 36, 1820. Not at HAL.
- Ranunculus lechleri*** Schltld., Linnaea 27: 557, 1856. Not at HAL.
- Ranunculus litoralis*** Schltld., in Lechl., Berberid. Amer. austral.: 54, 1857 (nom. illeg.). Chile: Valdivia, W. Lechler, Pl. chil. Ed. R.F. Hohenacker. Syntypus: HAL 63575.
- Ranunculus llaveanus*** Schltld., Linnaea 10: 233, 1835/36. Not at HAL.
- Ranunculus pallasii*** Schltld., Animad. Ran. 1: 15, 1819. In sinu Eschscholzii et insula St. Georgii, A. v. Chamisso. Holotypus: HAL 63560.
- Ranunculus pedatifidus*** Schltld., Animad. Ran. 2: 18, 1820. In sinu St. Laurentii, A. v. Chamisso. Lectotypus: HAL 61971, nom. illeg., homonym of *R. pedatifidus* Sm. 1815.
- Redowskia sophiaefolia*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 33, 1826. Russia: Asia boreali orientali, Kamtschatka, Redowskii, 1816. Syntypus: HAL 84106.
- Rhamnus capreaefolia*** Schltld., Linnaea 15: 464, 1841. Mexico: in saxosis Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Lectotypus: HAL 21748 (2 sheets). Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 21523 (2 sheets).
- Rhamnus mucronata*** Schltld., Linnaea 15: 465, 1841. Mexico: prope Angangués, reg. frig. (Michoacan, Angangué, 30 km N of Zitácuaro), C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Lectotypus: HAL 21798 (4 sheets). Mexico: prope Chantla, reg. frig., C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Syntypus: HAL 21797 (2 sheets).
- Rhexia deppeana*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 566, 1830. Not at HAL.
- Rhexia floribunda*** Schltld., Linnaea 13: 43, 1839. Not at HAL.
- Rhexia grandifolia*** Schltld., Linnaea 13: 429, 1839. Not at HAL.
- Rhexia inaequilateralis*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 567, 1830. Not at HAL.
- Rhexia parvifolia*** Schltld., Linnaea 13: 428, 1839. Not at HAL.
- Rhexia rufipilis*** Schltld., Linnaea 13: 430, 1830 [= *Rhexia schiedeana* (var.) *macrantha* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 566, 1830]. Not at HAL.
- Rhexia scabriuscula*** Schltld., Linnaea 13: 43, 1839. Not at HAL.
- Rhexia schiedeana*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 565, 1830. Not at HAL.
- Rhus crenatifolia*** Schltld., Linnaea 16: 483, 1842. Not at HAL.
- Rhus schiedeana*** Schltld., Linnaea 16: 480, 1842. Not at HAL.
- Rhus schmidelioides*** Schltld., Linnaea 16: 482, 1842. Not at HAL.
- Rhus terebinthifolia*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 600, 1830. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jan. 1829. Typus: HAL 79259.
- Rhynchospora adulta*** Schltld., Bot. Zeitung 7: 166, 1849. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 79376 (2 sheets).
- Rhynchosia erythrinoides*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 587, 1830. Mexico: inter Misantlam et Nantlam in sylvis, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98589 (2 sheets).
- Rhynchosia grandiflora*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 588, 1830. Mexico: in apricis prope la Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98590 (2 sheets).
- Rhynchospora laevis*** Schltld., Linnaea 25: 166, 1852. Not at HAL.
- Richardsonia grandiflora*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 351, 1828. Brazil: Brasilia

- meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98298.
- Richardsonia humistrata*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 353, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98299.
- Richardsonia stellaris*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 352, 1828. Not at HAL.
- Robinia acuminata*** Schldtl., Linnaea 12: 306, 1838. Mexico: prope Mapilque, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 47637 (2 sheets).
- Robinia ehrenbergii*** Schldtl., Linnaea 12: 303, 1838. Mexico: nördlich der heißen Bäder bei Grande, Kalkboden, C. Ehrenberg, Jul. 1831–39. Typus: HAL 71864 (2 sheets).
- Robinia melanocarpa*** Schldtl., Linnaea 12: 305, 1838. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 71866.
- Robinia schiedeana*** Schldtl., Linnaea 12: 306, 1838. Mexico: inter Vera-Cruz et Santa Fe, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 27985.
- Rollinia emarginata*** Schldtl., Linnaea 9: 318, 1834. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Isolectotypus: HAL 76440.
- Rollinia laurifolia*** Schldtl., Linnaea 9: 319, 1934. Not at HAL.
- Rollinia rugulosa*** Schldtl., Linnaea 9: 316, 1834. Not at HAL.
- Rollinia salicifolia*** Schldtl., Linnaea 9: 317, 1834. Brazil: in Brasilia australiori, F. Sellow, 1814–31. Lectotypus: HAL 76442. Isolectotypus: HAL 76443.
- Rotala mexicana*** Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 567, 1830. Mexico: in aquis fluentibus prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98154.
- Rubia ephedroides*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 231, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 46683.
- Rubia equisetoides*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 232, 1828. Not at HAL.
- Rubia indecora*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 229, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98344.
- Rubia relbun*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 229, 1828. Not at HAL.
- Rubia valantioides*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 231, 1828. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98345.
- Rubia vilis*** Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 230, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98350.
- Rubus adenotrichos*** Schldtl., Linnaea 13: 267, 1839. Mexico: in dumetis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 60490 (3 sheets).
- Rubus dumetorum*** Schldtl., Linnaea 13: 267, 1839, nom. illeg. (≡ ***Rubus schiedeanus*** Steud. 1841). Mexico: in dumetis Jalapae, May 1829, C.J.W. Schiede. Holotypus: HAL 60485
- Rubus fagifolius*** Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 571, 1830. Mexico: in dumetis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 60479 (3 sheets).
- Rubus fastigiatus*** (var.) ***bergii*** Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 16, 1827. Not at HAL.
- Rubus humifusus*** Schldtl., Linnaea 13: 270, 1839, nom. illeg. [≡ ***Rubus humistratus*** Steud. 1841]. Mexico: prope San Miguel, Jun. 1829, C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 60488. Mexico: in dumetis pricis et graminosis Jalapae, May 1829, C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 60489 (2 sheets).
- Rubus imperialis*** Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 13, 1827. Not at HAL.
- Rubus mundtii*** Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 18, 1827. South Africa: Prom. bon. spei: prope Hanglip, Mundt & Maire, Jul. 1815–31. Typus: HAL 98161.

- Rubus occidentalis* (b) *incisus* Schltld., Linnaea 13: 271, 1828. Mexico: prope Lerma, C.J.W. Schiede, Sept. 1830. Typus: HAL 60484.
- Rubus sapidus* Schltld., Linnaea 13: 269, 1839. Mexico: in dumetis Jalapae frequens, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 60482 (2 sheets). Mexico: prope Reglam, C. Ehrenberg, 1835. Syntypus: HAL 60483.
- Rubus sapidus* Schltld. (f.) *abnormis* Schltld., Linnaea 13: 269, 1839. Mexico: in dumetis Jalapae quam inter Jalapam et del Molino de Pedreguera, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 60481.
- Rubus sellowii* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 15, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98247.
- Rubus tagallus* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 9, 1827. Not at HAL.
- Rubus trichomallus* Schltld., Linnaea 19: 268, 1846. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 60486 (2 sheets).
- Rubus ursinus* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 11, 1827. Not at HAL.
- Rubus vitifolius* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 10, 1827. Not at HAL.
- Ruehssia purpurea* Schltld., Linnaea 26: 669, 1855. Not at HAL.
- Ruellia jussieuoides* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 370, 1831. Mexico: ad ripas fluminis Misantlensis prope Misantlam, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98540.
- Ruellia lacustris* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 96, 1830. Mexico: in Laguna de Jalapa, Sep. 1828. Typus: HAL 97785.
- Ruellia rivularis* Schltld., Linnaea 7: 396, 1832. Not at HAL.
- Russelia alata* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 3, 1828. Brazil: in Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 71747.
- Russelia equisetiformis* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 377, 1831. Mexico: in apricioribus Papantlae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 97776 (2 sheets).
- Russelia syringiaefolia* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 376, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 97775.
- Sabbatia australis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 194, 1826. Brazil: prov. Cisplantina (Montevideo), F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 76411.
- Sabicea grisea* Cham. & Schltld., Linnaea 4: 192, 1829. Not at HAL.
- Sagittaria chilensis* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 155, 1827. In reg. Chilensi. Typus: HAL 63585.
- Sagittaria montevidensis* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 156, 1827. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 63582.
- Salix microphylla* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Mexico: ad ripam arenosam fluminis Tecolutensis prope San Pablo, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Lectotypus: HAL 69741 (2 sheets).
- Salvia affinis* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 99, 1830. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 98245.
- Sambucus australis* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 140, 1828. Not at HAL.
- Sambucus bipinnatus* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 171, 1830. Mexico: in sepibus Jalapae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Topotypus: HAL 98549. Mexico: in sepibus Jalapae, C. de Hoffmanssegg, May 1829. Topotypus: HAL 98550.
- Sanicula liberta* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 353, 1826. Not at HAL.

- Saponaria dioica* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 38, 1826. Not at HAL.
- Saurauja kegeliana* Schldtl., Bot. Zeitung 11: 694, 1853. Not at HAL.
- Saurauja leucocarpa* Schldtl., Linnaea 10: 249, 1836. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1829. Typus: HAL 22008 (4 sheets).
- Schweiggera mexicana* Schldtl., Linnaea 12: 204, 1838. Not at HAL.
- Scleria brekiana* Schldtl., Bot. Zeitung 3: 491, 1845. Not at HAL.
- Scleria bulbosa* Schldtl., Bot. Zeitung 3: 495, 1845. Schimper iter Abyssinicum 327. 3 Oct. 1837. Typus: HAL 82174, nom. illeg.
- Scleria melaleuca* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 29, 1831. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 79367 B (2 sheets). Suriname: Weigelt, 1827. Syntypus: HAL 79367 A.
- Scleria melicoides* Schldtl., Linnaea 26: 127, 1854. Not at HAL.
- Scleria palmifolia* Hoffm. ex Schldtl., Bot. Zeitung 3: 492, 1845. Brazil: C. de Hoffmannsegg. Typus: HAL 82169.
- Scleria praealta* Salzm. ex Schldtl., Bot. Zeitung 3: 461, 1845. Brazil: Bahia, P. Salzmann, 1827–1830. Typus: HAL 82044.
- Scleria scabriuscula* Schldtl., Linnaea 20: 544, 1847. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 64838.
- Scleria schiedeana* Schldtl., Bot. Zeitung 3: 489, 1845. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 64837.
- Scoparia annua* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 375, 1831. Not at HAL.
- Scoparia ericacea* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 604, 1827. Not at HAL.
- Scoparia flava* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 603, 1827. Not at HAL.
- Scoparia plebeja* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 605, 1827. Not at HAL.
- Scutellaria dumetorum* Schldtl., Linnaea 7: 400, 1832. Mexico: in dumetis inter San Miguel del Soldado et la Joya, Jun. 1829. Typus: HAL 98355.
- Sebaea capitata* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 193, 1826. Not at HAL.
- Sebaea crassulaefolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 193, 1826. Not at HAL.
- Sebaea sulphurea* Schldtl., Linnaea 1: 192, 1826. Not at HAL.
- Securidaca sylvestris* Schldtl., Linnaea 14: 381, 1840. Not at HAL.
- Sedum stephani* Schldtl., Linnaea 6: 549, 1831. Kamtschatka, P.S. Pallas. Typus: HAL 98636 [ex herb. Willdenow].
- Selliera herpystica* Schldtl., Linnaea 20: 598, 1847. Australia: auf torfigem im Winter überschwemmten Boden an dem Gawlerriver bei Bethanien, H. Behr, Feb. 1844/45. Typus: HAL 98334.
- Serjania cambessedeani* Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 214, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. Typus: HAL 98602 (2 sheets).
- Serjania cardiospermoides* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 418, 1831. Mexico: Papantla, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 61457 (2 sheets).
- Serjania monogyna* Hoffm. ex Schldtl., Linnaea 18: 39, 1844. Brazil: Parà, F.W. Sieber pro C. de Hoffmannsegg, 1801–07. Typus: HAL 90517. Notes: p. 39 in Linnaea 18 is wrongly printed as p. “55”.
- Serjania moritziana* Schldtl., Linnaea 18: 44, 1844. Columbia, K. Moritz, 1835–37, 1840–66. Typus: HAL 92764. Notes: p. 44 in Linnaea 18 is wrongly printed as p. “60”.
- Serjania regnellii* Schldtl., Linnaea 18: 57, 1844. Brazil: Prov. Minas Geraes, A.F.

- Regnell, 1841–74. Holotypus: HAL 64975.
- Setaria dasyura* Schltldl., *Linnaea* 26: 463, 1855. Not at HAL.
- Sicydium schiedeanum* Schltldl., *Linnaea* 7: 388, 1832. Not at HAL.
- Sida acuminata* (var.) *macrophylla* Schltldl., *Linnaea* 3: 268, 1828. Insula St. Thomas, C. Ehrenberg, 1827–1828. Typus: HAL 36723.
- Sida collina* Schltldl., *Linnaea* 11: 364, 1837. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 36722. Mexico: Hacienda de la Laguna, in collibus apricis, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 36721.
- Sida costata* Schltldl., *Linnaea* 11: 365, 1837. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 34056 (2 sheets).
- Sida tristis* Schltldl., *Linnaea* 3: 271, 1828. Not at HAL.
- Sida venusta* Schltldl., *Linnaea* 11: 365, 1837. Mexico: ad Tlalpujahua, Keerl. Holotypus: HAL 37332.
- Sieversia rotundifolia* Schltldl. & Cham., *Linnaea* 2: 4, 1827. Not at HAL.
- Sisyrinchium scabrum* Schltldl. & Cham., *Linnaea* 6: 57, 1831. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 55575.
- Smilax acutifolia* Schltldl., *Linnaea* 18: 449, 1845. Mexico: prope el Banco, C. Ehrenberg, Jan. 1839. Syntypus: HAL 71861 (2 sheets). Mexico: prope Angangueco, reg. frig., C.J.W. Schiede, Nov. 1829. Syntypus: HAL 71906.
- Smilax discolor* Schltldl., *Linnaea* 18: 454, 1845. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 71860 (2 sheets).
- Smilax glaucocarpus* Schltldl., *Linnaea* 18: 450, 1845. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, May. Syntypus: HAL 63540. Mexico: in tierra fria ad Hacienda del Carmen, C. Ehrenberg, Aug. Syntypus: HAL 63541.
- Smilax medica* Schltldl. & Cham., *Linnaea* 6: 47, 1831. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Holotypus: HAL 79372 (2 sheets).
- Smilax jalapensis* Schltldl., *Linnaea* 18: 451, 1845. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Synypi: HAL 71862 (2 sheets), 71909 and three additional sheets without number.
- Smilax platycentron* Schltldl., *Linnaea* 18: 452, 1845. Mexico: in dumetis sylvisque Jalapae, C.J.W. Schiede, May/June. 1829. Typus: HAL 79369 (2 sheets).
- Smilax platycentron* Schltldl. (a) *emarginata* Schltldl., *Linnaea* 18: 452, 1845. Mexico: Puente de Dios, C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 79370 (2 sheets).
- Smilax platycentron* Schltldl. (b) *hastata* Schltldl., *Linnaea* 18: 452, 1845. Mexico: Puente de Dios, C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 79371 (2 sheets).
- Solanum aligerum* Schltldl., *Linnaea* 19: 301, 1846. Not at HAL.
- Solanum chrysotrichum* Schltldl., *Linnaea* 19: 304, 1846. Not at HAL.
- Solanum diversifolium* Schltldl., *Linnaea* 19: 297, 1846. Not at HAL.
- Solanum geminiflorum* Schltldl. & Cham., *Linnaea* 5: 112, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, Aug. Typus: HAL 95992 [as *geminifolium*, corr. Schltldl., *Linnaea* 8: 255, 1833].
- Solanum hydrophilum* Schltldl., *Linnaea* 8: 254, 1833. Not at HAL.
- Solanum maglia* Schltldl., Hort. Hal. 1: 6, 1841. Not at HAL.
- Solanum nigrum* Schltldl., *Linnaea* 19: 286, 1846. Not at HAL.
- Solanum nilagiricum* Schltldl., *Linnaea* 26: 484, 1855. Not at HAL.
- Solanum pedunculare* Schltldl., *Linnaea* 19: 305, 1846. Not at HAL.

- Solanum rengerii* Schltld., Hort. Hal. 1: 6, 1841. Not at HAL.
- Solanum schiedeantum* Schltld., Linnaea 19: 295, 1847. Mexico: in Monte Mascultepec pr. Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1823–33. Typus: HAL 95.
- Solanum sideroxyloides* Schltld., Linnaea 8: 253, 1833. Not at HAL.
- Solanum somniculentum* Kze. ex Schltld., Linnaea 19: 306, 1846. Mexico: prope Zimapan, C.J.W. Schiede, Jun. 1823–33. Typus: HAL 70816.
- Solanum stephanodes* Schltld., Linnaea 19: 291, 1846. Not at HAL.
- Solanum stoloniferum* Schltld. & Buché, Verh. Vereins Beförd. Gartenbaues Königgl. Preuss. Staaten 9: 317, 1833. Mexico: montis Orizabae; Laguna de Huetulaca, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Isolectotypus: HAL 7698.
- Solanum triferum* Schltld., Hort. Hal. 1: 6, 1841. Not at HAL.
- Solanum vellereum* Schltld., Linnaea 19: 302, 1846. Not at HAL.
- Solanum verrucosum* Schltld., Index Sem. Hort. Hal.: 10, 1839 and Hort. Hal. 1: 3, 1841. Mexico: ad vias in muris, per sylvas pr. Mineral Real del Monte frequ., C. Ehrenberg, Jul.–Sept. vel cult. in Hort. Bot. Hal. Lectotypus: HAL 70736.
- Sonchus capensis* Schltld., Ind. Sem. Hort. Hal.: 7, 1850 and Ann. Sci. Nat. Bot. 14: 342, 1850; Linnaea 24: 211, 1851. Not at HAL.
- Sonchus hypochaeroides* Schltld., Ind. Sem. Hort. Hal. 7, 1850 and Ann. Sci. Nat. Bot. 14: 343, 1850; Linnaea 24: 212, 1851. Not at HAL.
- Spermacoe riparia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 355, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, ad ripam fluvii Rio Negro (Rincon de Gallinas), F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98360.
- Sphaerotheca scoparioides* Cham. & Schltld., Linnaea 2: 606, 1827. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98474.
- Spigelia beyrichiana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 203, 1826. Not at HAL.
- Spigelia flemmingiana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 203, 1826. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 69905.
- Spigelia humboldtiana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 200, 1826. Brazil: Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 69878.
- Spigelia laurina* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 204, 1826. Not at HAL.
- Spigelia olfersiana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 206, 1826. Not at HAL.
- Spigelia scabra* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 202, 1826. Brazil: in provincia Cisplatina, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 69906.
- Spigelia sellowiana* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 205, 1826. Brazil: crescit in regionibus interioribus, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 69907.
- Stachys agraria* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 100, 1830. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 47321.
- Stachys boraginoides* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 100, 1830. Mexico: in umbrosis monte Macultepec et versus San Andres, fl. Jalapensis, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 47315.
- Stachys schiedeana* Schltld., Linnaea 7: 398, 1832. Mexico: prope San Miguel del Soldado et la Joya, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 47317.
- Stackhousia gunniana* Schltld. in Schuch., Linnaea 26: 18, 1854. [*Stackhousia gunii* Schltld. non Hook f. 1844]. Australia: auf dem Graslande, H. Behr, Sept. 1845/46. Holotypus: HAL 49070.

- Staelia thymoides* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 3: 364, 1828. Brazil: Basilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98315.
- Stellaria crispa* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 1: 51, 1826. Ex Insula Unalashka, A. v. Chamisso, 1817. Typus: HAL 98409.
- Stellaria marginata* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 1: 50, 1826. Ad sinum Schischmareff (an ad sinum St. Laurentii), A. v. Chamisso, 31 Jul. 1816. Typus: HAL 98408.
- Stemodia ehrenbergiana* Schldtl., *Ind. Sem. Hort. Hal.* 1: 169, 1842. Not at HAL.
- Stemodia hypoides* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 3: 8, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1815–28. Typus: HAL 60225.
- Stemodia philippensis* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 3: 5, 1828. Not at HAL.
- Stemodia stricta* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 3: 10, 1828. Not at HAL.
- Stevia conferta* (b) *puberula* (forma) *capitata* Schldtl., *Hort. Hal.* 2: 16, 1841. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, Sept. ad Nov. Lectotypus: HAL 32736.
- Stevia conferta* (b) *puberula* (forma) *corymbosa* Schldtl., *Hort. Hal.* 2: 16, 1841. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, Sept. ad Nov. Lectotypus: HAL 32734.
- Stevia conferta* (b) *puberula* (forma) *ramosa* Schldtl., *Hort. Hal.* 2: 16, 1841. Mexico: Zetete Xonotla, C.J.W. Schiede. Lectotypus: HAL 32740.
- Stevia dissoluta* Schldtl., *Hort. Hal.* 2: 16, 1841. Mexico: inter las Trojes et Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 327449 (11 sheets).
- Stevia ehrenbergiana* Schldtl., *Linnaea* 16: 370, 1842. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, Sept.–Oct. 1834–40. Typus: HAL 72113.
- Stevia glandulifera* Schldtl., *Ind. Sem. Hort. Bot. Hal.*: 19, 1839. *Linnaea* 14: Litt.-Ber. 129, 1840 and *Hort. Hal.* 2: 15, 1841. Aut Mexico, leg. C. Ehrenberg vel C.J.W. Schiede, aut cult. in *Hort. Bot. Halensis*. Lectotypus: HAL 20972. Syntypi: HAL 98714–98718, 98720.
- Stevia leucantha* Schldtl., *Hort. Hal.* 2: 16, 1841. Mexico: C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 72114.
- Stevia pyrolaeifolia* Schldtl., *Linnaea* 16: 326, 1842. Mexico: in monte Kankandó, C. Ehrenberg. Typi: HAL 32743, 91218.
- Stevia verticillata* Schldtl., *Linnaea* 16: 372, 1842. Brazil: in provincia Rio de Janeiro prope Novo Friburgo in planitie. Typus: HAL 32758.
- Swertia perennis* (b) *alternifolia* Cham. & Schldtl., *Linnaea* 1: 189, 1826. Not at HAL.
- Symplocos schiedeana* Schldtl., *Linnaea* 8: 527, 1833. Mexico: inter Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98594.
- Tagetes schiedeana* Schldtl., *Linnaea* 9: 271, 1834. Mexico: im graminosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98094.
- Tamonea scabra* Schldtl. & Cham., *Linnaea* 5: 99, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Oct. 1828/29. Syntypus: HAL 98486. Mexico: Puente del Rey, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Syntypus: HAL 98487.
- Tamonea scabra* Schldtl. & Cham. (var.) *minor* Schldtl. & Cham., *Linnaea* 6: 373, 1831. Mexico: ad littora maris arenosa prope Laguna salada reg. calid., F. Deppe & C.J.W. Schiede, Mar. 1828/29. Typus: HAL 98481.
- Tauschia nudicaulis* Schldtl., *Linnaea* 9: 607, 1835. Mexico: A: inter las Vigas et Perote, C.J.W. Schiede & F. Deppe. B: in locis tenui gramine vestitis inter la Joya

et San Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 66180 A, B (2 sheets).

Taxus globosa Schldtl., Linnaea 12: 496, 1838. Not at HAL.

Tephrosia schiedeana Schldtl., Linnaea 12: 299, 1838. Mexico: in praeruptis in Barranca de Tioselo prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98588 (3 sheets).

Tephrosia vicioides Schldtl., Linnaea 12: 297, 1838. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98609 (2 sheets).

Ternstroemia sylvatica Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 220, 1830. Mexico: in sylvaticis inter Jalapam et San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus/Isolectotypus: HAL 60004 (2 sheets). Mexico: San Miguel del Saldado, C.J.W. Schiede, Nov. 1828. Syntypus: HAL 60005.

Tetracera fagifolia Schldtl., Linnaea 8: 174, 1833. Brazil: prov. Parà, C. de Hoffmansegg. Isotypus: HAL 16530.

Tetracera sellowiana Schldtl., Linnaea 8: 175, 1833. Not at HAL.

Tetrachyron manicatum Schldtl., Linnaea 19: 744, 1847. Not at HAL.

Tetramerium latifolium Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 30, 1829. Not at HAL.

Tetramerium montevidense Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 29, 1829. Not at HAL.

Tetramerium stipulaceum Cham. & Schldtl., Linnaea 4: 31, 1829. Not at HAL.

Tetrapteris schiedeana Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 218, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam in arboribus scandens, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 74280. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Syntypus: HAL 74281.

Teucrium trifidum Schldtl., Linnaea 20: 609, 1847. Australia: auf sandigem Boden, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 42538.

Tilia mexicana Schldtl., Linnaea 11: 377, 1837. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 42250.

Tillandsia aloides Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 55, 1831. Mexico: in arboribus parasitica prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45464 (2 sheets).

Tillandsia apicroides Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 55, 1831. Mexico: in arboribus parasitica prope Jalapam (err. "in graminosis"), C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45619 (2 sheets).

Tillandsia brachycaulos Schldtl., Linnaea 18: 422, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 45602.

Tillandsia caespitosa Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 54, 1831. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45603.

Tillandsia circinnata Schldtl., Linnaea 18: 430, 1845. Mexico: in arboribus Misantlae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Syntypus: HAL 45627. Mexico: Hacienda de la Laguna, in arboribus, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 45628.

Tillandsia erubescens Schldtl., Linnaea 18: 427, 1845. Mexico: S. Angel, S. Bastolo, C.J.W. Schiede, 1828–33. Typus: HAL 45608.

Tillandsia filifolia Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 53, 1831. Not at HAL.

Tillandsia grandis Schldtl., Linnaea 18: 424, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna in praeuptis, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 45629.

Tillandsia leiboldiana Schldtl., Linnaea 18: 414, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 45625. Mexico: in barrancos,

- F.E. Leibold. Syntypus: HAL 45630.
- Tillandsia limbata* Schldtl., Linnaea 18: 419, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna, in arboribus, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 45626 (3 sheets)
- Tillandsia paniculata* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 54, 1831, nom. illeg. (non *Tillandsia paniculata* L., 1762). Mexico: in arboribus parasitica prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45631 (2 sheets).
- Tillandsia punctulata* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 53, 1831. Mexico: Jalapa in arboribus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Nov. 1828. Typus: HAL 45635 (2 sheets).
- Tillandsia tricolor* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 54, 1831. Mexico: Jalapa in arboribus parasitica, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 45632 A. Mexico: in arboribus Jalapae, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 45632 B.
- Tillandsia variabilis* Schldtl., Linnaea 18: 418, 1845. Mexico: in arboribus prope Papantlan, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 45636 (2 sheets).
- Tillandsia variegata* Schldtl., Linnaea 18: 429, 1845. Mexico: in arboribus Jalapae, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 45637.
- Torenia hirta* Cham. & Schldtl., Linnaea 2: 571, 1827. Not at HAL.
- Tovomita calyptrata* Schldtl., Linnaea 8: 187, 1833. Not at HAL.
- Tradescantia gonatandra* Schldtl., Linnaea 24: 659, 1851. Not at HAL.
- Trichomanes melanotrichum* Schldtl., Adumbr. pl. 1: 56, 1832. South Africa: Prom. bon. spei, ad Plettenbergbay, Mundt & Maire, 1815. Typus: HAL 37269.
- Trichomanes schaffneri* Schldtl., Linnaea 26: 368, 1854. Not at HAL.
- Trigynaea oblongifolia* Schldtl., Linnaea 9: 329, 1834. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1815–31. Typus: HAL 59853 (fragment of the holotype from B).
- Triopteris sericea* Schldtl., Linnaea 10: 243, 1836. Mexico: Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 98388.
- Triplaris laurifolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 55, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98197.
- Triplaris salicifolia* Cham. & Schldtl., Linnaea 3: 56, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, Feb. 1814–31. Typus: HAL 97801 (2 sheets).
- Tropaeolum fintelmanni* Wagner ex Schldtl., Allgem. Gartenzeitung 18: 105, 1850. Not at HAL.
- Trophis ramon* Schldtl. & Cham., Linnaea 6: 357, 1831. Mexico: Misantla, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 97800 (2 sheets).
- Turraea graciliflora* Schldtl., Linnaea 25: 216, 1852. Not at HAL.
- Umbilicus mexicanus* Schldtl., Linnaea 13: 409, 1839. Not at HAL.
- Urvillea affinis* Schldtl., Linnaea 18: 38, 1844. Brazil: prov. Rio de Janeiro, in montibus ad Novo Friburgo, Oct. Typus: HAL 92765.
- Vaccinium leucanthum* Schldtl., Linnaea 8: 524, 1845. Mexico: prope Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 98447. Mexico: infra S. Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 98593.
- Vaccinium salicinum* Cham. & Schldtl., Linnaea 1: 525, 1826. Not at HAL.
- Valeriana armeriaefolia* Schldtl., Linnaea 28: 485, 1856. Peru: San Antonio, in rupibus umbrosis Cordiller. W. Lechler, Apr. 1854. Typus: HAL 8881.
- Valeriana cephalantha* Schldtl., Linnaea 28: 483, 1856. Peru: Tabina, W. Lechler,

- Jul. 1854. Typus: HAL 5436.
- Valeriana chamaedryfolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 129, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 5445.
- Veratrum caricifolium* Schltld., Ind. Sem. Hort. Hal.: 8, 1838. Mexico: in montibus calcareis prope los Banos de Grande, C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 64680 (4 sheets).
- Veratrum frigidum* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 46, 1831. Mexico: in regione alpestris montis Orizabae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Holotypus: HAL 79374 (2 sheets).
- Veratrum officinale* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 45, 1831. Mexico: in Barranco de Tioselo prope la Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Holotypus: HAL 79373 (2 sheets).
- Vernonia leiboldiana* Schltld., Linnaea 9: 742, 1835. Not at HAL.
- Vesicaria polyantha* Schltld., Bot. Zeitung 11: 620, 1853. Not at HAL.
- Viburnum microcarpum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 171, 1830. Mexico: prope Jalapam et inter Jalapam et San Miguel del Soldado, C.J.W. Schiede, Aug. 1826. Typus: HAL 98548.
- Viola ciliata* Schltld., Linnaea 12: 202, 1838. Mexico: in graminosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Lectotypus: HAL 71512. Isolectotypus: HAL 71513. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 71511.
- Viola reticulata* Schltld., Linnaea 12: 201, 1838. Not at HAL.
- Viscum falcatum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 172, 1830. Mexico: in arboribus parasiticus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98471.
- Vismia decipiens* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 116, 1828. Not at HAL.
- Vismia decipiens* Cham. & Schltld. (var.) *pyrifolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 116, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98394.
- Vismia magnoliaefolia* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 118, 1828. Not at HAL.
- Vismia mexicana* Schltld., Linnaea 10: 245, 1836. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jul. 1829. Syntypus: HAL 98604 (3 sheets). Mexico: C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 98389.
- Vismia parviflora* Cham. & Schltld., Linnaea 3: 119, 1828. Not at HAL.
- Weinmannia intermedia* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 555, 1830. Mexico: in sylvaticis prope San Andres, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 82844. Mexico: Cuesta grande inter Jalacingo et Huitamalco, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Syntypus: HAL 82845.
- Wenderothia discolor* Schltld., Linnaea 12: 330, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 97754.
- Wigandia macrophylla* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 382, 1831. Mexico: prope Sepillo ad flumen Tecolutense, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 97777 (2 sheets).
- Wimmeria concolor* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 428, 1831. Mexico: prope Colipam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98384.
- Wimmeria discolor* Schltld. & Cham., Linnaea 6: 428, 1831. Mexico: in sylvis apricioribus Papantlae arborescens, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. Typus: HAL 98385.

Wurmbea truncata Schldtl., *Linnaea* 1: 93, 1826. Not at HAL.

Xanthoxylum (Zanthoxylum) melanostictum Schldtl. & Cham., *Linnaea* 5: 231, 1830.

Mexico: prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98596 (2 sheets).

Xylopia parvifolia Schldtl., *Linnaea* 9: 327, 1834. Not at HAL.

Zornia laevis Schldtl. & Cham., *Linnaea* 5: 582, 1830. Mexico: in collibus apricis prope Jalapam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Aug. 1828/29. Typus: HAL 98427.

Danksagung:

Die Autoren danken Herrn H. Bensch für die Einrichtung der Datenbank. Ebenso danken wir Frau S. Richter für ihre Hilfe bei der Eingabe der Daten und Frau K. Schubert für ihre Unterstützung des gesamten Projektes.

Literature:

BRAUN, U. 1998: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 1: Pteridophyta und Gymnospermae. *Schlechtendalia* 1: 15–18.

BRAUN, U. 2000: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 2: Myrtaceae. *Schlechtendalia* 5: 1–10.

HEKLAU, H. 1998: Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal (1794–1866). *Schlechtendalia* 1: 11–14.

HOFFMANN, M.H. 1998: Type specimens of the Ranunculaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). *Schlechtendalia* 1: 19–22.

HOFFMANN, M.H. 2000: Type specimens of the Brassicaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). *Schlechtendalia* 4: 35–40.

KESTING, S. & HOFFMANN, M.H. 2000: Type specimens of the Apocynaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae, Loganiaceae and Menyanthaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). *Schlechtendalia* 5: 11–17.

Anschriften der Verfasser:

Dr. U. Braun & A.-K. Wittig, Martin-Luther-Universität, FB. Biologie, Institut für Geobotanik und Botanischer Garten, Neuwerk 21, D-06099 Halle/Saale, BR Deutschland.
(braun@botanik.uni-halle.de)