

Repertorium specierum novarum regni vegetabilis

Herausgegeben von Professor Dr. phil. Friedrich Fedde.

Beihefte. Band CVI.

Verzeichnis der Arten

der

Gattung *Mesembryanthemum* L.

nebst deren abgetrennten Gattungen

(Index specierum generis *Mesembryanthemi* L.
cum separatis Generibus)

einschl. der Synonyma, Umbenennungen, Standortsangaben
und der Literaturangaben

Bearbeitet

auf Grund der einschlägigen Literatur vom 1. April 1938

von

H. Jacobsen

Universitätsgarteninspektor in Kiel

Herausgegeben von der

Deutschen Kakteen-Gesellschaft E. V.

im Selbstverlage des Repertoriums, Dahlem bei Berlin, Fabekstraße 49

1 9 3 8



CJ-1798

Befr. Nr. 23978 (1238)

Gedruckt bei A. W. Hayn's Erben, Potsdam

D32-148/68/er

20,-

Vorwort

Die überaus artenreiche Gattung *Mesembryanthemum* wurde 1753 durch Linné aufgestellt. Sie besteht aus niederliegenden oder aufrechten Kräutern oder Halbsträuchern mit meist gegenständigen, fleischigen Blättern und weißen, gelben oder roten Blüten. Der Habitus ist so überaus verschieden, daß schon Haworth 1821 die Gattung in Sektionen aufteilte, ja, schon den Versuch machte, einige Gattungen abzuspalten. Dr. N. E. Brown begann 1921 mit der Aufteilung der Gattung, die er auf Fruchtmerkmale begründete; Prof. Dr. G. Schwantes folgte 1926, Dr. Louisa Bolus 1927. Inzwischen sind etwa 150 Gattungen beschrieben; die Artenzahl ist in den letzten zwanzig Jahren durch Neuentdeckungen fast überreich geworden. Eine geschlossene Übersicht über die Artenzahl lag bisher zur Zeit nicht vor. Der einzige Anhaltspunkt für die beschriebenen und vielfach umbenannten Arten wäre der wegen seines hohen Preises schwierig zugängliche Index Kewensis*). Die systematische Gliederung der Gattung *Mesembryanthemum* wurde mehrfach versucht, und liegen auch eine Anzahl brauchbarer Schlüssel vor. In „Aufteilung der Gattung *Mesembryanthemum*“, Fedde Repertorium specierum regni vegetabilis XXXII, 1933, faßt Dr. von Poellnitz die derzeit vorliegenden Schlüssel von Dr. N. E. Brown zusammen, und gibt im folgenden eine Zusammenstellung der Gattungen mit Leitart und einigen weiteren Arten. In „Aizoaceae-Mesembryanthemum“, „Die natürlichen Pflanzenfamilien“, II. Auflage, herausgegeben von A. Engler, fortgesetzt von H. Harms, Bd. 16c, 1934, geben F. Pax

*) In Justs Bot. Jahresberichte, herausgegeben von F. Fedde, werden die neuen Familien, Gattungen, Arten, Abarten und Formen, sowie die Umtaufungen mit Literaturangabe und Heimat alljährlich aufgeführt, und zwar seit dem Jahre 1873. Zuletzt (Dezember 1937) ist der Index spec. nov. für 1929 erschienen.

und H. Hoffmann eine Übersicht über den derzeitigen Stand der systematischen Arbeiten über die Gattung *Mesembryanthemum* und deren Aufteilung. Ich verweise ganz besonders auf die dort aufgeführten Angaben der speziellen ältesten bis zur jüngsten Literatur. Eingehend wird der Schlüssel von A. Berger wieder gegeben, welchen Berger 1908 in seiner Monographie „Mesembryanthemen und Portulacaceen“ (Verlag Eugen Ulmer in Stuttgart) darstellte (Gliederung in Sektionen). Als Kapitel „Die neuere Gliederung der Gattung“ folgt ein Schlüssel von N. E. Brown und eine „Übersicht der abgespalteten Gattungen“ mit Literaturangaben, Leitart und weiteren Arten. Vollständigkeit in der Angabe der Arten und auch Gattungen ist nicht erreicht und auch wohl nicht gewollt. In der Einleitung zu „Die neuere Gliederung der Gattung“, p. 204 Natürl. Pflanzenfam. II. Bd. 16c, 1934, geben die Verfasser der Meinung Ausdruck, daß die heute vorliegende, äußerst weitgehende Spaltung der Gattung *Mesembryanthemum* durchaus nicht als endgültig aufzufassen sei. Es wird bezweifelt, ob sich die vielen Gattungen in Zukunft aufrechterhalten lassen werden.

Wenngleich auch heute noch neue Arten in Süd-Afrika gefunden werden, und diese vor allem von Mrs. L. Bolus bestimmt und publiziert werden (Notes on *Mesembryanthemum*, Part III), so kann man in der Literatur doch hier und da Ansätze für eine kritische Sichtung und Ordnung innerhalb der neuen Gattungen finden. Es scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, das in ungeheurer Fülle vorliegende Material an Gattungs- und Artbeschreibungen zu sammeln, zu sichten und zu ordnen, um damit die Vorarbeit für eine monographische Arbeit zu schaffen. Eines erscheint sicher: Viele Arten werden, da diese von verschiedenen Autoren unabhängig voneinander beschrieben wurden, verschwinden, d. h. zusammengezogen werden können. Ebenso sicher erscheint es, daß Gattungen, die teilweise auf geringste Abweichungen in den Fruchtmerkmalen begründet sind, zusammengelegt werden können.

In dem vorliegenden Verzeichnis der Arten der Gattung *Mesembryanthemum* und verwandter Gattungen sind, soweit es mir möglich war, alle beschriebenen Arten festgelegt. Es ist erstaunlich, in wie vielen Büchern und Zeitschriften Diagnosen und

Umbenennungen publiziert wurden. Viele, besonders den fremden Lesern und Autoren nicht geläufige und nicht bekannte Zeitschriften wurden benutzt, und so ist es erklärlich, daß beispielsweise Umbenennungen doppelt, ja sogar dreifach von verschiedenen Autoren, originellerweise oft fast gleichzeitig vorgenommen wurden. Dabei handelte jeder wohl immer in Unkenntnis der Maßnahmen des anderen. Viele Umbenennungen, die zum Teil schon in anderer einschlägiger Literatur übernommen sind, müssen abgeändert werden, da ja die internationalen Regeln, besonders das Prioritätsrecht, gewahrt werden müssen.

Zwecks Zusammenfassung der Beschreibungen benutzte ich nur die neuere Literatur, und zwar ab 1908, beginnend mit A. Berger: „Mesembryanthemen und Portulacaceen“. Ein eingehendes Verzeichnis der von mir verwendeten Literatur habe ich unten angefügt. Ich habe bei den Literaturangaben, soweit ich nicht die Originalliteratur durch Fettdruck gekennzeichnet habe, auf die Angabe der Originalbeschreibung verzichtet, zumal in den meisten Fällen die von mir angegebene Literatur die ältere Literaturangabe auswies, z. B. A. Berger. „Mesembryanthemen und Portulacaceen“. N. E. Brown in „Gardeners Chronicle“ u. a. Im übrigen verweise ich auch auf die Literaturangaben im „Index Kewensis“ und im Index spec. nov. im „Just“. Der interessierte Leser wird an Hand der von mir angeführten Literatur direkt oder indirekt an die Originalbeschreibung der Arten herangeführt. Sehr wichtig erschien mir die Möglichkeit der Auffindung der vielfachen und oft verschiedenen Umbenennungen (combinatio nova). Von ganz wenigen Einzelfällen abgesehen, habe ich noch während meiner Arbeit bestehende Unstimmigkeiten in den Bezeichnungen durch Veröffentlichung in der Zeitschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft „Kakteen und andere Sukkulanten“ und in Fedde, „Repertorium specierum novarum“ XLIII, diese geklärt bzw. richtig gestellt. Die noch zur Zeit vorliegenden vereinzelt Unklarheiten, die vor Herausgabe einer umfassenden Monographie wohl nicht geklärt werden können, habe ich besonders bezeichnet (+, ×). Die Einfügung des heimatlichen Standortes der Arten dürfte den mit der Kultur der Pflanzen Vertrauten manch wertvollen Hinweis auf die Pflege der Pflanzen geben. Betreffend der Schreib-

weise, ob *Mesembryanthemum* oder *Mesembrianthemum* schließe ich mich der Ausführung von Prof. Dr. H. Harms, Fußnote p. 195, der schon zitierten Arbeit über *Mesembryanthemum* in „Die natürlichen Pflanzenfamilien“, II, 16c, 1934, an. Demnach ist die Bezeichnung *Mesembryanthemum* maßgebend.

Die umständliche Arbeit des Sammelns der Artenbeschreibungen und der Nachweise der Umbenennungen erstreckte sich auf fast zwei Jahre. Die Möglichkeit der Benutzung der einschlägigen Literatur wurde mir erleichtert durch die Literaturangaben in Labarre, „*Mesembryanthema*“. Die notwendigen Bücher und Zeitschriften stellte mir zum Teil Herr Professor Dr. G. Schwantes-Kiel liebenswürdigerweise zur Verfügung. Herr Prof. Schwantes war mir auch bei der Klärung einiger verworrener Fälle behilflich, wofür ich herzlich danke. Weitere Bücher entlehnte ich durch freundliche Vermittlung des Herrn Prof. Dr. E. Werdermann-Berlin der Bibliothek des Botanischen Instituts in Berlin-Dahlem. Herrn Prof. Werdermann danke ich herzlich für seine Hilfe. Die Universitätsbibliothek in Kiel und die preußische Staatsbibliothek in Berlin stellten mir zahlreiche Schriften zur Verfügung. Auch diesen Instituten sei gedankt. Last but not least danke ich Sir Arthur Hill, Director of the Kew Botanic Gardens, für freundliche Hilfe durch mir zugegangene Abschriften aus Werken aus dem Besitz des dortigen Botanischen Museums.

Möge das vorliegende Werk, welches für manchen Leser vielleicht nur eine trockene Aneinanderreihung von Namen und Ziffern erscheint, für den Eingeweihten eine Fundgrube des Wissens, ein Born der Erkenntnisse sein. Ich hoffe, mit meiner Arbeit einen Baustein für eine künftige Monographie der *Mesembryanthema* zu setzen.

Kiel, im März 1938.

H. Jacobsen

Verzeichnis

der Literatur, gleichzeitig Schlüssel für die Literaturangaben
bei den Gattungen und Arten.

Neben den nachstehend verzeichneten Schriften war mir für die Feststellung von Standortsangaben wertvolle Grundlage:

K. Dinter: *Botanische Reisen in Deutsch-Südwest-Afrika*. Posen 1918. Fedde Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, Beiheft 3.

- A.** = **F. Pax und K. Hoffmann:** *Aizoaceae-Mesembryanthemum* in „Die natürlichen Pflanzenfamilien“, zweite Auflage, herausgegeben von A. Engler, fortgesetzt von H. Harms, Bd. 16c, 1934, p. 195—221.
- A.B.H.** = **Annals of the Bolus Herbarium** (Cambridge University Press), Fetter Lane, London. (Period. Publikat.) Vol. I 1914/15, Vol. II 1916—1918, Vol. III 1920—1924, Vol. IV 1925—1928.
- B.Mag.** = **Botanical Magazin, Curtis's**, First edited by Curtis (1787) continued by Sims, W. J. Hooker. London. (Period. Publikat.) Vol. 138 (1912), Vol. 141 (1915), Vol. 142 (1916), Vol. 143 (1917), Vol. 144 (1918), Vol. 145 (1919), Vol. 146 (1920), Vol. 148 (1922), Vol. 151 (1925).
- B.M.P.** = **A. Berger:** *Mesembrianthemum und Portulacaceen*. Verlag Eugen Ulmer in Stuttgart, 1908.
- B.M.J.** = **Bulletin of Miscellaneous Informations**. Royal Botanic Gardens, Kew. „N. E. Brown: New species of and critical notes on *Mesembryanthemum* and allied genera.“ 1929; A. A. Bullock, Notes on *Mesembryanthemum* I, 1937.
- C.J.** = **The Cactus Journal**. Cactus and Succulent Society of Great Britain. London. (Period. Publikat.) Vol. I 1932/33, Vol. II 1933/34, Vol. III 1934/35, Vol. IV 1935/36. Vol. V 1936/37, Vol. VI 1937/38.
- C.V.** = **Cactussen en Vetplanten** (Period. Publikat.). Holland. Vol. I 1935.
- D.** = **Desert Plant Life**. — Desert Magazine. — Publishing Company, Glendale, California, U.S.A. Vol. I—VIII, 1929—1938.

- D.B.F.** — **K. Dinter: Beiträge zur Flora von Südwest-Afrika. I. *Mesembryanthema* nova.** — Fedde: Repertorium specierum novarum regni vegetabilis XIX, p. 122—160. Berlin 1923.
- D.D.F.** — **K. Dinter: Diagnosen neuer südwestafrikanischer Pflanzen.** — Fedde: Repertorium specierum novarum regni vegetabilis XXIX, 1931, p. 253—272; XXX, 1932, p. 80—96, 180—205. Berlin.
- D.N.Pfl.** — **K. Dinter: Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwest-Afrikas.** — Okahandja 1914.
- D.S. I** — **K. Dinter: Sukkulentenforschung in Südwest-Afrika.** — Fedde: Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, Beiheft XXIII. Berlin 1923.
- D.S. II** — **K. Dinter: Sukkulentenforschung in Südwest-Afrika, II. Teil.** — Herrnhut 1928.
- D.K.G.** — **Deutsche Kakteen-Gesellschaft, Berlin.** Monatsschrift für Kakteenkunde, Bd. 28, 1918; Bd. 29, 1919; Bd. 30, 1920; Bd. 31, 1921; Bd. 32, 1922. — Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Bd. I, 1923/24; Bd. II, 1925/26; Bd. III, 1927/28. — Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Bd. I, 1929; Bd. II, 1930; Bd. III, 1931; Bd. IV, 1932. — Kakteenkunde 1933, 1934, 1935, 1936. — Kakteen und andere Sukkulenten 1937, 1938 (Period. Publikat.)
- D.K.G.J.** — **Deutsche Kakteen-Gesellschaft, Jahrbuch** Bd. I: Juli 1935 bis Dezember 1936.
- Fl.P.** — **The Flowering Plants of South Africa.** — Edited by J. B. Pole Evans. London and Cape Town. (Period. Publikat.) Vol. II, 1922; Vol. III, 1923; Vol. VII, 1927.
- F.R.** — **Fedde: Repertorium specierum novarum regni vegetabilis.** Berlin. (Period. Publikat.) — Vol. I 1905; Vol. II 1906; Vol. III 1906/07; Vol. IV 1907; Vol. V 1908; Vol. VI 1908/09; Vol. VII 1909; Vol. VIII 1910; Vol. IX 1910/11; Vol. X 1910/11; Vol. XI 1911/12; Vol. XII 1913; Vol. XIII 1915; Vol. XIV 1916; Vol. XV 1919; Vol. XVI 1920; Vol. XVII 1921; Vol. XVIII, 1922; Vol. XIX 1924; Vol. XX 1924; Vol. XXI 1925; Vol. XXII 1926; Vol. XXIII 1926/27; Vol. XXIV 1927; Vol. XXV 1928; Vol. XXVI 1929; Vol. XXVII 1929/30; Vol. XXVIII 1930; Vol. XXIX 1931; Vol. XXX 1932; Vol. XXXI 1932; Vol. XXXII 1933; Vol. XXXIII 1933; Vol. XXXIV 1933; Vol. XXXV 1934; Vol. XXXVI 1934; Vol. XXXVII 1934; Vol. XXXVIII 1935; Vol. XXXIX 1935/36; Vol. XL 1936; XLIII 1938.
- G.C.** — **The Gardeners Chronicle,** — London, Covent Garden (Period. Publikat.). — N. E. Brown: *Mesembryanthemum* and some new genera separated from it: 1921 II/ = Vol. LXX; 1922 I/ = Vol. LXXI; 1922 II/ = LXXII; 1925 II/ = LXXVIII; N. E. Brown: *Mesembryanthema*: 1926 I/ = Vol. LXXIX;

- 1926 II/ = Vol. LXXX; 1927 I/ = Vol. LXXXI; 1927 II/ = Vol. LXXXII; 1928 I/ = Vol. LXXXIII; 1928 II/ = Vol. LXXXIV; 1929 I/ = Vol. LXXXV; 1929 II/ = Vol. LXXXVI; 1930 I/ = Vol. LXXXVII; 1930 II/ = LXXXVIII; 1931 I/ = LXXXIX; 1931 II/ = Vol. XC; 1932 I/ = Vol. XIC.
- Gfl.** = **Gartenflora.** — Deutsche Gartenbau-Gesellschaft, Berlin (Period. Publikat.). — Vol. 76 1927; Vol. 77 1928.
- G.S.L.** = **K. Dinter: Südwestafrikanische Lithops-Arten.** — Verzeichnis R. Graessner, Perleberg 1928.
- Gw.** = **Die Gartenwelt.** — Verlag Paul Parey, Berlin SW 11 (Period. Publikat.). — Vol. XXXII 1928; Vol. XXXIII 1929.
- J.B.** = **Journal of Botany** by Rendle. British and foreign. (Period. Publikat.) Vol. 65 1927; Vol. 66 1928; Vol. 67 1929; Vol. 68 1930.
- J.C.S.** = **Journal of the Cactus and Succulent Society of America.** — 1800 Marengo Street, Los Angeles, California (Period. Publikat.). — Vol. I 1929/30; Vol. II 1930/31; Vol. III 1931/32; Vol. IV 1932/33; Vol. V 1933/34; Vol. VI 1934/35; Vol. VII 1935/36.
- J.S.** = **H. Jacobsen: Die Sukkulente.** — Verlag Paul Parey, Berlin SW 11, 1933.
- J.S.P.** = **H. Jacobsen: Succulent Plants.** — Williams and Norgate, Ltd., London 1935.
- L.B.I.** = **L. Bolus: Notes on Mesembryanthemum and some allied genera.** With descriptions of a hundred new species. — Vol. I, 1928. The Specialty Press of South Africa. Ltd. Wynberg (Cape).
- L.B. II** = **L. Bolus: Notes on Mesembryanthemum and some allied genera. Part II.** Capetown, Nov. 1928 — Febr. 1935. University of Capetown, Bolus Herbarium.
- L.B. III** = Desgl. Part III, 1936/37 usw.
- K.Kd.** = **Kakteenkunde.** — Verlag J. Neumann-Neudamm (Period. Publikat.) 1937/38. (Bis 1936 war diese Zeitschrift Organ der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Siehe D.K.G.)
- M.** = **Labarre: Mesembryanthema.** — L. Reeve and Co., Ltd. Ashford, Kent, England. 1931.
- M.D.G.Z.** = **Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.** — Erfurt. (Period. Publikat.) Vol. 41 1926; Vol. 42 1927; Vol. 43 1928.
- M.Fl.Pl.I.** = **J. Burt Davy: A Manual of the flowering Plants and Ferns of the Transvaal with Swaziland, S.-Africa Part I, Ficoideae** p. 156–164. London 1926.
- M.J.B.H.** = **Mitteilungen aus dem Institut für allgemeine Botanik in Hamburg.** — 8. Bd., Heft 1, 1929.

- N.E.Br.M.** = N. E. Brown: New and old species of *Mesembryanthemum* with critical notes. — Journal of the Linnean Society-Botany. — Vol. XLV, July 1920, London (Period. Publikat.).
- P.G.S.A.P.** = E. P. Phillips: The Genera of South African Flowering Plants. — Capetown 1926.
- v.P.M.** = Dr. K. von Poellnitz: Die Aufteilung der Gattung *Mesembryanthemum*. — Fedde: Repertorium specierum novarum regni vegetabilis XXXII, Berlin 1933.
- S.** = Succulenta. — Maanblad van de Nederlandse Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. — Leeuwarden (Period. Publ.). — Jahrg. I bis 19, 1919 bis 1938.
- S.G.** = South African Gardening and Country Life. — The Specialty Press, Wynberg, Cape (Period. Publikat.). — Vol. XVII bis XXV, 1927 bis 1935.
- Tr.Ph.S.** = Transactions of the South African Philosophical Society. — Capetown. (Period. Publikat.) Vol. XVIII, 1907.
- Tr.R.S.** = Transactions of the Royal Society of South Africa. — Capetown. (Period. Publikat.) — Vol. I 1909/10, p. 150—155, 405—408; Vol. II 1910—1912, p. 34, 369; Vol. IV 1914/15, p. 137—138.

Zur gefl. Beachtung:

Seite 5 sind Erläuterungen eingefügt, welche auf Bezeichnungen hinweisen, die mit einem + bzw. × versehen sind.

***Acaulon* N.E.Br.**

J.B. (1928) 76; G.C. (1930, II) 279, 474; v.P.M. 23; A. 210.
Acaulon rosulatum N.E.Br. = *Aistocaulon rosulatum* v.P.

***Acrodon* N.E.Br.**

- * G.C. (1927, I) 12; J.B. (1928) 74; v.P.M. 24; A. 211.
***Acrodon bellidiflorus* (L.) N.E.Br.** — (*Mes. bellidiflorum* L., *Mes. bellidiflorum* var. *glaucescens* Haw.). — Mossel Bay-Divis. — J.B. (1928) 77; M. 104.
***Acrodon bellidiflorus* (L.) N.E.Br. var. *striatus* (Haw.) N.E.Br.** — (*Mes. bellidiflorum* var. *striatum* Haw., *Mes. bellidiflorum* Haw., *Mes. bellidiflorum* var. *subulatum* Haw.). — S.-Afr. — J.B. (1928) 178.
***Acrodon bellidiflorus* (L.) N.E.Br. var. *viridis* (Haw.) N.E.Br.** — (*Mes. bellidiflorum* var. *viride* Haw. — S.-Afr. — J.B. (1928) 178.
***Acrodon subulatus* (Mill.) N.E.Br.** — (*Mes. subulatum* Mill., *Mes. bellidiflorum* D.C., *Mes. bellidiflorum* var. *subulatum* S.D.). — Riversdale Divis. — J.B. (1928) 77; M. 106.

***Aethephyllum* N.E.Br.**

- M.D.G.Ztg. (1928) 400; v.P.M. 24; A. 211.
***Aethephyllum pinnatifidum* (L.) N.E.Br.** — (*Mes. pinnatifidum* L.f., *Mes. pinnatum* Thbg., *Cleretum pinnatifidum* L.Bol., *Cleretum pinnatifidum* N.E.Br.). — S.-Afr., sandige Berge bei Tulbagh. — L.B. I. 131 (*Cl. pinn.*); G.C. (1927, II) 228 (*Cl. pinn.*); M.D.G.Ztg. (1928) 400.

***Agnirictus* Schwant.**

- D.K.G. (1930) 21; v.P.M. 24; A. 220.
***Agn. agninum* (Haw.) Schwant.** — (*Mes. agninum* Haw., *Stomatium agninum* Schwant.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 269 (*Mes. agn.*); sh. D.K.G. (1925/26) 176 (*Stom. agn.*); D.K.G. (1930) 22.
***Agn. agninus* (Haw.) Schwant. var. *integrifolius* (Salm.) Schwant.** — (*Mes. agninum* Haw. var. *integrifolium* Salm.). — S.-Afr. — B.M.P. 270 (*Mes. agn.* var. *integrifol.*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 41.
***Agn. Lesliei* Schwant.** — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G. (1930) 21.

Aistocaulon vcn Poelln.

J.S.Pl. 123.

Aistocaulon rosulatum (Kensit) v.Poelln. — (*Mes. rosulatum* Kensit. *Aloinopsis rosulata* Schwant., *Acaulon rosulatum* N.E.Br.). — Willowmoore Divis., nahe Willowmoore; Kruidontein; Miller Distr. — Tr.R.S. I. 152 (*Mes. ros.*); F.R. XI. 477 (*Mes. ros.*); D.K.G. (1925 bis 1926) 178 (*Al. ros.*); D.K.G. (1927/28) 105 (*Al. ros.*); J.B. (1928) 176 (*Acaulon ros.*); S.G. (1929) 288 (*Al. ros.*); G.C. (1930, II) 474 (*Acaulon ros.*); M. 102 (*Acaulon ros.*); J.S.Pl. 123.

Aloinopsis Schwant.

D.K.G. (1925/26) 177; J.B. (1928) 78; v.P.M. 24.

Al. albinota Schwant. = *Rabiea albinota* N.E.Br.*Al. albipuncta* Schwant. = *Rabiea albipuncta* N.E.Br.*Al. aloides* Schwant. = *Nananthes aloides* Schwant.*Al. aloides* Schwant. var. *striata* L.Bol. = *Nananthus aloides* Schwant. var. *striatus* L.Bol*Al. Bromii* L.Bol. — Transvaal, bei Maquassi. — L.B. II. 474.*Al. cibdela* Schwant. = *Rabiea cibdela* N.E.Br.*Al. crassipes* L.Bol. = *Titanopsis crassipes* N.E.Br.*Al. Dyeri* L.Bol. = *Nananthus rubrolineatus* Schwant.*Al. Gerstneri* L.Bol. — Aliwal North Divis., zwischen Aliwal North und Doctor's Drift. — L.B. II. 46.*Al. Jamesii* L.Bol. — Cradock. Berge bei Halesowen. — L.B. II. 294.*Al. Lodevykii* L.Bol. — Bushmanland. — L.B. III. 47.*Al. Loganii* L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — L.B. II. 397.*Al. Orpenii* L.Bol. = *Prepodesma Orpenii* N.E.Br.*Al. pallens* L.Bol. — Gordonia Divis., bei Upington. — L.B. II. 473.*Al. Peersii* L.Bol. = *Deitanthe Peersii* N.E.Br.*Al. Pole Evansii* N.E.Br. = *Nananthus Pole Evansii* N.E.Br.*Al. rosulata* Schwant. = *Aistocaulon rosulatum* v.Poelln.*Al. rubrolineata* Schwant. = *Nananthus rubrolineatus* Schwant.*Al. Schooneesii* L.Bol. — Willowmoore, bei Steylerville. — L.B. II. 295; D.K.G. (1934) 53.*Al. transvaalensis* Schwant. = *Nananthus vittatus* Schwant.*Al. vittata* Schwant. = *Nananthus vittatus* Schwant.*Al. Witmaniae* L.Bol. — Griqualand West. — L.B. II. 397.*Amoebophyllum* N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 244; J.B. (1928) 79; G.C. (1928, I) 419; v.P.M. 25; A. 211.

Am. angustum N.E.Br. — (*Amoebophyllum roseum* L.Bol.). — Klein-Namaland, nahe Silverfontein, Copperberg. — S.G. (1927) 364 (*A. ros.*); J.B. (1928) 79; G.C. (1928, I) 419; L.B. I. 131 (*A. ros.*).

Am. Gürichianum (Pax) N.E.Br. — (*Mes. Gürichianum* Pax, *Cryophytum Gürichianum* Schwant.). — Damaraland, nahe Amichab. beim Ugab-Fluß. — J.B. (1928) 80; Gfl. (1928) 68 (*Cryoph. Gür.*); G.C. (1928, I) 419.

Am. Rangei N.E.Br. — Gr.-Namaland, Keis-Ebene, nahe Letterkopp. — J.B. (1928) 80; G.C. (1928, I) 419.

Am. roseum L.Bol. = *Am. angustum* N. E.Br

Antimima N.E.Br.

G.C. (1930, I) 211; v.P.M. 24; A. 211.

Antimima dualis N.E.Br. (*Mes. duale* N.E.Br., *Argyroderma duale* N.E.Br., *Ruschia dualis* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., auf Hügeln nahe Bakhuis, bei Van Rhynsdorp. — N.E.Br.M. 89 (*Mes. dual.*); G.C. (1922, I) 105 (*Arg. dual.*); D.K.G. (1927/28) 183, 347 (*Arg. dual.*); L.B. II.104 (*Ruschia dual.*); G.C. (1930, I) 211; M. 107.

Apatesia N.E.Br.

G.C. (1927, I) 12; J.B. (1928) 80, 138; G.C. (1932, I) 262, 263; v.P. M. 25; A. 211.

Apatesia helianthoides (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. helianthoides* Ait., *Mes. calendulaceum* Haw., *Mes. Candollei* Haw., *Mes. pilosum* Haw., *Thyrosperma helianthoides* N.E.Br.?, *Thyrasperma sabulosa* N.E.Br. — S.-Afr., Cape Peninsula, an sandigen Stellen. — G.C. (1927, I) 12; J.B. (1928) 80, 138; G.C. (1930, I) 71 (*Thyrasp. sabulosa*); G.C. (1932, I) 262, 263.

Apatesia Maughanii N.E.Br. — Piquetberg Divis., bei Endekuil. — G.C. (1932, I) 263.

Apatesia Pillansii N.E.Br. — S.-Afr., in weißem Sand am Somerset-Strand, nahe False Bay. — G.C. (1932, I) 262.

Aptenia N.E.Br.

G.C. (1925, II) 412; J.B. (1928) 139; G.C. (1928, II) 313; v.P.M. 25; A. 211.

Aptenia cordifolia (L.f.) N.E.Br. = *Aptenia cordifolia* (L.f.) Schwant.

Aptenia cordifolia (L.f.) Schwant. — (*Mes. cordifolium* L.f., *Litocarpus cordifolius* L.Bol., *Aptenia cordifolia* N.E.Br.). — Östliche Küstenwüsten Süd-Afrikas. — Fl.Pl. VII. Pl. 261 (*Litoc. cordif.*); Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 139; G.C. (1928, II) 313; v.P.M. 25; F.R. XLIII. 222; D.K.G. (1938) 41.

Aptenia cordifolia (L.f.) Schwant. var. *variegata* hort. — (*Mes. cordifolium* f. var. *variegatum* hort.).

***Argeta* N.E.Br.**

G.C. (1927, II) 113; J.B. (1928) 265; D.K.G. (1929) 234; v.P.M. 26; A. 211; D.K.G. (1937) 150.

Argeta petrensis N.E.Br. = *Gibbaeum petrense* Tisch.

***Argyroderma* N.E.Br.**

G.C. (1922) I. 92, 105; D.K.G. (1925/26) 116; G.C. (1926) I. 268; P.G. S.A.P. 242; S. (1928) 104; J.B. (1928) 265; D.K.G. (1929) 27; S.G. (1929) 181; v.P.M. 26; A. 211.

Arg. amoenum Schwant. — (*Arg. testiculare* var. *luteum* N.E.Br.). — G.C. (1922, I) 93 (*Arg. test. lut.*); G.C. (1926, I) 268 (*Arg. test. lut.*); D.K.G. (1927/28) 181, 182, 347 *Arg. test. lut.*); D.K.G. (1929) 32.

Arg. angustipetalum L.Bol. — (*Arg. Jacobsenianum* Schwant.). — Kl.-Namaland, Koekenaap; 12 miles nördl. Port Nolloth. — S.G. (1928) 198; J.S. 91 (*Arg. Jacobs.*); J.S.Pl. 126 (*Arg. Jacobs.*); D.K.G. (1928) 198 (*Arg. Jacobs.*).

Arg. aureum L.Bol. — Kl.-Namaland, Van Rhynsdorp Divis., Mrs. Rood's Farm westl. Van Rhynsdorp. — S.G. (1934) 198.

Arg. australe L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., auf Kalksteinhügel an der rechten Seite des Weges vor Eingang von Van Rhynsdorp. — L.B. II. 455.

Arg. blandum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlokke. — L.B. II. 455.

Arg. Braunsii Schwant. — (*Cheiridopsis Braunsii* Schwant.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — D.K.G. (1927/28) 179 (*Cheir. Braunsii*); J.C. (1929) 19 (*Cheir. Braunsii*); Gw. (1929) 69; D.K.G. (1929) 31, 32.

Arg. brevipes (Schltr.) Schwant. — (*Mes. brevipes* Schltr., *Arg. digitifolium* Schwant., *Roodia brevipes* L.Bol., *Roodia digitifolia* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, trockene Hügel nahe Zout-River in der Knechs Vlagte. — B.M.P. 274 (*Mes. brevipes*); G.C. (1926, I) 308 (*Arg. digit.*); Fl.Pl. VII. Pl. 268 (*Roodia brevipes*); D.K.G. (1927/28) 348 (*Roodia digit.*); D.K.G. (1929) 31 (*Arg. digit.*); B.M.J. (1929) 61 (*Roodia digit.*); L.B. II. 79.

Arg. brevitubum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 456.

Arg. carinatum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 456.

Arg. citrinum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 11½ miles südl. der Salt-River-Brücke. — L.B. II. 438.

Arg. concinnum (N.E.Br.) Schwant. — (*Arg. testiculare* var. *roseum* N.E.Br.). — G.C. (1926, I) 269 (*Arg. test. ros.*); D.K.G. (1929) 32; S.G. (1929) 183.

Arg. congregatum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — S.G. (1932) 177.

- Arg. crateriforme* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. crateriforme* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — A.B.H. III. 165 (*Mes. crat.*); D.K.G. (1927/28) 183, 347; Fl.Pl.VII. Pl. 268; J.B. (1928) 265.
- Arg. cuneatipetalum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 8 miles jenseits der Zout River-Brücke. — L.B. II. 457.
- Arg. Delaetii* Maass = *Arg. roseum* Schwant.
- Arg. Delaetii* Maass var. *purpureum* Maass. — D.K.G. (1927/28) 294, 347.
- Arg. densipetalum* L.Bol. — Von Rhynsdorp Divis., bei Nieuwerust. — L.B. II. 457.
- Arg. digitifolium* Schwant. = *Arg. brevipes* L. Bol.
- Arg. duale* N.E.Br. = *Antimima dualis* N.E.Br.
- Arg. fissum* (Haw.) L.Bol. — (*Mes. fissum* Haw.). — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 79; M. 79.
- Arg. formosum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 458.
- Arg. Framesii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. — L.B. II. 459.
- Arg. Framesii* L.Bol. var. *minus* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 11 miles nördl. Zout River-Brücke — L.B. II. 459.
- Arg. gregarium* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlaakte, Hügel 3 miles vom Hauptweg zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. — L.B. III. 45.
- Arg. Hutchinsonii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 85.
- Arg. Jacobsenianum* Schwant. = *Arg. angustipetalum* L.Bol.
- Arg. Kleijnhansii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Bakklyplaats bei Oliphant's River. — L.B. II. 460.
- Arg. latipetalum* L.Bol. — Zwischen Van Rhynsdorp und Namaland. — L.B. II. 462.
- Arg. Lesliei* N.E.Br. = *Arg. octophyllum* Schwant.
- Arg. leucanthum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., in der Mitte der Fläche begrenzt östl. vom Vers River und westl. vom Zout River, links des Weges. — L.B. II. 460.
- Arg. longipes* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 7 miles von Nieuwerust am Rande der Knechtsvlaakte. — L.B. II. 461.
- Arg. Luckhoffii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Zout River-Brücke. — S.G. (1934) 198.
- Arg. Margaretae* N.E.Br. = *Lapidaria Margaretae* Schwant.
- Arg. necopinum* N.E.Br. — (*Mes. necopinum* N.E.Br., *Mes. testiculare* var. γ Haw., *Mes. octophyllum* var. β Haw.). — Fundort unbekannt, wahrscheinlich zwischen Van Rhynsdorp und Kl.-Namaland. — N.E.Br.M. 90 (*Mes. nec.*); G.C. (1922, I) 105; G.C. (1926, I) 268; D.K.G. (1927/28) 183, 347; S. (1928) 121; D.K.G. (1929) 29, 30 (*Mes. test.* var. γ *Mes. oct.* var. β); M. 116.

Arg. Nortieri L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Klaver über den Fluß. — **L.B. II. 462.**

Arg. octophyllum L.Bol. = *Arg. octophyllum* Schwant.

Arg. octophyllum (Haw.) Schwant. — (*Mes. octophyllum* Haw., *Mes. octophyllum* Verl., *Arg. Lesliei* N.E.Br., *Arg. octophyllum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis. D.K.G. (1927/28) 183 (*Mes. oct.*); M. 261 (*Mes. oct.*); M. 112 (*Arg. Lesl.*); D.K.G. (1929) 28; S.G. (1929) 183; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 222.

Arg. orientalis L.Bol. — Calvinia Divis., bei Calvinia. — **L.B. II. 463.**

Arg. orale L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 15 miles westl. von Van Rhynsdorp im niederen Bereich des Vers River. — **L.B. II. 463;** S.G. (1924) 221.

Arg. Pearsonii (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. Pearsonii* N.E.Br., *Arg. testiculare* var. *Pearsonii* N.E.Br.). — B.Mag. 138 Tab. 8463 (*Mes. Pears.*); G.C. (1922, I) 93 (*Arg. test. Pears.*); G.C. (1926, I) 268 (*Arg. test. Pears.*); D.K.G. (1927/28) 181, 182, 347 (*Arg. test. Pears.*); D.K.G. (1929) 32.

Arg. Peersii L.Bol. — Genauer Standort unbekannt, zwischen Van Rhynsdorp und Namaland. — **L.B. II. 464.**

Arg. planum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — **L.B. II. 465.**

Arg. productum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — **L.B. II. 465.**

Arg. pulvinare L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — **L.B. II. 466.**

Arg. reniforme L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlaakte, Hügel 7 miles vom Hauptweg zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust — **L.B. III. 45.**

Arg. ringens L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. zwischen Klaver und Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 437.**

Arg. roseatum N.E.Br. = *Lapidaria Margaretae* Schwant.

Arg. roseum (Haw.) Schwant. — (*Mes. octophyllum* var. *roseum* Haw., *Mes. testiculare* Jacq., *Mes. testiculatum* Jacq. var. *roseum* Haw., *Arg. testiculare* var. *roseum* N.E.Br., *Arg. Delaetii* Maass). — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — G.C. (1922, I) 93 (*Arg. test. ros.*); D.K.G. (1927/28) 180 (*Arg. Delaetii*); D.K.G. (1927/28) 181, 182, 347 (*Arg. test. ros.*); J.B. (1928) 266 (*Arg. Delaetii*); S. (1928) 109 (*Arg. Delaetii*); D.K.G. (1929) 30; M. 109 (*Arg. Delaetii*).

Arg. Schlechteri Schwant. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. in der Knechtsvlaakte bei Van Rhynsdorp, bei Grootmiss. — D.K.G. (1929) 32; S.G. (1929) 181; D.K.G. (1934) 53.

Arg. Schuldtii Schwant. — **J.S.P. 129.**

Arg. speciosum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., genauer Standort unbekannt. — **L.B. II. 466.**

Arg. splendens L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Standort unbekannt. — **L.B. II. 467.**

- Arg. strictum* L.Bol. — Von Rhynsdorp Divis., zwischen Koekenaap und Nieuwerust. — L.B. III. 46.
- Arg. subalbum* N.E.Br. — (*Mes. subalbum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., nahe Bakhuis. — N.E.Br.M. 91 (*Mes. subalb.*); G.C. (1922. I) 93; D.K.G. (1927/28) 183, 347; D.K.G. (1929) 29; M. 117.
- Arg. subrotundum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Standort unbekannt. — L.B. II. 467.
- Arg. testiculare* (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. testiculare* Ait.). — Karroo. — G.C. (1922, I) 93; D.K.G. (1927/28) 181, 347; S. (1928) 106.
- Arg. testiculare* (Ait.) N.E.Br. var. *luteum* N.E.Br. = *Arg. amoenum* Schwant.
- Arg. testiculare* var. *Pearsonii* N.E.Br. = *Arg. Pearsonii* Schwant.
- Arg. testiculare* var. *roseum* N.E.Br. — (G.C. [1926, I] 269) = *Arg. concinnum* Schwant.
- Arg. testiculare* var. *roseum* N.E.Br. — (G.C. [1922, I] 93) = *Arg. roseum* Schwant.
- Arg. Villetii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Koekenaap, ca. 45 km nordwestlich von Van Rhynsdorp. — S.G. (1924) 198; D.K.G.J. I. 49.

Aridaria N.E.Br.

- G.C. (1925, II) 433; J.B. (1928) 140; v.P.M. 27; A. 211.
- Arid. abbreviata* L.Bol. — Kl.-Namaland, Quarzhügel zwischen Zout River und Nieuwerust. — L.B. II. 177.
- Arid. acuminata* (Haw.) Schwant. — (*Mes. acuminatum* Haw., *Mes. flexuosum* S.D., *Mes. sulcatum* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 121 (*Mes. acum.*); N.E.Br.M. 107; Gfl. (1928) 69.
- Arid. anginea* L.Bol. — Kl.-Namaland, Karroide Hügel zwischen Groot Derm und der Mündung des Orange River. — L.B. I. 128.
- Arid. arcuata* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — L.B. II. 33.
- Arid. arenicola* L.Bol. — Kl.-Namaland, sandige Flächen an der Hondeklip Bay. — L.B. II. 357.
- Arid. aurea* (Thbg.) L.Bol. — (*Mes. aureum* Thbg.). — Van Rhynsdorp Divis., beim Zout River. — L.B. II. 68.
- Arid. ausana* (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. ausanum* Dtr. et Bgr.). — Gr.-Namaland, Aus. — F.R. XIX. 132, 188 (*Mes. aus.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. blanda* L.Bol. — Laingsburg Divis., Ebene bei Whitehill. — L.B. II. 148.
- Arid. brevicarpa* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Doornpoort. — L.B. II. 33.
- Arid. brevifolia* L.Bol. — S.-Afr., bei Barrydale. — L.B. I. 127.



- Arid. brevisepala* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Walle Kraal. — L.B. II. 26.
- Arid. calycina* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 49.
- Arid. caudata* L.Bol. — L.B. I. 65 (ohne Text!), S.G. (1928) 127.
- Arid. celans* L.Bol. — Montagu Divis., 20 miles von Montagu an dem alten Wege nach Ladysmith. — L.B. III. 1.
- Arid. compacta* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — L.B. II. 34.
- Arid. congesta* L.Bol. — Zwischen Van Rhynsdorp und Springbok. — L.B. II. 178.
- Arid. constricta* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 5.
- Arid. debilis* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 49.
- Arid. decidua* L.Bol. — Kl.-Namaland, am Koodas River südl. Sendlingsdrift. — L.B. I. 128.
- Arid. decurrata* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Sendlingsdrift. — L.B. I. 97, 133; S.G. (1927) 433.
- Arid. defoliata* (Haw.) Schwant. — (*Mes. defoliatum* Haw., *Mes. clavatum* Jacq.). — S.-Afr. — B.M.P. 125 (*Mes. defol.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. Dejagerae* L.Bol. — Beaufort West-Divis., bei Beaufort West. — L.B. II. 312.
- Arid. dela* L.Bol. — (*Mes. delum* L.Bol.). — Kap Prov., Upper Region, Nieuwoudtsville; Western Region, Van Rhynsdorp. — A.B.H. IV. II (*Mes. delum*); Fl.Pl. VII. Pl. 258.
- Arid. Dyeri* L.Bol. — Albany Divis., Botha's Hill. — L.B. II. 28.
- Arid. ebracteata* N.E.Br. var. *brevipetala* L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Clanwilliam und Oliphants River. — L.B. II. 227.
- Arid. fastigiata* (Haw.) Schwant. — (*Mes. fastigiatum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 120 (*Mes. fastig.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. flexuosum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. flexuosum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 122 (*Mes. flex.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. floribunda* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Bitterfontein und Springbok. — L.B. II. 161.
- Arid. Framesii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 4.
- Arid. fulva* (Haw.) Schwant. — (*Mes. fulvum* Haw., *Mes. noctiflorum* var. *fulvum* S.D.). — Gr.-Namaland, bei Graaf Reinet, bei Garub. — B.M.P. 125 (*Mes. fulvum*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. Fourdadei* L.Bol. — Uniondale Divis., niedrige Abhänge des Zuurberg, bei Georgida. — L.B. II. 69.
- Arid. glandulifera* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — L.B. II. 215.
- Arid. globosa* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Bitterfontein. — L.B. II. 148.

- Arid. Godmaniae* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Bitterfontein. — L.B. II. 131.
- Arid. gracilis* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Hügel bei Zout River 18 miles von Van Rhynsdorp. — L.B. II. 70.
- Arid. Gratiae* L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown längs des Cradock-Weges. — L.B. II. 312.
- Arid. horizontalis* (Haw.) Schwant. — (*Mes. horizontale* Haw.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69.
- Arid. intricata* L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Klaver und Clanwilliam. — L.B. II. 131.
- Arid. latipetala* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Concordia und Pella. — L.B. II. 111.
- Arid. laxa* L.Bol. = *Sphalmanthus laxus* N.E.Br.
- Arid. laxipetala* L.Bol. — Worcester Divis., beim Doorn River. — L.B. II. 214.
- Arid. leptopetala* L.Bol. — Ladismith Divis., zwischen Touw's River und Ladismith. — L.B. II. 225.
- Arid. lignea* L.Bol. — Bushmanland, Puffadder. — L.B. II. 50.
- Arid. longispinula* L.Bol. = *Sphalmanthus longispinulus* N.E.Br.
- Arid. longistyla* (D.C.) Schwant. — (*Mes. longistylum* D.C., *Mes. pallens* Jacq., *Mes. pallescens* var. β Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 122 (*Mes. longist.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. longituba* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Hügel etwa 1 mile südl. Bitterfontein. — L.B. II. 193.
- Arid. luteoalba* L.Bol. — Orange Free State. — L.B. I. 144.
- Arid. macrosiphon* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlakte. — L.B. II. 358.
- Arid. meridiana* L.Bol. — Calvinia Divis., Nieuwoudtsville. — L.B. II. 132.
- Arid. Meyeri* L.Bol. — Kl.-Namaland, Obob bei Steinkopf. — L.B. II. 475.
- Arid. multiseriata* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Hondeklip. — L.B. II. 226.
- Arid. nutans* L.Bol. — Cradock Divis. — L.B. II. 149.
- Arid. noctiflora* L.Bol. = *Aridaria noctiflora* Schwant.
- Arid. noctiflora* (L.) Schwant. — (*Mes. noctiflorum* L., *Aridaria noctiflora* L.Bol.). — SW.-Afr., Büllsporter Fläche, östl. Karasberg, sandige Flächen nordöstl. von Narudas-Süd. — B.M.P. 123 (*Mes. noct.*); A.B.H. I. 18 (*Mes. noct.*); F.R. XIX. 191 (*Mes. noct.*); Gfl. (1928) 69; A.B.H. IV. 128; D.K.C. (1937) 160; F.R. XLIII. 222.
- Arid. obtusa* L.Bol. — Kl.-Namaland (?), Standort unbekannt. — L.B. II. 227.
- Arid. oculata* (N.E.Br.) L.Bol. — (*Mes. oculatum* N.E.Br., *Sphalmanthus oculatus* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Quarz-

- gestein der oberen nordwestl. Abhänge der Hügel südwestl. Chu-biessis. — N.E.Br.M. 120 (*Mes. ocul.*); G.C. (1928. II) 95 (*Sphalm. oc.*); L.B. II. 215.
- Arid. oubergensis* L.Bol. — Zwischen Toums River und Montagu, Ouberg-Paß. — L.B. II. 417.
- Arid. oralis* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kommaggas. — L.B. II. 228.
- Arid. parvisepala* L.Bol. var. *fera* L.Bol. — Kl.-Namaland, 2 miles nordöstl. von Walle Kraal. — L.B. II. 70.
- Arid. paucandra* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Zout River und Nieuwerust, in Frames' Koppie. — L.B. II. 162.
- Arid. paucandra* L.Bol. var. *gracillima* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Nieuwerust. — L.B. II. 162.
- Arid. Peersii* L.Bol. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — L.B. II. 193.
- Arid. pentagona* L.Bol. — Albany Divis., Fish River-Valley (Tal), zwischen Ploto' Vale und Committees flats. — L.B. II. 35.
- Arid. pentagona* L.Bol. var. *occidentalis* L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Preska. — L.B. II. 337.
- Arid. platysepala* L.Bol. — Bei Montagu. — L.B. II. 417.
- Arid. Pomonae* L.Bol. — Gr.-Namaland, bei Pomona. — L.B. II. 418.
- Arid. prasina* L.Bol. — Kl.-Namaland, Walle Kraal bei Hondeklip Bay. — L.B. II. 6.
- Arid. primulina* L.Bol. — Uitenhage Divis., bei Despatch; Willowmoore Divis., bei Toverwater Poort. — L.B. II. 26.
- Arid. pumila* L.Bol. — S.-Afr., bei Laingsburg. — L.B. II. 214.
- Arid. quartzitica* L.Bol. — Kl.-Namaland, Küstengürtel zwischen Port Nolloth und Holgat. — L.B. II. 69.
- Arid. quaterna* L.Bol. — S.-Afr., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 337.
- Arid. Rabei* L.Bol. = *Sphalmanthus Rabei* N.E.Br.
- Arid. rabiesbergensis* L.Bol. — Worcester Divis., Langebergen, Rabies Berg. — L.B. III. 1.
- Arid. radicans* L.Bol. — SW.-Afr., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 102.
- Arid. recurra* L.Bol. — Bushmanland, zwischen Steinkopf und Goodhouse. — L.B. II. 359.
- Arid. recurrata* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Sendlingsdrift. — L.B. I. 133.
- Arid. resurgens* L.Bol. = *Phyllobolus resurgens* Schwant.
- Arid. rhodandra* L.Bol. — Calvinia Divis., zwischen Karroopoort und Calvinia. — L.B. II. 225.
- Arid. rosea* L.Bol. — Oudtshoorn Divis., bei Calitzdorp. — L.B. II. 27.
- Arid. saturata* L.Bol. — Clanwilliam Divis. — L.B. II. 178.
- Arid. serotina* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — J.B. (1928) 196.

- Arid. splendens* (L.) Schwant. — (*Mes. splendens* L.). — S.-Afr. — B.M.P. 119 (*Mes. splendens*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. straminea* L.Bol. = *Aridaria straminicolor* L.Bol.
- Arid. straminea* (Haw.) Schwant. — (*Mes. stramineum* Haw.). — Gfl. (1928) 69.
- Arid. straminicolor* L.Bol. comb. nov. — (*Aridaria straminea* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Steinkopf. — L.B. II. 359 (*Aridaria straminea*). (Die comb. nov. laut briefl. Mitteilung.)
- Arid. striata* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 2.
- Arid. stricta* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Pograbies Poort. — S.G. (1927) 433; L.B. I. 98, 133.
- Arid. subaequans* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 2.
- Arid. subpatens* L.Bol. — S.-Afr., bei Graaf Reinet. — L.B. III. 3.
- Arid. suffusa* L.Bol. — Kap Prov., Western Region, Kl.-Namaland, Hügel westl. Arris Drift. — A.B.H. IV. 102.
- Arid. sulcata* (Haw.) Schwant. — (*Mes. sulcatum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 119 (*Mes. sulc.*); N.E.Br.M. 135 (*Mes. sulc.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. tenuifolia* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Walle Kraal, zwischen Walle Kraal und Garies. — L.B. II. 150.
- Arid. tetragona* (Thbg.) L.Bol. — (*Mes. tetragonum* Thbg.; *Arid. tetragona* Schwant.). — S.-Afr., Hantam-Berge, Springbokkcel, Komseep. — B.M.P. 125 (*Mes. tetr.*); Fl.Pl. VII. Pl. 258; Gfl. (1928) 69; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.
- Arid. tetragona* Schwant. = *Arid. tetragona* L.Bol.
- Arid. tetramera* L.Bol. — Kl.-Namaland, sandige Hügel bei Hondeklip Bay. — A.B.H. IV. 103.
- Arid. tetramera* L.Bol. var. *parriflora* L.Bol. — Bei Van Rhynsdorp. — L.B. III. 3.
- Arid. trichotoma* (Thbg.) L.Bol. — (*Mes. trichotomum* Thbg.). — S.-Afr., in der Karroo zwischen Oliphants River und Bocklandsberg. — B.M.P. 131 (*Mes. trich.*); Fl.Pl. VII. Pl. 258; S.G. (1927) 434; L.B. I. 16.
- Arid. umbelliflora* (Jacq.) Schwant. — (*Mes. umbelliflorum* Jacq.). — S.-Afr. — B.M.P. 121 (*Mes. umb.*); Gfl. (1928) 69.
- Arid. vernalis* L.Bol. — Ceres Divis., zwischen Patat's River und Karroopoort, nördl. des Bonteberg. — L.B. II. 337.
- Arid. vespertina* L.Bol. — Kl.-Namaland, südl. Seite des Orange River, karroide Hügel zwischen Dun Vlei und Groot Derm. — A.B.H. IV. 127.
- Arid. viridiflora* (Ait.) L.Bol. — (*Mes. viridiflorum* Ait., *Sphalmanthus viridiflorus* N.E.Br.). — S.-Afr. — B.M.P. 68 (*Mes. virid.*); G.C. (1928, II) 95 (*Sphalm. virid.*); L.B. II. 131.

Arid. Watermeyeri L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Droogehouts Flats. — L.B. II. 5.

Arid. willowmorensis L.Bol. — Willowmore Divis., bei Willowmore. — L.B. II. 216.

Aristanthus Schwant.

D.K.G. (1927/28) 28.

Aspazoma N.E.Br.

G.C. (1925, I) 413; P.G.S.A.P. 244; G.C. (1928, I) 419; J.B. (1928) 266; v.P.M. 27; A. 211.

Aspazoma amplexens (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. amplexens* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Hügel nahe Daunabis; Van Rhynsdorp Divis., Hügel nahe Nieuwerust; Berge nordöstlich Walle Kraal. — G.C. (1928, I) 419; J.B. (1928) 266.

Astridia Dtr. et Schwant.

D.K.G. (1927/28) 14, 16, 106; J.B. (1928) 266; v.P.M. 27; A. 211.

Astridia maxima (Haw.) Schwant. — (*Mes. maximum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 185 (*Mes. max.*); D.K.G. (1927/28) 16; J.B. (1928) 266.

Astridia velutina Dtr. — (*Mes. velutinum* Dtr.). — Gr.-Namaland, südl. Teil des Klinghardt-Gebirges. — D.B.F. XIX. 149 (*Mes. vel.*); D.K.G. (1927/28) 16, 106; J.B. (1928) 266.

Astridia velutina Dtr. var. *tutata* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlingsdrift. — L.B. II. 95.

Bergeranthus Schwant

D.K.G. (1925/26) 179; D.K.G. (1927/28) 105; J.B. (1928) 266; v.P.M. 27; A. 211.

Berg. albidus Schwant. = *Machairophyllum albidum* Schwant.

Berg. artus L.Bol. — Kap-Prov., South Eastern Region. — L.B. I. 87, 131; J.B. (1928) 267; S.G. (1927) 364.

Berg. caninus Schwant. = *Carruanthus caninus* Schwant

Berg. carinans (Haw.) Schwant. — (*Mes. carinans* Haw., *Mes. canum* Salm.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 245 (*Mes. car.*); N.E.Br.M. 65 (*Mes. car.*); D.K.G. (1925/26) 180; G.C. (1926, II) 229 (*Mes. car.*).

Berg. Cookii Schwant. = *Machairophyllum Cookii* Schwant.

Berg. Derenbergiana Schwant. = *Ebracteola Derenbergiana* Dtr. et Schwant.

Berg. glenensis N.E.Br. — Orange Free State. — M. 120.

Berg. granulatus Schwant. = *Hereroa granulata* Dtr. et Schwant.

- Berg. ignavus** Schwant. — S.-Afr. — D.K.G. (1925/26) 180; J.B. (1928) 267.
- Berg. Jamesii** L.Bol. — Cradock Divis., Abhänge nahe Halesowen. — L.B. III. 21.
- Berg. longisepalus** L.Bol. — Alexandria Divis., Bushman's River. — L.B. II. 476.
- Berg. Montis-Moltkei** Schwant. = *Ebracteola Montis-Moltkei* Dtr. et Schwant.
- Berg. multiceps** (Salm.) Schwant. — (*Mes. multiceps* Salm.). — Uitenhage Divis., Swartkops River und nahe Uitenhage. — B.M.P. 253 (*Mes. mult.*); D.K.G. (1925/26) 180; J.B. (1928) 267; M. 121.
- Berg. Puttkamerianus** Schwant. = *Hereroa Puttkameriana* Dtr. et Schwant.
- Berg. Rehneltianus** Schwant. = *Hereroa Rehneltiana* Dtr. et Schwant.
- Berg. rhomboideus** Schwant. = *Rhombophyllum rhomboideum* Schwant.
- Berg. scapigerus** Schwant. = *Berg. scapiger* N.E.Br.
- Berg. scapiger** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. scapiger* Haw., *M. scapigerum* Eckl. et Zeyh., *Bergeranthus scapigerus* Schwant.). — East London Divis., Uitenhage und Albany Divis., Caledon Divis. — D.K.G. (1925/26) 180; D.K.G. (1927/28) 105; J.B. (1928) 267; M. 122.
- Berg. respertinus** (Bgr.) Schwant. — (*Mes. respertinum* Bgr.). — Uitenhage und Albany Divis.; Somerset Divis., nahe Somerset East. — D.K.G. (1925/26) 180; J.B. (1928) 267.

Berrisfordia L.Bol.

- L.B. II. 313; v.P.M. 28; A. 220. (*Berrisfordia* ist Druckfehler!)
- Berrisfordia khamiesbergensis** L.Bol. — Kl.-Namaland, Khamiesberge. Abhänge westl. Ezelskop. — L.B. II. 313.

Bijlia N.E.Br.

- J.B. (1928) 267; Gw. (1928) 34; G.C. (1929, I) 34; v.P.M. 28; A. 211.
- Bijlia cana** (Haw.?) N.E.Br. — (*Mes. canum* Haw. ? s. die Anmerkung bei *Mes. canum* [Haw.] Bgr.; *Mes. Tugwelliae* L.Bol., *Juttadinteria Tugwelliae* Schwant., *Hereroa Tugwelliae* L.Bol., *Bolusanthemum Tugwelliae* Schwant., *Hereroa cana* L.Bol.). — Prince Albert Divis., zwischen Felsen nahe Prince Albert in der Karroo Reg. — B.M.P. 279 (*Mes. canum* Haw. ???) — A.B.H. I. 129 (*Mes. Tugw.*); S. (1925) 5 (*Mes. Tugw.*); D.K.G. (1925/26) 184 (*Juttadint. Tugw.*); S.G. (1928) 253 (*Hereroa Tugw.*); L.B. I. 143 (*Hereroa Tugw.*); J.B. (1928) 268; Gw. (1928) 514 (*Bolusanthemum Tugw.*); G.C. (1929, I) 34; S.G. (1930) 121 (*Hereroa cana*); S.G. (1930) 121 (*Hereroa Tugw.*); S. (1930) 109 (*Hereroa Tugw.*); M. 124.

Über die richtige Synonomie für *Bijlia cana* gehen die Auffassungen noch sehr auseinander. N. E. Brown behauptet, eine ihm gesandte Pflanze sei *Mes. Tugwelliae* L. Bol. In ihr erkenne er das alte *Mes. canum* Haw. wieder. Nach Brown's Ansicht ist die von Dr. v. Poellnitz neu aufgestellte Synonomie in v.P.M. 28 richtig.

L. Bolus ist der Ansicht, daß ihr *Mes. Tugwelliae* L. Bol. (A.B.H. I. 129) zur Gattung *Hereroa* gehört, also *Hereroa Tugwelliae* (L. Bol.) L. Bol. L. Bolus behauptet weiter, daß man *Mes. canum* Haw. nicht wieder erkennen könne, weil:

1. Haworth keine Blüten gesehen hat,
2. keine Zeichnung angefertigt wurde,
3. kein Herbar vorhanden ist.

Mes. canum gehört nach Ansicht L. Bolus' zu den ungenügend bekannten Arten, die es wohl in allen Gattungen im Pflanzenreich gibt. Es ist nach Meinung L. Bolus' unmöglich, in irgendeiner Pflanze *Mes. canum* Haw. wieder zu erkennen. L. Bolus behauptet weiter, daß N. E. Brown gar nicht ihr *Mes. Tugwelliae* L. Bol. (= *Hereroa Tugwelliae* L. Bol.) vor sich gehabt hat, als er die Gattung *Bijlia* N.E.Br. veröffentlicht hat. Da aber das alte *Mes. canum* Haw. nicht zu erkennen ist, heißt die Pflanze nach Ansicht L. Bolus' nicht *Bijlia cana* (Haw.) N.E.Br., sondern einfach *Bijlia cana* N.E.Br. Nach L. Bolus hat die Gattung *Bijlia* N.E.Br. keine Berechtigung. Da die Art *Bijlia cana* N.E.Br., auf die sich die Gattung gründet, zu der bereits vorher bekannten Gattung *Hereroa* gehört, heißt die *Bijlia cana* N. E. Br. nunmehr *Hereroa cana* (N.E.Br.) L. Bol. (Siehe die Ausführungen L. Bolus' in S.G. [1930] 121.)

Es war mir leider trotz aller Bemühungen nicht möglich, völlige Klarheit in die verworrene Synonomie zu erlangen. Es erscheint angebracht, die Originalbeschreibung Haworths von *Mes. canum* Haw. mit der Originalbeschreibung L. Bolus' *Mes. Tugwelliae* L. Bol. zu vergleichen, und gegebenenfalls die Beschreibung Haworths fallen zu lassen, wenn sich herausstellt, daß diese für das Wiedererkennen der Art nicht ausreicht. Bis dahin möchte ich *Bijlia cana* (Haw.) N.E.Br. aufrechterhalten.

***Bolusanthemum* Schwant.**

Gw. (1928) 514; v.P.M. 28.

Bolusanthemum Tugwelliae Schwant. = *Bijlia cana* N.E.Br.

***Braunsia* Schwant.**

Gw. (1928) 644; v.P.M. 28.

Braunsia bina Schwant. = *Echinus edentulus* N.E.Br.

Braunsia edentula N.E.Br. = *Echinus edentulus* N.E.Br.

Braunsia Maximiliani Schwant. = *Echinus Maximiliani* N.E.Br.
Braunsia Nelii Schwant. — Gw. (1928) 644.

***Brownanthus* Schwant. (*Trichocyclus* N.E.Br.)**

D.K.G. (1927/28) 14, 20, 106; J. B. (1928) 267; v.P.M. 29; B.M.J. (1937) 492.

***Brownanthus ciliatus* (Ait.) Schwant.** — (*Mes. ciliatum* Ait. auch Thbg., *Mes. Schenkii* Schinz, *Brownanthus Schenkii* Schwant., *Trichocyclus ciliatus* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, bei Aus, steinige Gründe zwischen Kl.-Karas und Nackeis, Kl.-Namaland und südl. bis Prince Albert Divis. — A.B.H. I. 18 (*Mes. ciliatum*); D.N.Pfl. 43 (*Mes. Schenkii*); D.K.G. (1927/28) 21, 106; D.K.G. (1927/28) 234, 322 (*Trichoc. ciliatus*); J.B. (1929) 267 (*Trichoc. cil.*); M. 296 (*Trichoc. cil.*); B.M.J. (1937) 493.

***Brownanthus Marlothii* (Pax) Schwant.** — (*Mes. Marlothii* Pax, *Trichocyclus Marlothii* N.E.Br.). — Sw.-Afr., bei Lüderitzbucht, Namib des Namalandes. — F.R. XIX. 190 (*Mes. Marl.*); Tr.R.S. II. 34 (*Mes. Marl.*); D.K.G. (1927/28) 20; J.B. (1928) 267 (*Trichoc. Marl.*); D.K.G. (1927/28) 234, 322 (*Trichoc. Marl.*); B.M.J. (1937) 495.

***Brownanthus namibensis* (Marl.) Bullock.** — (*Mes. namibense* Marl., *Trichocyclus namibensis* N.E.Br.). — Sw.-Afr., steinige Plätze bei Lüderitzbucht. — Tr.R.S. II. 35 (*Mes. namib.*); F.R. XIX. 191 (*Mes. namib.*); D.K.G. (1927/28) 234, 322 (*Trichoc. namib.*); B.M.J. (1937) 496.

***Brownanthus pubescens* (N.E.Br. ex Maass) Bullock.** — (*Trichocyclus pubescens* N.E.Br., *Trichocyclus buchubergensis* Dtr., *Trichocyclus Pillansii* L.Bol.). — Sw.-Afr., Lüderitz-Distr., östl. der Buchu-Berge, Kl.-Namaland, alte Flußterrassen an der Mündung des Orangefflusses zwischen Arris Drift und Swartwater, zwischen Arris Drift und Arris, Sendlingsdrift. — D.K.G. (1927/28) 234, 322 (*Trichoc. pubescens*); F.R. XXIX. 169 (*Trichoc. buchub.*); L.B. II. 311 (*Trichoc. Pillansii*); B.M.J. (1937) 495.

***Brownanthus Schenkii* Schwant. = *Brownanthus ciliatus* Schwant.**

***Brownanthus simplex* (N.E.Br. ex Maas) Bullock.** — (*Trichocyclus simplex* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Lüderitz-Distr., steinige Gründe zwischen Kl.-Karas und Nakcis. — D.K.G. (1927/28) 234, 322 (*Trichoc. simpl.*); M. 297 (*Trichoc. simpl.*); B.M.J. (1937) 494.

***Calamophyllum* Schwant.**

D.K.G. (1927/28) 15, 28, 106; J.B. (1928) 322; v.P.M. 29; M. 211.

***Cal. cylindricum* (Haw.) Schwant.** (*Mes. cylindricum* Haw.) — S.-Afr., Standort unbekannt. B.M.P. 224 (*Mes. cyl.*); N.E.Br.M. 101 (*Mes. cyl.*); D.K.G. (1927/28) 29; J.B. (1928) 322.

Cal. teretifolium (Gaw.) Schwant. (*Mes. teretifolium* Haw., *Mes. cylindricum* var. *β* Haw.). — S.-Afr. B.M.P. 224 (*Mes. teret.*); D.K.G. (1927/28) 29, 106; J.B. (1928) 322.

Cal. teretiunculum (Haw.) Schwant. (*Mes. tereticusculum* Haw.). — S.-Afr. B.M.P. 224 (*Mes. teretiunc.*); D.K.G. (1927/28) 29, 106; J.B. (1928) 322.

***Callistigma* Dtr. et Schwant.**

Gw. (1928) 644; v.P.M. 29; A. 220.

Callistigma inachabensis (Engl.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. inachabense* Engl., *Cryophytum inachabense* N.E.Br.). — Gr.-Namaland. Sanddünen bei Inachab, Warmbad. — Gw. (1928) 644; G.C. (1928, II) 211 (*Cryoph. inach.*).

***Carpanthea* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 412; P.G.S.A.P. 245; J.B. (1928) 323; v.P.M. 29; A. 211.

Carpanthea pomeridiana (L.) N.E.Br. — (*Mes. pomeridianum* L., *Mes. pomeridianum* var. *Andrewsii* Haw., *Mes. pomeridianum* var. *glabrum* D.C., *Mes. glabrum* Andr., *Carpanthea pomeridiana* Schwant.) — Cape Peninsula. — B.M.P. 29 (*Mes. pom.*); P.G.S.A.P. 246; S.G. (1927) 434; Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 323; L.B. I. 15; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Carpanthea pomeridiana Schwant. = ***Carp. pomeridiana*** N.E.Br.

***Carpobrotus* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 249; J.B. (1928) 323; v.P.M. 29; A. 211.

Carpobr. abbreviatum Schwant. = ***Carp. glaucescens*** Schwant.

Carpobr. acinaciformis (L.) L.Bol. — (*Mes. acinaciforme* L., *Mes. rubrocinctum* Eckl. et Zeyh., *Carpobr. acinaciformis* Schwant.). — S.-Afr., sandige Stellen bei Kapstadt. — B.M.P. 202 (*Mes. acin.*); Fl.Pl. VII. Pl. 247; J.B. (1928) 324; Gfl. (1928) 68; D.K.G. (1937) 155; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Carpobr. acinaciformis Schwant. = ***Carpobr. acinaciformis*** L.Bol.

Carpobr. aequilaterus (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. aequilaterum* Haw., *Mes. aequilaterale* Haw., *Mes. nigrescens* Haw.). — W.- und Sw.-Australien, Küste von Tasmanien, Victoria und Queensland; Amerika; Küsten Chiles und Kaliforniens. — B.M.P. 205 (*Mes. aequ.*); J.B. (1928) 324.

Carpobr. chilensis (Mol.) N.E.Br. — (*Mes. chilense* Mol.), *Mes. aequilaterale* var. *chiloense* S.D.). — Chile, Kalifornien. — J. B. (1928) 324.

Carpobr. concavus L.Bol. — Bredasdorp Divis., Cape Agulhas. — L.B. III. 3.

- Carpobr. deliciosus*** L.Bol. — (*Mes. deliciosum* L.Bol.). — Kap-Prov., South Western Reg., Riversdale Divis., Albertina. — A.B.H. IV. 41 (*Mes. del.*); A.B.H. IV. 109; J. B. (1928) 324.
- Carpobr. disparilis*** N.E.Br. — (*Mes. virescens* S.D.). — Australien. — J.B. (1928) 324.
- Carpobr. dulcis*** L.Bol. — Humansdorp Divis.? — L.B. II. 48.
- Carpobr. edulis*** (L.) L.Bol. — (*Mes. edule* L., *Mes. edule* var. *virescens* Moss., *Carpobr. edulis* Schwant.). — B.M.P. 204 (*Mes. edul.*); P.G. S.A.P. 249; Fl.Pl. VII. Pl. 247; Gfl. (1928) 68; J. B. (1928) 324; B.Mag. 144. Tab. 8783 (*Mes.*); D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.
- Carpobr. edulis* Schwant. = ***Carpobr. edulis*** L.Bol.
- Carpobr. Fourcadei*** L.Bol. — Kap-Prov., South Western Reg., Humansdorp Divis., auf der Spitze des Karedouw-Passes. — A.B.H. IV. 109; Fl.Pl. VII. Pl. 247; J.B. (1928) 324 (das hier angeführte Synonym: *Mes. Fourcadei* L.Bol., A.B.H. IV. 84 ist ein Irrtum. *Mes. Fourc.* L.Bol. = *Drosanthemum Fourcadei* [L.Bol.] Schwant.).
- Carpobr. glaucescens* N.E.Br. = ***Carpobr. glaucescens*** Schwant.
- Carpobr. glaucescens*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. glaucescens* Haw., *Mes. abbreviatum* Haw., *Mes. virescens* Haw., *Carpobr. glaucescens* N.E.Br., *Carpobr. abbreviatum* Schwant., *Carpobr. virescens* Schwant.) — Australien. — Gfl. (1928) 69; Gfl. (1928) 68 (*Carp. abbr.*); J.B. (1928) 324; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.
- Carpobr. Juritzii*** L.Bol. — (*Mes. Juritzii* L.Bol., *Mes. dimidiatum* Bgr.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. III. 137 (*Mes. Jur.*); A.B.H. IV. 109; J.B. (1928) 324.
- Carpobr. laevigatus* N.E.Br. = ***Carpobr. laevigatus*** Schwant.
- Carpobr. laevigatus*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. laevigatum* Haw., *Carpobr. laevigatus* N.E.Br.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 325; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.
- Carpobr. Mellei*** L.Bol. — (*Mes. Mellei* L.Bol.). — Kap-Prov., South Western Reg., Robertson. — A.B.H. III. 137 (*Mes. Mellei*); A.B.H. IV. 109; J.B. (1928) 325.
- Carpobr. Muiri*** L.Bol. — (*Mes. Muiri* L.Bol.). — Riversdale Divis., Zoutpass nahe Albertina. — A.B.H. III. 138 (*Mes. Muiri*); A.B.H. IV. 109; J.B. (1928) 325.
- Carpobr. Pagae*** L.Bol. — Robertson Divis., nahe Montagu, beim Strom, Montagu Baths, beim Strom im Dooker Kloof, Montagu. — A.B.H. IV. 107; J.B. (1928) 325.
- Carpobr. Peersii*** L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Miller. — L.B. III. 4.
- Carpobr. Pillansii*** L.Bol. — Caledon Divis., Viljoen's Pass. — L.B. II. 313.
- Carpobr. quadrifidus*** L.Bol. — Calvinia Divis.? — L.B. II. 15; S.G. (1928) 279.

Carpobr. quadrifidus L.Bol. var. *roseus* L.Bol. — Malmesbury Divis., bei Saldanha Bay. — L.B. II. 15.

Carpobr. Rossii N.E.Br. = *Carpobr. Rossii* Schwant.

Carpobr. Rossii (Haw.) Schwant. — (*Mes. Rossii* Haw., *Carpobr. Rossii* N.E.Br.). — Tasmanien. — Gfl. (1928) 68; J.B. (1928) 325; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Carpobr. rubrocinctus N.E.Br. = *Carpobr. rubrocinctus* Schwant.

Carpobr. rubrocinctus (Haw.) Schwant. — (*Mes. rubrocinctum* Haw., *Carpobr. rubrocinctus* N.E.Br.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; J.B. (1929) 325; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Carpobr. Sauerae Schwant. — S.-Afr., Darling. — D.K.G. (1927/28) 275; J.B. (1928) 325.

Carpobr. subalatus N.E.Br. = *Carpobr. subalatus* Schwant.

Carpobr. subalatus (Haw.) Schwant. — (*Mes. subalatum* Haw., *Carpobr. subalatus* N.E.Br.). — S.-Afrika. — Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 325; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Carpobr. Vanzijliae L.Bol. — Kap-Prov., South Western Reg., genauer Standort unbekannt, aber wahrscheinlich zwischen George und Oudtshoorn. — A.B.H. IV. 108; J.B. (1928) 325.

Carpobr. virescens Schwant. = *Carpobr. glaucescens* Schwant.

Carruanthus Schwant.

D.K.G. (1926/27) 180, 181; D.K.G. (1927/28) 106; J.B. (1928) 325; v.P.M. 30; A. 212.

Carr. albidus Schwant. = *Machairophyllum albidum* Schwant.

Carr. caninus (Haw.) Schwant. — (*Mes. caninum* Haw., *Mes. ringens* var. *caninum* L., *Bergeranthus caninus* Schwant.). — Willowmoore Divis., Toverwater Poort. — D.K.G. (1925/26) 180, 181; D.K.G. (1927/28) 106; L.B. I. 90.

Carr. Cookii Schwant. = *Machairophyllum Cookii* Schwant.

Cephalophyllum Haw. = *Cephalophyllum* N.E.Br.

Nach N.E.Brown in J.B. (1928) 325, 326 ist Haworth als Autor nicht haltbar. Die *Cephalophyllum*-Arten mit der Autorbezeichnung Haworth in L.B. I. 116, 118, 121 und S.G. (1927) 156 sind gem. N.E.Brown abgeändert.

Cephalophyllum (Haw.) N.E.Br.

G.C. (1925. II) 433; P.G.S.A.P. 247; S.G. (1927) 155; J.B. (1928) 325; L.B. I. 116; v.P.M. 30, 72; A. 212.

Cephalophyllum acutum L.Bol. = *Ceph. subulatoides* N.E.Br.

Ceph. albertiniense L.Bol. = *Ceph. albertiniense* Schwant.

Ceph. albertiniense (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. albertiniense* L.Bol., *Ceph. albertiniense* L.Bol.). — Riversdale Divis., nahe Albertinia

(Oude Tuin) in Sand. — A.B.H. IV. 3 (*Mes. alb.*); Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; L.B. I. 121; J.B. (1928) 326; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Ceph. Alstonii Marl. — Ceres Karroo. — S.G. (1928) 156; J.B. (1928) 326; L.B. I. 120.

Ceph. anemoniflorum L.Bol. = ***Ceph. anemoniflorum*** Schwant.

Ceph. anemoniflorum (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. anemoniflorum* L.Bol., *Ceph. anemoniflorum* L.Bol.). — Caledon Divis., nahe Hermanus. — A.B.H. III. 159 (*Mes. anemon.*); Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; L.B. I. 121; J.B. (1928) 326; K.Kd. (1937) 9, 10; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Ceph. apiculatum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis.? — L.B. II. 112.

Ceph. aurantiacum L.Bol. — Riversdale Divis. — L.B. II. 113.

Ceph. aureorubrum L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. III. 21.

Ceph. ausense L.Bol. — Sw.-Afr., Aus. — L.B. II. 87.

Ceph. caledonicum L.Bol. — Caledon Divis. — D.K.G. (1927) 10, 11.

Ceph. cauliculatum (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. cauliculatum* Haw., *Mes. diminutum* var. *cauliculatum* Haw.). — S.-Afr. — J.B. (1928) 325.

Ceph. ceresianum L.Bol. — Ceres Divis., Karroopoort. nahe des Weges nach Sutherland. — L.B. II. 359.

Ceph. clarifolium L.Bol. (*Mes. clarifolium* L.Bol.). — S.-Afr. — L.B. I. 121; J.B. (1928) 326.

Ceph. compactum L.Bol. — Van Rhynsdorp. — L.B. II. 398.

Ceph. Comptonii (L.Bol.) N.E.Br. (*Mes. loreum* var. L.Bol.). — S.-Afr. — J.B. (1928) 326.

Ceph. confusum (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. confusum* Dtr., *Ceph. confusum* L.Bol.). — Gr.-Namaland, Hügel nahe der Schlafkuppe im Klinghardt-Gebirge. — D.B.F. XIX. 126 (*Mes. conf.*); Gfl. (1928) 69; L.B. II. 71; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Ceph. confusum L.Bol. = ***Ceph. confusum*** Dtr. et Schwant.

Ceph. corniculatum L.Bol. = ***Ceph. loreum*** Schwant.

Ceph. corniculatum Schwant. = ***Ceph. loreum*** Schwant.

Ceph. crassum L.Bol. — Clanwilliam Divis., Packhuis Pass. — L.B. II. 96.

Ceph. cupreum L.Bol. — Kl.-Namaland, in Dünen und sandigen Flächen 4 miles südl. Hondeclip Bay. — L.B. II. 114.

Ceph. curtophyllum N.E.Br. = ***Ceph. curtophyllum*** Schwant.

Ceph. curtophyllum (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. curtophyllum* L.Bol., *Ceph. curtophyllum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — A.B.H. III. 160 (*Mes. curt.*); Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 327; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.

Ceph. decipiens (Haw.) L.Bol. — (*Mes. decipiens* Haw., *Mes. dubium* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Graafwater. — N.E.Br.M. 107 (*Mes. dec.*); J.B. (1928) 327.

- Ceph. densum* (L.) N.E.Br. — (*Mes. diversifolium* L., *Mes. laeve* L.Bol.) — S.-Afr., bei Greepoint, Bethelsdorp und Cradockcity. — J.B. (1928) 327.
- Ceph. diminutum* (Haw.) L.Bol. — (*Mes. diminutum* Haw., *Mes. diminutum* var. *pallidum* Haw., *Mes. corniculatum* Haw.; *Mes. loreum* L. siehe in J.B. [1928] 327). — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. I. 121; N.E.Br. 63 (*Mes. dim.*); J.B. (1928) 327.
- Ceph. dissimile* N.E.Br. = *Ceph. dissimile* Schwant.
- Ceph. dissimile* (S.D.) Schwant. — (*Mes. validum* S.D., *Mes. dissimile* N.E.Br.; *Ceph. dissimile* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 105 (*Mes. diss.*); Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 327; L.B. II. 115; D.K.G. (1937) 160; F.R. XLIII. 223.
- Ceph. diversifolium* L.Bol. = *Ceph. diversiphyllum* N.E.Br.
- Ceph. diversifolium* Schwant. = *Ceph. diversiphyllum* N.E.Br.
- Ceph. diversiphyllum* (Haw.) N.E.Br. (*Mes. diversiphyllum* Haw., *Mes. diversifolium* Haw., *Mes. diversifolium* Haw. var. *congestum* S.D., *Mes. loreum* Haw., *Mes. loreum* L., *Mes. loreum* var. β und γ L., *Ceph. diversifolium* L.Bol., *Ceph. diversifolium* Schwant., *Ceph. loreum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Graafwater. — L.B. I. 118 (*Ceph. loreum*); Gfl. (1928) 69; J.B. (1929) 17.
- Ceph. dubium* (Haw.) L.Bol. — (*Mes. dubium* Haw., *Mes. procumbens* Haw., *Ceph. procumbens* L.Bol. in L.B. I. 66 u. S.G. [1928] 127. non L.B. II. 115!; *Ceph. procumbens* Schwant.). — S.-Afr. — S.G. (1927) 434 (*Mes. proc.*); Gfl. (1928) 69 (*Ceph. proc.* Schw.); S.G. (1928) 156; J.B. (1929) 17; L.B. I. 16 (*Mes. proc.*); D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Ceph. ebracteatum* L.Bol. = *Ceph. ebracteatum* Dtr. et Schwant.
- Ceph. ebracteatum* (Schltr. et Diels) Dtr. et Schwant. — (*Mes. ebracteatum* Schltr. et Diels [Pax]; *Mes. Rangei* Engl.; *Ceph. ebracteatum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Kalahari; Gr.-Namaland. Lüderitzbucht in den Küstenwüsten bis Buntfeldschub. Namib bei Angra Pequena. — F.R. VII. 149 (*Mes. ebr.*); F.R. XIX. 128 (*Mes. ebr.*); Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; L.B. I. 120; J.B. (1929) 17; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 223.
- Ceph. Ernii* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kolman's Kop. — L.B. II. 71.
- Ceph. Framesii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., beim Zout River. — L.B. II. 127.
- Ceph. Fulleri* L.Bol. — Kenhardt Divis., Pofadder. — L.B. II. 133.
- Ceph. Goodii* L.Bol. — Namaland. — L.B. II. 87.
- Ceph. gracile* L.Bol. — S.-Afr., nahe Montagu, bei Kensit und Caporn. — L.B. I. 119. 149; S.G. (1928) 155; J.B. (1929) 17.
- Ceph. gracile* L.Bol. var. *longisepalum* L.Bol. — Montagu Divis., Hügel bei Montagu. — L.B. II. 114.

- Ceph. Herrei*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Swartwater. — L.B. II. 314.
- Ceph. Herrei*** L.Bol. var. *decumbens* L.Bol. — Kl.-Namaland, Hell's Kloof. — L.B. II. 314.
- Ceph. inaequale*** L. Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Holgat und Orange River. — L.B. I. 149; J.B. (1929) 17.
- Ceph. latipetalum*** L.Bol. — S.-Afr. — L.B. II. 71.
- Ceph. loreum*** L.Bol. = ***Ceph. diversiphyllum*** N.E.Br.
- Ceph. loreum*** N.E.Br. = ***Ceph. loreum*** Schwant.
- Ceph. loreum*** (L.) Schwant. (*Mes. loreum* L., *Mes. corniculatum* L., *Ceph. corniculatum* Schwant., *Ceph. cornic.* L.Bol.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 155 (*Ceph. corn.*); J.B. (1929) 17; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 223.
- Ceph. maritimum*** L.Bol. = ***Ceph. maritimum*** Schwant.
- Ceph. maritimum*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. maritimum* L.Bol., *Ceph. maritimum* L.Bol.). — Riversdale Divis., Still Bay im Sand nahe der See. — A.B.H. IV. 2 (*Mes. marit.*); Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; L.B. I. 121; J.B. (1929) 17; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 223.
- Ceph. namaquanum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Hügel zwischen Groot Derm und Groot Doorn, und zwischen Holgat und Orange River. — L.B. I. 120, 149; S.G. (1928) 156; J.B. (1929) 17.
- Ceph. niveum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 295.
- Ceph. parviflorum*** L.Bol. — S.-Afr., nahe Darling. — L.B. I. 119, 150; S.G. (1928) 156; J.B. (1929) 18.
- Ceph. parviflorum*** L.Bol. var. *proliferum* L.Bol. — Malmesbury Divis., Koeberg. — L.B. II. 114.
- Ceph. paucifolium*** L.Bol. — Matjesfontein. — L.B. II. 51.
- Ceph. Pillansii*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Copperberg bei Ookiep, bei Van Rhynsdorp, Springbok. — L.B. II. 95; K.Kd. (1937) 8, 10.
- Ceph. Pillansii*** L.Bol. var. *grandiflorum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Weg zwischen Springbok und Ookiep. — L.B. II. 96.
- Ceph. Pittenii*** L.Bol. — Piquetberg Divis., nahe Lambert's Bay. — L.B. I. 120, 149; S.G. (1928) 156; J.B. (1929) 18.
- Ceph. platycalyx*** L.Bol. = ***Ceph. platycalyx*** Schwant.
- Ceph. platycalyx*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. platycalyx* L.Bol., *Ceph. platycalyx* L.Bol.). — S.-Afr., Karroo Reg., nahe Matjesfontein. — Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; L.B. I. 121; J.B. (1929) 18; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 223.
- Ceph. primulinum*** L.Bol. = ***Ceph. primulinum*** Schwant.
- Ceph. primulinum*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. primulinum* L.Bol., *Ceph. primulinum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., Bakhuis. — A.B.H. III. 160 (*Mes. prim.*); Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; L.B. I. 121; J.B. (1929) 18; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 223.

- Ceph. procumbens*** L.Bol. — Cape Peninsula, Sanddünen bei Muizenberg, bei Wynberg. — L.B. II. 115; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Ceph. procumbens* L.Bol. in L.B. I. 66 und S.G. (1928) 127 (non in L.B. L.B. II. 115!!) = ***Ceph. dubium*** L.Bol.
- Ceph. procumbens* Schwant. = ***Ceph. dubium*** L.Bol.
- Ceph. pulchrum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlakte. — L.B. II. 354.
- Ceph. pulchellum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Konkas bei Bitterfontein. — L.B. III. 47.
- Ceph. punctatum*** (Haw.) L.Bol. — (*Mes. punctatum* Haw.). — S.-Afr. — J.B. (1929) 18.
- Ceph. purpureo-album* L.Bol. = ***Ceph. purpureo-album*** Schwant.
- Ceph. purpureo-album*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. purpureo-album* Haw., *Ceph. purpureo-album* L.Bol.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; S.G. (1928) 156; J.B. (1928) 156; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Ceph. ramosum*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. diversifolium* L.Bol.). — S.-Afr. — J.B. (1929) 18; L.B. II. 128.
- Ceph. regale*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. Karrachab. — L.B. II. 337.
- Ceph. rhodandrum*** L.Bol. — Ceres Divis., Ceres Karroo. — L.B. II. 296.
- Ceph. rigidum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, am westl. Fuß des „Fifteen Mile Mountain“, östl. Port Nolloth. — J.B. (1928) 198; L.B. I. 121; J.B. (1929) 18.
- Ceph. saturatum* L.Bol. nomen nudum = ***Ceph. Pillauti*** L. Bol.
- Ceph. serrulatum*** L.Bol. — Worcester Divis. — L.B. II. 418.
- Ceph. spongiosum*** L.Bol. — (*Mes. spongiosum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, auf sandigen Flächen um die Hondeklip Bay. — A.B.H. IV. 74 (*Mes. spong.*); J.B. (1928) 18; L.B. I. 121.
- Ceph. staminodosum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Springbok. — L.B. II. 194.
- Ceph. subulatoides*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. subulatoides* Haw., *Mes. acutum* Haw., *Mes. subrostratum* Willd., *Ceph. acutum* [Haw.] L.Bol.) — S.-Afr. — Fl.Pl. VII. Pl. 257 (*Ceph. acut.*); L.B. I. 121 (*Ceph. acut.*); J.B. (1929) 18.
- Ceph. tenuifolium*** L.Bol. — S.-Afr., bei Nieuwoudtville. — L.B. II. 111.
- Ceph. tricolorum*** (Haw.) N.E.Br. (*Mes. tricolorum* Haw., *Ceph. tricolorum* Schwant.). — S.-Afr. — Phil.Gen.S.-Afr.Pl. 247; Gfl.(1928) 69; J.B. (1929) 18; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Ceph. tricolorum* Schwant. = ***Ceph. tricolorum*** N.E.Br.
- Ceph. truncatum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Nieuwerust. — L.B. II. 398.

- Ceph. uniflorum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Port Nolloth und Holgat. — L.B. II. 88.
- Ceph. validum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. validum* Haw.). — S.-Afr. — N.E.Br.M. 121 (*Mes. val.*); Gfl. (1928) 69.
- Ceph. Vandermerwei*** (L.) L.Bol. — (*Mes. loreum* var. β L., *Mes. loreum* var. *congestum* Haw.). — Swellendam Divis., bei Swellendam. — L.B. II. 112.
- Ceph. Watermeyerii*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 338.
- Ceph. Weigangianum*** (Dtr.) Dtr. et Schwant. = ***Leipoldtia Weigangiana*** Dtr. et Schwant.
- Ceph. worcesterense*** L.Bol. — S.-Afr., bei Worcester, Steinhänge bei Breede River-Brücke. — L.B. II. 419.

Cerochlamys N.E.Br.

J.B. (1928) 171; J.B. (1929) 18; v.P.M. 30; A. 212.

- Cerochlamys trigona*** N.E.Br. — Swellendam Divis., „in crevices of the Bokke-veld shales“. — Kl.-Karoo. — J.B. (1928) 171; J.B. (1929) 18.

Chasmatophyllum Dtr. et Schwant.

D.K.G. (1927/28) 15, 17; Gfl. (1928) 44; v.P.M. 31; A. 212.

- Chasmatophyllum Braunsii*** Schwant. — Laingsburg Divis. — D.K.G. (1927/28) 279; J.B. (1929) 18.

- Chasm. maninum*** L.Bol. — Richmond. Divis., nahe Leopard's Vlei. — S.G. (1927) 399; L.B. I. 133; J.B. (1929) 18.

- Chasm. musculinum*** (Haw.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. musculinum* Haw., *Mes. Dinterae* Dtr., *Mes. recumbens* N.E.Br., *Stomatium musculinum* Schwant.). — Gr.-Namaland, Kl.-Karas; Orange Free State, nahe Blomfontein. — B.M.P. 272 (*Mes. musc.*); D.N.-Pfl. 39 (*Mes. Dint.*); G.C. (1921) II. 303 (*Mes. rec.*); D.K.G. (1927/28) 176 (*Stom. musc.*); D.K.G. (1927/28) 18; J.B. (1929) 18.

- Chasm. Nelii*** Schwant. — Graaf Reinet Divis. — Gfl. (1928) 43; J.B. (1929) 18.

- Chasm. Rouxii*** L.Bol. = ***Rhinephyllum Rouxii*** L.Bol.

- Chasm. Verdoorniae*** (N.E.Br.) L.Bol. — (*Mossia Verdoorniae* N.E.Br.). — L.B. III. 40.

- Chasm. willowmoreense*** L.Bol. — (? *Rhinophyllum willowmoreense* L.Bol.). — L.B. II. 377, 378.

Cheiridopsis N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; G.C. (1926, I). 406; PG. S.A.P. 244; D.K.G. (1927/28) 348; J.B. (1929) 19; v.P.M. 31; A. 212.

- Cheiridopsis acuminata*** L.Bol. — Namaland, Richtersveld, Kubus. — L.B. II. 296.

- Cheir. alata* L.Bol. — Kl.-Namaland. Obob bei Steinkopf. — L.B. II. 297.
- Cheir. altitecta* Schwant. — Kl.-Namaland. — D.K.G. (1927/28) 278, 349; J.B. (1929) 19.
- Cheir. ampliata* L.Bol. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — L.B. II. 361.
- Cheir. angustipetala* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kl.-Kommaggas. — L.B. II. 399.
- Cheir. aspera* L.Bol. — Kl.-Namaland, Steinkopf, zwischen Bowesdorp und Springbok. — L.B. III 133.
- Cheir. aurea* L.Bol. — Kl.-Namaland zwischen Arris und Sendlingsdrift. — S.G. (1927) 280; D.K.G. (1927/28) 349; L.B. I. 74, 130; J.B. (1929) 19.
- Cheir. aurea* L.Bol. var. *lutea* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Doornpoort. — L.B. II. 271.
- Cheir. bibracteata* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. bibracteatum* Haw., *Mes. rostratum* S.D. var. *bibracteatum*). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 77 (*Mes. bibr.*); G.C. (1926, I). 406; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. bifida* (Haw.) N.E.Br. (*Mes. bifidum* Haw., *Mes. multipunctatum* S.D.). — Kl.-Namaland, Copperberg. — N.E.Br.M. 78 (*Mes. bif.*); G.C. (1926) I. 407; S.G. (1927) 281; D.K.G. (1927/28) 349; L.B. I. 76.
- Cheir. borealis* L.Bol. — Sw.-Afr., Wittpütz. — L.B. II. 399.
- Cheir. brachystigma* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. II. 298.
- Cheir. Braunsii* Schwant. = *Arguroderma Braunsii* Schwant.
- Cheir. Breachiae* L.Bol. — Kl.-Namaland, Ookiep. — S.G. (1927) 326; D.K.G. (1927/28) 249; J.B. (1929) 19; L.B. I. 80, 130.
- Cheir. brevipes* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. II. 269.
- Cheir. brevis* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Nieuwoudtville „The Falls“. — L.B. II. 133.
- Cheir. brevis* Schwant. = *Cheir. verrucosa* Schwant.
- Cheir. Brownii* Schick et Tisch. — D.K.G. (1927/28) 249; J.B. (1929) 19.
- Cheir. candidissima* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. candidissimum* Haw., *Mes. denticulatum* var. *candidissimum* Haw.). — N.E.Br.M. 79 (*Mes. cand.*); G.C. (1926) I. 407; D.K.G. (1927/28) 349; M. 128.
- Cheir. carinata* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Hell's Kloof. — L.B. II. 299.
- Cheir. carnea* N.E.Br. — Piquetberg Divis., auf einer Kuppe nahe Eende Kuil. — G.C. (1926) I. 425; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. Caroli-Schmidtii* (Dtr. et Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. Caroli-Schmidtii* Dtr. et Bgr.). — Gr.-Namaland, bei Aus. — G.C. (1926) I. 425; D.K.G. (1927/28) 278, 349; F.R. XIX. 189; M. 130.

- Cheir. cigarettifera*** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. cigarettiferum* Bgr., *Mes. vescum* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — N.E.Br.M. 89 (*Mes. vesc.*); N.E.Br.M. 111; G.C. (1926, I) 425; D.K.G. (1927/28) 278, 345.
- Cheir. citrina*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — L.B. II. 477.
- Cheir. compressa*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garcia und Springbok. — L.B. II. 216.
- Cheir. Comptonii*** L.Bol. nomen nudum.
- Cheir. crassa*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Goodhouse. — L.B. II. 269; D. (1934) 180.
- Cheir. cuprea*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. cupreum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — A.B.H III. 159 (*Mes. cupr.*); G.C. (1926, I) 426; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. curta*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Springbok. — L.B. II. 217.
- Cheir. denticulata*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. denticulatum* Haw.). — S.-Afr. zwischen Karroo und Oliphantsriver und Bockland, in Hantum im Roggeveld. — N.E.Br.M. 80 (*Mes. dent.*); G.C. (1926) I. 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. denticulata*** (Haw.) N.E.Br. var. ***glauca*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. denticulatum* Haw. var. *glaucum* Haw.). — Heimat wie die Art. — N.E.Br.M. 80 (*Mes. dent. gl.*); G.C. (1926, I) 407.
- Cheir. Derenbergiana*** Schwant. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — M.D.G.Ztg. (1927) 159; D.K.G. (1927/28) 249; J.B. (1929) 19.
- Cheir. difformis*** (Thbg.) N.E.Br. — (*Mes. difforme* Thbg., *Mes. eriguum* N.E.Br.). — Calvinia Divis., zwischen Olifants River und Bokkeland in Hantum und dem Roggeveld. — N.E.Br.M. 102 (*Mes. erig.*); G.C. (1926, I) 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. Duplessii*** L.Bol. — Calvinia Divis., bei Calvinia, 6 miles südl. Butterkloof, Doornbosch; bei Biesiesfontein zwischen Pakhuis und Oumuur. — L.B. II. 400.
- Cheir. eburnea*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — L.B. III. 43.
- Cheir. excarata*** L.Bol. — Kl.-Namaland, südl. Breckpoort, Nieuwefontein. — L.B. III. 48; D.K.G. (1937) 154.
- Cheir. Framesii*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — S.G. (1927) 326; D.K.G. (1927/28) 349; J.B. (1929) 19; L.B. I. 82, 131.
- Cheir. gibbosa*** Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, Bergland südl. der Bahnlinie Port Nolloth-Ananous. — D.K.G. (1927/28) 154, 349; J.B. (1929) 19.
- Cheir. Graessneri*** Schick et Tisch. = ***Cheir. insignis*** Schwant.
- Cheir. grandiflora*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Hell's Kloof. — L.B. II. 271.

- Cheir. Herrei*** L.Bol. — Kl.-Namaland. Richtersveld, Klipbokberge, Stinkfontein, 70 miles der Mündung des Orange River. — **L.B. II. 272**; D. (1934) 165.
- Cheir. Hilmari*** L.Bol. — Laingsburg Divis., 15 miles nördl. Laingsburg am Sutherland-Weg. — **L.B. II. 315**.
- Cheir. Hutchinsonii*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 25 miles nördl. von Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 117**.
- Cheir. imitans*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — **L.B. II. 477**.
- Cheir. inaequalis*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — **L.B. II. 134**.
- Cheir. inconspicua*** N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — **G.C. (1926, I) 426**; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. insignis*** Schwant. — (*Cheir. Graessneri* Schick et Tisch, *Cheir. Schlechteri* Schwant.). — Kl.-Namaland, Alexanderbay. — **D.K.G. (1927/28) 276, 349, 350**; D.K.G. (1927/28) 349, 351 (*Ch. Graessneri*); D.K.G. (1929) 17; Gfl. (1928) 245; J.B. (1929) 19 (Hier ist N.E. Brown die Notiz Schwantes' betr. *Ch. Graessneri* in D.K.G. (1929) 17 entgangen!).
- Cheir. inspersa*** N.E.Br. — (*Mes. inspersum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 81 (*Mes. insp.*); **G.C. (1926, I) 407**; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. intrusa*** L.Bol. — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — **L.B. II. 360**.
- Cheir. Johannis-Winkleri*** Schwant. = ***Cheir. Schlechteri*** Tisch.
- Cheir. latifolia*** L.Bol. — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — **L.B. II. 195**.
- Cheir. lecta*** N.E.Br. — (*Mes. lectum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., nahe Bakhuis. — N.E.Br.M. 82 (*Mes. lect.*); **G.C. (1926, I) 407**; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. leptopetala*** L.Bol. — Kl.-Namaland, 20 miles von Port Nolloth am Hauptweg nach Ookiep. — **L.B. III. 49**.
- Cheir. longipes*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Springbok. — **L.B. II. 217**.
- Cheir. Luckhoffii*** L.Bol. — Kl.-Namaland, 25 miles südwestl. Springbok. — **L.B. II. 298**.
- Cheir. macrocalyx*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Temple Kloof, Komaggas. — **L.B. II. 299**.
- Cheir. macrophylla*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — **L.B. II. 300**.
- Cheir. Marlothii*** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — **G.C. (1926, II) 9**; D.K.G. (1927/28) 349; M. 131.
- Cheir. Meyeri*** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — **G.C. (1926, II) 9**; D.K.G. (1927/28) 349; M. 132; L.B. III. 50.

- Cheir. Meyeri** N.E.Br. var. *minor* L.Bol. — Bushmanland, Wolfkraal; Witwater bei Alwynsfontein. — **L.B. III. 49.**
- Cheir. minima** Tisch. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — S. (1927) 145; D.K.G. (1927/28) 349; J.B. (1929) 19.
- Cheir. mirabilis** Schwant. = **Cheir. verrucosa** L.Bol.
- Cheir. multiseriata** L.Bol. — Kl.-Namaland, 28 miles östl. von Port Nolloth. — **L.B. II. 270.**
- Cheir. Nelii** Schwant. — Van Rhynsdorp Divis. — D.K.G. (1927/28) 277, 351; J.B. (1929) 19.
- Cheir. olivacea** Schwant. = **Cheir. Schickiana** Tisch.
- Cheir. pachyphylla** Schwant. = **Cheir. verrucosa** L.Bol.
- Cheir. parvibracteata** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Zout River Brücke. — **L.B. II. 135.**
- Cheir. parrula** (Schlecht.) N.E.Br. — (*Mes. parvulum* Schlecht.). — G.C. (1926. I) 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. paucifolia** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Springbok. — **L.B. II. 195.**
- Cheir. Pearsonii** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Khamiesberg Region in nassem Sand in Naras Ravine; Copperburg. — G.C. (1926. II) 35; D.K.G. (1927/28) 349; S.G. (1927) 280; L.B. I. 75.
- Cheir. peculiaris** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — G.C. (1926, II) 34, 35; D.K.G. (1927/28) 278, 349; M. 134.
- Cheir. Peersii** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — **L.B. III. 50.**
- Cheir. perdecora** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Cheir. robusta* L.Bol.). — S.G. (1927) 281 (*Cheir. rob.*); J.B. (1929) 19.
- Cheir. Pillansii** L.Bol. — Richtersveld, zwischen Doornpoort und Braakfontein und nördl. und südl. Braakfontein. — S.G. (1927) 326; **L.B. I. 79, 130**; J.B. (1929) 19; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. pressa** N.E.Br. — (*Mes. pressum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 83 (*Mes. press.*); G.C. (1926. I) 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. pulcrulenta** L.Bol. — Bushmanland, Jakkalswater. — **L.B. II. 270.**
- Cheir. purpurascens** (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. purpurascens* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 83 (*Mes. purp.*); G.C. (1926. I) 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. purpurascens** (S.D.) N.E.Br. var. *Leipoldtii* L.Bol. — Malmesbury Divis., bei Langebaan. — **L.B. II. 11**; K.Kd. (1937) 63.
- Cheir. purpurea** L.Bol. — Kl.-Namaland, Berge der Karrachab im Richtersveld. — **L.B. II. 245**; D.K.G. (1934) 54.
- Cheir. quadrifida** (Haw.) Schwant. — (*Mes. quadrifidum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 257 (*Mes. quadrifidum*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.

- Cheir. quadrifolia* L.Bol. — Kl.-Namaland, Lammerhoek. — L.B. III. 101.
- Cheir. resurgens* L.Bol. — Kl.-Namaland, Bowevlei bei Kamieskroon. — L.B. III. 50.
- Cheir. Richardiana* L.Bol. — Kenhardt Divis., Pofadder. — L.B. II. 135.
- Cheir. robusta* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. robustum* Haw.). — Kl.-Namaland, Richtersveld. — N.E.Br.M. 84 (*Mes. rob.*); L.B. I. 75; G.C. (1926, I) 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. robusta* L.Bol. = *Cheir. perdecora* N.E.Br.
- Cheir. Roodiae* N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis. — G.C. (1926, II) 72; D.K.G. (1927/28) 278, 349.
- Cheir. rostrata* (L.) N.E.Br. — (*Mes. rostratum* L., *Mes. rostrum* Ardeae reference Dillen). — Zwischen Olifants River und Bockland; in der Nähe Saldanha Bay und im Zwartland. — B.M.P. 255 (*Mes. rostratum*); N.E.Br.M. 85 (*Mes. rostratum*); G.C. (1926, II) 72; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. rostratoides* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. rostratoides* Haw., *Mes. ramulosum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 85 (*Mes. rostr.*); G.C. (1926, I) 407; D.K.G. (1927/28) 349.
- Cheir. rudis* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Kambroekop. — L.B. II. 338.
- Cheir. scabra* L.Bol. — Ceres Divis., Ceres Karroo. — L.B. II. 218.
- Cheir. scabra* L.Bol. forma *fera* L.Bol. — Laingsburg Divis., Kl.-Roggeveld. — L.B. III. 5.
- Cheir. Schickiana* Tisch. — (*Cheir. olivacea* Schwant.). — Kl.-Namaland, ca. 29 miles nordöstl. Port Nolloth; Alexander Bay bis nahe Port Nolloth (*Mes. olivac.*). — D.K.G. (1927/28) 122, 350; D.K.G. (1927/28) 277 (*Ch. olivac.*); J.B. (1929) 19 (*Ch. olivac.*).
- Cheir. Schlechteri* Schwant. = *Cheir. insignis* Schwant.
- Cheir. Schlechteri* Tisch. — (*Cheir. Johannis-Winkleri* Schwant.). — Kl.-Namaland, Steinkopf. — S. (1927) 144; D.K.G. (1927/28) 277 (*Cheir. Joh.-Winkl.*); D.K.G. (1927/28) 351; J.B. (1929) 20; M. 136.
- Cheir. serrulata* L.Bol. — Kl.-Namaland, Temple Kloof, Komaggas. — L.B. II. 339.
- Cheir. speciosa* L.Bol. — Gr.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — S.G. (1927) 280; L.B. I. 73, 74, 129; J.B. (1929) 20; D.K.C. (1927/28) 350.
- Cheir. splendens* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. II. 51.
- Cheir. staminodifera* L.Bol. — Kl.-Namaland, Swartwater. — L.B. II. 339.
- Cheir. subalba* L.Bol. — Kl.-Namaland, Hangpaal bei Steinkopf. — L.B. II. 273.

- Cheir. tenuifolium*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., ca. 35 miles nördl. von Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 136.**
- Cheir. truncata*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Sendlingsdrift. — **L.B. II. 300.**
- Cheir. tuberculata*** (S.D.) N.E.Br. (*Mes. tuberculata* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 87 (*Mes. tuberc.*); G.C. (1926, II) 73; D.K.G. (1927/28) 350.
- Cheir. turbinata*** L.Bol. — Kl.-Namaland bei Ookiep. — **L.B. II. 136.**
- Cheir. turbinata*** L.Bol. var. *minor* L.Bol. — Kl.-Namaland bei Garies und Springbok. — **L.B. II. 137.**
- Cheir. turgida*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Swartwater. — **L.B. II. 273.**
- Cheir. umdausensis*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Umdaus. — **L.B. III. 51.**
- Cheir. Vanzijlii*** L.Bol. — Kenhardt Divis., Pofadder. — **L.B. II. 116.**
- Cheir. velutina*** L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Klaver und Clanwilliam. — **L.B. II. 137.**
- Cheir. ventricosa*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. ventricosum* L.Bol.). — Kap-Prov., South Western Reg., nahe Clanwilliam; Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — **A.B.H. III. 128** (*Mes. ventr.*); G.C. (1926, II) 73; D.K.G. (1927/28) 350.
- Cheir. verrucosa*** L.Bol. — (*Cheir. brevis* Schwant., *Cheir. mirabilis* Schwant., *Cheir. pachyphylla* Schwant.). — Kl.-Namaland, zwischen Groot Doorn und Grootderm (*Ch. verr.*); Alexander Bay (*Ch. mirab.*); ca. 50 miles NO Port Nolloth (*Ch. pach.*); rechtes Orange River-Ufer nahe der Mündung (*Ch. mirab.*). — **S.G. (1927) 281; L.B. I. 76, 130; D.K.G. (1927/28) 275, 278, 349, 350** (*Ch. mirab.*); **D.K.G. (1927/28) 276, 350** (*Cheir. brev.*); **D.K.G. (1927/28) 350; D.K.G. (1927/28) 276, 349** (*Cheir. pachyp.*); Gfl. (1928) 245; Gfl. (1928) 246 (*Ch. brev.*); J.B. (1929) 20.
- Cheir. verrucosa*** L.Bol. var. *minor* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — **L.B. III. 102.**

***Circanda* N.E.Br.**

G.C. (1930, I) 126; v.P.M. 31; A. 212.

- Circanda serrata*** (L.) N.E.Br. — (*Mes. serratum* L.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1930, I) 126.

***Cleretum* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 412; G.C. (1927, II) 228; M.D.G.Ztg. (1928) 238; M.D.G.Ztg. (1928) 400; v.P.M. 32; A. 212.

- Cleretum apetalum*** N.E.Br. = ***Dorotheanthus apetalus*** N.E.Br.
- Cler. criniflorum*** N.E.Br. = ***Dorotheanthus bellidiformis*** N.E.Br.
- Cler. cuneifolium*** N.E.Br. = ***Micropterum cuneifolium*** Schwant.

- Cler. gramineum* N.E.Br. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.
Cler. limpidum N.E.Br. = *Micropterum limpidum* Schwant.
Cler. longipes L.Bol. = *Micropterum longipes* Schwant.
Cler. papulosum L.Bol. = *Micropterum papulosum* Schwant.
Cler. papulosum N.E.Br. = *Micropterum papulosum* Schwant.
Cler. pinnatifidum L.Bol. = *Aethephyllum pinnatifidum* N.E.Br.
Cler. pinnatifidum N.E.Br. = *Aethephyllum pinnatifidum* N.E.Br.
Cler. puberulum N.E.Br. = *Micropterum puberulum* Schwant.
Cler. Schlechteri N.E.Br. = *Micropterum Schlechteri* Schwant.
Cler. sessiliflorum N.E.Br. = *Micropterum sessiliflorum* Schwant.

Conicosia N.E.Br.

- G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 247; M.I.B.H. 163; G.C. (1928, II) 253; G.C. (1931, II) 13; v.P.M. 32; A. 212.
Conicosia affinis (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. elongatum* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1928, II) 253; G.C. (1932, I) 121.
Conicosia Bijlii N.E.Br. — George Divis., „The Wilderness“. — G.C. (1932, I) 121.
Conicosia brevicaulis N.E.Br. = *Conicosia brevicaulis* Schwant.
Conicosia brevicaulis (Haw.) Schwant. — (*Mes. brevicaule* Haw., *Conicosia brevicaulis* N.E.Br.). — S.-Afr., zwischen dem Vaal Fluß und Graaf Reinet. — B.M.P. 216 (*Mes. brev.*); N.E.Br.M. 126 (*Mes. brev.*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 253; G.C. (1931, II) 136; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
Conicosia capensis (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. pugioniforme* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1928, II) 233; G.C. (1931, II) 333.
Conicosia capitata Schwant. = *Conicosia pugioniformis* N.E.Br.
Conicosia communis (Edwards) N.E.Br. — (*Mes. capitatum* Edwards, *Mes. pugioniforme* S.D.). — Cape Divis., Camp ground, Chapman's Bay, nahe Vyge Kraal, Diepriver Station. — G.C. (1931, II) 137.
Conicosia coruscans (Haw.) Schwant. — (*Mes. coruscans* Haw.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; G.C. (1932, I) 144 (*Mes. corusc.*).
Conicosia elongata N.E.Br. = *Conicosia elongata* Schwant.
Conicosia elongata (Haw.) Schwant. — (*Mes. elongatum* Haw., *Mes. elongatum* var. *minus* Haw., *Mes. elongatum* var. *b.* Haw., *Mes. pugioniforme* D.C., *Conicosia elongata* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 253; G.C. (1932, I) 121; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
Conicosia fusiformis (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. fusiforme* Haw., *Mes. bicolorum* Klinsmann). — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 253; G.C. (1932, I) 144.

- Conicosia Muiri*** N.E.Br. — Riversdale Divis., auf sandigen Plätzen in 100—300 Fuß Höhe. — G.C. (1928, II) 253; G.C. (1932, II) 104.
- Conicosia pugioniformis*** (L.) N.E.Br. — (*Mes. pugioniforme* L., *Mes. capitatum* Haw., *Conicosia capitata* Schwant., *Conicosia pugioniformis* Schwant.). — Cape Peninsula. — P.G.S.A.P. 247; Gfl. (1928) 69; Gfl. (1928) 69 (*Con. cap.*); G.C. (1928, II) 253; G.C. (1931, II) 136; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Conicosia pugioniformis*** Schwant. = ***Conicosia pugioniformis*** N.E.Br.
- Conicosia pulliloba*** N.E.Br. — Cape Divis., nahe Malmesbury-Weg durchs Riet Vley. — G.C. (1932, I) 104.
- Conicosia robusta*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. pugioniforme* L.Bol.). — Kl.-Namaland, am Twee River, in sandigem Grunde von Stinkfontein nach Liliefontein. — G.C. (1928, II) 253; G.C. (1932, I) 144.
- Conicosia Roodiae*** N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — G.C. (1928, II) 253; G.C. (1932, I) 144.

Conophyllum Schwant.

D.K.G. (1927/28) 321; v.P.M. 32.

- Conophyllum chrysoleucum*** Schwant. = ***Monilaria chrysoleuca*** Schwant.
- Conophyllum clivorum*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. clivorum* N.E.Br., *Mitrophyllum clivorum* Schwant.). — Kl.-Namaland, Abhänge des Passes zwischen Stinkfontein und Chubiessis. — N.E.Br.M. 113 (*Mes. cliv.*); D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. cliv.*); D.K.G. (1927/28) 322; G.C. (1929, II) 249.
- Conophyllum cognatum*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. cognatum* N.E.Br., *Mitrophyllum cognatum* Schwant.). — Kl.-Namaland, obere Abhänge der Hügel südwestl. Chubiessis. — N.E.Br.M. 113 (*Mes. cogn.*); D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. cogn.*); D.K.G. (1927/28) 321; G.C. (1929, II) 249; M. 262 (*Mitr.*).
- Conophyllum dissitum*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. dissitum* N.E.Br., *Mitrophyllum dissitum* Schwant.). — Kl.-Namaland, zwischen Büschen an den oberen Abhängen der Hügel oberhalb Daunabis; Richtersveld. — N.E.Br.M. 114 (*Mes. diss.*); D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. diss.*); Fl.Pl. VII. Pl. 272 (*Mes. diss.*); D.K.G. (1927/28) 321; G.C. (1929, II) 248 (*Mitr. diss.*); M. 263 (*Mitr.*).
- Conophyllum globosum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, „Sand Veld“ bei Springbok. — L.B. III. 52.
- Conophyllum Herrei*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Doorn River. — L.B. II. 274; D.K.G. (1932) 139.
- Conophyllum Marlothianum*** Schwant. — (*Mitrophyllum Marlothianum* Schwant.). — Kl.-Namaland, bei Kommaggas. — D.K.G. (1927/28) 321; D.K.G. (1929) 14 (*Mitr. Marl.*).

Conophyllum moniliforme Schwant. = *Monilaria moniliformis* Schwant.

Conophyllum nanum L.Bol. = *Mitrophyllum nanum* N.E.Br.

Conophyllum pisiforme Schwant. = *Monilaria pisiformis* Schwant.

Conophyllum proximum (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. proximum* N.E.Br., *Mitrophyllum proximum* Schwant.). — Kl.-Namaland, ca. 6 miles von „fifteen miles mountain“ und 3 miles nördl. Brakfontein. — N.E.Br.M. 117 (*Mes. prox.*); D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. prox.*); D.K.G. (1927/28) 321; S.G. (1927) 239 (*Mes. prox.*); G.C. (1929, II) 248 (*Mitr. prox.*); M. 266 (*Mitr. prox.*); L.B. I. 70 (*Mes. prox.*).

Conophyllum scutatum Schwant. = *Monilaria chrysoleuca* Schwant.

Conophytum N.E.Br.

G.C. (1922, I) 198, 214; D.K.G. (1925/26) 117; G.C. (1925, II) 450; G.C. (1926, I) 134; P.G.S.A.P. 241; G.C. (1927, I) 31; S. (1927) 79; D.K.G. (1927/28) 222; Gfl. (1927) 376, 422; Gw. (1929) 25; v.P.M.32; A. 212; C.J. VI. 13.

Conophytum advenum N.E.Br. — Montague Divis. — G.C. (1925, II) 451; D.K.G. (1927/28) 222.

Con. aggregatum (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. aggregatum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, II) 8; N.E.Br.M. 91; D.K.G. (1927/28) 222.

Con. albertense N.E.Br. = *Con. Purpusii* N.E.Br.

Con. albescens N.E.Br. — Kl.-Namaland. Standort unbekannt, wahrscheinlich in der Nähe von Chubiessis. — G.C. (1926) 12; D.K.G. (1927/28) 222.

Con. albifissum Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — C.J. III. 63.

Con. altile N.E.Br. (*Mes. altile* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 92 (*Mes. altile*); G.C. (1922, II) 83; D.K.G. (1927/28) 222.

Con. altum L.Bol. — Kl.-Namaland auf einem Hügel südl. Brakfontein. — S.G. (1927) 294; L.B. I. 21, 130.

Con. altum L.Bol. var. *plenum* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Port Nolloth. — L.B. III. 86.

Con. amplum L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Vlakkyn. — L.B. III. 87.

Con. andausanum N.E.Br. — Kl.-Namaland, bei Andaus Poort nahe Anenous im Richtersveld. — G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 222; M. 139.

Con. andausanum N.E.Br. var. *immaculatum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Ezelsfontein auf dem Wege von Springbok nach Spektakel. — L.B. III. 87.

- Con. Angelicae** (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Angelicae* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, Eendorn, nahe Warmbad. — D.K.G. (1925/26) 27 (*Mes. Ang.*); G.C. (1925, II) 451; D.K.G. (1927/28) 222; S. (1934) 55; D.K.G. (1937) 28.
- Con. angustum** N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 427.
- Con. angustum** L. Bol. = **Con. nutaboiense** Tisch.
- Con. apertum** Tisch. — Kl.-Namaland, NO von Port Nolloth. — S. (1931) 52.
- Con. apiatum** N.E.Br. — (*Mes. apiatum* N.E.Br., *Derenbergia apiata* Schwant.). — Kl.-Namaland, westl. Abhänge eines Bergrückens zwischen Daunabis und Bethanydrift. — N.E.Br.M. 64 (*Mes. apiatum*); G.C. (1922, II) 83; D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenb. ap.*); D.K.G. (1927/28) 222; M. 140.
- Con. apiculatum** N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 427.
- Con. approximation** Lavis. — Kl.-Namaland, Steinkopf, Grot Mis, nahe Springbok, an einem Wege nach Bushmanland. — S.G. (1932) 257; D.K.G. (1934) 52.
- Con. Archeri** Lavis. — Montagu-Divis., bei Montagu. — L.B. II. 378.
- Con. assimile** N.E.Br. — (*Mes. assimile* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 92 (*Mes. ass.*); G.C. (1925, II) 451; D.K.G. (1927/28) 222; M. 141.
- Con. auctum** N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 429.
- Con. auriflorum** Tisch. — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — D.K.G. (1927/28) 122; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. Batesii** N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1925, II) 468; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. bilobum** (Marl.) N.E.Br. — (*Mes. bilobum* Marl., *Mes. stylosum* N.E.Br., *Derenbergia biloba* Schwant.). — Kl.-Namaland, zwischen Stinkfontein und Chubiessis, Karrachab Richtersveld. — Tr.Ph.S. XVIII. 44 (*Mes. bil.*); B.Mag. 141. Tab. 8595B (*Mes. styl.*); G.C. (1922, II) 83; D.K.G. (1925/26) 138 (*Deremb. bil.*); S. (1927) 94; D.K.G. (1927/28) 222; M. 143.
- Con. blandum** L.Bol. — Bushmanland, bei Geselskopbank. — L.B. III. 88.
- Con. Bolustiae** Schwant. — Kl.-Namaland, zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. — Gw. (1929) 25; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. Braunsii** Schwant. = **Con. Pearsonii** N.E.Br. var. *minor* N.E.Br.
- Con. breve** N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — G.C. (1925, II) 468; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. brevipetalum** Lavis. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 290.
- Con. brevitybum** Lavis. — Ladismith Divis., am Eingang zu Seven Weeks Poort. — L.B. II. 292.

- Con. Brownii* Tisch. — Kl.-Namaland, genauer Standort unbekannt. — M.D.G.Ztg. (1926) 257; G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. calculus* (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. calculus* Bgr.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp, bei Nieuwerust. — D.K.G. (1920) 131 (*Mes. calc.*); G.C. (1922, I) 231; D.K.G. (1927/28) 222; S. (1928) 5.
- Con. calitzdorpense* L.Bol. — (*Con. calitzdorpense* Tisch.). — Ladismith Divis., bei Calitzdorp. — L.B. III. 21; C.J. V. 13; C.J. VI. 38; F.R. XLIII. 228; D.K.G. (1938) 41.
- Con. calitzdorpense* Tisch. = *Con. calitzdorpense* L.Bol.
- Con. Caroli* Lavis = *Ophthalmophyllum Caroli* Tisch.
- Con. catervum* N.E.Br. — (*Mes. catervum* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., bei Grootfontein. — N.E.Br.M. 93 (*Mes. cat.*); G.C. (1922, I) 8; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. cauliferum* N.E.Br. — (*Mes. cauliferum* N.E.Br., *Derenbergia caulifera* Schwant.). — Kl.-Namaland, südwestl. von Chubiessis. — G.C. (1922, II) 84; D.G.K. (1925/26) 138 (*Derenb. caulif.*); S. (1927) 95; D.K.G. (1927/28) 222.
- Con. ceresianum* L.Bol. — Ceres Divis., Ceres Karroo. — L.B. III. 83.
- Con. chloratum* Tisch. = *Con. limbatum* N.E.Br.
- Con. cibdelum* N.E.Br. = *Con. truncatellum* N.E.Br.
- Con. circumpunctatum* Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, südl. Ananous. — S. (1931) 53.
- Con. citrinum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Kubus. — L.B. III. 26.
- Con. clarum* N.E.Br. — Calvinia Divis., zwischen Granitfelsen an den Hügeln am Fuße des Langeberg. — G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. compressum* N.E.Br. — S.-Afr., Alexanderbay. — C.J. III. 37.
- Con. Comptonii* N.E.Br. — Malmesbury Divis., nahe Nieuwoudtville. — G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 223; M. 145.
- Con. concavum* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay in Richtung Riet Hus. — L.B. III. 23.
- Con. concinnum* Schwant. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — M.D.G.Ztg. (1927) 27; D.K.G. (1927/28) 223; F.R. XLIII. 221; D.K.G. (1938) 46.
- Con. connatum* L.Bol. — Kl.-Namaland, 28 miles von Port Nolloth auf dem Wege nach Ookiep; Sw.-Afr., bei Wittpütz. — L.B. III. 88; C.J. VI. 51.
- Con. Conradii* L.Bol. — Kl.-Namaland, Breekpoort bei Steinkopf. — L.B. III. 89.
- Con. convexum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Nieuwe Mine. — L.B. III. 26.
- Con. corculum* Schwant. — Kl.-Namaland, ca. 35 km östl. Port Nolloth. — Gw. (1929) 68.

- Con. cordatum* Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, Bergland südl. der Bahn Port Nolloth—Ananous. — D.K.G. (1927/28) 152; D.G.K. (1927/28) 223; M. 146.
- Con. cordatum* Schick et Tisch. var. *macrostigma* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, „Tussen-in-Mountain“. — L.B. III. 89.
- Con. corniferum* Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, Berge der Bahnlinie südl. Port Nolloth—Ananous. — D.K.G. (1927/28) 151; D.K.G. (1927/28) 223; S. (1931) 225; M. 147.
- Con. cuneatum* Tisch. = *Con. hatschbergense* N.E.Br.
- Con. cupreatum* Tisch. — Südl. Kl.-Namaland, Bushmanland, bei Gamoeop und bei Namies. — S. (1936) 33.
- Con. cylindratum* Schwant. — Kl.-Namaland, Alexanderbay. — Gw. (1929) 69.
- Con. declinatum* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Abhänge bei Doornbosch River Bridge. — L.B. III. 101.
- Con. Dennisii* N.E.Br. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — J.C.S. II. 428.
- Con. densipunctum* (Tisch.) L.Bol. — (*Derenbergia densipuncta* Tisch.) — Sw.-Afr., Karasberge, Warmbad. — S.G. (1930) 212.
- Con. depressum* Lavis. — Kl.-Namaland, Khamiesberg. — L.B. II. 264.
- Con. difforme* L.Bol. — C.J. VI. 51.
- Con. dispar* N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1925, II) 468; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. divaricatum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — M. 148.
- Con. divergens* L.Bol. — Ceres Divis., Karrooport. — L.B. III. 83.
- Con. diversum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, bei Ananous im Richtersveld. — G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 223; S.G. (1932) 257.
- Con. ectypum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — G.C. (1925, II) 468; G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. Edithae* N.E.Br. = *Ophthalmophyllum Edithae* Tisch.
- Con. Edwardii* Schwant. — S.-Afr., Standort unbekannt. — Gw. (1929) 69.
- Con. Edwardsiae* Lavis. — S.-Afr., Clanwilliam Divis., Warmbaths. — L.B. II. 291.
- Con. eenkokereense* L.Bol. — Bushmanland, Eenkoker Mountains. — L.B. III. 89.
- Con. elegans* N.E.Br. = *Con. pellucidum* Schwant.
- Con. Elishae* N.E.Br. — (*Mes. Elishae* N.E.Br., *Derenbergia Elishae* Schwant.). — Kl.-Namaland, nahe der Oranjemündung. — B.Mag. 144. Tab. 8776 B (*Mes. El.*); G.C. (1922, II) 124; D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenb. El.*); G.C. (1926, I) 134; S. (1927) 97; D.K.G. (1927/28) 223; M.D.G.-Ztg. (1927) 283; M. 150.
- Con. elongatum* Schick et Tisch. = *Con. hians* N.E.Br.

- Con. Ernianum* Loesch et Tisch. — Gr.-Namaland, Wittputz. — D.K.G. (1933) 47.
- Con. Etaylori* Schwant. = *Con. piluliforme* N.E.Br.
- Con. exiguum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 428.
- Con. exsertum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. Standort unbekannt. — G.C. (1926, I) 30; D.K.G. (1927/28) 223; M. 152.
- Con. fenestratum* Schwant. — S.-Afr., Standort unbekannt. — Gw. (1929) 68; F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.
- Con. fibuliforme* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. fibuliforme* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 214; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. ficiforme* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. ficiforme* Haw.). — Worcester Divis., bei Worcester. — D.K.G. (1920) 131 (*Mes. fic.*); G.C. (1922, II) 54; S. (1927) 110; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. fimbriatum* (Sond.) N.E.Br. — (*Mes. fimbriatum* Sond.). — Nahe Gamka River in Beaufort-West-Divis. oder Prince Albert Divis.; Lüderitzbucht (?). — Tr.R.S. I. 406 (*Mes. fimbr.*); G.C. 1922, I) 214; F.R. XIX. 189; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. flarum* N.E.Br. — (*Con. concinnum* Schwant.). — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 223; M. 155; M.D.G.Ztg. (1927) 27 (*Con. concinnum*); D.K.G. (1927/28) 223 (*Con. concinnum*).
- Con. Forresteri* L.Bol. — Von Rhynsdorp Divis., bei Nieuwefontein. — L.B. III. 84.
- Con. fossulatum* Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — S. (1931) 221.
- Con. Framesi* Lavis. — S.-Afr., zwischen Van Rhynsdorp und Clanwilliam. — S.G. (1929) 144.
- Con. fraternum* N.E.Br. — (*Mes. fraternum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Hügel südl. Chubiessis. — G.C. (1922, I) 261; S. (1927) 165; D.K.G. (1927/28) 223; M. 156; S. (1926) 14 (bei *Con. Marlothii*!).
- Con. fraternum* N.E.Br. var. *leptanthum* L.Bol. — Riversdale Divis. Garcia's Paß. — L.B. III. 23; C. 3. VI. 9; L.B. III. 79.
- Con. Friedrichiae* Schwant. = *Ophthalmophyllum Friedrichiae* Dtr. et Schwant.
- Con. frutescens* Schwant. — Kl.-Namaland, Kommaggas bei Steinkopf. — M.D.G.Ztg. (1927) 123; G.C. (1927, II) 228; C.J. IV. 39.
- Con. Fulleri* L.Bol. — S.-Afr., Kenhardt Divis., Kakamas. — L.B. II. 62.
- Con. geometricum* Lavis = *Con. violaciflorum* Schiek et Tisch.
- Con. germanum* N.E.Br. — S.-Afr., Hügel der Piquetberg Divis. — C.J. II. 7.
- Con. globosum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, 3 miles westl. von Garies. — G.C. (1922, I) 231; D.K.G. (1927/28) 223; S. (1928) 61.

- Con. globuliforme** Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, Bergland südl. der Bahn Port Nolloth—Ananous. — D.K.G. (1927/28) 152; D.K.G. (1927/28) 202; S. (1931) 226; F.R. XLIII. 221; D.K.G. (1938) 46.
- Con. gracile** N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 427.
- Con. gracilistylum** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. gracilistylum* L.Bol.; *Mes. augeiforme* Schwant.; *Mes. Chauviniae* Schwant.; *Derenbergia gracilistyla* Schwant.; *Derenbergia augeiforme* Schwant.; *Derenbergia Chauviniae* Schwant.). — Kl.-Namaland, Stinkfontein. — D.K.G. (1920) 77 (*Mes. Chauviniae*); D.K.G. (1920) 78 (*Mes. aug.*); D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenbg.*); G.C. (1925, II) 484; S. (1927) 98; D.K.G. (1927/28) 223; M. 258.
- Con. Graessneri** Tisch. — Gr.-Namaland, nahe der Oranjemündung. — D.K.G. (1930) 63.
- Con. grandiflorum** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. III. 90.
- Con. gratum** N.E.Br. — (*Mes. gratum* N.E.Br.; *Mes. nanum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, auf einem Abhang nahe Daunabis im Richtersveld, Numees. — N.E.Br.M. 93 (*Mes. gratum*); G.C. (1922, I) 261; D.K.G. (1927/28) 223; M. 159.
- Con. halenbergense** (Dur. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. halenbergense* Dtr. et Schwant., *Derenbergia halenbergensis* Schwant., *Con. cuneatum* Tisch.). — Gr.-Namaland, bei Halenberg. — D.K.G. (1925/26) 17 (*Mes. halenberg.*); D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenbergia hal.*); G.C. (1926, I) 30; D.K.G. (1927/28) 223; S. (1932) 113 (*Con. cuneatum*); D.K.G. (1937) 28; F.R. XLIII. 221; D.K.G. (1938) 46; C.J. VI. 51.
- Con. Helmutii** Lavis = **Con. Stephanii** Schwant.
- Con. Herrei** Schwant. — Van Rhynsdorp Divis. auf dem Giftberg, Pakhinspaß bei Clanwilliam. — D.K.G. (1927/28) 179; C.J. I. 29; C.J. VI. 9, 11; L.B. III. 79.
- Con. hians** N.E.Br. — (*Con. elongatum* Schick et Tisch.). — Kl.-Namaland, Lekkersing im Richtersveld; südl. der Bahn Port Nolloth—Ananous. — G.C. (1927, I) 32; S. (1927) 168 (*Con. elongatum*); D.K.G. (1927/28) 223 (*Con. elong.*); D.K.G. (1927/28) 223; M. 151 (*Con. elong.*); S. (1931) 243; S. (1932) 113; C.J. VI. 51.
- Con. hirtum** Schwant. — Kl.-Namaland, ca. 45 km NO Port Nolloth. — D.K.G. (1927/28) 278.
- Con. incurcum** N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 427; C.J. V. 15.
- Con. inornatum** N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. Johannis-Winkleri** (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Johannis-Winkleri* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, Klinghardt-Gebirge. — D.K.G. (1925/26) 18 (*Mes. Joh.-W.*); G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 223; S. (1934) 55; D.K.G. (1937) 28.

- Con. Joubertii* Lavis. — Ladismith Divis., bei Van Wyksdorp. — L.B. II. 439.
- Con. jucundum* N.E.Br. — (*Mes. jucundum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp, nahe Bakhuis, in trockenen steinigen Flußbetten 1 mile südl. von Bethany Drift. — N.E.Br.M. 93 (*Mes. juc.*); G.C. (1922, I) 231; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. Julii* Schwant. = *nomen nudum*. — D.K.G. (1937) 207; F.R. XLIII. 228.
- Con. karamoepense* L.Bol. — Bushmanland, Karamoep. — L.B. III. 90.
- Con. klaverense* N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Klaver. — G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 223; M. 162.
- Con. klipbokbergense* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Klipbokberge. — L.B. III. 27.
- Con. kubusanum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, bei Kubus im Richtersveld. — G.C. (1927, I) 32; D.K.G. (1927/28) 223; S. (1936) 14.
- Con. labyrinthum* N.E.Br. — (*Mes. labyrinthum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 94 (*Mes.*); G.C. (1922, II) 8; S. (1927) 131; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. laetum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Sandveld, Wildeperdehoek. — L.B. III. 92.
- Con. Lambertense* Schick et Tisch. — S.-Afr., Lamberts Bay. — S. (1931) 222.
- Con. latum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kubus. — L.B. III. 27.
- Con. Lavisianum* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Kommaggas und Meskraal. — L.B. III. 91.
- Con. laxipetalum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Springbok. — C.J. III. 37.
- Con. Leightoniae* L.Bol. — Zwischen Ladismith und Montagu. — L.B. III. 85.
- Con. Leipoldtii* N. E. Br. — Clanwilliam Divis., nahe Clanwilliam. — G.C. (1922, I) 214; S.G. (1927) 372; D.K.G. (1927/28) 223; L.B. I. 26.
- Con. lekkersingense* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Lekkersing. — L.B. III. 28; C.J. VI. 51.
- Con. leptanthum* L.Bol. — Kl.-Karoo, zwischen Garcias Paß und Barrydale. — L.B. III. 23; C.J. VI. 11.
- Con. leucanthum* Lavis. — Kl.-Namaland, 23 miles nördl. von Steinkopf. — L.B. II. 468.
- Con. leucanthum* Lavis var. *multi-petalum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. III. 28.
- Con. leviculum* N.E.Br. — (*Mes. leviculum* N.E.Br., *Mes. glebula* Schwant.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 94 (*Mes. lev.*); D.K.G. (1920) 121 (*Mes. gleb.*); G.C. (1922, II) 8; G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 223; M. 164.

- Con. limbatum* N.E.Br. — (*Con. chloratum* Tisch.). — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — G.C. (1927, I) 33; D.K.G. (1927/28) 223; M.D.G. Ztg. (1928) 150 (*Con. chloratum*); S. (1931) 243 (*Con. chloratum*); F.R. XLIII. 221; D.K.G. (1938) 46.
- Con. linearilucidum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, „Tussen-in-Mountains“. — L.B. III. 92.
- Con. literatum* N.E.Br. — Namaland, Standort unbekannt. — M. 180; S. (1936) 35.
- Con. Loeschianum* Tisch. — Gr.-Namaland, am Ufer des Oranjerflusses bei Hohenfels. — S. (1931) 225; S. (1935) 163.
- Con. longibracteatum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kommaggas, Sandberge. — L.B. III. 93.
- Con. longifissum* Tisch. — Kl.-Namaland. — M.D.G.Ztg. (1927) 28; D.K.G. (1927/28) 223; M. 165; C.J. VI. 38.
- Con. longipetatum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Alwynsfontein, östl. Garies. — L.B. III. 84.
- Con. longistylum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — G.C. (1930, I) 515.
- Con. longum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Een Riet. — G.C. (1930, II) 8; M. 166.
- Con. lucipunctum* N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — C.J. I. 58.
- Con. Luckhoffii* Lavis. — S.-Afr., Clanwilliam Divis., im Citrusdale-Tal. — L.B. II. 291.
- Con. Luisae* Schwant. — Kl.-Namaland, Karrachab im Richtersveld, Lekkersing. — D.K.G. (1930) 22; C.J. IV. 39.
- Con. luteum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — G.C. (1930, I) 515.
- Con. marginatum* Lavis. — Bushmanland Karroo, 20 miles östl. Springbok am Wege nach Puffadder. — S.G. (1930) 212, 214.
- Con. Markoetterae* Schwant. — Kl.-Namaland, 30 miles NO von Port Nolloth. — Gw. (1929) 25.
- Con. Marlothii* N.E.Br. — Kl.-Namaland, Ugrabis-Mountains. — G.C. (1927, I) 52; S. (1936) 14.
- Con. Maughanii* N.E.Br. = *Ophthalmophyllum Maughanii* Schwant.
- Con. Meleagris* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 80 miles von Van Rhynsdorp auf dem Nieuwefontein-Weg. — L.B. III. 83.
- Con. Meyerae* Schwant. — Kl.-Namaland, Steinkopf-Umdaus. — Gw. (1929) 25; S. (1936) 35.
- Con. Meyeri* N.E.Br. — Kl.-Namaland bei Steinkopf. — G.C. (1925, II) 484; G.C. (1927, I) 52; D.K.G. (1927/28) 223; M. 168.
- Con. minimum* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. minimum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 307; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. minusculum* N.E.Br. — (*Mes. minusculum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis., zwischen Clanwilliam und Citrusdale. — G.C. (1922, II) 24; S.G. (1927) 334; D.K.G. (1927/28) 223; L.B. I. 24; M. 169.

- Con. minutiflorum** (Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. minutiflorum* Schwant., *Mes. calculus minutiflorum* Schwant.). — Kl.-Namaland, nahe Ookiep in den Kamiesbergen; Gr.-Namaland, auf dem Copperberg. — D.K.G. (1920) 81 (*Mes. calc. min.*); D.K.G. 1922. 81 (*Mes. min.*); G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 223; L.B. I. 30.
- Con. minutum** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. minutum* Haw., *Mes. thecatum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp, bei Bakhuis. — B.Mag. 141. Tab. 8595. A (*Mes. thec.*); D.K.G. (1920) 131 (*Mes.*); G.C. (1922, I) 231; D.K.G. (1927/28) 223; S. (1928) 64; M. 170; D.K.G. (1931) 44, 45.
- Con. minutum** (Haw.) N.E.Br. var. *laxum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., beim Zout River. — L.B. II. 293.
- Con. misellum** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Witklip Poort, nahe Ugrabis im Richtersveld. — G.C. (1927, I) 53; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. miserum** N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Grootmist. — C.J. I. 58.
- Con. modestum** L.Bol. — Kl.-Namaland, Sendlingsdrift. — L.B. III. 29.
- Con. Morganii** Lavis. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 289.
- Con. Muiri** N.E.Br. — Ladismith Divis., auf der Hügelseite südl. des Touws Berg. — G.C. (1927, I) 53; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. multicolor** Tisch. — Van Rhynsdorp Divis. — S. (1928) 127; S. (1932) 83; S. (1936) 36.
- Con. multipunctatum** Tisch. — Uniondale Divis. — C.J. VI. 37.
- Con. mundum** N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 307; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. muscosipapillatum** Lavis. — Kl.-Namaland, Sendeberge bei Komaggas. — L.B. II. 379; D.K.G. (1934) 51; C.J. VI. 52.
- Con. nanum** Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.J. III. 63.
- Con. Nelianum** Schwant. — Kl.-Namaland. Van Reenenswater, Kommaggas — D.K.G. (1927/28) 180.
- Con. Nevillei** (Sims.) N.E.Br. — (*Mes. Nevillei* N.E.Br., *Mes. obrordellum* Sims.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp, bei Klaver. — N.E.Br.M. 95 (*Mes. Nev.*); G.C. (1922, I) 307; S. (1927) 132; D.K.G. (1927/28) 223; M. 172; C. J. VI. 10. 11; L.B. III. 80.
- Con. noisabisense** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Helskloof. — L.B. III. 29.
- Con. notabile** N.E.Br. — Kl.-Namaland, genauer Standort unbekannt. — G.C. (1930, I) 515.
- Con. notatum** N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. novellum** N.E.Br. — Clanwilliam Divis., nahe Klawer. — G.C. (1927, I) 53; D.K.G. (1927/28) 224; S. (1932) 83.
- Con. novicium** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — C.J. II. 53.

- Con. nuciforme* N.E.Br. = *Gibbaeum cryptopodium* L.Bol.
- Con. nutaboense* (L.Bol.) Tisch. — (*Con. angustum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Richtersveld, Nutabooi, Buffels River. — L.B. III. 25 (*Con. ang.*); D.K.G. (1937) 16.
- Con. obconellum* N.E.Br. = *Con. obcordellum* N.E.Br.
- Con. obcordellum* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. obcordellum* Haw., *Con. obconellum* N.E.Br.). — Worcester Divis.: bei Worcester; Clanwilliam Divis.: bei Clanwilliam. — D.K.G. (1920) 132 (*Mes. obcon.*); G.C. (1922, I) 307; M.D.G.Ztg. (1926) 308; S. (1927) 149; D.K.G. (1927/28) 224; D.K.G. (1930) 266.
- Con. obmetale* N.E.Br. — (*Mes. obmetale* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 95 (*Mes. obm.*); G.C. (1922, I) 307; D.K.G. (1927/28) 223.
- Con. oboratum* Lavis. — Kl.-Namaland, auf Quartz-Hügel 5 miles südl. Khamies Kroon. — L.B. II. 401.
- Con. obscurum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, Ugrabis Mountain im Richtersveld. — G.C. (1927, I) 53; D.K.G. (1927/28) 224; M. 173.
- Con. obtusum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 427.
- Con. occultum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Komkans, etwa 18 miles südl. von Bitterfontein. — L.B. III. 24; C.J. VI. 9, 11.
- Con. odoratum* N.E.Br. — (*Mes. odoratum* N.E.Br., *Mes. jugiferum* N.E.Br.). — Worcester Divis., auf einem Berge nahe Worcester. — N.E.Br.M. 94 (*Mes. jug.*); G.C. (1922, II) 83; S. (1927) 111; D.K.G. (1927/28) 224; S.G. (1927) 446; L.B. I. 33; M. 174.
- Con. ornatum* Lavis = *Con. percrassum* Schick et Tisch.
- Con. oviforme* N.E.Br. = *Oophytum oviforme* N.E.Br.
- Con. ovigerum* Schwant. — Kl.-Namaland, 35 miles östl. Port Nolloth. — Gw. (1929) 68; S. (1931) 226; F.R. XLIII. 221; D.K.G. (1938) 46.
- Con. Pageae* N.E.Br. — (*Mes. Pageae* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, nahe Garies. — N.E.Br.M. 96 (*Mes. Pag.*); G.C. (1922, I) 231; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. pallidum* N.E.Br. — (*Mes. pallidum* N.E.Br.). — Worcester Divis., auf einem Berge nahe Worcester. — N.E.Br.M. 96 (*Mes. pall.*); G.C. (1922, II) 83; M.D.G.Ztg. (1926) 220; S. (1927) 113; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. parvidisum* Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — S. (1931) 223; S. (1932) 83.
- Con. parviflorum* N.E.Br. — Clanwilliam Divis., in Spalten von Sandstein nahe Clanwilliam. — C.J. II. 53.
- Con. parvipetalum* N.E.Br. (*Mes. parvipetalum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 97 (*Mes. parv.*); G.C. (1922, II) 8; D.K.G. (1927/28) 224; M. 175.
- Con. parvulum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. III. 30.

- Con. pauxillum** N.E.Br. — (*Mes. pauxillum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis., nahe Graafwater. — N.E.Br.M. 97 (*Mes. paux.*); G.C. (1922, II) 24; D.K.G. (1927/28) 224; L.B. I. 34; S.G. (1928) 28.
- Con. Pearsonii** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Wettsteinii* L.Bol.) — Van Rhynsdorp Divis., nahe Bakhuis. — G.C. (1925, II) 484; D.K.G. (1927/28) 224; M. 176.
- Con. Pearsonii** (L.Bol.) N.E.Br. var. *minor* N.E.Br. — (*Con. Braunsii* Schwant.). — Van Rhynsdorp Divis. — G.C. (1935, I) 500; D.K.G. (1927/28) 178 (*Con. Braunsii*); D.K.G. (1927/28) 224; M. 176.
- Con. Peersii** Lavis. — Willowmoore Divis., nahe Toverwater. — J.B. (1929) 77.
- Con. pellucidum** (N.E.Br.) Schwant. — (*Lithops Marlothii* N.E.Br., *Con. elegans* N.E.Br., *Ophthalmophyllum Marlothii* Schwant.). — Kl.-Namaland, bei Ookiep. — G.C. (1926, I) 102 (*L. Marl.*); S. (1927) 77 (*L. Marl.*); M.D.G.Ztg. (1927) 64 (*Ophth. Marl.*); D.K.G. (1927/28) 22 (*Ophth. M.*) 224; M.D.G.Ztg. (1927) 316; S. (1928) 104; G.C. (1927, II) 228 (*Con. eleg.*); M. 178.
- Con. percrassum** Schick et Tisch. — (*Con. ornatum* Lavis.). — Kl.-Namaland Undaus b. Steinkopf. — S. (1931) 223; S. (1932) 84; L.B. II. 265 (*Con. orn.*); D.K.G. (1935) 210.
- Con. permaculatum** Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G. (1938) 33.
- Con. perpusillum** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. perpusillum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, II) 307; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. petraeum** N.E.Br. — Laingsburg Divis., nahe Laingsburg. — G.C. (1922, II) 54; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. pictum** N.E.Br. — (*Mes. pictum* N.E.Br.). — 7 miles von Graafwater an der Clanwilliam-Seite. — N.E.Br.M. 97 (*Mes. pict.*); G.C. (1922, II) 8; S. (1927) 130; S.G. (1927) 334; L.B. I. 22; M. 180.
- Con. picturatum** N.E.Br. — Clanwilliam Divis., zwischen Clanwilliam und Citrusdale. — G.C. (1927, I) 53; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. Pillansii** Lavis. — S.-Afr., zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwerust. — S.G. (1929) 144.
- Con. pilosulum** N.E.Br. = **Gibbaeum pilosulum** N.E.Br.
- Con. piluliforme** N.E.Br. — (*Mes. piluliforme* N.E.Br., *Con. Etaylori* Schwant.). — Robertson Divis., nahe Montagu. — N.E.Br. 98 (*Mes. pil.*); G.C. (1922, I) 261; D.K.G. (1927/28) 224; Gw. (1929) 68 (*Con. Et.*); C.J. III. 63.
- Con. piriforme** L.Bol. — Kl.-Namaland, Kubusberge, Kubus, Richtersveld. — L.B. III. 30.
- Con. pisinum** N.E.Br. — (*Mes. pisinum* N.E.Br.). — Karroo. — N.E.Br.M. 98 (*Mes. pis.*); G.C. (1922, I) 214; D.K.G. (1927/28) 224.

- Con. placitum* N.E.Br. — (*Mes. placitum* N.E.Br.). — Robertson Divis., nahe Robertson. — N.E.Br.M. 99 (*Mes. plac.*); G.C. (1927/28) 224; S. (1927) 114; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. plenum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 428.
- Con. Poellnitzianum* Schwant. — (*Con. Victoris* Lavis.). — Kl.-Namaland. — M.D.G.Ztg. (1928) 31; L.B. II. 293 (*Con. Victoris*); F.F. XLIII. 221; D.K.G. (1938) 46.
- Con. Pole Evansii* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 429; C.J. VI. 51.
- Con. polulum* N.E.Br. — Laingsburg Divis., nahe Laingsburg. — G.C. (1922, II) 24; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. polyandrum* Lavis. — Kl.-Namaland, Kommaggas — L.B. II. 441; C.J. VI. 9. 11; L.B. III. 80.
- Con. praecinctum* N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 307; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. praecox* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — M. 183.
- Con. praeparvum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, auf den Langebergen nahe Garies. — G.C. (1927, I) 70; D.K.G. (1927/28) 224; C.J. (III) 63.
- Con. praeparvum* N.E.Br. var. *roseum* Lavis. — Auf Felsen am Rande des Namalandes. — S.G. (1930) 153.
- Con. praesectum* N.E.Br. = *Ophthalmophyllum praesectum* Schwant.
- Con. Primosii* Lavis. — Kl.-Namaland, Mesklip, Kommaggas Berge. — L.B. II. 267.
- Con. puberulum* Lavis. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. II. 266.
- Con. pubicalyx* Lavis. — Van Rhynsdorp Divis., 45 miles nördl. von Bitterfontein, nahe der Farm Nieuwefontein. — L.B. II. 401.
- Con. pumilum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, östl. Steinkopf. — C.J. II. 53.
- Con. Purpusii* (Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Purpusii* Schwant., *Mes. minusculum* Schwant., *Mes. malleoliforme* Schwant., *Mes. albertense* N.E.Br., *Mes. familiare* Schwant., *Mes. obcordellum* Marl., *Mes. uvaeforme* Purp., *Con. albertense* N.E.Br.). — Prince Albert Karroo, nahe Prince Albert. — D.K.G. (1920) 38 (*Mes. Purp.*); D.K.G. (1920) 40 (*Mes. min.*); D.K.G. (1920) 77 (*Mes. mall.*); N.E.Br.M. 92 (*Mes. alb.*); D.K.G. (1922) 129 (*Mes. fam.*); G.C. (1922, I) 261 (*Con. alb.*); G.C. (1925, I) 500; S. (1927) 151; D.K.G. (1927/28) 224; S.G. (1927) 446; L.B. I. 31; M. 184.
- Con. pusillum* N.E.Br. — (*Mes. pusillum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 99 (*Mes. pus.*); G.C. (1922, II) 24; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. pygmaeum* Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, Grootmouth, südl. der Bahnlinie Port Nolloth-Ananous. — D.K.G. (1927/28) 154; D.K.G. (1927/28) 224.

- Con. quaesitum* N.E.Br. — (*Mes. quaesitum* N.E.Br., *Derenbergia quaesita* Schwant.). — Kl.-Namaland, Jackhals-Mountains bei Sendlings Drift, am Ufer des Oranje-Flusses bei Hohenfels. — N.E.Br.M. 65 (*Mes. quacs.*); G.C. (1922, II) 83; D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenb. quacs.*); D.K.G. (1927/28) 224; J.C.S. II. 428.
- Con. quarziticum* Tisch. — Gr.-Namaland, Udabib Mountains. — J.C.S. VII. 9.
- Con. radiatum* Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — S. (1931) 224.
- Con. ramosum* Lavis. — Kl.-Namaland, Kurkamberge bei Komaggas. — L.B. II. 265; D.K.G. (1934) 51.
- Con. regisum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 428; C.J. V. 14.
- Con. regale* Lavis. — Kl.-Namaland, Ratelpoort bei Ookiep. — L.B. II. 469.
- Con. Renniei* Davis. — Prince Albert Divis. — J.B. (1930) 78.
- Con. reticulatum* L. Bol. — Clanwilliam Divis., Cedarbergen. — L.B. III. 25; C.J. VI. 9, 11; L.B. III. 80.
- Con. retusum* N.E.Br. — Kl.-Namaland, auf Felsen im Kavarass River im Richtersveld. — G.C. (1927, I) 70; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. Ricardianum* Loesch et Tisch. — Gr.-Namaland, nahe Oranje-Fluß oberhalb Hohenfels. — D.K.G. (1932) 74.
- Con. robustum* Tisch. — Gr.-Namaland, wahrscheinlich südl. Wittpütz. — S. (1936) 12.
- Con. Roodiae* N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — G.C. (1926, I) 30; D.K.G. (1927/28) 224; M. 185.
- Con. rufescens* N.E.Br. = *Ophthalnophyllum rufescens* Tisch.
- Con. salmonicolor* L.Bol. — Kl.-Namaland, Koufontein bei Komaggas. — L.B. III. 93.
- Con. saxetanum* N.E.Br. — (*Mes. saxetanum* N.E.Br., *Mes. fimbriatum* Marl., *Mes. Böhmerianum* Dtr., *Derenbergia saxetana* Schwant.). — Gr.-Namaland, in Felsspalten nahe Angra Pequena. — N.E.Br.M. 99 (*Mes. saxet.*); G.C. (1922, I) 261; D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenb. saxet.*); D.K.G. (1927/28) 224; S. (1928) 65.
- Con. Schickianum* (Bgr.) Tisch. — (*Mes. Schickianum* Bgr.). — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — D.K.G. (1927/28) 120; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. Schlechteri* Schwant. — Kl.-Namaland, ca. 45 miles NO von Port Nolloth. — D.K.G. (1927/28) 279.
- Con. scitulum* N.E.Br. — (*Mes. scitulum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 100 (*Mes. scit.*); G.C. (1922, II) 54; S. (1927) 132; M. 187.
- Con. semirestitum* L.Bol. — Bushmanland, 3 miles nördl. von Jackhalswater. — L.B. III. 94.

- Con. signatum** N.E.Br. — (*Mes. signatum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 100 (*Mes. sign.*); G.C. (1922, II) 24; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. simile** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — J.C.S. II. 428.
- Con. simplum** N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 427.
- Con. Smithersii** L.Bol. — Kl.-Namaland, Eenrietberge bei Steinkopf. — L.B. III. 31.
- Con. sororium** N.E.Br. — Kl.-Namaland, wahrscheinlich zwischen Stinkfontein und Chubiessis. — G.C. (1926, I) 30; D.K.G. (1927/28) 224; M. 188.
- Con. spectabile** Lavis. — Worcester Divis., Kaainan's Gat bei Triangle. — L.B. II. 264.
- Con. spirale** N.E.Br. — Prince Albert Divis., nahe Prince Albert Road. — G.C. (1925, II) 500; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. springbokense** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Springbok. — J.C.S. II. 429; C. J. V. 13.
- Con. Stephanii** Schwant. — (*Con. Helmutii* Lavis.). — Kl.-Namaland, ca. 35 miles östl. Port Nolloth, Kinderlê nahe Steinkopf. — Gw. (1929) 25; S. G. (1932) 138 (*Con. Helm.*); D.K.G. (1933) 46.
- Con. strictum** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Hytkovas. — L.B. III. 31.
- Con. strictum** L.Bol. var. *inaequale* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Grariespütz. — L.B. III. 94.
- Con. subacutum** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Steinkopf und Hangpaal. — L.B. III. 95.
- Con. subfenestratum** Schwant. — (*Ophthalmophyllum cornutum* Schwant.). — Kl.-Namaland. — Gw. (1929) 68; D.K.G. (1934) 60 (*Ophth. corn.*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 41.
- Con. subglobosum** Tisch. — Ceres Karroo. — C.J. VI. 37.
- Con. subrisum** N.E.Br. — (*Mes. subrisum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., auf einem Hügel nahe Atties. — N.E.Br.M. 100 (*Mes. subr.*); D.K.G. (1927/28) 224; S. (1928) 62; M. 189.
- Con. subtenue** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — L.B. III. 95.
- Con. subtilis** N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Grootmist. — C.J. II. 7.
- Con. tabulare** Loesch et Tisch. — Kl.-Namaland, nördl. Scndlingsdrift. — J.S. 117; J.S.Pl. 158
- Con. tantillum** N.E.Br. — Kl.-Namaland, nahe Steinkopf. — G.C. (1926, I) 12; G.C. (1927, I) 70; D.K.G. (1927/28) 224; M. 190.
- Con. Taylorianum** (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Taylorianum* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, Klinghardtgebirge, Quarzitberg. — D.K.G. (1925/26) 27 (*Mes. Tayl.*); G.C. (1926, I) 12; D.K.G. (1927/28) 224; S. (1927) 28; D.K.G. (1937) 28.
- Con. tectum** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Springbok. — J.C.S. II. 427.
- Con. teguliflorum** Tisch. — Kl.-Namaland (?). — C.J. IV. 39.

- Con. terricolor* Tisch. — S.-Afr., Kl.-Namaland, bei Springbok. — S. (1934) 54.
- Con. tetracarpum* Lavis. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. II. 439.
- Con. tinctum* Lavis. — Kl.-Namaland. — L.B. II. 440.
- Con. Tischeri* Schick. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — D.K.G. (1927/28) 158; D.K.G. (1927/28) 224; D.K.G. (1929) 60; S. (1931) 245.
- Con. translucens* N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 261; L.B. I. 29; D.K.G. (1927/28) 224.
- Con. truncatellum* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. truncatellum* Haw., *Con. cibdelum* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein; Oudthoorn Divis. — G.C. (1922, I) 261; G.C. (1925, II) 468 (*Con. cibd.*); D.K.G. (1925/26) 151 (*Mes. trunc.*); D.K.G. (1927/28) 223 (*Con. cibd.*), 224; S. (1928) 3; M. 192 (*Con. cibd.*).
- Con. truncatum* (Thunb.) N.E.Br. — (*Mes. truncatum* Thunb.). — Uniondale Divis., zwischen Felsen in Kamanassie Karroo. — G.C. (1922, I) 261; D.K.G. (1927/28) 225; S. (1928) 2; L.B. I. 19.
- Con. tubatum* Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — S. (1932) 81.
- Con. tumidum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — J.C.S. II. 428.
- Con. turrigerum* N.E.Br. — (*Mes. turrigerum* N.E.Br., *Derenbergia turrigera* Schwant.). — Malmesbury Divis., nahe Klipheuveld. — N.E.Br.M. 102 (*Mes. turrig.*); G.C. (1922, II) 124; D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenb. turrig.*); D.K.G. (1927/28) 225; M. 194; K.Kd. (1937) 62.
- Con. udabibense* Loesch et Tisch. — Gr.-Namaland, in den Udabibbergen. — D.K.G. (1932) 16.
- Con. Ursprungianum* Tisch. — Calvinia Divis. — D.K.G. (1938) 33.
- Con. uraeforme* N.E.Br. — (*Con. vanrhynsdorpense* Schwant.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — G.C. (1922, II) 54; D.K.G. (1927/28) 225; Gw. (1929) 68 (*Con. vanrh.*); M. 195; S. (1936) 34.
- Con. vagum* N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, II) 54; D.K.G. (1927/28) 225.
- Con. vanrhynsdorpense* Schwant. = *Con. uraeforme* N.E.Br.
- Con. Vanzijlii* Lavis. — Kenhardt Divis., Pofadder. — L.B. II. 267.
- Con. velutinum* Schwant. — (*Derenbergia velutina* Schwant.). — Kl.-Namaland, bei Kommaggas, bei Steinkopf. — M.D.G.Ztg. (1927) 139 (*Derenb. vel.*); D.K.G. (1927/28) 225; M. 196; S. (1931) 244; C.J. VI. 11; L.B. III. 81.
- Con. veseum* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — M. 198.
- Con. Victoris* Lavis = *Con. Poellnitzianum* Schwant.
- Con. Villetii* L.Bol. — Kl.-Karoo. — L.B. III. 84.
- Con. violuciflorum* Schick et Tisch. — (*Con. geometricum* Lavis). — Kl.-Namaland, nahe Springbok-Fontein. — M.D.G.Ztg. (1928) 239; L.B. II. 438 (*Con. geometr.*); D.K.G. (1935) 86.

- Con. virens* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — L.B. III. 86.
Con. viridicatum N.E.Br. — (*Mes. viridicatum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 101 (*Mes. virid.*); G.C. (1922, I) 261; D.K.G. (1927/28) 225.
Con. viridicatum N.E.Br. var. *punctatum* N.E.Br. — Laingsburg Divis., nahe Grootfontein. — G.C. (1926, I) 12; D.K.G. (1927/28) 223.
Con. vlakmyense L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. Vlakmyn. — L.B. III. 96.
Con. Wagneriorum Schwant. — Willowmoore Divis. — D.K.G. (1927/28) 179.
Con. Wettsteinii (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. Wettsteinii* Bgr., *Mes. truncatellum* Othmer.). — Kl.-Namaland, genauer Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 231; G.C. (1925, II) 484!!; G.C. (1926, I) 12, 134; M.D.G.Ztg. (1926) 257; D.K.G. (1927/28) 225; L.B. I. 35; S.G. (1928) 28; S. (1928) 63; S. (1930) 44; M. 200.
Con. Wettsteinii (Bgr.) N.E.Br. var. *oculatum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Noisabis. — L.B. III. 80; C.J. VI. 10, 11.
Con. Wiggettiae N.E.Br. — Oudtshoorn Divis., bei Hezenyacht. — G.C. (1926, I) 12; D.K.G. (1927/28) 225; M. 201; D.K.G. (1932) 132.

Corpuscularia Schwant.

- D.K.G. (1925/26) 185; D.K.G. (1927/28) 105, 351; Gw. (1928) 644; D.K.G. (1929) 17; D.K.G. (1929) 35; v.P.M. 35; A. 220.
Corpuscularia cymbiformis (Haw.) Schwant. (*Mes. cymbiforme* Haw.). — D.K.G. (1925/26) 186.
Corp. dolomitica Schwant. = *Ruschia dolomitica* Dtr. et Schwant.
Corp. Lehmannii (Eckl. et Zeyh.) Schwant. — (*Mes. Lehmannii* Eckl. et Zeyh., *Mes. sexpartitum* N.E.Br., *Schoenlandia Lehmannii* L.Bol.). — Uitenhage Divis., nahe des Swartkop River, Karroo. — N.E.Br. M. 105 (*Mes.*); D.K.G. (1925/26) 186; Fl.Pl. VII. Pl. 259; D.K.G. (1927/28) 105; D.K.G. (1929) 17.
Corp. molle Schwant. = *Ruschia molle* Schwant.
Corp. perdiantha Tisch. = *Nelia Schlechteri* Schwant.
Corp. quarziticum Schwant. = *Ruschia quarzitica* Dtr. et Schwant.
Corp. Taylora Schwant. = *Delosperma Taylora* L.Bol.
Corp. Thunbergii Schwant. = *Hymenocyclus Thunbergii* L.Bol.

Crocanthus L.Bol.

- Fl.Pl. VII. Pl. 255; v.P.M. 35; A. 220.
Crocanthus croceus L.Bol. = *Hymenocyclus croceus* Schwant.
Croc. luteolus L.Bol. = *Hymenocyclus luteolus* Schwant.
Croc. purpureo-croceus L.Bol. = *Hymenocyclus purpureo-croceus* L.Bol.
Croc. Thunbergii L.Bol. = *Hymenocyclus Thunbergii* L.Bol.

***Cryophytum* N.E.Br.**

- G.C. (1925, II) 412; P.G.S.A.P. 245; G.C. (1928, II) 128; v.P.M. 35; A. 214.
- Cryophytum acuminatum*** L.Bol. — Kapl. zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 54.**
- Cryoph. Aitonis*** (Jacq.) N.E.Br. — (*Mes. Aitonis* Jacq., *Mes. angulatum* Thbg., *Mes. Volckameri* Haw., *Mes. lanceolatum* Haw. einschl. vars., *Mes. crystalloplanes* Eckl. et Zeyh., *Cryoph. angulatum* Schwant.). — Uitenhage Divis., Zwartkop River; Albany Divis., nahe Grahamstown; Cradock Divis., nahe Mortimer. — B.M.P. 36 (*Mes. Ait.*); Gfl. (1928) 68 (*Cr. ang.*); G.C. (1928, II) 128.
- Cryoph. alatum*** L.Bol. — Piquetberg Divis., bei St. Helena Bay. — **L.B. II. 37.**
- Cryoph. alcalifugum*** Dtr. — (*Mes. alcalifugum* Dtr.). — Sw.-Afr., Gr. Tigerberg. — D.S. I. 64 (*Mes. alc.*); F.R. XXXVI. 13.
- Cryoph. angulatum* (Thbg.) Schwant. = ***Cryoph. Aitonis*** N.E.Br.
- Cryoph. arenarium*** N.E.Br. — Gr.-Namaland, Kl.-Karas-Berge, zwischen Naais und Kl.-Karasberg; Orange-Fluß. — G.C. (1928, II) 192.
- Cryoph. aureum*** L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein, zwischen Laingsburg und Matjesfontein, Whitehill. — **L.B. II. 32.**
- Cryoph. Barklyi*** N.E.Br. — (*Mes. Barklyi* N.E.Br., *Mes. Barklyi* var. *obtusifolium* L.Bol., *Platythyra Barklyi* Schwant.). — Kl.-Namaland, Richtersveld, Hondeklip Bay zwischen Holgat und Witbank. — A.B.H. IV. 79 (*Mes. Barkl.*); L.B. I. 107; Gfl. (1928) 68 (*Platythyra Barkl.*); S.G. (1928) 83; G.C. (1928, II) 211.
- Cryoph. Bijliae*** N.E.Br. — Mosselbay Divis., nahe Great Brak River. — G.C. (1929, I) 84.
- Cryoph. Burchellii*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. sessiliflorum* var. *album* Haw.). — Graaf Reinet Divis., beim Sundays River nahe Monkey Ford. — G.C. (1928, II) 128.
- Cryoph. calycinum*** L.Bol. — S.-Afr., zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 52.**
- Cryoph. carinatum*** L.Bol. — S.-Afr., zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 52.**
- Cryoph. clandestinum* L.Bol. = ***Cryoph. conjectum*** N.E.Br.
- Cryoph. clandestinum*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. clandestinum* Haw., *Mes. alsinifolium* Don.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — G.C. (1928, II) 128.
- Cryoph. clavatum* L.Bol. = ***Eurystigma clavatum*** L.Bol.
- Cryoph. cleistum*** L.Bol. — Laingsburg Divis., Whitehill. — **L.B. II. 151.**
- Cryoph. conjectum*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Cryoph. clandestinum* L.Bol.) — Montagu-Divis., nahe Montagu. — G.C. (1928, II) 153.

- Cryoph. crassifolium*** L.Bol. — Sw.-Afr., Lüderitzbucht, Distrikt Ukasos bis Swakopmund. — S.G. (1928) 83, 84.
- Cryoph. crassifolium* L.Bol. in S.G. (1928) 83 = wahrscheinlich entweder *Cryoph. Fenchelii* N.E.Br. oder *Cryoph. grandifolium* N.E.Br. — G.C. (1928, II) 153.
- Cryoph. crassipes*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Zout-Fluß und Nieuwerust. — L.B. II. 162.
- Cryoph. crystallinum*** (L.) N.E.Br. — (*Mes. crystallinum* L., *Mes. glaciale* Haw., *Cryoph. crystallinum* Schwant.). — Sw.-Afr., an der Swakop-Mündung; Küstengebiete von Cape Divis. bis Uitenhage Divis.; an den Küsten des Mittelmeer-Gebietes und Kanarischen verschleppt und verwildert. — M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. cryst.*); P.G.S. A.Pl. 245; Gfl. (1928) 68; S.G. (1928) 83; G.C. (1928, II) 153; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Cryoph. crystallinum* Schwant. = ***Cryoph. crystallinum*** N.E.Br.
- Cryoph. Dejagerae*** L. Bol. — S.-Afr. bei Beaufort West. — L.B. II. 315.
- Cryoph. excavatum*** L.Bol. — (*Mes. excavatum* L.Bol.). — Cape Prov., Upper Reg., nahe Beaufort West. — A.B.H. III. 133 (*Mes. exc.*); L.B. II. 32.
- Cryoph. Fenchelii*** (Schinz) N.E.Br. — (*Mes. Fenchelii* Schinz.). — Gr.-Namaland, östl. Keetmanshoop, Tsoachaub, Usakos. — F.R. XIX. 189; G.C. (1928, II) 153.
- Cryoph. Framesii*** L.Bol. — S.-Afr., bei Clanwilliam. — L.B. II. 31.
- Cryoph. Framesii*** L.Bol. var. *laxum* L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Touws River. — L.B. II. 38.
- Cryoph. Fulleri*** L.Bol. — Kenhardt Divis., 5 miles südl. von Kakamas. — L.B. II. 301.
- Cryoph. Galpinii*** L.Bol. — Calvinia Divis., Hügel bei Nieuwoudtville. — L.B. II. 231.
- Cryoph. gariusianum*** Dtr. (*Mes. gariusianum* Dtr.). — Sw.-Afr., Lichtenfels. — F.R. XXXVI. 14 (*Mes. gar.*).
- Cryoph. gibbosum*** (L.) N.E.Br. — (*Mes. nodiflorum* L., *Cryoph. nodiflorum* L.Bol.). — S.-Eur., N.-Afr., Arabien, Persien, Baluchistan, Kurdistan, Madeira, Kanar. Inseln; Kl.-Namaland, bei Valle Kraal; Van Rhynsdorp Divis., Eenkokerboom; Piquetberg Divis., Eendekuil; Cape Peninsula, Possession Ins.; Kalifornien. — L.B. I. 131 (*Cryoph. nod.*); S.G. (1928) 84 (*Cryoph. nod.*); G.C. (1928, II) 212 (*Cryoph. nod.*); G.C. (1929, I) 84.
- Cryoph. grandifolium*** (Schinz) Dtr. et Schwant. — (*Mes. grandifolium* Schinz, *Cryoph. grandifolium* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, Rehoboth. — D.B.F. XIX. 126 (*Mes. grandifol.*); Gfl. (1928) 68; G.C. (1928, II) 153; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Cryoph. grandifolium* N.E.Br. = ***Cryoph. grandifolium*** Dtr. et Schwant.

- Cryoph. grandiflorum*** (Eckl. et Zeyh.) N.E.Br. (*Mes crystallinum* L. var. *grandiflorum* Eckl. et Zeyh.). — Prince Albert Divis., nahe Albert Kraal; Riversdale Divis., gemein im ganzen Distrikt; Orange River Reg. — G.C. (1928, II) 153; L.B. II. 164.
- Cryoph. Gurichianum*** Schwant. = ***Amoemophyllum Gurichianum*** N.E.Br.
- Cryoph. inachabense*** N.E.Br. = ***Callistigma inachabensis*** Schwant.
- Cryoph. intermedium*** L.Bol. — Worcester Divis., Hex River bei De Doorns, Hex River Pass bei Oaplaats. — L.B. II. 53.
- Cryoph. karroicum*** L.Bol. — Cradock Divis. — L.B. II. 55.
- Cryoph. latiseptum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Hondeklip Bay. — L.B. II. 163.
- Cryoph. lineare*** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 165.
- Cryoph. longipapillatum*** L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Kenhardt. — L.B. II. 38.
- Cryoph. Maxwellii*** L.Bol. — Ladismith Divis., zwischen Ladismith und Laingsburg. — L.B. I. 141; SG. (1928) 84; G.C. (1928, II) 212; L.B. II. 164.
- Cryoph. nanum*** N.E.Br. — Malmesbury Divis., Region der Saldanha Bay. — G.C. (1929, I) 84.
- Cryoph. neglectum*** N.E.Br. — Worcester Divis., nahe Worcester. — G.C. (1928, II) 212.
- Cryoph. Nelsoniae*** L.Bol. — Ceres Divis. — L.B. II. 32.
- Cryoph. nodiflorum*** L.Bol. = ***Cryoph. gibbosum*** N.E.Br.
- Cryoph. parvum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — L.B. II. 98.
- Cryoph. paulum*** N.E.Br. — Riversdale Divis., in grasigen Wiesen nahe des Vet River (Fluß). — G.C. (1928, II) 211.
- Cryoph. pentagonum*** L.Bol. — Ladismith Divis., zwischen Touw's River und Ladismith. — L.B. II. 228.
- Cryoph. planum*** L.Bol. — Caledon Divis., zwischen Caledon und Genadendal. — L.B. II. 15.
- Cryoph. pusillum*** L.Bol. — Ceres Divis., zwischen Matjesfontein und Karroo Poort. — L.B. II. 152.
- Cryoph. Rogersii*** L.Bol. — Oudthoorn Divis., in einem trockenen Tal bei Cango bei Zebra Siding. — L.B. I. 142; S.G. (1928) 84; G.C. (1928, II) 212.
- Cryoph. roseum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — L.B. II. 38.
- Cryoph. Salteri*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Viol's Drift, Orange-Fluß. — L.B. II. 316.
- Cryoph. sessiliflorum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Nieuwe-rust. — L.B. II. 165.
- Cryoph. sessiliflorum*** N.E.Br. = ***Micropterum sessiliflorum*** Schwant.

Cryoph. setosum L.Bol. — Zwischen Klaver und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 53.

Cryoph. squamulosum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Van Rhynsdorp. — L.B. II. 71.

Cryoph. stenandrum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 36.

Cryoph. subulatum L.Bol. — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtville. — L.B. II. 229.

Cryoph. suffruticosum L.Bol. — Malmesbury Divis., 1 mile nördl. Moorreesburg. — L.B. II. 230.

Cryoph. truncatum L.Bol. — Kl.-Karoo, zwischen Garcia's Paß und Barrydale. — L.B. II. 164.

Cryoph. velutinum L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Nieuwerust. — L.B. II. 166.

Cryoph. Wilmaniae L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt, aber wahrscheinlich von De Aar. — S.G. (1928) 84; G.C. (1928, II) 212.

***Cylindrophyllum* Schwant.**

D.K.G. (1927/28) 15, 28, 106; v.P.M. 36; A. 220.

Cylindrophyllum calamiforme (L.) Schwant. — (*Mes. calamiforme* L.). — S.-Afr. — B.M.P. 225 (*Mes. calam.*); D.K.G. (1927/28) 28, 106.

Cyl. Comptonii L.Bol. — Kl.-Karoo, bei Ladismith. — L.B. II. 316.

Cyl. Dyeri L.Bol. — Jansenville Divis., ca. 25 miles von Kendrew am Jansenville-Weg. — L.B. II. 166.

Cyl. dichroum Schwant. = ***Ruschia dichroa*** L.Bol.

Cyl. obsubulatum (Haw.) Schwant. — (*Mes. obsubulatum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 226 (*Mes. obsub.*); D.K.G. (1927/28) 28.

Cyl. Tugwelliae L.Bol. — S.-Afr., nahe Prince Albert, Laingsburg Divis., bei Whitehill. — S.G. (1930) 121; L.B. II. 179.

***Dactyloopsis* N.E.Br.**

Dactyloopsis digitata (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. digitatum* Ait., *Mes. digitiforme* Thbg., *Gibbaeum digitiforme* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., Knegsvlakte bei Van Rhynsdorp. — Tr.R.S. I. 407 (*Mes. digit.*); Fl.Pl. III 102 (*Mes. digit.*); P.G.S.A.P. 244 (*Mes. digit.*); G.C. (1928, I) 339; M. 202; S.G. (1930) 79; F.R. XXXVI. 15 (*Gibbaeum digitiforme* [Thbg.] N.R.Br.); Fl.Pl. II. 405. N.E. Brown scheint in G.C. (1928, I) 339 übersehen zu haben, daß *Gibb. digitiforme* als Synonym hierher zu stellen ist.

***Deilanthus* N.E.Br.**

G.C. (1930, II) 278; G.C. (1931, I) 259; v.P.M. 36; A. 214.

Deilanthus Peersii (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. canum* [Haw.] Bgr., *Nananthus Peersii* L.Bol., *Aloinopsis Peersii* L.Bol., *Nananthus*

Soehlemannii Hgr.jr.). — Cape Prov., Karroo Reg., nahe Miller, nahe Willowmoore; Laingburg Divis., nahe Matjesfontein; Prince Albert Divis., Karroo, nahe Klaarstrom. — B.M.P. 279 (*Mes. canum* Haw.; es erscheint sehr zweifelhaft, ob diese von Berger angegebene Beschreibung mit der von Haworth übereinstimmt!); A.B.H. IV. 104 (*Nananthus Peersii*); S.G. (1929) 245, 288 (*Aloin. Peersii*); G.C. (1931, I) 259; D.K.G. (1937) 163 (*Nan. Soehlem.*); F.R. XLIII. 227.

Delosperma N.E.Br.

G.C. (1925, II) 412; M.Fl.Pl. 1. 157; M.D.G.Ztg. (1927) 234; v.P.M. 36; A. 214.

Delosperma aberdeenense L.Bol. — (*Mes. aberdeenense* L.Bol.). — Karroo Reg., Aberdeen Road. — A.B.H. III. 171 (*Mes. aberd.*); L.B. I. 135.

Del. aberdeenense N.E.Br. in S. (1930) 209 ist Schreibfehler und muß heißen *Del. aberdeenense* L.Bol.

Del. abyssinicum (Rgl.) Schwant. — (*Mes. abyssinicum* Rgl.). — Abessinien, Distr. Urahut: Eritraea, Plateau von Kohaito. — B.M.P. 76 (*Mes. abyss.*); Gfl. (1928) 69.

Del. acuminatum L.Bol. — Albany Divis., nahe Granhamstown. — L.B. I. 143.

Del. aereum L.Bol. — (*Mes. aereum* L.Bol.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 13 (*Mes. aereum*); L.B. I. 135.

Del. aereum L.Bol. var. *album* L.Bol. — (*Mes. aereum* L.Bol. var. *album* L.Bol.). — A.B.H. IV. 13 (*Mes. aer. v. alb.*).

Del. Albert Krejci hybr. — (*Delosperma Steytlerae* × ?). — J.C.S. VI. 152.

Del. Algoense L.Bol. — Uitenhage Divis., bei Port Elizabeth. — L.B. II. 57.

Del. alticolum L.Bol. — Natal, Drakensberg, Cathkin Peak. — L.B. II. 383.

Del. annulare L.Bol. — Transvaal, bei Dulstroom. — L.B. II. 385.

Del. Ashtonii L.Bol. — Besutoland. — L.B. II. 317.

Del. brerispetalum L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown. — L.B. II. 152.

Del. brerisepalum L.Bol. — S.-Afr., Somerset East. — L.B. II. 169.

Del. Britteniae L.Bol. — Albany Divis., Felsen zwischen Hamilton Reservoir und Bay Road, nahe Grahamstown. — L.B. II. 24.

Del. Brunnthaleri (Bgr.) Schwant. — (*Mes. Brunnthaleri* Bgr.). — S.-Afr. — Parey's Blumengärtnerei Bd. I. 533 (*Mes. Brunnth.*); J.S. 120; J.S.Pl. 163.

Del. Burtoniae L.Bol. — Cape Prov., genauer Standort unbekannt. — L.B. I. 142.

- Del. caespitosum* L.Bol. — Kentani Divis., Transkei, Qolora-Fluß-Mündung. — **L.B. II. 167.**
- Del. caespitosum* L.Bol. var. *roseum* L.Bol. — **L.B. II. 168.**
- Del. calycinum* L.Bol. — Albany Divis., nahe Grahamstown, 9 bis 10 miles längs des Pigget Bridge-Weg. — **L.B. I. 142.**
- Del. carolinense* N.E.Br. — Transvaal, Carolina, in Felsspalten. — **M.Fl.Pl. I. 158.**
- Del. Carterae* L.Bol. — S.-Afr., bei Kingwilliamstown. — **L.B. II. 478.**
- Del. concavum* L.Bol. — S.-Afr., zwischen Graaff Reinet und Mount Stewart. — **L.B. II. 340.**
- Del. Cooperi* (Hook. f.) L.Bol. — (*Mes. Cooperi* Hook. f., *Delosp. Cooperi* Schwant.). — S.-Afr. — B.M.P. 76 (*Mes. Coop.*); Fl.Pl. VII. Pl. 261; Gfl. (1928) 69; L.B. I. 142; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224
- Del. Cooperi* (Hook. f.) L.Bol. var. *bicolor* L.Bol. — Orange Free State, Ladybrand. — **L.B. I. 142.**
- Del. Cooperi* Schwant. = *Delosperma Cooperi* L.Bol.
- Del. crassuloides* (Haw.) L.Bol. — (*Mes. crassuloides* Haw., *Mes. crassulinum* D.C.). — S.-Afr., nahe Grahamstown, Mountain Drive, nahe Dassie Krantz. — **L.B. I. 135; L.B. II. 153.**
- Del. crassum* L.Bol. — (*Drosanthemum robustum* L.Bol.). — S.-Afr., Van Rhynsdorp Divis. — **L.B. II. 10** (*Dros. rob.*); **L.B. II. 169.**
- Del. Davyi* N.E.Br. — Transvaal, in Felsen am Klip River, bei Farm Kookfontein. — **M.Fl.Pl. I. 158.**
- Del. denticulatum* L.Bol. — Transvaal, Barberton Divis. — **L.B. II. 383.**
- Del. dunense* L.Bol. — East London Divis., Kaysers Beach. — **L.B. II. 36.**
- Del. Dyeri* L.Bol. — Alice Divis., Berge, nahe Hogsback. — **L.B. I. 135.**
- Del. Dyeri* L.Bol. var. *laxum* L.Bol. — S.-Afr., bei Tarkastadt. — **L.B. II. 25.**
- Del. echinatum* (Ait.) Schwant. — (*Mes. echinatum* Ait., *Trichodiadema echinatum* L.Bol.). — S.-Afr., am Zwartkop-Fluß, am Gauritz-Fluß. — B.M.P. 77 (*Mes. ech.*); M.D.G.Ztg. (1927) 258; S.G. (1930) 18 (*Trichodiadema echinatum* L.Bol. ist ein Irrtum!); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 226.
- Del. Ecklonis* L.Bol. = *Del. Ecklonis* Schwant.
- Del. Ecklonis* (Salm.) Schwant. — (*Mes. Ecklonis* Salm, *Del. Ecklonis* L.Bol.). — S.-Afr., am Zwartkop-Fluß. — B.M.P. 103 (*Mes. Eckl.*); M.D.G.Ztg. (1927) 258; L.B. I. 135; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Del. Edwardsiae* L.Bol. — S.-Afr., Pondoland Divis., Port St. John. — **L.B. II. 63.**
- Del. erectum* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. II. 420.**

- Del. floribundum* L.Bol. — Orange Free State, nahe Smithfield. — L.B. I. 135; S.G. (1928) 16.
- Del. Framesii* L.Bol. — Transvaal, bei Johannesburg. — L.B. II. 67.
- Del. frutescens* L.Bol. — S.-Afr., Albany Divis., Puto's Tal, 3—4 miles nördl. Botha's Hill. — L.B. II. 39.
- Del. Galpinii* L.Bol. — Natal, Nottingham Road (Weg). — L.B. II. 380.
- Del. Gerstneri* L.Bol. — Basutoland, bei Mafeteng. — L.B. II. 441.
- Del. grandiflorum* L.Bol. — S.-Afr., Clanwilliam Divis., bei Biesiesfontein, zwischen Pakhuis und Oumuur. — L.B. II. 421.
- Del. Grantiae* L.Bol. — S.-Afr., Alice Divis., Hogsback-Berge. — L.B. II. 42.
- Del. Gratiae* L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown. — L.B. II. 317.
- Del. herbeum* N.E.Br. — (*Mes. herbeum* N.E.Br.). — Transvaal, nahe Johannesburg. — N.E.Br.M. 108 (*Mes. herbeum*); M.Fl.Pl. I. 159.
- Del. hirtum* L.Bol. = *Del. hirtum* Schwant.
- Del. hirtum* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. hirtum* N.E.Br., *Del. hirtum* L.Bol.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; L.B. II. 269; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Del. Hollandii* L.Bol. — Uitenhage Divis., bei Despatch. — L.B. II. 40.
- Del. imbricatum* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt, wahrscheinlich Albany Divis. — L.B. II. 168.
- Del. incomptum* L.Bol. var. *gracile* L.Bol. — Queenstown Divis. — L.B. I. 142.
- Del. inconspicuum* L.Bol. — Knysna Distr., nahe Belvidere. — L.B. I. 152.
- Del. intonsum* L.Bol. — Fraserburg Divis., bei Fraserburg Road. — L.B. II. 318.
- Del. Jansei* N.E.Br. — Transvaal, Saddlebock Mountains. — M.Fl.Pl. I. 158.
- Del. karroicum* L.Bol. — S.-Afr., bei Graaff Reinet, in Schattenlagen des Tales von Desolation. — L.B. II. 340.
- Del. katbergense* L.Bol. — Stutterheim Divis., Katberg. — L.B. II. 25.
- Del. katbergense* L.Bol. var. *amatolense* L.Bol. — King Williamstown Divis., zwischen Felsen, Kincardine, Amatola Mountains. — L.B. II. 355.
- Del. katbergense* L.Bol. var. *angustifolia* L.Bol. — Stutterheim Divis., Katberg. — L.B. II. 25.
- Del. klinghardianum* (Dtr.) Schwant. — (*Mes. klinghardianum* Dtr.). — Gr.-Namaland, Klinghardtgebirge. — D.B.F. XIX. 131 (*Mes. klingh.*); Gfl. (1928) 69.
- Del. Larisiae* L.Bol. — Kalahari Reg., Orange Free State, ca. 6 miles von Fouriesburg. — J.B. (1928) 12.

- Del. laxipetala** L.Bol. — Albany Divis., Pluto's Vale (Tal), Grahams-town. — **L.B. II. 66.**
- Del. Leendertziae** N.E.Br. — Transvaal, felsige Hügel bei Witpoortje Kloof, Canada, Heidelberg. — **M.Fl.Pl. I. 158.**
- Del. lineare** L.Bol. — **L.B. II. 170.**
- Del. lineare** L.Bol. var. **tenuifolium** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. II. 384.**
- Del. Linneae** L.Bol. — Basutoland. — **L.B. I. 143.**
- Del. litorale** (Kensit) L.Bol. — (*Mes. litorale* Kensit.). — S.-Afr., Mossel Bay, an der Küste nahe der Stadt; KI.-Namaland, nahe Mierkraal. — **Tr.R.S. I. 153** (*Mes. lit.*); **F.R. XII. 323** (*Mes. lit.*); **L.B. I. 135.**
- Del. Longii** L.Bol. — Uitenhage Divis., bei Port Elizabeth, gemein am Cape Road (Weg) und Korsten Hill-Gebiet. — **L.B. III. 96.**
- Del. longipes** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Koudeberg, bei Wupperthal, Bidouw Berg, Agtertuin. — **L.B. II. 62.**
- Del. Luckhoffii** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. II. 41.**
- Del. luteum** L.Bol. — Albany Divis., First River Valley, zwischen Pluto's Valley (Tal) und Committees. — **L.B. II. 387.**
- Del. macellum** N.E.Br. — (*Mes. macellum* N.E.Br.). — Transvaal, Houtkop, nahe Vereeniging. — **G.C. (1921, I) 138** (*Mes. macellum*); **M.Fl.Pl. I. 159.**
- Del. macrorrhizum** (Haw.) Schwant. — (*Mes. macrorrhizum* Haw., auch Don.). — S.-Afr., wahrscheinlich Lion Mountains nahe Cape Town. — **N.E.Br.M. 121** (*Mes. macr.*); **M.D.G.Ztg. (1927) 258.**
- Del. macrostigma** L.Bol. — Swellendam Divis., Southey's Paß. — **L.B. II. 180.**
- Del. Mahonii** N.E.Br. — (*Mes. Mahonii* N.E.Br.). — S. Rhodesia, bei Melsetter. — **B.M.P. 74** (*Mes. Mahonii*); **M.Fl.Pl. I. 158.**
- Del. Mariae** L.Bol. — Bredasdorp Divis., Struis Bay, bei Kap Agulhas. — **L.B. II. 245.**
- Del. Maxwellii** L.Bol. — Willowmoore Divis. — **L.B. II. 89.**
- Del. Muiri** L.Bol. — S.-Afr., bei East London. — **L.B. II. 479.**
- Del. multiflorum** L.Bol. — Humansdorp Distr., Gamtoos-Fluß, nahe Hankey. — **L.B. I. 151.**
- Del. napiforme** (D.C.) Schwant. — (*Mes. macrorrhizum* D.C., *Mes. napiforme* N.E.Br.). — Island of Bourbon. — **N.E.Br.M. 110** (*Mes. napif.*); **N.E.Br.M. 121**; **M.D.G.Ztg. (1927) 258.**
- Del. Neethlingiae** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Neethlingiae* L.Bol.). — Cape Prov., South Western Reg., Caledon Divis., nahe der Stadt, Fluß Zondereinde; Riversdale Divis., genauer Standort unbekannt. — **A.B.H. IV. 99** (*Mes. Neeth.*); **D.K.G. (1927/28) 106.**
- Del. obtusum** L.Bol. — Orange Free State, Marquard. — **L.B. II. 388.**
- Del. pachyrhizum** L.Bol. — Zululand, Lebombo Flats. — **L.B. II. 381.**

- Del. pallidum* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 246.
- Del. parviflorum* L.Bol. — Uitenhage Divis., Despatch. — J.B. (1928) 230.
- Del. Patersoniae* L.Bol. — (*Mes. Petersoniae* L.Bol.). — Cape Prov., South Western Reg., Uitenhage Divis., Schoenmaker's Kop, nahe Port Elizabeth. — A.B.H. II. 30 (*Mes. Paters.*); L.B. I. 135.
- Del. Peglerae* L.Bol. — S.-Afr., Kentami Divis., Transkei. — L.B. II. 65.
- Del. pergamentaceum* L.Bol. — Kl.-Namaland. Hügel 1 mile westl. Arris Drift. — Fl.Pl. VII. Pl. 278.
- Del. platysepalum* L.Bol. — Albany Divis., Fort Brown. — L.B. II. 56.
- Del. Pontii* L.Bol. — Orange Free State, bei Kroonstadt. — L.B. II. 247.
- Del. Pottsii* L.Bol. — (*Mes. Pottsii* L.Bol.). — Kalahari Reg., Orange Free State, nahe Bloemfontein, Eegle's Nest. — A.B.H. IV. 13 (*Mes. Pottsii*); L.B. I. 135.
- Del. prasinum* L.Bol. — S.-Afr., bei Alexandria. — L.B. II. 385.
- Del. repens* L.Bol. — Transkei, bei Maclear. — L.B. II. 421.
- Del. robustum* L.Bol. — Albany Divis.? — L.B. I. 134; S.G. (1928) 16.
- Del. Rogersii* L.Bol. var. *glabrescens* L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown, südl. Abhänge der Berge im Felschatten. — L.B. II. 180.
- Del. scabripes* L.Bol. — S.-Afr., Transkei, bei Maclear. — L.B. II. 388.
- Del. Smythae* L.Bol. — Natal, Nottingham Road (Weg). — L.B. II. 41.
- Del. stenandrum* L.Bol. — Pondoland Divis., nahe Umtata. — L.B. I. 152.
- Del. Steytlerae* L.Bol. — Rhodesia, nahe Zimbabwe. — L.B. I. 135; S.G. (1928) 16.
- Del. subclaratum* L.Bol. — Bedford Divis., an der Wegseite zwischen Grahamstown und Bedford in karroider Vegetation. — L.B. II. 196.
- Del. subincanum* L.Bol. = *Del. subincanum* Schwant.
- Del. subincanum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. subincanum* Haw., *Delosp. subincanum* L.Bol.). — S.-Afr. — M.D.G.Ztg. (1927) 258; L.B. I. 135; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Del. subpetiolatum* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 168.
- Del. sulcatum* L.Bol. — S.-Afr., bei Alexandria. — L.B. II. 341.
- Del. Sutherlandii* (Hook.f.) N.E.Br. (*Mes. Sutherlandii* Hook.f.). — S.-Afr. — M.Fl.Pl. I. 158; M.D.G.Ztg. (1927) 234; M.J.B.H. 163.
- Del. Taylora* (N.E.Br.) L.Bol. — (*Mes. Taylora* N.E.Br., *Corpuscularia Taylora* Schwant.). — S.-Afr. — D.K.G. (1925/26) 186 (*Corp. Taylora*); D.K.G. (1929) 17 (*Corp. Tayl.*); L.B. II. 67.
- Del. Taylora* (N.E.Br.) L.Bol. var. *albanense* L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown, am Gipfel des Queens Road (Weg). — L.B. II. 67.

Del. testaceum L.Bol. = *Del. testaceum* Schwant.

Del. testaceum (Haw.) Schwant. — (*Mes. testaceum* Haw., *Delosp. testaceum* L.Bol.). — S.-Afr., zwischen Vaal River (Fluß) und Graaff Reinet. — N.E.Br.M. 136 (*Mes. test.*); M.D.G.Ztg. (1927) 258; L.B. I. 135 (siehe auch die dortige Fußnote!); D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.

Del. tradescantioides (Bgr.) L.Bol. — (*Mes. tradescantioides* Bgr., *Mes. Flanaganii* Kensit). — Östl. S.-Afr., Komgha Divis., nahe Komgha; Qolora Tal in Kentani Divis.; Natal; Upper Sand River (Fluß), Lydenberg Divis.; Transvaal; Maputaland. — Fl.Pl. VII. Pl. 261.

Del. tradescantioides (Bgr.) L.Bol. var. *lebomboense* L.Bol. — Zululand, Lebombo-Ebene. — L.B. II. 382.

Del. tuberosum L.Bol. = *Del. tuberosum* Schwant.

Del. tuberosum (L.) Schwant. — (*Mes. tuberosum* L., *Delosp. tuberosum* L.Bol.). — Östl. Zentral-Karasberge, Granithügel Narudas-Süd, Abhänge südwestl. Krai-Kluft. — A.B.H. I. 18 (*Mes. tub.*); M.D.G.Ztg. (1927) 258; L.B. I. 135; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.

Del. uitenhagense L.Bol. — S.-Afr., bei Uitenhage. — L.B. II. 89.

Del. uncinatum L.Bol. — Uitenhage Divis., Red House. — L.B. II. 65.

Del. uniflorum L.Bol. — S.-Afr., Peddie Divis.?, Keiskama River. — L.B. II. 342.

Del. velutinum L.Bol. — Natal, Krantzkop. — L.B. II. 39.

Del. verekundum L.Bol. — Albany Div., bei Grahamstown. — L.B. II. 64.

Del. vernicolor L.Bol. — S.-Afr., bei Alexandria. — L.B. II. 381.

Del. versicolor L.Bol. — Bedford Divis., zwischen Grahamstown und Bedford. — L.B. II. 386.

Del. vinaceum L.Bol. — (*Mes. vinaceum* L.Bol.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 14 (*Mes. vinac.*); L.B. I. 135.

Del. virens L.Bol. — Riversdale Divis., in den Dünen-Kalksteinen bei Melkfontein am Gauritz River (Fluß). — L.B. I. 106; S.G. (1928) 16.

Del. Vogtsii L.Bol. — Transvaal, Megalisbergen bei Pretoria. — L.B. II. 301.

Del. Wethamae L.Bol. — Orange Free State, bei Cuntree. — L.B. II. 170.

Del. zeederbergensis L.Bol. — Transvaal, Spekboom Road (Weg), bei Lydenburg. — L.B. II. 422.

Del. Zoeae L.Bol. — Kimberley Divis., Kalkdrift, bei Modder River Station. — L.B. II. 479.

Depacarpus M.E.Br.

G.C. (1930. I) 71; v.P.M. 37; A. 214.

Depacarpus tinctus (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. tinctum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Fl.Pl. VII. Pl. 271 (*Mes. tinct.*); D.K.G. (1930. I) 31.

***Derenbergia* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 137; v.P.M. 37.

Derenbergia apiala Schwant. = *Conophytum apiatum* N.E.Br.*Derenb. augeiformis* Schwant. = *Conophytum gracilistylum* N.E.Br.*Derenb. biloba* Schwant. = *Conophytum bilobum* N.E.Br.*Derenb. caulifera* Schwant. = *Conophytum cauliferum* N.E.Br.*Derenb. Chauviniae* Schwant. = *Conophytum gracilistylum* N.E.Br.*Derenb. cryptopodia* Schwant. = *Gibbaeum cryptopodium* L.Bol.*Derenb. densipuncta* Tisch. = *Conophytum densipunctum* L.Bol.*Derenb. Elishae* Schwant. = *Conophytum Elishae* N.E.Br.*Derenb. Friedrichiae* Schwant. = *Ophthalmophyllum Friedrichiae*

Dtr. et Schwant.

Derenb. gracilistyla Schwant. = *Conophytum gracilistylum* N.E.Br.*Derenb. halenbergensis* Schwant. = *Conophytum halenbergense*
N.E.Br.*Derenb. nuciformis* Schwant. = *Gibbaeum cryptopodium* L. Bol.*Derenb. quaesita* Schwant. = *Conophytum quaesitum* N.E.Br.*Derenb. saxetana* Schwant. = *Conophytum saxetanum* N.E.Br.*Derenb. turrigera* Schwant. = *Conophytum turrigerum* N.E.Br.*Derenb. velutinum* Schwant. = *Conophytum velutinum* Schwant.***Derenbergiella* Schwant.**

Gw. (1928) 599; v.P.M. 37; A. 220.

Derenbergiella Luisae Schwant. — Kl.-Namaland, Alexanderberg.
— Gw. (1928) 599.

Diese Art ist, wie Prof. Schwantes noch während der Drucklegung mitteilt, hinsichtlich der Form von allen bekannten Gattungen abweichend, nach dem Blütenbau jedoch in die Gattung *Cryophytum* einzugliedern, worauf Dr. N.E. Brown bereits hingewiesen hat.

***Dicrocaulon* N.E.Br.**J.B. (1928) 141; S.G. (1929) 353; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 37;
A. 214.*Dicrocaulon brevifolium* N.E.Br. — S.-Afr., 21 miles nördl. von
Van Rhynsdorp. — S.G. (1929) 353.*Dicr. Pearsonii* N.E.Br. — G.C. (1930, I) 71.***Didymaotus* N.E.Br.**G.C. (1925, II) 433; G.C. (1926, II) 149; S. (1929) 26; v.P.M. 38;
A. 214.*Didymaotus lapidiformis* (Marl.) N.E.Br. — (*Mes. lapidiforme*
Marl.). — S.-Afr., Bokkeveld Karroo, nördl. und nordöstl. von

Karroopoort; Ceres Karroo. — **Tr.R.S. IV. 137** (*Mes. lap.*); D.K.G. (1923/24) 6 (*Mes. lap.*); G.C. (1926, II) 149; L.B. I, 43; S. (1929) 27; S.G. (1929) 221; M. 204.

***Dinteranthus* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 184; D.K.G. (1927/28) 30, 105, 226; M.D.G.Ztg. (1927) 223; G.C. (1928, II) 472; v.P.M. 33; A. 214; L.B. III. 71.

Dinteranthus subgenus Lapidaria Dtr. et Schwant. = ***Lapidaria* Schwant.**

***Dint. inexpectatus* Dtr. — (*Mes. inexpectatum* Dtr.). — D.K.G. (1925/26) 184; D.K.G. (1927/28) 30; L.B. III. 73.**

Dint. microsperma* (Dtr. et Derenbg.) Schwant. — (*Mes. microspermum* Dtr. et Derenbg., *Rimaria microsperma* N.E.Br.). — Gr.- und Kl.-Namaland, 12 miles südl. Warmbad; Bushmanland. — **D.K.G. (1925/26) 264 (*Mes. micr.*); D.K.G. (1925/26) 184; G.C. (1927, I) 85 (*Rim. micr.*); D.K.G. (1927/28) 105; G.C. (1928, II) 472; S.G. (1929) 288; L.B. III. 70.*

Dint. Margaretae Schwant. = ***Lapidaria Margaretae* Schwant.**

Dint. Pole Evansii* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. Pole Evansii* N.E.Br., *Rimaria Pole Evansii* N.E.Br.). — Kl.-Karoo in Prieska Divis. und Ladysmith Divis. — **N.E.Br.M. 90 (*Mes. Pole Evansii*); D.K.G. (1925/26) 184; G.C. (1926, I) 156 (*Rim. Pole Evansii*); G.C. (1928, II) 472; M. 207; D.K.G. (1934) 54; L.B. III. 74.*

***Dint. puberulus* N.E.Br. — Kl.-Namaland. — G.C. (1928, II) 472; M. 208; L.B. III. 73.**

***Dint. punctatus* L.Bol. — Bushmanland, Pofadder. — L.B. II. 67. — (Nach Herre in K.Kd. [1934] 54 identisch mit *Dint. puberulus* N.E.Br.).**

***Diplosoma* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 179; D.K.G. (1927/28) 105; G.C. (1928, I) 251; v.P.M. 38; A. 214.

***Diplosoma Leipoldtii* L.Bol. — Piquetberg Divis., zwischen Eendekuil und Grey's Paß. — S.G. (1927) 238; L.B. I. 128; G.C. (1928, I) 251.**

Diplosoma Leipoldtii L.Bol. forma *dormiens* = ***Mitrophyllum nanum* N.E.Br.**

***Diplosoma retroversum* (Kensit) Schwant. — (*Mes. retroversum* Kensit.). — Piquetberg Divis., nahe Eendekuil, Grey's Paß. — F.R. XI. 476 (*Mes. retr.*); D.K.G. (1925/26) 179; D.K.G. (1927/28) 105; G.C. (1928, I) 251.**

***Disphyma* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 433; v.P.M. 39: A. 214.

***Disphyma australe* (Sol.) N.E.Br.** — (*Mes. australe* Sol.). — Australien, Küste von Sw.-Australien, New South Wales, Tasmanien, Neu-Seeland. Chatham-Inseln. — B.M.P. 206 (*Mes. austr.*); G.C. (1930, II) 14.

***Disphyma crassifolium* (L.) L.Bol.** — (*Mes. crassifolium* L.). — S.-Afr., sandige Stellen, Uylenkraal. — B.M.P. 206 (*Mes. crass.*); Fl.Pl. VII. Pl. 276.

***Disphyma Dunstonii* L.Bol.** — Caledon Divis. — L.B. II. 247.

***Dorotheanthus* Schwant.**

M.D.G.Ztg. (1927) 283; M.D.G.Ztg. (1928) 400; B.M.J. (1929) 57; v.P.M. 39; A. 214.

***Dorotheanthus apetalus* (L.f.) N.E.Br.** — (*Mes. apetalum* L.f., *Cleretum apetalum* N.E.Br., *Stigmatocarpum copticum* L.Bol., *Stigm. caducum* L.Bol., *Dorotheanthus copticus* L.Bol.). — S.-Afr. — S.G. (1927) 365; G.C. (1927, II) 228; M.D.G.Ztg. (1928) 400; L.B. I. 89, 132 (*Stigm. copt.*); L.B. I. 123 (*Dor. copt.*).

***Dor. bellidiformis* (Burm.) N.E.Br.** — (*Mes. bellidiformis* Burm., *Mes. criniflorum* L.f., *Mes. spathulatum* Willd., *Dorotheanthus criniflorus* Schwant., *Cleretum criniflorum* N.E.Br.). — S.-Afr., Cape Peninsula. — G.C. (1937, II) 228 (*Cleretum crinifl.*); M.D.G.Ztg. (1927) 283 (*Dor. crinifl.*); M.D.G.Ztg. (1928) 238 (*Cleretum crinifl.*); M.D.G.Ztg. (1928) 400 (*Dor. crinifl.*); B.M.J. (1929) 56; v.P.M. 39.

Dor. copticus L.Bol. = ***Dor. apetalus* N.E.Br.**

Dor. criniflorus Schwant. = ***Dor. bellidiformis* N.E.Br.**

***Dor. gramineus* (Haw.) Schwant.** — (*Mes. gramineum* Haw., *Mes. clavatum* Haw., *Mes. claviforme* D.C., *Mes. pyropaeum* Haw., *Mes. tricolor* Willd., *Cleretum gramineum* N.E.Br.). — Cape Peninsula. — M.D.G.Ztg. (1927) 283; G.C. (1927, II) 228 (*Cleretum gramineum*); M.D.G.Ztg. (1928) 238.

***Dor. gramineus* (Haw.) Schwant. var. *albus* (Haw.) Schwant.** — (*Mes. pyropaeum* var. *album* Haw., *Mes. apetalum* Thbg., *Mes. lineare* Thbg.). — D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

***Dor. gramineus* (Haw.) Schwant. var. *roseus* (Haw.) Schwant.** — (*Mes. pyropaeum* var. *roseum* Haw.). — D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

***Dor. luteus* N.E.Br.** — Khamiesberg. — M.D.G.Ztg. (1928) 400.

***Dracophilus* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 183; M.D.G.Ztg. (1927) 187; v.P.M. 39; A. 214.

***Dracophilus Delaetianus* (Dtr.) Dtr. et Schwant.** — (*Mes. Delaetianum* Dtr., *Juttadinteria Delaetianus* Dtr. et Schwant.). —

Gr.-Namaland, Kuckausberge, in ca. 1000 m Seehöhe, zwischen Kuckaus und Pockenbank. — D.K.G. (1925/26) 184 (*Jutt. Del.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187; M. 209; S. (1938) 26.

Dracoph. Montis Draconis (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Montis Draconis* Dtr., *Juttadinteria Montis Draconis* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, 5—6 km östl. Pomona, am Fuße des Drachenberges 18 km östl. Pomona; Kalkplatteauberg bei Buntfeldschuh, im Klinghardt-Gebirge 30 km östl. Bogenfels. — D.B.F. XIX. 136 (*Mes. Montis Drac.*); D.K.G. (1925/26) 184 (*Jutt. Mont. Drac.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187; S.G. (1928) 249; S. (1938) 25, 26.

Dracoph. rheolens (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. rheolens* L.Bol.). — Kl.-Namaland, karroide Hügel an der Südseite des Orange-Flusses zwischen Dun Vley und Groot Doorn. — A.B.H. IV. 76 (*Mes. rheolens*); D.K.G. (1927/28) 106.

***Drosanthemum* Schwant.**

D.K.G. (1927/28) 14, 29, 106; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 40: A. 214.

Drosanthemum acutifolium L.Bol. — (*Mes. capillare* L. f. var. *acutifolium* L.Bol., *Dros. capillare* [L.] Schwant. var. *acutifolium* [L.Bol.] Schwant.). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — A.B.H. IV. 83 (*Mes. cap. v. acut.*); D.K.G. (1927/28) 106 (*Dros. cap. acut.*); L.B. II. 188.

Dros. albens L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. II. 9.

Dros. albiflorum (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. albiflorum* L.Bol.). — Riversdale Divis., Phisantifontein. — A.B.H. IV. 82 (*Mes. albifl.*); D.K.G. (1927/28) 106.

Dros. ambiguum L.Bol. — Malmesbury Divis., zwischen Cape Town und Melkbos und Mamre. — L.B. II. 321.

Dros. anomalum L.Bol. — S.-Afr., bei Montagu. — L.B. III. 53.

Dros. Archeri L.Bol. — Laingsburg Divis., Whitehill. — L.B. II. 181.

Dros. asperulum (Salm.) Schwant. — (*Mes. asperulum* Salm.). — Cape Peninsula. — D.K.G. (1927/28) 30.

Dros. attenuatum (Haw.) Schwant. — (*Mes. attenuatum* Haw., *Mes. striatum* Haw. var. *attenuatum* Salm.). — S.-Afr. — B.M.P. 88 (*Mes. striat. v. attenuatum*); D.K.G. (1927/28) 30; S.G. (1927) 434; L.B. I. 101.

Dros. austricolum L.Bol. — Bredasdorp Divis., Cape Agulhas. — L.B. II. 480.

Dros. autumnale L.Bol. — Mossel Bay Divis., bei Mossel Bay. — L.B. II. 186.

Dros. Barkerae L.Bol. — Oudtshoorn Divis., 1 mile östl. Oudtshoorn. — L.B. II. 361.

Dros. bellum L.Bol. — Ceres Divis. — L.B. II. 43.

- Dros. Bredai** L.Bol. — Worcester Divis., Veld Reserve bei Worcester. — L.B. II. 481.
- Dros. breve** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Bitterfontein. — L.B. II. 321.
- Dros. brevifolium** (Ait.) Schwant. — (*Mes. brevifolium* Ait., *Mes. erigeriflorum* Jacq., *Mes. lateriflorum* D.C.). — S.-Afr., auf Hügeln bei Uitenhage, Olifantsriver, Gauritzriver, Swellendam. — B.M.P. 96 (*Mes. brevifol.*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. calycinum** (Haw.) Schwant. — (*Mes. calycinum* Haw.). — S.-Afr., sandige Felder am Olifants River (Fluß). — B.M.P. 90 (*Mes. cal.*); D.K.G. (1927/28) 29.
- Dros. candens** (Haw.) Schwant. — (*Mes. candens* Haw., *Mes. hispidum* var. *a.* Thbg.). — S.-Afr., nahe der Küste. — B.M.P. 90 (*Mes. cand.*); D.K.G. (1927/28) 29.
- Dros. capillare** (L.) Schwant. — (*Mes. capillare* L.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 106.
- Dros. capillare** (L.) Schwant. var. *acutifolium* (L.Bol.) Schwant. = **Dros. acutifolium** L.Bol.
- Dros. chrysum** L.Bol. — Laingsburg Divis., Fuß-Hügel der Swartbergen nach dem Durchgang durch Seven Week's Poort. — L.B. II. 423.
- Dros. collinum** (Sond.) Schwant. — (*Mes. collinum* Sond., *Mes. micans* Thbg.). — S.-Afr., auf Hügeln im Bokkeveld, Gauritz-Fluß. — B.M.P. 97 (*Mes. coll.*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. Comptonii** L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Whitehill. — L.B. II. 153.
- Dros. concavum** L.Bol. — Calvinia Divis., 20 miles nördl. Calvinia. — L.B. II. 154.
- Dros. croceum** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 424.
- Dros. curtophyllum** L.Bol. — Kl.-Namaland, Küstengürtel zwischen Port Nolloth und Holgat-Fluß; Hügel nordöstl. Valle Kraal. — L.B. II. 187.
- Dros. cymiferum** L.Bol. — S.-Afr., zwischen Karroopoort und Calvinia. — L.B. II. 231.
- Dros. Dejagerae** L.Bol. — Beaufort West Divis., bei Beaufort West. — L.B. II. 318.
- Dros. delicatulum** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. delicatulum* L.Bol.). — Ladismith Divis., Adam's Kraal; Swellendam Divis., Kl.-Karroo. — A.B.H. IV. 84 (*Mes. del.*); D.K.G. (1927/28) 106.
- Dros. diversifolium** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 10.
- Dros. Duplessiae** L.Bol. — S.-Afr., bei Oudtshoorn. — L.B. II. 482.
- Dros. Edwardsiae** L.Bol. — George Divis., bei Great Brak River (Fluß). — L.B. II. 319.

- Dros. expersum* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. expersum* N.E.Br.). — D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. flavum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. flavum* Haw.). — S.-Afr., Hügel am Zwartkops-Fluß. — B.M.P. 96 (*Mes. flavum*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. floribundum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. floribundum* Haw., *Mes. hispidum* var. *pallidum* Haw.). — S.-Afr., nahe der Lagune bei Milnerton und auf Paarden Island nahe der Mündung des Solt River (Fluß). — M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. florib.*); D.K.G. (1927/28) 29; S.G. (1927) 433; L.B. I. 99.
- Dros. Fourcadei* L.Bol. = *Dros. Fourcadei* Schwant.
- Dros. Fourcadei* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Fourcadei* L.Bol., *Dros. Fourcadei* L.Bol.). — Humansdorp Divis., Hügel nahe Hankey. — A.B.H. IV. 84 (*Mes. Fourc.*); D.K.G. (1927/28) 106; L.B. II. 188; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Dros. Framesii* L.Bol. — S.-Afr., Spes Bona in der Ceres Divis.; Van Rhyn's Paß in Calvinia Divis. — S.G. (1927) 434; L.B. I. 101, 133.
- Dros. Fulleri* L.Bol. — Kenhardt Divis., 20 miles südwestl. Kakamas. — L.B. II. 170.
- Dros. glabrescens* L.Bol. — Clavinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 186.
- Dros. globosum* L.Bol. — Montagu Divis., zwischen Ashton und Montagu. — L.B. II. 185.
- Dros. Godmaniae* L.Bol. — Kl.-Namaland, Springbok. — L.B. II. 137.
- Dros. gracillimum* L.Bol. — Uniondale Divis., Hügel nahe Avontuur. — L.B. II. 196.
- Dros. Hermannii* (Pax) Schwant. — (*Mes. Hermannii* Pax). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 30; F.R. XIX. 190 (*Mes. Herm.*).
- Dros. hirtellum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. hirtellum* Haw.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. hispidum* (L.) Schwant. — (*Mes. hispidum* L.). — Gr.-Nama-land, zwischen Nomtsas und Gamies, Büllsporter Fläche. — F.R. XIX. 190 (*Mes. hisp.*); D.K.G. (1927/28) 27, 29, 106; S.G. (1927) 434; L.B. I. 101.
- Dros. hispidum* (L.) Schwant. var. *platypetalum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. hispidum* L. var. *platypetalum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 129 (*Mes. hisp. platypet.*); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.
- Dros. hispifolium* (Haw.) Schwant. — (*Mes. hispifolium* Haw., *Mes. striatum* Haw. var. β . *hispifolium* Salm., *Mes. tuberculatum* D.C.). — B.M.P. 88 (*Mes. hispifol.*); D.K.G. (1927/28) 29.
- Dros. intermedium* L.Bol. — (*Mes. intermedium* L.Bol.). — Mossel Bay Divis., Mossel Bay, Hügel nahe Gauritz River (Fluß); Riversdale Divis., im Sand bei Swartklip nahe Albertina. — A.B.H. III. 171 (*Mes. interm.*); L.B. II. 188.

- Dros. Jamesii*** L.Bol. — Cradock Divis., bei Halesowen. — **L.B. II. 319.**
- Dros. karroense*** L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Whitehall. — **L.B. II. 185.**
- Dros. latipetalum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Giftberg. — **L.B. II. 138.**
- Dros. Lacisii*** L.Bol. — Bredasdorp Divis., zwischen Struis Bay und Bredasdorp. — **L.B. II. 483.**
- Dros. Leipoldtii*** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Pakhuis Paß. — **L.B. II. 183.**
- Dros. lignosum*** L.Bol. — Ceres Divis. — **L.B. II. 322.**
- Dros. lique*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. lique* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — **N.F.Br.M. 103** (*Mes. lique*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. Lüderitzii*** (Engl.) Schwant. — (*Mes. Lüderitzii* Engl.). — Sw.-Afr., Lüderitzbucht. — **F.R. XIX. 190** (*Mes. Lüd.*); D.K.G. (1927/28) 29.
- Dros. macocalyx*** L.Bol. — Kl.-Karoo, 8 miles nördl. Ladismith. — **L.B. II. 154.**
- Dros. maculatum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. maculatum* Haw., *Mes. micans* var. β . Haw.). — S.-Afr. — **D.K.G. (1927/28) 30.**
- Dros. marinum*** L.Bol. — Darling Divis., Uyzerfontein. — **L.B. II. 322.**
- Dros. Mathewsii*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Zout River. — **L.B. II. 248.**
- Dros. micans*** (L.) Schwant. — (*Mes. micans* L.). — S.-Afr., steinige Stellen im Purpas Tal, Swellendam, Genadenthal, Rietkuil. — **B.M.P. 97** (*Mes. mic.*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. montaguense*** L.Bol. — Montagu Divis., bei Montagu. — **L.B. II. 320.**
- Dros. Muiri*** L.Bol. — Riversdale Divis., "old wall in Riversdale". **L.B. II. 181.**
- Dros. nitidum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. nitidum* Haw., *Mes. brachiatum* D.C.). — S.-Afr., am Zwartkops-Fluß. — **B.M.P. 65** (*Mes. nitidum*); **F.R. XLIII. 229**; D.K.G. (1938) 42.
- Dros. obliquum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. obliquum* Haw.). — S.-Afr., auf Hügeln am Zwartkops Fluß. — **B.M.P. 96** (*Mes. obl.*); D.K.G. (1927/28) 31.
- Dros. oculatum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Vlermuisklip bei Bitterfontein. — **L.B. II. 323.**
- Dros. opacum*** L.Bol. — Tulbagh Divis., auf flachem Abhang an der westl. Vorderseite nahe des südl. Einganges zu Mitchell's Paß. — **L.B. II. 182.**
- Dros. Pageanum*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Pageanum* L.Bol.). — Montagu Divis., nahe Montagu Baths. — **A.B.H. IV. 99** (*Mes. Pag.*); D.K.G. (1927/28) 106.

- Dros. pallens*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. striatum* Haw. var. *pallens* Haw., *Mes. striatum* DC., *Mes. striatum* Haw., var. *α. pallidum* D.C.). — S.-Afr. — B.M.P. 88 (*Mes. striatum* v. *pallens*). — F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.
- Dros. papillatum*** L.Bol. — Worcester Divis., Tal zwischen Robertson und Worcester. — L.B. II. 23.
- Dros. parvifolium*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. parvifolium* Haw.). — Kl.-Namaland, am Gauritz-Fluß. — B.M.P. 95 (*Mes. parvifol.*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. pauper*** (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. pauper* Dtr.). — Gr.-Namaland, am Drachenberg, Klinghardtgebirge. — D.B.F. XIX. 180 (*Mes. pauper*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. Paxianum*** (Schltr. et Diels) Schwant. — (*Mes. Paxianum* Schltr. et Diels., *Mes. Paxii* Engl., *Mes. brachyphyllum* Pax). — Gr.-Namaland, Angra Piquena, Lüderitzbucht. — F.R. VIII. 150 (*Mes. Paxianum*); F.R. XIX. 191 (*Mes. Paxianum*); D.K.G. (1927 bis 1928) 29.
- Dros. praecultum*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. praecultum* N.E.Br.). — D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. prostratum*** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Oliphant's Fluß-Tal bei Pickenier's Kloof. — L.B. II. 302.
- Dros. pruinoseum*** (Thbg.) Schwant. — (*Mes. pruinoseum* Thbg.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. pulchellum*** (Haw.?) L.Bol. — (*Mes. asperulum* Haw.?). — Clanwilliam. — L.B. II. 182.
- Dros. pulchrum*** L.Bol. — Worcester Divis., 10 miles von Worcester auf dem Wege nach Touw's Fluß. — L.B. II. 424.
- Dros. pulverulentum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. pulverulentum* Haw.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. ramosissimum*** (Schltr.) L.Bol. — (*Mes. ramosissimum* Schltr.). — S.-Afr. — L.B. II. 188.
- Dros. robustum* L.Bol. = *Delosperma crassum* L.Bol.
- Dros. roridum*** L.Bol. — Montagu Divis., Kl.-Karoo. — A.B.H IV. 129; L.B. II. 186.
- Dros. salicolum*** L.Bol. — Piquetberg Divis., Salz-Ebenen St. Helena-fontein. — L.B. II. 425.
- Dros. Schoenlandianum*** (Schltr.) L.Bol. — (*Mes. Schoenlandianum* Schltr.). — L.B. II. 187.
- Dros. semiglobosum*** L.Bol. — Worcester Divis., Hey River (Fluß). — L.B. II. 426.
- Dros. sessile*** (Thbg.) Schwant. — (*Mes. sessile* Thbg.). — S.-Afr., Karroo zwischen Olifants River und Bocklandsberg. — B.M.P. 131 (*Mes. sessile*); D.K.G. (1927/28) 106.

- Dros. speciosum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. speciosum* Haw.). — S.-Afr., auf Hügeln am Gauritz-Fluß, Swellendam. — B.M.P. 98 (*Mes. speciosum*); D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. splendens*** L.Bol. — S.-Afr., bei Montagu. — L.B. II. 483.
- Dros. Stokei*** L.Bol. — Kap-Prov., Kleinmond. — S.G. (1927) 434.
- Dros. striatum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. striatum* Haw.). — S.-Afr., um Cape Town, am Zwartkops-Fluß, Kleinriviersberge, Caledon, Tulbagh, Olifantsriver. — B.M.P. 87 (*Mes. striat.*); D.K.G. (1927 bis 1928) 29.
- Dros. subalbum*** L.Bol. — S.-Afr., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 248.
- Dros. subcompressum*** L.Bol. = ***Dros. subcompressum*** Schwant.
- Dros. subcompressum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. subcompressum* Haw., *Dros. subcompressum* L.Bol.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 29; L.B. II. 186; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.
- Dros. subglobosum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. subglobosum* Haw.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 30.
- Dros. subplanum*** L.Bol. — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 232.
- Dros. tardum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlings Drift. — L.B. II. 183.
- Dros. torquatum*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. torquatum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G. (1927/28) 30; S.G. (1927) 433; L.B. I. 100.
- Dros. ruginatum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Bitterfontein. — L.B. II. 139.
- Dros. vandermereiei*** L.Bol. — Swellendam Divis., bei Swellendam. — L.B. II. 139.
- Dros. vespertinum*** L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — L.B. II. 184.
- Dros. vespertinum*** L.Bol. var. ***suffusum*** L.Bol. — Ceres Divis., Karroopoort. — L.B. II. 249.
- Dros. wittebergense*** L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein, bei Witteberg. — L.B. III. 5.
- Dros. worcesterense*** L.Bol. — Worcester Divis., Veld Reserve bei Worcester. — L.B. II. 484.

Eberlanzia Schwant.

- D.K.G. (1925/26) 189; D.K.G. (1927/28) 106; v.P.M. 40.
- Eberlanzia aculeata*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. aculeatum* N.E.Br.). — D.K.G. (1927/28) 30.
- Eberl. clausa*** (Dtr.) Schwant. — (*Mes. clausum* Dtr.). — Gr.-Namaland, bei Aus im Klinghardtgebirge. — D.B.F. XIX. 129; D.K.G. (1925/26) 189; D.K.G. (1927/28) 106.

- Eberl. cradockensis** (O.Ktze.) Schwant. — (*Mes. cradockense* O.Ktze.) — D.K.G. (1925/26) 189.
- Eberl. hospitalis** (Dtr.) Schwant. — (*Mes. hospitale* Dtr.). — Gr.-Namaland, bei Aus. — D.B.F. XIX. 13 (*Mes. hosp.*); D.K.G. (1925/26) 189.
- Eberl. intricata** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. intricatum* N.E.Br.). — Transvaal, Johannesburg Distr. — M.Fl.Pl. I. 161; (*Mes. intric.*).
- Eberl. micrantha** (Pax) Schwant. — (*Mes. spinosum* L. var. *micranthum* Pax.). — S.-Afr., bei De Aar. — B.M.P. 133 (*Mes. spin.* v. *micr.*); D.K.G. (1925/26) 189.
- Eberl. mucronifera** (Haw.) Schwant. — (*Mes. mucroniferum* Haw., *Mes. pulverulentum* Willd.). — S.-Afr., D.K.G. (1925/26) 189.
- Eberl. sedoides** (Dtr. et Bgr.) Schwant. — (*Mes. sedoides* Dtr. et Bgr.). — Gr.-Namaland, Lüderitzbucht. — D.B.F. XIX. 124 (*Mes. sedoides*); D.K.G. (1925/26) 189.
- Eberl. spinosa** (L.) Schwant. — (*Mes. spinosum* L.). — Sw.-Afr., östl. und Zentr.-Karasberge; niedrige Abhänge Kraikluft; Karroo überall häufig; bei Laingsburg, zwischen Olifantsriver und Bocklandsberg, Middelburg Road. — A.B.H. I. 18 (*Mes. spin.*); B.M.P. 132 (*Mes. spin.*); D.K.G. (1925/26) 189.

Ebracteola Dtr. et Schwant.

D.K.G. (1927/28) 15. 24, 106; v.P.M. 40; A. 220.

- Ebracteola Derenbergiana** (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Derenbergianum* Dtr., *Bergeranthus Derenbergianus* Schwant.). — Gr.-Namaland, Kleinfontein-Fläche, westl. Aus, Halenberg, Klinghardtgebirge. — D.B.F. XIX. 137 (*Mes. Derenb.*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. Derenb.*); D.K.G. (1927/28) 24.
- Ebract. Montis Moltkei** (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Montis Moltkei* Dtr., *Bergeranthus Montis Moltkei* Schwant.). — Sw.-Afr., östl. Kamm der Auas-Berge, Moltkeblick und Kempinskyberg. — D.K.G. (1922) 113 (*Mes. Mont. Moltk.*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. Mont. Moltk.*); D.K.G. (1927/28) 24, 106.

Echinus L.Bol.

Fl.Pl. VII. Pl. 266; B.M.J. (1929) 56; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 41; A. 214.

Echinus apiculatus L.Bol. = **Echinus edentulus** N.E.Br.

- Echinus edentulus** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. edentulum* Haw., *Mes. apiculatum* Kensit, *Mes. binum* N.E.Br., *Echinus apiculatus* L.Bol., *Braunsia bina* Schwant., *Braunsia edentula* N.E.Br.). — Cape Prov., Matjesfontein, Touws River; Clanwilliam Divis., Doorn River, niedrige Hänge nordöstl. Matjesfontein; Giftberg, Packhuisberg, Van Rhynsdorp. — Tr.R.S. I. 154 (*Mes. apicul.*); N.E.Br.M. 119

(*Mes. binum*); F.R. XII. 323 (*Mes. apicul.*); Fl.Pl. VII. 266 (*Echinus apicul.*); Gw. (1928) 644 (*Braunsia bina*); B.M.J. (1929) 57; M. 126 (*Braunsia edentula*) (die bei M. 126 angegebene Synonymie ist völlig unklar, vgl. mit B.M.J. [1929] 57, und deshalb nicht berücksichtigt).
Echinus geminatus (Haw.) L.Bol. — (*Mes. geminatum* Haw., *Mes. Mathewsi* L.Bol., *Echinus Mathewsi* N.E.Br.). — Cape Prov., South Western Reg., zwischen Muiskraal und Ladismith; Karroo Reg., Prince Albert Divis., nahe Prince Albert. — A.B.H.I. 189 (*Mes. Mathewsi*); B.M.J. (1929) 57 (*Echinus Mathewsi*); S.G. (1930) 48; L.B. II. 79.

Echinus Mathewsi N.E.Br. = ***Echinus geminatus*** L.Bol.

Echinus Maximiliani (Schltr.) N.E.Br. — (*Mes. Maximiliani* Schltr., *Mes. apiculatum* var. *muticum* L.Bol., *Mes. Phillipsii* L.Bol., *Mes. binum* L.Bol., *Braunsia Maximilianii* Schwant.). — A.B.H. IV. 5 (*Mes. Phillipsii*); Fl.Pl. VII. Pl. 263 (*Mes. binum*); Gw. (1928) 644 (*Braunsia Maximilianii*); B.M.J. (1929) 57.

Ectotropis N.E.Br.

G.C. (1927, I) 12; v.P.M. 41; A. 214.

Ectotropis alpina N.E.Br. — Fort Beaufort Divis., Hogsback. — A.B.H. IV. 98; G.C. (1927, I) 12.

Enarganthe N.E.Br.

G.C. (1930, I) 71, 151; v.P.M. 41; A. 214.

Enargantha octonaria (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. octonarium* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Fl.Pl. VII. Pl. 271 (*Mes. oct.*); G.C. (1931, I) 71, 151.

Erepsia N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 248; v.P.M. 41; A. 214.

Erepsia anceps L.Bol. = ***Erepsia anceps*** Schwant.

Erepsia anceps (Haw.) Schwant. — (*Mes. anceps* Haw., *Erepsia anceps* L.Bol.). — S.-Afr., am Tafelberg, bei Swellendam. — B.M.P. 177 (*Mes. anceps*); Gfl. (1928) 68; L.B.I. 123; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 225.

Erepsia aspera (Haw.) L.Bol. — (*Mes. asperum* Haw., *Erepsia aspera* Schwant.). — S.-Afr. — B.M.P. 178 (*Mes. asp.*); Fl.Pl. VII. Pl. 254; Gfl. (1928) 68; L.B.I. 123; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 224.

Erepsia aspera Schwant. = ***Erepsia aspera*** L.Bol.

Erepsia bracteata L.Bol. = ***Erepsia bracteata*** Schwant.

Erepsia bracteata (Ait.) Schwant. — (*Mes. bracteatum* Ait., *Erepsia bracteata* L.Bol.). — S.-Afr., sandige Stellen an der Nordseite des Tafelberges, in Hottentottholland, Diepsriver Station. — B.M.P. 178 (*Mes. bract.*); Gfl. (1928) 68; L.B. I. 123; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 225.

- Erepsia brevipetala*** L.Bol. — Malmesbury Divis., zwischen Hopefield und Veldrift. — L.B. II. 426.
- Erepsia caledonica*** L.Bol. — S.-Afr., Caledon. — L.B. II. 342.
- Erepsia Carterae*** L.Bol. — Ceres Divis., Roman's Halt. — L.B. III. 32.
- Erepsia compressa*** L.Bol. = ***Erepsia compressa*** Schwant.
- Erepsia compressa*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. compressum* Haw., *Erepsia compressa* L.Bol.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 68; L.B. I. 123; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 225.
- Erepsia coralliflora*** (S.D.) Schwant. — (*Mes. coralliflorum* S.D., *Lampranthus coralliflora* N.E.Br.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 68; G.C. (1930, I) 212 (*Lampr. cor.*).
- Erepsia cyathiformis*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. cyathiforme* L.Bol., *Lampranthus cyathiformis* N.E.Br.). — Cape Prov., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. III. 165 (*Mes. cyath.*); Gfl. (1928) 68; G.C. (1930, I) 212.
- Erepsia distans*** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Cedarbergen. — L.B. I. 147.
- Erepsia Dregeana*** (Sond.) Schwant. — (*Mes. Dregeanum* Sond.). — S.-Afr., bei Tulbagh. — B.M.P. 196 (*Mes. Dreg.*); Gfl. (1928) 68.
- Erepsia forficata*** Schwant. = ***Ruschia forficata*** L.Bol.
- Erepsia gracilis*** (Haw.) L.Bol. — (*Mes. gracile* Haw., *Mes. stellatum* [hort.] Haw., *Erepsia gracilis* Schwant.). — S.-Afr., bei Kapstadt. — B.M.P. 177 (*Mes. grac.*); Fl.Pl. VII. Pl. 254; Gfl. (1928) 68; D.K.G. (1937) 161; F.R. XLIII. 225.
- Erepsia gracilis*** Schwant. = ***Erepsia gracilis*** L.Bol.
- Erepsia Haworthii*** (Don.) Schwant. — (*Mes. Haworthii* Don., *Lampranthus Haworthii* N.E.Br.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 68; G.C. (1930, I) 212 (*Lampr. Haw.*).
- Erepsia heteropetala*** (Haw.) Schwant. (*Mes. heteropetalum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 195 (*Mes. heterop.*); Gfl. (1928) 68.
- Erepsia inclaudent*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. inclaudent* Haw., *Mes. inclaudent* Eckl. et Zeyh., *Mes. mutabilis* Eckl. et Zeyh.). — S.-Afr., Cape Flats (Ebenen). — B.M.P. 196 (*Mes. incl.*); Gfl. (1928) 68.
- Erepsia insignis*** (Schltr.) Schwant. — (*Mes. insigne* Schltr.). — Ceres Divis., Felsen bei Bainskloof. — B.M.P. 181 (*Mes. insignis*); Gfl. (1928) 68.
- Erepsia laxa*** L.Bol. — Caledon Divis., nahe Sir Lowry's Paß. — L.B. I. 147.
- Erepsia teris*** L.Bol. — Robertson Divis., beim Fluß (River) Zonder Einde. — L.B. II. 343.
- Erepsia Marlothii*** N.E.Br. — Clanwilliam Divis., Cedarberg Range, 1000 Fuß Höhe. — B.M.J. (1929) 61.

Erepsia montana (Schltr.) Schwant. — (*Mes. montanum* Schltr.). — S.-Afr., Felsen bei French Hoek. — B.M.P. 194 (*Mes. mont.*); Gfl. (1928) 68.

Erepsia Muiri L.Bol. — Swellendam Divis., bei Swellendam; Ladismith Divis., Muiskraal. — L.B. I. 146; L.B. II. 192.

Erepsia mutabilis L.Bol. = *Erepsia mutabilis* Schwant.

Erepsia mutabilis (Haw.) Schwant. — (*Mes. mutabile* Haw., *Mes. filamentosum* D.C., *Mes. forficatum* Jacq., *Mes. glaucinum* Haw., *Mes. tricolor* Jacq., *Erepsia mutabilis* L.Bol.). — Uitenhage Divis.; Beaufort Divis. — B.M.P. 195 (*Mes. mut.*); Gfl. (1928) 68; L.B. I. 123; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Erepsia Pagae L.Bol. — Cape Peninsula, Abhänge des Tafelberges, oberhalb Camp's Bay. — L.B. I. 148.

Erepsia patula L.Bol. = *Erepsia patula* Schwant.

Erepsia patula (Haw.) Schwant. — (*Mes. patulum* Haw., *Erepsia patula* L.Bol.). — S.-Afr., Tafel Bay; Swellendam Divis. — B.M.P. 179 (*Mes. pat.*); Gfl. (1928) 68; L.B. I. 123; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Erepsia pentagona L.Bol. — (*Mes. pentagonum* L.Bol., *Erepsia pentagona* Schwant.). — Riversdale Divis., Garcia's Paß; Abhänge der Fußhügel des Langeberg bei Glen. — A.B.H. IV. 3 (*Mes. pent.*); Fl.Pl. VII. Pl. 254; Gfl. (1928) 68; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Erepsia pentagona Schwant. = *Erepsia pentagona* L.Bol.

Erepsia polita L.Bol. — (*Mes. politum* L.Bol., *Erepsia polita* Schwant.) — Ladismith Divis., Muiskraal. — A.B.H. III. 168 (*Mes. politum*); Fl.Pl. VII. Pl. 254; Gfl. (1928) 68; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Erepsia polita Schwant. = *Erepsia polita* L.Bol.

Erepsia Promontori L.Bol. — Cape Divis., Cape Point. — A.B.H. IV. 106; L.B. I. 123.

Erepsia purpureostylus L.Bol. = *Ruschia forficata* L.Bol.

Erepsia racemosa (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. racemosum* N.E.Br.). — S.-Afr. — B.M.P. 180 (*Mes. rac.*); Gfl. (1928) 68.

Erepsia radiata L.Bol. = *Erepsia radiata* Schwant.

Erepsia radiata (Haw.) Schwant. — (*Mes. radiatum* Haw., *Erepsia radiata* L.Bol.). — S.-Afr., am Lionsmountain, Greenpoint. — B.M.P. 180 (*Mes. rad.*); Gfl. (1928) 68; L.B. I. 123; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Erepsia ramosa L.Bol. — Piquetberg Divis., genauer Standort unbekannt. — L.B. I. 146.

Erepsia restiophilum L.Bol. — S.-Afr., Cape Flats (Ebenen). — Fl.Pl. VII. Pl. 254.

Erepsia roseocalba L.Bol. — Malmesbury Divis., Berge Riebecks Kasteel. — L.B. I. 147.

Erepsia saturata L.Bol. — Piquetberg Divis. — L.B. I. 147.

Erepsia Steytlerae L.Bol. — Caledon Divis., bei Kleinmond. — L.B. II. 57.

Erepsia stipulaceus (L.) Schwant. — (*Mes. stipulaceum* L., *Mes. disgregum* N.E.Br., *Lampranthus stipulaceus* N.E.Br., *Lampranthus disgregus* N.E.Br.). — Uitenhage Divis, und Alexandra Divis., Sunday-Fluß, nahe Swartkopsfluß bei Redhouse. — B.M.P. 157 (*Mes. stipulaceum*); Gfl. (1928) 68; B.M.J. (1929) 59 (*Mes. disgregus*); L.B. II. 192 (*Mes. stipulaceum*); G.C. (1930, I) 212 (*Lampr. disgr.*, *Lampr. stip.*).

Erepsia Stokoei L.Bol. — Caledon Divis., Palmiet River Mountains. — A.B.H. IV. 107.

Erepsia viridis L.Bol. = *Smicrostigma viride* N.E.Br.

Erepsia tuberculata N.E.Br. — S.-Afr., Cape Peninsula. — L.B. I. 123.

Erepsia Urbaniana (Schltr.) Schwant. — (*Mes. Urbanianum* Schltr.). — S.-Afr., sandige Stellen der Berge bei Sir Lowry's-Paß. — B.M.P. 182 (*Mes. Urb.*); Gfl. (1928) 68.

Eurystigma L.Bol.

L.B. II. 179; v.P.M. 41; A. 220.

Eurystigma clavatum L.Bol. — (*Cryophytum clavatum* L.Bol.). — Ceres Divis. — L.B. II. 151 (*Cryoph. clavat.*); L.B. II. 179.

Faucaria Schwant.

D.K.G. (1925/26) 176; D.K.G. (1927/28) 105; v.P.M. 41; A. 214; L.B. III. 109, 114.

Faucaria acutipetala L.Bol. — Somerset East Divis., Bruintjeshoogte. — L.B. II. 443.

Fauc. albidens N.E.Br. — Östl. Kap-Prov. — J.B. (1927) 349; S.G. (1930) 153.

Fauc. Bosscheana (Bgr.) Schwant. — (*Mes. Bosscheanum* Bgr.). — S.-Afr., Standort?. — B.M.P. 269 (*Mes. Bossch.*); D.K.G. (1925/26) 177; L.B. III. 112.

Fauc. Brittenae L.Bol. — Albany Divis., zwischen Grahamstown und Committees. — S.G. (1933) 22; L.B. III. 112.

Fauc. candida L.Bol. — Cradock Divis., Scanlan. — L.B. III. 105.

Fauc. crassipetala L.Bol. — Somerset East Divis., Bruintjeshoogte. — L.B. II. 442.

Fauc. coronata L.Bol. — Albany Divis., zwischen Riebeeck East und Carlisle Bridge. — L.B. II. 446.

- Fauc. cradockensis*** L.Bol. — Cradock Divis., bei Cradock. — **L.B. II. 448.**
- Fauc. Duncanii*** L.Bol. — Uitenhage Divis., Coega. — **S.G. (1933) 22.**
- Fauc. felina*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. felinum* [Haw.] Hill., *Mes. ringens* f. *felinum* L., *Mes. rictum felinum repraesentans* Dillen.). — Karroo-Gebiet, Roggeveld, Bockland, Zwartkop River. — B.M.P. 267 (*Mes. fel.*); N.E.Br.M. 76 (*Mes. fel.*); D.K.G. (1925/26) 177; S.G. (1933) 22.
- Fauc. felina*** (Haw.) Schwant. var. ***Jamesii*** L.Bol. — Cradock Divis., auf einer Bergspitze bei Halesowen und auf Olive Schreiner's Mountain. — **L.B. II. 395.**
- Fauc. Gratiae*** L.Bol. — Albany Divis., Mitford Park bei Riebeeck East. — **L.B. II. 394.**
- Fauc. Haagei*** Tisch. — Willowmoore Divis. — **D.K.G. (1929) 20.**
- Fauc. Hooleae*** L.Bol. — Albany Divis., Mitford Park bei Riebeeck East. — **L.B. II. 447; L.B. III. 114.**
- Fauc. kendrewensis*** L.Bol. — Graaf Reinet Divis., Kendrew. — **L.B. II. 469.**
- Fauc. Kingiae*** L.Bol. — Albany Divis., bei Alicedale. — **L.B. III. 106.**
- Fauc. latipetala*** L.Bol. — Bedford Divis., bei Bedford. — **L.B. II. 443; L.B. III. 114.**
- Fauc. laxipetala*** L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown. — **L.B. II. 444.**
- Fauc. longidens*** L.Bol. — Somerset East Divis., Yester Farm bei Somerset East. — **L.B. II. 470.**
- Fauc. longifolia*** L.Bol. — Bedford Divis., bei Bedford. — **L.B. II. 471; L.B. III. 112.**
- Fauc. lupina*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. lupinum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 268 (*Mes. lup.*); D.K.G. (1925/26) 177.
- Fauc. militaris*** Tisch. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **D.K.G. (1932) 280.**
- Fauc. montana*** L.Bol. — Cradock Divis., Berg „Olive Schreiner“. — **L.B. II. 448.**
- Fauc. multident*** L.Bol. — Bei Bedford. — **L.B. II. 450.**
- Fauc. multident*** L.Bol. var. ***paardeportensis*** L.Bol. — Uitenhage Divis., Paardepoort in Kl.-Winterhoek-Berge. — **L.B. III. 107.**
- Fauc. paucidens*** N.E.Br. — Graaf Reinet Divis. — M. 210; D.K.G. (1935) 188; L.B. III. 112.
- Fauc. Peersii*** L.Bol. — Jansenville Divis., bei Klipplaat. — **L.B. III. 108.**
- Fauc. plana*** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. III. 107.**
- Fauc. Ryneveldiae*** L.Bol. — Bedford Divis., bei Bedford. — **L.B. II. 446.**

- Fauc. Smithii** L.Bol. — Albany Divis., Fish-River Tal, nahe am Fuße des Pluto's Tal, ca. 20 miles östl. Grahamstown. — **L.B. III. 33.**
- Fauc. speciosa** L.Bol. — Albany Divis., bei Grahamstown. — **L.B. II. 445.**
- Fauc. subindurata** L.Bol. — S.-Afr., zwischen Peddie und Fish-River-Mündung, 12 miles jenseits Peddie. — **L.B. II. 444; L.B. III. 112.**
- Fauc. subintegra** L.Bol. — Bedford Divis., bei Bedford. — **L.B. II. 449.**
- Fauc. tigrina** (Haw.) Schwant. — (*Mes. tigrinum* Haw.). — In der Karroo, Onderste Roggeveld, Bothasberg in Albany Divis.; Uitenhage Divis. — B.M.P. 266 (*Mes. tigr.*): D.K.G. (1925/26) 177; D.K.G. (1927/28) 105; Fl.Pl. VII. Pl. 267; M. 211.
- Fauc. tuberculosa** (Rolfe) Schwant. — (*Mes. tuberosum* Rolfe.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — **B.Mag. 142 Tab. 8674B** (*Mes. tub.*); D.K.G. (1925/26) 177; S.G. (1930) 382; M. 212.
- Fauc. uniondalensis** L.Bol. — Bei Uniondale. — **L.B. III. 106.**

Fenestraria N.E.Br.

- G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 246; v.P.M. 42; A. 215.
- Fenestraria aurantiaca** N.E.Br. — Grotterm-Richtersveld, Port Nolloth, Alexanderbay. — G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 246.
- Fen. rhopalophylla** (Schl. et Diels) N.E.Br. — (*Mes. rhopalophyllum* Schl. et Diels.). — Gr.-Namaland, südl. Namib bei Pomona-Eiland, bei Lüderitzbucht. — Tr.R.S. I. 406 (*Mes. rhop.*); F.R. VIII. 148 (*Mes. rhop.*); M.D.G.Ztg. (1926) 291 (*Mes. rhop.*); M. 214.

Frithia N.E.Br.

- G.C. (1925, II) 433; M.Fl.Pl. I. 162; P.G.S.A.P. 247; v.P.M. 42; A. 215; K.Kd. (1938) 36.
- Frithia pulchra** N.E.Br. — Transvaal, Magaliesberge. — **M.Fl.Pl. I. 162; Fl.Pl. VII. Pl. 275; S. (1928) 215; M. 215; S. (1935) 81, 97; D.K.G. (1935) 106.**

Gibbaeum (Haw.) N.E.Br.

- G.C. (1922, I) 129; D.K.G. (1925/26) 116; G.C. (1926, I) 172, 194; P.G.S.A.P. 242; D.K.G. (1927/28) 227; v.P.M. 43; A. 215; D.K.G. (1937) 150.
- Gibbaeum album** N.E.Br. — Kl.-Karoo, Ladismith Divis. — G.C. (1926, I) 215; D.K.G. (1927/28) 227; M. 218.
- Gibbaeum album** N.E.Br. var. **roseum** N.E.Br. — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — **G.C. (1927, I) 430; D.K.G. (1927/28) 227.**

- Gibbaeum angulipes* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. angulipes* L.Bol.). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — A.B.H. IV. 2 (*Mes. angulipes*); G.C. (1927, I) 430; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum argenteum* N.E.Br. — Ladismith Divis. — G.C. (1921, II) 273.
- Gibbaeum Blackburnii* L.Bol. — Ladismith Divis., lehmige Abhänge bei Calitzdorp. — L.B. III. 65.
- Gibbaeum Comptonii* L.Bol. — (*Rimaria Comptonii* L.Bol.). — Ladismith Divis., Karrevlakte, Umgegend von Touws River. — L.B. II. 369 (*Rimaria Compt.*); S.G. (1932) 330, 331 (*Rim. Compt.*); D.K.G. (1934) 55 (*Rim. Compt.*); L.B. III. 65.
- Gibbaeum cryptopodium* (Kensit) L.Bol. — (*Mes. cryptopodium* Kensit, *Conophytum nuciforme* N.E.Br. partim?, *Derenbergia cryptopodia* Schwant., *Derenbergia nuciformis* Schwant.). — Laingsburg Divis., linke Seite des Weges zwischen Witte Poort und Laingsburg. — Tr.R.S. I. 150 (*Mes. crypt.*); B.M.P. 283 (*Mes. nuc.*); F.R. XI. 476 (*Mes. crypt.*); G.C. (1922, II) 84 (*Con. nuc.*); D.K.G. (1925/26) 138 (*Derenb. crypt.*); D.K.G. (1927/28) 224 (*Con. nuc.*); L.B. II. 402.
- Gibbaeum digitiforme* (Thbg.) N.E.Br. = *Dactylopsis digitata* N.E.Br.
- Gibbaeum dispar* N.E.Br. — Ladismith Divis., zwischen Waterval und Van Wijks Dorp. — G.C. (1926, I) 215; G.C. (1927, I) 430; D.K.G. (1927/28) 227; D.K.G. (1932) 17.
- Gibbaeum geminum* N.E.Br. — Kl.-Karoo in Ladismith Divis., südwestl. von Touwsberg. — G.C. (1928, I) 129; G.C. (1926, I) 215; G.C. (1927, I) 430; D.K.G. (1927/28) 227; L.B. I. 58; S.G. (1928) 125; M. 216.
- Gibbaeum gibbosum* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. gibbosum* Haw.). — Ceres. — B.M.P. 226 (*Mes. gibb.*); G.C. (1922, I) 151; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum Haagei* Schwant. — S.-Afr., Standort nicht bekannt. — J.S.P. 179.
- Gibbaeum Heathii* (N.E.Br.) L.Bol. — (*Mes. Heathii* N.E.Br., *Rimaria Heathii* N.E.Br.). — Prieska Divis., südl. von Touwsberg; Ladismith Divis., Kl.-Karoo, zwischen Garcia's Paß und Ladismith, nahe Adams Kraal, bei Hondeklip, bei Algeryns Kraal. — N.E.Br.M. 67 (*Mes. Heath.*); G.C. (1926, I) 135 (*Rim. Heath.*); M.D.C.Ztg. (1926) 342 (*Rim. Heath.*); D.K.G. (1927/28) 226 (*Rim. Heath.*); S. (1930) 24 (*Rim. Heath.*); S.G. (1932) 330, 331 (*Rim. Heath.*); M. 228 (*Rim. Heath.*); L.B. III/65.
- Gibbaeum Heathii* (N.E.Br.) L.Bol. var. *elevata* L.Bol. — (*Rimaria Heathii* N.E.Br. var. *elevata* L.Bol.). — S.G. (1932) 330, 331 (*Rim. Heathii* v. *elevata*).

- Gibbaeum Heathii*** (N.E.Br.) L.Bol. var. *major* L.Bol. — (*Rimaria Heathii* N.E.Br. var. *major* L.Bol.). — S.G. (1932) 330, 331 (*Rim. Heathii* v. *major*); D.K.G. (1937) 152, 154 (*Rim. Heathii* v. *major*).
- Gibbaeum Helmbiae*** L.Bol. — Oudtshoorn Divis., Zebra. — L.B. II. 402.
- Gibbaeum Luckhoffii*** L.Bol. — (*Rimaria Luckhoffii* L.Bol. — Ladismith Divis., am Fuße des Klein-Swartberg. — L.B. II. 232; S.G. (1931) 317; L.B. II. 368 (*Rimaria Luckh.*); S.G. (1932) 330, 331; L.B. III. 65.
- Gibbaeum luteoviride*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. perviride* var. *B.* Haw., *Mes. luteoviride* Haw., *Gibbaeum perviride* N.E.Br. var. *luteoviride* N.E.Br.). — Kl.-Karoo. — G.C. (1922, I) 151; G.C. (1926, I) 215; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum Marlothii*** N.E.Br. — Ceres Divis., nördl. Karroo Poort. — G.C. (1928, II) 492.
- Gibbaeum molle*** N.E.Br. — Ladismith Divis., Kl.-Karoo, auf Hügeln bei Adams Kraal; Montague Divis., zwischen Touwsfontein und Allemorgensfontein; Riversdale Divis., Marthinus Kloof. — G.C. (1926, I) 216; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum Muiri*** N.E.Br. — Montagu Divis., zwischen Touwsfontein und Allemorgensfontein. — G.C. (1926, I) 216; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum Muiri*** (N.E.Br.) Schwant. = ***Gibbaeum Schwantesii*** Tisch.
- Gibbaeum Nebrownii*** (N.E.Br.) Tisch. — (*Imitaria Muiri* N.E.Br.). — S.-Afr., auf Hügeln in Kl.-Karoo. — J.B. (1927) 348 (*Imitaria Muiri*); M. 238 (*Imitaria Muiri*); D.K.G. (1927) 151.
- Gibbaeum Nelii*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. obtusum* Haw., *Mes. fissoides* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 273 (*Mes. obt.*); N.E.Br.M. 74 (*Mes. fissoides*); D.K.G. (1925/26) 165 (*Mes. fissoides*); S.G. (1928) 279 (*Mes. fissoides*); J.S. 133; J.S.P. 180. — (Es bestehen Zweifel, ob die heute in den Gärten verbreiteten *Gibbaeum Nelii* [meist als *Mes. obtusum* eingeführten Pflanzen] wirklich mit den Haworthschen Arten identisch sind.)
- Gibbaeum pachypodium*** (Kensit) L.Bol. — (*Mes. pachypodium* Kensit.). — S.-Afr., zwischen Muis Kraal und Ladismith. — Tr.R.S. I. 152 (*Mes. pachypod.*); F.R. XII. 322 (*Mes. pachypod.*); L.B. I. 152.
- Gibbaeum perviride*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. perviride* Haw.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 151; G.C. (1926, I) 234; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum perviride* var. *luteoviride* N.E.Br. = ***Gibbaeum luteoviride*** N.E.Br.
- Gibbaeum petrense*** (N.E.Br.) Tisch. — (*Argeta petrensis* N.E.Br.). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo, "on Bokkeveld shales". — G.C. (1927, II) 114 (*Argeta petr.*); S.G. (1929) 221 (*Arg. petr.*); D.K.G. (1929) 234 (*Arg. petr.*); M. 108 (*Arg. petr.*); D.K.G. (1937) 151.

- Gibbaeum pilosulum*** N.E.Br. — (*Mes. pilosulum* N.E.Br., *Conophytum pilosulum* N.E.Br.). — Kl.-Karoo in Ladismith Divis., bei Touwsberg Mountains, zwischen Hondewater und Warmbad. — N.E.Br.M. 98 (*Mes. pilos.*); G.C. (1922, I) 214 (*Con. pilos.*); G.C. (1925, I) 484; G.C. (1926, I) 234; D.K.G. (1927/28) 227.
- Gibbaeum pubescens*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. pubescens* Haw.). — Kl.-Karoo in Ladismith Divis., Hondsberg nahe Ladismith. — Tr.Ph.S. XVIII. 44 (*Mes. pubesc.*); G.C. (1922, I) 129; G.C. (1926, I) 234; D.K.G. (1927/28) 227; S.G. (1928) 318; L.B. I. 45; M. 222.
- Gibbaeum Schwantesii*** (N.E.Br.) Tisch. — (*Mentocalyx Muiri* N.E.Br., *Gibbaeum Muiri* [N.E.Br.] Schwant.). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — G.C. (1927, I) 252 (*Ment. Muiri*); J.S. 133 (*Gibb Muiri* Schw.); J.S.Pl. 180 (*Gibb. Muiri* Schw.); D.K.G. (1937) 152.
- Gibbaeum Shandii*** N.E.Br. — (*Mes. Shandii* N.E.Br.). — Swellendam Divis., Karroo bei Sevenfontein. — G.C. (1922, I) 129; G.C. (1926, I) 235; G.C. (1927, I) 430; D.K.G. (1927/28) 227; M. 223.
- Gibbaeum velutinum*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. velutinum* L.Bol., *Mentocalyx velutinus* N.E.Br., *Mentocalyx velutinus* Schwant.). — Kl.-Karoo; angeblich in der Nachbarschaft von Robertson. — A.B.H. III. 124 (*Mes. vel.*); D.K.G. (1927/28) 106, 227; D.K.G. (1929) 17 (*Ment. vel.*); M. 258 (*Ment. velutinus* N.E.Br.); B.M.J (1929) 57 (*Ment. vel.* N.E.Br.); D.K.G. (1932) 73; C.J. VI. 20; (*Ment. vel.*); D.K.G. (1927) 152, 163; D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

***Glottiphyllum* (Haw.) N.E.Br.**

- G.C. (1921, II) 311; D.K.G. (1925/26) 115; P.G.S.A.P. 243; G.C. (1927, II) 290, 348, 369; D.K.G. (1929) 105; v.P.M. 43; A. 215.
- Glottiphyllum angustum*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. angustum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1927, II) 327, 470; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. apiculatum*** N.E.Br. — Oudshoorn Divis., nahe Oudtshoorn. — G.C. (1927, II) 449; M. 224.
- Gl. arrectum*** N.E.Br. — Sevenfontein in Swellendam Divis. — G.C. (1922, I) 9; G.C. (1927, II) 390; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. carnosum*** N.E.Br. — Ladismith Divis., zwischen Plathuis und Touwsberg. — G.C. (1927, II) 490; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. compressum*** L.Bol. — Ladismith Divis., Kl.-Karoo Ebenhaezer, bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 249.
- Gl. concavum*** N.E.Br. — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1927, II) 450; D.K.G. (1929) 106
- Gl. cruciatum*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. cruciatum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 9; G.C. (1927, II) 409; D.K.G. (1929) 106.

- Gl. cultratum* N.E.Br. = *Gl. latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
Gl. Durisii L.Bol. — Ceres Divis., Ceres Carroo. — L.B. II. 403.
Gl. depressum (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. depressum* Haw., *Mes. longum* var. *declive* Haw., *Mes. linguiforme* var. *flaccidum* Bgr.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1921, II) 327; G.C. (1927, II) 510; D.K.G. (1929) 106.
Gl. difforme (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. difforme* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 22; G.C. (1927, II) 390; D.K.G. (1929) 106; S.G. (1930) 48.
Gl. erectum N.E.Br. — Victoria East Divis., nahe Alice. — G.C. (1927, II) 489; D.K.G. (1929) 106.
Gl. Fergusoniae L.Bol. — Kl.-Karoo. — L.B. II. 58; S.G. (1929) 144, 151.
Gl. fragrans (S.D.) Schwant. — (*Mes. fragrans* S.D., *Mes. linguiforme* L. var. *fragrans* Bgr.). — Kl.-Karoo in Ladismith Divis., Plathuis Region; Swellendam Divis., "on the Bokkeveld shales and in rock crevices at Koenie Kuilen". — B.Mag. 148. Tab 8937 (*Mes. frag.*); G.C. (1928, I) 13; D.K.G. (1939) 106; M. 226.
Gl. Framesii L.Bol. — Bredasdorp Divis., Honig Rug Farm. — L.B. II. 81.
Gl. grandiflorum (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. grandiflorum* Haw., *Mes. linguiforme* L. var. *grandiflorum* Bgr.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1921, II) 327; G.C. (1927, II) 489; D.K.G. (1929) 106.
Gl. Haagei Tisch. — Heimat?. — D.K.G. (1929) 106.
Gl. Herrei L.Bol. — Worcester Divis., bei Touw's River. — L.B. II. 403.
Gl. latifolium N.E.Br. — Kl.-Karoo, Ladismith Divis. — M. 228.
Gl. latum (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. linguiforme* var. *cultratum* subvar. *perviride* Salm., *Mes. linguiforme* var. *adscendens* Bgr., *Mes. adscendens* S.D., auch Haw., *Mes. linguiforme* L. var. *latum* S.D., *Mes. linguiforme* L. var. *obliquum* Bgr., *Mes. linguaeforme* Haw., *Mes. linguaeforme* var. *subcruciatum* Haw., *Mes. linguaeforme* var. *prostratum* Haw., *Mes. linguaeforme* var. *assurgens* Haw., *Mes. latum* Haw., *Mes. latum* var. *breve* Haw., *Mes. obliquum* Willd., *Mes. medium* Haw., *Glott. obliquum* N.E.Br.). — Riversdale Divis., Hügel nahe Riversdale; Mossel-Bay Divis., nahe Little Brak River. — N.E.Br.M. 132 (*Mes. medium*); G.C. (1921, II) 327; G.C. (1921, II) 336 (*Gl. obl.*); G.C. (1927, II) 509; D.K.G. (1929) 106, 107.
Gl. latum (S.D.) N.E.Br. var. *cultratum* Bgr. — (*Mes. depressum* S.D., *Mes. cultratum* S.D., *Mes. linguaeforme* S.D., *Mes. linguiforme* var. *declive* Bgr., *Mes. linguiforme* var. *depressum* Bgr., *Mes. linguiforme* var. *cultratum* Bgr., *Mes. longum* var. *flaccidum* Haw., *Mes. longum* Haw. (nach Dillen.), *Mes. longum* var. *declive* S.D., *Mes. lucidum* Haw., *Glott. cultratum* N.E.Br.). — G.C. (1921, II) 336 (*Gl. cul-*

- tratum*); G.C. (1927, II) 510; D.K.G. (1929) 106; D.K.G. (1929) 107: Notiz bei *Gl. longum* N.E.Br., betr. *Mes. lucidum* Haw. und *Mes. longum* var. *flaccidum* Haw.
- Gl. linguiforme*** (L.) N.E.Br. — (*Mes. linguiforme* L., *Mes. linguiforme* var. *scalpratum* Bgr., *Mes. scalpratum* Haw.). — S.-Afr., Fundort nicht angegeben. — G.C. (1921, II) 327; G.C. (1928, I) 13; D.K.G. (1929) 106; M. 230.
- Gl. longipes*** (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. cruciatum* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1927, II) 429; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. longum*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. longum* Haw., *Mes. longum* var. β , *Mes. linguiforme* S.D., *Mes. linguiforme* L. var. *pustulatum* Bgr., *Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr., *Mes. pustulatum* Haw., *Mes. pustulatum* var. *lividum* S.D., *Glott. pustulatum* N.E.Br.). — Port Elizabeth Divis., nahe Port Elizabeth. — G.C. (1921, II) 327 (*Gl. pust.*); G.C. (1922, I) 9; G.C. (1927, I) 470; G.C. (1927, II) 489 (*Gl. pust.*); D.K.G. (1929) 106—107.
- Gl. longum*** (Haw.) N.E.Br. var. *hamatum* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. angustum* var. *heterophyllum* Haw., *Mes. heterophyllum* Jackson). — Uitenhage Divis., nahe Uitenhage. — G.C. (1927, II) 471; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. Marlothii*** Schwant. — Uniondale Divis., Karroo, nahe Uniondale. — D.K.G. (1925 26) 242; G.C. (1927, II) 429; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. Muiri*** N.E.Br. — Riversdale Divis., Kl.-Karoo, nahe Montagu Baths. — G.C. (1927, II) 489; L.B. I. 49; S.G. (1928) 222.
- Gl. Neilii*** N.E.Br. — Prince Albert Divis., Karroo nahe Prince Albert. — G.C. (1928, II) 49; D.K.G. (1929) 106; S.G. (1929) 91; M. 232.
- Gl. Netli*** Schwant. — Willowmoore Divis. — M.D.G.Ztg. (1928) 92; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. ochraceum*** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. ochraceum* Bgr.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 234 (*Mes. ochr.*); G.C. (1922, I) 22; G.C. (1928, I) 49; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. oliocarpum*** L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Willowmoore. — L.B. II. 450.
- Gl. pallens*** L.Bol. — Jansenville Divis., zwischen Klipplaat und Mount Stewart. — L.B. II. 389.
- Gl. parvifolium*** L.Bol. — Kl.-Karoo, Ladismith Divis. (?). — L.B. II. 250.
- Gl. Peersii*** L.Bol. — Prince Albert Divis., zwischen Kl. Swarteberg und Klaarstrom. — L.B. II. 362.
- Gl. platycarpum*** L.Bol. — Riversdale Divis., Marthinus Kloof. — L.B. II. 81.
- Gl. praepingue*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. praepingue* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 9; G.C. (1927, II) 449; D.K.G. (1929) 106.

- Gl. proclive* (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. angustum* var. *heterophyllum* S.D., *Mes. linguiforme* var. *heterophyllum* Bgr.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1927, II) 470; S.G. (1928) 222.
- Gl. propinquum* N.E.Br. — Mossel Bay Divis., Reg. des Great Brak Fluß. — B.M.J. (1929) 57.
- Gl. pustulatum* N.E.Br. = *Gl. longum* N.E.Br.
- Gl. pygmaeum* L.Bol. — Jansenville Divis., bei Klipplaat. — L.B. II. 390.
- Gl. regium* N.E.Br. — Oudtshoorn Divis., nahe Gamka River. — G.C. (1928, I) 123; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. rubrostigma* L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — L.B. II. 72.
- Gl. rufescens* (Haw.) Tisch. — (*Mes. rufescens* Haw., *Mes. depressum* var. *lividum* Haw., *Mes. linguiforme* var. *rufescens* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G. (1929) 106—107.
- Gl. Salmii* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. Salmii* Haw., *Mes. Salmii* var. *semicruciatum* Haw., *Mes. Salmii* var. *decassatum* Haw.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 9; G.C. (1927, II) 429; D.K.G. (1929) 106, 108.
- Gl. semicylindricum* (Haw.) N.E.Br. (*Mes. semicylindricum* Haw., *Mes. bigibberatum* Haw., *Mes. bidentatum* Haw.). — Jansenville Divis., Mount Stewart. — N.E.Br M. 125 (*Mes. bident.*); G.C. (1922, I) 22; G.C. (1927, II) 409; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. Starkeae* L.Bol. — Uniondale Divis., Avontuur. — L.B. II. 404.
- Gl. suave* N.E.Br. — Kl.-Karoo in Ladismith Divis., nahe Plathuis. — G.C. (1928) I. 13; D.K.G. (1929) 106; M. 234.
- Gl. subditum* (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. praepingue* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1927, II) 409; D.K.G. (1929) 106.
- Gl. (?) surrectum* Haw. — S.G. (1928) 223. — Die Bezugnahme L.Bolus' auf G.C. (1928, I) 49 betrifft *Mesembryanthemum surrectum* Haw. (siehe Lit.-Angabe bei *Mes. surrectum* Haw.!).
- Gl. taurinum* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. taurinum* Haw., *Mes. depressum* var. *pallens* Haw., *Mes. angustum* Haw. var. *pallidum* Haw., *Mes. angustum* S.D., *Mes. linguiforme* var. *angustum* Bgr.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 9; G.C. (1927, II) 470; D.K.G. (1929) 107.
- Gl. uncatum* (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. uncatum* S.D., *Mes. longum* var. *uncatum* Haw., *Mes. longum* var. *attollens* Haw., *Mes. linguiforme* var. *uncatum* Bgr., *Mes. linguiforme* var. *attollens* Bgr.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1921, II) 336; G.C. (1927, II) 470; D.K.G. (1929) 107.
- Gl. uniondalense* L.Bol. — Uniondale Divis., Standort unbekannt. — L.B. II. 363.

***Gymnopoma* N.E.Br.**

G.C. (1928, I) 194; v.P.M. 44; A. 215.

Gymnopoma Tripolium N.E.Br. = *Skiaetophytum Tripolium* L.Bol.***Halenbergia* Dtr.**

D.K.G. (1937) 158.

Halenbergia hypertrophica Dtr. — (*Mes. hypertrophicum* Dtr.). — Sw.-Afr., Halenberg, an eingetrocknetem Salztümpel bei Warmbad, in ähnlicher Situation 60 km südl. Warmbad, auf dem Wege südl. ab bis fast zum Orange-Fluß. — D.S. I. 63 (*Mes. hypertr.*); D.S. II. 35, 36 (*Mes. hypertr.*); D.K.G. (1937) 158, 200.

***Henricia* L.Bol.**

L.B. III. 39.

Henricia Sibbettii L.Bol. — Orange Free State, Fauresmith Divis., Oorlog's Poort; Farm Pampoenpoort, 10 miles westl. Victoria West. — L.B. III. 39; D.K.G. (1937) 152, 153.

***Hereroa* Dtr. et Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 180; D.K.G. (1927/28) 14, 15, 23, 106; v.P.M. 44; A. 215.

Hereroa acuminata L.Bol. — Ladismith Divis. — L.B. II. 390.*Hereroa angustifolia* L.Bol. — Sw.-Afr., bei Aus. — L.B. II. 197.*Hereroa aspera* L.Bol. — Kl.-Karoo; Swellendam Divis., bei Barrydale. — L.B. II. 391.*Hereroa brevifolia* L.Bol. — Prince Albert Divis. — L.B. II. 116.*Hereroa calycina* L.Bol. — Queenstown Divis. — J.B. (1928) 200.*Hereroa cana* L.Bol. = *Bijlia cana* N.E.Br.*Hereroa concava* L.Bol. — Beaufort West Divis., auf steinigen Hügeln nahe Beaufort West. — J.B. (1928) 200.*Hereroa crassa* L.Bol. — Beaufort West Divis.; Laingsburg Divis., Whitehill bei Matjesfontein. — L.B. II. 363.*Hereroa dolabrisformis* L.Bol. = *Rhombophyllum dolabrisforme* Schwant.*Hereroa Dyeri* L.Bol. — Albany Divis., nahe Grahamstown. — L.B. I. 143; S.G. (1928) 126.*Hereroa fimbriata* L.Bol. — Prince Albert Divis., Abraham's Kraal, nahe Prince Albert; nahe Matjesfontein. — J.B. (1928) 198; S.G. (1930) 18.*Hereroa gracilis* L.Bol. — Kl.-Karoo. — L.B. II. 268.*Hereroa gracilis* L.Bol. var. *compressa* L.Bol. — Uniondale Divis. — L.B. II. 268.

- Hereroa granulata* (N.E.Br.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. granulatum* N.E.Br., *Mes. carinans* Bgr., *Bergeranthus granulatus* Schwant.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 66 (*Mes. granul.*); D.K.G. (1925/26) 180; D.K.G. (1927/28) 24.
- Hereroa Herrei* Schwant. — Graaff Reinet Divis. — D.K.G. (1927/28) 302.
- Hereroa hesperantha* (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. hesperanthum* Dtr., *Mes. Bergerianum* Dtr.). — Gr.-Namaland, bei Aus-Gubub. Ussis-Schlucht bei Kanus am Süden der Karasberge. — D.N.Pfl. 37 (*Mes. Berg.*); D.N.Pfl. 41 (*Mes. hesp.*); D.K.G. (1927/28) 24.
- Hereroa incurra* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 83.
- Hereroa Joubertii* L.Bol. — Laingsburg Divis., südl. Laingsburg. — L.B. II. 484.
- Hereroa latipetala* L.Bol. — Prince Albert Divis., Abraham's Kraal. — J.B. (1928) 199.
- Hereroa Muiri* L.Bol. — Swellendam Divis.; Kl.-Karoo. — S.G. (1927) 365.
- Hereroa Nelii* Schwant. — Ceres Divis., Karrooport bei Ceres. — D.K.G. (1929) 14.
- Hereroa Puttkameriana* (Bgr. et Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Puttkamerianum* Bgr. et Dtr., *Bergeranthus Puttkamerianus* Schwant.). — Gr.-Namaland, bei Aus, bei Karas. — D.N.Pfl. 242 (*Mes. Puttk.*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. Puttk.*); D.K.G. (1927/28) 24, 106.
- Hereroa Rehneltiana* (Bgr.) et Schwant. — (*Mes. Rehneltianum* Bgr., *Bergeranthus Rehneltianus* Schwant.). — B.M.P. 245 (*Mes. Rehnelt.*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. Rehnelt.*); D.K.G. (1927/28) 24.
- Hereroa Stanfordiae* L.Bol. — S.-Afr., bei Victoria West. — L.B. II. 485.
- Hereroa teretifolia* L.Bol. — Cape Prov., wahrscheinlich Calvinia oder Ceres Divis. — J.B. (1928) 229.
- Hereroa tenuifolia* L.Bol. — S.-Afr., zwischen Robertson und Barrydale. — L.B. II. 251.
- Hereroa Tugwelliae* L.Bol. = *Rijlia cana* N.E.Br.
- Hereroa willowmoreense* L.Bol. — S.-Afr., bei Willowmore. — L.B. II. 323.
- Hereroa Wilmanae* L.Bol. — Griqualand West, bei Dunmury. — L.B. II. 82.
- Hereroa Wilmanae* L.Bol. var. *langebergensts* L.Bol. — Griqualand West, Hay Distr., Langeberg. — L.B. II. 82.

***Herrea* Schwant.**

M.D.G.Ztg. (1927) 436; M.D.G.Ztg. (1928) 166; M.D.G.Ztg. (1928) 238, 401; v.P.M. 44; L.B. II. 233; M.J.B.H. 163.

Herrea Nelii Schwant. — M.J.B.H. 163.

***Herreanthus* Schwant.**

Gw. (1928) 514; v.P.M. 54; A. 220.

Herreanthus Meyeri Schwant. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf. — Gw. (1928) 37.

***Hydrodea* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 412; G.C. (1928, II) 268; v.P.M. 45; A. 215; D.K.G. (1937) 137, 200.

Hydrodea Bossiana Dtr. — Sw.-Afr., Swakopmund. — D.K.G. (1937) 158.

Hydrodea cryptantha (Hook.f.) N.E.Br. — (*Mes. cryptanthum* Hook.f.). — Insel St. Helena. — G.C. (1928, II) 268.

Hydrodea Hampdenii N.E.Br. = *Hydrodea sarcocalycantha* Dtr.

Hydrodea sarcocalycantha (Dtr. et Bgr.) Dtr. — (*Mes. sarcocalycanthum* Dtr. et Bgr., *Hydrodea Hampdenii* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Lüderitzbucht, Klinghardtgebirge, Vley 4 km östl. der Buchberge, Bogenfels. — F.R. XIX. 192 (*Mes. sarc.*); G.C. (1928, I) 268 (*Hydr. Hampd.*); D.K.G. (1937) 157, 158, 200; D.K.G. (1938) 44.

***Hymenocyclus* Dtr. et Schwant.**

M.D.G.Ztg. (1927) 27; D.K.G. (1927/28) 14, 16, 106; M.D.G.Ztg. (1928) 7; v.P.M. 46; A. 220; F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hymenocyclus crassus L.Bol. — Ceres Divis., Karroopoort, nahe des Weges nach Sutherland. — L.B. II. 363.

Hym. croceus (Jacq.) Schwant. — (*Mes. croceus* Jacq., *Mes. insititum* Willd., *Malephora crocea* Schwant., *Crocanthus croceus* L.Bol.). — Fraserburg Divis., nahe Fraserburg, zwischen Karroo River und Klein Quaggas Fontein. — M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. croc.*); M.D.G.Ztg. (1927) 27; M.D.G.Ztg. (1928) 7 (*Maleph. croc.*); Fl.Pl. VII. Pl. 255 (*Croc. croc.*); F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hym. Englerianus (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Englerianum* Dtr. et Bgr., *Mes. Vernae* Dtr. et Bgr., *Malephora Engleriana* Schwant.). — Gr.-Namaland, Bastardland, Büllsporter Fläche. — D.N.Pl. 40 (*Mes. Englerianum*); D.K.G. (1927/28) 16; M.D.G.Ztg. (1927) 27; M.D.G.Ztg. (1928) 7 (*Mal. Engl.*); F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hym. flavocroceus (Haw.) Schwant. — (*Mes. flavocroceum* Haw., *Mes. purpureocroceum* var. *flavocroceum* Haw., *Mes. croceum* var. *flavocroceum* D.C.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 128 (*Mes. flavocr.*); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

Hym. Framesii L.Bol. — Piquetberg Divis., St. Helena Bay. — L.B. II. 58.

Hym. Herrei Schwant. — (*Malephora Herrei* Schwant.). — S.-Afr. — M.D.G.Ztg. (1927) 27; M.D.G.Ztg. (1928) 7 (*Maleph. Herrei*); F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hym. latipetalus L.Bol. — Oudtshoorn Divis., bei Calitzdorp. — L.B. II. 118.

Hym. luteus (Haw.) Schwant. — (*Mes. luteum* Haw., *Malephora lutea* Schwant.). — S.-Afr. — B.M.P. 174 (*Mes. luteum*); M.D.G.Ztg. (1927) 27; M.D.G.Ztg. (1928) 7; F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hym. luteolus (Haw.) Schwant. — (*Mes. luteolum* Haw., *Malephora lutea* Schwant., *Crocanthus luteus* L.Bol.). — S.-Afr. — M.D.G.Ztg. (1927) 27; M.D.G.Ztg. (1928) 7 (*Maleph. luteola*); Fl.Pl. VII. Pl. 255 (*Croc. luteolus*); F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hym. purpureo-croceus (Haw.) L.Bol. — (*Mes. purpureo-croceum* Haw., *Malephora purpureo-crocea* Schwant., *Crocanthus purpureo-croceus* L.Bol.). — S.-Afr. — L.B. I. 133; Fl.Pl. VII. Pl. 255 (*Croc. purpureo-croc.*); Gfl. (1928) 69 (*Maleph. purpureo-croc.*); F.R. XLIII. 231; D.K.G. (1938) 43.

Hym. Smithii L.Bol. — Orange Free State, nahe Fauresmith. — S.G. (1927) 399; L.B. I. 84, 132.

Hym. Thunbergii (Haw.) L.Bol. — (*Mes. Thunbergii* Haw., *Mes. laeve* Thbg., *Corpuscularia Thunbergii* Schwant., *Crocanthus Thunbergii* L.Bol., *Malephora Thunbergii* Schwant.). — In den folgenden Divis. der Cape Prov.: Graaff Reinet, Cradock, Albany, Riversdale, Van Rhynsdorp; Uitenhage Divis., nahe Sunday's River. — N.E.Br.M. 106 (*Mes. Thunb.*); D.K.G. (1925/26) 186 (*Corp. Thunb.*); L.B. I. 133; Fl.Pl. VII. Pl. 255 (*Croc. Thunb.*); Gfl. (1928) 69 (*Maleph. Thunb.*); D.K.G. (1929) 36; F.R. XLIII. 232; D.K.G. (1938) 43.

Hym. uitenhagensis L.Bol. — (Fortasse idem cum *Mes. verruculoides* var. *minus* Sond.). — Uitenhage Divis. — L.B. II. 119.

Hym. verruculoides (Sond.) L.Bol. — (*Mes. verruculoides* Sond., *Malephora verruculoides* Schwant.). — Kapland, am Tafelberg, Hantams Berge, Zwartkops River. — B.M.P. 127 (*Mes. verrucul.*); L.B. I. 133; Gfl. (1928) 69 (*Maleph. verrucul.*); F.R. XLIII. 232; D.K.G. (1938) 43.

Hymenogyne (Haw.) N.E.Br.

P.G.S.A.P. 246; G.C. (1928, II) 253; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 46.

Hymenogyne glabra (Ait.) Haw. — (*Mes. glabrum* Ait.). — S.-Afr. — S.G. (1927) 434; G.C. (1928, II) 253; L.B. I. 15.

Hymenogyne Stephensiae (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. pomeridianum* L.Bol.). — G.C. (1928, II) 253.

***Imitaria* N.E.Br.**

J.B. (1927) 348; v.P.M. 46; A. 215.

Imitaria Muiri N.E.Br. = *Gibbaeum Nebrownii* Tisch.

***Juttadinteria* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 182; D.K.G. (1927/28) 30, 105; v.P.M. 46; A. 215.

Juttadinteria albata L.Bol. — Sw.-Afr. — S.G. (1928) 249.

Jutt. ausensis (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. ausense* L.Bol.). — Sw.-Afr., Aus. — A.B.H. III. 123 (*Mes. aus.*); D.K.G. (1925/26) 183; S.G. (1928) 249.

Jutt. cinerea Schwant. = *Namibia cinerea* Dtr. et Schwant.

Jutt. dealbata (N.E.Br.) L.Bol. — (*Mes. dealbatum* L.Bol.). — Sw.-Afr. — S.G. (1928) 249.

Jutt. decumbens Schick et Tisch. — Kl.-Namaland, bei Dünvley. — D.K.G. (1933) 48.

Jutt. Delaetianus Dtr. et Schwant. = *Dracophilus Delaetianus* Dtr. et Schwant.

Jutt. deserticola (Marl.) Schwant. — (*Mes. deserticolum* Marl.). — Gr.-Namaland, Angra Pequena bei Lüderitzbucht. — Tr.R.S. II. 34 (*Mes. desert.*); D.K.G. (1929) 56 (*Mes. desert.*); D.K.G. (1925/26) 183.

Jutt. Elizae (Dtr. et Bgr.) L.Bol. — (*Mes. Elizae* Dtr. et Bgr.). — S.-Afr. — S.G. (1928) 249.

Jutt. insolita L.Bol. — (*Mes. insolitum* L.Bol.). — Kap-Prov., South Western Reg., karroide Hügel zwischen Dun Vley und Groot Derm. — A.B.H. IV. 75 (*Mes. ins.*); S.G. (1928) 249.

Jutt. kovisimontana Dtr. — (*Mes. kovisimontanum* Dtr.). — Gr.-Namaland, Kavisberge, ca. 25 km östl. Lüderitzbucht. — D.B.F. XIX. 135 (*Mes. kovis.*); D.K.G. (1925/26) 183; D.K.G. (1927/28) 105.

Jutt. longipetala L.Bol. — Sw.-Afr., bei Halenberg. — L.B. II. 12; S.G. (1928) 250.

Jutt. Montis-Draconis Dtr. et Schwant. = *Dracophilus Montis-Draconis* Dtr. et Schwant.

Jutt. Pomonae Schwant. = *Namibia Pomonae* Dtr. et Schwant.

Jutt. proxima L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlingsdrift. — Fl.Pl. VII. Pl. 273.

Jutt. rheolens L.Bol. — Fl.Pl. VII. Pl. 273.

Jutt. Simpsonii (Dtr.) Schwant. — (*Mes. Simpsonii* Dtr.). — Gr.-Namaland, bei Halenberg. — D.B.F. XIX. 134 (*Mes. Simps.*); D.K.G. (1925/26) 183.

Jutt. suavissima (Dtr.) Schwant. — (*Mes. suavissimum* Dtr.). — Gr.-Namaland, östl. Pomona bei Alicetal, am Bocksberg südöstl. von Pomona. — D.B.F. XIX. 138 (*Mes. suav.*); D.K.G. (1925/26) 183.

Jutt. tetrasepala L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Swartwater.
— L.B. II. 343.

Jutt. Tugwellia Schwant. = **Bijlia cana** N.E.Br.

Khadia N.E.Br.

G.C. (1931, I) 279; v.P.M. 47; L.B. III. 7; A. 215.

Khadia acutipetala N.E.Br. — (*Mes. acutipetalum* N.E.Br.). — Transvaal, nahe Johannesburg. — M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. acut.*); G.C. (1931, I) 279; L.B. III. 8.

Khadia Beswickii (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Beswickii* L.Bol.). — Transvaal, nahe Johannesburg. — A.B.H. III. 124 (*Mes. Besw.*); G.C. (1931, I) 279; L.B. III. 9.

Khadia borealis L.Bol. — Transvaal, Zoutpansberg, auf der Farm Ventersdorp. — L.B. III. 6.

Khadia carolinensis L.Bol. — (*Mes. carolinense* L.Bol.; *Nananthus albipunctus* L.Bol., *Rabiea carolinensis* N.E.Br.). — Transvaal, Carolina. — A.B.H. III. 128 (*Mes. carol.*); M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. carol.*); G.C. (1931, I) 53; L.B. III. 6, 10.

Khadia Nationae N.E.Br. — (*Mes. Nationae* N.E.Br.). — Transvaal, nahe Rustenberg (wahrscheinlich). — M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. Nat.*); G.C. (1931, I) 279.

Khadia Nelsoni N.E.Br. — Transvaal, Witte Koppies und nahe Boksburg. — G.C. (1931, I) 279.

Lampranthus N.E.Br.

G.C. (1931, I) 71, 211; v.P.M. 47; A. 216.

Lampranthus acutifolius (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. acutifolium* L.Bol.). — Malmesbury Divis., „in monte Riebeeck's Kasteel“. — L.B. II. 59 (*Mes. acutifol.*); G.C. (1930, I) 211.

Lampr. aduncus (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. aduncum* Haw.). — S.-Afr., Lions mountains. — B.M.P. 143 (*Mes. aduncum*); G.C. (1930, I) 211.

Lampr. altistylus (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. longistylum* L.Bol.). — Malmesbury Divis., Ebene zwischen Cape Town und Kalabas Kraal. — L.B. II. 2 (*Mes. longistylus*); G.C. (1930, I) 211.

Lampr. amoenus (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. amoenum* S.D.). — S.-Afr., Saldanha Bay. — B.M.P. 161 (*Mes. amoenum*); G.C. (1930, I) 211.

Lampr. aurantiacus (D.C.) Schwant. — (*Mes. aurantiacum* D.C., *Mes. aurantiacum* Haw.). — Kapland, auf sandigen Stellen der Cape Flats, Rietvalley, etc. — B.M.F. 166 (*Mes. aur.*); F.R. XI.III. 229; D.K.G. (1938) 42.

Lampr. aureus (L.) N.E.Br. — (*Mes. aureum* L.). — S.-Afr., sandige Stellen der Saldanha Bay. — B.M.P. 165 (*Mes. aureum*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. aurcum*, *Sekt. Aurea*); G.C. (1930, I) 211.

- Lampr. bicolorus* (L.) N.E.Br. — (*Mes. bicolorum* L.). — S.-Afr., sandige Ebene bei Cape Town, an den Hängen des Tafelberges, bei Brakfontein. — B.M.P. 152 (*Mes. bicol.*); G.C. (1930, I) 211.
- Lampr. bicolorus* (L.) N.E.Br. var. *inaequalis* (Haw.) Schwant. — (*Mes. bicolorum* L. var. *inaequale* Haw.). — S.-Afr., sandige Ebenen bei Cape Town, an den Hängen des Tafelberges, bei Brakfontein. — B.M.P. 152 (*Mes. bicol.* v. *inaeq.*).
- Lampr. blandus* (Haw.) Schwant. — (*Mes. blandum* Haw.). — Bathurst Divis., nahe Barville. — B.M.P. 162 (*Mes. bland.*); N.E.Br.M. 125 (*Mes. bland.*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. brachyandrus* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. brachyandrum* L.Bol.). — Kl.-Namaland. zwischen Oograbis Poort und Port Nolloth. — L.B. II. 3 (*Mes. brachyandrum*); G.C. (1930, I) 211.
- Lampr. Brownii* (Hook.f.) N.E.Br. — (*Mes. Brownii* Hook.f.). — S.-Afr. — B.M.P. 148 (*Mes. Brownii*); G.C. (1930, I) 211.
- Lampr. caespitosus* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. caespitosum* L.Bol.). — Paarl. Divis., nahe Paarl. — A.B.H III. 4 (*Mes. caesp.*); G.C. (1930, I) 211.
- Lampr. caespitosus* (L.Bol.) N.E.Br. var. *luxurians* L.Bol. — (*Mes. caespitosum* L.Bol. var. *luxurians* L.Bol.). — Worcester Divis., Veld Reserve bei Worcester — L.B. II. 487. (*Mes. caesp.* var. *lux.*).
- Lampr. calcaratus* (Wolley-Dod) N.E.Br. — (*Mes. calcaratum* Wolley-Dod.). — G.C. (1930, I) 211.
- Lampr. capillaceus* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. capillaceum* L.Bol.). — S.-Afr., nahe Tulbagh. — L.B. I. 137 (*Mes. capillaceum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. coccineus* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. coccineum* Haw.). — S.-Afr., sandige Stellen um Cape Town, Saldanha Bay. — B.M.P. 150 (*Mes. coccineum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Comptonii* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Comptonii* L.Bol.). — South Western Reg., Klaver. — A.B.H III. 162 (*Mes. Comptonii*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Comptonii* (L.Bol.) N.E.Br. var. *angustifolius* L.Bol. — (*Mes. Comptonii* L.Bol. var. *angustifolium* L.Bol.). — Kl.-Namaland bei Steinkopf. — L.B. II. 409 (*Mes. Compl.* v. *ang.*).
- Lampr. Comptonii* (L.Bol.) N.E.Br. var. *roseum* L.Bol. — (*Mes. Comptonii* L.Bol. var. *roseum* L.Bol.). — S.-Afr., bei Clanwilliam. — L.B. II. 409 (*Mes. Compl.* v. *roseum*).
- Lampr. conspicuus* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. conspicuum* Haw.). — S.-Afr., Saldanha Bay. — B.M.P. 159 (*Mes. consp.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. coralliflorus* N.E.Br. = *Erepsia coralliflora* Schwant.
- Lampr. curviflorus* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. curviflorum* Haw., *Mes. blandum* Haw. var. *curviflorum* [Haw.] Bgr.). — S.-Afr., bei Wor-

- cester. — B.M.P. 163 (*Mes. blandum* v. *curvifl.*); D.K.G. (1927/28) 27 (*Mes. curvifl.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. cyathiformis* N.E.Br. = *Erepsia cyathiformis* Schwant.
- Lampr. debilis* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. debile* Haw.). — S.-Afr., — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. deflexus* (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. deflexum* Ait.). — S.-Afr., nahe Milnerton, einige miles von Cape Town. — L.B. I. 104 (*Mes. defl.*); S.G. (1928) 16 (*Mes. defl.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Degreanus* (Sond.) N.E.Br. — (*Mes. Degreanum* Sond.). — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. depranophyllum* (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. depranophyllum* Bgr.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. diffusum* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. diffusum* L.Bol.). — S.-Afr., nahe Ceres. — L.B. I. 137 (*Mes. diffusum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. dilutum* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. pallidum* L.Bol.). — Piquetberg Divis., bei Porterville. — L.B. II. 119 (*Mes. pallidum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. disgregus* N.E.Br. = *Erepsia stipulacea* Schwant.
- Lampr. diutinum* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. diutinum* L.Bol.). — Riversdale Divis. — A.B.H. III. 167 (*Mes. diutinum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Dyckii* (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. Dyckii* Bgr., *Mes. conspicuum* S.D. et Bgr.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. elegans* (Jacq.) Schwant. — (*Mes. elegans* Jacq., *Mes. retroflexum* Haw.). — Kapland, verbreitet auf sandigen und felsigen Orten, auch in Worcester Divis. und Uitenhage Divis., Signal Hill, nahe Cape Town. — B.M.P. 148 (*Mes. eleg.*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. eleg.* Sekt. *Scabrida*); S.G. (1928) 16 (*Mes. eleg.*); L.B. I. 104 (*Mes. eleg.*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. emarginatoides* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. emarginatoides* Haw.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. emarginatus* (L.) N.E.Br. — (*Mes. emarginatum* L. *Mes. violaceum* Haw., *Mes. polyphyllum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 146. (*Mes. emarg.*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. emarg.* Sekt. *Scabrida*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. emarginatus* (L.) N.E.Br. var. *puniceus* (Jacq.) Schwant. — (*Mes. emarginatum* L. var. *puniceum* Jacq.). — B.M.P. 147 (*Mes.*).
- Lampr. erratus* (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. virens* S.D.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. explanatus* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. explanatum* L.Bol.). — South Western Reg., Cape Flats., Cape Peninsula, Abhänge bei Muizenburg, an der Seeseite. — A.B.H. III. 166 (*Mes. expl.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. falcatus* (L.) N.E.Br. — (*Mes. falcatum* L.). — S.-Afr., bei Cape Town. — B.M.P. 188 (*Mes. falcatum*); G.C. (1930, I) 212.

- Lampr. falcatus** (L.) N.E.Br. var. **Galpinii** L.Bol. — (*Mes. falcatum* L. var. *Galpinii* L.Bol.) — Bredasdorp Divis., Berge bei Bredasdorp. — **L.B. II. 234** (*Mes. falc. v. Galp.*).
- Lampr. falciformis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. falciforme* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 187 (*Mes. falciforme*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. filicaulis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. filicaule* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 143 (*Mes. filicaule*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. flexifolius** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. flexifolium* Haw.). — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. flexilis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. flexile* Haw.). — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. formosus** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. formosum* Haw.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 212 (*Mes. formosum*, Sekt. *Amoena*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Framesii** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Framesii* L.Bol.). — Caledon Divis., zwischen Hermanus und Bredasdorp. — **L.B. I. 137**. (*Mes. Framesii*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. furcus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. furvum* L.Bol.). — Caledon Divis., nahe Gordon's Bay. — **L.B. I. 134** (*Mes. furvum*); S.G. (1928) 16 (*Mes. furvum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. glaucoides** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. glaucoides* Haw.). — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. glaucus** (L.) N.E.Br. — (*Mes. glaucum* L.). — S.-Afr. — B.M.P. 164 (*Mes. glaucum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. glaucus** (L.) N.E.Br. var. **tortuosum** (Haw.) Schwant. — (*Mes. glaucum* L. var. *tortuosum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 165 (*Mes. glaucum v. tort.*).
- Lampr. glomeratus** (L.) N.E.Br. — (*Mes. glomeratum* L., *Mes. inflexum* Haw.). — S.-Afr., um Cape Town, am Tafelberg, Lionsmountains, bei Tulbagh. — B.M.P. 145 (*Mes. glomeratum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. gracilipes** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. gracilipes* L.Bol.). — Piquetberg Divis., Grey's Paß. — **L.B. II. 73, 236** (*Mes. gracilipes*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Guthrieae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Guthrieae* L.Bol.). — Ceres Divis., angeblich Ceres Karroo. — **A.B.H. IV. 101** (*Mes. Guthr.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Haworthii* N.E.Br. = *Erepsia Haworthii* Schwant.
- Lampr. Henricii** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Henricii* L.Bol.). — Clanwilliam Divis, Karroo Reg., Witteberg nahe Matjesfontein, Kondeberg nahe Wupperthal. — **A.B.H. III. 168** (*Mes. Henricii*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. imbricans** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. imbricans* Haw.). — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.

- Lampr. Immelmaniae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Immelmaniae* L.Bol. — Piquetberg Divis. — L.B. I. 136 (*Mes. Immelm.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. inaequalis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. inaequale* Haw.), — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. inconspicuus** (Haw.) Schwant. — (*Mes. inconspicuum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 144 (*Mes. inconsp.*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. incurvus** (Willd.) Schwant. — (*Mes. roseum* Willd. var. *confertum* Salm., *Mes. incurvum* Haw.). — S.-Afr., am Tafelberg. — B.M.P. 186 (*Mes. ros. v. conf.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. laxifolius** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. laxifolium* L.Bol.). — Riversdale Divis., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 86 (*Mes. laxifol.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. leptaleon** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. leptaleon* Haw.). — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Lerouxiae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Lerouxiae* L.Bol.). — Namaland, Nababeep. — A.B.H. III. 170 (*Mes. Lerouxiae*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. longistamineus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. longistamineum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Boontjes Fluß, nahe Pakhuis-Paß. — L.B. I. 148 (*Mes. longist.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. lunatus** (Willd.) N.E.Br. — (*Mes. lunatum* Willd.). — Clanwilliam Divis. — B.M.P. 187 (*Mes. lunatum*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. lunatum*, Sekt. *Falcata*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. macrocarpus** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. macrocarpum* Bgr.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. magnificus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. magnificum* L.Bol.). — Malmesbury Divis. — A.B.H. IV. 93 (*Mes. magnificum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. marcidulus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. flaccidum* L.Bol.). — Montagu Divis., offenes Veld zwischen Montagu und Montagu Baths. — A.B.H. III. 164 (*Mes. flaccidum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. maturus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. praecox* L.Bol.). — Paarl Divis., bei Klapmuts. — L.B. II. 3 (*Mes. praecox*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. microstigma** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. microstigmum* L.Bol.). — Piquetberg Divis.?. — L.B. II. 142 (*Mes. microstigmum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. multiradiatus** (Jacq.) N.E.Br. — (*Mes. multiradiatum* Jacq.) — S.-Afr. — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. multiseriatum** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. multiseriatum* L.Bol.) — Riversdale Divis., Ou'tyn, nahe Albertina. — A.B.H. IV. 128 (*Mes. multiseriatum*); G.C. (1930, I) 212.

- Lampr. mutans** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. mutans* L.Bol.). — Humansdorp Divis., Zuurbron, 240 m. — L.B. II. 18 (*Mes. mutans*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. pauciflorus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. pauciflorum* L.Bol.). — Knysna Divis., „on rocky ledges and stony screes of cliffs“, Noetzie. — A.B.H. IV. 90 (*Mes. pauciflorum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. paucifolius** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. paucifolium* L.Bol.). — Calvinia Divis., Nicuwoudtville. — L.B. I. 138 (*Mes. paucifolium*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Peersii** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Peersii* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Graaff Water. — A.B.H. III. 131 (*Mes. Peersii*) G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. perspicuus** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. perspicuum* Bgr.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Pittenii** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Pittenii* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Lambert's Bay. — L.B. II. 98 (*Mes. Pittenii*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. plautus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. latum* L.Bol.). — Kl.-Namaaland, zwischen Khamies Kroon und Springbok. — L.B. II. 141 (*Mes. latum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Pocockiae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Pocockiae* L.Bol.). — Prince Albert Divis., Swartberg. — A.B.H. IV. 80 (*Mes. Pocockiae*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. polyanthou** (L.) N.E.Br. — (*Mes. polyanthum* L.). — B.M.P. 146 (*Mes. polyanthum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. productus** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. productum* Haw.). — S.Afr., Uitenhage Divis., Albany Divis., auf Hügeln im Karroogebiet. — B.M.P. 158 (*Mes. productum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. productum** (Haw.) N.E.Br. var. **lepidum** (S.D.) Schwant. — (*Mes. productum* Haw. var. *lepidum* S.D., *Mes. lepidum* Haw.). — S.-Afr., nahe Cape Town. — B.M.P. 158 (*Mes. prod. v. lepid.*); M.D.G.Ztg. (1928) 168, 238, 401 (siehe *Mes. Stephani*!).
- Lampr. productum** (Haw.) N.E.Br. var. **purpureum** L.Bol. — (*Mes. productum* Haw. var. *purpureum* L.Bol.). — Albany Divis., Peddie Road, 25 miles von Grahamstown. — L.B. II. 43 (*Mes. prod. v. purg.*).
- Lampr. Promontorii** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Promontorii* L.Bol.). — Cape Peninsula, Hügel nahe Glencair und Abhänge nahe der See am Cape Point. — A.B.H. IV. 10 (*Mes. Promont.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. reptans** (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. reptans* Ait., *Mes. crassifolium* Thbg.). — S.-Afr., nahe Cape Town, Zoutriver und im Zwartland. — B.M.P. 134 (*Mes. reptans*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. roseus** (Willd.) Schwant. — (*Mes. roseum* Willd., *Mes. incurvum* Haw. var. *roseum* D.C.). — S.-Afr. — B.M.P. 185 (*Mes.*

- roseum*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. roseum*, Sekt. *Falcata*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. rupestris** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. rupestre* L.Bol.). — Malmesbury Divis., Paradeberg. — L.B. I. 134 (*Mes. rupestre*); S.G. (1928) 16 (*Mes. rupestre*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Rustii** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. Rustii* Bgr.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. saturatus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. saturatum* L.Bol.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt, wahrscheinlich Van Rhynsdorp Divis. — A.B.H. III. 169 (*Mes. saturatum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. scaber** (L.) N.E.Br. — (*Mes. scabrum* L.). — S.-Afr., am Tafelberg, Lionsmountains. — B.M.P. 147 (*Mes. scabrum*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. scabrum*, Sekt. *Scabrida*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. sociorus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. sociorum* L.Bol.). — S.-Afr., Darling, nahe Tulbagh, Riversdale. — A.B.H. III. 132 (*Mes. sociorum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. spectabilis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. spectabile* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 161 (*Mes. spectabile*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. spiniformis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. spiniforme* Haw.). — S.-Afr., Lionmountains. — B.M.P. 140 (*Mes. spiniforme*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Stayneri** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Stayneri* L.Bol.). — S.-Afr., South Western Reg., Bedford. — A.B.H. IV. 6 (*Mes. Stayneri*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. stenopetalus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. stenopetalum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Graafwater. — A.B.H. IV. 10 (*Mes. stenop.*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. stenus** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. stenum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 153 (*Mes. stenum*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. stenum*, Sekt. *Tenuifolia*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Stephanii** Schwant. — (*Mes. Stephanii* Schwant.). — (N. E. Brown hielt diese Art für *Mes. productum* Haw. var. *lepidum* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — M.D.G.Ztg. (1928) 166, 238, 401 (*Mes. Steph.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. stipulaceus** N.E.Br. = *Erepsia stipulacea* Schwant.
- Lampr. swartbergensis** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. swartbergense* L.Bol.). — Prince Albert Divis., Swartbergen. — L.B. I. 137 (*Mes. swartbergense*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. tegens** (F.Muell.) N.E.Br. — (*Mes. tegens* F.Muell.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. tenuifolius** (L.) Schwant. — (*Mes. tenuifolium* L.). — S.-Afr. — D.K.G. (1927/28) 27, 106 (*Mes. tenuifol.*); F.R. XLIII 230; D.K.G. (1938) 42.

- Lampr. tenuis** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. tenue* L.Bol.). — S.-Afr., bei Caledon. — L.B. II. 1 (*Mes. tenue*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. tulbaghensis** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. tulbaghense* L.Bol.). — Tulbagh Divis., nahe des Weges zwischen Tulbagh und Tulbagh Road. — L.B. II. 364 (*Mes. tulbaghense*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. turbinatus** (Jacq.) N.E.Br. — (*Mes. turbinatum* Jacq.). — S.-Afr. — B.M.P. 164 (*Mes. turbinatum*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Mes. turbinatum*, Sekt. *Blanda*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. vallis-gratie** (Schltr. et Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. vallis-gratie* Schltr. et Bgr.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Vanziyliae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Vanziyliae* L.Bol.). — S.-Afr., Worcester. — A.B.H. III. 126 (*Mes. Vanziyliae*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. variabilis** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. variabile* Haw.). — S.-Afr., Küste der Saldanha Bay. — B.M.P. 130 (*Mes. variabile*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. verecundus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. verecundum* L.Bol.). — Riversdale Divis. — L.B. I. 134 (*Mes. verecundum*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. viatorus** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. viatorium* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Bitterfontein und Stinkfontein. — A.B.H. III. 136 (*Mes. viatorium*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. violaceus** (D.C.) Schwant. — (*Mes. violaceum* D.C.). — S.-Afr., Cape Peninsula. — L.B. I. 104 (*Mes. violac.*); S.G. (1927) 16 (*Mes. violac.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Lampr. Watermeyeri** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Watermeyeri* L.Bol.). — G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Woodburniae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Woodburniae* L.Bol.). — S.-Afr., Hex River-Valley (Flußtal). — L.B. II. 1 (*Mes. Woodburniae*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Wordsworthiae** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. Wordsworthiae* L.Bol.). — Caledon Divis., Sir Lowry's Paß. — A.B.H. III. 126 (*Mes. Wordsworthiae*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. Zeyheri** (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. Zeyheri* S.D.). — S.-Afr., Zwartkops-Fluß. — B.M.P. 157 (*Mes. Zeyheri*); G.C. (1930, I) 212.
- Lampr. zygophylloides** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. zygophylloides* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Pakhuis Paß. — A.B.H. IV. 89 (*Mes. zygophylloides*); G.C. (1930, I) 212.

Lapidaria Schwant.

(*Dinteranthus* subgen. *Lapidaria* Dtr. et Schwant.). — M.D.G.Ztg. (1927) 223; G.C. (1928, II) 472, 492; A. 216

Lapidaria Margaretae Dtr. et Schwant. — (*Mes. Margaretae* Schwant., *Argyroderma roseatum* N.E.Br., *Argyroderma Margaretae*

N.E.Br., *Dinteranthus Margaretae* Schwant.). — Gr.-Namaland, Warmbad. — D.K.G. (1919) 55 (*Mes. Margaretae*); G.C. (1922, I) 105 (*Arg. roseatum*); G.C. (1926, I) 268 (*Arg. Marg.*); D.K.G. (1925/26) 184 (*Dint. Marg.*); M.D.G.Ztg. (1927) 150 (*Dint. Marg.*); M.D.G.Ztg. (1927) 223; D.K.G. (1927/28) 347 (*Dint. Marg.*); G.C. (1928, II) 492; S.G. (1929) 288; L.B. I. 41 (*Dint. Marg.*); M. 240 (*Dint. Marg.*).

Leipoldtia L.Bol.

Fl.Pl. VII. Pl. 256; G.C. (1930, I) 72; v.P.M. 48; A. 216.

Leipoldtia amplexicaulis L.Bol. — (*Mes. amplexicaule* L.Bol.). — Clanwilliam und Calvinia Divis. — A.B.H. III. 164 (*Mes. ampl.*); Fl.Pl. VII. Pl. 256.

Leip. brevifolia L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — L.B. II. 139.

Leip. Britteniae L.Bol. — (*Mes. Britteniae* L.Bol. — Cape Prov., South Eastern Reg., nahe Grahamstown. — A.B.H. III. 132 (*Mes. Britt.*); L.B. II. 11.

Leip. calandra L.Bol. — (*Mes. calandrum* L.Bol.). — L.B. II. 11.

Leip. compacta L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Oograbies Poort. — A.B.H. IV. 129.

Leip. compressa L.Bol. — Kl.-Namaland, Meselpaad zwischen Springbok und Valle Kraal. — L.B. II. 188.

Leip. constricta L.Bol. — (*Mes. constrictum* L.Bol.). — Cape Prov., wahrscheinlich Clanwilliam und Calvinia Divis. — A.B.H. IV. 11 (*Mes. constr.*); Fl.Pl. VII. Pl. 256.

Leip. Framesii L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — L.B. II. 140.

Leip. klaverensis L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., am linken Ufer des Olifantflusses bei Klaver. — L.B. III. 53.

Leip. laxa L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. II. 11.

Leip. Nelii L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. III. 54.

Leip. pauciflora L.Bol. — Calvinia Divis., bei Pofadder. — L.B. II. 302.

Leip. plana L.Bol. — (*Mes. planum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — A.B.H. IV. 12 (*Mes. planum*); Fl.Pl. VII. 260.

Leip. rosea L.Bol. — S.-Afr., zwischen Calvinia und Nieuwoudtsville. — L.B. II. 13.

Leip. uniflora L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Port Nolloth und Holgat. — J.B. (1928) 13.

Leip. Weigangiana (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Weigangianum* Dtr., *Cephalophyllum Weigangianum* Dtr. et Schwant., *Rhopalocyclus Weigangianus* Dtr. et Schwant.). — Gr. Namaland, 4 km

nördl. Aus. — D.B.F. XIX. 131 (*Mes. Weig.*); Gfl. (1928) 69 (*Ceph. Weig.*); Gw. (1928) 599 (*Rhop. Weig.*); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 226.

Lithops N.E.Br.

- G.C. (1922, I) 44; D.K.G. (1925/26) 117; P.G.S.A.P. 242; M.Fl.Pl. I. 163; G.C. (1926, I) 80; S. (1927) 37; D.K.G. (1927/28) 220; D.K.G. (1927) 66, 81, 97; v.P.M. 48; A. 216; D.K.G. (1932) 228.
- Lithops alpina* Dtr. — Gr.-Namaland, Ruschberg (Farm Lichtenstein), Kranznecus, Pochaganao, 40 km nördl. Windhoek. — M.D.G. Ztg. (1927) 123; D.K.G. (1927/28) 220; S. (1927) 125.
- Lithops Aucampiae* L.Bol. — Transvaal, Postmasberg, nahe Kimberley. — S.G. (1932) 306.
- Lithops aurantiaca* L.Bol. — Sw.-Afr., 80 km südl. Lüderitzbucht. — L.B. II. 344; D.K.G. (1934) 49.
- Lithops bella* (Dtr.) N.E.Br. — (*Mes. bellum* Dtr.). — Gr.-Namaland, Berge von Aus. und Cubub. bei Garub. Gr.-Karasberge. — D.B.F. XIX. 123 (*Mes. bellum*; G.C. (1922, I) 80; G.C. (1927, I) 84; S. (1927) 62; D.K.G. (1927/28) 220; M. 242.
- Lithops brevis* L.Bol. — Kl.-Namaland, Hügel 5 miles südöstl. von Viol's Drift, Orange-Fluß. — L.B. II. 344. — (Dürfte mit *Lithops olivacea* L.Bol. identisch sein.)
- Lithops Bromfieldii* L.Bol. — Gordonias Divis., bei Upington. — L.B. II. 452.
- Lithops commoda* Dtr. nomen nudum = *Lithops karasmontana* N.E.Br.
- Lithops Comptonii* L.Bol. — S.-Afrikan. Karroo, Ceres Karroo, Laingsburg Divis., 30 km westl. Matjesfontein. — S.G. (1930) 212, 214; D.K.G. (1934) 48.
- Lithops damarana* N.E.Br. = *Lithops karasmontana* N.E.Br.
- Lithops Dinteri* Schwant. — Gr.-Namaland, Wittsand, Endorn. — D.K.G. (1927/28) 97, 220; G.S.L. 17.
- Lithops diutina* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Jakhalswater und Springbok. — L.B. II. 345; D.K.G. (1934) 48.
- Lithops divergens* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlakte, 30 miles nördl. von Van Rhynsdorp. — L.B. II. 451.
- Lithops Eberlanzii* (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Eberlanzii* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, Kavisberge, 35 km östl. Lüderitzbucht: Kuckaus-Pockenbank-Fläche; Rote Kuppe (Halenberg? Tschaukeib?). — D.K.G. (1925/26) 25 (*Mes. Eberl.*); G.C. (1926, I) 80; M.D.G.Ztg. (1926) 343; D.K.G. (1927/28) 220; D.K.G. (1937) 27.
- Lithops Edithae* N.E.Br. — Standort unbekannt, wahrscheinlich Gr.-Namaland. — C.J. II. 70.

- Lithops elevata* L.Bol. — Gr.-Namaland, 10 km östl. Sendlingsdrift am Orange-Fluß. — L.B. II. 345.
- Lithops Elisabethae* Dtr. — Sw.-Afr., Onazuhetter am Fuße des Waterberges. — D.K.G. (1933) 50; S. (1938) 2.
- Lithops Erniana* Loesch et Tisch. — Gr.-Namaland, Pockenbank, Wittpütz. — D.K.G. (1934) 49; S. (1936) 76.
- Lithops farinosa* Dtr. nomen nudum = *Lithops pseudotruncatella* N.E.Br.
- Lithops Framesii* L.Bol. — Karroo. 20 miles östl. Springbok am Wege nach Puffadder. — S.G. (1930) 182; M. 243.
- Lithops Franciscii* (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Franciscii* Dtr. et Schwant. — Gr.-Namaland. Halenberg, 53 km östl. Lüderitzbucht. — D.K.G. (1925/26) 19 (*Mes. Eberl.*); G.C. (1926, I) 102; D.K.G. (1927/28) 220; D.K.G. (1937) 27.
- Lithops Friedrichiae* N.E.Br. = *Ophthalmophyllum Friedrichiae* Dtr. et Schwant.
- Lithops Fulleri* N.E.Br. — (*Lithops Maughanii* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Kakamas, Keimoes; Kenhardt Divis., nahe Kenhardt. — G.C. (1927, I) 70; D.K.G. (1927/28) 220; B.M.J. (1929) 57 (*L. Maugh.*) D.K.G. (1931) 268; M. 244.
- Lithops Fulleri* N.E.Br. var. *Tapscottii* L.Bol. — Hopetown Divis. — S.G. (1929) 182.
- Lithops fulviceps* N.E.Br. — (*Mes. fulviceps* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, Gr. Karasberge auf sandigen Vlakten; Farm Grünau, Garius, Narudas Süd. — B.Mag. 144. Tab. 8776 A (*Mes. fulv.*); G.C. (1922, I) 55; G.C. (1926, I) 102; M.D.G.Ztg. (1926) 308; S. (1927) 50; D.K.G. (1927/28) 220; M. 246.
- Lithops gracilidelineata* Dtr. — Sw.-Afr., zwischen Uis und Neineis am Brandberg und südl. des Pad von Franzfontein nach Ontje bei Wittklip; bei Arandis, bei Pforte. — G.S.L. 18; S. (1936) 77.
- Lithops Gulielmi* L.Bol. — Sw.-Afr., Kl. Karasberg in Quartz Gries auf der Farm Florida. — L.B. III. 100.
- Lithops halenbergense* Tisch. — Gr.-Namaland, bei Halenberg. — D.K.G. (1932) 281. (Diese Art wird von Kennern für eine Standortsvarietät von *L. Franciscii* gehalten.)
- Lithops Helmuti* L.Bol. — Kl.-Namaland, Steinkopf-Kinderle. — S.G. (1933) 218; D.K.G. (1934) 49.
- Lithops Herrei* L.Bol. — Kl.-Namaland, Swartwater-Richtersveld. — L.B. II. 346; S.G. (1932) 221; D.K.G. (1934) 46; S. (1938) 2.
- Lithops Herrei* L.Bol. var. *plena* L.Bol. — S.G. (1932) 221.
- Lithops Hookeri* (Bgr.) Schwant. — (*Mes. Hookeri* Bgr., *Mes. truncatellum* Hook.f.). — Ost-Karroo, Somerset East Divis. — B.M.P. 283 (*Mes. Hookeri*); M.D.G.Ztg. (1928) 46. — (N.E. Brown stellt *Mes. Hookeri* Bgr. in G.C. [1922, I] 55 zu *Mes. turbiniforme* Haw.

- = *Lithops turbiniformis* N.E.Br., was Schwantes in M.D.G.Ztg. [1928] 46 ablehnt.)
- Lithops inornata* Dtr. nomen nudum = *Lithops Marthae* Lösch. et Tisch.
- Lithops insularis* L.Bol. — Gordonia Divis., Insel Keimoes im Orange-Fluß. — L.B. III. 75.
- Lithops Jacobseniana* Schwant. — (*Lithops Ursulae* [nomen nudum]) Gr.-Namaland, Gruendorn, 40 km nördl. Kalkfontein-Süd. — S. (1936) 25, 104.
- Lithops Julii* (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Julii* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, bei Vahldoorn, bei Warmbad. — D.K.G. (1925/26) 26 (*Mes. Julii*); G.C. (1926, I) 102; D.K.G. (1927/28) 220; D.K.G. (1937) 27.
- Lithops Julii* (Dtr. et Schwant.) var. *pallida* Tisch. — Sw.-Afr., Auros-Ocidip, westl. Warmbad. — (Bleiche Abart fast ohne Zeichnung, bisher nicht beschrieben.)
- Lithops Julii* (Dur. et Schwant.) N.E.Br. var. *reticulata* Tisch. — Sw.-Afr., bei Vahldoorn. — (Mit ausdrucksvoller, dunkelbrauner, netzartiger Zeichnung, bisher nicht beschrieben.)
- Lithops karasmontana* (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. karasmontanum* Dtr. et Schwant., *Mes. damaranum* N.E.Br., *Lithops damarana* N.E.Br., *Lithops commoda* Dtr.). — Gr.-Namaland, Hereroland: Karasberge. — D.K.G. (1920) 36 (*Mes. karasm.*); N.E.Br.M. 67 (*Mes. damarana*); G.C. (1922, I) 80 (*Lith. damarana*); D.K.G. (1925/26) 152; G.C. (1926, I) 102; M.D.G.Ztg. (1926) 257; M.D.G.Ztg. (1927) 102; S. (1927) 63; D.K.G. (1927/28) 221; M. 247; D.K.G. (1937) 163 (*L. commoda*); F.R. XLIII. 227 (*L. commoda*).
- Lithops kuibisensis* Dtr. — Gr.-Namaland, bei Kalkfontein, 15 km südl. Kuibis. — J.S. 147; J.S.P. 199.
- Lithops kunjaseusis* Dtr. — G.-Namaland, bei Kunjas, westl. Bethanien. — G.S.L. 14.
- Lithops lactea* Schick et Tisch. — Gr.-Namaland, Kalkkrücken bei Romansdrift, bei Aiais am Fischfluß. — D.K.G. (1933) 49.
- Lithops lateritia* Dtr. — Sw.-Afr., bei Mickberg. — G.S.L. 16. — (Ob Form von *L. mickbergensis* Dtr. ?.)
- Lithops Lericheana* Dtr. et Schwant. — (*Mes. Lericheanum* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, Garub, Gr. Karasberge. — D.K.G. (1925/26) 25, 132; G.C. (1926, I) 102; D.K.G. (1927/28) 221; D.K.G. (1929) 43.
- Lithops Lesliei* N.E.Br. — (*Mes. Lesliei* N.E.Br., *Mes. ferrugineum* Schwant.). — Transvaal, bei Vereeniging; Griqualand West, bei Kimberley, bei Griquatown; Orange Free State, bei Bethlehem; bei Pretoria. — Tr.R.S. II. 369 (*Mes. Lesl.*); D.K.G. (1920) 129 (*Mes. Lesl.*); G.C. (1922, I) 65; D.K.G. (1922) 94 (*Mes. ferrug.*); M.Fl.Pl.

I. 163; G.C. (1926, I) 102; M.D.G.Ztg. (1927) 38; S. (1927) 40; D.K.G. (1927/28) 221; M. 248; D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 226 (*Mes. ferr.*).

Lithops localis (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. locale* N.E.Br.). — Beaufort West-Divis., nahe des Gamka-Flusses. — N.E.Br.M. 68 (*Mes. locale*); D.K.G. (1927/28) 221 (*Mes. locale*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.

Lithops Lydiae L.Bol. = nomen nudum. — Gr.-Namaland, Namib, Gr. Karasberge.

Lithops Marlothii N.E.Br. = ***Conophytum pellucidum*** Schwant.

Lithops marmorata N.E.Br. — (*Mes. marmoratum* N.E.Br.). — Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 68 (*Mes. marm.*); G.C. (1922, I) 80; G.C. (1925, I) 116; S. (1927) 61; M. 250. — (Eine sehr unbestimmte Art, offenbar Standortsvarietät einer anderen Art.)

Lithops Marthae Loesch et Tisch. — Gr.-Namaland, Wittputz bei Pockenbank, Pockenbank. — S. (1936) 74; D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 228.

Lithops Maughanii N.E.Br. = ***Lithops Fulleri*** N.E.Br.

Lithops Mennellii L.Bol. — Gordonias Divis., Louisvale bei Upton. — L.B. III. 76.

Lithops Meyeri L.Bol. — Kl.-Namaland, Brakfontein, Richtersveld. — S.G. (1932) 102; D.K.G. (1934) 46.

Lithops mickbergensis Dtr. — Gr.-Namaland, bei Mickberg und südl. Karasberge. — G.S.L. 16.

Lithops Mundtii Tisch. = ***Lithops pseudotruncatella*** N.E.Br. var. ***Mundtii*** Tisch.

Lithops olivacea L.Bol. — Kl.-Namaland, Kenhardt Divis., Kakamas, Puffadder. — L.B. II. 84; M. 251; D.K.G. (1932) 131; S. (1938) 33.

Lithops opalina Dtr. — Sw.-Afr., westl. Kl.-Karas in Eisterbank. — M.D.G.Ztg. (1927) 139; D.K.G. (1927/28) 221.

Lithops optica (Marl.) N.E.Br. — (*Mes. opticum* Marl., *Mes. marginatum* Marl.). — Gr.-Namaland, bei Prince of Wales-Bay, bei Lüderitzbucht, Pomona-Klinghardt-Gebirge. — Tr.R.S. I. 405 (*Mes. opt.*); G.C. (1922, I) 80; M.D.G.Ztg. (1926) 336; D.K.G. (1927/28) 221; S. (1927) 78; M. 252.

Lithops optica (Marl.) N.E.Br. var. ***rubra*** Tisch. — (*Mes. opticum* Marl. var. *rubrum* Tisch., *Lithops rubra* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Küstenwüstengebiet zwischen Lüderitzbucht und Buntfeldschuh im Gebiet der Consolidated Diamond Mines. — D.K.G. (1925/26) 65 (*Mes. opt. rubr.*); G.C. (1926, I) 116 (*L. rubr.*); D.K.G. (1927/28) 221; D.K.G. (1929) 43.

Lithops Otzeniana Nel. — Boemanland, Brakfontein, 30 miles von Loeriesfontein. — K.Kd. (1937) 123.

Lithops Peersii L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Miller, bei Graaff Reinet; Laingsburg, Prince Albert. — L.B. II. 84.

Lithops Pillansii L.Bol. — Sw.-Afr., Arandis, nahe Walfish Bay. — L.B. II. 84. (Diese Art soll mit *L. Ruschiorum* N.E.Br. identisch sein?!)

Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. pseudotruncatellum* Bgr., *Mes. truncatellum* Dtr., *Lithops farinosa* Dtr.). — Gr.-Namaland, Aus-Berge bei Windhoek, bei Lichtenstein, Plateau des Khomas-Hochlandes bis etwa 80 miles nach Westen, bis Friedenau im Süden; östl. Windhoek (vom Eros-Gebirge bis Ondekarumba), nördl. bis zur Ongati-Mine in den Onjati-Bergen. — D.K.G. (1920) 117 (*Mes. pseudotr.*); G.C. (1922, I) 65; L.B. I. 53; D.K.G. (1927/28) 221; S. (1927) 38; S.G. (1928) 125; M. 253; D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N.E.Br. var. *albiflora* nomen nudum. — (Eine angeblich weißblühende Abart?!)

Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N.E.Br. var. *alta* Tisch. — Gr.-Namaland, Farm Hoffnung. — M.D.G.Ztg. (1926) 331; G.C. (1927, I) 84; D.K.G. (1927/28) 221.

Lithops pseudotruncatella (Bgr.) N.E.Br. var. *Mundtii* Tisch. — (*Lithops Mundtii* Tisch.). — Sw.-Afr., Mundi's Farm östl. Windhoek, nahe Witvley. — M.D.G.Ztg. (1926) 330; D.K.G. (1927/28) 221; G.C. (1927, I) 84 (*L. Mundtii*).

Lithops pseudotruncatella (Bgr.) var. *pulmonuncula* (Dtr.) = ***Lithops pulmonuncula*** Dtr.

Lithops pulmonuncula Dtr. — (*Lithops pseudotruncatella* var. *pulmonuncula* Dtr.). — Sw.-Afr., Farm Friedenstal bis Blumental. — J.S. 150 (*L. ps. v. pulm.*); J.S.P. 203 (*L. ps.-pulm.*).

Lithops rubra N.E.Br. = ***Lithops optica*** N.E.Br. var. *rubra* Tisch.

Lithops rugosa Dtr. — Gr.-Namaland, 80 km westl. Hetneringshausen bei Sinclair-Mine. — G.S.L. 15.

Lithops Ruschiana N.E.Br. = ***Lithops Ruschiorum*** N.E.Br.

Lithops Ruschiorum (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Ruschiorum* Dtr. et Schwant., *Mes. Ruschianum* Dtr., *Lithops Ruschiana* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, ca. 30 km von Swakopmund bei Arandis, bei Spitzkuppe, Rössing, und südl. bis Cape Cross, zwischen Arandis und Kanrivier. — D.K.G. (1925/26) 21 (*Mes. Rusch.*); G.C. (1926, I) 116, 194 (*L. Ruschiana*); D.K.G. (1927/28) 221; S. (1936) 76.

Lithops salicola L.Bol. — Orange Free State, Fauresmith Divis., "on the farm Rose-Marie" in der Salz-Ebenc. — L.B. III. 33.

Lithops Schickiana (ohne Autor) nomen nudum in G.S.L. 2.

Lithops Schwantesii Dtr. — Gr.-Namaland, bei Barby, ca. 80 km westl. Bethanien. — G.S.L. 14; S. (1936) 77.

- Lithops summitatum* Dtr. — Sw.-Afr., Kl.-Karas. — M.D.G.Ztg. (1927) 101; D.K.G. (1927/28) 221.
- Lithops terricolor* N.E.Br. — Laingsburg Divis., bei Grootfontein; Willowmoore Divis., nahe Miller. — G.C. (1922, I) 65; G.C. (1926, I) 117; S. (1927) 47; D.K.G. (1927/28) 221.
- Lithops translucens* L.Bol. — Kl.-Namaland, 60 miles nördl. Port Nolloth. — L.B. II. 347.
- Lithops Triebneri* L.Bol. — Sw.-Afr., Namib, Tirasberge. — L.B. II. 391; S.G. (1934) 100.
- Lithops turbiniformis* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. turbiniforme* Haw.). — Karroo, Bokkeveld nahe des Hex-River (Fluß); Prieska Divis., im Zandvlei zwischen Keikams Poort und Orange-Fluß bei Kanabee; Ost-Karroo, Somerset East Divis. — N.E.Br.M. 137 (*Mes. turb.*); G.C. (1922, I) 55; S. (1927) 48; D.K.G. (1927/28) 221; M. 256.
- Lithops umdausensis* L.Bol. — Kl.-Namaland, Umदाus-Steinkopf. — L.B. II. 347; D.K.G. (1934) 47.
- Lithops urikosensis* Dtr. — Sw.-Afr., Urikos, 90 km westl. Maltahöhe am Fuße der Vankluft. — G.S.L. 15; S. (1938) 2.
- Lithops Ursulae* (nomen nudum) = *Lithops Jacobseniana*
- Lithops Vallis-Mariae* (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — (*Mes. Vallis-Mariae* Dtr. et Schwant.). — Gr.-Namaland, bei Marienthal, 5 km von Station Marienthal, Brandt's Farm, auch 20 km östl. der Station. — D.K.G. (1925/26) 22; G.C. (1926, I) 117; D.K.G. (1927/28) 221.
- Lithops Vanzijlii* L.Bol. — Bushmanland, bei Kakamas, Keimoes, Pellar, Puffadder. — S.G. (1932) 177; D.K.G. (1934) 48; S. (1936) 94, 113; L.B. III. 74.

Litocarpus L.Bol.

Fl.Pl. VII. Pl. 261; v.P.M. 48.

Lithocarpus cardifolius L.Bol. = *Aptenia cordifolia* Schwant.

Machairophyllum Schwant.

M.D.G.Ztg. (1927) 187; v.P.M. 48; A. 220.

- Machairophyllum albidum* (L.) Schwant. — (*Mes. albidum* L., *Bergeranthus albidus* Schwant., *Carruanthus albidus* Schwant.). — Kl.-Namaland. — B.M.P. 251 (*Mes. alb.*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. alb.*); D.K.G. (1925/26) 181 (*Car. alb.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187.
- Machairophyllum acuminatum* L.Bol. — S.-Afr., bei Humansdorp. — L.B. II. 485.
- Machairophyllum Baxteri* L.Bol. — S.-Afr., bei George. — L.B. II. 486.

- Machairophyllum Cookii*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Cookii* L.Bol., *Bergeranthus Cookii* Schwant., *Carruanthus Cookii* Schwant.). — Cape Prov., South Western Reg., Barrydale und 15 miles westl. davon. — A.B.H. IV. 2 (*Mes. Cookii*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. Cookii*); D.K.G. (1925/26) 181 (*Carr. Cookii*); M.D.G.Ztg. (1927) 187.
- Machairophyllum stenopetalum*** L.Bol. — Willowmoore Divis. — L.B. II. 303.

Macrocaulon N.E.Br.

G.C. (1927, I) 12; v.P.M. 49; A. 216.

Malephora N.E.Br.

G.C. (1927, I) 12; D.K.G. (1927/28) 106; M.D.G.Ztg. (1927/28) 7; v.P.M. 49; A. 216.

Malephora crocea Schwant. = *Hymenocyclus croceus* Schwant.
Malephora Engleriana Schwant. = *Hymenocyclus Englerianus* Dtr.
 et Schwant.

Malephora Herrei Schwant. = *Hymenocyclus Herrei* Schwant.

Malephora lutea Schwant. = *Hymenocyclus luteus* Schwant.

Malephora luteola Schwant. = *Hymenocyclus luteolus* Schwant.

Malephora mollis (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. molle* Ait.). — S.-Afr. — B.M.P. 130 (*Mes. molle*); G.C. (1927, I) 12.

Malephora purpureo-crocea Schwant. = *Hymenocyclus purpureo-croceus* L.Bol.

Malephora Thunbergii Schwant. = *Hymenocyclus Thunbergii* L.Bol.

Malephora verruculoides Schwant. = *Hymenocyclus verruculoides* L.Bol.

Marlothistella Schwant.

Gw. (1928) 599; v.P.M. 49; A. 220.

Marlothistella uniondalensis Schwant. — Karroo von Uniondale — Gw. (1928) 599.

Maughania N.E.Br.

J.C.S. II. 389.

Maughania insignis N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen weißen Steinen. — J.C.S. II. 390.

Mentocalyx N.E.Br. (*Menticalyx* N.E.Br.)

G.C. (1927) 251; v.P.M. 49; A. 216; C.J. VI. 20 (*Menticalyx*); D.K.G. (1937) 151.

Mentocalyx Muiri N.E.Br. = *Gibbaeum Schwantesii* Tisch.

Mentocalyx velutinum Schwant. = *Gibbaeum velutinum* Schwant.

Mesembryanthemum L. (emend. L.Bol.)

D.K.G. (1921) 23, 24, 165; D.K.G. (1922) 57, 102; D.K.G. (1925/26) 77, 137, 151, 155, 173; D.K.G. (1927/28) 14, 24, 105, 106; D.K.G. (1932) 221, 263; G.C. (1921, I) 125, 138, 151, 172, 207, 223, 250, 273, 289, 303, 311; C.G. (1925, II) 211, 232, 272, 412, 433; G.C. (1927, I) 12; G.C. (1930, I) 13, 32, 71; G.C. (1930, II) 278; N.E.Br.M. 53; M.Fl.Pl. I. 158; B.M.P. 1—294; F.R. XXXII; v.P.M. 50; A. 216.

(Alle mit einem + bezeichneten Arten sind solche, die wegen Mangel an lebendem und Herbar-Material nicht genau zu identifizieren sind, und deren Stellung innerhalb der Gattung durchaus nicht klar ist. Der größte Teil dieser Arten sollte, um Konfusionen zu vermeiden, gestrichen werden. Alle mit einem × versehenen Arten sind solche, deren neue Bezeichnungen bis zur Drucklegung dieses Verzeichnisses nicht veröffentlicht waren. In einen Nachtrag, welcher in Fedde, Repertorium spec. nov. erscheinen wird, sind die comb. novae nachzulesen.)

Mesembryanthemum abbreviatum Haw. = *Carpobrotus glaucescens*

Schwant.

Mes. aberdeenense L.Bol. = *Delosperma aberdeenense* L.Bol.

Mes. abruptum Bgr. = *Octopoma abruptum* N.E.Br.

Mes. abyssinicum Rgl. = *Delosperma abyssinicum* Schwant.

Mes. acinaciforme D.C. = *Semnanthe lacerum* N.E.Br.

Mes. acinaciforme L. = *Carpobrotus acinaciformis* L.Bol.

Mes. acrosepalum L.Bol. — Piquetberg Divis., Plateau auf Kapitains Kloof Mountains, Piquetberg Range. — L.B. III. 11. ×

Mes. aculeatum N.E.Br. = *Eberlanzia aculeata* Schwant.

Mes. acuminatum Haw. = *Aridaria acuminata* Schwant.

Mes. acuminatum S.D. = *Mes. nothum* N.E.Br.

Mes. acutangulum Haw. = *Ruschia acutangula* Schwant.

Mes. acutifolium L.Bol. = *Lampranthus acutifolius* N.E.Br.

Mes. acutipetalum N.E.Br. = *Khadia acutipetala* N.E.Br.

Mes. acutisepalum Bgr. = *Psilocaulon absimile* N.E.Br.

Mes. acutum Haw. = *Cephalophyllum subulatoides* N.E.Br.

Mes. adscendens Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.

Mes. adscendens S.D. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.

Mes. aduncum Haw. = *Lampranthus aduncus* N.E.Br.

Mes. aduncum Jacq. = *Mes. Schollii* S.D.

Mes. aduncum Willd. = *Ruschia Willdenowii* Schwant.

Mes. aequilaterale Haw. = *Carpobrotus aequilaterus* N.E.Br.

Mes. aequilaterale var. *chiloense* S.D. = *Carpobrotus chilensis* N.E.Br.

Mes. aequilaterum Haw. = *Carpobrotus aequilaterus* N.E.Br.

Mes. aereum L.Bol. = *Delosperma aereum* L.Bol.

Mes. aereum L.Bol. var. *album* L.Bol. = *Delosperma aereum* L.Bol. var. *album* L.Bol.

Mes. aestivum L.Bol. — Caledon Divis., bei Kleinmond. — L.B. II.

188. ×

Mes. agninum Haw. = *Agnirictus agninus* Schwant.

Mes. agninum Haw. var. *integrifolium* Salm. = *Agnirictus agninus* Schwant. var. *integrifolius* Schwant.

Mes. aggregatum Haw. = *Conophytum aggregatum* N.E.Br.

Mes. Aitonis Jacq. = *Cryophytum Aitonis* N.E.Br.

Mes. albatum L.Bol. — Kl.-Namaland, westl. Arris Drift. — A.B.H.

IV. 97. ×

Mes. albertense N.E.Br. = *Conophytum Purpusii* N.E.Br.

Mes. albertinense L.Bol. = *Cephalophyllum albertinense* Schwant.

Mes. albicula N.E.Br. = *Ruschia Bolusiae* Schwant.

Mes. albidum L. = *Machairophyllum albidum* Schwant.

Mes. albiflorum L.Bol. = *Drosanthemum albiflorum* Schwant.

Mes. albinotum Haw. = *Rabiea albinota* N.E.Br.

Mes. albipunctum Haw. = *Rabiea albipuncta* N.E.Br.

Mes. albipunctum Haw. var. *major* Haw. = *Rabiea cibdela* N.E.Br.

Mes. alboroseum L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlingsdrift. — L.B. I. 148. ×

Mes. album L.Bol. — Clanwilliam Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B.

II. 365. ×

Mes. alcalifugum Dtr. = *Cryophytum alcalifugum* Dtr.

Mes. aloides Haw. = *Nananthus aloides* Schwant.

Mes. aloides hort. = *Nananthus vittatus* Schwant.

Mes. aloides S.D. = *Rabiea cibdela* N.E.Br.

Mes. alsinifolium Don. = *Cryophytum clandestinum* N.E.Br.

Mes. altigenum L.Bol. — Cape Prov., Karroo Reg., Laingsburg Divis., an der Spitze des Witteberg — A.B.H. IV. 36. ×

Mes. altile N.E.Br. = *Conophytum altile* N.E.Br.

Mes. amicorum L.Bol. = *Ruschia amicora* Schwant.

Mes. amoenum S.D. = *Lampranthus amoenus* N.E.Br.

Mes. amplexens L.Bol. = *Aspazoma amplexens* N.E.Br.

Mes. amplexicaule L.Bol. = *Leipoldtia amplexicaule* L.Bol.

Mes. amplexum N.E.Br. = *Ruschia inclusa* L.Bol.

Mes. ampliata N.E.Br. = *Ruschia ampliata* L.Bol.

Mes. anatomicum Haw. = *Sceletium anatomicum* L.Bol.

Mes. anceps Haw. = *Erepsia anceps* Schwant.

Mes. androsaceum N.E.Br. = *Ruschia androsacea* Marl. et Schwant.

Mes. anemoniflorum L.Bol. = *Cephalophyllum anemoniflorum* Schwant.

Mes. Angelicae Dtr. et Schwant. = *Conophytum Angelicae* N.E.Br.

Mes. angulatum Thbg. = *Cryophytum Aitonis* N.E.Br.

Mes. angulatum var. *ovatum* Sond. = *Platythyra Haeckeliana* N.E.Br.

- Mes. angulipes* L.Bol. = *Gibbacum angulipes* N.E.Br.
Mes. angustipetalum L.Bol. = *Vanzijlia angustipetala* N.E.Br.
Mes. angustum Haw. = *Glottiphyllum angustum* N.E.Br.
Mes. angustum S.D. = *Glottiphyllum taurinum* N.E.Br.
Mes. angustum var. *heterophyllum* Haw. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br. var. *hamatum* N.E.Br.
Mes. angustum var. *pallidum* Haw. = *Glottiphyllum taurinum* N.E.Br.
Mes. annulatum L.Bol. = *Vanzijlia annulata* N.E.Br.
Mes. antemeridianum L.Bol. — S.-Afr., Riversdale Divis., nahe Albertina. — L.B. I. 135. ×
Mes. antemeridianum L.Bol. f. fl. *pleno* L.Bol. — Riversdale Divis., in Sanddünen auf Farm Welgevonden. — L.B. II. 404. ×
Mes. apetalum L.f. = *Dorotheanthus apetalus* N.E.Br.
Mes. apetalum Thbg. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant. var. *albus*.
Mes. apiatum N.E.Br. = *Conophytum apiatum* N.E.Br.
Mes. apiculatum Kensit = *Echinus edentulus* N.E.Br.
Mes. apiculatum Kensit var. *muticum* L.Bol. = *Echinus Maximiliani* N.E.Br.
Mes. apodanthum Schltr. et Diels. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — F.R. VIII. 148. +
Mes. approximatum L.Bol. = *Ruschia approximata* Schwant.
Mes. aquosum L.Bol. = *Opophytum aquosum* N.E.Br.
Mes. arboriforme Burch. — Griqualand West, Hay Divis., zwischen Wittewater und Rietfontein; Philippstown Divis., nahe Petrusville, nahe der Diamantfelder. — N.E.Br.M. 125 +
Mes. Arbuthnotiae L.Bol. — Cape Prov., South Western Region, genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 8. ×
Mes. arenosum Schinz = *Psilocaulon arenosum* L.Bol.
Mes. arenosum L.Bol. — Malmesbury Divis., Saldanha Bay bei Langebaan. — L.B. II. 367.
Mes. areum L.Bol. = *Delosperma areum* L.Bol.
Mes. argenteum L.Bol. — Clanwilliam Divis., Graafwater. — A.B.H. IV. 8.
Mes. aristulatum Sond. = *Ruschia aristulata* Schwant.
Mes. armatum N.E.Br. = *Ruschia armata* L.Bol.
Mes. articulatum Thbg. = *Psilocaulon articulatum* N.E.Br.
Mes. asperulum Haw. = *Drosanthemum pulchellum* L.Bol.
Mes. asperulum Salm. = *Drosanthemum asperulum* Schwant.
Mes. asperum Haw. = *Erepsia aspera* L.Bol.
Mes. assimile N.E.Br. = *Conophytum assimile* N.E.Br.
Mes. Astridae Dtr. = *Titanopsis Hugo-Schlechteri* Dtr. et Schwant.
Mes. atratum N.E.Br. = *Ruschia atrata* L.Bol.

- Mes. atrocinctum* N.E.Br. = *Ruschia saturata* L.Bol.
Mes. attenuatum Haw. = *Drosanthemum attenuatum* Schwant.
Mes. attonsum L.Bol. = *Trichodiadema attonsum* Schwant.
Mes. augeiforme Schwant. = *Conophytum gracilistylum* N.E.Br.
Mes. aurantiacum D.C. = *Lampranthus aurantiacus* Schwant.
Mes. aurantiacum Haw. = *Lampranthus aurantiacus* Schwant.
Mes. auratum Sond. — (*Mes. aureum* Thbg.). — S.-Afr., zwischen
 Olifant's River und Bocklandsberg. — B.M.P. 69. +
Mes. aureum L. = *Lampranthus aureus* N.E.Br.
Mes. aureum Thbg. = *Mes. auratum* Sond.
Mes. ausanum Dtr. = *Aridaria ausana* Dtr. et Schwant.
Mes. ausense L.Bol. = *Juttadinteria ausensis* Schwant.
Mes. australe Sol. = *Disphyma australe* N.E.Br.
Mes. austricolum L.Bol. — Cape Peninsula, zwischen Smitswinkel
 und Olifantsbosch. — L.B. II. 453. ×
Mes. Axthelmianum Dtr. = *Ruschia Axthelmiana* Schwant.
Mes. barbatum Curtis = *Trichodiadema stelligerum* Schwant.
Mes. barbatum L. = *Trichodiadema barbatum* Schwant.
Mes. barbatum L. var. *densum* Willd. = *Trichodiadema densum*
 Schwant.
Mes. densum L. var. *hirsutum* Willd. = *Trichodiadema stellatum*
 Schwant.
Mes. barbatum L. var. β Haw. = *Trichodiadema stelligerum*
 Schwant.
Mes. barbatum L. var. β L. = *Trichodiadema stellatum* Schwant.
Mes. barbatum L. var. γ L. = *Trichodiadema densum* Schwant.
Mes. Barklyi B.E.Br. = *Cryophytum Barklyi* N.E.Br.
Mes. Barklyi N.E.Br. var. *obtusifolium* L.Bol. = *Cryophytum Bark-*
lyi N.E.Br.
Mes. Barnardii N.E.Br. = *Ruschia Barnardii* L.Bol.
Mes. Beetzii Dtr. = *Stöberia Beetzii* Dtr. et Schwant.
Mes. bellidiflorum D.C. = *Acrodon subulatus* N.E.Br.
Mes. bellidiflorum Haw. = *Acrodon bellidiflorus* N.E.Br. var. *stri-*
atus N.E.Br.
Mes. bellidiflorum Haw. var. *glaucescens* Haw. = *Acrodon bellidi-*
florus N.E.Br.
Mes. bellidiflorum Haw. var. *striatum* Haw. = *Acrodon bellidiflorus*
 var. *striatus* N.E.Br.
Mes. bellidiflorum Haw. var. *subulatum* Haw. = *Acrodon bellidi-*
florus N.E.Br. var. *striatus* N.E.Br.
Mes. bellidiflorum Haw. var. *subulatum* S.D. = *Acrodon subulatus*
 N.E.Br.
Mes. bellidiflorum Haw. var. *viride* Haw. = *Acrodon bellidiflorus*
 N.E.Br. var. *viridis* N.E.Br.

- Mes. bellidiflorum* L. = *Acrodon bellidiflorus* N.E.Br.
Mes. bellidiforme Burm. = *Dorotheanthus bellidiformis* N.E.Br.
Mes. bellum Dtr. = *Lithops bella* N.E.Br.
Mes. Bergerianum Dtr. = *Hereroa hesperantha* Dtr. et Schwant.
Mes. Beswickii L.Bol. = *Khadia Beswickii* N.E.Br.
Mes. bibracteatum Haw. = *Cheiridopsis bibracteata* N.E.Br.
Mes. bicolor Curtis = *Mes. coccineum* Haw.
Mes. bicolorum L. = *Lampranthus bicolorus* N.E.Br.
Mes. bicolorum L. var. *inaequale* Haw. = *Lampranthus bicolorus* N.E.Br. var. *inaequalis* Schwant.
Mes. bicoloratum N.E.Br. = *Ruschia bicoloratum* L.Bol.
Mes. bicolorum Klinsmann = *Conicosia fusiformis* N.E.Br.
Mes. bicornis Sond. = *Psilocaulon tenue* Schwant.
Mes. bidentatum Haw. = *Glottiphyllum semicylindricum* N.E.Br.
Mes. bifidum Marl. = *Cheiridopsis bifida* N.E.Br.
Mes. bifoliatum L.Bol. — Cape Prov., South Western Reg. — A.B.H.

III. 130. ×

- Mes. biforme* N.E.Br. = *Ruschia biformis* Schwant.
Mes. bigibberatum Haw. = *Glottiphyllum semicylindricum* N.E.Br.
Mes. Bijliae N.E.Br. = *Ruschia Bijliae* L.Bol.
Mes. bilobum Marl. = *Conophytum bilobum* N.E.Br.
Mes. binum L.Bol. = *Echinus Maximiliani* N.E.Br.
Mes. binum N.E.Br. = *Echinus edentulus* N.E.Br.
Mes. blandum Haw. = *Lampranthus blandus* Schwant.
Mes. blandum Haw. var. *curviflorum* (Haw.) Bgr. = *Lampranthus curviflorus* N.E.Br.
Mes. Böhmerianum Dtr. = *Conophytum saxetanum* N.E.Br.
Mes. Bolusiae (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. recurvum* L.Bol.). — Tulbagh Divis., an feuchten Stellen zwischen Tulbagh und Tulbagh Road Station. — L.B. II. 367 (*Mes. recurvum*); F.R. XLIII. 228; D.K.G. (1938) 41. ×
Mes. Bolusii Hook.f. = *Pleiospilos Bolusii* N.E.Br.
Mes. Bosscheanum Bgr. = *Faucaria Bosscheana* Schwant.
Mes. brachiatum D.C. = *Drosanthemum nitidum* Schwant.
Mes. brachyandrum L.Bol. = *Lampranthus brachyandrus* N.E.Br.
Mes. brachyphyllum Pax = *Drosanthemum Paxianum* Schwant.
Mes. brachyphyllum Welw. — B.M.P. 292. +
Mes. brakdamense L.Bol. — S.-Afr., Brakdam. — A.B.H. III. 127. ×
Mes. bracteatum Ait. = *Erepsia bracteata* Schwant.
Mes. brevicaule Haw. = *Conicosia brevicaulis* Schwant.
Mes. brevicolle N.E.Br. = *Ruschia brevicollis* Schwant.
Mes. brevifolium Ait. = *Drosanthemum brevifolium* Schwant.
Mes. brevipes Schltr. = *Argyroderma brevipes* L.Bol.

- Mes. brevistaminum** L.Bol. — Worcester Divis., am Fuße des Matroosberg. — L.B. II. 155. ×
- Mes. Britteniae** L.Bol. = **Leipoldtia Britteniae** L.Bol.
- Mes. Brownii** Hook. f. = **Lampranthus Brownii** N.E.Br.
- Mes. Brunthaleri** Bgr. = **Delosperma Brunthaleri** Schwant.
- Mes. bulbosum** Haw. = **Trichodiadema bulbosum** Schwant.
- Mes. caducum** Ait. = **Psilocaulon caducum** N.E.Br.
- Mes. caespitosum** L.Bol. = **Lampranthus caespitosus** N.E.Br.
- Mes. caespitosum** L.Bol. var. *luxurians* L.Bol. = **Lampranthus caespitosus** NEBr. var. *luxurians* L.Bol.
- Mes. calamiforme** L. = **Cylindrophyllum calamiforme** Schwant.
- Mes. calandrum** L.Bol. — Cape Prov., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 7. ×
- Mes. calandrum** L.Bol. = **Leipoldtia calandra** L.Bol.
- Mes. calcaratum** Wolley-Dod. = **Lampranthus calcaratus** N.E.Br.
- Mes. calcareum** Marl. = **Titanopsis calcarea** Schwant.
- Mes. calcicolum** L.Bol. — Riversdale Divis., in Kalkstein nahe der See, nahe Eland's Kop in den Dünen, Guritz-Fluß, Melkhoutfontein. — A.B.H. IV. 5. ×
- Mes. calculus** Bgr. = **Conophytum calculus** N.E.Br.
- Mes. calculus** Bgr. var. *minutiflorum* Schwant. = **Conophytum minutiflorum** N.E.Br.
- Mes. calendulaceum** Haw. = **Apatesia helianthoides** N.E.Br.
- Mes. calycinum** Eckl. et Zeyh. = **Sphalmanthus canaliculatus** N.E.Br.
- Mes. calycinum** Haw. = **Drosanthemum calycinum** Schwant.
- Mes. campestre** Burch. = **Ruschia campestris** Schwant.
- Mes. canaliculatum** Haw. = **Sphalmanthus canaliculatus** N.E.Br.
- Mes. canaliculatum** S.D. = **Sphalmanthus salmoneus** N.E.Br.
- Mes. candens** Haw. = **Drosanthemum candens** Schwant.
- Mes. candidissimum** N.E.Br. = **Cheiridopsis candidissima** N.E.Br.
- Mes. Candollei** Haw. = **Apatesia helianthoides** N.E.Br.
- Mes. canescens** Haw. = **Ruschia pulchella** Schwant.
- Mes. caninum** Haw. = **Carruanthus caninus** Schwant.
- Mes. caninum** Haw. var. *paucidentatum* Salm. = **Mes. caninum** Haw. var. *vulpinum* Haw.
- Mes. caninum** Haw. var. *vulpinum* Haw. — (*Mes. vulpinum* Haw., *Mes. caninum* var. *paucidentatum* Salm.). — (Ist nach Schwantes wohl nur individuelle Form.) — B.M.P. 251. +
- Mes. canonotatum** L.Bol. = **Ruschia canonotata** Schwant.
- Mes. canum** Haw. (siehe N. E. Brown in G.C. [1929, I] 34 und L. Bolus in S.G. [1930] 121) ist eine heute sehr schwer festzustellende Art, die am besten zu den „ungenügend bekannten Arten“ zu stellen ist. Die Beschreibung Bergers in B.M.P. 279 soll nach Ansicht von

Prof. Schwantes nicht der Originalbeschreibung Haworths entsprechen. Diese Beschreibung paßt vielmehr zu dem heutigen *Deilanthus Peersii* N.E.Br., und muß wie folgt geschrieben werden:
Mes. canum (Haw.) Bgr. (im übrigen siehe *Bijlia cana* N.E.Br.).

Mes. canum (Haw.) Bgr. = *Deilanthus Peersii* N.E.Br.

Mes. canum Salm. = *Hereroa carinans* Dtr. et Schwant.

Mes. capillaceum L.Bol. = *Lampranthus capillaceus* N.E.Br.

Mes. capillare L. = *Drosanthemum capillare* Schwant.

Mes. capillare L. var. *acutifolium* L.Bol. = *Drosanthemum acutifolium* L.Bol.

Mes. capitatum Edwards = *Conicosia communis* N.E.Br.

Mes. capitatum Haw. = *Conicosia pugioniformis* N.E.Br.

Mes. Capornii L.Bol. — Kl.-Namaland, Garies. — A.B.H. II. 30. ×

Mes. Capornii L.Bol. f. *fera* L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Pakhuis Paß und Oumuur. — L.B. II. 405. ×

Mes. Capornii L.Bol. var. *longifolium* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Klaver. — L.B. II. 405. ×

Mes. capulatum L.Bol. Malmesbury Divis., Oliphant's River, nahe Saldanha Bay. — A.B.H. IV. 91. ×

Mes. carinans Bgr. = *Hereroa granulata* Dtr. et Schwant.

Mes. carinans Haw. = *Bergeranthus carinans* Schwant.

Mes. carinatum Vent. = *Semnanthe lacerum* N.E.Br.

Mes. carneum Haw. = *Sphalmanthus carneus* N.E.Br.

Mes. Caroli L.Bol. = *Ruschia Caroli* Schwant.

Mes. Caroli-Schmidtii Dtr. et Bgr. = *Cheiridopsis Caroli-Schmidtii* N.E.Br.

Mes. carolinense L.Bol. = *Khadia carolinensis* L.Bol.

Mes. caudatum L.Bol. = *Sphalmanthus caudatus* N.E.Br.

Mes. caulescens Mill. = *Oscularia caulescens* Schwant.

Mes. cauliculatum Haw. = *Cephalophyllum cauliculatum* N.E.Br.

Mes. cauliferum N.E.Br. = *Conophytum cauliferum* N.E.Br.

Mes. cedarbergensis L.Bol. — Clanwilliam Divis., Cedarberge, Pakhuis Pass. — L.B. II. 487. ×

Mes. ceratophyllum Willd. = *Mes. curvifolium* Haw.

Mes. ceriseum L.Bol. — Riversdale Divis., Melkhuisfontein bei Still Bay. — L.B. II. 327. ×

Mes. Chauviniae Schwant. = *Conophytum gracilistylum* N.E.Br.

Mes. chilense Molina = *Carpobrotus chilensis* N.E.Br.

Mes. chrysoleucum Schlecht. = *Monilaria chrysoleuca* Schwant.

Mes. cibdelum N.E.Br. = *Rubia cibdela* N.E.Br. — (Der Hinweis als Synonym zu *Conophytum truncatellum* N.E.Br. in M. 192 ist falsch.)

Mes. cigaretiferum Bgr. = *Cheiridopsis cigaretifera* N.E.Br.

Mes. ciliatum Ait., auch Thbg. = *Brownanthus ciliatus* Schwant.

Mes. ciliolatum N.E.Br. = *Ruschia concava* L.Bol.

Mes. cinctum L.Bol. — Riversdale Divis., nahe Riversdale. — A.B.H.

III. 133. ×

Mes. cinereum Marl. = *Namibia cinerea* Dtr. et Schwant.

Mes. citrinum L.Bol. — Malmesbury Divis., zwischen Kalabas Kraal und Malmesbury. — L.B. II. 326. ×

Mes. clandestinum Haw. = *Cryophytum clandestinum* N.E.Br.

Mes. clausum Dtr. = *Eberlanzia clausa* Schwant.

Mes. clavatum Haw. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.

Mes. clavatum Jacq. = *Aridaria defoliata* Schwant.

Mes. clavellatum (Haw.?) Bgr. = *Psilocaulon squamifolium* N.E.Br.

Mes. claviforme L.Bol. — Kl.-Namaland, sandige Flächen an der Hondeklip Bay. — A.B.H. IV. 95. ×

Mes. claviforme DC. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.

Mes. clavulatum Bgr. = *Psilocaulon clavulatum* N.E.Br.

Mes. cleistum N.E.Br. = *Ruschia cleista* L.Bol.

Mes. clivorum N.E.Br. = *Conophyllum clivorum* Schwant.

Mes. coccineum Eckl. et Zeyh. = *Mes. bicolorum* L.

Mes. coccineum Haw. = *Lampranthus coccineus* N.E.Br.

Mes. cognatum N.E.Br. = *Conophyllum cognatum* Schwant.

Mes. collinum Sond. = *Drosanthemum collinum* Schwant.

Mes. coloratum N.E.Br. = *Ruschia versicolor* L.Bol.

Mes. commutatum Bgr. = *Sphalmanthus commutatus* N.E.Br.

Mes. compactum Ait. = *Pleiospilos nobilis* Schwant.

Mes. compressum Haw. = *Erepsia compressa* Schwant.

Mes. Comptonii L.Bol. = *Lampranthus Comptonii* N.E.Br.

Mes. Comptonii L.Bol. var. *angustifolium* L.Bol. = *Lampranthus Comptonii* N.E.Br. var. *angustifolius* L.Bol.

Mes. Comptonii L.Bol. var. *roseum* L.Bol. = *Lampranthus Comptonii* N.E.Br. var. *roseus* L.Bol.

Mes. comptum N.E.Br. = *Ruschia concinna* L.Bol.

Mes. concavum Haw. = *Scletium concavum* L.Bol.

Mes. concinnum N.E.Br. = *Titanopsis Schwantesii* Schwant.

Mes. condensum N.E.Br. = *Ruschia condensa* Schwant.

Mes. confusum Dtr. = *Cephalophyllum confusum* Dtr. et Schwant.

Mes. congestum S.D. = *Ruschia congesta* L.Bol.

Mes. connatum N.E.Br. = *Ruschia connata* L.Bol.

Mes. conspicuum Haw. = *Lampranthus conspicuus* N.E.Br.

Mes. conspicuum S.D. et Bgr. = *Lampranthus Dyckii* N.E.Br.

Mes. constrictum L.Bol. = *Leipoldtia constricta* L.Bol.

Mes. convexum L.Bol. — S.-Afr., Tulbagh Divis. — L.B. II. 18. ×

Mes. Cookii L.Bol. = *Machairophyllum Cookii* Schwant.

Mes. Cooperi Hook. f. = *Delosperma Cooperi* L.Bol.

Mes. coptiosum L.Bol. — S.-Afr. — Standort unbekannt. — L.B.

II. 324. ×

- Mes. copticum* Jacq. = *Dorotheanthus apetalus* N.E.Br.
Mes. coralliferum S.D. = *Erepsia corallifera* Schwant.
Mes. coralliforme Vest. — B.M.P. 292. +
Mes. corallinum Thbg. = *Psilocaulon corallinum* Schwant.
Mes. cordifolium L.f. = *Aptenia cordifolia* Schwant.
Mes. cordifolium L.f. var. *variegatum* hort. = *Aptenia cordifolia* Schwant. var. *variegata* hort.
Mes. coriaria Burch. = *Psilocaulon stenopetalum* L.Bol.
Mes. corniculatum L. = *Cephalophyllum loreum* Schwant.
Mes. coruscans Haw. = *Conicosia coruscans* Schwant.
Mes. cradockense O.Ktze. = *Eberlanzia cradockensis* Schwant.
Mes. crassicaule Haw. = *Sceletium crassicaule* L.Bol.
Mes. crassifolium L. = *Disphyma crassifolia* L.Bol.
Mes. crassifolium Thbg. = *Lampranthus reptans* N.E.Br.
Mes. crassipes Marl. = *Titanopsis crassipes* N.E.Br.
Mes. crassulinum D.C. = *Delosperma crassuloides* L.Bol.
Mes. crassuloides Haw. = *Delosperma crassuloides* L.Bol.
Mes. crassulifolium N.E.Br. = *Ruschia crassuloides* L.Bol.
Mes. crassum L.Bol. = *Ruschia crassa* Schwant.
Mes. crateriforme L.Bol. = *Argyroderma crateriforme* N.E.Br.
Mes. crispum Haw. — (*Mes. crispatum* Haw.) — B.M.P. 292. +
Mes. criniflorum L.f. = *Dorotheanthus bellidiformis* N.E.Br.
Mes. croceum Jacq. = *Hymenocyclus croceus* Schwant.
Mes. croceum Jacq. var. *flavocroceum* D.C. = *Hymenocyclus flavo-croceus* Schwant.
Mes. cruciatum Haw. = *Glottiphyllum cruciatum* N.E.Br.
Mes. cruciatum S.D. = *Glottiphyllum longipes* N.E.Br.
Mes. cryptanthum Hook.f. = *Hydrodea cryptantha* N.E.Br.
Mes. cryptopodium Kensit = *Gibbaeum cryptopodium* L.Bol.
Mes. crystallinum L. = *Cryophytum crystallinum* N.E.Br.
Mes. crystallinum L. var. *grandiflorum* Eckl. et Zeyh. = *Cryophytum crystallinum* N.E.Br.
Mes. crystallophanes Eckl. et Zeyh. = *Cryophytum Aitonis* N.E.Br.
Mes. cultratum S.D. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum*.
Mes. cuneifolium Jacq. = *Micropterum cuneifolium* Schwant.
Mes. cupreum L.Bol. = *Cheiridopsis cuprea* N.E.Br.
Mes. cupulatum L.Bol. = *Ruschia cupulata* Schwant.
Mes. curtophyllum L.Bol. = *Cephalophyllum curtophyllum* Schwant.
Mes. curtum Haw. = *Ruschia curta* Schwant.
Mes. curviflorum Haw. = *Lampranthus curviflorus* N.E.Br.
Mes. curvifolium Haw. — (*Mes. ceratophyllum* Willd.) — S.-Afr. — B.M.P. 141. +

- Mes. curvifolium* Haw. var. *minus* Salm. — B.M.P. 142. +
Mes. cyathiforme L.Bol. = *Erepsia cyathiformis* Schwant.
Mes. cylindricum Haw. = *Calamophyllum cylindricum* Schwant.
Mes. cylindricum Haw. var. β Haw. = *Calamophyllum teretifolium* Schwant.
Mes. cylindricum Haw. var. *teretifolium* Haw. = *Calamophyllum teretifolium* Schwant.
Mes. cymbifolium Haw. = *Ruschia cymbifolium* L.Bol.
Mes. cymbiforme Haw. = *Corpuscularia cymbiformis* Schwant.
Mes. cymosum L.Bol. = *Ruschia cymosa* Schwant.
Mes. dactylinum Welw. = *Opophytum dactylinum* N.E.Br.
Mes. damaranum N.E.Br. = *Lithops karasmontana* N.E.Br.
Mes. dasyphyllum Schltr. = *Ruschia dasyphylla* Schwant.
Mes. dealbatum N.E.Br. = *Juttadinteria dealbata* L.Bol.
Mes. debile Haw. = *Lampranthus debilis* N.E.Br.
Mes. deceptum N.E.Br. = *Ruschia cymbifolia* L.Bol.
Mes. decipiens Haw. = *Cephalophyllum decipiens* L.Bol.
Mes. decurrens N.E.Br. = *Ruschia decurrens* L.Bol.
Mes. decussatum Thbg. — B.M.P. 69. +
Mes. deflectum N.E.Br. = *Ruschia decumbens* L.Bol.
Mes. deflexum Ait. = *Lampranthus deflexus* N.E.Br.
Mes. deflexum Haw. = *Mes. elegans* Jacq.
Mes. defoliatum Haw. = *Aridaria defoliata* Schwant.
Mes. Degreanum Sond. = *Lampranthus Degreanus* N.E.Br.
Mes. Dekenahi N.E.Br. = *Ruschia Dekenahi* Schwant.
Mes. Delaetianum Dtr. = *Dracophilus Delaetianus* Dtr. et Schwant.
Mes. delicatulum L.Bol. = *Drosanthemum delicatulum* Schwant.
Mes. deliciosum L.Bol. = *Carpobrotus deliciosus* L.Bol.
Mes. deltoides L. = *Oscularia deltoides* Schwant.
Mes. deltoides L. var. *majus* Weston = *Oscularia deltoides* Schwant.
var. *majus* Schwant.
Mes. deltoides L. var. *muricatum* Bgr. = *Oscularia deltoides* Schwant.
var. *muricata* Schwant.
Mes. deltoides L. var. *pedunculatum* N.E.Br. = *Oscularia deltoides* Schwant.
var. *pedunculata* Schwant.
Mes. deltoides L. var. *simplex* D.C. = *Oscularia caulescens* Schwant.
Mes. deltoides Mill. = *Oscularia deltoides* Schwant. — (Nicht *O. del-*
tata Schwant., wie irrthümlich angegeben in M.D.G.Ztg. [1927] 187.)
Mes. delum L.Bol. = *Aridaria dela* L.Bol.
Mes. demissum Willd. = *Disphyma australe* N.E.Br.
Mes. densifolium L.Bol. — Malmesbury Divis., nahe Vredenburg. —
L.B. I. 136. ×
Mes. densipetalum L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und
Kamieskroon. — L.B. II. 219. ×

- Mes. densum* Haw. = *Trichodiadema densum* Schwant.
Mes. dentatum Kern = *Semnanthe lacera* N.E.Br.
Mes. denticulatum Haw. = *Cheiridopsis denticulata* N.E.Br.
Mes. denticulatum Haw. var. *candidissimum* Haw. = *Cheiridopsis candidissima* N.E.Br.
Mes. denticulatum Haw. var. *canum* Haw. — B.M.P. 257. +
Mes. denticulatum Haw. var. *glaucum* Haw. — B.M.P. 257. +
Mes. dependens L.Bol. — Robertson Divis., Cogman's Kloof, nahe Montagu Baths. — A.B.H. III. 134. ×
Mes. depranophyllum Bgr. = *Lampranthus depranophyllus* N.E.Br.
Mes. depressum Haw. = *Glottiphyllum depressum* N.E.Br.
Mes. depressum Haw. var. *lividum* Haw. = *Glottiphyllum rufescens* Tisch.
Mes. depressum Haw. var. *pallens* Haw. = *Glottiphyllum taurinum* N.E.Br.
Mes. depressum S.D. = *Glottiphyllum latum* var. *cultratum* N.E.Br.
Mes. Derenbergianum Dtr. = *Ebracteola Derenbergiana* Dtr. et Schwant.
Mes. deserticolum Marl. = *Juttadinteria deserticola* Schwant.
Mes. dichroum Rolfe = *Ruschia dichroa* L.Bol.
Mes. difforme Haw. = *Glottiphyllum difforme* N.E.Br.
Mes. difforme Thbg. = *Cheiridopsis difformis* N.E.Br.
Mes. diffusum L.Bol. = *Lampranthus diffusus* N.E.Br.
Mes. digitatum Ait. = *Dactyloopsis digitata* N.E.Br.
Mes. digitiforme Thbg. = *Dactyloopsis digitata* N.E.Br.
Mes. dilatatum Haw. — B.M.P. 172. +
Mes. dimidiatum Bgr. = *Carpobrotus Juritzii* L.Bol.
Mes. dimidiatum Haw. = *Semnanthe lacera* N.E.Br.
Mes. diminutum Haw. = *Cephalophyllum diminutum* L.Bol.
Mes. diminutum Haw. var. *canaliculatum* Haw. = *Cephalophyllum cauliculatum* N.E.Br.
Mes. deminutum Haw. var. *pallidum* Haw. = *Cephalophyllum diminutum* L.Bol.
Mes. dimorphum Welw. = *Psilocaulon dimorphum* N.E.Br.
Mes. Dinterae Dtr. = *Chasmatophyllum musculinum* Dtr. et Schwant.
Mes. Dinteri Engl. = *Psilocaulon Dinteri* Schwant.
Mes. diplosum N.E.Br. = *Ruschia patens* L.Bol.
Mes. disgregum N.E.Br. = *Erepsia stipulacea* Schwant.
Mes. dissimile N.E.Br. = *Cephalophyllum dissimile* Schwant.
Mes. dissitum N.E.Br. = *Conophyllum dissitum* Schwant.
Mes. distans L.Bol. — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 89. ×
Mes. diutinum L.Bol. = *Lampranthus diutinus* N.E.Br.

- Mes. divergens** Kensit. — S.-Afr., Matjesfontein. — Tr.R.S. I. 151; F.R. XI. 477. ×
- Mes. diversifolium** Haw. = **Cephalophyllum diversiphyllum** N.E.Br.
- Mes. diversifolium** Haw. var. **congestum** Salm. = **Cephalophyllum diversiphyllum** N.E.Br.
- Mes. diversifolium** L. = **Cephalophyllum densum** N.E.Br.
- Mes. diversifolium** L.Bol. = **Cephalophyllum ramosum** N.E.Br.
- Mes. diversipapillosum** Bgr. = **Psilocaulon diversipapillosum** N.E.Br.
- Mes. diversiphyllum** Haw. = **Cephalophyllum diversiphyllum** N.E.Br.
- Mes. dolabrilforme** L. = **Rhombophyllum dolabrilforme** Schwant.
- Mes. dolomiticum** Dtr. = **Ruschia dolomitica** Dtr. et Schwant.
- Mes. Dregeanum** Sond. = **Erepsia Dregeana** Schwant.
- Mes. duale** N.E.Br. = **Antimima dualis** N.E.Br.
- Mes. dubitans** L.Bol. — Ceres Divis., Abhänge und Ebenen am Fuße des Matroosberges. — L.B. II. 119. ×
- Mes. dubium** Haw. = **Cephalophyllum dubium** L.Bol.
- Mes. Duckittiae** L.Bol. — Darling Divis. — A.B.H. IV. 15. ×
- Mes. dulce** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Tal des Olifants-Flusses bei Warmbaths. — L.B. II. 328. ×
- Mes. dumosum** N.E.Br. = **Ruschia virens** L.Bol.
- Mes. dunense** Sond. — S.-Afr., am Strande bei Kapstadt. — B.M.P. 208. +
- Mes. Duthiae** L.Bol. — S.-Afr., South Western Reg., Knysna. — A.B.H. III. 162. ×
- Mes. Dyckii** Bgr. = **Lampranthus Dyckii** N.E.Br.
- Mes. Dyeri** N.E.Br. = **Ruschia Dyeri** L.Bol.
- Mes. Eberlanzii** Dtr. et Schwant. = **Lithops Eberlanzii** N.E.Br.
- Mes. ebracteatum** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — A.B.H. I. 191. ×
- Mes. ebracteatum** (Pax) Schltr. et Diels = **Cephalophyllum ebracteatum** Dtr. et Schwant.
- Mes. echinatum** Ait. = **Delosperma echinatum** Schwant.
- Mes. Ecklonis** Salm. = **Delosperma Ecklonis** Schwant.
- Mes. edentulum** Haw. = **Echinus edentulus** N.E.Br.
- Mes. edule** L. = **Carpobrotus edulis** L.Bol.
- Mes. edule** L. var. **virescens** Moss. = **Carpobrotus edulis** L.Bol.
- Mes. Edwardsiae** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Olifants-Flußtal. — A.B.H. III. 163. ×
- Mes. egregium** L.Bol. — Montagu Divis., 2 miles von Montagu längs des Weges nach Ladismith. — L.B. III. 12. ×
- Mes. elegans** Jacq. = **Lampranthus elegans** Schwant.
- Mes. elineatum** N.E.Br. = **Ruschia elineata** L.Bol.

- Mes. Elishae* N.E.Br. = *Conophytum Elishae* N.E.Br.
Mes. Elizae Dtr. et Bgr. = *Juttadinteria Elizae* L.Bol.
Mes. elongatum Haw. = *Conicosia elongata* Schwant.
Mes. elongatum Haw. v. „b“ Haw. = *Conicosia elongata* Schwant.
Mes. elongatum Haw. var. *minus* Haw. = *Conicosia elongata* Schwant.
Mes. elongatum S.D. = *Conicosia affinis* N.E.Br.
Mes. elongatum Thbg. = *Platythyra Haeckeliana* N.E.Br.
Mes. emarcidum Thbg. = *Sceletium anatomicum* L.Bol.
Mes. emarginatoides Haw. = *Lampranthus emarginatioides* N.E.Br.
Mes. emarginatum Eckl. et Zeyh. = *Lampranthus bicolorus* N.E.Br.
Mes. emarginatum L. = *Lampranthus emarginatum* N.E.Br.
Mes. emarginatum L. var. *puniceum* Jacq. = *Lampranthus emarginatus* var. *puniceus* Schwant.
Mes. Englerianum Dtr. et Bgr. = *Hymenocyclus Englerianus* Dtr. et Schwant.
Mes. Englishiae L.Bol. — Robertson. — A.B.H. III. 125. ×
Mes. enormis N.E.Br. = *Ruschia tuberculosa* L.Bol.
Mes. erectum hort. — B.M.P. 292. +
Mes. erectum L.Bol. = *Ruschia erecta* Schwant.
Mes. erigeriflorum Jacq. = *Drosanthemum brevifolium* Schwant.
Mes. erminium Haw. = *Stomatium erminium* Schwant.
Mes. Ernestii L.Bol. — Bredasdorp Divis., bei Bredasdorp. — L.B. II. 327. ×
Mes. evolutum N.E.Br. = *Ruschia evoluta* L.Bol.
Mes. exacutum N.E.Br. = *Ruschia acuminata* L.Bol.
Mes. excavatum L.Bol. = *Cryophytum excavatum* L.Bol.
Mes. excedens L.Bol. — S.-Afr., zwischen Piquetberg und Clanwilliam. — L.B. II. 324. ×
Mes. exiguum N.E.Br. = *Cheiridopsis difformis* N.E.Br.
Mes. exile N.E.Br. = *Ruschia glauca* L.Bol.
Mes. expansum D.C. = *Prenia pallens* N.E.Br.
Mes. expansum L. = *Sceletium expansum* L.Bol.
Mes. expansum Thbg. = *Skatophytum Tripolium* L.Bol.
Mes. expersum N.E.Br. = *Drosanthemum expersum* Schwant.
Mes. explanatum L.Bol. = *Lampranthus explanatus* N.E.Br.
Mes. falcatum L. = *Lampranthus falcatus* N.E.Br.
Mes. falcatum L. var. *Galpinii* L.Bol. = *Lampranthus falcatus* N.E.Br. var. *Galpinii* L.Bol.
Mes. falcatum Thbg. = *Semnanthe lacera* N.E.Br.
Mes. falciforme Haw. = *Lampranthus falciformis* N.E.Br.
Mes. familiare Schwant. = *Conophytum Purpusii* N.E.Br.
Mes. fastigiatum Haw. = *Aridaria fastigiata* Schwant.
Mes. fastigiatum Thbg. = *Opophytum fastigiatum* N.E.Br.
Mes. felinum (Haw.) Hill. = *Faucaria felina* Schwant.

Mes. Fenchelii Schinz = *Cryophytum Fenchelii* N.E.Br.

Mes. Fergusoniae L.Bol. — S.-Afr., Kalkdünen bei Riversdale. —

L.B. II. 427. ×

Mes. Fergusoniae N.E.Br. = *Ruschia Fergusoniae* L.Bol.

Mes. ferrugineum Schwant. = *Lithops Lesliei* N.E.Br.

Mes. festivum N.E.Br. = *Ruschia festiva* Schwant.

Mes. fibuliforme Haw. = *Conophytum fibuliforme* N.E.Br.

Mes. ficiforme Haw. = *Conophytum ficiforme* N.E.Br.

Mes. filamentosum D.C. = *Erepsia mutabilis* Schwant.

Mes. filamentosum D.C. var. *anceps* D.C. = *Ruschia forficata* L.Bol.

Mes. filamentosum L. = *Ruschia filamentosa* L.Bol.

Mes. filicaule Haw. = *Lampranthus filicaulis* N.E.Br.

Mes. filiforme Thbg. — B.M.P. 293. +

Mes. filipetalum N.E.Br. = *Ruschia filipetalum* L.Bol.

Mes. fimbriatum Marl. = *Conophytum saxetanum* N.E.Br.

Mes. fimbriatum Sond. = *Conophytum fimbriatum* N.E.Br.

Mes. firmum N.E.Br. = *Ruschia brevipes* L.Bol.

Mes. fissoides Haw. = *Gibbaeum Nelii* Schwant.

Mes. fissum Haw. = *Argyroderma fissum* L.Bol.

Mes. flaccidum L.Bol. = *Lampranthus marcidulus* N.E.Br.

Mes. Flagananii Kensit = *Delosperma tradescantioides* L.Bol.

Mes. flavens N.E.Br. = *Ruschia lutea* L.Bol.

Mes. flavocroceum Haw. = *Hymenocyclus flavocroceus* Schwant.

Mes. flavum Haw. = *Drosanthemum flavum* Schwant.

Mes. flexifolium Haw. = *Lampranthus flexifolius* N.E.Br.

Mes. flexile Haw. = *Lampranthus flexilis* N.E.Br.

Mes. flexuosum Haw. = *Aridaria flexuosa* Schwant.

Mes. flexuosum S.D. = *Aridaria acuminata* Schwant.

Mes. floribundum Haw. = *Drosanthemum floribundum* Schwant.

Mes. floriferum N.E.Br. = *Ruschia Pillansii* L.Bol.

Mes. foliolosum Haw. = *Ruschia tumidula* Schwant.

Mes. forficatum Jacq. = *Erepsia mutabilis* Schwant.

Mes. forficatum L. = *Ruschia forficata* L.Bol.

Mes. formosum Haw. = *Lampranthus formosus* N.E.Br.

Mes. formosulum N.E.Br. = *Ruschia Peersii* L.Bol.

Mes. Forskahlü Hochst. = *Opophytum Forskahlü* N.E.Br.

Mes. Fourcadei L.Bol. = *Drosanthemum Fourcadei* Schwant.

Mes. Fourcadei N.E.Br. = *Ruschia Fourcadei* L.Bol.

Mes. fragrans S.D. = *Glottiphyllum fragrans* Schwant.

Mes. Framesii L.Bol. = *Lampranthus Framesii* N.E.Br.

Mes. Framesii N.E.Br. = *Ruschia Framesii* L.Bol.

Mes. Franciscii Dtr. et Schwant. = *Lithops Franciscii* N.E.Br.

Mes. fraternum N.E.Br. = *Conophytum fraternum* N.E.Br.

- Mes. Frederici* L.Bol. — Cape Prov., South Western Reg., Hex River Valley (Hex-Flußtal), Orchard Siding. — A.B.H. II. 31. ×
- Mes. Friedrichiae* Dtr. = *Ophthalmophyllum Friedrichiae* Dtr. et Schwant.
- Mes. Frithii* L.Bol. = *Peersia Frithii* L.Bol.
- Mes. fulviceps* N.E.Br. = *Lithops fulviceps* N.E.Br.
- Mes. fulvum* Haw. = *Aridaria fulva* Schwant.
- Mes. furvum* L.Bol. = *Lampranthus furvus* N.E.Br.
- Mes. fusiforme* Haw. = *Conicosia fusiformis* N.E.Br.
- Mes. Galpiniae* L.Bol. — Bredasdorp Divis., Struis Bay bei Cape Agulhas. — L.B. II. 328. ×
- Mes. gariusianum* Dtr. = *Cryophytum gariusianum* Dtr.
- Mes. geminatum* Haw. = *Echinus geminatus* L.Bol.
- Mes. geminatum* Jacq. = *Mes. geminiflorum* Haw.
- Mes. geminiflorum* Haw. — (*Mes. geminatum* Jacq.). — B.M.P. 212. +
- Mes. geminum* N.E.Br. = *Ruschia gemina* L.Bol.
- Mes. geminum* N.E.Br. als Synonym zu *Gibbaeum geminum* N.E.Br. (Dr. Tischer in D.K.G. [1927/28] 227) ist ein Irrtum.
- Mes. geniculiflorum* L. — B.M.P. 63. +
- Mes. Gessertianum* Dtr. et Bgr. = *Psilocaulon Gessertianum* Schwant.
- Mes. gibbosum* Haw. = *Gibbaeum gibbosum* N.E.Br.
- Mes. Giffenii* L.Bol. — Montagu Divis., zwischen Montagu und Barrydale. — A.B.H. IV. 12. ×
- Mes. Giffenii* L.Bol. var. *intertextum* L.Bol. — Riversdale Divis., Oakdale. — A.B.H. IV. 76. ×
- Mes. Gigas* Dtr. = *Stöberia Gigas* Dtr. et Schwant.
- Mes. glabrum* Ait. = *Hymenogyne glabra* Haw.
- Mes. glabrum* Andr. = *Carpanthea pomeridiana* N.E.Br.
- Mes. glaciale* Haw. = *Cryophytum crystallinum* N.E.Br.
- Mes. gladiatum* Jacq. = *Semnanthe lacerum* N.E.Br.
- Mes. glareosum* Dtr. et Bgr. = *Psilocaulon glareosum* Schwant.
- Mes. glaucescens* Haw. = *Carpobrotus glaucescens* Schwant.
- Mes. glaucinum* Haw. = *Erepsia mutabilis* Schwant.
- Mes. glaucoides* Haw. = *Lampranthus glaucoides* N.E.Br.
- Mes. glaucum* L. = *Lampranthus glaucus* N.E.Br.
- Mes. glaucum* L. var. *tortuosum* Haw. = *Lampranthus glaucum* N.E.Br. var. *tortuosum* Schwant.
- Mes. globula* Schwant. = *Conophytum leviculatum* N.E.Br.
- Mes. globosum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Van Rhyn's Paß. — L.B. II. 233. ×
- Mes. glomeratum* L. = *Lampranthus glomeratus* N.E.Br.
- Mes. Godmaniae* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — L.B. II. 141. ×

- Mes. Godmaniae* L.Bol. var. *grandiflorum* L.Bol. — Ceres Divis., zwischen Patat's Fluß und Karroopoort. — L.B. II. 326. ×
- Mes. Goodiae* N.E.Br. = *Ruschia Goodiae* L.Bol.
- Mes. gracile* Haw. = *Erepsia gracilis* L.Bol.
- Mes. gracilipes* L.Bol. = *Lampranthus gracilipes* N.E.Br.
- Mes. gracilistylum* L.Bol. = *Conophytum gracilistylum* N.E.Br.
- Mes. gramineum* Haw. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.
- Mes. grandiflorum* Haw. = *Glottiphyllum grandiflorum* N.E.Br.
- Mes. grandifolium* Schinz = *Cryophytum grandifolium* Dtr. et Schwant.
- Mes. graniforme* Haw. — Laingsburg Divis., „in the Koup“. — L.B. II. 128. +
- Mes. graniticum* L.Bol. — Kl.-Namaland, „on masses of granite Platte Klip“. — A.B.H. IV. 88. ×
- Mes. granulatum* N.E.Br. = *Hereroa granulata* Dtr. et Schwant.
- Mes. granulicaule* Haw. = *Psilocaulon granulicaule* N.E.Br.
- Mes. gratum* N.E.Br. = *Conophytum gratum* N.E.Br.
- Mes. griquense* L.Bol. = *Ruschia griquensis* Schwant.
- Mes. griseum* L.Bol. = *Ruschia grisea* Schwant.
- Mes. grossum* Ait. = *Sphalmanthus grossum* N.E.Br.
- Mes. grossum* Haw. = *Sphalmanthus carneus* N.E.Br.
- Mes. guianense* Klotzsch. — B.M.P. 293. +
- Mes. Gurichianum* Pax = *Amoebophyllum Gurichianum* N.E.Br.
- Mes. Guthrieae* L.Bol. = *Lampranthus Guthrieae* N.E.Br.
- Mes. gymnocladum* Schltr. et Diels = *Psilocaulon arenosum* L.Bol.
- Mes. Haagei* Bgr. = *Faucaria Haagei* Tisch.
- Mes. Haeckelianum* Bgr. = *Platythyra Haeckeliana* N.E.Br.
- Mes. halenbergense* Dtr. et Schwant. = *Conophytum halenbergense* N.E.Br.
- Mes. hamatile* N.E.Br. = *Ruschia hamatilis* L.Bol.
- Mes. hamatum* L.Bol. = *Ruschia hamata* Schwant.
- Mes. harazianum* Deff. — B.M.P. 293. +
- Mes. Haworthii* Don. = *Erepsia Haworthii* Schwant.
- Mes. Heathii* N. E.Br. = *Gibbaeum Heathii* L.Bol.
- Mes. hebes* N.E.Br. = *Ruschia obtusa* L.Bol.
- Mes. helianthoides* Ait. = *Apatesia helianthoides* N.E.Br.
- Mes. helianthoides* Ait. var. *glabrum* Sond. — B.M.P. 30. +
- Mes. Henricii* L.Bol. = *Lampranthus Henricii* N.E.Br.
- Mes. herbeum* N.E.Br. = *Delosperma herbeum* N.E.Br.
- Mes. Hermannii* Pax = *Drosanthemum Hermannii* Schwant.
- Mes. Herrei* N.E.Br. = *Ruschia Herrei* Schwant.
- Mes. Herrei* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kommaggas, Sandberge. — L.B. II. 276. ×

- Mes. hesperanthum* Dtr. et Bgr. = *Hereroa hesperantha* Dtr. et Schwant.
- Mes. hesperanthum* L.Bol. = *Mes. vigilans* L.Bol.
- Mes. heteropetalum* Haw. = *Erepsia heteropetala* Schwant.
- Mes. heterophyllum* Haw. — (*Glottiphyllum*? nach N.E.Br.). — S.-Afr.. Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 22; G.C. (1928, I) 49; D.K.G. (1929) 107.
- Mes. heterophyllum* Jackson = *Glottiphyllum longum* N.E.Br. var. *hamatum* N.E.Br.
- Mes. hexamerum* N.E.Br. = *Ruschia hexamera* L.Bol.
- Mes. hiemale* L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 189. ×
- Mes. hirsutum* Haw. = *Trichodiadema stellatum* Schwant.
- Mes. hirtellum* Haw. = *Drosanthemum hirtellum* Schwant.
- Mes. hirtum* N.E.Br. = *Delosperma hirtum* Schwant.
- Mes. hispidum* L. = *Drosanthemum hispidum* Schwant.
- Mes. hispidum* L. var. *a* Thbg. = *Drosanthemum candens* Schwant.
- Mes. hispidum* L. var. *pallidum* Haw. = *Drosanthemum floribundum* Schwant.
- Mes. hispidum* L. var. *platypetalum* Haw. = *Drosanthemum hispidum* Schwant. var. *platypetalum* Schwant.
- Mes. hispidifolium* Haw. = *Drosanthemum hispidifolium* Schwant.
- Mes. Hörteianum* Dtr. — Gr.-Namaland, Buntfeldschuh-Plateau, Klinghardtgebirge. — D.B.F. XIX. 153. +
- Mes. Hollandii* L.Bol. — S.-Afr., Alexandria Divis. — L.B. II. 274. ×
- Mes. Hookeri* Bgr. = *Lithops Hookeri* Schwant.
- Mes. horizontale* Haw. = *Aridaria horizontalis* Schwant.
- Mes. hospitale* Dtr. = *Eberlanzia hospitalis* Schwant.
- Mes. Hugo-Schlechteri* Tisch. = *Titanopsis Hugo-Schlechteri* Dtr. et Schwant.
- Mes. humifusum* Ait. = *Micropterum papulosum* Schwant.
- Mes. humile* Haw. — B.M.P. 209, 293. +
- Mes. humile* L.Bol. — Swellendam Divis? — L.B. II. 73. ×
- Mes. Hurlingii* L.Bol. — Robertson Divis., Bushman's Fluß in McGregor. — L.B. II. 427. ×
- Mes. Hutchinsonii* N.E.Br. = *Ruschia Hutchinsonii* L.Bol.
- Mes. hybridum* Haw. — B.M.P. 251. +
- Mes. hypertrophicum* Dtr. = *Halenbergia hypertrophica* Dtr.
- Mes. imbricans* Haw. = *Lampranthus imbricans* N.E.Br.
- Mes. imbricatum* Haw. = *Ruschia imbricata* Schwant.
- Mes. imbricatum* Haw. var. *rubrum* Haw. = *Ruschia tumidule* Schwant.
- Mes. Immelmaniae* L.Bol. = *Lampranthus Immelmaniae* N.E.Br.
- Mes. inachabense* Engl. = *Callistigma inachabensis* Dtr. et Schwant.

- Mes. inaequale* Haw. = *Lampranthus inaequalis* N.E.Br.
Mes. incidens N.E.Br. = *Ruschia incidens* L.Bol.
Mes. inclaudens Eckl. et Zeyh. = *Erepsia inclaudens* Schwant.
Mes. inclaudens Haw. = *Erepsia inclaudens* Schwant.
Mes. inclusum L.Bol. = *Octopoma inclusum* N.E.Br.
Mes. incomptum Haw. — Prieska Divis., zwischen Brak River und Vaal River (Fluß). — N.E.Br.M. 131. +
Mes. incomptum S.D. = *Mes. invalidum* N.E.Br.
Mes. incomptum var. *Ecklonis* D.S. = *Mes. invalidum* N.E.Br.
Mes. inconspicuum Haw. = *Lampranthus inconspicuus* Schwant.
Mes. incurvatum N.E.Br. = *Ruschia incurvata* L.Bol.
Mes. incurvum Haw. = *Lampranthus incurvus* Schwant.
Mes. incurvum Haw. var. *roseum* D.C. = *Lampranthus roseus* Schwant.
Mes. indecorum L.Bol. = *Ruschia indecora* Schwant.
Mes. induratum L.Bol. = *Ruschia indurata* Schwant.
Mes. inexpectatum Dtr. = *Dinteranthus inexpectatus* Schwant.
Mes. inflexum Haw. = *Lampranthus glomeratus* N.E.Br.
Mes. insigne Schltr. = *Erepsia insignis* Schwant.
Mes. insitum Willd. = *Hymenocylus croceus* Schwant.
Mes. insolitum L.Bol. = *Juttadinteria insolita* L.Bol.
Mes. inspersum N.E.Br. = *Cheiridopsis inspersa* N.E.Br.
Mes. integrum L.Bol. = *Ruschia integra* Schwant.
Mes. intermedium L.Bol. = *Drosanthemum intermedium* L.Bol.
Mes. intervallare L.Bol. = *Mossia intervallare* N.E.Br.
Mes. intonsum Haw. = *Trichodiadema intonsum* Schwant.
Mes. intricatum N.E.Br. = *Eberlanzia intricata* Schwant.
Mes. introrsum Hook.f. = *Trichodiadema introrsum* Schwant.
Mes. intrusum Kensit. — S.-Afr., Hügel nahe Robertson. — Tr.U.S. I. 151; F.R. XI. 477. ×
Mes. invalidum N.E.Br. — (*Mes. incomptum* S.D., *Mes. incomptum* var. *Ecklonis* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 105. +
Mes. iteratum N.E.Br. = *Ruschia Britteniae* L.Bol.
Mes. Ivori N.E.Br. = *Ruschia Ivori* Schwant.
Mes. Johannis Winkleri Dtr. et Schwant. = *Conophytum Johannis Winkleri* N.E.Br.
Mes. jucundum N.E.Br. = *Conophytum jucundum* N.E.Br.
Mes. jugiferum N.E.Br. = *Conophytum jugiferum* N.E.Br.
Mes. Julii Dtr. et Schwant. = *Lithops Julii* N.E.Br.
Mes. junceum Haw. = *Psilocaulon junceum* Schwant.
Mes. junceum Haw. var. *pauciflorum* Sond. = *Psilocaulon pauciflorum* Schwant.
Mes. junceum L.Bol. = *Psilocaulon squamifolium* N.E.Br.

- Mes. Juritzii* L.Bol. = *Carpobrotus Juritzii* L.Bol.
Mes. Juttae Dtr. et Bgr. = *Synaptophyllum Juttae* N.E.Br.
Mes. karasbergense L.Bol. — Gr.-Namaland, Centr. Karasberge,
Ebene westl. Krai-Kluft. — A.B.H. I. 17. ×
Mes. karasmontanum Dtr. = *Lithops karasmontana* N.E.Br.
Mes. karroicum L.Bol. = *Ruschia karroica* L.Bol.
Mes. klaverense L.Bol. — Clanwilliam Divis., Klaver. — A.B.H.
IV. 96. ×
Mes. klinghardtianum Dtr. = *Delosperma klinghardtianum* Schwant.
Mes. knysnanum L.Bol. = *Ruschia knysnana* L.Bol.
Mes. Kolbei L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp.
— A.B.H. III. 131. ×
Mes. kovisimontanum Dtr. = *Juttadinteria kovisimontana* Dtr. et
Schwant.
Mes. Kuntzei Schinz = *Psilocaulon Schlichtianum* Schwant.
Mes. labyrinthum N.E.Br. = *Conophytum labyrinthum* N.E.Br.
Mes. lacerum Haw. = *Semnanthe lacerum* N.E.Br.
Mes. lacunatum N.E.Br. = *Ruschia velutina* L.Bol.
Mes. laetum L.Bol. — Montagu Divis., in den felsigen Cliffs der
Montagu Baths Ravine. — L.B. II. 189. ×
Mes. laeve Ait. — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 103. +
Mes. laeve L.Bol. = *Cephalophyllum densum* N.E.Br.
Mes. laeve Thbg. = *Hymenocyclus Thunbergii* L.Bol.
Mes. laevigatum Haw. = *Carpobrotus laevigatus* Schwant.
Mes. lanceolatum Haw. (incl. variet.) = *Cryophytum Aitonis* N.E.Br.
Mes. lanceum Thbg. = *Prenia pallens* N.E.Br.
Mes. lapidiforme Marl. = *Didymaotus lapidiformis* N.E.Br.
Mes. latens N.E.Br. = *Ruschia inconspicua* L.Bol.
Mes. lateriflorum D.C. = *Drosanthemum brevifolium* Schwant.
Mes. latum Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
Mes. latum Haw. var. *breve* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
Mes. latum L.Bol. = *Lampranthus plautus* N.E.Br.
Mes. Lawisii L.Bol. — Humansdorp Divis., Assegai Bosch. — L.B.
II. 156. ×
Mes. Lawsonii L.Bol. — Kalahari Reg., Hay Divis., Papkuil. —
A.B.H. IV. 85. ×
Mes. laxifolium L.Bol. = *Lampranthus laxifolius* N.E.Br.
Mes. laxipetalum N.E.Br. = *Ruschia laxipetala* L.Bol.
Mes. laxum L.Bol. — S.-Afr., bei Nieuwoudtsville, genauer Standort
unbekannt. — L.B. II. 406. ×
Mes. laxum Willd. — B.M.P. 123. +
Mes. lectum N.E.Br. = *Cheiridopsis lecta* N.E.Br.
Mes. Lehmannii Eckl. et Zeyh. = *Corpuscularia Lehmannii* Schwant.

- Mes. Leightoniae* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Kromme River, Cedarberge. — L.B. II. 488. ×
- Mes. Leipoldtii* L.Bol. — Worcester Divis., zwischen Worcester und Villiersdorp. — L.B. II. 156. ×
- Mes. Leipoldtii* N.E.Br. = *Ruschia Leipoldtii* L.Bol.
- Mes. lene* N.E.Br. = *Ruschia mollis* Schwant.
- Mes. lepidum* Haw. = *Lampranthus productus* N.E.Br. var. *lepidus* Schwant.
- Mes. leptaleon* Haw. = *Lampranthus leptaleon* N.E.Br.
- Mes. leptarthron* Bgr. = *Psilocaulon leptarthron* N.E.Br.
- Mes. leptosepalum* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Uitkyk-Paß, Cedarberge. — L.B. II. 489. ×
- Mes. Lericheanum* Dtr. et Schwant. = *Lithops Lericheana* Dtr. et Schwant.
- Mes. Lerouxiae* L.Bol. = *Lampranthus Lerouxiae* N.E.Br.
- Mes. Lesliei* N.E.Br. = *Lithops Lesliei* N.E.Br.
- Mes. leucantherum* L.Bol. = *Ruschia leucanthera* L.Bol.
- Mes. leviculum* N.E.Br. = *Conophytum leviculum* N.E.Br.
- Mes. Lervysiae* L.Bol. — S.-Afr., Gansfontein zwischen Ceres und Calvinia. — S.G. (1927) 238; L.B. I. 69, 128. ×
- Mes. Lewisiae* L.Bol. — Ceres Divis., Gydouw-Paß. — L.B. III. 54. ×
- Mes. limbatum* N.E.Br. = *Ruschia limbata* Schwant.
- Mes. limpidum* Ait. = *Micropterum limpidum* Schwant.
- Mes. Lindequistii* Engl. = *Psilocaulon Lindequistii* Schwant.
- Mes. lineare* Thbg. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.
- Mes. lineolatum* Haw. = *Ruschia lineolata* Schwant.
- Mes. linguaeforme* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguaeforme* Haw. var. *assurgens* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguaeforme* Haw. var. *prostratum* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguaeforme* Haw. var. *rufescens* Haw. = *Glottiphyllum rufescens* Tisch.
- Mes. linguaeforme* Haw. var. *subcruciatum* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguaeforme* S.D. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. = *Glottiphyllum linguiforme* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *adscendens* Bgr. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *angustum* Bgr. = *Glottiphyllum taurinum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *attollens* Bgr. = *Glottiphyllum uncatum* N.E.Br.

- Mes. linguiforme* L. var. *cultratum* Bgr. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *cultratum* Bgr. subvar. *perviride* Salm. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *depressum* Bgr. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *flaccidum* Bgr. = *Glottiphyllum depressum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *fragrans* Bgr. = *Glottiphyllum fragrans* Schwant.
- Mes. linguiforme* L. var. *grandiflorum* Bgr. = *Glottiphyllum grandiflorum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *latum* S.D. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr. subvar. *angustius* Haw. — B.M.P. 240. +
- Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr. subvar. *attollens* Haw. — B.M.P. 240. +
- Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr. subvar. *declive* Haw. — B.M.P. 240. +
- Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr. subvar. *flaccidum* Haw. — B.M.P. 240. +
- Mes. linguiforme* L. var. *longum* Bgr. subvar. *purpurascens* Haw. — B.M.P. 240. +
- Mes. linguiforme* L. var. *obliquum* Bgr. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *obliquum* Bgr. subvar. *assurgens* Haw. — B.M.P. 241. +
- Mes. linguiforme* L. var. *obliquum* Bgr. subvar. *prostratum* Haw. — B.M.P. 241. +
- Mes. linguiforme* L. var. *obliquum* Bgr. subvar. *subcruciatum* Haw. — B.M.P. 241. +
- Mes. linguiforme* L. var. *purpurascens* Bgr. — D.K.G. (1929) 107. +
- Mes. linguiforme* L. var. *pustulatum* Bgr. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *pustulatum* Bgr. subvar. *lividum* Salm. — B.M.P. 240. +
- Mes. linguiforme* L. var. *scalpratum* Bgr. = *Glottiphyllum linguiforme* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* L. var. *uncatum* Bgr. = *Glottiphyllum uncatum* N.E.Br.
- Mes. linguiforme* S.D. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br.
- Mes. lique* N.E.Br. = *Drosanthemum lique* Schwant.

- Mes. litorale* Kensit = *Delosperma litorale* L.Bol.
Mes. locale N.E.Br. = *Lithops localis* Schwant.
Mes. longifolium L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — J.B. (1928) 196. ×
Mes. longipes N.E.Br. = *Ruschia longipes* L.Bol.
Mes. longisepalum L.Bol. — S.-Afr., zwischen Karroo Poort (in Ceres Divis.) und Calvinia. — L.B. II. 198. ×
Mes. longispinulum Haw. = *Sphalmanthus longispinulus* N.E.Br.
Mes. longispinulum S.D. = *Sphalmanthus commutatus* N.E.Br.
Mes. longispinulosum Sond. = *Sphalmanthus canaliculatus* N.E.Br.
Mes. longistamineum L.Bol. = *Lampranthus longistamineus* N.E.Br.
Mes. longistylum D.C. = *Aridaria longistyla* Schwant.
Mes. longistylum D.C. var. *purpurascens* D.C. — (*Mes. pallescens* var. α Haw., *Mes. reflexum* Haw.). — B.M.P. 123. +
Mes. longistylum L.Bol. = *Lampranthus altistylus* N.E.Br.
Mes. longum Haw. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br.
Mes. longum Haw. (nach Dillenius) = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
Mes. longum var. β Haw. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br.
Mes. longum Haw. var. *angustum* Haw. — G.C. (1927, II) 471. ×
Mes. longum Haw. var. *attollens* Haw. = *Glottiphyllum uncatum* N.E.Br.
Mes. longum Haw. var. *declive* Haw. = *Glottiphyllum depressum* N.E.Br.
Mes. longum Haw. var. *declive* S.D. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
Mes. longum Haw. var. *flaccidum* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
Mes. longum Haw. var. *purpurascens* Haw. — G.C. (1927, II) 471; D.K.G. (1929) 107. ×
Mes. longum Haw. var. *uncatum* Haw. = *Glottiphyllum uncatum* N.E.Br.
Mes. loratum Haw. = *Prenia pallens* N.E.Br.
Mes. loreum Haw. = *Cephalophyllum diversiphyllum* N.E.Br.
Mes. loreum L. = *Cephalophyllum diversiphyllum* N.E.Br.
Mes. loreum L. (rotblühend!) = *Cephalophyllum diminutum* L.Bol. (siehe auch *Ceph. loreum* N.E.Br. in J.B. (1929) 17 = *Ceph. loreum* Schwant.).
Mes. loreum L. var. *congestum* Haw. = *Cephalophyllum Vandermerwei* L.Bol.
Mes. loreum L. var. L.Bol. = *Cephalophyllum Comptonii* N.E.Br.
Mes. loreum L. var. β L. = nach N.E.Brown: *Cephalophyllum diversiphyllum* N.E.Br.; nach L.Bolus: *Cephalophyllum Vandermerwei* L.Bol.

- Mes. loreum* L. var. γ L. = *Cephalophyllum diversiphyllum* N.E.Br.
- Mes. lucidum* Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br. var. *cultratum* N.E.Br.
- Mes. lucidum* Mill. = *Glottiphyllum linguiforme* N.E.Br.
- Mes. Lüderitzii* Engl. = *Drosanthemum Lüderitzii* Schwant.
- Mes. lunatum* Willd. = *Lampranthus lunatus* N.E.Br.
- Mes. lupinum* Haw. = *Faucaria lupina* Schwant.
- Mes. luteolum* Haw. = *Hymenocyclus luteolus* Schwant.
- Mes. luteoviride* Haw. = *Gibbaeum luteoviride* N.E.Br.
- Mes. luteum* Haw. = *Hymenocyclus luteus* Schwant.
- Mes. macellum* N.E.Br. = *Delosperma macellum* N.E.Br.
- Mes. MacOranii* L.Bol. — S.-Afr., Cape Peninsula in felsigen Plätzen an der Seite der Lions Mountains (Berge), bei Kamp's Bay, nahe Miller's Point. — A.B.H. IV. 37. $\times$
- Mes. macradenium* L.Bol. = *Peersia macradenia* L.Bol.
- Mes. macrocalyx* Kensit. — S.-Afr., Skurf Kop, nahe Somerset West. — Tr.R.S. I. 153; F.R. XII. 322. $\times$
- Mes. macrocarpum* Bgr. = *Lampranthus macrocarpus* N.E.Br.
- Mes. macrorrhizum* D.C. = *Delosperma napiforme* Schwant.
- Mes. macrorrhizum* Haw. = *Delosperma macrorrhizum* Schwant.
- Mes. macrosepalum* L.Bol. — Humansdorp Divis., Assegaibosch. — L.B. II. 219. $\times$
- Mes. maculatum* Haw. = *Drosanthemum maculatum* Schwant.
- Mes. magnificum* L.Bol. = *Lampranthus magnificus* N.E.Br.
- Mes. magnipunctatum* Burch. — B.M.P. 293. +
- Mes. magnipunctatum* Haw. = *Pleiospilos magnipunctatus* Schwant.
- Mes. magnipunctatum* Schwant. = *Pleiospilos Purpusii* Schwant.
- Mes. Mahonii* N.E.Br. = *Delosperma Mahonii* N.E.Br.
- Mes. maleolens* N.E.Br. = *Ruschia maleolens* L.Bol.
- Mes. malleoliforme* Schwant. = *Conophytum Purpusii* N.E.Br.
- Mes. Mallesoniae* L.Bol. — Ceres Divis., Hügel nahe Ceres. — A.B.H. III. 129. $\times$
- Mes. Margaretae* Schwant. = *Lapidaria Margaretae* Schwant.
- Mes. marginatum* Haw. — B.M.P. 117. +
- Mes. marginatum* Ktze. — B.M.P. 118. +
- Mes. marginatum* Marl. = *Lithops optica* N.E.Br.
- Mes. Mariae* L.Bol. — Ceres Divis. — L.B. II. 329.
- Mes. Marianae* L.Bol. — S.-Afr., South Western Reg., Nieuwoudtsville. — A.B.H. III. 169. $\times$
- Mes. marinum* Bgr. = *Psilocaulon Dinteri* Schwant.
- Mes. maritimum* L.Bol. in A.B.H. IV. 2 = *Cephalophyllum maritimum* Schwant.

Mes. maritimum L.Bol. — Stellenbosch Divis., Roviels bei Gordon's Bay. — L.B. III. 55. ×

Mes. Marlothianum Pax = *Conophyllum Marlothianum* Schwant.

Mes. Marlothii N.E.Br. = *Conophytum pellucidum* Schwant.

Mes. Marlothii Pax = *Brownanthus Marlothii* Schwant.

Mes. marmoratum N.E.Br. = *Lithops marmorata* N.E.Br.

Mes. Martleyi L.Bol. — Piquetberg Divis., zwischen Piquetberg und Langebaan. — L.B. II. 366. ×

Mes. Mathewsii L.Bol. = *Echinus geminatus* L.Bol.

Mes. maturatum L.Bol. — Piquetberg Divis. — L.B. I. 135. ×

Mes. Maximiliani Schlecht. = *Echinus Maximiliani* N.E.Br.

Mes. maximum Haw. = *Astridia maxima* Schwant.

Mes. Maxwellii N.E.Br. = *Ruschia Maxwellii* L.Bol.

Mes. medium Haw. = *Glottiphyllum latum* N.E.Br.

Mes. megarrhizum Don. = *Delosperma macrorrhizum* Schwant.

Mes. melanospermum Bgr. = *Psilocaulon melanospermum* N.E.Br.

Mes. melanospermum Dtr. = *Sphalmanthus melanospermus* Dtr. et Schwant.

Mes. Meleagris L.Bol. — Ceres Divis., bei Karroo Poort. — L.B. II. 17. ×

Mes. Mellei L.Bol. = *Carpobrotus Mellei* L.Bol.

Mes. mentiens Bgr. = *Psilocaulon mentiens* N.E.Br.

Mes. Meyeri N.E.Br. = *Ruschia Meyeri* Schwant.

Mes. micans L. = *Drosanthemum micans* Schwant.

Mes. micans Thbg. = *Drosanthemum collinum* Schwant.

Mes. micans Thbg. var. β Haw. = *Drosanthemum maculatum* Schwant.

Mes. micranthum Haw. = *Psilocaulon parviflorum* Schwant.

Mes. micropetalum N.E.Br. = *Ruschia microsperma* L.Bol.

Mes. microphyllum Haw. = *Ruschia microphylla* Schwant.

Mes. microspermum Dtr. et Derenbg. = *Dinteranthus microspermus* Schwant.

Mes. microstigmum L.Bol. = *Lampranthus microstigma* N.E.Br.

Mes. Middlemostii L.Bol. — Caledon Divis., bei Houw Hoek. — L.B. II. 329. ×

Mes. minimum Haw. = *Conophytum minimum* N.E.Br.

Mes. minusculum N.E.Br. = *Conophytum minusculum* N.E.Br.

Mes. minusculum Schwant. = *Conophytum Purpusii* N.E.Br.

Mes. minutiflorum Schwant. = *Conophytum minutiflorum* N.E.Br.

Mes. minutum Haw. = *Conophytum minutum* N.E.Br.

Mes. mirabile N.E.Br. = *Trichodiadema mirabile* Schwant.

Mes. miserum L.Bol. — Cape Prov., South Western Reg., genauer Standort unbekannt, wahrscheinlich in Clanwilliam Divis. — A.B.H. III. 164. ×

- Mes. mitratum* Marl. = *Mitrophyllum mitratum* Schwant.
Mes. modestum Dtr. et Bgr. = *Psammophora modesta* Dtr. et Schwant.
Mes. molle Ait. = *Malephora mollis* N.E.Br.
Mes. molle Bgr. = *Ruschia mollis* Schwant.
Mes. moniliforme Thbg. = *Monilaria moniliformis* Schwant.
Mes. montaguense L.Bol. — Montagu Divis., nahe Montagu. —
 A.B.H. IV. 9. ×
Mes. montanum Schltr. = *Erepsia montana* Schwant.
Mes. monticolum L.Bol. — S.-Afr., Cape Peninsula, Tafelberg —
 L.B. II. 171. ×
Mes. monticolum Sond. — B.M.P. 128. +
Mes. Montis Draconis Dtr. = *Dracophilus Montis Draconis* Dtr. et Schwant.
Mes. montis Moltkei Dtr. = *Ebracteola Montis Moltkei* Dtr. et Schwant.
Mes. mucronatum Haw. = *Ruschia mucronata* Schwant.
Mes. mucroniferum Haw. = *Eberlanzia mucronifera* Schwant.
Mes. mucronulatum Dtr. = *Psilocaulon mucronulatum* N.E.Br.
Mes. Muelleri L.Bol. = *Ruschia Muelleri* Schwant.
Mes. Muiri L.Bol. = *Carpobrotus Muiri* L.Bol.
Mes. Muirianum L.Bol. = *Ruschia Muiriana* Schwant.
Mes. multiceps Salm. = *Bergeranthus multiceps* Schwant.
Mes. multiflorum Haw. = *Ruschia multiflora* Schwant.
Mes. multiflorum Haw. var. *rubrum* Haw. = *Ruschia tumidula* Schwant.
Mes. multipunctatum S.D. = *Cheiridopsis bifida* N.E.Br.
Mes. multiradiatum Jacq. = *Lampranthus multiradiatus* N.E.Br.
Mes. multiseriatum L.Bol. = *Lampranthus multiseriatus* N.E.Br.
Mes. munitum L.Bol. — Willowmoore Divis., Toverwater Poort. —
 L.B. II. 4. ×
Mes. muricatum Haw. = *Oscularia deltoides* Schwant var. *muricata*.
Mes. murinum Haw. = *Stomatium murinum* Schwant.
Mes. musculinum Haw. = *Chasmatophyllum musculinum* Dtr. et Schwant.
Mes. mustellinum S.D. = *Stomatium mustellinum* Schwant.
Mes. mutabile Eckl. et Zeyh. = *Erepsia inlaudens* N.E.Br.
Mes. mutabile Haw. = *Erepsia mutabilis* Schwant.
Mes. mutans L.Bol. = *Lampranthus mutans* N.E.Br.
Mes. muticum N.E.Br. = *Ruschia mutica* L.Bol.
Mes. namaquanum N.E.Br. = *Ruschia namaquana* L.Bol.
Mes. namaquense Sond. — B.M.P. 247. +
Mes. namibense Marl. = *Brownanthus namibensis* Bullock.

Mes. nanum L.Bol. = *Conophytum gratum* N.E.Br.

Mes. nanum Schltr. = *Oophytum nanum* L.Bol. (siehe auch D.K.G. [1927/28] 225 *Conophytum*?).

Mes. napiforme N.E.Br. = *Delosperma napiforme* Schwant.

Mes. nardouwense L.Bol. — Clanwilliam Divis., Nardouw-Paß, etwa 5 miles vom Weg zwischen Clanwilliam und Klaver. — L.B. II. 407. ×

Mes. Nationae N.E.Br. = *Khadia Nationae* N.E.Br.

Mes. necopinum N.E.Br. = *Argyroderma necopinum* N.E.Br.

Mes. Neethlingiae L.Bol. = *Delosperma Neethlingiae* Schwant.

Mes. Nevillei N.E.Br. = *Conophytum Nevillei* N.E.Br.

Mes. nigrescens Haw. = *Carpobrotus aequilaterus* N.E.Br.

Mes. Nissenii Dtr. = *Psammophora Nissenii* Dtr. et Schwant.

Mes. nitidum Haw. = *Drosanthemum nitidum* Schwant.

Mes. niveum N.E.Br. = *Ruschia nivea* L.Bol.

Mes. nobile Haw. = *Pleiospilos nobilis* Schwant.

Mes. noctiflorum L. = *Aridaria noctiflora* Schwant.

Mes. noctiflorum L. var. *fulvum* S.D. = *Aridaria fulva* Schwant.

Mes. nodiflorum L. = *Cryophytum gibbosum* N.E.Br.

Mes. nothum N.E.Br. — (*Mes. acuminatum* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 109. +

Mes. nubigenum Schltr. — B.M.P. 75. +

Mes. nuciforme Haw. = *Conophytum nuciforme* N.E.Br.

Mes. obconellum Haw. = *Conophytum obcordellum* N.E.Br.

Mes. obconicum L.Bol. — Calvinia Divis., Sandflächen bei Nieuwoudtsville L.B. II. 220. ×

Mes. obcordellum Marl. = *Conophytum obcordellum* N.E.Br.

Mes. obcordellum Sims. = *Conophytum Nevillei* N.E.Br.

Mes. obliquum Haw. = *Drosanthemum obliquum* Schwant.

Mes. obliquum Willd. = *Glottiphyllum latum* B.E.Br.

Mes. obmetale N.E.Br. = *Conophytum obmetale* N.E.Br.

Mes. obsubulatum Haw. = *Cylindrophylloides obsubulatum* Schwant.

Mes. obtusum Haw. = *Gibbaea Neelii* Schwant.

Mes. ochraceum Bgr. = *Glottiphyllum ochraceum* N.E.Br.

Mes. octojuge L.Bol. = *Octopoma octojuge* N.E.Br.

Mes. octonarium L.Bol. = *Enarganthe octonaria* N.E.Br.

Mes. octophyllum Haw. = *Argyroderma octophyllum* Schwant.

Mes. octophyllum Haw. var. β Haw. = *Argyroderma necopinum* N.E.Br.

Mes. octophyllum var. γ *roseum* Haw. = *Argyroderma roseum* Schwant.

Mes. octophyllum Verl. = *Argyroderma octophyllum* Schwant.

Mes. oculatum N.E.Br. = *Aridaria oculata* L.Bol.

Mes. odontocalyx Schltr. et Diels = *Ruschia odontocalyx* Schwant.

Mes. odoratum L.Bol. — Swellendam Divis., Uitvlugt. — A.B.H. IV. 100. ×

Mes. odoratum N.E.Br. = *Conophytum odoratum* N.E.Br.

Mes. oligandrum Kunze = *Micropterum papulosum* Schwant.

Mes. optatum N.E.Br. = *Pleiospilos optatus* Schwant.

Mes. opticum Marl. = *Lithops optica* N.E.Br.

Mes. opticum Marl. var. *rubrum* Tisch. = *Lithops optica* N.E.Br. var. *rubra* Tisch.

Mes. opulentum L.Bol. — Riversdale Divis., Roversdale. A.B.H. II. 29. ×

Mes. Orpenii N.E.Br. = *Aloinopsis Orpenii* N.E.Br.

Mes. Otzeanum Dtr. = *Psilocaulon Otzeanum* L.Bol.

Mes. ovatum Thbg. = *Platythyra Haeckeliana* N.E.Br.

Mes. oviforme N.E.Br. = *Oophytum oviforme* N.E.Br.

Mes. paardebergense L.Bol. — Meslmesbury Divis., in Felsspalten des Paardeberg. — L.B. II. 200. ×

Mes. pachyphyllum L.Bol. — Oudtshoorn Divis., Hügelseite des Klip-Fluß nahe Oudtshoorn. — J.B. (1928) 11. ×

Mes. pachypodium Kensit = *Gibbaeum pachypodium* L.Bol.

Mes. Pageae N.E.Br. = *Conophytum Pageae* N.E.Br.

Mes. Pageanum L.Bol. in A.B.H. IV. 99 = *Drosanthemum Pageanum* Schwant.

Mes. Pageanum L.Bol. — Clanwilliam Divis. — L.B. II. 97. ×

Mes. pakhuisense L.Bol. — Clanwilliam Divis., Pakhuis-Paß. — L.B. II. 364. ×

Mes. pallens Ait. = *Prenia pallens* N.E.Br.

Mes. pallens Jacq. = *Aridaria longistyla* Schwant.

Mes. pallescens var. α Haw. = *Mes. longistylum* D.C. var. *purpurascens* D.C.

Mes. pallescens var. β Haw. = *Aridaria longistyla* Schwant.

Mes. pallidum L.Bol. = *Lampranthus dilutus* N.E.Br.

Mes. pallidum N.E.Br. = *Conophytum pallidum* N.E.Br.

Mes. palustre L.Bol. — Stellenbosch Divis., Sümpfe zwischen Botte-
lay und Stellenbosch. — L.B. II. 325. ×

Mes. pansifolium N.E.Br. = *Ruschia Promontori* L.Bol.

Mes. papillatum N.E.Br. = *Ruschia papillata* L.Bol.

Mes. papuliferum D.C. — B.M.P. 36. +

Mes. papulosum L. f. = *Micropterum papulosum* Schwant.

Mes. paripetalum L.Bol. — Kl.-Namaland, Hondekliip Bay an der
Küste. — A.B.H. IV. 87. ×

Mes. parvibracteatum N.E.Br. = *Ruschia parvibracteata* L.Bol.

Mes. parviflorum Haw. = *Ruschia parviflora* Schwant.

Mes. parviflorum Jacq. = *Psilocaulon parviflorum* Schwant.

Mes. parvifolium Haw. = *Drosanthemum parvifolium* Schwant.

- Mes. parvipetalum* N.E.Br. = *Conophytum parvipetalum* N.E.Br.
Mes. parvulum Schlecht. = *Cheiridopsis parvula* N.E.Br.
Mes. parvum N.E.Br. = *Ruschia pusilla* Schwant.
Mes. Patersoniae L.Bol. = *Delosperma Patersoniae* L.Bol.
Mes. patulum Haw. = *Erepsia patula* Schwant.
Mes. pauciflorum L.Bol. = *Lampranthus pauciflorus* N.E.Br.
Mes. paucifolium L.Bol. = *Lampranthus paucifolium* N.E.Br.
Mes. pauper Dtr. = *Drosanthemum pauper* Dtr. et Schwant.
Mes. pauxillum N.E.Br. = *Conophytum pauxillum* N.E.Br.
Mes. Parianum Schltr. et Diels = *Drosanthemum Parianum* Schwant.
Mes. Peacockiae L.Bol. — Cape Prov., South Western Divis., nahe Darling; Malmesbury Divis., nahe Kalabas Kraal; Cape Peninsula, Lion Mountains. — A.B.H. III. 71. ×
Mes. Pearsonii N.E.Br. = *Argyroderma Pearsonii* Schwant.
Mes. Peersii L.Bol. = *Lampranthus Peersii* N.E.Br.
Mes. pellanum N.E.Br. = *Ruschia muricata* L.Bol.
Mes. pentagonum L.Bol. = *Erepsia pentagona* L.Bol.
Mes. perfoliatum Mill. = *Ruschia perfoliata* Schwant.
Mes. perforatum N.E.Br. = *Ruschia perforata* L.Bol.
Mes. perpusillum Haw. = *Conophytum perpusillum* N.E.Br.
Mes. persistens L.Bol. — Calvinia Divis., Grasberg bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 235. ×
Mes. perspicuum Bgr. = *Lampranthus perspicuus* N.E.Br.
Mes. perviride Haw. = *Gibbaeum perviride* N.E.Br.
Mes. perviride Haw. var. B. Haw. = *Gibbaeum luteoviride* N.E.Br.
Mes. Pfeilii Engl. = *Psilocaulon Pfeilii* Schwant.
Mes. Phillipsii L.Bol. = *Echinus Maximilianii* N.E.Br.
Mes. phyllicoides N.E.Br. = *Ruschia phyllicoides* L.Bol.
Mes. pictum N.E.Br. = *Conophytum pictum* N.E.Br.
Mes. Pillansii Kentsit = *Piqueta Pillansii* N.E.Br.
Mes. pilosum Haw. = *Apatesia helianthoides* N.E.Br.
Mes. piluliforme N.E.Br. = *Conophytum piluliforme* N.E.Br.
Mes. pinnatifidum L.f. = *Aethephyllum pinnatifidum* N.E.Br.
Mes. pinnatum Thbg. = *Cleretum pinnatifidum* N.E.Br.
Mes. piquetbergense L.Bol. — Piquetberg Divis., Berge bei Piquetberg. — L.B. II. 325. ×
Mes. piscodorum N.E.Br. = *Ruschia piscodora* L.Bol.
Mes. pisiforme Haw. = *Monilaria pisiformis* Schwant.
Mes. pisinnum N.E.Br. = *Conophytum pisinnum* N.E.Br.
Mes. Pittenii L.Bol. = *Lampranthus Pittenii* N.E.Br.
Mes. placitum N.E.Br. = *Conophytum placitum* N.E.Br.
Mes. planum L.Bol. = *Leipoldtia plana* L.Bol.
Mes. platycalyx L.Bol. = *Cephalophyllum platycalyx* Schwant.

- Mes. plenum* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Oliphant's River Valley, zwischen Modderfontein und Warm Baths. — L.B. II. 407. ×
- Mes. Pocockiae* L.Bol. = *Lampranthus Pocockiae* N.E.Br.
- Mes. Pole Evansii* N.E.Br. = *Dinteranthus Pole Eransii* Schwant.
- Mes. politum* L.Bol. = *Erepsia polita* L.Bol.
- Mes. polyanthum* Haw. = *Lampranthus polyanthon* N.E.Br.
- Mes. polyphyllum* Haw. = *Lampranthus emarginatus* N.E.Br.
- Mes. pomeridianum* L. = *Carpanthea pomeridiana* N.E.Br.
- Mes. pomeridianum* L. var. *Andrewsii* Haw. = *Carpanthea pomeridiana* N.E.Br.
- Mes. pomeridianum* L. var. *glabrum* D.C. = *Carpanthea pomeridiana* N.E.Br.
- Mes. Pomonae* Dtr. = *Namibia Pomonae* Dtr. et Schwant.
- Mes. ponderosa* Dtr. = *Namibia ponderosa* Dtr. et Schwant.
- Mes. Pottsii* L.Bol. = *Delosperma Pottsii* L.Bol.
- Mes. praecipitatum* L.Bol. — Albany Divis., Dassie Krantz bei Grahamstown. — L.B. II. 330. ×
- Mes. praecox* L.Bol. = *Lampranthus maturus* N.E.Br.
- Mes. praecultum* N.E.Br. = *Drosanthemum praecultum* Schwant.
- Mes. praepingue* Haw. = *Glottiphyllum praepingue* N.E.Br.
- Mes. praepingue* S.D. = *Glottiphyllum subditum* N.E.Br.
- Mes. pressum* N.E.Br. = *Cheiridopsis pressa* N.E.Br.
- Mes. primiversum* L.Bol. — Piquetberg Divis., Grey's-Paß (Pickernier's Kloof). — L.B. II. 199. ×
- Mes. primulinum* L.Bol. = *Cephalophyllum primulinum* Schwant.
- Mes. procumbens* Haw. = *Cephalophyllum dubium* L.Bol.
- Mes. procumbens* L.Bol. = *Cephalophyllum dissimile* N.E.Br.
- Mes. productum* Haw. = *Lampranthus productus* N.E.Br.
- Mes. productum* Haw. var. *lepidum* S.D. = *Lampranthus productus* N.E.Br. var. *lepidum* Schwant.
- Mes. productum* Haw. var. *purpureum* L.Bol. = *Lampranthus productum* N.E.Br. var. *purpureus* L.Bol.
- Mes. prominulum* L.Bol. — George Divis.? — L.B. II. 408. ×
- Mes. Promontorii* L.Bol. = *Lampranthus Promontorii* N.E.Br.
- Mes. pronom* N.E.Br. = *Ruschia radicans* L.Bol.
- Mes. propinquum* N.E.Br. = *Ruschia propinqua* Schwant.
- Mes. prostratum* N.E.Br. = *Ruschia prostrata* L.Bol.
- Mes. proximum* L.Bol. = *Mitrophyllum grande* N.E.Br.
- Mes. proximum* N.E.Br. = *Conophyllum proximum* Schwant.
- Mes. pruinolum* Thbg. = *Drosanthemum pruinolum* Schwant.
- Mes. psammophilum* Dtr. = *Ruschia psammophila* Dur. et Schwant.
- Mes. pseudotruncatellum* Bgr. = *Lithops pseudotruncatella* N.E.Br.
- Mes. puberulum* Haw. = *Micropterum puberulum* Schwant.
- Mes. pubescens* Haw. = *Gibbaeum pubescens* N.E.Br.

- Mes. pugioniforme* D.C. = *Conicosia elongata* Schwant.
Mes. pugioniforme Haw. = *Conicosia capensis* N.E.Br.
Mes. pugioniforme L. = *Conicosia pugioniformis* Schwant.
Mes. pugioniforme L.Bol. = *Conicosia robusta* N.E.Br.
Mes. pugioniforme S.D. = *Conicosia communis* N.E.Br.
Mes. pugioniforme var. *purpureum* und *Mes. pugioniforme* var. *carneum*
 Haw. gehören offenbar zur Gattung *Chrysanthemum*. — G.C.
 (1932, I) 144. +
Mes. pulchellum Haw. = *Ruschia pulchella* Schwant.
Mes. pulverulentum Haw. = *Drosanthemum pulverulentum* Schwant.
Mes. pulverulentum Willd. = *Eberlanzia mucronifera* Schwant.
Mes. pulrinatum O.Ktze. — B.M.P. 75. +
Mes. punctatum Haw. = *Cephalophyllum punctatum* L.Bol.
Mes. punctulatum L.Bol. — Calvinia Divis. — L.B. II. 17. ×
Mes. pumilum N.E.Br. = *Ruschia pumila* L.Bol.
Mes. purpurascens S.D. = *Cheiridopsis purpurascens* N.E.Br.
Mes. purpureoalbum Haw. = *Cephalophyllum purpureoalbum*
 Schwant.
Mes. purpureocroceum Haw. = *Hymenocyclus purpureocroceus*
 L.Bol.
Mes. purpureocroceum var. *flavocroceum* Haw. = *Hymenocyclus fla-*
rocroceus Schwant.
Mes. purpureostylum L.Bol. = *Ruschia forficata* L.Bol.
Mes. Purpusii Schwant. = *Conophytum Purpusii* N.E.Br.
Mes. pusillum N.E.Br. = *Conophytum pusillum* N.E.Br.
Mes. pustulatum Haw. = *Glottiphyllum longum* N.E.Br.
Mes. pustulatum Haw. f. *lividum* S.D. = *Glottiphyllum longum*
 N.E.Br.
Mes. Putterlickii L.Bol. — Orange Free State, Harrismith, Basuto-
 land, Butha Butha. — A.B.H. IV. 4. ×
Mes. Puttkamerianum Dtr. et Bgr. = *Hereroa Puttkameriana* Dtr.
 et Schwant.
Mes. pygmaeum Haw. = *Ruschia pygmaea* Schwant.
Mes. pyrodorum Diels = *Stomatium pyrodorum* L.Bol.
Mes. pyropaeum Haw. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.
Mes. pyropaeum Haw. var. *album* Haw. = *Dorotheanthus grami-*
neus Schwant. var. *albus* Schwant.
Mes. pyropaeum Haw. var. *roscum* Haw. = *Dorotheanthus grami-*
neus Schwant. var. *roseus* Schwant.
Mes. quadrifidum Haw. = *Cheiridopsis quadrifida* Schwant.
Mes. quaesitum N.E.Br. = *Conophytum quaesitum* N.E.Br.
Mes. quarziticum Dtr. = *Ruschia quarzitica* Dur. et Schwant.
Mes. rabiesbergense L.Bol. — Worcester Divis., Langeberge zwischen
 Robertson und Worcester, Abhang des Rabiesbergs. — L.B. III. 13. ×

- Mes. racemosum* N.E.Br. = *Erepsia racemosa* Schwant.
Mes. radiatum Haw. = *Erepsia radiata* Schwant.
Mes. ramosissimum Schltr. = *Drosanthemum ramosissimum* L.Bol.
Mes. ramulosum Haw. = *Cheiridopsis rostratoides* N.E.Br.
Mes. Rangei Engl. = *Cephalophyllum ebracteatum* Dtr. et Schwant.
Mes. rapaceum Jacq. = *Psilocaulon rapaceum* Schwant.
Mes. recumbens N.E.Br. = *Chasmatophyllum musculinum* Dtr. et Schwant.
Mes. recurvum Haw. = *Mes. Schollii* S.D.
Mes. recurvum L.Bol. = *Mes. Bolusiae* Schwant.
Mes. recurvum Moench. — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 123. +
Mes. reductum N.E.Br. — G.C. (1930, I) 33. (N.E. Brown bezeichnet *Ruschia subglobosa* L.Bol. und *Ruschia nana* L.Bol. als *Mes. reductum* N.E.Br. Da beide *Ruschia*-Arten jedoch verschiedene Arten sind, liegt hier offenbar ein Irrtum vor!)
Mes. reflexum Haw. = *Mes. longistylum* D.C. var. *purpurascens* D.C.
Mes. reflexum Willd. = *Sphalmanthus canaliculatus* N.E.Br.
Mes. Rehmannii Schz. — Hereroland. — F.R. XIX. 192. +
Mes. Rehneltianum Bgr. = *Hereroa Rehneltiana* Dtr. et Schwant.
Mes. relaxatum Willd. = *Prenia relaxata* N.E.Br.
Mes. Renniei L.Bol. — Sw.-Afr., Moltke-Blick, Anas Mountains, Windhoek. — A.B.H. IV. 94. ×
Mes. reptans Ait. = *Lampranthus reptans* N.E.Br.
Mes. resurgens Kensit = *Phyllobolus resurgens* Schwant.
Mes. retroflexum Haw. = *Lampranthus elegans* Schwant.
Mes. retroversum Kensit = *Diplosoma retroversum* Schwant.
Mes. rheolens L.Bol. = *Dracophilus rheolens* Schwant.
Mes. rhomboideum S.D. = *Rhombophyllum rhomboideum* Schwant.
Mes. rhopalophyllum Schltr. et Diels = *Fenestraria rhopalophylla* N.E.Br.
Mes. rictum felinum repraesentans Dillen = *Faucaria felina* Schwant.
Mes. rigidicaule Haw. — B.M.P. 210. +
Mes. rigidum Haw. = *Ruschia rigida* Schwant.
Mes. rigidum Haw. var. *tenellum* Haw. = *Ruschia tenella* Schwant.
Mes. ringens var. *caninum* L. = *Carruanthus caninus* Schwant.
Mes. ringens var. *felinum* L. = *Faucaria felina* Schwant.
Mes. robustum Haw. = *Cheiridopsis robusta* N.E.Br.
Mes. Roodiae N.E.Br. = *Pleiospilos prismaticus* Schwant.
Mes. roseatum N.E.Br. = *Ruschia Comptonii* L.Bol.
Mes. roseolum N.E.Br. = *Ruschia roseola* Schwant.
Mes. roseum Willd. = *Lampranthus roseus* Schwant.

Mes. roseum Willd. var. *confertum* Salm. = *Lampranthus incurvus* Schwant.

Mes. Rossii Haw. = *Carpobrotus Rossii* N.E.Br.

Mes. rostellatum D.C. = *Ruschia rostellata* Schwant.

Mes. rostellum Haw. = *Ruschia rostellata* Schwant.

Mes. rostratoides Haw. = *Cheiridopsis rostratoides* N.E.Br.

Mes. rostratum *Ardeae* reference Dillen = *Cheiridopsis rostrata* N.E.Br.

Mes. rostratum L. = *Cheiridopsis rostrata* N.E.Br.

Mes. rostratum S.D. = *Cheiridopsis tuberculata* N.E.Br.

Mes. rostratum S.D. var. *bibracteatum* = *Cheiridopsis bibracteata* N.E.Br.

Mes. rosulatum Kensit = *Aistocaulon rosulatum* v. Poelln.

Mes. Rothii hort. = *Pleiospilos Rothii* hort.

Mes. rubricaulis Haw. = *Ruschia rubricaulis* L.Bol.

Mes. rubrocinctum Eckl. et Zeyh. = *Carpobrotus acinaciformis* L.Bol.

Mes. rubrocinctum Haw. = *Carpobrotus rubrocinctus* Schwant.

Mes. rubrolineatum N.E.Br. = *Nananthus rubrolineatus* Schwant.

Mes. rubroluteum L.Bol. — Piquetberg Divis., Nordseite des Plateaus der Kapitäins Kloof Mountains, Piquetberg Range. — L.B. III. 11. ×

Mes. rubrum L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Swartwater. — L.B. II. 275. ×

Mes. rufescens Haw. = *Glottiphyllum rufescens* Tisch.

Mes. rupestre L.Bol. = *Lampranthus rupestris* N.E.Br.

Mes. rupicolum Engl. = *Ruschia rupicola* Schwant.

Mes. rupis *Arcuatae* Dtr. = *Stöberia rupis Arcuatae* Dtr. et Schwant.

Mes. rurale N.E.Br. = *Ruschia ruralis* Schwant.

Mes. Ruschianum Dtr. = *Lithops Ruschiorum* N.E.Br.

Mes. Ruschiorum Dtr. et Schwant. = *Lithops Ruschiorum* N.E.Br.

Mes. Rustii Bgr. = *Lampranthus Rustii* N.E.Br.

Mes. sabulosum Thbg. — B.M.P. 30. + (Ob mit *Apatesia helianthoides* [Ait.] N.E.Br. identisch?).

Mes. salicolum L.Bol. — Piquetberg Divis., Salzebene zwischen Veldrift und St. Helena-Fontein. — L.B. III. 12. ×

Mes. salicornioides Pax = *Psilocaulon salicornioides* Schwant.

Mes. Salmii Haw. = *Glottiphyllum Salmii* N.E.Br.

Mes. Salmii Haw. var. *decussatum* Haw. = *Glottiphyllum Salmii* N.E.Br.

Mes. Salmii Haw. var. *semicruciatum* Haw. = *Glottiphyllum Salmii* N.E.Br.

Mes. salmoneum Haw. = *Sphalmanthus salmoneus* N.E.Br.

Mes. salmoneum S.D. = *Sphalmanthus canaliculatus* N.E.Br.

Mes. Salteri L.Bol. — Bredasdorp Divis., Cape Agulhas. — L.B. II. 428. ×

- Mes. sarcocalycanthum* Dtr. et Bgr. = *Hydrodea sarcocalycantha* Dtr.
- Mes. sarmentosum* Haw. — S.-Afr., Cape Flats, Zwartland auf sandigen Stellen. — B.M.P. 212. +
- Mes. sarmentosum* Haw. var. *rigidum* Salm. — B.M.P. 212. +
- Mes. saturatum* L.Bol. = *Lampranthus saturatus* N.E.Br.
- Mes. Sauerae* L.Bol. — Darling Divis., bei Yserfontein. — L.B. II. 409. ×
- Mes. saxetanum* N.E.Br. = *Conophytum saxetanum* N.E.Br.
- Mes. saxicolum* N.E.Br. = *Ruschia saxicola* L.Bol.
- Mes. scabrum* L. = *Lampranthus scaber* N.E.Br.
- Mes. scalpratum* Haw. = *Glottiphyllum linguiforme* N.E.Br.
- Mes. scapigerum* Eckl. et Zeyh. = *Bergeranthus scapiger* N.E.Br.
- Mes. scapigerum* Haw. = *Bergeranthus scapiger* N.E.Br.
- Mes. Schenkii* Schinz = *Brownanthus ciliatus* Schwant.
- Mes. Schickianum* Bgr. = *Conophytum Schickianum* Tisch.
- Mes. Schlechteri* N.E.Br. = *Ruschia Schlechteri* L.Bol.
- Mes. Schlichtianum* Sond. = *Psilocaulon Schlichtianum* Schwant.
- Mes. Schoenlandianum* Schltr. = *Drosanthemum Schoenlandianum* L.Bol.
- Mes. Schollii* S.D. — (*Mes. recurvum* Haw., *Mes. aduncum* Jacq.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 120. +
- Mes. Schollii* S.D. var. *caledonicum* L.Bol. — Caledon Divis., Hügelseite nahe Caledon. — A.B.H. III. 161. ×
- Mes. Schultzii* Schltr. et Diels. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — F.R. VIII. 148. +
- Mes. Schwantesii* Dtr. = *Titanopsis Schwantesii* Schwant.
- Mes. scintillans* Dtr. = *Sphalmanthus scintillans* Dtr. et Schwant.
- Mes. scitulum* N.E.Br. = *Conophytum scitulum* N.E.Br.
- Mes. scutatum* L.Bol. = *Monilaria chrysoleuca* Schwant.
- Mes. secundum* Thbg. = *Psilocaulon articulatum* N.E.Br.
- Mes. sedoides* Dtr. et Bgr. = *Ebertanzia sedoides* Schwant.
- Mes. semicylindricum* Haw. = *Glottiphyllum semicylindricum* N.E.Br.
- Mes. semidentatum* S.D. = *Ruschia semidentata* Schwant.
- Mes. senarium* N.E.Br. = *Ruschia senaria* L.Bol.
- Mes. separatum* N.E.Br. = *Ruschia calycina* L.Bol.
- Mes. serpens* L.Bol. — Caledon Divis., bei Kleinmond. — L.B. II. 221. ×
- Mes. serratum* L. = *Circandra serrata* N.E.Br.
- Mes. serrulatum* Haw. = *Ruschia serrulata* Schwant.
- Mes. sessile* Thbg. = *Drosanthemum sessile* Schwant.
- Mes. sessiliflorum* Ait. = *Micropterum sessiliflorum* Schwant.
- Mes. sessiliflorum* var. *album* Haw. = *Cryophytum Burchellii* N.E.Br.
- Mes. setuliferum* N.E.Br. = *Trichodiodema setuliferum* Schwant.
- Mes. sexpartitum* N.E.Br. = *Corpuscularia Lehmannii* Schwant.

Mes. Shandii N.E.Br. = *Gibbaeum Shandii* N.E.Br.

Mes. (?) Sibbettii L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B.

II. 251. ×

Mes. signatum N.E.Br. = *Conophytum signatum* N.E.Br.

Mes. simile Sond. = *Psilocaulon simile* Schwant.

Mes. simile Sond. var. *namaquense* Sond. = *Psilocaulon namaquense* Schwant.

Mes. Simpsonii Dtr. = *Juttadinteria Simpsonii* Schwant.

Mes. simulans Marl. = *Pleiospilos simulans* N.E.Br.

Mes. sinuosum L.Bol. — Namaland. — A.B.H. IV. 14. ×

Mes. Sladenianum L.Bol. = *Prenia Sladeniana* L.Bol.

Mes. sobrinum N.E.Br. = *Ruschia sobrina* Schwant.

Mes. sociorum L.Bol. = *Lampranthus sociorus* N.E.Br.

Mes. socium N.E.Br. = *Ruschia socia* Schwant.

Mes. solidum = *Ruschia solida* L.Bol.

Mes. sororium N.E.Br. = *Pleiospilos sororius* Schwant.

Mes. spathulatum L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. I. 136. ×

Mes. spathulatum Thbg. = *Titanopsis spathulata* Schwant.

Mes. spathulifolium Willd. = *Dorotheanthus bellidiformis* N.E.Br.

Mes. speciosum Haw. = *Drosanthemum speciosum* Schwant.

Mes. spectabile Haw. = *Lampranthus spectabilis* N.E.Br.

Mes. spinescens Pax — Sw.-Afr., Warmbad, Kl.-Karass. — F.R.

XIX. 236. +

Mes. spiniforme Haw. = *Lampranthus spiniformis* N.E.Br.

Mes. spinosum L. = *Eberlanzia spinosa* Schwant.

Mes. spinosum L. var. *micranthum* Pax = *Eberlanzia micrantha* Schwant.

Mes. spinuliferum Haw. — B.M.P. 66. +

Mes. splendens L. = *Aridaria splendens* Schwant.

Mes. spongiosum L.Bol. = *Cephalophyllum spongiosum* L.Bol.

Mes. staminodiosum L.Bol. — Clanwilliam Divis., Eland's Kloof. — L.B. III. 76. ×

Mes. staminodiosum N.E.Br. = *Ruschia staminodiosa* L.Bol.

Mes. Stanleyi L.Bol. — S.-Afr., Karroo Reg., Willowmoore Divis., nahe Miller; Prince Albert Divis., Abraham's Kraal. — A.B.H.

IV. 92. ×

Mes. Stayneri L.Bol. = *Lampranthus Stayneri* N.E.Br.

Mes. steenbergense L.Bol. — S.-Afr., Cape Peninsula, Steenberg. —

L.B. II. 199. ×

Mes. Steingröveri Pax = *Ruschia Steingröveri* Schwant.

Mes. stellans N.E.Br. = *Ruschia stellata* L.Bol.

Mes. stellatum hort. Haw. = *Erepsia gracilis* Schwant.

Mes. stellatum Mill. = *Trichodiadema stellatum* Schwant.

- Mes. stelligerum* Haw. = *Trichodiadema stelligerum* Schwant.
Mes. stenopetalum L.Bol. = *Lampranthus stenopetalus* N.E.Br.
Mes. stenophyllum L.Bol. — Humansdorp Divis., Witte Els Bosch.
 — A.B.H. IV. 1. ×
Mes. stenum Haw. = *Lampranthus stenus* N.E.Br.
Mes. Stephanii Schwant. = *Lampranthus Stephanii* Schwant.
Mes. stipulaceum L. = *Erepsia stipulacea* Schwant.
Mes. Stokoei L.Bol. — Caledon Divis., Wildepaardcberg. — L.B. I. 137. ×
Mes. stramineum Haw. = *Aridaria straminea* Schwant.
Mes. stramineum Willd. = *Cephalophyllum tricolorum* N.E.Br.
Mes. striatum D.C. = *Drosanthemum pallens* Schwant.
Mes. striatum Haw. = *Drosanthemum striatum* Schwant.
Mes. striatum Haw. var. γ *attenuatum* Salm. = *Drosanthemum attenuatum* Schwant.
Mes. striatum Haw. var. *pallens* Haw. = *Drosanthemum pallens* Schwant.
Mes. striatum Haw. var. α *pallidum* D.C. = *Drosanthemum pallens* Schwant.
Mes. striatum Haw. var. β Salm. = *Drosanthemum hispidum* Schwant.
Mes. strictum Haw. — B.M.P. 131. +
Mes. Strubeniae L.Bol. — S.-Afr., South Western Reg., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. III. 5. ×
Mes. strumosum Haw. = *Trichodiadema strumosum* L.Bol.
Mes. styliiferum N.E.Br. = *Ruschia stylosa* L.Bol.
Mes. stylosum N.E.Br. = *Conophytum bilobum* N.E.Br.
Mes. suaveolens Schwant. = *Stomatium suaveolens* Schwant.
Mes. suavissimum Dtr. = *Juttadinteria suavissima* Schwant.
Mes. suavissimum L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay. — L.B. II. 220. ×
Mes. suavissimum L.Bol. forma *fera* L.Bol. — Kl.-Namaland bei Walle Kraal. — L.B. II. 221. ×
Mes. suavissimum L.Bol. var. *oculatum* L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay. — L.B. II. 221. ×
Mes. subaequale L.Bol. — Uniondale Divis. — L.B. III. 56. ×
Mes. subalatum Haw. = *Carpobrotus subalatus* Schwant.
Mes. subalbum N.E.Br. = *Argyroderma subalbum* N.E.Br.
Mes. subcompressum Haw. = *Drosanthemum subcompressum* Schwant.
Mes. subglobosum Haw. = *Drosanthemum subglobosum* Schwant.
Mes. subglobosum L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 57. ×
Mes. subincanum Mill. = *Delosperma subincanum* Schwant.
Mes. sublunatum N.E.Br. = *Ruschia stricta* L.Bol.

- Mes. subnodosum* Bgr. = *Psilocaulon subnodosum* N.E.Br.
Mes. subrisum N.E.Br. = *Conophytum subrisum* N.E.Br.
Mes. subrostratum Haw. = *Cephalophyllum subulatoides* N.E.Br.
Mes. subulatoides Haw. = *Cephalophyllum subulatoides* N.E.Br.
Mes. subulatum Mill. = *Acrodon subulatus* N.E.Br.
Mes. succulentum N.E.Br. = *Ruschia succulenta* L.Bol.
Mes. succumbens Dtr. = *Schwantesia succumbens* Dtr.
Mes. sulcatum Haw. = *Aridaria sulcata* Schwant.
Mes. sulcatum S.D. = *Aridaria acuminata* Schwant.
Mes. superans L.Bol. — S.-Afr., zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 348. ×
Mes. suppositum L.Bol. = *Zeuctophyllum suppositum* N.E.Br.
Mes. surrectum Haw. — (*Glottiphyllum*? nach N.E.Brown). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1922, I) 22; G.C. (1928, I) 49; D.K.G. (1929) 107; B.M.P. 236. ×
Mes. Sutherlandii Hook. f. = *Delosperma Sutherlandii* N.E.Br.
Mes. swartbergense L.Bol. = *Lampranthus swartbergensis* N.E.Br.
Mes. taurinum Haw. = *Glottiphyllum taurinum* N.E.Br.
Mes. Taylorianum Dtr. et Schwant. = *Conophytum Taylorianum* N.E.Br.
Mes. Taylori N.E.Br. = *Delosperma Taylori* L.Bol.
Mes. tegens F.Muell. = *Lampranthus tegens* N.E.Br.
Mes. tenellum Haw. = *Ruschia tenella* Schwant.
Mes. tenue Haw. = *Psilocaulon tenue* Schwant.
Mes. tenue L.Bol. = *Lampranthus tenuis* N.E.Br.
Mes. tenuiflorum Jacq. = *Sphalmanthus tenuiflorus* N.E.Br.
Mes. tenuiflorum Eckl. et Zeyh. = *Mes. coccineum* Haw.
Mes. tenuifolium L. = *Lampranthus tenuifolius* Schwant.
Mes. tenuifolium Thbg. = *Lampranthus bicolorus* N.E.Br.
Mes. teretifolium Haw. = *Calamophyllum teretifolium* Schwant.
Mes. teretiuseculum Haw. = *Calamophyllum teretiuseculum* Schwant.
Mes. testaceum Haw. = *Delosperma testaceum* Schwant.
Mes. testiculare Ait. = *Argyroderma testiculare* N.E.Br.
Mes. testiculare Ait. var. γ Haw. = *Argyroderma necopinum* N.E.Br.
Mes. testiculare Jacq. = *Argyroderma roseum* Schwant.
Mes. testiculare Jacq. var. *roseum* Haw. = *Argyroderma roseum* Schwant.
Mes. tetragonum Thbg. = *Aridaria tetragona* L.Bol.
Mes. tetracepalum Regel. — B.M.P. 294. +
Mes. thecatum N.E.Br. = *Conophytum minutum* N.E.Br.
Mes. Theris Perr. — B.M.P. 294. +
Mes. thermarum L.Bol. — Clanwilliam Divis., Oliphants Fluß-Tal, bei Warm Baths. — L.B. II. 365. ×

- Mes. Thunbergii* Haw. = *Hymenocyclus Thunbergii* L.Bol.
Mes. tigrinum Haw. = *Faucaria tigrina* Schwant.
Mes. tinctum L.Bol. = *Depacarpus tinctus* N.E.Br.
Mes. torquatum Haw. = *Drosanthemum torquatum* Schwant.
Mes. tortuosum D.C. = *Sceletium expansum* L.Bol.
Mes. tortuosum L. = *Sceletium tortuosum* N.E.Br.
Mes. tradescantioides Bgr. = *Delosperma tradescantoides* L.Bol.
Mes. translucens N.E.Br. = *Ruschia translucens* L.Bol.
Mes. transvaalense Rolfe = *Nananthus rittatus* Schwant.
Mes. trichotomum Thbg. = *Aridaria trichotoma* L.Bol.
Mes. tricolor Jacq. = *Erepsia mutabilis* Schwant.
Mes. tricolor Willd. = *Dorotheanthus gramineus* Schwant.
Mes. tricolorum Haw. = *Cephalophyllum tricolorum* N.E.Br.
Mes. triflorum N.E.Br. = *Ruschia triflora* L.Bol.
Mes. Tripolium L. = *Skiatophytum Tripolium* L.Bol.
Mes. triquetrum N.E.Br. = *Ruschia triquetra* L.Bol.
Mes. triticiforme L.Bol. — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. —

A.B.H. IV. 4. ×

- Mes. Trothai* Engl. = *Psilocaulon Trothai* Schwant.
Mes. truncatellum Dtr. = *Lithops pseudotruncatella* N.E.Br.
Mes. truncatellum Haw. = *Conophytum truncatellum* N.E.Br.
Mes. truncatellum Hook.f. = *Lithops Hookeri* Schwant.
Mes. truncatellum Othmer = *Conophytum Wettsteinii* N.E.Br.
Mes. truncatum Thbg. = *Conophytum truncatum* N.E.Br.
Mes. tuberculatum D.C. = *Drosanthemum hispidum* Schwant.
Mes. tuberculatum Mill. = *Cheiridopsis tuberculata* N.E.Br.
Mes. tuberosum Rolfe = *Faucaria tuberosa* Schwant.
Mes. tuberosum L. = *Delosperma tuberosum* Schwant.
Mes. Tugwelliae L.Bol. = *Bijlia cana* N.E.Br.
Mes. tulbaghense L.Bol. = *Lampranthus tulbaghensis* N.E.Br.
Mes. tumidulum Haw. = *Ruschia tumidula* Schwant.
Mes. tumidulum Sond. = *Ruschia festiva* Schwant.
Mes. turbiniforme Haw. = *Lithops turbiniformis* N.E.Br.
Mes. turbinatum Jacq. = *Lampranthus turbinatus* N.E.Br.
Mes. turrigerum N.E.Br. = *Conophytum turrigerum* N.E.Br.
Mes. uitenhagense L.Bol. = *Ruschia uitenhagensis* Schwant.
Mes. umbellatum L. = *Ruschia umbellata* Schwant.
Mes. umbelliflorum Jacq. = *Aridaria umbelliflora* Schwant.
Mes. uncatum S.D. = *Glottiphyllum uncatum* N.E.Br.
Mes. uncinatum Mill. = *Ruschia uncinata* Schwant.
Mes. uncinellum Haw. = *Ruschia uncinella* Schwant.
Mes. uncum L.Bol. — Calvinia Divis., Nieuwoudtville. — L.B. I. 136. ×
Mes. uncum L.Bol. var. *gydouwense* L.Bol. — Ceres Divis., Gydouw-
 Paß. — L.B. III. 55. ×

- Mes. uncidens* Haw. = *Ruschia uncidens* Schwant.
- Mes. uniflorum* L.Bol. — Karroo Reg., Beaufort West Divis., Klipbank. — A.B.H. III. 135. ×
- Mes. Urbanianum* Schltr. = *Erepsia Urbaniana* Schwant.
- Mes. utile* L.Bol. — Kl.-Namaland. — L.B. II. 99. ×
- Mes. uraeforme* Haw. = *Conophytum uraeforme* N.E.Br.
- Mes. uraeforme* Purpus = *Conophytum Purpusii* N.E.Br.
- Mes. vaginatum* Haw. = *Ruschia vaginata* Schwant.
- Mes. vaginatum* Haw. var. *acutangulum* Bgr. = *Ruschia acutangula* Schwant.
- Mes. vaginatum* Haw. var. *curtum* Bgr. = *Ruschia curta* Schwant.
- Mes. valens* N.E.Br. = *Ruschia glauca* L.Bol.
- Mes. validum* Haw. = *Cephalophyllum validum* Schwant.
- Mes. validum* S.D. = *Cephalophyllum dissimile* Schwant.
- Mes. vallis-gratiae* Schltr. et Bgr. = *Lampranthus vallis-gratiae* N.E.Br.
- Mes. Vallis-Mariae* Dtr. et Schwant. = *Lithops Vallis-Mariae* N.E.Br.
- Mes. Vanzijliae* L.Bol. = *Lampranthus Vanzijliae* N.E.Br.
- Mes. variabile* Haw. = *Lampranthus variabilis* N.E.Br.
- Mes. varians* Haw. = *Sceletium varians* L.Bol.
- Mes. variifolium* N.E.Br. = *Ruschia diversifolia* L.Bol.
- Mes. velutinum* Dtr. = *Astridia velutina* Dtr.
- Mes. velutinum* L.Bol. = *Gibbaeum velutinum* Schwant.
- Mes. ventricosum* L.Bol. = *Ruschia ventricosa* Schwant.
- Mes. verecundum* L.Bol. = *Lampranthus verecundus* N.E.Br.
- Mes. Vermeuleniae* L.Bol. = *Ruschia Wilmaniae* L.Bol. var. *Vermeuleniae* L.Bol.
- Mes. Vernae* Dtr. et Bgr. = *Hymenocyclus Englerianus* Dtr. et Schwant.
- Mes. vernale* L.Bol. — Cape Prov., South Western Reg., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 93. ×
- Mes. vernicolor* L.Bol. — Tulbagh Divis., Tulbagh Kloof. — L.B. II. 304. ×
- Mes. verruculatum* L. — B.M.P. 126. +
- Mes. verruculoides* Sond. = *Hymenocyclus verruculoides* L.Bol.
- Mes. verruculoides* Sond. var. *minus* Sond. = *Hymenocyclus uiteenhagensis* L.Bol.
- Mes. verruculosum* N.E.Br. = *Ruschia verruculosa* L.Bol.
- Mes. versicolor* Haw. — B.M.P. 149. +
- Mes. vescum* N.E.Br. = *Cheiridopsis cigarettifera* N.E.Br.
- Mes. vespertinum* Bgr. = *Bergeranthus vespertinus* Schwant.
- Mes. viatorum* L.Bol. = *Lampranthus viatorum* N.E.Br.
- Mes. Victoris* L.Bol. = *Ruschia Victoris* L.Bol.

- Mes. vigilans** L.Bol. — (*Mes. hesperanthum* L.Bol.). — Kalahari Reg., Bechuanaland, Gaberones. — A.B.H. I. 190 (*Mes. hesperanthum*); N.E.Br.M. 121. ×
- Mes. Villersii** L.Bol. — Villiersdorp Divis., Belgravia. — L.B. II. 489. ×
- Mes. villosum* L. gehört zu *Aizoon* (Sonder). — B.M.P. 294. +
- Mes. vinaceum* L.Bol. = *Delosperma vinaceum* L.Bol.
- Mes. violaceum* D.C. = *Lampranthus violaceus* Schwant.
- Mes. violaceum* Haw. = *Lampranthus emarginatus* N.E.Br.
- Mes. virens** Haw. — B.M.P. 197. +
- Mes. virens* S.D. = *Lampranthus erratus* N.E.Br.
- Mes. virescens* Haw. = *Carpobrotus glaucescens* Schwant.
- Mes. virescens* S.D. = *Carpobrotus disparilus* N.E.Br.
- Mes. virgatum* Haw. = *Ruschia virgata* L.Bol.
- Mes. viride* Haw. = *Smicrostigma viride* N.E.Br.
- Mes. viridicatum* N.E.Br. = *Conophytum viridicatum* N.E.Br.
- Mes. viridiflorum* Ait. = *Sphalmanthus viridiflorus* N.E.Br.
- Mes. viridiflorum* Jacq. = *Aridaria viridiflora* L.Bol.
- Mes. vittatum* N.E.Br. = *Nananthus vittatus* Schwant.
- Mes. Volckameri* Haw. = *Cryophytum Aitonis* N.E.Br.
- Mes. vulpinus* Haw. = *Mes. caninum* Haw. var. *vulpinum* Haw.
- Mes. vulvarium* Dtr. = *Ruschia vulvaria* Schwant.
- Mes. Watermeyeri* L.Bol. = *Lampranthus Watermeyeri* N.E.Br.
- Mes. Weigangianum* Dtr. = *Leipoldtia Weigangianus* Dtr. et Schwant.
- Mes. Wettsteinii* Bgr. = *Conophytum Wettsteinii* N.E.Br.
- Mes. Wettsteinii* L.Bol. = *Conophytum Pearsonii* N.E.Br.
- Mes. Wilmaniae* L.Bol. = *Ruschia Wilmaniae* L.Bol.
- Mes. wittebergense* L.Bol. = *Ruschia wittebergensis* Schwant.
- Mes. Woodburniae* L.Bol. = *Lampranthus Woodburniae* N.E.Br.
- Mes. Wordsworthiae* L.Bol. = *Lampranthus Wordsworthiae* N.E.Br.
- Mes. Zeyheri* S.D. = *Lampranthus Zeyheri* N.E.Br.
- Mes. zygophylloides* L.Bol. = *Lampranthus zygophylloides* N.E.Br.

Meyerophytum Schwant.

- M.D.G.Ztg. (1927) 436; D.K.G. (1927/28) 322; v.P.M. 51; A. 220.
- Meyerophytum Meyeri*** Schwant. — (*Mitrophyllum Meyeri* Schwant.) — Kl.-Namaland, Nutabooi, Buffelsriver bei Kommaggas. — M.D.G.Ztg. (1927) 150 (*Mitr. Meyeri*); D.K.G. (1927/28) 322.

Micropterum Schwant.

- M.D.G.Ztg. (1928) 17; M.D.G.Ztg. (1928) 166, 238, 400; v.P.M. 51; F.R. XLIII. 257.
- Micropterum cuneifolium*** (Jacq.) Schwant. — (*Mes. cuneifolium* Jacq., *Cleretum cuneifolium* N.E.Br.). — S.-Afr. — M.D.G.Ztg. (1928) 400 (*Cler. cuneifol.*); F.R. XLIII. 257.

- Micropterum limpidum*** (Ait.) Schwant. — (*Mes. limpidum* Ait., *Cleretum limpidum* N.E.Br.). — S.-Afr. — M.D.G.Ztg. (1928) 400 (*Cler. limpidum*); F.R. XLIII. 257.
- Micropterum longipes*** (L.Bol.) Schwant. — (*Cleretum longipes* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Bowesdorp und Springbok. — L.B. II. 150 (*Cler. longipes*); F.R. XLIII. 257.
- Micropterum papulosum*** (L.f.) Schwant. — (*Mes. papulosum* L.f., *Mes. humifusum* Ait., *Mes. oligandrum* Kunze, *Cleretum papulosum* L.Bol., *Cleretum papulosum* N.E.Br.). — S.-Afr., bei Brakfontein, Clanwilliam Divis. — B.M.P. 41 (*Mes. papulosum*); L.B. I. 131 (*Cler. papulosum* L.Bol.); G.C. (1927, II) 228 (*Cler. papulosum* N.E.Br.); M.D.G.Ztg. (1928) 400 (*Cler. papulosum*); D.K.G. 1937, 161 (*Cler. pap.*); F.R. XLIII. 257.
- Micropterum puberulum*** (Haw.) Schwant. (*Mes. puberulum* Haw., *Cleretum puberulum* N.E.Br.). — S.-Afr., sandige Stellen am Sondags-Fluß, bei Graaff Reinet, bei Kingwilliams-Town. — B.M.P. 35 (*Mes. puberulum*); G.C. (1927, II) 228 (*Cleretum puberulum*); F.R. XLIII. 257.
- Micropterum Schlechteri*** Schwant. — (*Cleretum Schlechteri* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Waterklip. — M.D.G.Ztg. (1928) 17; M.D.G.Ztg. (1928) 166, 238, 400 (*Cler. Schlechteri*); F.R. XLIII. 257.
- Micropterum sessiliflorum*** (Ait.) Schwant. — (*Mes. sessiliflorum* Ait., *Cryophytum sessiliflorum* N.E.Br., *Cleretum sessiliflorum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — B.M.P. 37 (*Mes. sessilifl.*); G.C. (1928, II) 182 (*Cryoph. sessilifl.*); M.D.G.Ztg. (1928) 400 (*Cler. sessilifl.*); F.R. XLIII. 257.

***Mitrophyllum* Schwant.**

- D.K.G. (1925/26) 181; D.K.G. (1927/28) 105, 321; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 51; A. 217.
- (?) ***Mitrophyllum abbreviatum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, 50 miles nordöstl. von Port Nolloth. — L.B. II. 368.
- (?) ***Mitr. affine*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Helskloof. — L.B. II. 97.
- Mitr. chrysoleucum*** Schwant. = ***Monilaria chrysoleuca*** Schwant.
- Mitr. clivorum*** Schwant. = ***Conophyllum clivorum*** Schwant.
- Mitr. cognatum*** Schwant. = ***Conophyllum cognatum*** Schwant.
- (?) ***Mitr. Conradii*** L.Bol. — Kl.-Namaland. Richtersveld, Stinkfonteinberg. — L.B. III. 97.
- Mitr. dissitum*** Schwant. = ***Conophyllum dissitum*** Schwant.
- (?) ***Mitr. Framesii*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Hügel zwischen Springbok und Walle Kraal. — L.B. II. 289.
- Mitr. grande*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. proximum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, auf Hügeln nördl. Brakfontein. — G.C. (1929, II) 227; M. 264.

(?) *Mitr. karrachabense* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Karrachab. — L.B. III. 98.

(?) *Mitr. kubusanum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Kubus. — L.B. III. 99.

Mitr. Marlothianum Schwant. = *Conophyllum Marlothianum* Schwant.

Mitr. Meyeri Schwant. = *Meyerophytum Meyeri* Schwant.

Mitr. mitratum L.Bol. = *Mitr. Pillansii* N.E.Br.

Mitr. mitratum (Marl.) Schwant. — (*Mes. mitratum* Marl.). — Kl.-Namaland, sandige Wüsten ca. 10 miles östl. von Port Nolloth, Richtersveld, Braakfontein. — Tr.R.S. II. 35 (*Mes. mitr.*); N.E.Br. M. 115 (*Mes. mitr.*); D.K.G. (1925/26) 182; Fl.Pl. VII. Pl. 274; D.K.G. (1927/28) 105, 321; G.C. (1929, II) 228.

Mitr. mitratum (Marl.) Schwant. var. *eburneum* L.Bol. — Kl.-Namaland, 28 miles östl. von Port Nolloth. — L.B. II. 252.

Mitr. moniliforme Schwant. = *Monilaria moniliformis* Schwant.

Mitr. nanum (L.Bol.) N.E.Br. — (*Conophyllum nanum* L.Bol., *Diplosoma Leipoldtii* L.Bol. forma *dormiens* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., zwischen Twenty-four Rivers und Porterville. — L.B. II. 51 (*Con. nanum*); L.B. II. 128, 129 (*Dipl. Leip. f. dorm.*). — G.C. (1929) 264.

(?) *Mitr. niveum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kommaggas. — L.B. II. 471; K.Kd. (1937) 44.

Mitr. Pillansii (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mitr. mitratum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, auf Hügeln ca. 6 miles nordöstl. von Oograbies Poort. — G.C. (1929, II) 228.

Mitr. pisiforme Schwant. = *Monilaria pisiformis* Schwant.

Mitr. proximum Schwant. = *Conophyllum proximum* Schwant.

(?) *Mitr. roseum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Kurkamberge bei Kommaggas. — L.B. II. 349; D.K.G. (1934) 50.

Mitr. Schickianum Tisch. — Kl.-Namaland. — G.C. (1929, II) 264; M. 268. — Ob mit *Mitr. nanum* (L.Bol.) N.E.Br. identisch?

Mitr. scutatum Schwant. = *Monilaria chrysoleuca* Schwant.

(?) *Mitr. tenuifolium* L.Bol. — Kl.-Namaland, Hangpaal bei Steinkopf. — L.B. II. 409; K.Kd. (1937) 45.

Monilaria Schwant. (*Schwantesia* L.Bol.)

Gw. (1929) 69; S.G. (1928) 279 (*Schwantesia*); G.C. (1929, I) 32; G.C. (1930) 71; v.P.M. 54; A. 217.

Monilaria brevifolia L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtshlakte. — L.B. III. 57.

Mon. chrysoleuca (Schlecht.) Schwant. — (*Mes. chrysoleucum* Schlecht., *Mes. scutatum* L.Bol.; *Mitrophyllum chrysoleucum* Schwant., *Mon. scutata* Schwant., *Conophyllum chrysoleucum* Schwant., *Conophyllum scutatum* Schwant.). — Van Rhynsdorp Divis., Karree Bergen;

- Kl.-Namaland, nahe Walle Kraal, nahe Hondeclip Bay. — A.B.H. IV. 73 (*Mes. scut.*); L.B. I. 59 (*Mes. scut.*); D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. chrys.*); D.K.G. (1927/28) 105 (*Mitr. scut.*); D.K.G. (1927/28) 322 (*Con. chrys.*, *Con. scut.*); S.G. (1928) 126 (*Mes. scut.*); Gw. (1929) 69 (*Mon. chrys.*, *Mon. scut.*); G.C. (1929, II) 34.
- Mon. Luckhoffii** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 20 miles jenseits Van Rhynsdorp. — L.B. II. 222.
- Mon. microstigma** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Knechtsvlakte. — L.B. II. 331.
- Mon. moniliformis** (Thbg.) Schwant. — (*Mes. moniliforme* Thbg. 1791, *Mes. moniliforme* Haw., *Mitrophyllum moniliforme* Schwant., *Conophyllum moniliforme* Schwant., *Schwantesia moniliformis* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., auf Hügeln nahe des Oliphants River. — B.M.P. 56 (*Mes. mon.* Haw.); N.E.Br.M. 116 (*Mes. mon.*); D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. mon.*); D.K.G. (1927/28) 322 (*Con. mon.*); Gw. (1929) 69; G.C. (1929, II) 33; M. 270.
- Mon. pisiformis** (Haw.) Schwant. — (*Mes. pisiforme* Haw., *Mitrophyllum pisiforme* Schwant., *Conophyllum pisiforme* Schwant., *Schwantesia pisiformis* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., Van Rhynsdorp-Karoo. — D.K.G. (1925/26) 182 (*Mitr. pis.*); D.K.G. (1927/28) 322 (*Con. pis.*); Gw. (1929) 69; G.C. (1929, II) 34.
- Mon. Peersii** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — L.B. II. 58.
- Mon. Primosii** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Vredendal bei Oliphants River. — L.B. III. 57.
- Mon. ramulosa** L.Bol. = **Mon. ramulosa** Schwant.
- Mon. ramulosa** (L.Bol.) Schwant. — (*Schwantesia ramulosa* L.Bol., *Mon. ramulosa* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Hondeclip Bay. — L.B. II. 14 (*Schwant. ram.*); S.G. (1928) 279 (*Schwant. ram.*); Gw. (1929) 69; L.B. II. 331; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.
- Mon. salmonea** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Karree-Bergen, auf weißen Quarzstücken etwa 2 miles südl. von Nieuwerust. — L.B. II. 355.
- Mon. scutata** Schwant. = **Mon. chryssoleuca** Schwant.
- Mon. vestita** Schwant. — Kl.-Namaland. — J.S. 163; J.S.Pl. 220.
- Mon. Watermeyereri** L.Bol. — (*Schwantesia Watermeyereri* L.Bol.). — Van Rhynsdorp. — S.G. (1928) 279 (*Schwant. Wat.*); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 41.

Mossia N.E.Br.

- G.C. (1930, I) 71, 151; v.P.M. 55; C.J. (III) 10; A. 217.
- Mossia intervallaris** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. intervallare* L.Bol.). — Kalahari-Region, Transvaal, Forest-Hill nahe Johannesburg, nahe Alberton, nahe Lake Chrissie; Herschell Divis. Sterkspruit; Orange Free State „Goedehoep“, Zastron. — A.B.H. IV. 81 (*Mes. interv.*); G.C. (1930, I) 151.

Mossia intervallis (L.Bol.) N.E.Br. in v.P.M. 55 ist ein Druckfehler, und muß heißen: *Mossia intervallaris* (L.Bol.) N.E.Br.

Mossia Verdoorniae N.E.Br. = *Chasmatophyllum Verdoorniae* L.Bol.

Muiria N.E.Br.

G.C. (1927, I) 116; D.K.G. (1929) 233; v.P.M. 55; A. 217.

Muiria Hortenseae N.E.Br. — Kl.-Karoo in Riversdale Divis. — G.C. (1927, I) 116, 251; S.G. (1929) 91; D.K.G. (1929) 233; S.G. (1931) 134; M. 272.

Muiro-Gibbaeum spec. N.E.Br. — Naturbastard (*Gibbaeum album* N.E.Br. [?] × *Muiria Hortenseae* N.E.Br.). — S.G. (1931) 134.

Namibia Dtr. et Schwant.

D.K.G. (1925/26) 184; D.K.G. (1927/28) 106; v.P.M. 56; A. 220.

Namibia cinerea (Marl.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. cinereum* Marl., *Juttadinteria cinerea* Schwant.). — Gr.-Namaland, bei Rote Kuppe. — Tr.R.S. I. 407 (*Mes. cin.*); D.K.G. (1925/26) 184; D.K.G. (1927/28) 106.

Namibia Pomonae (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Pomonae* Dtr., *Juttadinteria Pomonae* Schwant.). — Gr.-Namaland, zwischen Pomona und Pumpstation Alicetal. — D.B.F. XIX. 125 (*Mes. Pom.*); D.K.G. (1925/26) 184.

Namibia ponderosa (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. ponderosum* Dtr.). — Gr.-Namaland. — J.S.Pl. 222.

Nananthus N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; G.C. (1931, I) 92; J.B. (1928) 78; v.P.M. 56; A. 217.

Nananthus albinotus L.Bol. = *Rabiea albinota* N.E.Br.

Nan. albipunctus L.Bol. = *Khadia carolinensis* L.Bol.

Nan. albipunctus N.E.Br. = *Rabiea albipuncta* N.E.Br.

Nan. albipunctus Schwant. = *Rabiea albipuncta* N.E.Br.

Nan. aloides N.E.Br. = *Nananthus aloides* Schwant.

Nan. aloides (Haw.) Schwant. — (*Mes. aloides* Haw., *Aloinopsis aloides* Schwant., *Nan. aloides* N.E.Br.). — Östl. Kap-Provinz: Griqualand-West, Beschuanaland, am Matlowing River, bei Jabiru Fontein, nahe Takun, nahe Postmasburg. — N.E.Br.M. 123 (*Mes. al.*); Fl.Pl. II. 54 (*Mes. al.*); D.K.G. (1922) 129 (*Mes. al.*); D.K.G. (1925/26) 178 (*Al. al.*); Gfl. (1928) 68; G.C. (1931, I) 133; M. 274; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Nan. aloides (Haw.) Schwant. var. *striata* L.Bol. — (*Aloinopsis aloides* Schwant. var. *striata* L.Bol.). — Barkly West Divis., Bultfontein und Boetsap. — S.G. (1930) 48 (*Al. al. str.*).

- Nan. canus* Schwant. = *Deilanthus Peersii* N.E.Br.
Nan. cibdelus Schwant. = *Rabiea cibdela* N.E.Br.
Nan. Comptonii L.Bol. = *Rabiea albinota* N.E.Br.
Nan. difformis L.Bol. — Cradock Divis., bei Cradock. — L.B. II. 392.
Nan. Dyeri L.Bol. = *Nan. rubrolineatus* Schwant.
Nan. Jamesii L.Bol. — Cradock Divis., Berge bei Halesowen. — L.B. II. 304.
Nan. Loganae L.Bol. nomen nudum. — Dürfte mit *Aloinopsis Loganii* L.Bol. identisch sein.
Nan. Peersii L.Bol. = *Deilanthus Peersii* N.E.Br.
Nan. Pole Eransii N.E.Br. — Prieska Divis., Zand Vlei. — G.C. (1931, I) 133; M. 275.
Nan. rubrolineatus N.E.Br. = *Nan. rubrolineatus* Schwant.
Nan. rubrolineatus (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. rubrolineatum* N.E.Br., *Aloinopsis rubrolineata* Schwant., *Aloinopsis Dyeri* L.Bol., *Nan. Dyeri* L.Bol., *Nan. rubrolineatus* N.E.Br.). — Graaf Reinets Divis., Kendrew. — D.K.G. (1925/26) 178 (*Al. rubr.*); Gfl. (1928) 6. J.B. (1928) 78; S.G. (1929) 244, 245 (*Al. Dyeri*); L.B. II. 83 (*Nan. Dyeri*); G.C. (1931, I) 134; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.
Nan. Soehlemanni Hge. jr. nomen nudum = *Deilanthus Peersii* N.E.Br.
Nan. vittatus N.E.Br. = *Nan. vittatus* Schwant.
Nan. vittatus (N.E.Br.) Schwant. (*Mes. vittatum* N.E.Br., *Mes. transvaalense* Rolfe, *Aloinopsis vittata* Schwant., *Aloinopsis transvaalensis* Schwant., *Nan. vittatus* N.E.Br.). — Östl. Kap-Prov., Orange Free State, Fauresmith Distr., nahe des Walwas River, Jagersfontein. Transvaal: Smitskraal, Boshof Distr., Hamans Kraal. — B.Mag. (142) Tab. 8674 A. (*Mes. transv.*) D.K.G. (1925/26) 178 (*Al. vitt.*); M.Fl.Pl. I. 162 (*Mes. vitt.*); Gfl. (1928) 69; J.B. (1928) 78; S.G. (1928) 127 (*Mes. vitt.*); G.C. (1931, I) 78; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Nelia Schwant.

- M.D.G.Ztg. (1928) 92; Gfl. (1928) 129; v.P.M. 56; A. 220.
Nelia Meyeri Schwant. — (*Sterropetalum Pillansii* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Nutabooi am Buffelsriver. — Gfl. (1928) 129; G.C. (1928, I) 266 (*Sterrop. Pill.*); D.K.G. (1929) 16.
Nelia Meyeri Schwant. var. *longipetala* L.Bol. — Kl.-Namaland, auf den Hügeln etwa 3 miles südl. Doornpoort. — L.B. I. 151.
Nelia robusta Schwant. — Kl.-Namaland, ca. 45 miles nordöstl. Port Nolloth. — D.K.G. (1929) 16.
Nelia Schlechteri Schwant. — (*Corpuscularia perdiantha* Tisch.). — Kl.-Namaland, ca. 28 miles nordöstl. Port Nolloth, Braakfontein Richtersveld. — D.K.G. (1930) 20 (*Corp. perd.*); D.K.G. (1930) 69.

Neorhine Schwant.

D.K.G. (1930) 22; v.P.M. 57; A. 221.

Neorhine Pillansii (N.E.Br.) Schwant. — (*Rhinephyllum Pillansii* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., nahe Matjesfontein. — G.C. (1927, II) 93 (*Rhin. Pill.*); D.K.G. (1930) 22; M. 287 (*Rhin. Pill.*)

Octopoma N.E.Br.

G.C. (1930, I) 72, 126; v.P.M. 57; A. 217.

Octopoma abruptum (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. abruptum* Bgr.). — Clanwilliam Divis., Brandywine River. — G.C. (1930, I) 126.

Octopoma inclusum (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. inclusum* L.Bol.). — Kl.-Namaland. Abhänge südl. Hondeklip Bay, Flamink Berg, Walle Kraal. — A.B.H. IV. 40 (*Mes. incl.*); G.C. (1930, I) 126.

Octopoma octojuge (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. octojuge* L.Bol., *Ruschia octojugis* L.Bol.?). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — A.B.H. IV. 77 (*Mes. octojuge*); G.C. (1930, I) 126; L.B. II. 175 (*Ruschia octojugis*).

Odontophorus N.E.Br.

G.C. (1927, I) 12; v.P.M. 58; A. 217.

Odontophorus albus L.Bol. — Kl.-Namaland. Steinkopf-Umdaus. — L.B. II. 490.

Odontophorus areolatus Marl. nomen nudum ist mit **Odontophorus nanus** L.Bol. identisch.

Odont. Herrei L.Bol. — Kl.-Namaland, Steinkopf. — L.B. II. 491.

Odont. Marlothii N.E.Br. — Kl.-Namaland, von Steinkopf nach Koufontein. — S.G. (1927) 434; L.B. I. 16, 101.

Odont. nanus L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Eenriet ca. 7 miles nordöstl. von Steinkopf. — L.B. II. 59.

Odont. primulinus L.Bol. — Namaland, auf mit weißem Quarz bedeckten Hügeln nahe Aribies bei Steinkopf. — L.B. II. 223.

Oophytum N.E.Br.

G.C. (1926, I) 48; P.G.S.A.P. 241; D.K.G. (1927/28) 225; v.P.M. 58; A. 217.

Oophytum nanum (Schltr.) L.Bol. — (*Mes. nanum* Schltr.). — Kl.-Namaland. Trockene Hügel am Rande der Ebene Knechts Vlagte. — B.M.P. 284 (*Mes. nan.*); S.G. (1929) 121.

Oophytum oviforme N.E.Br. — (*Conophytum oviforme* N.E.Br.). — Rhynsdorp Divis., auf dem Hardveld. — N.E.Br.M. 95 (*Mes. ov.*); G.C. (1922, I) 231 (*Con. ov.*); D.K.G. (1927/28) 226; L.B. I. 39; S.G. (1929) 121.

***Ophthalmophyllum* Dtr. et Schwant.**

D.K.G. (1927/28) 15, 21, 106; M.D.G.Ztg. (1927) 64; D.K.G. (1934) 58; v.P.M. 58.

Ophthalmophyllum Caroli* (Lavis) Tisch. — (*Conophytum Caroli* Lavis). — Kl.-Namaland, ca. 100 miles südöstl. Springbok. — **L.B. II. 378** (*Conoph. Caroli*); **D.K.G. (1935) 86.*

***Ophth. cornutum* Schwant. = *Conophytum subfenestratum* Schwant.**

Ophth. Dinteri* Schwant. — Gr.-Namaland, Vaaldoorn, 40 km östl. Warmbad; Eendoorn, Kriegskuppe südwestl. Warmbad. — **J.S.P. 226.*

Ophth. Edithae* (N.E.Br.) Tisch. — (*Conophytum Edithae* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., Knegs Vlakke. — **J.S.C. II. 429** (*Con. Edithae*); **D.K.G. (1934) Seite XLVII.*

Ophth. Friedrichiae* (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Friedrichiae* Dtr., *Derenbergia Friedrichiae* Schwant., *Lithops Friedrichiae* N.E.Br., *Conophytum Friedrichiae* Schwant.). — Gr.-Namaland, Warmbad, und westl. Warmbad. — **D.N.Pfl. 41** (*Mes. Friedr.*); **D.K.G. (1920) 132** (*Mes. Friedr.*); **D.K.G. (1925/26) 138** (*Derenb. Friedr.*); **G.C. (1926, I) 102** (*Lithops Friedr.*); **M.D.G.Ztg. (1926) 219** (*Lithops Friedr.*); **S. (1927) 74** (*Lithops Friedr.*); **M.D.G.Ztg. (1927) 64**; **D.K.G. (1927/28) 21** (*Conophytum Friedr.*) **106**; **S.G. (1927) 372**; **L.B. I. 37**; **D.K.G. (1934) 42, 59**; **J.S.P. 226.*

Ophth. Fulleri* Lavis. — Bushmanland, Kakamas. — **L.B. II. 472**; **J.S.P. 226.*

Ophth. Herrei* Lavis. — Kl.-Namaland, Breckpoort bei Steinkopf. — **L.B. II. 473**; **S. (1933) 43**; **D.K.G. (1934) 60**; **J.S.P. 227.*

Ophth. Jacobsenianum* Schwant. — Kenhard Divis., bei Pofadder, 40 miles südöstl. Pofadder. — **J.S.P. 228.*

***Ophth. Marlothii* Schwant. = *Conophytum pellucidum* Schwant.**

Ophth. Maughanii* (N.E.Br.) Schwant. — (*Conophytum Maughanii* N.E.Br., *Ophth. Maughanii* Tisch.). — Kl.-Namaland; Kenhardt-Divis., nahe Pofadder, Keimos, Kakamas. — **G.C. (1930, I) 516** (*Conoph. Maugh.*); **M. 167** (*Conoph. Maugh.*); **D.K.G. (1934) 60**; **J.S.P. 228**; **D.K.G. (1936) 157** (*Ophth. Maugh. Tisch.*); **D.K.G. (1937) 162**; **F.R. XLIII. 225.*

***Ophth. Maughanii* (N.E.Br.) Schwant. var. *rubrum* N.E.Br. nomen nudum? = *Ophth. Schuldtii* Schwant.**

***Ophth. Maughanii* (N.E.Br.) Tisch. = *Ophth. Maughanii* Schwant.**

***Ophth. Pillansii* L.Bol. nomen nudum. — Kl.-Namaland, Springbok = *Conophytum subfenestratum* Schwant.**

Ophth. praesectum* (N.E.Br.) Schwant. — (*Conophytum praesectum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland. Kenhardt Divis., bei Pofadder. — **G.C. (1930, II) 8** (*Con. praesectum*); **D.K.G. (1934) 60.*

- Ophth. pubescens*** Tisch. — Bushmanland, bei Argusfontein. — D.K.G. (1938) 34.
- Ophth. rufescens* Schwant. nomen nudum. = ***Ophth. Schuldtii*** Schwant.
- Ophth. rufescens*** (N.E.Br.) Tisch. — (*Conophytum rufescens* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, nahe Pofadder. — G.C. (1930, II) 8 (*Conoph. ruf.*); D.K.G. (1936) 157.
- Ophth. Schlechteri*** Schwant. — Kl.-Namaland, 40 miles östl. Port Nolloth. — J.S.P. 228.
- Ophth. Schuldtii*** Schwant. — (*Ophth. Maughanii* Schwant. var. *rubrum* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, bei Vaaldoorn, 40 km östl. Warmbad. — J.S.P. 229.
- Ophth. Triebneri*** Schwant. — Gr.-Namaland, 60 miles südl. Een-doorn, südöstl. Warmbad. — D.K.G. (1934) 60; J.S.P. 229.
- Ophth. verrucosum*** Lavis. — Van Rhynsdorp Divis., Nieuwerust. — L.B. II. 473; J.S.P. 229.

***Opophytum* N.E.Br.**

- G.C. (1925, II) 412; G.C. (1928, II) 253; v.P.M. 58; A. 217.
- Opophytum aquosum*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. aquosum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, 7 miles von der Mündung und 3 miles südl. der Orange-Fluß-Mündung. — A.B.H. IV. 72 (*Mes. aqu.*); G.C. (1928, II) 253.
- Opophytum dactylinum*** (Welw.) N.E.Br. — (*Mes. dactylinum* Welw.). — Trop. West-Afrika, Angola, bei Mossamedes. — B.M.P. 226 (*Mes. dact.*); G.C. (1928, II) 253.
- Opophytum fastigiatum*** (Thbg.) N.E.Br. — (*Mes. fastigiatum* Thbg.). — S.-Afr. — B.M.P. 120 (*Mes. fastig.*); G.C. (1928, II) 253.
- Opophytum Forskahlii*** (Hochst.) N.E.Br. — (*Mes. Forskahlii* Hochst.). — Arabien, Ägypten am Gestade des Roten Meeres. — B.M.P. 42 (*Mes. Forsk.*); G.C. (1928, II) 253.
- Opophytum speciosum*** N.E.Br. — G.C. (1928, II) 253.

***Orthopterum* L.Bol.**

- G.C. (1927) 281; v.P.M. 58; A. 221; L.B. III. 109, 113.
- Orthopterum coegana*** L.Bol. — Uitenhage Divis., Coega Kop. — L.B. III. 103, 114.
- Orthopterum Waltoniae*** L.Bol. — Albany Divis., Grahamstown nahe Forst Brown. — S.G. (1927) 281; L.B. I. 77, 130; L.B. III. 114.

***Oscularia* Schwant.**

- M.D.G.Ztg. (1927) 187; G.C. (1930, I) 81; v.P.M. 59; A. 217.
- Oscularia caulescens*** (Mill.) Schwant. — (*Mes. caulescens* Mill., *Mes. deltoides* var. *simplex* D.C.). — B.M.P. 188 (*Mes. caul.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187.

Oscularia deltata Schwant. (*Mes. deltoides* Mill.). — M.D.G.Ztg. (1927) 187. *Osc. deltata* Schwant. ist eine irrtümliche Bezeichnung und ist auf *Osc. deltoides* Schwant. abzuändern.

Oscularia deltata var. *majus* Schwant. = *Oscularia deltoides* var. *majus* Schwant.

Oscularia deltoides (L. auch Mill.) Schwant. — (*Mes. deltoides* Mill.). — Tulbagh Divis., New Kloof, nahe Tulbagh, nahe Tulbagh-Wasserfall. — N.E.Br.M. 118 (*Mes. delt.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187.

Oscularia deltoides (L. auch Mill.) Schwant. var. *majus* Schwant. — (*Mes. deltoides* Mill. var. *majus* Weston. *Oscularis deltata* var. *majus* Schwant.). — N.E.Br.M. 118 (*Mes. delt. v. majus*); M.D.G.Ztg. (1927) 118 (*Osc. deltata* var. *majus* ist eine irrtümliche Bezeichnung).

Oscularia deltoides (L. auch Mill.) Schwant var. *muricata* (Bgr.) Schwant. — (*Mes. deltoides* Mill. var. *muricatum* Bgr., *Mes. muricatum* Haw.). — B.M.P. 190 (*Mes. delt. var. muric.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187.

Oscularia deltoides (Mill.) Schwant. var. *pedunculata* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. deltoides* var. *pedunculatum* N.E.Br.). — N.E.Br. M. 118 (*Mes. delt. var. pedunc.*); M.D.G.Ztg. (1927) 187.

Peersia L.Bol.

Fl.Pl. VII. Pl. 264; v.P.M. 59; A. 221.

Peersia Frithii L.Bol. — (*Mes. Frithii* L.Bol.). — S.-Afr., Aberdeen Road (Weg), Grootfontein. — A.B.H. III. 125 (*Mes. Frith.*); L.B. II. 94.

Peersia macradenia L.Bol. — (*Mes. macradenium* L.Bol.). — Ceres Karroo, am Beukerfontein Road (Weg). — Fl.Pl. VII. Pl. 264.

Perissolobus N.E.Br.

G.C. (1931, I) 204; v.P.M. 59; A. 217.

Perissolobus Bijlji N.E.Br. — Somerset Divis., genauer Standort unbekannt. — G.C. (1931, I) 294.

Pherelobus N.E.Br.

M.D.G.Ztg. (1928) 400; v.P.M. 59; A. 217.

Pherelobus Maughanii N.E.Br. — Calvinia Divis. — M.D.G.Ztg. (1928) 400.

Phyllobolus N.E.Br.

G.C. (1925, II) 413; P.G.S.A.P. 246; G.C. (1928, II) 253; v.P.M. 59; A. 217.

Phyllobolus Lesliei N.E.Br. — G.C. (1928, II) 253.

Phyllobolus Pearsonii N.E.Br. — Kl.-Namaland. — P.G.S.A.P. 246.

Phyllobolus pubicalyx N.E.Br. — G.C. (1928, II) 253.

Phyllobolus resurgens N.E.Br. = ***Phyllobolus resurgens*** Schwant.

Phyllobolus resurgens (Kensit) Schwant. — (*Mes. resurgens* Kensit, *Aridaria resurgens* L.Bol., *Phyllobolus resurgens* N.E.Br.). — S.-Afr., Matjesfontein; Calvinia Divis., Bokkeveld, nahe Papelfontein; Clanwilliam. — Tr.R.S. I. 154 (*Mes. resurg.*); F.R. XII. 323 (*Mes. resurg.*); Gfl. (1928) 68; L.B. I. 61, 66 (*Arid. resurg.*); S.G. (1928) 126 (*Arid. resurg.*); C.J. V. 65; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Piquetia N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 248; v.P.M. 60; A. 218.

Piquetia Pillansii (Kensit) N.E.Br. — (*Mes. Pillansii* Kensit, *Piquetia Pillansii* Schwant.). — Piquetberg Divis. — B.Mag. 143 Tab. 8703 (*Mes. Pillansii*); Fl.Pl. III. 110 (*Mes. Pillansii*); P.G.S. A.P. 249; Gfl. (1928) 68; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Piquetia Pillansii Schwant. = ***Piquetia Pillansii*** N.E.Br.

Platythyra N.E.Br.

G.C. (1925, II) 412; G.C. (1928, II) 313; v.P.M. 60; A. 218.

Platythyra Barklyi Schwant. = ***Cryophytum Barklyi*** N.E.Br.

Platythyra Haeckeliana (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. Haeckelianum* Bgr., *Mes. ovatum* Thbg., *Mes. elongatum* Eckl. et Zeyh., *Mes. angulatum* var. *ovatum* Sond.). — Uitenhage Divis., Tal und Hügel des Zwartkops-Fluß, nahe Uitenhage. — G.C. (1928, II) 313.

Platythyra pallens L.Bol. = ***Prenia pallens*** N.E.Br.

Platythyra relaxata Schwant. = ***Prenia relaxata*** N.E.Br.

Pleiospilos N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; G.C. (1926, II) 89; D.K.G. (1927/28) 22; S. (1928) 122; v.P.M. 60; A. 218.

Pleiospilos Archeri L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Laingsburg. — L.B. II. 246.

Pleiospilos Bolusii (Hook.f.) N.E.Br. — (*Mes. Bolusii* Hook.f.). — Östl. Karroo, Aberdeen Road; Graaff Reinet Divis., bei Graaff Reinet, bei Kendrew; bei Willowmoore. — D.K.G. (1925/26) 159 (*Mes. Bolusii*); G.C. (1926, II) 89; S. (1928) 123; S.G. (1930) 253; M. 277.

Pleiospilos borealis L.Bol. — Orange Free State, bei Bloemfontein, — L.B. II. 288.

Pleiospilos brevisepalus L.Bol. — Uniondale Divis., bei Uniondale. — L.B. II. 255.

- Pleiospilos canus*** L.Bol. — (*Punctillaria cana* L.Bol.). — S.-Afr. zwischen Oudtshoorn und Mossel Bay, wahrscheinlich in der Nähe von Oudtshoorn. — S.G. (1927) 326 (*Punct. cana*); L.B. I. 84 (*Punct. cana*); L.B. II. 100.
- Pleiospilos claratus*** L.Bol. — Laingsburg Divis., zwischen Sutherland und Laingsburg. — L.B. II. 454.
- Pleiospilos compacta*** Schwant. = ***Pleiospilos nobilis*** Schwant.
- Pleiospilos Dekenahi*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Punctillaria Dekenahi* N.E.Br.). — Fraserburg Divis., bei Fraserburg. — G.C. (1928, I) 215 (*Punct. Dekenahi*); M. 282 (*Punct. Dekenahi*); D.K.G. (1930) 22.
- Pleiospilos dimidiatus*** L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Laingsburg. — L.B. II. 257.
- Pleiospilos Fergusoniae*** L.Bol. — Ladismith Divis., Ockert's Kraal bei Ladismith. — L.B. II. 99.
- Pleiospilos Framesii*** L.Bol. — Willowmoore Divis. — L.B. II. 85.
- Pleiospilos grandiflorus*** L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — L.B. II. 255.
- Pleiospilos Hilmari*** L.Bol. — Ladismith Divis., am Fuße des Klein-Swarteberg. — L.B. II. 253; S.G. (1931) 317.
- Pleiospilos Kingiae*** L.Bol. — Uniondale Divis., Uniondale Road (Weg), Uniondale. — L.B. III. 33.
- Pleiospilos latifolius*** L.Bol. — Prince Albert Divis. — L.B. III. 34.
- Pleiospilos latipetalus*** L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Willowmoore. — L.B. II. 277.
- Pleiospilos Leipoldtii*** L.Bol. — Uniondale Divis., bei Uniondale. — L.B. II. 278.
- Pleiospilos Loganii*** L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — L.B. II. 453.
- Pleiospilos longibracteatus*** L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 258.
- Pleiospilos longisepalus*** L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Willowmoore. — L.B. III. 37.
- Pleiospilos magnipunctatus*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. magnipunctatum* Haw., *Punctillaria magnipunctata* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., Karroo bei Laingsburg und Fraserburg; Prince Albert Divis., nahe Abraham's Kraal, Karroo bei Prince Albert; nahe Matjesfontein. — N.E.Br.M. 132 (*Mes. magn.*); D.K.G. (1925/26) 160 (*Mes. magn.*); G.C. (1926, II) 212 (*Punct. magn.*); D.K.G. (1927/28) 23.
- Pleiospilos magnipunctatus*** (Haw.) Schwant. var. *inaequalis* L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — L.B. II. 254.
- Pleiospilos magnipunctatus*** (Haw.) Schwant. var. *sesquiuncinialis* L.Bol. — (*Punctillaria magnipunctata* var. *sesquiuncinialis* L.Bol.). — S.G. (1927) 326 (*Punct. magn. var. sesqu.*); L.B. I. 84.

Pleiospilos minor L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Steylerville. — L.B. II. 259.

Pleiospilos Nelii Schwant. — (*Pleiospilos tricolor* N.E.Br., *Pleiospilos pedunculata* L.Bol.). — Willowmoore Divis., zwischen Prince Albert und Willowmoore. — D.K.G. (1930) 146; S.G. (1930) 253 (*Pl. pedunc.*); G.C. (1930, II) 296 (*Pl. tric.*); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

Pleiospilos nobilis (Haw.) Schwant. — (*Mes. nobile* Haw., *Mes. compactum* Ait., *Punctillaria compacta* N.E.Br., *Pleiospilos compacta* Schwant.). — Oudtshoorn Divis. — B.Mag. 145. Tab. 8814 (*Mes. nob.*); D.K.G. (1925/26) 163 (*Mes. nob.*); G.C. (1926, II) 228 (*Punct. comp.*); S.G. (1927) 326 (*Punct. comp.*); G.C. (1928, I) 216 (*Punct. comp.*); G.C. (1928, II) 492 (*Punct. comp.*); L.B. I. 82 (*Punct. comp.*); D.K.G. (1927/28) 23; M. 280 (*Punct. comp.*).

Pleiospilos optatus (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. optatum* N.E.Br., *Punctillaria optata* N.E.Br.). — Oudtshoorn Divis., Bank Hoogte. — N.E.Br.M. 71 (*Mes. opt.*); D.K.G. (1925/26) 163 (*Mes. opt.*); G.C. (1926, II) 229 (*Punct. opt.*); D.K.G. (1927/28) 23; G.C. (1929, I) 34 (*Punct. opt.*); M. 283 (*Punct. opt.*).

Pleiospilos pedunculatus L.Bol. = **Pleiospilos Nelii** Schwant.

Pleiospilos Peersii L.Bol. — Willowmoore Divis., Wonderling bei Toverwater. — L.B. II. 278.

Pleiospilos prismaticus (Marl.) Schwant. — (*Mes. prismaticum* Marl., *Mes. Roodiae* N.E.Br., *Punctillaria Roodiae* N.E.Br., *Pleiospilos Roodiae* Schwant.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. Ceres Divis., bei Karroopoort. — D.K.G. (1919) 42 (*Mes. prism.*); G.C. (1926, II) 229; D.K.G. (1927/28) 23 (*Pl. Roodiae*), 182; Fl.Pl. VII. Pl. 269 (*Punct. Roodiae*); M.D.G.Ztg. (1928) 46.

Pleiospilos Purpusii Schwant. — *Mes. magnipunctatum* Schwant., *Punctillaria Purpusii* N.E.Br.). — Willowmoore Divis., nahe Miller — M.D.G.Ztg. (1928) 46; G.C. (1928, II) 493 (*Punct. Purp.*); G.C. (1929, I) 34 (*Punct. Purp.*).

Pleiospilos Roodiae Schwant. = **Pleiospilos prismaticus** Schwant.

Pleiospilos Rothii hort. × — (*Mes. Rothii* hort. ×). — Bastard: *Pleiospilos Bolusii* N.E.Br. × *Pleiospilos Purpusii* Schwant. — D.K.G. (1925/26) 160 (*Mes. Roth.*); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

Pleiospilos Rouxii L.Bol. — Victoria West Divis., 40 miles nordswestl. von Victoria West. — L.B. III. 37.

Pleiospilos sesquiuncialis (N.E.Br.) Schwant. — (*Punctillaria sesquiuncialis* N.E.Br.). — Prince Albert Divis., Hügel nahe Prince Albert. — G.C. (1928, II) 493 (*Punct. sesqu.*); D.K.G. (1930) 22.

Pleiospilos simulans (Marl.) N.E.Br. — (*Mes. simulans* Marl.). — Graaff Reinet Divis., östl. Karroo bei Klipplaat südl. von Graaff

Reinet; Aberdeen Divis., bei Aberdeen Road. — **Tr.R.S. XVIII. 43** (*Mes. simulans*); D.K.G. (1925/26) 156 (*Mes. simulans*); G.C. (1926, II) 89; S. (1928) 143; M. 278.

Pleiospilos sororius (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. sororium* N.E.Br., *Punctillaria sororia* N.E.Br.). — S.-Afr., wahrscheinlich Kl.-Karoo. — **N.E.Br.M. 72** (*Mes. sororius*); D.K.G. (1925/26) 164 (*Mes. sor.*); G.C. (1926, II) 213 (*Punct. sor.*); D.K.G. (1927/28) 23; L.B. I. 47 (*Punct. sor.*); S.G. (1928) 352 (*Punct. sor.*); M. 284 (*Punct. sor.*).

Pleiospilos tricolor N.E.Br. = **Pleiospilos Nelii** Schwant.

Pleiospilos willowmorensis L.Bol. — Willowmore Divis., bei Willowmore. — **L.B. II. 256.**

Polymita N.E.Br.

G.C. (1930, I) 72; v.P.M. 61; A. 218.

Polymita Pearsonii N.E.Br. — G.C. (1930, I) 72.

Prenia N.E.Br.

G.C. (1925, II) 412, 433; G.C. (1928, II) 268; v.P.M. 61; A. 218.

Prenia pallens (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. pallens* Ait., *Mes. lanceum* Thbg., *Mes. loratum* Haw., *Mes. expansum* D.C., *Platythyra pallens* L.Bol.). — Cape Divis., nahe Maitland, Pappendorp; Clanwilliam Divis. — L.B. I. 131 (*Platythyra pallens*); S.G. (1927) 326, 327 (*Platythyra pallens*); G.C. (1928, II) 268; S.G. (1929) 49.

Prenia relaxata (Willd.) N.E.Br. — (*Mes. relaxatum* Willd., *Platythyra relaxata* Schwant.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1928, II) 268; Gf. (1928) 68 (*Platythyra relax.*).

Prenia Sladeniana L.Bol. — (*Mes. Sladenianum* L.Bol., *Synaptophyllum Sladenianum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, bei Richtersveld. — G.C. (1928, II) 254 (*Synapt. Slad.*); S.G. (1929) 49.

Prepodesma N.E.Br.

G.C. (1930, II) 279; G.C. (1931, I) 389; v.P.M. 61; A. 218.

Prepodesma Orpenii N.E.Br. — (*Mes. Orpenii* N.E.Br., *Aloinopsis Orpenii* L.Bol.). — Griqualand West, nahe Campbell. — **G.C. (1921, II) 303** (*Mes. Orp.*); S.G. (1929) 288 (*Aloinopsis Orp.*); G.C. (1931, I) 389.

Prepodesma uncipectata N.E.Br. — Griqualand West, nahe Campbell. — **G.C. (1931, I) 389.**

Psammophora Dtr. et Schwant.

D.K.G. (1925/26) 188; D.K.G. (1927/28) 30, 106; v.P.M. 61; A. 221.

Psammophora Herrei L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Swartwater. — **L.B. II. 305.**

Psammophora longifolia L.Bol. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — L.B. II. 201.

Psammophora modesta (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. modestum* Dtr. et Bgr.). — Sw.-Afr., bei Lüderitzbucht. — D.K.G. (1925/26) 189; Fl.Pl. VII. Pl. 280.

Psammophora Nissenii (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Nissenii* Dtr.). — Gr.-Namaland, Rote Kuppe, Kovichberge, am Drachenberge (16 km östl. Pomona). — D.B.F. XIX. 123 (*Mes. Nissenii*); D.K.G. (1925/26) 189; M.D.G.Ztg. (1927) 63; D.K.G. (1927/28) 106; D.K.G.J. I. 26.

Psammophora Pillansii L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — Fl.Pl. VII. Pl. 280.

***Psilocaulon* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 433; M.Fl.Pl. I. 157; P.G.S.A.P. 247; G.C. (1928, II) 253; v.P.M. 62; A. 218.

Psilocaulon absimile (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. acutisepalum* Bgr., *Psiloc. acutisepalum* N.E.Br.). — G.C. (1928, II) 253.

Psiloc. acutisepalum N.E.Br. = ***Psiloc. absimile*** N.E.Br.

Psiloc. album L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — S.G. (1927) 264; G.C. (1928, II) 253.

Psiloc. annuum L.Bol. — Middelburg Divis., Grootfontein. — L.B. II. 29.

Psiloc. arenosum (Schinz) L.Bol. — (*Mes. arenosum* Schinz, *Mes. gymnocladum* Schl. et Diels, *Psilocaulon gymnocladum* Dtr. et Schwant., *Psiloc. arenosum* Schwant.). — Gr.-Namaland, Namib bei Angra Piquena, Aus. — F.R. VIII. 149 (*Mes. gymn.*); F.R. XIX. 188 (*Mes. aren.*); L.B. I. 134; Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 253; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Psiloc. arenosum Schwant. = ***Psiloc. arenosum*** L.Bol.

Psiloc. articulatum (Thbg.) N.E.Br. — (*Mes. articulatum* Thbg., *Mes. secundum* Thbg., *Psiloc. articulatum* Schwant.). — S.-Afr., — P.G.S.A.P. 248; Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 253; F.R. XLIII. 225.

Psiloc. articulatum Schwant. = ***Psiloc. articulatum*** N.E.Br.

Psiloc. asperulum N.E.Br. — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. bicornis Schwant. = ***Psiloc. tenue*** Schwant.

Psiloc. Bijliae N.E.Br. — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. Bryantii L.Bol. — Prieska Divis., sandige Flächen um Prieska. — L.B. II. 173.

Psiloc. caducum (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. caducum* Ait.). — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. calvinianum L.Bol. — S.-Afr., bei Calvinia. — L.B. II. 410.

Psiloc. clavulatum (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. clavulatum* Bgr.). — G.C. (1928, II) 254.

- Psiloc. corallinum* N.E.Br. = *Psiloc. corallinum* Schwant.
- Psiloc. corallinum* (Thbg.) Schwant. — (*Mes. corallinum* Thbg., *Psiloc. corallinum* N.E.Br.). — S.-Afr., Hügel nördl. von Oliphants River (Fluß), in der Karroo, Bockland etc. — B.M.P. 61 (*Mes. cor.*): Gf. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.
- Psiloc. coriarum* (Burch.) N.E.Br. = *Psiloc. stenopetalum* L.Bol.
- Psiloc. Dejagerae* L.Bol. — Beaufort West. — L.B. II. 236.
- Psiloc. delosepalum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Zout River (Fluß) und Nieuwerust. — L.B. II. 174.
- Psiloc. densum* N.E.Br. — G.C. (1928, II) 234.
- Psiloc. dimorphum* (Welw.) N.E.Br. — (*Mes. dimorphum* Welw.). — Trop. West-Afr., Angola, bei Mossamedes. — B.M.P. 60 (*Mes. dimorph.*); G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. Dinteri* N.E.Br. = *Psiloc. Dinteri* Schwant.
- Psiloc. Dinteri* (Engl.) Schwant. — (*Mes. Dinteri* Engl., *Mes. marinum* Bgr.). — F.R. XIX. 189 (*Mes. Dint.*); Gf. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.
- Psiloc. distinctum* N.E.Br. — Gr.-Namaland, Keiap Ranine, Gr.-Karasberg. — B.M.J. (1929) 60.
- Psiloc. diversipapillosum* (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. diversipapillosum* Bgr.). — G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. Duthiae* L.Bol. — Cradock Divis., bei Baroda. — L.B. II. 331.
- Psiloc. fasciculatum* N.E.Br. — G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. fimbriatum* L.Bol. — Sw.-Afr., nahe des Orange-Flusses, $\frac{3}{4}$ miles nördl. Sendlingsdrift. — A.B.H. IV. 105; G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. filipetalum* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Kamieskroon und Springbok. — L.B. II. 491.
- Psiloc. foliolosum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Abhänge nördl. Walle Kraal bei Hondeklip Bay. Wildepaarde Kraal zwischen Meselpaad und Walle Kraal. — L.B. II. 100, 142.
- Psiloc. Framesii* L.Bol. — Kl.-Karoo zwischen Touws-Fluß und Ladismith. — L.B. II. 190.
- Psiloc. Gessertianum* N.E.Br. = *Psiloc. Gessertianum* Schwant.
- Psiloc. Gessertianum* (Dtr. et Bgr.) Schwant. — (*Mes. Gessertianum* Dtr. et Bgr., *Psiloc. Gessertianum* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Sandverhaar. — F.R. XIX. 189 (*Mes. Gessert.*); Gf. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.
- Psiloc. glareosum* N.E.Br. = *Psiloc. glareosum* Dtr. et Schwant.
- Psiloc. glareosum* (Dtr. et Bgr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. glareosum* Dtr. et Bgr., *Psiloc. glareosum* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Aus. — F.R. XIX. 190 (*Mes. glareosum*); Gf. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 225.

Psiloc. Godmaniae L.Bol. — S.-Afr., zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwe Rust. — **L.B. II. 143.**

Psiloc. Godmaniae L.Bol. var. *gracile* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Zout River und Bitterfontein. — **L.B. II. 174.**

Psiloc. granulicaule N.E.Br. = ***Psiloc. granulicaule*** Schwant.

Psiloc. granulicaule (Haw.) Schwant. — (*Mes. granulicaule* Haw., *Psiloc. granulicaule* N.E.Br.). — S.-Afr., östl., Centr.- und westl. Karasberge, sandige Flächen zwischen Gründoorn und Nakeis auf karrooartigen Hügeln; Zwartkops River, Oliphants River, Gauritz River, Nieuweveld, Beaufort etc. — A.B.H. I. 18 (*Mes. granulic.*); B.M.P. 59 (*Mes. granulic.*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. gymnocladum Dtr. et Schwant. = ***Psiloc. arenosum*** L.Bol.

Psiloc. hirtellum L.Bol. — Malmesbury Divis., zwischen Malmesbury und Hopfield. — **L.B. II. 191.**

Psiloc. imitans L.Bol. — Piquetberg Divis., St. Helena Bay, Salzebenen, St. Helenafontein. — **L.B. II. 429.**

Psiloc. inconspicuum L.Bol. — Kl.-Namaland, beim Orange-Fluß — **L.B. II. 36.**

Psiloc. implexum N.E.Br. — Riversdale Divis., beim Kafirkuils-Fluß. — **B.M.J. (1929) 60.**

Psiloc. junceum N.E.Br. = ***Psiloc. junceum*** Schwant.

Psiloc. junceum (Haw.) Schwant. — (*Mes. junceum* Haw., *Psiloc. junceum* N.E.Br.). — S.-Afr., Karroo bei Beaufort West, Cogmannkloof bei De Aar. — B.M.P. 58 (*Mes. junceum*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. Kuntzei Dtr. et Schwant. = ***Psiloc. Schlichtianum*** Schwant.

Psiloc. laxiflorum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Nieuwe Rust. — **L.B. II. 157.**

Psiloc. Leightoniae L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein am Fuße des Witteberges. — **L.B. III. 14.**

Psiloc. leptarthron (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. leptarthron* Bgr.). — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. Lervynsiae N.E.Br. — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. Lewisiae L.Bol. — Swellendam Divis., bei Bonnievale. — **L.B. II. 492.**

Psiloc. Lindequistii N.E.Br. = ***Psiloc. Lindequistii*** Schwant.

Psiloc. Lindequistii (Engl.) Schwant. — (*Mes. Lindequistii* Engl., *Psiloc. Lindequistii* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Aus. — F.R. XIX. 190 (*Mes. Lindequ.*); Gfl. (1928) 69; F.R. XXXVI. 17; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. longipes L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Hondeklip Bay und Walle Kraal. — **L.B. II. 101.**

- Psiloc. luteum*** L.Bol. — Sw.-Afr., nahe Keetmanshop. — L.B. I. 141; G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. melanospermum*** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. melanospermum* Bgr.). — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. mentiens*** (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. mentiens* Bgr.). — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. micranthum*** L.Bol. = ***Psiloc. parviflorum*** Schwant.
- Psiloc. mucronulatum*** (Dtr.) N.E.Br. — (*Mes. mucronulatum* Dtr.). — Gr.-Namaland, Kl.-Karas, Warmbad. — D.N.Pfl. 42 (*Mes. mucr.*); G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. namaquense*** N.E.Br. = ***Psiloc. namaquense*** Schwant.
- Psiloc. namaquense*** (Sond.) Schwant. — (*Mes. simile* var. *namaquense* Sond., *Psiloc. namaquense* N.E.Br.). — Namaland. — B.M.P. 62 (*Mes. sim.* var. *namaqu.*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.
- Psiloc. Otzeanum*** (Dtr.) L.Bol. — (*Mes. Otzeanum* Dtr.). — Gr.-Namaland. Buntfeldschuh-Plateau. Rand des großen Vley's am Ostfuße des Zwartkoppes. — F.R. XIX. 152 (*Mes. Otzeanum*); L.B. II. 31.
- Psiloc. Pagae*** L.Bol. — Montagu Divis., Montagu Bath's. — A.B.H. IV. 106; G.C. (1928, II) 254.
- Psiloc. Pagae*** L.Bol. var. ***grandiflorum*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 30.
- Psiloc. parviflorum*** L.Bol. = ***Psiloc. parviflorum*** Schwant.
- Psiloc. parviflorum*** (Jacq.) Schwant. — (*Mes. parviflorum* Jacq., *Mes. micranthum* Haw., *Psiloc. parviflorum* L.Bol., *Psiloc. micranthum* L.Bol.). — S.-Afr., sandige Stelle bei Rietvalley, bei Genaden-thal. — B.M.P. 59 (*Mes. parvifl.*); Gfl. (1928) 69. L.B. I. 124; L.B. I. 132 (*Psiloc. micr.*); G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.
- Psiloc. pauciflorum*** (Sond.) Schwant. — (*Mes. junceum* Haw. var. *pauciflorum* Sond.). — S.-Afr. — B.M.P. 59 (*Mes. junc.* var. *paucifl.*); F.R. XLIII. 229.
- Psiloc. pauper*** L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — L.B. II. 191.
- Psiloc. Peersii*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Kliphoek und Komkans. — L.B. III. 99.
- Psiloc. Pfeilii*** N.E.Br. = ***Psiloc. Pfeilii*** Schwant.
- Psiloc. Pfeilii*** (Engl.) Schwant. — (*Mes. Pfeilii* Engl., *Psiloc. Pfeilii* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Koes Rietmond, Gabiser Pforte. — F.R. XIX. 191 (*Mes. Pfeilii*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.
- Psiloc. planum*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Orange-Fluß-Mündung. — L.B. II. 173.

Psiloc. pomeridianum L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Kakamas. — L.B. II. 29.

Psiloc. pubescens N.E.Br. — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. rapaceum L.Bol. = ***Psiloc. rapaceum*** Schwant.

Psiloc. rapaceum (Jacq.) Schwant. — (*Mes. rapaceum* Jacq., *Psiloc. rapaceum* L.Bol.). — S.-Afr. — B.M.P. 63 (*Mes. rapac.*); Gfl. (1928) 69; L.B. II. 143; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. Rogersiae L.Bol. — Cradock Divis. — L.B. II. 30.

Psiloc. roseoalbum L.Bol. — Griqualand-West zwischen Kimberley und Kenilworth. — L.B. II. 493.

Psiloc. salicornioides N.E.Br. = ***Psiloc. salicornioides*** Schwant.

Psiloc. salicornioides (Pax) Schwant. — (*Mes. salicornioides* Pax, *Psiloc. salicornioides* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Dünen an der Kuisib-Mündung bei Walfish Bay. — F.R. XIX. 192 (*Mes. salic.*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. Schlichtianum N.E.Br. = ***Psiloc. Schlichtianum*** Schwant.

Psiloc. Schlichtianum (Sond.) Schwant. — (*Mes. Schlichtianum* Sond., *Mes. Kuntzei* Schinz, *Psiloc. Schlichtianum* N.E.Br., *Psiloc. Kuntzei* Dtr. et Schwant.). — Sw.-Afr., Richthofen. — B.M.P. 62 (*Mes. Schlichtianum*); F.R. XIX. 190 (*Mes. Kuntzei*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. semilunatum L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. (?), zwischen Zout River (Fluß) und Bitterfontein (?). — L.B. II. 174.

Psiloc. simile N.E.Br. = ***Psiloc. simile*** Schwant.

Psiloc. simile (Sond.) Schwant. — (*Mes. simile* Sond., *Psiloc. simile* N.E.Br.). — S.-Afr., am Zwartkops River (Fluß). — B.M.P. 62 (*Mes. simile*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. squamifolium (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. clavellatum* [Haw.?] Bgr., *Mes. junceum* L.Bol.). — Australien. — B.M.P. 208 (*Mes. clav.*); G.C. (1928, II) 254. (N.E. Brown in G.C. [1928, II] 254 zitiert *M. clavellatum* Bgr., dieses ist offenbar ein Druckfehler, und muß heißen Haw.).

Psiloc. stenopetalum L.Bol. — (*Mes. coriarium* Burch., *Ruschia coriaria* [Burch.] Schwant., *Psilocaulon coriarium* [Burch.] N.E.Br.). — Prieska Divis., Philipstown nahe Petrusville. — B.M.P. 292 (*Mes. cor.*); N.E.Br.M. 127 (*Mes. cor.*); D.K.G. (1927/28) 20 (*Ruschia coriaria*); G.C. (1928, II) 254 (*Psiloc. coriaria*); L.B. II. 171, 172.

Psiloc. subintegrum L.Bol. — Malmesbury Divis., bei Hopefield. — L.B. II. 429.

Psiloc. subnodosum (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. subnodosum* Bgr.). — G.C. (1928, II) 254.

Psiloc. tenue N.E.Br. = ***Psiloc. tenue*** Schwant.

Psiloc. tenue (Haw.) Schwant. — (*Mes. tenue* Haw., *Mes. bicornis* Sond., *Psiloc. tenue* N.E.Br.). — S.-Afr. — Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. Trothai W.E.Br. = ***Psiloc. Trothai*** Schwant.

Psiloc. Trothai (Engl.) Schwant. — (*Mes. Trothai* Engl., *Psiloc. Trothai* N.E.Br.). — Trop.-Afr., auf der sandigen Sohle des Kan. — F.R. XIX. 236 (*Mes. Trothai*); Gfl. (1928) 69; G.C. (1928, II) 254; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.

Psiloc. uncinatum L.Bol. — Sw.-Afr., bei Aus. — L.B. II. 60.

Psiloc. utile L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Whitehill. — L.B. II. 157.

Psiloc. variabile L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Honderklip Bay. — L.B. II. 190.

Psiloc. Woodii L.Bol. — Sw.-Afr., Pforte. — L.B. II. 393.

***Punctillaria* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 433; G.C. (1926, II) 212; P.G.S.A.P. 243; M.D.G. Ztg. (1928) 166, 238, 400.

Punct. cana L.Bol. = ***Pleiospilos canus*** L.Bol.

Punct. compacta N.E.Br. = ***Pleiospilos nobilis*** Schwant.

Punct. Dekenahi N.E.Br. = ***Pleiospilos Dekenahi*** Schwant.

Punct. magnipunctata N.E.Br. = ***Pleiospilos magnipunctatus*** Schwant.

Punct. magnipunctata N.E.Br. var. ***sesquiuncialis*** L.Bol. = ***Pleiospilos magnipunctatus*** Schwant. var. ***sesquiuncinalis*** L.Bol.

Punct. nobilis N.E.Br. = ***Pleiospilos nobilis*** Schwant.

Punct. Roodiae N.E.Br. = ***Pleiospilos prismaticus*** Schwant.

Punct. sesquiuncialis N.E.Br. = ***Pleiospilos sesquiuncinalis*** Schwant.

Punct. sororia N.E.Br. = ***Pleiospilos sororius*** Schwant.

***Rabiea* N.E.Br.**

G.C. (1930, II) 279; G.C. (1931, I) 53; v.P.M. 63; A. 218.

Rabiea albinota (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. albinotum* Haw., *Aloinopsis albinota* Schwant., *Nananthus albinota* L.Bol., *Nananthus Comptonii* L.Bol.). — Orange Free State, Bloemfontein, nahe Harismith, nahe Fauresmith. — B.M.P. 261 (*Mes. alb.*); D.K.G. (1925/26) 178 (*Aloinopsis alb.*); S.G. (1927) 399 (*Nananthus alb.*); S.G. (1928) 127 (*Nan. alb.*); L.B. I. 97 (*Nan. alb.*); L.B. II. 120 (*Nan. Compt.*); G.C. (1931, I) 53.

Rabiea albipuncta (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. albipunctum* Haw., *Aloinopsis albipuncta* Schwant., *Nananthus albipunctus* Schwant., *Nananthus albipunctus* N.E.Br.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — B.M.P. 261 (*Mes. albipunct.*); D.K.G. (1925/26) 178

(*Aloinopsis albipunct.*); Gfl. (1928) 68 (*Nan. albipunct.*); G.C. (1931. I) 54.

Rabiea caroliniensis N.E.Br. = *Khadia caroliniensis* L.Bol.

Rabiea cibdela (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. aloides* S.D., *Mes. albipunctum* var. *major* Haw., *Mes. cibdelum* N.E.Br., *Aloinopsis cibdela* Schwant., *Nananthus cibdelus* Schwant.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 64 (*Mes. cibd.*); D.K.G. (1925/26) 178 (*Aloinopsis cibd.*); Gfl. (1928) 68 (*Nananthus cibd.*); G.C. (1931, I) 54.

Rabiea Lesliei N.E.Br. — Orange Free State, auf Hügeln zwischen Westminster und Clocolan. — G.C. (1931. I) 54.

Rabiea tersa N.E.Br. — Griqualand-West. nahe Kuruman. — G.C. (1931. I) 53.

Rhinephyllum N.E.Br.

G.C. (1927, II) 92; S.G. (1928) 370; v.P.M. 63: L.B. III. 40; A. 218.

Rhinephyllum Broomii L.Bol. — Fraserburg Divis., Fraserburg Road (Weg). — L.B. III. 15.

Rhinephyllum Comptonii L.Bol. — S.G. (1928) 370, 371.

Rhinephyllum inaequale L.Bol. — Graaff Reinet Divis., bei Kendrew. — L.B. II. 430.

Rhinephyllum inaequale L.Bol. var. *latipetalum* L.Bol. — S.-Afr., am Wege nach Graaff Reinet, 29 miles nördl. Jansenville. — L.B. III. 39.

Rhinephyllum Muiri N.E.Br. — Kl.-Karoo in Swellendam Divis., Kl.-Karoo. Quartz-Felder im Bokkeveld. — G.C. (1927, II) 92; M. 286.

Rhinephyllum obliquum L.Bol. — Fraserburg Divis., bei Lutting. — L.B. III. 59.

Rhinephyllum parvifolium L.Bol. — Jansenville Divis., zwischen Kendrew und Klipplaat. — L.B. II. 377.

Rhinephyllum Pillansii N.E.Br. = *Neorhine Pillansii* Schwant.

Rhinephyllum Rouxii L.Bol. — (*Chasmatophyllum Rouxii* L.Bol.). — Victoria West Divis., auf einer Kuppe auf der Farm Pompoenpoort halbwegs zwischen Cornavon und Victoria West. — L.B. III. 5 (*Chasm. Rouxii*); L.B. III. 40.

Rhinephyllum Schonlandii L.Bol. — Fraserburg Divis., bei Fraserburg Road (Weg). — L.B. III. 15.

(?) *Rhinephyllum willowmoreense* L.Bol. — S.-Afr., bei Willowmore. — L.B. II. 348 = *Chasmatophyllum willowmoreense* L.Bol.?

Rhombophyllum Schwant.

D.K.G. (1925/26) 180; D.K.G. (1927/28) 16, 23, 106; v.P.M. 64; A. 221.

Rhombophyllum dolabrifforme (L.) Schwant. — (*Mes. dolabrifforme* L., *Hereroa dolabrifformis* L.Bol.). — S.-Afr., Ost-Karoo,

Schorsteenberg. — B.M.P. 213 (*Mes. dolabr.*); Gfl. (1928) 87; L.B. I. 143 (*Hereroa dolabr.*).

Rhomb. Nelii Schwant. — Graff Reinet Divis. — Gfl. (1928) 85.

Rhomb. rhomboideum (S.D.) Schwant. — (*Mes. rhomboideum* S.D., *Bergeranthus rhomboideus* Schwant.). — S.-Afr., Felder am Zwartkops-Fluß. Coega und Zondagsriver, östl. Kap-Prov. — B.M.P. 247 (*Mes. rhomb.*); D.K.G. (1925/26) 180 (*Berg. rhomb.*); D.K.G. (1927/28) 23, 106.

***Rhopalocyclus* Schwant.**

Gw. (1928) 599; v.P.M. 64; A. 221.

Rhopalocyclus Herrei Schwant. — Robertson Divis. — Gw. (1928) 599.

Rhopalocyclus Nelii Schwant. — Robertson Divis. — Gw. (1928) 599.

Rhopalocyclus Weigangianus Dtr. et Schwant. = ***Leipoldtia Weigangiana*** Dtr. et Schwant.

***Rimaria* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 413; G.C. (1926, I) 134; D.K.G. (1927/28) 226; S. (1930) 22; v.P.M. 64; L.B. II. 68; A. 218.

Rimaria augusta L.Bol. — Kl.-Namaland, Bushmanland. — L.B. III. 66, 67.

Rimaria Comptonii L.Bol. = ***Gibbaeum Comptonii*** L.Bol.

Rimaria Comptonii L.Bol. forma L.Bol. — Laingsburg Divis., zwischen Laingsburg und Southerland, 3 miles nördl. Laingsburg. — L.B. II. 411. Diese Form dürfte ebenfalls in ***Gibbaeum*** umzubenennen sein.

Rimaria divergens L.Bol. — Bushmanland-Nieuwefontein, am Wege nach Calvinia. — L.B. III. 66, 67.

Rimaria dubia N.E.Br. — (*Mes. fissum* N.E.Br., non Haw.!). — G.C. (1926, I) 155; D.K.G. (1927/28) 226; S. (1930) 27.

Rimaria Heathii N.E.Br. = ***Gibbaeum Heathii*** L.Bol.

Rimaria Heathii L.Bol. var. *elevata* L.Bol. = ***Gibbaeum Heathii*** L.Bol. var. *elevata* L.Bol.

Rimaria Heathii L.Bol. var. *major* L.Bol. = ***Gibbaeum Heathii*** L.Bol. var. *major* L.Bol.

Rimaria Luckhoffii L.Bol. = ***Gibbaeum Luckhoffii*** L.Bol.

Rimaria microsperma N.E.Br. = ***Dinteranthus microspermus*** Schwant.

Rimaria Pole-Evansii N.E.Br. = ***Dinteranthus Pole-Evansii*** Schwant.

Rimaria Primosii L.Bol. — Bushmanland, zwischen Farm Gamoeep und Dabeep. — L.B. II. 411; L.B. III. 66.

Rimaria Roodiae N.E.Br. — Kl.-Namaland, Bushmanland. — G.C. (1926, I) 156; D.K.G. (1927/28) 226; S. (1930) 42; M. 290; L.B. III. 66.

Roodia N.E.Br.

G.C. (1925, II) 433; D.K.G. (1927/28) 348; P.G.S.A.P.243: v.P.M. 65; A.218.

Roodia brevipes L.Bol. = *Arguroderma brevipes* L.Bol.

Roodia digitifolia N.E.Br. = *Argyroderma brevipes* L.Bol.

Ruschia Schwant.

D.K.G. (1925/26) 186; D.K.G. (1927/28) 14, 18, 105; v.P.M. 65.

Ruschia abbreviata L.Bol. — Kl.-Namaland, Hels Kloof. — L.B. II. 493.

Ruschia acuminata L.Bol. — (*Mes. exacutum* N.E.Br.). — Prince Albert Divis. — L.B. II. 20; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. exac.*).

Ruschia acutangula (Haw.) Schwant. — (*Mes. acutangulum* Haw., *Mes. vaginatum* Haw. var. *acutangulum* Bgr.). — S.-Afr. — B.M.P. 111 (*Mes. vag.* var. *acutangulum*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 43.

Ruschia addita L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Steinkopf, Richtersveld bei Karrachab. — L.B. III. 284.

Ruschia alata L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 350.

Ruschia albiflora L.Bol. — Kl.-Namaland, Kopperburg. — J.B. (1928) 12.

Ruschia alborubra L.Bol. — Kl.-Namaland, Kommaggas. — L.B. II. 494.

Ruschia amicora (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. amicorum* L.Bol.). — Montagu Divis., nahe Montagu. — A.B.H. III. 127 (*Mes. amic.*); D.K.G. (1927/28) 20.

Ruschia amoena Schwant. — Kl.-Namaland, 25 miles östl. Port Nolloth, südl. der Bahnlinie. — D.K.G. (1930) 66.

Ruschia amplata L.Bol. in L.B. I. 145 ist Druckfehler und muß heißen *Ruschia ampliata* L.Bol.

Ruschia ampliata L.Bol. — (*Mes. ampliatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Hondeklip Bay. — L.B. I. 145; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. ampl.*).

Ruschia androsacea Marl. et Schwant. — (*Mes. androsaceum* N.E.Br.). — S.-Afr., bei Sutherland. — D.K.G. (1927/28) 299; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. andr.*); D.K.G. (1930) 68.

Ruschia approximata (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. approximatum* L.Bol.). — Montagu Divis., nahe Montagu Bath's. — A.B.H. IV. 37 (*Mes. appr.*); D.K.G. (1925/26) 187.

Ruschia Archeri L.Bol. — Karroo Reg., nahe Ladismith. — A.B.H. IV. 127.

Ruschia arenosa L.Bol. — Calvinia Divis., Oorlog's Kloof bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 411.

Ruschia aristata L.Bol. — Uitenhage Divis., Kamachs. — **L.B. II. 369.**

Ruschia aristulata (Sond.) Schwant. — (*Mes. aristulatum* Sond.). — S.-Afr., auf steinigten Stellen der Lionmountains. — **B.M.P. 169** (*Mes. aristul.*); **D.K.G. (1927/28) 19.**

Ruschia armata L.Bol. — (*Mes. armatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Oograbis. — **L.B. I. 145**; **G.C. (1930, I) 32** (*Mes. arm.*).

Ruschia atrata L.Bol. — (*Mes. atratum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlingsdrift. — **L.B. I. 144**; **G.C. (1930, I) 32** (*Mes. atratum*).

Ruschia Arthelmiana (Dtr.) Schwant. — (*Mes. Arthelmianum* Dtr.). — Gr.-Namaland, Auasgebirge, Farm Lichtenstein. — **D.B.F. XIX. 129** (*Mes. Arth.*); **D.K.G. (1925/26) 187.**

Ruschia Barnardii L.Bol. — (*Mes. Barnardii* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Vaalkoek, Kl.-Karas. — **L.B. II. 19**; **G.C. (1930, I) 32** (*Mes. Barnardii*).

Ruschia beaufortensis L.Bol. — Berge bei Beaufort West. — **L.B. II. 430.**

Ruschia bicolorata L.Bol. — (*Mes. bicoloratum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland bei Hondeklip Bay. — **L.B. II. 101**; **G.C. (1930, I) 32** (*Mes. bicolor.*).

Ruschia biformis (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. biforme* N.E.Br.). — S.-Afr., Swellendam Divis., nahe Barrydale. — **B.M.J. (1929) 58** (*Mes. biforme*); **F.R. XLIII. 230**; **D.K.G. (1938) 42.**

Ruschia Bijliae L.Bol. — (*Mes. Bijliae* N.E.Br.). — Prince Albert Divis. — **L.B. II. 20**; **G.C. (1930, I) 32** (*Mes. Bijliae*).

Ruschia bina L.Bol. — Clanwilliam Divis., bei Doorn River Bridge. (Doorn-Fluß-Brücke). — **L.B. II. 282.**

Ruschia bipapillata L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Klaver. — **L.B. II. 412.**

Ruschia Bolusiae (L.Bol.) Schwant. — (*Ruschia rigida* L.Bol., *Mes. albicutum* N.E.Br.). — Calvinia Divis. — **L.B. II. 108** (*Ruschia rigida*); **G.C. (1930, I) 32** (*Mes. albic.*); **F.R. XLIII. 228**; **D.K.G. (1938) 41.**

Ruschia bracteata L.Bol. — Kl.-Namaland. — **L.B. II. 93.**

Ruschia breckportensis L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Breckpoort bei Steinkopf. — **L.B. II. 284.**

Ruschia brevibracteata L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Walle Kraal. — **L.B. II. 144.**

Ruschia brevicollis (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. brevicolle* N.E.Br.). — Ladismith Divis., Kl.-Karoo. — **B.M.J. (1929) 58** (*Mes. brevic.*); **F.R. XLIII. 230**; **D.K.G. (1938) 42.**

- Ruschia brevicyma* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 370.
- Ruschia brevipes* L.Bol. — (*Mes. firmum* N.E.Br.). — Prince Albert Divis. — L.B. II. 74; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. firm.*).
- Ruschia brevipes* L.Bol. var. *gracilis* L.Bol. — Prince Albert Divis. — L.B. II. 74.
- Ruschia Britteniae* L.Bol. — (*Mes. iteratum* N.E.Br.). — Albany Divis., bei Grahamstown längs des Cradock-Weges. — L.B. II. 45; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. iteratum*).
- Ruschia Burtoniae* L.Bol. — Clavinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 279.
- Ruschia calcarea* L.Bol. — Hopetown Divis., bei Hopetown. — L.B. II. 495.
- Ruschia callifera* L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — L.B. II. 335.
- Ruschia calycina* L.Bol. — (*Mes. separatum* N.E.Br.). — Riversdale Divis.?, Karree Vlakte. — L.B. II. 47; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. separatum*).
- Ruschia campestris* (Burch.) Schwant. — (*Mes. campestre* Burch.). — Sutherland Divis., nahe Sutherland. — N.E.Br.M. 126 (*Mes. campestris*); D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia canonotata* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. canonotatum* L.Bol.). — Kalahari Reg., Griqualand-West, Kimberley Divis. — A.B.H. IV. 40 (*Mes. canon.*); D.K.G. (1927/28) 187.
- Ruschia Caroli* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Caroli* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., nahe Clanwilliam, Robertson; Montagu Baths. — A.B.H. III. 129 (*Mes. Caroli*); D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia cedarbergensis* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Cedarbergen. — L.B. II. 496.
- Ruschia ceresiana* (L.Bol.) Schwant. — (*Ruschia congesta* L.Bol.). — Ceres Divis., Ceres Karroo. — L.B. III. 59 (*Ruschia congesta* L.Bol.); F.R. XLIII. 229; D.K.G. (1938) 42.
- Ruschia clarata* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 158.
- Ruschia cleista* L.Bol. — (*Mes. cleistum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Holgat und Dun Vlei. — L.B. II. 102; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. cleistum*).
- Ruschia compacta* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Walle Kraal. — L.B. II. 144.
- Ruschia complanata* L.Bol. — Cradock Divis., Berge Zwagershoek. — L.B. II. 376.
- Ruschia Comptonii* L.Bol. — (*Mes. roseatum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. II. 8; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. rosat.*).
- Ruschia concava* L.Bol. — (*Mes. ciliatum* N.E.Br.). — Ceres Divis. — L.B. II. 124; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. conc.*).

- Ruschia concinna*** L.Bol. — (*Mes. comptum* N.E.Br.). — Malmesbury Divis., Oudepost, zwischen Malmesbury und Hopefield. — L.B. II. 123; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. conc.*).
- Ruschia condensa*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. condensum* N.E.Br.). — Montagu Divis., Kl.-Karoo. — B.M.J. (1929) 38 (*Mes. cond.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Ruschia congesta*** (S.D.) L.Bol. — (*Mes. congestum* S.D.). — Uitenhage Divis., am Kap Recife, Bethelsdorp, etc.; Albany Divis. — B.M.P. 183 (*Mes. cong.*); S.G. (1927) 239; L.B. I. 72.
- Ruschia congesta* L.Bol. = ***Ruschia ceresiana*** Schwant.
- Ruschia conjuncta*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Rietkloof. — L.B. II. 239.
- Ruschia connata*** L.Bol. — (*Mes. connatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — L.B. I. 139; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. connatum*).
- Ruschia constricta*** L.Bol. — Bredasdorp. — L.B. II. 496.
- Ruschia coriaria* Schwant. = ***Psilocaulon stenopetalum*** L.Bol.
- Ruschia costata*** L.Bol. — Montagu Divis., bei Montagu. — L.B. III. 60.
- Ruschia crassa*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. crassum* L.Bol.). — Karroo Reg., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 38 (*Mes. crassum*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia crassisejala*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Div., zwischen Nieuwerust und Bitterfontein. — L.B. II. 334.
- Ruschia crassuloides*** L.Bol. — (*Mes. crassulifolium* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, „coast-belt“ zwischen Port Nolloth und Holgat. — L.B. II. 102; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. crassulifol.*).
- Ruschia cupulata*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. cupulatum* L.Bol.). — D.K.G. (1927/28) 106.
- Ruschia curta*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. curtum* Haw., *Mes. vaginatum* Haw. var. *curtum* Bgr.). — S.-Afr. — B.M.P. 111 (*Mes. vag. var. curtum*); F.R. XI.III. 230; D.K.G. (1938) 43.
- Ruschia cyathiformis*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. II. 240.
- Ruschia cymbifolia*** (Haw.) L.Bol. — (*Mes. cymbifolium* Haw., *Mes. deceptum* N.E.Br.). — Riversdale Divis.; Hügel bei Onverwacht nahe Albertina. — B.M.P. 184 (*Mes. cymbifol.*); Fl.Pl. VII. Pl. 277; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. decept.*).
- Ruschia cymosa*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. cymosum* L.Bol.). — Montagu Divis., Montagu Baths; Oudtshoorn Divis., „The Brook“ nahe Oudtshoorn. — A.B.H. III. 170 (*Mes. cymosa*); D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia dasyphylla*** (Schltr.) Schwant. — (*Mes. dasyphyllum* Schltr.). — B.M.P. 171 (*Mes. dasyp.*); D.K.G. (1927/28) 20.

- Ruschia decumbens* L.Bol. — (*Mes. deflectum* N.E.Br.). — Karroo Reg., Ladismith Divis. — **A.B.H. IV. 126**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. deflect.*).
- Ruschia decurrens* L.Bol. — (*Mes. decurrens* N.E.Br.). — S.-Afr., zwischen Van Rhynsdorp und Clanwilliam. — **L.B. II. 78**; (1930, I) 32 (*Mes. decurrens*).
- Ruschia decurrans* L.Bol. — S.-Afr., zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp, genauer Standort unbekannt. — **L.B. II. 211**.
- Ruschia Dejagerae* L.Bol. — (*Mes. Dejagerae* N.E.Br.). — S.-Afr., nahe Beaufort West. — **L.B. I. 139**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Dejag.*).
- Ruschia Dekenahi* (N.E.Br.) Schwant. (*Mes. Dekenahi* N.E.Br.). — Fraserburg Divis., Fraserburg Karroo. — **B.M.J. (1929) 58** (*Mes. Dekenahi*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Ruschia depressa* L.Bol. — S.-Afr., genauer Standort unbekannt, wahrscheinlich Uitenhage Divis. — **L.B. II. 336**.
- Ruschia dichotoma* L.Bol. — Kl.-Namaland, Nutabooi, Buffels-Fluß. — **L.B. II. 350**.
- Ruschia dichroa* (Rolfe) L.Bol. — (*Mes. dichroum* Rolfe, *Cylindrophyllum dichroum* Schwant.). — S.-Afr. — **B.Mag. 146. Tab. 8872** (*Mes. dichr.*); D.K.G. (1927/28) 28 (*Cylindr. dichr.*); **L.B. II. 103**.
- Ruschia dichroa* (Rolfe) L.Bol. var. *alba* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Nicuwoudtsville. — **L.B. II. 103**.
- Ruschia dilatata* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Zout-Fluß. — **L.B. II. 240**.
- Ruschia disarticulata* L.Bol. — Calvinia Divis., 8 miles zwischen Nieuwoudtsville und Calvinia. — **L.B. II. 286**.
- Ruschia diutina* L.Bol. — Kl.-Namaland, Hügel etwa 6 miles südöstl. Viol's Drift, Orange-Fluß. — **L.B. II. 356**.
- Ruschia divaricata* L.Bol. — Kenhardt Divis., 20 miles südwestl. Kakamas. — **L.B. II. 202**.
- Ruschia diversifolia* L.Bol. — (*Mes. variifolium* N.E.Br.). — Worcester Divis., Ebenen südl. Breede-River Bridge (Flußbrücke). — **L.B. II. 103**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. variifol.*).
- Ruschia dolomitica* (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. dolomiticum* Dtr., *Corpuscularia dolomitica* Schwant.). — Gr.-Namaland, zwischen Pomona und Pumpstation Alicetal. — **D.B.F. XIX. 150** (*Mes. dolomit.*); D.K.G. (1925/26) 186 (*Corp. dolom.*); D.K.G. (1927/28) 36; Gw. (1929) 69; D.K.G. (1930) 68.
- Ruschia dualis* L.Bol. = *Antimima dualis* N.E.Br.
- Ruschia Duplessiae* L.Bol. — S.-Afr., bei Oudtshoorn. — **L.B. II. 431**.
- Ruschia Dyeri* L.Bol. — (*Mes. Dyeri* N.E.Br.). — Albany Divis., 15 miles von Grahamstown am Kingwilliamstown-Weg. — **J.B. (1928) 230**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Dyeri*).

- Ruschia elevata* L.Bol. — Kl.-Namaland, 100 miles nördl. von Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 305.**
- Ruschia elineata* L.Bol. — (*Mes. elineatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Copperburg. — **L.B. II. 105**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. elin.*).
- Ruschia erecta* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. erectum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, steinige Hügel nordseits Ookiep. — **A.B.H. IV. 80** (*Mes. erectum*); D.K.G. (1927/28) 105.
- Ruschia evoluta* L.Bol. — (*Mes. evolutum* N.E.Br.). — Vermutlich Klein-Namaland. — S.G. (1928) 178; M. 260; D.K.G. (1930) 68.
- Ruschia exurgens* L.Bol. — Calvinia Divis., 8 miles zwischen Nieuwoudtsville und Calvinia. — **L.B. II. 280.**
- Ruschia extensa* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Oograbis. — **L.B. II. 202.**
- Ruschia fenestrata* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 20 miles nördl. Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 281.**
- Ruschia Fergusoniae* L.Bol. — (*Mes. Fergusoniae* N.E.Br.). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — **L.B. II. 7**; S.G. (1928) 279; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Ferg.*).
- Ruschia ferox* L.Bol. — Cradock Divis., bei Halesowen. — **L.B. II. 371.**
- Ruschia festiva* (Sond.) Schwant. — (*Mes. tumidulum* Sond., *Mes. festivum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., Driefontein. — **N.E.Br.M. 122** (*Mes. festiv.*); D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia filamentosa* (L.) L.Bol. — (*Mes. filamentosum* L.). — S.-Afr. — **B.M.P. 199** (*Mes. filament.*); **L.B. I. 124.**
- Ruschia filipetata* L.Bol. — (*Mes. filipetalum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis., Zeekoe Vlei. — **L.B. II. 94**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. filipet.*).
- Ruschia firma* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp — **L.B. II. 213.**
- Ruschia floribunda* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Hügel bei Klaver. — **L.B. II. 497.**
- Ruschia foliolosa* Schwant. = *Ruschia tumidula* Schwant.
- Ruschia forficata* (L.) L.Bol. — (*Mes. forficatum* L., *Mes. purpureostylus* L.Bol., *Mes. filamentosum* var. *anceps* D.C., *Erepsia forficata* Schwant., *Erepsia purpureostylus* L.Bol.). — Swellendam Divis., Bonny Vale. — **A.B.H. III. 6** (*Mes. purpureostylus*); Gfl. (1928) 68 (*Ereps. forfic.*); **L.B. II. 79.**
- Ruschia Fourcadei* L.Bol. — (*Mes. Fourcadei* N.E.Br.). — Uniondale Divis., bei Toverwater, Toverwater Poort. — **L.B. II. 46**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Fourc.*).
- Ruschia Framesii* L.Bol. — (*Mes. Framesii* N.E.Br.). — Jansenville Divis., einige Meilen südl. Jansenville. — **J.B. (1928) 231**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Framesii*).

- Ruschia fugitans* L.Bol. — Kl.-Namaland bei Bitterfontein. — **L.B. III. 60.**
- Ruschia Fulleri* L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Pella. — **L.B. II. 159.**
- Ruschia gemina* L.Bol. — (*Mes. geminum* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., bei Laingsburg, Rooihogte, zwischen Ladismith und Laingsburg. — **L.B. II. 105**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. geminum*).
- Ruschia gibbosa* L.Bol. — Kl.-Namaland, Alexander Bay. — **L.B. II. 285.**
- Ruschia glauca* L.Bol. — (*Mes. valens* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlingsdrift. — **L.B. II. 121**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. valens*).
- Ruschia globularis* L.Bol. — Standort unbekannt, wahrscheinlich Prince Albert — Oudtshoorn Divis., Meiring's Poort, Swartbergen. — **L.B. II. 413.**
- Ruschia Goodiae* L.Bol. — (*Mes. Goodiae* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Sand Veld zwischen Ookiep und dem Meer. — **L.B. II. 78**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Goodiae*).
- Ruschia gracillima* L.Bol. — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — **L.B. II. 203.**
- Ruschia gracilis* L.Bol. — (*Mes. exile* N.E.Br.). — Riversdale Divis., Rietvlei; Melkhoutfontein, Gauritz-Fluß, bei Riversdale. — **L.B. II. 62**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. exile*).
- Ruschia gravida* L.Bol. — Kl.-Namaland. Meselpaad, zwischen Springbok und Walle Kraal. — **L.B. II. 145.**
- Ruschia griquensis* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. griquense* L.Bol.). — Kalahari Reg., Kimberley Divis. — **A.B.H. IV. 39** (*Mes. griquense*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia grisea* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. griseum* L.Bol.). — S.-Afr., wahrscheinlich Montagu Divis. — **A.B.H. IV. 39** (*Mes. griseum*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia hamata* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. hamatum* L.Bol.). — Kalahari Reg., nahe Kimberley, Wimbledon Berge; zwischen Kuruman und Vaal. — **A.B.H. II. 29** (*Mes. hamatum*); M.Fl.Pl. I. 161 (*Mes. ham.*); Fl.Pl.VII. Pl. 251 (*Mes. hamatum*); D.K.G. (1927/28) 19.
- Ruschia hamatilis* L.Bol. — (*Mes. hamatile* N.E.Br.). — Worcester Divis., karroide Ebenen bei Worcester. — **L.B. II. 106**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. hamatile*).
- Ruschia Herrei* Schwant. — (*Mes. Herrei* N.E.Br.). — Ceres Divis. — **D.K.G. (1927/28) 301**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Herrei*).
- Ruschia hexamera* L.Bol. — (*Mes. hexamerum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Hügel nahe Brakfontein. — **L.B. I. 144**; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. hexamerum*).
- Ruschia hexamera* L.Bol. var. *longipetala* L.Bol. — Kl.-Namaland, Port Nolloth. — **L.B. II. 237.**

- Ruschia Hollowayana* L.Bol. — Sw.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. III. 103.**
- Ruschia horrescens* L.Bol. — Swellendam Divis., Kl.-Karoo. — **L.B. II. 204.**
- Ruschia horrescens* L.Bol. var. *densa* L.Bol. — **L.B. II. 204.**
- Ruschia horrida* L.Bol. — Albany Divis., karroide Flächen, 22–24 miles von Grahamstown. — **L.B. II. 204.**
- Ruschia Hutchinsonii* L.Bol. — (*Mes. Hutchinsonii* N.E.Br.). — Malmesbury Divis., bei Saldanha Bay. — **L.B. II. 23;** G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Hutch.*).
- Ruschia imbricata* (Haw.) Schwant. — (*Mes. imbricatum* Haw.). — D.K.G. (1927/28) 19.
- Ruschia impressa* L.Bol. — Kl.-Karoo. zwischen Barrydale und Ladismith. — **L.B. II. 159.**
- Ruschia inclusa* L.Bol. — (*Mes. amplexum* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — **L.B. II. 44;** G.C. (1930, I) 32 (*Mes. amplexum*).
- Ruschia inconspicua* L.Bol. — (*Mes. latens* N.E.Br.). — Kl.-Nama-land, zwischen Arris Drift und Sendlingsdrift. — **J.B. (1928) 232;** G.C. (1930, I) 32 (*Mes. latens*).
- Ruschia incumbens* L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Klaver und Clanwilliam. — **L.B. II. 212.**
- Ruschia incurvata* L.Bol. — (*Mes. incurvatum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis., bei Graafwater. — **L.B. II. 124;** G.C. (1930, I) 32 (*Mes. incurv.*).
- Ruschia indecora* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. indecorum* L.Bol.). — Cape Divis., an der Wegseite Cape Town und Melkbosch Strand. — **A.B.H. IV. 91** (*Mes. indecorum*); D.K.G. (1927/28) 106.
- Ruschia indurata* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. induratum* L.Bol.). — Cape Prov., Karroo Reg., Steyterville. — **A.B.H. III. 135** (*Mes. induratum*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia insidens* L.Bol. — (*Mes. insidens* N.E.Br.). — Calvinia Divis., Nieuwoudtsville. — **L.B. II. 77;** G.C. (1930, I) 32 (*Mes. insid.*).
- Ruschia integra* Schwant. = *Smicrostigma viride* N.E.Br.
- Ruschia intervallis* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 91.**
- Ruschia Ivori* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. Ivori* N.E.Br.). — Fraserburg Divis., Karroo nahe Fraserburg. — **B.M.J. (1929) 58** (*Mes. Ivori*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Ruschia kakamasensis* L.Bol. — Bushmanland. Lurthberg bis Kakamas. — **L.B. III. 15.**
- Ruschia karrachabensis* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Karrachab. — **L.B. II. 287.**

- Ruschia karrooica*** L.Bol. — (*Mes. karrooicum* L.Bol.). — Karroo Reg., trockene Plätze nahe Matjesfontein. — A.B.H. IV. 9 (*Mes. karrooicum*); S.G. (1927) 239; L.B. 72.
- Ruschia karroidea*** L.Bol. — Laingsburg Divis., Dassie Kloof bei Matjesfontein. — L.B. II. 306.
- Ruschia kenhardtensis*** L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Kenhardt. — L.B. II. 498.
- Ruschia knysnana*** L.Bol. — (*Mes. knysnanum* L.Bol.). — Cape Prov., Knysna Divis., nahe Knysna. — A.B.H. IV. 97 (*Mes. knysnanum*); L.B. I. 146.
- Ruschia knysnana*** L.Bol. var. *angustifolia* L.Bol. — S.-Afr., nahe Humansdorp. — L.B. I. 146.
- Ruschia langbaanensis*** L.Bol. — Malmesbury Divis., Saldanha Bay. Langebaan. — L.B. II. 372.
- Ruschia Larisii*** L.Bol. — Stellenbosch Divis., Gordon's Bay. — L.B. II. 205.
- Ruschia laxiflora*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — L.B. II. 237.
- Ruschia laxipetala*** L.Bol. — (*Mes. laxipetalum* N.E.Br.). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — L.B. II. 44; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. laxipet.*).
- Ruschia Leightoniae*** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Kromme River (Fluß), Cedarbergen. — L.B. II. 499.
- Ruschia Leipoldtii*** L.Bol. — (*Mes. Leipoldtii* N.E.Br.). — Worcester Divis., zwischen Robertson und Worcester. — L.B. II. 61; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Leipoldtii*).
- Ruschia leptocalyx*** L.Bol. — Riversdale Divis., Melkfontein bei Still Bay. — L.B. II. 306.
- Ruschia leptophylla*** L.Bol. — Caledon Divis., bei Hermanus zwischen Mossel-Fluß und Riviera-Hotel. — L.B. II. 333.
- Ruschia leucanthera*** L.Bol. — (*Mes. leucantherum* L.Bol.). — A.B.H. IV. 7 (*Mes. leuc.*); L.B. I. 72.
- Ruschia leucosperma*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Bitterfontein und Springbok. — L.B. II. 160.
- Ruschia limbata*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. limbatum* N.E.Br.). — S.-Afr., Saldanha Bay. — B.M.J. (1929) 59 (*Mes. limbatum*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Ruschia lineolata*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. lineolatum* Haw.). — Caledon Divis. — B.M.P. 171 (*Mes. lineolatum*); D.K.G. (1927/28) 20; D.K.G. (1930) 68.
- Ruschia Laganii*** L.Bol. — Laingsburg Divis., Kl.-Roggeveld. — L.B. III. 61.
- Ruschia longifolia*** L.Bol. — Ladismith Divis., Huisriversberg-Paß zwischen Calitzdorp und Ladismith. — L.B. II. 500; K.Kd. (1937) 143.

- Ruschia longipes* L.Bol. — (*Mes. longipes* N.E.Br.). — Kl.-Nama-land, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — S.G. (1927) 239; L.B. I. 72, 129; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. longipes*).
- Ruschia Luckhoffii* L.Bol. — Ceres Divis., Ceres Karroo. — L.B. II. 283.
- Ruschia lutea* L.Bol. — (*Mes. flavens* N.E.Br.). — Prince Albert Divis. — L.B. I. 138; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. flavens*).
- Ruschia macrophylla* L.Bol. — Robertson Divis., bei McGregor. — L.B. II. 351.
- Ruschia maleolens* L.Bol. — (*Mes. maleolens* N.E.Br.). — Kl.-Nama-land, Walle Kraal bei Hondeklip Bay. — L.B. II. 22; G.C. (1930) I. 32 (*Mes. maleolens*).
- Ruschia marginata* L.Bol. — Clanwilliam Divis., bei Pakhuis. — L.B. II. 500.
- Ruschia Mariae* L.Bol. — Steytlerville Divis. — L.B. III. 62.
- Ruschia Matthewsii* L.Bol. — Malmesbury Divis., Oude Poort nahe Saldanha Bay. — L.B. I. 139.
- Ruschia Maxwellii* L.Bol. — (*Mes. Maxwellii* N.E.Br.). — S.-Afr., zwischen Knysna und Willowmoore. — L.B. II. 106; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Maxw.*).
- Ruschia mesklipensis* L.Bol. — Kl.-Namaland, Mesklip. — L.B. II. 281.
- Ruschia Meyerae* Schwant. — Kl.-Namaland. — D.K.G. (1930) 64.
- Ruschia Meyeri* Schwant. — (*Mes. Meyeri* N.E.Br.). — Kl.-Nama-land, Koufontein bei Steinkopf. — D.K.G. (1927/28) 300; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Meyeri*).
- Ruschia micropetala* L.Bol. — (*Mes. micropetalum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Groot Derm. — L.B. II. 76; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. micropet.*).
- Ruschia microphylla* (Haw.) Schwant. — (*Mes. microphyllum* Haw.). — D.K.G. (1927/28) 20; D.K.G. (1930) 68.
- Ruschia modesta* L.Bol. — Sw.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 105.
- Ruschia mollis* (Bgr.) Schwant. — (*Mes. molle* Bgr., *Corpuscularia mollis* Schwant., *Mes. leve* N.E.Br.). — S.-Afr. — B.M.P. 130 (*Mes. molle*); D.K.G. (1925/26) 186 (*Corp. mollis*); D.K.G. (1929) 36; Gw. (1929) 69; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. leve*).
- Ruschia montaguensis* L.Bol. — S.-Afr., bei Montagu. — L.B. II. 432.
- Ruschia mucronata* (Haw.) Schwant. — (*Mes. mucronatum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 170 (*Mes. mucr.*); D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia Muelleri* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Muelleri* L.Bol.). — Sw.-Afr., bei Lüderitzbucht. — A.B.H. III. 130 (*Mes. Muelleri*); D.K.G. (1927/28) 20.

- Ruschia Muiriana*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. Muirianum* L.Bol.). — Ladismith Divis., Muiskraal. — A.B.H. IV. 94 (*Mes. Muirianum*); D.K.G. (1927/28) 106.
- Ruschia multiflora*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. multiflorum* Haw.). — Karroo-Gebiet, Gauritz-Fluß, Swellendam bei Cogman's Kloof. — B.M.P. 110 (*Mes. multiftl.*); D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia muricata*** L.Bol. — (*Mes. pellanum* N.E.Br.). — Bushmanland, bei Pella. — L.B. II. 21; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. pellanum*).
- Ruschia mutica*** L.Bol. — (*Mes. muticum* N.E.Br.). — Ceres Divis., zwischen Matjesfontein und Karroo Poort. — L.B. II. 61; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. muticum*).
- Ruschia namaquana*** L.Bol. — (*Mes. namaquanum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Brakfontein und Fifteen mile Mountain. — L.B. I. 140; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. namaqu.*).
- Ruschia namaquana*** L.Bol. var. ***quinqueflora*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlingsdrift. — L.B. II. 107.
- Ruschia nana*** L.Bol. — (*Mes. reductum* N.E.Br.?). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — L.B. II. 75; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. reduct.*).
- Ruschia Neilii*** L.Bol. — Robertson Divis., zwischen Bushman's Fluß und McGregor. — L.B. II. 433.
- Ruschia Neilii*** Schwant. — S.-Afr. — D.K.G. (1930) 66.
- Ruschia nivea*** L.Bol. — (*Mes. niveum* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Aus. — L.B. II. 45; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. niveum*).
- Ruschia nieuwerustensis*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., etwa 2 miles südl. Nieuwerust. — L.B. II. 210.
- Ruschia nobilis*** Schwant. — Kl.-Namaland, Umgegend von Port Nolloth. — D.K.G. (1930) 65, 68.
- Ruschia noniocompressa*** L.Bol. — Cradock Divis., Halesowen. — L.B. II. 374.
- Ruschia obtusa*** L.Bol. — (*Mes. hebes* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Arris und Sendlingsdrift. — L.B. II. 79; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. hebes*).
- Ruschia octojugis*** L.Bol. = ***Octopoma octojuge*** N.E.Br.
- Ruschia odontocalyx*** (Schl. et Diels) Schwant. — *Mes. odontocalyx* Schl. et Diels). — Gr.-Namaland, Kalkniederung von Chamies. — F.R. VII. 149 (*Mes. odont.*); F.R. XIX. 149 (*Mes. odont.*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia orientalis*** L.Bol. — Albany Divis., gemein in offenen Partien zwischen Sträuchern, am Ende des Queen's Road (Weg) nahe Botha's Hill. Grahamstown. — Fl.Pl. VII. Pl. 277.
- Ruschia Orsmondiae*** L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Prieska. — L.B. II. 433.

- Ruschia oriformis*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Nutabooi Buffels-Fluß. — L.B. II. 261.
- Ruschia pakhuisensis*** L.Bol. — Clanwilliam Divis., Pakhuis-Paß. — L.B. II. 414.
- Ruschia pallens*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Port Nolloth und Holgat. — L.B. II. 146.
- Ruschia papillata*** L.Bol. — (*Mes. papillatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — L.B. I. 129; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. papillatum*).
- Ruschia parvibracteata*** L.Bol. — (*Mes. parvibracteatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Walle Kraal. Flamink-Berg nördl. Albany. — L.B. II. 74; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. parvibract.*).
- Ruschia parviflora*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. parviflorum* Haw.). — Kl.-Namaland, am Gauritz-Fluß. — B.M.P. 95 (*Mes. parvifl.*); D.K.G. (1927/28) 19.
- Ruschia parvifolia*** L.Bol. — Karroo Reg., steinige Hügel nahe Beaufort West. — J.B. (1928) 13.
- Ruschia parvipetala*** L.Bol. var. *occultans* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. II. 125.
- Ruschia patens*** L.Bol. — (*Mes. diplosum* N.E.Br.). — Cape Prov., wahrscheinlich nahe Piquetberg. — L.B. I. 145; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. diplosum*).
- Ruschia patulifolia*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 206.
- Ruschia pauciflora*** L.Bol. — (?) Piquetberg Divis., zwischen Malmesbury und Greys-Paß. — L.B. II. 352.
- Ruschia Peersii*** L.Bol. — (*Mes. Peersii* N.E.Br.). — Riversdale Divis., nahe Riversdale. — L.B. I. 135; S.G. (1927) 178; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Peersii*).
- Ruschia perfoliata*** (Mill.) Schwant. — (*Mes. perfoliatum* Mill.). — S.-Afr., in der Karroo bei Matjesfontein, Prince Albert. — B.M.P. 104 (*Mes. perfol.*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia perforata*** L.Bol. — (*Mes. perforatum* N.E.Br.). — Sw.-Afr., zwischen Pomona und Orange-Fluß. — L.B. II. 80; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. perforatum*).
- Ruschia persistens*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 334.
- Ruschia phyllicoides*** L.Bol. — (*Mes. phyllicoides* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, südöstl. Hondeklip Bay. — L.B. II. 75; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. phyllicoides*).
- Ruschia Pillansii*** L.Bol. — (*Mes. floriferum* N.E.Br.). — S.-Afr., zwischen Arrisdraft und Sendlingsdrift. — L.B. II. 92; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. floriferum*).

- Ruschia pinguis* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Walle Kraal. — L.B. II. 146.
- Ruschia piscodora* L.Bol. — (*Mes. piscodorum* N.E.Br.). — Prince Albert Divis., nahe Prince Albert. — L.B. I. 141; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. piscodorum*).
- Ruschia* (?) *polita* L.Bol. — Laingsburg Divis., Touws-Fluß. — L.B. II. 332.
- Ruschia Primosii* L.Bol. — Bushmanland, Gamoepe. — L.B. III. 44.
- Ruschia profunda* L.Bol. — Piquetberg Divis., Kapitain's Kloof. — L.B. III. 16.
- Ruschia Promontori* L.Bol. — (*Mes. pansifolium* N.E.Br.). — S.-Afr., Cape Peninsula bei Cape Point. — L.B. II. 121; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Promont.*).
- Ruschia propinqua* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. propinquum* N.E.Br.). — Montagu Divis., in Kl.-Karoo. — B.M.J. (1929) 59 (*Mes. prop.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.
- Ruschia prostrata* L.Bol. — (*Mes. prostratum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis., Hecks-Fluß, Oliphants-Fluß. — L.B. II. 61; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. prostratum*).
- Ruschia psammophila* (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. psammophilum* Dtr.). — D.K.G. (1927/28) 20.
- Ruschia pulchella* L.Bol. = *Ruschia pulchella* Schwant.
- Ruschia pulchella* L.Bol. var. *caespitosa* L.Bol. = *Ruschia pulchella* Schwant. var. *caespitosa* L.Bol.
- Ruschia pulchella* (Haw.) Schwant. — (*Mes. pulchellum* Haw., *Mes. canescens* Haw., *Ruschia pulchella* L.Bol.). — S.-Afr. — B.M.P. 167 (*Mes. pulchellum*); D.K.G. (1927/28) 20; L.B. I. 124; D.K.G. (1937) 162; F.R. XLIII. 226.
- Ruschia pulchella* (Haw.) Schwant. var. *caespitosa* L.Bol. — (*Ruschia pulchella* L.Bol. var. *caespitosa* L.Bol.). — S.-Afr. — L.B. II. 123; D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 226.
- Ruschia pulvinaris* L.Bol. — Steynsburg Divis., bei Steynsburg. — L.B. II. 241.
- Ruschia pumila* L.Bol. — (*Mes. pumilum* N.E.Br.). — Calvinia Divis. — L.B. II. 60; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. pumilum*).
- Ruschia puniceus* L.Bol. — Griqualand West, Herbert Divis., Hügel bei Orange River Station. — L.B. II. 502.
- Ruschia pusilla* Schwant. — (*Mes. parvum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Ratel Poort und Steinkopf. — D.K.G. (1927/28) 300; L.B. II. 192; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. parvum*).
- Ruschia pygmaea* (Haw.) Schwant. — (*Mes. pygmaeum* Haw.). — Worcester und Laingsburg Divis., Karoo jenseits des Hex-Flusses, Matjesfontein. — N.E.Br.M. 110 (*Mes. pygmaeum*); M.D.G.Ztg. (1928) 92; D.K.G. (1930) 68; S.G. (1930) 153.

Ruschia quadrisepala L.Bol. — Kl.-Karoo, Ladismith. — **L.B. II. 175.**

Ruschia quarzitica (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. quarziticum* Dtr., *Corpuscularia quarzitica* Schwant.). — Gr.-Namaland, Klinghardtgebirge, Quarzitberg. — **D.B.F. XIX. 150** (*Mes. quarz.*); D.K.G. (1925/26) 186 (*Corp. quarz.*); Gw. (1929) 69; D.K.G. (1929) 36.

Ruschia radicans L.Bol. — (*Mes. radicans* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis. — **L.B. I. 146**; G.C. (1930. I) 32 (*Mes. radicans*).

Ruschia rariflora L.Bol. — Clanwilliam Divis., bei Clanwilliam. — **L.B. II. 414.**

Ruschia rigens L.Bol. — Orange Free State, Bloemfontein. — **L.B. II. 259.**

Ruschia rigida L.Bol. = ***Ruschia Bolusiae*** Schwant.

Ruschia rigida (Haw.) Schwant. — (*Mes. rigidum* Haw.). — S.-Afr., in der Karroo, bei Zwartkopsriver, Gauritzriver, Swellendam, bei Caledon. — **B.M.P. 111** (*Mes. rigidum*); D.K.G. (1927/28) 19.

Ruschia robusta L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Bushmanland. — **L.B. II. 147.**

Ruschia robusta Schwant. = ***Ruschia valida*** Schwant.

Ruschia roseola (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. roseolum* N.E.Br.). — Montagu Divis., Kl.-Karoo. — **B.M.J. (1929) 60** (*Mes. ros.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.

Ruschia rostella (Haw.) Schwant. — (*Mes. rostellum* Haw., *Mes. rostellatum* D.C.). — S.-Afr. — **B.M.P. 115** (*Mes. rostellum*); D.K.G. (1927/28) 20; D.K.G. (1930) 68.

Ruschia rostella (Haw.) Schwant. forma L.Bol. — Ladismith Divis., bei Ladismith. — **L.B. II. 260.**

Ruschia rubricaulis (Haw.) L.Bol. — (*Mes. rubricaule* Haw.). — Cape Peninsula. — **B.M.P. 200** (*Mes. rubricaule*); **L.B. I. 124**; D.K.G. (1930) 68.

Ruschia rupicola (Engl.) Schwant. — (*Mes. rupicolum* Engl.). — Gr.-Namaland, Aus. — **D.N.Pfl. 44** (*Mes. rupicol.*); F.R. XIX. 192; D.K.G. (1925/26) 187; D.K.G. (1927/28) 105.

Ruschia rupigena L.Bol. — Clanwilliam Divis., zwischen Pakhuis und Biesiesfontein. — **L.B. II. 145.**

Ruschia ruralis (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. rurale* N.E.Br.). — Transvaal, Bushveld, Karroidveld, Highveld. — **M.Fl.Pl. I. 161** (*Mes. rurale*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 42.

Ruschia Ruschiana (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Ruschianum* Dtr.). — Gr.-Namaland, Kuckaus. — **D.B.F. XIX. 180**; D.K.G. (1927/28) 20; D.K.G. (1930) 68.

Ruschia sabulicola Dtr. — Gr.-Namaland, Kl.-Karass. — **D.B.F. XIX. 190.**

- Ruschia saginata*** L.Bol. — Sw.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 104.
- Ruschia Salteri*** L.Bol. — Ceres Divis., nahe des Weges nach Sutherland. — L.B. II. 371.
- Ruschia saturata*** L.Bol. — (*Mes. atrocinctum* N.E.Br.). — S.-Afr., Tulbagh Divis. — L.B. II. 122; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. atrocinctum*).
- Ruschia saxicola*** L.Bol. — (*Mes. saxicolum* N.E.Br.). — Orange Free State, bei Fauresmith. — L.B. II. 46; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. saxicolum*).
- Ruschia Schlechteri*** Schwant. (*Mes. Schlechteri* N.E.Br.). — Kl.-Namaland. — D.K.G. (1927/28) 301; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. Schlechteri*); D.K.G. (1930) 68.
- Ruschia semidentata*** (S.D.) Schwant. — (*Mes. semidentatum* S.D.). — S.-Afr., am Gamka River. — B.M.P. 108 (*Mes. semident.*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia senaria*** L.Bol. — (*Mes. senarium* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. II. 108; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. senarium*).
- Ruschia serrulata*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. serrulatum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 200 (*Mes. serrul.*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 43.
- Ruschia simulans*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Frames Koppie, zwischen Zout River und Nieuwerust. — L.B. II. 260.
- Ruschia sobrina*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. sobrinum* N.E.Br.). — Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — B.M.J. (1929) 60 (*Mes. sobrinum*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 43.
- Ruschia socia*** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. socium* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., trockene Stellen südwestl. von Bakhuis. — N.E.Br.M. 91 (*Mes. socium*); D.K.G. (1927/28) 183 (*Mes. socium*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 43.
- Ruschia solida*** L.Bol. — (*Mes. solidum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., Nieuwerust. — A.B.H. III. 136 (*Mes. solidum*); S.G. (1927) 239; L.B. I. 72.
- Ruschia solida*** L.Bol. var. ***stigmatica*** L.Bol. — Van Rhynsdorp. — L.B. II. 94.
- Ruschia spathulata*** L.Bol. — Sw.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 103.
- Ruschia spinescens*** L.Bol. — Laingsburg Divis., Whitehill bei Matjesfontein. — L.B. II. 175.
- Ruschia staminodiosa*** L.Bol. — (*Mes. staminodiosum* N.E.Br.). — Riversdale Divis. — L.B. I. 140; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. stamid.*).
- Ruschia Steingröveri*** (Pax) Schwant. — (*Mes. Steingröveri* Pax.). — Sw.-Afr., zwischen Lüderitzbucht und Orange-Fluß. — F.R. XIX. 236 (*Mes. Steingr.*); D.K.G. (1925/26) 187.

- Ruschia stellata* L.Bol. — (*Mes. stellans* N.E.Br.). — Laingsburg Divis Whitehill. — L.B. I. 140; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. stellans*).
- Ruschia stellata* L.Bol. forma L. Bol. — S.-Afr., zwischen Ceres und Calvinia. — L.B. II. 207.
- Ruschia Stokoei* L.Bol. — Caledon Divis., Palmiet River Mountains. — L.B. II. 160.
- Ruschia stricta* L.Bol. — (*Mes. sublunatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, nördl. Abhänge der Hügel um Walle Kraal nahe Hondeklip Bay. — L.B. I. 146; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. sublunatum*).
- Ruschia stricta* L.Bol. var. *turgida* L.Bol. — Kl.-Namaland. — L.B. II. 207.
- Ruschia stylosa* L.Bol. — (*Mes. styliiferum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Hügel nördl. Arrisdrift. — L.B. I. 144; G.C. (1930, I) 32 (*Mes. styliiferum*).
- Ruschia suareolens* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Giftberg. — L.B. II. 352.
- Ruschia subglobosa* L.Bol. — (*Mes. reductum* N.E.Br.?). — Kl.-Namaland, nahe Ookiep. — L.B. I. 140; G.C. (1930, I) 33 (*Mes. reductum*).
- Ruschia subpaniculata* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Van Putten's Vlei bei Lambert's Bay. — L.B. II. 503.
- Ruschia subsphaerica* L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Springbok. — L.B. 208.
- Ruschia subteres* L.Bol. — Worcester Divis., bei Touw's Fluß. — L.B. II. 434.
- Ruschia subtruncata* L.Bol. — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 211.
- Ruschia succulenta* L.Bol. — (*Mes. succulentum* N.E.Br.) — Kl.-Namaland zwischen Brakfontein und Oograbies. — L.B. I. 144; G.C. (1930, I) 33 (*Mes. succulentum*).
- Ruschia tardissima* L.Bol. — S.-Afr., zwischen Karroopoort und Clavinia. — L.B. II. 353.
- Ruschia tecta* L.Bol. — Malmesbury Divis., zwischen Melkbos und Mamre. — L.B. II. 332.
- Ruschia tenella* (Haw.) Schwant. — (*Mes. tenellum* Haw., *Mes. rigidum* Haw. var. *tenellum* Bgr.). — S.-Afr., Karroo. — B.M.P. 112 (*Mes. rigid.* var. *tenellum*); D.K.G. (1927/28) 19.
- Ruschia testacea* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., 12 miles nördl. Nieuwerust. — L.B. II. 435.
- Ruschia tetrasepala* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Van Rhynsdorp und Zout River. — L.B. II. 373.
- Ruschia translucens* L.Bol. — (*Mes. translucens* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, beim Orange-Fluß. — L.B. II. 92; G.C. (1930, I) 33 (*Mes. translucens*).

- Ruschia tribracteata*** L.Bol. — Kl.-Namaland, Copperberg. — L.B. II. 238.
- Ruschia triflora*** L.Bol. — (*Mes. triflorum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis. — L.B. II. 109; G.C. (1930, I) 33 (*Mes. triflorum*).
- Ruschia triquetra*** L.Bol. — (*Mes. triquetrum* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis., nahe Clanwilliam. — J.B. (1928) 231; S.G. (1928) 178; G.C. (1930, I) 33 (*Mes. triquetrum*).
- Ruschia tuberculosa*** L.Bol. — (*Mes. enormis* N.E.Br.). — Clanwilliam Divis. — L.B. II. 110; G.C. (1930, I) 33 (*Mes. enormis*).
- Ruschia tumidula*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. tumidulum* Haw., *Mes. foliolosum* Haw., *Mes. imbricatum* var. *rubrum* Haw., *Mes. multiflorum* var. *rubrum* Haw., *Ruschia foliolosa* Schwant.). — Swellendam Divis., am rechten Ufer des Zondereinde-Flusses, Driefontein. — B.M.P. 114 (*Mes. tumid.*); N.E.Br. 130 (*Mes. tumid.*); D.K.G. (1927/28) 20. — (Anm. Nach N.E. Brown in N.E.Br.M. 130 ist *Mes. tumidulum* Haw. mit *Mes. foliolosum* Haw. identisch; demnach also *Ruschia foliolosa* Schwant. = *Ruschia tumidula* Schwant.).
- Ruschia uitenhagensis*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. uitenhagense* L.Bol.). — Cape Prov., South Western Reg., nahe Uitenhage. — A.B.H. IV. 82 (*Mes. uitenhag.*); D.K.G. (1927/28) 105.
- Ruschia umbellata*** (L.) Schwant. (*Mes. umbellatum* L.). — S.-Afr., sandige Stellen, den sogenannten Cape Plats, Genadental, Karroo. — B.M.P. 114 (*Mes. umbellatum*); D.K.G. (1927/28) 20. 27.
- Ruschia uncinata*** (Mill.) Schwant. — (*Mes. uncinatum* Mill.). — S.-Afr., in der Karroo zwischen Oliphants-Fluß und Bocklandberg. — B.M.P. 105 (*Mes. uncinatum*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia uncinella*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. uncinellum* Haw.). — S.-Afr., Karroo. Zoutpanshooedge am Zwartkops-Fluß, Gamka-Fluß, Central Karasberg, Gipfel des Scharfenstein. — B.M.P. 106 (*Mes. uncinellum*); A.B.H. I. 16 (*Mes. uncinellum*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia unidens*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. unidens* Haw.). — S.-Afr. nahe Fauresmith, Centr. Karasberg, Bothasberg am Vischriver, Albany Divis. — B.M.P. 108 (*Mes. unidens*); A.B.H. I. 17 (*Mes. unidens*); D.K.G. (1925/26) 187; L.B. I. 65; S.G. (1928) 127.
- Ruschia vaginata*** (Haw.) Schwant. — (*Mes. vaginatum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 110 (*Mes. vaginatum*); D.K.G. (1927/28) 19.
- Ruschia valida*** Schwant. — (*Ruschia robusta* Schwant.). — Kl.-Namaland, 25 miles nordöstl. von Port Nolloth. — D.K.G. (1930) 66 (*Ruschia robusta*); F.R. XLIII. 228; D.K.G. (1938) 41.
- Ruschia Vamiekerkiae*** L.Bol. — Ladismith Divis., Kl.-Karoo bei Ladismith. — L.B. II. 335.
- Ruschia Vanderbergii*** L.Bol. — Graaff Reinets Divis., Kendrew. — L.B. II. 503.

- Ruschia Vanzijlii*** L.Bol. — Kenhardt Divis., bei Pofadder. — **L.B. II. 209.**
- Ruschia varians*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Springbok. — **L.B. II. 209.**
- Ruschia velutina*** L.Bol. — (*Mes. lacunatum* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — **L.B. II. 76;** G.C. (1930, I) 33 (*Mes. lacunatum*).
- Ruschia ventricosa*** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. ventricosum* L.Bol., *Cheiridopsis ventricosum* N.E.Br.). — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — **A.B.H. III. 128** (*Mes. ventr.*); G.C. (1926, II) 73 (*Cheirid. ventr.*); D.K.G. (1927/28) 106, 302; D.K.G. (1927/28) 350 (*Cheirid. ventr.*); D.K.G. (1930) 68; F.R. XLIII. 228; D.K.G. (1938) 41.
- Ruschia verruculosa*** L.Bol. — (*Mes. verruculosum* N.E.Br.). — Worcester Divis., Hex River, bei Orchards. — **L.B. II. 125;** G.C. (1930, I) 33 (*Mes. verruculosum*).
- Ruschia versicolor*** L.Bol. — (*Mes. coloratum* N.E.Br.). — Namaland, Ebenen bei Hondeclip Bay. — **L.B. II. 7;** G.C. (1930, I) 33 (*Mes. coloratum*).
- Ruschia Victoris*** L.Bol. — (*Mes. Victoris* L.Bol.). — Cape Prov., South Western Reg., Graafwater. — **A.B.H. IV. 7;** L.B. II. 94.
- Ruschia Villetii*** L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., Koekanaap bei Van Rhynsdorp. — **L.B. II. 501.**
- Ruschia virens*** L.Bol. — (*Mes. dumosum* N.E.Br.). — Mossel Bay Divis., Langebergen. — **L.B. II. 21;** G.C. (1930, I) 33 (*Mes. dumosum*).
- Ruschia virgata*** (Haw.) L.Bol. — (*Mes. virgatum* Haw.). — S.-Afr., bei Muizenberg. — **B.M.P. 183** (*Mes. virgatum*); S.G. (1927) 239; L.B. I. 72; D.K.G. (1930) 68.
- Ruschia viridifolia*** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Bitterfontein und Springbok. — **L.B. II. 147.**
- Ruschia vulnerans*** L.Bol. — Hopetown Divis., Hügel bei Hopetown. — **L.B. II. 504.**
- Ruschia vulgaris*** (Dtr.) Schwant. — (*Mes. vulvarium* Dtr.). — Gr.-Namaland, Büllsporter Fläche. — **D.N.Pfl. 44** (*Mes. vulv.*); D.K.G. (1925/26) 187.
- Ruschia Watermeyerii*** L.Bol. — Nahe Van Rhynsdorp. — **L.B. I. 146.**
- Ruschia Willdenowii*** (Willd.) Schwant. — (*Mes. aduncum* Willd.). — S.-Afr., Lionsmountains. — **B.M.P. 145** (*Mes. aduncum*); F.R. XLIII. 230; D.K.G. (1938) 43.
- Ruschia Wilmaniae*** L.Bol. — (*Mes. Wilmaniae* L.Bol.). — Griqualand West, Kalahari Reg.; Hay Divis., Papkuil. — **A.B.H. II. 28** (*Mes. Wilmaniae*); L.B. II. 158.

Ruschia Wilmaniae L.Bol. var. *Vermeuleniae* L.Bol. — (*Mes. Vermeuleniae* L.Bol.). — Kalahari Reg., Griqualand West, Niekerks Hoop. — A.B.H. III. 123 (*Mes. Verm.*); L.B. II. 158.

Ruschia wittebergensis (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. wittebergense* L.Bol.). — Karroo Reg., Laingsburg Divis., Witteberg. — A.B.H. IV. 88 (*Mes. witteberg.*); D.K.G. (1927/28) 106.

Saphesia N.E.Br.

G.C. (1932, I) 205; A. 218.

Saphesia flaccida (Jacq.) N.E.Br. — (*Mes. flaccidum* Jacq.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — G.C. (1932, I) 205.

Sceletium N.E.Br.

G.C. (1925, II) 412; P.G.S.A.P. 245; S.G. (1927) 399; L.B. I. 91; v.P.M. 66; A. 218.

Sceletium albanense L.Bol. — Albany Divis., Cradock-Weg, Karroo-Ebenen gegen Carlisle Bridge (Brücke). — L.B. II. 396.

Sceletium anatomicum (Haw.) L.Bol. — (*Mes. anatomicum* Haw., *Mes. emarcidum* Thbg.). — Karroo-Gebiet, Baroda nahe Cradock, Bockland. — B.M.P. 49 (*Mes. anatomicum*); L.B. I. 133.

Sceletium Archeri L.Bol. — S.-Afr., Whitehill bei Matjesfontein. — L.B. II. 16.

Sceletium boreale L.Bol. — Bushmanland. Standort unbekannt, wahrscheinlich Onseepkans. — L.B. II. 375.

Sceletium compactum L.Bol. — Laingsburg Divis., 6 miles von Laingsburg. — L.B. II. 393.

Sceletium concavum (Haw.) Schwant. — (*Mes. concavum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 51 (*Mes. concavum*); D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 227.

Sceletium crassicaule (Haw.) L.Bol. — (*Mes. crassicaule* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 52 (*Mes. crassicaule*); L.B. I. 133.

Sceletium Dejagerae L.Bol. — Beaufort West, bei „Waterfall“ am Fuße der Nieuweveldbergen. — L.B. II. 126.

Sceletium expansum (L.) L.Bol. — (*Mes. expansum* L., *Mes. tortuosum* D.C.). — Willowmoore Divis., Toverwater, Tois Kloof. — B.M.P. 49 (*Mes. expans.*); L.B. I. 91, 133.

Sceletium Framesii L.Bol. — Calvinia Divis., bei Calvinia. — L.B. II. 176.

Sceletium gracile L.Bol. — Willowmoore Divis., Rietbron bei Willowmoore. — L.B. II. 375.

Sceletium Joubertii L.Bol. — Ladisnuth Divis., Van Wyksdorp. — L.B. II. 435.

Sceletium namaquense L.Bol. — Kl.-Namaland, Breekpoort bei Steinkopf. — L.B. II. 374.

Sceletium namaquense L.Bol. var. *subglobosum* L.Bol. — Kl.-Namaland, Bysondermeid bei Steinkopf. — **L.B. II. 375.**

Sceletium rigidum L.Bol. — Laingsburg Divis. — **L.B. II. 13; S.G. (1928) 279.**

Sceletium strictum L.Bol. — Ladismith in Kl.-Karoo. — **S.G. (1927) 398; L.B. I. 94. 132.**

Sceletium subvelutinum L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. II. 223.**

Sceletium subvelutinum L.Bol. forma *luxurians* L.Bol. — **L.B. II. 224.**

Sceletium tortuosum (L.) N.E.Br. — (*Mes. tortuosum* L.). — Montagu Divis., nahe Montagu Baths. — **B.M.P. 50 (*Mes. tortuosum*); P.G.S. A.P. 245; L.B. I. 91.**

Sceletium Tugwelliae L.Bol. — Prince Albert Divis., bei Prince Albert. — **L.B. II. 394.**

Sceletium varians (Haw.) L.Bol. — (*Mes. varians* Haw.). — Clanwilliam Divis., Oackhuis, Piquetberg. — **L.B. I. 91.**

***Schlechteranthus* Schwant.**

D.K.G. (1929) 16; v.P.M. 72; A. 221.

Schlechteranthus Maximiliani Schwant. — Kl.-Namaland, 30 miles nordöstl. Port Nolloth und Alexander Bay. — **D.K.G. (1929) 16.**

***Schönlandia* L.Bol.**

Fl.Pl. VII. Pl. 239; v.P.M. 65; A. 221.

Schönlandia Lehmanni L.Bol. = *Corpuscularia Lehmannii* Schwant.

***Schwantesia* Dtr.**

M.D.G.Ztg. (1927) 234; v.P.M. 65; A. 221.

Schwantesia L.Bol. (**S.G. [1928] 279; v.P.M. 65**) = *Monilaria* Schwant.

Schwantesia acutipetala L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — **L.B. III. 62.**

Schwantesia australis L.Bol. — Bushmanland, Rosynebosch. — **L.B. III. 63.**

Schwantesia Barchardii L.Bol. — Upington Divis., Kurop Valley — **L.B. II. 86.**

Schwantesia Herrei L.Bol. — Kl.-Namaland, Bushmanland, Noisabis-Helskloof-Richtersveld. — **L.B. II. 287; D.K.G. (1935) 32.**

Schwantesia Loeschiana Tisch. — Gr.-Namaland, südl. Wittputz nahe am Orange-Fluß. — **D.K.G. J. I. 71.**

Schwantesia Marlothii L.Bol. — Kl.-Namaland, auf einem felsigen Hügel nahe Nariemoep, Kl.-Bushmanland. — **L.B. II. 354.**

Schwantesia moniliforme L.Bol. = *Monilaria moniliforme* Schwant.

Schwantesia Pillansii L.Bol. — Bushmanland; Kenhardt Divis., zwischen Pofadder und Kakamas. — L.B. II. 86.

Schwantesia pisiiforme L.Bol. = ***Monilaria pisiiforme*** Schwant.

Schwantesia ramulosa L.Bol. = ***Monilaria ramulosa*** Schwant.

Schwantesia Rüdebuschii Dtr. — Gr.-Namaland, Farm Vahldoorn, Quarzberg 8 km östl. Eendorn. — M.D.G.Ztg. (1927) 234.

Schwantesia succumbens Dtr. — (*Mes. succumbens* Dtr.). — Sw.-Afr. — J.S. 178; J.S.Pl. 245.

Schwantesia Triebneri L.Bol. — Bushmanland. — L.B. III. 100.

Schwantesia Watermeyeri L.Bol. = ***Monilaria Watermeyeri*** L.Bol.

Semnanthe N.E.Br.

G.C. (1927, I) 12; v.P.M. 66; A. 218.

Semnanthe lacera (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. lacera* Haw., *Mes. acinaciforme* D.C., *Mes. gladiatum* Jacq., *Mes. falcatum* Thbg., *Mes. carinatum* Vent., *Mes. dimidiatum* Haw., *Mes. dentatum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 193 (*Mes. lacera*); G.C. (1927, I) 12.

Skatophytum L. Bol. (*Gymnopoma* N.E.Br.)

S.G. (1927) 435; G.C. (1928, I) 194 (*Gymnopoma*); v.P.M. 44 (*Gymnopoma*); v.P.M. 67.

Skatophytum Tripolium (L.) L.Bol. — (*Mes. Tripolium* L., *Mes. expansum* Thbg., *Gymnopoma Tripolium* N.E.Br.). — Cape Divis., Cape Peninsula; Piquetberg Divis., Pickiniers-Paß; Clanwilliam Divis., Oliphants River Valley (Flußtal) nahe Warmbaths. — S.G. (1927) 434; L.B. I. 134; G.C. (1928, I) 195 (*Gymnopoma Tripolium*); M.J.B.H. 162, 163; v.P.M. 44 (siehe bei *Gymnopoma*).

Smicrostigma N.E.Br.

G.C. (1930, I) 72, 186; v.P.M. 67; A. 219.

Smicrostigma viride (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. viride* Haw., *Mes. integrum* L.Bol., *Ruschia integra* Schwant., *Erepsia viridis* L.Bol.). — Montagu Divis., nahe Montagu Baths, Concordia Valley; Robertson Divis., Ashton; Riversdale Divis., Kl.-Karoo. — B.M.P. 106 (*Mes. viride*); A.B.H. III. 134 (*Mes. integrum*); D.K.G. (1925/26) 187 (*Ruschia integra*); Fl.Pl. VII. Pl. 270 (*Erepsia integra*); G.C. (1930, I) 186.

Sphalmanthus N.E.Br.

G.C. (1928, II) 13; v.P.M. 67; A. 219.

Sphalmanthus calycinus L.Bol. = ***Sphalmanthus canaliculatus*** N.E.Br.

Sphalmanthus canaliculatus (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. canaliculatum* Haw., *Mes. calycinum* Eckl. et Zeyh., *Mes. salmoneum* S.D., *Mes. longispinulum* Sond., *Mes. reflexum* Willd., *Sphalmanthus*

- calycinus* L.Bol.). — Cape Peninsula, besonders nahe Muizenburg, am Zwartkops-Fluß. — B.M.P. 71 (*Mes. canalicul.*); S.G. (1927) 398 (*Sphalm. calycinus*); G.C. (1928, II) 13; L.B. I. 94 (*Sphalm. calycinus*).
- Sphalmanthus carneus*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. carneum* Haw., *Mes. grossum* Haw.). — S.-Afr. — N.E.Br.M. 92 (*Mes. grossum*); G.C. (1928, II) 95.
- Sphalmanthus caudatus*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. caudatum* L.Bol.). — Cape Prov., Worcester Divis., Orchard Siding, Hex River Valley (Flußtal). — A.B.H. II. 29 (*Mes. caudatum*); G.C. (1928, II) 96.
- Sphalmanthus commutatus*** (S.D.) N.E.Br. — (*Mes. commutatum* S.D., *Mes. longispinulum* S.D.). — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 96.
- Sphalmanthus fragilis*** N.E.Br. — Kl.-Namaland, Richtersveld. — G.C. (1928, II) 95.
- Sphalmanthus grossus*** (Ait.) N.E.Br. — (*Mes. grossum* Ait.). — S.-Afr., am Zwartkop-Fluß. — B.M.P. 66 (*Mes. grossum*); N.E.Br. M. 92 (*Mes. grossum*); G.C. (1928, II) 96.
- Sphalmanthus Herberti*** N.E.Br. — Van Rhynsdorp Divis. — C.J. II. 70.
- Sphalmanthus laxis*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Aridaria laxa* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Doornpoort und Brakfontein. — S.G. (1927) 433 (*Aridaria laxa*); G.C. (1928, II) 96; L.B. I. 99, 133 (*Arid. laxa*).
- Sphalmanthus longispinulus*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. longispinulum* Haw., *Aridaria longispinula* L.Bol.?). — S.-Afr., auf sandigen Stellen bei Rietvalley. — B.M.P. 68 (*Mes. longisp.*); G.C. (1928, II) 96; L.B. I. 66 (*Arid. longisp.*); S.G. (1928) 127 (*Arid. longisp.*).
- Sphalmanthus melanospermus*** (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. melanospermus* Dtr.). — Gr.-Namaland, Bogenfels, Buntfeldschuh-Plateau Klinghardtgebirge, 2 km östl. Pomona. — D.B.F. XIX. 133 (*Mes. melanosp.*); Gw. (1929) 69.
- Sphalmanthus oculatus*** N.E.Br. = ***Aridaria oculata*** L.Bol.
- Sphalmanthus Rabei*** (L.Bol.) N.E.Br. — (*Aridaria Rabei* L.Bol.). — Orange Free State, Groenvlei nahe Fauresmith. — S.G. (1927) 433 (*Arid. Rabei*); G.C. (1928, II) 96; L.B. I. 99, 133 (*Arid. Rabei*).
- Sphalmanthus salmoneus*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. salmoneum* Haw., *Mes. canaliculatum* S.D.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — N.E.Br.M. 134 (*Mes. salmoneum*); G.C. (1928, II) 95.
- Sphalmanthus scintillans*** (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. scintillans* Dtr.). — Gr.-Namaland, Klinghardtgebirge. — D.B.F. XIX. 129 (*Mes. scintillans*); Gw. (1929) 69.
- Sphalmanthus tenuiflorus*** (Jacq.) N.E.Br. — (*Mes. tenuiflorum* Jacq.). — S.-Afr. — G.C. (1928, II) 95.
- Sphalmanthus viridiflorus*** N.E.Br. = ***Aridaria viridiflora*** L.Bol.

***Sterropetalum* N.E.Br.**

G.C. (1928, I) 266; v.P.M. 68, 73; A. 219.

Sterropetalum Pillansii N.E.Br. = *Nelia Meyeri* Schwant.***Stigmatocarpum* L.Bol.**

L.B. I. 131; v.P.M. 68.

Stigmatocarpum caducum L.Bol. = *Dorotheanthus apetalus* N.E.Br.*Stigmatocarpum coticum* L.Bol. = *Dorotheanthus apetalus* N.E.Br.***Stöberia* Dr. et Schwant.**

D.K.G. (1927/28) 14, 106; v.P.M. 68; A. 221.

Stöberia Beetzii (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Beetzii* Dtr.). — Gr.-Namaland, Alicetal bei Pomona, Buntfeldschuh. — F.R. XIX. 180 (*Mes. Beetzii*); D.K.G. (1927/28) 17, 106.*Stöberia Gigas* (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Gigas* Dtr.). — Gr.-Namaland, Klinghardtgebirge, am Fuße des Sargdeckels. — D.B.F. XIX. 153 (*Mes. Gigas*); D.K.G. (1927/28) 17.*Stöberia rupis Arcuatae* (Dtr.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Arcuatae* Dtr.). — Gr.-Namaland, Bogenfels. — D.B.F. XIX. 151 (*Mes. Arcuatae*); D.K.G. (1927/28) 17.***Stomatium* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 175; D.K.G. (1927/28) 30, 105; S.G. (1928) 370; v.P.M. 219; A. 219.

Stomatium agninum Schwant. = *Agnirictus agninus* Schwant.*Stom. albo-roseum* L.Bol. — Bushmanland. — L.B. II. 242.*Stom. angustifolium* L.Bol. — S.-Afr., bei Somerset East. — L.B. II. 505.*Stom. beaufortense* L.Bol. — S.-Afr., bei Beaufort West. — L.B. III. 63.*Stom. Bolusiae* Schwant. — Orange Free State, Jagersfontein. — D.K.G. (1930) 22.*Stom. Braunsii* L.Bol. — Zwischen Van Rhynsdorp und Clanwilliam. — L.B. II. 309.*Stom. Bryantii* L.Bol. — S.-Afr., bei Prieska. — L.B. II. 507.*Stom. defiens* L.Bol. — (Hybr.?). — Cradock Divis., bei Halesowen. — L.B. II. 508.*Stom. difforme* L.Bol. — Laingsburg Divis., bei Laingsburg. — L.B. II. 263.*Stom. Duthiae* L.Bol. — Middelburg Divis., bei Middelburg. — L.B. II. 309.*Stom. ermininum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. ermininum* Haw.). — Cradock. — N.E.Br.M. 75 (*Mes. erm.*); D.K.G. (1925/26) 176.*Stom. Fulleri* L.Bol. — Kenhard Divis. — L.B. II. 90.

- Stom. Geoffreyi* L.Bol. — Cradock Divis., Berge bei Halesowen. — L.B. II. 436.
- Stom. Gerstneri* L.Bol. — Herschel Divis., bei Lady Grey. — L.B. II. 505.
- Stom. grandidens* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 506.
- Stom. Jamesii* L.Bol. — Cradock Divis., Berge bei Halesowen. — L.B. II. 308.
- Stom. latifolium* L.Bol. — Fraserburg Divis., bei Williston. — L.B. II. 310.
- Stom. leve* L.Bol. — Cradock? — L.B. III. 17.
- Stom. Loganii* L.Bol. — Laingsburg Divis., Klein-Roggeveld. — L.B. III. 39.
- Stom. Meyeri* L.Bol. — Kl.-Namaland, Doorn River, Steinkopf. — L.B. II. 262.
- Stom. middelburgense* L.Bol. — Middelburg Divis. — L.B. II. 309.
- Stom. murinum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. murinum* Haw.). — Fraserburg Divis., bei Williston. — B.M.P. 270 (*Mes. mur.*); D.K.G. (1925/26) 176.
- Stom. musculinum* Schwant. = *Chasmatophyllum musculinum* Dtr. et Schwant.
- Stom. mustellinum* (S.D.) Schwant. — (*Mes. mustellinum* S.D.). — B.M.P. 271 (*Mes. must.*); D.K.G. (1925/26) 176; D.K.G. (1931) 270; S. (1937) 131.
- Stom. niveum* L.Bol. — Bushmanland. — L.B. II. 263.
- Stom. patulum* L.Bol. nomen nudum.
- Stom. paucidens* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. II. 507.
- Stom. Peersii* L.Bol. — Victoria West, bei Hutchinson. — L.B. III. 17.
- Stom. pluridens* L.Bol. — Kl.-Namaland-Bushmanland, Julie's Vlei. — L.B. III. 64.
- Stom. pyrodorum* (Diels.) L.Bol. — (*Mes. pyrodorum* Diels.). — Calvinia. — Fl.Pl. VII. Pl. 265; S.G. (1928) 371.
- Stom. resedolens* L.Bol. — Sutherland Divis., Roggeveld bei Sutherland. — L.B. III. 65.
- Stom. Ronaldii* L.Bol. — Cradock Divis., bei Halesowen. — L.B. II. 311.
- Stom. Rouxii* L.Bol. — Carnavon Divis., zwischen Carnavon und Victoria West. — L.B. III. 17.
- Stom. Ryderae* L.Bol. — Cradock Divis., 49 miles von Graaf-Reinet am Cradock-Weg. — L.B. III. 18.
- Stom. suaveolens* Schwant. — (*Mes. suaveolens* Schwant.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — D.K.G. (1925/26) 176 (*Mes. suav.*); D.K.G. (1925/26) 254; D.K.G. (1927/28) 105; M. 294.

Stom. suricatum L.Bol. — Laingsburg Divis., auf einem Plateau zwischen den Fußhügeln des Klein-Swartberges, 23 miles südl. von Laingsburg. — L.B. II. 242.

Stom. trifarium L.Bol. — Fraserburg Divis., bei Williston. — L.B. II. 90.

Stom. trifarium L.Bol. — S.-Afr., Standort? — L.B. II. 437.

Stom. viride L.Bol. — Bei Beaufort West. — L.B. III. 39.

***Synaptophyllum* N.E.Br.**

G.C. (1925, I) 412; G.C. (1928, II) 254; v.P.M. 69; A. 219.

Synaptophyllum Juttae (Dtr. et Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. Juttae* Dtr. et Bgr.). — Sw.-Afr., Lüderitzbucht. — F.R. XIX. 190 (*Mes. Juttae*); G.C. (1928, II) 254; S.G. (1929) 49.

Syn. Sladenianum N.E.Br. = ***Prenia Sladeniana*** L.Bol.

***Thyracosperma* N.E.Br.**

(erwähnt ist *Th. sabulosa* N.E.Br. in M.D.G. Ztg. [1928] 166) dürfte Schreibfehler sein und muß heißen: ***Thyrasperma sabulosa*** N.E.Br.

***Thyrasperma* N.E.Br.**

G.C. (1925, II) 412; P.G.S.A.P. 246; M.J.B.H. 163; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 69; A. 219.

Thyrasperma helianthoides N.E.Br. = ***Apatesia helianthoides*** N.E.Br.

Thyr. sabulosa N.E.Br. = ***Apatesia helianthoides*** N.E.Br.

***Titanopsis* Schwant.**

D.K.G. (1925/26) 178; D.K.G. (1927/28) 105; G.C. (1931, I) 13; v.P.M. 69; S. (1936) 172; A. 219.

Titanopsis calcarea (Marl.) Schwant. — (*Mes. calcareum* Marl.). — Alexandersfontein bei Kimberley, Kapplateau bei Griquatown, Hopetown, Griqualand-West Prieska Distr. — Tr.Ph.S. XVIII. 45, 281 (*Mes. calc.*); D.K.G. (1925/26) 178; D.K.G. (1926/28) 105; M. 295; G.C. (1931, I) 13; D.K.G. (1931) 43.

Tit. crassipes (Marl.) N.E.Br. — (*Mes. crassipes* Marl., *Aloinopsis crassipes* L.Bol.). — Sutherland Divis., Waterkloop nahe Sutherland. — Fl.Pl. II. Pl. 73 (*Mes. crass.*); S.G. (1929) 245 (*Al. crass.*); G.C. (1931, I) 14.

Tit. Fulleri Tisch. — Prieska in Griqualand West. — Bisher nicht veröffentlicht.

Tit. Hugo-Schlechteri (Tisch.) Dtr. et Schwant. — (*Mes. Hugo-Schlechteri* Tisch., *Mes. Astridae* Dtr., *Verrucifera Hugo-Schlechteri* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, Warmbad. — D.K.G. (1925/26) 203

- (*Mes. Hugo-Schlecht.*); D.K.G. (1925/26) 179 (*Mes. Astr.*); D.K.G. (1927/28) 30; M.D.G.Ztg. (1927/28) 157; G.C. (1930. II) 513 (*Verruc. Hugo-Schlecht.*).
- Tit. Hugo-Schlechteri** (Tisch.) Dtr. et Schwant. var. *albociridis* Dtr. — Sw.-Afr., südl. Warmbad. — M.D.G.Ztg. (1927) 158.
- Tit. Luckhoffii** L.Bol. — Kl.-Namaland, 100 miles südöstlich von Springbok. — L.B. II. 307; S.G. (1931) 316.
- Tit. Lüderitzii** Tisch. — (*Verrucifera Lüderitzii* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, bei Halenberg, bei Rote Kuppe. — S. (1927) 156; D.K.G. (1935) 244; G.C. (1930, II) 513 (*Verr. Lüd.*).
- Titunopsis Primosii** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Nieuwefontein. — D. (1938) 8, 9.
- Tit. Schwantesii** (Dtr.) Schwant. — (*Mes. Schwantesii* Dtr., *Mes. concinnum* N.E.Br., *Verrucifera Schwantesii* N.E.Br.). — Sw.-Afr., Karasberge, Kl.-Karas, zwischen Gubub und Kuckaus. — D.N.Pfl. 38 (dort als *Tit. calcarea* beschrieben!); G.C. (1921, I) 126 (*Mes. conc.*); D.K.G. (1922) 129; D.K.G. (1925/26) 179; G.C. (1930, II) 513 (*Verr. Schwantesii*); D.K.G. (1934) 56.
- Tit. setifera** L.Bol. — Kl.-Namaland, Van Rhynsdorp Divis., am Wege nach Nieuwefontein, an einem Punkt 25 miles nördl. von Van Rhynsdorp. — L.B. II. 416; D. (1938) 28, 29.
- Tit. spathulata** L.Bol. = **Tit. spathulata** Schwant.
- Tit. spathulata** (Thunb.) Schwant. — (*Mes. spathulatum* Thunb., *Tit. spathulata* L.Bol.). — Van Rhynsdorp- oder Calvinia Divis., Roggeveld. — D.K.G. (1927/28) 105; S.G. (1929) 245; G.C. (1931, I) 14; D.K.G. (1937) 163; F.R. XLIII. 226.

Trichocyclus N.E.Br.

- G.C. (1925, II) 433; P.G.S.A.P. 248; D.K.G. (1927/28) 20 (*Brownanthus*), 234, 322; J.B. (1928) 267; v.P.M. 70; A. 220; B.M.J. (1937) 492 (*Brownanthus*).
- Trichocyclus buchbergensis* Dtr. = *Brownanthus pubescens* Bullock.
- Trichocyclus ciliatus* N.E.Br. = *Brownanthus ciliatus* Schwant.
- Trichocyclus Marlothii* N.E.Br. = *Brownanthus Marlothii* Schwant.
- Trichocyclus namibensis* N.E.Br. = *Brownanthus namibensis* Schwant.
- Trichocyclus Pillansii* L.Bol. = *Brownanthus pubescens* Bullock.
- Trichocyclus pubescens* N.E.Br. = *Brownanthus pubescens* Bullock.
- Trichocyclus simplex* N.E.Br. = *Brownanthus simplex* Bullock.

Trichodiadema Schwant.

- D.K.G. (1925/26) 187; D.K.G. (1927/28) 106; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 70; A. 220.
- Trichodiadema attonsum** (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. attonsum* L.Bol.). — South Western Reg., Riversdale Div.?, genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 78 (*Mes. att.*); D.K.G. (1927/28) 106.

- Tr. barbatum** (L.) Schwant. — (*Mes. barbatum* L.). — Karroo bei Cradock, Beaufort. auf Hügeln im Zwartland: Karasberge, mittl. Abhänge des Scharfenstein. — B.M.P. 80 (*Mes. barb.*); A.B.H. I. 18 (*Mes. barb.*); D.K.G. (1925/26) 188.
- Tr. bulbosum** (Haw.) Schwant. — (*Mes. bulbosum* Haw.). — Steinige Hügel bei Port Elizabeth. — B.M.P. 81 (*Mes. bulb.*); D.K.G. (1925/26) 188; S.G. (1930) 381.
- Tr. calvatum** L.Bol. — Robertson Divis., Langebergcn, Rabie's Berg. — L.B. III. 19.
- Tr. densum** (Haw.) Schwant. — (*Mes. densum* Haw., *Mes. barbatum* L. var. *densum* Willd., *Mes. barbatum* var. γ L.). — Karroo, Clanwilliam, Zwartkops River. — B.M.P. 85 (*Mes. dens.*); D.K.G. (1925/26) 188; S.G. (1928) 125; D.K.G. (1934) 57.
- Tr. echinatum** L.Bol. — *Delosperma echinatum* Schwant.
- Tr. emarginatum** L.Bol. — Kap-Prov., Standort unbeständig. — L.B. I. 151.
- Tr. Fergusoniae** L.Bol. — Riversdale Divis., Oakdale nahe Riversdale. — L.B. II. 9; S.G. (1928) 279; S.G. (1929) 144.
- Tr. Fourcadei** L.Bol. — Humansdorp Divis., nahe Hankey. — L.B. I. 138.
- Tr. gracile** L.Bol. — Caledon Divis., am River Zondereinde. — L.B. II. 127.
- Tr. inornatum** L.Bol. — Kl.-Namaland, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort. — L.B. II. 8.
- Tr. intonsum** (Haw.) Schwant. — (*Mes. intonsum* Haw., *Mes. introsum* Hook.f.). — Fläche am Zwartkopsriver und Zondagsriver. — B.M. 83 (*Mes. intons.*); D.K.G. (1925/26) 188.
- Tr. Marlothii** L.Bol. — Kap-Prov., Standort unbeständig. — L.B. I. 150.
- Tr. mirabile** (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. mirabile* N.E.Br.). — Karroo Reg., von Laingsburg nach Uitenhage Divis. — B.M.P. 86 (*Mes. mirab.*); D.K.G. (1925/26) 188; M. 298.
- Tr. occidentale** L.Bol. — Bredasdorp Distr. zwischen „Heuningrug“ und „Lewiesdrift“. — L.B. I. 150.
- Tr. olivaceum** L.Bol. — Somerset East Divis., Farm Apple Glen. — L.B. II. 261.
- Tr. orientale** L.Bol. — Uitenhage Divis., nahe Redhouse. — T.B. I. 150.
- Tr. Peersii** L.Bol. — Willowmoore Divis., bei Miller. — L.B. II. 42.
- Tr. pomeridianum** L.Bol. — Orange Free State, Fauresmith-Distr., Fauresmith Karroo. — L.B. I. 138.
- Tr. Rogersiae** L.Bol. — Cradock Divis., bei Cradock. — L.B. II. 177.
- Tr. rupicolum** L.Bol. — Uitenhage Divis., nahe Redhouse. — L.B. I. 150.
- Tr. Ryderae** L.Bol. — Bedford Divis., bei Bedford. — L.B. II. 244.

- Tr. setuliferum* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. setuliferum* N.E.Br.). — Karroo bei Bruintjes Hoogte. — B.M.P. 82 (*Mes. set.*); D.K.G. (1925/26) 188; S.G. (1930) 381.
- Tr. setuliferum* (N.E.Br.) Schwant. var. *nireum* L.Bol. — Victoria West Divis., „dolerite ridges near Victoria West“. — L.B. II. 243.
- Tr. stellatum* (Mill.) Schwant. — (*Mes. stellatum* Mill., *Mes. barbatum* var. β L., *Mes. barbatum* var. *hirsutum* Willd., *Mes. hirsutum* Haw.). — Trockene Hügel am Zwartkops River, Zondags River. — B.M.P. 84 (*Mes. stellat.*); B.Mag. 151. Tab. 9103 (*Mes. stellat.*); D.K.G. (1925/26) 188.
- Tr. stelligerum* (Haw.) Schwant. — (*Mes. stelligerum* Haw., *Mes. barbatum* var. β Haw., *Mes. barbatum* Curtis). — S.-Afr. — B.M.P. 82 (*Mes. stellig.*); D.K.G. (1925/26) 188; D.K.G. (1927/28,) 106.
- Tr. strumosum* (Haw.) L.Bol. — (*Mes. strumosum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 79 (*Mes. strum.*); L.B. I. 66; S.G. (1928) 127.

Vanzijlia L.Bol.

- Fl.Pl. VII. Pl. 262; B.M.J. (1929) 61; G.C. (1930, I) 71; v.P.M. 71; A. 220.
- Vanzijlia angustipetala* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. angustipetalum* L.Bol., *Vanzijlia annulata* L.Bol.). — A.B.H. III. 166 (*Mes. angustipetalum*); Fl.Pl. VII. Pl. 262 (*Vanzijlia annulata* L.Bol.); B.M.J. 62; A. 220.
- Vanzijlia annulata* L.Bol. = *Vanzijlia angustipetala* N.E.Br.
- Vanzijlia annulata* (Bgr.) N.E.Br. — (*Mes. annulatum* Bgr.). — Van Rhynsdorp Divis., Karree-Bergen. — B.M.J. (1929) 62.
- Vanzijlia rostellum* L.Bol. — Malmesbury Divis., bei Hoetjes Bay, Langebaan. — L.B. II. 47.

Verrucifera N.E.Br.

- G.C. (1930, II) 513; v.P.M. 71; A. 220.
- Verrucifera Hugo-Schlechteri* N.E.Br. = *Titanopsis Hugo-Schlechteri* Dtr. et Schwant.
- Verrucifera Lüderitzii* N.E.Br. = *Titanopsis Lüderitzii* Tisch.
- Verrucifera Schwantesii* N.E.Br. = *Titanopsis Schwantesii* Schwant.

Zeuktophyllum N.E.Br.

- G.C. (1927, I) 12; v.P.M. 71; A. 220.
- Zeuktophyllum suppositum* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. suppositum* L.Bol.). — Kap Prov. South Western Reg., Riversdale Divis., Phisantifontein. — A.B.H. IV. 1 (*Mes. supp.*); G.C. (1927, I) 12.



cū-1798

0457

Nachtrag I 1939.

Das mit Interesse aufgenommene Verzeichnis der Arten der Gattung *Mesembryanthemum*, welches im März 1938 erschien, zeigt die Literaturangaben bis zu diesem Datum auf. Inzwischen sind neue Arten beschrieben worden, neue Umbenennungen vorgenommen, wodurch Verschiebungen von Hinweisen im Index eingetreten sind. Auch sind trotz sorgfältigster Bearbeitung einige Fehler festgestellt worden, einige Zitate sind übersehen, auch Druckfehler sind beim Korrekturlesen übersehen.

Ich hielt es jetzt für zweckmäßig, den ersten Nachtrag zu dem Verzeichnis zu bearbeiten. Weitere Nachträge werden in entsprechenden Zeitabschnitten folgen. Für Mitteilungen über Fehler und Irrtümer bin ich stets dankbar.

Verzeichnis der Literatur.

(Erklärung der Abkürzungen siehe S. 7 u. s. f. des Index.)

- B.M.J. A.A.Bullock, *Notes on Mesembryanthemum* II. 1938.
C.J. = Vol. VII, bis einschließlich März 1939.
D. = Vol. VIII, März bis Dezember 1938, Vol. IX, Januar 1939.
D.K.G.B.I. = Deutsche Kakteen-Gesellschaft: Beiträge zur Sukkulantenkunde und -pflege I. 1938.
K.Kd. = 1938 bis Januar 1939.
L.B. III = Seiten 115—138 (März 1938).
M.G.A.etM = Salin Dyck, *Monographia Generum Aloes et Mesembryanthemi* (1836—1854)
S. = April 1938 bis Februar 1939.

I. Korrekturen, Druckfehlerberichtigungen usw. (Corrigenda).

(Die Fehler sind handschriftlich im Index richtig zu stellen.)

- Seite 10: Zur gefl. Beachtung: „Seite 5 sind . . .“ lies: „Seite 5 und 111“ sind . . .
Seite 11: *Aethephyllum pinnatifidum* „(L.)“ N.E.Br. lies: „(L. f.)“ N.E.Br.
Seite 11: *Agnirictus* „agninum“ lies: *Agnirictus* „agninus“.
Seite 14: *Argyroderma brevipes* (Schltr.) „Schwant.“ lies: „L.Bol.“
Seite 17: *Argyroderma Villetii* L.Bol. „S.G. (1924) 198“ lies: „S.G. (1927) 198“;

D 32-149/681a

20, -

- Seite 17: *Aridaria brevifolia* L.Bol. „L.B. I. 127“ lies: „L.B. II. 27“.
- Seite 18: *Aridaria caudata* L.Bol. „L.B. I. 65“ lies: „L.B. I. 66“
- Seite 18: *Aridaria „flexuosum“* (Haw.) Schwant.
lies: „*flexuosa*“.
- Seite 19: *Aridaria „nutans“* L.Bol. lies: „*mutans*“ L.Bol.
- Seite 20: *Aridaria parvisepala* L.Bol. forma *fera* L.Bol. ist abzuändern wie folgt: „*Aridaria parvisepala* L.Bol. forma *fera* L.Bol. (*Aridaria gibbosa* L.Bol.). — Kl.-Nama-land, 2 miles nordöstl. Walle Kraal. — L.B. II. 70 (*A. gibbosa*), 129“.
- Seite 22: *Aspazoma* N.E.Br. „G.C. (1925. I) 413“;
lies: „G.C. (1925. II) 413“;
- Seite 26: *Carpobrotus „abbreviatum“* Schwant. lies: „*abbreviatus*“.
- Seite 34: *Cheiridopsis aspera* L.Bol. „L.B. III. 133“
lies: „L.B. II. 133“.
- Seite 34: *Cheiridopsis Braunsii* Schwant. = „*Arguroderma Braunsii* Schwant. lies: „*Argyroderma*“.
- Seite 38: *Cheiridopsis Schickiana* Tisch. „D.K.G. (1927/28) 122, 350“ lies: „D.K.G. (1927/28) 121, 350“;
- Seite 47: *Conophytum halenbergense* „(Dur. et Schwant.)“
N.E.Br. lies: „(Dtr. et Schwant.)“ N.E.Br.
- Seite 51: *Conophytum obconellum* „N.E.Br.“ = lies: „Schwant.“ =
- Seite 51: *Conophytum obcordellum* (Haw.) N.E.Br. (*Mes. obcordellum* Haw., *Con. obconellum* „N.E.Br.“). —
lies: „Schwant.“ —
- Seite 52: *Conophytum Peersii* Lavis „J.B. (1929) 77“
lies: „J.B. (1930) 77“.
- Seite 54: *Conophytum Renniei* „Davis“ lies: „Lavis“.
- Seite 56: *Conophytum riolaciflorum* Schick et Tisch. —
„M.D.G.Ztg. (1928) 239“ lies: „M.D.G.Ztg. (1928) 238“.
- Seite 57: *Corpuscularia „molle“* Schwant. = *Ruschia „molle“*
Schwant. lies: „*mollis*“.
- Seite 57: *Corpuscularia „quarziticum“* Schwant. lies: „*quarzitica*“.
- Seite 60: *Cryophytum „Nelsoniae“* L.Bol. lies: „*Neilsoniae*“
L.Bol.
- Seite 63: *Delosperma dunense* L.Bol. „L.B. II. 36“
lies: „L.B. II. 56“.
- Seite 68: *Derenbergia „velutinum“* Schwant. lies: „*velutina*“.
- Seite 69: *Dinteranthus „microsperma“* lies: „*microspermus*“.
- Seite 70: *Dorotheanthus bellidiformis* (Burm.) N.E.Br. —
„G.C. (1937. II) 228“ lies: „G.C. (1927. II) 228“.
- Seite 76: *Drosanthemum „Stoket“* L.Bol. lies: „*Stokoet*“ L.Bol.
- Seite 76: *Drosanthemum vaginatum* L.Bol. — „L.B. II. 139“
lies: „L.B. II. 138“.

- Seite 80: *Erepsia „restiophilum“* L.Bol. lies: „*restiophila*“ L.Bol.
- Seite 81: *Erepsia tuberculata* N.E.Br. — „L.B. I. 123“ lies: „G.C. (1926. II) 150; L.B. I. 123“.
- Seite 91: *Hereroa „Wilmanae“* L.Bol. lies: „*Wilmaniae*“ L.Bol.
- Seite 91: *Hereroa „Wilmanae“* L.Bol. var. *langebergensis* L.Bol. lies: „*Wilmaniae*“
- Seite 93: *Hymenocyclus uitenhagensis* L.Bol. „L.B. II. 119“ lies: „L.B. II. 118“.
- Seite 94: *Juttadinteria kovisimontana* „Dtr.“ lies: „(Dtr.) Schwant.“
- Seite 96: *Lampranthus Comptonii* (L.Bol.) N.E.Br. var. „*roseum*“ L.Bol. lies: „*roseus*“ L.Bol.
- Seite 106: *Lithops Julii* „(Dur. et Schwant.)“ N.E.Br. var. *reticulata* Tisch. lies: „(Dtr. et Schwant.)“ N.E.Br.
- Seite 110: *Mentocalyx „velutinum“* Schwant. lies: „*velutina*“.
- Seite 112: *Mesembr. „allicuta“* N.E.Br. = lies: „*albicuta*“.
- Seite 112: *Mesembr. amicorum* L.Bol. = *Ruschia „amicora*“ Schwant. lies: „*amicorum*“.
- Seite 112: *Mesembr. amplexicaule* L.Bol. = *Leipoldtia „amplexicaule*“ L.Bol. lies: „*amplexicaulis*“.
- Seite 128: *Mesembr. introrsum* „Hook.f. = *Trichodiadema introrsum* Schwant.“ ändern in:
Mesembr. introrsum „Haw. = *Trichodiadema decorum* (N.E.Br.) Stearn“.
- Seite 129: *Mesembr. kovisimontanum* Dtr. = *Juttadinteria kovisimontana* „Dtr. et Schwant.“ lies: „Schwant.“
- Seite 134: *Mesembr. „maturatum“* L.Bol. lies: „*matutinum*“ L.Bol.
- Seite 134: *Mes. micropetala* N.E.Br. = *Ruschia „microsperma*“ L.Bol. lies: „*micropetala*“ L.Bol.
- Seite 136: *Mes. obcordellum* „Marl.“ lies: „Haw.“
- Seite 137: *Mesembr. „Otzeanum“* Dtr. = *Psilocaulon „Otzeanum*“ L.Bol. lies: *Mesembr. „Otzenianum“* Dtr. = *Psilocaulon „Otzenianum*“ L.Bol.
- Seite 166: *Psilocaulon „Otzeanum“* (Dtr.) L.Bol. — (*Mes. „Otzeanum“* Dtr.). — lies: *Psilocaulon „Otzenianum*“ (Dtr.) L.Bol. — (*Mes. „Otzenianum“* Dtr.). —
- Seite 169: *Rabiea „caroliniensis*“ N.E.Br. — *Khadia „caroliniensis*“ L.Bol. lies: *Rabiea „carolinensis*“ N.E.Br. — *Khadia „carolinensis*“ L.Bol.
- Seite 170: *Rimaria „angusta*“ L.Bol. lies: „*angusta*“ L.Bol.
- Seite 171: *Roodia brevipes* L.Bol. = „*Arguroderma*“ *brevipes* L.Bol. lies: „*Argyroderma*“

- Seite 171: *Ruschia „amicora“* (L.Bol.) Schwant. lies: „*amirorum*“.
- Seite 173: *Ruschia „canonotata“* (L.Bol.) Schwant. — (*Mes. „canonotatum“* L.Bol.) lies: „*caninotata*“ bzw. „*caninotatum*“.
- Seite 197: *Trichodiadema intonsum* (Haw.) Schwant. —
Streichen: Synonym (*Mes. intosum* Hook.f.).

II. Nachträge und Neue Arten

(Addenda et species novae).

- Aridaria Framesii* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis., nahe Van Rhynsdorp. — L.B. II. 4.
- Aridaria longisepala* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Abhänge zwischen Pakhuis und Doornbusch-River-Bridge. — L.B. III. 119.
- Bergeranthus addoensis* L.Bol. — Uitenhage Divis., Addo Bush. — L.B. III. 120.
- Bergeranthus concavus* L.Bol. — Bei East London. — L.B. III. 120.
- Bergeranthus firmus* L.Bol. — Port Elizabeth Distr., bei Swartkops River. — L.B. III. 121.
- Chasmatophyllum Braunsii* Schwant. var. *major* L.Bol. — Bei Victoria West. — L.B. III. 121.
- Cheiridopsis Brownii* Schick et Tisch. — Klein-Namaland. — M.D.G.Ztg. (1928) 248.
- Cheiridopsis quaternifolia* L.Bol. — Bushmanland, Weg von Nieuwefontein nach Brakfontein. — L.B. III. 122.
- Cheiridopsis subaequalis* L.Bol. — Kl.-Namaland, längs des Weges von Hoit nach Concordia. — L.B. III. 122.
- Conophytum difforme* L.Bol. — Kl.-Namaland, Richtersveld, Reinhogte. — L.B. III. 115, 117, C.J.VI. 51.
- Conophytum lithopoides* L.Bol. — Bushmanland, Pofadder. — L.B. III. 138.
- Conophytum obovatum* Lavis var. *obtusum* L.Bol. — Van Rhynsdorp Divis. — L.B. III. 132.
- Conophytum Pole-Eransii* N.E.Br. — Kl.-Namaland, längs des Weges von Porth Nolloth nach Steinkopf, „at 28 miles from the former, almost on the border of the Richtersveld“. — J.C.S. II (1931) 429; L.B. III. 116; C.J. VI. 51.
- Conophytum Ruschii* Schwant. — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G.B. I (1938) 88.
- Conophytum Schlechteri* Schwant. — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G.B. I (1938) 89.
- Conophytum Sitzlerianum* Schwant. — Kl.-Namaland, genauer Standort unbekannt. — D.K.G.B. I (1938) 14.

- Conophytum Tischleri* Schwant. — Kl.-Namaland, Aribies bei Steinkopf. — D.K.G.B. I (1938) 15.
- Conophytum Triebneri* Schwant. — Bushmanland, Pofadder. — D.K.G.B. I (1938) 88.
- Conophytum Wiesemannianum* Schwant. — Bushmanland, Garies. — D.K.G.B. I (1938) 16.
- Delosperma alivalensis* L.Bol. — Bei Aliwal North. — L.B. III. 123.
- Delosperma brevisepalum* L.Bol. var. *major* L.Bol. — S.-Afr., zwischen Queenstown und Adelaide. — L.B. III. 123.
- Delosperma incomptum* (Haw.) L.Bol. var. *gracile* L.Bol. — (*Mes. incomptum* Haw.). — L.B. I. 142.
- Delosperma ornatulum* N.E.Br. — S.-Afr., Graaf Reinet Divis. bis Orange Free State. — B. Mag. 154 (1931) Tab. 9240.
- Delosperma Rogersii* (Schönl. et Bgr.) L.Bol. — (*Mes. Rogersii* Schönl. et Bgr.). — S.-Afr. — L.B. II. 63.
- Delosperma saturatum* L.Bol. — Zululand, Gonzoga bei Qudeni. — L.B. III. 124.
- Dicrocaulon humile* N.E.Br. — Kapland. — J.B. (1928) 142.
- Dicrocaulon nodosum* N.E.Br. — Kapland. — J.B. (1928) 142.
- Dicrocaulon spissum* N.E.Br. — Kapland. — J.B. (1928) 142.
- Dorotheanthus Muiri* N.E.Br. — Kapland. — G.C. (1929. I) 244.
- Dorotheanthus oculatus* N.E.Br. — Kapland. — G.C. (1929. I) 244.
- Drosanthemum larum* L.Bol. — Robertson Divis., Robertson. — L.B. III. 138.
- Faucaria grandis* L.Bol. — Albany Divis., Standort unbekannt. — L.B. III. 125.
- Gibbaeum Haagei* Schwant. — S.-Afr., Standort unbekannt. — D.K.G.B. I (1938) 89.
- Glottiphyllum Cilliersiae* Schwant. — Oudtshoorn Divis., 15 miles südl. Oudtshoorn. — D.K.G.B. I (1938) 91.
- Lampranthus Degreanus* (Sond.) N.E.Br. — (*Mes. Degreanum* Sond.). — S.-Afr. — G.C. (1930. I) 212.
- Lampranthus parvus* (L.Bol.) N.E.Br. — (*Mes. tenue* L.Bol.). — S.-Afr. — G.C. (1930. I) 212.
- Leipoldtia grandifolia* L.Bol. — Sw.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 125.
- Machairophyllum brevifolium* L.Bol. — Oudtshoorn. — L.B. III. 126.
- Machairophyllum latifolium* L.Bol. — Oudtshoorn. — L.B. III. 126.
- Macrocaulon Candollei* (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. Candollei* Haw.). — S.-Afr. — G.C. (1927. I) 12.

- Mesembr. Berghiae* L.Bol. — Clanwilliam Divis., in Sand zwischen Pakhuis und Nardouw. — **L.B. III. 127.**
- Mesembr. liberale* L.Bol. — S.-Afr., Standort unbekannt. — **L.B. III. 128.**
- Nananthus Malherbei* L.Bol. — Calvinia Divis., bei Calvinia. — **L.B. III. 131.**
- Nananthus Villetii* L.Bol. — Bushmanland. — **L.B. III. 131.**
- Nelia Pillansii* (N.E.Br.) Schwant. — (*Sterropetalum Pillansii* N.E.Br.). — Kl.-Namaland. — **G.C. (1928, I) 266 (Sterr. Pill.); D.K.G. (1929) 16.**
- Odontophorus angustifolius* L.Bol. — Kl.-Namaland. Kosies. — **L.B. III. 128.**
- Ruschia caudata* L.Bol. — Malmesbury Divis. — **L.B. III. 129.**
- Schwantesia Borchersii* L.Bol. — Upington Divis., Kurop Valley. — **L.B. II. 86.**
- Schwantesia Pillansii* L.Bol. — Bushmanland, Kenhardt Divis., zwischen Pofadder und Kakamas. — **L.B. II. 86.**
- Stomatium acutifolium* L.Bol. — Bei Beaufort West. — **L.B. III. 130.**
- Stomatium Villetii* L.Bol. — Bei Beaufort West. — **L.B. III. 129.**
- Trichodiadema tenue* L.Bol. — Mossel Bay Divis., Brak River. — **L.B. III. 130.**

III. Neue Umbenennungen (Combinationes novae).

- Cheiridopsis Peersii* L.Bol. — (*Mes. canum* [Haw.] Bgr.? *Nananthus Peersii* L.Bol., *Aloinopsis Peersii* L.Bol., *Nananthus Soehlemannii* Hge. jr., *Deilanthus Peersii* N.E.Br.). — Cape Prov., Karroo Reg., nahe Miller, nahe Willowmoore, Laingsburg Divis., nahe Matjesfontein, Prince Albert Divis., Karroo, nahe Klaarstroom. — **B.M.P. 279 (Mes. canum Haw.: es erscheint sehr zweifelhaft, ob die von Berger angegebene Beschreibung mit der von Haworth übereinstimmt!); A.B.H. IV. 104 (Nan. Peersii); S.G. (1929) 245, 288 (Al. Peersii); G.C. (1931, I) 259 (Deil. Peersii); D.K.G. (1937) 163 (Nan. Soehlemannii); F.R. XLIII, 227 (Deil. Peersii); L.B. III. 137 (non L.B. III. 50!).**
- Cheiridopsis Peersii* L.Bol. in L.B. III. 50 = *Cheiridopsis Victoris* L.Bol. (sh. L.B. III. 137).
- Drosanthemum lique* (N.E.Br.) Schwant. — (*Mes. obliquum* Haw., *Mes. lique* N.E.Br., *Drosanthemum obliquum* [Haw.] Schwant.). — S.-Afr., auf Hügeln am Zwartkops-Fluß. — **B.M.P. 96 (Mes. obliquum); N.E.Br.M. 103 (Mes. lique); D.K.G. (1927/28) 31 (Dros. obl.); D.K.G. (1927/28) 30; C.J. VII, 78, Fußnote 80.**
- Hereroa uncipetala* (N.E.Br.) L.Bol. — (*Prepodasma uncipetala* N.E.Br.). — Griqualand West, nahe Campbell. — **G.C. (1931, I) 389 (Prepod. uncipetala); L.B. III. 135.**

- Nananthus Broomii*** L.Bol. — (*Aloinopsis Broomii* L.Bol.). — Transvaal, bei Maquassi. — L.B. II. 474 (*Al. Broomii*); L.B. III. 133.
- Nananthus crassipes*** (Marl.) L.Bol. — (*Mes. crassipes* Marl., *Aloinopsis crassipes* L.Bol., *Titanopsis crassipes* N.E.Br.). — Sutherland Divis., Waterkloof nahe Sutherland. — Fl.Pl. II. Pl. 73 (*Mes. crassipes*); S.G. (1929) 245 (*Al. crassipes*); G.C. (1931, I) 14 (*Titan. crassipes*); L.B. III. 133.
- Nananthus Gerstneri*** L.Bol. — (*Aloinopsis Gerstneri* L.Bol.). — Alival North Divis., zwischen Alival North und Doctor's Drift. — L.B. II. 46 (*Aloinopsis Gerstn.*); L.B. III. 134.
- Nananthus Jamesii*** L.Bol. — (*Aloinopsis Jamesii* L.Bol.). — Cradock, Berge bei Halesowen. — L.B. II. 294 (*Al. Jamesii*); L.B. III. 133.
- Nananthus Lodevykii*** L.Bol. — (*Aloinopsis Lodevykii* L.Bol.). — Bushmanland. — L.B. III. 47 (*Al. Lodew.*); L.B. III. 134.
- Nananthus Loganii*** L.Bol. — (*Aloinopsis Loganii* L.Bol.). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein. — L.B. II. 397 (*Al. Loganii*); L.B. III. 134.
- Nananthus Luckhoffii*** L.Bol. — (*Titanopsis Luckhoffii* L.Bol.). — Kl.-Namaland, 100 miles südöstl. von Springbok. — L.B. II. 307 (*Titanopsis Luckh.*); S.G. (1931) 316 (*Titanopsis Luckh.*); L.B. III. 134; D. (1938) 52 (*Tit. Luckh.*).
- Nananthus Orpenii*** (N.E.Br.) L.Bol. — (*Mes. Orpenii* N.E.Br., *Aloinopsis Orpenii* L.Bol., *Prepodesma Orpenii* N.E.Br.). — Griqualand West, nahe Campbell. — G.C. (1921, II) 303 (*Mes. Orpenii*); S.G. (1929) 288 (*Al. Orp.*); G.C. (1931, II) 389 (*Prep. Orp.*); L.B. III. 133.
- Nananthus pallens*** L.Bol. — (*Aloinopsis pallens* L.Bol.). — Gordonias Divis., bei Upington. — L.B. II. 473 (*Al. pallens*); L.B. III. 134.
- Nananthus Schooneesii*** L.Bol. — (*Aloinopsis Schooneesii* L.Bol.). — Willowmoore, bei Steytlerville. — L.B. II. 295 (*Al. Schoon.*); D.K.G. (1934) 53 (*Al. Schoon.*); L.B. III. 134.
- Nananthus Wilmaniae*** L.Bol. — (*Aloinopsis Wilmaniae* L.Bol.). — Griqualand West. — L.B. II. 397 (*Al. Wilm.*); L.B. III. 134.
- Neohenricia*** L.Bol. (*Henricia* L.Bol.) L.B. III. 39 (*Henricia*); Journ. S. Afr. Bot. 4, 51 (1938).
- Neohenricia Sibbettii*** (L.Bol.) L.Bol. — (*Mes. Sibbettii* L.Bol., *Henricia Sibbettii* L.Bol.). — Orange Free State, Fauresmith Divis., Oorlog's Poort; Farm Pampoenpoort, 10 miles westl. Victoria West. — L.B. II. 251 (*Mes. Sibb.*); L.B. III. 39 (*Henricia Sibb.*); South Afr. Bot. 4, 51 (1938).
- Rabiea Comptonii*** L.Bol. — (*Nananthus Comptonii* L.Bol.). — Orange Free State, bei Bloemfontein. — L.B. II. 120 (*Nananth.*

- Compt.*); L.B. III. 134. (Nach N.E.Brown in G.C. [1931. I] 53 identisch mit *Rabiea albinota* [Haw.] N.E.Br.).
- Rabiea difformis*** L.Bol. — (*Nananthus difformis* L.Bol.). — Cradock Divis., bei Cradock. — L.B. II. 392 (*Nan. diff.*); L.B. III. 134.
- Rabiea Jamesii*** L.Bol. — (*Nananthus Jamesii* L.Bol.). — Cradock Divis., Berge bei Halsowen. — L.B. II. 304 (*Nanan. Jamesii* [non L.B. III. 133!]); L.B. III. 134.
- Rhinephyllum Frithii*** L.Bol. — (*Mes. Frithii* L.Bol., *Peersia Frithii* L.Bol.). — S.-Afr., Aberdeen Road (Weg), Grootfontein. — A.B.H. III. 125 (*Mes. Frithii*); L.B. II. 94 (*Peersia Frithii*); L.B. III. 135.
- Rhinephyllum macradenium*** L.Bol. — (*Mes. macradenium* L.Bol., *Peersia macradenia* L.). — Ceres Karroo, am Beukerfontein Road (Weg). — Ann. S. Afr. Mus. IX (1913) 143 (*Mes. macr.*); Fl. Pl. VII. Pl. 264 (*Peersia macr.*); L.B. III. 135.
- Trichodiadema barbatum*** (L.) Schwant. — (*Mes. barbatum* L., *Mes. barbatum* var. β Haw., *Mes. barbatum* Curtis, *Mes. stelligerum* Haw., *Trichodiadema stelligerum* [Haw.] Schwant.). — Karroo bei Cradock, Beaufort auf Hügeln im Zwartland, Karasberge, mittl. Abhänge des Scharfenstein. — B.M.P. 80 (*Mes. barb.*); A.B.H. 1. 18 (*Mes. barb.*); B.M.P. 82 (*Mes. stelligerum*); D.K.G. (1925/26) 188; D.K.G. (1925/26) 188 (*Trichod. stellig.*); D.K.G. (1927/28) 106 (*Trichod. stellig.*); C.J. VII. 74, Fußnote 30.
- Vanheerdia*** L.Bol. — L.B. III. 136.
- Vanheerdia angusta*** L.Bol. — (*Rimaria angusta* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Bushmanland. — L.B. III. 66, 67 (*Rim. angusta*); L.B. III. 136.
- Vanheerdia divergens*** L.Bol. — (*Rimaria divergens* L.Bol.). — Bushmanland, Nieuwefontein, am Wege nach Calvinia. — L.B. III. 66, 67 (*Rim. diverg.*); L.B. III. 136.
- Vanheerdia Primosii*** L.Bol. — (*Rimaria Primosii* L.Bol.). — Bushmanland, zwischen Farm Gamoeep und Dabeep. — L.B. II. 411 (*Rim. Primosii*); L.B. III. 66 (*Rim. Prim.*); L.B. III. 136.
- Vanheerdia Roodiae*** (N.E.Br.) L.Bol. — (*Rimaria Roodiae* N.E.Br.). — Kl.-Namaland, Bushmanland. — G.C. (1926, I) 79, 156 (*Rim. Roodiae*); D.K.G. (1927/28) 226 (*Rim. Roodiae*); M. 290 (*Rim. Roodiae*); L.B. III. 66 (*Rim. Roodiae*); L.B. III. 136.

IV. Neue Namensübertragungen (Transitiones novae).

- Aridaria albicaulis*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. albicaule* Haw.). — S.-Afr. — M.G.A. et M. § 44, Fig. 5 (*Mes. alb.*); C.J. VIII. 73, Fußnote 23.

- Aridaria geniculiflora* (L.) N.E.Br.** — (*Mes. geniculiflorum* L.). — S.-Afr. — B.M.P. 63 (*Mes. geniculifl.*); C.J. VII. 77, Fußnote 62.
- Aridaria notha* (N.E.Br.) N.E.Br.** — (*Mes. acuminatum* S.D., *Mes. nothum* N.E.Br.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — M.G.A. et M. § 44, Fig. 4 (*Mes. acuminatum*); N.A.Br.M. 100 (*Mes. nothum*); C.J. VII, 73, Fußnote 18.
- Aridaria plenifolia* (N.E.Br.) Stearn.** — (*Mes. fastigiatum* Haw., *Mes. plenifolium* N.E.Br., *Aridaria fastigiata* [Haw.] Schwant.). — S.-Afr. — B.M.P. 120 (*Mes. fastig.*); *Bothalia* I. 155 (1923) (*Mes. plenifol.*); Gfl. (1928) 69 (*Arid. fastig.*); C.J. VII, 76, Fußnote 58.
- Aridaria spinulifera* (Haw.) N.E.Br.** — (*Mes. spinuliferum* Haw.). — S.-Afr. — B.M.P. 66 (*Mes. spinul.*); C.J. VII. 80, Fußnote 99.
- Drosanthemum erigeriflorum* (Jacq.) Stearn.** — (*Mes. erigeriflorum* Jacq., *Mes. brevifolium* S.D.). — S.-Afr. — Hort. Schönbr. 4. 39. Tab. 477 (1804) (*Mes. erigerifl.*); M.G.A. et M. § 50, Fig. 4 (*Mes. brevifol.*); C.J. VII. 74, Fußnote 39.
- Trichodiadema decorum* (N.E.Br.) Stearn.** — (*Mes. introrsum* Haw.). — Bot. Mag. 99 (1873) Tab. 6057 (*Mes. introrsum* Haw. sec. Hook. f.).
- Trichodiadema hirsutum* (Haw.) Stearn.** — (*Mes. barbatum* var. ♂ L., *Mes. hirsutum* Haw., *Mes. stellatum* D.C., *Mes. barbatum* var. *hirsutum* Willd. [? J.]). — S.-Afr. — C.J. VII. 74, Fußnote 30, desgl. 80, Fußnote 100.

V. Neue Bezeichnung (Nomen novum).

- Cheiridopsis Victoris* L.Bol.** — (*Cheir. Peersii* L.Bol.). — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — L.B. III. 59 (*Ch. Peersii*); L.B. III. 137.

VI. Hinweise, welche infolge der neuen Umbenennungen abzuändern bzw. infolge der Ergänzungen einzufügen sind, desgl. Synonyma.

- Aloinopsis Broomii* L.Bol. = *Nananthus Broomii* L.Bol.
Aloinopsis crassipes L.Bol. = *Nananthus crassipes* L.Bol.
Aloinopsis Gerstneri L.Bol. = *Nananthus Gerstneri* L.Bol.
Aloinopsis Jamesii L.Bol. = *Nananthus Jamesii* L.Bol. (L.B. III. 134, non L.B. II. 304!).
Aloinopsis Lodewykii L.Bol. = *Nananthus Lodewykii* L. Bol.
Aloinopsis Loganii L.Bol. = *Nananthus Loganii* L.Bol.
Aloinopsis Orpenii L.Bol. = *Nananthus Orpenii* L.Bol.
Aloinopsis pallens L.Bol. = *Nananthus pallens* L.Bol.
Aloinopsis Peersii L.Bol. = *Cheiridopsis Peersii* L.Bol. (in L.B. III. 137, non 50!).

Aloinopsis Schooneesii L.Bol. = *Nananthus Schooneesii* L.Bol.

Argyroderma Braunsii Schwant.

einfügen: Syn. (*Roodia Braunsii* Schwant.) Gw. (1929) 69.

Aloinopsis Wilmaniae L.Bol. = *Nananthus Wilmaniae* L.Bol.

Aridaria fastigiata (Haw.) Schwant. = *Aridaria planifolia* Stearn.

Aridaria gibbosa L.Bol. in L.B. II. 70 = *Aridaria parvisepala* L.Bol. forma *fera* L.Bol. (siehe Corrigenda L.B. II. 129).

Cheiridopsis Peersii L.Bol. (in L.B. III. 50, non 137!) = *Cheiridopsis Victoris* L.Bol.

Conophyllum clivorum (N.E.Br.) Schwant.

einfügen: Syn. (*Schwantesia clivorum* L.Bol.) S.G. (1928) 279.

Conophyllum cognatum (N.E.Br.) Schwant. einfügen: Syn. (*Schwantesia cognatum* L.Bol.) S.G. (1928) 279.

Conophyllum dissitum (N.E.Br.) Schwant.

einfügen: Syn. (*Schwantesia dissita* L.Bol.) S.G. (1928) 279.

Conophyllum proximum (N.E.Br.) Schwant.

einfügen: Syn. (*Schwantesia proxima* L.Bol.) S.G. (1928) 279.

Deilanthus Peersii N.E.Br. = *Cheiridopsis Peersii* L.Bol. (L.B. 137, non 50!).

Drosanthemum brevifolium (Ait.) Schwant. streichen: Synonym: (*Mes. erigeriflorum* Jacq.).

Drosanthemum obliquum (Haw.) Schwant. = *Drosanthemum lique* Schwant.

Henricia L.Bol. = *Neohenricia* L.Bol.

Henricia Sibbettii L.Bol. = *Neohenricia Sibbettii* L.Bol.

Mesembryanthemum acuminatum S.D. = *Aridaria notha* N.E.Br.

Mesembryanthemum albicaule Haw. = *Aridaria albicaulis* N.E.Br.

Mesembryanthemum barbatum Curtis = *Trichodiadema barbatum* Schwant.

Mesembryanthemum var. β Haw. = *Trichodiadema barbatum* Schwant.

Mesembryanthemum barbatum var. β L. = *Trichodiadema hirsutum* Stearn.

Mesembryanthemum barbatum var. *hirsutum* Willd. = *Trichodiadema hirsutum* Stearn.

Mesembryanthemum brevifolium S.D. = *Drosanthemum erigeriflorum* Stearn.

Mesembryanthemum Candollii Haw. = *Macrocaulon Candollii* N.E.Br.

Mesembryanthemum canum (Haw.) Bgr. = *Cheiridopsis Peersii* L.Bol.

Mesembryanthemum crassipes Marl. = *Nananthus crassipes* L.Bol.

Mesembryanthemum Dregeanum Sond. = *Lampranthus Degreanus* N.E.Br.

- Mesembryanthemum erigeriflorum* Jacq. = ***Drosanthemum erigeriflorum*** Stearn.
- Mesembryanthemum fastigiatum* Haw. = ***Aridaria plenifolia*** Stearn.
- Mesembryanthemum Frithii* L.Bol. = *Rhinephyllum Frithii* L.Bol.
- Mesembryanthemum geniculiflorum* L. = ***Aridaria geniculiflora*** N.E.Br.
- Mesembryanthemum hirsutum* Haw. = ***Trichodiadema hirsutum*** Stearn.
- Mesembryanthemum incomptum* Haw. = ***Delosperma incomptum*** L.Bol.
- Mesembryanthemum insidens* N.E.Br. = ***Ruschia insidens*** L.Bol.
- Mesembryanthemum lique* N.E.Br. = ***Drosanthemum lique*** Schwant.
- Mesembryanthemum macradenium* L.Bol. = ***Rhinephyllum macradenium*** L.Bol.
- Mesembryanthemum nothum* N.E.Br. = ***Aridaria notha*** N.E.Br.
- Mesembryanthemum obliquum* Haw. = ***Drosanthemum lique*** Schwant.
- Mesembryanthemum Orpenii* N.E.Br. = ***Nananthus Orpenii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum plenifolium* N.E.Br. = ***Aridaria plenifolia*** Stearn.
- Mesembryanthemum Rogersii* Schönk. et Bgr. = ***Delosperma Rogersii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Sibbettii* L.Bol. = ***Neohenricia Sibbettii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum spinuliferum* Haw. = ***Aridaria spinulifera*** N.E.Br.
- Mesembryanthemum stellatum* D.C. = ***Trichodiadema hirsutum*** Stearn.
- Mesembryanthemum stelligerum* Haw. = ***Trichodiadema barbatum*** Schwant.
- Mesembryanthemum tenue* L.Bol. = ***Lampranthus parvus*** N.E.Br.
- Monilaria chrysoteuca*** (Schlecht.) Schwant.
 einfügen: Syn. (*Schwantesia chrysoteuca* L.Bol., *Schwantesia scutata* L.Bol.). — S.G. (1928) 279.
- Nananthus Comptonii* L.Bol. = ***Rabiea Comptonii*** L.Bol.
- Nananthus difformis* L.Bol. = ***Rabiea difformis*** L.Bol.
- Nananthus Jamesii* L.Bol. (L.B. II. 304, non L.B. III. 134!) = ***Rabiea Jamesii*** L.Bol.
- Nananthus Peersii* L.Bol. = ***Cheiridopsis Peersii*** L.Bol. (L.B. III. 137, non 50!).
- Nananthus Sochlemani* Hgr. jr. = ***Cheiridopsis Peersii*** L.Bol. (L.B. III. 137, non 50!).
- Nelia Meyeri*** Schwant. — Zu streichen ist: Synonym: *Sterropetalum Pillansii* N.E.Br., ebenfalls die Literaturangabe: G.C. (1928, I) 266 (Sterr. Pill.).

Oophytum oriforme N.E.Br. — Einfügen: Synonym (*Mes. oriforme* N.E.Br.).

Peersia Frithii L.Bol. = ***Rhinephyllum Frithii*** L.Bol.

Peersia macradenium L.Bol. = ***Rhinephyllum macradenium*** L.Bol.

Prepodesma Orpenii N.E.Br. = ***Nananthus Orpenii*** L.Bol.

Prepodesma uncipetala N.E.Br. = ***Hereroa uncipetala*** L.Bol.

Rimaria angusta L.Bol. = ***Vanheerdiia angusta*** L.Bol.

Rimaria divergens L.Bol. = ***Vanheerdiia divergens*** L.Bol.

Rimaria Primosii L.Bol. = ***Vanheerdiia Primosii*** L.Bol.

Rimaria Roodiae N.E.Br. = ***Vanheerdiia Roodiae*** L.Bol.

Roodia Braunsii Schwant. = ***Argyroderma Braunsii*** Schwant.

Ruschia ceresiana L.Bol. = ***Ruschia ceresiana*** Schwant.

Schwantesia chrysoleuca L.Bol. = ***Monilaria chrysoleuca*** Schwant.

Schwantesia clivorum L.Bol. = ***Conophyllum clivorum*** Schwant.

Schwantesia cognata L.Bol. = ***Conophyllum cognatum*** Schwant.

Schwantesia dissita L.Bol. = ***Conophyllum dissitum*** Schwant.

Schwantesia scutata L.Bol. = ***Monilaria chrysoleuca*** Schwant.

Sterroptelatum Pillansii N.E.Br. = ***Nelia Pillansii*** Schwant.

Titanopsis crassipes N.E.Br. = ***Nananthus crassipes*** L.Bol.

Titanopsis Luckhoffii L.Bol. = ***Nananthus Luckhoffii*** L.Bol.

Trichodiadema stellatum (Mill.) Schwant. —

zu streichen sind die Synonyma: (*Mes. barbatum* var. β L., *Mes. barbatum* var. *hirsutum* Willd., *Mes. hirsutum* Haw.).

Trichodiadema stelligerum (Haw.) Schwant. = ***Trichodiadema barbatum*** Schwant.

VII. Literaturzitate — Nachträge.

Acaulon N.E.Br. — L.B. III. 133.

Aistocaulon v. P. — B.M.J. (1938) 157.

Aistocaulon rosulatum (Kensit) v. P. — B.M.J. (1938) 158.

Aloinopsis Schwant. — L.B. III. 133; B.M.J. (1938) 153, 157.

Aridaria straminicolor L.Bol. — L.B. III. 137.

Cheiridopsis purpurascens L.Bol. var. ***Leipoldtii*** L.Bol. — D. (1938) 147.

Conophyllum album L.Bol. var. ***plenum*** L.Bol. — C.J. VI. 69.

Conophyllum bilobum (Marl.) N.E.Br. — C.J. VI. 70.

Conophyllum blandum L.Bol. — C.J. VII. 52.

Conophyllum citrinum L.Bol. — C.J. VI. 69.

Conophyllum concarum L.Bol. — C.J. VII. 52.

Conophyllum connatum L.Bol. — L.B. III. 119; C.J. VI. 51.

Conophyllum cordatum Schick et Tisch. var. ***macrostigma*** L.Bol. — C.J. VI. 70.

Conophyllum eenkokerense L.Bol. — C.J. VII. 55.

Conophyllum Fulleri L.Bol. — C.J. VII. 54.

- Conophytum halenbergense* (Dtr. et Schwant.) N.E.Br. — L.B. III. 117; C.J. VI. 51.
- Conophytum hians* N.E.Br. — L.B. III. 117; C.J. VI. 51.
- Conophytum lekkersingense* L.Bol. — L.B. III. 116; C.J. VI. 51.
- Conophytum lericulum* N.E.Br. — S. (1939) 16.
- Conophytum marginatum* Lavis. — C.J. VII. 52.
- Conophytum Meyerae* Schwant. — C.J. VI. 70.
- Conophytum minutum* N.E.Br. — S. (1938) 120.
- Conophytum modestum* L.Bol. — C.J. VI. 69.
- Conophytum mundum* N.E.Br. — S. (1938) 146.
- Conophytum muscosipapillatum* Lavis. — L.B. III. 119; C.J. VI. 52.
- Conophytum obcordellum* (Haw.) N.E.Br. — M.D.G.Ztg. (1927) 316 (*Con. obcon.*).
- Conophytum Primosii* Lavis. — C.J. VII. 55.
- Conophytum pubicalyx* Lavis. — C.J. VII. 54.
- Conophytum regale* Lavis. — C.J. VII. 52.
- Conophytum parvulum* L.Bol. — C.J. VI. 69.
- Conophytum salmonicolor* L.Bol. — L.B. III. 133. — Kurkamborgen, bei Koonmaggas (Locus datus Koufontein erratum est!).
- Conophytum turrigerum* N.E.Br. — C.J. VII. 54.
- Conophytum Villetii* L.Bol. — L.B. III. 133. — Bushmanland, bei Nieuwefontein (Locus datus Kl.-Karoo erratum est!).
- Conophytum violaciflorum* Schick et Tisch. — C.J. VII. 55.
- Conophytum vlakmynense* L.Bol. — C.J. VI. 69.
- Deilanthus* N.E.Br. — L.B. III. 136.
- Delosperma aberdeenense* N.E.Br. — S. (1939) 19.
- Delosperma Brunthaleri* (Bgr.) Schwant. — S. (1939) 19.
- Delosperma lineare* L.Bol. — L.B. I. 143.
- Fenestraria aurantiaca* N.E.Br. — G.C. (1927, II) 263.
- Fenestraria rhopalophylla* (Schltr. et Diels) N.E.Br. — G.C. (1927, II) 263.
- Gibbaeum Nebrownii* (N.E.Br.) Tisch. — S. (1938) 66.
- Glottiphyllum Haagei* Tisch. — M.D.G.Ztg. (1928) 394.
- Khadia carolinensis* L.Bol. — B.M.J. (1938) 160.
- Lithops Mennellii* L.Bol. — S. (1939) 7.
- Lithops Vanzijlii* L.Bol. — S. (1938) 91.
- Machairophytum* Schwant. — L.B. III. 135.
- Trichodiadema stellatum* (Mill.) Schwant. — C.J. VII. 74, Fußnote 30.
- Monilaria moniliformis* (Thbg.) Schwant. — S.G. (1928) 279 (*Schwantesia moniliformis* L.Bol.).
- Monilaria pisiformis* (Haw.) Schwant. — S.G. (1928) 279 (*Schwantesia pisiformis* L.Bol.).

- Monilaria ramulosa* (L.Bol.) Schwant. — S.G. (1928) 279
(*Schwantesia ramulosa* L.Bol.).
- Monilaria Watermeyeri* L.Bol. — L.B. III. 138.
- Nananthus* N.E.Br. — B.M.J. (1938) 153; L.B. III. 133, 134.
- Nananthus aloides* (Haw.) Schwant. — B.M.J. (1938) 158.
- Nananthus Pole Evansii* N.E.Br. — B.M.J. (1938) 159.
- Nananthus rubrolineatus* (N.E.Br.) Schwant. — B.M.J. (1938) 159.
- Nananthus vittatus* (N.E.Br.) Schwant. — B.M.J. (1938) 158
- Perissolobus* N.E.Br. — L.B. III. 135.
- Prepodesma* N.E.Br. — L.B. III. 134.
- Psammophora* Dtr. et Schwant. — S. (1938) 108.
- Psammophora Herrei* L.Bol. — S. (1938) 110.
- Psammophora Nissenii* Dtr. et Schwant. — S. (1938) 109.
- Rabiea* N.E.Br. — B.M.J. (1938) 157; L.B. III. 133.
- Rabiea albinota* (Haw.) N.E.Br. — B.M.J. (1938) 159.
- Rabiea albipuncta* (Haw.) N.E.Br. — B.M.J. (1938) 159.
- Rabiea cibdela* (S.D.) N.E.Br. — B.M.J. (1938) 159.
- Rabiea tersa* N.E.Br. — B.M.J. (1938) 160.
- Rimaria* N.E.Br. — L.B. III. 136.
- Rhinephyllum parvifolium* L.Bol. — K.Kd. (1938) 117.
- Ruschia ceresiana* (L.Bol.) Schwant. — L.B. III. 137; als Synonym einfügen: (*Ruschia ceresiana* L.Bol.).
- Schwantesia acutipetala* L.Bol. — K. Kd. (1938) 60.
- Schwantesia australis* L.Bol. — K.Kd. (1938) 60, 72.
- Schwantesia Herrei* L.Bol. — K.Kd. (1938) 72.
- Schwantesia Marlothii* L.Bol. — K.Kd. (1938) 93.
- Schwantesia Pillansii* L.Bol. — K.Kd. (1938) 93.
- Schwantesia Triebneri* L.-Bol. — K.Kd. (1938) 94.
- Trichodiadema stellatum* (Mill.) Schwant. — C.J. VII. 74. Fußnote 30.
- Vanheerdiia divergens* L.Bol. — D. (1938) 134 (*Rimaria diverg.*).
- Vanheerdiia Primosii* L.Bol. — D. (1938) 89 (*Rimaria Primosii*).
- Vanheerdiia Roodiae* (N.E.Br.) L.Bol. — D. (1938) 71 (*Rimaria Rood.*).

Nachtrag II 1939.

Verzeichnis der Literatur.

(Erklärung der Abkürzungen siehe S. 7 u. s. f. des Index.)

- C.J. = Vol. VII bis einschl. Juli 1939.
D. = Vol. XI (1939) bis einschl. Juli 1939.
D.K.G.B. II. = Deutsche Kakteen-Gesellschaft, Beiträge zur Sukkul-
entenkunde und -pflege, II, 1939.
L.B. III = Seite 139 bis 198, Juli 1939.
S. = März bis September 1939.

I. Korrekturen, Druckfehlerberichtigungen usw. (Corrigenda.)

(Die Fehler sind handschriftlich im Index richtig zu stellen.)

- Seite 13: *Apatesia helianthoides* (Ait.) N. E. Br.: streichen
Synonym (*Mes. Candollei* Haw.).
Seite 70: *Dracophilus* „Schwant.“ lies „Dtr. et Schwant.“.
Seite 128: *Mes. „incidens“* N.E.Br. = *Ruschia „incidens“* L.Bol.
lies: „*insidens*“ bzw. „*insidens*“.

II. Neue Arten. (Species novae.)

- Aridaria Esterhuyseniae* L.Bol. — Bushmanland, zwischen Ken-
hardt und Kakamas. — L.B. III. 149.
Aridaria subtruncata L.Bol. — Bushmanland, 35 miles von
Nieuwefontein am Wege nach Pofadder. — L.B. III. 150.
Cephalophyllum bredasdorpense L.Bol. — Bei Bredasdorp. —
L.B. III. 150.
Cephalophyllum caledonicum L.Bol. — Caledon Divis., zwischen
Caledon und Napier. — L.B. III. 151; (bereits erwähnt D.K.G.
[1927] 10, 11).
Cephalophyllum cedrimontanum L.Bol. — Clanwilliam Distr.,
Cedarberge, Krom-River, bei Uitkyk Pass. — L.B. III. 151.
Conophytum gracile Schwant. — Kl.-Namaland. — D.K.G.B. II.
(1939) 44.
Conophytum rubronireum L.Bol. — Bushmanland. 40 miles
nördl. Pofadder. — L.B. III. 152.
Dinteranthus Wilmotianus L.Bol. — Gordonia Distr., bei Kei-
moes, auf der Farm Geetkop. — L.B. III. 153.
Drosanthemum acuminatum L.Bol. — Montagu Distr., Dobbe-
laars Kloof, 22 miles von Montagu. — L.B. III. 153.

- Drosanthemum eburneum* L.Bol. — Zwischen Sutherland und Matjesfontein. — L.B. III. 154.
- Drosanthemum micans* (Haw.) Schwant. var. *atropurpureum* L.Bol. — Swellendam Distr., bei Bruintjes Rivier. — L.B. III. 154.
- Drosanthemum subclausum* L.Bol. — Bushmanland, 10 miles von Nieuwefontein, am Wege nach Pofadder. — L.B. III. 155.
- Erepsia Esterhuyseniae* L.Bol. — Paarl Distr., Haalhoek Sneeuw-kop „in shale land“, in 5000 Fuß Höhe. — L.B. III. 155.
- Hereroa pallens* L.Bol. — Kl.-Namaland, Pofadder. — L.B. III. 156.
- Juttadinteria attenuata* Walgate. — SW.-Afrika, Gouvernements-Garten Windhoek. — L.B. III. 178.
- Lampranthus candidus* L.Bol. — Piquetberg Divis., Jonker's Klip, 2 miles nördl. Verloren Vlei und östl. Abhang von Muis Hock Berg, südl. Seite von Verloren Vlei. — L.B. III. 156.
- Lampranthus prasinus* L.Bol. — Piquetberg Divis., Jonker's Klip, 2 miles nördl. Verloren Vlei. — L.B. III. 157.
- Lampranthus purpureus* L.Bol. — Clanwilliam Divis., Oliphants River-Tal, Hügel 1 mile südöstl. Keerom. — L.B. III. 157.
- Lampranthus sternens* L.Bol. — Bredasdorp Distr., Cape Agulhas. — L.B. III. 159.
- Lampranthus subtruncatus* L.Bol. — Piquetberg Distr., östl. Basis des Nordendes der Piquetberg-Mountains. — L.B. III. 159.
- Lampranthus Walgateae* L.Bol. — Swellendam Distr., Tradouw Pass. — L.B. III. 159.
- Lithops Dorotheae* Nel. — (*L. Eksteeniae* L.Bol.). — Pella, bei Pofadder, Bushmanland. — S. (1939) 77; L.B. III. 163 (L. Ekst.); S. (1939) 110.
- Lithops Eksteeniae* L.Bol. = *L. Dorotheae* L.Bol.
- Lithops Netii* Schwant. — Cape Cross bis zur Mündung des Ugab. SW.-Afr. — D.K.G.B. II. (1939) 43.
- Pleiospilos beaufortensis* L.Bol. — Bei Beaufort West. — L.B. III. 163.
- Psilocaulon inconstrictum* L.Bol. — Bushmanland, zwischen Kakamas und Bladground. L.B. III. 160.
- Psilocaulon planisepalum* L.Bol. — Bushmanland, 10–35 miles von Nieuwefontein am Wege nach Pofadder. — L.B. III. 160.
- Ruschia aspera* L.Bol. — Bushmanland, 35 miles von Nieuwefontein am Wege nach Pofadder. — L.B. III. 161.
- Ruschia copiosa* L.Bol. — Clanwilliam Distr., zwischen Clanwilliam (6 miles von Clanwilliam) und Lamberts Bay. — L.B. III. 161.

III. Neue Umbenennungen und Namensänderungen. (Combinations novae, nomen novae.)

- Cheiridopsis noctiflora* L.Bol. — (*Mes. canum* [Haw.] Bgr.?, *Nananthus Peersii* L.Bol., *Aloinopsis Peersii* L.Bol., *Nananthus Soehlemannii* Hge. jr., *Deilanthe Peersii* N.E.Br., *Cheiridopsis*

- Peersii* L.Bol. [L.B. III. 137]). — Cape Prov., Karroo Reg., nahe Miller, nahe Willowmoore; Laingsburg Divis., nahe Matjesfontain, Prince Albert Divis., Karroo nahe Klaarstrom. — B.M.P. 279 (*Mes. canum* Haw.; es erscheint sehr zweifelhaft, ob diese von Berger angegebene Beschreibung mit der von Haworth übereinstimmt!); A.B.H. IV. 104 (*Nan. Peersii*); S.G. (1929) 245, 288 (*Al. Peersii*); G.C. (1931, I) 259 (*Deil. Peersii*); D.K.G. (1937) 163 (*Nan. Soehl.*); F.R. XLIII. 227 (*Deil. Peersii*); L.B. III. 137 (non L.B. III. 50) (*Cheir. Peersii*); L.B. III. 170.
- Cheiridopsis Peersii*** L.Bol. — (*Cheiridopsis Victoris* L.Bol.) — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — L.B. III. 50; L.B. III. 137 (*Ch. Vict.*); L.B. III. 170.
- Dracophilus dealbatus*** (N.E.Br.) Walgate. — (*Mes. dealbatum* N.E.Br., *Juttadinteria dealbata* N.E.Br., *Juttadinteria rheolens* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Richtersveld, Alexanderbay, zwischen Dun Vlei und Groot Derm; SW.-Afr., 22 miles südl. Wittpütz. — Kew Bull. (1911) p. 357 (*Mes. dealb.*); S.G. (1928) 249 (*Jutt.dealb.*); S.G. XVIII (1928) 249 (*Jutt. rheol.*); Fl.Pl. VII, Pl. 273 (*Jutt. rheol.*); L.B. III. 184.
- Dracophilus proximus*** (L.Bol.) Walgate. — (*Juttadinteria proxima* L.Bol.) — Kl.-Namaland, zwischen Arris Drift und Sendlingsdrift; SW.-Afr., 15—18 miles westl. Wittpütz. — Fl.Pl. VII (1927) Pl. 273 (*Jutt. prox.*); L.B. III. 185.
- Lampranthus acrosepalus*** L.Bol. — (*Mes. acrosepalum* L.Bol.) — Piquetberg Divis., Plateau auf Kapiteins Kloof Mt., Piquetberg Range. — L.B. III. 11 (*Mes. acr.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus aestivus*** L.Bol. — (*Mes. aestivum* L.Bol.) — Caledon Divis., bei Kleinmend. — L.B. II. 188 (*Mes. aest.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus albus*** L.Bol. — (*Mes. album* L.Bol.) — Clanwilliam Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 365 (*Mes. album*); L.B. III. 168.
- Lampranthus antemeridianus*** L.Bol. — (*Mes. antemeridianum* L.Bol.; *Mes. antemeridianum forma flore pleno* L.Bol.) — Riversdale Distr., nahe Albertina (*Mes. ant.*). In Sanddünen von Farm Welgevonden (*Mes. ant. fl. pl.*). — L.B. I. 135 (*Mes. ant.*); L.B. II. 404 (*Mes. ant. fl. pl.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus Arbuthnotiae*** L.Bol. — (*Mes. Arbuthnotiae* L.Bol.). — Cape Prov. Südwestl. Reg. — A.B.H. IV. 8 (*Mes. Arb.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus arenosus*** L.Bol. — (*Mes. arenosum* L.Bol.). — Malmesbury Divis., Saldanha Bay bei Langebaan. — L.B. II. 367 (*Mes. ar.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus austricolus*** L.Bol. — (*Mes. austricolum* L.Bol.). — Cape Peninsula, zwischen Smitswinkel und Olifantsbosch. — L.B. II. 453 (*Mes. austr.*); L.B. III. 168.



- Lampranthus Berghiae*** L.Bol. — (*Mes. Berghiae* L.Bol. — Clanwilliam Divis., im Sand zwischen Pakhuis und Nardouw. — L.B. III. 127 (*Mes. Bergh.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus brevistamineus*** L.Bol. — (*Mes. brevistamineum* L.Bol.). — Worcester Divis., am Fuße des Berges Matrosberg.
- Lampranthus Capornii*** L.Bol. — (*Mes. Capornii* L.Bol.). — Cape Prov., Western Reg.; Namaland, Garies. — A.B.H. II. 30 (*Mes. Cap.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus Capornii*** L.Bol. f. *fera* L.Bol. — (*Mes. Capornii* L.Bol. f. *fera* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., zwischen Pakhuiss Pass und Oumuur. — L.B. II. 405 (*Mes.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus Capornii*** L.Bol. var. *longifolius* L.Bol. — (*Mes. Capornii* L.Bol. var. *longifolium* L.Bol.); Van Rhynsdorp Divis., bei Klaver. — L.B. II. 405 (*Mes.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus cedarbergensis*** L.Bol. — (*Mes. cedarbergense* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Cedarbergen, Pakhuis Pass. — L.B. II. 487 (*Mes. cedarberg.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus ceriseus*** L.Bol. — (*Mes. ceriseum* L.Bol.). — Riversdale Divis., Melkhoutfontein, bei Still Bay. — L.B. II. 327 (*Mes. cer.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus citrinus*** L.Bol. — (*Mes. citrinum* L.Bol.). — Malmesbury Divis., zwischen Kalabas Kraal und Malmesbury. — L.B. II. 326 (*Mes. citr.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus convexus*** L.Bol. — (*Mes. convexum* L.Bol.). — Tulbagh Divis. — L.B. II. 18 (*Mes. conv.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus copiosus*** L.Bol. — (*Mes. copiosum* L.Bol.). — Kapland, Standort unbekannt. — L.B. II. 324 (*Mes. cop.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus densipetalus*** L.Bol. — (*Mes. densipetalum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Garies und Kamieskroon. — L.B. II. 219 (*Mes. densip.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus dependens*** L.Bol. — (*Mes. dependens* L.Bol.). — Cape Prov., Robertson Divis., Cogman's Kloof; nahe Montagu Baths. — A.B.H. III. 134 (*Mes. dep.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus dubitans*** L. Bol. — (*Mes. dubitans* L.Bol.). — Ceres Divis., Abhänge und Ebenen am Fuße des Berges Matrosberg. — L.B. II. 119 (*Mes. dub.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus dulcis*** L.Bol. — (*Mes. dulce* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Tal des Oliphants River, bei Warm Baths. — L.B. II. 328 (*Mes. dulc.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus Edwardsiae*** L.Bol. — (*Mes. Edwardsiae* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Oliphants River-Tal. — A.B.H. III. 163 (*Mes. Educ.*); L.B. III. 170.

- Lampranthus egregius*** L.Bol. — (*Mes. egregium* L.Bol.). — Montagu Divis., 2 miles von Montagu längs des Weges nach Ladismith. — L.B. III. 12 (*Mes. egr.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus Ernestii*** L.Bol. — (*Mes. Ernestii* L.Bol.). — Bredasdorp Divis., bei Bredasdorp. — L.B. II. 327 (*Mes. Ern.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus excedens*** L.Bol. — (*Mes. excedens* L.Bol.). — Zwischen Piquetberg und Clanwilliam. — L.B. II. 324 (*Mes. exc.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus falciformis*** N.E.Br. var. *maritimus* L.Bol. — (*Mes. maritimum* L.Bol.). — Stellenbosch Divis., Roviels bei Gordonias Bay. — L.B. III. 55 (*Mes. maritimum*); L.B. III. 170.
- Lampranthus Fergusoniae*** L.Bol. — (*Mes. Fergusoniae* L.Bol.). — Kalkdünen bei Riversdale. — L.B. II. 427 (*Mes. Ferg.*); L.B. III. 168.
- Lampranthus Galpiniae*** L.Bol. — (*Mes. Galpiniae* L.Bol.). — Bredasdorp Divis., Struis Bay bei Cape Agulhas. — L.B. II. 328 (*Mes. Galp.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus globosus*** L.Bol. — (*Mes. globosum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., Van Rhynd's Pass. — L.B. II. 235 (*Mes. glob.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Godmaniae*** L.Bol. — Kl.-Namaland, bei Springbok. — L.B. II. 141 (*Mes. Godm.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Godmaniae*** L.Bol. var. *grandiflorus* L.Bol. — (*Mes. Godmaniae* L.Bol. var. *grandiflorum* L.Bol.). — Ceres Divis., zwischen Patat's River und Karroopoort. — L.B. II. 326 (*Mes. Godm. var. grandifl.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Herrei*** L.Bol. — (*Mes. Herrei* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Kommaggas, Sandberge. — L.B. II. 276 (*Mes. Herrei*); L.B. III. 169.
- Lampranthus hiemalis*** L.Bol. — (*Mes. hiemale* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 189 (*Mes. hiem.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Hollandi*** L.Bol. — (*Mes. Hollandii* L.Bol.). — Alexander Divis. — L.B. II. 274 (*Mes. Holl.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Hurlingii*** L.Bol. — (*Mes. Hurlingii* L.Bol.). — Robertson Divis., zwischen Bushman's River und McGregor. — L.B. II. 427 (*Mes. Hurl.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus laetus*** L.Bol. — (*Mes. laetum* L.Bol.). — Montagu Divis., „on the rocky cliffs Montagu Bath's Ravine“. — L.B. II. 189 (*Mes. laetum*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Lawisii*** L.Bol. — (*Mes. Lawisii* L.Bol.). — Humansdorp Divis., Assegaibosch. — L.B. II. 156 (*Mes. Law.*); L.B. III. 169.

- Lampranthus Leightoniae*** L.Bol. — (*Mes. Leightoniae* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Kromme River, Cedarbergen. — L.B. II. 488 (*Mes. Leight.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Leipoldtii*** L.Bol. — (*Mes. Leipoldtii* L.Bol.). — Worcester Divis., zwischen Worcester und Villiersdorp. — L.B. II. 156 (*Mes. Leip.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus leptosepalus*** L.Bol. — (*Mes. leptosepalum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Uitkyk Pass, Cedarbergen. — L.B. II. 489 (*Mes. lept.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Lewisiae*** L.Bol. — (*Mes. Lewisiae* L.Bol.). — Ceres Divis., Gydouw Pass. — L.B. III. 54 (*Mes. Lew.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus liberalis*** L.Bol. — (*Mes. liberale* L.Bol.). — S.-Afr., Standort unbekannt. — L.B. III. 128 (*Mes. lib.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus longisepalus*** L.Bol. — (*Mes. longisepalum* L.Bol.). — Zwischen Karroo Poort (in Ceres Divis.) und Calvinia. — L.B. II. 198 (*Mes. long.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus macrosepalus*** L.Bol. — (*Mes. macrosepalum* L.Bol.). — Humansdorp Divis., Assegaibosch. — L.B. II. 219 (*Mes. macr.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Mariae*** L.Bol. — (*Mes. Mariae* L.Bol.). — Ceres Divis. — L.B. II. 329 (*Mes. Mar.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Martleyi*** L.Bol. — (*Mes. Martleyi* L.Bol.). — Piquetberg Divis., zwischen Piquetberg und Langebaan. — L.B. II. 366 (*Mes. Martl.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Meleagris*** L.Bol. — (*Mes. Meleagris* L.Bol.). — Ceres Divis., bei Karroo Poort. — L.B. II. 17 (*Mes. Mel.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Middlemostii*** L.Bol. — (*Mes. Middlemostii* L.Bol.). — Caldon Divis., bei Houw Hoek. — L.B. II. 329 (*Mes. Middl.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus monticolus*** L.Bol. — (*Mes. monticolum* L.Bol.). — Cape Peninsula, Tafelberg. — L.B. II. 171 (*Mes. mont.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus nardouwensis*** L.Bol. — (*Mes. nardouwense* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Nardouw Pass, ca. 5 miles vom Wege zwischen Clanwilliam und Klaver. — L.B. II. 407 (*Mes. nard.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus obconicus*** L.Bol. — (*Mes. obconicum* L.Bol.). — Calvinia Divis., Sandflächen bei Nieuwoudtville. — L.B. II. 220 (*Mes. obc.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus ornatus*** L.Bol. — (*Mes. ornatum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis. — L.B. II. 97 (*Mes. orn.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus paardebergensis*** L.Bol. — (*Mes. paardebergense* L.Bol.). — Malmesbury Divis., in Felsspalten des Paardeberg. — L.B. II. 200 (*Mes. paardeberg.*); L.B. III. 169.

- Lampranthus pakhuisensis*** L.Bol. — (*Mes. pakhuisense* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Pakhuis Pass. — L.B. II. 364 (*Mes. pakh.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus palustris*** L.Bol. — (*Mes. palustre* L.Bol.). — Stellenbosch Divis., Sümpfe zwischen Bottelary und Stellenbosch. — L.B. II. 325 (*Mes. pal.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Peacockiae*** L.Bol. — (*Mes. Peacockiae* L.Bol.). — Cape Prov., Südwestl. Reg., nahe Darling; Malmesbury Divis., nahe Kalabas Kraal; Cape Peninsula, Lion Mountains. — A.B.H. III. 71 (*Mes. Peac.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus perreptans*** L.Bol. — (*Mes. humile* L.Bol.). — Swellendam Divis.? — L.B. II. 73 (*Mes. humile*); L.B. III. 169.
- Lampranthus persistens*** L.Bol. — (*Mes. persistens* L.Bol.). — Calvinia Divis., Grasberg bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 235 (*Mes. pers.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus piquetbergensis*** L.Bol. — (*Mes. piquetbergense* L.Bol.). — Piquetberg Divis., Berge bei Piquetberg. — L.B. II. 325 (*Mes. piquetb.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus plenus*** L.Bol. — (*Mes. plenum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Oliphants River-Tal, zwischen Modderfontein und Warm Bath's. — L.B. II. 407 (*Mes. plenum*); L.B. III. 169.
- Lampranthus praecipitatus*** L.Bol. — (*Mes. praecipitatum* L.Bol.). — Albany Divis., Dassie Krantz bei Grahamstown. — L.B. II. 330 (*Mes. praec.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus primivernus*** L.Bol. — (*Mes. primivernum* L.Bol.). — Piquetberg Divis., Grey's Pass (Pickernier's Kloof). — L.B. II. 199 (*Mes. prim.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus prominulus*** L.Bol. — (*Mes. prominulum* L.Bol.). — George Divis.? — L.B. II. 408 (*Mes. prom.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus punctatulus*** L.Bol. — (*Mes. punctatum* L.Bol.). — Calvinia Divis. — L.B. II. 17 (*Mes. punct.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus rabiesbergensis*** L.Bol. — (*Mes. rabiesbergense* L.Bol.). — Worcester Divis., zwischen Robertson und Worcester, Abhang des Rabiesbergs. — L.B. III. 13 (*Mes. rab.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus ruber*** L.Bol. — (*Mes. rubrum* L.Bol.). — Kl.-Nama-land, Richtersveld, Swartwater. — L.B. II. 275 (*Mes. rubr.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus rubroluteus*** L.Bol. — (*Mes. rubroluteum* L.Bol.). — Piquetberg Divis., nördl. Seite des Plateaus des Kapiteins Kloof Mountain, Piquetberg Range. — L.B. III. 11 (*Mes. rubrolut.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus saliculus*** L.Bol. — (*Mes. salicolum* L.Bol.). — Piquetberg Divis., Salzebene zwischen Veldrift und St. Helena-Fontein. — L.B. III. 12 (*Mes. sal.*); L.B. III. 170.

- Lampranthus Salteri*** L.Bol. — (*Mes. Salteri* L.Bol.). — Bredasdorp Divis., Cape Agulhas. — L.B. II. 428 (*Mes. Salt.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus Sauerae*** L.Bol. — (*Mes. Sauerae* L.Bol.). — Darling Divis., bei Yserfontein. — L.B. II. 409 (*Mes. Sauerae*); L.B. III. 169.
- Lampranthus serpens*** L.Bol. — (*Mes. serpens* L.Bol.). — Caledon Divis., bei Kleinmond. — L.B. II. 221 (*Mes. serp.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus steenbergensis*** L.Bol. — (*Mes. steenbergense* L.Bol.). — Cape Peninsula, Steenberg. — L.B. II. 199 (*Mes. steenb.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus suavissimus*** L.Bol. — (*Mes. suavissimum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay. — L.B. II. 220 (*Mes. suar.*); L.B. III. 163.
- Lampranthus suavissimus*** L.Bol. f. *fera* L.Bol. — (*Mes. suavissimum* L.Bol. f. *fera* L.Bol.). — Kl.-Namaland, bei Walle Kraal. — L.B. II. 221 (*Mes. suav. f. fera*); L.B. III. 169.
- Lampranthus suavissimus*** L.Bol. var. *oculatus* L.Bol. — (*Mes. suavissimum* L.Bol. var. *oculatum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, bei Hondeklip Bay. — L.B. II. 221 (*Mes. suav. var. oc.*); L.B. III. 169.
- Lampranthus subaequalis*** L.Bol. — (*Mes. subaequale* L.Bol.). — Uniondale Divis. — L.B. III. 56 (*Mes. subaequ.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus sublaxus*** L.Bol. — (*Mes. laxum* L.Bol.). — Kapland, bei Nieuwoudtsville, genauer Standort unbekannt. — L.B. II. 406 (*Mes. laxum*); L.B. III. 169.
- Lampranthus subrotundus*** L.Bol. — (*Mes. subglobosum* L.Bol.). — Standort unbekannt. — L.B. III. 57 (*Mes. subglob.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus superans*** L.Bol. — (*Mes. superans* L.Bol.). — Zwischen Clanwilliam und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 348 (*Mes. sup.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus thermarum*** L.Bol. — (*Mes. thermarum* L.Bol.). — Clanwilliam Divis., Oliphantsriver Tal, bei Warm Baths. — L.B. II. 365 (*Mes. therm.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus uniflorus*** L.Bol. — (*Mes. uniflorum* L.Bol.). — Karroo Reg., Beaufort West Divis., Klipbank. — A.B.H. III. 135 (*Mes. unifl.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus vernalis*** L.Bol. — (*Mes. vernale* L.Bol.). — Cape Prov., Südwestl. Reg., genauer Standort unbekannt. — A.B.H. IV. 93 (*Mes. vern.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus vernicolor*** L.Bol. — (*Mes. vernicolor* L.Bol.). — Tulbagh Divis., Tulbagh Kloof. — L.B. II. 304 (*Mes. vern.*); L.B. III. 170.
- Lampranthus Villiersii*** L.Bol. — (*Mes. Villiersii* L.Bol.). — Villiersdorp Divis., Belgravia. — L.B. II. 489 (*Mes. Vill.*); L.B. III. 170.

- Macrocaulon Candollei*** (Haw.) N.E.Br. — (*Mes. Candollei* Haw.). G.C. (1927, I) 12.
- Mesembryanthemum Aitonis*** Jacq. — (*Mes. angulatum* Thunb., *Mes. Volekameri* Haw., *Mes. lanceolatum* Haw. einsch. var., *Mes. crystallophanes* Eckl. et Zeyh., *Cryophytum Aitonis* N.E.Br., *Cryophytum angulatum* Thbg.). — Uitenhage Divis., Zwartkops-Fluß; Albany Divis., nahe Grahamstown; Cradock Divis., nahe Mortimer. — B.M.P. 136; Gfl. (1928) 68 (*Cryoph. ang.*); G.C. (1928 II) 128 (*Cryoph. Aitonis*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum alatum*** L.Bol. (*Cryophytum alatum* L.Bol., *Cryophytum nanum* N.E.Br.). — Piquetberg Divis., bei St. Helena Bay; Malmesbury Divis., Region der Saldanha Bay. — L.B. II. 37 (*Cryoph. al.*); G.C. (1929 I) 84 (*Cryoph. nanum*); L.B. III. 167, 168.
- Mesembryanthemum alcalifugum*** Dtr. — (*Cryophytum alcalifugum* Dtr.). — SW.-Afr., Tigerberg. — D.S.I. 14; F.R. XXXVI (*Cryoph. alc.*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum annuum*** L.Bol. — (*Cryophytum Wilmaniae* L.Bol.). — S.G. (1928) 84 (*Cryoph. Wilm.*); L.B. I. 112, 113 (*Cr. Wilm.*); G.C. (1928 II) 212 (*Cr. Wilm.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum arenarium*** (N.E.Br.) L.Bol. — (*Cryophytum arenarium* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, Kl. Karas-Berge, zwischen Nakeis und Kl. Karasberg; Orange-Fluß. — G.C. (1928 II) 192 (*Cryoph. ar.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum Barklyi*** N.E.Br. — (*Mes. Barklyi* N.E.Br. var. *obtusifolium* L.Bol.; *Cryophytum Barklyi* N.E.Br., *Platythyra Barklyi* Schwant.). — Kl.-Namaland, Richtersveld; Hondeklip Bay, zwischen Holgat und Witbank. — A.B.H. IV. 79; L.B. I. 107 (*Mes. Barkl.* var. *obtusifol.*); Gfl. (1928) 68 (*Plat. Barkl.*); S.G. (1928) 83 (*Cryoph. Barkl.*); G.C. (1928 II) 211 (*Cryoph. Barkl.*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum breve*** L.Bol. — (*Cryophytum parvum* L.Bol.) Kl.-Namaland, Standort unbekannt. — L.B. II. 98 (*Cryoph. parv.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum chrysium*** L.Bol. — (*Cryophytum aureum* L.Bol.). — Laingsburg Divis., bei Matjesfontein, zwischen Laingsburg und Matjesfontein, Whitehill. — L.B. II. 32 (*Cryoph. aureum*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum clandestinum*** Haw. — (*Mes. alsinifolium* Don., *Cryophytum clandestinum* N.E.Br.). — S.-Afr., genauer Standort unbekannt. — G.C. (1928, II) 128; siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum crycocalyx*** L.Bol. — (*Cryophytum intermedium* L.Bol.). — Worcester Divis., Hex River, bei De Doorns, Hex River Pass, bei Ooplaats. — L.B. II. 53 (*Cryoph. interm.*); L.B. III. 167.

- Mesembryanthemum crystallinum* L.** — (*Mes. glaciale* Haw., *Cryophytum crystallinum* N.E.Br., *Cryophytum crystallinum* Schwant.). — SW.-Afr., an der Swakopmündung; Küstengebiete der Cape Divis. bis Uitenhage Divis.; Küstengebiete des Mittelmeeres, und der Kanar. Inseln verschleppt und verwildert. — P.G.S.A.P. 1126/245; Gfl. (1928) 68 (*Cryoph. cryst.*); S.G. (1928) 83 (*Cr. cr.*); G.C. (1928, II) 153 (*Cr. cr.*); D.K.G. (1937) 161 (*Cr. cr.*); F. R. XLIII. 224 (*Cr. cr.*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum Dejagerae* L.Bol.** — (*Cryophytum Dejagerae* L.Bol.). — Bei Beaufort West. — L.B. II. 315 (*Cryoph. Dej.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum excavatum* L.Bol.** — (*Cryophytum excavatum* L.Bol.). — Cape Prov., Upper Reg., nahe Beaufort West. — A.B.H. III. 133; L.B. II. 32 (*Cryoph. exc.*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum Fenchelii* Schinz.** — (*Cryophytum Fenchelii* N.E.Br.). — Gr.-Namaland, östl. Keetmanshoop, Tsoaschaub, Ukasos. — F. R. XIX. 189 (*Cryoph. Fench.*); G.C. (1928, II) 153 (*Cryoph. Fench.*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum Fulleri* L.Bol.** — Kenhardt Divis., 5 miles südl. von Kakamas. — L.B. II. 301; L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum Galpinii* L.Bol.** — (*Cryophytum Galpinii* L.Bol.). — Calvinia Divis., Hügel bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 231 (*Cryoph. Galp.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum garusianum* Dtr.** — (*Cryophytum garusianum* Dtr.). — SW.-Afr., Lichtenfels. F. R. XXXVI. 14; siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum grandifolium* Schinz.** — (*Cryophytum grandifolium* N.E.Br., *Cryophytum grandifolium* Dtr. et Schwant.). Gr.-Namaland, nahe Rehoboth. — D.B.F. XIX. 126; Gfl. (1928) 68 (*Cr. grandifol.*); G.C. (1928, II) 153 (*Cryoph. grandifol.*); D.K.G. (1927) 161 (*Cr. grandifol.*); F. R. XLIII. 224 (*Cr. grandifol.*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum inornatum* L.Bol.** — (*Cryophytum cleistum* L.Bol.). — Laingsburg Divis., Whitehill. — L.B. II. 151 (*Cryoph. cleistum*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum intransparens* L.Bol.** — (*Cryophytum Framesii* L.Bol.). — Bei Clanwilliam. — L.B. II. 31 (*Cryoph. Fram.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum intransparens* L.Bol. var. *laxum* L.Bol.** — (*Chryophytum Framesii* L.Bol. var. *laxum* L.Bol.). — Laingsburg Divis., bei Touws-Fluß. — L.B. II. 38 (*Cr. Fram. var. laxum*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.

- Mesembryanthemum karrooense*** L.Bol. — (*Cryophytum karrooicum* L.Bol.). — Cradock Divis. — L.B. II. 55 (*Cryoph. karr.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum latisepalum*** L.Bol. — (*Cryophytum latisepalum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Hondeklip Bay. — L.B. II. 163 (*Cryoph. latisep.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum linearifolium*** L.Bol. — (*Cryophytum lineare* L.Bol.). — Kapl., Standort unbekannt. — L.B. II. 165 (*Cryoph. lin.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum longipapillatum*** L.Bol. — (*Cryophytum longipapillatum* L.Bol.). — Kenhardt Divis., bei Kenhardt. — L.B. II. 38 (*Cryoph. long.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum macrophyllum*** L.Bol. — (*Cryophytum velutinum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, zwischen Springbok und Nieuwerust. — L.B. II. 166 (*Cryoph. vel.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum macrostigma*** L.Bol. — (*Cryophytum Maxwellii* L.Bol.). — Ladismith Divis., zwischen Ladismith und Laingsburg. — L.B. I. 141 (*Cryoph. Marx.*); S.G. (1928) 84 (*Cryoph. Marx.*); G.C. (1928, II) 212 (*Cryoph. Marx.*); L.B. II. 164 (*Cryoph. Marx.*) L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum magniflorum*** (Eckl. et Zeyh.) L.Bol. — (*Mes. crystallinum* L. var. *grandiflorum* Eckl. et Zeyh.; *Cryophytum grandiflorum* N.E.Br.). — Prince Albert Divis., nahe Abrahams Kraal; Riversdale Divis., dort überall gemein; Orange-Fluß-Region. — G.C. (1928, II) 153 (*Cryoph. grandifl.*); L.B. II. 164 (*Cryoph. grandifl.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum Neilsoniae*** L.Bol. — (*Cryophytum Neilsoniae* L.Bol.). — Ceres Divis. — L.B. II. 32 (*Cryoph. Neils.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum pachypus*** L.Bol. — (*Cryophytum crassipes* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., zwischen Zout-Fluß und Nieuwerust. — L.B. II. 162 (*Cryoph. crassipes*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum parvipapillatum*** B.Bol. — (*Cryophytum acuminatum* L.Bol.). — Zwischen St. Helena-Bay, Klaver und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 54 (*Cryoph. acum.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum paucandrum*** L.Bol. — (*Cryophytum Rogersii* L.Bol.). — Calitzdorp; Oudthorn Divis., „at Zebra Siding“. — L.B. I. 142 (*Cryoph. Rog.*); L.B. II. 39 (*Cryoph. Rog.*); S.G. (1928) 84 (*Cryoph. Rog.*); G.C. (1928, II) 212 (*Cryoph. Rog.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum paulum*** (N.E.Br.) (L.Bol. — *Cryophytum paulum* N.E.Br.). — Riversdale Divis., in Graswiesen nahe des Vet-Flusses. — G.T. (1929, II) 211 (*Cryoph. paul.*); L.B. III. 167.

- Mesembryanthemum pingue** L.Bol. — (*Cryophytum crassifolium* L.Bol.). — SW.-Afr., Lüderitzbucht, Distr. Usakos bis Swakopmund. — S.G. (1928) 83, 84 (*Cryoph. crassifol.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum purpureoalbum** L.Bol. — (*Cryophytum truncatum* L.Bol.). — Kl.-Karoo, zwischen Gracia's Pass und Barrydale. — L.B. II. 164 (*Cryoph. trunc.*); L.B. III. 168.
- Mesembryanthemum quinangulatum** L.Bol. — (*Cryophytum pentagonum* L.Bol.). — Ladismith Divis., zwischen Touw's River und Ladismith. — L.B. II. 228 (*Cryoph. pent.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum rhodanthum** L.Bol. — (*Cryophytum roseum* L.Bol.). — Kl.-Namaland, bei Bitterfontein. — L.B. II. 38 (*Cryoph. ros.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum rubroroseum** L.Bol. — (*Cryophytum carinatum* L.Bol.). — Kapl., zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 52 (*Cryoph. carin.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum sedentiflorum** L.Bol. — (*Cryophytum sessiliflorum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., bei Nieuwerust. — L.B. II. 165 (*Cryoph. sessil.*); L.B. III. 168.
- Mesembryanthemum sessiliflorum** Ait. var. *album* Haw. — (*Cryophytum Burchellii* N.E.Br.). — Graaf Reinet Divis., bei dem Sundays-Fluß nahe Monkey Ford. — G.C. (1928, II) 128 (*Cryoph. Burch. var. album*); siehe Neuordnung L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum setosum** L.Bol. — (*Cryophytum setosum* L.Bol.). — Kapl., zwischen Klaver und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 53 (*Cryophytum set.*); L.B. III. 168.
- Mesembryanthemum squamulosum** L.Bol. — (*Cryophytum squamulosum* L.Bol.). — Van Rhynsdorp Divis., Van Rhynsdorp. — L.B. II. 71 (*Cryoph. squam.*); L.B. III. 168.
- Mesembryanthemum stenandrum** L.Bol. — (*Cryophytum stenandrum* L.Bol.). — Bei Van Rhynsdorp. — L.B. II. 36 (*Cryoph. sten.*); L.B. III. 168.
- Mesembryanthemum stratum** L.Bol. — (*Cryophytum planum* L.Bol.). — Caledon Divis., zwischen Caledon und Genadental. — L.B. II. 15 (*Cryoph. planum*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum subrigidum** L.Bol. — (*Cryophytum subulatum* L.Bol.). — Calvinia Divis., bei Nieuwoudtsville. — L.B. II. 229 (*Cryoph. subul.*); L.B. III. 168.
- Mesembryanthemum subtereticaule** L.Bol. — (*Cryophytum calycinum* L.Bol.). — Kapl., zwischen St. Helena Bay, Klaver und Van Rhynsdorp. — L.B. II. 52 (*Cryoph. cal.*); L.B. III. 167.
- Mesembryanthemum subtruncatum** L.Bol. — (*Cryophytum pusillum* L.Bol.). — Ceres Divis., zwischen Matjesfontein und Karroo Poort. — L.B. II. 152 (*Cryoph. pus.*); L.B. III. 168.

Mesembryanthemum violense L.Bol. — (*Cryophytum Salteri* L.Bol.). — Kl.-Namaland, Viol's Drift, Orange-Fluß. — L.B. II. 316 (*Cryoph. Salteri*); L.B. III. 168.

Nananthus cradockensis L.Bol. — (*Aloinopsis Jamesii* L.Bol., *Nananthus Jamesii* L.Bol.). — Cradock, Berge bei Halesowen. — L.B. II. 294 (*Al. Jam.*); L.B. III. 133 (non L.B. II. 304!) (*Nan. Jam.*); L.B. III. 170.

III. Hinweise, welche infolge der neuen Umbenennungen bzw. der Ergänzungen einzufügen sind, desgl. Synonyma.

Aloinopsis Jamesii L.Bol. = *Nananthus cradockensis* L.Bol.

Aloinopsis Peersii L.Bol. = *Cheiridopsis noctiflora* L.Bol.

Cheiridopsis Peersii (L.B. III. 50 [non L.B. III. 137!]) = *Cheiridopsis Peersii* L.Bol.

Cheiridopsis Peersii L.Bol. (L.B. III. 137 [non L.B. III. 50]) = *Cheiridopsis noctiflora* L.Bol.

Cheiridopsis Victoris L.Bol. = *Cheiridopsis Peersii* L.Bol.

Cryophytum acuminatum L.Bol. = *Mesembryanthemum parvipapillatum* L.Bol.

Cryophytum alatum L.Bol. = *Mesembr. alatum* L.Bol.

Cryophytum alcalifugum Dtr. = *Mesembr. alcalifugum* Dtr.

Cryophytum Aitonis N.E.Br. = *Mesembr. Aitonis* Jacq.

Cryophytum angulatum (Thbg.) Schwant. = *Mesembr. Aitonis* Jacq.

Cryophytum arenarium N.E.Br. = *Mesembr. arenarium* L.Bol.

Cryophytum aureum L.Bol. = *Mesembr. chrysium* L.Bol.

Cryophytum Barklyi N.E.Br. = *Mesembr. Barklyi* N.E.Br.

Cryophytum Bijliae N.E.Br. scheint eine Form von *Mesembr. Aitonis* Jacq. zu sein. (L.Bol. in L.B. III. 168.)

Cryophytum Burchellii N.E.Br. = *Mesembr. sessiliflorum* Ait. var. *album* Haw.

Cryophytum calycinum L.Bol. = *Mesembr. subtereticaule* L.Bol.

Cryophytum carinatum L.Bol. = *Mesembr. rubroroseum* L.Bol.

Cryophytum clandestinum N.E.Br. = *Mesembr. clandestinum* Haw.

Cryophytum crystallinum N.E.Br. = *Mesembr. crystallinum* L.

Cryophytum crystallinum Schwant. = *Mesembr. crystallinum* L.

Cryophytum cleistum L.Bol. = *Mesembr. inornatum* L.Bol.

Cryophytum crassifolium L.Bol. — *Mesembr. pingue* L.Bol.

Cryophytum crassipes L.Bol. = *Mesembr. pachypus* L.Bol.

Cryophytum Dejagerae L.Bol. = *Mesembr. Dejagerae* L.Bol.

Cryophytum excavatum L.Bol. = *Mesembr. excavatum* L.Bol.

Cryophytum Fenchelii N.E.Br. = *Mesembr. Fenchelii* Schinz.

Cryophytum Framesii L.Bol. = *Mesembr. intransparens* L.Bol.

- Cryophytum Framesii* L.Bol. var. *laxum* L.Bol. = *Mesembr. intransparens* L.Bol. var. *laxum* L.Bol.
- Cryophytum Fulleri* L.Bol. = *Mesembr. Fulleri* L.Bol.
- Cryophytum Galpinii* L.Bol. = *Mes. Galpinii* L.Bol.
- Cryophytum gariisianum* Dtr. = *Mesembr. gariisianum* Dtr.
- Cryophytum gibbosum* N.E.Br. = *Mesembr. nodiflorum* L.
- Cryophytum grandifolium* Dtr. et Schwant. = *Mesembr. grandifolium* Schinz.
- Cryophytum grandifolium* N.E.Br. = *Mesembr. grandifolium* Schinz.
- Cryophytum grandiflorum* N.E.Br. = *Mesembr. magniflorum* L.Bol.
- Cryophytum intermedium* L.Bol. = *Mesembr. cryocalyx* L.Bol.
- Cryophytum karrooicum* L.Bol. = *Mesembr. karrooense* L.Bol.
- Cryophytum latisepalum* L.Bol. = *Mesembr. latisepalum* L.Bol.
- Cryophytum lineare* L.Bol. = *Mesembr. linearifolium* L.Bol.
- Cryophytum longipapillatum* L.Bol. = *Mesembr. longipapillatum* L.Bol.
- Cryophytum Maxwellii* L.Bol. = *Mesembr. macrostigma* L.Bol.
- Cryophytum nanum* N.E.Br. = *Mesembr. alatum* L.Bol.
- Cryophytum neglectum* N.E.Br. ist offenbar *Aridaria* (L.Bolus in L.B. III. 168).
- Cryophytum Neilsoniae* L.Bol. = *Mesembr. Neilsoniae* L.Bol.
- Cryophytum nodiflorum* L.Bol. = *Mesembr. nodiflorum* L.Bol.
- Cryophytum parvum* L.Bol. = *Mesembr. breve* L.Bol.
- Cryophytum paulum* N.E.Br. = *Mesembr. paulum* L.Bol.
- Cryophytum pentagonum* L.Bol. = *Mesembr. quinangulatum* L.Bol.
- Cryophytum planum* L.Bol. = *Mesembr. stratum* L.Bol.
- Cryophytum pusillum* L.Bol. = *Mesembr. subtruncatum* L.Bol.
- Cryophytum Rogersii* L.Bol. = *Mesembr. paucandrum* L.Bol.
- Cryophytum roscum* L.Bol. = *Mesembr. rhodanthum* L.Bol.
- Cryophytum Salteri* L.Bol. = *Mesembr. violense* L.Bol.
- Cryophytum sessiliflorum* L.Bol. = *Mesembr. sedentiflorum* L.Bol.
- Cryophytum setosum* L.Bol. = *Mesembr. setosum* L.Bol.
- Cryophytum squamulosum* L.Bol. = *Mesembr. squamulosum* L.Bol.
- Cryophytum stenandrum* L.Bol. = *Mesembr. stenandrum* L.Bol.
- Cryophytum subulatum* L.Bol. = *Mesembr. subrigidum* L.Bol.
- Cryophytum suffruticosum* L.Bol. ist offenbar *Aridaria* (L.Bolus in L.B. III. 168).
- Cryophytum truncatum* L.Bol. = *Mesembr. purpureoroseum* L.Bol.
- Cryophytum velutinum* L.Bol. = *Mesembr. macrophyllum* L.Bol.
- Cryophytum Wilmaniae* L.Bol. = *Mesembr. annuum* L.Bol.

- Deilanthe Peersii* N.E.Br. = *Cheiridopsis noctiflora* L.Bol.
Juttadinteria dealbata (N.E.Br.) L.Bol. = *Dracophilus dealbatus* Walgate.
Juttadinteria proxima L.Bol. = *Dracophilus proximus* Walgate.
Juttadinteria rheolens L.Bol. = *Dracophilus dealbatus* Walgate.
Lampranthus gracilipes L.Bol. = *Lampranthus gracilipes* N.E.Br.
Lithops insularis L.Bol. = *Lithops Bromfieldii* L.Bol.
Mesembryanthemum acrosepalum L.Bol. = *Lampranthus acrosepalus* L.Bol.
Mesembryanthemum aestivum L.Bol. = *Lampranthus aestivus* L.Bol.
Mesembryanthemum album L.Bol. = *Lampranthus albus* L.Bol.
Mesembryanthemum alsinifolium Don. = *Mesembr. clandestinum* Haw.
Mesembryanthemum angulatum Thunb. = *Mesembr. Aitonis* Jacq.
Mesembryanthemum antemeridianum L.Bol. = *Lampranthus antemeridianus* L.Bol.
Mesembryanthemum antemeridianum L.Bol. f. *fl. pleno* L.Bol. = *Lampranthus antemeridianus* L.Bol.
Mesembryanthemum Arbuthnotiae L.Bol. = *Lampranthus Arbuthnotiae* L.Bol.
Mesembryanthemum arenosum L.Bol. = *Lampranthus arenosus* L.Bol.
Mesembryanthemum austricolum L.Bol. = *Lampranthus austricolus* L.Bol.
Mesembryanthemum Barklyi N.E.Br. var. *obtusifolium* L.Bol. = *Mesembr. Barklyi* N.E.Br.
Mesembryanthemum Berghiae L.Bol. = *Lampranthus Berghiae* L.Bol.
Mesembryanthemum brevistamineum L.Bol. = *Lampranthus brevistamineus* L.Bol.
Mesembryanthemum canum (Haw.) Bgr. = *Cheiridopsis noctiflora* L.Bol.
Mesembryanthemum Candollei Haw. = *Macrocaulon Candollei* N.E.Br.
Mesembryanthemum Capornii L.Bol. = *Lampranthus Capornii* L.Bol.
Mesembryanthemum Capornii L.Bol. f. *fera* L.Bol. = *Lampranthus Capornii* L.Bol. f. *fera* L.Bol.
Mesembryanthemum Capornii L.Bol. var. *longifolium* L.Bol. = *Lampranthus Capornii* L.Bol. var. *longifolius* L.Bol.
Mesembryanthemum cedarbergense L.Bol. = *Lampranthus cedarbergensis* L.Bol.
Mesembryanthemum ceriseum L.Bol. = *Lampranthus ceriseus* L.Bol.

- Mesembryanthemum citrinum* L.Bol. = *Lampranthus citrinus* L.Bol.
Mesembryanthemum convexum L.Bol. = *Lampranthus convexus* L.Bol.
Mesembryanthemum copiosum L.Bol. = *Lampranthus copiosus* L.Bol.
Mesembryanthemum crystallinum L. var. *grandiflorum* Eckl. et Zeyh. = *Mesembr. magniflorum* L.Bol.
Mesembryanthemum crystallophanes Eckl. et Zeyh. = *Mesembr. Aitonis* Jacq.
Mesembryanthemum dealbatum N.E.Br. = *Dracophilus dealbatus* Walgate.
Mesembryanthemum densipetalum L.Bol. = *Lampranthus densipetalus* L.Bol.
Mesembryanthemum dependens L.Bol. = *Lampranthus dependens* L.Bol.
Mesembryanthemum dubitans L.Bol. = *Lampranthus dubitans* L.Bol.
Mesembryanthemum dulce L.Bol. = *Lampranthus dulcis* L.Bol.
Mesembryanthemum Ernestii L.Bol. = *Lampranthus Ernestii* L.Bol.
Mesembryanthemum excedens L.Bol. = *Lampranthus excedens* L.Bol.
Mesembryanthemum egregium L.Bol. = *Lampranthus egregius* L.Bol.
Mesembryanthemum Edwardsiae L.Bol. = *Lampranthus Edwardsiae* L.Bol.
Mesembryanthemum Fergusoniae L.Bol. = *Lampranthus Fergusoniae* L.Bol.
Mesembryanthemum Galpiniae L.Bol. = *Lampranthus Galpiniae* L.Bol.
Mesembryanthemum glaciale Haw. = *Mesembr. crystallinum* L.
Mesembryanthemum globosum L.Bol. = *Lampranthus globosus* L.Bol.
Mesembryanthemum Godmaniae L.Bol. = *Lampranthus Godmaniae* L.Bol.
Mesembryanthemum Godmaniae L.Bol. var. *grandiflorum* L.Bol. = *Lampranthus Godmaniae* L.Bol. var. *grandiflorus* L.Bol.
Mesembryanthemum Herrei L.Bol. = *Lampranthus Herrei* L.Bol.
Mesembryanthemum hiemale L.Bol. = *Lampranthus hiemalis* L.Bol.
Mesembryanthemum Hollandii L.Bol. = *Lampranthus Hollandii* L.Bol.
Mesembryanthemum humile L.Bol. = *Lampranthus perreptans* L.Bol.

- Mesembryanthemum Hurlingii* L.Bol. = ***Lampranthus Hurlingii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum laetum* L.Bol. = ***Lampranthus laetus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum lanceolatum* Haw. (incl. var.) = ***Mesembr. Aitonis*** Jacq.
- Mesembryanthemum Lawisii* L.Bol. = ***Lampranthus Lawisii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum laxum* L.Bol. = ***Lampranthus sublaxus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Leightoniae* L.Bol. = ***Lampranthus Leightoniae*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Leipoldtii* L.Bol. = ***Lampranthus Leipoldtii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum leptosepalum* L.Bol. = ***Lampranthus leptosepalus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Lewisiae* L.Bol. = ***Lampranthus Lewisiae*** L.Bol.
- Mesembryanthemum liberale* L.Bol. = ***Lampranthus liberalis*** L.Bol.
- Mesembryanthemum longisepalum* L.Bol. = ***Lampranthus longisepalus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum macrosepalum* L.Bol. = ***Lampranthus macrosepalus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Mariae* L.Bol. = ***Lampranthus Mariae*** L.Bol.
- Mesembryanthemum maritimum* L.Bol. = ***Lampranthus falci-formis*** N.E.Br. var. ***maritimus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Martleyi* L.Bol. = ***Lampranthus Martleyi*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Meleagris* L.Bol. = ***Lampranthus Meleagris*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Middlemostii* L.Bol. = ***Lampranthus Middlemostii*** L.Bol.
- Mesembryanthemum monticolum* L.Bol. = ***Lampranthus monticulus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum nardouwense* L.Bol. = ***Lampranthus nardouwensis*** L.Bol.
- Mesembryanthemum obconicum* L.Bol. = ***Lampranthus obconicus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum paardebergense* L.Bol. = ***Lampranthus paardebergensis*** L.Bol.
- Mesembryanthemum Pageanum* L.Bol. (L.B. II. 97) = ***Lampranthus ornatus*** L.Bol.
- Mesembryanthemum pakhuisense* L.Bol. = ***Lampranthus pakhuisensis*** L.Bol.
- Mesembryanthemum palustre* L.Bol. = ***Lampranthus palustris*** L.Bol.

- Mesembryanthemum Peacockiae* L.Bol. = *Lampranthus Peacockiae* L.Bol.
- Mesembryanthemum persistens* L.Bol. = *Lampranthus persistens* L.Bol.
- Mesembryanthemum piquetbergense* L.Bol. = *Lampranthus piquetbergensis* L.Bol.
- Mesembryanthemum plenum* L.Bol. = *Lampranthus plenus* L.Bol.
- Mesembryanthemum praecipitatum* L.Bol. = *Lampranthus praecipitatus* L.Bol.
- Mesembryanthemum primivernum* L.Bol. = *Lampranthus primivernus* L.Bol.
- Mesembryanthemum prominulum* L.Bol. = *Lampranthus prominulus* L.Bol.
- Mesembryanthemum punctulatum* L.Bol. = *Lampranthus punctulatus* L.Bol.
- Mesembryanthemum rabiesbergense* L.Bol. = *Lampranthus rabiesbergensis* L.Bol.
- Mesembryanthemum rubroluteum* L.Bol. = *Lampranthus rubroluteus* L.Bol.
- Mesembryanthemum rubrum* L.Bol. = *Lampranthus ruber* L.Bol.
- Mesembryanthemum salicolum* L.Bol. = *Lampranthus salicolus* L.Bol.
- Mesembryanthemum Salteri* L.Bol. = *Lampranthus Salteri* L.Bol.
- Mesembryanthemum Sauerae* L.Bol. = *Lampranthus Sauerae* L.Bol.
- Mesembryanthemum serpens* L.Bol. = *Lampranthus serpens* L.Bol.
- Mesembryanthemum suarissimum* L.Bol. = *Lampranthus suarissimus* L.Bol.
- Mesembryanthemum suarissimum* L.Bol. f. *fera* L.Bol. = *Lampranthus suarissimum* L.Bol. f. *fera* L.Bol.
- Mesembryanthemum suarissimum* L.Bol. var. *oculatum* L.Bol. = *Lampranthus suarissimum* L.Bol. var. *oculatus* L.Bol.
- Mesembryanthemum subaequale* L.Bol. = *Lampranthus subaequalis* L.Bol.
- Mesembryanthemum subglobosum* L.Bol. = *Lampranthus subrotundus* L.Bol.
- Mesembryanthemum supernans* L.Bol. = *Lampranthus supernans* L.Bol.
- Mesembryanthemum steenbergense* L.Bol. = *Lampranthus steenbergensis* L.Bol.
- Mesembryanthemum thermarum* L.Bol. = *Lampranthus thermarum* L.Bol.
- Mesembryanthemum uniflorum* L.Bol. = *Lampranthus uniflorus* L.Bol.
- Mesembryanthemum vernale* L.Bol. = *Lampranthus vernalis* L.Bol.

- Mesembryanthemum vernicolor* L.Bol. = *Lampranthus vernicolor* L.Bol.
Mesembryanthemum Villiersii L.Bol. = *Lampranthus Villiersii* L.Bol.
Mesembryanthemum Volckameri Haw. = *Mesembr. Aitonis* Jacq.
Nananthus Jamesii L.Bol. (L.B. III. 133 [non L.B. II. 304]) = *Nananthus cradockensis* L.Bol.
Nananthus Peersii L.Bol. = *Cheiridopsis noctiflora* L.Bol.
Nananthus Soehlemannii Hge. jr. = *Cheiridopsis noctiflora* L.Bol.
Platythyra Barklyi Schwant. = *Mesembr. Barklyi* N.E.Br.

IV. Literaturzitate — Nachträge.

- Conophytum altum* L.Bol. — L.B. III. 139.
Conophytum bilobum (Marl.) N.E.Br. — L.B. III. 140.
Conophytum blandum L.Bol. — L.B. III. 141.
Conophytum breripetalum Lav. — C.J. VII. 97; L.B. III. 145.
Conophytum calitzdorpense L.Bol. — C.J. VII. 100; L.B. III. 147.
Conophytum caterrum N.E.Br. — C.J. VII. 98; L.B. III. 146.
Conophytum citrinum L.Bol. — L.B. III. 139.
Conophytum concarum L.Bol. — L.B. III. 141.
Conophytum cordatum Schick et Tisch. var. *macrostigma* L.Bol. — L.B. III. 140.
Conophytum eenkokerense L.Bol. — L.B. III. 143.
Conophytum Fulleri L.Bol. — L.B. III. 143.
Conophytum Leightoniae L.Bol. — C.J. VII. 98; L.B. III. 145.
Conophytum marginatum Lavis. — L.B. III. 142.
Conophytum Meyerae Schwant. — L.B. III. 141.
Conophytum modestum L.Bol. — L.B. III. 140.
Conophytum parvulum L.Bol. — L.B. III. 140.
Conophytum pisinum N.E.Br. — C.J. VII. 100; L.B. III. 147.
Conophytum praecinctum N.E.Br. — C.J. VII. 99.
Conophytum Primosii Lavis. — L.B. III. 145.
Conophytum pubicalyx Lavis. — L.B. III. 143.
Conophytum regale Lavis. — L.B. III. 141.
Conophytum Renniei Lavis. — C.J. VII. 100; L.B. III. 149.
Conophytum Schlechteri Schwant. — D.K.G.B. I (1938) 89.
Conophytum spectabile Lavis. — C.J. VII. 98; L.B. III. 146.
Conophytum spirale N.E.Br. — C.J. VII. 98; L.B. III. 147.
Conophytum subglobosum Tisch. — C.J. VII. 100; L.B. III. 149.
Conophytum turrigerum N.E.Br. — L.B. III. 142.
Conophytum violaciflorum Schick et Tisch. — L.B. III. 143.
Conophytum vlakmyense L.Bol. — L.B. III. 139.
Conophytum Wiggettae N.E.Br. — L.B. VII. 97; L.B. III. 145.

409/20

2B

Cryophytum conjectum N.E.Br. — (Ungenügend beschriebene Art. L. Bolus in L.B. III. 167.)

Dracophilus Dtr. et Schwant. — L.B. III. 182.

Dracophilus Delaetianus (Dtr.) Dtr. et Schwant. — L.B. III. 183.

Dracophilus Montis-Draconis (Dtr.) Dtr. et Schwant. — L.B. III. 184.

Juttadinteria Schwant. — L.B. III. 171, 173.

Juttadinteria albata L.Bol. — L.B. III. 180.

Juttadinteria ausensis (L.Bol.) Schwant. — L.B. III. 181.

Juttadinteria decumbens Schick et Tisch. — L.B. III. 118.

Juttadinteria deserticola (Marl.) Schwant. — L.B. III. 176.

Juttadinteria Elizae (Dtr. et Bgr.) L.Bol. — Engl. Bot. Jahrb.

Suppl. L. p. 597 (1914); L.B. III. 182.

Juttadinteria insolita L.Bol. — L.B. III. 177.

Juttadinteria kovisimontana (Dtr.) Schwant. — L.B. III. 175.

Juttadinteria longipetala L.Bol. — L.B. III. 175.

Juttadinteria Simpsonii (Dtr.) Schwant. — L.B. III. 181.

Juttadinteria suavissima (Dtr.) Schwant. — L.B. III. 180.

Juttadinteria tetrasepala L.Bol. — L.B. III. 177.

Lampranthus gracilipes (L.Bol.) N.E.Br. Synonym einfügen: (*Lampr. gracilipes* L.Bol.).

Lithops Bromfieldii L.Bol. — Wie folgt ergänzen: (*L. insularis* L.Bol.). — Gordonias Divis., bei Upington, Insel Keimos, im Oranje-Fluß (*L. ins.*). — L.B. II. 452; L.B. III. 75 (*L. ins.*); S. (1939) 78.

Lithops Dinteri Schwant. — D.K.G.B. II (1939) 44.

Mesembryanthemum L. (emend.) L.Bol. — L.B. III. 164—166.

Mesembryanthemum L. (emend. N.E.Br.) — G.C. (1930, I) 32.

Mesembryanthemum L. (emend. Schwant.). — D.K.G. (1927/28) 24.

Mesembryanthemum nodiflorum L. — Fabii Columnae Lyncei Ekphrasis, p. 72 (1616); L.B. III. 167.

Namibia Dtr. et Schwant. — L.B. III. 186.

Namibia cinerea (Marl.) Dtr. et Schwant. — L.B. III. 186.

Namibia Pomonae (Dtr.) Dtr. et Schwant. — L.B. III. 187.

Namibia ponderosa (Dtr.) Dtr. et Schwant. — SW.-Afr., nahe Halenbsrg. — L.B. III. 187.



Biblioteka
W. S. P.
w Gdańsku

0451

C-II-1798

72814

SB