

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdén gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.*
- *E gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak.*

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Belara filmtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Belara filmtabletták szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Belara filmtablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

BELARA filmtabletta

Hatóanyag: 1,71 mg klórmadinon, (2 mg klórmadinon-acetát formájában) és 30 µg etinil-ösztadiol filmtablettánként
Segédanyagok: magnézium-sztearát, polividon K30, kukoricakeményítő, vörös vasoxid, propilén-glikol, makrogol, talkum, titán-dioxid, hipromellóz, laktóz-monohidrát (68,97 mg).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Grünenthal GmbH, Németország

Gyártó:

Grünenthal GmbH D- 52078 Aachen, Germany
Grünenthal GMBH Aachen, Németország licence alapján

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A BELARA FILMTABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Belara filmtabletta progesztágent (klórmadinon) és ösztrogént tartalmazó monofázisú fogamzásgátló készítmény. Hormonális fogamzásgátlás.

2. TUDNIVALÓK A BELARA FILMTABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

Nem alkalmazható a Belara filmtabletta:

- Terhesség,
- Fennálló vagy a múltban lezajlott véralvadási problémák a vénákban vagy az artériákban, pl. mélyvénás trombózis, tüdőembólia, szívinfarktus, agyvérzés.
- Műtétek előtt (a tervezett műtét időpont előtt 4 - 6 héttel hagyja abba a Belara szedését) valamint hosszantartó mozgáskorlátozottság, pl. balesetek után (gipszes stb.)
- Kóros véralvadást megelőző állapotok vagy annak kezdődő jelei, vénagyulladás vagy embólia, mint pl. műlő, néha éles fájdalom vagy szorító érzés a mellkasban.
- Cukorbetegség érelváltozásokkal
- Kifejezett, nem ellenőrzött vércukor-ingadozások.
- Nehezen befolyásolható magas vérnyomás vagy a vérnyomás jelentős emelkedése
- Sárgaság, májgyulladás (ha a májgyulladás a vírus okozta, nem szedheti a Belara filmtablettát a normál érték elérését követő hat hónapig), egész testre terjedő viszketés, epe elvezetés, és májműködés rendellenességei esetében (különösen ha ezek a rendellenességek az előző terhesség vagy ösztrogén kezelés hatására keletkeztek).
- Vírushepatitis után a máj paraméterek normál értékre történő visszaállása után 6 hónapig.
- Dubin-Johnson szindróma, Rotor szindróma, epe elfolyási rendellenesség esetén.
- Múltbéli vagy fennálló májdaganat
- Súlyos alhasi fájdalom, megnagyobbodott máj vagy hasúri vérzés jelei.
- Sarlósejtes vérszegénység
- Porfiria első vagy ismételt megjelenése (olyan rendellenességek egy csoportja melyet a hem szintézisében szerepet játszó enzim okoz).
- Múltban előforduló vagy jelenleg fennálló hormon-függő rosszindulatú daganatok, mint például emlő- vagy méhdaganat.
- Súlyos zsíryanycsere elváltozások
- Migrén-szerű fejfájás jelentkezése vagy szokatlanul súlyos fejfájás jelentkezése fokozott gyakorisággal.
- Érzés vagy mozgásérzékelési zavarok, amelyek a migrént kísérik.
- Hirtelen megjelenő érzékszervi zavarok (látási és hallási zavarok)
- Mozgás zavarai (különösen a bénulás jelei).
- Epilepsziás rohamok fokozódása
- Bőrhólyagok jelentkezése a korábbi terhességekben (herpes gestationis).
- Ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés
- Fokozott érzékenység (allergia) a Belara valamely összetevőjével szemben

Fontos információk a kezelés megkezdése előtt:

Bizonyos körülmények között az alább említett esetekben különös figyelemmel lehet alkalmazni a Belara filmtablettát. Bizonyos betegségek/állapotokat a hormonális fogamzásgátlók szedése befolyásol. Kérjen tanácsot orvosától, ha az alábbi betegségek közül valamelyik előfordult Önnél a múltban vagy a Belara szedése közben kialakult volna:

- epilepszia
- sclerosis multiplex
- otosclerosis (a középfül eredetű sükettség speciális formája)
- izomgörcsök (tetánia)
- migrén
- szív-, vese- vagy májbetegségek
- vitus-tánc (chorea minor)
- cukorbetegség
- zsíryanycsere zavarok
- immunrendszer betegségei (lupus erythematosus)
- elhízás
- magas vérnyomás
- jóindulatú méhnyálkahártya burjánzása
- visszér
- vénagyulladás
- véralvadási zavarok
- emlőgyulladás
- méh jóindulatú daganata (mioma)

Terhesség, szoptatás

Terhesség: ha a fogamzásgátló szedése közben terhes lesz, hagyja abba a filmtabletták szedését, jöllehet a Belara szedése közben jelentkező terhességet nem kell megszakítani.

Szoptatás: ha szoptatás alatt Belara-t szed vegye figyelembe, hogy a tejtermelés csökkenhet és a gyógyszer a tej állomány minőségét is befolyásolhatja. Kis

mennyiségben az aktív hatóanyagok átjutnak az anyatejbe, de a csecsemőre káros hatásuk nem ismeretes. Mindazonáltal a hormonális fogamzásgátlók, (a Belara is) kerülendőek, amíg a szoptatás tart.

Fokozott elővigyázatosság

Ha a következő kockázati tényezők valamelyike fennáll, kialakul vagy súlyosbodik a gyógyszer szedése alatt, azonnal forduljon orvosához. Orvosa fogja meghatározni, hogy Ön tovább szedheti a Belara filmtablettát vagy abba kell hagynia.

Véralvadási zavarok

Számos bizonyíték arra mutat, hogy a hormonális fogamzásgátlók a vénákban és artériákban vérrögök létrejöttének fokozott kockázatát jelentik. Ennek eredménye lehet szívinfarktus, agyvérzés, mélyvénás trombózis és tüdőembólia. Ezek előfordulása ritka. Vénás trombózis akkor is kialakulhat, ha Ön nem szed hormonális fogamzásgátlót. A vénás trombózis előfordulása a fogamzásgátlók szedőkben nagyobb kockázatot jelent, mint a nem szedőkben, de kisebb a kockázata, mint magának a terhességnek. Az erekben jelentkező kóros alvadás jelei: fájdalom és / vagy duzzanat a lábon, hirtelen súlyos mellkasi fájdalom, ami akár a bal karba is kisugározhat, hirtelen légszomj, hirtelen köhögés, váratlanul jelentkező súlyos fejfájás, részleges vagy teljes látászavar, kettős-látás, beszédnehézség, szédülés, ájulás (esetleg epilepsziás rohammal együtt) hirtelen gyengeség és jelentős zibbadás a test egyik felén, mozgási rendellenesség vagy hirtelen fájdalom a hasüregben.

Az érzékelődés kockázatát a következő tényezők fokozhatják:

- Életkor
- Dohányzás (a dohányzás mellett a kockázat fokozódik a korrallal és az emelkedő cigaretta fogyasztással) különösen a 35 év fölötti nők tartózkodjanak a dohányzástól, ha hormonális fogamzásgátlót szednek.
- Érelzáródási betegségek előfordulása a családban (pl.: testvér, szülők fiatalkori trombózis). Ebben az esetben orvosa elvégeztesse egy véralvadás teszt vizsgálatot és az eredménytől függően dönti el, hogy Ön szedheti-e a Belara filmtablettát.
- Jelentős túlsúly.
- Zsíryanycsere zavarok
- Magas vérnyomás
- Szívbetegségek
- Pitvar fibrilláció (szívritmus zavar).
- Hosszantartó ágyhoz kötöttség, nagyobb műtétek, az alsó lábszár műtéti vagy súlyos sérülései. Ezekben az esetekben min. 4 héttel a műtét tervezett időpontja előtt hagyja abba a Belara szedését. Ne kezdje el újra a gyógyszer szedését korábban, mint a teljes mozgásképesség visszanyerése után 2 héttel.

Daganatok kialakulása

Bizonyítékok vannak arra, hogy a hormonális fogamzásgátlók enyhén fokozhatják a mellrák kockázatát. Valószínűleg azok a nők, akik ilyen készítményeket alkalmaznak, gyakrabban kerülnek vizsgálatra és ezért a mellrák korábban felismerhető. Azt is kimutatták, hogy ez a kockázat átmeneti és a kezelés abbahagyás után 10 évvel már megszűnik. Ritkán figyelték meg a jóindulatú- és még ritkábban rosszindulatú májdaganat előfordulását hormonális fogamzásgátlók szedése során. Ugyanakkor a hormonális fogamzásgátlók csökkentik a petefészek- és a méhrák kialakulásának kockázatát.

Egyéb betegségek

Nem szedhet Belara filmtablettát, ha Ön galaktóz intoleranciában, laktáz hiányban vagy glükóz-galaktóz felszívódási zavarban szenved. Ritkán barna foltok jelentkezhetnek az arcon, különösen ha már ez korábbi terhességeknél is jelentkezett. Ha hajlama van erre az elváltozásra, akkor a Belara szedése közben a tartós napozást kerülje.

Menstruációs ciklusra gyakorolt hatás

Vérzés a menstruációs ciklus közben:

Ritka esetekben, különösen a hormonális fogamzásgátló szedésének első néhány hónapjában szabálytalan (áttörésses/pecsételő) vérzés jelentkezhet. Ilyen esetben általában tovább folytathatja a Belara szedését. Ha a vérzés néhány napon belül magától nem szűnik meg vagy több cikluson keresztül megismétlődik, forduljon orvosához. A ciklus közben jelentkező vérzés a fogamzásgátlás hatássóságának csökkenését is jelentheti. Ez megtörténhet, ha Ön elfelejtette bevenni a Belara filmtablettát, hányszor vagy hasmenés miatt vagy ha bizonyos más gyógyszereket szedett egyidejűleg (lsd. „Helytelen használat és túladagolás” és „Kölcsönhatás” résznl).

Megvonásos vérzés hiánya:

A Belara 21 napon szedése után a vérzés hasonlít a menstruációs vérzéshez. Alkalmoszerűen, különösen a gyógyszer alkalmazásának első néhány hónapjában ez a vérzés elmaradhat, ami nem szükségszerűen a csökkent fogamzásgátló hatásosság jele. Ha Ön helyesen alkalmazta a gyógyszert, a tabletamentes időszak nem haladhatja meg a 7 napot, nem szedett más gyógyszereket egyidejűleg és nem volt erős hányása, hasmenés, akkor nem valószínű, hogy Ön terhes. Ez esetben Ön folytathatja a Belara szedését. Az új ciklus első 10 napja alatt terhesség kizárható. Ha viszont a vérzés két egymást követő ciklusban nem jelentkezik, akkor kérdezze meg orvosát, hogy folytathatja-e a Belara szedését.

Orvosi vizsgálatok

Mielőtt elkezdi a fogamzásgátló szedést az orvos elrendelheti az általános és nőgyógyászati kivizsgálást. Ennek célja a terhesség fennállásának kizárása, valamint az ellenjavallatok és figyelmeztetések figyelembe vételével annak eldöntése, hogy a Belara alkalmazása megfelel-e Önnek. Később ezeket a vizsgálatokat a Belara szedése során évente meg kell ismétlni.

Hatásosság

A filmtabletták szedés elfelejtése, hányás, hasmenés (lsd. „Helytelen használat és túladagolás”) valamint más gyógyszerek egyidejű használata (lsd. „Kölcsönhatások”)

károsíthatja a hormonális fogamzásgátlók hatosságát. Még helyes használat esetében sem képesek a hormonális fogamzásgátlók 100% védelmet biztosítani a terhesség ellen. A hormonális fogamzásgátlók nem védenek meg az AIDS ellen, sem egyéb, szexuálisan terjedő betegségekkel szemben.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása (gyógyszerkölcsonhatások)

A Belara fogamzásgátló hatóanyag tartalma gyógyszerek egyidejű bevitelével károsulhat.

Ilyen hatóanyagok

fenitoin, barbiturátok, karbamazepin, rifampicin, oxokarbazepin, topiramát, felbamát, griseofulvin, fenilbutazon, barbaklone és primidon valamint bizonyos antibiotikumok, mint az ampicillin és tetraciklinek.

Ha már használja vagy kezdi használni a fent említett hatóanyag tartalmú gyógyszereket folytathatja a Belara szedését. A kezelés alatt és 7 nappal a kezelés vége után használjon kiegészítőként nem hormonális védekező módszereket, mint pl.: kondom (Knaus-Ogino hőmérséklet ellenőrző módszer kivételével). Ha rifampicin készítményt szed, akkor egyéb kiegészítő nem hormonális védekezési módszert is kell alkalmazni a rifampicin kezelés befejezését követő 4 hétig. Mondja el orvosának, ha inzulinra, vagy más vércukor csökkentő gyógyszerrel kezelik. Lehetséges ugyanis, hogy azok adagját csökkenteni kell. A hormonális fogamzásgátlók alkalmazása során a koffein és teofillin kiürülése csökkenhet, ami fokozott és elnyújtott hatásukat eredményezheti. Vegye figyelembe a fenti tényeket, ha a Belara szedés megkezdése előtt periódusban szedte a fenti anyagok bármelyikét. Bizonyos májfunkciós vizsgálatokat a mellékvese és pajzsmirigy laboratóriumi értékeit a Belara szedés befolyásolhatja. Ilyenkor vérével előtt tájékoztassa orvosát a Belara szedéséről.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Járművezetést és gépkezelést nem befolyásolja.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A BELARA FILMTABLETTÁT?

Az itt következő irányelvek minden esetben érvényesek, kivéve ha az Ön orvosa ettől eltérő utasítást adott a Belara használatára. Kérjük kövesse a használati utasítást, mivel másképp a gyógyszer nem képes teljesen kifejteni hatását.

Nyomja ki a bliszterből az első filmtablettát, amelyen a megfelelő napot jelölik (pl.: Sun = Sunday, V = Vasárnap) és nyelje le rágás nélkül. Utána mindennap vegyen ki egy filmtablettát a nyíl irányába haladva. Amennyiben lehetséges mindennap ugyanabban a napszakban vegye be a gyógyszert, lehetőleg este. A két filmtabletta közötti időtartam lehetőleg mindig 24 óra legyen. A napokat jelölő nyomtatott jelzés a csomagoláson lehetővé teszi, hogy mindennap ellenőrizze, hogy bevette-e az aznapi gyógyszert. A napi egy filmtablettát egymást követő 21 napon keresztül szedje. Ezt kövesse egy 7 napos gyógyszermentes időszak. A vérzés általában 2 - 4 nappal az utolsó filmtabletta bevétele után jelentkezik. A 7 napos gyógyszermentes időszak után folytassa a következő csomagból a Belara szedését, függetlenül attól, hogy a vérzés abba maradt-e vagy még fennáll.

Ha előzőleg (az utolsó havi ciklusban) nem szedett semmiféle hormonális fogamzásgátlót:

Az első Belara filmtablettát a következő menstruáció első napján vegye be. A fogamzásgátló hatás kifejődéséhez legalább 1 heti folyamatos adagolás szükséges és ez a hatás 7 napos gyógyszermentes időszakban is fennáll.

Ha menstruációja már elkezdődött vegye be az első filmtablettát a menstruáció 5. napján függetlenül attól, hogy a vérzés már megszűnt vagy fennáll. Ebben az esetben azonban más fogamzásgátló módszert is kell alkalmazni a filmtablettaszedés első 7 napjában (7 napos szabály).

Ha menstruáció kezdete több mint 5 nappal korábban volt, akkor várja meg a következő menstruációt és csak akkor kezdje el a Belara szedését.

Ha korábban másfajta 21-napos vagy 22-napos készítményt szedett:

Használja fel a régi készítményt az előírásoknak megfelelően. A Belara filmtabletta bevitelét közvetlenül az ezt követő napon kezdje meg, tehát anélkül, hogy a tabletták szedését megszakítaná. Nem szükséges megvárnia a következő menstruációt. Ugyancsak nincs szükség kiegészítő védekezési módszerre.

Ha korábban kombinált fogamzásgátlót (COC) szedett:

Az előző készítmény utolsó tablettája után kezdje el azonnal a Belara filmtabletta bevitelét, anélkül, hogy a tabletták szedését megszakítaná. Nem szükséges megvárnia a következő menstruációt. Ugyancsak nincs szükség kiegészítő védekezési módszerre. Ha korábban csak progesztin készítményt használt (amit általában "mini-pill"-nek neveznek):

Az első Belara filmtablettát a menstruációja első napján vegye be, akkor is ha már az adott napon bevette a "mini-pill"-t. Nincs szükség kiegészítő védekezésre. A "mini-pill" filmtabletta szedésekor a menstruáció elmaradhat. Ebben az esetben az első Belara filmtablettát csak az utolsó "mini-pill" bevétele után egy nappal vegye be. Ez esetben azonban az első hét napon kiegészítő védekezést kell alkalmazni.

Ha korábban fogamzásgátló hormon injekciókat kapott vagy spirált viselt:

Az első Belara filmtablettát azon a napon vegye be, amelyen a spirált eltávolították vagy amelyiken az injekció beadását tervezték. A következő hét napon azonban kiegészítő védekezést kell alkalmazni.

Első harmadban bekövetkező vetélés vagy terhességmegszakítás után:

A Belara filmtabletta szedését kezdje el a vetélés vagy a terhességmegszakítás után. Ebben az esetben nem szükséges a kiegészítő védekezés.

Szülés után vagy a II. harmadban elvégzett terhességmegszakítás után:

Ha nem szoptat akkor 21 - 28 nappal a szülés után már elkezdheti a Belara szedését. Ha több mint 28 nap telt el a szülés óta, akkor az első hét napon kiegészítő védekezést kell alkalmazni.

Ha korábban már nemi életet élt, akkor ki kell zárni a terhesség lehetőségét és akkor kell elkezdeni a Belara szedését, amikor a következő menstruáció elkezdődik.

Terhességmegszakítás után 21 - 28 nappal kezdheti el szedni a filmtablettát.

Vegye figyelembe, hogy a szoptatás alatt tilos a Belara filmtabletta szedése!

Ha hormonális fogamzásgátlást akar folytatni, akkor a Belara filmtablettát az ellenjavallatok és figyelmeztetések figyelembevételével mellett évenként folytathatja. A filmtabletta szedésének abbahagyása után általában az ivarmirigyek működése gyorsan visszaáll és ismét fogamzóképesé válhat. Ilyenkor a következő menstruáció jelentkezése néhány hetet késhet.

Ha túl sok Belara filmtablettát vett be (szándékos vagy véletlen túladagolás):

Egyszeri nagyszámú filmtabletta bevitelének nincsenek súlyos mérgezési tünetei. Általában gyerekek esetében sem jelentkeznek komoly panaszok.

Lehetséges hatások: hányinger, hányás és lány gyermeknél vérzés.

Ezekben az esetekben forduljon orvosához, aki szükség esetén ellenőriztetni fogja a só-víz háztartást és a májfunkciót.

Ha elfelejtette bevenni a Belara filmtablettát:

Ha elfelejtette bevenni a filmtablettát a szokásos időben, akkor azt 12 órán belül pótolja. Ebben az esetben egyéb védekezés nem szükséges és a szokásos módon folytathatja a Belara filmtabletta szedését. Ha a filmtabletta pótlás 12 óránál hosszabb

idő múlva történik, akkor a Belara filmtabletta fogamzásgátló hatása nem biztosított. Ebben az esetben azonnal vegye be az elfelejtett filmtablettát és a következő filmtablettát a szokásos időpontban. Ilyenkor azonban a következő 7 napban egyéb védekezést (pl.: kondom) kell alkalmazni. Ha ezalatt a 7 nap alatt fogy el a gyógyszer azonnal vegye elő a következő Belara csomagot és abból folytassa megszakítás nélkül (7 napos szabály). Ha a következő csomagot is elhasználta és menstruációja nem jelentkezik, akkor végezze el a terhességi tesztet.

Ha hányinger, hányás jelentkezik a Belara szedése alatt:

A gyógyszer bevitelét követő 2 - 4 óras időszakra jelentkező hányás esetén ugyanúgy folytassa a Belara szedését mint egyébként. Mivel azonban lehetséges, hogy az aktív hatóanyagok nem teljesen szívódnak fel a szervezetben ezért a megbízható fogamzásgátlás nem garantált. Ebben az esetben a menstruációs ciklus napjaiban kiegészítő védekezést kell alkalmazni.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek a Belara filmtablettának is lehetnek mellékhatásai.

Súlyos mellékhatások

1. Hormonális fogamzásgátlók az artériák és vénák területén a véráramlás fokozott kockázatával járnak (pl. vénatrombózis, tüdőembólia, agyvérzés, szívinfarktus). Ez a kockázat tovább fokozódhat egyéb rizikó-faktorok által (Isd.: Figyelmeztetések).
2. Hosszú távú alkalmazás során az erebetegségek előfordulási gyakoriságának enyhe fokozódását figyelték meg. Az ösztrogén tartalmazó készítmények, mint a Belara is nem fokozza bizonyíthatóan az epéké képződés előfordulását.
3. Nagyon ritkán jóindulatú- és még ritkábban rosszindulatú májdaganatok kialakulását figyelték meg a hormonális fogamzásgátlók szedése kapcsán és kivételesen előfordult életveszélyes hasúri vérzés.
4. Tájékoztassa orvosát ha olyan hasi panaszokat tapasztal, ami magától nem szűnik meg. Ilyenkor lehetséges, hogy abba kell hagyni a Belara szedését. Nagyon ritka esetekben a panaszokat máj vagy belek vénáinak trombóza okozhatja.

Enyhe mellékhatások

Enyhe mellékhatások gyakran járnak együtt a hormonális fogamzásgátlók, így a Belara szedésével is. Ezek a mellékhatások a felhasználó jó közérzetét befolyásolhatják, de nem jelentenek komoly egészségi kockázatot.

Általában a tünetek előfordulási gyakorisága a gyógyszer folyamatos alkalmazása során csökken.

Idegrendszer

Gyakori: lehangolt lelkiállapot, ingerlékenység, fejfájás
Alkalmanként: idegesség, szédülés, migrén (vagy ezek kiújulása)

Érzékszervek

Alkalmanként: látási zavarok
Ritkán: kőtőhárya gyulladás (pl. kontaktlencse viselőknél), kényelmetlen érzés kontaktlencse viselésekor, fülzúgás

Szív és érrendszer

Ritkán: ájulás
Nagyon ritkán: magas vérnyomás

Gyomor-, bélrendszer

Gyakori: hányinger
Alkalmanként: hányás
Ritkán: hasi fájdalom, gyomor-, bélpanaszok

Bőr

Ritkán: pigment zavarok, chloasma (barna foltok az arcon), száraz bőr, csalánkiütés, viszketés, bizonyos allergiás bőrreakciók, átmeneti pattanás és hajhullás
Nagyon ritkán: ekcéma, bőrpír, meglévő pikkelysömör kiújulása

Izom, csont és kötőszövet

Ritkán: hát fájdalom, izompanaszok

Nemi szervek és emlők

Gyakori: emlő feszülés, hüvelyi folyás, fájdalmas menstruáció
Ritkán: alhisi fájdalom, hüvelygomba, emlőmirigy váladékozása, jóindulatú kötőszöveti elváltozások, hüvelygyulladások előfordulhatnak bár a petefészek tiszták előfordulási gyakorisága csökken.
Nagyon ritkán: mellmegnagyobbzás, elnyújtott és / vagy felerősödött menstruációs vérzés valamint pre-menstruációs tünetek (fizikai és lelki instabilitás a vérzést megelőzően)

Egyéb

Gyakori: fáradékonyság
Alkalmanként: elnehezülés érzése és folyadékgyülem (ödéma a lábakon)
Ritkán: súly-, étvágy-, szexuális változások, izzadásra való hajlam

Ha úgy gondolja, hogy Önnél olyan panasz jelentkezik, amelyet ez a tájékoztató nem tartalmaz, kérjük forduljon orvosához vagy gyógyszerészehez.

5. TÁROLÁS

Különleges tárolást nem igényel.

A gyógyszer a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-8786/01-02

Betegtájékoztató OGYI-eng.szám: 13273/41/2005