


Zonas de Pastizales de Chile

Área mediterránea

Rolando Demanet Filippi
Universidad de La Frontera

ZONA DE PASTIZALES

Zona Mediterránea































CUARTEL 167
CARMENERE
PLANTACIÓN 1998

Ningún

Zona Mediterránea

- **Costa Mediterránea**
 - **Estepa Mediterránea Semi - Arida**
 - **Estepa Mediterránea Húmeda**
-

Costa Mediterránea

- **Suelos:** Costa mediterránea, Pardo no cálcico, Pardo rojizo
 - **Clima:** Templado de verano seco
 - **Precipitación:** 400 - 900 mm
 - **Vegetación:** Estepa costera, matorral costero mesomórfico, bosque de transición y matorral costero arborescente.
-

Costa Mediterránea

- **Gramíneas:**

- *Avena barbata*
- *Bromus mollis*
- *Vulpia dertonensis*
- *Aira caryophylla*
- *Briza minor*
- *Piptochaetium stipoides*
- *Stipa duriuscula*

- **Leguminosas:**

- *Trifolium glomeratum*
 - *Trifolium filiforme*
 - *Trifolium macrei*
 - *Medicago polymorpha*
-

Estepa Mediterránea Semi Arida

- **Geomorfología: Complejo montañoso andino - costero**
 - **Suelos: Pardo no Cálcicos**
 - **Clima: Templado con precipitación invernal**
 - **Precipitación promedio anual: 250-600 mm**
 - **Vegetación: Matorral *Acacia caven***
-

Estepa Mediterránea Semi Arida

- **Gramíneas:**

- *Avena barbata*
- *Bromus mollis*
- *Vulpia dertonensis*
- *Aira caryophylla*
- *Briza minor*
- *Hordeum berteruanum*
- *Melica sp.*

- **Leguminosas:**

- *Trifolium glomeratum*
 - *Trifolium striatum*
 - *Trifolium arvense*
 - *Medicago polymorpha*
-

Estepa Mediterránea Semi Arida

Matorral

- *Acacia caven*
 - *Lithraea castica*
 - *Quillaja saponaria*
 - *Proustia pungens*
 - *Trevoa trinervis*
 - *Colletia spinosa*
 - *Maytenus boaria*
 - *Schinus pollyphyllus*
 - *Adesmia arborea*
 - *Colliguaya odorifera*
 - *Baccharis sp.*
 - *Porlieria chilensis*
-

Estepa Mediterránea Húmeda

- **Geomorfología: Llano longitudinal**
 - **Suelos: Pardo no Cálcicos**
 - **Clima: Templado con precipitación invernal**
 - **Precipitación: 700-1.300 mm**
 - **Vegetación : Matorral *Acacia caven***
-

Estepa Mediterránea Húmeda

- **Gramíneas:**

- *Avena barbata*
- *Bromus mollis*
- *Vulpia dertonensis*
- *Aira caryophylla*
- *Koeleria phleoides*
- *Briza minor*
- *Briza maxima.*


- **Leguminosas:**

- *Trifolium glomeratum*
 - *Trifolium striatum*
 - *Trifolium arvense*
 - *Medicago polymorpha*
-

Estepa Mediterránea Húmeda


Matorral

- *Acacia caven*
 - *Lithraea castica*
 - *Quillaja saponaria*
 - *Proustia pungens*
 - *Trevoa trinervis*
 - *Colletia spinosa*
 - *Maytenus boaria*
 - *Boldea boldus*
 - *Cestrum parqui*
 - *Salix chilensis*
 - *Baccharis sp.*
 - *Porlieria chilensis*
-



ESQUEMA DE LAS VARIACIONES DEL INDICE DE IMPORTANCIA DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS DE ACUERDO A LA ANTIGUEDAD DE LA SUBSERE Y AL TRATAMIENTO DE LA PRADERA. ZONA MEDITERRANEA.

FUENTE: OLIVARES Y GASTO, 1971.



CURVAS DE PRODUCCION DE FITOMASA DE LA ESTRATA HERBACEA EN UN PASTIZAL ANUAL EN EL SECANO INTERIOR DE LA REGION MEDITERRANEA.
 FUENTE: OVALLE Y OTROS, 1984.

Zonas de Pastizales de Chile

Área mediterránea

Rolando Demanet Filippi
Universidad de La Frontera