



Ο μοναδικός τριπλός συνδυασμός για κάθε δερματική φλεγμονή!

Τριαμσινολόνη

► Κορτικοστεροειδές

Νυστατίνη

► Αντιμυκοπτιασικό

Νεομυκίνη

► Αντιβιοτικό



Παράτριμμα
(Σύγκαμα)



Κνοσμός
(Φαγούρα)



Εξάνθημα
(Κοκκινίλα)



Οίδημα -
Πόνος

Kenacomb®

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα στα φαρμακευτικά εργαστήρια της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ
Εργ.: 49ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 19011 Αυλώνας, Αττική

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
PROTASIS PHARMACEUTICALS LIMITED CYPRUS
Λεωφόρος Ακροπόλεως 66, 2012, Λευκωσία Κύπρος

Για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης: Τηλ. 210 6561435

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Αριθμός εγκρίσεως ΕΟΦ: 21167/29-4-2009

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την
<< ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ >>



KENACOMB® CREAM
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
NEOMYCIN SULFATE – NYSTATIN
IN UNIBASE

Σύνθεση: 1 g KENACOMB Cream περιέχει: Triamcinolone acetonide 1 mg, Neomycin sulfate ισοδύναμη προς 2,5 mg Neomycin base και Nystatin 100.000 μονάδες, μέσα σε ειδικό έκδοχο, την Unibase. Η Unibase αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των εκδόχων των δερματολογικών σκευασμάτων, επειδή, λόγω της σύνθεσής της, συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες ιδιότητες της αλοιφής και της κρέμας. Εξυπορετεί άριστα τη σημερινή τάση απλοποίησεως, γιατί χρησιμοποιείται με την ίδια επιτυχία τόσο σε υγρές, όσο και σε ξηρές δερματοπάθειες. Επιπλέον, η Unibase δε διακρίνεται καθόλου μετά την εφαρμογή της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακάλιπτες περιοχές όπως το πρόσωπο.

Δράση: Η κρέμα KENACOMB είναι ένα πολυδύναμο σκεύασμα προοριζόμενο για τοπική χρήση σε φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις, ειδικά όταν είναι επιμολυσμένες ή απειλούνται από βακτηριακή μυκοπιασική λοιμώξη. Η KENACOMB ασκεί τις εξής βασικές θεραπευτικές δράσεις: αντιαλεργική, αντιφλεγμονώδη, αντικνησμώδη, αντιμικροβιακή, αντιμυκοπιασική. Το Ακετονίδιο της Τριαμσινολόνης είναι ένα δραστικό τοπικό κορτικοστεροειδές, με ισχυρή αντιφλεγμονώδη, αντιαλεργική και αντικνησμώδη δράση. Επιτυγχάνει γρήγορη, πλήρες και συνήθως παρατεταμένη θεραπευτική αποτέλεσμα ακόμα και σε περιπτώσεις όπου άλλα κορτικοειδή απέτυχαν. Η Νυστατίνη είναι ένα ειδικό αντιμυκοπιασικό αντιβιοτικό που ασκεί εκλεκτική δράση έναντι των μυκήτων του γένους Candida και αποσκοπεί στη θεραπεία ή την αποτροπή των λοιμώξεων που οφείλονται στους μύκοτες αυτούς. Η Νεομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό ευρέος φάσματος, δραστικό έναντι των περισσοτέρων θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηρίων που προκαλούν συνήθως τις λοιμώξεις του δέρματος.

Η κρέμα KENACOMB επιφέρει γρήγορη πλήρη και παρατεταμένη ανακούφιση από τον κνησμό, το κάψιμο και τη φλεγμονή, συγχρόνως δε καταπολεμάει και αποτρέπει τις βακτηριακές ή μυκοπιασικές επιπλοκές σε επιφανειακές μικροβιακές λοιμώξεις, δερματικές καντιντιάσεις, παράτριμα, χρόνιο απλό λειχήνα, πρωκτογεννητικό κνησμό, παιδικό έκζεμα, δερματίτιδα εκ σπαργάνων. Ενδείκνυται επίσης στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που υπόκεινται σε μικροβιακή ή μυκοπιασική λοιμώξη όπως: έκζεμα, ατοπική δερματίτιδα, νομισματοειδή δερματίτιδα, δερματίτιδα εξ επαφής, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και νευροδερματίτιδα. Επιπλέον εξασφαλίζει τη συνεργασία του ασθενούς, επειδή δεν ερεθίζει τοπικά, δεν προκαλεί αλλεργική υπερευαισθησία ούτε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Χάρη στο ειδικό έκδοχο, την Unibase, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές αλλοιώσεις.

Ενδείδεις: Η KENACOMB ενδείκνυται σε δερματοπάθειες που οφείλονται στην Candida Albicans και σε βακτήρια ή που έχουν επιμολυνθεί από αυτά. Βάσει εγκυκλίου του Y.K.Y περιγράφονται πιο κάτω οι αντενδείξεις και οι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι δυνατόν να οφείλονται σε μακροχρόνια χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών.

Αντενδείξεις: Σε λοιμώδεις νόσους, αιμορραγική διάθεση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, σε περιπτώσεις με βαρεία νεφρική νόσο με εξαίρεση τη νέφρωση. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται όταν πρόκειται να γίνουν εμβολιασμοί.

Η κρέμα KENACOMB αντενδείκνυται σε ασθενείς που έχουν υπερευαισθησία στα συστατικά της.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση των τοπικών κορτικοστεροειδών είναι δυνατόν να οφείλονται οι πιο κάτω ανεπιθύμητες ενέργειες: Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδιακού άξονα, πτώση του επιπέδου κορτιζόλης στο πλάσμα, σύνδρομο Cushing, τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί άκαιρης ή τοπικής χρήσεως (μυκοπιασιες-ψώρα), μικροβιακές λοιμώξεις – τοπικές (έναρξη λανθανούσσης λοιμώξεως ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκοπιασικές λοιμώξεις, εμφάνιση μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών

κονδυλωμάτων, αναστολή της επούλωσης τραυμάτων, στοιχεία ακμής ή δημιουργίας φλύκταινας, δροσίθη, περιστοματική δερματίτιδα, εξάνθημα με μορφή "ροδόχρου ακμής", επιδείνωση γλαυκώματος, υποτροπής φλυκταινώδους ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας (Rebound phenomenon), διάχυτες ατροφίες με μορφή ουλών, γραμμοειδείς ραβδώσεις, ευρυαγγείς, ερύθημα διάχυτο, πορφυρά εξανθήματα, άτυπα βλατδο-φυσαληδώδη εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία και τοπική υπερτρίχωση. Κατά τη χρήση της κρέμας KENACOMB είναι πιθανόν να οφείλεται στη Neomycin.

Προφυλάξεις: Εάν εμφανισθεί οποιοσδήποτε ερεθισμός η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. Να αποφεύγεται η μακροχρόνια χρήση στα παιδιά. Γενικά συνιστάται να μη γίνεται χρήση τοπικού κορτικοστεροειδούς περισσότερο από τρεις εβδομάδες χωρίς επανεξέταση από τον ειδικό γιατρό. Όταν εφαρμόζεται στεγανή επίδεση πρέπει το δέρμα να καθαρίζεται πρώτα καλά για να προληφθεί πιθανή επιμόλυνση. Κατά την εφαρμογή στεγανής επίδεσης είναι δυνατόν να παρατηρηθεί θυλακίτιδα, καθώς και τοπική ατροφία του δέρματος.

Δοσολογία: Η κρέμα KENACOMB επαλεύεται στην πάσχουσα περιοχή δύο ή τρεις φορές την ημέρα.

Συσκευασία: Σωληνάρια των 10 g και 25 g. Μπορεί να μνη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κρέμα υποκίτρινου χρώματος για τοπική δερματική χρήση.

Έκδοxa: Antifoam emulsion, methyl paraben, propyl paraben, white soft paraffin, polyoxyethylene fatty alcohol ether, sorbitol solution, aluminium hydroxide gel, titanium dioxide Cl 77891 (E171), propylene glycol, perfume No E 1991 (verley), ethylene diamine, hydrochloric acid, purified water.

Φύλαξη: Διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Το προϊόν να χρησιμοποιείται μέχρι την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Kenacomb®

Παρασκευάζεται στην Ελλάδα:
Στα φαρμακευτικά εργαστήρια της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

Εργ.: 49ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 19011
Αυλώνας, Αττική

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
PROTASIS PHARMACEUTICALS LIMITED
CYPRUS, Λεωφόρος Ακροπόλεως 66, 2012,
Λευκωσία Κύπρος

Για θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης:
Τηλ. 210 6561435

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Αριθμός εγκρίσεως ΕΟΦ: 21167/29-4-2009

