

Addenda et Corrigenda:

Pag. 13 lin. 17, supra, *adde*: rarissime articulo unico instructi.

Tuponia pallida REUT., p. 17, l. 20, supra, *legitur*: *Hab.* in Turkomannia, *lege*: *Hab.* in Turkestan (Sardara!, Kisilkum!, etc.).

Tuponia elegans JAKOVL., p. 18, l. 12, supra, *legitur*: Turkomannia!, *lege*: Turkestan!

Tuponia Lethierryi REUT., p. 20, l. 21, supra, *adde*: Aegyptus! (Museum Holmiae).

Tuponia roseipennis REUT., p. 21, l. 11, supra. *legitur*: *Hab.* in Turcomannia; *lege*: *Hab.* in Turkestan.

Asciodesma obsoletum D. et Sc. Pag. 35, l. 3, supra, *adde*: Hispania, D. v. VOLXEM, sec. D. LETHIERRY.

Auchenocrepis Reuteri JAKOVL., p. 41, lin. 20, supra, *adde*: Turkestan (montes ad Tsirtschik, 3500', Taschkent!), D. OSCHANIN.

Pag. 43 ante *Sthenarum modestum* MEY. *adde*:

Sthenarus dissimilis REUT.

Diagnosis: Oblongus (σ) vel ovatus, niger, subtiliter griseopubescens, praesertim scutello hemelytrisque pilis aureis brevibus adspersis; anten-nis corpore dimidio brevioribus, articulis duobus ultimis pallide testaceis; apice femorum, tibiis anterioribus et tarsis omnibus testaceis, tibiis posticis nigris, apicem versus colore in testaceum vergentibus. Long. ♂ $3\frac{1}{2}$, ♀ $2\frac{1}{2}$ —3 mm.

Syn.: *Atractotomus dissimilis* REUT. olim in litt.

Hab. in *Abiete pectinata*: Gallia (Vosges!), D. Dr PUTON.

Deser.: *Sthenaro modesto* MEY. affinis, a speciebus omnibus colore pedum mox distinctus. *Psallo Kolenatii* FLOR sat similis, differt autem notis genericis, capite aliter constructo, verticis margine postico rotundato et tereti, fronte magis convexa, rostri articulo primo breviore, oculis minoribus et minus exsertis, pedibus anterioribus aliter coloratis. Corpus oblongum et lateribus sub-parallelum (σ) vel ovatum (φ), nigrum, nitidum, subtiliter griseopubescens, praesertim in hemelytris pilis brevioribus pallide aureis adspersum. Caput fortiter nutans, longitudine latius, clypeo basi cum fronte confluente, haud prominente, vertice oculo circiter dimidio (σ) vel $\frac{3}{4}$ — fere duplo (φ) latiore, margine ejus acuto, gula brevissima. Rostrum nigro-piceum, basin coxa-rum intermedianarum attingens, articulo primo caput haud vel parum superante. Anten-nae dimidio corpore cum hemelytris breviores, articulis duobus primis nigris, secundo