

# Fiebre tifoidea (fiebre entérica)

**Definición:** es una infección sistémica causada por Salmonella Typhi con un periodo de incubación de en el ser humano de 3 a 21 días, debido a deficientes condiciones de salubridad es transmitido vía fecal- oral( agua, alientos ,etc), cuando no se trata, se divide en cuatro fases durando cada una de ellas una semana aproximadamente.



Fiebre



Malestar general



Dolor abdominal



Diarrea



Falta de apetito



Erupción cutánea (Manchas rosas)

© Desalud.net

**Primera semana:** Durante esta fase sube lentamente la temperatura con una bradicardia relativa, malestar general, dolor de cabeza y tos.

**Segunda semana:** Durante esta fase se produce la postración. Llegando la fiebre a los 40º C. Hay bradicardia con un pulso dicrótico. El delirio es frecuente.

**Tercera semana:** En esta semana si la fiebre tifoidea no se trata, las complicaciones son frecuentes: Hemorragias Intestinales debidas a la congestión de las Placas de Peyer.

**Finales de Tercera semana/Principios de la cuarta:** La temperatura corporal se va restableciendo, pero el debilitamiento aun persiste

Dx diferenciales:

fiebre + braquicardia, pulso dicrotico, cefalea, lengua tostada

signos	Sintomas	laboratorio
Palidez fiebre apático decaído hepatomegalia hesplenomegalia	dolor abdominal cefalea diarrea escalofrios tos	reacción de wildan Elisa hemograma leucopenia

Fiebre continua(meseta)	Temperaturas superiores 39ºg con oscilaciones menores de 1ºc, durante varios días. (neumonía, sepsis, tifoidea)
Fiebre remitente	Temperaturas superiores a 1.5ºC (no llega a la temperatura normal) bronconeumonía, tifoidea
Fiebre intermitente	La temperatura descienden hasta lo normal, para luego ascender <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre cotidiana: paludismos</li> <li>• Fiebre terciana: días alternos</li> <li>• Fiebre cuartana: después de 2 días de apirexia</li> <li>• Fiebre quintana: rickettsia</li> </ul>
Fiebre recuente	Se alternan varios días de la fiebre con días y temperatura normal (fiebre reumática)
Fiebre dromedaria	Poliomelitis
Fiebre ondulante	Periodo de fiebre continua, alternado con periodos de apirexia
Fiebre de Pel-Ebstein	Periodo de fiebre de 3 a 10 días, seguido de periodos de apirexia de 3 a 10 días más.

## Tipos de pulsos

- Taquicardia (>90)
- Braquicardia (<60)
- Pulso Celler( insuficiencia aortica)
- Pulso bigeminado (intoxicación por digital)
- Pulso filiforme(shock)
- Pulso paradójico (taponamiento cardiaco)
- Pulso parvus y tardus (estenosis aortica)
- Pulso alternante (IC avanzada)
- Pulso dicroto (fiebre tifoidea)

## TIPOS DE LENGUA

**SABURRAL:** Coloración blanquizca o amarillenta en dorso.  
**ESCROTAL** Pliegues del dorso marcados y profundos  
**GEOGRAFICA** Lesiones blanco-rojizas que cambian de forma.  
**INDENTADA** Irregularidades del margen y de la punta lingual debido al rose con las piezas dentarias  
**ARAMBUESADA DE ESCARLATINA** Formación de capa blanca sobre la lengua que luego de unos días cae dejando la lengua  
**ANQUILOGLOSIA** Frenillo corto que restringe movimientos  
**MICROGLOSIA** Lengua empujueñecida acompañada frecuentemente de glotitis atroficas crónicas  
**MACROGLOCIA** Aumento excesivo del tamaño de la lengua (causas varias)  
**LENGUA SECA** Causas múltiples como deshidratación general, respiración bucal entre otros



Afectación del nervio periférico	Modo de transmisión genética	Denominación Tipo de CMT
DESMIELINIZANTE	AUTOSÓMICA DOMINANTE	CMT1
	AUTOSÓMICA RECESIVA	CMT4
AXONAL	AUTOSÓMICA (DOMINANTE O RECESIVA)	CMT2
INTERMEDIA	LIGADA AL CROMOSOMA X (AUTOSÓMICA DOMINANTE)	CMTX
	AUTOSÓMICA DOMINANTE	CMTDI

### Enfermedad de Charcot-marie-tooth

Definición: trastorno neurológico hereditario, caracterizado por pérdida de la propiocepción y atrofia musculares

Signos: deformaciones en el pie, atrofia muscular, talon invertido, inestabilidad

Síntomas: calambre, fatiga, dolor de hueso, alteraciones visuales, sordera

Laboratorio: electromiograma, radiología

Dx diferenciales: marcha equina, pie cavo, dedos en martillo, patas de cigüeña

#### Tipos de marcha

**Cerebelosa:** intoxicación por alcohol, sedantes, enfermedad vascular cerebral (EVC)

**Tabética:** tabes dorsal, déficit de vitamina B12, ataxia de Friedreich


**Equina:** daño del nervio ciático, enf. De Charcot-Marie-Tooth

**Espástica:** meningomielitis, EVC, compresión de la médula


**Parkinsoniana:** enf. De Parkinson, hidrocefalia, demencia senil

**Coreoatetósica:** Huntington

**Trendelenburg:** distrofia muscular, luxación de la cadera




Enfermedad de Duchenne



Enfermedad de Becker





Distrofia muscular de Emery-Dreifuss




Miopatía de Landouzy




Pata de cigüeña



dedo en martillo



dedo en garra



Dedo en masa



Halux valgus





