

## АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЯЛТИНСКОГО ГОРНО-ЛЕСНОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

**Бондаренко З. Д., Жигалова Т. П., Гавриш Е. А.**

*ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник», Республика Крым, г. Ялта,*

Ялтинский горно-лесной природный заповедник (ЯГЛПЗ) создан в 1973 г. на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор с целью сохранения и восстановления в естественном состоянии уникального горно-лесного природного комплекса южного горного Крыма (особенно насаждений сосны крымской) со всей совокупностью их компонентов, изучения в нем природных процессов и явлений, разработки научных основ охраны окружающей природной среды, эффективного использования природных ресурсов и экологической безопасности, улучшения почвозащитных, водоохраных, бальнеологических и эстетических свойств горных лесов, усиления их охраны (особенно от пожаров) (Vobra et al., 2013).

Территория Ялтинского горно-лесного природного заповедника находится на Южном берегу Крыма и простирается вдоль Черного моря с запада на восток от Фороса до Гурзуфа на 40 км, окружая Большую Ялгу. Заповедник находится в пределах высот 380-1200 м над уровнем моря, в отдельных местах понижаясь к морю. Верхняя его граница проходит по Ай-Петринской, Ялтинской и Никитской яйлам (плато).

Из общей площади ЯГЛПЗ покрытый лесом район составляет 11090 га, безлесые земли – 3227 га, в т.ч. пашни – 4 га, сенокосы – 73 га, застроенные земли – 30 га, водные – 7 га, дороги – 155 га. Около 75% площади заповедника занимают хвойные и широколиственные леса центрально-европейского типа. На платообразной вершине главной гряды леса сменяются горно-степной, луговой растительностью (Бондаренко, 2012; Дідух, 2012; Vobra et al., 2013).

Изучение растительного мира Крыма имеет свою историю, которой около 200 лет: К. И. Габлиц (1752-1821), П. С. Паласс (1741-1811), Ф. М. Биберштейн (1768-1826), Х. Х. Стевен (1781-1863), В. Н. Аггеев (1860-1907), Е. В. Вульф (1885-1941), Н. И. Рубцов (1907-1988), а также В. Н. Голубев, Н. М. Зеленецкий, С. С. Станков, Н. И. Рубцов, Л. А. Привалова, Ю. Н. Прокудин, А. И. Пояров, М. И. Котов и мн. др. Огромное количество научных работ имеет отношение в той или иной мере к флоре и растительности ЯГЛПЗ и представлены в Летописях природы: А.М. Мустафина, О.Б. Рыбина и Т.А. Родионова (Летопись..., 1983), Е.С. Крайнюк (Летопись..., 1983), А.И. Зубков (Летопись..., 1984), Ю.А. Лукс (Летопись..., 1988), Я.П. Дидух (Летопись..., 1987, 1988), Е.А. Васильева (Летопись..., 1989, Т.Г. Ларина (Летопись..., 1990, 1992), И.А. Ругузов, Л.Л. Воронина (Летопись..., 1992 г.), Н.В. Корнилова (Летопись..., 1990-1992, 1997, 1999-2001), В.М. Крюков (Летопись..., 1997), А.И. Ругузова (Летопись..., 2006, 2007), А.Л. Заиграева (Летопись..., 2007-2009), В.П. Исиков (Летопись..., 2007, 2009), Н.В. Кушнир и Т.А. Козак (Летопись..., 2008, 2009), А.В. Фатерыга (Летопись..., 2011, 2012, 2013) и пр. (Бондаренко, 2012).

Первый наиболее полный список видов растений для Ялтинского ГЛПЗ приводится в монографии Ю.Р. Шеляг-Сосонко и Я.П. Дидуха (1980) – 1363 вида. Также списки растений приводились Я.П. Дидухом (1992) и в «Проекте организации территории Оползневского лесничества» (2003). Находки новых видов высших

растений было зафиксированы в заповеднике в 1996 г. (Летопись..., 1997) и в 2011-2013 гг (Летопись..., 2012-2014). Всего для Ялтинского заповедника по разным источникам приводятся сведения о 1363-1376 видах.

Настоящий список флоры заповедника подготовлен на основании имеющихся данных о распространении сосудистых растений на территории ЯГЛПЗ. Он представлен 1362 видом и подвидом из 104 семейств. Номенклатура таксонов составлена согласно С.Л. Мосякину, Н.М. Федорончуку (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999), с некоторыми дополнениями и уточнениями по С.К. Черепанову (1995), также приводятся синонимы названий. Семейство Orchidaceae приводится согласно А.В. Фатериге (Fateriga and Kreutz, 2014).

На территории природного заповедника произрастают редкие и нуждающиеся в охране виды: ERL – 143, КК РФ – 47.

Относительно уровня эндемизма: из 106 эндемичных видов Крымского полуострова, приводимых А.В. Еной (2012), 47 произрастает на территории ЯГЛПЗ, что составляет 44% эндемов Крыма (Э).

К адвентивным видам на территории Ялтинского заповедника отнесено 49 видов (Багрикова, 2013), а индекс адвентизации флоры составляет 3,6% (А).

#### **Aceraceae Juss. – Кленовые**

*Acer campestre* L. – **Клен полевой**. В дубовых и буковых лесах, среди кустарников, часто.

*Acer stevenii* Pojark. (##\**A. hyrcanum* ssp. *stevenii* (Pojark.) E. Murray, *A. opalus* ssp. *stevenii* (Pojark.) E. Murray) – **Клен Стевена**. В буковых, дубовых лесах средней и верхней зоны, часто. Э.

#### **Adiantaceae (Pteridaceae s.l.) – Адриантовые**

*Adiantum capillus-veneris* L. – **Адиантум венерин волос**. Каменистые обнажения, изредка.

*Ceterach officinarum* Willd. (*Asplenium ceterach* L.) – **Скребница лекарственная**. Среди скал, камней в буковых лесах, довольно обычно.

*Cheilanthes persica* (Boгу) Mett. ex Kuhn – **Краекучник персидский**. На каменистых экотопах, редко.

#### **Alismataceae Vent. (Elismataceae Nakai) – Частуховые**

*Alisma plantago-aquatica* L. – **Частуха подорожниковая**. По берегам водоемов, часто. **ERL.**

*Alisma lanceolatum* With. (*Alisma loeselii* Gorski) = *Alisma gramineum* (*Alisma longifolium* J.Presl) = *Alisma lanceolatum* (*Alisma parnassifolium* L.) = *Caldesia parnassifolia* – **Частуха ланцетная**. Берега ручьев, редко. **ERL.**

#### **Alliaceae I.Agardh – Луковые**

*Allium rotundum* L. (*A. scorodoprasum* L. ssp. *rotundum* (L.) Stearn) – **Лук круглый**. На луговинах яйлы, опушках, обычно. **ERL.**

*Allium firmotunicatum* Fomin (*A. atroviolaceum* auct. non Boiss.) – **Лук прочноодетый**. На яйле, обычно. **ERL.**

*Allium paniculatum* L. – **Лук метельчатый**. Под пологом леса, на полянах, обычно. **ERL.**

- Allium paczoskianum* Tuzs. (#*A. flavum* ssp. *tauricum* (Besser ex Rchb.) Stearn; #*A. flavum* subssp. *tauricum* (Rchb.) K. Richt.; *A. flavum* var. *tauricum* Besser ex Rchb., *A. pulchellum* auct. non G. Don. f.; *A. tauricum* (Besser ex Rchb.) Bordz.) – **Лук Пачоского**. На сухих склонах, обычно. **ERL.**
- Allium rupestre* Steven (*A. paniculatum* L. ssp. *rupestre* (Steven) K. Richt.) – **Лук скальный**. На каменистых склонах, в верхней зоне и на яйле, обычно. **ERL.**
- Allium marschalianum* Vved. (~*Allium saxatile* auct. non M. Bieb.) – **Лук Маршалла**. На остепненных полянах и каменистых склонах, по всей территории, обычно. **ERL.**
- Allium cyrillii* Ten. (*A. auctum* Omelcz.) – **Лук Кирилла**. В дубовых и смешанных лесах, среди кустарников, обычно. **ERL.**
- Allium waldsteinii* G. Don. f – **Лук Вальдштейна**. Можжевеловые леса, каменистые обнажения, редко.
- Allium sphaerocephalon* L. – **Лук круглоголовый**. Саванноиды, каменистые обнажения, изредка. **ERL.**
- Allium moschatum* L. – **Лук мускусный**. Крымскососновые леса, каменистые обнажения, изредка. **ERL.**
- Allium erubescens* K. Koch. – **Лук краснеющий**. Луга, каменистые осыпи, очень редко. **ERL.**
- Allium vineale* L. (*Allium volhynicum* Besser) = *Allium strictum* – **Лук виноградничный**. Каменистые осыпи, редко. **ERL.**

#### **Amaryllidaceae Jaume – Амариллисовые**

- Galanthus plicatus* M. Bieb. (*G. latifolius* Salisb.) – **Подснежник складчатый**. В лесах, среди кустарников, по всей территории. **ККРФ. ERL.**
- Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. – **Штернбергия зимовникоцветковая**. Степи и томилляры, редко. **ККРФ. ERL.**

#### **Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые**

- Cotinus coggygria* Scop. (*Rhus cotinus* L.) – **Скумпия кожевенная**. На сухих склонах и в светлых лесах, часто.
- Pistacia mutica* Fisch. et C.A. Mey – **Фисташка туполистная**. Можжевеловые, пушистодубовые леса, обычно. **ККРФ.**
- Rhus coriaria* L. – **Сумах дубильный**. В сосновых и смешанных лесах южного макросклона, на сухих склонах, обычно.

#### **Apiaceae Lindl. (Umbeliferae Juss., Hydrocotylaceae Nyl.) – Зонтичные**

- Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. – **Купырь лесной**. В лесах, на полянах, яйле, обычно.
- Anthriscus nemorosa* (Bieb.) Spreng. – **Купырь дубравный**. Буковые леса, обычно.
- Anthriscus caucalis* Bieb. (*A. vulgaris* Pers. nom. *illegit*, *A. scandicina* Mansf.) – **Купырь прицепниковый**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Bifora radians* Bieb. – **Бифора лучистая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Bunium ferrulaceum* Smith. (#*B. bourgaei* (Boiss.) Freyn & Sint., #*B. microcarpum* (Boiss.) Freyn. & Sint. ex Freyn.) – **Буний феруловый**. На южных каменистых и скалистых склонах, редко.
- Vupleurum affine* Sadler. – **Воллудушка родственная**. По сухим склонам, обычно.
- Vupleurum asperuloides* Heldr. – **Воллудушка ясменниковая**. Каменистые обнажения,

- редко.
- Vupleurum falcatum* L. (*V. rossicum* (Coso-Pol.) Woronow) – **Володушка серповидная**. На яйле, приайлинских южных склонах, обычно.
- Vupleurum exaltatum* M.Bieb. (#*V. kotschyanum* Boiss., #*V. linearifolium* auct.) – **Володушка высокая**. На щебнистых, каменистых горных склонах, полянах, яйле, изредка.
- Vupleurum rotundifolium* L. – **Володушка круглолистная**. На полянах со степной растительностью, редко.
- Vupleurum pauciradiatum* Fenzl ex Boiss. – **Володушка малолучевая**. На сухом шиферном склоне, редко.
- Vupleurum woronowii* Manden. – **Володушка Воронова**. Крымскососновые леса, редко.
- Caucalis platycarpus* L. (*C. lappula* (Weber) Grande, *C. daucooides* L., #*C. daucooides* ssp. *muricata* Bisch. ex Čelak., #*C. daucooides* var. *muricata* (Bisch. ex Čelak.) Tamamsch., #*C. platycarpus* ssp. *bischoffii* (Koso-Pol.) Soó; #*C. platycarpus* ssp. *muricata* (Bisch. ex Čelak.) Holub) – **Прицепник плоскоплодный**. Среди кустарников, на сухих полянах, у дорог, изредка.
- Chaerophyllum temulum* L. – **Бутень опьяняющий**. В лесах, среди кустарников, на сорных местах, обычно.
- Chaerophyllum hirsutum* L. (*Ch. maculatum* Willd. ex DC.) – **Бутень пятнистый**. Сосновые, грабовые и буковые леса, часто.
- Chaerophyllum bulbosum* L. (#*Ch. bobrovii* Schischk., #*Ch. bulbosum* ssp. *bobrovii* (Schischk.) Soó, #*Ch. caucasicum* (Hoffm.) Schischk.) – **Бутень клубненосный**. В лесах, на лесосеках, у дорог, изредка.
- Conium maculatum* L. – **Болиголов пятнистый**. На сорных местах, у жилья, часто.
- Critium maritimum* L. – **Критмум морской**. Каменистые осыпи, изредка. ККРФ.
- Daucus carota* L. (*D. australis* Kotov, #*D. kotovii* M.Hiroe) – **Морковь дикая**. На сухих склонах и полянах в нижнем и среднем поясе, обычно. ERL.
- Eryngium campestre* L. – **Синеголовник полевой**. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.
- Falcaria vulgaris* Bernh. (#*Drepanophyllum sioides* Wib., *F. neglectissima* Klokov, *F. sioides* (Wibb.) Asch.) – **Резак обыкновенный**. На сухих полянах, у дорог, обычно.
- Ferulago taurica* Schischk. – **Ферульник крымский**. Крымскососновые леса, степи и томиляры, обычно.
- Heracleum pubescens* (Hoffm.) M.Bieb. (*Pastinaca pubescens* (Hoffm.) Calest., *Sphondylium pubescens* Hoffm.) – **Борщевик пушистый**. На влажных затененных местах в дубовых и грабовых лесах, редко.
- Heracleum ligusticifolium* M.Bieb. – **Борщевик лигустиколистный**. На каменистых склонах и осыпях близ яйлы, довольно редко. Э.
- Heracleum stevenii* Manden. – **Борщевик Стевена**. На каменистых склонах, в тенистых лесах, на яйле, обычно.
- Heracleum sibiricum* L. (*H. sphondylium* L. ssp. *sibiricum* (L.) Simonk.) – **Борщевик сибирский**. На полянах и в лесах, в тенистых балках, редко.
- Laser trilobum* (L.) Borkh. (*Laserpitium trilobum* L.) – **Лазурник трехлопастный**. В лесах, особенно сосновых, на полянах, часто.
- Laserpitium hispidum* M.Bieb. – **Гладыш щетинистоволосистый**. В лесах, на полянах, лесосеках, среди кустарников, обычно.

- Ligusticum mutellina* (L.) Crantz. (*Malabaila graveolens* (Bieb.) Hoffm.) – **Малабайла пахучая**. Каменистые осыпи, только в районе водопада Учан-Су, редко.
- Oenanthe pimpinelloides* L. – **Омежник бедренцевидный**. На влажных местах, редко.
- Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. (*Caucalis grandiflora* L.) – **Орлайя крупноцветковая**. На лесных полянах, открытых сухих склонах, обычно.
- Orlaya daucoides* (L.) Greuter (*Caucalis daucoides* L., *#O. kochii* Heywood, *O. platycarpus* (L.) W.D.J.Koch p.p. excl. *basionymo*) – **Орлайя морковновидная**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые обнажения, обычно.
- Pastinaca umbrosa* Stev. ex DC. – **Пастернак теневой**. Каменистые осыпи, изредка.
- Peucedanum tauricum* Bieb. – **Горичник крымский**. Степи и томилляры, изредка.
- Physospermum cornubiense* (L.) DC. (*Danaa nudicaulis* (M.Bieb.) Grossh., *P. danae* (M.Bieb.) Schischk. ex N.I.Rubtzov) – **Вздутосемянник Корнуба**. В лесах, особенно сосновых, часто.
- Physocaulis nodosus* (L.) W.D.J.Koch (*#Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon) – **Вздугостебельник узловатый**. В смешанных лесах, на каменистых местах, изредка.
- Pimpinella lithophila* Schischk. (~*P. tragium* aggr.) – **Бедронец камнелюбивый**. На каменистых склонах, осыпях, сухих полянах, яйле, обычно.
- Pimpinella peregrina* L. (*#P. affinis* Ledeb., *#P. affinis* var. *multiradiata* Boiss., *#P. korovinii* Kamelin, *#P. multiradiata* (Boiss.) Korovin, *P. taurica* (Ledeb.) Steud.) – **Бедронец иноземный**. На сухих склонах, полянах, очень редко.
- Prangos trifida* (Mill.) Herrnst. et Heyn (*Cachrys trifida* Mill.) – **Прангос трёхраздельный**. Каменистые склоны, горные луга, редко. **ККРФ**.
- Rumia crithmifolia* (Willd.) K.-Pol. (*Cachrys taurica* M.Bieb. 1808, non Willd. 1801, *Rumia taurica* Hoffm., *Sanicula crithmifolia* Willd., *Trinia crithmifolia* (Willd.) H.Wolff, *T. taurica* (Hoffm.) Schmalh.) – **Румия критмолистная**. На сухих склонах и осыпях, редко. Э.
- Sanicula europea* L. – **Подлесник европейский**. В тенистых лесах, на влажных полянах, изредка.
- Scandix pecten-veneris* L. – **Скандикс гребенчатый**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Scandix europae* L.S. *falcata* auch non Londes = *S. taurica* Stev. – **Скандикс серповидный**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Scandix stellata* Banks et Soland. – **Скандикс звездчатый**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Seseli dichotomum* Pall. ex M.Bieb. – **Жабрица вильчатая**. На южных каменистых склонах, в светлых лесах, на яйле, обычно.
- Seseli gummiferum* Pall. ex Smith. – **Жабрица камеденосная**. На каменистых осыпях, скалистых склонах, обычно.
- Seseli lehmannii* Degen. – **Жабрица Лемана**. На каменистых луговинах яйлы и безлесных вершинах гор, очень редко. Э.
- Sium sisaroides* DC. (*S. sisarum* L.) – **Поручейник сизаровидный**. Берега ручьев, изредка. **ERL**.
- Smyrniium perfoliatum* L. – **Смирния пронзеннолистная**. В дубовых, ясеневых лесах, на опушках и вырубках, изредка.
- Tordylium maximum* L. – **Тордилиум крупный**. На сухих склонах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. (*Caucalis japonica* Houtt.) – **Торилис японский**. У лесных

- дорог, на опушках, сухих склонах, довольно обычно.
- Torilis arvensis* (Huds.) Link (*Caucalis arvensis* Huds.) – **Торилис полевой**. На сухих полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- Torilis heterophylla* Guss. (*Caucalis heterophylla* (Guss.) Arcang., #*T. arvensis* ssp. *heterophylla* (Guss.) Thell., *T. heterosperma* Steven) – **Торилис разнолистный**. На лесных полянах, в нижнем поясе, изредка.
- Torilis nodosa* (L.) P.Gaertn. (*Caucalis nodosa* (L.) Crantz.) – **Торилис узловатый**. На сорных местах, изредка.
- Torilis leptophylla* (L.) Rchb. (*Caucalis leptophylla* L., #*T. xanthotricha* (Steven) Stankov) – **Торилис тонколистный**. На полянах в смешанных лесах, редко.
- Trinia glauca* (L.) Dumort. (#*Pimpinella glauca* L., *T. stankovii* Schischk.) – **Триния сизая**. На сухих шиферных склонах и яйле, обычно.
- Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. (*Caucalis latifolia* L.) – **Тургенция широколистная**. На сухих склонах и осыпях, в нижнем и среднем поясе, изредка.

#### **Аросупасеae Juss. – Кутровые**

- Trachomitum sarmatiense* Woodson. – **Кендырь сарматский**. Каменистые осыпи, изредка.
- Vinca herbacea* Waldst. & Kit. (#*V. semidesertorum* Ponert) – **Барвинок травянистый**. На лесных полянах, среди кустарников, изредка.
- Vinca minor* L. – **Барвинок малый**. Пушистодубовые леса, редко. А.

#### **Агасеae Juss. – Ароидные**

- Arum elongatum* Steven (*A. orientale* M.Bieb. var. *elongatum* (Steven) Boiss.) – **Аронник удлиненный**. В лесах, среди кустарников, по всей территории, обычно.
- Arum albispalum* Steven ex Ledeb. – **Аронник белокрылый**. Лиственные леса, редко.

#### **Агалиеae Juss. – Аралиевые**

- Hedera helix* L. (#*H. caucasigena* Pojark., #*H. helix* ssp. *caucasigena* (Pojark.) Takht. & Mulk., #*H. taurica* Carrière) – **Плющ обыкновенный**. В дубовых и буковых лесах, обычно, часто.

#### **Аristolochiaceae Juss. – Кирказоновые**

- Aristolochia clematitis* L. – **Кирказон ломоносовидный**. Тенистый лиственный лес, редко.

#### **Асклепиадеae R.Br. – Ластовневые**

- Vincetoxicum hirundinaria* Medik. (#*Alexitoxicon cretaceum* (Pobed.) Pobed., #*A. laxum* (Bartl.) Pobed. ex Kuth., #*A. officinale* (Moench) St.-Lag., #*A. stauropolitanum* (Pobed.) Pobed., #*A. vincetoxicum* (L.) H.P. Fuchs, *Antitoxicum cretaceum* Pobed., *A. laxum* (Bartl.) Pobed., *A. officinale* (Moench) Pobed., #*A. stauropolitanum* (Pobed.) Pobed., #*Cynanchum vincetoxicum* ssp. *laxum* (Bartl.) V.E. Avet., *V. cretaceum* (Pobed.) Wissjul., #*V. hirundinaria* ssp. *cretaceum* (Pobed.) Markgr., *V. laxum* (Bartl.) Gren. & Godr., *V. officinale* Moench, #*V. stauropolitanum* Pobed., #*V. tanaicense* P.A. Smirn.) – **Ластовень ласточкин**. На опушках, сухих склонах, светлых лесах, изредка.
- Vincetoxicum jailicola* Juz. – **Ластовень яйлинский**. На яйле, каменистых обнажениях, изредка.

- Vincetoxicum juzepeczukii* (Pobed.) Privalova ex Wissjul. (*Antitoxicum juzepeczukii* Pobed., #*Cynanchum juzepeczukii* (Pobedimova) Borhidi, #*V. juzepeczukii* (Pobed.) Markgr. comb. superfl.) – **Ластовень Юзепчука**. В лесах, на полянах, редко.
- Vincetoxicum maeoticum* (Клеоров) Barbar. – *V. minus* (С. Koch) – **Ластовень малый**. Каменные обнажения, редко.
- Vincetoxicum scandens* Sommier & Levier (#*Alexitoxicon scandens* (Sommier & Levier) Pobed., *Antitoxicum scandens* Sommier & Levier, #*A. scandens* (Sommier & Levier) Pobed., #*V. amplifolium* К.Коч, *V. nigrum* auct.) – **Ластовень лезящий**. В лесах, на полянах, вырубках, среди кустарников, по всей территории, обычно.
- Vincetoxicum schmalgausenii* (Kusn.) Stank. (#*Alexitoxicon schmalhauseni* (Kusn.) Pobed., *Antitoxicum schmalgausenii* (Kusn.) Pobed., #*V. schmalhauseni* (Kusn.) Markgr., comb. superfl.) – **Ластовень Шмальгаузена**. На открытых южных склонах, полянах, изредка.

### Asparagaceae Juss. – Спаржевые

- Asparagus verticillatus* L. – **Спаржа мутовчатая**. Каменные склоны, обычно. **ERL**.
- Asparagus officinalis* L. (*A. caspius* Schult. & Schult.f., #*A. polyphyllus* Steven, #*A. setiformis* Krylov) – **Спаржа лекарственная**. Каменные южные склоны, остепненные поляны, обычно. **ERL**.
- Asparagus tenuifolius* Lam. – **Спаржа тонколистная**. Крымскососновые леса, каменные осыпи, редко. **ERL**.
- Asparagus polyphyllus* Steven (*Asparagus ponticus* Woronow) = *Asparagus pallasii* – **Спаржа многолистная**. Каменные обнажения и осыпи, изредка.

### Asphodelaceae - Асфodelовые

- Asphodeline lutea* (L.) Rchb. – **Асфodelина желтая**. Хвойные леса, степи, томиляры, каменные обнажения и осыпи, часто.
- Asphodeline taurica* (Pall. ex M.Bieb.) Endl. – **Асфodelина крымская**. Можжевельниковые леса, степи, томиляры, каменные обнажения, обычно. **ККРФ**.
- Eremurus tauricus* Steven – **Эремурус крымский**. Каменные обнажения, редко.
- Anthericum ramosum* L. – **Венчик ветвистый**. Крымскососновые леса, в междуречье Учан-Су – Яузлар, очень редко.

### Aspleniaceae Mett. ex Frank – Костенцовые

- Asplenium adiantum-nigrum* L. – **Костенец черный**. Среди скал, редко. **ККРФ**.
- Asplenium ruta-muraria* L. – **Костенец постенный**. Среди скал, по всей территории, обычно.
- Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – **Костенец северный**. Среди камней, дубовый лес, обычно.
- Asplenium trichomanes* L. (#*A. melanocaulon* Willd., *A. trichomanes* ssp. *Bivalens* D.E.Mey) – **Костенец волосовидный**. Среди влажных камней, по всей территории, обычно.
- Asplenium viride* Huds. – **Костенец зеленый**. Среди скал, в верхнем горном поясе и на яйле, изредка.

### Asteraceae Dumort. (=Compositae) – Астровые, сложноцветные

- Achillea nobilis* L. – **Тысячелистник благородный**. На каменных и травянистых склонах, довольно редко.

- Achillea setacea* Waldst. & Kit. (*A. millefolium* L. ssp. *setacea* (Waldst. & Kit.) Weiss) – **Тысячелистник щетинистый**. На полянах, сухих склонах, у дорог, на яйле и приайлинских склонах, обычно.
- Anthemis ruthenica* M.Bieb. (*A. neilreichii* Ortman) – **Пулавка русская**. На сухих склонах, в нижней зоне, обычно.
- Anthemis tinctoria* L. ssp. *subtinctoria* (Dobroc.) Soó (*A. subtinctoria* Dobroc., *A. tinctoria* ssp. *subtinctoria* (Dobroc.) Soó, #*A. zephyrovii* Dobroc., #*Cota tinctoria* ssp. *subtinctoria* (Dobroc.) Holub) – **Пулавка светло-желтая**. На сухих остепненных склонах, в нижней и средней зоне, обычно.
- Anthemis monantha* Willd. (#*A. cretacea* Zefir., #*A. parviceps* Dobroc. & Fed. ex Klokov, #*Cota cretacea* (Zefir.) Holub) – **Пулавка однокорзинчатая**. На травянистых лесных склонах и полянах, у дорог, обычно. Э.
- Anthemis jailensis* Zefir. (#*Cota jailensis* (Zefir.) Holub) – **Пулавка яйлинская**. На луговых склонах, в верхнем лесном поясе, на яйле, довольно редко. Э.
- Anthemis altissima* L. (#*Cota altissima* (L.) J. Gay) – **Пулавка высочайшая**. На сухих склонах, изредка.
- Anthemis austriaca* Jacq. (#*Cota austriaca* (Jacq.) J. Gay) – **Пулавка австрийская**. На сухих склонах, сорных местах, редко.
- Anthemis cotula* L. – **Пулавка собачья**. На сухих склонах и полянах, довольно редко.
- Antennaria dioica* (L.) P.Gaertn. – **Кошачья лапка двудомная**. На луговинах яйлы и приайлинских склонах, обычно.
- Arctium lappa* L. (*A. chaorum* Klokov, *A. majus* Bernh.) – **Лопух репейник**. На сорных местах, у жилья, изредка.
- Arctium nemorosum* Lej (#*A. glabrescens* Klokov) – **Лопух дубравный**. На лесных полянах, преимущественно в нижней зоне, редко.
- Arctium minus* (HilL.) Bernh. – **Лопух малый**. У дорог, редко.
- Artemisia absinthium* L. – **Полынь горькая**. На лесных полянах, у дорог и жилья, изредка. А.
- Artemisia annua* L. – **Полынь однолетняя**. Каменистые осыпи, у дорог, редко. А.
- Artemisia austriaca* Jacq. (*A. repens* Pall. ex Willd.) – **Полынь австрийская**. На сухих склонах и полянах, изредка.
- Artemisia marschalliana* Spreng. [*Artemisia marschalliana* Spreng. var. *tschernieviana* (Besser) Leonova] = *Artemisia tschernieviana* – **Полынь Маршалла**. Каменистые осыпи, у дорог, изредка.
- Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. – **Полынь метельчатая**. Каменистые осыпи, у дорог, редко.
- Artemisia santonica* L. – **Полынь сантонинская**. Каменистые осыпи, редко.
- Artemisia taurica* Willd. – **Полынь крымская**. Каменистые осыпи, у дорог, редко.
- Artemisia vulgaris* L. (#*A. coarctata* Forselles; #*A. vulgaris* ssp. *coarctata* (Forselles) Ameljcz., comb. inval., #*A. vulgaris* ssp. *urijanchaica* Ameljczenko, nom. inval.) – **Полынь обыкновенная**. В светлых лесах, на полянах, у жилья, изредка.
- Aster bessarabicus* Bernh. ex Rchb. (*A. amelloides* Besser 1822, non Hoffm. 1801, *A. amellus* L. ssp. *bessarabicus* (Bernh. Ex Rchb.) Soó) – **Астра бессарабская**. На каменистых склонах, яйле, изредка.
- Barkhausia pseudalpina* Klokov = *Crepis alpina*, *Barkhausia rhoeadifolia* (M.Bieb.) M.Bieb. = *Crepis rhoeadifolia*, *Barkhausia setosa* (Hall. f.) DC. = *Crepis setosa* – **Баркгаузия ложноальпийская (маколистная, щетинистая)**. Саванноиды, каменистые осыпи, у дорог, изредка.



- Bellis perennis* L. – **Маргаритка многолетняя**. На лесных и луговых полянах, обычно.
- Bellis sylvestris* Сут. – **Маргаритка лесная**. Можжевельниковые и пушистодубовые леса, саванноиды, редко.
- Bidens frondosa* L. (*Bidens melanocarpa* Wiegand) = *Bidens frondosa* (*Bidens orientalis* Velen.) = *Bidens tripartita* L. var. *orientalis* – **Черда восточная**. Берега ручьев, редко. **ERL**.
- Bombycileana erecta* (L.) Smoljjan. – **Бомбицилена прямостоячая**. На сухих склонах, обычно.
- Carduus nutans* L. (#*C. coloratus* Tamamsch., *C. kondratjukii* Gorlaczova, #*C. nutans* var. *armenus* Boiss., #*C. schischkinii* Tamamsch., #*C. songoricus* Tamamsch., #*C. thoermeri* ssp. *armenus* (Boiss.) Kazmi) – **Чертополох поникающий**. У дорог, жилья, обычно.
- Carduus acanthoides* L. (*C. fortior* Klokov) – **Чертополох колючий**. На сорных местах, у дорог, редко.
- Carduus hamulosus* Ehrh. (*C. tyraicus* Klokov) – **Чертополох крючковатый**. На вырубках, сорных местах, обычно.
- Carduus hamulosus* Ehrh. (*Carduus heterophyllus* L.) = *Cirsium heterophyllum* (*Carduus incanus* Klokov) = *Carduus crispus* – **Чертополох мелкокрючковый**. Саванноидные сообщества, каменистые осыпи, редко.
- Carlina vulgaris* L. (#*C. taurica* Klokov) – **Ключник обыкновенный**. На сухих склонах, яйле, ветровалах, в светлых лесах, обычно.
- Carthamus glaucus* M.Bieb. – **Сафлор сизый**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Carthamus lanatus* L. – **Сафлор шерстистый**. На сухих склонах, обычно.
- Centaurea aemulans* Klokov {*Centaurea alpestris* auct. non Hegetschw.} = *Centaurea ossetica* – **Василек альпийский**. Степи, очень редко.
- Centaurea calcitrapa* L. {*Centaurea cana* auct. non Sibth. & Smith} = *Centaurea fuscomarginata* – **Василек колючеголовый**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Centaurea caprina* Steven – **Василек козий**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Centaurea declinata* M.Bieb. – **Псефелус наклоненный**. Можжевельниковые, крымскососновые леса, степи, томиляры, каменистые обнажения, обычно.
- Centaurea diffusa* Lam. (*Acosta diffusa* (Lam.) Soják., #*C. microcalathina* A.O.Tarassov) – **Василек раскидистый**. На сухих остепненных склонах, в нижней зоне, обычно. **A**.
- Centaurea comperiana* Steven – **Василёк Компера**. На сухих каменистых склонах, скалах и осыпях, редко.
- Centaurea fuscomarginata* (K.Koch) Juz. (*C. cana* auct. non Sibth. & Smith, #*C. triumfettii* ssp. *cana* auct. p.p.) – **Василек буроотороченный**. На яйле и приайлинских склонах, обычно. **Э**.
- Centaurea iberica* Trev. – **Василек иберийский**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Centaurea jacea* L. – **Василек луговой**. На полянах, сухих склонах, среди кустарников, обычно.
- Centaurea orientalis* L. (*Colymbada orientalis* (L.) Holub) – **Василек восточный**. На сухих каменистых склонах, у дорог, изредка.
- Centaurea salonitana* Vis. (*Colymbada salonitana* (Vis.) Holub) – **Василек салонский**.

- На сухих склонах, обычно.
- Centaurea solstitialis* L. – **Василек солнечный**. На сухих полянах, обычно.
- Centaurea sterilis* Steven [*Centaurea sterilis* Steven subsp. *semijusta* (Juz.) Dostal] = *Centaurea semijusta*, [*Centaurea sterilis* Steven subsp. *vankovii* (Klokov) Dostal] = *Centaurea vankovi* – **Василек бесплодный**. Можжевельниковые, крымскососновые леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Centaurea steveniana* Klokov (*C. ovina* Pall. ex Willd. subsp. *steviana* (Klokov) Dostal) – **Василёк Стевена**. Приморские ракушечные пески, каменистые горные склоны, редко.
- Centaurea substituta* Czerep. (*C. pannonica* (Heuff.) ssp. *substituta* (Czerep.) Dostal Jacea *substituta* (Czerep.) Soják) – **Василек замещающий**. На полянах в сосновых лесах, редко.
- Centaurea vankovii* Klokov (*C. sterilis* Steven subsp. *vankovii* (Klokov) Dostal) – **Василёк Ванькова**. Горные каменистые склоны, обычно.
- Cephalorrhynchus tuberosus* (Steven) Schchian – **Цефалоринхус клубневой**. В лесах и на опушках, изредка.
- Chondrilla juncea* L. – **Хондрилла ситниковидная**. На сухих шиферных склонах, в нижней зоне, обычно.
- Cichorium inthybus* L. – **Цикорий обыкновенный**. На сорных местах, у дорог, среди кустарников, изредка. **A.**
- Cirsium laniflorum* (M.Bieb.) M.Bieb. – **Бодяк шерстистоцветковый**. В сосновых лесах, у дорог, на полянах, обычно.
- Cirsium incanum* (S.G.Gmel.) Fisch. (*C. arvense* ssp. *incanum* (S.G.Gmel.) Petrak ex Pjin) – **Бодяк седой**. На полянах, в светлых лесах, на вырубках и ветровалах, изредка, обычно.
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. – **Бодяк обыкновенный**. Каменистые осыпи, у дорог, обычно.
- Crepis micrantha* Czerep. (*C. parviflora* Desf. 1807, non Moench 1794) – **Скерда мелкоцветковая**. На сухих склонах, в нижней зоне, обычно.
- Crepis pannonica* (Jasq.) K. Koch. (*Crepis parviflora* Desf. 1807, non Moench 1794) = *Crepis micrantha*, (*Crepis planitierum* Klokov) = *Crepis mollis* – **Скерда венгерская**. Крымскососновые, скальнодубовые леса, каменистые осыпи, редко.
- Crepis pulchra* L. [*Crepis purpurea* (Willd.) M.Bieb.] = *Lagosotis purpurea* – **Скерда красивая**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно. **ERL.**
- Crupina vulgaris* Cass. – **Крупина обыкновенная**. На поляне со степной растительностью, обычно.
- Echinops armatus* Steven {*Echinops banaticus* auct. non Rochel ex Schrad.} = *Echinops armatus*, (*Echinops commutatus* Juratzka) = *Echinops exaltatus* – **Мордовник вооруженный**. Хвойные, скальнодубовые леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Echinops sphaerocephalus* L. (#*E. erevanensis* Mulk.) – **Мордовник шароголовый**. На сухих каменистых склонах, осыпях, обычно.
- Erigeron acer* auct. = *Erigeron acris* – **Мелколепестник едкий**. У дорог, обычно.
- Erigeron orientalis* Boiss. – **Мелколепестник восточный**. На остепненных лугах, изредка.
- Eupatorium cannabinum* L. – **Посконник коноплевидный**. Во влажных местах, по берегам рек, в средней и нижней зоне, изредка.

- Filago eriocephala* Guss. (*Filago germanica* L. 1763, non Huds. 1762) = *Filago vulgaris* – **Жабник германский**. Саванноиды, каменистые осыпи, очень редко.
- Filago arvensis* L. (*F. montana* auct. non L., #*Logfia arvensis* (L.) Holub, #*Oglifa arvensis* (L.) Cass.) – **Жабник полевой**. В сосновых борах и по их опушкам, на песчаных местах, сухих склонах, редко.
- Gnaphalium sylvaticum* L. (*Omalotheca sylvatica* (L.) Sch.Bip. & F.Schultz) – **Сушеница лесная**. В буковых лесах, на яйле по понижениям, изредка.
- Helichrysum arenarium* (L.) Moench – **Цмин песчаный**. На каменистых склонах, яйле, обычно.
- Helichrysum graveolens* (M.Bieb.) Sweet (#*H. aurantiacum* Boiss. & Huet.) – **Цмин сильнопахнущий**. На сухих склонах, яйлах, обычно.
- Hieracium alpinum* L. (*Hieracium alupkanum* (Zahn) Ueksip) = *Pilosella auriculoides* – **Ястребинка алупкская**. Каменистые осыпи, изредка.
- Hieracium anocladum* (Naeg. et Peter) Ueksip = *Pilosella* x *mollicaulis*. – **Ястребинка рыхловетвистая**. Леса из сосны Сосновского, степи, томилляры, каменистые осыпи, редко.
- Hieracium argillaceum* Jord. [*Hieracium asiaticum* (Naeg. et Peter) Ueksip] = *Pilosella asiatica*, (*Hieracium asperillum* Schur) = *Pilosella auriculoides* – **Ястребинка азиатская (Я. прежесткая)**. Степи и томилляры, каменистые осыпи, изредка.
- Hieracium auratum* Fr. (#*H. sabaudum* ssp. *boreale* var. *auratum* (Fr.) Nyár.) – **Ястребинка золотистая**. По опушкам лесов, довольно редко.
- Hieracium virosum* Pall. (*Hieracium viscidulum* (Tausch) Ueksip, nom. inval.) = *Pilosella viscidula* (*Hieracium volhynicum* (Naeg. & Peter) Ueksip, nom. inval.) = *Pilosella volhynica* – **Ястребинка ядовитая**. Каменистые осыпи, обычно.
- Hieracium bauhiniflorum* (Naeg. et Peter) Ueksip = *Pilosella* x *mollicaulis* – **Ястребинка баугиноцветковая**. Каменистые осыпи, редко.
- Hieracium chlorophyllum* Jord. ex Boreau (*Hieracium christoglossum* (Zahn) Ueksip) = *Pilosella* x *tephrocephala* – **Ястребинка окрашенно-язычковая**. Каменистые осыпи, изредка.
- Hieracium crocatum* Fr. (*Hieracium cumanthum* (Naeg. et Peter) Ueksip, nom. inval.) = *Pilosella cumantha* – **Ястребинка ложнозонтичная**. Сосновые леса, степи, томилляры, каменистые обнажения, довольно обычно.
- Hieracium echinocephalum* (Naeg. & Peter) Ueksip [*Hieracium echioides* Lumn.] = *Pilosella echioides* – **Ястребинка румяноквая**. Степи и томилляры, обычно.
- Hieracium festinum* Jord. ex Boreau [*Hieracium filiferum* Tausch] = *Pilosella filifera* – **Ястребинка нитяная**. Каменистые осыпи, редко.
- Hieracium gentile* Jord. ex Boreau – **Ястребинка сродственная**. В лесах, на полянах, обычно.
- Hieracium glandulosodentatum* Uechtr [*Hieracium glaucescens* Besser] = *Pilosella glaucescens* – **Ястребинка голубовато-зеленая**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Hieracium jackardii* Zahn (*Hieracium jailanum* (Zahn) Ueksip) = *Pilosella* x *tephrocephala* – **Ястребинка яйлы**. Каменистые осыпи, редко.
- Hieracium lamprocomum* (Naeg. et Peter) Ueksip = *Pilosella* x *lamprocoma* – **Ястребинка блестяшеволосистая**. Луга, изредка.
- Hieracium lonchopodium* (Zahn) Schljak. (*Hieracium bifidum* aggr., *Hieracium longipes* (K. Koch ex Naeg. & Peter) Ueksip) = *Pilosella bifurca* (*Hieracium longisetum* (Naeg. & Peter) Ueksip) = *Pilosella auriculoides* – **Ястребинка длинноногая (Я.**

- длиннощетиная**). Степи и томиляры, каменные осыпи, обычно.
- Hieracium macrolepium* (Naeg. et Peter) Ueksip = *Pilosella submacrolepis* – **Ястребинка крупночешуйчатая**. Луга, изредка.
- Hieracium magocsyanum* Jav. [*Hieracium malacotrichum* (Naeg. et Peter) Ueksip] = *Pilosella malacotricha* [*Hieracium marginale* (Naeg. et Peter) Ueksip] = *Pilosella marginalis* – **Ястребинка мягковолосистая (я. каемчатая)**. Степи и томиляры, каменные осыпи, изредка.
- Hieracium pilosella* L. = *Pilosella officinarum* – **Ястребинка волосистая**. Леса из сосны Сосновского, степи, томиляры, каменные осыпи, обычно.
- Hieracium prenanthoides* Vill. [*Hieracium progenitum* (Norrl.) Norrl.] = *Pilosella* x *progenita*, [*Hieracium proceriforme* (Naeg. et Peter) Zahn] = *Pilosella proceriformis* [*Hieracium procerum* Fr.] = *Pilosella procera* – **Ястребинка высокая (высокорослая)**. Каменные осыпи, изредка.
- Hieracium rohacsense* Kit. ex Kanitz [*Hieracium rojowskii* Rehman] = *Pilosella rojowskii* – **Ястребинка Ройовского**. Каменные осыпи, редко.
- Hieracium sarmaticum* (Zahn) Schljak (*Hieracium sarmentosum* Froel.) = *Pilosella* x *auriculoides* – **Ястребинка хворостовидная**. Крымскососновые леса, степи, томиляры, каменные осыпи, редко.
- Hieracium sparsum* Friv. (*Hieracium sterromastix* (Naeg. et Peter) Ueksip) = *Pilosella bifurca* – **Ястребинка жесткопобежистая**. Луга и степи, редко.
- Hieracium tephropodum* (Zahn) Ueksip = *Pilosella* x *tephrocephala* – **Ястребинка пепельностопая**. Луга и степи, обычно.
- Hieracium truncipilum* (Thaisz & Zagn) Schljak (*Hieracium tubuliflorum* (Naeg & Peter) Ueksip) = *Pilosella* x *brachiata* (*Hieracium tuscheticum* (Zahn) Ueksip) = *Pilosella* x *tephrocephala* – **Ястребинка тушетская**. Каменные осыпи, редко.
- Hieracium umbellatum* L. (*Hieracium umbelliferum* Naeg. & Peter) = *Pilosella* x *densiflora*, (*Hieracium umbellosum* (Naeg. & Peter) Ueksip) = *Pilosella* x *auriculoides* – **Ястребинка рыхлозонтичная**. Луга, редко.
- Hieracium uczanssunense* Ueksip – **Ястребинка учансунская**. Буковые леса, редко. Э.
- Hieracium vagum* Jord. (*H. sabaudum* L. ssp. *vagum* (Jord.) Zahn, #*H. sublactucaceum* auct.) – **Ястребинка блуждающая**. На лесных полянах, в светлых лесах, изредка.
- Hieracium vasconicum* Jord. ex Boreau [*Hieracium verruculatum* Link] = *Pilosella verruculata* – **Ястребинка баскская**. Каменные осыпи, редко.
- Hieracium virgultorum* Jord. – **Ястребинка ветвистая**. На лесных полянах, склонах, среди кустарников, изредка.
- Inula aspera* Poir. (#*I. salicina* ssp. *aspera* (Poir.) Jav., #*I. salicina* var. *aspera* (Poir.) Beck) – **Девясил шероховатый**. На сухих каменных склонах, открытых лесных полянах, обычно.
- Inula britannica* L. – **Девясил британский**. На лесных опушках или полянах, по берегам водоемов, довольно редко.
- Inula conyza* (Greiss.) Meikle (*I. conyza* DC, #*I. squarrosa* (L.) Bernh. 1800 non L. 1763, *I. vulgaris* (Lam.) Trevis.) – **Девясил растопыренный**. В лесах и на полянах, изредка.
- Inula ensifolia* L. – **Девясил мечелистный**. На яйле и приайлинских склонах, обычно.
- Inula germanica* L. – **Девясил германский**. Луга, обычно.
- Inula helenium* L. – **Девясил высокий**. В сосновых борах, в лиственных лесах и кустарниковых зарослях, на лесных полянах и по берегам горных речек, редко.

- Inula oculus-christi* L. – **Девясил глазковый**. На каменистых склонах, осыпях, яйле, обычно.
- Inula thapsoides* (M.Bieb.) Spreng. (*Inula vulgaris* (Lam.) Trevis.) = *Inula conyuza* – **Девясил коровяковый**. Каменистые осыпи, возможно, исчезнувший.
- Jurinea sordida* Steven – **Наголоватка грязная**. На травянистых и каменистых склонах, яйлинских плато, часто.
- Lactuca serriola* L. (*L. scariola* L.) – **Латук дикий, компасный**. У дорог, жилья, сорное в посевах, обычно. **ERL**.
- Lactuca tatarica* (L.) C. A. Mey. (*Lactuca tuberosa* Jacq.) = *Steptorhamphus tuberosus*, [*Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl] = *Scariola viminea* (*Lactuca wilhelmsiana* Fisch. & C.A.Mey. ex DC.) = *Lactuca quercina* – **Латук татарский**. Каменистые осыпи, редко. **ERL**.
- Lagoseris callicephalo* Juz. – **Лагозерис красивоголовый**. На скалистых обнажениях, осыпях, довольно редко.
- Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss. [*Lagoseris sancta* (L.) K. Maly] = *Pterotheca sancta* – **Лагозерис пурпурный**. Каменистые осыпи и саванноиды, изредка.
- Lapsana communis* L. [*Lapsana communis* L. subsp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek] = *Lapsana intermedia*, {*Lapsana grandiflora* auct. non M.Bieb.} = *Lapsana intermedia* (*Lapsana grandiflora* M.Bieb. var. *intermedia* (M.Bieb.) Schmalh.) = *Lapsana intermedia* – **Бородавник обыкновенный**. Сосновые и лиственные леса, каменистые осыпи, обычно.
- Lapsana intermedia* M.Bieb. (*L. aipetriensis* Vassilez., *L. alpina* auct. non Boiss. & Balansa, *L. communis* L. ssp. *intermedia* (M.Bieb.) Hayek, *L. grandiflora* M.Bieb. var. *intermedia* (M.Bieb.) Schmalh.) – **Бородавник средний**. В лесах, на полянах, у дорог, часто.
- Leontodon biscutellifolius* DC. (*L. asper* (Waldst. & Kit.Poir 1814, non Forssk. 1775, *L. crispus* auct. non Vill., #*L. crispus* ssp. *asper* (Waldst. & Kit.) Rohlena) – **Кульбаба шероховатая**. На сухих полянах, в сосновых лесах, на яйле, обычно.
- Leontodon hispidus* L. – **Кульбаба щетинистая**. На свухих каменистых склонах, яйле, обычно.
- Leucanthemum vulgare* Lam. – **Нивяник обыкновенный, поповник**. На лесных полянах, лугах, яйле, обычно, часто.
- Linosyria carpatica* Pojark (*Linosyris villosa* (L.) DC.) = *Galatella vulgaris*, (*Linosyris vulgaris* Cass. ex Less.) = *Galatella vulgaris* – **Грудница обыкновенная (Г. мохнатая)**. Степи и томиляры, редко.
- Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, #*M. chamomilla* var. *recutita* (L.) Grierson, #*M. chamomilla sensu* L. 1755) – **Ромашка ободранная**. Сорное на огородах и у жилья, довольно редко.
- Mycelis muralis* (L.) Dumort. (*Lactuca muralis* (L.) Gaerth.) – **Мицелис стеной**. В буковых, дубовых лесах, часто. **ERL**.
- Oporordum tauricum* Willd. – **Татарник крымский**. На пустырях, сухих полянах, редко.
- Pallenis spinosa* (L.) Cass. – **Палленис колючий**. Саванноиды, каменистые осыпи, очень редко.
- Petasites hybridus* (L.) Gaertn., В.Mey. & Scherb. – **Белокопытник гибридный**. По берегам речек, на влажных полянах, в нижнем поясе, обычно.
- Picnometon acarna* (L.) Cass. – **Пикномон колючий**. На полянах, в светлых лесах, у дорог, сорное, редко.

- Picris echioides* L. (*Helminthia echioides* (L.) Juss., *Helminthotheca echioides* (L.) Holub) – **Горлюха румяноквидная**. На сорных местах, у дорог, изредка.
- Picris rigida* Ledeb. ex Spreng. (*P. strigosa* auct. non M.Bieb.) – **Горлюха твердая**. На сухих щебнистых склонах, полянах, среди кустарников, обычно.
- Picris pauciflora* Willd. – **Горлюха малоцветковая**. На сухих каменистых склонах, редко.
- Scariola viminea* (L.) F.W. Schmidt (*Lactuca viminea* (L.) J.Presl & C.Presl) – **Скариола прутьевидная**. На полянах, у дорог, на сухих склонах, обычно.
- Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter = *Lamyra echinocephala* – **Птилостефон ежеголовый**. Можжевельниковые, крымскососновые леса, саванноиды, каменистые обнажения, обычно.
- Pulicaria uliginosa* Steven ~ *Pulicaria dysenterica* – **Блошница болотная**. Берега ручьев, обычно.
- Pyrethrum parthenifolium* Willd. – **Пиретрум девичьелистный**. В лесу, на полянах, лесосеках, у дорог, обычно.
- Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop. – **Пиретрум, ромашник щитковый**. В лесах, на полянах, среди кустарников, обычно.
- Rhagadiolus edulis* P.Gaertn. {*Rhagadiolus stellatus* auct. non (L.) P.Gaertn.} = *Rhagadiolus edulis*, (*Rhagadiolus stellatus* (L.) P.Gaertn.var. *edulis* (P.Gaertn.) DC.) = *Rhagadiolus edulis* – **Рагадиолус съедобный**. Каменистые осыпи, изредка.
- Scolymus hispanicus* L. – **Сколимум испанский**. Каменистые осыпи, редко.
- Scorzonera crispa* M.Bieb. (#*S. austriaca* ssp. *crispa* (M.Bieb.) Numan) – **Козелец курчавый**. На каменистых склонах, скалах, яйле, обычно.
- Scorzonera laciniata* L. – **Козелец разрезной**. На каменистых полянах, луговинах, редко.
- Scorzonera mollis* M.Bieb. – **Козелец мягкий**. Можжевельниковые леса, каменистые осыпи, редко.
- Scorzonera taurica* M.Bieb. – **Козелец крымский**. Крымскососновые леса, саванноиды, степи, томиляры, редко.
- Senecio cineraria* DC., Note: Reported as a naturalized species in Crimea. (*Senecio congestus* (R.Br.) DC.) = *Tephroseris palustris* (*Senecio crispatus* DC.) = *Tephroseris crispa*, (*Senecio czernjaevii* Minder.) = *Tephroseris integrifolia*, {*Senecio doria* auct. non L.} = *Senecio schvetzovii* & *Senecio umbrosus* (*Senecio doria* L. subsp. *umbrosus* (Waldst. & Kit.) Soo) = *Senecio umbrosus* – **Крестовник цинерариевый**. На приморских скалах, одичавшее, изредка. **А.**
- Senecio jacobaea* L. – **Крестовник луговой**. На полянах, луговинах яйлы, склонах, обычно.
- Senecio vulgaris* L. – **Крестовник обыкновенный**. Сорное у дорог, обычно. **А.**
- Senecio vernalis* Waldst. & Kit. (#*S. euxinus* Minderova, #*S. leucanthemifolius* var. *vernalis* (Waldst. & Kit.) C.Alexander) – **Крестовник весенний**. На полянах, среди кустарников, в нижней зоне, очень обычно.
- Serratula radiata* (Waldst. et Kit.) M. Bieb. [*Serratula radiata* (Waldst. et Kit.) M.Bieb. subsp. *bracteifolia* Pjin ex Grossh.] = *Serratula bracteifolia*, (*Serratula salsa* Pall. ex M.Bieb.) = *Saussurea salsa* – **Серпуха лучевая**. Степи и томиляры, изредка.
- Sigesbeckia orientalis* L. (*Sigesbeckia serrata* DC.) = *Sigesbeckia orientalis* s.l. – **Сигезбекия восточная**. Рудеральные местообитания, очень редко.
- Solidago virgaurea* L. – **Золотарник обыкновенный (золотая розга)**. В лесах, на полянах, открытых травянистых склонах, на яйле, обычно.

- Stectorhamphus tuberosus* (Jacq.) Grossh. – **Стрепторамфус клубненосный**. Можжевельовые леса, каменистые обнажения, довольно редко.
- Tanacetum millefolium* (L.) Tzvelev – **Пижма тысячелистная**. Каменистые осыпи, редко.
- Tanacetum vulgare* L. – **Пижма обыкновенная, дикая рябинка**. На лесных полянах, луговинах, у дорог, изредка.
- Taraxacum erythrospermum* Andrz. (#*T. laevigatum* auct.) – **Одуванчик красносемянный**. На сухих полянах, яйле, редко.
- Taraxacum hybernum* Steven – **Одуванчик осенний**. Можжевельовые леса, саванноиды, довольно обычно.
- Taraxacum officinale* Wigg. aggr. (#*T. laeticolor* Dahlst.) – **Одуванчик лекарственный**. На лесных полянах, у дорог, жилья, обычно.
- Tephrosia jalicola* (Juz.) Konechn. (*Senecio jalicola* Juz.) – **Пепельник (крестовник) яйлинский**. Степи и томиляры, обычно.
- Tragopogon dasyrhynchus* Artemcz. – **Козлобородник опушенноносный**. На сухих остепненных полянах, довольно редко.
- Tragopogon dubius* Scop. (#*T. major* Jacq., *T. tauricus* Klokov) – **Козлобородник сомнительный**. На сухих полянах, луговинах, у дорог, жилья, обычно.
- Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. – **Трехреберник запахучий**. Луга, довольно редко. А.
- Tussilago farfara* L. – **Мать-и-мачеха обыкновенная**. На смытых почвах, у речек, дорог, обычно.
- Xeranthemum annuum* L. – **Сухоцвет однолетний**. У дорог, на сухих склонах, обычно.
- Xeranthemum cylindraceum* Sibth. & Smith (*Xeroloma cylindracea* (Sibth. & Smith) Holub) – **Сухоцвет цилиндрический**. На задерненных склонах со степной растительностью, обычно.
- Zacintha verrucosa* P.Gaertn. – **Зацинта бородавчатая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, редко.

#### **Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые**

- Cystopteris alpina* (Lam.) Desv. (*C. fragilis* (L.) Bernh. subsp. *alpina* (Lam.) S.Hartm., *C. fragilis* (L.) Bernh. var. *alpina* (Lam.) Desv., *C. regia* auct. non (L.) Desv., *Polypodium alpinum* Lam.) – **Пузырник альпийский**. Среди скал, по всей территории, очень редко.

#### **Berberidaceae Juss. – Барбарисовые**

- Berberis vulgaris* L. – **Барбарис обыкновенный**. В лесах и на полянах, изредка.
- Berberis orientalis* C.K.Schneid. (*B. vulgaris* L. ssp. *orientalis* (C.K.Schneid.) Takht., *B. vulgaris* L. var. *orientalis* (Schneid.) Papava) – **Барбарис восточный**. Под пологом смешанных лесов, на сухих склонах, редко.

#### **Betulaceae - Берёзовые**

- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **Ольха клейкая**. По берегам ручьев, изредка.

#### **Boraginaceae Juss. – Бурачниковые**

- Anchusa gmelinii* Ledeb. (*Anchusa italica* Retz.) = *Anchusa azurea* – **Анхуза итальянская**. Каменистые осыпи, обычно.
- Anchusa leptophylla* Roem. & Schult. – **Анхуза узколистная**. На сухих местах и у

- дорог, обычно.
- Anchusa stylosa* M.Bieb. – **Анхуза длинностолбиковая**. На сухих каменистых склонах, редко.
- Asperugo procumbens* L. – **Острица простертая**. Пушистодубовые леса, луга, каменистые осыпи, изредка.
- Cerintho minor* L. (*C. quinguemaculata* Vahlenb.) – **Восковник малый**. На сухих склонах, лесных полянах, обычно.
- Cynoglossum germanicum* Jacq. {*Cynoglossum montanum* auct. non L.} = *Cynoglossum germanicum* – **Чернокорень горный**. Буковые леса, изредка.
- Cynoglossum creticum* Mill. – **Чернокорень критский**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Cynoglossum officinale* L. – **Чернокорень лекарственный**. На каменистых склонах, в речных долинах, у дорог, редко.
- Echium russicum* J. F.Gmel. (*E. maculatum* auct. non L., *E. rubrum* Jacq. 1778, non Forssk. 1774) – **Синяк русский**. На остепненных полянах, каменистых склонах, в нижней зоне, редко. **ERL**.
- Echium biebersteinii* Lacaita (*E. italicum* auct. non L., #*E. italicum* ssp. *Biebersteinii* (Lacaita) Greuter & Burdet, #*E. italicum* var. *biebersteinii* Lacaita, *E. pyramidatum* DC.) – **Синяк Биберштейна**. На каменистых склонах, у дорог, обычно.
- Echium vulgare* L. – **Синяк обыкновенный**. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.
- Heliotropium europaeum* L. – **Гелиотроп европейский**. Сорные места, пляжи, редко.
- Heliotropium ellipticum* Ledeb. – **Гелиотроп эллиптический**. Каменистые осыпи, приморские пески, изредка.
- Lappula barbata* (M.Bieb.) Guerke (*Myosotis barbata* M.Bieb.) – **Липучка бородчатая**. На каменистых склонах, обычно.
- Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort. (*L. echinata* Gilib. nom. inval., *L. myositis* Moench, *Myosotis lappula* L., #*M. squarrosa* Retz.) – **Липучка расстопыренная**. В посевах, у дорог, сорное, обычно.
- Lappula semicincta* (Steven) M. Pop. ex Dobrocz. – **Липучка полуокруженная**. Каменистые обнажения и осыпи, очень редко.
- Lappula patula* (Lehm.) Menyh. – **Липучка пониклая**. Каменистые осыпи, обычно.
- Lithospermum apulum* (L.) = *Neatostema apulum* – **Воробейник апулейский**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Lithospermum arvense* L. = *Buglossoides arvensis* – **Воробейник полевой**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Lithospermum officinale* L. – **Воробейник лекарственный**. Среди кустарников, в светлых лесах, на сухих полянах, обычно.
- Lithospermum officinale* L. (*Lithospermum purpureocoeruleum* L. = *Aegonychon purpureocoeruleum*, *Lithospermum sibthorpiatum* Griseb. = *Buglossoides sibthorpiana*) – **Воробейник (эгонихон) пурпурно-синий**. Хвойные и лиственные леса, часто.
- Lycopsis orientalis* L. – **Кривоцвет восточный**. Каменистые осыпи, обычно.
- Myosotis arvensis* (L.) Hill (*M. scorpioides* L. var. *arvensis* L.) – **Незабудка полевая**. На склонах, лесных полянах, обычно. **ERL**.
- Myosotis incrassata* Guss. – **Незабудка утолщенная**. Саванноиды и каменистые осыпи, редко.
- Myosotis litoralis* Steven ex M.Bieb. – **Незабудка береговая**. На каменистых сухих



- полянах, редко.
- Myosotis micrantha* Pall. ex Lehm. (*M. arenaria* Schrad. ex Schultz; *M. stricta* Link ex Roem. & Schult.; *M. verna* Opiz) – **Незабудка мелкоцветковая**. На сухих полянах и склонах, обычно.
- Myosotis popovii* Dobrocz. (#*M. suaveolens* auct. p.p.) – **Незабудка Попова**. На яйле и приайлинских склонах, обычно.
- Myosotis ramosissima* Rochel ex Schult. (*M. collina* Rchb. 1822, non Hoffm. 1791, *M. hispida* Schlectht.) – **Незабудка ветвистая**. На сухих каменистых склонах, обычно.
- Myosotis sparsiflora* J.C.Mikan ex Pohl (#*M. pseudopropinqua* Popov, *Strophostoma sparsiflora* (Pohl) Turcz.) – **Незабудка редкоцветковая**. На лесных полянах, в лесах, в поймах, по берегам болотцев, редко.
- Onosma polyphylla* Ledeb. – **Оносма многолистная**. На каменистых и скалистых склонах яйлы, изредка. **ККРФ, ERL.**
- Onosma rigida* Ledeb. – **Оносма жесткая**. На каменистых обнажениях яйлы, изредка.
- Onosma taurica* Pall. – **Оносма крымская**. На каменистых полянах и осыпях, изредка.
- Pulmonaria obscura* Dumort. (*P. officinalis* L. ssp. *obscura* (Dumort.) Murb.) – **Медуница неясная**. В буковых и дубовых лесах, изредка.
- Symphytum tauricum* Willd. (*S. orientale* auct. non L.) – **Окопник крымский**. В лесах, на полянах, у дорог, обычно.
- Symphytum officinale* L. – **Окопник лекарственный**. Во влажных местах, очень редко.
- Tournefortia sibirica* L. = *Argusia sibirica* – **Турнефорция сибирская**. Пляжи, изредка.
- Brassicaceae Burnett (=Cruciferae Juss., nom. altern.) – Капустные, крестоцветные**
- Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande (#*A. alliacea* (Salisb.) Britten & Rendle nom. illeg., *A. officinalis* Andrzej. ex M.Bieb., *Arabis petiolata* M.Bieb., *Sisymbrium alliaceum* Salisb., nom. illeg.) – **Чесночник черешчатый**. В лесах, на вырубках, у дорог, обычно.
- Alyssum alyssoides* (L.) L. (*A. calycinum* L., *Psilonema calycinum* (L.) C. A. Mey.) – **Бурачок бурачковидный**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Alyssum borzaeanum* Nyár. (*A. obtusifolium* auct. non Steven ex DC., *A. tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. *borzaeanum* (Nyár.) Nyár., *A. tenderiense* Kotov) – **Бурачок Борзы (туполистный)**. На остепненных каменистых склонах, редко.
- Alyssum calycinum* L. (*A. alyssoides* (L.) L., *A. campestre* (L.) L., #*Clypeola alyssoides* L., #*C. campestris* L., #*Psilonema alyssoides* (L.) Heideman, #*P. calycinum* (L.) C.A.Mey.) – **Бурачок чашечковый**. На сухих полянах, каменистых склонах, сорное у дорог, очень редко.
- Alyssum desertorum* Stapf (*A. minimum* auct. non L., *A. turkestanicum* Regel & Schmalh. var. *desertorum* (Stapf.) Botsch., *A. vindobonense* Beck) – **Бурачок пустынный**. Каменистые сухие склоны, обычно.
- Alyssum hirsutum* M.Bieb. (*A. brodensе* Zapal., #*A. minus* (L.) Rothm. ssp. *hirsutum* (M.Bieb.) Stojan. & Stef.) – **Бурачок шершавый**. Поляны у границы леса, обычно.
- Alyssum minutum* Schlecht. ex DC. – **Бурачок маленький**. На шиферных сухих склонах, довольно обычно.
- Alyssum rostratum* Steven (*A. montanum* L. ssp. *rostratum* (Steven) Schmalh.) – **Бурачок**

- носатый.** На сухих склонах и каменистых обнажениях, довольно обычно.
- Alyssum tortuosum* Waldst. & Kit. (#*A. bracteatum* auct., #*A. cuneipetalum* Nybr., #*A. diversicaule* P.A. Smirn., *A. longistylum* (N.Busch.) Grossh., #*A. longistylum* (Sommier & Levier) Grossh., *A. odessanum* Nybr., #*A. serpyllifolium* var. *longistylum* Sommier & Levier, #*A. tortuosum* var. *longistylum* (Sommier & Levier) N. Busch, #*A. transiens* Nybr.) – **Бурачок извилистый.** На щебнистых сухих склонах, часто.
- Alyssum trichostachyum* Rupr. (*A. montanum* L. ssp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek, *A. repens* Baubg. ssp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek) – **Бурачок пушистый.** На каменистых склонах, осыпях, яйлах, остепненных полянах, обычно.
- Alyssum umbellatum* Desv. – **Бурачок зонтичный.** На остепненных сухих полянах, каменистых склонах, изредка.
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. – **Резушка Галя.** На сухих склонах, в нижней зоне, редко.
- Arabis auriculata* Lam. (*A. dasycarpa* Andrz. ex DC., *A. recta* Vill.) – **Резуха ушастая.** На сухих каменистых склонах, довольно обычно.
- Arabis caucasica* Schlecht. ex Willd. (*A. alpina* L. ssp. *caucasica* Schlectht. ex Willd.) Briq., #*A. caucasica* var. *dolichothrix* (N. Busch) Grossh., #*A. dolichothrix* (N.Busch) N.Busch, #*A. flaviflora* Bunge, #*A. ionocalyx* auct.) – **Резуха кавказская.** На скалах, каменистых обнажениях, обычно.
- Arabis sagittata* (Bertol.) DC. (*A. hirsuta* auct. non (L.) Scop., #*Turritis sagittata* Bertol.) – **Резуха стреловидная.** Поляны и остепненные склоны, довольно обычно.
- Arabis turrata* L. – **Резуха башенная.** В лесах, на полянах, у дорог, обычно.
- Barbarea vulgaris* R.Br. ssp. *arcuata* (Opiz ex J.& C.Presl) Hayek (*B. Arcuata* (Opiz ex J.et C.Presl) Reichenb., *B. taurica* DC. #*Campe barbarea* (L.) Wight ex Piper, *Erysimum arcuatum* Opiz ex J. & C.Presl) – **Сурепка дуговидная.** В поймах рек, на лесных полянах, луговинах, изредка.
- Berteroa incana* (L.) DC. (*Alyssum incanum* L.) – **Икотник серый.** На сухих полянах, у дорог, изредка.
- Calepina irregularis* (Asso) Thell. – **Калепина неравномерная.** На полянах и сорных местах, часто.
- Camelina microcarpa* Andrz. – **Рыжик мелкоплодный.** Каменистые осыпи, довольно редко. **ERL.**
- Camelina rumelica* Velen. (*C. albiflora* (Boiss.) N. Busch) – **Рыжик румелийский.** Каменистые осыпи, редко. **ERL.**
- Camelina sativa* (L.) Crantz. (имеются расы с голыми листьями – *C. glabrata* (DC.) Fritsch. и густоопушенными – *C. pilosa* (DC.) Vass. – **Рыжик посевной.** Каменистые осыпи, обычно. **ERL. А.**
- Cardamine graeca* L – **Сердечник греческий.** Пушистодубовые леса, редко.
- Cardamine hirsuta* L. (*C. multicaulis* Норре) – **Сердечник шершавый.** По тенистым, влажным местам, в лесах и среди кустарников, изредка.
- Cardamine impatiens* L. (#*C. dasycarpa* M.Vieb.) – **Сердечник недотрога.** Леса, луга, берега рек, очень редко.
- Capsella bursa-pastoris* Medik. (#*Capsella hircana* Grossh., *Thlaspi bursa-pastoris* L.) – **Пастушья сумка обыкновенная.** По обочинам дорог, у жилья, сорное, обычно. **А.**
- Chorispora tenella* (Pall.) DC – **Хориспора нежная.** Саванноиды, каменистые осыпи, довольно редко

- Clypeola jonthlaspi* L. – **Щитница яруточна**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Coronopus squamatus* (Forssk.) Aschers. (*C. procumbens* Gilib., *Lepidium squamatum* Forssk.) – **Воронья лапа чешуйчатая**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Conringia orientalis* (L.) Dum. – **Конрингия восточная**. Каменистые осыпи, изредка.
- Crambe pontica* Stev. – **Кагран понтийский**. Галечниковые пляжи, изредка.
- Dentaria bulbifera* L. (*Cardamine bulbifera* (L.) Krantz.) – **Зубянка клубненосная**. В буковых, смешанных лесах, на дне балок, очень редко.
- Dentaria quinquefolia* M.Bieb. (*Cardamine quinquefolia* (M.Bieb.) Schmalh.) – **Зубянка пятилистная**. Широколиственные леса, часто.
- Diplotaxis muralis* (L.) DC. – **Двурядка стенная**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка. **ERL.**
- Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. (*Sisymbrium tenuifolium* L.) – **Двурядка тонколистная**. На сухих склонах, сорное, изредка. **ERL.**
- Diplotaxis viminea* (L.) DC. – **Двурядка прутяная**. Каменистые осыпи и обнажения, изредка. **ERL.**
- Draba cuspidata* M.Bieb. – **Крупка вытянутостолбиковая**. На каменистых склонах в верхнем поясе, на яйле, довольно обычно.
- Draba muralis* L. – **Крупка стенная**. На каменистых местах, шиферных склонах, редко.
- Draba nemorosa* L. – **Крупка дубравная**. Горные луга, каменистые осыпи, берега рек, обочины дорог, довольно редко.
- Erophila praecox* (Steven) DC. (*E. verna* (L.) Besser ssp. *praecox* (Steven) Walters) – **Веснянка ранняя**. На полянах, склонах, залежах, обычно.
- Erophila verna* (L.) Besser (*Draba verna* L., *E. verna* (L.) Besser ssp. *Praecox* (Steven) Walters, #*E. verna* (L.) Chevall., comb. Superfl.) – **Веснянка весенняя**. На сухих полянах, вырубках, у дорог, довольно обычно.
- Erucastrum armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruchert. (*Brassica armora-cioides*' , Czern. ex Turcz., *B. elongata* Ehrh. p. p.) – **Рогач хреновидный**. Саванноиды, каменистые осыпи и обнажения, изредка.
- Erucastrum cretaceum* Kotov (*Brassica elongata* Ehrh. var. *pinnati* Uda Schmalh.) – **Рогач меловой**. Каменистые обнажения, довольно редко. **ERL.**
- Erysimum cuspidatum* (M.Bieb.) DC. (*Acachmena cuspidata* (Bieb.) H.P. Fuchs, #*Cuspidaria cuspidata* (M.Bieb.) Takht., #*Syrenia cuspidata* (N.Busch) Rchb., #*Syreniopsis cuspidata* (M.Bieb.) H.P.Fuchs) – **Желтушник щитовидный**. На каменистых, сухих склонах, остепненных полянах, обычно.
- Erysimum diffusum* Ehrh. (*E. canescens* Roth.) – **Желтушник рассеянный**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Erysimum repandum* L. – **Желтушник вырезанный**. Саванноиды, каменистые осыпи и обнажения, довольно обычно.
- Fibigia clypeata* (L.) Medik. – **Фибигия щитовидная**. На сухих склонах и полянах южного склона гор, обычно.
- Hesperis ruscotricha* Borbas & Degen. – **Вечерница ночная фиалка**. В лесах и среди кустарников, на полянах, сухих склонах, обычно.
- Hesperis steveniana* DC. – **Вечерница Стевена**. В дубовых лесах южного склона, обычно.
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss. – **Гиршфельдия серая**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

- Hornungia petraea* (L.) Reichb. (*Hutschinsia petraea* (L.) R. Br.) – **Горнунгия скальная**.  
Каменные обнажения и осыпи, изредка.
- Iberis pinnata* L. – **Иберийка перистая**. Каменные осыпи, редко.
- Iberis saxatilis* L. – **Иберийка скальная**. На скалистых и каменных склонах яйлы, обычно.
- Iberis taurica* DC. (#*I. oschtenica* Kharkev., *I. simplex* auct. p.p.) – **Иберийка крымская**.  
На каменных склонах, осыпях в нижней и верхней зонах, обычно.
- Isatis taurica* M.Bieb. – **Ваида крымская**. На сухих склонах, изредка.
- Isatis tinctoria* L. – **Ваида красильная**. Каменные склоны, изредка. **ERL**.
- Lepidium draba* L. (*Cardaria draba* (L.) Desf.) – **Клоповник крупковидный**.  
Саванноиды, каменные осыпи, изредка.
- Lepidium campestre* (L.) R.Br. (*Thlaspi campestre* L.) – **Клоповник полевой**. На сухих склонах, полянах, у дорог, довольно обычно. **ERL**.
- Lepidium graminifolium* L. – **Клоповник злаколистный**. Саванноиды, каменные осыпи редко. **ERL**.
- Lepidium perfoliatum* L. – **Клоповник пронзеннолистный**. Сорное у дорог, довольно обычно. **ERL**.
- Matthiola odoratissima* (Pall. ex Bieb.) R. Br. – **Левкой душистый**. Каменные обнажения, редко.
- Matthiola longipetala* (Vent.) DC. (*M. oxyceras* DC.) – **Левкой длиннолепестковый**.  
Каменные обнажения, редко.
- Meniocus linifolius* (Steph. ex Willd.) DC. – **Плоскоплодник льнолистный**.  
Можжевельные леса, саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Nasturtium officinale* R. Br. – **Жеруха, настурция лекарственная**. Берега ручьев, довольно редко.
- Neslia paniculata* (L.) Desv. (#*N. paniculata* ssp. *apiculata* (Fisch. & C.A.Mey) Maire & Weiller) – **Неслия метельчатая**. На полянах, сухих склонах, по обочинам дорог, довольно обычно. **A**.
- Rapistrum rugosum* (L.) All. – **Репник морщинистый**. Каменные осыпи, изредка.
- Rorippa austriaca* (Crantz) Besser (*Nasturtium austriacum* Crantz) – **Жерушник австрийский**. По сырым местам и берегам водоемов, редко.
- Sinapis avrensis* L. – **Горчица полевая**. Каменные склоны, изредка. **ERL. A**.
- Sisymbrium confertum* Stev. ex Turcz. – **Гулявник густой**. Каменные осыпи, редко. **ERL**.
- Sisymbrium orientale* L. (#*S. daghestanicum* Vassilcz.) – **Гулявник восточный**. Сухие остепненные поляны, в нижней зоне, изредка.
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop. (*Erysimum officinale* L.) – **Гулявник лекарственный**.  
На полянах, у дорог, сорное, довольно обычно.
- Sobolewskia sibirica* (Willd.) P.W.Ball. (*S. lithophila* M.Bieb., #*Cochlearia sibirica* Willd.) – **Соболевския сибирская**. Каменные места и скалы, редко. **Э**.
- Thlaspi arvense* L. – **Ярутка полевая**. Сорное на огородах, у дорог, довольно обычно. **A**.
- Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch (*Noccaea macrantha* (Lipsky) F.K.Mey.) – **Ярутка крупноцветковая**. На каменных и скалистых склонах, лесных полянах, обычно.
- Thlaspi perfoliatum* L. (*Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey.) – **Ярутка пронзенная**.  
На южных склонах и остепненных полянах, обычно.
- Thlaspi praecox* Wulf (*Noccaea praecox* (Wulf.) F.K. Mey.) – **Ярутка ранняя**. На сухих

склонах, скалах, обычно.

*Turritis glabra* L. (*Arabis glabra* L.) – **Башенница гладкая**. На лесных и яйлинских луговинах, изредка.

#### **Callitrichaceae Link – Болотниковые**

*Callitriche palustris* L. (#*C. anceps* ssp. *subanceps* (Petrov) A.Löve & D.Löve, #*C. elegans* Petrov, #*C. fallax* Petrov, #*C. palustris* var. *elegans* (Petrov) Y.L. Chang, #*C. subanceps* Petrov, *C. verna* L., #*C. verna* var. *elegans* (Petrov) Kitag., *C. vernalis* W.D.J.Koch) – **Болотник болотный**. Берега водоемов, озер, рек, редко. **ERL**.

#### **Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые**

*Adenophora taurica* (Sukacz.) Juz. – **Бубенчик крымский**. На лугах яйлы и склонах гор, очень редко.

*Campanula bononiensis* L. – **Колокольчик болонский**. На лесных полянах, в лесах, на яйлинских склонах, обычно.

*Campanula glomerata* L. – **Колокольчик сборный**. Луга, изредка.

*Campanula rapunculoides* L. (#*C. grossheimii* Kharadze) – **Колокольчик рапунцелевидный**. В светлых лесах, очень редко.

*Campanula taurica* Juz. (\*\**C. sibirica* L. ssp. *taurica* (Juz.) Fed.) – **Колокольчик крымский**. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, среди кустарников, обычно. Э.

*Campanula trachelium* L. (*C. urticifolia* Schmidt) – **Колокольчик крапиволистный**. Хвойные и широколиственные леса, редко.

*Legousia hybrida* (L.) Delarbre – **Легузия гибридная**. Можжевельниковые леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.

#### **Cannabaceae Endl. – Коноплевые**

*Humulus lupulus* L. – **Хмель обыкновенный**. По берегам рек и озер, изредка.

#### **Capparaceae Juss - Каперсовые**

*Capparis herbaceae* Willd. (*C. spinosa* auct., non L.) – **Каперсы травянистые**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

#### **Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные**

*Sambucus ebulus* L. – **Бузина травянистая**. У дорог, на лесосеках, у кордонов, редко.

*Sambucus nigra* L. – **Бузина черная**. У дорог, в балках, изредка.

*Viburnum lantana* L. – **Калина гордовина**. Грабовые и буковые леса, изредка.

*Viburnum opulus* L. – **Калина обыкновенная**. Среди кустарников, редко.

#### **Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные**

*Arenaria leptoclados* (Reichb.) Guss. – **Песчанка тонковетвистая**. Крымскососновые леса, каменистые обнажения, редко.

*Arenaria serpyllifolia* L. – **Песчанка тимьянолистная**. На остепненных склонах, в светлых лесах и как сорное в огородах, довольно обычно.

*Bufonia tenuifolia* L. – **Бюфония узколистная**. Каменистые обнажения, изредка.

*Cerastium balearicum* F.Herm. (*C. dentatum* Möeschl., #*C. semidecandrum* ssp. *balearicum* (F. Herm.) Litard., #*C. semidecandrum* ssp. *dentatum* (Moschl) Maire & Weiller, #*C. semidecandrum* var. *dentatum* (Moschl) Kharadze) – **Ясколка**

- балеарская.** В светлых лесах, на каменистых склонах, у дорог, обычно.
- Cerastium biebersteinii* DC. (#*C. biebersteinii* ssp. *transcaucasicum* Buschm.) – **Ясколка Биберштейна.** На яйле, каменистых склонах гор, на полянах у границы леса, обычно. Э.
- Cerastium glomeratum* Thuill. – **Ясколка скупенноцветковая.** На сухих склонах и у дорог, редко.
- Cerastium glutinosum* Fries (#*C. pallens* (F.W. Schultz) F.W. Schultz, #*C. pumilum* ssp. *glutinosum* (Fr.) Jalas, #*C. pumilum* ssp. *pallens* (F.W. Schultz) Schinz & Thell.) – **Ясколка клейкая.** Открытые поляны, обычно.
- Cerastium holosteoides* Fr. (*C. caespitosum* Gilib., nom. inval., #*C. caespitosum* ssp. *triviale* (Spenn.) Hiitonen, #*C. fontanum* ssp. *holosteoides* (Fr.) Salman, Ommerring & de Voogd, #*C. fontanum* ssp. *triviale* (Spenn.) Jalas, #*C. fontanum* ssp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet, #*C. holosteoides* ssp. *triviale* (Spenn.) Moschl, #*C. rigidulum* Takeda, #*C. triviale* Link nom. illeg., #*C. vulgare* Hartm., #*C. vulgatum* auct.) – **Ясколка костенецевидная.** На лугах, опушках леса, берегах водоемов, обочины дорог, обычно.
- Cerastium nemorale* Vieb. – **Ясколка лесная.** Лесные опушки, кустарники, обычно.
- Cerastium tauricum* Spreng. (#*C. brachypetalum* Desp. ex Pers., #*C. brachypetalum* f. *tauricum* (Spreng.) Prodan, #*C. brachypetalum* Pers. ssp. *tauricum* (Spreng.) Murb.) – **Ясколка крымская.** Сухие лесные поляны и каменистые склоны, обычно.
- Coronaria coriacea* (Moench) Schischk. & Gorschk. (*Lychnis coronaria* (L.) Desr.) – **Горицвет кожистый.** На сухих полянах, в светлых лесах, довольно редко.
- Dianthus armeria* L. – **Гвоздика армериевидная.** В лесах и на опушках, обычно.
- Dianthus capitatus* Balb. ex DC. – **Гвоздика головчатая.** На лесных полянах и приайлинских склонах, изредка
- Dianthus humilis* Willd. ex Ledeb. – **Гвоздика низкая.** На каменистых и сухих склонах, обычно.
- Dianthus marschallii* Schischk. – **Гвоздика Маршалла.** Можжевеловые и пушистодубовые леса, саванноиды, каменистые осыпи, довольно обычно. Э.
- Gypsophila glomerata* Pall. ex Adam (*G. globulosa* Steven ex Boiss., *G. pallasii* Ikonn.) – **Качим скупенный.** Открытые склоны гор, редко.
- Gypsophila pallasii* Ikonn. – **Качим Палласа.** Каменистые обнажения. Только у края Ай-Петринской яйлы в одном месте.
- Herniaria besseri* Fisch. ex Hornem. (*H. incana* auct. non Lam.) – **Грыжник Бессера.** На сухих склонах и полянах, редко.
- Holosteum umbellatum* L. (*Alcine umbellata* (L.) Lam., *H. syvachycum* Kleopov) – **Костенец зонтичный.** На сухих полянах и среди кустарников, обычно.
- Kohlruschia prolifera* (L.) Kunth (*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball & Heywood) – **Кольраушия побегоносная.** На каменистых склонах, остепненных полянах, обычно.
- Melandrium album* (Mill.) Garcke (#*Lychnis alba* Mill., #*L. pratensis* Rafn, #*M. dioicum* ssp. *album* (Mill.) D.Love, #*M. pratense* (Rafn) Roehl., *Silene alba* (Mill.) E.H.L. Krause 1901, non Britt. 1893, #*Silene latifolia* ssp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet, #*S. pratensis* (Rafn) Godr.) – **Дрема белая.** По обочинам дорог, среди кустарников, в дубовых лесах, обычно.
- Melandrium latifolium* (Poir.) Maire (*M. boissieri* Schischk., *M. divaricatum* (Reichenb.) Fenzl, *Silene latifolia* Poir.) – **Дрема широколистная.** По лесным опушкам и открытым луговым склонам, редко.

- Melandrium noctiflorum* (L.) Fries = *Elisanthe noctiflora* – **Дрема ночная**. Томилляры, степи, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Minuartia birjuczensis* Klokov (*M. hybrida* auct. non (Vill.) Schischk.) – **Миуарция бирючинская**. На каменистых и сухих склонах, довольно редко.
- Minuartia glomerata* (M.Bieb.) Degen – **Миуарция скученная**. На скалах, щебнистых и каменистых южных склонах, обычно.
- Minuartia hirsuta* (M.Bieb.) Hand.-Mazz – **Миуарция волосистая**. На яйле, каменистых полянах приайлинских склонов, обычно. Э.
- Minuartia taurica* (Steven) Graebn. (*Alcine taurica* Steven) – **Миуарция крымская**. Среди камней на яйле, редко. Э.
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. (*Alcine trinervia* (L.) Crantz, *M. Bracteata* Slendz.) – **Мерингия трехжилковая**. В лесах, на влажных полянах, довольно редко.
- Myosoton aquaticum* (L.) Moench (*M. sarmaticum* (Zapał.) Sävul. & Rayss., *Cerastium aquaticum* L., *Malachium aquaticum* (L.) Fr.) – **Мягковолосник водяной**. Под пологом пойменных лесов, по берегам водоемов, изредка.
- Orites densiflorus* (D'Urv.) Grossh. (*Silene densiflora* D'Urv.) – **Отитес густоцветковый**. На южных каменистых склонах со степной растительностью, обычно.
- Paronychia cephalotes* (M.Bieb.) Bess. (*P. cephalotes* (M.Bieb.) Besser ssp. *pontica* Borhidi, *P. pontica* (Borhidi) Claudhri, *P. taurica* Borhidi & Sikura – **Приноготовник головчатый**. На сухих каменистых склонах, яйлах, обычно. ККРФ.
- Pleconax subconica* (Friv.) ourkov (#*Conosilene conica* var. *subconica* (Friv.) A.Цвe & Kjellq., *P. conica* auct. non (L.) Ikonn., #*Pleconax conica* var. *subconica* (Friv.), *Silene conica* auct. non L., *S. conica* L. ssp. *subconica* (Friv.) Gavioli, #*Silene subconica* Friv.) – **Плеконакс полуконическая**. На остепненных склонах, среди кустарников, на яйлах, изредка.
- Queria hispanica* L. – **Кверия испанская**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Saponaria glutinosa* M.Bieb. – **Мыльнянка клейкая**. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, изредка.
- Scleranthus annuus* L. – **Дивала однолетняя**. На сухих склонах, просеках, у дорог, обычно.
- Scleranthus syvaschicum* Клеоров & *S. tauricus* Schur (*S. polycarpus* auct. non L., *S. verticillatus* auct. non Tausch) – **Дивала многоплодная**. На сухих полянах, остепненных склонах редко.
- Silene bupleuroides* (#*S. longiflora* Ehrh., *S. mariae* Klokov, *S. multifuga* Klokov, *S. ucrainica* Klokov) – **Смолевка володушковая**. На полянах в верхнем лесном поясе, яйле, довольно редко.
- Silene dichotoma* Ehrh – **Смолевка вильчатая**. Саванноиды, каменистые осыпи и обнажения, изредка.
- Silene comutata* Guss. (*Oberna comutata*) – **Смолевка замещающая**. Можжевеловые, лиственные леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Silene crispata* Steven = *Oberna crispata* – **Смолевка курчавая**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи и обнажения, изредка.
- Silene viridiflora* L. – **Смолевка зеленоватая**. На лесных опушках и лугах в поясе буковых и смешанных лесов, очень редко.
- Stellaria graminea* L. – **Звездчатка злаковая**. В пойменных лесах, на полянах, у дорог, обычно.
- Stellaria media* (L.) Vill. (*Alcine media* L., #*Alsinula media* (L.) Dostál, *S. xanthanthera*

- Pobed.) – **Звездчатка средняя, мокрица**. По сырым местам у жилья, сорное в посевах, у дорог, часто.
- Stellaria neglecta* Weine – *Stellaria media* aggr. – **Звездчатка злаковая незаметная**. Каменистые осыпи, редко.
- Stellaria pallida* (Dum.) Pire – *Stellaria media* aggr. – **Звездчатка бледная**. Саванноиды, редко.
- Velesia rigida* L. – **Велезия жесткая (липкая)**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

#### **Celastraceae R. Br. – Бересклетовые**

- Euonymus europaea* L. (#*E. bulgarica* Velen., #*E. europaea* f. *bulgarica* (Velen.) Gancev, *E. floribunda* Steven, *E. medirossica* Klokov, #*E. suberosa* Klokov) – **Бересклет европейский**. В лесах, кустарниковых зарослях, обычно.
- Euonymus latifolia* (L.) Mill. (#*E. europaea* beta *latifolia* L., *Kalonymus latifolia* (L.) Prokh.) – **Бересклет широколистный**. В лесах, часто буковых, по тенистым балкам, обычно.
- Euonymus verrucosa* Scop. – **Бересклет бородавчатый**. Сосновые и лиственные леса, обычно.

#### **Chenopodiaceae Vent. – Маревые**

- Atriplex oblongifolia* Waldst. & Kit – **Лебеда продолговатая**. Сорное в посевах, редко.
- Atriplex hastata* L. (A. *prostrata*) – **Лебеда копьевидная**. Каменистые осыпи, обычно.
- Atriplex nitens* Schkuhr (*A. saggitata* Borkh) – **Лебеда лоснящаяся**. Каменистые осыпи, у дорог, довольно обычно. **A.**
- Beta trigyna* Waldst. & Kit. – **Свекла трехстолбиковая**. У дорог, по берегам рек среди зарослей, изредка. **ERL.**
- Chenopodium album* L. (#*Ch. album* ssp. *virgatum* (Thunb.) Blom, #*Ch. centrорubrum* (Makino) Nakai, #*Ch. giganteum* auct., *Ch. leiospermum* DC., #*Ch. virgatum* Thunb., #*Ch. viride* auct.) – **Марь белая**. Сорное в посевах, у жилья, обычно.
- Chenopodium botrys* L. (*Neobotrydium botrys* (L.) Mold.) – **Марь душистая**. Каменистые осыпи, травянистые склоны, изредка. **A.**
- Chenopodium foliosum* Asch. (#*Ch. korshinskyi* Litv., #*Monolepis litwinowii* Paulsen) – **Марь многолистная**. На вырубках, полянах, у дорог, в посевах, сорное, обычно.
- Chenopodium murale* L. – **Марь стенная**. Каменистые осыпи, редко. **A.**
- Chenopodium opulifolium* L. – **Марь калинолистная**. Каменистые осыпи, травянистые склоны, редко. **A.**
- Chenopodium polyspermum* L. (*Ch. acutifolium* Smith.) – **Марь многосемянная**. В посевах, у дорог, по берегам болотцев и водоемов, обычно. **A.**
- Chenopodium vulvaria* L. – **Марь вонючая**. Каменистые осыпи, обычно. **A.**
- Polycnemum majus* R. Br. – **Хрупливник большой**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.

#### **Cistaceae Juss. – Ладанниковые**

- Cistus tauricus* (C. Presi) – **Ладанник крымский**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые обнажения, обычно.
- Fumana arabica* (L.) Spach. Для Крыма приводится *F. viscidula* (Stev. ex Palib.) Juz – **Фумана аравийская**. Можжевеловые леса, томиляры, саванноиды,



каменистые обнажения, изредка.

- Fumana procumbens* (Dun.) Gren. & Godr. (*Cistus fumana* L.) – **Фумана лежачая**. На сухих склонах со степной растительностью, довольно обычно.
- Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Weff. – **Фумана тимьянолистная**. Каменистые обнажения, очень редко.
- Fumanopsis laevis* (Cav.) Tzvelev (*Cistus thymifolius* auct. non L., *Fumana thymifolia* auct. non (L.) Spach ex Webb) – **Фуманопсис гладкий**. На щебнистых глинистых склонах, на известняковых скалах, редко.
- Helianthemum chamaecystus* Mill. (*#H. hirsutum* (Truill.) Mérat, *H. ovatum* (Viv.) Dun.) – **Солнцецвет яйцевидный**. На сухих склонах, горных лугах, в светлых лесах, обычно.
- Helianthemum grandiflorum* (Scop.) DC. (*H. nummularium* (L.) Mill. Ssp. *grandiflorum* (Scop.) Schintz & Thell., *H. tauricum* Sweet) – **Солнцецвет крупноцветковый**. На луговинах яйлы, лесных полянах, горных склонах, обычно.
- Helianthemum nitidum* Clementi (*H. nummularium* (L.) Mill. ssp. *grandiflorum* (Scop.) Schintz & Thell., *H. tauricum* Sweet) – **Солнцецвет блестящий**. На яйлах и приайлинских склонах, изредка.
- Helianthemum nummularium* (L.) Mill. – **Солнцецвет монетолистный**. Степи, томиляры, каменистые обнажения, изредка.
- Helianthemum orientale* (Grosser) Juz. & Pozdeeva (*H. oelandicum* (L.) DC. ssp. *orientale* (Grosser) Proctor, *Rhodax orientalis* (Grosser) Holub) – **Солнцецвет восточный**. На яйлах, открытых каменистых склонах, изредка.
- Helianthemum salicifolium* (L.) Mill. – **Солнцецвет иволистный**. Можжевельниковые леса, саванноиды, томиляры, степи, каменистые осыпи, обычно.
- Helianthemum stevenii* Rupr. ex Juz. & Pozdeeva (*#H. canum* ssp. *stevenii* (Rupr. ex Juz. & Pozdeeva) M. Proctor, *#H. oelandicum* ssp. *stevenii* (Juz. & Pozdeeva) Greuter & Burdet, *Rhodax stevenii* (Rupr. ex Juz. & Pozdeeva) Holub) – **Солнцецвет Стевена**. На сухих каменистых местах, обрывах, яйлах, часто. Э.

#### **Clusiaceae (=Hypericaceae Juss.; Guttiferae auct.) – Зверобойные**

- Hypericum chrysothyrsum* (Woronow) Grossh. – **Зверобой золотистокистевый**. Каменистые обнажения, довольно редко.
- Hypericum hirsutum* L. – **Зверобой жестковолосый**. На лесных полянах, среди кустарников, изредка.
- Hypericum perforatum* L. (*#H. komarovii* Gorschk., *#H. Nachitschevanicum* Grossh.) – **Зверобой продырявленный**. На лесных полянах, среди кустарников, на вырубках и ветровалах, обычно.
- Hypericum tauricum* R. Keller (*H. alpestre* (Steven ex Woronov) Gorschk., *H. linarioides* Bosse) – **Зверобой крымский**. На сухих лесных полянах, приайлинских склонах и яйле, часто.
- Hypericum tetrapterum* Fries (*H. acutum* Moench nom. illegit.) – **Зверобой четырехкрылый**. Берега ручьев, редко.

#### **Convallariaceae – Нолиновые**

- Convallaria majalis* L. (*Convallaria latifolia* Mill.) = *Convallaria majalis* – **Ландыш майский**. Сосновые, скальнодубовые, грабовые и буковые леса, обычно.
- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce – **Купена душистая**. Сосновые и лиственные леса, часто.

*Polygonatum orientale* Desf. (*Polygonatum polyanthemum* (M.Bieb.) Link) = *Polygonatum orientale* – **Купена многоцветковая**. Грабовые и буковые леса, обычно.

#### **Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые**

*Calystegia sepium* (L.) R. Br. [*Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *americana* (Sims) Brummitt] = *Calystegia inflata* – **Повой заборный**. Пушистодубовые леса, обычно.

*Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. (*C. sylvestris* Roem. & Schult., nom. illeg.) – **Повой лесной**. В лесах и на полянах, обычно.

*Convolvulus arvensis* L. – **Вьюнок полевой**. На огородах, у дорог, жилья, обычно.

*Convolvulus bracteosus* Juz. ~ *Convolvulus calvertii* [*Convolvulus calvertii* Boiss. subsp. *bracteosus* (Juz.) Smoljjan.] = *Convolvulus bracteosus* [*Convolvulus calvertii* Boiss. subsp. *tauricus* (Bornm.) Smoljjan.] = *Convolvulus tauricus* – **Вьюнок прицветниковый**. Каменистые обнажения, редко.

*Convolvulus betonicifolius* Mill. (*Convolvulus hirsutus* Steven ex M.Bieb.) – **Вьюнок бетониколистный**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.

*Convolvulus cantabrica* L. – **Вьюнок кантабрийский**. На сухих полянах, каменистых склонах, обычно.

*Convolvulus holosericeus* M.Bieb. – **Вьюнок шелковистый**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.

*Convolvulus scammonia* L. (*Convolvulus sepium* L.) = *Calystegia sepium* – **Вьюнок смолоносный**. Пушистодубовые леса, саванноиды, каменистые осыпи, редко.

*Convolvulus tauricus* (Bornm.) Juz. (*C. calvertii* Boiss. ssp. *tauricus* (Bornm.) Smoljjan.) – **Вьюнок крымский**. На сухих каменистых склонах гор и яйлы, редко.

#### **Cornaceae Dumort. – Кизилы**

*Cornus mas* L. – **Кизил мужской**. В лесах, по долинам рек, по всей территории, часто.

*Swida australis* (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. (*Cornus australis* C.A.Mey., #*C. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Jav., #*S. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Kubat, #*S. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.), #*S. sanguinea* ssp. *australis* (C.A. Mey.) Takht., comb. superfl., *Thelycrania australis* (C.A. Mey.) Sanadze) – **Свидина южная**. В лесах, среди кустарников, по всей территории, обычно.

#### **Corylaceae Mirb. – Лещиновые**

*Carpinus betulus* L. (#*C. caucasica* Grossh.) – **Граб обыкновенный**. Эдификатор, часто.

*Carpinus orientalis* Mill. – **Граб восточный, грабинник**. В дубовых, грабовых лесах в виде подлеска или образует кустарниковые заросли, эдификатор, часто.

*Corylus avellana* L. – **Лещина обыкновенная**. В дубовых и буковых лесах как подлесок, обычно.

#### **Crassulaceae DC. – Толстянковые**

*Sedum acre* L. – **Очиток едкий**. На каменистых склонах, осыпях, лесных полянах, обычно.

*Sedum album* L. (#*Oreosedum album* (L.) Grulich) – **Очиток белый**. На каменистых склонах, осыпях, полянах, изредка.

*Sedum antiquum* Omelcz. et Zaverucha (*S. hispanicum* auct. non L.) – **Очиток древний (Очиток испанский)**. По скалистым местам, на каменистых склонах, обычно.

*Sedum caespitosum* (Cav.) DC. – **Очиток дернистый**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.

*Sedum pallidum* M.Bieb. – **Очиток бледный**. На каменистых полянах, скалах, в лесах, по всей территории, обычно.

#### Cupressaceae Bartl. – Кипарисовые

*Juniperus excelsa* M.Bieb. (*J. isophyllos* auct. non K.Koch) – **Можжевельник высокий**. Каменистые осыпи, опушки леса, обычно, эдификатор. **ККРФ**.

*Juniperus hemisphaerica* C.Presl. (*J. communis* L. ssp. *hemisphaerica* (C.Presl) Nyman, *J. depressa* Steven 1857, non Raf. 1818, *J. klokovii* Kondr., nom. inval., *J. pygmaea* auct. non K.Koch) – **Можжевельник полушаровидный**. По верхней границе леса, на яйле, изредка.

*Juniperus oxycedrus* L. (*J. marschalliana* Steven, #*J. oxycedrus* ssp. *rufescens* Deb., #*J. rufescens* Link nom. Illeg.) – **Можжевельник колючий**. В сосновых лесах южного макросклона, на яйле, обычно.

*Juniperus sabina* L. – **Можжевельник казацкий**. По верхней границе леса и по сухим склонам, образует стелющиеся заросли с можжевельником полушаровидным, изредка.

#### Cuscutaceae Dumort. – Повиликовые

*Cuscuta alba* J.Presl & C.Presl – **Повилика белая**. Степи, каменистые обнажения и осыпи, редко.

*Cuscuta approximata* Vab. (#*C. cupulata* Engelm.) – **Повилика сближенная**. На полянах и склонах со степной растительностью, обычно.

*Cuscuta epithymum* (L.) (#*C. europaea* var. *epithymum* L., #*C. trifolii* Vab.) – **Повилика тимьянная**. На травянистых склонах и полянах, обычно.

*Cuscuta europaea* L. (#*C. viciae* W.D.J.Koch, W.Schnizl. & Schonh.) – **Повилика европейская**. На сорных местах, в посевах, на лесных полянах, у дорог, обычно.

*Cuscuta monogyna* Vahl. (*Cuscuta scandens* Brot. subsp. *cesatiana* (Bertol.) Greuter & Burdet) = *Cuscuta cesatiana* – **Повилика одностолбиковая**. Травянистые склоны, обычно.

#### Cyperaceae Juss. – Осоковые

*Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link. – **Блисмус сжатый**. Берега водоемов, редко.

*Carex divisa* Huds. (#*C. coarcta* Boott, #*C. divisa* var. *coarcta* (Boott) T. Kouyama) – **Осока раздельная**. Вдоль речек и на полянах, изредка.

*Carex divulsa* Stokes (#*Vignea divulsa* (Stokes) Rchb.) – **Осока прерванная**. В лесу и на луговинах яйлы, редко.

*Carex caryophylla* Latourr. (*C. praecox* Jack. 1778, non Schreb. 1771, *C. ruthenica* V.Krecz., #*C. scabricuspis* V. Krecz., *C. verna* Schaaix, non Lam.) – **Осока гвоздичная**. На лесных полянах, изредка.

*Carex cuspidata* Host (#*C. flacca* ssp. *cuspidata* (Host) Vicioso, #*C. flacca* ssp. *serrulata* (Biv.) Greuter, #*C. glauca* ssp. *serrulata* (Biv.) Arcang., #*C. glauca* ssp. *serrulata* (Biv.) K. Richt., #*C. serrulata* Biv) – **Осока заостренная**. В лесах и на полянах, часто.

*Carex digitata* L. – **Осока пальчатая**. В лесах, по всей территории, изредка.

*Carex distans* L. – **Осока расставленная**. На влажных полянах и на яйле, редко.

- Carex flava* L. (*C. flavella* V.V.Krecz., #*C. nevadensis* ssp. *flavella* (V.I. Krecz.) Patzke & Podlech) – **Осока желтая**. На влажных лугах, очень редко.
- Carex halleriana* Asso – **Осока Галлеровская**. Каменистые склоны, часто.
- Carex hirta* L. – **Осока волосистая**. На влажных полянах, в поймах, редко.
- Carex hordeistichos* Vill. – **Осока ячменеvidная**. Буковые леса, луга, изредка.
- Carex humilis* Leys. (#*C. buschiorum* V. Krecz.) – **Осока низкая**. На сухих склонах и яйлах, часто.
- Carex melanostachya* M.Bieb. ex Willd. (*C. nutans* Host, #*C. ripariiformis* Litv.) – **Осока черноколосая**. Среди лугов, на опушках, очень редко.
- Carex michelii* Host – **Осока Микеля**. В лесах, на луговинах яйлы, обычно.
- Carex otrubae* Podp. (*C. compacta* sensu V.Krecz. non Lam., *C. subvulpina* Senay, #*Vignea otrubae* (Podp.) Soják) – **Осока Отрубь**. В светлых лесах, лугах, на яйле, изредка.
- Carex pendula* Huds. – **Осока висячая**. В буковых лесах и у ручьев, редко.
- Carex pilulifera* L. (*Carex polyphylla* Kar. & Kir.) = *Carex guestphalica* (*Carex polyrrhiza* Wallr.) = *Carex umbrosa*) – **Осока многолистная**. Лиственные леса, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Carex pseudocyperus* L. – **Осока ложносыть**. На влажных полянах, в верхнем поясе, редко.
- Carex remota* L. – **Осока раздвинутая**. У лесных болотцев, на влажных полянах, изредка.
- Carex spicata* Huds. (*C. contigua* Hoppe, *C. limnitzeri* Host, *C. pairaei* F.Scultz ssp. *limnitzeri* (Rouy) Soò) – **Осока соседняя**. На лесных полянах, в светлых лесах, редко.
- Carex stenophylla* Wahlenb. (*Carex stolonifera* Hoppe) = *Carex nigra* (*Carex stricta* Gooden.) = *Carex elata* – **Осока узколистная**. Каменистые осыпи, изредка. **ERL.**
- Carex sylvatica* Huds. – **Осока лесная**. В тенистых лесах, у болотцев, изредка.
- Carex tomentosa* L. – **Осока шерстистая**. На сухих склонах, в лесах и на яйле, обычно.
- Carex transsilvanica* Schur (*C. depressa* auct. non Link, *C. depressa* Link ssp. *transsilvanica* (Schur) K.Richt., #*C. euxina* (Woronow & Marc.) V.Krecz.) – **Осока трансильванская**. На лесных полянах, очень редко.
- Cyperus badius* Desf. – **Сыть темно-каштановая**. Берега водоемов, редко.
- Cyperus fuscus* L. – **Сыть бурая**. Берега водоемов, редко. **ERL.**
- Cyperus glaber* L. – **Сыть гладкая**. Берега водоемов, редко. **ERL.**
- Cyperus longus* L. [*Cyperus longus* L. subsp. *badius* (Desf.) Murb.] = *Cyperus badius* – **Сыть длинная**. Берега водоемов, редко. **ERL.**
- Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. (*E. crassa* Fisch. & C.A.Mey. ex Zinserl., #*E. crassa* Zinserl. 1935 sensu p.p., #*E. ecarinata* Zinserl., *E. eupalustis* Lindb.f., #*E. globularis* Zinserl., *E. intersita* Zinserl., #*E. kasakstanica* Zinserl., *E. levinae* Zoz, *E. mammilata* auct. non Lindb.f., *E. oxystachys* Sakalo, #*E. palustris* ssp. *globularis* (Zinserl.) Egor., #*E. palustris* var. *globularis* (Zinserl.) A.E.Kozhevnikov, #*E. palustris* ssp. *microcarpa* Walters, *Heleocharis palustris* (L.) R.Br., #*Scirpus palustris* L.) – **Болотница болотная**. Влажные места по берегам рек, у болотцев, редко. **ERL.**
- Pycreus esculentus* L. [*Pycreus flavescens* (L.)] = *Pycreus flavescens* – **Ситовник желтоватый**. Берега водоемов, очень редко.

*Schoenus nigricans* L. – **Схенус черноватый**. Берега водоемов, редко.  
*Scirpus setaceus* L. – **Камыш щетиновидный**. Берега водоемов, редко.

**Dennstaedtiaceae** Lotsy (=Hypolepidaceae Pichi Sermolli) — **Деннштедтиевые**  
*Pteridium tauricum* (C.Presl) V. Krecz. ex Grossh. (#*Allosorus tauricus* C. Presl. nom. nud.,  
#*P. aquilinum* ssp. *brevipes* (Tausch) E.Wulf., #*Pteris aquilina* f. *transcaucasica*  
Rupr.) – **Орляк крымский**. В сосновых лесах южного склона, обычно.

**Dioscoreaceae** R.Br. – **Диоскорейные**  
*Tamus communis* L. – **Тамус обыкновенный**. В буковых лесах нижней зоны, изредка.

**Dipsacaceae** Juss. – **Ворсянковые**  
*Dipsacus laciniatus* L. – **Ворсянка разрезная**. На лесных полянах, вырубках, у дорог, обычно.  
*Dipsacus pilosus* L. (#*Dipsacella pilosa* (L.) Soják, *Virga pilosa* (L.) Hill) – **Ворсянка волосистая**. В светлых лесах, на полянах, у дорог, изредка.  
*Dipsacus strigosus* Willd. ex Roem. & Schult. (#*Virga strigosa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Holub) – **Ворсянка щетинистая**. На лесных полянах, сорных местах, у дорог, изредка.  
*Dipsacus sylvestris* Huds. (*D. fullonum* L. p.p., nom. ambig.) – **Ворсянка лесная**. В речных долинах, в зарослях кустарников и по сорным местам, редко.  
*Cephalaria coriacea* (Willd.) Steud. – **Головчатка кожистая**. На южных каменистых склонах, в разреженных дубовых лесах со степной растительностью, обычно.  
*Cephalaria transsylvanica* (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. – **Головчатка трансильванская**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.  
*Knautia arvensis* (L.) Coult. (*Scabiosa arvensis* L., *S. campestris* Andrz. ex Besser, #*Trichera arvensis* (L.) Schrad.) – **Короставник полевой**. На лесных полянах, среди кустарников, на травянистых склонах, редко.  
*Pterocephalus plumosus* (L.) Coult. – **Птероцефалюс перистый**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.  
*Scabiosa argentea* L. s.l. (*S. taurica* Kotov.) – **Скабиоза серебристая**. Каменистые обнажения и осыпи, обычно.  
*Scabiosa columbaria* L. – **Скабиоза голубиная**. На полянах, лесных опушках, луговинах яйлы, обычно.  
*Scabiosa micrantha* Desf. (*Lomelosia micrantha* (Desf.) Greuter & Burdet, #*Trochocephalus micranthus* (Desf.) A. Löve & D. Löve) – **Скабиоза мелкоцветковая**. На сухих склонах и полянах, обычно.

**Dryopteridaceae** Ching. (=Aspidiaceae Mett. ex Frank, nom. illeg.) – **Щитовниковые**  
*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott – **Щитовник мужской**. Во влажных местах, по всей территории, обычно.  
*Polystichum aculeatum* (L.) Roth (#*P. lobatum* (Huds.) Bast., #*Polypodium aculeatum* L., *P. lobatum* Huds.) – **Многорядник шиповатый**. Среди скал, в верхнем горном поясе, очень редко.

**Ephedraceae** Dumort — **Хвойниковые**  
*Ephedra distachya* L. – **Эфедра двуколосковая**. Можжевеловые леса, каменистые осыпи и обнажения, изредка.

### **Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые**

- Equisetum arvense* L. (#*E. arvense* ssp. *boreale* (Bong.) Tolm., #*E. boreale* Bong.) – **Хвощ полевой**. Сырые лесные поляны, долины рек, сорное в посевах, изредка. **ERL**.
- Equisetum hyemale* L. (#*E. komarovii* Пjin, *Hippochaete hyemalis* (L.) Bruhin) – **Хвощ зимующий**. На галечниковых берегах ручьев, редко.
- Equisetum ramosissimum* Desf. (*Hippochaete ramosissima* (Desf.) Börner) – **Хвощ ветвистый**. По речным долинам, редко.
- Equisetum telmateia* Ehrh. (*E. maximum* Lam., *E. majus* Garsault) – **Хвощ большой**. По берегам лесных болотцев, источников, редко.

### **Ericaceae Juss - Вересковые**

- Arbutus andrachne* L. – **Земляничник мелкоплодный**. Можжевеловые, пушистодубовые леса, скалы, изредка.

### **Euphorbiaceae Juss. – Молочайные**

- Andrachne telephoides* L. – **Андрахна телефиевидная**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Euphorbia agraria* M.Bieb. (*Tithymalus agrarius* (M.Bieb.) Klotzsch & Garcke) – **Молочай пашенный**. На сухих каменистых полянах, среди кустарников, обычно.
- Euphorbia amygdaloides* L. (*Tithymalus amygdaloides* (L.) Garsault.) – **Молочай миндалевидный**. В лесах, особенно буковых, часто.
- Euphorbia chamaesyce* L. – **Молочай мелкосмоковник**. Каменистые обнажения, у дорог, редко.
- Euphorbia falcata* L. – **Молочай серповидный**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Euphorbia glareosa* Pall. ex M.Bieb. (#*E. maleevii* Tamamsch., #*E. nicaeensis* ssp. *glareosa* (Pall. ex M.Bieb.) A.R.Smith, #*E. nicaeensis* ssp. *maleevii* (Tamamsch.) Qudejans, *Tithymalus glareosus* (Pall. ex M.Bieb.) Prokh.) – **Молочай хрящеватый**. Каменистые склоны и поляны, обычно.
- Euphorbia helioscopia* L. (*Tithymalus helioscopia* (L.) Hill.) – **Молочай солнцегляд**. На сухих склонах и полянах, каменистых осыпях, редко.
- Euphorbia myrsinites* L. (*Tithymalus mirsinites* (L.) Hill) – **Молочай миртолистный**. На скалах, каменистых осыпях, горных лугах, обычно.
- Euphorbia peplis* L. – **Молочай бутерлаковидный**. Песчаные осыпи, обычно.
- Euphorbia petrophila* С.А.Мей. (*E. subhastifolia* Клоков, *Tithymalus petrophilus* (С.А.Мей.) Soják) – **Молочай камнелюбивый**. На скалах, каменистых склонах, обычно.
- Euphorbia platyphyllos* L. (*Tithymalus platyphellos*) – **Молочай расширеннолистный**. По лесным вырубкам и полянам, редко.
- Euphorbia rigida* Vieb. (*E. biglandulosa* Desv.) – **Молочай жесткий**. Саванноиды, каменистые осыпи и обнажения, обычно. **ККРФ**.
- Euphorbia semivillosa* Prokh. (*E. villosa* auct., non Waldst. et Kit. ex Willd.) – **Молочай полумохнатый**. Каменистые осыпи, изредка.
- Euphorbia stricta* L. (*E. serrulata* Thuill., *Tithymalus strictus* (L.) Klotzsch & Garcke) – **Молочай прямой**. В светлых лесах, на полянах, вырубках, у дорог, редко.
- Euphorbia tauricola* Prokh. (*E. villosa* auct., non Waldst. et Kit. ex Willd.) – **Молочай**

**крымский.** Каменистые обнажения, изредка.

*Euphorbia taurinensis* All. (*E. graeca* Boiss. & Sprun., *Tithymalus taurinensis* (L.) Klotzsch & Garcke) – **Молочай греческий.** На каменистых склонах, полянах, осыпях, обычно.

*Euphorbia virgultosa* Klok – **Молочай прутьевидный.** Каменистые осыпи, редко.

*Mercurialis perennis* L. – **Пролесник многолетний.** В лесах, на опушках, часто.

### **Fabaceae Lindl. (=Leguminosae Juss.) – Бобовые**

*Anthyllis biebersteiniana* Popl. (#*A. daghestanica* Chinth., #*A. vulneraria* var. *biebersteiniana* Taliev nom. provis., #*A. vulneraria* ssp. *pulchella* auct. p.p.) – **Язвенник Биберштейна.** На каменистых склонах, луговинах яйлы, часто.

*Anthyllis macrocephala* Wender. (*A. schiwereckii* (DC.) Blocki, #*A. grossheimii* Chinth. p.p. excl. typo; *A. polyphylla* auct. non (DC.) Kit. ex Loudon, #*A. vulneraria* ssp. *polyphylla* (Ser.) Numan) – **Язвенник многолистный.** На лесных полянах, у дорог, по сухим склонам, редко.

*Anthyllis taurica* Juz. (*A. vulneraria* L. ssp. *boissieri* (Sagorski) Bornm.) – **Язвенник крымский.** На скалистых обнажениях, каменистых склонах яйлы, обычно.

*Argyrolobium biebersteinii* P. W. Ball. – **Аргиролобиум Биберштейна.** Крымскососновые леса, редко.

*Astragalus borysthenticus* Klokov (*A. onobrychis* auct. non L.) – **Астрагал днепровский.** Литоральные пески, а также песчаные и супесчаные склоны, редко.

*Astragalus brachyceras* Ledeb. – **Астрагал короткорогий.** Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.

*Astragalus cicer* L. – **Астрагал нутовый.** На лесных полянах, лесосеках, изредка.

*Astragalus dolichophyllus* Pall. – **Астрагал длиннолистный.** Саванноиды, каменистые осыпи, часто.

*Astragalus glycyphylloides* DC. (#*A. fraxinifolius* auct., *A. glycyphyllos* L. ssp. *glycyphylloides* (DC.) V.A.Matthews) – **Астрагал ложносладколистный.** В дубовых и дубово-ясеневых лесах, изредка.

*Astragalus glycyphyllos* L. – **Астрагал сладколистный.** В дубовых и буковых лесах, на полянах, у дорог, обычно.

*Astragalus onobrychis* L. (#*A. borysthenticus* Klokov, #*A. hybridus* S.G.Gmel., *A. pseudonobrychis* Andrz., #*A. troizkii* Grossh.) – **Астрагал эспарцетный (а. днепропетровский).** На сухих полянах, шиферных склонах, в дубовых, грабовых лесах, обычно.

*Astragalus ponticus* Pall. – **Астрагал понтийский.** Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

*Astragalus rupifragus* Pall. – **Астрагал камнеломный.** Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, редко.

*Astragalus sinaicus* Boiss. – **Астрагал синайский.** Саванноиды, каменистые осыпи, довольно редко.

*Astragalus utriger* Pall. – **Астрагал пузыристый.** Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

*Chamaecytisus polytrichus* (M.Bieb.) Rothm. (#*Ch. hirsutus* ssp. *polytrichus* (M.Bieb.) Ponert, #*Cytisus polytrichus* M.Bieb.) – **Ракитник многоволосковый.** На каменистых обнажениях в светлых лесах и на яйле, обычно.

*Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Wol.) Klásková (#*Ch. caucasicus* (Grossh.) Holub, #*Ch. ratisbonensis* ssp. *ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Zielinski, #*Cytisus*

- caucasicus* Grossh., #*C. ruthenicus* Fisch. ex Woloszcz.) – **Ракитник русский**.  
Каменные осыпи и скалы, луга, обычно.
- Chamaecytisus wulffii* (V.Krecz.) Klaskova (#*Cytisus wulffii* V.Krecz.) – **Ракитник Вульфа**. У верхней границы сосновых лесов, на яйлах, известняковых скалах, изредка.
- Colutea cilicica* Boiss. & Balansa (*C. arborescens* L. ssp. *cilicica* (Boiss. & Balansa) Ponert) – **Пузырник киликийский**. В сухих лесах, среди кустарников на южных склонах, обычно.
- Coronilla coronata* L. (*C. montana* Scop., *Coronilla emeroides* Boiss. et Sprun., *C. cretica* L.) – **Вязель увенчанный**. В сосновых лесах, на южных каменистых склонах, у дорог, обычно.
- Coronilla scorpioides* (L.) W.D.J.Koch (*C. varia* L.) – **Вязель завитой**. На сухих полях, южных щепнистых склонах, обычно.
- Dorycnium graecum* (L.) Ser. (*D. latifolium* Willd.) – **Дорикниум греческий**. На лесных полях, щепнистых склонах, редко.
- Dorycnium herbaceum* Vill. (*D. intermedium* Ledeb., #*D. pentaphyllum* ssp. *herbaceum* (Vill.) Rouy) – **Дорикниум средний**. На степенных склонах, полях, у дорог, обычно.
- Galega officinalis* L. – **Козлятник лекарственный**. По долинам рек, у дорог, среди кустарников, обычно.
- Genista albida* Willd. – **Дрок беловатый**. На каменистых склонах, яйлах, часто. **ККРФ**.
- Genista depressa* M.Bieb. (*G. tinctoria* L. var. *depressa* (M.Bieb.) Schmalh.) – **Дрок прижатый**. На каменистых местах, скалистых склонах и осыпях, на яйле, часто.
- Genista scythica* Pacz. (incl. *G. verae* Juz.) – **Дрок скифский**. На каменистых местах, редко.
- Hedysarum candidum* M.Bieb. – **Копеечник бледный**. На каменистых местах, редко. **ККРФ**.
- Hedysarum tauricum* Pall. ex Willd. – **Копеечник крымский**. Каменные обнажения и осыпи, редко.
- Hippocrepis ciliata* Willd. – **Гиппокрепис реснитчатый**. Можжевельные леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Hippocrepis emeroides* (Boiss. & Sprimer) Czerep. (*H. unisiliquosa* L.) – **Гиппокрепис одностручковый**. Можжевельные леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Lathyrus aphaca* L. – **Чина безлисточковая**. Можжевельные, пушистодубовые леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Lathyrus aureus* (Steven) Brandza (#*Orobis aureus* Steven) – **Чина золотистая**. В лесах, на полях, у дорог, по всей территории, обычно.
- Lathyrus cicera* L. – **Чина нутовая**. В дубово-грабовых, дубовых лесах, на полях, редко. **ERL**.
- Lathyrus digitatus* (Bieb.) Fiori (*Orobis digitatus* Bieb.) – **Чина пальчатая**. Можжевельные, крымскососновые, дубовые леса, саванноиды, обычно.
- Lathyrus laxiflorus* (Desf.) O.Kuntze (*Orobis laxiflorus* Desf.) – **Чина редкоцветковая**. В лесах и на полях, обычно.
- Lathyrus megalanthus* Stend – **Чина крупноцветковая**. Каменистые осыпи, редко.
- Lathyrus nissolia* L. (*Orobis nissolia* (L.) Döll.) – **Чина злаколистная**. В светлых



- лесах, на полянах и луговинах, обычно.
- Lathyrus pallescens* (M.Bieb.) K.Koch (#*Orobus canescens* auct., #*O. filiformis* auct., *O. pallescens* M.Bieb.) – **Чина бледнеющая**. В лесах, на полянах, обычно.
- Lathyrus pannonicus* (Jacq.) Garcke (*L. austriacus* (Crantz) Wissjul., *Orobus austriacus* Crantz, *O. pannonicus* Jacq.) – **Чина паннонская**. На лесных полянах, яйлинских склонах, в дубовых лесах, обычно.
- Lathyrus pratensis* L. (*Orobus pratensis* (L.) Döll.) – **Чина луговая**. В светлых лесах и на полянах с луговой растительностью, изредка.
- Lathyrus rotundifolius* Willd. – **Чина круглолистная**. В лиственных лесах, среди кустарников, у дорог, обычно. **ERL.**
- Lathyrus saxatilis* (Vent.) Vis. – **Чина щебенчатая**. Саванноиды, каменистые осыпи, очень редко.
- Lathyrus sphaericus* L. – **Чина шаровидная**. Можжевельные леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Lathyrus tuberosus* L. – **Чина клубненосная**. Сорное в огородах, у дорог, обычно. **ERL. A.**
- Lens ervoides* (Bring.) Grande (*L. lenticula* (Schreb.) Alef) – **Чечевица линзовидная**. Можжевельные леса, саванноиды, каменистые осыпи, редко. **ERL.**
- Lens nigricans* (Bieb.) Webb. et Berth. – **Чечевица черноватая**. Саванноиды и каменистые осыпи, довольно редко. **ERL.**
- Lotus angustissimus* L. – **Лядвенец узкий**. На влажных и затененных местах, по берегам рек, очень редко.
- Lotus corniculatus* L. – **Лядвенец рогатый**. На луговинах, в долинах рек, довольно обычно. **ERL.**
- Lotus tauricus* Juz. (*L. caucasicus* auct. non Kuprian. ex Juz.) – **Лядвенец крымский**. На скалах и известняковых склонах, обычно.
- Lupinus polyphyllus* Lindl. – **Люпин многолистный**. Ай-Петринская яйла, луга, обычно. **A.**
- Medicago agrestis* Ten. – **Люцерна полевая**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Medicago arabica* (L.) Huds. – **Люцерна аравийская**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно. **ERL.**
- Medicago denticulata* Willd. – **Люцерна зубчатая**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Medicago falcata* L. aggr. (#*M. borealis* Grossh., #*M. glutinosa* ssp. *praefalcata* Sinsk., *M. procumbens* Besser, #*M. quasifalcata* Sinskaya, #*M. sativa* ssp. *falcata* (L.) Arcang.) – **Люцерна серповидная**. На сухих склонах и луговинах яйлы, у дорог, на лесных полянах, по всей территории, часто.
- Medicago lupulina* L. – **Люцерна хмелевидная**. На каменистых склонах с луговой растительностью, сорное у дорог, обычно. **ERL.**
- Medicago minima* (L.) Bartal. (#*M. polymorpha* var. *minima* L.) – **Люцерна маленькая**. На каменистых нагреваемых склонах, обычно. **ERL.**
- Medicago orbicularis* (L.) Bartal. (*M. marginata* Willd., #*M. polymorpha* var. *orbicularis* L.) – **Люцерна округлая**. На полянах, залежах, обычно. **ERL.**
- Medicago praecox* DC. – **Люцерна ранняя**. На сухих лесных полянах, редко. **ERL.**
- Medicago rigidula* (L.) All. – **Люцерна жестковатая**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко. **ERL.**
- Medicago sativa* L. (#*M. afghanica* (Bordere) Vassilcz., #*M. glomerata* Balb., #*M. grandiflora* (Grossh.) Vassilcz., #*M. ladak* Vassilcz., #*M. mesopotamica* Vassilcz.,

- #M.orientalis* Vassilcz., *#M. polia* (Brand) Vassilcz., *#M. praesativa* Sinskaya, *#M.praesativa* ssp. *spontanea* Sinsk., *#M. sativa* grex *afganica* Bord., *#M. sativa* var. *polia* Brand, *#M. Sogdiana* (Brand) Vassilcz. – **Люцерна посевная**. На луговых полянах, обычно. **ERL. А.**
- Medicago varia* L. – **Люцерна изменчивая**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Melilotus albus* Medic. – **Донник белый**. Можжевеловые леса, каменистые осыпи, у дорог, обычно. **ERL.**
- Melilotus neapolitanus* Ten. – **Донник неаполитанский**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Melilotus officinalis* (L.) Pall. (*M. arvensis* Wallr.) – **Донник лекарственный**. На лугах, у дорог, жилья, в посевах, сорное, обычно. **ERL.**
- Melilotus tauricus* (M.Bieb.) Ser. – **Донник крымский**. На луговинах и полянах, обычно.
- Onobrychis jailae* Czernova – **Эспарцет яйлинский**. На яйле, по склонам гор, часто. Э.
- Onobrychis miniata* Steven (*Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. ssp. *miniata* (Steven) P.W.Pall.) – **Эспарцет киноварно-красный**. На яйле и приайлинских склонах, обычно.
- Onobrychis transcaucasica* Grossh. – **Эспарцет закавказский**. На сухих полянах и склонах, редко.
- Ononis arvensis* L. – **Стальник пашенный**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Ononis leiosperma* Boiss. (*#O. repens* ssp. *leiosperma* (Boiss.) Greuter, *#O. spinosa* ssp. *leiosperma* (Boiss.) Sirj.) – **Стальник гладкосеменной**. На злаково-разнотравном лугу, обычно.
- Ononis pusilla* L. – **Стальник маленький**. Можжевеловые, пушистодубовые, крымскососновые леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Pisum elatius* M.Bieb. (*#P. humile* Boiss & Noe, *#P. sativum* L. ssp. *elatius* (M.Bieb.) Asch. & Graebn., *P. sativum* var. *elatius* (M.Bieb.) Trautv.) – **Горох высокий**. На каменистых осыпях, очень редко. **ERL.**
- Psoralea bituminosa* L. – **Псоралея смолистая**. Можжевеловые, крымскососновые леса, саванноиды, обычно.
- Scorpiurus muricatus* L. (*S. subvillosus* L.) – **Личинник колючий**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Securigera securidaca* (L.) Degen et Dorfl. – **Секуригера мечевидная**. Можжевеловые, пушистодубовые леса, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Sophora alopecuroides* L. ssp. *jaubertii* (Spach) Borsa (*#Goebelia alopecuroides* (L.) Bunge, *#G. alopecuroides* beta *tomentosa* Bunge, *#Pseudosophora alopecuroides* (L.) Sweet, *#S. alopecuroides* L., *#S. alopecuroides* var. *tomentosa* (Bunge) Chamberlain, *#S. alopecuroides* ssp. *tomentosa* (Bunge) Ponert, *#S. alopecuroides* ssp. *tomentosa* (Bunge) Yakovl., *S. prodanii* E.S.Anderson, *Vexibia alopecuroides* (L.) Yakovl., *#V. alopecuroides* ssp. *tomentosa* (Bunge) Yakovl.) – **Софора лисохвостная**. На светлых лесных полянах, редко. **А.**
- Tragacantha arnacantha* (Bieb.) Stev. (*Astracantha arnacantha* (M. Bieb.) Podlech) – **Трагакант колючковатый (астраканта колючковая)**. Каменистые обнажения и осыпи, редко. **ККРФ.**
- Trifolium alpestre* L. – **Клевер альпийский**. На полянах, среди кустарников на яйле, часто.
- Trifolium ambiguum* M.Bieb. (*Amoria ambigua* (M.Bieb.) Soják) – **Клевер сходный**. На горных лугах, лесных полянах, часто.

- Trifolium angustifolium* L. – **Клевер узколистный**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменные осыпи, обычно.
- Trifolium arvense* L. (*T. eriocephalum* Ledeb.) – **Клевер пашенный**. На сухих полянах, в редколесье, довольно обычно.
- Trifolium aureum* Pollich (*Chrysaspis aurea* (Pollich.) Greene, *T. agrarium* L., nom. utique rej. propr., *T. strepens* Crantz) – **Клевер золотистый**. На лугах, среди кустарников, обычно.
- Trifolium campestre* Schreb. (*Chrysaspis campestris* (Schreb.) Desv., *T. procumbens* L., nom. utique rej. propr.) – **Клевер полевой**. На сухих полянах и склонах, изредка.
- Trifolium caucasicum* Tausch (*#T. marschalii* Rouy, *#T. ochroleucon* auct. p.p., *#T. ochroleucon* ssp. *caucasicum* (Tausch) Kozhukharov, *#T. panormitanum* auct., *#T. Topczibaschevii* Khalilov) – **Клевер кавказский**. На светлых сухих полянах, изредка.
- Trifolium dubium* Sibth. – **Клевер сомнительный**. Саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Trifolium hirtum* All. – **Клевер мохнатый**. На открытых полянах в сосновых и смешанных лесах, обычно.
- Trifolium hybridum* L. (*Amoria hybrida* (L.) C.Presl, *#A. hybrida* ssp. *elegans* (Savi) Soják, *#T. elegans* Savi, *#T. hybridum* L., *#T. hybridum* ssp. *elegans* (Savi) Asch. & Graebn., *#T. hybridum* var. *elegans* (Savi) Boiss.) – **Клевер гибридный**. На влажных, реже сухих лугах, среди кустарников, редко.
- Trifolium lappaceum* L. – **Клевер репейниковый**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменные осыпи, довольно обычно.
- Trifolium leucanthum* Vieb. – **Клевер бледноцветковый**. Можжевеловые, крымскососновые леса, саванноиды и каменные осыпи, часто.
- Trifolium medium* L. – **Клевер средний**. На лесных полянах и опушках, часто.
- Trifolium molineri* Balb. ex Hornem. – **Клевер Молинери**. Саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Trifolium montanum* L. (*Amoria montana* (L.) Soják) – **Клевер горный**. На полянах в лиственных лесах, изредка.
- Trifolium neglectum* C. A. Mey – **Клевер земляничный**. Луга, редко.
- Trifolium phleoides* Pourr. – **Клевер батлачковый**. Каменные осыпи, редко.
- Trifolium pratense* L. (*#T. ucrainicum* Opperman ex Wissjul.) – **Клевер луговой**. На открытых склонах и луговинах яйлы, часто.
- Trifolium repens* L. (*Amoria repens* (L.) C.Presl, *#A. repens* ssp. *orbelica* (Velen.) Soják, *#T. orbelicum* Velen., *#T. repens* ssp. *orbelicum* (Vel.) Pawl.) – **Клевер ползучий**. На влажных лесных полянах, по долинам рек, обычно.
- Trifolium scabrum* L. – **Клевер шершавый**. На сухих луговинах, обычно.
- Trifolium striatum* L. – **Клевер ребристый**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменные осыпи, изредка.
- Trifolium subterraneum* L. – **Клевер подземный**. Каменные осыпи, изредка.
- Trifolium parviflorum* Ehrh. (*T. retusum* L.) – **Клевер мелкоцветковый**. Саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Trigonella gladiata* Stev. ex Vieb. – **Пажитник мечевидный**. Можжевеловые, крымскососновые леса, саванноиды, каменные осыпи, обычно.
- Trigonella monspeliaca* L. – **Пажитник монпельевский**. Саванноиды, каменные осыпи, обычно.
- Trigonella procumbens* (Bess.) Reichb. (*T. besserana* ser. nom. illegit.) – **Пажитник**

- лежащий.** Саванноиды, каменные осыпи, изредка.
- Vicia amphicarpa* Dorthes (*V. sativa* L. ssp. *amphicarpa* (Dorthes) Aschers.) – **Вика двоякоплодная.** Саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Vicia angustifolia* L. (*V. sativa* L. ssp. *nigra* (L.) Ehrh.) – **Вика узколистная.** Саванноиды и каменные осыпи, обычно.
- Vicia bithynica* (L.) L. – **Вика вифинская.** Саванноиды и каменные осыпи, обычно. **ERL.**
- Vicia boissieri* Freyn (*V. tenuifolia* Roth. ssp. *boissieri* (Freyn (Radzhi) – **Вика Буассье.** Лиственные леса, каменные осыпи, редко.
- Vicia cassubica* L. – **Вика кашубская.** В лиственных лесах, на полянах, у дорог, обычно.
- Vicia cordata* Wulf ex Hoppe (*V. sativa* L. ssp. *cordata*) Wulf ex Hoppe (Aschers.) – **Вика сердцевидная.** Саванноиды, каменные осыпи, часто.
- Vicia cracca* L. (#*V. heteropus* Freyn, #*V. macrophylla* (Maxim.) B. Fedtsch., #*V. neglecta* Hanelt & Mettin) – **Вика мышинный горошек.** На склонах, лугах и в дубовых лесах, изредка.
- Vicia dasycarpa* Ten. – **Вика шерстистоплодная.** Саванноиды, каменные осыпи, обычно.
- Vicia ervilia* (L.) Willd. – **Вика четкообразная.** Глинистые склоны, очень редко. **ERL. А.**
- Vicia grandiflora* Scop. – **Вика крупноцветковая.** Саванноиды, каменные осыпи, редко. **ERL.**
- Vicia heracleotica* Juz. (#*V. asiatica* (Freyn) Grossh. *V. dalmatica* auct. non A.Kern., *V. elegans* auct. non Guss., #*V. elegans* var. *asiatica* Freyn, #*V. heracleotica* Juz.) – **Вика далматская.** На лесных полянах южных склонов, лесосеках, обычно.
- Vicia hirsuta* (L.) S.F.Gray (#*Ervum hirsutum* L.) – **Вика волосистая.** На полянах, в светлых лесах, сорное в огородах, обычно.
- Vicia hybrida* L. – **Вика гибридная.** Саванноиды и каменные осыпи, обычно. **ERL.**
- Vicia incisa* Bieb. (*V. sativa* L. ssp. *incisa* (Bieb.) Arcang.) – **Вика надрезанная.** Каменные осыпи, редко.
- Vicia lathyroides* L. (#*Ervum lathyroides* (L.) Stank.) – **Вика чиновидная.** На сухих склонах и полянах, в нижнем лесном поясе, изредка. **ERL.**
- Vicia loiseleurii* (M.Bieb.) Litv. (#*Ervum loiseleurii* M.Bieb., #*E. terronii* Ten., *V. litvinovii* Boriss., #*V. meyeri* Boiss., *V. pubescens* Link.) – **Вика Луазелёрии.** На сухих склонах, редко.
- Vicia narbonensis* L. – **Вика нарбонская.** Саванноиды и каменные осыпи, обычно.
- Vicia pannonica* Crantz – **Вика паннонская.** На полянах со степной растительностью, обычно. **ERL.**
- Vicia peregrina* L. – **Вика иноземная.** Саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Vicia pilosa* Bieb. (*V. sativa* L. ssp. *nigra* (L.) Ehrh.) – **Вика опушенная.** Саванноиды, каменные осыпи, редко.
- Vicia sativa* L. – **Вика посевная.** Можжевельниковые леса, саванноиды, каменные осыпи, обычно. **ERL.**
- Vicia tenuifolia* Roth (#*V. brachytropis* Kar. & Kir., *V. cracca* ssp. *tenuifolia* (Roth) Gaudin) – **Вика тонколистная.** На полянах в светлых лесах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- Vicia tenuissima* (Bieb.) Schinz. et Thell. (*V. gracilis* Loisel., non Banke et Soland.) – **Вика редкоцветный.** Сосновые леса, саванноиды, каменные осыпи, изредка.

*Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. – **Вика четырехсемянная**. На сухих полянах, среди кустарников, обычно.

*Vicia villosa* Roth. – **Вика мохнатая**. Каменистые осыпи, редко.

#### Fagaceae Dumort. – Буковые

*Fagus orientalis* Lipsky (*F. sylvatica* L. ssp. *orientalis* (Lipsky) Greuter & Burdet) – **Бук восточный**. Лесообразующая порода на высоте 400-1350 м, эдификатор, часто.

*Fagus sylvatica* L. – **Бук обыкновенный**. Широколиственные леса, обычно.

*Quercus petraea* Liebl. (#*Q. iberica* var. *polycarpa* (Schur) Zohary, #*Q. polycarpa* Schur, *Q. petraea* Mattuschka, non *basionimum*, #*Q. robur* L. Spielart, *Q. sessiliflora* Salisb., *Q. sessilis* Ehrh. – **Дуб скальный**. Лесообразующая порода в верхнем горном поясе, эдификатор, часто.

*Quercus pubescens* Willd. (#*Q. anatolica* Sosn. ex Bandin p.p. *quoad plantas*, nom.inval., #*Q. crispata* Steven, #*Q. lanuginosa* Lam. ssp. *crispata* (Steven) A. Camus, #*Q. pubescens* ssp. *crispata* (Steven) Greuter & Burdet) – **Дуб пушистый**. Горные кустарники, широколиственные леса и лесные опушки, часто.

#### Fumariaceae DC. – Дымянковые

*Corydalis marschalliana* (Pall. ex Willd) Pers. (*C. bulbosa* (L.) DC. ssp. *marschalliana* (Pers.) Chater, comb. inval., *C. cava* (L.) Schweigg. & Körte ssp. *marschalliana* (Pall. Ex Willd.) Hayek, #*Fumaria marschalliana* Pall., *F. marschalliana* Pall. ex Willd., #*Pistolochia bulbosa* ssp. *marschalliana* (Pall.) Soják, *P. marschalliana* (Pall.) Holub) – **Хохлатка Маршалла**. Под пологом лиственных лесов и на полянах, очень редко.

*Corydalis paczoskii* N.Busch (*Pistolochia paczoskii* (N. Busch) Soják) – **Хохлатка Пачоского**. В дубово-грабниковых лесах, на сухих полянах, яйлах, довольно обычно.

*Fumaria kralikii* Jord. – **Дымянка Кралика**. Каменистые осыпи, изредка.

#### Gentianaceae Juss. – Горечавковые

*Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. – **Блейкстония пронзеннолистная**. Берега ручьев, редко.

*Centaurium erythraea* Rafn (#*C. erythraea* ssp. *austriacum* (Ronniger) Holub, *C. minus* auct. non Monch., #*C. minus* ssp. *austriacum* (Ronniger) O. Schwarz, #*C. umbellatum* Gilib., #*C. umbellatum* ssp. *austriacum* Ronniger) – **Золототысячник обыкновенный**. На лесных полянах, открытых склонах, обычно.

*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce. – **Золототысячник красивый**. На солонцеватых лугах и солончаках, по берегам рек и водоёмов, изредка.

*Centaurium spicatum* (L.) Fritsch. – **Золототысячник колосовидный**. На лесных полянах, открытых склонах, редко.

*Centaurium tenuiflorum* (Hoffmg. et Link) Fritsch. – **Золототысячник тонкоцветковый**. На лесных полянах, открытых склонах, изредка.

*Gentiana cruciata* L. (#*Pneumonanthe cruciata* (L.) Zuev, #*Tretorhiza cruciata* (L.) Delarbre, #*T. cruciata* (L.) Oriz) – **Горечавка крестообразная**. На яйле, горных травянистых склонах, лесных опушках, обычно.

*Gentianella amarella* (L.) Börner (#*Gentiana amarella* L., #*G. amarella* ssp. *axillaris* (F.W. Schmidt) Murb., *G. axillaris* Murb., #*G. axillaris* (F.W. Schmidt) Rchb., *Gentianella amarella* (L.) Harry Sm., comb. superfl.; *G. axillaris* (F.W.Schmidt) A.Löve &

D.Löve, #*G. axillaris* (F.W. Schmidt) Jovan.-Dunj.) – **Горчавочка горьковатая**.  
На горных лугах, опушках леса, изредка.

### **Geraniaceae Juss. – Гераниевые**

*Erodium ciconium* (L.) L'Her. – **Журавельник длинноклвый**. Каменистые обнажения и осыпи, обычно.

*Erodium cicutarium* (L.) L'Her. (*Geranium cicutarium* L.) – **Журавельник цикутовый**.  
На каменистых склонах и полянах, у дорог, сорное в посевах, довольно обычно.

*Geranium asphodeloides* Burm.f. (*G. tauricum* Rupr., #*G. pallens* M.Bieb.) – **Герань крымская**. В светлых лиственных лесах, на полянах, среди кустарников в нижней зоне, обычно.

*Geranium columbinum* L. – **Герань голубиная**. На сухих склонах и полянах, у дорог, обычно.

*Geranium dissectum* L. – **Герань рассеченная**. На лугах, опушках, на яйле, изредка.

*Geranium divaricatum* Ehrh. – **Герань растопыренная**. В дубовых, дубово-ясеневых лесах, на каменистых склонах, редко.

*Geranium lucidum* L. – **Герань блестящая**. В светлых лесах, на склонах, обычно.

*Geranium molle* L. – **Герань мягкая**. В лесах, на полянах, обычно.

*Geranium purpureum* Vill. (*G. robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Schmalh.) – **Герань пурпуровая**. В дубовых лесах, на каменистых склонах, обычно.

*Geranium pusillum* L. – **Герань маленькая**. На полянах, у дорог, сорное, обычно. **A.**

*Geranium pyrenaicum* Burm.f. – **Герань пиренейская**. На лесных полянах, луговинах, в тенистых местах, обычно.

*Geranium robertianum* L. – **Герань Роберта**. В лесах и на полянах, на каменистых склонах яйлы, по всей территории, обычно.

*Geranium rotundifolium* L. – **Герань круглолистная**. Как сорное, изредка.

*Geranium sanguineum* L. – **Герань кроваво-красная**. В лесах, на опушках, на луговинах яйлы, по всей территории, обычно.

*Geranium tuberosum* L. – **Герань клубненосная**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.

### **Haloragaceae R. Вг. in Flinders - Сланоягодниковые**

*Myriophyllum verticillatum* L. – **Уруть мутовчатая**. Пресные водоемы, редко. **ERL.**

### **Нуаcинthaceae – Пролесковые**

*Bellevalia sarmatica* (Pall. ex Georgi) Woronow. – **Бельвалия сарматская**.  
Саванноиды, каменистые осыпи, обычно. **ККРФ.**

*Leopoldia comosa* (L.) Parl. – **Леопольдия хохолковая**. Луга, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

*Leopoldia tenuiflora* (Tausch) Heldr., (*Leopoldia tubiflora* (Steven) Juz.) = *Leopoldia comosa* – **Леопольдия трубноцветковая**. Луга и саванноиды, редко.

*Ornithogalum fimbriatum* Willd. – **Птицемлечник бахромчатый**. Можжевеловые, дубовые леса, каменистые осыпи, часто.

*Ornithogalum flavescens* Lam. {*Ornithogalum gussonei* auct. non Ten.} = *Ornithogalum kochii* [*Ornithogalum gussonei* Ten. subsp. *kochii* (Parl.) Holub] = *Ornithogalum kochii* – **Птицемлечник желтоватый**. Крымскососновые леса, каменистые обнажения, обычно.

- Ornithogalum ponticum* Zahar. {*Ornithogalum pyrenaicum* auct. non L.} = *Ornithogalum ponticum* – **Птицемлечник понтийский**. Можжевельниковые, крымскососновые, лиственные леса, каменистые осыпи, обычно.
- Ornithogalum woronowii* Krasch. – **Птицемлечник Воронова**. Пушистодубовые леса, каменистые осыпи, обычно.
- Scilla autumnalis* L. – **Пролеска осенняя**. Можжевельниковые, крымскососновые леса, каменистые обнажения, часто.
- Scilla bifolia* L. (*Scilla cernua* Delar.) = *Scilla sibirica* – **Пролеска двулистная**. Хвойные и лиственные леса, часто.
- Scilla sibirica* Haw. (*Scilla sibirica* Haw., ortho) = *Scilla sibirica* (*Scilla taurica* (Regel) Fuss) = *Scilla bifolia* – **Пролеска сибирская**. Буковые леса, редко.

#### **Iridaceae Juss. – Касатиковые**

- Crocus angustifolius* Weston (*C. susianus* Ker.-Gawl.) – **Шафран узколистный**. На сухих шиферных склонах, обычно.
- Crocus speciosus* M.Bieb. – **Шафран красивейший (Ш. прекрасный)**. На луговых склонах, полянах, яйле, обычно. **ККРФ**.
- Crocus tauricus* (Trautv.) Puring – **Шафран крымский**. На травянистых склонах, полянах, особенно на яйле, обычно. **ККРФ**.
- Gladiolus apterus* Klokov = *Gladiolus tenuis* – **Шпажник безкрылый**. Луга, редко.
- Gladiolus italicus* Mill. (*G. segetum* Ker Gawl., *G. tenuiflorus* K.Koch) – **Шпажник итальянский**. Луга, изредка.
- Gladiolus tenuis* M.Bieb. (*G. apterus* Klokov, *G. communis* L. var. *tenuis* (M.Bieb.) Wahlb., *G. imbricatus* auct. non L.) – **Шпажник тонкий**. Луга, редко.
- Iris pumila* L. – **Касатик низкий (ирис карликовый)**. Степи и томиляры, очень редко. **ККРФ**.

#### **Juncaceae Juss. – Ситниковые**

- Juncus ambiguus* Guss. ~ *Juncus bufonius* aggr. – **Ситник неопределенный**. Берега водоемов, редко.
- Juncus articulatus* L. (*J. geniculatus* Schrank, *J. lamprocarpus* Ehrh. ex Hoffm., *J. macrocephalus* Viv., *J. obtusiflorus* Moench, nom. illeg., #*J. subarticulatus* Zak. & Novopokr.) – **Ситник членистый**. На влажных полянах, по берегам водоемов, редко. **ERL**.
- Juncus bufonius* L. [*Juncus bufonius* L. subsp. *nastanthus* (V. Kreez. & Gontsch.) Soo] = *Juncus nastanthus* – **Ситник лягушечий**. Берега водоемов, редко.
- Juncus compressus* Jacq. (#*J. compressus* var. *subcompressus* (Zak. et Novopokr.) V. Novik., *J. subcompressus* Zarikov & Novopokr.) – **Ситник сплюснутый**. По берегам рек, водоемов, редко.
- Juncus effusus* L. – **Ситник развесистый**. На влажных полянах, в поймах, у источников, обычно. **ERL**.
- Juncus gerardii* Loisel. [*Juncus gerardii* Loisel. subsp. *soranthus* (Schrenk) K. Richt.] = *Juncus soranthus* (*Juncus glaucus* Ehrh.) = *Juncus inflexus* (*Juncus gracilis* Roth) = *Juncus capitatus* – **Ситник Жерара**. Берега водоемов, изредка.
- Juncus inflexus* L. (*J. glaucus* Ehrh., *J. paniculatus* Horre ex Mert. & W.D.J.Koch) – **Ситник склоненный**. По берегам болотцев, ручьев, изредка.
- Juncus maritimus* Lam. – **Ситник морской**. Берега водоемов, обычно.
- Luzula campestris* (L.) DC. (#*Juncus campestris* L., *L. subpilosa* Gilib.) – **Ожика**

**луговая.** В лесах, на луговинах яйлы, обычно.

- Luzula forsteri* (Smith) DC. – **Ожика Форстера.** Светлые листовенные леса, обычно.  
*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej. [*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej. subsp. *taurica* (V. Krecz.) V. Novikov] = *Luzula taurica* (*Luzula nemorosa* (Pollich) E.Mey. 1848, non Hornem. 1815) = *Luzula luzuloides* (*Luzula pallescens* Sw. s.str.) = *Luzula multiflora*, {*Luzula pallescens* auct. non Sw.} = *Luzula pallidula* – **Ожика многоцветковая.** Луга и степи, редко.

#### **Lamiaceae Lindl. (=Labiatae Juss.) – Губоцветные**

- Acinos graveolens* (M.Bieb.) Link = *Acinos rotundifolius* – **Душевка пахучая.** Каменные обнажения и осыпи, редко.  
*Acinos rotundifolius* Pers. (*Acinos schizodontus* Klokov) = *Acinos arvensis* (*Acinos suberispus* Klokov) = *Acinos rotundifolius* (*Acinos thymiodes* Moench) = *Acinos arvensis* – **Душевка круглолистная.** Каменные обнажения и осыпи, редко.  
*Acinos villosus* Pers. (#*A. arvensis* ssp. *eglandulosus* (Klokov) Tzvelev, #*A. arvensis* ssp. *villosus* (Pers.) Soják, *A. eglandulosus* Klokov) – **Душевка мохнатая.** На сухих склонах, полянах, среди кустарников, обычно.  
*Ajuga chia* Schreb. (*A. chamaepitys* (L.) Schreb. ssp. *chia* (Schreb.) Arcang., *Chamaepitys chia* (Schreb.) Holub) – **Живучка хиосская.** Сухие щебнистые склоны, поляны, сорное у жилья, чаще в нижней зоне, обычно.  
*Ajuga genevensis* L. – **Живучка женовская.** На полянах в светлых лесах, среди кустарников, обычно.  
*Ajuga glabra* C. Presl (*Ajuga pseudochia* Des.-Shost.) – **Живучка голая (ложнохиосская).** Можжевеловые леса, саванноиды, каменные обнажения и осыпи, изредка.  
*Ajuga laxmannii* (L.) Benth. (*Phleboanthe laxmannii* (L.) Tausch) – **Живучка Лаксмана.** На открытых полянах со степной растительностью, редко.  
*Ajuga orientalis* L. – **Живучка восточная.** На сухих каменных склонах, яйлинских лугах, лесных полянах, обычно.  
*Ballota longicalyx* Klokov ~ *Ballota nigra* – **Белокудренник рудеральный.** Каменные осыпи, обычно.  
*Betonica officinalis* L. (*Betonica perauca* Klokov) = *Betonica officinalis* – **Буквица лекарственная.** Крымскососновые леса, луга и степи, обычно.  
*Calamintha grandiflora* (L.) Moench (*Melissa grandiflora* L.) – **Душевик крупноцветковый.** В буковых лесах на полянах, обычно.  
*Calamintha nepeta* (L.) Savi (#*C. largiflora* Klokov, #*C. officinalis* Moench) – **Душевик котовниковый.** На сухих каменных склонах, обычно.  
*Clinopodium vulgare* L. (*Calamintha clinopodium* Benth., *C. vulgaris* (L.) Halacsy) – **Пахучка обыкновенная.** В светлых лесах, на полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.  
*Dracoscephalum thymiflorum* L. – **Змееголовник тимьяноцветный.** У дорог, жилья, редко. **А.**  
*Galeopsis ladanum* L. (*Galeopsis neglecta* Schult.) = *Galeopsis tetrahit* – **Пикульник ладанниковый.** Каменные осыпи, редко. **А.**  
*Glechoma hederacea* L. – **Будра плющевидная.** На лесных полянах, среди кустарников, по долине, редко.  
*Lamium amplexicaule* L. – **Яснотка стеблеобъемлющая.** Каменные обнажения и осыпи, обычно.



- Lamium glaberrimum* (K. Koch) Taliev {*Lamium laevigatum* auct. non L.} = *Lamium maculatum* (*Lamium luteum* (Huds.) Krock.) = *Lamium galeobdolon* – **Яснотка голая**. Каменистые обнажения, очень редко. Э.
- Lamium laevigatum* auct. non L. = *Lamium maculatum* – **Яснотка крапчатая**. Лиственные леса, каменистые обнажения, обычно.
- Lamium purpureum* L. (*Lamium stepposum* Kossko ex Klokov) = *Lamium amplexicaule* – **Яснотка пурпуровая**. Лиственные леса, обычно.
- Lycopus europaeus* L. – **Зюзник европейский**. На сырых местах, у болотцев и речек, редко. **ERL**.
- Marrubium praecox* Janka (*M. pestalozzae* auct. non Boiss.) – **Шандра ранняя**. На сухих склонах, у дорог, обычно.
- Marrubium vulgare* L. – **Шандра обыкновенная**. Сорные места, у дорог, обычно.
- Melissa officinalis* L. (*M. bicornis* Klokov) – **Мелисса лекарственная**. На лесных опушках, вырубках, у дорог, обычно.
- Mentha aquatica* L. – **Мята водная**. По берегам речек, озер, водоемов, редко.
- Mentha longifolia* (L.) Huds. (#*M. spicata* ssp. *longifolia* (L.) Tasic) – **Мята длиннолистная**. На влажных полянах, в поймах, по берегам болотцев, обычно.
- Mentha pulegium* L. (#*M. daghestanica* Boriss., #*Pulegium dagestanicum* (Boriss.) Holub, *P. vulgare* Mill.) – **Мята блошница**. По берегам речек и на влажных местах, редко. **ERL**.
- Mentha spicata* L. – **Мята колосистая**. Берега ручьев, очень редко.
- Nepeta cataria* L. – **Котовник кошачий**. На сорных местах, у жилья, дорог, изредка.
- Nepeta pannonica* L. (*N. nuda* L.) – **Котовник венгерский**. На полянах и горных склонах, у дорог, обычно.
- Origanum vulgare* L. (*O. dilatatum* Klokov, *O. puberulum* (G.Beck) Klokov, #*O. vulgare* var. *puberulum* Beck) – **Душица обыкновенная**. На лесных полянах, вырубках, луговинах яйлы, среди кустарников, обычно.
- Phlomis taurica* Hartwiss & Bunge – **Зопник крымский**. На сухих склонах и полянах, на каменистых обнажениях яйлы, обычно.
- Phlomis tuberosa* L. (#*Ph. desertorum* Smirn., #*Ph. glandulifera* Klokov, #*Ph. jailicola* Klokov, #*Ph. piskunovii* Klokov, #*Ph. stepposa* Klokov, *Phlomoides tuberosa* (L.) Moench) – **Зопник клубненосный**. На лесных полянах, сухих сорных склонах, обычно.
- Prunella laciniata* (L.) L. – **Черноголовка разрезная**. На лесных полянах, травянистых склонах, у дорог, среди кустарников, обычно.
- Prunella vulgaris* L. – **Черноголовка обыкновенная**. На лесных полянах и луговинах, у дорог, обычно, обычно.
- Salvia aethiopsis* L. – **Шалфей эфиопский**. На сухих каменистых склонах, обычно.
- Salvia austriaca* Jacq. – **Шалфей австрийский**. На открытых, сухих полянах, редко.
- Salvia glutinosa* L. – **Шалфей железистый**. В лесах и на полянах, обычно.
- Salvia nemorosa* L. aggr. (#*S. deserta* Schangin, *S. jailikola* Klokov, *S. moldavica* Klokov, *S. nemorosa* ssp. *jailikola* (Klokov) Соó, #*S. nemorosa* ssp. *moldavica* (Klokov) Соó) – **Шалфей дубравный**. На лесных полянах, каменистых склонах, у дорог, обычно.
- Salvia sclarea* L. – **Шалфей мускатный**. На сухих каменистых склонах, по сорным местам, у дорог, обычно.
- Salvia sibthorpii* Smith (*S. campestris* M.Bied., *S. extensa* Klokov, *S. virgata* auct. non Jacq.) – **Шалфей Сибторпа**. На каменистых и сухих полянах, в светлых лесах,

- изредка.
- Salvia tesquicola* Klokov & Pobed. (*S. praemontana* Klokov, *S. nemorosa* ssp. *praemontana* (Klokov) Соó, *S. nemorosa* ssp. *tesquicola* (Klokov & Pobed.) Соó, #*S. sylvestris* ssp. *tesquicola* (Klokov & Pobed.) Soják) – **Шалфей сухостепной**. На лесных полянах, сухих склонах, обычно.
- Salvia tomentosa* Mill. (*S. brachystemon* Klokov, *S. grandiflora* Etl.) – **Шалфей войлочный**. В светлых лесах, на полянах, каменистых склонах, осыпях, у дорог, обычно.
- Salvia verbenaca* L. – **Шалфей вербеновый**. Каменистые осыпи, обычно.
- Salvia verticillata* L. – **Шалфей мутовчатый**. На южных каменистых склонах, у жилищ и дорог, обычно.
- Salvia virgata* Jacq. (#*S. elenevskii* Pobed.) – **Шалфей прутьевидный**. В разреженных лесах, на полянах и склонах, изредка.
- Salvia viridis* L. (*S. horminum* L.) – **Шалфей зеленый**. На сухих склонах, обычно.
- Scutellaria albida* L. (*S. pallida* M.Bieb., *S. subalbida* Klokov) – **Шлемник беловатый**. На сухих полянах и в светлых лесах, редко.
- Scutellaria altissima* L. – **Шлемник высочайший**. В лесах и на полянах, среди кустарников, у дорог, редко.
- Scutellaria orientalis* L. aggr. – **Шлемник восточный**. На шиферных сухих склонах, осыпях, обычно.
- Sideritis comosa* (Rochel ex Benth.) Stank. – **Железница хохлатая**. Можжевельовые леса, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Sideritis montana* L. (#*Hesiodia montana* (L.) dumort.) – **Железница горная**. На каменистых горных склонах, осыпях, обычно.
- Scutellaria supina* L. (*Scutellaria alpina* ssp. *supina* (L.) I. Richardson) – **Шлемник приземистый**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Sideritis taurica* Stephan aggr. (*S. libanotica* Labill. ssp. *taurica* (Stephan) Glagoleva, nom. Invalid, *S. syriaca* L. ssp. *taurica* (Stephan) Gladkova, *S. scythica* Juz., #*Navicularia syriaca* ssp. *taurica* (Stephan) Soják) – **Железница крымская**. Выходы известняков, осыпи, каменистые степные участки и склоны, обычно. Э.
- Stachys angustifolia* M.Bieb. – **Чистец узколистный**. Каменистые обнажения, редко.
- Stachys cretica* L. subsp. *velata* (Klokov) Greuter & Burdet = *Stachys velata* – **Чистец критский**. Можжевельовые леса, саванноиды, каменистые обнажения, обычно.
- Stachys germanica* L. (*Stachys germanica* L. subsp. *cordata* (Klokov) Greuter & Burdet) = *Stachys germanica* – **Чистец германский**. Можжевельовые, пушистодубовые леса, каменистые обнажения, обычно.
- Stachys iberica* M.Bieb. – **Чистец иберийский**. Можжевельовые леса, каменистые обнажения, обычно.
- Stachys neglecta* Klokov ex Kossko, nom. inval. = *Stachys annua* – **Чистец забытый**. Каменистые обнажения, редко.
- Stachys recta* L. [*Stachys recta* L. subsp. *atherocalyx* (K.Koch) Derviz-Sokolova] = *Stachys atherocalyx* – **Чистец Прямой**. Можжевельовые леса, каменистые обнажения, обычно.
- Stachys sylvatica* L. (*Stachys taurica* Zefir.) = *Stachys byzantina* (*Stachys transsilvanica* Schur) = *Stachys recta* – **Чистец лесной**. Грабовые и буковые леса, обычно.
- Teucrium chamaedrys* L. (*T. officinale* Lam., *T. pulchris* Juz., *T. stevenianum* Klokov) – **Дубровник обыкновенный**. В лесах, на сухих каменистых склонах, луговинах яйлы, часто.

- Teucrium jailae* Juz. (~*T. cretaceum* Kotov, \*\**T. montanum* L. ssp. *jailae* (Juz.) Soó) – **Дубровник яйлинский**. На каменистых обнажениях, скалах, яйле, часто.
- Teucrium polium* L. – **Дубровник белый**. В шибляковых лесах на шиферных склонах, обычно.
- Teucrium scordioides* Schreb. (*T. scordium* L. ssp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm.) – **Дубровник скордиевидный**. У водоемов, на влажных лугах, изредка. **ERL**.
- Thymus Callieri* Borb. ex Velen. – **Тимьян Каллье**. Хвойные леса, степи, томиляры, каменистые обнажения, часто.
- Thymus dzevanovskyi* Klokov & Des.-Shost. – **Чабрец Дзевановского**. В разреженных лесах на шиферных сухих склонах, на яйле, обычно.
- Thymus jailae* (Klokov & Des.-Shost.) Stank. (#*Thymus roegneri* K.Koch) – **Чабрец яйлинский**. На каменистых обнажениях яйлы, осыпях, приайлинских склонах, часто.
- Thymus roegneri* K.Koch aggr. (*Th. attenuatus* Klokov, *Th. callieri* Borb. ex Velen., #*Th. callieri* ssp. *urumovii* Velen., #*Th. glabrescens* ssp. *urumovii* (Velen.) Jalas, *Th. hirsutus* M.Bieb., #*Th. hirtellus* Klokov, #*Th. jailae* (Klokov & Des.-Shost.) Stankov, *Th. karadagensis* Zefir., *Th. zelenetzkyi* Klokov & Des.-Shost.) – **Чабрец Регнера**. На сухих каменистых склонах, среди кустарников, луговинах яйлы, обычно.
- Thymus tauricus* Klokov & Des.-Shost. (*Th. cherlerioides* auct. non Vis., *Th. pseudohumillinus* Klokov & Des.-Shost.) – **Чабрец крымский**. На скалистых и каменистых местах, яйле, часто.
- Ziziphora capitata* L. (*Ziziphora parviflora* (Trautv.) Des.-Shost.) = *Ziziphora tenuior* – **Зизифора головчатая**. Каменистые осыпи, обычно.

#### Liliaceae Juss. – Лилейные

- Gagea bulbifera* (Pall.) Salisb. – **Гусиный лук луковиценосный**. Каменистые осыпи, редко.
- Gagea callieri* Pascher – **Гусиный лук Каллье**. На щебнистых сухих склонах, редко.
- Gagea dubia* Terr. (*G. littoralis* Artemcz.) – **Гусиный лук сомнительный**. По луговым склонам, изредка.
- Gagea fistulosa* Ker-Gawl. (#*Ornithogalum fistulosum* Ramond ex DC., nom. illeg. superfl.) – **Гусиный лук дудчатый**. На луговинах яйлы, изредка.
- Gagea germanae* Grossh. – **Гусиный лук Жермены**. В светлых лесах, на полянах в верхней зоне, обычно.
- Gagea granatellii* (Parl.) Parl. (#*G. arvensis* ssp. *granatellii* (Parl.) Asch. & Graebn., comb. superfl., #*G. arvensis* ssp. *granatellii* (Parl.) K. Richt., #*Ornithogalum granatelli* Parl.) – **Гусиный лук Гранателли**. Яйла, редко.
- Gagea heldreichii* Terr. – **Гусиный лук Гельдрейха**. Пушистодубовые леса, редко.
- Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl. – **Гусиный лук желтый**. В поймах, на склонах яйл, в светлых лесах, редко.
- Gagea minima* (L.) Ker-Gawl. – **Гусиный лук малый**. В лесах, на полянах, обычно.
- Gagea transversalis* Steven – **Гусиный лук поперечный**. По степным и травянистым склонам на низменности и в горах, обычно.
- Gagea villosa* (M.Bieb.) Duby (*G. arvensis* (Pers.) Dumort, # *Ornithogalum arvense* Pers., #*O. villosum* M.Bieb.) – **Гусиный лук вильчатый**. На сухих открытых местах, редко.
- Lilium monodelphum* M.Bieb. (#*L. georgicum* Manden.) – **Лилия однобратственная**. На

лесных полянах и опушках, вероятно, исчезнувший. **А.**

*Tulipa schrenkii* Regel (~ *T. gesneriana* L. s.l.) – **Тюльпан Шренка**. Каменистые осыпи, горная степь, редко.

#### **Linaceae S.F.Gray – Льновые**

*Linum austriacum* L. (#*L. perenne* L. ssp. *austriacum* (L.) Bolos & Vigo, #*L. squamulosum* Rudolphi) – **Лен австрийский**. Каменистые склоны, поляны, обычно.

*Linum catharticum* L. (*Cathartolinum catharticum* (L.) Small., *C. pratense* Rchb., nom. illeg.) – **Лен слабительный**. Влажные поляны в буковом лесу, изредка.

*Linum lanuginosum* Juz. (*L. hirsutum* L. ssp. *lanuginosum* (Juz.) Egorova) – **Лен шерстистый**. На каменистых склонах, осыпях, редко.

*Linum nervosum* Waldst. & Kit. (*L. aucheri* auct. non Planch., #*L. nervosum* ssp. *glabratum* (DC.) P.H. Davis) – **Лен жилковатый**. На горных склонах, яйлах, лесных полянах, обычно.

*Linum nodiflorum* L. (*L. luteolum* Vieb.) – **Лен узловатый**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.

*Linum squamulosum* Rudolphi ex Willd. (*L. austriacum* L. ssp. *euxinum* (Juz.) Ockendon, *L. euxinum* Juz.) – **Лен чешуйчатый**. На полянах, каменистых склонах, яйлах, обычно.

*Linum tenuifolium* L. – **Лен тонколиственный**. На остепненных и каменистых склонах, сухих лесных полянах, изредка.

*Linum trigynum* L. (*L. gallicum* L.) – **Лен трехстолбиковый**. На остепненных полянах, скалах, редко.

#### **Loranthaceae Juss. – Ремнецветковые**

*Arceuthobium oxycedri* (DC.) Bieb. (*Rasousowakia oxycedri* (DC.)' F. Schultz. – **Арцеутобиум можжевельниковый**. Можжевеловые леса, редко.

*Viscum album* L. – **Омела белая**. Паразитирует на диких плодовых деревьях, липе, обычно.

#### **Lythraceae Jaume – Дербенниковые**

*Lythrum salicaria* L. – **Дербенник иволистный**. На влажных местах, по берегам речек и болотцев, не часто, обычно. **ERL.**

#### **Malvaceae Juss. – Мальвовые**

*Alcea taurica* Пjin – **Шток-роза крымская**. На лесных полянах, сухих склонах и сорных местах, редко.

*Althaea cannabina* L. – **Алтей коноплевый**. В светлых лесах, среди кустарников, на открытых склонах, обычно.

*Althaea hirsuta* L. – **Алтей шерстковолосистый**. На сухих полянах и открытых склонах, сорное в посевах, обычно.

*Althaea narbonensis* Pourg. – **Алтей нарбонский**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

*Lavatera thuringiaca* L. – **Хатьма тюрингенская**. На лесных полянах и луговинах, изредка.

*Malva neglecta* Wallr. (*M. rotundifolia* auct. non L., nom. ambig.) – **Просвирник пренебреженный**. Поляны в лесу и на яйле, сорное у жилья, обычно. **А.**

*Malva pusilla* Smith (#*M. rotundifolia* auct. non L. nom. ambig.) – **Просвирник низкий**.

Сорное, обычно. **А.**

*Malva sylvestris* L. (#*M. grossheimii* Pjin, #*M. mauritiana* L.) – **Просвирник лесной**. На лесных полянах, сорное, редко. **А.**

### **Melanthiaceae Batsch (Colchicaceae DC.) – Мелантиевые**

*Colchicum umbrosum* (Ker Gawl.) Steven (*C. arenarium* Waldst. et Kit. var. *umbrosum* Ker Gawl.) – **Безвременник теневой**. В лиственных и смешанных лесах, на склонах Главной гряды, редко. **ККРФ.**

### **Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые**

*Monotropa hypopitys* L. (*Hypopitys monotropa* Crantz) – **Вертляница подъяедниковая**. В сосновых, буковых, иногда в дубовых лесах, обычно.

### **Oleaceae Hoffm. & Link. – Маслиновые**

*Fraxinus angustifolia* Vahl. – **Ясень узколистный**. На лесных полянах, изредка.

*Fraxinus excelsior* L. – **Ясень высокий**. В лесах и по склонам, по всей территории, часто.

*Fraxinus pacovskyi* Domin. (*F. rotundifolia* Mill. (*F. oxycarpa* Willd., *F. syriaca* Boiss) – **Ясень круглолистный**. Пушистодубовые леса, редко.

*Jasminum fruticans* L. – **Жасмин кустарниковый**. На каменистых южных склонах, часто.

*Ligustrum vulgare* L. – **Бирючина обыкновенная**. На сухих полянах, каменистых склонах, обычно.

### **Onagraceae Juss. – Кипрейные**

*Chamerion angustifolium* (L.) Holub (*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop., *Epilobium angustifolium* L.) – **Хаменерион узколистный**. На лесных опушках и полянах, образует заросли, редко.

*Circaea lutetiana* L. (#*C. quadrisulcata* (Maxim.) Franch. & Savat p.p.) – **Двулепестник парижский**. В тенистых лесах, по балкам, вырубкам, обычно.

*Epilobium hirsutum* L. – **Кипрей мохнатый**. У источников, по берегам рек и ручьев, по влажным местам, обычно.

*Epilobium montanum* L. – **Кипрей горный**. В лесах и на полянах, вырубках и каменистых склонах, обычно.

*Epilobium parviflorum* Schreb. – **Кипрей мелкоцветковый**. Во влажных местах, в лесу, очень редко.

### **Ophioglossaceae (R.Br.) Agardh – Ужовниковые**

*Botrychium lunaria* (L.) Sw. – **Гроздовник полулунный**. На луговинах на яйле, на полянах по склонам гор, очень редко.

*Ophioglossum vulgatum* L. (#*O. mironovii* Sumn.) – **Ужовник обыкновенный**. В лесах и на влажных полянах, очень редко.

### **Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые**

*Anacamptis coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase – **Ятрышник жилковатый (я. клопоносный)**. В лесах, на луговинах яйлы и на полянах, редко. **ККРФ. ERL.**

*Anacamptis morio* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. *caucasica* (K.

- Koch) Н. Kretzschmar, Eccarius & Н. Dietr. – **Анакамптис дремлик (ятрышник дремлик)**. В широколиственных лесах, на луговинах яйлы и на полянах, редко. **ERL. ККРФ.**
- Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. (*Orchis pyramidalis* L.) – **Анакамптис пирамидальный**. В лесах, на полянах, по всей территории, редко. **ККРФ. ERL.**
- Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce (*C. grandiflora* S.F.Gray, *#C. latifolia* Janch., *C. lonchophyllum* (L. f) Rchb. f., *#Serapias damasonium* Mill., *#S. grandiflora* L., *#S. lonchophyllum* L. f.) – **Пыльцеголовник крупноцветковый**. В лесах, по всей территории. **ККРФ. ERL.**
- Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch (*C. ensifolia* (Sw.) Rich.) – **Пыльцеголовник длиннолистный**. В лесах и на опушках, обычно. **ККРФ. ERL.**
- Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (*^Serapias rubra* L.) – **Пыльцеголовник красный**. В лесах, по всей территории, обычно. **ККРФ. ERL.**
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm. – **Поллопестник зелёный**. В лесах и на опушках, редко. **ERL.**
- Comperia comperana* (Steven) Asch. & Graebn. (*Comperia taurica* K.Koch) = *Comperia comperiana* – **Комперия крымская (Компера)**. Можжевельниковые, пушистодубовые леса, редко, в западной части заповедника.
- Corallorhiza trifida* Châtel. (*C. neottia* Scop., *C. innata* R.Br., *Ophrys corallorhiza* L.) – **Ладьян трехнадрезанный**. В тенистых лесах, редко.
- Dactylorhiza iberica* (M.Bieb. ex Willd.) Soó (*Dactylorchis iberica* (M.Bieb. ex Willd.) Vermeulen, *#Orchis angustifolia* M.Bieb., *O. iberica* M.Bieb. ex Willd.) – **Ятрышник иберийский**. На влажных полянах, в буковых лесах, редко. **ERL.**
- Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (*^D. cruenta* (O.F.Mull.) Soó, *^D. ochroleuca* (Boll) Holub, *#D. strictifolia* (Opiz) Rauschert, *Dactylorchis incarnata* (L.) Vermeulen, *Orchis incarnata* L., *#O. latifolia sensu* Nevski p.p., *^O. latifolia* L. nom. rej., *#Orchis strictifolia* Opiz) – **Ятрышник мясокрасный**. На влажных лугах, редко. **ERL.**
- Dactylorhiza romana* (Seb. & Mauri) Soó (*D. sambucina* (L.) Soó ssp. *Romana* (Sebast.) Bornm., *D. sulphurea* (Link) Franco ssp. *pseudosambucina* (Ten.) Franco, *Dactylorchis romana* (Sebast.) Vermeulen, *Orchis pseudosambucina* Ten., *O. romana* Sebast.) – **Ятрышник римский**. В сосновых и лиственных лесах, обычно. **ERL.**
- Epipactis densifolia* W. Hahn, Passin & R. Wegener. – **Дремлик густолиственный**. Светлые, полутенистые дубовые леса, редко.
- Epipactis helleborine* (L.) Crantz (*E. latifolia* (L.) All., *#Serapias helleborine* L., *S. helleborine* var. *latifolia* L.) – **Дремлик морозниковый**. В лесах, по всей территории, обычно. **ERL.**
- Epipactis krymmtana* Kreutz, Fateryga & Efimov – **Дремлик горно-крымский**. В лесах, каменистые осыпи, редко.
- Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. (*Serapias microphylla* Ehrh.) – **Дремлик мелколистный**. В лесах, по всей территории, обычно.
- Epipactis muelleri* Godfery – **Дремлик Мюллера**. В лесах, редко. **ERL.**
- Epipactis palustris* (L.) Crantz – **Дремлик болотный**. Луга, очень редко.
- Epipactis persica* (Soó) Nannf. (включает два подвида: *\*Epipactis persica* (Soó) Nannf. subsp. *persica* и *\*Epipactis persica* (Soó) Nannf. subsp. *taurica* (Fateryga & Kreutz) Fateryga & Kreutz) – **Дремлик персидский**. В буковых лесах, редко. **ERL.**
- Epipactis turcica* Kreutz – **Дремлик турецкий**. В светлых сосновых лесах, в зарослях кустарников, на суходольных лугах, на каменистых склонах, редко.
- Epipogium aphyllum* Sw. – **Надбородник безлистный**. Леса, редко. **ККРФ**

- Goodyera repens* (L.) R.Br. (*Satyrium repens* L.) – **Гудайера ползучая**. В сосновых и смешанных лесах, изредка. **ERL.**
- Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br. (*^Orchis conopsea* L., incl. *G. alpina* (Turcz. ex Rchb.f.) Czer., *G. conopsea* (L.) R.Br. ssp. *alpina* (Turcz. ex Rchb.f.) Janchen ex Soó) – **Кокушник длиннорогий**. На лесных полянах, редко. **ERL.**
- Himantoglossum caprinum* (M.Bieb.) K.Koch (*H. hircinum* (L.) W.D.J.Koch ssp. *caprinum* (M.Bieb.) K. Richt., *H. caprinum* (M.Bieb.) Spreng., comb. illeg., *Orchis caprina* M.Bieb.) – **Ремнелепестник козий**. На лесных полянах, в светлых лесах, редко. **ККРФ. ERL.**
- Limodorum abortivum* (L.) Sw. (*Orchis abortiva* L.) (включает три разновидности: \**Limodorum abortivum* (L.) Sw. var. *abortivum*, \**Limodorum abortivum* (L.) Sw. var. *rubrum* H. Sund. ex Kreutz и \**Limodorum abortivum* (L.) Sw. var. *viridis* Fateruga & Kreutz) – **Лимодорум недоразвитый**. В светлых лесах, обычно. **ККРФ. ERL.**
- Listera ovata* (L.) R.Br. (*Ophrys ovata* L., *^Neottia latifolia* Rich.) – **Тайник яйцевидный**. По всей территории, обычно.
- Neotinea tridentata* (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (*Orchis tridentata* Scop., *O. variegata* All.) – **Неотиния трёхзубчатая (ятрышник трёхзубчатый)**. На полянах в лиственных лесах, изредка. **ККРФ.**
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich. (*^Ophrys nidus-avis* L., *^Neottia vulgaris* Kolb.) – **Гнездовка настоящая**. В буковых лесах, в дубовых и пойменных лесах, редко.
- Ophrys apifera* Huds. (*Ophrys corallorhiza* L.) = *Corallorhiza trifida* (*Ophrys cordata* L.) = *Listera cordata* – **Офрис пчелоносная**. Можжевельниковые, пушистодубовые леса, каменистые осыпи, очень редко. **ККРФ. ERL.**
- Ophris oestriifera* M.Bieb. (*O. cornuta* Steven, *O. oestriifera* M.Bieb. ssp. *cornuta* (Steven) Soó, *O. scolopax* Cav. ssp. *cornuta* (Steven) E.G.Camus, *O. scolopax* Cav. ssp. *oestriifera* (M.Bieb.) Soó) – **Офрис оводоносная**. Среди кустарников на каменистом склоне, очень редко. **ККРФ.**
- Ophris taurica* (Agg.) Nevski (*^O. aranifera* Huds. var. *taurica* Aggeenko, *O. sphegodes* Mill. ssp. *taurica* (Aggeenko) Soó, *O. mammosa* auct. non Desf.) – **Офрис крымская**. В разреженных лесах, на каменистых склонах, редко.
- Orchis mascula* (L.) L. (*Orchis morio* L. var. *masculus* L.) (включает две разновидности: \**Orchis mascula* (L.) L. var. *mascula* и \**Orchis mascula* (L.) L. var. *wanjkovii* (E. Wulff) Fateruga & Kreutz) – **Ятрышник мужской**. На лесных полянах, среди кустарников, обычно. **ККРФ. ERL.**
- Orchis militaris* L. subsp. *stevanii* (Rchb. f.) B. Baumann & Al. – **Ятрышник шлемоносный**. В дубовых лесах на южных склонах, обычно. **ККРФ. ERL.**
- Orchis pallens* L. – **Ятрышник бледный**. На горных луговых полянах, в светлых дубовых лесах, редко. **ККРФ. ERL.**
- Orchis palustris* Jacq. (*Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. *elegans* (Heuff.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase) – **Анакамптис (ятрышник) болотный**. На влажных луговинах верхнего пояса, кроме яйлы, изредка. **ККРФ.**
- Orchis provincialis* Balb. – **Ятрышник прованский (я. провансальский)**. Смешанный лес, редко. **ККРФ. ERL.**
- Orchis punctulata* Steven ex Lindl. – **Ятрышник мелкоточечный (я.точечный, я. Шелковникова)**. Заросли кустарников, лесные поляны, редко. **ККРФ. ERL.**
- Orchis purpurea* Huds. (incl. *O. pontica* Fleischm. & Hand.-Mazz.) – **Ятрышник пурпурный**. В смешанных и лиственных лесах, на полянах, редко. **ККРФ. ERL.**

- Orchis simia* Lam. – **Ятрышник обезьяний**. В дубовых лесах, на каменистых склонах, поросших кустарником, редко. **ККРФ. ERL.**
- Platanthera bifolia* (L.) Rich. – **Любка двулистная**. Лесные луга, окраины лесов, заросли кустарников, редко. **ERL.**
- Platanthera chlorantha* (Cust.) Rchb. (*Orchis chlorantha* Cust.) – **Любка зеленоцветковая**. В лесах и среди кустарников, изредка. **ERL.**
- Stenisiella satyrioides* (Steven) Schlechter (*Himantoglossum satyrioides* Spreng., *Orchis satyrioides* Steven, non L.) – **Стевениелла сатириовидная**. В дубовых лесах и среди кустарников, на южных склонах, редко. **ККРФ. ERL.**
- Traunsteinera globosa* (L.) Rchb. – **Траунштейнера шаровидная (ятрышник шаровидный)**. На влажных луговинах, редко. **ККРФ. ERL.**

#### **Orobanchaceae Vent. – Молочайные**

- Diphelypaea coccinea* (M.Bieb.) Nicolson (*Phelypaea coccinea* (M.Bieb.) Poir.) – **Дифелипея красная**. На щебнистых, каменистых горных склонах, лесных полянах, паразитирует на васильке наклоненном, изредка.
- Orobanche alba* Stephan ex Willd. – **Заразиха белая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Orobanche cernua* Loefl. [*Orobanche cernua* Loefl. subsp. *cumana* (Wallr.) Soo] = *Orobanche cumana* (*Orobanche cervaria* Suard.) = *Orobanche alsatica* – **Заразиха поникшая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Orobanche crenata* Forssk. (#*O. owerinii* (G. Beck) O.Beck) – **Заразиха городчатая**. На каменистых склонах, полянах, паразитирует на бобовых, обычно.
- Orobanche cumana* Wallr. (*O. cernua* Loefl. ssp. *cumana* (Wallr.) Soó, *O. cumana* Wall. ssp. *parviflora* Kotov, #*O. sarmatica* Kotov) – **Заразиха подсолнечная**. На каменистых склонах, у дорог, паразитирует на полыни, дурнишнике, редко. **A.**
- Orobanche dalmatica* (G. Beck.) Tzvelev = *Phelipanche dalmatica* – **Заразиха далматская**. Каменистые осыпи, травянистые склоны, редко.
- Orobanche elatior* Sutton (*O. kochii* F.Schultz, *O. major* auct. non L.) – **Заразиха высокая**. На каменистых склонах, у лесных дорог, редко, паразитирует на сложноцветных, обычно.
- Orobanche hederæ* Vaucher ex Duby – **Заразиха плющевая**. В лесах, паразитирует на плюще, обычно.
- Orobanche lutea* Baumg. (*Orobanche major* L., nom. utique rej. prop.) = *Orobanche caryophyllacea* {*Orobanche major* auct. non L.} = *Orobanche elatior* – **Заразиха желтая**. Каменистые осыпи, редко.
- Orobanche minor* Smith, *Orobanche mutelii* F. Schultz = *Phelipanche mutelii*, *Orobanche oxyloba* (Reut.) G. Beck = *Phelipanche oxyloba*, *Orobanche nana* (Rent.) Noe ex G.Beck = *Phelipanche oxyloba* – **Заразиха малая (з. Мутеля, з. остролопастная, з. низкая)**. Каменистые осыпи, изредка.
- Orobanche pubescens* D'Urv. [*Orobanche ramosa* L.] = *Phelipanche ramosa* – **Заразиха ветвистая (з. пушистая)**. Можжевеловые леса, обнажения, обычно.
- Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják (*Orobanche purpurea* Jacq.) – **Фелипанче пурпурная**. На горных склонах, паразитирует на полыни и тысячелистниках, изредка.

#### **Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые**

- Paeonia daurica* Andrews (*P. taurica* Andrews, schalm. corr., *P. mascula* (L.) Mill. ssp.



*triternata* (Pall. ex DC.) Stearn & P.H.Davis, *P. triternata* Pall. ex DC.) – **Пион крымский (пион трижды-тройчатый)**. В буковых и смешанных лесах, на полянах южных склонов, обычно.

*Paeonia tenuifolia* L. (*P. biebersteiniana* Rupr., *P. lithophila* Kotov) – **Пион узколистный**. На каменистых склонах и полянах, обычно. **ККРФ. ERL.**

#### **Рanaveraceae Juss. – Маковые**

*Chelidonium majus* L. – **Чистотел большой**. В светлых лесах, среди кустарников, сорное у дорог и жилья, обычно.

*Glaucium corniculatum* (L.) J. Rudolph. – **Мачок рогатый**. Саванноиды, каменистые осыпи, довольно редко.

*Glaucium flavum* Crantz – **Мачок желтый**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно. **ККРФ.**

*Papaver dubium* L. – **Мак сомнительный**. На полянах и остепненных склонах, обычно.

*Papaver hybridum* L. (*P. argemone* L. ssp. *hybridum* (L.) Schmalh.) – **Мак гибридный**. На сухих склонах, сорных местах, обычно.

*Papaver rhoeas* L. – **Мак самосейка**. На южных склонах, полянах, у жилья, обычно.

#### **Pinaceae Lindl. – Сосновые**

*Pinus kochiana* Klotzsch ex K.Koch (*P. hamata* (Steven) Sosn. 1925 non Roetzl 1857, *P. sosnovskyi* Nakai, #*P. sylvestris* ssp. *hamata* (Stev.) Fomin, #*P. sylvestris* ssp. *kochiana* (Klotzsch ex C.Koch) Elicin) – **Сосна Коха**. В верхнем поясе, на яйлах, эдификатор, часто.

*Pinus pallasiana* D.Don. (*Pinus nigra* J.F.Arnold ssp. *pallasiana* (D.Don) Holmboe) – **Сосна крымская**. По южному склону Главной гряды, эдификатор, часто. **ККРФ.**

#### **Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые**

*Plantago lanceolata* L. – **Подорожник ланцетолистный**. На сухих полянах, склонах, лугах, обычно.

*Plantago major* L. (#*P. borysthenica* (Rogow.) Wissjul., #*P. major beta borysthenica* Rogow.) – **Подорожник большой**. На сорных местах, у дорог и жилья, обычно.

*Plantago media* L. – **Подорожник средний**. На лесных полянах, лугах, в светлых лесах, обычно.

#### **Роaceae Barnhart (=Graminea Juss.) – Мятликовые, злаковые**

*Achnatherum bromoides* (L.) Beauv. (#*Aristella bromoides* (L.) Bertol., *Lasiagrostis bromoides* (L.) Nevski & Roshev., #*Stipa bromoides* (L.) Doerfler) – **Чий костерovidный**. На сухих склонах, изредка.

*Aegilops biuncialis* Vis. – **Эгилопс двухдвоймовый**. Саванноиды, каменистые осыпи, часто.

*Aegilops cylindrica* Host (#*A. cylindrical* ssp. *aristulata* Zhuk., #*A. cylindrical* var. *aristulata* (Zhuk.) Tzvel., #*A. cylindrical* ssp. *pauciaristata* (Eig) Chennav., *Cylindropyrum cylindricum* (Host) A.Löve, #*Triticum cylindricum* (Host) Cesati) – **Эгилопс цилиндрический**. Сухие склоны, редко. **ERL.**

*Aegilops ovata* L. (#*A. neglecta* Req. ex Bertol., *A. triaristata* auct. non Willd., #*A. triaristata* ssp. *contorta* Zhuk., #*A. triaristata* ssp. *intermixta* Zhuk., #*Triticum*

- neglectum* (Beretol.) Grueter, #*T. ovatum* (L.) Rasp.) – **Эгилопс яйцевидный (трехостный)**. Сухие склоны, поляны, часто. **ERL**.
- Aegilops triuncialis* L. (#*A. triaristata* Willd.) – **Эгилопс трехдоймовый**. Сухие склоны, обычно. **ERL**.
- Agropyron pectinatum* (M. Bieb.) P.Beauv (*Agropyron pectiniforme* Roem. et Schult.) = *Agropyron pectinatum* {*Agropyron pinifolium* auct. non Nevski} = *Agropyron ponticum* – **Житняк гребневидный**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Agropyron ponticum* Nevski (\*\**A. cristatum* (L.) P.Beauv. ssp. *ponticum* (Nevski) Tzvelev, *A. pinifolium* auct. non Nevski) – **Житняк понтийский**. Сухие склоны и луговины, изредка. Э.
- Agrostis capillaris* L. (*A. stricta* Willd., *A. tenuis* Sibth., *A. vulgaris* With.) – **Полевица тонкая**. На луговинах, лесных полянах, обычно.
- Agrostis gigantea* Roth (*A. alba* auct. non L., #*A. alba* ssp. *gigantea* (Roth) Jir., #*A. diffusa* Host, *A. graniticola* Klokov, *A. praticola* Klokov, #*A. stolonifera* ssp. *gigantea* (Roth) Beldie, #*A. stolonifera* ssp. *gigantea* (Roth) Maire & Weiller, #*Cinna karataviensis* Pavl.) – **Полевица гигантская**. На луговинах и опушках, по всей территории, изредка.
- Agrostis stolonifera* L. (*A. alba* auct. non L., #*A. alba* ssp. *stolonifera* (L.) Jir., #*A. alba* ssp. *stolonizans* (Bess. ex Schult. & Schult. fil.) Lavr., #*A. jacutica* Schischk., *A. karsensis* Litv., #*A. macrantha* Schischk., #*A. palustris* Hudson, #*A. prorepens* (Koch) Golub., *A. pseudoalba* Klokov, #*A. sibirica* Petr., #*A. stolonifera* ssp. *palustris* (Huds.) Tzvel., #*A. stolonifera* ssp. *stolonizans* (Bess. ex Schult. & Schult. fil.) Soy, #*A. stolonizans* Bess. ex Schult. & Schult. fil., *A. zerovii* Klokov) – **Полевица побегоносная**. На лугах, на приречных песках и галечниках, на болотах, по берегам водоёмов, у дорог, редко. **ERL**.
- Alopecurus aequalis* Sobol. (#*A. aequalis* ssp. *amurensis* (Kom.) Hult., #*A. aequalis* ssp. *aristulatus* (Michx.) Tzvel., #*A. amurensis* Kom., #*A. aristulatus* Michaux, *A. fulvus* Smith, #*A. geniculatus* ssp. *fulvus* (Smith) C. Hartm.) – **Лисохвост равный**. На мокрых лугах, по берегам водоемов, обычно. **ERL**.
- Alopecurus arundinaceus* Poir. (*Alopecurus fulvus* Smith) = *Alopecurus aequalis* – **Лисохвост тростниковидный**. Луга, берега ручьев, изредка.
- Alopecurus myosuroides* Huds. – **Лисохвост мышехвостниковидный**. Луга, каменистые осыпи, саванноиды, изредка.
- Alopecurus vaginatus* (Willd.) Pall. ex Kunth (#*A. brevifolius* Grossh., p.p. excl. typo, #*A. longifolius* Kolak., *Polypogon vaginatus* Willd.) – **Лисохвост влагалищный**. На луговинах яйлы, обычно.
- Anisantha madritensis* (L.) Nevski (*Bromus madritensis* L., *Zerna madritensis* S.F.Gray, #*Z. madritensis* (L.) Grossh., comb. superfl.) – **Неравноцветник (анизанта) мадридский**. На сухих полянах, в нижнем лесном поясе, часто.
- Anisantha sterilis* (L.) Nevski (*Bromus sterilis* L., *Zerna sterilis* (L.) Panz.) – **Неравноцветник стерильный**. У дорог, жилья, сорное, обычно.
- Anisantha tectorum* (L.) Nevski (*Bromus tectorum* L., #*Zerna tectorum* (L.) Lindm., *Z. tectorum* (L.) Panz.) – **Неравноцветник кровельный**. В сухих лесах, среди кустарников, у жилья, сорное, часто.
- Arrhenatherum elatius* (L.) J.Presl & C. Presl – **Райграс высокий**. На луговинах, в верхнем горном поясе, обычно. **ERL**.
- Avena barbata* Pott ex Link – **Овес бородач**. Каменистые осыпи, очень редко. **ERL**.
- Avena fatua* L. (*Avena ludoviciana* Durieu) = *Avena persica* – **Овес Людовика**.

- Саванноиды, каменистые осыпи, обычно. **ERL. А.**
- Avena trichophylla* K. Koch. (*Avena wiestii* Steud.) = *Avena barbata* – **Овес волосистый**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng (#*Amphilopsis ischaemum* (L.) Nash, *Andropogon ischaemum* L., #*B. ischaemum* (L.) Henrard, comb. superfl., #*B. ischaemum* (L.) Mansf., comb. superfl., #*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty) – **Бородач кровоостанавливающий**. На сухих полянах, у дорог, изредка.
- Brachypodium pinnatum* (L.) P.Beauv. (*Bromus pinnatus* L.) – **Коротконожка перистая**. На луговинах яйлы, изредка.
- Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult. (*B. pinnatum* var. *rupestre* (Host) Reichenb., *B. pinnatum* ssp. *rupestre* (Host) Schubl. & Martens, *B. pinnatum* ssp. *rupestre* (Host) Tzvel.) – **Коротконожка скальная**. На сухих склонах, в верхнем поясе, часто.
- Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. (*Brevipodium sylvaticum* (Huds.) A.Löve & D.Löve) – **Коротконожка лесная**. В лесах и на полянах, по всей территории, обычно.
- Briza clatior* Sibth. et Smith [*Briza humilis* M.Bieb.] = *Brizochloa humilis* – **Трясунка низкая**. Можжевельные леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Briza elatior* Sibth. & Smith. (*B. australis* Prokud., #*B. media* ssp. *elatior* (Sibth. & Smith) Rohlena) – **Трясунка высокая**. По всей территории, обычно.
- Bromus commutatus* Schrad. (*B. racemosus* auct. non L., *B. racemosus* ssp. *commutatus* (Schrsd.) Maire & Weiller) – **Костер изменчивый**. На остепненных полянах, у дорог, сорное, часто.
- Bromus hordeaceus* L. (*B. mollis* L.) – **Костер мягкий**. На остепненных полянах, у дорог, часто.
- Bromus japonicus* Thunb. (#*B. japonicus* ssp. *typicus* (Hack.) Penzes, nom. illeg., #*B. japonicus* var. *typicus* Hack., nom. illeg., *B. patulus* Mert. & W.D.J.Koch, *B. subsquarrosus* Borbás) – **Костер японский**. По лесным полянам и горным склонам, обычно.
- Bromus scoparius* L. – **Костер метельчатый**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Bromus secalinus* L. – **Костер ржаной**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко. **А.**
- Bromus squarrosus* L. (*B. megastachys* Borbás, *B. squarrosus* ssp. *typicus* Penzes, nom. illeg.) – **Костер растопыренный**. Сухие склоны, обычно.
- Calamagrostis epigeios* (L.) Roth (*Arundo epigejos* L., *C. gigantea* auct. non Roshev., ~ *C. macrolepis* Litv., #*C. lenkoranensis* Steud.) – **Вейник наземный**. На сухих склонах, лесных полянах, по берегам озерец, изредка.
- Catabrosa aquatica* (L.) P.Beauv. – **Поручейница водяная**. По берегам лесных болотцев, изредка. **ERL.**
- Cleistogenes serotina* (L.) Keng [*Cleistogenes serotina* (L.) Keng subsp. *bulgarica* (Bornm.) Tutin] = *Cleistogenes bulgarica* – **Клейстогенес поздний**. Можжевельные леса, саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers. – **Свинорой, цинодон пальчатый**. У жилищ, сорное, изредка.
- Cynosurus cristatus* L. – **Гребневик обыкновенный**. На лугах, лесных полянах, у дорог, часто.
- Cynosurus echinatus* L. – **Гребневик шиповатый**. Сухие склоны, изредка.
- Dactylis glomerata* L. – **Ежа сборная**. В лесах, среди кустарников, на полянах, обычно.

- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. subsp. *aegyptiaca* (Retz.) Henrard] = *Digitaria aegyptiaca*, [*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. subsp. *pectiniformis* Henrard] = *Digitaria pectiniformis*, (*Digitaria vulgaris* (Schrad.) Besser) = *Digitaria sanguinalis* – **Росичка кровавая**. Каменистые осыпи, обычно. **А.**
- Echinaria capitata* (L.) Desf. – **Ежовка головчатая**. Можжевельниковые леса, саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Echinochloa crusgalli* (L.) P.Beauv. (#*E. colonum* auct., *E. occidentalis* (Wiegand) Rydb.s.str.) – **Ежовник обыкновенный**. У жилищ, дорог, сорное, обычно. **А.**
- Elymus caninus* (L.) L. (#*Elytrigia canina* (L.) Drob., #*Gouardia canina* (L.) Husn., *Roegneria canina* (L.) Nevski, #*R. tuskaulensis* Vass.) – **Пырейник собачий**. Леса, луга, редко. **ERL.**
- Elytrigia elongata* (Host) Nevski – **Пырей удлиненный**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Elytrigia intermedia* (Host) Nevski (*Agropyron glaucum* (Desf. ex DC.) Roem. & Schult., #*A. hispidum* Opiz, *A. intermedium* (Host) P.Beauv., *A. rigidum* C.Presl, #*Elymus hispidus* (Opiz) Melderis) – **Пырей средний**. По лесным опушкам, обнаженным склонам, обычно.
- Elytrigia maeotica* (Prokud.) Prokud – **Пырей азовский**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Elytrigia nodosa* (Nevski) Nevski (*Agropyron nodosum* Nevski, *Elymus nodosus* (Nevski) Melderis, \*\**Elytrigia caespitosa* ssp. *nodosa* (Nevski) Tzvel., #*Lophopyrum nodosum* (Nevski) A.Löve, #*Triticum nodosum* Stev. ex Bieb.) – **Пырей узловатый**. На каменистых склонах и осыпях, часто. **Э.**
- Elytrigia repens* (L.) Nevski (#*Agropyron caesium* J. & C.Presl, *A. repens* (L.) P.Beauv., #*A. sachalinense* Honda, #*Elymus repens* (L.) Gould) – **Пырей ползучий**. На лесных полянах, луговинах яйлы, среди кустарников, обычно.
- Elytrigia scythica* (Nevski) Nevski (*Agropyron scythicum* Nevski, #*Elymus bungeanus* ssp. *scythicus* (Nevski) Melderis, #*Elytrigia geniculata* ssp. *scythica* (Nevski) Tzvel., #*Pseudoroegneria geniculata* ssp. *scythica* (Nevski) A.Löve) – **Пырей скифский**. На каменистых склонах и осыпях, часто.
- Elytrigia strigosa* (M.Bieb.) Nevski (*Agropyron strigosum* (M.Bieb.) Boiss, #*Elymus reflexiaristatus* ssp. *strigosus* (Bieb.) Melderis, #*Pseudoroegneria strigosa* (Bieb.) A.Löve) – **Пырей щетинистый**. На каменистых склонах, яйлах, часто. **Э.**
- Elytrigia trichophora* (Link) Nevski (#*Agropyron barbulatorum* Schur., #*A. elongatum* ssp. *ruthenicum* (Griseb.) Anghel & Morariu, #*A. glaucum* ssp. *barbulatorum* (Schur) K. Richt., #*A. intermedium* ssp. *trichophorum* (Link) Reichenb. ex Hegi, #*A. intermedium* ssp. *trichophorum* (Link) Volkart, #*A. ruthenicum* (Griseb.) Prokud., *A. trichophorum* (Link) K. Richt., #*A. truncatum* ssp. *trichophorum* (Link) Soó, #*Elymus hispidus* ssp. *barbulatus* (Schur) Melderis, *Elytrigia aucheri* (Boiss.) Nevski, #*E. intermedia* ssp. *barbulata* (Schur) A.Löve, #*E. intermedia* ssp. *barbulata* (Schur) Soják, *E. intermedia* ssp. *trichophora* (Link) A. & D.Löve, #*E. intermedia* (Host) Nevski ssp. *trichophora* (Link) Nevski, #*E. intermedia* ssp. *trichophora* (Link) Tzvel., *E. ruthenica* (Griseb.) Prokud., p.p. quoad nomen, *Triticum rigidum beta ruthenicum* Griseb.) – **Пырей волосоносный**. На остепненных склонах, среди кустарников, обычно.
- Eragrostis minor* Host – **Полевичка малая**. Каменистые осыпи, изредка.
- Festuca callieri* (Hack.) Markgr. – **Овсяница Калье**. Можжевельниковые, сосновые,

- пушистодубовые леса, саванноиды, степи, томилляры, каменистые обнажения, часто.
- Festuca gigantea* (L.) Vill. (#*F. bonassorum* Bornm., #*F. pseudogigantea* Ovcz. & Schibk.) – **Овсяница гигантская**. Преимущественно в буковых лесах, под пологом, редко.
- Festuca pratensis* Huds. (*F. elatior* L. nom. *utique* rej.) – **Овсяница луговая**. На лесных полянах, луговинах яйлы, изредка.
- Festuca regeliana* Pavl. (*F. arundinacea* Schreb. ssp. *orientalis* (A.Kern. ex Hack.) Tzvelev, *F. orientalis* (A.Kern. ex Hack.) V.Krecz. & Bobrov 1934, non B.Fedtsch. 1915) – **Овсяница восточная**. По влажным берегам рек, часто.
- Festuca rupicola* Heuff. (*F. sulcata* (Hack.) Nyman; *F. valesiaca* aggr., #*F. valesiaca* Gaudin. ssp. *sulcata* (Hack.) Schinz. & R.Keller, #*F. ganeschii* Drob., #*F. hirsuta* Host, #*F. ovina* var. *hirsuta* Link, #*F. recognita* Reverd., #*F. sulcata* (Hack.) Nym. p.p. nom. illeg., #*F. valesiaca* ssp. *sulcata* (Hack.) Schinz & R. Keller, #*F. valesiaca* ssp. *valesiaca* var. *ganeschii* (Drob) Tzvel., #*F. valesiaca* ssp. *valesiaca* var. *hirsuta* (Link) E.Alexeev, #*F. valesiaca* var. *wagneri* auct. p.p) – **Овсяница бороздчатая**. На лесных полянах, на яйле, изредка. **ERL**.
- Glyceria notata* Chevall. (*G. plicata* (Fries) Fries, #*G. turcomanica* Kom.) – **Манник складчатый**. По берегам водоемов, долинам рек, обычно. **ERL**.
- Haynaldia villosa* (L.) Schur = *Dasyurum villosum* – **Гайнальдия мохнатая**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Helictotrichon schellianum* (Hack.) Kitag. (*Avenastrum schellianum* (Hack.) Rochev, #*Avenochloa hookeri* ssp. *schelliana* (Hack.) Soják, *A. schelliana* (Hack.) Holub, #*Avenulla hookeri* ssp. *schelliana* (Hack.) Lomonosova, *A. schelliana* (Hack.) Holub, #*A. schelliana* (Hack.) Sauer & Chmelitschek, #*H. hookeri* (Scribn.) Henrard ssp. *Schellianum* (Hack.) Kitag.), (*Helictotrichon tauricum* Prokud.) = *Helictotrichon compressum* – **Овсец Шелля (о. крымский)**. На лесных полянах, в верхнем поясе, яйлах, обычно.
- Holcus lanatus* L. – **Бухарник шерстистый**. На опушках, среди кустарников, часто.
- Hordelymus europaeus* (L.) Jessen ex C.O.Harz (*Cuviera europaea* (L.) Koeler) – **Хорделимус европейский**. В поясе буковых лесов, часто.
- Hordeum bulbosum* L. (#*Critesion bulbosum* (L.) A.Löve) – **Ячмень луковичный**. На остепненных полянах, обычно. **ERL**.
- Hordeum leporinum* Link. (#*Critesion murinum* (L.) A.Löve ssp. *leporinum* (Link) A.Löve, #*H. murinum* ssp. *leporinum* (Link) Arcangeli) – **Ячмень заячий**. На сорных местах, у дорог, на горных склонах, часто.
- Hordeum murinum* L. (#*Critesion murinum* (L.) A.Löve) – **Ячмень мышиный**. У жилья, дорог, сорное, часто. **ERL**.
- Koeleria brevis* Steven – **Тонконог короткий**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Koeleria cristata* (L.) Pers. (#*Aira cristata* L., *K. gracilis* Pers., nom. illeg., *K. macrantha* auct. non (Ledeb.) Schult.) – **Тонконог гребенчатый**. Остепненные склоны, поляны, яйла, обычно.
- Koeleria lobata* (M.Bieb.) Roem. & Schult. (#*Dactylis lobata* Bieb., #*K. callieri* (Domin) Ujhelyi, #*K. cristata robusta* Pacz. ex Schmalh., #*K. robusta* (Pacz. ex Schmalh.) Janata, #*K. splendens* C. Presl, *K. splendens* var. *callieri* Domin, *K. theodoriana* Klokov, nom. inval.) – **Тонконог лопастный**. Каменистые склоны, луговины яйлы, обычно.

- Lolium loliaceum* (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz. (*Lolium marschallii* Steven) = *Lolium perenne* – **Плевел южный**. Луга, саванноиды, каменистые осыпи, обычно.
- Lolium perenne* L. (*L. marschallii* Steven) – **Плевел многолетний**. На сухих южных склонах, у дорог, часто. **ERL**.
- Lophochloa cristata* (L.) Hyl. = *Rostraria cristata* – **Лофохлоа гребенчатая**. Каменистые осыпи, изредка.
- Melica monticola* Prokud. (*M. ciliata* L. ssp. *monticola* (Prokud.) Tzvelev, *M. taurica* ssp. *monticola* (Prokud.) Prokud.) – **Перловник горный**. На каменистых склонах яйл, обычно.
- Melica nutans* L. – **Перловник понижающий**. В лесах и на полянах, часто.
- Melica taurica* K.Koch (#*M. ciliata* ssp. *micrantha* (Boiss. & Hohen.) Soják, *M. ciliata* L. ssp. *taurica* (K.Koch) Tzvelev, #*M. micrantha* Boiss. & Hohen., #*M. transsilvanica* ssp. *micrantha* (Boiss. & Hohen.) K.Richt.) – **Перловник крымский**. На открытых луговинах, среди кустарников, обычно.
- Melica transsilvanica* Schur (*M. ciliata* L. ssp. *transsilvanica* (Schur) Čelak) – **Перловник трансильванский**. На каменистых местах в лесу, на полянах, обычно.
- Millium effusum* L. – **Бор развесистый**. В лесах, на полянах, обычно.
- Nardurus krausei* (Regel) V.Krecz. & Bobrov (*Nardurus tenuiflorus* (Schrad.) Boiss.) = *Nardurus krausei* – **Белоусник тонкоцветковый**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Phleum montanum* K.Koch (*Ph. phleoides* (L.) H.Karst. ssp. *montanum* (K.Koch) Tzvelev) – **Тимофеевка горная**. На каменистых склонах и скалах, обычно.
- Phleum nodosum* L. (*Phleum bertolonii* DC.) – **Тимофеевка узловатая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Phleum paniculatum* Huds. (#*Ph. annuum* M.Bieb., #*Ph. asperum* ssp. *annuum* (M.Bieb.) K.Richt., #*Ph. asperum* var. *ciliatum* Boiss., #*Ph. boissieri* auct., #*Ph. paniculatum* ssp. *annuum* (M.Bieb.) Holub., #*Ph. paniculatum* ssp. *ciliatum* (Boiss.) M.Dogan) – **Тимофеевка метельчатая**. На сухих каменистых склонах, обычно.
- Phleum phleoides* (L.) H.Karst. (#*Ph. boehmeri* Wib., #*Ph. laeve* M.Bieb.) – **Тимофеевка степная**. В лесу, на полянах и луговинах яйлы, обычно.
- Phleum pratense* L. (*Ph. nodosum* L., *Ph. pratense* L. ssp. *nodosum* (L.) Arcang.) – **Тимофеевка луговая**. На лесных опушках, среди кустарников, у дорог, изредка.
- Phleum subulatum* (Savi) Asch. et Graebn. (*Phleum tenue* (Host) Schrad.) = *Phleum subulatum* – **Тимофеевка шиловидная**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. (*Arundo australis* Cav., *A. phragmites* L., *P. communis* Trin.) – **Тростник южный**. По берегам болотцев, обычно. **ERL**.
- Piptatherum holciforme* (M.Bieb.) Roem. & Schult. (*Oryzopsis holciformis* (M.Bieb.) Hack, #*O. kopetdagensis* Roshev., #*P. karataviense* Roshev.) – **Ломкоостник бухарниковидный**. На каменистых склонах, обычно.
- Piptatherum virescens* (Trin.) Boiss. (*Oryzopsis virescens* (Trin.) G.Beck) – **Ломкоостник зеленоватый**. В лесу, на полянах, в поймах, часто.
- Poa angustifolia* L. (*P. pratensis* L. ssp. *angustifolia* (L.) Gaudin., #*P. pratensis* ssp. *angustifolia* (L.) Arcang., #*P. pratensis* ssp. *angustifolia* (L.) Lindb. fil., #*P. setacea* Hoffm., *P. strigosa* Hoffm., *P. viridula* Palib.) – **Мятлик узколистный**. В светлых лесах, на полянах, яйле, обычно.
- Poa annua* L. – **Мятлик однолетний**. На лугах, вдоль дорог, обычно.

- Poa bulbosa* L. (#*P. bulbosa* ssp. *pseudoconcinna* (Schur) Jir., #*P. pseudoconcinna* Schur) – **Мятлик луковичный**. Остепненные поляны, у дорог, обычно.
- Poa compressa* L. – **Мятлик сплюснутый**. На каменистых склонах, в верхнем поясе, часто.
- Poa fagetorum* P.Smirn. (*P. longifolia* Trin. ssp. *fagetorum* (P.Smirn.) Tzvelev) – **Мятлик буковый**. На горных каменистых склонах, в разреженных лесах, часто.
- Poa nemoralis* L. – **Мятлик лесной**. В лесах и на полянах, изредка.
- Poa pratensis* L. (#*P. angustifolia* var. *angustiglumis* (Roshev.) Worosch., #*P. angustiglumis* Roshev., #*P. articulata* Ovcz., #*P. garanica* Ikonn., #*P. maydelii* Roshev., #*P. pinegensis* Roshev., #*P. pratensis* ssp. *angustiglumis* (Roshev.) Tzvel., #*P. pratensis* var. *angustiglumis* (Roshev.) Bondar., #*P. subglabriflora* Roshev., #*P. urjanichaica* Roshev.) – **Мятлик луговой**. На лугах и лесных полянах, обычно. **ERL**.
- Poa sterilis* M.Bieb. (#*Festuca asperrima* Link) – **Мятлик бесплодный**. На сухих каменистых склонах, в светлых лесах, обычно.
- Poa sylvicola* Guss. (*P. trivialis* L. ssp. *sylvicola* (Guss.) Lindb.f.) – **Мятлик дубравный**. В лесах, поймах рек, у дорог, изредка.
- Poa taurica* H. Pojark. – **Мятлик крымский**. Можжевельниковые и крымскососновые леса, саванноиды, степи, топиляры, каменистые обнажения, изредка.
- Polypogon viridis* (Gouan) Breist. (*P. semiverticillatus* (Forssk.) Hyl., #*A. semiverticillata* (Forssk.) C. Christ., #*A. verticillata* Vill., #*A. viridis* Gouan, *Nowodworskya semiverticillata* (Forssk.) Nevski, #*N. verticillata* (Vill.) Nevski, *Phalaris semiverticillata* Forssk.) – **Многобородник зеленый**. У дороги, изредка.
- Psilurus aristatus* (L.) Lange = *Psilurus incurvus* – **Мелкохвостник согнутоколосый**. Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.
- Sclerochloa dura* (L.) P.Beauv. – **Жесткоколосница твердая**. Каменистые осыпи, у дорог, обычно.
- Scleropoa rigida* (L.) Griseb. (*Catapodium rigidum* (L.) Hubbard ex Dony, *Desmazeria rigida* (L.) Tutin ex Clapham) – **Жесткомятлик жесткий**. По сухим склонам, у дорог, изредка.
- Sieglingia decumbens* (L.) Bernh. (*Danthonia decumbens* (L.) DC.) – **Зиглингия лежачая**. На луговинах яйлы, обычно.
- Stipa lithophila* P.Smirn. (#*S. eriocaulis* Borb. ssp. *lithophila* (P.Smirn.) Tzvelev, #*S. pennata* ssp. *lithophila* (P. Smirn.) Martinovsky) – **Ковыль камнелюбивый**. На каменистых склонах, на яйлах, изредка. Э.
- Stipa oreades* Klokov ( *S. pulcherrima* K.Koch s.l., incl., *S. glabrinoda* Klokov, *S. oreades* Klokov var. *glabrinoda* (Klokov) Dubovik) – **Ковыль горный**. Горные степи, редко.
- Stipa pulcherrima* K.Koch (*S. grafiana* Steven, #*S. pennata* ssp. *grafiana* (Stev.) K.Richt., #*S. pennata* ssp. *pulcherrima* (C. Koch) A. & D.Love, #*S. pennata* ssp. *pulcherrima* (C. Koch) Freitag, comb. superfl., #*S. pulcherrima* ssp. *grafiana* (Stev.) Pacz.) – **Ковыль красивейший**. На опушках и каменистых склонах, обычно. **ККРФ**.
- Stipa tirsia* Steven (#*S. longifolia* Borbás, *S. stenophylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv., #*S. cerariorum* Panc., #*S. longifolia* Borb., #*S. pennata stenophylla* Lindem., #*S. stenophylla* (Lindem.) Trautv.) – **Ковыль узколистный, тырса**. На горных луговинах и в нижней зоне, обычно. **ERL**.
- Taeniatherum asperum* (Simonk.) Nevski [*Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski subsp. *asperum* (Simonk.) Melderis] = *Taeniatherum asperum*, [*Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski subsp. *crinitum* (Schreb.) Melderis] = *Taeniatherum crinitum* –

**Лентоостник шероховатый.** Саванноиды, каменистые осыпи, редко.

*Taeniatherum crinitum* (Simonk.) Nevski (#*Elymus caput-medusae* ssp. *crinitus* (Schreb.) Maire & Weiller, #*Hordelymus caput-medusae* ssp. *crinitum* (Scherb.) Pignatti, *T. caput-medusae* ssp. *crinitum* (Schreb.) Melderis., #*T. caput-medusae* var. *crinitum* (Schreber) C. J. Humphries) – **Лентоостник длинноволосый.** На открытых каменистых склонах, редко.

*Trachynia distachya* (L.) Link – **Трахиния двухколосковая.** Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.

*Ventenata dubia* (Leers) Coss. (*Avena dubia* Leers) – **Вентената сомнительная.** На сухих склонах, обычно.

*Vulpia myuros* (L.) C. C. Gmel. – **Вульпия мышехвостник.** Саванноиды, каменистые осыпи, изредка.

*Zea mays* L. (*Zerna benekenii* (Lange) Lindm. = *Bromopsis benekenii*, *Zerna inermis* (Leys.) Lindm) = *Bromopsis inermis* – **Зерна Бенекена (з. безостая).** Лиственные леса, луга и каменистые осыпи, обычно.

### **Polygalaceae R. Br. – Истодовые**

*Polygala anatolica* Boiss. & Heldr. (*P. major* Jacq. var. *anatolica* (Boiss. & Heldr.) Schmalh.) – **Истод анатолийский.** На горных склонах, в светлых лесах, на полянах, редко.

*Polygala andrachnoides* Willd. – **Истод андрахновидный.** На поляне, изредка.

*Polygala major* Jacq. – **Истод большой.** Можжевеловые, крымскососновые леса, степи, томиляры, каменистые обнажения, часто.

### **Polygonaceae Juss. – Гречишные**

*Bistorta officinalis* Delarble (*Polygonum bistorta* L.) – **Горец зменный (рачьи шейки).** На луговинах яйлы и у верхней границы леса, обычно.

*Fallopia convolvulus* (L.) A.Löve (*Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort., #*Fagopyrum convolvulus* (L.) H. Gross, *Polygonum convolvulus* L., #*Reynoutria convolvulus* (L.) Shinners) – **Фаллопия вьюнковая.** На остепненных полянах, сорное в посевах, у дорог, часто. **А.**

*Fallopia dumetorum* (L.) Holub (*Bilderdykia dumetorum* (L.) Dumort., #*Fagopyrum dumetorum* (L.) Schreb., *Polygonum dumetorum* L., #*Reynoutria scandens* ssp. *dumetorum* (L.) Shinners) – **Фаллопия кустарниковая.** В дубовых, буковых лесах, среди кустарников, сорное в посевах, изредка.

*Polygonum aviculare* L. (#*P. aviculare* ssp. *heterophyllum* (Lindm.) Asch. & Graebn., #*P. aviculare* ssp. *monspeliense* (Thiebaut ex Pers.) Chrtek, *P. heterophyllum* Lindm., *P. monspeliense* Thiébaud ex Pers.) – **Горец птичий, спорыш.** На полянах, у жилья, редко.

*Polygonum euxinum* Chrtek [*P. lapathifolium* L.] – **Горец щавелелистный.** Луга, изредка.

*Polygonum persicaria* L. – **Горец почечуйный.** Берега ручьев, обычно.

*Rumex confertus* Willd. – **Щавель конский.** Луга, изредка.

*Rumex conglomeratus* Murr. – **Щавель клубковатый.** Во влажных местах, редко.

*Rumex crispus* L. – **Щавель курчавый.** На полянах, вырубках, у дорог, обычно.

*Rumex obtusifolium* L. (ssp. *sylvestris* (Lam.) Čelak. (*R. sylvestris* (Lam.) Wall.) – **Щавель лесной.** На лесных полянах, среди кустарников, у дорог, довольно редко.

*Rumex pulcher* L. – **Щавель красивый.** На каменистых местах, близ дорог в



предгорье, довольно редко.

*Rumex scutatus* L. (*R. alpestris* Jacq., *Acetosa scutata* (L.) Mill.) – **Щавель щитковидный**. На каменистых осыпях и скалах, редко.

*Rumex tuberosus* L. ssp. *turcomanicus* Rech.f. (*R. euxinus* Klokov, *R. tuberosus* L. ssp. *euxinus* (Klokov) Borodina, #*R. turcomanicus* (Rech. f.) Czerep.) – **Щавель клубненосный**. На лесных полянах и каменистых склонах, изредка.

#### **Polypodiaceae Bercht. & Presl. – Многоножковые**

*Polypodium interjectum* Shivas – **Многоножка промежуточная**. Грабовые и буковые леса, на обнажениях, очень редко.

*Polypodium vulgare* L. (#*P. nipponicum* auct., #*P. someyae* auct., #*P. vulgare* ssp. *issaevii* Askerov & A. Bobrov) – **Многоножка обыкновенная**. По всей территории, обычно.

#### **Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые**

*Potamogeton crispus* L. – **Рдест курчавый**. Водоемы, редко.

*Potamogeton natans* L. (*P. morongii* A. Benn.) – **Рдест плавающий**. Лесные болотца, редко.

*Potamogeton nodosus* Poir. – **Рдест узловатый**. Водоемы, изредка.

#### **Primulaceae Vent. – Первоцветные**

*Anagallis arvensis* L. – **Очный цвет пашенный**. На сухих склонах, в посевах, часто.

*Anagallis foeminae* Mill. (*A. arvensis* L. ssp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell., *A. caerulea* Schreb.) – **Очный цвет Фомина**. У дорог, по сухим склонам, обычно.

*Androsace elongata* L. – **Проломник удлиненный**. Сухие склоны, остепненные поляны, в нижней зоне, редко.

*Androsace maxima* L. ssp. *turczaninovii* (Freyn) Fed. (#*A. maxima* L., *A. turchaninovii* Freyn) – **Проломник большой (п. Турчанинова)**. Сухие склоны со степной растительностью, редко.

*Androsace taurica* Ovcz. (\*\**A. villosa* L. ssp. *taurica* (Ovcz.) Fed.) – **Проломник крымский**. На каменистых, остепненных склонах, яйле, обычно. Э.

*Lysimachia nummularia* L. – **Вербеник монетный**. Влажные места, буковый лес, редко. ERL.

*Lysimachia verticillaris* Spreng. (*L. verticillata* M.Bieb.) – **Вербеник мутовчатый**. В сырых, тенистых местах, в кустарниковых зарослях у источников, рек, редко.

*Primula acaulis* (L.) L. (*P. vulgaris* Huds.) – **Первоцвет бесстебельный**. В лесах, на луговинах яйлы, лесных полянах, обычно.

*Primula macrocalyx* Bunge (#*P. inflata* ssp. *macrocalyx* (Bunge) O. Schwarz, *P. veris* L. ssp. *macrocalyx* (Bunge) Ludi) – **Первоцвет крупночашечный**. На яйле, лесных полянах, редко.

*Samolus valerandii* L. – **Самолюс Валеранда**. Каменистые осыпи, редко. ERL.

#### **Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые**

*Moneses uniflora* (L.) A. Gray (*Pyrola uniflora* L.) – **Одноцветка одноцветковая**. В сосновых и смешанных лесах верхнего горного пояса, редко.

*Orthilia secunda* (L.) House (*Pyrola secunda* L., *Ramischia secunda* (L.) Garcke) – **Ортилия однобокая**. В лиственных и сосновых лесах средней и верхней зоны, обычно.

*Pyrola chlorantha* Sw. (#*P. virens* Schweigg., #*P. virescens* auct.) – **Грушанка зеленоцветковая**. В сосновых и лиственных лесах средней и верхней зоны, обычно.

*Pyrola minor* L. (#*P. conferta* Fisch. ex Cham. & Schltdl., #*P. minor* var. *conferta* (Fisch. ex Cham. & Schltdl.) A.P.Khokh) – **Грушанка малая**. В буковых и сосновых лесах, редко.

#### **Ranunculaceae Juss. – Лютиковые**

*Aconitum jacquini* Rchb. (*A. anthora* auct. non L.) – **Аконит Жакена**. На луговинах яйлы, лесных полянах, в верхнем поясе, редко.

*Aconitum lasiostomum* Rchb. – **Аконит шерстистоусый**. На лесных полянах, в верхнем поясе, редко.

*Adonis aestivalis* L. (*A. autumnalis* L., *A. miniata* Besser, *A. squarrosa* Steven) – **Адонис, горцивет летний**. В посевах, на обочинах дорог, обычно.

*Adonis flammea* Jacq. (*A. caudata* Steven) – **Адонис пламенный**. На полянах, огородах, сорное, обычно.

*Adonis vernalis* L. (*Adonanthe vernalis* auct. non L.) – **Адонис весенний**. На яйлах, на полянах в нижней зоне, изредка. **ERL**.

*Batrachium trichophyllum* (Chaix) Bosch (*B. divaricatum* (Schrank) Wimmer, *B. kauffmannii* (Clerc.) V.Krecz., #*B. penicillatum* Dumort., *Ranunculus divaricatum* Schrank, *R. kauffmannii* Clerc., #*R. penicillatus* (Dumort.) Bab., #*R. pseudofluitans* (Syme) Newbould ex Baker & Foggitt, *R. trichophyllum* Chaix) – **Шелковник волосолистный**. В лесных болотцах, изредка.

*Ceratocephala falcata* (L.) Pers. subsp. *incurva* (Steven) Chrtek & Chrtkova – *Ceratocephala incurva* – **Рогоглавник серповидный**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.

*Ceratocephala testiculata* (Crantz) Besser (*C. orthoceras* DC., #*C. reflexa* Steven, *Ranunculus testiquilatus* Crantz, \**R. orthoceras* Benth & Hoorks.) – **Рогоглавник ячковый**. Сухие каменистые склоны и поляны, обычно.

*Clematis integrifolia* L. – **Ломонос цельнолистный**. На яйле, лесных полянах, в верхнем горном поясе, изредка.

*Clematis vitalba* L. – **Ломонос виноградолистный**. В нижней зоне, обычно.

*Consolida orientalis* (J. Gay) Schrodinger (*C. hispanica* (Costa) Greuter & Burdet, #*Delphinium orientale* J.Gay.) – **Живокость восточная**. Остепненные поляны, опушки, вырубки, обычно.

*Consolida paniculata* (Host) Schur (*C. regalis* S.F.Gray ssp. *paniculata* (Host) Soó, #*Delphinium paniculatum* Host.) – **Живокость метельчатая**. На сухих лесных полянах, у дорог, среди кустарников, обычно.

*Delphinium pallasii* Nevski (*D. fissum* auct. non Waldst. & Kit) – **Живокость Палласа**. На лесных полянах, каменистых склонах, осыпях, обычно.

*Ficaria calthifolia* Reichb. – **Чистяк калужницелистный**. Луга, редко.

*Ficaria verna* Huds. aggr. (*Ranunculus ficaria* L.) – **Чистяк весенний**. Тенистые леса, влажные поляны, обычно.

*Myosurus minimus* L. – **Мышехвостник маленький**. Берега водоемов, изредка.

*Nigella damascena* L. – **Чернушка дамасская**. На полянах, среди кустарников, изредка. **A**.

*Pulsatilla taurica* Juz. (\*\**P. halleri* (All.) Willd. ssp. *taurica* (Juz.) K.Krause, *P. litophila* Kotov, *P. halleri* auct.) – **Сон-трава крымская**. В лесах, на полянах, луговинах

яйлы, обычно. Э.

*Ranunculus chius* DC. – **Лютик хиосский**. Саванноиды, очень редко.

*Ranunculus constantinopolitanus* (DC.) D'Urv. (*R. villosus* DC. Ssp. *constantinopolitanus* (DC.) A.Jelen.) – **Лютик константинопольский**. В лиственных лесах, часто.

*Ranunculus crimaeus* Juz. (*R. brutius* auct. non Ten., #\*\**R. brutius* ssp. *crimaeus* (Juz.) Jelen.) – **Лютик крымский**. В тенистых лесах и на полянах, в верхнем горном поясе, редко. Э.

*Ranunculus dissectus* M.Bieb. – **Лютик раздельный**. На каменистых склонах, луговинах яйлы, в лесах на границе с яйлой, обычно. Э.

*Ranunculus illyricus* L. (#*R. alexeenkoi* Grossh., *R. meridionalis* Grossh.) – **Лютик иллирийский**. На яйле, южных каменистых склонах, обычно.

*Ranunculus muricatus* L. – **Лютик мягкоигольчатый**. Берега ручьев, обычно.

*Ranunculus neapolitanus* Ten. – **Лютик неаполитанский**. Сухие поляны нижней зоны, редко.

*Ranunculus ophioglossifolius* Vill. – **Лютик ужовниколистный**. Берега ручьев, редко.

*Ranunculus oreophilus* M.Bieb. (#*R. acutidentatus* Rupr., #*R. acutilobus* Ledeb., #*R. makaschwilii* Kem.-Nath.) – **Лютик горный**. На луговинах яйлы, обычно.

*Ranunculus oxyspermus* Willd. – **Лютик остроплодный**. На сухих склонах, полянах, как сорное в посевах, часто.

*Ranunculus pavlii* (A.Jelen. & Derviz-Sokolova) Tzvelev (*R. caucasicus* auct. non M.Bieb., \*\**R. caucasicus* M.Bieb. ssp. *pavlii* A.Jelen. & Derviz-Sokolova) – **Лютик Павла**. В лесах и на полянах, в верхнем горном поясе, редко. Э.

*Ranunculus pedatus* Waldst. et. Kit. – **Лютик стоповидный**. Саванноиды, каменистые осыпи, очень редко.

*Ranunculus polyanthemos* L. – **Лютик многоцветковый**. На лесных полянах, склонах яйлы, сорное у дорог, жилья, часто.

*Ranunculus pseudoacris* Tzvelev (*R. pseudobulbosus* Schur) – **Лютик ложноклубненосный**. Берега ручьев, редко.

*Ranunculus repens* L. – **Лютик ползучий**. Влажные луга, обычно.

*Ranunculus sceleratus* L. (#*R. dolosus* Fisch. & C.A.Mey.) – **Лютик ядовитый**. По берегам лесных болотцев, редко.

*Ranunculus trachycarpus* Fisch. et C. A. Mey – **Лютик ворсинчатоплодный**. Берега ручьев, очень редко.

*Thalictrum minus* L. (*T. angustifolium* Besser, non L., #*T. collinum* Wallr., *T. flexuosum* Bernh. ex Rchb., #*T. kochii* auct., *T. transsilvanicum* Schur) – **Василисник малый**. В лесах, на полянах и яйле, в верхнем горном поясе, обычно.

### Resedaceae S.F. Gray – Резедовые

*Reseda lutea* L. – **Резеда желтая**. На пустырях, у дорог и жилья, обычно.

*Reseda luteola* L. – **Резеда желтенькая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, довольно обычно.

### Rhamnaceae Juss – Крушиновые

*Frangula alnus* Mill. (*Rhamnus frangula* L.) – **Крушина ольховидная**. В лесах, среди кустарников, изредка, обычно.

*Paliurus spina-christi* Mill. – **Держи-дерево колючее**. Можжевеловые и пушистодубовые леса, саванноиды, часто.

*Rhamnus cathartica* L. – **Жостер слабительный**. На сухих каменистых склонах, в

лесах, изредка, обычно.

### **Rosaceae Juss. – Розоцветные**

- Agrimonia eupatoria* L. (*A. adscendens* Andrz., *A. officinalis* Lam. ex Poir.) – **Репейничек лекарственный**. В лесах, на полянах, среди кустарников, обычно.
- Alchemilla camptopoda* Juz. – **Манжетка изогнуточерешковая**. Луга, редко. Э.
- Alchemilla crebridens* Juz. – **Манжетка частозубчатая**. Луга, редко. Э.
- Alchemilla exsanguis* Juz. – **Манжетка бескровная**. Растёт по лесам, лугам, лесным опушкам, изредка. Э.
- Alchemilla exuens* Juz. – **Манжетка сбрасывающая**. На яйле, редко. Э.
- Alchemilla hebescens* Juz. – **Манжетка притупляющаяся**. Луга, редко.
- Alchemilla hirsutissima* Juz. – **Манжетка самая-жестковолосистая**. На каменистых склонах, редко. Э.
- Alchemilla imberbis* Juz – **Манжетка безбородая**. Луга, редко. Э.
- Alchemilla jailae* Juz. – **Манжетка яйлинская**. На яйле, обычно. Э.
- Alchemilla languescens* Juz. – **Манжетка слабеющая, м. Стевена**. Луга, редко. Э.
- Alchemilla lithophila* Juz. – **Манжетка камнелюбивая**. На яйле, обычно. Э.
- Alchemilla nemoralis* Alech – **Манжетка дубравная**. Луга, редко.
- Alchemilla supina* Juz. – **Манжетка низкая**. На приайлинских склонах, яйле. Э.
- Alchemilla taurica* Juz. – **Манжетка крымская**. На лесных опушках верхнего пояса и на яйле, обычно. Э.
- Alchemilla tythantha* Juz. (#*A. multiflora* Buser ex Rothm.) – **Манжетка мелкоцветковая**. На яйле, лесных полянах, горных луговинах, обычно. Э.
- Alchemilla vinacea* Juz. – **Манжетка винная**. Луга, редко. Э.
- Amelanchier ovalis* Medik. (*A. rotundifolia* (Lam.) Dui.-Cours., nom. illeg., *A. vulgaris* Moench, #*Crataegus rotundifolia* Lam.) – **Ирга круглолистная**. На лесных полянах, в светлых лесах, осыпях, изредка.
- Cerasus avium* (L.) Moench (*Prunus avium* L.) – **Вишня птичья, черешня**. В смешанных лиственных лесах, редко.
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. (*Padellus mahaleb* (L.) Vass.) – **Вишня антипка, магалепка**. На полянах и крутых склонах, редко.
- Cotoneaster integerrimus* Medik. – **Кизильник цельнокрайний**. На каменистых склонах, осыпях, яйлах, изредка.
- Cotoneaster tauricus* Pojark – **Кизильник крымский**. В сосновых лесах, на полянах, яйле, изредка.
- Crataegus curvisepala* Lindm. (#*C. calycina* ssp. *curvisepala* (Lindm.) Franco, #*C. kyrtostyla* auct., #*C. monogyna* ssp. *curvisepala* (Lindm.) Soó, #*C. oxyacantha* L., #*C. pseudokyrtostyla* Klokov) – **Боярышник отогнуточашелистиковый**. В подлеске, на полянах и опушках, обычно.
- Crataegus dipyrena* Pojark. – **Боярышник двукосточковый**. Лиственные леса, изредка.
- Crataegus microphylla* K. Koch. – **Боярышник мелколистный**. В подлеске светлых лесов и на опушках, обычно.
- Crataegus orientalis* Pall. ex M.Bieb. (#*C. laciniata* auct. p.p.) – **Боярышник восточный**. В лесах и на полянах, обычно. Э.
- Crataegus pallasii* Griseb. (*C. stevenii* Pojark., #*C. beckeriana* Pojark.) – **Боярышник Палласа**. На сухих склонах, опушках, обычно.
- Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit. (#*C. colchica* Grossh., #*C. klokovii* Ivaschin, #*C.*

- melanocarpa* M.Bieb.) – **Боярышник пятипестичный**. В дубовых и буковых лесах, на опушках, обычно.
- Filipendula vulgaris* Moench (*F. hexapetala* Gilib., nom. inval.) – **Лабазник обыкновенный**. На полянах, лесных опушках, на яйле, часто.
- Fragaria campestris* Stev. – **Земляника равнинная**. Степи и луга, изредка.
- Fragaria vesca* L. – **Земляника лесная**. На полянах, вырубках, опушках, изредка.  
**ERL.**
- Fragaria viridis* Duchesne (*F. collina* Ehrh.) – **Земляника зеленая, полуница**. На полянах, лесных опушках, на яйле, изредка. **ERL.**
- Geum urbanum* L. (#*G. rivale* ssp. *urbanum* (L.) A.Löve & D.Löve) – **Гравилат городской**. Среди кустарников, на опушках, у дорог, обычно.
- Malus praecox* (Pall.) Borkh. (#*M. sylvestris* Mill. ssp. *praecox* (Pall.) Soò, *M. sylvestris* Mill. var. *praecox* (Pall.) Ponomarenko) – **Яблоня лесная ранняя**. На опушках и полянах, у дорог, обычно.
- Mespilus germanica* L. – **Мушмула германская**. В сосновых лесах, на опушках южного макросклона, изредка.
- Potentilla alba* L. – **Лапчатка белая**. Крымскососновые леса, очень редко.
- Potentilla angustifolia* DC. – **Лапчатка узколистная**. Степи и томиляры, обычно.
- Potentilla argentea* L. – **Лапчатка серебристая**. На открытых склонах, остепненных полянах, изредка.
- Potentilla astracanicus* Jacq. (#*P. bornmuelleri* Borbas, #*P. mollicrinis* (Borbas) Stankov) – **Лапчатка астраханская**. На сухих открытых склонах, у дорог, изредка.
- Potentilla canescens* Besser (#*P. adscendens* Waldst. & Kit. ex Willd., #*P. inclinata* auct. p.p.) – **Лапчатка серая**. На лесных полянах, изредка.
- Potentilla depressa* Willd. ex Schlecht. – **Лапчатка прижатая**. На каменистых склонах, на яйле, в лесах на южном макросклоне, часто. Э.
- Potentilla geoides* M.Bieb. – **Лапчатка гравилатовидная**. На скалах и сухих каменистых склонах, на яйле, обычно.
- Potentilla laeta* Reichb. – **Лапчатка веселая**. Саванноиды, каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Potentilla pedata* Nestl. – **Лапчатка стоповидная**. Можжевельниковые леса, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Potentilla recta* L. (*P. sulphurea* Lam.) – **Лапчатка прямая**. На сухих склонах, по всей территории, обычно.
- Potentilla reptans* L. – **Лапчатка ползучая**. На сырых полянах, довольно редко.
- Potentilla semilaciniosa* Borbás (#*P. recta* L. ssp. *semilaciniosa* (Borb.) Jav.) – **Лапчатка полундрезанная**. Каменистые склоны в смешанных лесах, изредка.
- Poterium polygamum* Waldst. & Kit. (*P. sanguisorba* L. ssp. *polygamum* (Waldst. & Kit.) Simonk., *Sanguisorba minor* Scop. ssp. *polygama* (Waldst. & Kit.) Holub) – **Черноголовник многобрачный**. На сухих склонах, лесных полянах, среди кустарников, часто.
- Prunus spinosa* L. – **Слива колючая, терн**. На лесных полянах, обычно.
- Pyracantha coccinea* (L.) M.Roem. – **Пираканта красная**. В светлых смешанных лесах, у дорог на южном макросклоне, обычно.
- Pyrus communis* L. – **Груша обыкновенная**. В лесах, на полянах, шиферных склонах, обычно. А.
- Pyrus elaeagnifolia* Pall. – **Груша лохолистная**. На каменистых сухих склонах, лесных полянах, по всей территории, часто.

- Rosa canina* L. (*R. arguta* Steven, *R. armata* Steven, *R. calycina* M.Bieb., *R. ciliato-sepala* Błonski, *R. glauca* Schott. & Besser, non Pourr., *R. kosinskiana* Besser) – **Роза (шиповник) собачья**. На лесных полянах, травянистых склонах, у дорог, обычно.
- Rosa corymbifera* Borkh. (*R. collina* M.Bieb., *R. friedlaendriana* Besser, *R. kalmiussica* Chrshan. & Laseb., *R. montana* Steven ex Besser, *R. saxatilis* Steven, *R. taurica* M.Bieb., *R. wittmanii* Heinr. Braun) – **Роза щитконосная**. Среди кустарников, на лесных опушках, обычно.
- Rosa jundzillii* Besser (*R. glandulosa* auct. non Besser, *R. jundzilliana* Besser, *R. trachyphylla* Rau) – **Роза Юндзилла**. Степные биотопы, редко.
- Rosa micrantha* Smith. – **Роза мелкоцветковая**. На лесных полянах, каменистых склонах, у дорог, редко.
- Rosa rubiginosa* L. – **Роза ржаво-красная**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Rosa spinosissima* L. (*R. micrantha* Besser, #*R. pimpinellifolia* L.) – **Роза колючейшая**. На луговинах яйлы, каменистых склонах, обычно.
- Rosa tomentosa* Smith – **Роза войлочная**. Каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Rosa tschatyrdagi* Chrshan. – **Роза Чатырдага**. На лесных полянах, яйлах, у дорог, обычно.
- Rosa turcica* Rouy (*R. horrida* Fisch. ex Stép. 1872 non Spreng.) – **Роза турецкая**. Среди кустарников, изредка.
- Rubus anatolicus* (Focke) Focke ex Hausskn. (#*R. sanguineus* auct.) – **Ежевика анатолийская**. На опушках, открытых каменистых склонах, изредка.
- Rubus caesius* L. – **Ежевика сизая**. В светлых лесах на полянах, у дорог, жилья, обычно.
- Rubus canescens* DC. (*R. tomentosus* auct. non Borkh.) – **Ежевика войлочная**. На лесосеках, у дорог, в кустарниковых зарослях, обычно.
- Rubus crimaeus* Juz. (*R. aipetrensis* Juz., *R. eurythyrsiger* Juz.) – **Ежевика крымская**. Крымскососновые леса, каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Rubus idaeus* L. – **Малина обыкновенная**. На опушках, вырубках, у дорог, редко. **А.**
- Rubus paratauricus* Juz. – **Ежевика сходно-таврическая**. Крымскососновые леса, прогалины, лесосеки; в районе Учан-Су, изредка.
- Rubus saxatilis* L. – **Костяника**. В лесах, на приайлинских склонах, на яйле, редко.
- Rubus tauricus* Schlecht. ex Juz. – **Ежевика таврическая**. В светлых лесах, на полянах, обычно.
- Sanguisorba taurica* Juz. (*S. officinalis* L.) – **Кровохлебка лекарственная**. На южных каменистых склонах, луговинах яйлы, редко.
- Sorbus aucuparia* L. (#*S. caucasigena* Kom. ex Gatsch.) – **Рябина обыкновенная**. В лесах и на полянах в верхнем поясе, обычно.
- Sorbus domestica* L. – **Рябина крупноплодная**. В лесах и среди кустарников, в нижней зоне, обычно.
- Sorbus graeca* (Spach) Lodd. ex Schauer (#*S. baldaccii* (Degen & Fritsch ex C.K. Schneid.) Zins, #*S. umbellata* var. *cretica* auct. p.p.) – **Рябина греческая**. На каменистых осыпях, скалах, в лесах, часто.
- Sorbus roopiana* Bordz. (*S. dualis* Zinserl.) – **Рябина Роопа**. В верхнем лесном поясе на границе с яйлой, редко.
- Sorbus tauricola* Zaikonn. (*S. pseudolatifolia* K.Pop. 1959, non Boros 1937) – **Рябина крымская**. На каменистых склонах, в смешанных лесах у верхней границы леса, редко. **Э.**

*Sorbus torminalis* (L.) Crantz. – **Берека лечебная (рябина берека, глодовина)**. В буковых и смешанных лесах, изредка.

### **Rubiaceae Juss. – Мареновые**

- Asperula arvensis* L. – **Ясменник полевой**. Каменистые осыпи, редко.
- Asperula caespitans* Juz. (*A. transhelii* Klokov) – **Ясменник дернистый**. На каменистых склонах, осыпях, скалистых обнажениях, яйле, обычно.
- Asperula galioides* M. Bieb., nom. illeg. = *Galium biebersteinii* – **Ясменник подмаренниковый**. Можжевеловые, крымскососновые, пушистодубовые леса, саванноиды, каменистые обнажения, обычно.
- Asperula humifusa* (M.Bieb.) Besser = *Galium humifusum* – **Ясменник распростертый**. Каменистые обнажения и осыпи, обычно.
- Asperula odorata* L. = *Galium odoratum* – **Ясменник душистый**. Буковые, грабовые леса, леса из сосны, обычно.
- Asperula propinqua* Pobed – **Ясменник близкий**. Буковые леса, редко.
- Asperula stevenii* V.Krecz. (*A. cynanchica* L. var. *elongata* Steven, #*A. tenella* Heuff. ex Degen, *A. maeotica* M.Pop. & Chrshan.) – **Ясменник Стевена**. На щебнистых и каменистых обрывах, обычно.
- Asperula taurica* Pacz. – **Ясменник крымский**. На сухих каменистых склонах и осыпях, изредка.
- Asperula tauroscythica* Klokov ~ *Asperula taurica* – **Ясменник крымскоскифский**. Крымскососновые леса каменистые обнажения, редко.
- Asperula vestita* auct. non V. Krecz. (*Asperula kotovii*) – **Ясменник шерстеносный**. Леса из сосны Сосновского, редко.
- Crucianella angustifolia* L. (*C. oxyloba* Janka) – **Крестовница узколистная**. На сухих склонах со степной растительностью, обычно.
- Crucianella catellata* Klokov – **Крестовница цепочная**. Можжевеловые леса, саванноиды, каменистые осыпи, редко.
- Galium aparine* L. – **Подмаренник цепкий**. В лесах, среди кустарников, обычно.
- Galium cruciata* (L.) Scop. – **Подмаренник крестообразный**. Луга, редко.
- Galium elongatum* C.Presl (*G. maximum* G.Moris, *G. palustre* L. ssp. *elongatum* (C.Presl.) Lange) – **Подмаренник вытянутый**. У лесных болотцев, редко.
- Galium mollugo* L. (*G. erectum* auct. non Huds., #*G. tyrolense* Willd.) – **Подмаренник мягкий**. В лесах, на полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- Galium pedemontanum* All. = *Cruciata pedemontana* – **Подмаренник пьемонтский**. Сосновые леса, каменистые обнажения и осыпи, редко.
- Galium rubioides* L. (*G. articulatum* Lam., #*G. dasypodum* Klokov) – **Подмаренник мареновидный**. На лесных полянах, опушках, у лесных дорог, обычно.
- Galium tauricum* (Pall. ex Willd) Roem. et Schult. = *Cruciata taurica* – **Подмаренник крымский**. Хвойные леса, степи, томиляры, каменистые обнажения, обычно.
- Galium tenuissimum* M.Bieb. – **Подмаренник тончайший**. На сухих каменистых склонах, полянах, у дорог, обычно.
- Galium verticillatum* Danth. – **Подмаренник мутовчатый**. На лесных полянах, среди кустарников, сухих склонах, редко.
- Galium verum* L. – **Подмаренник настоящий**. В разреженных лесах, на полянах, луговинах яйлы, часто.
- Sherardia arvensis* L. – **Жерардия полевая**. На сухих склонах, среди кустарников, обычно.

### Ruscaceae – Иглицевые

*Ruscus hypoglossum* L. {*Ruscus hypoglossum* auct. non L.} = *Ruscus colchicus* – **Иглица подъязычная**. Дубовые леса, редко (только возле Ливадийского лесничества).

*Ruscus ponticus* Woronow ex Grossh. ~ *Ruscus aculeatus* – **Иглица понтийская**. Можжевельниковые, крымскососновые, дубовые леса, часто.

### Rutaceae Juss. – Рутовые

*Dictamnus gymnostylis* Steven – **Ясенец голостолбиковый**. В лесах, среди кустарников, по всей территории, особенно на южном макросклоне, обычно.

*Haplophyllum suaveolens* (DC.) G.Don f. (*H. ciliatum* Griseb.) – **Цельнолистник душистый**. На каменистых, щебнистых склонах, осыпях, изредка.

*Ruta divaricata* Ten. – **Рута раскидистая**. Можжевельниковые леса, саванноиды, каменистые обнажения, изредка.

### Salicaceae Mirb. – Ивовые

*Populus alba* L. – **Тополь серебристый**. Берега ручьев, часто.

*Populus nigra* L. – **Тополь черный**. Берега ручьев, обычно.

*Populus tremula* L. (*P. pseudotremula* N.I.Rubtzov) – **Осина обыкновенная**. В буковых и дубовых лесах единично, по берегам водоемов и рек, заросли, обычно.

*Salix alba* L. (*S. vitellina* L.) – **Ива белая**. Берега озер, рек, ручьев, обычно.

*Salix caprea* L. (#*S. bakko* Kimura, #*S. coaetanea* (Hartm.) Flod., #*S. Hultenii* Flod.) – **Ива козья**. Берега озер, рек, ручьев, изредка.

*Salix cinerea* L. (#*S. deserticola* Goerz ex Pavlov, #*S. phlomoides* M.Bieb. p.p.) – **Ива серая**. Берега ручьев, изредка.

*Salix purpurea* L. (#*S. caesifolia* Drobow) – **Ива пурпуровая**. Берега ручьев, обычно.

### Santalaceae R.Br. – Санталовые

*Thesium brachyphyllum* Boiss. – **Ленец коротколистный**. На каменистых склонах, изредка.

*Thesium procumbens* C.A.Mey (*Thesium ramosum* Haune) – **Ленец ветвистый**. Крымскососновые леса, саванноиды, обычно.

### Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые

*Saxifraga irrigua* M.Bieb. – **Камнеломка орошенная**. В сырых затененных местах, по каменистым склонам, обычно.

*Saxifraga tridactylites* L. – **Камнеломка трехпальчатая**. На сухих каменистых полянах, склонах, обычно.

### Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые

*Antirrhinum majus* L. (*Antirrhinum minus* L.) = *Chaenorrhinum minus* [*Antirrhinum orontium* L.] = *Misopates orontium* (*Antirrhinum spurium* L.) = *Kickxia spuria* – **Львиный зев садовый**. Каменистые обнажения, редко. А.

*Celsia orientalis* L. = *Verbascum orientale* – **Цельзия восточная**. Каменистые осыпи, изредка.

*Euphrasia irenae* Juz. (#*E. liburnica* auct. p.p., *E. tatarica* auct. non Fisch. ex Spreng.) – **Очанка Ирены**. На сухих склонах, лесных полянах, на яйле, обычно.

*Euphrasia taurica* Ganesch. ex Popl. – **Очанка крымская**. На скалистых склонах яйлы



- и каменистых обнажениях, обычно. Э.
- Gratiola officinalis* L. – **Авран лекарственный**. На влажных местах, в нижней зоне, редко. **ERL**.
- Lathraea squamaria* L. – **Петров крест чешуйчатый**. В лесах, паразитирует на лещине, ольхе, изредка.
- Linaria genistifolia* (L.) Mill. (*Antirrhinum genistifolium* L., #*L. caucasigena* Kem.-Nath., #*L. iberica* Kem.-Nath., #*L. imerethica* Kem.-Nath., #*L. kantschavelii* Kem.-Nath., *L. pontica* Kuprian., *L. scenoreina* Juz.) – **Льянка дроколистная**. На каменистых склонах, полянах, у дорог, обычно.
- Linaria petraea* Steven = *Linaria sypspirensis* – **Льянка каменная**. Каменистые обнажения и осыпи, изредка.
- Linaria simplex* (Willd.) DC. – **Льянка простая**. Каменистые обнажения, обычно.
- Linaria vulgaris* Mill. – **Льянка обыкновенная**. Каменистые осыпи, обычно.
- Melampyrum argyrocotum* Fisch. ex Koso.- Pol. (#*M. arvense* var. *argyrocotum* Fisch. ex Ledeb.) – **Марьянник серебристоохлатый**. На лесных полянах, очень редко.
- Melampyrum arvense* L. (#*M. arvense* ssp. *aestivum* Govor., #*M. arvense* ssp. *pseudobarbatum* (Schur) Ronniger, #*M. arvense* var. *pseudobarbatum* Schur, #*M. arvense* ssp. *vernum* Govor., #*M. pseudobarbatum* (Schur) Schur) – **Марьянник полевой**. На лесных полянах, в светлых лесах, на луговинах яйлы, обычно.
- Odontites glutinosus* (M.Bieb.) Benth. = *Macrosyringium glutinosum* – **Зубчатка клейкая**. Степи и томиляры, довольно редко.
- Odontites luteus* (L.) Clairv. (*Orphantha lutea* (L.) A. Kerner ex Wettst.) – **Зубчатка (Органта) желтая**. На луговых и степных склонах, довольно редко.
- Odontites vulgaris* Moench (*O. serotinus* Dumort., #*E. rubra* Baumg. nom. illeg., *O. rubra* (Baumg.) Opiz, nom. illeg., #*O. rubra* Gilib. nom. inval., *Euphrasia serotina* Lam., nom. illeg., #*O. verna* ssp. *serotina* (Dumort.) Corb.) – **Зубчатка обыкновенная**. На лесных сухих полянах, среди кустарников, обычно.
- Pedicularis sibthorpii* Boiss. – **Мытник Сибторпа**. На лесных полянах, травянистых склонах в светлых лесах, на яйле, довольно обычно.
- Rhinanthus aestivalis* (N.Zinger) Schischk. & Serg. (*Alectorolophus aestivalis* N.Zinger, #*Rh. angustifolius* ssp. *aestivalis* (N.W.Zinger) Soó, #*Rh. angustifolius* var. *aestivalis* (N.W.Zinger) E.Mayer, *Rh. angustifolius* ssp. *grandiflorus* (Wallr.) D.A.Webb, p.p., #*Rh. grandiflorus* ssp. *aestivalis* (N.W.Zinger) Soó, #*Rh. serotinus* ssp. *aestivalis* (N.W.Zinger) Dostál, #*Rh. vernalis* ssp. *aestivalis* (N.W.Zinger) Ivanina) – **Погремок летний**. На луговинах яйлы, на склонах и в лесах, в среднем и верхнем поясе, обычно.
- Rhinanthus vassilzenkoi* Ivanina & Karasjuk (*Rh. mediterraneus* auct. non (Sterneck) Adamov) – **Погремок Вассильченкой**. На горных склонах, редко.
- Scrophularia bicolor* Smith (*S. canina* auct. non L., #*S. canina* ssp. *bicolor* (Sm.) Greuter) – **Норичник двуцветный**. На каменистых, сухих полянах, у дорог, редко.
- Scrophularia exilis* Popl. – **Норичник тонкий**. Каменистые обнажения, редко.
- Scrophularia goldeana* Juz. – **Норичник Гольде**. Каменистые обнажения, изредка.
- Scrophularia nodosa* L. – **Норичник узловатый**. В лесах, на опушках, среди кустарников, обычно.
- Scrophularia rupestris* M.Bieb. ex Willd. (#*S. variegata* ssp. *rupestris* (M.Bieb. ex Willd.) Grau) – **Норичник скальный**. На щебнистых, каменистых склонах яйлы, обычно.
- Scrophularia scopoli* Horre ex Pers. – **Норичник Скополи**. В лесах, на полянах, в

- тенистых местах, обычно.
- Scrophularia umbrosa* Dumort. (*S. alata* Gilib., nom. inval.; *S. aquatica* L., nom. utique rej. Prop.) – **Норичник теневой**. На влажных полянах, у водоемов, редко.
- Verbascum blattaria* L. – **Коровяк тараканий**. На сухих склонах и полянах, по берегам водоемов, изредка.
- Verbascum densiflorum* Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.) – **Коровяк высокий**. На сухих склонах, лесных полянах, лугах, обычно.
- Verbascum gnaphalodes* M.Bieb. – **Коровяк сухоцветовидный**. Каменистые осыпи, очень редко.
- Verbascum lychnitis* L. – **Коровяк мучнистый**. Каменистые осыпи, очень редко.
- Verbascum orientale* (L.) All. (*Celsia orientalis* L., *V. chaixii* Vill. ssp. *orientale* (M.Bieb.) Hayek, *V. marshallianum* Ivavina & Tzvelev) – **Коровяк восточный**. На лесных полянах, лесосеках, у лесных дорог и жилья, обычно.
- Verbascum phlomoides* L. – **Коровяк лекарственный**. На сухих склонах, открытых полянах, у жилья, обычно.
- Verbascum phoeniceum* L. – **Коровяк фиолетовый**. Каменистые осыпи, изредка.
- Verbascum pyramidatum* M. Bieb. – **Коровяк пирамидальный**. На каменистых склонах, обычно.
- Verbascum sinuatum* L. – **Коровяк выемчатый**. Каменистые осыпи, очень редко.
- Verbascum spectabile* M. Bieb. – **Коровяк блестящий**. На сухих склонах, лесных полянах, у лесных дорог, обычно.
- Veronica anagallis-aquatica* L. (*V. anagalliformis* Boreau, #*V. anagallis-aquatica* ssp. *anagallidiformis* (Boreau) Soó) – **Вероника ключевая**. По берегам ручьев, болотцев, редко. **ERL.**
- Veronica arvensis* L. – **Вероника полевая**. На шиферных склонах, у дорог, обычно. **A.**
- Veronica austriaca* L. (*V. dentata* F.W.Schmidt) – **Вероника австрийская**. На каменистых склонах, в светлых лесах, обычно.
- Veronica barrelieri* Schott ~ *Veronica spicata* aggr. (*Veronica barrelieri* Schott var. *donetzica* Ostapko, nom. inval.) = *Veronica donetzica* – **Вероника Барельера**. Степи и томиляры, редко.
- Veronica beccabunga* L. – **Вероника поточная**. Во влажных местах, по берегам болотцев, очень редко. **ERL.**
- Veronica capselllicarpa* Dubovik (*V. multifida* auct. non L., #*V. multifida* ssp. *capselllicarpa* (Dubovik) Jelen.) – **Вероника пастушьесумкоплодная**. На сухих склонах, в светлых лесах, часто.
- Veronica chamaedrys* L. – **Вероника дубравная**. В лесах, на полянах, среди кустарников, на луговинах, обычно.
- Veronica gentianoides* Vahl. (#*V. charadzeae* Kem.-Nath., #*V. kemulariae* Kuth.) – **Вероника горечавковая**. На лесных полянах, луговинах яйлы и приайлинских склонах, обычно.
- Veronica hederifolia* L. – **Вероника плещелистная**. На сухих полянах, среди кустарников, у дорог, обычно.
- Veronica lysimachioides* Boiss. – **Вероника вербейниковая**. Берега ручьев, редко.
- Veronica officinalis* L. – **Вероника лекарственная**. На лесных опушках, в лесах, на лугах, в среднем и верхнем поясе, изредка.
- Veronica persica* Poir. (#*V. meskhetica* Kem.-Nath.) – **Вероника персидская**. На лесных полянах, яйле, сухих склонах, как сорное, обычно. **A.**
- Veronica polita* Fr. (*V. didyma* auct. vix Ten.) – **Вероника глянцева**. На сухих склонах,

- сорное в посевах, изредка. А.
- Veronica praecox* All. – **Вероника ранняя**. На каменистых склонах со степной растительностью, яйле, редко.
- Veronica scutellata* L. – **Вероника щитковая**. Болота, сырые берега рек, озер, влажные понижения колковых лесков, изредка.
- Veronica serpyllifolia* L. (*#V. serpyllifolia* ssp. *nummularioides* (Lecoq & Lamotte) Dostál, *#V. serpyllifolia* var. *nummularioides* Lecoq & Lamotte, *#V. tenella* All.) – **Вероника тимьянолистная**. На лесных полянах, сухих склонах, у дорог, редко.
- Veronica taurica* Willd. – **Вероника крымская**. На каменистых сухих склонах, яйле, обычно. Э.
- Veronica teucrium* L. (*V. austriaca* L. ssp. *teucrium* (L.) D.A.Webb, *#V. austriaca* var. *teucrium* (L.) O. Bolos & Vigo) – **Вероника широколистная**. В светлых лесах, на полянах, среди кустарников, обычно.
- Veronica triphyllos* L. – **Вероника трехлистная**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно. А.
- Veronica umbrosa* M.Bieb. – **Вероника тневая**. В тенистых лесах, на каменистых склонах, обычно.

#### Sinopteridaceae – Синоптерисовые

- Cheilanthes persica* (Bory) Mett. ex Kuhn (*Notholaena persica* Bory) – **Краекучник персидский**. Каменистые экотопы, трещины выветривания в конгломератах и денудационные трещины известняковых скал, редко.

#### Solanaceae Juss. – Пасленовые

- Atropa belladonna* L. – **Красавка белладонна (обыкновенная)**. На лесных полянах, лесосеках, у дорог, изредка. ККРФ.
- Datura stramonium* L. – **Дурман обыкновенный**. У жилья, на огородах, у дорог, изредка. А.
- Hyoscyamus niger* L. (*#H. bohemicus* F.W. Schmidt, *H. pallidus* Waldst. & Kit. ex Willd.) – **Белена черная**. На остепненных полянах, у жилья и дорог, обычно. А.
- Physalis alkekengi* L. – **Физалис обыкновенный**. В тенистых местах, среди кустарников, у ручьев и дорог, обычно.
- Solanum dulcamara* L. – **Паслен сладко-горький**. В кустарниковых зарослях, на огородах, у жилья, редко.
- Solanum nigrum* L. (*S. flavescens* Andrzej. 1862, non Dun. 1813) – **Паслен черный**. На придорожных полянах, у жилья, на огородах, редко. А.
- Solanum zelenetzki* Pojark. ~ *Solanum alatum* – **Паслен Зеленецкого**. Сорные места, изредка.

#### Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые

- Sparganium erectum* L. (*S. polyedrum* (Asch. & Graebn.) Juz., *S. ramosum* Huds., *S. ramosum* Huds. ssp. *polyedrum* Asch. & Graebn., *#S. erectum* ssp. *polyedrum* (Asch. & Graebn.) Schinz & Thell.) – **Ежеголовник прямой**. По берегам водоемов и болотцев, редко. ERL.

#### Tamaricaceae Link – Гребенщиковые

- Myricaria bracteata* Royle (*M. alopecuroides* Schrenk., *M. germanica* ssp. *alopecuroides*

(Schrenk) Kitam.) – **Мирикария прицветниковая**. Каменистые осыпи, горные кустарники, изредка.

*Tamarix ramosissima* Ledeb. s. 1. – **Гребенщик ветвистый**. Песчаные осыпи, часто.

*Tamarix smyrnensis* Bunge (*T. Hohenackei* Bunge) – **Гребенщик Смирнова**. Песчаные осыпи, часто.

*Tamarix tetrandra* Pall. ex M.Bieb. – **Гребенщик (тамарикс) четырехтычинковый**. Преимущественно, вдоль рек, часто.

#### **Taxaceae S.F. Gray – Тиссовые**

*Taxus baccata* L. – **Тисс ягодный**. Среди скал на яйле, под пологом букового леса, по балкам, обычно. **ККРФ**.

#### **Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые**

*Thelypteris palustris* Schott (*#Dryopteris thelypteris* (L.) A. Gray, *#Lastrea thelypteris* (L.) Bory, *#Nephrodium thelypteroides* Michx., *#Th. thelypteroides* ssp. *Glabra* Holub, *#Polypodium palustre* Salisb. nom. illeg.) – **Телиптерис болотный**. На берегах ручьев, редко.

#### **Thymelaeaceae Juss – Волчниковые**

*Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ. – **Волчник обыкновенный**. Каменистые осыпи, изредка.

#### **Tiliaceae Juss. – Липовые**

*Tilia begoniifolia* Steven (*T. caucasica* Rupr., *#T. caucasica* f. *begoniifolia* (Stev.) Ig. Vassil., *#T. officinarum* ssp. *caucasica* (Rupr.) Andonovski, *#T. platyphyllos* ssp. *caucasica* (Rupr.) Loria, *#T. prilipkoana* Grossh. & J. Wagner) – **Липа бегониелистная**. В лиственных и смешанных лесах, на опушках, обычно.

*Tilia cordata* Mill. (*T. officinarum* Crantz., nom. utique rej. prop., *T. parvifolia* Hoffm.) – **Липа сердцевидная**. В лесах, по всей территории, изредка.

*Tilia dasystyla* Steven – **Липа пушистостолбиковая**. В лесных ценозах преимущественно среднего и верхнего горных поясов, редко.

#### **Typhaceae Juss. – Рогозовые**

*Typha angustifolia* L. (*#T. foveolata* Pobed., *T. pontica* Klokov f. & A.Krasnova) – **Рогоз узколистный**. По берегам озер, рек, болот, изредка. **ERL**.

*Typha latifolia* L. – **Рогоз широколистный**. По берегам озер, рек, болот, изредка. **ERL**.

*Typha laxmannii* Lepesch. – **Рогоз Лаксмана**. Берега водоемов, изредка. **ERL**.

#### **Ulmaceae Mirb. – Ильмовые**

*Celtis glabrata* Steven ex Planch. – **Каркас голый**. Каменистые осыпи, опушки леса, берега водоемов, обычно.

*Ulmus glabra* Huds. (*U. elliptica* K.Koch, *U. excelca* Borkh., *U. podolica* (Wilcz.) Klokov, *U. scabra* Mill., *U. sukaczevii* Andron.) – **Ильм голый**. В лесах верхнего и среднего пояса как сопутствующая порода, часто.

*Ulmus minor* Mill. (*#U. araxina* Takht., *U. campestris* L., nom. ambig., *U. carpiniifolia* Rupp. ex Suckow; *U. corylifolia* Host; *#U. densa* Litv.; *U. foliacea* Gilib., nom. inval.; *#U. georgica* Schchian, *U. glabra* Mill. 1768, non Huds. 1762,

#*U. grossheimii* Takht., #*U. minor* var. *suberosa* (Moench) Dostál, #*U. suberosa* Moench, #*U. uzbekistanica* Drobow, *U. wyssozkyi* Kotov) – **Вяз малый**. В светлых лесах нижней зоны, изредка.

#### Urticaceae Juss. – Крапивные

*Parietaria diffusa* Mert. et Koch. – **Постенница раскидистая**. Скалы, изредка.

*Parietaria officinalis* L. (*P. erecta* Mert. & W.D.J.Koch) – **Постенница лекарственная**.

В балках, образует заросли, очень редко.

*Urtica dioica* L. – **Крапива двудомная**. Под пологом леса и на полянах, у дорог и жилья, сорное, изредка.

#### Valerianaceae Batsch – Валериановые

*Centranthus calcitrapa* (L.) Dufur. – **Центрантус валериановидный**. Каменистые осыпи, редко.

*Valeriana wolgensis* Kazak. (#*V. collina* ssp. *nitida* (Kreyer) A. & D.Love, *V. nitida* Kreyer, *V. officinalis* L. ssp. *nitida* (Kreyer) Soò, ~ *V. officinalis* L., #*V. officinalis* var. *nitida* (Kreyer) Rostanski, #*V. tanaitica* Worosch., #*V. wallrothii* ssp. *nitida* (Kreyer) Dostál, #*V. wolgensis* var. *nitida* Kazak.) – **Валериана лекарственная**. На влажных полянах, лесных опушках, по берегам рек, изредка.

*Valerianella carinata* Loisel. – **Валерианелла килеватая**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.

*Valerianella coronata* (L.) DC. – **Валерианелла килеватая**. На сухих склонах, обычно.

*Valerianella dentata* (L.) Poll. – **Валерианелла зубчатая**. На сухих полянах, сорных склонах, обычно.

*Valerianella echinata* (L.) DC. – **Валерианелла ежовая**. Саванноиды, каменистые осыпи, редко.

*Valerianella locusta* (L.) Laterrade (*V. olitoria* (L.) Pollich) – **Валерианелла колосковая**. На травянистых полянах, опушках, обычно.

*Valerianella muricata* (Stev.) W. Baxt. (*V. truncata* Betke) – **Валерианелла усеченная**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.

*Valerianella pumila* (L.) DC. – **Валерианелла маленькая**. На сухих полянах, остепненных склонах, изредка.

*Valerianella turgida* (Stev.) Betke. – **Валерианелла вздутая**. Саванноиды, каменистые осыпи, обычно.

#### Verbenaceae Jaume – Вербеновые

*Verbena officinalis* L. – **Вербена лекарственная**. На лесных полянах, у дорог, редко.

*Vitex agnus-castus* L. – **Прутняк обыкновенный**. Каменистые осыпи, редко.

#### Violaceae Batsch – Фиалковые

*Viola acrescens* Klok. (*V. pumila* Cheix var. *orientalis* Kupf.) – **Фиалка увеличенная**. Томиляры и степи, очень редко.

*Viola ambigua* Waldst. & Kit. (*V. campestris* M.Bieb.) – **Фиалка сомнительная**. Среди кустарников, на сухих склонах и яйле, обычно.

*Viola arvensis* Murray (*V. agrestis* Jord., *V. parviflora* Neilr.) – **Фиалка полевая**. Каменистые осыпи, обычно. А.

*Viola canina* L. – **Фиалка собачья**. В лесах и на полянах, редко.

- Viola donetzkiensis* Klok. (*V. elatior* Fries) = *V. montana* s.str *Viola kitaibeliana* Schult. (*V. parviflora* Kit., ~*V. arvensis* Murray) – **Фиалка Китайбелева**. На каменистых склонах, остепненных полянах, довольно обычно.
- Viola mirabilis* L. – **Фиалка удивительная**. В лесах и на полянах, обычно.
- Viola odorata* L. – **Фиалка пахучая**. В лесах на полянах, обычно.
- Viola oreades* M.Bieb. – **Фиалка крымская (скальная)**. На каменистых склонах, обычно.
- Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau (*V. sylvatica* Fr. ex Hartm.f., *V. sylvestris sensu* Rchb., non Lam., #*V. sylvestris* Lam. p.p. nom. illeg.) – **Фиалка Рейхенбаха**. В лесах, среди кустарников и на луговинах, обычно.
- Viola riviniana* Reichb – **Фиалка Ривина**. Сосновые и лиственные леса, довольно обычно.
- Viola saxatilis* F.W.Schmidt (*V. elisabethae* Klokov, *V. vespertina* Klokov) – **Фиалка каменная**. На лесных полянах и приайлинских склонах, обычно.
- Viola scotophylla* Jord. – **Фиалка темнолистная**. Сосновые и лиственные леса, обычно.
- Viola sieheana* W.Beck. – **Фиалка Зиге**. В лесах и на яйлинских лугах, часто.
- Viola suavis* M.Bieb. (*V. austriaca* A.Kern. & J.Kern., #*V. pontica* W. Beck.) – **Фиалка приятная**. В лесах и на полянах верхнего пояса, довольно редко.

#### **Vitaceae Juss. – Виноградовые**

- Vitis sylvestris* C.C.Gmel. (*V. vinifera* L. ssp. *sylvestris* (C.C.Gmel.) Hegi) – **Виноград лесной**. В лиственных лесах нижней и средней зоны, изредка. **ERL**.

#### **Zygophyllaceae R.Br.in Flinders – Парнолистниковые**

- Tribulus terrestris* L. – **Якорцы стелющиеся**. Саванноиды, каменистые осыпи, у дорог изредка.

#### **Литература**

- Багрикова Н.А. Адвентивные виды растений на территориях природных заповедников Крыма // Труды Никитс. ботан. сада. – 2013. – Т. 135. – С. 96-106.
- Бондаренко З.Д. Научная деятельность Ялтинского горно-лесного природного заповедника // Записки природного заповедника Мыс Мартьян. – 2012. – Вып. 3. – С 23-29.
- Дідух Я.П. ПЗ Ялтинський гірсько-лісовий // Фіторізноманіття заповідників та національних природних парків України / Під ред. Онищенко В.А. І Андрієнка Т.Л. К.:Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с.
- Ена А.В. Природная флора Крымского полуострова. Симферополь: Н. Ореанда, 2012. – 232 с.
- Ена А.В. Эндемизм флоры Крыма в ландшафтном контексте // Черноморский ботанический журнал. – 2008. – Т. 4. – № 2. – С.175-179.
- Красная Книга Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sevin.ru/redbooksevin/>
- Летопись природы Ялтинского горно-лесного природного заповедника. – Т 1-34. 1979-2013.
- Отчет о научно-технической работе «Проект организации территории Оползневского

- лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника и охрана его природных комплексов». – 2003. – 361 с.
- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и современных государств (в пределах бывшего СССР). – С.-Пб.: Мир и семья, 1995. – 992 с.
- Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной государственный заповедник. Ботанико-географический очерк. – Киев: Наук. думка, 1980. – 184 с.
- Bobra T., Lychak A., Prokopov G., Rudyk A., Amelichev G. Research and management of forest ecosystems in mountain Crimea. Yalta Mountain Forest Nature Reserve. Scientific monograph. – Simferopol: Publising House “DOLYA”, 2013. – 176 p.
- Alexander V. Fateryga and Karel C.A.J. Kreutz Checklist of the orchids of the Crimea (Orchidaceae) *Journal Europäischer Orchideen* 46 (2): 2014.
- Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine a nomenclatural checklist. Kiev, 1999. – 345 p.
- IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. – <http://www.iucnredlist.org/>