

H 1208



Akademie der Landwirtschaftswissenschaften
der Deutschen Demokratischen Republik
Institut für Pflanzenforschung
Kleinmachnow, Bereich Eberswalde
Schicklerstraße 5
Eberswalde-Finow 1
1 3 0 0

Verantwortlicher Bearbeiter: Dr. K. Rohlfien

Redaktionsschluß: 4. 3. 1987

Printed in the German Democratic Republic

Gesamtherstellung: ILID — Druckerei Olbernhau
Karl-Marx-Str. 11
Olbernhau
9 3 3 0

III/20/5 G 219/87

Vorwort

Mit den „Nova Supplementa Entomologica“ soll eine Schriftenreihe eröffnet werden, welche bewußt an die „Supplementa Entomologica“ anknüpft, die in den Jahren 1912–1929 in 17 Bänden vom „Deutschen Entomologischen Institut“ (bis Bd. 8 unter der Bezeichnung „Deutsches Entomologisches Museum“) herausgegeben wurde. So wie in dieser sollen auch in der neuen Reihe Originalarbeiten systematischer Art, Bibliographien und Kataloge der entomologischen Sammlungen sowie der Bibliothek enthalten sein. Es sind Ergebnisse aus der Arbeit der Abteilung Taxonomie der Insekten und der Bibliothek des Instituts für Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow, Bereich Eberswalde, der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, welche in loser Folge hier veröffentlicht werden. Die vorliegende Arbeit bildet Band 3/1987 dieser Reihe.

Band 1/19785 ist *Periodica entomologica*: Bestandsverz. d. laufend gehaltenen Zeitschr. u. Serien: Stand: 31. März 1985 / (zsgest. u. bearb. von Christel Wutzmer u. Felicitas Marwinski). Akad. d. Landwirtschaftswiss. d. Dt. Demokrat. Republik, Inst. f. Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow, Entomol. Bibliothek. – Eberswalde-Finow, 1985. – 235 S.: Ill.

Band 2/1987 lautet: Katalog der Porträtsammlung bedeutender Entomologen: Stand: Sept. 1984 / (erarb. von Felicitas Marwinski). Akad. d. Landwirtschaftswiss. d. Dt. Demokrat. Republik, Inst für Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow, Entomolog. Bibliothek. Eberswalde-Finow, 1987. – 75 S.

Die „Nova Supplementa Entomologica“ sind im Schriftentausch über die Entomologische Bibliothek zu beziehen.

Die Redaktion

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

Helga Döbler

**Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten
des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde
(ehemals Deutsches Entomologisches Institut),
aufbewahrten Typen – XXVI**

Inhaltsverzeichnis

Coleoptera

Helotidae	7
Languriidae	7
Mycetophagidae	13
Lathridiidae	14
Colydiidae	16
Sphaeritidae	23
Spindidae	24
Propalticidae	24
Thorictidae	26
Phalacridae	27
Endomychidae	29
Coccinellidae	33
Rhizophagidae	51
Cisidae	51
Temnochilidae	51
Cucujidae	52
Nitidulidae	58
Cryptophagidae	70
Erotylidae	74
Bostrychidae	91
Ptiniidae	93
Anobiidae	95

Helotidae

sjöstedti Ritsema, 1905 (Helota)

Not. Leyd. Mus. **25**, 163–165, 205

Mehrere Syntypen, West-Africa, Cameroon, im Museum Stockholm, Museum Leyden, Museum Berlin, in Coll. Schenkling und Coll. Oberthür.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Camerun, leg. Sjöstedt, Coll. Kraatz (nicht Schenkling).

sumbawensis Ritsema, 1909 (Helota)

Not. Leyd. Mus. **31**, 183–185

♀ Holotypus, Sumbawa Insel, durch Schenkling, im DEI }Coll. Kraatz<.¹

Languriidae

acuminipennis Kraatz, 1899 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 311

2 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt; im DEI }Coll. Kraatz<.¹

angustior Fowler, 1913 (Anadastus)

Arch. Natur. **79**, A 7, 137–138

Syntypen, Formosa, leg. Sauter, im DEI: 2 Ex. Kankau, Koshun, V. 1912, 1 Ex. Taihorin, 1911, 1 Ex. Taihorinsho.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, V. 1912, leg. Sauter (1 Ex. wurde in der Beschreibung nicht erwähnt).

basalis Martins, 1965 (Crotchia)

Papéis Dep. Zool. S. Paulo **18**, 42–44, 2, 4, 6, 8, 13

♂ Holotypus, Argentina, Misiones, durch Richter, im Museum La Plata; 2 ♀♀, Brasil, Guanabara, Rio de Janeiro, Coll. Fry, im Britischen Museum und Dept. de Zoologia Sao Paulo; 1 ♀, durch Sahlberg, im Museum Stockholm; 1 ♀, Eldorado, in Coll. Prosen; 1 ♀, sem procedência, im DEI; Paratypen.

DEI: 1 ♀, Paratypus, ohne Fundort, Nr. 388, Coll. Kraatz.

bedeli Villiers, 1945 (Anadastus)

Abeille **37**, 102, Fig. 191–193

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Pajakombo, Ile Nias, im Museum Paris und in Coll. Oberthür.

DEI: 1 Paratypus, Nias, Coll. Kraatz.

bocae Villiers, 1945 (Anadastus)

Abeille **37**, 107–108, Fig. 201, 202

Holotypus, mehrere Paratypen, Java, Soebakoemi, Pengalengan, 1 200–1 300 m, Malang, Wynkoops Bay, im Museum Paris und in Coll. Oberthür.

DEI: 1 Paratypus, Java occident., Pengalengan, 4 000', 1893, leg. Fruhstorfer.

borneensis Villiers, 1945 (Doubledaya)

Abeille **37**, 210–211, Fig. 408–416

Holotypus, mehrere Paratypen, Borneo, Pontianak, riviére Sintang, Sumatra, Palembang, in Coll. Villiers, im Museum Paris und in Coll. Oberthür.

DEI: 1 Paratypus, Borneo occ., Riv. Sintang, 1905, leg. Buffat.

¹ In () wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

borneensis Kraatz, 1899 (Platycladoxena)

Dtsch. Ent. Ztschr., 313

Mehrere Syntypen, Borneo, durch Staudinger.

DEI: 9 Syntypen, Borneo.

Syn. zu *jansoni* Crotch, 1873.

brunnea Kraatz, 1895 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 203–204

2 Syntypen, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

callosipennis Kraatz, 1899 (Penolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 315

Holotypus, ohne Fundortangabe.

DEI: Holotypus, Usambara, Coll. Kraatz.

castanea Kraatz, 1899 (Platycladoxena)

Dtsch. Ent. Ztschr., 312–313

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. Conradt.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz;
designiert durch Villiers.

caudata Kraatz, 1895 (Stenolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 206–207

Mehrere Syntypen, Togo.

DEI: 5 Syntypen, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

cognata Kraatz, 1895 (Languria)

Ent. Nachr. **21**, 196

2 Syntypen, Nord-Borneo, Brunei.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, Coll. Kraatz.

comboceroides Villiers, 1942 (Thalisselodes)

Arb. morph. tax. Ent. **9**, 89–90, Fig. 1

Holotypus, Ouest de Sumatra, 1 Paratypus, Borneo; im DEI (Coll. Kraatz).

concolor Kraatz, 1899 (Ischnolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 308

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. Conradt.

DEI: 1 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. Conradt; 2 Ex.
Kamerun, leg. Conradt; 1 Ex. ohne Fundort; Coll. Kraatz, Syntypen.

concolor Kraatz, 1895 (Stenolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 207

Holotypus, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

conradti Kraatz, 1899 (Ischnolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 308–309

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. Conradt.

DEI: 5 Syntypen, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

crucicollis Kraatz, 1899 (Tetralanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 348

6 Ex. Himalaya; 1 Ex. Indien, 1 Ex. Ruby Mines, leg. Doherty; 1 Ex. Sikkim; Syntypen.

DEI: 1 Ex. Himalaya, Darjeling; 1 Ex. Himalaya, Sikkim (als var. *triplagiata* Kraatz bezettelt); Syntypen, Coll. Kraatz.

curvipes Pereira & Martins, 1965 (*Dasydactylus*)

Arch. Zool. Est. S. Paulo **13**, 256–258, Fig. 84

♂ Holotypus, Equador, Cachabé, I. 1897, leg. Rosenberg, im DEI; 2 ♂♂, dto., XII. 1896/II. 1897; 3 ♂♂, 2 ♀♀, Equador, Coll. Schenkling, im DEI und Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura, Sao Paulo; 1 ♂, Panama, Coll. Kraatz, im DEI: Paratypen.

DEI: ♂ Holotypus, Cachabé, low. c., I. 1897, leg. Rosenberg, Coll. Srnka; 1 ♂, dto., XII. 1896; 1 ♂, Panama, 1 ♂, ohne Fundort, Coll. Kraatz; 3 ♂♂, 1 ♀, Ecuador, leg. Rosenberg, Coll. Schenkling: Paratypen.

dilatipleura Pereira & Martins, 1965 (*Camptocarpus*)

Arch. Zool. Est. S. Paulo **13**, 209–211

♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, Mexico, leg. Hoege, im DEI und Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura, Sao Paulo.

DEI: ♂ Holotypus, Mexico, leg. Hoege, Coll. Srnka.

dolens Kraatz, 1899 (*Languria*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 309

2 Ex. Kamerun, leg. Conradt, 1 Ex. Old-Calabar, durch Donckier, Syntypen; im DEI.

elateroides Kraatz, 1895 (*Languria*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 202–203

Holotypus, Togo; im DEI.

excelsa Pereira & Martins, 1965 (*Goniolanguria*)

Arch. Zool. Est. S. **13**, 239–241

♀ Holotypus, Bolivia, Mapiiri, im Riksmuseum; 1 ♂, Bolivia, leg. Rolle, im DEI; 1 ♀, Peru, Chanchamayo, 1 ♂, 1 ♀, Marcapata; Coll. Sicard, im Museum Paris: Paratypen.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Bolivien, Dardjiling, leg. Rolle, Coll. Schenkling.

formosanus Fowler, 1913 (*Anadastus*)

Arch. Naturg. **79**, A 7, 136–137

12 Syntypen, Formosa, Suisharyo, X. 1911, Taihorin, X. 1909/1910/1911, Kan-kau, Koshun, V. 1912, Chikutoki, V. 1911, leg. Sauter, im DEI

DEI: Syntypen, Formosa, leg. Sauter: 2 Ex. Taihorin, 7. VIII. 1911; 7 Ex. Kan-kau, V. 1912; 1 Ex. Chikutoki, 21. V. 1911.

gracilior Kraatz, 1899 (*Languria*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 311

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt.

DEI: 1 Syntypus, J. Albrechtshöhe, Coll. Kraatz.

Syn. zu *suturalis* Kraatz, 1895; bezettelt von Villiers.

impressicollis Kraatz, 1899 (*Tetralanguria*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 350

Holotypus, Naga Hills, im DEI (Coll. Kraatz).

ajvanica Kraatz, 1899 (Platycladoxena)

Dtsch. Ent. Ztschr., 313

Holotypus, Java, in Coll. Kraatz; im DEI.

kankau Fowler, 1913 (Anadastus)

Arch. Naturg. **79**, A 7, 138

5 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, IV., V., VI. 1912, leg. Sauter, im DEI.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V., VI., VIII. 1912 (nicht IV.!)

lewisii Kraatz, 1895 (Doubledaya)

Dtsch. Ent. Ztschr., 208

♂ Holotypus, Siam, leg. Lewis; im DEI (Coll. Kraatz).

Syn. zu viator White, 1850

macilenta Kraatz, 1899 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 311–312

Holotypus, Kamerun, leg. Conradt; im DEI (ohne Fundort, Coll. Kraatz).

meridionalis Pereira & Martins, 1965 (Goniolanguria)

Arch. Zool. Est. S. Paulo **13**, 228–231, Fig. 51, 60, 72

♂ Holotypus, Brasilien, Minas Gerais, Corcovado, im Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura, Sao Paulo; Paratypen, nähere Angaben, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Ex. Ctr.-Brasil., Rio de Janeiro, 31. XII. 1918, leg. Fischer; 1 Ex. Espirito Santo, Coll. Kraatz; Paratypen.

micron Pereira & Martins, 1965 (Nomotus)

Arch. Zool. Est. S. Paulo **13**, 180–182, Fig. 39

Holotypus, 1 Paratypus, México, Veracruz, Jalapa, leg. Hoege, Coll. Kraatz, im DEI und Britischen Museum.

DEI: Holotypus, Mexico, Coll. Kraatz.

miles Fowler, 1913 (Tetralanguria)

Arch. Naturg. **79**, A 7, 134

2 Ex. Formosa, Kosempo, 1912, 1 Ex. Kankau, Koshun, 1912; leg. Sauter, im DEI, Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, V. 1912, leg. Sauter.

monacha Kraatz, 1899 (Penolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 315

Holotypus, ohne Fundortangabe.

DEI: Holotypus, Usambara, Coll. Kraatz.

nana Martins, 1965 (Crotchia)

Papéis Dep. Zool. S. Paulo **18**, 44, Fig. 5, 10, 15

♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀, Peru, Callanga, im DEI und Departamento de Zoologia Sao Paulo; 1 ♀, Satipo X. XII. 1935, leg. Waytkowski, im Britischen Museum; 1 ♂, Tingo Maria, Monson Valley, 23. XII. 1954, leg. Schlinger & Ross, im California Academy of Sciences; Paratypen.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Peru, Callanga.

nigerrima Kraatz, 1899 (Penolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr. 314–315

1 Ex. Kamerun, leg. Conradt, 1 Ex. ohne Fundort, durch Donckier; Syntypen.
DEI: 1 Syntypus, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

nigricollis Kraatz, 1895 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 204

Holotypus, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

opaca Kraatz, 1899 (Tetralanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 350

2 Syntypen, Naga Hills, ex Mus. v. Rothschild, in Coll. Kraatz.

DEI: 1 Syntypus, Naga Hills, Coll. Kraatz.

pallipes Kraatz, 1899 (Languria)

Ann. Soc. Ent. Belg. **43**, 218–219

Mehrere Syntypen; Südwest Sumatra, leg. Weyers; Tebing-tinggi, leg. Schultheiss.

DEI: 7 Ex. Sumatra; 3 Ex. N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. Schultheiss; Coll. Kraatz, Syntypen.

piceus Villiers, 1945 (Barbaropus)

Abeille **37**, 54–55, Fig. 113

Holotypus, mehrere Paratypen, Congo belge, Région du Lac Kivu, Kadjudju, leg. Babault, im Museum Paris.

DEI: 1 Paratypus, Congo Belge, Rég. Lac Kivu, Kadjudju.

potatoria Kraatz, 1899 (Megalanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 345; nom. praeocc. = producta Arrow, 1925, Faun. Brit. Ind. Langur., 169

Mehrere Syntypen, Sumatra, Deli, ex Coll. Richter.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Deli, Coll. Kraatz.

puncticollis Kraatz, 1899 (Anadastus)

Ann. Soc. Ent. Belg. **43**, 219

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. Weyers; im DEI (Coll. Kraatz).

robustior Fowler, 1913 (Anadastus)

Arch. Naturg. **79**, A 7, 136

Syntypen, Formosa, leg. Sauter, im DEI: 1 Ex. Sokutsu, Banshoryo District, 1912, 1 Ex. Taihorin, 1911.

DEI: 1 Syntypus, Sokutsu, Banshoryo District, 1912, leg. Sauter.

ruficollis Kraatz, 1899 (Cosmolanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 351

Holotypus, Khasis, Coll. Kraatz; im DEI (Assam, Khasia Hills).

ruficollis Kraatz, 1895 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 203

Mehrere Syntypen, Togo.

DEI: 1 Syntypus, Togo, Coll. Kraatz.

rufobrunnea Kraatz, 1895 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 204

Holotypus, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

Syn. zu brunnea Kraatz, 1895; bezettelt von Arrow.

sachtlebeni Villiers, 1942 (Thalisselodes)

Arb. morph. tax. Ent. **9**, 90–91, Fig. 2

Holotypus, Annam, Phic Son, im DEI (XI., XII., leg. Fruhstorfer).

sachtlebeni Villiers, 1945 (Trapezidistes)

Abeille **37**, 182–183, Fig. 336

Holotypus, mehrere Paratypen, Perak, im Museum Paris, in Coll. Oberthür und im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Perak, Coll. Kraatz.

sauterana Fowler, 1913 (Perilanguria)

Arch. Naturg. **79**, A 7, 135–136

Syntypen, Formosa, leg. Sauter, im DEI: 2 Ex. Taihorin, 1911, 2 Ex. Suisharyo, X. 1911, 2 Ex. Kankau, IV., VIII. 1912.

DEI: 2 Ex. Formosa, Taihorin, 7. VIII. 1911; 1 Ex. Kankau, Koshun, IV. 1912; leg. Sauter, Syntypen.

sauteri Fowler, 1913 (Tetralanguroides)

Arch. Naturg. **79**, A 7, 133

6 Ex. Formosa, Taihorin, 1911; 2 Ex. Kosempo, 1909/1911; mehrere Ex. Suisharyo, 1911, Taihorinsho, 1909; leg. Sauter, Syntypen.

DEI: 2 Ex. Formosa, Taihorinsho, X. 1909, Suisharyo, 1911 (als var. *simplex* bezettelt); 2 Ex. Kosempo, 7. IX. 1909/7. IX. 1911; leg. Sauter, Syntypen.

schenklingi Fowler, 1908 (Callilanguria)

In: Wytsman, Gen. Ins. **78**, 21, Taf. 2, Fig. 9

Mehrere Syntypen, S. India, Nilgiri Hills, leg. Andrewes.

DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. Schenkling, Nr. 1016.

semirufa Kraatz, 1895 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 204–205

Holotypus, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

soror Kraatz, 1895 (Languria)

Ent. Nachr. **21**, 195–196

Mehrere Syntypen, Nord-Borneo, Brunei.

DEI: 4 Syntypen, Borneo, Coll. Kraatz.

spectabilis Kraatz, 1899 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 309–310

Holotypus, Kamerun, leg. Conradt; im DEI (ohne Fundort, Coll. Kraatz).

Syn. zu *dubia* Fowler, 1885; bezettelt von Arrow.

speyeri Kraatz, 1899 (Pachylanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 346

Mehrere Syntypen, Südost-Borneo, Tandjong, via Speyer an Kraatz.

DEI: 2 Syntypen, S. O.-Borneo, Tandjong, Coll. Speyer-Coll. Kraatz.

Syn. zu *metasternalis* Crotch, 1876.

sumatrana Kraatz, 1899 (Platycladoxena)

Dtsch. Ent. Ztschr., 313

Mehrere Syntypen, Sumatra, Pancherang-Pisang, XI. 1890/III. 1891, leg. Modigliani.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. Kraatz.

sumatrensis Villiers, 1945 (Caenolanguria)

Abeille **37**, 236, Fig. 465

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Pajakombo, Médan, Umgebung von Dolok, Baros, im Museum Paris und DEI.

DEI: 1 Paratypus, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. Schultheiss, Coll. Kraatz.

suturalis Kraatz, 1895 (Languria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 205–206

Holotypus, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

tumidicollis Kraatz, 1899 (Tetralanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 349–350

Mehrere Syntypen, Indien, Coll. Richter, Naga Hills.

DEI: 1 Syntypus, Indien, Coll. Kraatz.

variventris Kraatz, 1899 (Tetralanguria)

Dtsch. Ent. Ztschr., 348–349

3 Syntypen, Darjeeling, Sikkim, durch Hauser, Kurseong.

DEI: 1 Ex. Himalaya, Darjeeling, 1 Ex. Sikkim, 1 Ex. Kurseong, leg. Braet; Coll. Kraatz, Syntypen.

xenopus Pereira & Martins, 1965 (Malleolanguria)

Arch. Zool. Est. S. Paulo **13**, 212–213, Fig. 20–22

♂ Holotypus, Costa Rica, Tucurrique, Coll. Schild & Burgdorf, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

insularis Fowler (Stenodastus)

DEI: 2 Typen, Formosa, Kosempo, 22. V. 1912, leg. Sauter.

Mycetophagidae

baudii Seidlitz, 1889 (Esarcus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 149

Mehrere Syntypen, Seealpen, durch Baudi an Seidlitz.

DEI: 1 Syntypus, Alp. marit., durch Seidlitz.

bellus Grouvelle, 1914 (Litargus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 185–187, Taf. 7, Fig. 1

Mehrere Syntypen, Afrique orientale allemande, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz (nicht orientale, wahrscheinlich Druckfehler!).

conradti Grouvelle, 1914 (Litargus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 184–185, Taf. 7, Fig. 6

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale allemande, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

crassus Grouvelle, 1914 (Litargus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 197–199, Taf. 7, Fig. 9

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale allemande, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 3 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

gigas Grouvelle, 1914 (Litargus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 188–190, Taf. 7, Fig. 8

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale allemande, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 1 Syntypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

heros Grouvelle, 1914 (Litargus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 187–188, Taf. 7, Fig. 7

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale allemande, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 3 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

infulata Reitter, 1884 (Tritoma)

Verh. Nat. Ver. Brünn **22** (1883), 6

Mehrere Syntypen, Lenkoran, Liryk, Hamarat.

DEI: 3 Syntypen, Caspi-M. Gebiet, Liryk, Hamarat, leg. Leder-Reitter, Coll. Kraatz, Coll. Stierlin.

ingens Grouvelle, 1914 (Litargus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 183–184, Taf. 7, Fig. 10

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale allemande, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 3 Ex. Kamerun, 1 Ex. Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; Syntypen.

sauteri Grouvelle, 1913 (Mycetophagus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 75–76

4 Ex. Hoozan, 1 Ex. Fuhosho; Syntypen, Formosa, leg. Sauter.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Hoozan, Fuhosho, 7. IX. 1908–10, leg. Sauter.

Lathridiidae

apfelbecki Reitter, 1901 (Coninomus)

Wien. Ent. Ztg. **20**, 159, Taf. 3, Fig. 3

Mehrere Syntypen, Byzant, Belgrader Wald bei Constantinopel, leg. Apfelbeck und bei Adampol, leg. Korb.

DEI: 1 Syntypus, Constantinopel, Adampol, Coll. v. Heyden.

attae Kraatz, 1858 (Choluocera)

Berl. Ent. Ztschr. **2**, 140

Mehrere Syntypen, Griechenland.

DEI: 2 Syntypen, Griechenland, Coll. Kraatz.

baudueri Reitter, 1877 (Merophysia)

Mitt. Münch. Ent. Ver. **1**, 6

Mehrere Syntypen, Algier, durch Oberthür und bei Bu-Sâada und Biskra, 1875.

DEI: 1 Syntypus, Alger., Ain Khala, durch Oberthür, Coll. v. Heyden.

beloni Wasmann, 1899 (Coluocera)

Dtsch. Ent. Ztschr., 160–161

Mehrere Syntypen, Indien, Ahmednagar-Distr., Wallon, Sangamner, leg. Heim.

DEI: 2 Syntypen, Wallon, Ahmednagar, leg. Heim.

borealis Wollaston, 1855 (Corticaria)

Zool. App. CCVI

Es ist nicht gelungen in die Originalbeschreibung einzusehen.

DEI: 1 Typus, ohne Fundort, Coll. Kraatz.

Syn. zu umbilicata Beck, 1817.

brenski Reitter, 1884 (Metophthalmus)

Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 64

Mehrere Syntypen, Griechenland, Kumani, leg. Brenske.

DEI: 2 Syntypen, Morea, Cumani, leg. Brenske, Coll. Kraatz, Coll. v. Heyden.

dualis Broun, 1914 (Lathridius)

Bull. N. Zealand Inst. 1, 181–182

Mehrere Syntypen, New Zealand, Ardagh, Mc Clennan's Bush und Methven, durch Hall.

DEI: 2 Syntypen, New Zealand, Coll. Hall.

formicaria lusitanica Reitter, 1913 (Merophysia)

Dtsch. Ent. Ztschr., 654

4 Syntypen, Portugal, Lissabon, leg. Schatzmayr, via Leonhard an Reitter.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, IV.–V. 1910, Coll. Leonhard (1 Ex. wird in der Beschreibung nicht erwähnt, obwohl es zur Typenserie gehört).

foveolata Baudi, 1870 (Merophysia)

Berl. Ent. Ztschr. 14, 59

Mehrere Syntypen, Cypern, leg. Truqui.

DEI: 2 Syntypen, Cypern, Coll. Kraatz.

heydeni Reitter, 1875 (Reveliera)

Stett. Ent. Ztg. 36, 339–340

Holotypus, Nordseite der Sierra Nevada, bei Huejar, leg. v. Heyden; im DEI.

Syn. zu genéi Aubé, 1850.

minor Baudi, 1870 (Merophysia)

Berl. Ent. Ztschr. 14, 59–60

Mehrere Syntypen, Cypern und Kleinasien, leg. Truqui.

DEI: 4 Syntypen, Cypern, Coll. Kraatz.

Syn. zu carmelitana Saulcy, 1861.

obscura Brisout, 1863 (Corticaria)

Mat. Catal. Grenier, 73–74

Mehrere Syntypen, Lyon, Pyrénées, Paris.

DEI: 1 Syntypus, Haut-Pyr., Coll. Kraatz.

procera Reitter, 1875 (Merophysia)

Stett. Ent. Ztg. **36**, 304–305

Mehrere Syntypen, Palaestina, durch v. Heyden, ex Museum München.

DEI: 2 Syntypen, Palästina, Mus. Monac, Coll. v. Heyden.

punctata sardoa Reitter, 1911 (Coluocera)

Wien. Ent. Ztg. **30**, 70

Mehrere Syntypen, bei Assuni, leg. Krausse.

DEI: 24 Syntypen, Sardinia, Assuni, leg. Krausse, Coll. Leonhard.

ragusae Reitter, 1875 (Metophthalmus)

Stett. Ent. Ztg. **36**, 315

Mehrere Syntypen, Sicilien, l. 1875, leg. Ragusa.

DEI: 1 Syntypus, Sicilia, leg. Ragusa, Coll. v. Heyden.

truquii Baudi, 1861 (Holoparamecus)

Berl. Ent. Ztschr. **5**, 182

Mehrere Syntypen, Cypro, leg. Truqui.

DEI: 1 Syntypus, Cypr., Coll. Kraatz.

Colydiidae

aetolicum Reitter, 1876 (Cerylon)

Dtsch. Ent. Ztschr. **20**, 313, 314, 386, Taf. 2, Fig. 1

Mehrere Syntypen, Aetolia, Asia minor, Caucasus etc.

DEI: 2 Syntypen, Aetolien, leg. Krüper, Coll. F. Müller.

Syn. zu semistriatum Perris, 1865.

angustus Kraatz, 1895 (Pycnocephalus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 161

Holotypus, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI.

Syn. zu bistriatus Fairmaire, 1891.

anophthalmus Franz, 1969 (Lathridiomorphus)

Eos. Madr. **44** (1968), 137–139, Fig. 1

♀ Holotypus, Insel Gran Canaria, bei Moya, El Brezal, 25. III. 1967, leg. Franz, in Coll. Franz; 38 Paratypen, dto., in Coll. Franz und im DEI.

DEI: 2 Paratypen, Gran Canaria, Umg. Moya, Lorbeerwald, leg. Franz.

antennatum Kraatz, 1895 (Colydium)

Dtsch. Ent. Ztschr., 158–159

2 Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.

DEI: Lectotypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

cactophagi Schwarz, 1899 (Bothrideres)

Psyche **8**, Suppl. 10

Holotypus, 100 Paratypen: Arizona, Tucson, leg. Hubbard, in Coll. Hubbard & Schwarz, im U. S. Nat. Museum.

DEI: 2 Paratypen, Tuscon, Ar., leg. Hubbard, Coll. Hubbard & Schwarz, USNM, Nr. 4568.

cardatus John, 1956 (Elytrotetrantus)

Rev. Zool. Bot. Afr. **54** (3–4), 276–278, Fig. 8–10

Holotypus, 5 Ex.: S. O. Kamerun, Lolodorf, leg. Conradt; Deutsch-Ost-Afrika, Marangu, durch Gebr. W. Müller, im DEI; 14 Ex. Haut-Uele, Moto, Abimva, Watsa, leg. Burgeon; Mayumbe, Zobe, leg. Mayné; Ruanda, Kisenyi, leg. Bertrand; Kivu, Bukavu, leg. Bomans; Guinée Espagnole, Mongo, leg. Palau; Mayumbe, Kai-Bumba, leg. Schouteden; Kivu, Buseregenye, Rutshuru, leg. Luja; Tshuapa, Bokuma, leg. Lootens; im Musée Royal du Congo Belge: Paratypen.

DEI: Holotypus, 4 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, leg. Conradt, Coll. Kraatz; 1 Ex. D.O. Afrika, Marangu, durch Gebr. W. Müller, 1909; 2 ♀♀, Haut-Uele, Abimva, VI.–VII. 1925, 2 Ex. Haut-Uele, Watsa, XI. 1919; leg. Burgeon; 1 Ex. Mayumbe, Zobe, 4. XII.–I. 1916, leg. Mayné; 1 Ex. Guinee, Espagnole, Mongo, 1946/1948, leg. Palau; ex Musée Du Congo: Paratypen.

conicicolle Reitter, 1882, (Cerylon)

Ver. Nat. Ver. Brünn **20**, 138

Mehrere Syntypen, Caspisches Meergebiet, Lenkoran, leg. Leder.

DEI: 4 Syntypen, Lenkoran, leg. Leder-Reitter, Coll. Stierlin, Coll. Kraatz.

conradti Grouvelle, 1914 (Cerylon)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 159–160, Taf. 6, Fig. 5

2 Syntypen, Afrique occidentale, in Coll. Grouvelle und im DEI.

DEI: Lectotypus, Togo, Bismarckburg, 1894, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

conradti Kraatz, 1895 (Cosmothorax)

Dtsch. Ent. Ztschr., 155

2 Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

conradti Grouvelle, 1914 (Endophloeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 148–150, Taf. 6, Fig. 10, 11

Mehrere Ex., Afrique occidentale, Cameroun, leg. Conradt, in Coll. Grouvelle und im DEI; mehrere Ex., Guinée espagnole, in Coll. du Musée Royal de Berlin; 1 Ex. Afrique orientale, Abyssinie, leg. Raffray, in Coll. Grouvelle; Syntypen.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

conradti Grouvelle, 1914 (Metopiestes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 158–159, Taf. 6, Fig. 2

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale, Cameroun, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

conradti Grouvelle, 1911 (Trachypholis)

Not. Leyd. Mus. **33**, 151–154, 161

Mehrere Syntypen, Cameroun, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

convexus Breit, 1913 (*Anommatus*)

Ent. Mitt. **2**, 17

Mehrere Syntypen, Oberitalien, Monte Guiglielmo, leg. Breit.

DEI: 1 Syntypus, Mt. Guiglielmo, leg. Breit, Coll. Leonhard.

costatus Kraatz, 1895 (*Bothrideres*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 161; nom. praeocc. = kraatzii Hetschko, 1928,
Wien. Ent. Ztg. **44**, 142

Holotypus, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

drakei Heinze, 1944 (*Murmidius*)

Ent. Bl. **40**, 29–30

Holotypus, 3 Paratypen, Paraguay, 188 . . . , leg. Drake, ex Coll. Kraatz, im
DEI und in Coll. Heinze.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fasciculatus Grouvelle, 1897 (*Hyberis*)

Ann. Mus. Civ. Genova (2) **18**, 378

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, leg. Modigliani, im Musée Civique de
Gênes.

DEI: Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. Kraatz; designiert
durch Slipinski.

fulvicincta Elston, 1922 (*Todima*)

Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austr. **46**, 310–312, Fig. 2

22 Ex. South Australia, Devil Peak, nahe Quorn, leg. Kemp und Elston; Holo-
typus, in Coll. Elston, Paratypen, I. 15232, im South Australian Museum.

DEI: 1 Paratypus, S. Australia, Quorn, leg. Elston.

giganteum Kraatz, 1895 (*Colydium*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 159

Mehrere Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, 2 ♀ ♀, Paralectotypen, Togo, leg. Conradt, Coll.
Kraatz; designiert durch Slipinski.

gjonovici Reitter, 1912 (*Langelandia*)

Wien. Ent. Ztg. **31**, 281

2 Syntypen, Süddalmatien, Castelnuovo, in Coll. Reitter und Coll. Leonhard.

DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, Castelnuovo, V. 1910, leg. Hilf, Coll. Leonhard.

glaber Kraatz, 1895 (*Teredus*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 159

Holotypus, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

globoicollis Heinze, 1943 (*Teredolaemus*)

Ent. Bl. **39**, 102–103

Holotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; im DEI.

graecum Obenberger, 1916 (*Cerylon*)

Arch. Naturg. **82**, A 4, 26

Mehrere Syntypen, Griechenland, in Coll. Obenberger.

DEI: 1 Syntypus, Parnass, leg. Paganetti.

hamatus Heinze, 1944 (*Philothermus*)

Arb. morph. tax. Ent. **11**, 137–138, 140, Fig. 1–5

Holotypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, ex Coll. Kraatz; 2 Ex. dto.; 2 Ex. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 3.–28. VIII., 14. IX.–6. X. 1898; Paratypen, im DEI, Museum Berlin und in Coll. Heinze.

DEI: ♂ Holotypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

helleri Heinze, 1944 (Pseudocerylon)

Arb. morph. tax. Ent. **11**, 26–27

Holotypus, 8 Paratypen, Philippinen, Siargao, Dapa, 30. IX. 1916, leg. Böttcher, im Museum Dresden, DEI und in Coll. Heinze.

DEI: 1 Paratypus, Philippinen, Dapa, 30. IX. 1916, leg. Böttcher.

humleri Obenberger, 1918 (Agelandia)

Ent. Bl. **14**, 58–59

Mehrere Syntypen, Süd-Italien, Gerace, leg. Paganetti-Hummler.

DEI: 1 Syntypus, Gerace, leg. Paganetti, Coll. F. Müller.

impressipennis Heinze, 1943 (Teredolaemus)

Ent. Bl. **39**, 98–99

Holotypus, 2 Paratypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz, in Coll. Heinze und im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

interstitialis Heyden, 1870 (Bothriдерes)

Reise Span., 107

2 Syntypen, bei Escorial und in der Serra de Gerez, durch v. Heyden; im DEI.

jelskii Wankowicz, 1867 (Lado)

Ann. Soc. Ent. Fr. (4) **7**, 249–251

Mehrere Syntypen, Umgebung Minsk, 1864.

DEI: 2 Syntypen, Minsk, leg. Wankowicz, Coll. Stierlin, Coll. v. Heyden.

johni Heinze, 1944 (Lapethus)

Arb. morph. tax. Ent. **11**, 112–114, Taf. 11, Fig. 1–10

Holotypus, Brasilien, Alto da Serra, Sao Paulo, 9. III. 1912, leg. Bryant; im DEI.

kiesenwetteri Heyden, 1870 (Tarphius)

Reise Span., 105

Holotypus, Nordportugal, Serra de Gerez, 4. VII., leg. v. Heyden; im DEI.

korschefskyi Heinze, 1942 (Philothemus)

Ent. Bl. **38**, 166–167, Fig. 1,2

10 Syntypen, Madagaskar, Annanarivo, leg. Sikora, dd. C. Schaufuß, im DEI und in Coll. Heinze.

DEI: Lectotypus, 7 Paralectotypen, Annanarivo, leg. Sikora, dd. C. Schaufuß; designiert durch Slipinski.

kraatzii Heinze, 1943 (Craspedophilus)

Ent. Bl. **39**, 116–117

♂ Holotypus, mehrere Ex. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. Conradt, Coll. Kraatz, im DEI und in Coll. Heinze; 1 Ex. Kamerun, Ebolowa, 1. IV. 1912, leg. v. Rothkirch, 2 Ex. Insel Fernando Póo, VI. 1900, leg. Conradt, im Museum Berlin: Paratypen.

DEI: Holotypus, 17 Ex. Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; 4 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. Conradt; Paratypen.

kraatzi Heinze, 1943 (Teredolaemus)

Ent. Bl. **39**, 103

Holotypus, 2 Paratypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz, im DEI und in Coll. Heinze.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

laevifrons Kraatz, 1895 (Colydium)

Dtsch. Ent. Ztschr., 157–158

2 Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

Syn. zu *auberti* Fairmaire, 1882.

laevigatus Heinze, 1944 (Philothermus)

Arb. morph. tax. Ent. **11**, 138–139, 140, Fig. 6

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, ex Coll. Kraatz, im DEI und in Coll. Heinze.

DEI: Holotypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

leai Carter, 1937 (Sparactus)

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **62**, 187, Taf. 8, Fig. 6

Holotypus, mehrere Paratypen, North Queensland, Cairns District, leg. Lea, im South Australian Museum.

DEI: 2 Paratypen, Cairns Distr., leg. Lea.

leonhardi Reitter, 1912 (Langelandia)

Wien. Ent. Ztg. **31**, 285

Mehrere Syntypen, Sardinien, via Leonhard an Reitter.

DEI: 1 Syntypus, Cagliari, Ende V. 1902, leg. Doderer, Coll. Leonhard.

livadus Pope, 1952 (Sosylus)

Ann. Mus. Congo Belge Sér. 8°, Zool. 19, 23–24

♂ Holotypus, Africa, Belgian Congo, Yangambi, XI. 1951, leg. Donis, 15 ♂♂, 11 ♀♀, Paratypen, Yangambi, VIII.–XI. 1950/XI. 1951, leg. Donis, im Musée Royal du Congo Belge, Tervuren.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Yangambi, 1951, leg. Donis, Nr. 482.

major Schaufuß, 1882 (Aglenus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (6) **2**, 48

Mehrere Syntypen, Andalusien.

DEI: 16 Ex. Andalusien, Coll. Schaufuß und zahlreiche Ex. dto. (im Röhrchen aufbewahrt), Syntypen.

malaccensis Heinze, 1944 (Lascotonus)

Ann. Mus. Nat. Hung. **37**, 2–3

Holotypus, 6 Paratypen, Malacca, Kaula Lumpur, 26. I. 1898, leg. Biró, im Ungarischen National-Museum und in Coll. Heinze.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

modigliani Grouvelle, 1897 (Hyberis)

Ann. Mus. Genova (2) **18**, 379

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, leg. Modigliani, im Musée Civique de Gênes.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Sumatra, Si Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. Modigliani, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

moyanus Franz, 1967 (Tarphius)

Eos Madr. **43**, 72–74, Fig. 11

Holotypus, 13 Paratypen, Gran Canaria, 4. VIII. 1966, leg. Franz, in Coll. Franz.

DEI: 1 Paratypus, Gran Canaria, Umg. Moya, Lorbeerwald, leg. Franz.

nodosus Wollaston, 1854 (Tarphius)

Ins. Gard., 140, Taf. 3, Fig. 6

Mehrere Syntypen, Madeira, Ribeiro Frio, Cruzinhas.

DEI: 1 Syntypus, Mad., Coll. F. Müller.

nitidicollis Reitter, 1910 (Langelandia)

Riv. Col. Ital. **8**, 115

Mehrere Syntypen, Sardinien, Asuni, leg. Krausse.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. Krausse.

notata Carter, 1937 (Phormesa)

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **62**, 189–190, Taf. 8, Fig. 11

Holotypus, 18 Paratypen, N. S. W.; Kindee, in Coll. Carter, Sydney, in Coll. Spence, Richmond R., im Britischen Museum, Bogan R. in Coll. Armstrong; Queensland, Cairns, in Coll. Lea, Goodna, in Coll. Wilson; N.-W. Aust., im National Museum.

DEI: 2 Paratypen, Queensland, durch F. Müller.

opacus Habelmann, 1854 (Teredus)

Stett. Ent. Ztg. **15**, 29

Mehrere Syntypen, Insel Wollin, Misdroy, VII., VIII., leg. Habelmann.

DEI: 8 Syntypen, Insel Wollin, Misdroy, leg. Habelmann, durch Dohrn, Coll. v. Heyden, Coll. Kraatz.

paganettii Obenberger, 1914 (Langelandia)

Col. Rundsch. **3**, 109, Fig. a

Mehrere Syntypen, Korfu, leg. Paganetti-Hummeler und leg. Werner.

DEI: 2 Syntypen, Corfu, leg. Paganetti.

Syn. zu viennensis Reitter, 1912.

parallela Reitter, 1922 (Diodesma)

Bestimm. Tab. **6**, 21

Mehrere Syntypen, Algier, in Coll. Kraatz.

DEI: 16 Syntypen, Algier.

peruvianum Heinze, 1954 (Nematidium)

In: Titschack, Beitr. Faun. Perus **4**, 165–166

Holotypus, Peru, Callanga; im DEI.

puberulus Schwarz, 1878 (Philothermus)

Proc. Amer. Philos. Soc. **17**, 361

In die Originalbeschreibung konnte nicht eingesehen werden.

DEI: 1 Typus, Tampa, 29. III., Fla, Coll. Hubbard & Schwarz.

puncticollis Pope, 1952 (Sosylus)

Ann. Mus. Congo Belge. Sér. 8°, Zool. 19, 24–25, Fig. 11

♂ Holotypus, Africa, Belgian Congo, Yangambi, XII. 1951, leg. Donis; 42 ♂♂, 27 ♀♀, Paratypen, Yangambi, VI., III., IV., XI. 1951, leg. Donis, im Musée du Congo Belge, Tervuren.

DEI: 1 Paratypus, Yangambi, 1951, leg. Donis, Z. 948, ex *Panda oleosa* Pierre, Coll. Mayné, Com. Et. Bois Congo, R. 2388.

quadraticeps Kraatz, 1895 (Leptosomatium)

Dtsch. Ent. Ztschr., 157

Mehrere Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.

DEI: 4 Syntypen, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

Syn. zu *planifrons* Westwood, 1869.

reflexipennis Reitter, 1912 (Langelandia)

Wien. Ent. Ztg. 31, 281

Mehrere Syntypen, Süddalmatien, Castelnuovo.

DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, Castelnuovo, Mokrinje, 5. X. 1910, Hilf, Coll. Leonhard.

reitteri Kraatz, 1895 (Leptosomatium)

Dtsch. Ent. Ztschr., 157

Holotypus, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

rufipes Kraatz, 1895 (Teredus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 159

Holotypus, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

sauteri Grouvelle, 1913 (Microvonus)

Arch. Naturg. 79, A 11, 47–49

Holotypus, Formosa, Sokutsu, leg. Sauter; im DEI (7. VI. 1912).

sauteri Grouvelle, 1913 (Asosylus)

Arch. Naturg. 79, A 11, 50–51

2 Syntypen, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr., leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 22. VI. 1912.

seminiger fuscus Heinze, 1942 (Philothermus)

Ent. Bl. 38, 165–166

4 Syntypen, Madagaskar, Annanarivo, leg. Sikora, dd. C. Schaufuß, im DEI und in Coll. Heinze.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Annanarivo, leg. Sikora, dd. Schaufuß; designiert durch Slipinski.

striolatus Grouvelle, 1913 (Metopiastes)

Arch. Naturg. 79, A 11, 49–50

Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. Sauter; im DEI (VII. 1911).

terricola Reitter, 1912 (Langelandia)

Wien. Ent. Ztg. 31, 280

Mehrere Syntypen, Korfu.

DEI: 3 Syntypen, Korfu, Gasturi, 1905, durch Leonhard.

tuberosus Schaufuß, 1893 (Rhechodes)

Nunq. otios. **3** (9), 593–596

Mehrere Syntypen, Madagascar, durch Schaufuß und Klocke.

DEI: Lectotypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

validus Kraatz, 1895 (Pycnocephalus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 160

2 Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.

DEI: Lectotypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Slipinski.

variegatus Schaufuß, 1893 (Rhechodes)

Nunq. otios. **3** (9), 596–597

Mehrere Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Coll. Schaufuß.

viennensis Reitter, 1912 (Langelandia)

Wien. Ent. Ztg. **31**, 283

Mehrere Syntypen, Wien, leg. Miller.

DEI: 2 Syntypen, Umgebung Wien, durch Reitter, Coll. Leonhard.

vulgaris Schaufuß, 1891 (Pycnomerus)

Tijdschr. Ent. **34**, 8–10

Mehrere Syntypen, Madagascar.

DEI: Lectotypus, 11 Paralectotypen, Madagascar, Coll. Schaufuß; designiert durch Slipinski.

wagneri Heinze, 1943 (Craspedophilus)

Ent. Bl. **39**, 117–118

Holotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz, im DEI; 1 Paratypus, dto., in Coll. Heinze.

DEI: Holotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

zacynthia Heinze, 1943 (Langelandia)

Ent. Bl. **39**, 127–129, Fig. 1, 2

♂ Holotypus, Insel Zante, Vasilikos, 21. III. 1909; 1 ♀, Paratypus, Insel Zante, Kalamaki, 1909; leg. Hilf, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

floridensis Gupta (Cerylcautomus)

DEI: 11 Paratypen, Florida, Leon Co, Chaires, 17. VII. 1965, leg. Suter, FM (HD) 65–457

mirabilis Heinze (Macroptychus)

DEI: 1 Type, Ukerewe Ins., Victoria-See, leg. Conrads.

Sphaeritidae

dimidiatus Jureček, 1934 (Sphaerites)

Časopis Čs. Spol. Ent. **31**, 45

4 Syntypen, Changhwa, Szetschuan, China.

DEI: 1 Syntypus, Czechuan, Chunghwa, Wassuland, durch Reitter.

Sphindidae

grandis Hampe, 1861 (Sphindus)

Wien. Ent. Monatsschr. **5**, 67

Mehrere Syntypen, Croatien, bei Agram, leg. Hampe.

DEI: 1 Syntypus, Croatien, Coll. Kraatz.

Propalticidae

acupinctum John, 1939 (Microloma)

Ent. Bl. **35**, 296–297, Taf. 1, Fig. 1–4, Textf. 5

♀ Holotypus, Sumatra, XI., leg. Grouvelle; im DEI.

disposita John, 1940 (Discogenia)

Arb. morph. tax. Ent. **7**, 262, Taf. 5, Fig. 5, 6 a, b, Taf. 6, Fig. 8 a–e

♂ Holotypus, Togo, leg. Conradt; im DEI.

dybasi John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 161–162, Tab. 3, Fig. 1 a–c

Palau-Is., Babelthuap, Ulimang; Koror, limestone ridge S. of inlet, 1947, leg. Dybas; Holotypus, 42 Paratypen, im U. S. Nat. Museum, im Museum Chicago, Bishop Museum und DEI.

DEI: 5 Ex. Koror I., Palau Isld., limestone ridge S. of inlet, 21. I. 1948, Pacific Sci. Board Ent. Surv. of Micronesia, leg. Dybas, beating vegetation; 1 Ex. Palau Island, Basel Thuap I., 22. XII. 1947, wooded valley, SW of Ulimang, beating vegetation, Pacific Sci. Board Ent. Surv. of Micronesia, leg. Dybas; 1 Ex. Palau Island Koror I., 15. III. 1963, at light, leg. Boudsley; Paratypen.

insularis John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 157, Taf. 5, Fig. 2 a–e

Carolinen: Kusaie, Mutunlik, III. 1953, leg. Clarke; Ponape, Mt. Tamatamansakir, Colonia, II. 1948, leg. Dybas; Colonia-Paliker, VI. 1939, leg. Teiso Esaki; Truk, Ton (Tol) Oley, leg. Sasumatsu & Joshimura; Palau, Koror, Babelthuap, Peleliu, I. 1948, leg. Dybas; Koror, II. 1953, leg. Beardsley; Ulithi Atoll, Potangeras, XI. 1947, leg. Dybas; Marianen: Saipan, Halaihai, As Teo area, As Mahetog area, Papago area, Laulau Bay, Mt. Tagpochau, I.–II. 1945, leg. Dybas; Marshall I., Enivetok Atoll, Japton, leg. Dybas; Arno Atoll, Ine, VI. 1950, leg. Usinger; Holotypus, 67 Paratypen, im U. S. Nat. Museum, Kyushu University und im DEI.

DEI: 2 Ex. Koror I., Palau Island, 21. XI. 1947, Pacific Sci. Board Ent. Surv. of Micronesia, leg. Dybas; 2 Ex. Peleliu I., north central and east coast, Pelew Islands, 2., 4. VIII. 1945, Col. & pres. by Dybas, Lot 2382, 2435; 1 Ex. Potangeras Islet, Ulithi Atoll, 10. XI. 1947, Pacific Sci. Board Ent. Surv. of Micronesia, leg. Dybas; Paratypen.

mixtocomatum John, 1939 (Microloma)

Ent. Bl. **35**, 297, Taf. 1, Fig. 7, 8, Textf. 1–4

2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, Weligama, 1899, leg. Horn; im DEI.

saipanensis John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 158, Taf. 5, Fig. 5 a–b

Marianen: Saipan, Garapan-Sadog Tasi, V. 1940, leg. Yasumatsu & Yoshimura; Saipan, Hills E. of Garapan, I. 1945, leg. Dybas; Holotypus, in der Kyushu Universität; Paratypen: 1 Ex. im Bishop Museum, 1 Ex. im Museum Chicago und 1 Ex. im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Saipan, Marianna Isls., Garapan-Sadog Tasi, 5. V. 1940, leg. Yasu. et Yoshi., Micronesia Coll., Kyushu Univ., Fukuoka, Japan.

schoutedeni John, 1942 (Discogenia)

Rev. Zool. Bot. Afr. **35**, 403–404, Taf. 12, Fig. 6, 7, Taf. 13, Fig. 1, 2, 11

4 Syntypen, Kabambaie und Haut Uélé, Moto, leg. Schouteden und Burgeon; im Museum Tervuren und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Kabambaie, 11.–15. X. 1921, leg. Schouteden, Musée du Congo.

scriptitatus John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 157–158, Taf. 5, Fig. 4 a–b

Marianen: Guam, Oca Point, Ritidian Point, Pati Point, Fadang, VII. 1945, leg. Dybas; Holotypus, 11 Paratypen, im Museum Chicago, Bishop Museum und DEI.

DEI: 1 Ex. Duam I., Marinas, Ritidian Point, 29. V. 1945, Col. & pres. by Dybas, Lot 2075, beating vegetation; 1 Ex. dto., Oca Point, Lot 2013; Paratypen.

sierraleonis John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 168–169, Taf. 4, Fig. 4a–b

W. Afrika, Sierra Leone, ex Coll. Grouvelle; Holotypus, 9 Paratypen, im Museum Paris und DEI.

DEI: 1 Paratypus, S. Leone, 1917, Coll. Grouvelle, ex Museum Paris.

tonkinensis John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 167–168, Taf. 2, Fig. 5a–c

Tonkin, Reg. de Hoa Binh, 1927, leg. de Cooman; Holotypus, 12 Paratypen, im Museum Paris und DEI.

DEI: 3 Paratypen, Tonkin, Reg. Hoa-Binh, 1927, leg. Cooman.

trilineata John, 1940 (Discogenia)

Arb. morph. tax. Ent. **7**, 259–262, Fig. 2, Taf. 5, Fig. 3, 4a, b, Taf. 6, Fig. 6, 7

♀ Holotypus, Togo, leg. Conradt; im DEI.

ulimanganus John, 1960 (Propalticus)

Pac. Insects **2**, 158–161, Taf. 5, Fig. 3a–b

Palau-Is., Babelthuap, Ulimang, in Mango-Borke, XII. 1947, leg. Dybas; Koror, Limestone ridge S. of inlet, I. 1948, leg. Dybas; Holotypus, im U. S. Nat. Museum, 3 Paratypen, im Museum Chicago, Bishop Museum und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Ulimang, Babel Thuap I., Palau Islands, 8. XII. 1947, Pacific Sci. Board, Ent. Surv. of Micronesia, leg. Dybas.

virgatum John, 1939 (Microloma)

Ent. Bl. **35**, 297, Taf. 1, Fig. 5, 6, Textfig. 6

♀ Holotypus, Sumatra, XI., leg. Grouvelle; im DEI.

Thorictidae

bicolor Kraatz, 1858 (Thorictus)

Berl. Ent. Ztschr. **2**, 141

Mehrere Syntypen, Griechenland, auf Zante, leg. v. Kiesenwetter.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, leg. v. Kiesenwetter, Coll. Kraatz.

Syn. zu *grandicollis* Germar, 1842; bezettelt von John.

braminus Wasmann, 1912 (Thorictus)

Ztschr. Wiss. Zool. **101**, 108–109, Taf. 7, Fig. 19

Mehrere Syntypen, Ostindien, Wallon, Ahmednagar-District, Bombay-Presidency, leg. Heim, aus Nestern von *Pheidole wroughtoni* For. und *Ph. sulcaticeps* Rog. subsp. *poonensis* For.

DEI: 1 Syntypus, Wallon, Ahmednagar, leg. Heim, b. *Pheidole wroughtoni* For.

castaneus Germar, 1834 (Thorictus)

In: Silbermann, Rev. Ent. **2**², No. 15, Fig. 17

Mehrere Syntypen, Nubien.

DEI: 1 Syntypus, Nubia, Coll. Germar-Schaum.

dispar Baudi, 1870 (Thorictus)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 58–59

Mehrere Syntypen, Asia minor, Cypro, leg. Truqui.

DEI: 2 Syntypen, Cyprus, durch Baudi, Coll. Kraatz.

grandicollis Germar, 1842 (Thorictus)

Faun. Ins. Europ. **22**, Nr. 4, Fig. 4

Mehrere Syntypen, Sicilia, leg. Grohmann, Mus. nostr.

DEI: 2 Syntypen, Sicilien, leg. Grohmann, Coll. Germar-Schaum.

heydeni Reitter, 1875 (Thorictodes)

Col. Hefte **14**, 46

Mehrere Syntypen, Gallia, Aegyptus, Algeria.

DEI: 1 Syntypus, Aegyptus, leg. Waltl, Coll. v. Heyden.

kraatzi Wasmann, 1895 (Thorictus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 292

Mehrere Syntypen, Algeria, leg. Kraatz.

DEI: 2 Syntypen, Algier, Coll. Kraatz.

leonhardi Reitter, 1913 (Thorictus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 654

Insel Zante, via Leonhard an Reitter, mehrere Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, Zante, Umgeb. d. Stadt, 1908, leg. Hilf, Coll. Leonhard.

paganettii Obenberger, 1917 (Thorictus)

Ent. Bl. **13**, 77

Mehrere Syntypen, Kreta, leg. Paganetti-Hummler.

DEI: 2 Syntypen, Kreta, leg. Paganetti, durch Leonhard.

pauciseta Wasmann, 1894 (Thorictus)

Krit. Verz. myrmek. termitoph. Arthrop., 219–220

Mehrere Syntypen, Tunesien, bei Gabes, leg. Forel.
DEI: 1 Syntypus, Tunis, Gabes, leg. Forel, Coll. Kraatz.

politus Wasmann, 1895 (Thorictus)
Dtsch. Ent. Ztschr., 292–293

Mehrere Syntypen, Tripolis, leg. Kraatz.
DEI: 1 Syntypus, Tripolis, Coll. Kraatz.

rugulosus Reitter, 1881 (Thorictus)
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **31**, 91

Holotypus, Algier, Coll. Kraatz; im DEI.

spectabilis Kraatz, 1858 (Thorictus)
Berl. Ent. Ztschr. **2**, 142, nota

Mehrere Syntypen, Mesopotamia, collect. Schaum.
DEI: 4 Syntypen, Mesopotamia, Coll. Germar-Schaum.
Syn. zu *orientalis* Peyerimhoff, 1857.

stricticollis Kraatz, 1859 (Thorictus)
Berl. Ent. Ztschr. **3**, 73

Holotypus, Oran, leg. Coquerel; im DEI (Coll. Kraatz).

Phalacridea

baudii Flach, 1888 (Olibrus)
Best.-Tab. **17**, 12, 21

Mehrere Syntypen, Sicilia, leg. Seidlitz und Baudi.
DEI: 2 Syntypen, Sicil., leg. Baudi, Coll. Flach.

demaisoni Flach, 1888 (Olibrus)
Best.-Tab. **17**, 13, 20, Taf. 1, Fig. 6

Mehrere Syntypen, Spanien, Pto. Sta. Maria, Cadix, leg. v. Bruck, Coll. v. Heyden, Algeria, durch Demaison.
DEI: 1 Ex. Cadix, 16. V. 1896, Coll. Flach, 1 Ex. Algeria, durch Demaison, Coll. Flach, 2 Ex. P. S. Maria, leg. v. Bruck, Coll. v. Heyden: Syntypen.

dieckmanni Vogt, 1967 (Phalacrus)
In: Freude, Harde, Lohse; Die Käfer Mitteleurop. **7**, 161
(als *dieckmanni* Thompson i. l. erwähnt)

Mehrere Syntypen, Ostseestrand von Holstein bis Preußen.

Die Syntypen, die sich im DEI befinden, wurden als Holotypus und Paratypen bezettelt, nach den Nomenklaturregeln liegt hiermit eine Lectotypenfestlegung vor.

DEI: ♂ Lectotypus, Danzig-Krakau, leg. Kniephof, Coll. Ermisch; 1 Ex. Ostseestrand, durch Reitter, Coll. Flach; 1 Ex. Ostseestrand, ex Küster, Coll. Flach; 2 Ex. Pommern, leg. Heizer, Coll. Liebmann; 2 Ex. Swinemünde, Schra., Coll. Kraatz; 1 Ex. Preußen, Coll. Stierlin; 1 ♀, Pommern, Insel Wollin, Umg. Pritter, auf der Düne, 13.–25. VII. 1936, leg. Köller; 1 Ex. Danzig-Krakau, leg. Kniephof, ex Coll. Dohrn: Paralectotypen (Thompson hat die Typen designiert, die Art aber nicht beschrieben).

frater Flach, 1888 (Phalacrus)

Best.-Tab. 17, 27

Mehrere Syntypen, Caucasus, Araxesthal, leg. Leder.

DEI: Lectotypus, Caucasus, Araxesthal, leg. Leder-Reitter, Coll. Flach; 4 Paralectotypen, dto., Coll. v. Heyden; durch Thompson, 1960 designiert.

gerhardti Flach, 1888 (Olibrus)

Best.-Tab. 17, 22

9 Syntypen, Niederschlesien, bei Lähn, VIII., auf *Senecio memorensis*.

DEI: 2 Syntypen, Silesia, *Senec. nemorensis*.

heydeni Flach, 1888 (Olibrus)

Best.-Tab. 17, 14, 21

Mehrere Syntypen, Hungaria, in Coll. v. Heyden, Orenburg, in Coll. Faust.

DEI: 1 Syntypus, Hungaria, durch Staudinger, Coll. v. Heyden.

hybridus Flach, 1888 (Phalacrus)

Best.-Tab. 17, 10, 18

Holotypus, Transsylvania (Siebenbürgen); im DEI (Coll. Flach).

incommodus Flach, 1888 (Phalacrus)

Best.-Tab. 17, 10, 18

Holotypus, Chersonesus tauricus, Krim; im DEI (Coll. Flach, 30:VI.)

koltzei Flach, 1888 (Olibrus)

Best.-Tab. 17, 11, 19

Mehrere Syntypen, Caucasus, Tiflis, sec. Koltze.

DEI: 9 Syntypen, Caucasus, Tiflis, Coll. Flach, Coll. v. Heyden, Coll. Koltze.

koltzei Reitter, 1887 (Stilbus)

Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 509

Mehrere Syntypen, Ostsibirien, Chabarowka, leg. Graeser.

DEI: 17 Syntypen, Amur, Chabarowka, leg. Graeser, Coll. Flach, Coll. Koltze (8 Ex. als var. *bifenestratus* Reitter bezettelt).

norvegicus Münster, 1901 (Olibrus)

Christ. Vid. Selsk. Forh. 1, 34

Lauerudmoen ved Kongsberg, Hougund og Vikesund pa Modum, durch Strand i. Laerdal i. Sogn; mehrere Syntypen.

DEI: 3 Syntypen, Kongsberg, durch Münster, durch Staudinger, Coll. Leonard, Coll. v. Heyden.

punctatostratus Kraatz, 1858 (Tolyphus)

Berl. Ent. Ztschr. 2, 132–133

Mehrere Ex. Griechenland, Patras, leg. v. Kiesenwetter, 1 Ex. Spanien, leg. Handschuch; Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, Spanien, Coll. Kraatz.

reitteri Flach, 1888 (Olibrus)

Best.-Tab. 17, 12, 20

3 Syntypen, Croatia, leg. Reitter.

DEI: 2 Syntypen, Croatia, leg. Reitter.

seriepunctatus Brisout, 1863 (Phalacrus)

Mat. Cat. Grenier, 44–45

Mehrere Syntypen, Frankreich, Collioure, Delarouzée.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Callioures, durch Brisout, Coll. Kraatz.

simoni Flach, 1888 (Tolyphus)

Best.-Tab. 17, 7, Taf. 1, Fig. 1, A, B

Mehrere Syntypen, Syrien, leg. Simon.

DEI: 1 Syntypus, Syria, Chaifa, leg. Simon, Coll. v. Heyden.

stierlini Flach, 1888 (Olibrus)

Best.-Tab. 17, 22–23, Fig. 6c

Mehrere Syntypen, Gallia m., Corsica, Italia.

DEI: 2 Ex. Ajaccio, leg. Schuster, Corsica, Coll. Kraatz; 4 Ex. Corsica, durch Dommer und Hiendlm., Coll. Flach und Coll. v. Heyden; Syntypen.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

kapfereri Reitter, 1915 (Tolyphus)

DEI: 1 Typus, Tunis, Ain Draham, durch v. Bodemeyer, Coll. Leonhard.

skradensis Obenberger (Olibrus)

DEI: 2 Typen, Croatia n., Skard, VII. 1913, leg. Obenberger, Coll. F.Müller.

Endomychidae

acuticolle Reitter, 1882 (Dapsa)

Nat. Sic. 1, 231

Mehrere Syntypen, Marokko, Algeciras, XI. 1880, leg. Simon.

DEI: 2 Syntypen, Süd-Spanien, Algeciras, leg. Simon.

albanicum Apfelbeck, 1906 (Sphaerosoma)

Sitz. Ber. Ak. Wiss. Wien 115, Abt. 1, 1670–1671

Mehrere Syntypen, Albanien, Gebirge der Merdita bei Oroshi (Mali Shêit) und Fandi (Munela, Zebia).

DEI: 2 Syntypen, Merdita, Zebia, Coll. F. Müller, Coll. Leonhard.

appendiculatus triplex Strohecker, 1953 (Trycherus)

Rev. Zool. Bot. Afr. 47, 81

♂ Holotypus, Belgisch Kongo, Kapanga, XI. 1933, leg. Overlaet, im Museum Congo; 34 ♂♂, 33 ♀♀, Paratypen, Kapanga, XII. 1932, leg. Overlaet, im Museum Congo.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Lulua-Kapanga, 30. XI. 1932, leg. Overlaet, Musée du Congo.

arrowi Strohecker, 1939 (Eumorphus)

Proc. Roy. Ent. Soc. London (B) 8, 118

♂ Holotypus, 5 ♀♀, „Sangir“, 1 ♀, Gilolo; Paratypen, in Coll. Strohecker und Kenyon College, Gambier, Ohio.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Sangir.

cordatus Strohecker, 1957 (Epopterus)

Ann. Hist. Nat. Mus. Hung. (N. S.) **8**, 266, Fig. 15

♂ Holotypus, Amazon, durch Staudinger, im DEI; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Amazon sup., Haituba, 7 ♀♀, Amazon, im Ungarischen Museum; 1 ♂, 1 ♀, Amazonasgebiet, im Museum Berlin: Paratypen.

DEI: Holotypus, Amazon., durch Staudinger, Coll. Kraatz.

csikii Apfelbeck, 1915 (Sphaerosoma)

Glazn. zem. Herceg. **27**, 421–422, Fig.

Mehrere Syntypen, Jugoist. Bosna, Ljubičnoj planini kod Celebica.

DEI: 3 Syntypen, Ljubična pl., 1902, leg. Apfelbeck, Coll. Leonhard.

cuprivestis Gorham, 1890 (Stenotarsus)

Biol. Centralamer. **7** (Col.), 139

Mehrere Syntypen, Panama, Volcan de Chiriqui, 3 000 ft., leg. Champion.

DEI: 1 Syntypus, V. de Chiriqui, below 4 000 ft., leg. Champion.

difficilis Strohecker, 1952 (Danaë)

Expl. Nat. Park Upemba **7**, 17, Fig. 13

♂ Holotypus, Lubanga, affl. dr. Senze (Sous affl. dr. Lufira), alt. 1.750 m, 5. IV. 1948, Witte Exped. Upemba Park; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Congo Belge, P. N. U., Lusinga, Mukana, 20., 21. VI. 1945, leg. De Witte, 149–151.

fodori Csiki, 1907 (Dapsa)

Ann. Mus. Nat. Hung. **5**, 578

Mehrere Syntypen, Hungaria centralis, Mária-Besnyö, leg. Fodor, im Museum Budapest.

DEI: 1 Syntypus, Budapest, leg. Fodor.

koltzei Reitter, 1887 (Lycoperdina)

Dtsch. Ent. Ztschr. **31**, 508

Mehrere Syntypen, Ostsibirien, von der Suyfunmündung, Coll. Koltze und Ussuri, Coll. Faust.

DEI: 1 Syntypus, Suyfun, durch Reitter.

leonhardi Apfelbeck, 1916 (Sphaerosoma)

Ann. Mus. Nat. Hung. **14**, 494

Holotypus, Mazedonien, Athos, leg. Schatzmayr, in Coll. Leonhard; im DEI.

libani Sahlberg, 1913 (Sphaerosoma)

Ofvers. Finsk. Vet. Soc. **55**, No. 8, 32

Mehrere Syntypen, Libani, nahe der Station Jammour, 9., 20. IV., Ain Sofar, 19. IV.

DEI: 3 Syntypen, Conv. Liban., Saalas; leg. Leonhard, ex. Mus. Zool. H:fors; durch Sahlberg-Bodemeyer, Coll. v. Heyden.

luzonica Strohecker, 1951 (Saula)

Pan. Pacif. Ent. **27** (4), 165

♂ Holotypus, Manila, Philippines, in Coll. Strohecker, 1 ♀, Manila, Luzon,

P. I., in Coll. Strohecker; 4 ♂♂, 2 ♀♀, Manila, 1 ♂, 1 ♀, Luzon, Cabugao, 1 ♂, 1 ♀, Luzon, Los Banos, 1 ♀, Luzon, Montalban; 1 ♀, Mt. Makiling, 1 ♂, Polillo, 1 ♀, Mt. Banahao: Paratypen.

DEI: 1 ♂, N. Luzon, Cabugao, 1 ♀, Philipp., Manila: Paratypen.

nevadense Reitter, 1883 (Alexia)

Dtsch. Ent. Ztschr. **27**, 241–242

Mehrere Syntypen, Sierra Nevada, Huejar, Coll. v. Heyden.

DEI: 1 Syntypus, Huejar, Sierra Nevada, Coll. v. Heyden.

overbecki Günther, 1936 (Beccaria)

Tijdschr. Ent. **79**, 72, Abb. 6

Holotypus, Java, Djokjakarta, 1933/34, leg. Overbeck, im Museum Dresden; 2 Paratypen, Java, Karanggandoel, Banjoemas, leg. Benner, im DEI.

DEI: 2 Paratypen, Karanggandoel, Banjoemas, 1922, leg. Benner.

paganettii Obenberger, 1914 (Sphaerosoma)

Col. Rundsch. **3**, 110

Mehrere Syntypen, Kalabrien, Aspromonte, leg. Paganetti-Hummler.

DEI: 9 Syntypen, Calabria, Aspromonte, leg. Paganetti, Coll. F. Müller, Coll. Leonhard.

panamanus Gorham, 1890 (Stenotarsus)

Biol. Centralamer. **7** (Col.), 138–139, Taf. 8, Fig. 8

Mehrere Syntypen, Panama, Volcan de Chiriqui, leg. Champion.

DEI: 1 Syntypus, V. de Chiriqui, 25–4000 ft., leg. Champion.

rambouseki Apfelbeck, 1916 (Sphaerosoma)

Ann. Mus. Nat. Hung. **14**, 490–491

22 Syntypen, am Kopaonik bei Novipazar, VII. 1910, leg. Rambousek.

DEI: 4 Syntypen, Serbien, Kopaonik, Suvo Rudiste, VII. 1910, leg. Rambousek, Coll. Leonhard.

troglydytes Hampe, 1850 (Symbiotes)

Stett. Ent. Ztg. **11**, 353

Mehrere Syntypen, im Prater, leg. Hampe.

DEI: 1 Syntypus, Wien, leg. Hampe, Rshr., Coll. v. Heyden.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

analisis Schenkling (Trycherus)

DEI: 2 ♂♂, Typen, Kamerun, Mundame, leg. Rohde; 2 ♀♀, Typen, Kamerun, Coll. Kraatz.

androgynus Schenkling (Spathomeles)

DEI: 1 ♂, Sumatra, Solok, ex Coll. Schneider, Coll. Schenkling; 1 ♀, Borneo, Sadong, Coll. Schenkling: Typen.

angusticollis Schenkling (Trycherus)

DEI: 1 ♂, Typus, Kamerun, Barombi, leg. Conradt, ex Museum Stettin.

caudatus Schenkling (Amphisternus)

DEI: 1 ♂, 5 ♀♀, Typen, Ostindien, Coll. Kraatz.

duplicatus Schenkling (Trycherus)

DEI: 2 ♂♂, Typen, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

formosus Csiki (Eumorphus)

DEI: 3 ♂♂, 3 ♀♀, Typen, Formosa, Kosempo, VI., VII. 1909.

frater Schenkling (Amphisternus)

DEI: 1 ♂, Typus, Borneo, Sadong, 1902, Coll. Schenkling.

frater Schenkling (Eumorphus)

DEI: 2 ♂♂, 3 ♀♀, Assam, Khasia Hills, Coll. Kraatz; 2 ♀♀, Java, durch Bonnefois und Staudinger, Coll. Srnka: Typen.

furcatus Schenkling (Trycherus)

DEI: 1 ♂, 1 ♀, D. O. Afrika, Langenburg, 3 ♂♂, 1 ♀, D. O. Afrika, Lindi, 1903, 1 ♂, D. O. A., Marienhof, Wugiri, 1 ♂, Lukuledi, 1 ♀, Usambara; Coll. Kraatz, Typen.

gazella Schenkling (Amphisternus)

DEI: 1 ♂, N. O. Sumatra, Tandjong Kasse, leg. Drescher, 1 ♂, Kina Balu, 1 ♀, Borneo, 1 ♂, Borneo, leg. Wahnes (var.); Coll. Kraatz, Typen.

laticollis Schenkling (Spathomeles)

DEI: 1 ♂, Borneo, 1 ♀, dto. leg. Wahnes, Coll. Kraatz, Coll. Schenkling, Typen.

mendax Schenkling (Amphisternus)

DEI: 1 ♂, Typus, Sumatra, Coll. Kraatz.

nigropunctatus Schenkling (Trycherus)

DEI: 1 ♀, Typus, Brit. Uganda, leg. Grauer, Coll. v. Bennigsen.

ovatus Schenkling (Trycherus)

DEI: 2 ♂♂, Kamerun, Mundame, leg. Rohde; 2 ♂♂, 1 ♀, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt; Coll. Kraatz, Typen.

pulchripes formosanus Schenkling (Eumorphus)

DEI: 3 ♂♂, 2 ♀♀, Formosa, Fuhosho, VI., VII. 1909, 2 ♂♂, 1 ♀, Hoozan, IX. 1910, 1 ♂, 1 ♀, Polisha, XI. 1908, 1 ♀, Kankau, Koshun, V. 1912, 1 ♀, Kosempo, VI. 1909; leg. Sauter; 2 ♂♂, Tonkin, Than-Moi, VI.–VII., leg. Fruhstorfer; Coll. Kraatz, Typen.

ramosus Schenkling (Trycherus)

DEI: 1 ♀, Typus, Kigonsera, Coll. Schenkling.

seminitidus Schenkling (Engonius)

DEI: 1 ♂, Java, leg. Fruhstorfer, 1 ♂, Nias, Ombolata, ex Coll. Schneider, Coll. Kraatz, Typen.

separandus Schenkling (Eumorphus)

DEI: 1 ♂, Typus, Borneo, Coll. Kraatz.

unifasciatus Schenkling (Trycherus)

DEI: 1 Typus, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

venustus Schenkling (Trycherus)

DEI: 3 ♀♀, Typen, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

vicinus Schenkling (Trycherus)

DEI: 5 Ex. S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, 1 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896; leg. Conradt, Coll. Kraatz; 1 Ex. Kamerun, Molive b. Victoria, Coll. Schenkling: Typen.

Coccinellidae

alternans Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. col. trim. sec., 767–769

Mehrere Syntypen, Java, collect. Chevrolat, Dejean, Germar und Schaum, Leconte, Melly und Westwood.

DEI: 1 Syntypus, Java, leg. Schaum, Coll. Haag.

ambrensis Sicard, 1907 (Solanophila)

Ann. Soc. Ent. Fr. **76**, 440–441, Fig.

Mehrere Syntypen, Madagascar, Amber-Gebirge.

DEI: 4 Syntypen, Madagascar, Mt. d'Ambre, durch Sicard, Coll. Kraatz.

ancoralis Germar, 1824 (Coccinella)

Ins. Spec. Nov. **1**, Col., 620

Mehrere Syntypen, Buenos Ayres.

DEI: 1 Syntypus, B. Ayres, leg. Schaum, Coll. Haag.

angolensis Korschefsky, 1935 (Lotis)

Stett. Ent. Ztg. **96**, 170

Holotypus, mehrere Paratypen, Lunda, IX., Kuandu, im Musée d' Histoire Naturelle, La Chaux-de-Fonds, im DEI und in Coll. Korschefsky.

DEI: 1 Paratypus, Kuandu, IX., Angola, Miss. sc. suisse, 1932–33.

araxis Reitter, 1897 (Lithophilus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 226–227

Mehrere Syntypen, Russisch-Armenien, Araxesthal bei Ordubad.

DEI: 7 Syntypen, Caucasus, Araxesthal, leg. Leder-Reitter, Coll. v. Heyden.

auritus anatolicus Weise, 1905 (Pullus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 219–220 (als var. beschrieben)

Mehrere Syntypen, Kleinasien, bei Biledjik, Eski Chehir, Burna etc., leg. v. Bodemeyer, bei Konstantinopel, leg. Merl.

Khuzorian hat nachträglich einen Holotypus und Paratypen festgelegt. Nach den Nomenklaturregeln liegt hiermit eine Lectotypenfestlegung vor.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Asia minor, Biledjik, leg. v. Bodemeyer, Stambul, Coll. Kraatz.

basalis Kirsch, 1870 (Pharus)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 394–395

Mehrere Syntypen, Egyptus, nahe Ramleh, leg. Schneider.

DEI: 1 Syntypus, Ramleh, leg. O. Schneider, Coll. v. Heyden.

Syn. zu interruptus Goeze, 1777

beneficus Weise, 1913 (Orcus)

Nova Guinea **9**, 444

Mehrere Syntypen, N. Guinea, Merauke, 1904–05, leg. Koch.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Merauke, 1904, leg. Koch.

bennigseni Weise, 1900 (Chilocorus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 128–129

Mehrere Syntypen, Ostafrika, Dar es Salaam, leg. v. Bennigsen.

DEI: 2 Syntypen, Dar-es-Salaam, leg. v. Bennigsen, Coll. v. Bennigsen.

bennigseni Weise, 1899 (Solanophila)

Arch. Naturg. **65**, A 1, 59–60

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Montes Ukami, leg. v. Bennigsen.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. v. Bennigsen.

bennigseni Weise, 1903 (Verania)

Dtsch. Ent. Ztschr., 231–232

Mehrere Syntypen, N.-Guinea, Friedrich Wilhelms-Hafen, leg. v. Bennigsen.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Friedrich Wilhelms-Hafen, Coll. v. Bennigsen.

biguttata Sicard, 1912 (Cleothera)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 136–137

Mehrere Syntypen, Santos, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. Metz, Coll. Kraatz.

bissexpustulata Mader, 1954 (Epilachna)

Expl. Parc Albert **80**, 21–23

Mehrere Ex. Belg.-Congo, Ituri, Nioka, leg. Leroy (sur caféier); 178 Ex.: Ituri,

Mahagi und Beni, leg. Lebrun; Mongbwalu, leg. Scheitz; Haut Uele, Moto,

leg. Burgeon; Lokwa, Nioka, leg. Vrydagh; Djugu, forêt; 48 Ex. Ruwenzori,

Mutwanga, Coll. Hackars; 300 Ex. Nandi, Mt. Elgon, leg. Alinder; Holotypus,

Paratypen, im Congo Museum, im Institut des Parcs Nationaux du Congo

Belge und in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates München.

DEI: 5 Paratypen, O. A., Mt. Elgon, 2200 m, VII. 1925, Nandi-Reservat, leg.

Alinder (als a. separata, trilobata und fulvicollis Mader bezettelt).

bodemeyeri Weise, 1900 (Coccinella)

Dtsch. Ent. Ztschr., 140

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Biledjek, leg. v. Bodemeyer.

DEI: 6 Syntypen, Asia minor, Biledjek, leg. v. Bodemeyer, Coll. Leonhard und

Coll. v. Heyden.

boops Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröffent. Zool. St. Samml. München **7**, 263, Abb. 66, 67

♂ Holotypus, Mombasa, 36 km S Lubero, VIII. 1932, im Zentralafrika-Museum
Tervuren; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Parotypus, Mombasa, 36 km Sud Lubero, Ende VIII. 1932, leg. Burgeon,
ex Coll. Fürsch, Musée du Congo.

brasiliensis Korschefsky, 1935 (Chnoodes)

Arb. morph. tax. Ent. **2**, 254–255, Fig. 3

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Campo de Jordao, leg. Lane, ded.
Melzer, Sao Paulo, leg. Mráz, im DEI, Museum Prag und in Coll. Korschefsky.
DEI: Holotypus, Brasilien, Sao Paulo, Campo de Jordao, leg. Lane, ded.
Melzer.

buqueti Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Col. Trim. Sec., 542–544

Mehrere Syntypen, Brésil, collect. Buquet, Dejean, Germar und Schaum.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

caseyi Sicard, 1912 (Helesius)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 135–136

Mehrere Syntypen, Columbien, Cauca, ex DEI.
DEI: 1 Syntypus, Cauca, Coll. Kraatz.

centralis Sicard, 1912 (Solanophila)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 132

Mehrere Syntypen, Brit. Uganda, ex DEI.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. Grauer.

cervicalis Mulsant, 1851 (Scymnus)

Spec. Col. Trim. Sec., 984–985

Mehrere Syntypen, Nord-Amerika, collect. Germar und Schaum.
DEI: 1 Syntypus, N.-Amerika, leg. Schaum, Coll. Haag.

ceylonicus Weise, 1900 (Brumus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 421–422

Mehrere Syntypen, Ceylon, Trincomalee, Weligama, leg. Horn.
DEI: 2 Syntypen, Weligama, Trincomali, 1899, leg. Horn.

circumducta Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 854–855

Mehrere Syntypen, Brésil, collect. Germar und Schaum; im Museum Paris.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

circumflua Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 852–853

Mehrere Syntypen, Brésil, collect. Buquet, Chevrolat, Dejean, Germar und
Schaum, Guérin, Melly, Reiche, im Museum Paris und Museum Kopenhagen.
DEI: 1 Ex. Brasilien, leg. Schaum, 2 Ex. ohne Fundort; Coll. Haag, Syntypen.
Syn. zu *contempta* Mulsant, 1851.

clandestina Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 848–849

Holotypus, mehrere Paratypen: Brésil, collect. Buquet, Chevrolat, Dejean,
Dohrn, Germar und Schaum, Guérin, Reiche, Solier, im Museum Paris.
DEI: 2 Paratypen, Brasilien, leg. Schaum und leg. Reiche, Coll. Haag.

concauus Fürsch, 1961 (Exochomus)

Ent. Arb. **12**, 74–75

♂ Holotypus, Afrika, Jadotville, IX./X. 1945, Coll. Basilewsky (Tervuren); mehrere Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Transvaal, Louis Trichardt, 30. XII. 1956, leg. Capener, ex Coll. Fürsch, 1964.

concinuus Weise, 1898 (Xanthorcus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 118

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

confusa tonkinensis Bielawski, 1961 (Illeis)

Ann. Zool. Warsaw **19**, 362–363

Holotypus, Haut Tonkin, Lamey, Coll. Kraatz; 1 Ex. Central-Tonkin, Chiem-Hoa, VIII.–IX., leg. Fruhstorfer; 2 Ex. Tonkin, Montes Mauson, IV.–V., 2–3000', leg. Fruhstorfer; 4 Ex. N. Vietnam, Kao-Bang, Bak-kan, 27.–28. IV. 1960, 1 Ex. N. Vietnam, Lang-Gon, Kao-Bang, 17. IV. 1960; leg. Tschoch; Paratypen, im DEI, Museum Berlin, im Zoolog. Institut d. Polnischen Akademie Warszawa und Zool. Institut d. Akademie d. Wissenschaften der UdSSR Leningrad.

DEI: ♂ Holotypus, Haut Tonkin, Lamey, Coll. Kraatz.

connexa Germar, 1824 (Coccinella)

Ins. Spec. Nov. Col. **1**, 621

Mehrere Syntypen, Buenos Ayres.

DEI: 2 Syntypen, B. Ayres, leg. Schaum, Coll. Haag.

contemptus Weise, 1923 (Pullus)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 186–187

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, Anping, leg. Sauter.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, Anping, VI., VII. 1911/1912, leg. Sauter.

corticalis Lea, 1908 (Scymnus)

Proc. Roy. Soc. Victoria **20**², 203–204

Mehrere Syntypen, King Island und Tasmania, Hobart, New Norfolk.

DEI: 1 Syntypus, Tasmania, Coll. Hacker.

cruciata Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 708–710

Holotypus, mehrere Paratypen; Columbien, collect. Buquet, Dejean, Germar und Schaum; Venezuela, collect. Reiche.

DEI: 5 Paratypen, Columbien, leg. Schaum, Coll. Haag.

cyanea Mulsant, 1851 (Poria)

Spec. Col. Trim. Sec., 885

Holotypus, mehrere Paratypen, Brésil, collect. Dejean, Germar und Schaum, Reiche, im Museum Kopenhagen.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

decemguttata Weise, 1923 (Solanophila)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 183

Mehrere Syntypen, Formosa, Taihorin, leg. Sauter.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. VIII. 1911, leg. Sauter.

decempunctatus Kraatz, 1862 (Novius)
Berl. Ent. Ztschr. **6**, 272

Mehrere Syntypen, Andalusien, durch Wehnke.
DEI: 1 Syntypus, Andalusien, durch Wehnke, Coll. Kraatz.

discrepens Weise, 1901 (Solanophila)
Ann. Soc. Ent. Belg. **45**, 275–276

Mehrere Syntypen, Usambara, Nguelo, Coll. Kraatz.
DEI: 1 Ex. Usambara, Nguelo, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. Kraatz, Syntypen.

dispar Weise, 1900 (Horniolus)
Dtsch. Ent. Ztschr., 443

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, Kandy, leg. Horn.
DEI: Lectotypus, Kandy, 1899, leg. Horn; designiert durch Fürsch.

egena Mulsant, 1851 (Pentilia)
Spec. Col. Trim. Sec., 502–503

Holotypus, mehrere Paratypen, Brésil, collect. Buquet, Chevrolat, Dejean, Germar, Schaum, Guérin, Pilate und Trobert.
DEI: 2 Paratypen, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

emarginata Chapin, 1926 (Telsimia)
Proc. Biol. Soc. Washingt. **39**, 132

♂ Holotypus, 36 Paratypen, China, Foochow, leg. Silvestri, durch Compere, im U. S. National Museum, Universität von California, Citrus Experiment Station, Riverside, Calif.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, China, Foochow, leg. Silvestri.

enneasticta Mulsant, 1851 (Epilachna)
Spec. Col. Trim. Sec., 769–771

Mehrere Syntypen, Java, collect. Buquet, Chevrolat, Dejean, Germar und Schaum, Guérin, Hope, Melly, Reiche, Westwood, im Museum Paris.
DEI: 1 Syntypus, Java, leg. Schaum.

erectepubescens Mader, 1941 (Chnootriba)
In: Expl. Parc. Nat. Albert **34**, 169–170, Fig. 487

Holotypus, 46 Paratypen; Südkamerun, Yoko, leg. Heine; Kamerun, Buschiri, in Coll. Mader und im Museum Hamburg.
DEI: 1 Paratypus, Kamerun, Joko.

fennicus Sahlberg, 1886 (Scymnus)
Meddel. Soc. Fennica **13**, 157–158

Mehrere Syntypen, Helsingfors und weitere Fundortangaben siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Syntypus, H:fors, fennia, durch Sahlberg, Nr. 99, Coll. v. Heyden.

festiva Mulsant, 1851 (Hyperaspis)
Spec. Col. Trim. Sec., 659–661

Mehrere Syntypen; Brésil, collect. Buquet, Chevrolat, Germar und Schaum; im Museum Kopenhagen; Columbien, collect. Chevrolat, Dejean, Melly, DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

flaviceps Mulsant, 1851 (Thalassa)

Spec. Col. Trim. Sec., 513–514

Holotypus, mehrere Paratypen, Cuba, collect. Dejean, Germar, Schaum und Trobert.

DEI: 1 Paratypus, Cuba, leg. Schaum, Coll. Haag.

formosana Weise, 1923 (Solanophila)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 183

Mehrere Syntypen, Formosa, Taihorin, Suisharyo, leg. Sauter.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Taihorin, Suisharyo, 7. IX., X. 1911, leg. Sauter.

formosana Weise, 1923 (Sticholotis)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 185

Holotypus, Formosa, Kankau, leg. Sauter; im DEI (Koshun, V. 1912).

fuscomaculata Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Col. Trim. Sec., 569–572

Holotypus, mehrere Paratypen, Brésil, collect. Dejean, Dupont, Germar und Schaum, im Museum Paris.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

gentilis Weise, 1901 (Solanophila)

Ann. Soc. Ent. Belg. **45**, 277–278

Mehrere Syntypen, Usambara, Nguelo, Coll. Kraatz und Coll. Hintz.

DEI: 1 Syntypus, Afrika, Nguelo, Coll. Kraatz.

glaucina Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 860

Mehrere Syntypen, Brésil, collect. Germar und Schaum, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

glyphica Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Trim. Sec., 585–588

Mehrere Syntypen, Brésil, collect. Dupont, Germar und Schaum, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

gorhami Sicard, 1912 (Exoplectra)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 137

Mehrere Syntypen, Mexico, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Coll. Kraatz.

gratiosus Weise, 1900 (Pullus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 439

Mehrere Syntypen, Ceylon, Negombo, Trincomalee, leg. Horn.

DEI: 1 Syntypus, Trincomali, 1899, leg. Horn (als var. a bezettelt).

guttata Sicard, 1912 (Aulis)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 137–138

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Schaum, ex. DEI.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

hexastigma Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Col. Trim. Sec., 556–557

Mehrere Syntypen, Brésil, collect. Buquet, Germar und Schaum, Reiche.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag (ohne caput).

heydeni Weise, 1892 (Semiadalia)

Dtsch. Ent. Ztschr., 109–110

Mehrere Syntypen, Margelan.

DEI: 2 Syntypen, Margelan, durch Staudinger, Coll. v. Heyden.

hirtaeformis Mader, 1941 (Epilachna)

In: Expl. Parc Nat. Albert **34**, 136–138, Fig. 356–373

Holotypus, 80 Paratypen: Lac Gando, 2.400 m, 6.–8. III. 1935/IV.–V. 1935; Kihorwe à Ilega, VI. 1935; prés Gando, 2.400 m, Bonde, 10.–12. III. 1935; Mudende, 10. III. 1935; Bugeshi, 10.–12. III. 1935; Kibati, 1.900 m, IV.–V. 1935; 1.785–2.150 m, à Shove, VI. 1935; Mulera, 1.800–2.000 m, IV.–V. 1935; Tshamagussa, 8.–15. VI. 1935; Ninda, 25. IX. 1934; 2.150 m, 21.–22. IX. 1934; Rwan-keri, 2.200 m, IV.–V. 1935; Kinigi, 2.100 m, Ruhengeri, II. 1935; Kamatembe, riv. Bishakishaki, 3.100 m, 7.–23. I. 1935, im Congo-Museum und in Coll. Mader.

DEI: 1 Paratypus, Congo belge, P. N. A., riv. Bishakishaki-Kamatembe, 2.100 m, 7.–23. I. 1935, leg. De Witte, Nr. 1037.

horni Weise, 1900 (Aspidimerus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 424

Mehrere Syntypen, Ceylon, Horrowapotham, Weligama, 1899, leg. Horn.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, Horrowapotham, 1899, leg. Horn.

horni Korschefsky, 1934 (Neda)

Arb. morph. tax. Ent. **1**, 270

Holotypus, mehrere Paratypen, D. Neu-Guinea, Coll. F. Müller.

Neu-Guinea, im Museum Dresden, DEI, Museum Paris und in Coll. Korschefsky.

DEI: Holotypus, 9 Paratypen, D. Neu-Guinea, leg. Wahnes, Coll. F. Müller.

horni Weise, 1900 (Ortalia)

Dtsch. Ent. Ztschr., 433–434

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. Horn.

DEI: 1 Syntypus, Weligama, 1899, leg. Horn.

horni Weise, 1900 (Pharus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 434–435

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. Horn.

DEI: 3 Syntypen, Weligama, 1899, leg. Horn.

horni Weise, 1900 (*Sticholotis*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 429

Mehrere Syntypen, Ceylon, Puttalam, Nalanda, Colombo, Kandy, leg. Horn.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, Puttalam, Kandy, 1899; leg. Horn.

hybrida Mulsant, 1850 (*Psyllobora*)

Spec. Trim. Sec., 198–201

Holotypus, mehrere Paratypen, Brésil, collect. Dejean, Germar, Schaum, Muséum Paris, voyage Castelnau und Deville.
DEI: 2 Paratypen, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

immaculata Bielawski, 1963 (*Epilachna*)

Ann. Zool. Warsaw **21**, 422–424, Abb. 333–340, 347–348

Holotypus, N. NW Guinea, 1 Ex. New Guinea (Neth.), Wisselmeren, Okaitadi, 1800 m, 8. VIII. 1955, Coll. Gressitt; 2 Ex. New Guinea (Neth.), Wisselmeren, Euarotadi, 1900 m, 19. VIII. 1955, Coll. Gressitt; Paratypen: im DEI, Bernice P. Bishop Museum in Honolulu und Zoolog. Institut d. Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warszawa.
DEI: Holotypus, N. NW Guinea, Nr. 2907.

impatiens Fürsch, 1960 (*Afissa*)

Beitr. Ent. **10**, 446–447, Abb. 7–9

♂ Holotypus, Kamerunberg, oberhalb Buëa, 1200 m, 1. II. 1958, leg. Knorr, Exped. Eisentraut, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto., 3. I. 1958, in Coll. Fürsch.
DEI: ♂ Holotypus, Kamerun, Kamerunberg, oberhalb Buëa, 1200 m, 1. I. 1958, Exped. Eisentraut, 1957/58, leg. Knorr.

insularis Sicard, 1912 (*Coelophora*)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 134

Mehrere Syntypen, Formosa, Taihorinsho, ex DEI.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, VIII. 1909, leg. Sauter.

inversa Sicard, 1912 (*Epilachna*)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 133

Mehrere Syntypen, Brit. Uganda, ex DEI.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. Grauer, Coll. Kraatz.

japonica amurensis Weise, 1887 (*Hyperaspis*)

Arch. Naturg. **53** (1), 87 (als var. beschrieben)

Mehrere Syntypen, Sibirien, Chabarofka, leg. Gräser und Koltze.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Chabarofka, Coll. Koltze.

jucunda Mader, 1941 (*Solanophila*)

In: Expl. Parc Nat. Albert **34**, 63–65, Fig. 88–120

Holotypus, 120 Paratypen: Lac Gando, 2400 m, IV.–V. 1935; N. E. Gando, 2400 m, IV. 1935; Kihorwe, 7.–12. III. 1935; Kihorwe a Ilega, VI. 1935; Bugeshi, près Gando, 2400 m, 10.–12. III. 1935; Bonde, près Gando, 2400 m, 10.–12. III. 1935; Mudende, près Gando, 2400 m, 10. III. 1935; Tamira, près Gando, 2600 m, 11. III. 1935; Mulera, 1800–2000 m, IV.–V. 1935; Kibati,

1900 m, IV.–V. 1935; à Shove, 1765–2150 m, VI. 1935; Ruhengeri, riv. Penge, 1800–1825 m, 4.–5. X. 1935; Ruhengeri, Kinigi, 2.100 m, II. 1935; Ninda, 2.150 m, 18.–26. IX. 1934; Rwankeri, 2.200 m, IV.–V. 1935; Munege près Kibumba, 12. II. 1935; rég. Kibumba, 2.000 m, VI. 1935; Nyabirehe, S. Karisimbi, 2.400 m, 22. II. 1935; Gahinga v. Rwebeya, 3.000 m, 26. IX. 1934; Tsamugussa, 8.–15. VI. 1935; Kinago, prés mont Hehu, 2.400 m, 10. III. 1935; Burunga, Mokoto, 2.000 m, 15.–16. III. 1934; im Congo Museum und in Coll. Mader.
DEI: 1 Paratypus, Ruanda, Kinigi, Ruhengeri, II. 1935, leg. De Witte, Parc Nat. Albert, Musée du Congo, 1323.

kaestneri Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröff. Zool. St. Sammlung München 7, 209–211

♂ Holotypus, Bambesa, VIII. 1933, leg. Leroy; 1 ♀, dto.; 47 Ex. dto., IV., VI., VIII., X.; Dingila (Uelle), VI., VIII., 48 Ex.; 2 Ex. Panga, IX.; 15 Ex. Wamba, I.; 5 Ex. Ituri Medje, VIII.; 7 Ex. Buta; im Museum Tervuren, Museum München, Museum Frey und in Coll. Fürsch: Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Bambesa, VIII. 1933, leg. Leroy, ex Coll. Fürsch, Musée du Congo.

kaestneri conjugata Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröff. Zool. St. Samml. München 7, 211, Abb. 14

♂ Holotypus, NW. Ruwenzori, Watalinga, VI. 1937, leg. Lisfranc; 9 Ex. dto.; 44 Ex. Rég. des Lacs; 68 Ex. Beni; 4 Ex. Kiganga; 4 Ex. Kaporata; 14 Ex. Urwald Moera; im Museum Tervuren, Museum München, Museum Frey, Museum Berlin und in Coll. Fürsch: Paratypen

DEI: 1 Paratypus, Beni, 18. VIII. 1932, leg. Burgeon, Musée du Congo, ex Coll. Fürsch.

kaestneri pallens Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröff. Zool. St. Samml. München 7, 211–213, Abb. 15, 16

♂ Holotypus, Ituri, Bunia, 1938, leg. Lefèvre; 1 ♀, dto.; 103 Ex. dto., VI., VII.; 26 Ex. Mongbwalu, III., VI., VII., VIII., XII.; 3 Ex. Kivu, Lulenga, XI.; Kassenyi, II., VII., X., 9 Ex.; 38 Ex. Mahagi, V., VI., VII., IX; 15 Ex. Djugu, VIII.; 1 Ex. Aru; 4 Ex. Blukwa, I.; 3 Ex. Ituri Loé, X.; 1 Ex. Geti; 3 Ex. Watsa; im Zentralafrika-Museum Tervuren, Museum München, Museum Frey und in Coll. Fürsch; Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Ituri, Bunia, 1938, leg. Lefèvre, Coll. Fürsch, Coll. Mus. Congo.

kalawrytus Reitter, 1883 (Litophilus)

Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 62, 63–64

Mehrere Syntypen, nördl. Teil von Morea, leg. Brenske.

DEI: 3 Syntypen, Graecia, Morea, Hagios Wlassis, leg. Brenske, Coll. Kraatz, Coll. v. Heyden, Coll. Stierlin.

klingenbergi Künnemann, 1917 (Coccinella)

Ent. Bl. 13, 266–267

Holotypus, Rumänische Karpathen, in der Nähe des Klosters Lepsa, leg. Klingenberg (VII. 1917, Coll. Künnemann).

kochi Weise, 1913 (Coelophora)

Nova Guinea **9**, 443

Mehrere Syntypen, N. Guinea, Merauke, 1904, leg. Koch.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1904, leg. Koch.

koltzei Weise, 1887 (Adalia)

Arch. Naturg. **53** (1.2), 209–210

Mehrere Syntypen, Sibirien, Chabarofka, leg. Koltze.

DEI: 1 Ex. Amur, durch Weise, 1 Ex. dto. (als var. *graeseri* bezettelt), Coll. Koltze; Syntypen.

koltzei Weise, 1887 (Scymnus)

Arch. Naturg. **53** (1.2), 213–214

Mehrere Syntypen, Sibirien, Chabarofka.

DEI: 3 Syntypen, Chabarofka, durch Weise, Coll. Koltze.

kraatzi Weise, 1898 (Solanophila)

Dtsch. Ent. Ztschr., 110–111, Taf. 1, Fig. 30

Mehrere Syntypen, Kamerun, Yaunde, Johann-Albrechtshöhe, Barombi, leg. Conradt, im Museum Berlin und in Coll. Kraatz.

DEI: 5 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

limbata rudis Weise, 1907 (Epilachna)

Arch. Naturg. **73**, A 1–2, 231 (als var. beschrieben)

Mehrere Syntypen, Abyssinien, Anderatscha, Gojeb, Schubba, Gimirra, Schenna, Binescho, leg. Neumann.

DEI: 1 Syntypus, N. O.-Afr., O. Sudas, Binescho, leg. Neumann.

lineatopunctata Germar, 1824 (Coccinella)

Ins. spec. nov. **1**, Col. 618

Mehrere Syntypen, America meridionali.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

litigiosa Mulsant, 1851 (Naemia)

Spec. Col. Trim. Sec., 31–33

Holotypus, mehrere Paratypen; Columbien, Coll. Melly; Mexico, leg. Reiche; Nord-Amerika, leg. Buquet, Chevrolat, Dejean, Guex, Sallé, Solier, Trobert, etc.

DEI: 1 Paratypus, N. Amerika, leg. Schaum, Coll. Haag.

lorata Mulsant, 1851 (Daulis)

Spec. Col. Trim. Sec., 338–340

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Germar und Schaum, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

luteola Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Col. Trim. Sec., 563–565

Mehrere Syntypen; Columbien, leg. Chevrolat, Dejean, Germar, Schaum, Guérin; St. Domingo, leg. Trobert.

DEI: 2 Syntypen, Columbien, leg. Schaum, Coll. Haag, Coll. Kraatz.

machatschkei Fürsch, 1960 (Thea)

Beitr. Ent. **10**, 449–450, Fig. 15

♂ Holotypus, Kamerunberg, 1950 m, Musake Hütte, 9. IV. 1958, leg. Knorr, Exped. Eisentraut; im DEI.

marginata Bielawski, 1960 (Rodolia)

Beitr. Ent. **10**, 439–442, Fig. 9, 10–16

Holotypus, Buitenzorg, 1916; im DEI (IX. 1919, nicht 1916 !)

margipallens Mulsant, 1851 (Scymnus)

Spec. Trim. Sec., 953

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Germar und Schaum.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

mauritiusi Korschefsky, 1935 (Scymnus)

Arb. morph. tax. Ent. **2**, 256

Holotypus, mehrere Paratypen, Mauritius, Corps de Garde, 2. XII. 1934, leg. Vinson, im DEI, in Coll. Vinson und Coll. Korschefsky.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

melanaria Mulsant, 1851 (Synia)

Spec. Col. Trim. Sec., 375–376

Mehrere Syntypen, Indien orientales, leg. Germar, Schaum, Trobert, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, Ost-Indien, leg. Schaum, Coll. Haag.

melzeri Korschefsky, 1935 (Oryssomus)

Arb. morph. tax. Ent. **2**, 255–256, Fig. 4

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Sao Paulo, Campo Jordao, leg. Lane, ded. Melzer, im DEI und in Coll. Korschefsky.

DEI: Holotypus, Est Sao Paulo, Campo Jordao, leg. Lane.

miniata Germar, 1824 (Coccinella)

Ins. spec. nov. **1** (Col.) 617–618

Mehrere Syntypen, Brasilia.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

misera Weise, 1900 (Epilachna)

Dtsch. Ent. Ztschr., 420

Mehrere Syntypen, Ceylon, Bentota, Kandy, Matala, leg. Horn.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon, Bentotta, 1899, leg. Horn.

morio Mulsant, 1851 (Scymnus)

Spec. Col. Trim. Sec., 954; nom. praeocc. = Zool. Jahrb. Suppl. **16**, 33; 1929, brasiliense Weise

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Chevrolat, Germar und Schaum.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

muelleri Wingelmüller, 1912 (Scymnus)

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **62**, 185 (als ab. von *apetzi* Mulsant beschrieben)

Mehrere Syntypen, Portugal, Monchique, Lissabon, Quellar, Sardinien, Assuni, Mti sette fratelli; Corsica, Biguglia; Sizilien, Ficuzza, Madonia, Nicolosi, Kephalonía, Argostoli; Zante, Kalamaki; in Coll. Leonhard.

DEI: 3 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Sicilia, Ficuzza, Nicolosi, 1906, leg. Leonhard; 1 ♂, Zante, Umgeb. d. Stadt, 1909, leg. Hilf, Coll. Leonhard.

murina Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 814–815

Mehrere Syntypen, Mexico, leg. Chevrolat, Dejean, Germar und Schaum.

DEI: 1 Ex. Mexico, leg. Schaum, 1 Ex. ohne Fundort; Coll. Haag, Syntypen.

musculus Weise, 1900 (Pullus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 438–439

Mehrere Syntypen, Ceylon, Negombo, Bentota, leg. Horn.

DEI: 1 Syntypus, Negombo, 1899, leg. Horn.

neglecta Mader, 1941 (Chnootriba)

In: Expl. Parc. Nat. Albert **34**, 161–163, Fig. 472–483

Holotypus, Lac Gando, I. 1935, 2.400 m, 6.–8. III. 1935; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Lac Gando, 2.400 m, 6.–8. III. 1935, leg. De Witte, Parc Nat. Albert, Musée du Congo, Nr. 1227.

nigerrimus Fürsch, 1960 (Novis)

Beitr. Ent. **10**, 447–448, Fig. 10, 11

♀ Holotypus, Abessinien, Coll. Kraatz; im DEI.

nigrovarius Lea, 1907 (Rhizobius)

Proc. Roy. Soc. Victoria (N. S.) **2** (20), 204–205

33 Syntypen: King Island, Bass Strait, leg. Lea, Kershaw, Conlon, Colbourn, Morton und Hickmott; Tasmania, Franford, Ulverstone, Launceston, New Norfolk.

DEI: 2 Syntypen, Tasmania, Coll. Hacker.

nivicola Mulsant, 1851 (Coccinella)

Spec. Col. Trim. Sec., 109–110

Mehrere Syntypen, Kamtschatka, Coll. Dejean, Chevrolat, etc.; Sitka, im Museum Petersburg.

DEI: Lectotypus, Kamtschatka, Coll. v. Heyden-Coll. Haag; designiert von Khnzorian, 1970.

numidicus Pic, 1900 (Pharus)

Echange **16**, 91

Mehrere Syntypen, Algérie, Tunisie, Tougourt, Gafsa, leg. Pic, Ain O'Grab, leg. Leprieur, etc.

DEI: 1 Syntypus, Tunis, durch Desbrochers, Coll. v. Heyden.

obscura Mulsant, 1851 (Oeneis)

Spec. Col. Trim. Sec., 500

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Germar und Schaum.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

oertzeni Weise, 1886 (Scymnus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 25–26

Mehrere Syntypen, Doris, leg. v. Oertzen.

DEI: 2 Syntypen, Graecia, Doris, leg. v. Oertzen, Coll. Leonhard.

opaca Weise, 1900 (Clanis)

Dtsch. Ent. Ztschr., 430

Mehrere Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, Kanthalay, Bandarawella, leg. Horn.

DEI: 2 Syntypen, Anuradhapura, Bandarawella, 1899, leg. Horn.

paenulata Germar, 1824 (Coccinella)

Ins. spec. nov. **1** (Col.), 618–619

Mehrere Syntypen, Buenos Ayres.

DEI: 1 Syntypus, Buenos Ayres, durch Schaum, Coll. Haag.

pantherina Sicard, 1912 (Solanophila)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 129–130

Mehrere Syntypen, Brit. Uganda, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. Grauer, Coll. Kraatz.

parenthesis Weise, 1923 (Nephus)

Arch. Naturg. **89**, A2, 187–188

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, V. 1912, leg. Sauter.

perlata Sicard, 1907 (Solanophila)

Ann. Soc. Ent. Fr. **76**, 451–452

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Diego Suarez, Amber-Gebirge, Antsianaka, leg. Perrot, in Coll. Oberthür.

DEI: 2 Syntypen, Madagaskar, Mt. d'Ambre, durch Sicard, Coll. Kraatz.

pilosula Weise, 1900 (Clanis)

Dtsch. Ent. Ztschr., 429–430

Mehrere Syntypen, Ceylon, Weligama, Kekirawa, leg. Horn.

DEI: 1 Syntypus, Weligama, 1899, leg. Horn.

podagrica Weise, 1908 (Rodolia)

Nova Guinea 307

Mehrere Syntypen, Java, Montes Tengger, leg. Drescher.

DEI: 1 Syntypus, Java, Tenggergeb., leg. Drescher.

politus Schaufuß, 1879 (Scymnus)

Nunqu. otiosus **3**, 480

Mehrere Syntypen, Nova-Granata.

DEI: 2 Syntypen, Neu Granada, ded. 1932 Schaufuß.

praetermissa Korschefsky, 1928 (Solanophila)

Ent. Mitt, **17**, 42, Fig. 2

Mehrere Syntypen, D. O. Afrika, Amani, im DEI.

DEI: 13 Syntypen, Amani, leg. Zimmermann.

prasina Mulsant, 1851 (Thalassa)

Spec. Col. Trim. Sec., 516

Mehrere Syntypen, Cuba, leg. Germar und Schaum.

DEI: 1 Syntypus, Cuba, leg. Schaum, Coll. Haag.

Syn. zu flavipes Mulsant, 1851.

processa Weise, 1908 (Epilachna)

Stett. Ent. Ztg. **79**, 217 (als ab. von wissmanni Mulsant beschrieben)

Mehrere Syntypen, Ostindien, Tharrawaddy, leg. Andrewes und von Siam über die großen Sundainseln verbreitet.

Li hat 1955, die Ex. die sich im DEI befinden als Paratypen ausgezeichnet.

Nach den Nomenklaturregeln liegt hiermit eine Lectotypenfestlegung vor.

DEI: 2 Paralectotypen, Formosa, Alikang, Taihorin, 1911, leg. Sauter.

prosternalis Fürsch, 1960 (Ortalia)

Beitr. Ent. **10**, 448–449, Fig. 12–14

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Benguella, leg. Wellman, Coll. Kraatz; im DEI.

pulchella Mulsant, 1851 (Coccinella)

Spec. Col. Trim. Sec., 102–104

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Dejean, etc.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Parz., Coll. Haag.

pyrenaeus Kraatz, 1873 (Exochomus)

Berl. Ent. Ztschr. **17**, 194 (als var. von auritus Scriba beschrieben)

Mehrere Syntypen, Ost-Pyrenäen.

DEI: 1 Syntypus, Pyrenäen or., Coll. Kraatz.

Syn. zu flavipes Thunberg, 1781.

quinquenotata Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Col. Trim. Sec., 548–550

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Dejean, Germar und Schaum, etc.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

quinquepunctatus Weise, 1923 (Nephus)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 188

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, VII. 1912, leg. Sauter.

roepkei Fluiter, 1938 (Scymnus)

Arch. v. d. Koffiecultura **12**, 49, Fig.

♀ Holotypus, 1 ♂; 2 ♂♂, 2 ♀♀, mikroskop. Präparate, Paratypen; Djember,

Ost-Java, 23., 28. XII. 1937, im Museum Leiden, in Coll. Lab. v. Ent., Wagenin-

gen en Zoöl. Mus., Buitenzorg, in Coll. Besoekisch Proefstation, Djember, Java.

DEI: 1 Paratypus, Java, Djember, 15. I. 1937, leg. De Fluiter.

rugulosa Sicard, 1912 (Harmonia)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 134

Mehrere Syntypen, Mexico, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Coll. Kraatz.

sauteri Weise, 1923 (Nephus)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 187

2 Syntypen, Formosa, Kankau, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, V. 1912, leg. Sauter.

sauteri Weise, 1923 (Solanophila)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 182–183

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 1912, leg. Sauter.

schaufussi Vogel, 1865 (Cleothera)

Isis Dresden, 234 (1864)

Mehrere Syntypen, N.-Granada.

DEI: 4 Syntypen, N.-Granada, durch Schaufuss, 1932.

Syn. zu tessulata Mulsant.

schenklingi Sicard, 1912 (Solanophila)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 130–131

Mehrere Syntypen, Afrika, Nyam Nyam, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Nyam Nyam, Coll. Kraatz.

scutifera Mulsant, 1851 (Cleothera)

Spec. Col. Trim. Sec., 565–566

Mehrere Syntypen, Prov. Vénézuéla, Umgebung Valencia, leg. Germar und Schaum.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, leg. Schaum, Coll. Haag.

sellata Mulsant, 1851 (Brachyacantha)

Spec. Col. Trim. Sec., 522–523

Holotypus, mehrere Paratypen, Brésil, leg. Buquet, Dejean, Doué, Dupont, Germar, Schaum, Hope, Trobert; im Museum Paris.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

seminulus Mulsant, 1851 (Scymnus)

Spec. Col. Trim. Sec., 954

Mehrere Syntypen, Brésil, leg. Chevrolat, Germar, Schaum.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

serraticornis Mulsant, 1851 (Macaria)

Spec. Col. Trim. Sec., 223

Holotypus, mehrere Paratypen, Brésil, leg. Dejean, Germar, Schaum, Reiche, etc.

DEI: 1 Paratypus, Brasilien, leg. Schaum, Coll. Haag.

sexareata Weise, 1897 (*Adalia*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 298

Mehrere Syntypen, Ostafrika, Usambara, bei Kwai, im Vorgebirgsland des Kilimandscharo, leg. P. Weise.

DEI: 1 Syntypus, Kwai, Coll. v. Bennigsen.

signifera Sicard, 1907 (*Solanophila*)

Ann. Soc. Ent. Fr., 450, Fig.

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Wald d' Ambre, leg. Sicard.

DEI: 4 Syntypen, Madagaskar, Mt. d' Ambre, leg. Sicard.

soarezica Sicard, 1907 (*Solanophila*)

Ann. Soc. Ent. Fr. **76**, 445, Fig.

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Amber-Gebirge, 900 m alt.

DEI: 4 Syntypen, Madagaskar, Mt. d' Ambre, leg. Sicard.

sodalis Weise, 1923 (*Pullus*)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 186

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: 9 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, IV., V., VII. 1912, leg. Sauter.

soluta Weise, 1900 (*Solanophila*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 119–121

Mehrere Syntypen, West-Usambara, bei Mombo, Mitte VII. 1899, leg. Weise.

DEI: 1 Syntypus, Mombo, Coll. Kraatz.

subfasciata Weise, 1923 (*Epilachna*)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 182

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, Anping, leg. Sauter.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, 7. IV. 1912.

subnigra Bielawski, 1963 (*Epilachna*)

Ann. Zool. Warsaw **21**, 371–373, Fig. 181–187

Holotypus, D. Neu Guinea, leg. Wahnes, durch F. Müller; im DEI.

tenuipicta Sicard, 1907 (*Solanophila*)

Ann. Soc. Ent. Fr. **76**, 443–444, Fig.

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Mont d' Ambre, 700 m altitude.

DEI: 4 Syntypen, Madagaskar, Mt. d' Ambre, leg. Sicard.

testaceus cognatus Weise, 1887 (*Scymnus*)

Arch. Naturg. **53** (1), 213

2 Syntypen, Sibirien, bei Chabarofka, durch Koltze.

DEI: 1 Syntypus, Chabarofka, durch Weise, Coll. Koltze.

thurifera Sicard, 1923 (*Thea*)

Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord **14**, 78–79

Mehrere Syntypen, Sgag (Aurés), leg. de Peyerimhoff.

DEI: 1 Syntypus, le Mahmel, Aurés, Algeria, durch Peyerimhoff.

togoensis Fürsch, 1960 (Scymnus)

Beitr. Ent. **10**, 444–446, Fig. 4–6

♂ Holotypus, 6 Paratypen, Togo, Coll. Kraatz, in Coll. Fürsch und im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, 4 Paratypen, Togo, Coll. Kraatz.

tonkinensis Bielawski, 1957 (Epilachna)

Acta Zool. Krakow **2**, 91–95, Fig. 1–8

Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV.–V., 2–3000 m, leg. Fruhstorfer; 6 Paratypen dto., im Zool. Institute of the Polish Academy of Sciences, Warszawa.
DEI: 1 Paratypus, Tonkin, Montes Mauson, IV., V., 2–3000', leg. Fruhstorfer, Mus. Zool. Polonicum, Warszawa.

tripartita Sicard, 1912 (Epilachna)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 132–133

Mehrere Syntypen, Britisch. Uganda, ex DEI.

DEI: 2 Syntypen, Brit. Uganda, leg. Grauer, Coll. Kraatz.

umerata Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröff. Zool. St. Samml. München **7**, 233–234, Abb. 36

♂ Holotypus, Mangu; 1 ♀, dto.; 4 Ex. dto., 2 Ex. Thikla; 4 Ex. Kenia, leg. Warrendorff; Paratypen: in der Zool. Staatssammlung München, im Museum Berlin, DEI und in Coll. Fürsch.

DEI: 3 Paratypen, Kenia, leg. Warrendorff, Coll. Kraatz.

vagula Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröff. Zool. St. Samml. München **7**, 226–227, Abb. 27

♂ Holotypus, Usambara, Nguelo, leg. Heyne; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Ex. Dar-es-'Salaam, leg. v. Bennigsen, Coll. v. Bennigsen; 3 Ex. Usambara, Coll. Schröder; 1 Ex. Brit. Uganda, leg. Grauer, Coll. Kraatz; 8 Ex. Usambara, Nguelo, Coll. Kraatz; 2 Ex. ohne Fundort, Coll. Kraatz; 8 Ex. Massai-steppe, leg. Schröder; 1 Ex. Zanzibar, leg. Cooke, ex. Museum Warschau; Paratypen.

variabilis Korschefsky, 1934 (Oryssomus)

Arb. morph. tax. Ent. **1**, 35–36

Mehrere Syntypen, Chile, Prov. Conception, VIII. 1903, leg. Herbst, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Chile, Prov. Conception, leg. Herbst, Coll. Kraatz.

varius Kirsch, 1870 (Scymnus)

Berl. Ent. Ztschr., 396

Mehrere Syntypen, Egyptus, Ramleh, leg. Schneider.

DEI: 3 Syntypen, Aegypten, leg. O. Schneider, Coll. v. Heyden.

varivestis Mulsant, 1851 (Epilachna)

Spec. Col. Trim. Sec., 815–817

Mehrere Syntypen, Mexico, leg. Chevrolat, Dejean, Germar und Schaum, Guérin, Melly, Perroud, Reiche, Westwood.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. Schaum, Coll. Haag.

vigintioctopunctata sumbana Bielawski, 1959 (Epilachna)

Verh. Nat. Ges. Basel **69**, 147–149, Abb. 1–7

♂ Holotypus, W. Sumba, Waikarudi, 5. IX. 1949; 1 ♀, dto., 2. IX. 1949; 16 Ex. C. Sumba, Lindiwatju, 29. IX.; W. Sumba, Bondo Kodi, 2. VIII., 4. VIII.; Waimangura, 17. VIII., Rua, 28., 30., 31. VIII., 1. IX.; Waikarudi, 3. IX.; O. Sumba, Baing. Wai Rara, 1. VII.; W. Flores, Mborong, 8. XI.: Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, W. Sumba, Rua, 31. VIII. 1949, leg. Bahler und Sutter, Inst. Zool. P. A. N. Warszawa, Nr. 113/57.

vilis Weise, 1923 (Pullus)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 186

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, Tainan, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: 2 Ex. Formosa, Kankau, Koshun, V., VIII. 1912, 1 Ex. Tainan, IV. 1912, 1 Ex. Kosempo, 22. V. 1912; leg. Sauter, Syntypen.

weisei Sicard, 1912 (Solanophila)

Arch. Naturg. **78**, A 6, 129

Mehrere Syntypen, Bolivien, ex DEI.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, Coll. Kraatz.

welwitschi planipennis Korschefsky, 1929 (Ailocaria)

Zool. Anz. **82**, 88

2 Ex. zwischen Klein-Popo und Bismarckburg, 8.–24. VIII. 1892, leg. Conradt, im Museum Berlin; 2 Ex. Congo Belgique, Kondue, leg. Luja, Kamerun, leg. v. Bennigsen, Coll. Kraatz, im DEI; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Congo-Belge, Kodué, leg. Luja, Coll. Kraatz.

zimmermanni Weise, 1922 (Solanophila)

Ent. Mitt. **11**, 105–106

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, bei Amani, leg. Zimmermann.

DEI: 43 Syntypen, Amani, leg. Zimmermann (als ab. a und ab. amaniensis Weise bezettelt).

zumpti Fürsch, 1963 (Epilachna)

Veröff. Zool. St. Samml. München **7**, 266, Abb. 73

♂ Holotypus, Njassa-See, Mango, 600 m, 9. IX. 1952, leg. Lindemann und Parlitzki; 1 ♀, Njassa-See, Lupingi, 1480 m, 3. IX. 1952, leg. Lindemann und Parlitzki; Ost-Afrika, Mufinda, 1800 m, leg. Zumpt, X. 1938, 12 Ex.; Lubero, 2 Ex.; Kivu, Katwe, 1 Ex.; Kivu, Tshibinda, XI., 2 Ex.; in der Zool. Staatssammlung München, im Museum Frey, im Zentralafrika-Museum Tervuren, DEI und in Coll. Fürsch: Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Kivu, Tshibinda, XI. 1932, leg. Burgeon, Musée du Congo.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

maxima formosana Korschefsky (Solanophila)

DEI: 1 Typus, Formosa, Taiheizan, 9. VII. 1933, Coll. Chujo.

moseri novaeguineensis Korschefsky (Coelophora)

DEI: 2 Typen, D. Neu-Guinea, leg. Wahnes, Coll. F. Müller.

oculata Korschefsky (Cycloneda)

DEI: 8 Typen, Brasilien, Sao Paulo, Canyo di Jordao Est, leg. Melzer, durch v. Laue.

pallidesignata Korschefsky (Coelophora)

DEI: 1 Typus, Malacca, Coll. Kraatz.

Rhizophagidae

wagai Wankowicz, 1865 (Rhizophagus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 5, 229 (als vagae beschrieben)

Mehrere Syntypen, Lithauen.

DEI: 5 Syntypen, Lithauen, Coll. Kraatz.

Syn. zu puncticollis Sahlberg, 1837.

Cisidae

giganteus Pic, 1934 (Cis)

Mél. exot. Ent. 63, 15

Mehrere Syntypen, China

DEI: 2 Syntypen; China, Südost Szechuan, Ginfushan, 600–1 600 m; Nitou Tatsienlu, Szechuan; leg. Reitter.

wagae Wankowicz, 1869 (Ennearthron)

Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 9, 421–422

Mehrere Syntypen, Lithauen.

DEI: 5 Syntypen, Lithauen, Coll. Kraatz.

Temnochilidae

interrupta Brookes, 1932 (Leperina)

Trans. Proc. N. Zealand Inst. 63, 28–29

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Stephan Island, Cook Strait.

DEI: 2 Paratypen, Stephan Island, Cook Strait, 9. XII.–I. 1931, Coll. Fairburn.

marginata Grouvelle, 1914 (Ancyrona)

Arch. Naturg. 79, A 11, 46–47

Holotypus, Formoso, Taihorin, leg. Sauter; im DEI (VII. 1911).

procera Kraatz, 1858 (Peltis)

Berl. Ent. Ztschr. 2, 136–137

Mehrere Syntypen, Parnes, leg. Zebe.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. Kraatz.

regularis Grouvelle, 1914 (Leperina)

Arch. Naturg. 79, A 11, 46

Mehrere Syntypen, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutshu, leg. Sauter.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1912.

Cucujidae

admotus Grouvelle, 1913 (Laemophloeus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 59–60

6 Syntypen, Formosa Taihorin, leg. Sauter.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Taihorin, VII. 1911, leg. Sauter.

africanus Kraatz, 1895 (Brontes)

Dtsch. Ent. Ztschr., 162, 437; nom. praecoc. = africana Grouvelle, 1889, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) **9**, 101, Taf. 5, Fig. 1

2 Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

australis Kessel, 1921 (Thione)

Arch. Naturg. **87**, A 6, 25

Holotypus, Australien, Cairns; im DEI (VII. 1905).

bruchii Grouvelle, 1905 (Telephanus)

Rev. Mus. La Plata **12**, 125–126

Mehrere Syntypen, Argentinien, Prov. Buenos Ayres.

DEI: 3 Syntypen, Argentina, Prov. Buenos Aires, 5. VI. 1904, leg. Bruch, Coll. Kraatz.

carenifrons Grouvelle, 1913 (Mimemodes)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 62–63

♂ Holotypus, Formosa, Suisharyo, leg. Sauter; im DEI (XII. 1911).

carpetanus Heyden, 1870 (Airophilus)

Berl. Ent. Ztschr., Beiheft: Heyden Reise Spanien, 108

Holotypus, Guadarrama-Gebirge, Puerto de Nava-Cerrada, 20. IV., Coll. v. Heyden; im DEI.

consors Sharp, 1900 (Silvanus)

Biol. Centralamer. **2** (1), 561–562, Tab. 17, Fig. 26

Mehrere Syntypen, Guatemala, nahe der Stadt, leg. Champion.

DEI: 2 Syntypen, Guatemala, City, leg. Champion.

costaricensis Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 163–166, Taf. 2, Fig. 4

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, San José, Coronado, West- und Südabhang des Vulkans Irazú, Hamburg Farm, Ramal Parismina, Vara Blanca, Tres Rios, in Coll. Nevermann, im Museum Hamburg, Senckenbergisches Museum in Frankfurt a. M., Britischen Museum und Museum Washington.

DEI: 9 Paratypen, Costa Rica, San José, 1000–1200 m, 15. IX. 1926/ 19. XII. 1928, Coronado, 17. I. 1929, 1400–1500 m; leg. Nevermann.

crenicollis Grouvelle, 1913 (Uleiota)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 57–58

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, I. 1908, leg. Sauter.

cribricollis Grouvelle, 1897 (Silvanus)

Ann. Mus. Nat. Genova (2) **18** (38), 397–398

- Mehrere Syntypen, Sumatra, Deli, in Coll. Grouvelle, Engano, Bua Bua, Malacconi, leg. Modigliani, im Museum Gênes.
DEI: 1 Syntypus, Engano, Bua Bua, V. VI. 1891, leg. Modigliani, Coll. Kraatz.
- denticulata** Baudi, 1870 (Cyprogenia)
Berl. Ent. Ztschr. **14**, 54–55
- Mehrere Syntypen, Cypern.
DEI: 1 Syntypus, Cypern, Coll. Kraatz.
- emarginata** Grouvelle, 1913 (Ancistrina)
Arch. Naturg. **79**, A 11, 56–57
- Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. Sauter; im DEI (08–10).
- felix** Kessel, 1921 (Laemophloeus)
Arch. Naturg. **87**, A 6, 30
- Holotypus, Australien, Cairns, im DEI (VIII. 1905, Coll. Hacker).
- ferrugineus** Kraatz, 1862 (Aerophilus)
Berl. Ent. Ztschr. **6**, 129
- Mehrere Syntypen, Andalusien, leg. Staudinger, in Coll. Kraatz.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- fibulatus** Kraatz, 1862 (Aerophilus)
Berl. Ent. Ztschr. **6**, 128–129
- Holotypus, Andalusien, leg. Staudinger, in Coll. Kraatz; im DEI.
Syn. zu *nasutus* Chevrolat, 1860.
- filum** Kraatz, 1895 (Silvanus)
Dtsch. Ent. Ztschr., 162
- Mehrere Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.
DEI: 4 Syntypen, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz.
- formosianus** Grouvelle, 1913 (Laemophloeus)
Arch. Naturg. **79**, A 11, 60–61
- ♂ Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. Sauter; im DEI (VII. 1911).
- freyreissi** Heyden, 1827 (Cucujus)
Frankf. Iris, Nr. 46
- Holotypus, Brasilien, durch Freyreiß.
DEI: ♀ Holotypus, Brasilia, leg. Feldegg, Coll. v. Heyden.
- gracilis** Schaufuß, 1893 (Telephanus)
Nunq. otios. **3**, 600–601
- Mehrere Syntypen, Madagascar, durch L. W. Schaufuß und Klocke.
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Antananarivo, Coll. L. W. Schaufuß, durch Heyne 1912 comm.
- grossicornis** Nevermann, 1931 (Telephanus)
Stett. Ent. Ztg. **9**, 139–140, Taf. 4, Fig. 2, 4c
- Holotypus, mehrere Paratypen; Costa Rica, Hamburg Farm, Ramal Parismina, Palo Seco; Panama, Porto Bello, Tabernilla (C. Z.); in Coll. Nevermann, Museum Hamburg, Museum Washington, Museum Berlin, Britischen Museum und Museum Wien.

DEI: 7 Paratypen, Costa Rica, Hamburg Farm, Reventazon, Ebene Limon, 3. VIII. 1929/14. XII. 1924/10. VI. 1923/3. VIII. 1929/6. VI. 1930/26. VI. 1930, leg. Nevermann.

horni Grouvelle, 1908 (Europs)

Rev. d' Ent. **27**, 187–188

Mehrere Syntypen, Afrique orientale allemande, Zanzibar, Kwai, leg. Weise, im DEI und im Coll. Grouvelle.

DEI: 6 Syntypen, Zanzibar, Coll. Kraatz.

horridus Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 175–177, Taf. 5, Fig. 5

Holotypus, 81 Paratypen, Costa Rica, Hamburg Farm, Las Mercedes, Ramal Parismina, Coronado, Rio Macho, Westabhang Vulkan Irazu, Turrialba, in Coll. Nevermann, im Britischen Museum, Museum Hamburg, Senckenbergischen Museum Frankfurt a. M., Museum Washington und Museum Berlin.

DEI: 5 Paratypen, Costa Rica, Coronado, 1400–1500 m, Rio Macho, 8. II. 1924, Hamburg Farm, Reventazon, Ebene Limon, 2. II. 1929/1. X. 1929; leg. Nevermann.

humeralifer Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 142–143, Taf. 4, Fig. 5

Holotypus, 89 Paratypen, Costa Rica, Bananito, Hamburg Farm, Guapiles, Ramal Parismina, Iberia Farm, in Coll. Nevermann, im Museum Hamburg, Britischen Museum, Senckenbergischen Museum Frankfurt a. M. und Museum Washington.

DEI: 2 Ex. Costa Rica, Hamburg Farm, Ebene Limon, Reventazon, 9. IV. 1929, 1 Ex. Ramal Parismina, Santa Clara, 7. IV. 1924, leg. Nevermann; Paratypen.

hypobori Perris, 1855 (Laemophloeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (3) **3**, Bull. LXXVII

Mehrere Syntypen, S. Frankreich, Landes.

DEI: 1 Syntypus, Landes, Dberus, Coll. Stierlein.

ignotus Kessel, 1921 (Laemophloeus)

Arch. Naturg. **87**, A 6, 30–31

Holotypus, Samoa; im DEI (Akia).

insidiosus Grouvelle, 1912 (Silvanoprus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **81**, 342–344

2 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

insularis Kessel, 1921 (Laemophloeus)

Arch. Naturg. **87**, A 6, 29–30; nom. praecoc. = singularis Hetschko, Wien. Ent. Ztg. **44**, 142; 1928

Holotypus, Samoa (?), Sotschi; im DEI.

integer Grouvelle, 1906 (Laemophloeus)

Rev. d' Ent. **25**, 118

Mehrere Syntypen, Ile Nias, leg. Thomas, in Coll. Grouvelle.

DEI: 3 Syntypen, Nias I., 1892, leg. Thomas.

juniperi Grouvelle, 1874 (Laemophloeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) **4**, Bull. XXVIII

Mehrere Syntypen, Frankreich, Österreich, Spanien; Fontainbleau; Marseille, leg. Perrin.

DEI: 4 Syntypen, Fontainbleau, durch Grouvelle und Desbrochers, Coll. v. Heyden.

juvencus Kessel, 1921 (Laemophloeus)

Arch. Naturg. **87**, A 6, 31

Holotypus, Australien, Cairns, im DEI (VII. 1905).

kraatzi Grouvelle, 1914 (Cheilopoma)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 162–163, Taf. 6, Fig. 3

Mehrere Syntypen; Afrique occidentale, Kamerun, leg. Conradt, in Coll. Grouvelle und im DEI; Bas Ogooué, leg. Haug, im Museum Paris.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt.

juvencus Kessel, 1921 (Laemophloeus)

Arch. Naturg. **87**, A 6, 31

Holotypus, Australien, Cairns, im DEI (VIII. 1905).

kraatzi Grouvelle, 1914 (Cheilopoma)

Ann. Soc. Ent. Fr. **83**, 162–163, Taf. 6, Fig. 3

Mehrere Syntypen; Afrique occidentale, Kamerun, leg. Conradt, in Coll. Grouvelle und im DEI; Bas Ogooué, leg. Haug, im Museum Paris.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. Conradt.

krueperi Reitter, 1879 (Laemophloeus)

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. **29**, 78–79

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. Krüper.

DEI: 1 Syntypus, Graecia, durch Reitter, Coll. v. Heyden.

kuntzeni Nevermann, 1931 ((Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 131–132

Holotypus, mehrere Paratypen, Mexico, Almolonga, Cuernavaca, Jomotla, Jalapa, Puebla, leg. Flohr, Amatan, Manantial, leg. Becker; im Museum Berlin, in Coll. Nevermann und DEI.

DEI: 2 Paratypen, Mexico, Jalapa, Veracruz, leg. Heine.

malyi Obenberger, 1914 (Monotoma)

Kol. Rundsch. **3**, 106–107

Mehrere Syntypen, Zentralasien, Buchara or., Jangi Kuduk, leg. Maly.

DEI: 1 Syntypus, Asia centr., Buchara or., Jangi Kuduk, leg. Mely, Coll. Obenberger.

melanchlorus Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 138–139, Taf. 4, Fig. 1, 4b

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, San José, Curridabat, Tres Rios, La Caja, leg. Schmidt, Turrúcares, Mojica, Turrialba, Las Mercedes, Panamá, Porto Bello (?), Venezuela, Caracas, leg. Thieme, in Coll. Nevermann, im Museum Berlin, Museum Hamburg, im Britischen Museum, Museum Wien und Museum Washington.

DEI: 1 ♀, Costa Rica, Mojica, Guanacaste, 18. VIII. 1929; 1 ♂, San José, 1000–1200 m, 12. X. 1926, leg. Nevermann; 1 ♂, 1 ♀, La Caja, San José, X. 1930, leg. L. Schmidt; Paratypen.

mobilis Grouvelle, 1908 (Laemophloeus)

Rev. d'Ent. **27**, 168–169

2 Syntypen, Zanzibar, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Zanzib., Coll. Kraatz.

nigra Kessel, 1921 (Thione)

Arch. Naturg. **87**, A 6, 25–26

Holotypus, Queensland, Cap York; im DEI (Coen District, Cape York, leg. Hacker).

paganettii Obenberger, 1918 (Airaphilus)

Ent. Bl. **14**, 60

Mehrere Syntypen, Kreta, leg. Paganetti-Hummeler.

DEI: 2 Syntypen, Kreta, leg. Paganetti.

proximus Grouvelle, 1913 (Mimemodes)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 63–64

♂ Holotypus, Formosa, Kamagawa, leg. Sauter (3. VIII. 1906); im DEI.

rodericensis Scott, 1933 (Hemipeplus)

Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **12**, 604–608, Fig. 1–3

Holotypus, 28 Paratypen, Rodriguez Island, VIII.–XI. 1918, leg. Thomasset und Snell, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, Rodriguez I., VIII.–XI. 1918, leg. Snell und Thomasset.

ruficollis Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **91**, 129–130, Taf. 2, Fig. 1

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Coronado, I.–IV., San José, XI., Curridabat, VI., in Coll. Nevermann, Museum Hamburg, Britischen Museum und Museum Washington.

DEI: 2 Paratypen, Costa Rica, Coronado, 1400–1500 m, 8., 15. II. 1924, leg. Nevermann.

sauteri Grouvelle, 1913 (Ancistria)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 54–56

4 Syntypen, Formosa, Fuhosho, Taihorin, leg. Sauter.

DEI: Lectotypus, Formosa, Taihorin, 2. VII., leg. Sauter; designiert durch Slipinski.

sauteri Grouvelle, 1913 (Inopeplus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 58–59

2 Syntypen, Formosa, Taihorin, leg. Sauter.

DEI: Lectotypus, Formosa, Taihorin, 7. VII. 1911, leg. Sauter; designiert durch Slipinski.

scrabrosicollis Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 167–169, Taf. 5, Fig. 1

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Hamburg Farm, Waldeck Farm, Ramal Parismina, Bananito, in Coll. Nevermann, im Museum Hamburg, Britischen Museum und Museum Washington.

DEI: 5 Paratypen, Costa Rica, Hamburg Farm, Reventazon, Ebene Limon, 2. II. 1929, leg. Nevermann.

sericellus Rottenberg, 1870 (Monotoma)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 237

Mehrere Syntypen, Sicilien, bei Catania.

DEI: 4 Syntypen, Catania, leg. v. Rottenberg.

Syn. zu multistriolatus Perris, 1866.

serratus Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 161, Taf. 5, Fig. 4

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Bananito, Hamburg Farm, Iberia Farm, Ramal Parismina, Panamá, Porto Bello, II. 1911, Coll. Schwarz, im Museum Washington, Museum Hamburg, Britischen Museum und in Coll. Nevermann.

DEI: 6 Paratypen, Costa Rica, Hamburg Farm, Reventazon, Ebene Limon, 14. X. 1924/1. X., 2. II. 1929/26. VI. 1930, leg. Nevermann.

siculus Stierlin, 1864 (Silvanus)

Berl. Ent. Ztschr. **8**, 147

Mehrere Syntypen, Sicilien.

DEI: 2 Syntypen, Sicilia, Coll. Stierlin.

Syn. zu unidentatus Fabricius, 1792.

talpa Kraatz, 1862 (Airaphilus)

Mehrere Syntypen, Hyères, durch Rey an Kraatz.

DEI: 1 Syntypus, Hyères, Coll. Kraatz.

Syn. zu nasutus Chevrolat, 1860.

tenuicorne Grouvelle, 1913 (Hectarthrum)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 53–54

Syntypen: 4 Ex. Tonkin, Hanoi, Region de Hong-Hai, in Coll. Grouvelle; 1 Ex. Formosa, Fuhosho, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Fuhosho, leg. Sauter, 7 IX.

turcicus Grouvelle, 1876 (Laemophloeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (5) **6**, Bull. XXXIII

Mehrere Syntypen, Turquie, in Coll. Grouvelle.

DEI: 6 Paralectotypen, Turcie, Sircut (nicht lesbar!) in prunis; designiert durch Lefkovitsch, 1962.

turrialbensis Nevermann, 1931 (Telephanus)

Stett. Ent. Ztg. **92**, 146–147

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Costa Rica, Turrialba, V., durch Heyne, im Museum Berlin und DEI.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 800 m, leg. Schild, durch Heyne.

walkeri Lea, 1904 (Dryocora)

Proc. Linn. Soc. N. S. Wales **29**, 87–88, Taf. 4, Fig. 5

Mehrere Syntypen; Australien, Mount Wellington, leg. Walker, Griffith, Lea; Huon River, leg. Hobart, Tasm., leg. Lea.

DEI: 1 Syntypus, Tasmania, Coll. Hacker.

Nitidulidae

africanus Kraatz, 1895 (Meligethes)

Dtsch. Ent. Ztschr., 150–151

Holotypus, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz, ♀).

africanus Kraatz, 1895 (Pocadius)

Dtsch. Ent. Ztschr., 152

Holotypus, Togo (♂, Coll. Kraatz).

alutaceus Obenberger, 1916 (Cybocephalus)

Arch. Naturg. **82** (4), 27

Mehrere Syntypen, Kreta.

DEI: 1 Syntypus, Kreta, leg. Paganetti, Coll. Leonhard.

amplus Grouvelle, 1913 (Brachypeplus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 34–35

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. VII. 1911.

analis Grouvelle, 1899 (Carpophilus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 129

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

basalis Grouvelle, 1899 (Cillaeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 125–126, 128

Mehrere Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1968.

basimacula Kraatz, 1895 (Cryptarcha)

Dtsch. Ent. Ztschr., 153

Holotypus, Togo; im DEI (♂).

basimaculatus Grouvelle, 1899 (Cyllodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 132–133, 135

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 5 Ex. Kamerun, 1 Ex. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, X. 1896, leg. Conradt, Coll. Kraatz, Paralectotypen; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

bifasciata Baudi, 1870 (Cryptarcha)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 52–53

10 Syntypen, Cypro

DEI: ♀ Lectotypus, Cypro, Coll. Stierlin; designiert durch Kirejtshuk, 1981.

bifasciata Kraatz, 1895 (Eपुरaea)

Dtsch. Ent. Ztschr., 148

Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: 2 Syntypen, Togo, Coll. Kraatz.

bimaculata Kraatz, 1895 (Platychora)

Dtsch. Ent. Ztschr., 149

Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: 2 Syntypen, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

Syn. zu ornata Reitter, 1875.

binotatus Reitter, 1879 (Strongylus)

Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 217

Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. Christoph.

DEI: 6 Syntypen, Amur, Coll. Kraatz, Coll. v. Heyden.

bistigma Grouvelle, 1908 (Carpophilus)

Rev. d' Ent. 27, 128–130

Mehrere Syntypen, Afrique occidentale, Kamerun, Biafra, im DEI, Museum Madrid und in Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, Biafra, Cabo, S. Juan, VII. 1901, Escalera; designiert durch Endrödy-Younga.

breviusculus Kraatz, 1895 (Meligethes)

Dtsch. Ent. Ztschr., 151

Holotypus, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz, ♀).

bucciarellii Audisio, 1976, (Meligethes)

Boll. Ass. Ent. Roma (1975) 30, 9–16, Fig. 1, 2, 3

♂ Holotypus, Italia, Puglie, Promontorio del Gargano, Monte S. Angelo (FG), 770 m, 13. IV. 1975, leg. Audisio & Zampetti, in Coll. Audisio; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Colli Albani, M. Artemisio, 1. V. 1975, leg. Audisio & Colonnelli.

castaneus Brisout, 1863 (Meligethes)

In: Grenier, Cat. Coleopt. France, 55

Mehrere Syntypen, Hyères, Lesterel, leg. Delarouzée.

DEI: 1 Syntypus, Hyères, Lesterelle, durch Brisout, Coll. Kraatz.

Syn. zu immundus Kraatz, 1858.

ceylonica Grouvelle, 1902 (Pria)

Ann. Soc. Ent. Fr. 71, 481–482

2 Syntypen, Haputala, in Coll. Grouvelle und Coll. Horn.

DEI: 1 Paralectotypus, Ceylon, Haputale, 1899, leg. Horn; designiert durch Kirejtshuk, 1981.

chlorocyaneus Audisio, 1977 (Meligethes)

Boll. Mus. Zool. Univ. Torino, Nr. 1, 2, 3–5

♂ Holotypus, Bulgaria, Monti Vitosha, 1600–1800 m, 24. VIII. 1960, leg. Hoberlandt, im Museum Prag; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Italia, Piemonte, Val d'Ala Chiampertotto (TO), 1000 m, 5. VII. 1976, leg. Audisio & Liberto, fiori di Hieracium sp.

conradti Grouvelle, 1899 (Cillaeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 126, 128

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 12 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1967.

conradti Grouvelle, 1899 (Cyllodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 133, 135

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

conradti Grouvelle, 1899 (Eपुरaea)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 130–131

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Jelinek, 1966.

consanguinea Grouvelle, 1914 (Eपुरaea)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 41

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Shis, leg. Sauter.

DEI: 4 Ex. Formosa, Kosempo, 22. V. 1912; 1 Ex. Shis, A 56, V.–VI. 1912; leg. Sauter, Syntypen.

consiglioi Audisio, 1978 (Eपुरaea)

Accad. Naz. Lincei, 135–136, Fig. 4–5,9

♂ Holotypus, Etiopia, Kaffa, Bonga, 1800 m, 25. X. 1973, leg. Consiglio; Paratypen, 7 ♂♂, 8 ♀♀, dto., leg. Vigna-Taglianti; 1 ♂, 3 ♀♀, dto., 27. X. 1973, leg. Consiglio; 1 ♂, 2 ♀♀, dto., 27. X. 1973, leg. Vigna-Taglianti.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Etiopia, Kaffa, Loc. 17 ter, Bango, ca. 1800 m, 27. X. 1973, leg. Consiglio.

copiosa Kirejtshuk, 1980 (Pria)

Rev. Zool. Afr. **94** (2), 289–291, Fig. 154–161

Holotypus, Zaire, Massif du Ruwenzori, Mahungu, 3.100 m, feuilles jeunes Ericas, 17.–29. VII. 1963, leg. Célis; 162 Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung; im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Zoological Institute of the U. S. S. R. Academy of Sciences und im Zool. Museum Berlin.

costata Schaufuß, 1891 (Omosiphora)

Tijdschr. Ent. **35**, 6–8

Mehrere Syntypen, Madagascar.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Coll. Schaufuß.

curvibius Kraatz, 1895 (Lordites)

Dtsch. Ent. Ztschr., 151–152

2 Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1968.

depressus Grouvelle, 1899 (Cillaeus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 126–127, 128

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

devillei Grouvelle, 1912 (Meligethes)

Bull. Soc. Ent. Fr., 168–169

Mehrere Syntypen, Alpes-Maritimes, l'Authion, 1 800–2 000 m, leg. Deville.

DEI: 1 Syntypus, L Authion, Alpes-Maritimes, leg. Deville, durch Le Moul, Coll. v. Heyden.

diffusa Brisout, 1863 (Eपुरaea)

In: Grenier, Cat. Coleopt. Fr., 46

Mehrere Syntypen, Normandie, Paris, leg. Delarouzée, Hyères.

DEI: 1 Syntypus, Paris, durch Reitter.

Syn. zu fuscicollis Stephens, 1832.

distinctus Schaufuß, 1879 (Conotelus)

Nunq. otios., 478

Mehrere Syntypen, Nova-Granata.

DEI: 1 Syntypus, N. Granada, Schaufuß, dedic. 1934.

Syn. zu luteicornis Erichson, 1843.

elegans Grouvelle, 1914 (Pria)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 37–38

6 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 22. V. 1912; designiert durch Kirejtshuk, 1981.

epuraeoides Grouvelle, 1914 (Amytrops)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 38–39

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. Sauter; im DEI (VIII. 1909).

floribundus Reitter, 1877 (Meligethes)

Dtsch. Ent. Ztschr. **21**, 293

Mehrere Syntypen, Caucasus, bei Alexanderhilf, auf Blüten, 8. VI. 1875, leg. Leder.

DEI: 3 Syntypen, Caucasus, leg. Leder, Coll. Stierlin, Coll. Kraatz.

formosiana Grouvelle, 1914 (Amystrops)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 39–40

♂ Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. Sauter; im DEI (1912).

frater Kraatz, 1895 (Brachypeplus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 146

Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Togo, leg. Conradt, durch Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

gracilis Brisout, 1863 (Meligethes)

In: Grenier, Cat. Coleopt. Fr., 48

Mehrere Syntypen, Paris, rare, Dijon, Strasburg, leg. Wencker, Vosges, Eaux-Bonnes, leg. Aubé.

DEI: 1 Syntypus, Straßburg, durch Brisout, Coll. Kraatz.

grouvellei Kraatz, 1895 (Brachypeplus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 145

Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: ♂ Lectotypus, 9 Paralectotypen, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1967.

grouvellei Heller, 1916 (Psilonitidula)

Nova Caledonia Zool. **2**, 279–280, Taf. 10, Fig. 7

Mehrere Syntypen, am Mt. Canala, Wald, 700–1 000 m, 3. XI. 1911.

DEI: 1 Paralectotypus, Neukaledonien, Mt. Kanala, leg. Sarasin & Roux; durch Kirejtshuk, 1981 designiert.

heydeni Reitter, 1875 (Cybocephalus)

In: Harold, Coleopt. Hefte **13**, 56

Mehrere Syntypen, bei Hyères, leg. v. Heyden.

DEI: 3 Syntypen, Hyères, Nr. 195, Coll. v. Heyden.

hildebrandti Grouvelle, 1909 (Pria)

In: Voeltzkow, Reise in Ostafrika **2**, 411

Mehrere Syntypen, Madagascar, int. austr., leg. Hildebrandt.

DEI: ♂ Lectotypus, Madagascar, int. austr., leg. Hildebrandt; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

horni Grouvelle, 1908 (Pria)

Rev. d' Ent. **27**, 139–140, 145

Mehrere Syntypen, Usambara, Nguelo, leg. Weise, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Usambara, leg. Weise, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

immundus Kraatz, 1858 (Meligethes)

Berl. Ent. Ztschr. **2**, 135–136

Mehrere Syntypen, Griechenland, Zante, Monte Scopo, leg. v. Kiesenwetter.

DEI: 1 Syntypus, Zante, leg. v. Kiesenwetter, Coll. Kraatz.

inaequalis Grouvelle, 1914 (*Lasiodactylus*)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 42–43

♀ Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. Sauter; im DEI (VII. 1908).

incognitus Jelinek, 1976 (*Anamartus*)

Acta Ent. Bohem. **73**, 25–27, Figs.

♂ Holotypus, Caucasus, leg. Leder, im Museum Budapest; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Kaukasus, leg. Leder.

initialis Kirejtshuk, 1979 (*Meligethes*)

Proc. Zool. Inst. Ac. Sci. USSR **88**, 59–61, Fig. 39–47

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 3 ♀♀, China, Setschuan, Kandin, 1. VII. 1893; 2 ♂♂, 6 ♀♀, dto., 27. VI. 1893; 4 ♂♂, 3 ♀♀, dto., 23. VI. 1893; 1 ♀, dto., 21. V. 1893; 1 ♂, zwischen Kandin und Jan, 13. VII. 1893; 1 ♀, dto., 12. VIII. 1893; 1 ♀, dt., 6. VIII. 1893; leg. Potanin, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, China, Setschuan, zwischen Kandin und Jan, 23. VI. 1893, leg. Potanin.

ipsoides Grouvelle, 1899 (*Xanthopeplus*)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 125

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1968.

irregularis Schaufuß, 1879 (*Conotelus*)

Nunq. otios. **3** (5), 479

Mehrere Syntypen, Nova-Granata.

DEI: 1 Syntypus, N. Granada, Coll. Schaufuß, dedic. 1934.

khevenhülleri Miller, 1852 (*Meligethes*)

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **1**, 112

Mehrere Syntypen, um Baden bei Wien.

DEI: 1 Syntypus, Wien, Coll. Kraatz.

Syn. zu *brevis* Sturm, 1845.

klapperichi Jelinek, 1975 (*Glischrochilus*)

Acta Ent. Bohem. **72**, 139–140, 3, 6, 17, 28–29, Plate 2,4

♂ Holotypus, China, Prov. Fukien, Kuatun, 2 300m, 27° 40' N, 117° 40' E, 16. IV. 1938, leg. Klapperich, im Museum Koenig, Bonn; 76 ♂♂, 110 ♀♀, dto., 11. IV.–13. V. 1938, im Museum Koenig, Bonn und Museum Prag; 2 ♂♂, Fokien, durch Donckier, Coll. Kraatz, im DEI: Paratypen.

DEI: 2 ♂♂, Paratypen, Fokien, durch Donckier, Coll. Kraatz.

korschefsky Bollow, 1941 (*Amphicrossus*)

Mitt. Münch. Ent. Ges. **31**, 236–237

♀ Holotypus, Himalaya, Kulu, leg. Rost, im DEI.

Syn. zu *japonicus* Reitter, 1873.

kraatzi Grouvelle, 1899 (Cyllodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 134, 135

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle

DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

kraatzi Grouvelle, 1910 (Circopes)

Not. Leiden Mus. **32**, 247–248

Mehrere Syntypen, Celebes, Banguay, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Brunei, Coll. Kraatz; designiert durch Kirejtshuk, 1981.

Syn. zu subquadrata Motschulsky, 1858.

kraatzi Reitter, 1871 (Meligethes)

Rev. Melig., 133, 135, Taf. 5, Fig. 68 a, b, c

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. Kraatz und Scriba.

DEI: 1 Syntypus, Graecia, Coll. Kraatz.

kraatzi Grouvelle, 1899 (Micropria)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 131

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

krueperi Reitter, 1873 (Meligethes)

Syst. Einteil. Nitid., 75–76

Mehrere Syntypen, Smyrna, via Krüper an Reitter.

DEI: 1 Syntypus, Smyrna, durch Reitter.

Syn. zu rosenhaueri Reitter, 1871.

maculipennis Kraatz, 1895 (Cryptarcha)

Dtsch. Ent. Ztschr., 153

Holotypus, Togo; im DEI (♀).

maculipennis Kraatz, 1895 (Lordites)

Dtsch. Ent. Ztschr., 152

Holotypus, Togo, leg. Conradt; im DEI (Coll. Kraatz).

marginicollis Kraatz, 1895 (Cryptarcha)

Dtsch. Ent. Ztschr., 153

Holotypus, Togo (♀, Coll. Kraatz).

misellus Grouvelle, 1899 (Cyllodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 134, 135

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

modiglianii Grouvelle, 1910 (Circopes)

Not. Leyd. Mus. **32**, 249–250

Mehrere Syntypen, Mentawai, Si-Oban, leg. Modigliani, im Musée de Gênes, DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Mentawai, Si Oban, IV.–VIII. 1894, leg. Modigliani, Coll. Kraatz; designiert durch Kirejtshuk, 1981.

multimaculatus Grouvelle, 1914 (Cyllodes)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 45–46

Holotypus, Formosa, Fuhosho, leg. Sauter; im DEI (IX. 1909).

oblita Grouvelle, 1908 (Pria)

Rev. d' Ent. **27**, 134–135, 147

1 Ex. Abyssinie, leg. Raffray, in Coll. Grouvelle; 1 Ex. Zanzibar, im DEI: Syntypen.

DEI: 1 ♀, Paralectotypus, Zanzibar, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga.

octusis Reitter, 1919 (Stelidota)

Verh. Nat. Ver. Brünn **56**, 76

Holotypus, Ostsibirien, Chabarofka, in Coll. Koltze; im DEI.

ocularis Kraatz, 1895 (Eपुरaea)

Dtsch. Ent. Ztschr., 148–149

2 Syntypen, Westafrika, Togo, leg. Conradt.

DEI: Lectotypus, Togo, leg. Conradt; designiert durch Jelinek, 1966.

omositina Jelinek, 1967 (Eपुरaea)

Acta Ent. Bohem. **64**, 115–119, Fig. 2, 5, 10, 11, 15

♂ Holotypus, Tanganyika, 1937, leg. Skulina, im Museum Prag, Nr. 19914;

1 ♀, dto., Nr. 19915; 1 ♂, 1 ♀, Zanzibar, Coll. Kraatz, im DEI; 1 ♂, Tanganyika, western slope of Mf. Meru, leg. Franz, in Coll. Franz; Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Zanzib., Coll. Kraatz.

opacus Grouvelle, 1908 (Carpophilus)

Rev. d' Ent. **27**, 127–128

Mehrere Syntypen, Afrique occ. allemande, Albrechtshöhe, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, J.-Albrechtshöhe, leg. Conradt; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

palustris Sahlberg, 1889 (Eपुरaea)

Enum. Col. Fenn., 105

Mehrere Syntypen, vid Helsingfors samt enstaka exemplar i Yläne, vid Tornea, samt i Turtola och Muonioniska (68°) i Lappland; i Uskela är den tagen af Ingelius och i Hvittisbofjärd af Wikström, U. F. M.

DEI: 9 Syntypen, Helsingfors, durch Sahlberg, Coll. Stierlin, Coll. Kraatz, Coll. Leonhard.

parallela Grouvelle, 1899 (Aethinopa)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 131–132

Mehrere Syntypen; Gabon, in Coll. Fry und Coll. Grouvelle; Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

peringueyi Grouvelle, 1908 (Circopes)

Rev. d' Ent. **27**, 148–149

Mehrere Syntypen, Transvaal, leg. Hartmann, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Transvaal, leg. Hartmann, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga.

picta Schaufuß, 1891 (Idosoronia)

Tijdschr. Ent. **34**, 4–6, Taf. 1, Fig. 2

Mehrere Syntypen, Central-Madagascar, im Museum Ludwig Salvator.

DEI: Lectotypus, Madagascar, Coll. Schaufuß, dedic. 1934; designiert durch Endrödy-Younga.

pilosella Kraatz, 1895 (Aethina)

Dtsch. Ent. Ztschr., 150

Holotypus, Togo; im DEI (Coll. Kraatz).

planus Erichson, 1843 (Ecnomaeus)

In: Germar, Ztschr. Ent. **4**, 266

Mehrere Syntypen, Senegal, via Buquet an Erichson.

DEI: ♀ Lectotypus, Senegal, leg. Buquet, Nr. 8418; designiert durch Endrödy-Younga, 1968.

praestus Grouvelle, 1899 (Cyllodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 133–134, 135

Mehrere Syntypen, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 Paralectotypen, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

Syn. zu basimaculatus Grouvelle, 1899; bezettelt von Endrödy-Younga.

pumilio Reitter, 1919 (Brachypterolus)

Verh. Nat. Ver. Brünn **56**, 14

Mehrere Syntypen, Portugal, Cea, Coll. v. Heyden.

DEI: 5 Syntypen, Cea, Coll. v. Heyden, Nr. 293.

quadripunctata Grouvelle, 1919 (Cryptarcha)

Mitt. Zool. Mus. Berlin **9**, 205

Mehrere Ex., Kamerun, leg. Conradt, im DEI und in Coll. Grouvelle; 1 Ex. Span.-Guinea, leg. Tessmann, im Museum Berlin: Syntypen.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 29. VIII.–13. IX. 1898, leg. Conradt; designiert durch Endrödy-Younga.

rhenanus Bach, 1851 (*Cercus*)

Käferf. Nord- und Mitteldtschl. **1**, 480

Mehrere Syntypen, Sächsische Schweiz, Hessen, Mark Brandenburg, Schlesien, Wetterau.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. Kraatz.

Syn. zu *solani* Heer, 1851.

rotundicollis, Brisout, 1863 (*Meligethes*)

In: Grenier, *Materiaux Cat.*, 56

Mehrere Syntypen, Paris, Hyères, leg. Delarouzée, Nice, leg. de Baran.

DEI: 3 Syntypen, Hyères, Coll. Kraatz.

rufangulus Grouvelle, 1899 (*Carpophilus*)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 129

Mehrere Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, Kamerun, Lolodorf; designiert durch Endrödy-Younga.

rufilabris Reitter, 1919 (*Brachypterolus*)

Verh. Nat. Ver. Brünn **56**, 14

Mehrere Syntypen, Tanger, leg. Rolph, in Coll. Kraatz.

DEI: 8 Syntypen, Tanger, leg. Rolph, Coll. Kraatz.

sauteri Grouvelle, 1914 (*Ithyphenes*)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 35–37

Holotypus, Formosa, Kankau, Koshun, leg. Sauter; im DEI (IV. 1912).

sauteri Grouvelle, 1914 (*Pocadites*)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 43–44

2 Syntypen, Formosa, Fuhosho, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, VIII. 1909.

sauteri Grouvelle, 1914 (*Tricanus*)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 46

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, leg. Sauter.

DEI: Lectotypus, 5 Paralectotypen, Formosa, Kankau, Koshun, V., VII., VIII./1912, leg. Sauter; designiert durch Kirejtshuk, 1981.

saphula Erichson, 1844 (*Enomaeus*)

In: Germar, *Ztschr. Ent.* **5**, 438

Mehrere Syntypen, Nubien, leg. Ehrenberg.

DEI: ♂ Lectotypus, N., leg. Ehrenberg, Nr. 8419; designiert durch Endrödy-Younga, 1968.

schenklingi Reitter, 1919 (*Meligethes*)

Verh. Nat. Ver. Brünn **56**, 31

♂ Holotypus, Japan, leg. Hiller, Coll. Kraatz; im DEI.

scutellaris Kraatz, 1895 (*Carpophilus*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 147

Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: ♀ Lectotypus, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga, 1968.

scutellaris Grouvelle, 1911 (Cryptarcha)

Bull. Soc. Ent. Fr., 67–68

♂ Kilimandjaro, im Museum Berlin; ♀ Zanzibar, im DEI: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Zanzib., Coll. Kraatz.

scutellaris Kraatz, 1895 (Eपुरaea)

Dtsch. Ent. Ztschr., 147

Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.

DEI: ♂ Lectotypus, 21 Paralectotypen, Togo, leg. Conradt, Coll. Kraatz; festgelegt in Acta Ent. Mus. Nat. Pragae **39**, 375; 1977 durch Jelinek.

seminulum Baudi, 1870 (Cybocephalus)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 52; als var. von *metallicus* Baudi beschrieben

20 Syntypen, Cypern, leg. Truqui.

DEI: 4 Syntypen, Cyprus, durch Baudi, Coll. Stierlin, Coll. Kraatz und Coll. Schneider-Kelch.

semirufus Reitter, 1879 (Meligethes)

Dtsch. Ent. Ztschr. **23**, 211, 216

Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, leg. Christoph.

DEI: 1 Syntypus, Sibirien, leg. Christoph, durch Reitter, Coll. v. Heyden.

simplex Kraatz, 1858 (Meligethes)

Berl. Ent. Ztschr. **2**, 135

Mehrere Syntypen, Griechenland, bei Athen, leg. v. Kiesenwetter.

DEI: 1 Syntypus, Athen, leg. v. Kiesenwetter, Coll. Kraatz.

sinuatus Jelinek, 1976 (Anamartus)

Acta Ent. Bohem. **73**, 29–30, Figs.

♂ Holotypus, Turkey, Konya, 1899, leg. Korb, im Museum Prag; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Anatolien, Konia, 1899, leg. Korb, Coll. Leonhard.

subopaca Reitter, 1891 (Micrurula)

Dtsch. Ent. Ztschr., 24; nom. praeocc. = *transmutatus* Grouvelle,

81, 393; 1913, Ann. Soc. Ent. Fr.

Mehrere Syntypen, Osh und Alai, durch v. Heyden.

DEI: 3 Syntypen, Alai, Turkesten, durch Staudinger, Coll. v. Heyden.

subopacus Reitter, 1874 (Meligethes)

Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien **24**, 511–512

Holotypus, Mogador, durch v. Heyden; im DEI (17. V. 1872, leg. Fritsch und Rein).

sulcatus Brisout, 1863 (Meligethes)

In: Grenier, Mat. Catal. Coleopt., 51

Mehrere Syntypen, Paris, leg. Aubé.

DEI: 1 Syntypus, Paris, durch Brisout.

syriacus Reitter, 1878 (Cybocephalus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **22**, 91

Mehrere Syntypen, Syria, Insel Cyprus, in Coll. Kraatz und Coll. Reitter.

DEI: ♂ Lectotypus, Syria, durch Deyrolle, Coll. v. Heyden; designiert durch Endrödy-Younga, 1967.

Syn. zu *memanaceus* Reitter, 1874.

tatjanae Kirejtshuk, 1982 (Meligethes)

Acad. Proc. Zool. Inst. USSR, **110**, 35–36

Holotypus, Usbekische SSR, Umgeb. Samarkand, 1896, leg. Barsčevskij; 37 Ex. dto.; 8 Ex. dto., Exped. Fedčenko, 2 Ex. Kasachische SSR, Kalassischer Alatau, Daubaba, 11. V. 1962, leg. Badenko; im Zool. Museum Leningrad, Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Samarkand, 1896, leg. Barsčevskij.

tessmanni Grouvelle, 1919 (Atarphia)

Mitt. Zool. Mus. Berlin **9**, 205

2 Syntypen, Span.-Guinea, Nkolentangan, Kamerun, Bibundi.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Bibundi, 16.–30. X. 1904, leg. Teßmann; designiert durch Endrödy-Younga, 1966.

tigrinus Grouvelle, 1914 (Cyllodes)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 44–45

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. VII. 1911.

tumidulus Grouvelle, 1899 (Carpophilus)

Ann. Soc. Ent. Fr. **68**, 130

Mehrere Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. Conradt, in Coll. Kraatz und Coll. Grouvelle.

DEI: Lectotypus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz; designiert durch Endrödy-Younga.

variolosus Easton, 1964 (Meligethes)

Proc. R. Ent. Soc. Lond. **33**, 3–5, Fig. 16

♂ Holotypus, Hungary, Győr, leg. Bokor; mehrere Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Slov., Kavacov, M. VII. 1959, leg. Marek.

weisei Grouvelle, 1908 (Eपुरaea)

Rev. d' Ent. **27**, 132–133, 146

Mehrere Syntypen, Usambara, im DEI und in Coll. Grouvelle.

DEI: 5 Syntypen, Usambara, leg. Weise, Coll. Kraatz.

x-rubrum Sahlberg, 1911 (Eपुरaea)

Medd. Soc. Fauna et Flora Fenn. **37**, 49–52

Mehrere Syntypen, Sör näs bei Helsingfors, 22.–29. X. 1910, leg. Sahlberg.

DEI: 1 Syntypus, Fenja, H. fors, leg. Sahlberg, durch v. Bodemeyer, Coll. v. Heyden.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

exornatus Grouvelle (Brachypeplus)

DEI: 2 Typen, Tam Mts., XI. 1906, Coll. Hacker.

grouvellei Rebmann (Cryptarcha)

DEI: 1 Typus, Formosa, Alikang, VI. 1909, leg. Sauter.

horni Grouvelle (Cyllodes)

DEI: 1 ♂, Typus, Kamerun, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

Cryptophagidae

atomarius Bruce, 1943 (Pseudhenoticus)

Arb. morph. tax. Ent. **10**, 57–58, Fig. 1, 4

2 ♂♂, 1 ♀, Holotypus, Paratypen, Madagascar, Annanarivo, leg. Sikora, ded. C. Schaufuß, im DEI und in Coll. Bruce.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Annanarivo, leg. Sikora, dd. C. Schaufuß.

bella Reitter, 1875 (Atomaria)

Dtsch. Ent. Ztschr. **19** (3), 48, 56

Mehrere Syntypen, Suecia, Saxonia, Silesia, Coll. Kraatz.

DEI: 1 Syntypus, Saxon, Nr. 71, Coll. Kraatz.

berolinensis Kraatz, 1853 (Atomaria)

Stett. Ent. Ztg. **14**, 94–95

8 Syntypen, i. d. Nähe von Berlin.

DEI: Lectotypus, ohne Fundort, 1 Paralectotypus, Berlin, Coll. Kraatz, Coll. v. Heyden; designiert durch Johnson, 1970.

Syn. zu *bicolor* Erichson, 1846.

bipubens Bruce, 1952 (Hapalips)

Beitr. Ent. **2**, 467–468

♀ Holotypus, Mexico, Coll. Kraatz, im DEI.

croaticus Reitter, 1879 (Cryptophagus)

Verh. Zool. Bot. Ges. **29**, 51

4 Ex. Croatien, leg. Reitter, 1 Ex. Umgebung Berlin, in Coll. Reitter, Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Croatien, leg. Reitter, Coll. Kraatz.

delicatulus Roubal, 1913 (Cryptophagus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 47–48

3 Ex. westl. Kaukasus, bei Krasnaja Poljana, 1910; mehrere Ex. Nord-Kaukasus, bei Teberda, VI. 1912, leg. Roubal; in Coll. Reitter und Coll. Roubal: Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, Ca. b. Teberda, VI. 1912, leg. Roubal.

dubia Grouvelle, 1908 (Micrambe)

Rev. d' Ent. **27**, 197–199

Mehrere Syntypen; Dar-es-Salaam, in Coll. Eichelbaum und Coll. Grouvelle; Zanzibar, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Zanzibar, Coll. Kraatz.

Syn. zu *eichelbaumi* Grouvelle, 1908.

erratus Bruce, 1952 (Hapalips)
Beitr. Ent. **2**, 462–464

fasciatus Kraatz, 1852 (Cryptophagus)
Stett. Ent. Ztg. **13**, 229–230

♀ Holotypus, Brasilien, St. Catharina, Blumenau, Coll. Kraatz; im DEI.
Mehrere Syntypen, ohne Fundortangabe.

DEI: 2 Syntypen, Venedig, Coll. Kraatz.

formosianus Grouvelle, 1913 (Tomarus)
Arch. Naturg. **79**, A 11, 66–67

2 Syntypen, Formosa, Hoozan, leg. Sauter.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Hoozan, l. 1908/l. 1910, leg. Sauter.

fossulata Bruce, 1943 (Brounina)
Arb. morph. tax. Ent. **10**, 58–59, Fig. 2, 5

♂ Holotypus, Süd-Chile, Puerto Puyuhuapi, 20.–25. I. 1938, leg. Schwabe; im DEI.

globosus Waltl, 1838 (Ephistemus)
Isis, 271

Mehrere Syntypen, um Passau.

DEI: 1 Syntypus, Passau, leg. Waltl, Coll. v. Heyden.

grandis Kraatz, 1856 (Cryptophagus)
Stett. Ent. Ztg. **17**, 240

Mehrere Syntypen, nördl. Deutschland, Swinemünde, leg. Kraatz.

DEI: 2 Syntypen, Swinemünde, Coll. Kraatz.

grilati Reitter, 1887 (Sternodea)
Verh. Nat. Ver. Brünn **26** (Best.-Tab.), 54

Mehrere Syntypen, Algier, Edough, leg. Grilat.

DEI: 1 Syntypus, Algier, Edough, durch Desbrochers, Coll. v. Heyden.

grouvellei Gorham, 1898 (Hapalips)
Proc. Zool. Soc. London 334–335, Taf. 27, Fig. 11, 11a, 12

Mehrere Syntypen, St. Vincent, Grenada, Mount Gay; Grand Etang, 1900 ft., Black Forest, Chantilly Estates, Balthazar, leg. Smith.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Mount Gay East, Leeward side, Grenada, W. I., leg. Smith, Coll. Kraatz.

guatemalensis Bruce, 1943 (Cryptophagus)
Arb. morph. tax. Ent. **10**, 59–60, Fig. 3, 6

♂ Holotypus, Guatemala; im DEI (1888).

hiemalis Baudi, 1870 (Atomaria)
Berl. Ent. Ztschr. **14**, 56

Mehrere Syntypen, Pedemont.

DEI: 1 Syntypus, Pedem., Coll. Kraatz, Nr. 109.

hirtulus Kraatz, 1858 (Cryptophagus)

Berl. Ent. Ztschr. **2**, 138

Mehrere Syntypen, Athen, Zante, Nauplia, leg. v. Kiesenwetter.

DEI: 1 Syntypus, Zante, leg. v. Kiesenwetter.

hispidus Bruce, 1952 (Hapalips)

Beitr. Ent. **2**, 466–467

♀ Holotypus, Peru, Callanga, Coll. Kraatz; im DEI.

humeralis Kraatz, 1853 (Atomaria)

Stett. Ent. Ztg. **14**, 98

Mehrere Ex. südl. Europa, Athen, leg. v. Kiesenwetter, Spanien, leg. Handschuch, Mt. Serrat, leg. v. Kiesenwetter; 1 Ex. Sardinien, im Museum Gené: Syntypen.

Johnson hat nachträglich einen Holotypus festgelegt, nach den Nomenklaturregeln liegt hiermit eine Lectotypenfestlegung vor.

DEI: Lectotypus, Europa mer., Coll. Kraatz.

impubens Reitter, 1887 (Atomaria)

Verh. Nat. Ver. Brünn **26**, 52

Mehrere Syntypen, Turkmenien, leg. Leder.

DEI: 4 Paralectotypen, Turcmenien, leg. Leder, Reitter, Coll. Kraatz; designiert durch Johnson, 1969.

Syn. zu rubricollis Brisout, 1863.

jailensis Breit, 1913 (Cryptophagus)

Ent. Bl. **9**, 294

Mehrere Syntypen, Krim, Jaila-Dagh, leg. Knirsch, Moczarski und Winkler.

DEI: 4 Syntypen, Krim, Jaila-Gebirge, leg. Winkler, Coll. Leonhard.

jonica Reitter, 1887 (Atomaria)

Verh. Nat. Ver. Brünn **26**, 50

Mehrere Syntypen, Ionische Inseln, Corfu.

DEI: Paralectotypus, Graecia, Corfu, leg. Reitter; designiert durch Johnson, 1969.

Syn. zu gibbula Erichson, 1845.

juriceki Obenberger, 1916 (Atomaria)

Arch. Naturg. **82**, A 4, 23–24

Mehrere Syntypen, Südtirol, Rovereto, leg. Jureček.

DEI: 1 Paralectotypus, Rovereto, Coll. Leonhard; festgelegt in Reichenbachia **14** (16), 136–137, durch Johnson, 1973.

kraatzi Reitter, 1875 (Cryptophagus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **19** (3), 15, 34–35

Mehrere Syntypen, Eur., bor., Russia.

DEI: 3 Syntypen, Germ. bor., Berlin, Calix., Coll. Kraatz.

Syn. zu subfumatus Kraatz, 1856.

marginicollis Grouvelle, 1913 (Glisonotha)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 64–65

Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. Sauter; im DEI (VII. 1911).

milleri Reitter, 1875 (Cryptophagus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **19** (3), 20–22

Mehrere Syntypen; Moravia, Silesia, Pascau, VII., VIII.; Cameral-Elgoth, leg. Heczko.

DEI: 1 Syntypus, Paskau, R., Coll. Kraatz.

peltata Kraatz, 1853 (Atomaria)

Stett. Ent. Ztg. **14**, 95–96

2 Ex. Thüringen, leg. Kellner, in der königl. Sammlung; 2 Ex. aus der hiesigen Gegend, 1 Ex. Dresden, in Coll. Kraatz; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangabe, Coll. Kraatz.

pseudodentatus Bruce, 1934 (Cryptophagus)

Ent. Tidskrift **55**, 168–171

Mehrere Syntypen: gemein in ganz Europa, sowohl in Gebirgsgegenden wie im Tiefland, Södermanland, Södertelje, Ostergötland, leg. Bruce, Halland, leg. Agren, Göteborg, leg. Tjeder, Bokuslän, leg. Klefbeck, Dalarna, leg. Olsson, Helsingland, leg. Sjöberg, Öland, Gotland, Smaland, Nerike, Stockholm, Uppland, Furu sund, leg. Jansson, Ostergötland, leg. Palm.

DEI: 3 Ex. ohne Fundort, Coll. Kraatz; 2 Ex. Kaukasus, leg. Leder, Coll. Stierlin; 1 Ex. Schaffh., Coll. Stierlin; 1 Ex. Gallia, Coll. Stierlin; 1 Ex. Neusiedler-See, leg. Breit; 19 Ex. Val. Camonica, Borno, Cogno, leg. Krüger, Coll. Leonhard; 25 Ex. Bosnia, Korična, Coll. Leonhard; 16 Ex. Bulg. Samokov, 1911, leg. Hilf, Coll. Leonhard; 8 Ex. Bosnien, Bjelasnica planina, Coll. Leonhard; 4 Ex. Sicilia, Madonia, leg. Krüger, Coll. Leonhard; 13 Ex. Sardinia, Aritzo, Mte. Genargentu, leg. Krüger, Coll. Leonhard; 1 Ex. Bulgaria, Trevna, V.–VI. 1912, leg. Hilf, Coll. Leonhard; 1 Ex. Serbien, Biograd, Topčidor, VI. 1910, leg. Ramboucek, Coll. Leonhard; 3 Ex. Bohemia, Libnoves, 15. IV. 1885, Coll. Leonhard; 2 Ex. Maklen Pass, Coll. Leonhard; 1 Ex. Velebit, Ostaria, 1910, leg. Hilf, Coll. Leonhard; 1 Ex. Banat, Herculesbad, 1909, leg. Hilf, Coll. Leonhard; 1 Ex. Cassel, Coll. Kraatz; 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 279, Coll. Kraatz; 1 Ex. Helvet., Coll. Kraatz; 1 Ex. Sevilla, Coll. Kraatz; 1 Ex. Thür., leg. Kelln., Coll. Kraatz; Syntypen.

pumila Reitter, 1875 (Atomaria)

Dtsch. Ent. Ztschr. **19** (3), 48, 49

Mehrere Syntypen, Silesia, Coll. Kraatz, bei Rauden, leg. Roger.

DEI: 1 Syntypus, Rauden, Coll. Kraatz.

quercinus Kraatz, 1852 (Cryptophagus)

Stett. Ent. Ztg. **13**, 228–229

Mehrere Ex. bei Berlin, 2 Ex. Steiermark, leg. Kahr; Syntypen.

DEI: 5 Syntypen, Berlin, Coll. Kraatz.

rhenona Kraatz, 1853 (Atomaria)

Stett. Ent. Ztg. **14**, 96–97

Mehrere Syntypen, bei Bonn aus Kehricht, leg. Kraatz; bei Boppard, leg. Bach, wohl am ganzen Rhein verbreitet.

DEI: 1 Syntypus, Bonn, Coll. Kraatz.

salicicola Kraatz, 1853 (Atomaria)

Stett. Ent. Ztg. **14**, 97–98

Mehrere Syntypen, i. d. Nähe von Cassel, leg. Riehl.

DEI: 1 Syntypus, Cassel, leg. Riehl, Coll. Kraatz.

Syn. zu zetterstedti Zetterstedt, 1838.

simplex Miller, 1858 (Cryptophagus)

Wien. Ent. Monatsschr. **2**, 94

Mehrere Syntypen, im Prater, leg. Türk.

DEI: 1 Syntypus, Prater, leg. Türk, Coll. Kraatz.

slavonica Johnson, 1971 (Atomaria)

Ent. Bl. **67**, 3–5, Fig. 2, 5, 8

♂ Holotypus, Czechoslovakia, Bohemia, Pribram, leg. Sipek, im Národ. Mus. Praha; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Slavon., Kupanje, Nr. 490, ex Coll. v. Heyden.

subfumatus Kraatz, 1856 (Cryptophagus)

Stett. Ent. Ztg. **17**, 241

Mehrere Syntypen, an verschiedenen Punkten Deutschlands, bei Rauden, leg. Roger.

DEI: 4 Syntypen, Siles., Rauden, leg. Roger, Coll. Kraatz.

trapeziformis Johnson, 1970 (Atomaria)

Reichenbachia **12** (26), 260–263, Fig. 1–3

♂ Holotypus, Mongolia, Central aimak, 11 km S vom Paß Zosijn davaa, 90 km S von Ulan-Baator, 1650 m, 16. VII. 1967, Nr. 924, im Museum Budapest; Paratypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, Exped. Kaszak, 1967.

validus Kraatz, 1856 (Cryptophagus)

Stett. Ent. Ztg. **17**, 240–241

Mehrere Syntypen, an verschiedenen Punkten Deutschlands, in Thüringen, leg. Kellner, bei Berlin, leg. Kraatz, Paris, via Fairmaire.

DEI: 1 Syntypus, Thüringen.

Erotylidae

abbreviatula Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 84

Mehrere Syntypen, Luzon, Monte Makiling, leg. Baker, Nr. 1973.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Makiling, leg. Baker.

aenea Heller, 1918 (Metallencaustes)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 25–26

Mehrere Syntypen, Borneo, ex Coll. Gehr. W. Müller-Jena, Sumatra, ex Coll. Schenkling, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Coll. Schenkling.

amurensis Reitter, 1879 (Triplax)

Dtsch. Ent. Ztschr. **23**, 222

6 Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. Christoph.

DEI: 2 Syntypen, Amur, 1877, leg. Christoph, Coll. Kraatz.

Syn. zu rufiventris Gebler, 1823.

andreae binotata Schenkling, 1919 (Palaeolybas)

Arch. Naturg. **83**, A 11 (1917), 87; als ab. beschrieben.

Holotypus, Engl. Goldküste, Akropong; im DEI (Coll. Kraatz).

andreae fasciata Schenkling, 1919 (Palaeolybas)

Arch. Naturg. **83**, A 11 (1917), 87; als ab. beschrieben.

Mehrere Syntypen, Angola, Bailundo, in Coll. Ertl.

DEI: 3 Syntypen, Angola, Bailundo.

andreae sexsignata Schenkling, 1919 (Palaeolybas)

Arch. Naturg. **83**, A 11 (1917), 87; als ab. beschrieben.

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, Süd-Kamerun, Lolodorf.

DEI: 15 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1895/1896, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

angolensis Schenkling, 1919 (Aulacochilus)

Arch. Naturg. **83**, A 11 (1917), 78

2 Syntypen, Angola, Bailundo, in Coll. Ertl und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Angola, Bailundo.

Syn. zu capensis Lacordier, 1842; nach Delkeskamp, 1957.

arcana Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 88–89

Mehrere Syntypen, Nova Guinea, Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Coll. Kraatz.

arcuata Kuhnt, 1910 (Triplax)

Dtsch. Ent. Ztschr., 219–220, Fig. 1

Holotypus, Sumatra, im DEI (leg. Morton, Coll. Kraatz).

arfakiana Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 101–102

Holotypus, Nova Guinea, Hattamarfale, leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz, im DEI.

australis Schenkling, 1919 (Aulacochilus)

Arch. Naturg. **83**, A 11 (1917), 78

Mehrere Syntypen, Australien, Cooktown.

DEI: 4 Syntypen, Australien, Cooktown, Coll. Kraatz.

basipunctata Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 278–279

Holotypus, Africa occ., Congo Belgico, Kondué, leg. Luja; im DEI.

biimpressicollis Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 88, Taf. 1, Fig. 21

Holotypus, Insel Sumbawa, Coll. Kraatz; im DEI.

bimaculicollis Mader, 1942 (Brachysphoenus)

Mitt. Münch. Ent. Ges. **32**, 554–555

Holotypus, Columbien, Cauca; im DEI (Coll. Kraatz).

bolivianus Schenkling, 1919 (Aegithus)

Arch. Naturg. **83**, A II (1917), 80

Mehrere Syntypen, Bolivia.

DEI: 3 Syntypen, Bolivia, Coll. Kraatz.

bolivianus Mader, 1942 (Homoeotelus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 194–195

Holotypus, 2 Ex. Bolivien, Coroico, in Coll. Mader, 8 Ex. Yungas de la Paz, im DEI, 1 Ex. Sorata, leg. Günther, im Museum Hamburg, 2 Ex. ohne nähere Angabe, im Museum Dresden: Paratypen.

DEI: 1 Ex. Bolivien, Yungas de La Paz, 1 000 m, leg. Rolle; 1 Ex. Bolivia, Jongo, 6 Ex. Bolivia; Coll. Kraatz; Paratypen.

bruchi Kuhnt, 1910 (Paratritoma)

Dtsch. Ent. Ztschr. 245–246, Fig. 12

Mehrere Syntypen, Argentinien, Prov. Santa Fé, Chaco, via Bruch an Kuhnt.

DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Chaco, leg. Bruch, Coll. Kraatz.

cameruna Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 148–149

Mehrere Syntypen; Kamerun, Coll. Felsche, im Museum Dresden; Südost-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, im DEI; Kamerun, Buea, 4. VII. 1913, durch Bigge, im Museum Hamburg.

DEI: 2 Syntypen, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

cameruna centralis Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 149

Holotypus, Zentralafrika, Coll. Kraatz; im DEI.

celebesica Heller, 1918 (Nesitis)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 66

Mehrere Syntypen, Celebes meridionalis, Loka und Bowonglangi, Drs. Sarasin, Bonthain, 1883, leg. Ribbe, Lompo Batan, 3000', 1896, leg. Fruhstorfer, im Museum Dresden und DEI (Coll. Kraatz).

DEI: 4 Syntypen, S. Celebes, Lompa, Battau, 3000', III. 1896, leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

chrysomelinus Heller, 1918 (*Aulacochilus*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 7–8

Mehrere Syntypen, Borneo, ex Coll. W. Müller-Jena, im Museum Dresden und DEL.

DEI: 1 Syntypus, Borneo, Coll. W. Müller.

clatrata Heller, 1918 (*Episcaphula*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 106

♀ Holotypus, Queensland, *septentrionalis*, monte Tambourine, ex Coll. Hacker; im DEL.

clathratus Schenkling, 1919 (*Aegithus*)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 79–80; nom. praeocc. = *schenklingi* Mader, 1942, Mitt. Münch. Ent. Ges. **32**, 551

Mehrere Syntypen, Amazonas.

DEI: 3 Syntypen, Amazonas, Coll. Kraatz.

confusa Heller, 1918 (*Episcapha*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 69, Taf. 1, Fig. 25

Mehrere Syntypen, Celebes, *meridionalis*, Monte Bonthain, 1883, leg. Ribbe, Monte Patunuang, 1896, leg. Fruhstorfer, Buru, leg. Riedel, Batjan, durch Staudinger und Bang-Haas, im Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Sud Celebes, Bonthain, 1883, leg. Ribbe.

conradti Gorham, 1900 (*Amblyscelis*)

Ann. Mag. Nat. Hist. (7) **5**, 88–89

Mehrere Syntypen, W. Africa, N. Cameroon, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt.

DEI: 5 Syntypen, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

contractus Kuhnt, 1908 (*Erotylus*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 86–87

Mehrere Syntypen, Bolivia.

DEI: 1 Syntypus, Bolivia, durch Staudinger, Coll. Schenkling.

cribricollis Schenkling, 1919 (*Aulacochilus*)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 78

Mehrere Syntypen, Banguay.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, Banguay, Coll. Kraatz.

cruentata Heller, 1918 (*Micrencaustes*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 13–14, Fig. 10

Holotypus, Nova Guinea Germanica, Sattelberg, ex Coll. v. Bennigsen; im DEL.

cunctans Schenkling, 1919 (*Magalodacne*)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 90–91

16 Syntypen, Angola, Bailundo, durch Ertl, Benguella, leg. Wellmann, im DEL.

DEI: 8 Syntypen, Angola, Bailundo, durch Ertl, Benguella, leg. Wellmann, Coll. Kraatz.

dajaca Heller, 1918 (Micrencaustes)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 22–23, Fig. 15

Mehrere Syntypen, Borneo, Kina-Balu, alt. 1500 m, leg. Rolle, ex. Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden, Borneo, in Coll. Wunderlich.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, Kina-Balu, 1500 m, leg. Rolle, Coll. Kraatz.

decurtata Delkeskamp, 1954 (Scaphodacne)

Ann. Mus. Congo Belg. Sér. 8°, Zool. 30, 58

2 Ex. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 11. IV.–27. V. 1898, leg. Conradt; 1 Ex. Eduntif-Jaunde, 1911, leg. Fröhlich; 3 Ex. Lolodorf, 1895, leg. Conradt; Paratypen, ♀ Holotypus, im Museum Berlin.

DEI: 3 Ex. S.O.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz; 1 Ex. Eduntif-Jaunde, 1911, leg. Fröhlich, Coll. F. Müller : Paratypen.

deminuta Heller, 1918 (Scaphodacne)

Ent. Bl. **14**, 152–153, Abb. 14

Mehrere Syntypen, Süd-Kamerun, Joko, Ekok, via Heyne an Heller, im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Süd-Kamerun, Ekok, IX, XII., durch Heyne.

disconigrum Mader, 1942 (Brachysphoenus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 185

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Chanchamayo, ex Coll. Muche, in Coll. Mader, im Museum Hamburg und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Peru, Chanchamayo, ex Coll. F. Schneider–Coll. Schenkling.

disconigrum Mader, 1942 (Ischyryus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 195

Holotypus, Peru, Chanchamayo; im DEI (ex Coll. F. Schneider–Coll. Schenkling).

dollmani Arrow, 1929 (Biphyllus)

Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **4**, 310–311

Mehrere Syntypen, N. W. Rhodesia, Mwendwa, XI. leg. Dollmann.

DEI: 2 Syntypen, N. W. Rhodesia, Mwendwa, 27° 40'E, 13° S., 25. IX. 1914, leg. Dollman (nicht XI.!).

duodecimpunctata Heller, 1918 (Tritoma)

Arch. Naturg. **84**, A8, 34–35, Taf. 2, Fig. 44

Mehrere Syntypen, Tonkin, montibus Mauson, altitude 2–3000 ft., leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV., V., 2–3000', leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

elegans Kuhnt, 1908 (Erotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 71

Mehrere Syntypen, Brasilien, durch Schenkling.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, durch Speyer, Coll. Schenkling.

ertli Schenkling, 1919 (Megalodacne)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 93

Mehrere Syntypen, Angola, Bailundo.

DEI: 4 Syntypen, Angola, Bailundo.

estriata Heller, 1918 (Episcapha)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 73

Mehrere Syntypen, Insel Banguey (in extrema septentrioni insulae Borneo), im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Banguey b. Borneo, 1918.

excellens Arrow, 1925 (Tritoma)

Faun. Brit. Ind. Col. Clavic. Erotyl., 124

Holotypus, mehrere Paratypen, N.W. Frontier Province, Hazara District, Dungagali, 8000 ft., V., leg. Fletcher, Kashmir, leg. Rost, im Britischen Museum.

DEI: 1 Paratypus, Kaschmir, 1905, leg. Rost.

exigua Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 85–87

Holotypus, Borneo, Coll. Kraatz; im DEI.

ferrugineus subparallelus Delkeskamp, 1934 (Plagiopisthen)

Rev. Zool. Bot. Afr. **25**, 318–319

1 ♀, D. O. Afrika, Peramiho, bei Kigonsera, Coll. Ertl und 3 Ex. dto., im Congo Museum: Holotypus, Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, Peramiho, 1905, leg. Ertl, Coll. Kraatz.

flavopunctatus Kuhnt, 1908 (Erotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 78

Mehrere Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata, durch Staudinger.

formosianus Grouvelle, 1913 (Diphyllus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 67–68

5 Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. Sauter.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, I. 1908, leg. Sauter.

formosanus Weise, 1923 (Rhizobius)

Arch. Naturg. **89**, A 2, 188

Mehrere Syntypen, Formosa, Akau, leg. Sauter.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. Sauter.

formosanus Fürsch, 1960 (Scymnus)

Beitr. Ent. **10**, 443–444, Fig. 1–3

♂ Holotypus, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. Sauter; 2 Paratypen, dto., in Coll. Fürsch und im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. Sauter.

gazellae Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 103–104, Taf. 2, Fig. 47

Holotypus, Nova Pommerania, peninsula „Gazelle“, ex Coll. v. Bennigsen; im DEI.

glaber Kuhnt, 1908 (*Erotylus*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 93

Mehrere Syntypen, Ecuador, Baiza.

DEI: 2 Syntypen, Ecuador, Baiza, leg. Haensch, Coll. Schenkling.

glabra sumatrana Heller, 1918 (*Episcapha*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 76–77, Taf. 1, Fig. 32

Mehrere Syntypen, Sumatra, Coll. Kraatz und durch Staudinger und Bang-Haas, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 3 Syntypen, Sumatra, IV. 1918, Coll. Kraatz.

goliath Schenkling, 1927 (*Micrencaustes*)

Ent. Mitt. **16**, 128–129, Fig.

Holotypus, Deutsch-Neuguinea, Coll. Wahnes; im DEI (durch F. Müller).

gracilis Kuhnt, 1908 (*Cypherotylus*)

Dtsch. Ent. Ztschr., 226

Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Chanchamayo, ex Coll. F. Schneider–Coll. Schenkling.

gracilis Heller, 1918 (*Episcaphula*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 89–90, Taf. 1, Fig. 5, 35

Holotypus, Sumatra, leg. Morton, Coll. Kraatz; im DEI.

grandis Schenkling, 1908 (*Amblyscelis*)

In: Sjöstedt, Kilim. Exp. I, **7** (7), 77

Mehrere Syntypen, Kilimandjaro, 19. XI. 1905, Kibonoto, 1300–1900 m, 27. XII. 1905, leg. Sjöstedt.

DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300–1900 m, 27. XII. 1905, leg. Sjöstedt.

guineensis Gorham, 1906 (*Lophocrotaphus*)

Ann. Mag. Nat. Hist (7) **5**, 92

Mehrere Syntypen, Africa, Guinea, Cameroon, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt.

DEI: 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung (als var. bezettelt).

Syn. zu *fulva* Westwood (*Zythonia*); bezettelt von Delkeskamp.

humeralis Heller, 1918 (*Episcaphula*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 95–96, Taf. 1, Fig. 37

Mehrere Syntypen, Celebes meridionalis, monte Lompo-Batang, altitudine 3000 ft., III. 1896, leg. Fruhstorfer, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 10 Syntypen, S. Celebes, Lompo-Battan, 3000', III. 1896, leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

hypocrita Heller, 1918 (*Episcapha*)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 77, Taf. 1, Fig. 31

Mehrere Syntypen, Java, Coll. Kirsch, Coll. Felsche, Java occident., monte Tjikorai, 4000', 1892, leg. Fruhstorfer, im Museum Dresden.

DEI: 5 Syntypen, Java, leg. Fruhstorfer, durch Koechlin, Coll. Kraatz, Coll. Stark, ded. Sternberg.

inflatus Mader, 1942 (Homoeotelus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 193–194

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Oxapampa, Chanchamayo, in Coll. Mader, im Museum Hamburg, Museum Dresden, Museum Stettin, Museum Wien und DEI.

DEI: 1 Ex. Peru, durch Lange, Coll. Schenkling; 1 Ex. Peru, Chanchamayo, durch Staudinger, Coll. Kraatz: Paratypen.

insignis Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 104–105, Taf. 2, Fig. 45

Mehrere Syntypen, Moluccarum insula Morotai, ex Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 2 Syntypen, Morotai, Coll. Kraatz.

intercedens Schenkling, 1919 (Brachysphaenus)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 82

Mehrere Syntypen, Peru, Ocobambe, Chanchamayo.

DEI: 6 Syntypen, Peru, Ocobambe, Chanchamayo, Coll. Kraatz.

irroratus Kuhnt, 1908 (Cypherotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 229–230

Mehrere Syntypen, Peru.

DEI: 1 Syntypus, Peru, durch Staudinger, Coll. Schenkling.

kraatzi Gorham, 1900 (Pycnogeusteria)

Ann. Mag. Nat. Hist. **5** (7), 91

Mehrere Syntypen, W. Africa, N. Cameroon, Johann-Albrechtshöhe.

DEI: 3 Syntypen, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, leg. Conradt.

laceratus Mader, 1938 (Brachysphaenus)

Ent. Bl. **34**, 14–15

Holotypus, 14 Paratypen, Columbien, Cauca-Tal, Coll. Kraatz, im DEI und in Coll. Mader.

DEI: Holotypus, 10 Paratypen, Cauca-Tal, Coll. Kraatz.

laetus Schenkling, 1919 (Megischyrus)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 85

Mehrere Syntypen, Peru.

DEI: 2 Syntypen, Peru, leg. Lange, Coll. Schenkling.

laevipennis Kuhnt, 1910 (Episcaphula)

Dtsch. Ent. Ztschr., 221–222, Fig. 2

Holotypus, Molukken, Batjan; im DEI.

laticornis Delkeskamp, 1943 (Episcaphula)

Dtsch. Ent. Ztschr., 34–37, Fig. 5, 6c, 7

Holotypus, Kamerun, Tibati, ex Coll. Moser, im Museum Berlin; mehrere Paratypen: Kamerun, Bibundi, 16.–31. I. 1905, leg. Teßmann, Johann-Albrechtshöhe, VIII.–X. 1898, leg. Conradt, Joko, Tibati, Jaunde-Stat., 800 m, leg. Zenker, Lolodorf, II.–III. 1895, leg. Conradt, Ebolowa, 1912, leg. v. Rothkirch; Span. Guinea, Nkolentangan, XI. 1907–V. 1908, leg. Teßmann.

DEI: 2 Paratypen, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

lindiana Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 277–278

Holotypus, Africa orientalis, Lindi, XI. 1903, leg. Hintz, ex Coll. Kraatz; im DEI.

linodesmoides Delkeskamp, 1936 (Apetus)

Rev. Zool. Bot. Afr. **29**, 123–124

♂ Holotypus, Kamerun, Edea-Jaunde, leg. Schaefer, im Museum Berlin; 1 ♀, Paratypus, Kamerun, Eduntif-Jaunde, 1911, leg. Fröhlich, im DEI.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Kamerun, Eduntif-Jaunde, 1911, leg. Fröhlich, Coll. F. Müller.

longula Schenkling, 1908 (Amblyscelis)

In: Sjöstedt, Exped. Kilimand. I, **7** (7), 76–77, Taf. 2, Fig. 10

9 Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto Kulturzone, 27. II., 30. IV. 1906, leg. Sjöstedt.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 30. IV., Coll. Schenkling. Syn. zu natalensis Crotch, 1876.

macrocera Heller, 1918 (Episcapha)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 70–71, Taf. 1, Fig. 22

Holotypus, Sumatra, Medan, 1906, leg. F. Schneider, ex Coll. Kraatz, im DEI.

manilae Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 108–109

Mehrere Syntypen, Luzon, Manila, leg. Bonnefois, ex Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Manila, leg. Bonnefois, Coll. Kraatz.

marginicollis Schenkling, 1919 (Megalodacne)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 91–92

Mehrere Syntypen; Kongo, Kondue, leg. Luja, Kabambarré, leg. Delhaize; N.-O. Kongo, leg. Grauer; Shibanga, im DEI.

DEI: 1 Ex. Congo-Belge, Kondue, leg. Luja; 1 Ex. N. O. Congo, leg. Grauer, 1 Ex. Congo, Kabambarré, 1900, leg. Delhaize: Syntypen.

Syn. zu abnormalis belgarum Bedel, 1917; bezettelt von Delkeskamp.

mausonica Heller, 1918 (Episcapha)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 80–81, Taf. 2, Fig. 51

Mehrere Syntypen, Tonkin, Mau-Son, ex Coll. Gehr. W. Müller, im Museum Dresden, ex Coll. Kraatz, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes, Mauson, IV., V., 2–3000', leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

mediofasciata Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 102–103

Mehrere Syntypen, Nova Pommerania, peninsula quae „Gazelle“ nominatur, ex Coll. v. Bennigsen, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 4 Syntypen, H. Insel Gazelle, Coll. v. Bennigsen.

- medius** Grouvelle, 1913 (Diphyllus)
Arch. Naturg. **79**, A 11, 72
2 Syntypen, Formosa, Taihorin, leg. Sauter.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, VII. 1911, leg. Sauter.
- miles** Mader, 1942 (Brachysphoenus)
Beitr. Faun. Perus **2**, 180–181
Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Marcapata, in Coll. Mader, im DEI und Museum Dresden.
DEI: 4 Paratypen, Peru, Marcapata, Coll. Kraatz.
- minimus** Grouvelle, 1914 (Cryptophilus)
Arch. Naturg. **79**, A 11, 72–73
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. Sauter.
DEI: 8 Syntypen, Formosa, Kosempo, VIII. 1909, leg. Sauter.
- minutus** Grouvelle, 1902 (Diphyllus)
Ann. Soc. Ent. Fr. **71**, 485
3 Syntypen, Ceylon, Nalanda, in Coll. Horn und Coll. Grouvelle.
DEI: 1 Syntypus, Nalanda, 1899, leg. Horn.
- mirus** Mader, 1942 (Brachysphaenus)
Beitr. Faun. Perus **2**, 181–182
Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Marcapata, Satipo, Chanchamayo, in Coll. Mader, im Museum Hamburg und DEI.
DEI: 6 Ex. Peru, Marcapata, durch Staudinger, Coll. Kraatz; 1 Ex. Chanchamayo, ex Coll. F. Schneider, Coll. Schenkling; 1 Ex. dto., Coll. Kraatz: Paratypen.
- mirus** Grouvelle, 1914 (Cryptophilus)
Arch. Naturg. **79**, A 11, 73–74
Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. Sauter; im DEI (VII. 1911).
- montana** Schenkling, 1919 (Encaustes)
Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 83–84
Mehrere Syntypen, Tonkin, Mausonberge, 2–3000', leg. Fruhstorfer.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- monticola** Heller, 1918 (Neotritoma)
Arch. Naturg. **84**, A 8, 45–46, Taf. 1, Fig. 2
Mehrere Syntypen, Sumatra occidentalis, Pengalengan, altitudine 4000 ft., leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.
DEI: 6 Syntypen, Java, Pengalengan, 4000', 1893, leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.
- mundus** Schenkling, 1919 (Brachysphoenus)
Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 82
Holotypus, Bolivia; im DEI (Coll. Kraatz).

neglecta Heller, 1918 (Scaphodacne)

Ent. Bl. **14**, 150, 151, 155–156, Abb. 9–12

Mehrere Syntypen, Kamerun, Victoria, durch Staudinger und Bang-Haas, im Museum Dresden, Bibundi, leg. Retzlaff, 1911, im Museum Hamburg; Goldküste, Akim, Coll. Dohrn; Gabun, Sibange, leg. Soyaux, im Museum Hamburg; Gabun, in Coll. Felsche; Oberer Kongo, durch Gorham, Coll. Kraatz, im DEI (als ab. *crotchi* beschrieben).

DEI: 1 Syntypus, Upper, Congo, durch Gorham, Coll. Kraatz (als ab. *crotchi* bezettelt).

nigribasis Arrow, 1925 (Tritoma)

Faun. Brit. Ind., Col. Clavic. Erotyl., 138–139

Holotypus, mehrere Paratypen, Ceylon, leg. Nietner, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 6 Paratypen, Ceylon, leg. Nietner, Coll. Kraatz.

nigrocinctus Kuhnt, 1908 (Erotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 87

4 Syntypen, Peru, im Museum Berlin und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Coll. Schenkling, durch Staudinger.

nigrotibialis Mader, 1942 (Coccimorphus)

Mitt. Münch. Ent. Ges. **32**, 549–550

Holotypus, 2 Paratypen, Paraguay, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Paraguay, Coll. Kraatz.

nitidus Mader, 1942 (Brachysphoenus)

Mitt. Münch. Ent. Ges. **32**, 556

Holotypus, 1 Paratypus, Bolivien, Jongo, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Paratypus, Bolivia, Jongo, Coll. Kraatz.

novae guineae Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 91–92

Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, ex Coll. Kraatz und Coll. v. Bennigsen; Sattelberg, ex Coll. v. Bennigsen; im DEI und Museum Dresden. DEI: 6 Syntypen, D. N. Guinea, Sattelberg, leg. v. Bennigsen, Coll. v. Bennigsen, Coll. Kraatz.

opalizans Mader, 1942 (Mycotretus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 200

Holotypus, 7 Paratypen, Peru, Chanchamayo, im DEI und in Coll. Mader.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Peru, Chanchamayo, Coll. Kraatz, Coll. Schenkling.

ornatissima Heller, 1918 (Episcaphula)

Erft. Bl. **14**, 283–284, Fig. 2

Holotypus, Africa (?), ex Coll. Kraatz; im DEI.

paganettii Obenberger, 1914 (Triplax)
Col. Rundsch. **3**, 108–109

Mehrere Syntypen, Kleinasien, Taurus, via Paganetti-Hummeler an Obenberger.

DEI: 1 Syntypus, As. min., Taurus, Coll. Käufel, Coll. Leonhard.

papuana Heller, 1914 (Mirencaustes)
Dtsch. Ent. Ztschr., 305–306

Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, Sattelberg, ex Coll. v. Bennigsen, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Syntypus, N.-Guinea, Sattelberg, leg. v. Bennigsen, Coll. v. Bennigsen.

papuana Heller, 1918 (Thallis)
Arch. Naturg. **84**, A 8, 61

Mehrere Syntypen, Salomo insulae, 1909, leg. Frogatt, im Museum Dresden, Nova Guinea Germanica, Finschhafen, ex Coll. Kraatz, im DEI.

DEI: 6 Ex. N. Guinea Germanica, 1 Ex. Finschhafen, leg. Rolle, Coll. Kraatz: Syntypen.

partialis Mader, 1940 (Mycotretus)
Ent. Bl. **36**, 12–13

Holotypus, 35 Paratypen, Columbien, Cauca, in Coll. Mader, in Coll. Kraatz.
DEI: 25 Paratypen, S. Am., Cauca, Coll. Kraatz.

parvus Kuhnt, 1908 (Erotylus)
Dtsch. Ent. Ztschr., 74–75

Mehrere Syntypen, Peru, Marcapata, via Schenkling an Mader.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Marcapata, Coll. Schenkling.

peregrinus Mader, 1942 (Erotylus)
Beitr. Faun. Perus **2**, 187–188

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Callanga, im DEI und in Coll. Mader.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Peru, Callanga, Coll. Kraatz.

perplexus Mader, 1942 (Brachysphoenus)
Beitr. Faun. Perus **2**, 179–180

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Chanchamayo, im Museum Stettin, DEI und in Coll. Mader.

DEI: 3 Paratypen, Peru, Pozuzu, Coll. Kraatz.

peruae Mader, 1942 (Ischyryus)
Beitr. Faun. Perus **2**, 196

2 Syntypen, Peru, Callanga, im DEI und in Coll. Mader.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga, Coll. Kraatz.

pictipennis Schenkling, 1919 (Megischyryus)
Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 84–85

Mehrere Syntypen, Venezuela meridionalis, Esmeralda.

DEI: 2 Syntypen, S. Venezuela, Esmeralda, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

pictus Schenkling, 1919 (Aegithus)
Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 80

Mehrere Syntypen, Panama, Chiriqui.

DEI: 2 Syntypen, Chiriqui, Coll. Kraatz.

prioteloides Mader, 1942 (Mycotretus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 196–197

Holotypus, Bolivien, Coroico, in Coll. Mader; 1 Paratypus, Peru, Calanga, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Peru, Callanga, Coll. Schenkling.

pseuda Heller, 1918 (Triplax)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 50–51, Taf. 1, Fig. 12

Mehrere Syntypen, Borneo, monte Kina Balu, durch Staudinger und Bang-Haas, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 3 Syntypen, Kina Balu, durch Staudinger, Coll. Kraatz.

puncticollis Mader, 1942 (Lybas)

Beitr. Faun. Perus **2**, 200–201

Holotypus, Peru, Cushi; im DEI (Coll. Kraatz).

puncticollis Heller, 1918 (Microsternus)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 113

Mehrere Syntypen, Annam, Phuc Son, ex Coll. Müller, im Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, Annam, Phuc Son.

pygmaea Kraatz, 1871 (Triplax)

Berl. Ent. Ztschr. **15**, 145

Holotypus, Steiermark, durch Hampe; im DEI (Coll. Kraatz).

quadriplagiata Schenkling, 1919 (Platydacne)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 89–90

Mehrere Syntypen, Südost-Afrika, Maputa-Sikumba.

DEI: 2 ♂♂, 5 ♀♀, Sikumba-Maputa, Il., Coll. Kraatz, Syntypen.

queenslandicus Heller, 1918 (Microsternus)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 113–114, Taf. 1, Fig. 38

Holotypus, Queensland borealis, Coll. Kraatz; im DEI.

regina Schenkling, 1919 (Megalodacne)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 92

Mehrere Syntypen, Angola, Bihé, Bailundo, leg. Wellman und durch Ertl.

DEI: 1 Syntypus, Angola, Bailundo, durch Ertl.

reitteri Mader, 1939 (Neotriplax)

Ent. Nachr. bl. Troppau **13**, 71–72

♂ Holotypus, 51 Paratypen, China, Tienmuschan, in Coll. Mader und Coll. Reitter.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, N. W. China, Tienmuschan, durch Reitter.

robusta Schenkling, 1919 (Platydacne)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 90

Holotypus, Uganda, leg. Grauer; im DEI (Coll. v. Bennigsen).

rubrifrons Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 87

Mehrere Syntypen, Insel Banguay (in extrema septentrioni insulae Borneo), Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 4 Syntypen, Banguay, durch Staudinger, Coll. Kraatz.

ruficornis Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 279–280

Mehrere Syntypen, Africa occidentalis, Benguella, leg. Wellman, ex Coll. Kraatz, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Benguella, leg. Wellman, Coll. Kraatz.

ruficornis Schenkling, 1919 (Platydacne)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 89

4 ♀ ♀, Syntypen, Belg. Kongo, Kondué, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 1 Syntypus, Belg. Kongo, Kondué, ex Museum Dresden.

rufipes Schenkling, 1919 (Nesitis)

Arch. Naturg. **83** (1917), A 11, 88

Mehrere Syntypen, Borneo.

DEI: 2 Syntypen, Borneo, Coll. Schenkling.

rufipes Heller, 1918 (Scaphodacne)

Ent. Bl. **14**, 153–154, Abb. 7

Mehrere Syntypen, Kongostaat, Kudué, leg. Luja, Coll. Kraatz, im DEI.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Congo-Belge, Kondué, leg. Luja, Coll. Kraatz.

samoensis Heller, 1918 (Thallis)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 61–62

Mehrere Syntypen, Samoa, Upolu, Coll. Kraatz, Nova Pommerania, Matupi, leg. Thiele, ex Coll. Schenkling, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Ex. Upolu, Coll. Kraatz, 1 Ex. Neu-Britannien, Matupi, leg. Thiele, ded. 20. VI. 1895, Coll. Schenkling: Syntypen.

sanguinans Kuhnt, 1908 (Erotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 88

Holotypus, Amazonas; im DEI (durch Staudinger).

sauteri Grouvelle, 1913 (Diphyllus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 70–72

4 Ex. Taihorin, 1 Ex. Combeh: Syntypen, Formosa, leg. Sauter.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Lambeh (nicht Combeh!), II. 1908, leg. Sauter (1 Ex. der Typenserie wird in der Beschreibung nicht erwähnt).

schenklingi Grouvelle, 1914 (Diphyllus)

Arch. Naturg. **79**, A 11, 68–70

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. Sauter; im DEI (I. 1908).

schenklingi Kuhnt, 1908 (Erotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 84

7 Syntypen, Amazonas, im Museum Berlin und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Amazon., durch Staudinger, Coll. Kraatz, Coll. Schenkling.

sellatus Arrow, 1924 (Simocoptengis)

Nova Guinea **15**, 5–6

Mehrere Syntypen, New Guinea, Doormanpadbivak, 1410 m, X. 1920, leg. v. Heurn.

DEI: 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

seriatus Kuhn, 1908 (Cypherotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 229

Mehrere Syntypen, Bolivien.

DEI: 2 Syntypen, Bolivien, durch Rolle, Coll. Schenkling (1 Ex. als var. nigroterminalis bezettelt).

sexsignata Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. 14, 281–282

Mehrere Syntypen, Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, ex Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sibiricus Reitter, 1879 (Aulacochilus)

Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 224

Holotypus, Ost-Sibirien, leg. Christoph; im DEI (1877, Coll. Kraatz).

simplex Schenkling, 1919 (Palaeolybas)

Arch. Nat. Gesch. 83, A 11 (1917), 86–87; als ab. von andreae Crotch beschrieben

Mehrere Syntypen, Kamerun, Kongo, Bénito, Bata.

DEI: 1 Syntypus, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

spinipes nigrescens Delkeskamp, 1937 (Micrencaustes)

Dtsch. Ent. Ztschr., 41

1 ♂, Kamerun, Dibongo, 1 ♀, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, mehrere Ex. Kamerun, Kribi; Paratypen, Holotypus, im Museum Berlin.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, Kribi.

stigmosa Heller, 1918 (Simocoptengis)

Arch. Naturg. 84, A 8, 81–82

Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, ex Coll. Kraatz, Sattelberg, Coll. v. Bennigsen, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 6 Syntypen, Dtsch. N.-Guinea, Sattelberg, Coll. v. Bennigsen, durch Staudinger, Coll. Kraatz.

subcostata Schenkling, 1908 (Episcapha)

In: Sjöstedt, Kilim. Exp. I, 7 (7), 76, Taf. 2, Fig. 9

3 Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Regenwald, 2000–3000 m, 5. I. 1906, leg. Sjöstedt.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. Schenkling.

sumatrensis Heller, 1918 (Tritomophasma)

Arch. Naturg. 84, A 8, 43–45, Taf. 1, Fig. 11, 19, 20

Mehrere Syntypen, Sumatra aequilonaris, Tebing-tinggi, leg. Schultheiss, im DEI und Museum Dresden, Banguay, Borneo, im Museum Dresden.

DEI: 4 Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. Schultheiss, Coll. Schultheiss.

suturalis Schenkling, 1919 (Encaustes)

Arch. Naturg. 83 (1917), A 11, 83

Mehrere Syntypen, N.-Borneo, Kinabalu.

DEI: 1 Ex. Borneo, 1 Ex. N. Borneo, leg. Schröder, Coll. Schenkling; 1 Ex. Borneo, Kinabalu, 1500 m, durch Rolle, Coll. Kraatz; Syntypen.

tamburinea Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 105–106

Mehrere Syntypen, Queensland septentrionalis, monte Tambourine, ex Coll. Hacker, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 1 Syntypus, S. Queensland, Mt. Tambourine, Coll. Hacker.

tigrinoides Mader, 1942 (Mycotretus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 196

Holotypus, Peru, Ocobambe, im DEI (Coll. Kraatz).

tigripennis Mader, 1942 (Mycotretus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 197–198

Holotypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. Haensch; im DEI (Coll. Kraatz).

tonkinensis Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 83–84

Mehrere Syntypen, Tonkin, Mau-Son, leg. Fruhstorfer, ex Coll. W. Müller, im Museum Dresden, ex Coll. Kraatz, im DEI.

DEI: 10 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV., V., 2–3000', leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

tonkinensis fratria Heller, 1920 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84** (1918), A 8, 83, 111

Mehrere Syntypen, Birma, Carin.

DEI: 16 Syntypen; Carin, Asciiui Cheba, 800–1400 m, XII. 1887; Carin Ghecù, 1300–1400 m, II.-III. 1888; leg. Fea, Coll. Kraatz.

tonkineus Arrow, 1928 (Cyrtomorphus)

Faune Col. Fr. **2**, 338–339

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV., V., leg. Fruhstorfer, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV., V., 2–3000', leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

tricolor Kuhnt, 1908 (Micrerotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 237–238

Holotypus, Peru; im DEI (durch Lange, Coll. Schenkling).

tricolor Heller, 1918 (Microsternus)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 112–113, Taf. 1, Fig. 16, Taf. 2, Fig. 46

Mehrere Syntypen, Japan, Insel Kiuschin, Yuyama, Prov. Higo, Phuc-Son in Anam, Coll. W. Müller, Tonkin, Mauson-Gebirge, IV.–V., 2–3000 m, leg. Fruhstorfer, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV., V., 2–3000', leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz.

tricolor Mader, 1942 (Prepopharus)

Beitr. Faun. Perus **2**, 190–191

Holotypus, 3 Paratypen, Peru, Chanchamayo, im DEI und in Coll. Mader.

DEI: Holotypus, Peru, Chanchamayo, ex Coll. F. Schneider, Coll. Schenkling.

tricolorata Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 282–283, Fig. 1

Holotypus, Africa or., Uganda Britannica, leg. Grauer, Coll. v. Bennigsen, im DEI.

tripunctata separata Heller, 1918 (Episcaphula)

Ent. Bl. **14**, 276–277

Mehrere Syntypen, Africa occident., Kamerun, Lolodorf, leg. Conradt, 1895, ex Coll. Kraatz, im DEI und Museum Dresden.

DEI: 6 Syntypen, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. Conradt, Coll. Kraatz.

tuberculifrons Lewis, 1887 (Eudaemonius)

Ann. Mag. Nat. Hist. (5) **20**, 72

Mehrere Ex. Japan, Miyanosita, Chiuzenji, V., VI., VIII., 5 Ex. Sapporo, in Yezo; Syntypen.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Japan, Coll. Kraatz.

turneri Arrow, 1929 (Biphyllus)

Ann. Mag. Nat. Hist. (10) **4**, 310

Mehrere Syntypen, Cape Prov., Pondoland, Port St. John, IX., leg. Turner.

DEI: 2 Syntypen, S. Africa, Pondoland, Port St. John, IX. 1923, leg. Turner, ex Brit. Mus. Nr. 1923–510.

uniramosa Heller, 1918 (Episcaphula)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 96–98

Mehrere Syntypen: Java, ex Coll. Felsche, Celebes, ex Coll. W. Müller, im Museum Dresden; Java, leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz, Java, Malang, durch Staudinger, ex Coll. Schenkling; Java meridionalis, Palabuan, 1892, leg. Fruhstorfer und Java occidentalis, mons Gede, alt. 4000 ft., leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz, im DEI.

DEI: 10 Ex. Java, leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz, 1 Ex. Java, Malang, durch Staudinger, Coll. Schenkling, 1 Ex. Java, occident., Mons Gede, 4000', VIII. 1892, leg. Fruhstorfer, Coll. Kraatz: Syntypen.

variomaculatus Kuhnt, 1908 (Erotylus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 77–78

Über 100 Syntypen, Bolivien, Yungas de la Paz.

DEI: 5 Syntypen, Bolivia, leg. Rolle, durch Staudinger, Coll. Schenkling (als var. niger, var. paucipunctatus und var. vittiger bezettelt).

wunderlichi Heller, 1918 (Micrencaustes)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 23–24

Mehrere Syntypen, Java, ex Coll. Wunderlich, Sumatra, Deli, W. Sumatra und Battak montibus, leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz, im Museum Dresden und DEI.

DEI: 2 Ex. W. Sumatra, Deli, 1 Ex. Montes Battak; ex Coll. Fruhstorfer, Coll. Schenkling; Syntypen.

wunderlichi tonkinensis Heller, 1918 (Mimencastes)

Arch. Naturg. **84**, A 8, 24

2 Syntypen, Tonkin, montibus Mau-Son, alt. 2–3000' ft., leg. Fruhstorfer, ex Coll. Kraatz; im DEI.

xanthomelas apicenigrum Mader, 1942 (Drepopharus)

Mitt. Münch. Ent. Ges. **32**, 570–571

Holotypus, Columbien, in Coll. Mader; 1 Paratypus, Columbien, Rio Dagua, leg. Rosenberg, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. Kraatz.

zischkai Delkeskamp, 1957 (Mycotretus)

Veröff. Zool. Staatss. München **5**, 112–113, 98, Fig. 10

Holotypus, Bolivien, Chapare-Gebiet, Oberer Rio Chipiriri, 400 m, 31. X. 1953, leg. Forster; 62 Paratypen: Bolivien, Chapare-Gebiet, Oberer Rio Chipiriri, 400 m, 30., 31. X. 1953, leg. Forster; Bolivia tropica, Region Chapare, 400 m, 10. V., 15. X. 1951/20. VIII. 1952/25. X. 1953/10. VIII. 1954, leg. Zischka, in der Zool. Sammlung des Bayerischen Staates, München.

DEI: 2 Paratypen, Bolivia trop-Region, Chapare, 400 m, 10. VIII. 1954, leg. Zischka.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

cingulata Arrow (Xenotritoma)

DEI: 1 Type, Tjibodas, 1400 m, VIII. 1921, No. 169.

sauteri Csiki (Amblyopus)

DEI: 24 Syntypen, Formosa, Fuhosho, Anping, VII. 1909, leg. Sauter.

Bostrychidae

bufo Lesne, 1907 (Sinoxylon)

Ann. Soc. Ent. Fr. **75** (1906), 482–484, Fig. 518–519

1 Ex. Borneo occidental, Pontianak, in Coll. Fairmaire; 1 Ex. Java, im DEI;
1 Ex. Java, Cordillère sud, leg. Rouyer, in Coll. Pic; Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Java.

caribeanus Lesne, 1931 (Lyctus)

Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) **3**, 96–98, Fig. 1

Mehrere Syntypen, nähere Angaben siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Motzorongo, leg. Hoege, Coll. Kraatz.

clavula Lesne, 1906 (Xyloperthodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **75**, 553, Fig. 563

4 Syntypen; Afrique orientale allemande, Zanzibar, Ousambara, Plantage Nguelo, im Museum Paris, Oukami, in Coll. Bedel; Zanzibar, im DEI.

DEI: † Syntypus, Zanzibar.

corticeus Lesne, 1908 (Lichenophanes)

In: Sjöstedt. Kilimand. Exp. I, **7** (4), 34

1 Ex. Meru-Niederung, Ngare na nyuki, 25. XI., leg. Sjöstedt; 1 Ex. Tanga, im DEI: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Tanga.

cuneolus Lesne, 1906 (Sinoxylon)

Ann. Soc. Ent. Fr. **75**, 470, 508, Fig. 536

2 Syntypen: Colonie du Cap, Pirie Bush près Willamstown, im Britischen Museum; Transvaal, leg. Hartmann, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Transvaal, leg. Hartmann.

evops Lesne, 1906 (Xyloperthodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **75**, 549, 556–557, Fig. 566

8 Syntypen: Haut-Zambéze, leg. Foa, im Museum Paris; Machonaland, im Britischen Museum; Salisbury, im Museum Cape Town; Rhodésia méridionale, Sebakwe, im Museum Cape Town; Benguela, leg. Wellman, im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Benguela, leg. Wellman.

heydeni Schilsky, 1899 (Xylopertha)

Käf. Europ. **36**, nr. 92

2 Syntypen, Algier, Bona, Ancey, Coll. v. Heyden.

DEI: 1 Syntypus, Algier, Ancey, Boghari, Coll. v. Heyden.

Syn. zu picea Olivier, 1790.

morbillosus Quedenfeldt, 1886 (Bostrychus)

Berl. Ent. Ztschr. **30**, 325

Mehrere Syntypen, Angola, vom Quango-Strom, 1878–1881, leg. v. Mechow.

DEI: 1 Syntypus, Angola.

nasifer Lesne, 1907 (Xyloperthodes)

Ann. Soc. Ent. Fr. **75** (1906), 557–558, Fig. 567, 568

Mehrere Syntypen: Madagascar, leg. Catat, etc., im Museum Paris, Britischen Museum, DEI und in Coll. Bedel; Tamatave, im Museum Paris; Tananarive, in Coll. Schaufuß, foret d' Ikongo, S. E. de Fianarantsoa, E. V., leg. Grandidier, im Museum Paris; Fort-Dauphin, in Coll. Alluaud.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar.

parvulum Lesne, 1925 (Heterarthron)

Enc. Ent. Coleopt. **1** (1), Serie B, 29–31

Holotypus, Monterey, 18. IV. 1869, durch Horn, im DEI.

reflexa Lesne, 1909 (Apate)

Ann. Soc. Ent. Fr. **78**, 533–535, Textf. 598–602, Taf. 2, 8, 12, 14, 15, 19, 20

2 ♀♀, Afrique guinéenne et bassin du Congo, Sierra Leone, Free Town, leg. Mocquerys, in Coll. Oberthür; 1 ♂, Cameroun, leg. Conradt, im DEI; 2 ♀♀, Johann-Albrechtshöhe, leg. Conradt, in Coll. Oberthür; 1 ♀, Gabon, Libreville, Coll. Fleutiaux; 1 ♀, Bassin du Congo, Léopoldville, V., VI., in Coll. Clavareau; 1 ♀, Ibembo, sur le Haut-Itimbiri, leg. Duvivire, im Museum Brüssel: 1 Syntypen.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Kamerun, leg. Conradt.

sublobata Lesne, 1909 (Phonapate)

Ann. Soc. Ent. Fr. **78**, 570–572, Textf. 633, Taf. 2, 4, 6, 14, 16, Taf. 7, Fig. 10, 11

♀ Holotypus, Sumatra, N.-O., Tebing-tinggi, leg. Schultheiß; im DEI, (23. VI. 1884).

zanzibaricus Lesne, 1925 (Lichenophanes)

Enc. Ent. Coleopt. **I**. (1), 28, Serie B, Fig. 1

28 Syntypen, Afrique orientale continentale, Zanzibar, Amani, durch Horn, Dar es Salam, durch Oberthür.

DEI: 17 Syntypen, Amani, XII. 1904, dedit. C. Schaufuß, 1922.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

venezulanum Lesne (Heterarthron)

DEI: 1 Typus, Venezuela, dedit. Schaufuß, 1922.

Ptiniidae

albipilis Reitter, 1884 (Ptinus)

Verh. Nat. Ver. Brünn **22**, 318

Mehrere ♀♀, Syntypen, Sierra-Lanjaron, Coll. v. Heyden.

DEI: 1 Syntypus, Lanjaron, Coll. v. Heyden.

anemophilus Chobaut, 1901 (Eurostus)

Bull. Soc. Ent. Fr., 298–299

Mehrere Syntypen, Frankreich, Mt. Ventoux, 10. VII. 1898/VII. 1900/VI. 1901, leg. Puel, Chobaut, Vareilles und Guignot.

DEI: 2 Syntypen, Mont Ventoux, Vaucluse, Versant Sud, leg. Chobaut, Coll. P. Meyer.

aubei Boieldien, 1854 (Ptinus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (3) **2**, Bull. LXXXI

Mehrere Syntypen, France méridionale, Sicile.

DEI: 2 Syntypen, Gallia m., Coll. Kraatz.

canaliculatus Reitter, 1884 (Bruchus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **28**, 85

Mehrere Ex. am thessalischen Olymp, Parnaß, leg. Krüper; mehrere Ex. Nord-Morea, leg. Brenske: Syntypen.

DEI: 2 Ex. Morea, Cumani, leg. Brenske, Coll. L. W. Schaufuß, Heyne comm. 1912, Coll. Konow; 4 Ex. Morea, Hagios Wlassis, leg. Brenske, Coll. Kraatz, Coll. v. Heyden: Syntypen.

corticinus Rottenberg, 1870 (Ptinus)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 245–246

1 ♂, 4 ♀♀, Syntypen, Mondello bei Palermo, Sicilien.

DEI: 4 Syntypen, Palermo, leg. v. Rottenberg.

Syn. zu *testaceus* Olivier, 1790.

densepunctatus Pic, 1936 (Sphaeriscus)

Arb. morph. tax. Ent. **3**, 131

Mehrere Syntypen, Brésil, Sao Paulo, leg. Fonseca, im DEI und in Coll. Pic.
DEI: 1 Syntypus, Sao Paulo, Capital, Nr. 377, Coll. Bocha.

disconotatus Pic, 1907 (Ptinus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 317

Mehrere Syntypen, Ost-Afrika, via Schenkling an Pic.

DEI: 1 Syntypus, Ost-Afrika, Coll. Kraatz.

divulgatus Pic, 1907 (Ptinus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 317

Mehrere Syntypen, America meridionalis, Chili, via Schenkling an Pic.

DEI: 1 Syntypus, Chili, Coll. Kraatz.

drakei Pic, 1907 (Ptinus)

Dtsch. Ent. Ztschr., 318

Mehrere Syntypen, America meridionalis, Paraguay, leg. Drake, via Schenkling an Pic.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, 188 . . . , leg. Drake, Coll. Kraatz.

fausti Heyden, 1886 (Niptus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **30**, 187

Mehrere Syntypen, Turkestan, Semiretschensk (zwischen Andidjan und Issik-
kul, Tschemkent), ex Coll. Faust.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Semiretschensk, durch Faus.

ferrugulus Reitter, 1884 (Niptus)

Verh. Nat. Ver. Brünn **22**, 300

Mehrere Syntypen, Spanien, Alpujarras, Sierra-Lanjaron, Coll. v. Heyden.

DEI: 1 Syntypus, S. Lanjaron, Coll. v. Heyden.

irroratus Kiesenwetter, 1851 (Ptinus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (2) **9**, 622–623

Mehrere Syntypen, Mont-Serrat, leg. v. Kiesenwetter.

DEI: 1 Syntypus, Mt. Serrat, Coll. Stierlin.

kiesenwetteri Reitter, 1884 (Bruchus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **28**, 83–84, Taf. 2, Fig. 19

Mehrere Syntypen, Griechenland, Attica, nördl. Morea, leg. Emge und leg.
Brenske.

DEI: 2 Ex. Morea, Hagios Wlassis, leg. Brenske, Coll. L. W. Schaufuß, Heyne
comm. 1912; 1 Ex. Morea, Parnon-Geb., leg. Emge, Coll. Stierlin; Syntypen.

leonhardi Breit, 1908 (Ptinus)

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **58**, 160–162

Mehrere Syntypen, Sizilien, Umgebung von Ficuzza, leg. Leonhard.

DEI: 33 Syntypen, Sicilia, Ficuzza und Messina, 1906, leg. Leonhard und Coll.
v. Heyden.

Syn. zu reitteri Pic, 1894.

meieri Reitter, 1897 (Xylotheca)

Wien. Ent. Ztg. **16**, 205–206

Mehrere Syntypen, in der Nähe der Stadt Hamburg, leg. W. Meier.

DEI: 4 Syntypen, Hamburg, leg. Meier, Coll. Stierlin und Coll. v. Heyden.

minimus Heyden, 1870 (Eurostus)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 128–129 (Beiheft)

3 Syntypen, in der Serra de Gerez, leg. v. Heyden.

DEI: 1 Syntypus, Gerez, Coll. v. Heyden.

reichei Boieldien, 1854 (Ptinus)

Ann. Soc. Ent. Fr. (3) **2**, Bull. LXXIX

Mehrere Syntypen, Sicile, Grèce, Algérie.

DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Graecie, Coll. Kraatz.

subaeneus Reitter, 1884 (Bruchus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **28**, 81, 82–83

Mehrere Syntypen; Nord-Morea, Kumani, leg. Brenske; Syrien, Haifa, leg. Lange.

DEI: 4 Syntypen, Morea, Cumani, leg. Brenske, Coll. L. W. Schaufuß und Coll. Konow.

tarsalis Reitter, 1884 (Bruchus)

Dtsch. Ent. Ztschr. **28**, 84–85, Taf. 2, Fig. 19

Mehrere Syntypen, Attica, Morea, leg. Brenske.

DEI: 1 Syntypus, Morea, Hagios Wlassis, leg. Brenske, Coll. L. W. Schaufuß, Heyne comm. 1912.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

angustior Schaufuß (Gibbium)

DEI: 4 Typen, Cairo, Coll. L. W. Schaufuß, Heyne comm. 1912.

Anobiidae

ausonicus Obenberger, 1917 (Stagetus)

Arch. Naturg. **82**, A 4, 35–36

2 Syntypen, Süditalien, in Coll. Obenberger.

DEI: 1 Syntypus, Gerace, Cal., leg. Paganetti.

bicolor Pic, 1927 (Theca)

Ent. Mitt. **16**, 248

Holotypus, mehrere Paratypen, Zanzibar, im DEI und in Coll. Pic.

DEI: Holotypus, Zanzibar.

carpetanum Heyden, 1870 (Anobium)

Berl. Ent. Ztschr. **14**, 129–130 (Beiheft)

Holotypus, Escorial, leg. v. Heyden; im DEI.

conradti Pic, 1927 (Caenocara)

Ent. Mitt. **16**, 248

Holotypus, Kamerun, leg. Conradt; im DEI.

leonhardi Roubal, 1917 (Priartobium)

Arch. Naturg. **82**, A 3, 52–53

Holotypus, Sardinia, Aritzo, Mte. Genargentu, leg. Krüger; im DEI (Coll. Leonhard).

lucens Peyerimhoff, 1926 (Dorcatoma)

Ann. Soc. Ent. Fr. **95**, 348–349

Mehrere Syntypen, Littoral d'Alger, forêt de Bainen, V., Zéralda.
DEI: 2 Syntypen, Alger, Zéralda, dedic. Peyerimhoff.

plicatipennis Pic, 1912 (Theca)

Echange **28**, 330, 46

Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. Sauter, in Coll. Kraatz, im DEI (VIII. 1909).

rufescens Pic, 1927 (Mesocoelopus)

Ent. Mitt. **16**, 247–248

Holotypus, mehrere Paratypen, Zanzibar, im DEI und in Coll. Pic.
DEI: Holotypus, Zanzibar.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

longiuculus Obenberger (Stagetus)

DEI: 1 Typus, Graecia, Kephallenias.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen (755), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.