



# STANDARD O.M.J.



## CARPODAQUE DU MEXIQUE

NOM LATIN: *Carpodacus mexicanus*

FAMILLE : Fringillidés

ORIGINE : Du Mexique au Canada

SOUS ESPECES:

*Carpodacus mexicanus mexicanus* (Statius Muller, 1776)

*Carpodacus mexicanus amplus* Ridgway, 1876

*Carpodacus mexicanus centralis* R. T. Moore, 1937

*Carpodacus mexicanus clementis* Mearns, 1898

*Carpodacus mexicanus coccineus* R. T. Moore, 1939

*Carpodacus mexicanus frontalis* (Say, 1823)

*Carpodacus mexicanus griscomi* A. H. Miller, 1939

*Carpodacus mexicanus mcgregori* Anthony, 1897

*Carpodacus mexicanus potosinus* Griscom, 1928

*Carpodacus mexicanus rhodopnus* R. T. Moore, 1936

*Carpodacus mexicanus roseipectus* Sharpe, 1888

*Carpodacus mexicanus ruberrimus* Ridgway, 1887

*Carpodacus mexicanus rhodocolpus*

*Carpodacus mexicanus solitudinus*

TAILLE : 15 cm de la pointe du bec à la fin de la queue

BAGUE CONSEILLÉE : 2.8 mm (pour les concours la bague doit obligatoirement être inamovible).



Foto femelle

Foto



Note: Toutes les dénominations seront précédées de: *Carpodacus mexicanus* CARPODAQUE DU MEXIQUE

Dans le cas de sujets de phénotype sauvage on emploiera seulement la dénomination ci-dessus.

Pour les mutations il faudra écrire :

*Carpodacus mexicanus* CARPODAQUE DU MEXIQUE pastel, (par exemple).

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



Les nouvelles mutations non standardisées seront jugées dans la classe :  
Nouvelles mutations en étude (pas de médaille)  
Ne sont pas admises toutes les combinaisons de mutations.

## TYPE

Le Carpodaque du Mexique est un oiseau costaud d'une allure robuste. Vu de face, la forme de la tête doit être large et bien arrondie. De la poitrine jusqu'à la région anale, le corps doit avoir une forme bien arrondie et régulière. Le bas du corps ne peut donner l'impression d'être corpulent. Le dos doit former une ligne droite à partir de la nuque jusqu'au bout de la queue.

## STRUCTURE et FORME :

Le **CARPODAQUE DU MEXIQUE** est un oiseau à la structure élancée et harmonieuse, avec une longueur totale maximum de 15 cm. La poitrine est légèrement arrondie. La tête doit avoir une bonne structure avec le front qui se détache.

Le bec est de forme conique, avec une base large et bien proportionnée.

La forme du bec : la mandibule supérieure doit légèrement être bombée et assez costaute, sans callosité. Les mandibules inférieure et supérieure doivent se rejoindre entièrement.

## DESSIN :

Le **CARPODAQUE DU MEXIQUE** est oiseau avec dimorphisme bien évident entre le mâle et la femelle.

Les mâles présentent une couleur rouge sur la poitrine et la tête.

Le dessin de la femelle est plus marqué ;

## COULEUR :

Les sujets doivent présenter le maximum de saturation dans les pigments mélaniques et lipochromiques, sans avoir d'interruptions des dessins ou interaction de lipochrome ou vice-versa.

La couleur rouge doit toujours apparaître intense, uniforme et brillante.

**PLUMAGE :** Le plumage est luisant, lisse bien serré et doit épouser la forme du corps. Sur la poitrine, sur le dos et les flancs il doit être bien compact et de bonne longueur. Des plumages usées, fripés, brisés ou sales sont inadmissibles.

**MAINTIEN :** le **CARPODAQUE DU MEXIQUE** est un oiseau vif, actif mais pas de tempérament sauvage, il se déplace continuellement d'un perchoir à l'autre de la cage en maintenant la ligne du corps à 45° par rapport à l'horizontale.

Les ailes doivent bien épouser la forme du corps et se rejoindre près du croupion.

Les ailes bien portées doivent coller au corps et se joindre sur le croupion, sans jamais être pendantes

Pattes parallèles, et légèrement fléchies, l'oiseau ne doit pas se dresser trop haut sur les pattes ou s'affaisser sur son perchoir.

## CONDITION GÉNÉRALE :

La condition optimale et un oiseau sain sont absolument nécessaires au moment du jugement.

Les pattes sont droites et solides, sans callosité ou difformité. Les doigts doivent bien serrer le perchoir. La patte possède quatre doigts dont trois sont dirigés vers l'avant et un vers l'arrière. Les ongles doivent être de même couleur.

Le plumage doit être en bon état sans plume brisée ou abîmée.

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## NOMENCLATURE OFFICIELLE

<b>PHENOTYPE SAUVAGE</b>	Mâle et femelle de phénotype sauvage
<b>TORBA</b>	Mâle et femelle mutation Torba. Transmission héréditaire : autosomique récessive.
<b>PHAEO</b>	Mâle et femelle mutation phaeo Transmission héréditaire : autosomique récessive
<b>DILUE</b>	Mâle et femelle mutation dilué Transmission héréditaire : autosomique récessive
<b>OPALE</b>	Mâle et femelle mutation opale Transmission héréditaire : autosomique récessive

## EFFETS DES MUTATIONS

DÉNOMINATION	ASPECT PHÉNOTYPIQUE	RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES
<b>TORBA</b>	Toutes les zones normalement noires deviennent noir-brun	Cette mutation présente une forte densité de brun et se différencie par le changement de toutes les zones noires (tête, ailes et queue), en noir-brun (mat). Bec brun-foncé. Pattes et ongles brun clair.
<b>PHAEO</b>	Toutes les zones normalement noires et brun deviennent de couleur Phaeo - maximale phaéomélanine brune et absence totale d'eumélanine noire	Pour le phaéo, les exigences suivantes sont de mise : Phaéomélanine brune maximale, répartie aussi également que possible avec de préférence dans la forme d'une courte interruption du dessin des petites lignes. Nous devons nous efforcer d'aller vers une couleur de corps qui est de couleur brune aussi claire que possible ; par contre le dessin doit être de couleur aussi profonde que possible.
<b>DILUE</b>	Toutes les zones normalement noires et brun sont gris	Cette mutation présente une dilution régulière sur tout le corps, l'eumélanine noire devient grise. Le dessin également éclairci
<b>OPALE</b>	Toutes les zones normalement noires et brun deviennent gris clair	Cette mutation présente une absence de phaéomélanine et une réduction régulière de l'eumélanine noire qui devient gris clair. Dans les meilleurs sujets on notera l'effet tendhal (reflet gris bleu). Les dessins stries du dos et des flancs doivent être bien visibles ; Les lipochromes ne sont pas altérés.

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## REMARQUES CONCERNANT LE JUGEMENT

Vu le progrès dans l'élevage des mutations en général, le comité technique exotique de l' SO SOF. a décidé de standardiser le Carpodaque du Mexique et ses mutations.

Comme pour chaque standard, périodiquement, les normes peuvent être changées et complétées..

Pour le jugement des oiseaux de propre élevage, les normes suivantes sont d'application :

Comme principe de base il doit y avoir un pigment maximal avec un dessin le plus net possible.

Si dans l'exposition, il y a une série prévue pour les mutations et si l'oiseau donne une satisfaction complète aux normes exigées, ce sujet peut obtenir un maximum de 92 points avec le titre de champion.

Une faute qui apparaît souvent chez le mâle c'est le débordement d'une couleur trop profonde, parfois il nous est présenté avec un reflet de couleur violette sur la poitrine, cela doit être puni dans la rubrique couleur. La préférence va chez le mâle vers un oiseau avec une couleur poitrinale égale.

## DÉFAUTS PRINCIPAUX

### Structure:

- Taille supérieure à 15 cm.
- Corps trop mince, trop rond, trop allongé.
- Tête plate, petite, disproportionnée.
- La forme du bec : la mandibule supérieure ressemble à celle du canari alors qu'elle doit légèrement être bombée
- Poitrine pas assez large.

### Dessin:

- Miroir alaire mal délimité, trop étendu.
- Répartition des striures insuffisante, incomplète et/ou irrégulière
- Bordures des rémiges blanches ou trop décolorées.

### Couleur (Dans les deux sexes):

- Présence d'orangé couleur
- Présence excessive de schimmel.
- Manque d'uniformité dans la couleur.
- Champs de couleur marbré entre autre la couleur de la poitrine rouge irrégulière ; en administrant trop de colorant : coloration trop profonde.

### Plumage:

- Trop clairsemé ou court, désordonné, flasque,
- Traces de mue ou de plumage juvénile.

### Maintien :

- Trop statique ou trop sauvage,
- Positions défectueuses (au perchoir, en fond de cage ou à la grille)

### Condition:

- Plumage, pattes, bec et bague sales.

**Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015**

**Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.**



# STANDARD O.M.J.



- Ongles trop longs, bec et pattes écaillés.

**Note complémentaire :**

Le sujet présenté en jugement ne doit pas exprimer les séquelles d'un métissage trop récent entre espèces proches. (Taille, couleur, structure, netteté du dessin)

## CARPODAQUE DU MEXIQUE

### PHENOTYPE SAUVAGE : COULEUR ET DESSINS

<b>Front - tête - occiput - cou</b>	Le front est rouge. Le vertex et l'occiput sont noirs. A partir du front partent les sourcils d'une couleur rouge qui se terminent dans la nuque.
<b>Joues</b>	Les lores et les joues sont noirs avec un reflet brun rouge.
<b>Menton - gorge</b>	Rouge
<b>Poitrine</b>	Rouge
<b>Ventre – dessous du corps et flancs</b>	Brun foncé garni des stries noires
<b>Dos -couvertures alaires - rémiges primaires</b>	Le dos est brun foncé strié de noir. Les rémiges primaires noires.
<b>Croupion - sus-caudales</b>	Le croupion est rouge. Les sus-caudales sont d'une couleur brun foncé.
<b>Queue - sous-caudales</b>	La queue est noire. Les sous-caudales, la culotte et les cuisses couleur crème sont striés de brun foncé.
<b>Yeux</b>	Noir
<b>Bec</b>	Mandibule supérieure : couleur corne foncé Mandibule inférieure : légèrement plus clair
<b>Pattes</b>	Couleur corne foncé
<b>Ongles</b>	Noir
<b>Remarques</b>	Chez la femelle, il manque la couleur rouge et elle est plus striée que le mâle

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## TORBA : COULEUR ET DESSINS

<b>Front - tête - occiput - cou</b>	Le front est rouge. Le vertex et l'occiput sont brun foncé. A partir du front partent les sourcils d'une couleur rouge qui se terminent dans la nuque
<b>Joues</b>	Les lores et les joues sont bruns
<b>Menton - gorge</b>	Rouge
<b>Poitrine</b>	Rouge
<b>Ventre – dessous du corps et flancs</b>	Brun clair avec des stries brun foncé
<b>Dos -couvertures alaires -rémiges primaires</b>	Le dos est brun finement strié de brun foncé. Les couvertures alaires et les rémiges primaires sont brun-foncé
<b>Croupion - sus-caudales</b>	Le croupion est rouge Les sus-caudales sont d'une couleur brun foncé
<b>Queue -sous-caudales</b>	La queue est brun foncé. Les sous-caudales brun-clair
<b>Yeux</b>	Brun foncé
<b>Bec</b>	Mandibule supérieure : couleur corne Mandibule inférieure : couleur chair
<b>Pattes</b>	Couleur corne
<b>Ongles</b>	Couleur corne
<b>Remarques</b>	Chez la femelle, il manque la couleur rouge et elle est plus striée que le mâle

## DILUE : COULEUR ET DESSINS

<b>Front - tête - occiput - cou</b>	Le front est rouge brillant. Le vertex et l'occiput sont gris foncé. A partir du front partent les sourcils d'une couleur rouge brillant qui se terminent dans la nuque
<b>Joues</b>	Les lores et les joues sont gris
<b>Menton - gorge</b>	Rouge brillant
<b>Poitrine</b>	Rouge brillant
<b>Ventre – dessous du corps et flancs</b>	gris clair avec des stries gris foncé
<b>Dos -couvertures alaires -rémiges primaires</b>	Le dos est gris finement strié de gris foncé. Les couvertures alaires et les rémiges primaires sont gris-foncé
<b>Croupion - sus-caudales</b>	Le croupion est rouge brillant. Les sus-caudales sont d'une couleur gris foncé.
<b>Queue -sous-caudales</b>	La queue est gris foncé. Les sous-caudales gris-clair
<b>Yeux</b>	Gris foncé
<b>Bec</b>	Mandibule supérieure : couleur corne Mandibule inférieure : couleur chair
<b>Pattes</b>	Couleur corne
<b>Ongles</b>	Couleur corne
<b>Remarques</b>	Chez la femelle, il manque la couleur rouge et elle est plus striée que le mâle

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## PHAEO : COULEUR ET DESSINS

Front - tête - occiput - cou	Le front est rouge. Le vertex et l'occiput sont bruns avec un reflet brun rouge. A partir du front partent les sourcils d'une couleur rouge qui se terminent dans la nuque
Joues	Les lores et les joues sont bruns
Menton - gorge	Rouge
Poitrine	Rouge avec un reflet brunâtre, la préférence sera donnée à un oiseau qui a une poitrine d'une couleur rouge uniforme.
Ventre – dessous du corps et flancs	Crème garni des stries brun clair
Dos -couvertures alaires - rémiges primaires	Le dos est brun léger avec un liséré crème. Les couvertures alaires et les rémiges primaires sont brun oxydé avec un liséré crème. Des bordures des rémiges blanches ou trop décolorées sont fautives.
Croupion - sus-caudales	Le croupion est rouge. Les sus-caudales sont d'une couleur brune.
Queue - sous-caudales	La queue est crème en son centre et bordée de brun oxydé Les sous-caudales, la culotte et les cuisses sont d'une couleur crème et sont garnies de stries brunes
Yeux	rouge
Bec	Mandibule : supérieure : couleur chair- inférieure : couleur chair.
Pattes	Couleur chair
Ongles	Couleur chair
Remarques	Chez la femelle, il manque la couleur rouge et elle est plus striée que le mâle

## OPALE : COULEUR ET DESSINS

Front - tête - occiput - cou	Le front est rouge. Le vertex et l'occiput sont gris clair. A partir du front partent les sourcils d'une couleur rouge qui se terminent dans la nuque.
Joues	Les lores et les joues sont gris clair
Menton - gorge	Rouge
Poitrine	Rouge
Ventre – dessous du corps et flancs	gris très clair avec des stries gris
Dos -couvertures alaires -rémiges primaires	Le dos est gris clair strié de gris. Les couvertures alaires et les rémiges primaires sont gris <a href="#">Dans les meilleurs sujets on notera l'effet tendhal (reflet gris bleu).</a>
Croupion - sus-caudales	Le croupion est rouge. Les sus-caudales sont d'une couleur gris.
Queue -sous-caudales	La queue est gris. Les sous-caudales gris très clair.
Yeux	noir
Bec	Mandibule supérieure : couleur gris foncé Mandibule inférieure : couleur gris
Pattes	Couleur gris foncé
Ongles	Gris foncé
Remarques	Chez la femelle, il manque la couleur rouge et elle est plus striée que le mâle

Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.



# STANDARD O.M.J.



## CARPODAQUE DU MEXIQUE

*(Carpodacus mexicanus)*



Elaboration : Piacenza 15/16 mai 2015

Experts OMJ : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse.