

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE  
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

*PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION*

Офіційне видання  
Official publication

Бюлетень  
Bulletin

12  
2023



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE  
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

# ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

*PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION*

*Бюлетень*  
*Ідентифікатор медіа*  
*R30-01983*

*Видається*  
*12 разів на рік*

*Заснований*  
*24 січня 2003 р.*

*Випуск 12, 2023*

**Головний редактор**  
Віштак І. А.

**Editor-in-chief**  
I. Vishtak

**Редакційна колегія**  
Мельник С. І.  
*(заступник головного редактора)*  
Павлюк Н. В.  
*(відповідальний секретар)*

**Editorial board**  
S. Melnyk  
*(deputyies editor-in-chief)*  
N. Pavlyuk  
*(executive secretary)*



Український інститут  
експертизи сортів рослин  
UKRAINIAN INSTITUTE FOR  
PLANT VARIETY EXAMINATION

Каражбей Г. М.  
Тиха Н. В.  
Голіченко Н. Б.  
Гринів С. М.  
Сиплива Н. О.  
Стариченко Є. М.  
Хоменко Т. М.

H. Karazhbei  
N. Tykha  
N. Holichenko  
S. Gryniv  
N. Syplyva  
Y. Starychenko  
T. Khomenko

# 12 2023

м. Вінниця  
ТОВ «ТВОРИ»  
2023

УДК 347.77:633(055)

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. Вип. 12. 518 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

**Адреса видавця:**

Український інститут експертизи сортів рослин,  
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,  
тел.: +38 044 290-40-45,  
e-mail: [sops@sops.gov.ua](mailto:sops@sops.gov.ua), [sops@i.ua](mailto:sops@i.ua)  
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

## ЗМІСТ

<b>Офіційні відомості</b>	6
Нормативно-правові документи	6
<b>Відомості, внесені до Реєстру заявок</b>	7
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	7
Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними	13
Інші відомості, внесені до Реєстру заявок	14
<b>Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин</b>	17
<b>Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин</b>	18
<b>Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин</b>	22
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	22
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	31
Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин	37
Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	40
<b>Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні</b>	41
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	41
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	52
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	58
Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту	59
Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту	65
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	66
<b>Відомості про відмову у державній реєстрації сорту та/або у державній реєстрації прав на сорт</b>	71
Відомості про відмову у державній реєстрації сорту	71
Відомості про відмову у державній реєстрації прав на сорт	72
<b>Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні</b>	73
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	73
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	86
<b>Сільськогосподарські:</b>	
<b>злаки</b>	86
<i>Кукурудза звичайна</i>	87
4111Ц	87
A8810	88
A9011	90
Алатус	92
Альт	93
Арго	95
АС 240	96
АФК Гроуз	98
АФК Фреш	99
БАДІАН	101
БУРБОН	102
Візібл	103
Гарт	105
Гермес	107
Голд 220	109
Голд 300	110
ГРОВІКС	111
ДКС3117	113
ДКС3527	114
ДКС4010	115
ДКС4125	116
ДКС4320	117
ДКС4726	118
ДКС4728	120
ДМС Таллер	121
ДМС Таргет	123
ДМС Траян	125
ДМС Тріод	127
ДН Летава	129
ДН Сінтоле	131
ДН Фонд	133
ДОНЕРІККС	135
ЕВ3077	137
ЕВ3738	139
ЕВ4665	141
Ерекорн	143
Ерест	145
ЕС СУБМАРИНА	147
ЕС ТРЕВЕЛЕР	149
ЕС Філдголд	151
ЕС320103	153
ЕС320208	155
ЕЮ4139	157
ІНІЦІАТОР	159
ІНТЕРАКТИС	160
ІНФЛЮЕНЦ	162
КВС АКАДО	164
Клеонс	166
КМ 2020	168
КМ 2165	170
КМ 2170	172
КМ 3131	174
КМ 3182	176
КМ 3490	178
КМ 5710	179
КМ 5960	181
Коін	183
ЛГ31271	184
ЛІД3130Ц	185
ЛІД3306Ц	187
МАЙОРК	189
МАС 282К	190
МАС 333Т	192
Мелодія	194
МІДНАЙТ	196
Мірісса	197
Орман	198
Паттерн	199
ПОПУЛЯРІО	201

Рекольт	202	ЕГІД3959	271	СДМ74	331
РЖТ Аксіональ	204	Ерая С	272	СМ 224	332
РЖТ Велюкксо	205	Ерена С	273	СМ 305	333
РЖТ Волкоккс	206	ЗМ446	274	СМ 306	334
РЖТ ЕЛЕККС	207	КВ ЗБ3048	275	СМ 307	335
РЖТ ЗАНЕТИККС ДУО	208	КМ 234	276	СМ 360	336
РЖТ ПРОДУККСІОН	209	КП 05	277	СМ 360 СМ 224	337
Рубікон	210	Крос202С	278	СМ 395 СМ 303	338
СИ АМФОРА	212	Крос269С	279	СМ 425	339
СИ ДІПЛОМАТ	214	Крос350С	280	СМ 636	340
СИ ЕЛЕНОР	216	КЮІА320В І00374	281	СМ 637	341
СИ ТОПАЗ	218	КЮЛБ34ІВ ПДА01ВІ	282	СМ 658	342
СИ ФАБІО	220	КЮЛЦ99ФФ	283	СМ 667	343
СИНОПСИС	222	ЛПФ3933	284	СМ395 СМ440	344
СІКСТІНА	223	ЛПХ3915	285	СМК 201	345
СМ Вавел	224	ЛРБ6379	286	СМС6466	346
СПЕКТРАЛ	225	ЛЮН2444	287	Союз М	347
Такт	227	М22303	288	ССС6475	348
Фармюллер	229	М38403	289	Ф25683	349
ХОНОРІН	231	М58723	290	ФСАКС3928	350
Хунта	232	М84583	291	ФСІД3818	351
ЦИТАДЕЛЬ	234	М85823	292	ЦІД2455	352
<b>Кукурудза звичайна –</b>		М98103	293	ЦІД2457 ЦІД2455	353
<b>батьківський компонент</b>	235	МКВ01	294		
А18643	235	МС255	295	<b>Сільськогосподарські:</b>	
АБ 25	236	МС306	296	<b>бобові</b>	354
АК335	237	МС744301	297	<b>Квасоля звичайна</b>	
АМ 15	238	НА 231ВС	298	<b>(зернова)</b>	355
АРА2528	239	НА 380ВМ	299	Садгорянка	355
АТ1635	240	НКЗ 1206	300	<b>Соя культурна</b>	356
АФК 0121	241	ПВК 1408	301	АФК Спрін	356
АФК 0221	242	ПК 1838	302	АФК Темпо	357
АФК 0321	243	ПК 1931	303	АФК Фест	358
БАА1197	244	ПРЦ12ФФ	304	Господиня	359
БВМ 01	245	Р07096 СМС	305	ДМ АМБАР	360
БВМ 465	246	Р08053 Р08068	306	ДМ ЕАСТІНА	361
БКс14Н037	247	Р10001 ЦМС	307	КСЖ 19005	362
БКс19С023	248	Р10034	308	Мая	363
В 1485 зс	249	Р11002	309	ПР2202	364
В 736 зс	250	Р14010 Р15076	310	ПР2203	365
В 7471 СВ	251	Р18009	311	ПР2204	366
В 753 зс	252	Р18021	312	Сахара	367
В 772 зс	253	Р19013	313	Сахара	368
В 772 с	254	Р19017	314	СВХ20Т00С4	369
В 781 СВ	255	Р20009	315	СТЕПА	370
В34363	256	Р21020	316	ФАНТІНЕ	371
В42703	257	Р21021	317	ФЙОРЕЛЛА	372
В46643	258	Р21028	318	ФРІНЕ	373
В89543	259	Р21029	319		
В93653	260	РЛ2275 МВ	320	<b>Сільськогосподарські:</b>	
ГЕІКС1770	261	РЛ272 СВ	321	<b>круп'яні</b>	374
ДА 48	262	РФЦ61ББ	322	<b>Сорго звичайне</b>	
ДЖ08563	263	С17 СВ	323	<b>(двокольорове)</b>	375
ДЖ13753	264	С274 СВ	324	АДВ Ф7103	375
ДК2239МВ	265	С3025 МВ	325	АДВ Ф8322	376
ДК2329 ЗСЗМ	266	СА1311 СВзМ	326	АДВГ 1329	377
ДК2525СВЗМ	267	СГ1035	327	АДВГ 2168 ІГ	378
ДК2663С	268	СГ1135 Мст	328	ДЖАМІ	379
ДК3643СВЗМ	269	СГ292 Сст	329	ЕС МОНСУН	380
Дружба С	270	СГ776 Мст	330	У55045	381

<b>Сільськогосподарські:</b>	АТ1720	439	<b>Сільськогосподарські:</b>	
<b>олійні та прядивні</b>	382 ДК 22 А	440	<b>кормові</b>	484
<b>Гірчиця біла</b>	383 ДК 22 Б	441	<b>Костриця овеча</b>	485
САЛЬФА	383 НР 0031В	442	Блискавка	485
<b>Гірчиця чорна</b>	384 НР 0041В	443	<b>Люцерна мінлива</b>	486
МЕДІВА	384 НР 0111В	444	Індіго	486
<b>Коноплі посівні</b>	385 Р143Е2МЖО	445	Струмочок	487
Орловські	385 Р16ЕІ3М	446	Янтарна	488
<b>Льон звичайний (ярий)</b>	386 Р16ПС1МЖК	447	<b>Сорго суданське</b>	489
Юстесс	386 Р4НП8М2Ж	448	Альтура	489
<b>Ріпак (озимий) –</b>	Р4НХ1МІ	449	<b>Фацелія пижмолиста</b>	490
<b>батьківський компонент</b>	387 Р5ПЕ4МЖ	450	ФОЛІС	490
РМОС9945Р	387 Р5ПЕ4МК	451		
<b>Соняшник однорічний</b>	388 РТ5919	452	<b>Сільськогосподарські:</b>	
1003Л	388 РТ6920	453	<b>овочеві</b>	491
Базальт	389 РТ7120	454	<b>Квасоля звичайна</b>	
Джерсі	390 РТ7220	455	<b>(овочева)</b>	492
КС 410 імі	392 РТ7521	456	Бергголд	492
КС 4100 імі	393 РХ569СУЛ	457	Топкроп	493
КС 4213 алс	395 РХ789СУЛ	458	<b>Кукурудза цукрова</b>	494
КС 5210	396 СС 2019	459	ФАЕСТАР	494
Людмила	398 СТ 1922	460	<b>Огірок посівний</b>	495
М94С35	400 СФ2615МЖІА	461	Герміна	495
Мілос КЛП	402 ТРІ5567Р	462	ФРОСТ	496
НА Акрас	403 ТРО5033Р	463	Хелен	497
НА Актар	405 ТРС5263Р	464	<b>Пастернак</b>	498
НА Альтаір	407 ТРС5270Р	465	Камо	498
НА Кайрос	409 ТРХ5190Р	466	<b>Перець однорічний</b>	499
НА Тасумо	411 Ф10Б32М20А	467	Ред Феррарі	499
НА Тесан	413 Ф5ДН3М2А	468	<b>Редька олійна</b>	500
НА Юміс	415 ФР84259	469	САТІС	500
Нобіліс КЛП	417 ХП3222ПР	470	<b>Цибуля шалот</b>	501
Овелл	418		Шелія	501
П64ГП630	419		<b>Шпинат городній</b>	502
П64ЛЛ173	420	<b>Сільськогосподарські:</b>	Матадор	502
П64ЛЛ264	421	<b>буряк</b>		
П64ЛП169	422	<b>Буряк цукровий</b>	471	
П64ЛП655	422	БТС 1920	472	
Са Лана	423	БТС 2645	472	<b>Плодові та ягідні</b>
Ф2687 ЦЛ	424	БТС 4685 Н	473	<b>Абрикос звичайний</b>
Ф4413ВО	426	БТС СМАРТ 9685	474	Голдріч
ХАЙСАН 151	428	МАРУН	475	<b>Груша звичайна</b>
Хорив	430	Огест	476	СХ 201
Яскравий	432	ТОТЕМ	477	<b>Калина звичайна</b>
	434	ФД Крампон	478	Гармонія
<b>Соняшник однорічний –</b>		ФД Стартер Смарт	479	<b>Обліпиха крушиновидна</b>
<b>батьківський компонент</b>	436	ФД22Б5006	480	Абориген
19303	436	ФД23Б5063	481	Оляна
33566	437	Фредерік	482	<b>Черешня</b>
АТ1119	438		483	Джаєнт Ред
				510
<b>Інші відомості</b>				511
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин				511
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту				512
Загальноживані скорочення термінів				516

# Офіційні відомості

## Official notifications

### Нормативно-правові документи

#### Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2092 від 01.12.2023 «Про внесення змін до Методик визначення відповідності сортів критеріям відмінності, однорідності та стабільності» внесено зміни до:

1) Методики визначення відповідності сортів капусти листової португальської (*Brassica oleracea* L. var. *costata* DC), капусти листової мозкової (*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell.), капусти листової кучеряволистої (*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *sabellica* L.), капусти листової зеленолистої (*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *viridis* L.), капусти листової пальмолистої (*Brassica oleracea* L. var. *palmifolia* DC.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 січня 2023 року № 42, доповнивши пункт 6 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«Експертиза на додатковому пункті дослідження здійснюється за клопотанням заявника для врахування результатів досліджень на випадок форсмажорних обставин на основному пункті дослідження.»

У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим.

2) Методики визначення відповідності сортів капусти японської (*Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt), капусти китайської × капусти японської (hybrids between *Brassica rapa* L. Emed. Metzg. ssp. *chinensis* (L.) Hanelt and *Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt), капусти японської × капусти широконосої (hybrids between *Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt and *Brassica rapa* L. subsp. *narinosa* (L. H. Bailey) Hanelt), капусти японської × ріпи (hybrids between *Brassica rapa* L. subsp. *nipposinica* (L. H. Bailey) Hanelt and *Brassica rapa* L. subsp. *rapa*) критеріям відмінності, однорідності та стабільності, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 лютого 2023 року № 133, доповнивши пункт 6 після абзацу другого новим такого змісту:

«Експертиза на додатковому пункті дослідження здійснюється за клопотанням заявника для врахування результатів досліджень на випадок форсмажорних обставин на основному пункті дослідження.»

У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим.

3) Методики визначення відповідності сортів кипця великоквіткового (*Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult.) і кипця сизого (*Koeleria glauca* (Spreng.) DC.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2023 року № 190, доповнивши пункт 6 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«Експертиза на додатковому пункті дослідження здійснюється за клопотанням заявника для врахування результатів досліджень на випадок форсмажорних обставин на основному пункті дослідження.»

У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим.

4) Методики визначення відповідності сортів роду сорго (*Sorghum* Moench) критеріям відмінності, однорідності та стабільності, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 березня 2023 року № 422, доповнивши пункт 6 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

«Експертиза на додатковому пункті дослідження здійснюється за клопотанням заявника для врахування результатів досліджень на випадок форсмажорних обставин на основному пункті дослідження.»

У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2170 від 14.12.2023 «Про затвердження Річного плану діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин на 2024 рік» затверджено Річний план діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин на 2024 рік.

## Відомості, внесені до Реєстру заявок Notification listed in the Register of applications

**Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд**  
Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
<b>Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn</b>					
23009055	18.08.2023	1092B840 01 1092B840 01	1688	ПС PBR	
23009065	20.11.2023	PX21037 RH21037	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009066	20.11.2023	PX23020 RH23020	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009067	20.11.2023	PX22024 RH22024	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009068	20.11.2023	PX22036 RH22036	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009070	20.11.2023	PX22026 RH22026	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009071	20.11.2023	PX22035 RH22035	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009072	20.11.2023	PX22002 RH22002	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009073	20.11.2023	PX22041 RH22041	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23009074	01.12.2023	Оптікс Optiks	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Тарас Віталійович
23009081	04.12.2023	ЕШЛІ ASHLEY	793	ПС, АС PBR, AC	Roelf Suk
23009084	04.12.2023	ДКС3937 DKC3937	844	РС NLI	
23009082	05.12.2023	ЕШЛІ ASHLEY	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009083	05.12.2023	КЛУНІ CLOONEY	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009085	05.12.2023	БЛЕНДІН BLANDEEN	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009090	05.12.2023	КЛУНІ CLOONEY	793	ПС, АС PBR, AC	Morgan Renault
23009091	05.12.2023	БЛЕНДІН BLANDEEN	793	ПС, АС PBR, AC	Morgan Renault
23009097	05.12.2023	ЛГ31224 LG31224	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009099	05.12.2023	ЛГ31228 LG31228	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009100	05.12.2023	РОЗАЛІН ROSALEEN	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009101	05.12.2023	ЛГ31331 LG31331	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009103	05.12.2023	ЛГ31217 LG31217	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009104	05.12.2023	ЛГ31230 LG31230	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009106	05.12.2023	ЛГ31276 LG31276	793	РС, АС NLI, AC	Luc Morvillier
23009107	05.12.2023	ЛГ31238 LG31238	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009108	05.12.2023	ЕГЛАНТІН EGLANTEEN	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009109	05.12.2023	ЛГ30258 LG30258	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009110	05.12.2023	ЛГ31207 LG31207	793	РС, АС NLI, AC	Roelf Suk
23009113	05.12.2023	РОЗАЛІН ROSALEEN	793	ПС, АС PBR, AC	Morgan Renault



## Відомості, внесені до Реєстру заявок

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
23009114	05.12.2023	ЛЗМ273/20 (селекційний код) LZM273/20 (selection code)	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Luc Morvillier
23009117	05.12.2023	ЕГЛАНТИН EGLANTEEN	793	ПС, АС PBR, AC	Morgan Renault
23009118	05.12.2023	ЛГЗ1331 LG31331	793	ПС, АС PBR, AC	Morgan Renault
23009098	06.12.2023	ЛГЗ1245 LG31245	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009102	06.12.2023	ЛГЗ1280 LG31280	793	РС, АС NLI, AC	Morgan Renault
23009111	06.12.2023	КВС КАСПЕРО KWS KASPERO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipter
23009112	06.12.2023	ДЖЕМЕСОН JAMESON	2449	РС, АС NLI, AC	Manos Remountakis
23009126	06.12.2023	ГЕРКУЛІО HERCULIO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipter
23009128	06.12.2023	КВС ПРОФУЗІО KWS PROFUSIO	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipter
23009130	06.12.2023	КХСЗ317 KXS317	2649	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Rainer Leipter
23009131	14.12.2023	ЕС КАЛДЕРОН ES CALDERON	2890	РС, АС NLI, AC	Laurent BETTINGER
23009135	25.12.2023	Фармерфі Farmurphy	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
23009136	25.12.2023	Фарморіц Farmoritz	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
23009137	25.12.2023	Файт Fight	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
23009138	25.12.2023	Фармодена Farmodena	2569	РС, АС NLI, AC	Ludwig Feldmeier
<b>Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)</b>					
23012043	10.11.2023	Вижниця Vyzhnytsia	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Володимир Васильович Якимчук Руслан Андрійович
23012044	13.11.2023	Форсаж Forsazh	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рибалка Олександр Ілліч Моргун Володимир Васильович Якимчук Руслан Андрійович
23012045	13.11.2023	Нептун Neptun	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Володимир Васильович Якимчук Руслан Андрійович Рибалка Олександр Ілліч
23012046	13.11.2023	Степова долина Stepova dolyna	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Богдан Володимирович Рибалка Олександр Ілліч Моргун Володимир Васильович Моргун Богдан Володимирович Скрипльов Володимир Олександрович
23012047	13.11.2023	Лютиця Lyutytsya	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Скрипльов Володимир Олександрович Рибалка Олександр Ілліч Коновалов Давид Віталійович Моргун Володимир Васильович
23012048	13.11.2023	Астартанова Astarta nova	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Володимир Васильович Коновалов Давид Віталійович Моргун Володимир Васильович Скрипльов Володимир Олександрович
23012049	13.11.2023	Пласт Plast	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Володимир Васильович Якимчук Руслан Андрійович
23012050	13.11.2023	Хлібодарка Khibodarka	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Богдан Володимирович Рибалка Олександр Ілліч Моргун Володимир Васильович Сандецька Надія Василівна
23012051	13.11.2023	Вектор Vektor	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Якимчук Руслан Андрійович Моргун Володимир Васильович Моргун Богдан Володимирович Рибалка Олександр Ілліч
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum</b>					
23018004	20.11.2023	РХС2221 RHS2221	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Joel Alcouffe
23018005	20.11.2023	РХС2223 RHS2223	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Joel Alcouffe

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>					
23020003	11.10.2023	Подільський-50 Podilskyi-50	1669	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Корнійчук Олександр Васильович Смолій Світлана Іванівна Нежбірська Людмила Іванівна Маренюк Олександр Борисович Дорошук Василь Олексійович
23020006	21.11.2023	Володьководівичський Volodkovodivyskyi	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буняк Наталія Михайлівна Расюк Наталія Іванівна Сизенко Олена Євгенівна Буняк Наталія Миколаївна Дворська Світлана Володимирівна Сардак Микола Олексійович
23020007	28.11.2023	Обрій Носівщини Obrii Nosivshchyny	1990	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Буняк Наталія Миколаївна Сардак Марія Іванівна Сардак Микола Олексійович Солонечна Ольга Володимирівна Буняк Наталія Михайлівна Наумов Олексій Германович Козаченко Михайло Романович
<b>Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)</b>					
23022005	10.11.2023	Фенікс Feniks	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рибалка Олександр Ілліч Моргун Володимир Васильович Якимчук Руслан Андрійович
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>					
23039038	23.10.2023	МЕДЖІК КЛП MAGIC CLP	2720	РС, АС NLI, AC	PETIARD Benoit
23039042	14.11.2023	Стеларіс КЛП Stelaris CLP	2537	РС NLI	Petran Alexandru-Viorel
23039043	16.11.2023	7036D091 01 7036D091 01	2715	РС NLI	Anke Gehinger
23039044	16.11.2023	7042D060 14 7042D060 14	2715	РС NLI	Nathalie Bourbon
23039045	16.11.2023	7042D071 31 7042D071 31	2715	РС NLI	Adriana Cristina Dobre
23039047	16.11.2023	7036D092 11 7036D092 11	2715	РС NLI	Anke Gehinger
23039049	16.11.2023	7042D068 31 7042D068 31	2715	РС NLI	
23039048	20.11.2023	7042D093 11 7042D093 11	2715	РС NLI	Anke Gehinger
23039050	22.11.2023	ЛІД5038Х LID5038H	2890	ПС, АС PBR, AC	Jean Pierre Dufourcq
23039052	23.11.2023	РА1034439 RA1034439	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
23039053	23.11.2023	РА1041132 RA1041132	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
23039054	23.11.2023	РА1043910 RA1043910	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
23039055	23.11.2023	РА1040895 RA1040895	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
23039056	23.11.2023	Холіб КЛП Holib CLR	1783	ПС PBR	Liliia Polovynko
23039057	24.11.2023	1046Х СУ 1046H SU	2890	ПС, АС PBR, AC	Jean Pierre Dufourcq
23039058	24.11.2023	1046Х СУ 1046H SU	2890	РС, АС NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
23039062	07.12.2023	ЛДХ22125 LDH22125	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
23039063	07.12.2023	ЛДХ23002 LDH23002	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
23039064	07.12.2023	ЛДХ22011 LDH22011	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Jean Pierre Dufourcq
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean</b>					
23045019	20.11.2023	С17278 S17278	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amandine Gras
23045021	20.11.2023	С17332 S17332	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Amandine Gras

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
<b>Буряк цукровий</b> <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell <b>Sugar Beet</b>					
23069009	15.12.2023	СМАРТ ПЕРЛА КВС SMART PERLA KWS	2649	PC, AC NLI, AC	Dietrich Hauer Ann-Katrin Muennekhoff
<b>Капуста кольрабі</b> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i> L. <b>Kohlrabi</b>					
23098001	07.12.2023	Констанс Konstance	751	PC, AC NLI, AC	John Pieter Schipper
<b>Морква</b> <i>Daucus carota</i> L. <b>Carrot</b>					
23109003	28.11.2023	МАЛІССІО MALISSIO	2813	PC NLI	
23109004	28.11.2023	ВАК 70 VAC 70	2813	PC NLI	
23109005	07.12.2023	Каталіна Catalina	751	PC, AC NLI, AC	John Pieter Schipper
<b>Огірок посівний</b> <i>Cucumis sativus</i> L. <b>Cucumber</b>					
23110012	04.12.2023	Хрусткий Khrustkyy	3236	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
<b>Редька посівна (редиска)</b> <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. <b>Radish, Garden Radish, European Radish</b>					
23118003	01.12.2023	Ніжна Nizhna	3236	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
<b>Кріп пахучий</b> <i>Anethum graveolens</i> L. <b>Dill</b>					
23125002	01.12.2023	Зелена Долина Zelena Dolina	3236	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
<b>Кабачок</b> <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov <b>Vegetable Marrow, Squash</b>					
23148004	01.12.2023	Італійський лебідь Italiiskyi lebid	3236	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Вовк Жанна Миколаївна
<b>Конюшина лучна (червона)</b> <i>Trifolium pratense</i> L. <b>Red Clover</b>					
23155002	20.11.2023	Фараон Носівський Faraon Nosivskyi	1990	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Веденко Наталія Володимирівна Буняк Наталія Миколаївна Боженко Анатолій Іванович Сизенко Олена Євгенівна
<b>Фацилія пижмолиста</b> <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. <b>Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell</b>					
23161001	08.12.2023	ФОЛІС FOLIS	3227	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Скрипка Олександр Миколайович Починок Віталій Михайлович Іванська Аліна Олександрівна Маменко Павло Миколайович Колодяжний Олександр Юрійович
<b>Буряк кормовий</b> <i>Beta vulgaris</i> L. <b>Fodder Beet</b>					
23166001	08.12.2023	ГУСТЕЯ КВС GUSTEA KWS	2649	PC, AC NLI, AC	Armin Klinke Gregory Lavric
23166002	08.12.2023	СУММО SUMMO	2649	PC, AC NLI, AC	Gregory Lavric Armin Klinke
23166003	08.12.2023	ЛАКТИМО LACTIMO	2649	PC, AC NLI, AC	Gregory Lavric Armin Klinke
23166004	08.12.2023	ДЖЕРОНИМО GERONIMO	2649	PC, AC NLI, AC	Armin Klinke Gregory Lavric
23166005	08.12.2023	БЕТИМО BETIMO	2649	PC, AC NLI, AC	Armin Klinke Gregory Lavric
<b>Пирій середній</b> <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski <b>Wheat-grass Intermediate</b>					
23188001	15.11.2023	Ара Ara	1669	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Бугайов Василь Дмитрович Бугайов Віктор Васильович Бортновський Віталій Миколайович
<b>Люцерна посівна</b> <i>Medicago sativa</i> L. <b>Lucerne</b>					
23196003	18.10.2023	Іда Ida	2838	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Dr. Fazekas Miklos
<b>Редька олійна</b> <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. <b>Fodder Radish</b>					
23218001	08.12.2023	САТІС SATIS	3227	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Починок Віталій Михайлович Маменко Павло Миколайович Скрипка Олександр Миколайович Іванська Аліна Олександрівна Колодяжний Олександр Юрійович

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
<b>Гірчиця чорна <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch</b> <b>Black Mustard</b>					
23219001	08.12.2023	МЕДІВА MEDIVA	3227	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Маменко Павло Миколайович Колодяжний Олександр Юрійович Іванська Аліна Олександрівна Скрипка Олександр Миколайович Починок Віталій Михайлович
<b>Горіх грецький <i>Juglans regia</i> L.</b> <b>Walnut</b>					
23284002	06.12.2023	Парамонівський Paramonivskiyi	3237	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Парамонов Денис Юсупович
<b>Малина <i>Rubus idaeus</i> L.</b> <b>Raspberry</b>					
23296008	17.11.2023	ЕРОС EROS	2816	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ioriatti Diego
<b>Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L.</b> <b>White Mustard</b>					
23380002	08.12.2023	САЛЬФА SALFA	3227	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Колодяжний Олександр Юрійович Починок Віталій Михайлович Маменко Павло Миколайович Скрипка Олександр Миколайович Іванська Аліна Олександрівна
<b>Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L.</b> <b>Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat</b>					
23539001	13.11.2023	Аматорка Amatorka	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Володимир Васильович Радченко Олексій Миколайович Моргун Богдан Володимирович Рибалка Олександр Ілліч
23539002	13.11.2023	Добра новина Dobra novyna	355	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Моргун Володимир Васильович Радченко Олексій Миколайович Моргун Богдан Володимирович Рибалка Олександр Ілліч
<b>Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam.</b> <b>Roman Lettuce, Cos Lettuce</b>					
23546002	13.11.2023	Одона Odon	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Johannes Schut
<b>Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L.</b> <b>Pea (Winter)</b>					
23559004	07.11.2023	Фенікс Feniks	1591	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Рабічук Анатолій Васильович Січкач Вячеслав Іванович Соломонов Руслан Вячеславович Коблай Світлана Володимирівна
<b>Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L.</b> <b>Blueberry; High Bush Blueberry</b>					
23666011	16.11.2023	Дюк Duke	3234	РС NLI	
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L.</b> <b>Maize, Corn – parental component</b>					
23909063	21.08.2023	1ПН3К23 1PNZQ23	1690	ПС PBR	Leah Stirling
23909083	06.11.2023	ПХ4С81 PH4C81	1688	ПС PBR	
23909084	20.11.2023	P19009ЦМС R19009CMS	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23909085	20.11.2023	P22023 R22023	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23909086	20.11.2023	P22019 R22019	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23909087	20.11.2023	P20021 R20021	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23909088	20.11.2023	P19009 R19009	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23909089	20.11.2023	P21022 R21022	1783	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Stephane Melkior
23909090	01.12.2023	V 53 V 53	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Тарас Віталійович
23909091	01.12.2023	V 567 V 567	2742	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Мельник Тарас Віталійович
23909092	01.12.2023	КЮВІ504 ПДА01ВІ QVI504 PDA01VI	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Morgan Renault
23909093	01.12.2023	КЮВА670 РВІ589 QVA670 RVI589	793	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Roelf SUK

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
23009105	05.12.2023	PBI589 RVI589	793	PC, AC NLI, AC	Louis Vlaswinkel
23909107	05.12.2023	КЮІБ55ФФ QIB55FF	793	PC, AC NLI, AC	Laurie GARD
23909108	05.12.2023	КЮІБ58ФФ QIB58FF	793	PC, AC NLI, AC	Laurie GARD
23909109	05.12.2023	КЮІБ54ФФ QIB54FF	793	PC, AC NLI, AC	Laurie GARD
23909110	05.12.2023	ЛОВ612 LOV612	793	PC, AC NLI, AC	Alain Lacombe
23909111	05.12.2023	КЮІБ58ФФ QIB58FF	793	PC, AC PBR, AC	Laurie GARD
23909115	05.12.2023	РФЕ84ВА RFE84VA	793	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Caroline DELLUC
23909116	05.12.2023	ЛОВ612 LOV612	793	PC PBR	Alain Lacombe
23909117	05.12.2023	PBI590 PBI589 RVI590 RVI589	793	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Roland Debeuf
23909131	14.12.2023	ЕС7711 ES7711	2890	PC, AC NLI, AC	Laurent BETTINGER
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus L.</i> Sunflower – parental component</b>					
23939039	21.08.2023	7ПЦРТ80Р 7PCRT80R	1688	PC PBR	Ion Sandu
23939044	06.11.2023	ЄС-312 YeS-312	2287	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович Шацман Дмитро Олександрович
23939045	06.11.2023	ЄС-212 YeS-212	2287	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович
23939046	06.11.2023	ЄС-311 YeS-311	2287	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович
23939047	06.11.2023	ЄС-521 YeS-521	2287	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Шацман Дмитро Олександрович Бушулян Олег Володимирович
23939049	06.11.2023	ЄС-122 YeS-122	2287	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Бушулян Олег Володимирович Шацман Дмитро Олександрович
23939050	22.11.2023	70004Pсуол 70004Rsuol	2890	PC, AC PBR, AC	Jean Pierre Dufourcq
23939053	23.11.2023	АТ3717 AT3717	1783	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Liliia Polovynko
<b>Ріпак (ярий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i> Spring Rape Seed – parental component</b>					
23941001	16.11.2023	ВНР 465 VNR 465	736	PC, PC, AC PBR, NLI, AC	Сидоров Андрій Валерійович Парій Ярослав Федорович Парій Мирослав Федорович

## Відкликані заявки або такі, що вважаються відкликаними

### Withdrawn applications for plant varieties or those that considered as withdrawn

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відкликання Date of withdrawal
<b>Кукурудза звичайна</b> <b>Maize, Corn</b>					
22009053	20.11.2022	1098B443 01 1098B443 01	а: 2715 б:	РС NLI	11.12.2023
22009059	30.11.2022	1084B561 01 1084B561 01	а: 2715 б:	РС NLI	06.12.2023
22009060	30.11.2022	1084B563 01 1084B563 01	а: 2715 б:	РС NLI	06.12.2023
22009073	30.11.2022	1081B761 01 1081B761 01	а: 2715 б:	РС NLI	20.12.2023
22009074	30.11.2022	1083A168 01 1083A168 01	а: 2715 б:	РС NLI	06.12.2023
23009033	18.08.2023	1098B443 01 1098B443 01	а: 1688 б:	ПС PBR	18.12.2023
23009034	18.08.2023	1084B563 01 1084B563 01	а: 1688 б:	ПС PBR	04.12.2023
23009040	21.08.2023	1083A168 01 1083A168 01	а: 1688 б:	ПС PBR	06.12.2023
23009052	29.08.2023	1081B761 01 1081B761 01	а: 1688 б:	ПС PBR	20.12.2023
23009053	29.08.2023	1084B561 01 1084B561 01	а: 1688 б:	ПС PBR	06.12.2023
<b>Соняшник однорічний</b> <b>Sunflower</b>					
22039043	28.11.2022	ЛГ50503 КЛП LG50503 CLP	а: 793 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	01.12.2023
<b>Соя культурна</b> <b>Soya Bean</b>					
22045001	12.01.2022	Р05Т80 Р05Т80	а: 2715 б:	РС NLI	20.12.2023
22045002	12.01.2022	Р05Т80 Р05Т80	а: 1688 б:	ПС PBR	20.12.2023
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент</b> <b>Maize, Corn – parental component</b>					
23909074	18.08.2023	1ПВЕВ24 1PWEW24	а: 1690 б:	ПС PBR	20.12.2023
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент</b> <b>Sunflower – parental component</b>					
23939032	21.08.2023	7ПИБК03Р 7PYBK03R	а: 1688 б:	ПС PBR	20.12.2023

## Інші відомості, внесені до Реєстру заявок

### Other notifications listed in the Register of Plant Variety Applications

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/28709 від 07.12.2023 «Про погодження внесення змін» внесено зміни щодо найменування представника та адреси для листування в електронну базу даних «Zajvka New» та Реєстр сортів, змінивши слова, цифри та символи

«ТОВ «Коссад Восток», вул. Червоноармійська, 72 А, м. Київ, 03680» на слова, цифри та символи «ТОВ «Лідея Україна», вул. Смольна, 9, м. Київ, 03022» щодо сортів згідно з переліком:

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
1	Кукурудза звичайна	04004082	Сеїді
2	Кукурудза звичайна	06004026	Бюрлі
3	Кукурудза звичайна	11004173	Галвані КС
4	Кукурудза звичайна	11004174	Деволві КС
5	Кукурудза звичайна	11004175	Лапері КС
6	Кукурудза звичайна	14009043	Остербі КС
7	Кукурудза звичайна	14009044	Трілоджі ДУО
8	Кукурудза звичайна	14009045	Аркаді КС
9	Кукурудза звичайна	14009046	Трілоджі КС
10	Кукурудза звичайна	14009047	Катарі КС
11	Кукурудза звичайна	14009048	Коріолі КС
12	Кукурудза звичайна	14009049	Тессалі КС
13	Кукурудза звичайна	14009050	Пінкі КС
14	Кукурудза звичайна	14009051	Белуджі КС
15	Кукурудза звичайна	14009200	Монлері КС
16	Кукурудза звичайна	14009201	ПОРТАЙЛ
17	Кукурудза звичайна	14009202	Спайсі КС
18	Кукурудза звичайна	14009203	Кампоні КС
19	Кукурудза звичайна	14009204	Пажані КС
20	Кукурудза звичайна	15009068	Тоніфі КС
21	Кукурудза звичайна	15009069	Конфетті КС
22	Кукурудза звичайна	15009070	БЕЛАМІ
23	Кукурудза звичайна	15009071	Евжені КС
24	Кукурудза звичайна	15009072	Шамбері КС
25	Кукурудза звичайна	15009073	Малаві КС
26	Кукурудза звичайна	16009091	Кодеос
27	Кукурудза звичайна	16009092	Глоріфі КС
28	Кукурудза звичайна	16009093	Анові КС
29	Кукурудза звичайна	17009094	Аденора
30	Кукурудза звичайна	17009095	Поезі КС
31	Кукурудза звичайна	17009096	Палізі КС
32	Кукурудза звичайна	17009097	Кіянті КС
33	Кукурудза звичайна	17009098	Наомі КС
34	Кукурудза звичайна	17009099	Грітрі КС
35	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909062	446ЖА695
36	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909063	226УА988
37	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909064	227ЮБ148
38	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909065	249Д635Х 48А014
39	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909067	422М766СТР
40	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909068	422М766СТРХ497Ц058СТР
41	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909069	427Ф567
42	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909070	497Ц058СТР
43	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909071	447ЦБ602
44	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909072	48А014
45	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909073	111В070
46	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909074	112К564
47	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909075	117ЦБ343
48	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909216	338БЦ439
49	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909217	277ХБ434
50	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909218	117ІБ602
51	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909219	427ББ498
52	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909220	447ЦБ671
53	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909221	111Х863
54	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909222	111Б791Х 111Х863
55	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909223	447ЦБ671Х 447ЦБ602
56	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909224	482Р867
57	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909110	427ББ498Х 247ББ319
58	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909111	247ББ319

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
59	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909112	441ГХ034
60	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909113	158ЕЦ474
61	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909114	118МЦ248
62	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909127	427ББ498Х 249Д635
63	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909128	431АГ044
64	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909129	279ЖД896
65	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909145	227ВБ025
66	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909147	262БХ503
67	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909148	156ЛА337Х 14Б001
68	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909149	156ЛА337
69	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909150	441ХФ006
70	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909158	444СХ118
71	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909159	483ЮХ037
72	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909160	223ДХ002
73	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909161	443УК319
74	Люцерна посівна	12058001	Рахель
75	Люцерна посівна	12058002	Ексквіз
76	Люцерна посівна	17196006	ЧАПКА
77	Пшениця м'яка (озима)	06007046	СО 207
78	Пшениця м'яка (озима)	16012047	СОФІ КС
79	Пшениця м'яка (озима)	16012048	СОФРУ
80	Пшениця м'яка (озима)	16012049	СОРРІАЛ
81	Ріпак (озимий)	09016186	Слакi КС
82	Ріпак (озимий)	09016187	Коррел
83	Ріпак (озимий)	12016025	Мазарі КС
84	Ріпак (озимий)	15040032	Меморі КС
85	Ріпак (озимий)	15040033	Сіртакі КС
86	Ріпак (озимий)	17040049	Селебріті КС
87	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016042	А97ЕД370
88	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016044	А97УЕ365
89	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016045	Р04ВМ067
90	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016046	Р04ТС083
91	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016047	Р02ГТ003
92	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	15940008	Р07НП137
93	Соняшник однорічний	06017011	Коралія КС
94	Соняшник однорічний	07017085	Фушія КЛ
95	Соняшник однорічний	07017086	Дюрбан
96	Соняшник однорічний	07017087	Імерія КС
97	Соняшник однорічний	08017020	Кларіса КЛ
98	Соняшник однорічний	08017024	Соларні КС
99	Соняшник однорічний	09017272	Кларіка КЛ
100	Соняшник однорічний	10017081	Велком
101	Соняшник однорічний	10017085	Хіمالія КЛ
102	Соняшник однорічний	11017096	Шаркс
103	Соняшник однорічний	11017099	Марбелія КЛ
104	Соняшник однорічний	11017101	Генова КЛ
105	Соняшник однорічний	14039034	Тоскана КС
106	Соняшник однорічний	14039036	Крессідія КС
107	Соняшник однорічний	14039037	Європа КЛП
108	Соняшник однорічний	14039110	Патріція КЛ
109	Соняшник однорічний	15039069	Натюрела КС
110	Соняшник однорічний	15039070	Малага КС
111	Соняшник однорічний	16039079	Каледонія КЛ
112	Соняшник однорічний	17039100	Аламбра КС
113	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017021	12Ф04
114	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017025	ІР152ДМР
115	Соняшник однорічний – батьківський компонент	14939029	85П10Р
116	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939041	20М60i
117	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939095	70004іс
118	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939096	20М60ісол
119	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939097	68І10Р
120	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939066	56Ц20Р
121	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939067	63Г13іс
122	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939068	67К23Р
123	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939070	49Ц01А
124	Соя культурна	12018002	Банжо КС
125	Соя культурна	06018001	КСБ 938
126	Кукурудза звичайна	18009119	КС Луксурі



№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
127	Кукурудза звичайна	18009124	Балі КС
128	Кукурудза звичайна	18009115	КС Кавані
129	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909067	263ФК318
130	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909068	271ХФ315
131	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	18940008	А08ТЦ443
132	Соняшник однорічний	18039090	КС Канарія СУ
133	Соняшник однорічний	18039089	КС Клерія КЛ
134	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939091	20М60су
135	Кукурудза звичайна	19009181	КС Амалфі
136	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909177	444ФЛ695
137	Люцерна посівна	19196003	ІДІЛЛЬ
138	Пшениця м'яка (озима)	20012044	НОВІК
139	Пшениця м'яка (озима)	19012086	СОЛІНДО КС
140	Пшениця м'яка (озима)	20012045	Соліфлор КС
141	Пшениця м'яка (озима)	19012087	СОМТЮ030 КС
142	Соняшник однорічний	19039068	КС МАГЕНТА
143	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939113	61Ф32Р

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/28773 від 08.12.2023 «Про погодження внесення змін» до електронної бази даних «Zajvka New», Реєстру сортів та Реєстру патентів внесено зміни стосовно інформації щодо найменування представника та адреси для листування, а саме: слова, цифри та символи «Новікова Лідія Аркадіївна (адреса: пр. Голосіївський, 15-А, кв. 185, м. Київ, 03039, е-пошта: ylr.post@gmail.com)» змінено словами, цифрами та символами «Петошевіч Діна Анатоліївна (а/с 147, м. Київ, Україна, 01042, е-пошта: dina.petosevic@petosevic.com) щодо сортів троянди КОРкут0159 (заявка № 17339008) та КОРкут0389 (заявка № 20339003).

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/30193 від 22.12.2023 «Про погодження внесення змін» до електронної бази даних «Zajvka New» щодо сорту соняшника однорічного М94С35 (заявка № 22039001)

у розділі 5б Заяви про визнання прав на сорт змінено назву селекційного позначення (літери та цифри М94С35 змінено на літери та цифри М94S35).

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/30233 від 22.12.2023 «Про погодження внесення змін» до електронної бази даних «Zajvka New» щодо сорту кукурудзи звичайної МДМ3303 (заявка № 22009139) стосовно інформації щодо зазначення селекційного коду (літери та цифри МГМ529875 змінено на літери та цифри МДМ3303).

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/30702 від 28.12.2023 «Про погодження внесення змін» до електронної бази даних «Zajvka New» щодо сорту сорго звичайного (двокольорового) ЕУГ1741Ф (заявка № 17018008) внесено зміни до найменування заявника (слова «Євраліс Семанс» замінено словами «Лідеа Франсе САС»).

## Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

### Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>				
22009050	2715	28.12.2023	10015858 01	ІНДЕМ1316 INDEM1316
22009064	2715	28.12.2023	10865224 01	Р86010 P86010
22009066	2715	28.12.2023	10875013 01	Р8738 P8738
22009070	2715	28.12.2023	10825213 01	Р82848 P82848
22009087	2715	28.12.2023	10925839 01	Р9279 P9279
22009139	2720	22.12.2023	МЖМ529875	МДМ3303 MDM3303
22009154	1783	05.12.2023	РЖТ ПЕТЕККСТ	РЖТ ПРТЕККСТ RGT PRETEKXTE
23009005	2890	28.12.2023	ЕС321401	Гастінгс HASTINGS
23009031	1688	18.12.2023	10825213 01	Р82848 P82848
23009035	1688	18.12.2023	10925839 01	Р9279 P9279
23009042	1688	28.12.2023	10865224 01	Р86010 P86010
23009044	1688	28.12.2023	10975703 01	Р9759 P9759
23009046	1688	28.12.2023	10835183 01	Р83224 P83224
23009047	1688	28.12.2023	10875013 01	Р8738 P8738
23009048	1688	28.12.2023	10015858 01	ІНДНМ1316 INDEM1316
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>				
22039003	2257	05.12.2023	КС 313 алс	КС 4100 імі KS 4100 imi
22039033	2715	28.12.2023	70425005 01	Р64ЛЛ187 P64LL187
22039038	2715	28.12.2023	70365027 14	Р63ГЕ189 P63HE189
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean</b>				
22045014	2863	26.12.2023	ГДМ1026	ДМ АМБАР DM AMBAR
22045015	2863	26.12.2023	ГДМ1071	ФАНТІНЕ FANTINE
22045016	2863	26.12.2023	ГДМ2068	ФРІНЕ FRINE
22045017	2863	26.12.2023	ГДМ9013	ФІОРЕЛЛА FIORELLA
22045018	2863	26.12.2023	ГДМ1080	ДМ ЕАСТІНА DM EASTINA

## Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

### Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>			
17009013	2265	27.12.2023	Говард Hovard
17009014	2265	27.12.2023	Мелдон Meldon
17009015	2265	27.12.2023	Терви Tervy
23009062	1688	28.12.2023	АКАНТО AKANTO
23009070	1783	28.12.2023	PX22026 RH22026
23009082	793	08.12.2023	ЕШЛІ ASHLEY
23009083	793	08.12.2023	КЛУНІ CLOONEY
23009084	844	28.12.2023	ДКС3937 DKC3937
23009085	793	08.12.2023	БЛЕНДІН BLANDEEN
23009097	793	12.12.2023	ЛГ31224 LG31224
23009098	793	13.12.2023	ЛГ31245 LG31245
23009099	793	12.12.2023	ЛГ31228 LG31228
23009100	793	12.12.2023	РОЗАЛІН ROSALEEN
23009101	793	12.12.2023	ЛГ31331 LG31331
23009102	793	12.12.2023	ЛГ31280 LG31280
23009103	793	12.12.2023	ЛГ31217 LG31217
23009104	793	12.12.2023	ЛГ31230 LG31230
23009106	793	12.12.2023	ЛГ31276 LG31276
23009107	793	12.12.2023	ЛГ31238 LG31238
23009108	793	12.12.2023	ЕГЛАНТИН EGLANTEEN
23009109	793	12.12.2023	ЛГ30258 LG30258
23009110	793	13.12.2023	ЛГ31207 LG31207
23009112	2449	14.12.2023	ДЖЕМЕСОН JAMESON
23009131	2890	19.12.2023	ЕС КАЛДЕРОН ES CALDERON
23009135	2569	28.12.2023	Фармерфі Farmurphy
23009136	2569	28.12.2023	Фарморіц Farmoritz
23009137	2569	28.12.2023	Файт Fight
23009138	2569	28.12.2023	Фармодена Farmodena
<b>Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)</b>			
23012043	355	27.12.2023	Вижиця Vyzhnytsia
23012044	355	29.12.2023	Форсаж Forsazh
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>			
23020003	1669	27.12.2023	Подільський-50 Podilskiyi-50

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>			
22039001	273	05.12.2023	M94C35
23039038	2720	26.12.2023	M94S35
23039040	2720	28.12.2023	МЕДЖИК КЛП
23039042	2537	05.12.2023	MAGIC CLP
23039047	2715	28.12.2023	НОРМАН КП
23039048	2715	28.12.2023	NORMAN CP
			Стеларіс КЛП
			Stelaris CLP
			7036D092 11
			7036D092 11
			7042D093 11
			7042D093 11
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean</b>			
20045056	142	18.12.2023	Сафіра
22045019	2557	18.12.2023	Safira
			ОАЦ Хастінгс
			OAC Hastings
<b>Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet</b>			
18069030	2552	18.12.2023	Смірнов
19069010	2552	18.12.2023	Smirnov
23069009	2649	19.12.2023	Керолл
			Caroll
			СМАРТ ПЕРЛА КВС
			SMART PERLA KWS
<b>Аніс звичайний <i>Anisum vulgare</i> Gaertn. Anise</b>			
23092001	1708	05.12.2023	Маяк 50
			Maiak 50
<b>Капуста кольрабі <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i> L. Kohlrabi</b>			
23098001	751	12.12.2023	Констанс
			Konstance
<b>Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot</b>			
23109005	751	12.12.2023	Каталіна
			Catalina
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato</b>			
23115029	1852	27.12.2023	АЛБРИС
23115033	1852	28.12.2023	ALBRICE
23115034	3233	28.12.2023	ДРК 936
23115035	3233	28.12.2023	DRK 936
			Хайнц1301
			Heinz1301
			Хайнц1648
			Heinz1648
<b>Холодок лікарський (спаржа) <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparagus</b>			
23124001	2434	28.12.2023	Гуелф Еквінокс
23124002	2839	05.12.2023	Guelph Equinox
23124003	2839	28.12.2023	Гуелф Екліпс
			Guelph Eclipse
			Гуелф Мілленніум
			Guelph Millennium
<b>Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon</b>			
23146001	1852	27.12.2023	БОТЛ РОКЕТ
			BOTTLE ROCKET
<b>Фацелія пижмолиста <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell</b>			
23161001	3227	28.12.2023	ФОЛІС
			FOLIS
<b>Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet</b>			
23166001	2649	18.12.2023	ГУСТЕЯ КВС
23166002	2649	28.12.2023	GUSTEA KWS
23166003	2649	28.12.2023	СУММО
			SUMMO
			ЛАКТИМО
			LACTIMO

## Відомості щодо ухвалені назви сорту рослин

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
23166004	2649	28.12.2023	ДЖЕРОНИМО
23166005	2649	28.12.2023	GERONIMO БЕТИМО BETIMO
<b>Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne</b>			
23196003	2838	22.12.2023	Іда Ida
<b>Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish</b>			
23218001	3227	28.12.2023	САТІС SATIS
<b>Гірчиця чорна <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch Black Mustard</b>			
23219001	3227	28.12.2023	МЕДІВА MEDIVA
<b>Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot</b>			
23256001	3218	18.12.2023	Голдріч Goldrich
<b>Смикавець їстівний (чуфа) <i>Cyperus esculentus</i> L. Nufa Sedge, Nut Grass, Yellow Nutsedge</b>			
23347001	1708	28.12.2023	Екватор Ekvator
<b>Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard</b>			
23380002	3227	28.12.2023	САЛЬФА SALFA
<b>Вівсяний корінь <i>Tragopogon porrifolium</i> L. Salsify</b>			
23391001	1708	12.12.2023	Прометей Prometei
<b>Скорзонера іспанська <i>Scorzonera hispanica</i> L. Black Salsify, Scorzonera</b>			
23392001	1708	23.12.2023	Сила Syla
<b>Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat</b>			
23539001	355	28.12.2023	Аматорка
23539002	355	12.12.2023	Аматорка Добра новина Dobra novyna
<b>Салат посівний ромен <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam. Roman Lettuce, Cos Lettuce</b>			
23546002	1730	28.12.2023	Одона Odon
<b>Кукурудза восковидна <i>Zea mays</i> var. <i>ceratina</i> L. Corn</b>			
23645001	1688	05.12.2023	X03M321BX X03M321WX
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component</b>			
23009105	793	22.12.2023	PBI589 RVI589
23909063	1690	12.12.2023	1ПНЗК23 1PNZQ23
23909065	1688	12.12.2023	1ПХЕГ21 1PHEG21
23909072	1688	12.12.2023	ПХ2РФВ PH2RFW
23909076	1688	05.12.2023	1ПСЦГ68 1PSCG68
23909079	1688	05.12.2023	1ПАБЦ82 1PABC82
23909081	1688	05.12.2023	1ПЛРФ93 1PLRF93
23909085	1783	28.12.2023	P22023 R22023
23909107	793	12.12.2023	КЮІБ55ФФ QIB55FF
23909108	793	12.12.2023	КЮІБ58ФФ QIB58FF
23909109	793	12.12.2023	КЮІБ54ФФ QIB54FF

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
23909110	793	12.12.2023	ЛОВ612
23909131	2890	19.12.2023	ЛОВ612 ЕС7711 ЕС7711
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>			
23939025	1688	18.12.2023	7ПАКЕ41Б 7РАQE41В
23939026	1688	18.12.2023	7ПАКЙ19Б 7РАQJ19В
23939027	1688	18.12.2023	7ПХБГ97Р 7РНВГ97R
23939031	1688	05.12.2023	7ПУАС84Б 7РУАС84В
23939032	1688	05.12.2023	7ПИБК03Р 7РУВК03R
23939034	1688	12.12.2023	7ПЗЛИ47Р 7РZLY47R
23939044	2287	28.12.2023	ЕС-312 YeS-312
23939045	2287	12.12.2023	ЕС-212 YeS-212
23939046	2287	12.12.2023	ЕС-311 YeS-311
23939048	2287	28.12.2023	ЕС-422 YeS-422
23939050	2890	28.12.2023	70004Рсуол 70004Rsuol
<b>Ріпак (ярий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Spring Rape Seed – parental component</b>			
23941001	736	28.12.2023	ВНР 465 VNR 465

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

### Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
<b>Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn</b>							
20009087	02.11.2020	230913	13.12.2023	02.11.2020	ІНІЦІАТОР INITIATOR	844	
20009088	02.11.2020	230914	13.12.2023	02.11.2020	БАДІАН BADIANE	844	
20009089	02.11.2020	230915	13.12.2023	02.11.2020	МАЙОРК MAJORQUE	844	
20009090	02.11.2020	230916	13.12.2023	02.11.2020	4111Ц 4111C	844	
20009091	02.11.2020	230917	13.12.2023	02.11.2020	ЕЮ4139 EU4139	844	
20009092	02.11.2020	230918	13.12.2023	02.11.2020	ДКС4010 DKC4010	844	
20009093	02.11.2020	230919	13.12.2023	02.11.2020	ЕВ4665 EV4665	844	
20009095	02.11.2020	230920	13.12.2023	02.11.2020	ІНФЛЮЕНЦ INFLUENCE	844	
20009096	02.11.2020	230921	13.12.2023	02.11.2020	СІНОПСИС SYNOPSIS	844	
20009098	02.11.2020	230922	13.12.2023	02.11.2020	ДКС3527 DKC3527	844	
20009134	23.11.2020	230923	13.12.2023	23.11.2020	ДКС4726 DKC4726	844	
20009136	23.11.2020	230924	13.12.2023	23.11.2020	ЕВ3738 EW3738	844	
20009137	23.11.2020	230925	13.12.2023	23.11.2020	ДКС4728 DKC4728	844	
20009138	23.11.2020	230926	13.12.2023	23.11.2020	ПОПУЛЯРІО POPULIARIO	844	
20009139	23.11.2020	230927	13.12.2023	23.11.2020	ЕВ3077 EV3077	844	
20009140	23.11.2020	230928	13.12.2023	23.11.2020	ІНТЕРАКТИС INTERAKTIS	844	
20009141	23.11.2020	230929	13.12.2023	23.11.2020	ДКС3117 DKC3117	844	
20009142	23.11.2020	230930	13.12.2023	23.11.2020	ДКС4125 DKC4125	844	
20009143	23.11.2020	230931	13.12.2023	23.11.2020	ДКС4320 DKC4320	844	
20009226	29.12.2020	231016	22.12.2023	29.12.2020	А8810 A8810	2760	
20009227	29.12.2020	231017	22.12.2023	29.12.2020	А9011 A9011	2760	
21009036	02.03.2021	230864	08.12.2023	02.03.2021	Хунта Khunta	2784 2785	
21009041	07.04.2021	230932	13.12.2023	07.04.2021	Мірісса Mirissa	2793	
21009088	16.11.2021	230991	20.12.2023	16.11.2021	Ерекорн Erekorn	2742	
21009089	16.11.2021	230992	20.12.2023	16.11.2021	Ерест Erest	2742	
21009091	22.11.2021	230813	05.12.2023	22.11.2021	СМ Вавел SM Wavel	2537	
21009112	08.12.2021	230754	04.12.2023	08.12.2021	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009113	08.12.2021	230755	04.12.2023	08.12.2021	КВС ГІПОЛІТО KWS HYPOLITO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009114	08.12.2021	230756	04.12.2023	08.12.2021	НАТАЕЛО NATAELO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21009115	08.12.2021	230757	04.12.2023	08.12.2021	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009116	08.12.2021	230758	04.12.2023	08.12.2021	КВС ОЛТЕНІО KWS OLTENIO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009117	08.12.2021	230759	04.12.2023	08.12.2021	КВС АМАТРІО KWS AMATRIO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009118	08.12.2021	230760	04.12.2023	08.12.2021	КВС БОЛІВІАНО KWS BOLIVIANO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009119	08.12.2021	230761	04.12.2023	08.12.2021	КВС КОРНЕЛІО KWS CORNELIO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009120	08.12.2021	230762	04.12.2023	08.12.2021	КВС ЕСТРЕЛЛО KWS ESTRELLO	2649	
21009122	08.12.2021	230763	04.12.2023	08.12.2021	КВС ГАЛІЛЕО KWS GALILEO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009123	08.12.2021	230764	04.12.2023	08.12.2021	КВС МАУРІЛІО KWS MAURILIO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009124	08.12.2021	230765	04.12.2023	08.12.2021	КВС АКАДО KWS ACADO	2649	
21009125	08.12.2021	230766	04.12.2023	08.12.2021	КВС АДНАНО KWS ADNANO	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21009143	20.12.2021	230767	04.12.2023	20.12.2021	СІКСТІНА SIXTINA	1783	
21009144	20.12.2021	230768	04.12.2023	20.12.2021	РЖТ ЗАНЕТІККС ДУО RGT ZANETIXX DUO	1783	
21009147	20.12.2021	230769	04.12.2023	20.12.2021	РЖТ Велюкксо RGT Veluxxo	1783	
21009148	20.12.2021	230770	04.12.2023	20.12.2021	РЖТ ПРОДУКЦІОН RGT PRODUXXION	1783	
21009149	20.12.2021	230771	04.12.2023	20.12.2021	РЖТ ЕЛЕККС RGT ALEXX	1783	
21009151	21.12.2021	230772	04.12.2023	21.12.2021	РЖТ Волкоккс RGT Volcoxx	1783	
21009153	21.12.2021	230773	04.12.2023	21.12.2021	РЖТ Акціональ RGT Axxional	1783	
21009154	21.12.2021	230774	04.12.2023	21.12.2021	ДОНЕРІККС DONERIXX	1783	
21009159	22.12.2021	230865	08.12.2023	22.12.2021	Рекольт Rekolt	2514	
21009160	22.12.2021	230866	08.12.2023	22.12.2021	Паттерн Pattern	2514	
21009161	22.12.2021	230867	08.12.2023	22.12.2021	Коїн Koın	2514	
21009162	22.12.2021	230868	08.12.2023	22.12.2021	Клеонс Kleons	2514	
21009165	29.12.2021	230775	04.12.2023	29.12.2021	МІДНАЙТ MIDNIGHT	793	
21009166	29.12.2021	230840	06.12.2023	29.12.2021	ЛГ31271 LG31271	793	
21009167	29.12.2021	230776	04.12.2023	29.12.2021	ХОНОРІН HONOREEN	793	
22009001	06.01.2022	230897	13.12.2023	06.01.2022	Такт Takt	2260 921	
22009002	06.01.2022	230898	13.12.2023	06.01.2022	Альт Alt	2260 921	
22009003	06.01.2022	230899	13.12.2023	06.01.2022	Мелодія Melodiia	2260 921	
22009004	11.01.2022	230961	14.12.2023	11.01.2022	КМ 5960 KM 5960	2257	
22009005	11.01.2022	230962	14.12.2023	11.01.2022	КМ 2020 KM 2020	2257	
22009006	12.01.2022	230963	14.12.2023	12.01.2022	КМ 2165 KM 2165	2257	
22009007	12.01.2022	230964	14.12.2023	12.01.2022	КМ 3182 KM 3182	2257	
22009008	12.01.2022	230965	14.12.2023	12.01.2022	КМ 3490 KM 3490	2257	
22009009	12.01.2022	230966	14.12.2023	12.01.2022	ГРОВОІКС GROWIX	2257	
22009010	12.01.2022	230967	14.12.2023	12.01.2022	КМ 5710 KM 5710	2257	
22009011	12.01.2022	230968	14.12.2023	12.01.2022	КМ 2170 KM 2170	2257	



## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22009012	12.01.2022	230969	14.12.2023	12.01.2022	КМ 3131 KM 3131	2257	
22009018	13.01.2022	230900	13.12.2023	13.01.2022	ДН Сінтоле DN Sintole	2260	
22009019	13.01.2022	230901	13.12.2023	13.01.2022	ДН Фонд DN Fond	2260	
22009020	13.01.2022	230902	13.12.2023	13.01.2022	ДН Летава DN Letava	2260	
22009024	31.01.2022	230993	20.12.2023	22.02.2031	ДМС Траян DMS Traian	2558	
22009025	31.01.2022	230994	20.12.2023	31.01.2022	ДМС Таргет DMS Tarhet	2558	
22009026	31.01.2022	230995	20.12.2023	31.01.2022	ДМС Таллер DMS Taller	2558	
22009027	31.01.2022	230996	20.12.2023	22.02.2031	Орман Orman	2558 2761	
22009028	31.01.2022	230997	20.12.2023	22.02.2031	Гермес Hermes	2558 2761	
22009029	31.01.2022	230998	20.12.2023	31.01.2022	ДМС Тріод DMS Triod	2558	
22009035	10.03.2022	230869	08.12.2023	10.03.2022	СТАЙН 9808ХП STINE 9808HP	2788	бюлетень, випуск 11, 2023
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum</b>							
20018013	30.12.2020	230958	13.12.2023	30.12.2020	АДВ Ф7103 ADV F7103	2554	
20018014	30.12.2020	230959	13.12.2023	30.12.2020	АДВГ 2168 ІГ ADVG 2168 IG	2554	
20018015	30.12.2020	230960	13.12.2023	30.12.2020	У55045 U55045	2554	
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>							
22020008	24.01.2022	231033	22.12.2023	24.01.2022	Ювента Juvanta	2302	бюлетень, випуск 10, 2023
22020009	24.01.2022	231034	22.12.2023	24.01.2022	Тася Tasja	2302	бюлетень, випуск 10, 2023
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>							
20039113	30.12.2020	231023	22.12.2023	30.12.2020	Ф4987В0 F4987V0	2195	бюлетень, випуск 6, 2022
21039092	20.12.2021	230801	04.12.2023	20.12.2021	Базаллт Basallt	1783	
21039093	20.12.2021	230802	04.12.2023	20.12.2021	Овелл Owell	1783	
21039094	20.12.2021	230803	04.12.2023	20.12.2021	Нобіліс КЛП Nobillis CLP	1783	
21039096	20.12.2021	230804	04.12.2023	20.12.2021	Людмила Ludmilla	1783	
21039097	20.12.2021	230805	04.12.2023	20.12.2021	Мілос КЛП Milos CLP	1783	
21039098	20.12.2021	230806	04.12.2023	20.12.2021	Джерсі Jersey	1783	
21039109	29.12.2021	231025	22.12.2023	29.12.2021	Ф4413В0 F4413V0	2195	
21039110	29.12.2021	231026	22.12.2023	29.12.2021	Ф2687 ЦЛ F2687 TsL	2195	
21039113	30.12.2021	230883	08.12.2023	30.12.2021	Са Лана Sa Lana	1517	
22039001	05.01.2022	231027	22.12.2023	05.01.2022	М94С35 M94S35	273	
22039004	11.01.2022	230975	14.12.2023	11.01.2022	КС 5210 KS 5210	2257	
22039005	11.01.2022	230976	14.12.2023	11.01.2022	КС 4213 алс KS 4213 als	2257	
22039006	12.01.2022	230977	14.12.2023	12.01.2022	КС 410 імі KS 410 imi	2257	
22039007	14.01.2022	230950	13.12.2023	14.01.2022	ХАЙСАН 151 HYSUN 151	2554	
22039015	09.03.2022	230884	08.12.2023	09.03.2022	СТК104 STK104	2788	бюлетень, випуск 11, 2023
22039019	18.11.2022	230951	13.12.2023	18.11.2022	Р64ЛП655 P64LP655	1688	

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22039020	18.11.2022	230952	13.12.2023	18.11.2022	П64ЛЛ173 P64LL173	1688	
22039023	18.11.2022	230953	13.12.2023	18.11.2022	П64ЛП169 P64LP169	1688	
22039024	18.11.2022	230954	13.12.2023	18.11.2022	П64ЛЛ264 P64LL264	1688	
22039028	18.11.2022	230955	13.12.2023	18.11.2022	П64ГП630 P64HP630	1688	
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean</b>							
17045055	04.12.2017	231030	22.12.2023	04.12.2017	Камея Kameia	2606	бюлетень, випуск 11, 2023
17045056	04.12.2017	231031	22.12.2023	04.12.2017	Златопільська Zlatopil'ska	2606	бюлетень, випуск 11, 2023
21045009	02.11.2021	230887	08.12.2023	02.11.2021	Кобуко Kobuko	1669	бюлетень, випуск 11, 2023
21045013	02.12.2021	230888	08.12.2023	02.12.2021	ПР2204 PR2204	142	
21045014	02.12.2021	230889	08.12.2023	02.12.2021	Мая Maya	142	
21045015	02.12.2021	230890	08.12.2023	02.12.2021	СВХ20Т00С4 SVX20T00S4	2061	
21045016	02.12.2021	230891	08.12.2023	02.12.2021	ПР2202 PR2202	142	
21045017	02.12.2021	230892	08.12.2023	02.12.2021	ПР2203 PR2203	142	
21045029	20.12.2021	230809	04.12.2023	20.12.2021	РЖТ СІГМА RGT SIGMA	1783	бюлетень, випуск 11, 2023
21045031	20.12.2021	231045	28.12.2023	20.12.2021	Сахара Sahara	1783	
21045032	20.12.2021	230810	04.12.2023	20.12.2021	СТЕПА STEPA	1783	
21045033	22.12.2021	230980	14.12.2023	22.12.2021	АФК Фест AFK Fest	655	
21045034	22.12.2021	230981	14.12.2023	22.12.2021	АФК Темпо AFK Tempo	655	
21045035	22.12.2021	230982	14.12.2023	22.12.2021	АФК Спрін AFK Sprin	655	
22045021	04.03.2022	230893	08.12.2023	04.03.2022	СТАЙН 06Н02 STINE 06N02	2788	
22045022	09.03.2022	230894	08.12.2023	09.03.2022	СТАЙН 20Н23 STINE 20N23	2788	бюлетень, випуск 11, 2023
22045023	09.03.2022	230895	08.12.2023	09.03.2022	СТАЙН 12Н23 STINE 12N23	2788	бюлетень, випуск 11, 2023
22045024	09.03.2022	230896	08.12.2023	09.03.2022	СТАЙН 02Н23 STINE 02N23	2788	бюлетень, випуск 11, 2023
<b>Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet</b>							
21069010	04.11.2021	230860	08.12.2023	04.11.2021	Микеланджело Michelangelo	2552	бюлетень, випуск 11, 2023
21069012	04.11.2021	230861	08.12.2023	04.11.2021	Хаббл Hubble	2552	бюлетень, випуск 11, 2023
23069002	06.01.2023	230862	08.12.2023	06.01.2023	Фредерік Frederic	2552	
23069003	06.01.2023	230863	08.12.2023	06.01.2023	Огест August	2552	
23069004	16.01.2023	230838	06.12.2023	16.01.2023	ФД23В5063 FD23B5063	796	
23069005	16.01.2023	230839	06.12.2023	16.01.2023	ФД22В5006 FD22B5006	796	
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalot</b>							
20106006	10.11.2020	230837	05.12.2023	10.11.2020	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	1852	бюлетень, випуск 10, 2023
<b>Цибуля шалот <i>Allium oshaninii</i> O. Fedtsch. Shallot, Grey Shallot</b>							
23107001	26.04.2023	231032	22.12.2023	26.04.2023	Шелія Schelia	1997	
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber</b>							
20110012	10.11.2020	230823	05.12.2023	10.11.2020	БРАНДІНО BRANDINO	1852	бюлетень, випуск 10, 2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21110001	01.02.2021	230986	20.12.2023	01.02.2021	Переможний Peremozhnyi	1781	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21110002	01.02.2021	230987	20.12.2023	01.02.2021	Слава Slava	1781	бюлетень, випуск 1, 2022
21110012	30.11.2021	230824	05.12.2023	30.11.2021	ГРАТЕН GRATEN	1852	бюлетень, випуск 11, 2023
21110013	01.12.2021	230825	05.12.2023	01.12.2021	ГРИФОН GRYPHON	1852	бюлетень, випуск 11, 2023
22110008	01.12.2022	230826	05.12.2023	01.12.2022	ФРОСТ FROST	1852	
23110011	20.09.2023	231024	22.12.2023	20.09.2023	Герміна Hermina	1997	
<b>Пастернак <i>Pastinaca sativa</i> L. Parsnip</b>							
21111001	18.01.2021	230988	20.12.2023	18.01.2021	Гномік Hnomik	1781	бюлетень, випуск 1, 2022
<b>Петрушка городня <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W.Hill Parsley</b>							
21114001	18.01.2021	230989	20.12.2023	18.01.2021	Казкова Kazkova	1781	бюлетень, випуск 1, 2022
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato</b>							
20115001	13.01.2020	231022	22.12.2023	13.01.2020	N 0507 N 0507	753	бюлетень, випуск 6, 2021
21115003	14.01.2021	230846	06.12.2023	14.01.2021	Спалах Spalakh	1802	бюлетень, випуск 11, 2023
21115035	30.11.2021	230827	05.12.2023	30.11.2021	ХАКІМАРУ HAKUMARU	1852	бюлетень, випуск 11, 2023
<b>Буряк столовий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Alef. Beetroot, Garden Beet</b>							
21122001	18.01.2021	230983	20.12.2023	18.01.2021	Король Korol	1781	бюлетень, випуск 1/2, 2023
<b>Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon</b>							
20146011	10.11.2020	230811	05.12.2023	10.11.2020	СВ3807BT SV3807WT	1852	бюлетень, випуск 10, 2023
20146012	10.11.2020	230812	05.12.2023	10.11.2020	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	1852	бюлетень, випуск 10, 2023
21146004	01.02.2021	230984	20.12.2023	01.02.2021	Татіус Tatius	1781	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21146005	01.02.2021	230985	20.12.2023	01.02.2021	Мет Met	1781	бюлетень, випуск 1/2, 2023
<b>Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne</b>							
20196006	26.11.2020	231039	28.12.2023	26.11.2020	Персія Носівська Persiia Nosivska	1990	бюлетень, випуск 11, 2023
<b>Льон звичайний (ярий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed</b>							
22243001	08.02.2022	230911	13.12.2023	08.02.2022	Юстесс Justess	2865	
<b>Обліпіха крушиновидна <i>Hippophae rhamnoides</i> L. Common Sea Buckthorn</b>							
21299003	02.12.2021	231014	20.12.2023	02.12.2021	Абориген Aboryhen	1601	
<b>Калина звичайна <i>Viburnum opulus</i> L. Snowball Tree</b>							
21303002	02.12.2021	230990	20.12.2023	02.12.2021	Гармонія Harmoniia	1601	
<b>Люцерна мінлива <i>Medicago</i> × <i>varia</i> Martyn Hybrid Lucerne</b>							
20364001	02.01.2020	230822	05.12.2023	02.01.2020	Струмочок Strumochok	3221	
20364003	06.10.2020	230948	13.12.2023	06.10.2020	Янтарна Yantarna	1626	
20364004	06.10.2020	230949	13.12.2023	06.10.2020	Індіго Indiho	1626	
<b>Костриця овеча <i>Festuca ovina</i> L. Sheep's Fescue</b>							
21473002	12.11.2021	230912	13.12.2023	12.11.2021	Блискавка Blyskavka	1626	

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component</b>							
20909104	02.11.2020	230933	13.12.2023	02.11.2020	B89543 V8954Z	844	
20909105	02.11.2020	230934	13.12.2023	02.11.2020	B93653 V9365Z	844	
20909106	02.11.2020	230935	13.12.2023	02.11.2020	B34363 V3436Z	844	
20909107	02.11.2020	230936	13.12.2023	02.11.2020	A18643 A1864Z	844	
20909108	02.11.2020	230937	13.12.2023	02.11.2020	M22303 M2230Z	844	
20909109	02.11.2020	230938	13.12.2023	02.11.2020	ДЖ13753 J1375Z	844	
20909140	23.11.2020	230939	13.12.2023	23.11.2020	ДЖ08563 J0856Z	844	
20909141	23.11.2020	230940	13.12.2023	23.11.2020	M98103 M9810Z	844	
20909142	23.11.2020	230941	13.12.2023	23.11.2020	Ф25683 F2568Z	844	
20909143	23.11.2020	230942	13.12.2023	23.11.2020	M38403 M3840Z	844	
20909144	23.11.2020	230943	13.12.2023	23.11.2020	M58723 M5872Z	844	
20909145	23.11.2020	230944	13.12.2023	23.11.2020	B46643 V4664Z	844	
20909146	23.11.2020	230945	13.12.2023	23.11.2020	M84583 M8458Z	844	
20909147	23.11.2020	230946	13.12.2023	23.11.2020	B42703 V4270Z	844	
20909148	23.11.2020	230947	13.12.2023	23.11.2020	M85823 M8582Z	844	
20909238	29.12.2020	231018	22.12.2023	29.12.2020	AT1635 AT1635	2760	
20909239	29.12.2020	231019	22.12.2023	29.12.2020	AK335 AK335	2760	
20909240	29.12.2020	231020	22.12.2023	29.12.2020	ЗМ446 ZM446	2760	
21909046	01.03.2021	231021	22.12.2023	01.03.2021	ДА 48 DA 48	2787	
21909044	02.03.2021	230870	08.12.2023	02.03.2021	БВМ 465 BVM 465	2784 2785	
21909045	02.03.2021	230871	08.12.2023	02.03.2021	БВМ 01 BVM 01	2784 2785	
21909065	07.04.2021	230872	08.12.2023	07.04.2021	КМ 234 KM 234	2793	
21909066	07.04.2021	230873	08.12.2023	07.04.2021	КР 05 KR 05	2793	
21909138	16.11.2021	230999	20.12.2023	16.11.2021	В 781 СВ V 781 SV	2742	
21909139	16.11.2021	231000	20.12.2023	16.11.2021	Ерена С Erena S	2742	
21909140	16.11.2021	231001	20.12.2023	16.11.2021	В 753 зс V 753 zs	2742	
21909141	16.11.2021	231002	20.12.2023	16.11.2021	В 772 с V 772 s	2742	
21909142	16.11.2021	231003	20.12.2023	16.11.2021	В 7471 СВ V 7471 SV	2742	
21909143	16.11.2021	231004	20.12.2023	16.11.2021	В 736 зс V 736 zs	2742	
21909144	16.11.2021	231005	20.12.2023	16.11.2021	В 772 зс V 772 zs	2742	
21909145	16.11.2021	231006	20.12.2023	16.11.2021	Ерая С Eraia S	2742	
21909146	16.11.2021	231007	20.12.2023	16.11.2021	В 1485 зс V 1485 zs	2742	
21909148	29.11.2021	230814	05.12.2023	29.11.2021	АРА2528 ARA2528	1959	
21909149	29.11.2021	230815	05.12.2023	29.11.2021	ГЕІК1770 GEIX1770	1959	
21909150	29.11.2021	230816	05.12.2023	29.11.2021	ЦІД2455 CID2455	1219	

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21909151	29.11.2021	230817	05.12.2023	29.11.2021	ЦІД2457 ЦІД2455 CID2457 CID2455	1219	
21909152	29.11.2021	230818	05.12.2023	29.11.2021	ЕГІД3959 EGID3959	1219	
21909153	29.11.2021	230819	05.12.2023	29.11.2021	ФСАКС3928 FSAX3928	1219	
21909154	29.11.2021	230820	05.12.2023	29.11.2021	ФСІД3818 FSID3818	1219	
21909155	29.11.2021	230821	05.12.2023	29.11.2021	БАА1197 BAA1197	1219	
21909163	08.12.2021	230777	04.12.2023	08.12.2021	КВ 6ЕЙ0079 KW 6EY0079	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909164	08.12.2021	230778	04.12.2023	08.12.2021	КВ 3Б3048 KW 3B3048	2649	
21909165	09.12.2021	230779	04.12.2023	09.12.2021	КВ 4ЕЦ2075 KW 4EC2075	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909166	09.12.2021	230780	04.12.2023	09.12.2021	КВ 4ЕЦ2076 KW 4EC2076	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909167	10.12.2021	230781	04.12.2023	10.12.2021	КВ 4ЕЦ2070 KW 4EC2070	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909168	10.12.2021	230782	04.12.2023	10.12.2021	КВ 6ФД0043 KW 6FD0043	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909169	10.12.2021	230783	04.12.2023	10.12.2021	КВ 9ЕЙ0115 KW 9EY0115	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909170	10.12.2021	230784	04.12.2023	10.12.2021	КВ 9ФД0047 KW 9FD0047	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909171	13.12.2021	230785	04.12.2023	13.12.2021	КВ 6ФЮ1809 KW 6FQ1809	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909172	13.12.2021	230786	04.12.2023	13.12.2021	КВ 6ФЮ1906 KW 6FQ1906	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909173	13.12.2021	230787	04.12.2023	13.12.2021	КВ 7ЕР1723 KW 7ER1723	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909174	13.12.2021	230788	04.12.2023	13.12.2021	КВ 7ФП1991 KW 7FP1991	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909175	13.12.2021	230789	04.12.2023	13.12.2021	КВ 9ФЮ1713 KW 9FQ1713	2649	бюлетень, випуск 11, 2023
21909176	20.12.2021	230790	04.12.2023	20.12.2021	Р07096 СМС R07096 SMS	1783	
21909177	20.12.2021	230791	04.12.2023	20.12.2021	Р14010 Р15076 R14010 R15076	1783	
21909178	20.12.2021	230792	04.12.2023	20.12.2021	Р18009 R18009	1783	
21909181	20.12.2021	230794	04.12.2023	20.12.2021	Р21020 R21020	1783	
21909182	20.12.2021	230795	04.12.2023	20.12.2021	Р21021 R21021	1783	
21909183	20.12.2021	230796	04.12.2023	20.12.2021	Р21029 R21029	1783	
21909185	20.12.2021	230798	04.12.2023	20.12.2021	Р08053 Р08068 R08053 R08068	1783	
21909186	20.12.2021	230799	04.12.2023	20.12.2021	Р21028 R21028	1783	
21909187	20.12.2021	230800	04.12.2023	20.12.2021	Р10001 ЦМС R10001 CMS	1783	
21909194	22.12.2021	230874	08.12.2023	22.12.2021	РЛ272 СВ RL272 SV	2514	
21909195	22.12.2021	230875	08.12.2023	22.12.2021	РЛ2275 МВ RL2275 MV	2514	
21909196	22.12.2021	230876	08.12.2023	22.12.2021	С274 СВ S274 SV	2514	
21909197	22.12.2021	230877	08.12.2023	22.12.2021	С17 СВ S17 SV	2514	
21909198	22.12.2021	230878	08.12.2023	22.12.2021	СГ776 Мст SH776 Mst	2514	
21909199	22.12.2021	230879	08.12.2023	22.12.2021	СГ292 Сст SH292 Sst	2514	
22909001	11.01.2022	230841	06.12.2023	11.01.2022	КЮІА320В І00374 QIA320V I00374	793	
22909002	11.01.2022	230842	06.12.2023	11.01.2022	КЮЛЦ99ФФ QLC99FF	793	
22909005	11.01.2022	230843	06.12.2023	11.01.2022	ПРЦ12ФФ PRC12FF	793	

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22909006	11.01.2022	230844	06.12.2023	11.01.2022	КЮЛБ34ІВ ПДА01ВІ QLB34IV PDA01VI	793	
22909007	11.01.2022	230845	06.12.2023	11.01.2022	РФЦ61ББ RFC61BB	793	
22909009	11.01.2022	230970	14.12.2023	11.01.2022	ПК 1931 PK 1931	2257	
22909010	11.01.2022	230971	14.12.2023	11.01.2022	ПВК 1408 PVK 1408	2257	
22909011	11.01.2022	230972	14.12.2023	11.01.2022	СМК 201 SMK 201	2257	
22909012	12.01.2022	230973	14.12.2023	12.01.2022	НКЗ 1206 NKZ 1206	2257	
22909013	12.01.2022	230974	14.12.2023	12.01.2022	ПК 1838 PK 1838	2257	
22909017	13.01.2022	230903	13.12.2023	13.01.2022	ДК2239МВ DK2239MV	2260	
22909018	13.01.2022	230904	13.12.2023	13.01.2022	ДК2329 ЗСЗМ DK2329 ZSZM	2260	
22909019	13.01.2022	230905	13.12.2023	13.01.2022	Крос269С Kros269S	2260	
22909020	13.01.2022	230906	13.12.2023	13.01.2022	ДК2525СВЗМ DK2525SVZM	2260	
22909021	13.01.2022	230907	13.12.2023	13.01.2022	ДК3643СВЗМ DK3643SVZM	2260	
22909022	13.01.2022	230908	13.12.2023	13.01.2022	ДК2663С DK2663S	2260	
22909023	13.01.2022	230909	13.12.2023	13.01.2022	Крос202С Kros202S	2260	
22909024	13.01.2022	230910	13.12.2023	13.01.2022	Крос350С Kros350S	2260	
22909029	31.01.2022	231008	20.12.2023	31.01.2022	СДМ74 SDM74	2558	
22909030	31.01.2022	231009	20.12.2023	31.01.2022	МС744301 MS744301	2558	
22909031	31.01.2022	231010	20.12.2023	31.01.2022	МС306 MS306	2558	
22909032	31.01.2022	231011	20.12.2023	31.01.2022	МС255 MS255	2558	
22909033	31.01.2022	231012	20.12.2023	31.01.2022	МКВ01 MKV01	2558	
22909137	14.12.2022	231035	28.12.2023	14.12.2022	Р18021 R18021	1783	
22909138	14.12.2022	231036	28.12.2023	14.12.2022	Р19017 R19017	1783	
22909193	14.12.2022	231037	28.12.2023	14.12.2022	Р11002 R11002	1783	
22909194	14.12.2022	231038	28.12.2023	14.12.2022	Р10034 R10034	1783	
23909053	01.03.2023	230882	08.12.2023	01.03.2023	СГ1135 Мст SH1135 Mst	2514	
23909050	02.03.2023	230880	08.12.2023	02.03.2023	СГ1035 SH1035	2514	
23909051	02.03.2023	231013	20.12.2023	02.03.2023	С3025 МВ S3025 MV	2514	
23909052	02.03.2023	230881	08.12.2023	02.03.2023	СА1311 СВЗМ SA1311 SVZM	2514	
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>							
20939137	24.12.2020	230978	14.12.2023	24.12.2020	СС 2019 SS 2019	2257	
20939175	31.12.2020	231028	22.12.2023	31.12.2020	ДК 22 А DK 22 A	2766	
20939176	31.12.2020	231029	22.12.2023	31.12.2020	ДК 22 Б DK 22 B	2766	
21939022	07.04.2021	230885	08.12.2023	07.04.2021	ПП 01 PP 01	2793	бюлетень, випуск 11, 2023
21939023	07.04.2021	230886	08.12.2023	07.04.2021	ПМ 678 PM 678	2793	бюлетень, випуск 11, 2023
21939058	23.11.2021	230847	06.12.2023	23.11.2021	Ф5ДНЗМ2А F5DN3M2A	1435	
21939059	23.11.2021	230848	06.12.2023	23.11.2021	Ф10БЗ2М20А F10BZ2M20A	1435	

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21939060	23.11.2021	230849	06.12.2023	23.11.2021	СФ2615МЖІА SF2615MJIA	1435	
21939061	23.11.2021	230850	06.12.2023	23.11.2021	P16E13M R16E13M	1435	
21939062	23.11.2021	230851	06.12.2023	23.11.2021	P16PC1MЖК R16PC1MJK	1435	
21939063	23.11.2021	230852	06.12.2023	23.11.2021	P4HP8M2Ж R4NP8M2J	1435	
21939064	23.11.2021	230853	06.12.2023	23.11.2021	P5PE4MЖ R5PE4MJ	1435	
21939065	23.11.2021	230854	06.12.2023	23.11.2021	P143E2MЖО R14ZE2MJО	1435	
21939066	23.11.2021	230855	06.12.2023	23.11.2021	P5PE4МК R5PE4MK	1435	
21939067	23.11.2021	230856	06.12.2023	23.11.2021	P4HX1MІ R4NX1MI	1435	
21939072	08.12.2021	230828	05.12.2023	08.12.2021	ФР406ЛC00 FR406LS00	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939073	09.12.2021	230829	05.12.2023	09.12.2021	ФС71549 FS71549	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939074	09.12.2021	230830	05.12.2023	09.12.2021	ФР84241 FR84241	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939080	09.12.2021	230831	05.12.2023	09.12.2021	ФР84289 FR84289	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939081	09.12.2021	230832	05.12.2023	09.12.2021	ФР402ЛЦ00 FR402LC00	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939082	09.12.2021	230833	05.12.2023	09.12.2021	ФА754XC05 FA754HS05	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939106	20.12.2021	230807	04.12.2023	20.12.2021	РТ7120 RT7120	1783	
21939107	20.12.2021	230808	04.12.2023	20.12.2021	РТ7220 RT7220	1783	
21939111	23.12.2021	230834	05.12.2023	23.12.2021	ФР842ЛН22 FR842LN22	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939112	23.12.2021	230835	05.12.2023	23.12.2021	ФА306ЛН00 FA306LN00	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939113	23.12.2021	230836	05.12.2023	23.12.2021	ФР407ЛН00 FR407LN00	1219	бюлетень, випуск 11, 2023
21939114	28.12.2021	230857	06.12.2023	28.12.2021	ЕХ500СУЛxMX501 EH500SULxMH501	2267	бюлетень, випуск 11, 2023
21939115	28.12.2021	230858	06.12.2023	28.12.2021	PX569СУЛ RH569SUL	2267	
21939116	28.12.2021	230859	06.12.2023	28.12.2021	PX789СУЛ RH789SUL	2267	
22939001	11.01.2022	230979	14.12.2023	11.01.2022	СТ 1922 ST 1922	2257	
22939006	14.01.2022	230956	13.12.2023	14.01.2022	33566 33566	2554	
22939007	14.01.2022	230957	13.12.2023	14.01.2022	19303 19303	2554	
22939047	14.12.2022	231040	28.12.2023	14.12.2022	РТ6920 RT6920	1783	
22939048	14.12.2022	231041	28.12.2023	14.12.2022	АТ1720 AT1720	1783	
22939049	14.12.2022	231042	28.12.2023	14.12.2022	АТ1119 AT1119	1783	
22939055	14.12.2022	231043	28.12.2023	14.12.2022	РТ7521 RT7521	1783	
22939056	14.12.2022	231044	28.12.2023	14.12.2022	РТ5919 RT5919	1783	
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i></b> <b>Rape Seed (Winter) – parental component</b>							
21940014	13.12.2021	231015	20.12.2023	13.12.2021	РМОС9945P RМОС9945R	2720	

## Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

### Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>					
20009087	02.11.2020	230913	ІНІЦІАТОР INITIATOR	844	20.12.2023
20009088	02.11.2020	230914	БАДІАН BADIANE	844	20.12.2023
20009089	02.11.2020	230915	МАЙОРК MAJORQUE	844	20.12.2023
20009090	02.11.2020	230916	4111Ц 4111C	844	20.12.2023
20009091	02.11.2020	230917	ЕЮ4139 EU4139	844	20.12.2023
20009092	02.11.2020	230918	ДКС4010 DKC4010	844	20.12.2023
20009093	02.11.2020	230919	ЕВ4665 EV4665	844	20.12.2023
20009095	02.11.2020	230920	ІНФЛЮЕНЦ INFLUENCE	844	20.12.2023
20009096	02.11.2020	230921	СИНОПСИС SYNOPSIS	844	20.12.2023
20009098	02.11.2020	230922	ДКС3527 DKC3527	844	20.12.2023
20009134	23.11.2020	230923	ДКС4726 DKC4726	844	20.12.2023
20009136	23.11.2020	230924	ЕВ3738 EW3738	844	20.12.2023
20009137	23.11.2020	230925	ДКС4728 DKC4728	844	20.12.2023
20009138	23.11.2020	230926	ПОПУЛЯРІО POPULIARIO	844	20.12.2023
20009139	23.11.2020	230927	ЕВ3077 EV3077	844	20.12.2023
20009140	23.11.2020	230928	ІНТЕРАКТИС INTERAKTIS	844	20.12.2023
20009141	23.11.2020	230929	ДКС3117 DKC3117	844	20.12.2023
20009142	23.11.2020	230930	ДКС4125 DKC4125	844	20.12.2023
20009143	23.11.2020	230931	ДКС4320 DKC4320	844	20.12.2023
21009001	04.01.2021	230637	Булат херсонський Bulat khersonskiyi	3221	01.12.2023
21009002	04.01.2021	230638	Дарунок херсонський Darunok khersonskiyi	3221	01.12.2023
21009003	05.01.2021	230639	Ярик Yaryk	3221	01.12.2023
21009004	05.01.2021	230640	Січовий Sichovyi	3221	01.12.2023
21009091	22.11.2021	230813	СМ Вавел SM Wawel	2537	08.12.2023
21009112	08.12.2021	230754	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO	2649	08.12.2023
21009113	08.12.2021	230755	КВС ГІПОЛІТО KWS HYPOLITO	2649	08.12.2023
21009114	08.12.2021	230756	НАТАЕЛО NATAELO	2649	08.12.2023
21009115	08.12.2021	230757	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO	2649	08.12.2023
21009116	08.12.2021	230758	КВС ОЛТЕНІО KWS OLTENIO	2649	08.12.2023
21009117	08.12.2021	230759	КВС АМАТРІО KWS AMATRIO	2649	08.12.2023
21009118	08.12.2021	230760	КВС БОЛІВІАНО KWS BOLIVIANO	2649	08.12.2023
21009119	08.12.2021	230761	КВС КОРНЕЛІО KWS CORNELIO	2649	08.12.2023
21009120	08.12.2021	230762	КВС ЕСТРЕЛЛО KWS ESTRELLO	2649	08.12.2023
21009122	08.12.2021	230763	КВС ГАЛІЛЕО KWS GALILEO	2649	08.12.2023



Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21009123	08.12.2021	230764	КВС МАУРІЛІО KWS MAURILIO	2649	08.12.2023
21009124	08.12.2021	230765	КВС АКАДО KWS ACADO	2649	08.12.2023
21009125	08.12.2021	230766	КВС АДНАНО KWS ADNANO	2649	08.12.2023
21009143	20.12.2021	230767	СІКСТІНА SIXTINA	1783	08.12.2023
21009144	20.12.2021	230768	РЖТ ЗАНЕТІККС ДУО RGT ZANETIXX DUO	1783	08.12.2023
21009147	20.12.2021	230769	РЖТ Велюкксо RGT Veluxxo	1783	08.12.2023
21009148	20.12.2021	230770	РЖТ ПРОДУККІОН RGT PRODUXXION	1783	08.12.2023
21009149	20.12.2021	230771	РЖТ ЕЛЕККС RGT ALEXH	1783	08.12.2023
21009151	21.12.2021	230772	РЖТ Волкоккс RGT Volcoxx	1783	08.12.2023
21009153	21.12.2021	230773	РЖТ Акксіональ RGT Axhional	1783	08.12.2023
21009154	21.12.2021	230774	ДОНЕРІККС DONERIXX	1783	08.12.2023
22009024	31.01.2022	230993	ДМС Траян DMS Traian	2558	27.12.2023
22009025	31.01.2022	230994	ДМС Таргет DMS Tarhet	2558	27.12.2023
22009026	31.01.2022	230995	ДМС Таллер DMS Taller	2558	27.12.2023
22009027	31.01.2022	230996	Орман Orman	2558 2761	27.12.2023
22009028	31.01.2022	230997	Гермес Hermes	2558 2761	27.12.2023
22009029	31.01.2022	230998	ДМС Тріод DMS Triod	2558	27.12.2023
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum</b>					
20018013	30.12.2020	230958	АДВ Ф7103 ADV F7103	2554	20.12.2023
20018014	30.12.2020	230959	АДВГ 2168 ІГ ADVG 2168 IG	2554	20.12.2023
20018015	30.12.2020	230960	У55045 U55045	2554	20.12.2023
<b>Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)</b>					
20019007	22.05.2020	230725	Єкатеріна Ekaterina	2524	04.12.2023
21019002	31.03.2021	230493	СИ ЛУНА SY LOONA	1219	27.12.2023
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>					
16020017	21.12.2016	230255	Лауреат Laureate	1959	27.12.2023
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>					
21039057	22.11.2021	230731	ЛГ50486 LG50486	793	04.12.2023
21039058	22.11.2021	230732	ЛГ50648 LG50648	793	04.12.2023
21039059	22.11.2021	230733	ЛГ50689 СХ LG50689 SX	793	04.12.2023
21039060	22.11.2021	230734	ЛГ50554 КЛП LG50554 CLP	793	04.12.2023
21039061	22.11.2021	230735	ЛГ50564 КЛП LG50564 CLP	793	04.12.2023
21039062	23.11.2021	230736	ЛГ50616 LG50616	793	04.12.2023
21039063	23.11.2021	230737	ЛГ50321 КЛП LG50321 CLP	793	04.12.2023
21039064	23.11.2021	230738	ЛГ50621 LG50621	793	04.12.2023
21039065	23.11.2021	230739	ЛГ50639 СХ LG50639 SX	793	04.12.2023
21039092	20.12.2021	230801	Базаллт Basallt	1783	08.12.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21039093	20.12.2021	230802	Овелл Owell	1783	08.12.2023
21039094	20.12.2021	230803	Нобіліс КЛП Nobillis CLP	1783	08.12.2023
21039096	20.12.2021	230804	Людмила Ludmilla	1783	08.12.2023
21039097	20.12.2021	230805	Мілос КЛП Milos CLP	1783	08.12.2023
21039098	20.12.2021	230806	Джерсі Jersey	1783	08.12.2023
21039106	28.12.2021	230742	Ліон Lion	2267	05.12.2023
21039107	28.12.2021	230743	Сульфостар Sulfostar	2267	05.12.2023
21039108	28.12.2021	230744	Маттіа Mattia	2267	05.12.2023
22039007	14.01.2022	230950	ХАЙСАН 151 HYSUN 151	2554	20.12.2023
<b>Ріпак (ярий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Spring)</b>					
21041004	23.12.2021	230728	Ріплеї Replay	2851	05.12.2023
<b>Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merr.</i> Soya Bean</b>					
21045012	16.11.2021	230752	Кінгстон Kingston	2739	05.12.2023
21045029	20.12.2021	230809	РЖТ СІГМА RGT SIGMA	1783	08.12.2023
21045032	20.12.2021	230810	СТЕПА STEPA	1783	08.12.2023
<b>Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum L.</i> Pea, Garden Pea</b>					
20095004	17.12.2020	230479	ЕЛЬДОРАДО ELDORADO	1959	27.12.2023
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa L.</i> Onion, Echalion</b>					
20106006	10.11.2020	230837	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	1852	20.12.2023
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus L.</i> Cucumber</b>					
20110012	10.11.2020	230823	БРАНДІНО BRANDINO	1852	20.12.2023
21110012	30.11.2021	230824	ГРАТЕН GRATEN	1852	20.12.2023
21110013	01.12.2021	230825	ГРИФОН GRYPHON	1852	20.12.2023
22110008	01.12.2022	230826	ФРОСТ FROST	1852	20.12.2023
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato</b>					
20115017	02.11.2020	230651	Арабат Arabat	3221	01.12.2023
20115018	02.11.2020	230652	Презент херсонський Prezent khersonskyi	3221	01.12.2023
21115035	30.11.2021	230827	ХАКІМАРУ HAKUMARU	1852	20.12.2023
<b>Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris L.</i> French Bean</b>					
20127009	17.12.2020	230721	ЕСКАДРОН ESCADRON	1959	27.12.2023
<b>Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i> Watermelon</b>					
20146011	10.11.2020	230811	СВ3807BT SV3807WT	1852	20.12.2023
20146012	10.11.2020	230812	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	1852	20.12.2023
<b>Суниця садова <i>Fragaria ananassa Duch.</i> Strawberry</b>					
21294002	12.11.2021	230712	ФЕДЕРІКА FEDERIKА	2832	05.12.2023
21294003	12.11.2021	230713	АРІАННА ARIANNA	2832	05.12.2023
21294004	12.11.2021	230714	САНДРІНА SANDRINA	2832	05.12.2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
<b>Троянда <i>Rosa L.</i> Rose</b>					
21339002	01.04.2021	230753	Доросіліп Dorosilpi	2441	11.12.2023
<b>Люцерна мінлива <i>Medicago × varia Martyn</i> Hybrid Lucerne</b>					
20364003	06.10.2020	230948	Янтарна Yantarna	1626	19.12.2023
20364004	06.10.2020	230949	Індіго Indiho	1626	19.12.2023
<b>Костриця овеча <i>Festuca ovina L.</i> Sheep's Fescue</b>					
21473002	12.11.2021	230912	Блискавка Blyskavka	1626	19.12.2023
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays L.</i> Maize, Corn – parental component</b>					
20909104	02.11.2020	230933	B89543 V8954Z	844	20.12.2023
20909105	02.11.2020	230934	B93653 V9365Z	844	20.12.2023
20909106	02.11.2020	230935	B34363 V3436Z	844	20.12.2023
20909107	02.11.2020	230936	A18643 A1864Z	844	20.12.2023
20909108	02.11.2020	230937	M22303 M2230Z	844	20.12.2023
20909109	02.11.2020	230938	ДЖ13753 J1375Z	844	20.12.2023
20909140	23.11.2020	230939	ДЖ08563 J0856Z	844	20.12.2023
20909141	23.11.2020	230940	M98103 M9810Z	844	20.12.2023
20909142	23.11.2020	230941	Ф25683 F2568Z	844	20.12.2023
20909143	23.11.2020	230942	M38403 M3840Z	844	20.12.2023
20909144	23.11.2020	230943	M58723 M5872Z	844	20.12.2023
20909145	23.11.2020	230944	B46643 V4664Z	844	20.12.2023
20909146	23.11.2020	230945	M84583 M8458Z	844	20.12.2023
20909147	23.11.2020	230946	B42703 V4270Z	844	20.12.2023
20909148	23.11.2020	230947	M85823 M8582Z	844	20.12.2023
20909209	16.12.2020	230230	ЕФКС5228С ЕFX5228S	1219	27.12.2023
20909210	16.12.2020	230231	ХІД3347С HID3347S	1219	27.12.2023
20909211	16.12.2020	230232	ФСАКС3657 FSAX3657	1959	27.12.2023
20909212	16.12.2020	230233	АНА1416 ANA1416	1959	27.12.2023
20909213	16.12.2020	230234	ГВІКС1660 GWIX1660	1219	27.12.2023
20909214	16.12.2020	230235	НПІД3881 НПІД3823 NPID3881 NPID3823	1219	27.12.2023
20909215	16.12.2020	230236	ФСІД3943 FSID3943	1219	27.12.2023
20909216	16.12.2020	230237	ХІД3855 HID3855	1219	27.12.2023
20909217	16.12.2020	230238	ЦІД2457С CID2457S	1219	27.12.2023
20909218	16.12.2020	230239	БХІ3048 BXI3048	1219	27.12.2023
20909219	16.12.2020	230240	АУП1328 AUP1328	1959	27.12.2023
20909220	16.12.2020	230241	БІА1333 BIA1333	1959	27.12.2023
21909002	04.01.2021	230641	ХН 3816 KhN 3816	3221	01.12.2023
21909003	04.01.2021	230642	ХН 5416 KhN 5416	3221	01.12.2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21909004	04.01.2021	230643	XH 1616	3221	01.12.2023
21909005	04.01.2021	230644	KhN 1616	3221	01.12.2023
21909007	04.01.2021	230646	XH 4616 KhN 4616	3221	01.12.2023
21909148	29.11.2021	230814	XH 1116 KhN 1116	1959	27.12.2023
21909149	29.11.2021	230815	APA2528 ARA2528	1959	27.12.2023
21909150	29.11.2021	230816	ГЕІКС1770 GEIX1770	1219	27.12.2023
21909151	29.11.2021	230817	ЦІД2455 CID2455	1219	27.12.2023
21909152	29.11.2021	230818	ЦІД2457 ЦІД2455 CID2457 CID2455	1219	27.12.2023
21909153	29.11.2021	230819	ЕГІД3959 EGID3959	1219	27.12.2023
21909154	29.11.2021	230820	ФСАКС3928 FSAX3928	1219	27.12.2023
21909155	29.11.2021	230821	ФСІД3818 FSID3818	1219	27.12.2023
21909163	08.12.2021	230777	БАА1197 BAA1197	2649	08.12.2023
21909164	08.12.2021	230778	КВ 6ЕЙ0079 KW 6EY0079	2649	08.12.2023
21909165	09.12.2021	230779	КВ 3Б3048 KW 3B3048	2649	08.12.2023
21909166	09.12.2021	230780	КВ 4ЕЦ2075 KW 4EC2075	2649	08.12.2023
21909167	10.12.2021	230781	КВ 4ЕЦ2076 KW 4EC2076	2649	08.12.2023
21909168	10.12.2021	230782	КВ 4ЕЦ2070 KW 4EC2070	2649	08.12.2023
21909169	10.12.2021	230783	КВ 6ФД0043 KW 6FD0043	2649	08.12.2023
21909170	10.12.2021	230784	КВ 9ЕЙ0115 KW 9EY0115	2649	08.12.2023
21909171	13.12.2021	230785	КВ 9ФД0047 KW 9FD0047	2649	08.12.2023
21909172	13.12.2021	230786	КВ 6ФЮ1809 KW 6FQ1809	2649	08.12.2023
21909173	13.12.2021	230787	КВ 6ФЮ1906 KW 6FQ1906	2649	08.12.2023
21909174	13.12.2021	230788	КВ 7ЕР1723 KW 7ER1723	2649	08.12.2023
21909175	13.12.2021	230789	КВ 7ФП1991 KW 7FP1991	2649	08.12.2023
21909176	20.12.2021	230790	КВ 9ФЮ1713 KW 9FQ1713	1783	08.12.2023
21909177	20.12.2021	230791	Р07096 CMC R07096 SMS	1783	08.12.2023
21909178	20.12.2021	230792	P14010 P15076 R14010 R15076	1783	08.12.2023
21909180	20.12.2021	230793	P18009 R18009	1783	08.12.2023
21909181	20.12.2021	230794	P20009 R20009	1783	08.12.2023
21909182	20.12.2021	230795	P21020 R21020	1783	08.12.2023
21909183	20.12.2021	230796	P21021 R21021	1783	08.12.2023
21909184	20.12.2021	230797	P21029 R21029	1783	08.12.2023
21909185	20.12.2021	230798	P19013 R19013	1783	08.12.2023
21909186	20.12.2021	230799	P08053 P08068 R08053 R08068	1783	08.12.2023
21909187	20.12.2021	230800	P21028 R21028	1783	08.12.2023
22909029	31.01.2022	231008	P10001 ЦМС R10001 CMS	2558	27.12.2023
22909030	31.01.2022	231009	СДМ74 SDM74	2558	28.12.2023
			МС744301 MS744301		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
22909031	31.01.2022	231010	MC306	2558	28.12.2023
22909032	31.01.2022	231011	MS306	2558	28.12.2023
22909033	31.01.2022	231012	MC255 MS255 МКВ01 МКV01	2558	28.12.2023
<b>Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) – parental component</b>					
21919001	01.04.2021	230495	PE40	1219	27.12.2023
21919002	01.04.2021	230496	RE40	1959	27.12.2023
21919003	01.04.2021	230497	PE36 RE36	1959 1219	27.12.2023
21919004	01.04.2021	230498	PE35 RE35 ФМ144094 FM144094	1219	27.12.2023
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>					
20939054	10.11.2020	230745	ЛЦ658AIP LC658AIR	2743	21.12.2023
20939057	10.11.2020	230746	РГА ІР 3РФ RHA IR 3RF	2743	21.12.2023
20939058	10.11.2020	230747	РХА 5Рф ІР RHA 5Rf IR	2743	21.12.2023
20939117	16.12.2020	230242	ФС75409	1219	27.12.2023
20939118	16.12.2020	230243	ФС75409	1219	27.12.2023
20939119	16.12.2020	230244	ФС74149	1219	27.12.2023
20939120	16.12.2020	230245	ФР842ЛН18 FR842LN18	1219	27.12.2023
20939121	16.12.2020	230246	ФР842ХС17 FR842HS17	1219	27.12.2023
20939123	16.12.2020	230247	ФС78000	1219	27.12.2023
20939124	16.12.2020	230248	ФР84278 FR84278	1219	27.12.2023
20939125	16.12.2020	230249	ФС73040	1219	27.12.2023
20939126	16.12.2020	230250	ФА715ХС11 FA715HS11	1219	27.12.2023
20939127	16.12.2020	230251	ФА741ЛН03 FA741LN03	1219	27.12.2023
20939128	16.12.2020	230252	ФА754ХН04 FA754HN04	1219	27.12.2023
20939129	16.12.2020	230253	ФР84249 FR84249	1219	27.12.2023
21939068	30.11.2021	230749	ФА301ХЦ00 FA301HC00	2649	08.12.2023
21939072	08.12.2021	230828	Х02020А-КЛ H02020A-CL	1219	27.12.2023
21939073	09.12.2021	230829	ФР406ЛС00 FR406LS00	1219	27.12.2023
21939074	09.12.2021	230830	ФС71549	1219	27.12.2023
21939080	09.12.2021	230831	ФР84241 FR84241	1219	27.12.2023
21939081	09.12.2021	230832	ФР84289 FR84289	1219	27.12.2023
21939082	09.12.2021	230833	ФР402ЛЦ00 FR402LC00	1219	27.12.2023
21939106	20.12.2021	230807	ФА754ХС05 FA754HS05	1783	08.12.2023
21939107	20.12.2021	230808	РТ7120 RT7120	1783	08.12.2023
21939111	23.12.2021	230834	РТ7220 RT7220	1219	27.12.2023
21939112	23.12.2021	230835	ФР842ЛН22 FR842LN22	1219	27.12.2023
21939113	23.12.2021	230836	ФА306ЛН00 FA306LN00	1219	27.12.2023
22939006	14.01.2022	230956	ФР407ЛН00 FR407LN00	2554	20.12.2023
22939007	14.01.2022	230957	33566 19303 19303	2554	20.12.2023

## Відомості щодо припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

### Information on the termination of intellectual property rights for plant varieties

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>					
04004082	08180	Сеїді Seiddi	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
07004121	110049	Реаллі КС Realli CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
11004173	150289	Галвані КС Galvani CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
11004174	150290	Деволві КС Devolvi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
11004175	150470	Ланері КС Laperi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009043	170351	Остербі КС Osterbi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009044	170352	Трілоджі ДУО Trilogi DUO	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009045	170353	Аркаді КС Arkadi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009046	170354	Трілоджі КС Trilogi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009047	170355	Катарі КС Katarí CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009048	170356	Коріолі КС Corioli CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009049	170357	Тессалі КС Tessali CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009050	170358	Пінкі КС Pincki CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009051	170359	Белуджі КС Belugí CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009200	170406	Монлері КС Monleri CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009201	170407	ПОРТАЙЛ PORTILE	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009202	170408	Спайсі КС Spruci CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009203	170409	Кампоні КС Kamroni CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14009204	170410	Пажані КС Paganí CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15009073	180870	Малаві КС Malawi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15009069	180929	Конфетті КС Confetti CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
16009092	190045	Глоріфі КС Glorifi CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
17009094	200047	Аденора Adenora	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>					
07017085	10873	Фушія КЛ Fushia CL	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
07017087	110157	Імерія КС Imeria CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
11017096	150400	Шаркс Charks	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
11017099	150401	Марбелія КЛ Marbelia CL	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
07017086	150944	Дюрбан Durban	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
11017101	170615	Генова КЛ Genova CL	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14039036	170639	Крессідія КС Cressidia CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14039037	170640	Європа КЛП Europa CLP	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
14039110	170659	Патріція КЛ Patricia CL	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14039034	180597	Тоскана КС Toscana CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15039069	190276	Натюрела КС Naturela CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15039070	190277	Малага КС Malaga CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
17039100	200322	Аламбра КС Alambra CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
16039079	210099	Каледонія КЛ Kaledonia CL	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter)</b>					
08016064	150388	Нодарі КС Nodari CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
08016065	150389	Тріпті КС Tripti CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12016025	170601	Мазарі КС Mazari CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15040033	190240	Сіртакі КС Sirtaki CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
17040049	200808	Селебріті КС Celebriti CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
<b>Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merr.</i> Soya Bean</b>					
12018002	180750	Банжо КС Banjo CS	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato</b>					
13115044	170538	СВ1521ТД SV1521TD	1852	22.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 22.12.2023 № 2222 (за клопотанням)
13115046	170539	СВ5215ТД SV5215TD	1852	22.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 22.12.2023 № 2222 (за клопотанням)
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays L.</i> Maize, Corn – parental component</b>					
12004008	140847	111Б791Х151Х716 111В791Кх151Кх716	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004009	140848	427Ф785Х48А014 427F785Kh48A014	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004011	140849	13Д514Х14Б001 13D514Kh14B001	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004015	140850	427Ф785Х41Е562 427F785Kh41E562	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004016	140851	25І503ХРПК7250 25I503KhRPK7250	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004017	140852	115Ф848Х14Б001 115F848Kh14B001	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004021	140853	227В539Х227В600 227V539Kh227V600	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004022	140854	111Х863Х111Б791 111Kh863Kh111B791	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004026	140855	19Б169Х13Д514 19B169Kh13D514	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004010	150342	493Е747 493E747	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004012	150343	465Ц653 465C653	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004014	150344	284К817 284K817	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004018	150345	155Р680 155R680	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004020	150509	227Б512Х227В600 227B512Kh227V600	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004023	150510	265С556Х269Ф518 265S556Kh269F518	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909062	170089	446ЖА695 446JA695	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909064	170091	227ЮБ148 227QB148	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909067	170092	422М766СТР 422M766STR	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)

Номер заявки Application number	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата реєстрації припинення права Registration date of the right termination	Підстава On the basis of
14909069	170093	427Ф567 427F567	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909070	170094	497Ц058СТР 497C058STR	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909071	170095	447ЦБ602 447CB602	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909072	170096	48А014 48A014	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909073	170097	111В070 111W070	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909074	170098	112К564 112K564	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909075	170099	117ЦБ343 117CB343	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909217	170131	277ХБ434 277HB434	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909218	170132	117ІБ602 117IB602	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909220	170133	447ЦБ671 447CB671	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909221	170134	111Н863 111H863	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909224	170135	482Р867 482R867	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909065	170449	249Д635Х 48А014 249D635X 48A014	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909222	170486	111В791Х 111Х863 111B791X 111X863	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909223	170487	447ЦБ671Х 447ЦБ602 447CB671X 447CB602	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
14909068	180219	422М766СТРХ 497Ц058СТР 422M766STRX 497C058STR	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15909111	180279	247ВБ319 247VB319	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15909112	180280	441ГН034 441GN034	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
15909113	180281	158ЕЦ474 158EC474	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
16909128	190097	431АГ044 431AG044	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
16909129	190098	279ЖД896 279JD896	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004013	190792	444Л568 444L568	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12004019	190793	224Е772 224E772	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
17909158	200152	444СХ118 444SH118	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
17909161	200155	443УК319 443UK319	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i></b> <b>Rape Seed (Winter) – parental component</b>					
12016042	180550	А97ЕД370 A97ED370	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12016044	180551	А97УЕ365 A97UE365	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12016046	180553	Р04ТС083 R04TS083	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)
12016047	180554	Р02ГТ003 R02GT003	485	08.12.2023	Наказ Мінагрополітики від 08.12.2023 № 2131 (за клопотанням)



## Інші відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

### Other notifications as listed in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2128 від 08.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, стосовно сортів кукурудзи звичайної ДКС3511ВХ (заявка № 10004218), ДКС4590ВХ (заявка № 18009112) щодо зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами), замінивши слова «Кукурудза звичайна (*Zea mays* L.)» словами «Кукурудза восковидна (*Zea mays* var. *ceratina* L.)».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2210 від 20.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослин стосовно сортів рослин згідно з переліком.

#### ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослин	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Павловнія	18649003	Лілов	2022	Закарпатська державна	Інститут аграрних ресурсів та
2	Павловнія	22649001	Лідея	2023	сільськогосподарська дослідна станція	регіонального розвитку Національної
3	Кукурудза звичайна	18009181	ДЗ Спалах	2021	Національної академії аграрних наук України	академії аграрних наук України

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2213 від 20.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в

Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі патентів на сорти рослин, щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

#### ПЕРЕЛІК сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі патентів на сорти рослин

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Запропонована нова назва сорту	Підстава
1	Кукурудза звичайна	17009013	ЛНЗ 3116 (LNZ 3116)	Говард (Hovard)	Клопотання Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» від 06.12.2023 № 278
2	Кукурудза звичайна	17009014	ЛНЗ 3518 (LNZ 3518)	Мелдон (Meldon)	Клопотання Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» від 06.12.2023 № 280
3	Кукурудза звичайна	17009015	ЛНЗ 3317 (LNZ 3317)	Терви (Tervy)	Клопотання Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» від 06.12.2023 № 279

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

## Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
<b>Кукурудза звичайна Zea mays L. Maize, Corn</b>						
19009200	07.12.2023	06.12.2019	ЕС СУБМАРИНА ES SUBMARINE	806	806	бюлетень, випуск 6, 2022
19009202	07.12.2023	06.12.2019	ЕС ТРЕВЕЛЕР ES TRAVELER	806	806	бюлетень, випуск 6, 2022
20009091	14.12.2023	02.11.2020	ЕЮ4139 EU4139	844	844	
20009093	14.12.2023	02.11.2020	ЕВ4665 EV4665	844	844	
20009095	14.12.2023	02.11.2020	ІНФЛЮЕНЦ INFLUENCE	844	844	
20009134	14.12.2023	23.11.2020	ДКС4726 DKC4726	844	844	
20009136	14.12.2023	23.11.2020	ЕВ3738 EW3738	844	844	
20009139	14.12.2023	23.11.2020	ЕВ3077 EV3077	844	844	
20009140	14.12.2023	23.11.2020	ІНТЕРАКТИС INTERAKTIS	844	844	
20009171	07.12.2023	03.12.2020	ЛІДЗ130Ц LID3130C	806	806	бюлетень, випуск 6, 2022
20009172	07.12.2023	03.12.2020	ЛІДЗ306Ц LID3306C	2890	2890	
20009175	21.12.2023	03.12.2020	ЕС320103 ESZ20103	806	806	бюлетень, випуск 6, 2022
20009176	07.12.2023	03.12.2020	ЕС Філдголд ES Fieldgold	2890	2890	
20009177	21.12.2023	03.12.2020	ЕС320208 ESZ20208	806	806	бюлетень, випуск 6, 2022
20009198	29.12.2023	15.12.2020	Алатус Alatus	2676	2676	
20009226	29.12.2023	29.12.2020	A8810 A8810	2760	2760	
20009227	29.12.2023	29.12.2020	A9011 A9011	2760	2760	
21009013	07.12.2023	21.01.2021	Арго Arho	1581	1581	бюлетень, випуск 4, 2023
21009016	07.12.2023	25.01.2021	Гарт Hart	1581 2260	1581 2260	бюлетень, випуск 4, 2023
21009036	14.12.2023	02.03.2021	Хунта Khunta	2784 2785	2784 2785	
21009041	14.12.2023	07.04.2021	Мірісса Mirissa	2793	2793	
21009080	21.12.2023		ЦИТАДЕЛЬ CITADEL	2720	2720	
21009081	21.12.2023		МАС 333Т MAS 333T	2720	2720	
21009082	21.12.2023		БУРБОН BOURBON	2720	2720	
21009085	21.12.2023		МАС 282К MAS 282K	2720	2720	
21009088	18.12.2023	16.11.2021	Ерекорн Erekorn	2742	2742	
21009089	18.12.2023	16.11.2021	Ерест Erest	2742	2742	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21009092	07.12.2023		СИ АМФОРА SY AMFORA	2644	1959	
21009093	07.12.2023		СИ ЕЛЕНОР SY HELENOR	2643	1219	
21009094	07.12.2023		СПЕКТРАЛ SPECTRAL	2643	1219	
21009095	07.12.2023		СИ ТОПАЗ SY TOPAZE	2643	1219	
21009096	07.12.2023		СИ ДІПЛОМАТ SY DIPLOMAT	2643	1219	
21009097	07.12.2023		СИ ФАБІО SY FABIO	2643	1219	
21009126	22.12.2023	16.12.2021	Тоналіт Tonalit	2890	2890	
21009127	22.12.2023	16.12.2021	Санбїрд Sunbird	2890	2890	
21009129	22.12.2023	16.12.2021	ЛІД4040Ц LID4040C	2890	2890	
21009130	22.12.2023	16.12.2021	Коконат Cocunut	2890	2890	
21009132	22.12.2023	16.12.2021	Кїнгстоун Kingstone	2890	2890	
21009134	22.12.2023	16.12.2021	Калькута Kalkuta	2890	2890	
21009135	22.12.2023	16.12.2021	Вїнтерстоун Winterstone	2890	2890	
21009154	29.12.2023	21.12.2021	ДОНЕРІККС DONERIXX	1783	1783	
21009155	29.12.2023	21.12.2021	АФК Гроуз AFK Hrouz	655	655	
21009156	29.12.2023	21.12.2021	АФК Фреш AFK Fresh	655	655	
21009157	29.12.2023	21.12.2021	Голд 220 Hold 220	2251	2251	
21009158	29.12.2023	21.12.2021	Голд 300 Hold 300	2251	2251	
21009159	14.12.2023	22.12.2021	Рекольт Rekolt	2849	2514	
21009160	14.12.2023	22.12.2021	Паттерн Pattern	2849	2514	
21009161	14.12.2023	22.12.2021	Коїн Koın	2849	2514	
21009162	14.12.2023	22.12.2021	Клеонс Kleons	2849	2514	
22009001	18.12.2023	06.01.2022	Такт Takt	2794 921	2260 921	
22009002	18.12.2023	06.01.2022	Альт Alt	2794 921	2260 921	
22009003	18.12.2023	06.01.2022	Мелодїя Melodiia	2794 921	921 2260	
22009004	21.12.2023	11.01.2022	КМ 5960 KM 5960	2257	2257	
22009005	21.12.2023	11.01.2022	КМ 2020 KM 2020	2257	2257	
22009006	21.12.2023	12.01.2022	КМ 2165 KM 2165	2257	2257	
22009007	21.12.2023	12.01.2022	КМ 3182 KM 3182	2257	2257	
22009008	21.12.2023	12.01.2022	КМ 3490 KM 3490	2257	2257	
22009009	21.12.2023	12.01.2022	ГРОВІКС GROWIX	2257	2257	
22009010	21.12.2023	12.01.2022	КМ 5710 KM 5710	2257	2257	
22009011	21.12.2023	12.01.2022	КМ 2170 KM 2170	2257	2257	
22009012	21.12.2023	12.01.2022	КМ 3131 KM 3131	2257	2257	
22009018	18.12.2023	13.01.2022	ДН Сїнтоле DN Sintole	2794	2260	
22009019	18.12.2023	13.01.2022	ДН Фонд DN Fond	2794	2260	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22009020	18.12.2023	13.01.2022	ДН Летава DN Letava	2794	2260	
22009024	29.12.2023	22.02.2031	ДМС Траян DMS Traian	2558	2558	
22009025	29.12.2023	31.01.2022	ДМС Таргет DMS Tarhet	2558	2558	
22009026	29.12.2023	31.01.2022	ДМС Таллер DMS Taller	2558	2558	
22009028	29.12.2023	22.02.2031	Гермес Hermes	2558 2761	2558 2761	
22009029	29.12.2023	31.01.2022	ДМС Тріод DMS Triod	2558	2558	
22009033	07.12.2023		Візібл Visible	2569	2569	
22009034	07.12.2023		Фармюллер Farmueller	2569	2569	
22009040	29.12.2023	31.03.2022	АС 240 AS 240	2871	2871	
22009049	29.12.2023	08.04.2022	Рубікон Rubikon	2873	2873	
23009006	22.12.2023	09.01.2023	Селеріна Celerina	2890	2890	
23009069	22.12.2023	20.11.2023	РЖТ АЛІККС ДУО RGT ALYXX DUO	1783	1783	
23009082	22.12.2023		ЕШЛІ ASHLEY	793	793	
23009083	22.12.2023	05.12.2023	КЛУНІ CLOONEY	793	793	
23009085	22.12.2023		БЛЕНДІН BLANDEEN	793	793	
23009098	22.12.2023		ЛГ31245 LG21245	793	793	
23009099	22.12.2023		ЛГ31228 LG31228	793	793	
23009102	22.12.2023		ЛГ31280 LG31280	793	793	
23009103	22.12.2023		ЛГ31217 LG31217	793	793	
23009108	22.12.2023	05.12.2023	ЕГЛАНТИН EGLANTEEN	793	793	
23009109	22.12.2023		ЛГ30258 LG30258	793	793	
23009110	22.12.2023		ЛГ31207 LG31207	793	793	
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum</b>						
20018002	07.12.2023	09.01.2020	АДВ Ф8322 ADV F8322	2834	2554	бюлетень, випуск 3, 2023
20018003	07.12.2023	09.01.2020	АДВГ 1329 ADVG 1329	2834	2554	бюлетень, випуск 3, 2023
20018010	07.12.2023	04.12.2020	ЕС МОНСУН ES MONSOON	806	806	
20018013	07.12.2023	30.12.2020	АДВ Ф7103 ADV F7103	2834	2554	
20018014	07.12.2023	30.12.2020	АДВГ 2168 ІГ ADVG 2168 IG	2834	2554	
20018015	07.12.2023	30.12.2020	У55045 U55045	2834	2554	
21018003	07.12.2023		ДЖАМІ JAMI	2838	2838	
21018004	22.12.2023		ГІГАНТ GIGANT	2838	2838	
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>						
23020005	07.12.2023	20.11.2023	СБ Скорє CB Score	1797	1797	
<b>Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean</b>						
21025001	14.12.2023	07.09.2021	Садгорянка Sadhorianka	2723	2723	бюлетень, випуск 6, 2023

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>						
20039076	22.12.2023	03.12.2020	1003Л 1003L	806	806	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21039005	07.12.2023	16.01.2021	Хорив Khoruv	1581	1581	бюлетень, випуск 4, 2023
21039006	07.12.2023	16.01.2021	Яскравий Yaskravuyi	1581	1581	бюлетень, випуск 4, 2023
21039019	14.12.2023		НА Актар NA Aktar	2204	2204	
21039020	14.12.2023	24.09.2021	НА Тасумо NA Tasumo	2204	2204	
21039024	14.12.2023	24.09.2021	НА Акрас NA Akras	2204	2204	
21039025	14.12.2023	24.09.2021	НА Кайрос NA Kairos	2204	2204	
21039026	14.12.2023	24.09.2021	НА Тесан NA Tiesan	2204	2204	
21039027	14.12.2023	24.09.2021	НА Юміс NA IUmis	2204	2204	
21039028	14.12.2023	24.09.2021	НА Альтаір NA Altair	2204	2204	
21039096	14.12.2023	20.12.2021	Людмила Ludmilla	1783	1783	
21039098	14.12.2023	20.12.2021	Джерсі Jersey	1783	1783	
21039109	07.12.2023	29.12.2021	Ф4413В0 F4413V0	2195	2195	
21039110	07.12.2023	29.12.2021	Ф2687 ЦЛ F2687 TsL	2195	2195	
21039113	21.12.2023	30.12.2021	Са Лана Sa Lana	1517	1517	
22039001	18.12.2023	05.01.2022	М94С35 M94S35	273	273	
22039003	21.12.2023	11.01.2022	КС 4100 імі KS 4100 imi	2257	2257	
22039004	21.12.2023	11.01.2022	КС 5210 KS 5210	2257	2257	
22039007	14.12.2023	14.01.2022	ХАЙСАН 151 HYSUN 151	2834	2554	
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean</b>						
20045046	21.12.2023	03.12.2020	КСЖ 19005 CSJ 19005	2653	485	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20045052	14.12.2023		Сахара Sahara	912	912	
21045001	07.12.2023	04.01.2021	Господиня Hospodynia	1581	1581	бюлетень, випуск 4, 2023
21045013	14.12.2023	02.12.2021	ПР2204 PR2204	142	142	
21045014	14.12.2023	02.12.2021	Мая Maia	142	142	
21045015	14.12.2023	02.12.2021	СВХ20Т00С4 SVX20T00S4	2061	2061	
21045016	14.12.2023	02.12.2021	ПР2202 PR2202	142	142	
21045017	14.12.2023	02.12.2021	ПР2203 PR2203	142	142	
21045033	21.12.2023	22.12.2021	АФК Фест AFK Fest	655	655	
21045034	21.12.2023	22.12.2021	АФК Темпо AFK Tempo	655	655	
21045035	21.12.2023	22.12.2021	АФК Спрін AFK Sprin	655	655	
22045014	29.12.2023	07.02.2022	ДМ АМБАР DM AMBAR	2863	2863	
22045015	29.12.2023	07.02.2022	ФАНТИНЕ FANTINE	2863	2863	
22045016	29.12.2023	07.02.2022	ФРИНЕ FRINE	2863	2863	
22045017	29.12.2023	07.02.2022	ФІОРЕЛЛА FIORELLA	2863	2863	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22045018	29.12.2023	07.02.2022	ДМ ЕАСТИНА DM EASTINA	2863	2863	
23045018	13.12.2023		ПРОЦЕРА 1020 PROCERA 1020	2788	2788	
23045020	22.12.2023	20.11.2023	САНКАРА SANKARA	1783	1783	
<b>Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>attissima</i> Doell</b> <b>Sugar Beet</b>						
21069013	29.12.2023		БТС 1920 BTS 1920	1974	1974	
21069015	29.12.2023		БТС 4685 Н BTS 4685 N	1974	1974	
21069020	29.12.2023		БТС 2645 BTS 2645	1974	1974	
21069021	29.12.2023		БТС СМАРТ 9685 BTS SMART 9685	1974	1974	
21069022	29.12.2023		МАРУН MAROON	1628	1628	
21069023	29.12.2023		ТОТЕМ TOTEM	1628	1628	
21069032	07.12.2023	23.12.2021	ФД Крампон FD Crampton	796	796	
21069033	07.12.2023	23.12.2021	ФД Стартер Смарт FD Starter Smart	796	796	
23069007	07.12.2023		Заппа Zappa	2552	2552	
23069008	07.12.2023		Ріголетто Rigoletto	2552	2552	
23069009	22.12.2023		СМАРТ ПЕРЛА КВС SMART PERLA KWS	2649	2649	
<b>Коноплі посівні <i>Cannabis sativa</i> L.</b> <b>Нерп</b>						
22080001	29.12.2023	22.02.2022	Орловські Orlovski	2430	2430	
<b>Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.</b> <b>Sweet Corn</b>						
21103007	07.12.2023		ФАЕСТАР FIRESTAR	2643	1219	
<b>Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L.</b> <b>Onion, Echalion</b>						
18106002	18.12.2023		Контадо Contado	2086	2086	
19106006	18.12.2023		Купідо Cupido	2086	2086	
<b>Цибуля шалот <i>Allium oschaninii</i> O. Fedtsch.</b> <b>Shallot, Grey Shallot</b>						
23107001	14.12.2023	26.04.2023	Шелія Schelia	1997	1997	
<b>Морква <i>Daucus carota</i> L.</b> <b>Carrot</b>						
23109002	18.12.2023		КУРОДА ПАУЕР KURODA POWER	1833	1833	
23109005	22.12.2023		Каталіна Catalina	751	751	
<b>Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L.</b> <b>Cucumber</b>						
22110008	21.12.2023	01.12.2022	ФРОСТ FROST	1852	1852	
23110006	29.12.2023	01.08.2023	Хелен Helene	1833	1833	
23110011	14.12.2023	20.09.2023	Герміна Hermina	1997	1997	
<b>Пастернак <i>Pastinaca sativa</i> L.</b> <b>Parsnip</b>						
23111001	14.12.2023	02.05.2023	Камо Kamo	1997	1997	
<b>Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annuum</i> L.</b> <b>Sweet Pepper, Paprika</b>						
22113006	22.12.2023		Раєн Rajen	1997	1997	
22113007	22.12.2023		Гранова Granova	1997	1997	
22113008	22.12.2023		Онтара Ontara	1997	1997	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22113009	22.12.2023		Рела Rela	1997	1997	
22113010	22.12.2023		Андреа Andrea	1997	1997	
23113006	29.12.2023	01.08.2023	Ред Феррарі Red Ferrari	1833	1833	
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato</b>						
23115025	18.12.2023		Хайнц2123 Heinz2123	3233	3233	
23115026	18.12.2023		Хайнц5108 Heinz5108	3233	3233	
<b>Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean</b>						
23127002	28.12.2023	26.06.2023	Бергголд Berggold	1163		
23127003	28.12.2023		Топкроп Topcrop	1163		
<b>Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach</b>						
23130002	28.12.2023		Матадор Matador	1163		
<b>Капуста брокколи <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. Calabrese, Sprouting Broccoli</b>						
23136001	18.12.2023		Тритон Triton	1833	1833	
23136002	18.12.2023		Арес Ares	1833	1833	
<b>Фацелія пижмолиста <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth. Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell</b>						
23161001	29.12.2023	08.12.2023	ФОЛІС FOLIS	3227	3227	
<b>Буряк кормовий <i>Beta vulgaris</i> L. Fodder Beet</b>						
23166001	22.12.2023		ГУСТЕЯ КВС GUSTEA KWS	2649	2649	
<b>Редька олійна <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Fodder Radish</b>						
23218001	29.12.2023	08.12.2023	САТІС SATIS	3227	3227	
<b>Гірчиця чорна <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch Black Mustard</b>						
23219001	29.12.2023	08.12.2023	МЕДІВА MEDIVA	3227	3227	
<b>Сорго суданське <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf Sudan Grass</b>						
21227001	29.12.2023	23.11.2021	Альтура Altura	2805 2806	2805 2806	
<b>Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L. Apricot</b>						
23256001	29.12.2023		Голдріч Goldrich	3218	3218	
<b>Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear</b>						
20258002	18.12.2023	16.11.2020	СХ 201 CH 201	2744	2744	
<b>Черешня <i>Prunus avium</i> L. Sweet Cherry</b>						
23262001	14.12.2023		Джаєнт Ред Giant Red	3208	3208	
<b>Обліпиха крушиновидна <i>Hippophae rhamnoides</i> L. Common Sea Buckthorn</b>						
18299009	29.12.2023		Оляна Oliana	1601 2480	1601 2480	
21299003	29.12.2023	02.12.2021	Абориген Aboryhen	1601	1601	
<b>Калина звичайна <i>Viburnum opulus</i> L. Snowball Tree</b>						
21303001	29.12.2023	02.12.2021	Ярославна Yaroslavna	1601	1601	бюлетень, випуск 11, 2023
21303002	29.12.2023	02.12.2021	Гармонія Harmoniia	1601	1601	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
<b>Люцерна мінлива <i>Medicago × varia</i> Martyn</b> <b>Hybrid Lucerne</b>						
20364001	18.12.2023	02.01.2020	Струмочок Strumochok	3221	3221	
20364003	21.12.2023	06.10.2020	Янтарна Yantarna	1626	1626	
20364004	21.12.2023	06.10.2020	Індіго Indiho	1626	1626	
<b>Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L.</b> <b>White Mustard</b>						
23380002	29.12.2023	08.12.2023	САЛЬФА SALFA	3227	3227	
<b>Калістефус китайський <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees</b> <b>China Aster</b>						
23415001	07.12.2023	07.02.2023	Яскрава Yaskrava	1601	1601	бюлетень, випуск 11, 2023
<b>Костриця овеча <i>Festuca ovina</i> L.</b> <b>Sheep's Fescue</b>						
21473002	21.12.2023	12.11.2021	Блискавка Blyskavka	1626	1626	
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L.</b> <b>Maize, Corn – parental component</b>						
20909106	14.12.2023	02.11.2020	V34363 V3436Z	844	844	
20909109	14.12.2023	02.11.2020	ДЖ13753 J1375Z	844	844	
20909111	21.12.2023		СМС6466 CMS6466	2720	2720	
20909113	21.12.2023		ССС6475 CSC6475	2720	2720	
20909143	14.12.2023	23.11.2020	М38403 M3840Z	844	844	
20909145	14.12.2023	23.11.2020	В46643 V4664Z	844	844	
20909147	14.12.2023	23.11.2020	В42703 V4270Z	844	844	
20909238	29.12.2023	29.12.2020	АТ1635 AT1635	2760	2760	
20909239	29.12.2023	29.12.2020	АК335 AK335	2760	2760	
20909240	29.12.2023	29.12.2020	ЗМ446 ZM446	2760	2760	
21909027	07.12.2023		БКс19С023 BX19S023	2569	2569	
21909031	07.12.2023		СМ395 СМ440 SM395 SM440	2569	2569	
21909036	07.12.2023		БКс14Н037 BX14N037	2569	2569	
21909044	14.12.2023	02.03.2021	ВМ 465 VVM 465	2784 2785	2784 2785	
21909045	14.12.2023	02.03.2021	ВМ 01 VVM 01	2784 2785	2784 2785	
21909046	29.12.2023	01.03.2021	ДА 48 DA 48	2787	2787	
21909052	07.12.2023		СМ 395 СМ 303 SM 395 SM 303	2569	2569	
21909053	07.12.2023		СМ 305 SM 305	2569	2569	
21909054	07.12.2023		СМ 307 SM 307	2569	2569	
21909055	07.12.2023		СМ 425 SM 425	2569	2569	
21909057	07.12.2023		СМ 636 SM 636	2569	2569	
21909058	07.12.2023		СМ 637 SM 637	2569	2569	
21909059	07.12.2023		СМ 658 SM 658	2569	2569	
21909065	14.12.2023	07.04.2021	КМ 234 KM 234	2793	2793	
21909066	14.12.2023	07.04.2021	КР 05 KP 05	2793	2793	



## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21909087	21.12.2023	11.10.2021	HA 231BC NA 231VS	2204	2204	
21909088	21.12.2023	11.10.2021	HA 380BM NA 380VM	2204	2204	
21909089	21.12.2023	11.10.2021	Союз М Soiuz M	2204	2204	
21909090	21.12.2023	11.10.2021	Дружба С Druzhba S	2204	2204	
21909132	21.12.2023	08.11.2021	ЛРБ6379 LRB6379	2720	2720	
21909134	21.12.2023	05.11.2021	ЛЮН2444 LJN2444	2720	2720	
21909135	21.12.2023	08.11.2021	ЛПХ3915 LRH3915	2720	2720	
21909136	21.12.2023	08.11.2021	ЛПФ3933 LPF3933	2720	2720	
21909138	18.12.2023	16.11.2021	В 781 СВ V 781 SV	2742	2742	
21909139	18.12.2023	16.11.2021	Ерена С Erena S	2742	2742	
21909140	18.12.2023	16.11.2021	В 753 зс V 753 zs	2742	2742	
21909141	18.12.2023	16.11.2021	В 772 с V 772 s	2742	2742	
21909142	18.12.2023	16.11.2021	В 7471 СВ V 7471 SV	2742	2742	
21909143	18.12.2023	16.11.2021	В 736 зс V 736 zs	2742	2742	
21909144	18.12.2023	16.11.2021	В 772 зс V 772 zs	2742	2742	
21909145	18.12.2023	16.11.2021	Ерая С Eraia S	2742	2742	
21909146	18.12.2023	16.11.2021	В 1485 зс V 1485 zs	2742	2742	
21909148	07.12.2023	29.11.2021	АРА2528 ARA2528	2644	1959	
21909149	07.12.2023	29.11.2021	ГЕІКС1770 GEIX1770	2644	1959	
21909150	07.12.2023	29.11.2021	ЦІД2455 CID2455	2643	1219	
21909151	07.12.2023	29.11.2021	ЦІД2457 ЦІД2455 CID2457 CID2455	2643	1219	
21909152	07.12.2023	29.11.2021	ЕГІД3959 EGID3959	2643	1219	
21909153	07.12.2023	29.11.2021	ФСАКС3928 FSAX3928	2643	1219	
21909154	07.12.2023	29.11.2021	ФСІД3818 FSID3818	2643	1219	
21909155	07.12.2023	29.11.2021	БАА1197 BAA1197	2643	1219	
21909176	29.12.2023	20.12.2021	Р07096 СМС R07096 SMS	1783	1783	
21909177	29.12.2023	20.12.2021	Р14010 Р15076 R14010 R15076	1783	1783	
21909178	29.12.2023	20.12.2021	Р18009 R18009	1783	1783	
21909180	29.12.2023	20.12.2021	Р20009 R20009	1783	1783	
21909181	29.12.2023	20.12.2021	Р21020 R21020	1783	1783	
21909182	29.12.2023	20.12.2021	Р21021 R21021	1783	1783	
21909183	29.12.2023	20.12.2021	Р21029 R21029	1783	1783	
21909184	29.12.2023	20.12.2021	Р19013 R19013	1783	1783	
21909185	29.12.2023	20.12.2021	Р08053 Р08068 R08053 R08068	1783	1783	
21909186	29.12.2023	20.12.2021	Р21028 R21028	1783	1783	
21909187	29.12.2023	20.12.2021	Р10001 ЦМС R10001 CMS	1783	1783	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21909188	29.12.2023	21.12.2021	АФК 0121 AFK 0121	655	655	
21909189	29.12.2023	21.12.2021	АФК 0321 AFK 0321	655	655	
21909194	14.12.2023	22.12.2021	РЛ272 СВ RL272 SV	2849	2514	
21909195	14.12.2023	22.12.2021	РЛ2275 МВ RL2275 MV	2849	2514	
21909196	14.12.2023	22.12.2021	С274 СВ S274 SV	2849	2514	
21909197	14.12.2023	22.12.2021	С17 СВ S17 SV	2849	2514	
21909198	14.12.2023	22.12.2021	СГ776 Мст SH776 Mst	2849	2514	
21909199	14.12.2023	22.12.2021	СГ292 Сст SH292 Sst	2849	2514	
21909200	29.12.2023	22.12.2021	АФК 0221 AFK 0221	655	655	
22909001	14.12.2023	11.01.2022	КЮІА320В І00374 QIA320V I00374	793	793	
22909002	14.12.2023	11.01.2022	КЮЛЦ99ФФ QLC99FF	793	793	
22909005	14.12.2023	11.01.2022	ПРЦ12ФФ PRC12FF	793	793	
22909006	14.12.2023	11.01.2022	КЮЛБ34ІВ ПДА01ВІ QLB34IV PDA01VI	793	793	
22909007	14.12.2023	11.01.2022	РФЦ61ББ RFC61BB	793	793	
22909009	21.12.2023	11.01.2022	ПК 1931 PK 1931	2257	2257	
22909010	21.12.2023	11.01.2022	ПВК 1408 PVK 1408	2257	2257	
22909011	21.12.2023	11.01.2022	СМК 201 SMK 201	2257	2257	
22909012	21.12.2023	12.01.2022	НКЗ 1206 NKZ 1206	2257	2257	
22909013	21.12.2023	12.01.2022	ПК 1838 PK 1838	2257	2257	
22909017	18.12.2023	13.01.2022	ДК2239МВ DK2239MV	2794	2260	
22909018	18.12.2023	13.01.2022	ДК2329 ЗСЗМ DK2329 ZSZM	2794	2260	
22909019	18.12.2023	13.01.2022	Крос269С Kros269S	2794	2260	
22909020	18.12.2023	13.01.2022	ДК2525СВЗМ DK2525SVZM	2794	2260	
22909021	18.12.2023	13.01.2022	ДК3643СВЗМ DK3643SVZM	2794	2260	
22909022	18.12.2023	13.01.2022	ДК2663С DK2663S	2794	2260	
22909023	18.12.2023	13.01.2022	Крос202С Kros202S	2794	2260	
22909024	18.12.2023	13.01.2022	Крос350С Kros350S	2794	2260	
22909029	29.12.2023	31.01.2022	СДМ74 SDM74	2558	2558	
22909030	29.12.2023	31.01.2022	МС744301 MS744301	2558	2558	
22909031	29.12.2023	31.01.2022	МС306 MS306	2558	2558	
22909032	29.12.2023	31.01.2022	МС255 MS255	2558	2558	
22909033	29.12.2023	31.01.2022	МКВ01 MKV01	2558	2558	
22909043	07.12.2023		СМ 667 SM 667	2569	2569	
22909050	07.12.2023		СМ 306 SM 306	2569	2569	
22909051	07.12.2023		СМ 360 SM 360	2569	2569	
22909053	07.12.2023		СМ 224 SM 224	2569	2569	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22909054	07.12.2023		CM 360 CM 224 SM 360 SM 224	2569	2569	
22909059	29.12.2023	13.03.2022	АБ 25 AB 25	2871	2871	
22909060	29.12.2023	13.03.2022	AM 15 AM 15	2871	2871	
22909137	29.12.2023	14.12.2022	P18021 R18021	1783	1783	
22909138	29.12.2023	14.12.2022	P19017 R19017	1783	1783	
22909193	29.12.2023	14.12.2022	P11002 R11002	1783	1783	
22909194	29.12.2023	14.12.2022	P10034 R10034	1783	1783	
23909042	13.12.2023	03.02.2023	IBB666 IVV666	793	793	
23909043	13.12.2023	03.02.2023	PВЛ173 RVL173	793	793	
23909044	13.12.2023	03.02.2023	PBI323 RVI323	793	793	
23909045	13.12.2023	03.02.2023	PBI441 RVI441	793	793	
23909047	13.12.2023	03.02.2023	КЮКЮА28BI QQA28VI	793	793	
23909048	13.12.2023	03.02.2023	ЛІМІВВ957 LIMIVV957	793	793	
23909050	14.12.2023	02.03.2023	СГ1035 SH1035	2849	2514	
23909051	14.12.2023	02.03.2023	С3025 MB S3025 MV	2849	2514	
23909052	14.12.2023	02.03.2023	CA1311 СВзМ SA1311 SVzM	2849	2514	
23909053	14.12.2023	01.03.2023	СГ1135 Мст SH1135 Mst	2849	2514	
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>						
20939054	07.12.2023	10.11.2020	ЛЦ658AIR LC658AIR	2743	2743	бюлетень, випуск 11, 2023
20939057	07.12.2023	10.11.2020	РГА ІР ЗРФ RHA IR 3RF	2743	2743	бюлетень, випуск 11, 2023
20939058	07.12.2023	10.11.2020	РХА 5РФ ІР RHA 5RF IR	2743	2743	бюлетень, випуск 11, 2023
20939105	22.12.2023	04.12.2020	P13CC3MЖ R13SS3MJ	1435	1435	
20939122	29.12.2023	16.12.2020	ФР84259 FR84259	2643	1219	
20939137	21.12.2023	24.12.2020	СС 2019 SS 2019	2257	2257	
20939175	29.12.2023	31.12.2020	ДК 22 А DK 22 A	2766	2766	
20939176	29.12.2023	31.12.2020	ДК 22 Б DK 22 B	2766	2766	
21939019	21.12.2023	30.03.2021	НР 0041В NR 0041V	2204	2204	
21939020	21.12.2023	30.03.2021	НР 0111В NR 0111V	2204	2204	
21939021	21.12.2023	30.03.2021	НР 0031В NR 0031V	2204	2204	
21939030	21.12.2023	08.11.2021	ТРХ5190Р TRH5190R	2720	2720	
21939031	21.12.2023	05.11.2021	ТРС5270Р TRC5270R	2720	2720	
21939032	21.12.2023	05.11.2021	ТРС5263Р TRS5263R	2720	2720	
21939033	21.12.2023	05.11.2021	ТРО5033Р TRO5033R	2720	2720	
21939058	14.12.2023	23.11.2021	Ф5ДН3М2А F5DN3M2A	1435	1435	
21939059	14.12.2023	23.11.2021	Ф10Б32М20А F10BZ2M20A	1435	1435	
21939060	14.12.2023	23.11.2021	СФ2615МЖІА SF2615MJIA	1435	1435	

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21939061	14.12.2023	23.11.2021	P16EI3M R16EI3M	1435	1435	
21939062	14.12.2023	23.11.2021	P16PC1MЖК R16PC1MJK	1435	1435	
21939063	14.12.2023	23.11.2021	P4HP8M2Ж R4NP8M2J	1435	1435	
21939064	14.12.2023	23.11.2021	P5PE4MЖ R5PE4MJ	1435	1435	
21939065	14.12.2023	23.11.2021	P143E2MЖ0 R14ZE2MJO	1435	1435	
21939066	14.12.2023	23.11.2021	P5PE4MK R5PE4MK	1435	1435	
21939067	14.12.2023	23.11.2021	P4HX1MI R4NX1MI	1435	1435	
21939083	21.12.2023	13.12.2021	TR15567P TR15567R	2720	2720	
21939106	14.12.2023	20.12.2021	PT7120 RT7120	1783	1783	
21939107	14.12.2023	20.12.2021	PT7220 RT7220	1783	1783	
21939115	07.12.2023	28.12.2021	PX569CYЛ RH569SUL	2267	2267	
21939116	07.12.2023	28.12.2021	PX789CYЛ RH789SUL	2267	2267	
22939001	21.12.2023	11.01.2022	CT 1922 ST 1922	2257	2257	
22939006	07.12.2023	14.01.2022	33566 33566	2834	2554	
22939007	07.12.2023	14.01.2022	19303 19303	2834	2554	
22939009	14.12.2023		XP3222PP HP3222PR	2256	2256	
22939047	29.12.2023	14.12.2022	PT6920 RT6920	1783	1783	
22939048	29.12.2023	14.12.2022	AT1720 AT1720	1783	1783	
22939049	29.12.2023	14.12.2022	AT1119 AT1119	1783	1783	
22939055	29.12.2023	14.12.2022	PT7521 RT7521	1783	1783	
22939056	29.12.2023	14.12.2022	PT5919 RT5919	1783	1783	
23939042	07.12.2023		70004Pсуол 70004Rsuol	2890	2890	

## Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
<b>Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell</b> <b>Sugar Beet</b>					
21069027	23.12.2021	231129	ЯНАСОФІЯ КВС JANASOFIJA KWS	2649	08.12.2023
21069028	23.12.2021	231130	СМАРТ МАТЕРІЯ КВС SMART MATERIA KWS	2649	08.12.2023
21069030	23.12.2021	231127	СМАРТ ЛІЄННА КВС SMART LIENNA KWS	2649	08.12.2023
21069031	23.12.2021	231131	СМАРТ МОДЕНТА КВС SMART MODENTA KWS	2649	08.12.2023
21069034	23.12.2021	231128	САЛЬВАТОРІКА КВС SALVATORICA KWS	2649	08.12.2023
21069024	23.12.2021	231132	БАЛАНСІЯ КВС BALANCIA KWS	2649	08.12.2023
<b>Виноград справжній <i>Vitis vinifera</i> L.</b> <b>Grape, Grapevine</b>					
21304007	13.10.2021	231047	АРРАТВЕНТІНАЙН ARRATWENTYNINE	2824	11.12.2023
21304008	18.10.2021	231141	АРРАСЬОРТИ ARRATHIRTY	2824	11.12.2023
<b>Гарбуз звичайний <i>Cucurbita pepo</i> L.</b> <b>Pumpkin</b>					
23150001	19.10.2023	230997	Енцо Enzo	2011	21.12.2023
<b>Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch.</b> <b>Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin</b>					
22228001	16.02.2022	231137	Спеллкаст Spellcast	840	05.12.2023
<b>Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L.</b> <b>White Mustard</b>					
20380001	04.11.2020	231048	Вероніка Veronika	2726	04.12.2023
<b>Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.</b> <b>Cauliflower</b>					
21101002	18.11.2021	230942	ЕЛЕКТРА ELECTRA	1050	27.12.2023
21101004	19.11.2021	230943	КЛЕМЕНТИН CLEMENTINE	1050	27.12.2023
21101005	19.11.2021	230944	ДЕПУРПЛ DEPURPLE	1219	27.12.2023
<b>Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L.</b> <b>French Bean</b>					
20127009	17.12.2020	230945	ЕСКАДРОН ESCADRON	1959	27.12.2023
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L.</b> <b>Maize, Corn</b>					
22009031	18.02.2022	231168	КС99ХП KS99XP	2829	05.12.2023
23009059	19.10.2023	230999	СЛ Енормо SL Enormo	2011	21.12.2023
21009125	08.12.2021	231125	КВС АДНАНО KWS ADNANO	2649	08.12.2023
21009143	20.12.2021	231016	СІКСТІНА SIXTINA	1783	08.12.2023
21009144	20.12.2021	231017	РЖТ ЗАНЕТІККС ДУО RGT ZANETIXX DUO	1783	08.12.2023
21009147	20.12.2021	231018	РЖТ Велюкко RGT Veluxxo	1783	08.12.2023
21009148	20.12.2021	231019	РЖТ ПРОДУККСІОН RGT PRODUXXION	1783	08.12.2023
21009149	20.12.2021	231020	РЖТ ЕЛЕККС RGT ALEXX	1783	08.12.2023
21009152	21.12.2021	231022	РЖТ ГЮККСО RGT HUXXO	1783	08.12.2023
22009030	18.02.2022	231167	КС94ХП KS94XP	2829	05.12.2023
22009032	18.02.2022	231169	КС85ХП KS85XP	2829	05.12.2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22009045	06.04.2022	231171	Лізавета Lisaveta	2829	05.12.2023
22009046	06.04.2022	231172	Валета Valeta	2829	05.12.2023
22009047	06.04.2022	231173	Роланда Rolanda	2829	05.12.2023
22009048	06.04.2022	231174	Арабелла Arabella	2829	05.12.2023
22009091	01.12.2022	231024	ДКС4031 DKC4031	844	07.12.2023
21009124	08.12.2021	231124	КВС АКАДО KWS ACADO	2649	08.12.2023
23009058	19.10.2023	230998	Магнато Magnato	2011	21.12.2023
21009151	21.12.2021	231021	РЖТ Волкокс RGT Volcoxx	1783	08.12.2023
23009060	19.10.2023	231000	Лігато Ligato	2011	21.12.2023
22009130	14.12.2022	231025	РЖТ СЕДЕКС RGT CEDEX	1783	08.12.2023
21009092	29.11.2021	231192	СИ АМФОРА SY AMFORA	1959	27.12.2023
21009153	21.12.2021	231023	РЖТ Аксіональ RGT Axional	1783	08.12.2023
21009123	08.12.2021	231123	КВС МАУРІЛІО KWS MAURILIO	2649	08.12.2023
20009168	03.12.2020	230504	АСТРИНГА ASTRINGA	2436	04.12.2023
20009168	03.12.2020	230504	АСТРИНГА ASTRINGA	2726	04.12.2023
20009169	03.12.2020	230505	АЛАБАНГА ALABANGA	2726	04.12.2023
21009093	29.11.2021	231193	СИ ЕЛЕНОР SY HELENOR	1219	27.12.2023
21009094	29.11.2021	231194	СПЕКТРАЛ SPECTRAL	1219	27.12.2023
21009095	29.11.2021	231195	СИ ТОПАЗ SY TOPAZE	1219	27.12.2023
21009096	29.11.2021	231196	СИ ДІПЛОМАТ SY DIPLOMAT	1219	27.12.2023
21009097	29.11.2021	231197	СИ ФАБІО SY FABIO	1219	27.12.2023
21009112	08.12.2021	231113	КВС ВОЛЬТАРІО KWS VOLTARIO	2649	08.12.2023
21009118	08.12.2021	231119	КВС БОЛІВІАНО KWS BOLIVIANO	2649	08.12.2023
21009122	08.12.2021	231122	КВС ГАЛІЛЕО KWS GALILEO	2649	08.12.2023
20009169	03.12.2020	230505	АЛАБАНГА ALABANGA	2436	04.12.2023
21009113	08.12.2021	231114	КВС ГІПОЛІТО KWS HYROLITO	2649	08.12.2023
21009119	08.12.2021	231120	КВС КОРНЕЛІО KWS CORNELIO	2649	08.12.2023
21009120	08.12.2021	231121	КВС ЕСТРЕЛЛО KWS ESTRELLO	2649	08.12.2023
21009117	08.12.2021	231118	КВС АМАТРІО KWS AMATRIO	2649	08.12.2023
21009116	08.12.2021	231117	КВС ОЛТЕНІО KWS OLTENIO	2649	08.12.2023
21009115	08.12.2021	231116	КВС ФОРТУРІО KWS FORTURIO	2649	08.12.2023
20009090	02.11.2020	231002	4111Ц 4111C	844	07.12.2023
21009114	08.12.2021	231115	НАТАЕЛО NATAELO	2649	08.12.2023
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component</b>					
21909173	13.12.2021	231110	КВ 7ЕР1723 KW 7ER1723	2649	08.12.2023
22909040	18.02.2022	231157	К93 K93	2829	05.12.2023
21909175	13.12.2021	231112	КВ 9ФЮ1713 KW 9FQ1713	2649	08.12.2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22909038	18.02.2022	231155	K91	2829	05.12.2023
22909039	18.02.2022	231156	K91 K17	2829	05.12.2023
21909172	13.12.2021	231109	K17 KB 6ФЮ1906	2649	08.12.2023
21909174	13.12.2021	231111	KW 6FQ1906 KB 7ФП1991	2649	08.12.2023
22909041	18.02.2022	231158	KW 7FP1991 KC55	2829	05.12.2023
22909042	18.02.2022	231159	KS55 K95	2829	05.12.2023
22909076	06.04.2022	231161	K95 ЗМГ4А03	2829	05.12.2023
22909077	06.04.2022	231162	ЗМГ4А03 ЗМГ2401	2829	05.12.2023
21909171	13.12.2021	231108	ЗМГ2401 KB 6ФЮ1809	2649	08.12.2023
21909151	29.11.2021	231213	KW 6FQ1809 ЦІД2457 ЦІД2455	1219	27.12.2023
22909078	06.04.2022	231163	CID2457 CID2455 ЗМГ4403	2829	05.12.2023
22909075	06.04.2022	231160	ЗМГ4403 ЗМГ1А01	2829	05.12.2023
21909155	29.11.2021	231217	ЗМГ1А01 БАА1197	1219	27.12.2023
22909130	12.12.2022	231040	БАА1197 КЮЛД47ФФ	793	04.12.2023
22909081	06.04.2022	231166	QLD47FF БГ1679	2829	05.12.2023
21909148	29.11.2021	231210	BG1679 АРА2528	1959	27.12.2023
21909149	29.11.2021	231211	АРА2528 ГЕІК1770	1959	27.12.2023
21909150	29.11.2021	231212	ГЕІХ1770 ЦІД2455	1219	27.12.2023
21909153	29.11.2021	231215	CID2455 ФСАКС3928	1219	27.12.2023
21909154	29.11.2021	231216	FSAX3928 ФСІД3818	1219	27.12.2023
21909170	10.12.2021	231107	FSID3818 KB 9ФД0047	2649	08.12.2023
21909163	08.12.2021	231101	KW 9FD0047 KB 6ЕЙ0079	2649	08.12.2023
21909165	09.12.2021	231102	KW 6EY0079 KB 4ЕЦ2075	2649	08.12.2023
21909166	09.12.2021	231103	KW 4EC2075 KB 4ЕЦ2076	2649	08.12.2023
21909167	10.12.2021	231104	KW 4EC2076 KB 4ЕЦ2070	2649	08.12.2023
21909168	10.12.2021	231105	KW 4EC2070 KB 6ФД0043	2649	08.12.2023
21909169	10.12.2021	231106	KW 6FD0043 KB 9ЕЙ0115	2649	08.12.2023
21909152	29.11.2021	231214	KW 9EY0115 ЕГІД3959	1219	27.12.2023
22909204	12.12.2022	231041	EGID3959 ПДА14ФФ	793	04.12.2023
23909019	17.01.2023	231042	PDA14FF ДБ1	793	04.12.2023
23909019	17.01.2023	231042	ДБ1 ДБ1	2649	04.12.2023
22909080	06.04.2022	231165	ДБ1 БГО3001	2829	05.12.2023
<b>Кукурудза цукрова <i>Zea mays L. ssp. saccharata</i> Sturt. Sweet Corn</b>					
21103007	18.11.2021	231223	ФАЕСТАР FIRESTAR	1219	27.12.2023
23103006	21.03.2023	231003	ВАН8028 WAV8028	1960	12.12.2023
<b>Патисон <i>Cucurbita pepo L. var. melopepo (L.) Harz</i> Yellow Summer Squash</b>					
21149001	18.11.2021	230517	САНБҮРСТ SUNBURST	1050	21.12.2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
<b>Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish</b>					
21118002	18.11.2021	230521	ЦЕСАР CESAR	1219	27.12.2023
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)</b>					
21040012	31.03.2021	230524	СИ ЛІОНЕТТА SY LIONETTA	1219	27.12.2023
21040013	31.03.2021	230525	СИ МАЛЕТТА SY MALETTA	1219	27.12.2023
<b>Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)</b>					
21041002	23.11.2021	231069	Коктейль КЛ Cocktail CL	912	19.12.2023
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>					
22039010	09.02.2022	231058	ЄС Перас YeS Pehas	2287	04.12.2023
21039094	20.12.2021	231031	Нобіліс КЛП Nobilis CLP	1783	08.12.2023
21039097	20.12.2021	231032	Мілос КЛП Milos CLP	1783	08.12.2023
21039104	23.12.2021	230985	АРНЕТЕС СУ ARNETES SU	1219	27.12.2023
22039009	09.02.2022	231057	ЄС Авалон YeS Avalon	2287	04.12.2023
22039011	09.02.2022	231059	ЄС Старк YeS Stark	2287	04.12.2023
22039012	09.02.2022	231060	ЄС Тор YeS Tor	2287	04.12.2023
22039041	28.11.2022	231043	ЛГ58561 КЛ LG 58561 CL	793	04.12.2023
21039092	20.12.2021	231029	Базалт Basaltt	1783	08.12.2023
23039037	19.10.2023	231001	Арунасан ІР Arunasun IR	2011	21.12.2023
21039076	09.12.2021	231081	СУЛІАНО SULTIANO	1219	27.12.2023
22039065	26.12.2022	230986	ДОВЕР КЛП DOVER CLP	1219	27.12.2023
20039079	03.12.2020	231074	1025Л 1025L	806	08.12.2023
21039093	20.12.2021	231030	Овелл Owell	1783	08.12.2023
20039075	03.12.2020	231071	ІНСАН 222 КЛП INSUN 222 CLP	806	08.12.2023
20039078	03.12.2020	231073	ЕСХ20023 ESH20023	806	08.12.2023
20039073	03.12.2020	231070	ЕС ТАНАІС КЛП ES TANAIIS CLP	806	08.12.2023
20039080	03.12.2020	231075	ІНСАН 110 INSUN 110	2890	08.12.2023
20039081	03.12.2020	231076	1044Л СУ 1044L SU	806	08.12.2023
20039082	03.12.2020	231077	ІНСАНХО 200 КЛП INSANHO 200 CLP	806	08.12.2023
21039068	08.12.2021	231078	СИ КОРСІКА АР SY CORSICA AR	1219	27.12.2023
21039071	08.12.2021	231079	СИ ЛАЗУРІ КЛП SY LAZURI CLP	1219	27.12.2023
21039072	08.12.2021	231080	СУРЕСТ SUREST	1219	27.12.2023
20039077	03.12.2020	231072	Супернова СУ Supernova SU	806	08.12.2023
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component</b>					
21939111	23.12.2021	231092	ФР842ЛН22 FR842LN22	1219	27.12.2023
21939074	09.12.2021	231088	ФР84241 FR84241	1219	27.12.2023
21939080	09.12.2021	231089	ФР84289 FR84289	1219	27.12.2023
21939081	09.12.2021	231090	ФР402ЛЦ00 FR402LC00	1219	27.12.2023



Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
21939082	09.12.2021	231091	ФА754XC05	1219	27.12.2023
21939112	23.12.2021	231093	ФА754HS05	1219	27.12.2023
21939113	23.12.2021	231094	ФА306ЛH00	1219	27.12.2023
21939114	28.12.2021	231146	ФА306LN00	2267	05.12.2023
22939006	14.01.2022	231234	ФР407ЛH00	2554	20.12.2023
22939022	28.11.2022	231044	FR407LN00	793	04.12.2023
21939023	07.04.2021	231145	EX500СУЛxMH501	2793	05.12.2023
22939007	14.01.2022	231235	EH500SULxMH501	2554	20.12.2023
20939048	09.11.2020	231082	33566	736	07.12.2023
21939068	30.11.2021	231085	33566	2649	08.12.2023
21939072	08.12.2021	231086	Л71234MIOA	1219	27.12.2023
21939022	07.04.2021	231144	L71234MIOA	2793	05.12.2023
21939013	27.01.2021	231084	ПМ 678	2537	08.12.2023
21939012	27.01.2021	231083	PM 678	2537	08.12.2023
20939157	29.12.2020	231143	19303	2267	05.12.2023
20939155	29.12.2020	231142	19303	2267	05.12.2023
20939058	10.11.2020	231231	ЛС 3008 С	2743	21.12.2023
20939057	10.11.2020	231230	LC 3008 С	2743	21.12.2023
20939054	10.11.2020	231229	Х02020А-КЛ	2743	21.12.2023
21939073	09.12.2021	231087	H02020A-CL	1219	27.12.2023
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L.</b>					
<b>Sorghum</b>					
21018001	11.01.2021	231175	ТИГРУС	2767	08.12.2023
20018015	30.12.2020	231241	TIGRUS	2554	20.12.2023
20018014	30.12.2020	231240	У55045	2554	20.12.2023
20018013	30.12.2020	231239	U55045	2554	20.12.2023
20018012	18.12.2020	231176	АДВГ 2168 ІГ	2649	08.12.2023
20018002	09.01.2020	231236	ADVG 2168 IG	2554	20.12.2023
20018003	09.01.2020	231237	АДВ Ф7103	2554	20.12.2023
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr.</b>					
<b>Soya Bean</b>					
21045029	20.12.2021	231063	РЖТ СІГМА	1783	08.12.2023
22045029	14.12.2022	231034	RGT SIGMA	1783	08.12.2023
17045056	04.12.2017	231096	СУПЕРНОВА	2606	05.12.2023
21045032	20.12.2021	231033	SUPERNOVA	1783	08.12.2023
22045030	14.12.2022	231035	Златопільська	1783	08.12.2023
21045030	20.12.2021	231045	Zlatopil'ska	1783	08.12.2023
20045043	03.12.2020	231099	СТЕПА	806	08.12.2023
20045041	03.12.2020	231097	СТЕПА	2890	08.12.2023
<b>Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L.</b>					
<b>Sorghum</b>					
21018001	11.01.2021	231175	ТИГРУС	2767	08.12.2023
20018015	30.12.2020	231241	TIGRUS	2554	20.12.2023
20018014	30.12.2020	231240	У55045	2554	20.12.2023
20018013	30.12.2020	231239	U55045	2554	20.12.2023
20018012	18.12.2020	231176	АДВГ 2168 ІГ	2649	08.12.2023
20018002	09.01.2020	231236	ADVG 2168 IG	2554	20.12.2023
20018003	09.01.2020	231237	АДВ Ф7103	2554	20.12.2023
<b>Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr.</b>					
<b>Soya Bean</b>					
21045029	20.12.2021	231063	РЖТ СІГМА	1783	08.12.2023
22045029	14.12.2022	231034	RGT SIGMA	1783	08.12.2023
17045056	04.12.2017	231096	СУПЕРНОВА	2606	05.12.2023
21045032	20.12.2021	231033	SUPERNOVA	1783	08.12.2023
22045030	14.12.2022	231035	Златопільська	1783	08.12.2023
21045030	20.12.2021	231045	Zlatopil'ska	1783	08.12.2023
20045043	03.12.2020	231099	СТЕПА	806	08.12.2023
20045041	03.12.2020	231097	СТЕПА	2890	08.12.2023

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
17045055	04.12.2017	231095	Камея	2606	05.12.2023
20045042	03.12.2020	231098	Камеїа	806	08.12.2023
21045012	16.11.2021	231100	КОМБІНАТОР Combinator	2739	05.12.2023
			Кінгстон Kingston		
<b>Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry</b>					
21294002	12.11.2021	231138	ФЕДЕРИКА	2832	05.12.2023
21294003	12.11.2021	231139	FEDERIKА	2832	05.12.2023
21294004	12.11.2021	231140	АРИАННА ARIANNA	2832	05.12.2023
			САНДРІНА SANDRINA		
<b>Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach</b>					
21130001	13.10.2021	231134	Траверс	840	05.12.2023
21130002	13.10.2021	231135	Траверс Traverse	840	05.12.2023
			Траялбосс Trailboss		
<b>Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)</b>					
21019002	31.03.2021	230685	СИ ЛУНА	1219	27.12.2023
			SY LOONA		
<b>Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) – parental component</b>					
21919001	01.04.2021	230687	РЕ40	1219	27.12.2023
21919002	01.04.2021	230688	РЕ40	1959	27.12.2023
21919003	01.04.2021	230689	РЕ36	1219	27.12.2023
21919003	01.04.2021	230689	РЕ36	1959	27.12.2023
21919004	01.04.2021	230690	РЕ35	1219	27.12.2023
			РЕ35	1959	27.12.2023
			РЕ35	1219	27.12.2023
			ФМ144094	1219	27.12.2023
			FM144094		
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>					
21020004	18.10.2021	231037	РЖТ АСТЕРОЇД	1783	08.12.2023
21020003	18.10.2021	231036	RGТ ASTEROID	1783	08.12.2023
			РЖТ ОРБІТЕР		
			RGТ ORBITER		

## Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

### Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
<b>Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L.</b>					
<b>Potato</b>					
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Захарчук Наталія Анатоліївна Zakharchuk Nataliia Anatoliivna	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Олійник Тетяна Миколаївна Oliiynyk Tetiana Mykolaivna	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Осипчук Алла Андріївна Osyrychuk Alla Andriivna	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Тактаєв Борис Анатолійович Taktaiev Borys Anatoliiovych	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Томаш Анатолій Іванович Tomash Anatolii Ivanovych	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Фурдига Микола Миколайович Furdyha Mykola Mykolaiovych	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Чередниченко Любов Миколаївна Cherednychenko Liubov Mykolaivna	05.12.2023
19088003	20.11.2019	211201	Медея Medeia	Бондарчук Анатолій Андрійович Bondarchuk Anatolii Andriiovych	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Чередниченко Любов Миколаївна Cherednychenko Liubov Mykolaivna	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Бондарчук Анатолій Андрійович Bondarchuk Anatolii Andriiovych	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Маруда Марина Юріївна Maruda Maryna Iuriivna	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Осипчук Алла Андріївна Osyrychuk Alla Andriivna	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Тактаєв Борис Анатолійович Taktaiev Borys Anatoliiovych	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Фурдига Микола Миколайович Furdyha Mykola Mykolaiovych	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Шмунь Світлана Андріївна Shmun Svitlana Andriivna	05.12.2023
20088020	26.11.2020	230790	Марфуша Marfusha	Томаш Анатолій Іванович Tomash Anatolii Ivanovych	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Бондарчук Анатолій Андрійович Bondarchuk Anatolii Andriiovych	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Захарчук Наталія Анатоліївна Zakharchuk Nataliia Anatoliivna	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Осипчук Алла Андріївна Osyrychuk Alla Andriivna	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Рожнятовський Андрій Олегович Rozhniatovskyi Andrii Olehovych	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Тактаєв Борис Анатолійович Taktaiev Borys Anatoliiovych	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Томаш Анатолій Іванович Tomash Anatolii Ivanovych	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Фурдига Микола Миколайович Furdyha Mykola Mykolaiovych	05.12.2023
20088021	26.11.2020	230791	Меланія Melaniia	Чередниченко Любов Миколаївна Cherednychenko Liubov Mykolaivna	05.12.2023
<b>Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L.</b>					
<b>Pear</b>					
22258002	20.12.2022	230711	Вежа мускатна Vezha muskatna	Ходаківська Юлія Борисівна Khodakivska Iuliia Borysivna	07.12.2023
22258002	20.12.2022	230711	Вежа мускатна Vezha muskatna	Гриник Ігор Володимирович Hrynyk Ihor Volodymyrovych	07.12.2023
22258002	20.12.2022	230711	Вежа мускатна Vezha muskatna	Матвієнко Микола Васильович Matviienko Mykola Vasylovych	07.12.2023

## Відомості щодо припинення чинності майнового права на поширення сорту

### Information on the termination of the validity of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn</b>					
00004041	12.02.2003	29.12.2023	PR38A24	767	767
04004018	11.01.2007	29.12.2023	PR38A24	767	767
04004019	01.01.2006	29.12.2023	PR39Ф58 PR39F58	767	767
04004082	23.01.2008	08.12.2023	PR39Г83 PR39G83	767	767
05004106	01.01.2009	29.12.2023	Сеїді Seiddi	485	485
05004107	01.01.2009	29.12.2023	PR37И12 PR37Y12	767	767
06004026	23.01.2008	08.12.2023	PR37Ф73 PR37F73	767	767
06004085	20.12.2011	29.12.2023	Бюрлі Burlı	485	485
06004093	20.12.2011	29.12.2023	P9025	767	767
07004045	30.11.2010	29.12.2023	P8529	767	767
07004050	26.12.2011	29.12.2023	PR38A22 PR38A22	1055	1055
07004052	30.11.2010	29.12.2023	P8000	1055	1055
07004055	30.11.2010	29.12.2023	PR38H86 PR38N86	1055	1055
07004061	26.12.2011	29.12.2023	PR38A79 PR38A79	1055	1055
07004121	30.11.2010	08.12.2023	PR35Ф38 PR35F38	1055	1055
08004057	20.12.2011	08.12.2023	Реаллі КС Realli CS	485	485
08004060	20.12.2011	08.12.2023	Ісбері Isberi	485	485
08004103	26.12.2011	29.12.2023	Текні Tekni	485	485
08004116	26.12.2011	29.12.2023	P9578	1055	1055
08004119	21.03.2013	29.12.2023	P9400	1055	1055
08004142	20.12.2011	22.12.2023	P8400	1055	1055
09004534	21.03.2013	29.12.2023	МТ Магадо MT Matado	918	918
09004617	18.03.2013	22.12.2023	PR38И34 PR38Y34	1055	1055
09004675	15.03.2013	08.12.2023	ДА Сонка DA Sonka	918	918
09004676	15.03.2013	08.12.2023	Кларіті КС Clariti CS	485	485
09004683	15.03.2013	08.12.2023	Жерзі КС Gerzi CS	485	485
10004094	02.07.2014	29.12.2023	Лубазі КС Loubazi CS	485	485
10004110	03.03.2014	08.12.2023	P0216	1055	1055
10004113	03.03.2014	08.12.2023	Жокарі КС Jokari CS	485	485
10004248	03.03.2014	22.12.2023	Гарні КС Garni CS	485	485
10004252	03.03.2014	22.12.2023	Сурреал Surreal	918	918
11004003	20.01.2015	29.12.2023	ДС0336 DS0336	918	918
11004173	26.02.2015	08.12.2023	P7709	1055	1055
11004174	26.02.2015	08.12.2023	Галвані КС Galvani CS	485	485
			Деволві КС Devolvi CS	485	485

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
11004175	18.03.2015	08.12.2023	Лапері КС Laperi CS	485	485
12004107	26.12.2014	22.12.2023	ДС0918Б DS0918B	918	918
12004109	26.12.2014	22.12.2023	ДС0493Б DS0493B	918	918
13009156	05.02.2016	22.12.2023	ДС1304С DS1304C	918	918
14009043	20.03.2017	08.12.2023	Остербі КС Osterbi CS	485	485
14009044	20.03.2017	08.12.2023	Трілоджі ДУО Trilogi DUO	485	485
14009045	20.03.2017	08.12.2023	Аркаді КС Arkadi CS	485	485
14009046	20.03.2017	08.12.2023	Трілоджі КС Trilogi CS	485	485
14009047	20.03.2017	08.12.2023	Катарі КС Katarí CS	485	485
14009048	20.03.2017	08.12.2023	Коріолі КС Corioli CS	485	485
14009049	31.03.2017	08.12.2023	Тессалі КС Tessali CS	485	485
14009050	20.03.2017	08.12.2023	Пінкі КС Pincki CS	485	485
14009051	20.03.2017	08.12.2023	Белуджі КС Belugi CS	485	485
14009148	16.03.2017	22.12.2023	ДС1202Б DS1202B	918	918
14009200	20.03.2017	08.12.2023	Монлері КС Monleri CS	485	485
14009201	20.03.2017	08.12.2023	ПОРТАЙЛ PORTALE	485	485
14009202	20.03.2017	08.12.2023	Спайсі КС Spruci CS	485	485
14009203	20.03.2017	08.12.2023	Кампоні КС Kamroni CS	485	485
14009204	20.03.2017	08.12.2023	Пажані КС Pagani CS	485	485
15009069	17.07.2018	08.12.2023	Конфетті КС Confetti CS	485	485
15009073	30.01.2018	08.12.2023	Малаві КС Malawi CS	485	485
16009092	12.02.2019	08.12.2023	Глоріфі КС Glorifi CS	485	485
17009094	12.03.2020	08.12.2023	Аденора Adenora	485	485
18009115	15.12.2021	08.12.2023	КС Кавані CS Cavani	2534	485
18009124	15.12.2021	08.12.2023	Балі КС Bali CS	2534	485
18009180	15.12.2020	22.12.2023	ДС1897Б DS1897B	2094	2094
19009181	15.12.2021	08.12.2023	КС Амалфі CS Amalfi	2653	485
98004102	01.01.2001	29.12.2023	ПР39Д81 PR39D81	767	767
<b>Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)</b>					
19020011	13.10.2021	22.12.2023	Файєрфокс Firefoxx	1891	1891
<b>Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower</b>					
06017011	23.01.2008	08.12.2023	Коралія КС Coralia CS	485	485
07017018	30.11.2010	29.12.2023	ПР64Г46 PR64G46	1055	1055
07017085	01.10.2010	08.12.2023	Фушія КЛ Fushia CL	485	485
07017086	20.12.2011	08.12.2023	Дюрбан Durban	485	485
07017087	30.11.2010	08.12.2023	Імерія КС Imeria CS	485	485
08017020	20.12.2011	08.12.2023	Кларіса КЛ Clarissa CL	485	485

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
08017024	20.12.2011	08.12.2023	Соларні КС Solarni CS	485	485
10017081	04.03.2014	08.12.2023	Велком Welcom	485	485
10017085	17.03.2014	08.12.2023	Хімалія КЛ Himalia CL	485	485
11017096	26.02.2015	08.12.2023	Шаркс Charks	485	485
11017099	26.02.2015	08.12.2023	Марбелія КЛ Marbelia CL	485	485
11017101	20.03.2017	08.12.2023	Генова КЛ Genova CL	485	485
14039034	30.01.2018	08.12.2023	Тоскана КС Toscana CS	485	485
14039036	19.05.2017	08.12.2023	Крессідія КС Cressidia CS	485	485
14039037	20.03.2017	08.12.2023	Європа КЛП Eurora CLP	485	485
14039110	20.03.2017	08.12.2023	Патріція КЛ Patricia CL	485	485
15039069	12.02.2019	08.12.2023	Натюрела КС Naturela CS	485	485
15039070	12.02.2019	08.12.2023	Малага КС Malaga CS	485	485
15039075	24.01.2018	22.12.2023	ДСЛ402 DSL402	2094	2094
16039079	15.12.2020	08.12.2023	Каледонія КЛ Kaledonia CL	485	485
17039100	28.12.2019	08.12.2023	Аламбра КС Alambra CS	485	485
18039089	15.12.2021	08.12.2023	КС Клерія КЛ CS Cleria CL	2534	485
18039090	15.12.2021	08.12.2023	КС Канарія СУ CS Canaria SU	2534	485
19039068	15.12.2021	08.12.2023	КС МАГЕНТА CS MAGENTA	2653	485
<b>Ріпак (озимий) <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter)</b>					
07016024	10.10.2011	29.12.2023	ПР 44 В 22 PR 44 W 22	767	767
08016064	19.04.2013	08.12.2023	Нодарі КС Nodari CS	485	485
08016065	19.04.2013	08.12.2023	Тріпті КС Tripti CS	485	485
09016008	30.11.2012	29.12.2023	ПР45Д05 PR45D05	1055	1055
09016186	26.05.2015	08.12.2023	Слаккі КС Slaki CS	485	485
09016187	26.05.2015	08.12.2023	Коррел Korrel	485	485
10016027	03.06.2014	29.12.2023	ПХ100СЛ PX100CL	1055	1055
12016025	30.12.2015	08.12.2023	Мазарі КС Mazari CS	485	485
15040033	09.11.2018	08.12.2023	Сіртакі КС Sirtaki CS	485	485
17040049	09.10.2020	08.12.2023	Селебріті КС Celebriti CS	485	485
<b>Соя культурна <i>Glycine max (L.) Merr.</i> Soya Bean</b>					
06018001	23.01.2008	08.12.2023	КСБ 938 CSB 938	485	485
12018002	28.12.2017	08.12.2023	Банжо КС Banjo CS	485	485
<b>Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum L.</i> Tomato</b>					
13115044	21.02.2017	22.12.2023	СВ1521ТД SV1521TD	1852	1852
13115046	21.02.2017	22.12.2023	СВ5215ТД SV5215TD	1852	1852
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays L.</i> Maize, Corn – parental component</b>					
09004284	20.11.2009	08.12.2023	260Ц788 260С788	485	485

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
09004285	20.11.2009	08.12.2023	227 В 539	485	485
09004286	20.11.2009	08.12.2023	227 V 539	485	485
09004287	20.11.2009	08.12.2023	14B001	485	485
09004288	20.11.2009	08.12.2023	226 Ж 509	485	485
09004289	20.11.2009	08.12.2023	226 J 509	485	485
09004290	20.11.2009	08.12.2023	227 В 600	485	485
09004291	20.11.2009	08.12.2023	227 V 600	485	485
09004292	20.11.2009	08.12.2023	226 Ж 598	485	485
09004293	20.11.2009	08.12.2023	226 J 598	485	485
09004294	20.11.2009	08.12.2023	269Ф518	485	485
09004295	20.11.2009	08.12.2023	269F518	485	485
09004296	20.11.2009	08.12.2023	14 П 395	485	485
09004297	20.11.2009	08.12.2023	14 P 395	485	485
09004298	20.11.2009	08.12.2023	13 Д 514 ЦМС	485	485
09004299	20.11.2009	08.12.2023	13 D 514 CMS	485	485
09004300	20.11.2009	08.12.2023	41 Е 562	485	485
09004301	20.11.2009	08.12.2023	41 E 562	485	485
09004302	20.11.2009	08.12.2023	339 Б 519	485	485
09004303	20.11.2009	08.12.2023	339 B 519	485	485
09004304	20.11.2009	08.12.2023	427 Ф 785	485	485
09004305	20.11.2009	08.12.2023	427 F 785	485	485
09004306	20.11.2009	08.12.2023	497 Ц 058	485	485
09004307	20.11.2009	08.12.2023	497C058	485	485
09004308	29.11.2010	08.12.2023	221П839	485	485
09004309	29.11.2010	08.12.2023	221P839	485	485
09004310	29.11.2010	08.12.2023	331Г844	485	485
09004311	29.11.2010	08.12.2023	331G844	485	485
09004312	29.11.2010	08.12.2023	111В791	485	485
09004313	29.11.2010	08.12.2023	111B791	485	485
09004314	29.11.2010	08.12.2023	228К573	485	485
09004315	29.11.2010	08.12.2023	228K573	485	485
09004316	29.11.2010	08.12.2023	331А759	485	485
09004317	29.11.2010	08.12.2023	331A759	485	485
09004318	29.11.2010	08.12.2023	990А707	485	485
09004319	29.11.2010	08.12.2023	990A707	485	485
10004073	10.02.2015	08.12.2023	19Б169	485	485
10004074	01.04.2013	08.12.2023	19B169	485	485
10004075	01.04.2013	08.12.2023	25Х761	485	485
10004076	01.04.2013	08.12.2023	25H761	485	485
10004077	01.04.2013	08.12.2023	151Х716	485	485
10004078	01.04.2013	08.12.2023	151X716	485	485
10004079	01.04.2013	08.12.2023	БЕ9513	485	485
10004080	01.04.2013	08.12.2023	BE9513	485	485
10004081	01.04.2013	08.12.2023	260Е742	485	485
10004082	04.03.2014	08.12.2023	260E742	485	485
10004083	01.04.2013	08.12.2023	291Г752	485	485
10004084	01.04.2013	08.12.2023	291G752	485	485
10004085	01.04.2013	08.12.2023	447К560	485	485
10004086	01.04.2013	08.12.2023	447K560	485	485
10004087	01.04.2013	08.12.2023	422М766	485	485
10004088	01.04.2013	08.12.2023	422M766	485	485
10004089	01.04.2013	08.12.2023	25I503	485	485
10004090	01.04.2013	08.12.2023	25Y503	485	485
10004091	01.04.2013	08.12.2023	КАР69	485	485
10004092	01.04.2013	08.12.2023	QAR69	485	485
12004008	19.11.2014	08.12.2023	111В791Х151Х716	485	485
12004009	19.11.2014	08.12.2023	111B791Kh151Kh716	485	485
12004010	04.03.2014	08.12.2023	427Ф785Х48А014	485	485
12004011	04.03.2014	08.12.2023	427F785Kh48A014	485	485
12004012	04.03.2014	08.12.2023	493Е747	485	485
12004013	04.03.2014	08.12.2023	493E747	485	485
12004014	19.11.2014	08.12.2023	13Д514Х14В001	485	485
12004015	04.03.2014	08.12.2023	13D514Kh14B001	485	485
12004016	04.03.2014	08.12.2023	465Ц653	485	485
12004017	06.05.2019	08.12.2023	465C653	485	485
12004018	04.03.2014	08.12.2023	444Л568	485	485
12004019	04.03.2014	08.12.2023	444L568	485	485
12004020	04.03.2014	08.12.2023	284К817	485	485
12004021	19.11.2014	08.12.2023	284K817	485	485
12004022	19.11.2014	08.12.2023	427Ф785Х41Е562	485	485
12004023	19.11.2014	08.12.2023	427F785Kh41E562	485	485
12004024	19.11.2014	08.12.2023	25I503ХРПК7250	485	485
12004025	19.11.2014	08.12.2023	25I503KhRPK7250	485	485

## Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
12004017	19.11.2014	08.12.2023	115Ф848Х14Б001	485	485
12004018	04.03.2014	08.12.2023	115F848Kh14B001	485	485
12004019	06.05.2019	08.12.2023	155P680 155R680	485	485
12004020	24.07.2015	08.12.2023	224E772 224E772	485	485
12004021	19.11.2014	08.12.2023	227B512X227B600 227B512Kh227V600	485	485
12004022	19.11.2014	08.12.2023	227B539X227B600 227V539Kh227V600	485	485
12004023	24.07.2015	08.12.2023	111X863X111B791 111Kh863Kh111B791	485	485
12004026	19.11.2014	08.12.2023	265C556X269Ф518 265S556Kh269F518	485	485
14909062	21.02.2017	08.12.2023	19B169X13Д514 19B169Kh13D514	485	485
14909064	21.02.2017	08.12.2023	446ЖА695 446JA695	485	485
14909065	21.02.2017	08.12.2023	227ЮБ148 227QB148	485	485
14909067	31.03.2017	08.12.2023	249Д635Х 48А014 249D635X 48A014	485	485
14909068	21.02.2017	08.12.2023	422М766СТР 422M766STR	485	485
14909069	30.01.2018	08.12.2023	422М766СТРХ 497Ц058СТР 422M766STRX 497C058STR	485	485
14909070	21.02.2017	08.12.2023	427Ф567 427F567	485	485
14909071	21.02.2017	08.12.2023	497Ц058СТР 497C058STR	485	485
14909072	21.02.2017	08.12.2023	447ЦБ602 447CB602	485	485
14909073	21.02.2017	08.12.2023	48А014 48A014	485	485
14909074	21.02.2017	08.12.2023	111В070 111W070	485	485
14909075	21.02.2017	08.12.2023	112К564 112K564	485	485
14909217	21.02.2017	08.12.2023	117ЦБ343 117CB343	485	485
14909218	21.02.2017	08.12.2023	277ХБ434 277HB434	485	485
14909220	21.02.2017	08.12.2023	117ІБ602 117EB602	485	485
14909221	27.02.2017	08.12.2023	447ЦБ671 447CB671	485	485
14909222	21.02.2017	08.12.2023	111Х863 111H863	485	485
14909223	31.03.2017	08.12.2023	111Б791Х 111Х863 111B791X 111X863	485	485
14909224	31.03.2017	08.12.2023	447ЦБ671Х 447ЦБ602 447CB671X 447CB602	485	485
15909111	21.02.2017	08.12.2023	482Р867 482R867	485	485
15909112	30.01.2018	08.12.2023	247ББ319 247BB319	485	485
15909113	30.01.2018	08.12.2023	441ГХ034 441GH034	485	485
16909128	30.01.2018	08.12.2023	158ЕЦ474 158EC474	485	485
16909129	12.02.2019	08.12.2023	431АГ044 431AH044	485	485
17909158	12.02.2019	08.12.2023	279ЖД896 279JD896	485	485
17909161	14.01.2020	08.12.2023	444СХ118 444SH118	485	485
19909068	14.01.2020	08.12.2023	443УК319 443YK319	485	485
19909177	15.12.2021	08.12.2023	271ХФ315 271HF315	2534	485
	15.12.2021	08.12.2023	444ФЛ695 444FL695	2653	485



Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата припинення Date of cancellation	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
<b>Ріпак (озимий) – батьківський компонент</b> <i>Brassica napus L. oleifera</i>					
<b>Rape Seed (Winter) – parental component</b>					
12016042	28.12.2017	08.12.2023	A97ED370	485	485
			A97ED370		
12016044	28.12.2017	08.12.2023	A97UE365	485	485
			A97UE365		
12016046	28.12.2017	08.12.2023	P04TC083	485	485
			R04TS083		
12016047	28.12.2017	08.12.2023	P02GT003	485	485
			R02GT003		

## Відомості щодо відновлення чинності майнового права на поширення сорту

### Information on revalidation of the property right to spread the variety

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата відновлення Date of renewal	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)
<b>Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L.</b>					
<b>Maize, Corn</b>					
16009148	29.01.2019	29.12.2023	ЛГ31256 LG31256	793	793
<b>Ліщина велика (фундук) <i>Corylus maxima</i> Mill.</b>					
<b>Hazelnut</b>					
18286001	11.02.2019	29.12.2023	Гетьман Hetman	2470	2470
18286002	11.02.2019	29.12.2023	Отаман Otaman	2470	2470
<b>Лохина високоросла <i>Vaccinium corymbosum</i> L.</b>					
<b>Blueberry, Highbush Blueberry</b>					
18519001	23.10.2019	29.12.2023	Ласка Laska	2470	2470
18519002	23.10.2019	29.12.2023	Мавка Mavka	2470	2470

## Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

### Other notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/27262 від 23.11.2023 «Про погодження внесення змін» по сортах згідно з додатком внесено зміни до електронної бази даних щодо зміни найменування представника та адреси для листування, а саме слова, цифри та

символи «ТОВ Коссад Україна» (проспект Червонозоряний, 96, офіс 118, а/с-168, м. Київ, 01033) замінено словами, цифрами та символами «ТОВ «Лідеа Україна» (вул. Смольна, 9, м. Київ, 03022).

#### Перелік сортів, щодо яких вносяться зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
1	Кукурудза звичайна	08004057	Ісбері
2	Кукурудза звичайна	08004060	Текні
3	Кукурудза звичайна	08004062	Луджі КС
4	Кукурудза звичайна	09004675	Кларіті КС
5	Кукурудза звичайна	09004676	Жерзі КС
6	Кукурудза звичайна	09004683	Лубазі КС
7	Кукурудза звичайна	10004110	Жокарі КС
8	Кукурудза звичайна	10004113	Гарні КС
9	Кукурудза звичайна	07004121	Реаллі КС
10	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004284	260Ц788
11	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004285	227 В 539
12	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004286	14Б001
13	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004287	226 Ж 509
14	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004288	227 В 600
15	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004289	226 Ж 598
16	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004290	269Ф518
17	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004291	14 П 395
18	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004292	13 Д 514 ЦМС
19	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004293	41 Е 562
20	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004294	339 Б 519
21	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004295	427 Ф 785
22	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004296	497 Ц 058
23	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004566	221П839
24	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004567	331Г844
25	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004568	111Б791
26	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004569	228К573
27	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004570	331А759
28	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	09004571	990А707
29	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004073	19Б169
30	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004074	25Х761
31	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004076	151Х716
32	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004079	БЕ9513
33	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004080	260Е742
34	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004082	291Г752
35	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004083	447К560
36	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004085	422М766
37	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004087	25І503
38	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004088	КАР69
39	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	10004089	249Д635
40	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004008	111Б791Х151Х716
41	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004009	427Ф785Х48А014
42	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004010	493Е747
43	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004011	13Д514Х14Б001
44	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004012	465Ц653
45	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004013	444Л568
46	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004014	284К817
47	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004015	427Ф785Х41Е562
48	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004016	25І503ХРПК7250
49	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004017	115Ф848Х14Б001
50	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004018	155Р680
51	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004019	224Е772
52	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004020	227Б512Х227В600
53	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004021	227Б539Х227В600

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
54	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004022	111X863X111Б791
55	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004023	265С556Х269Ф518
56	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004024	266ФА069
57	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	12004026	19Б169Х13Д514
58	Ріпак (озимий)	08016064	Нодарі КС
59	Ріпак (озимий)	08016065	Тріпті КС
60	Сорго звичайне (двокольорове)	09064009	Балто КС
61	Сорго звичайне (двокольорове)	09064008	Капелло КС
62	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017152	ІА 769 ДМР
63	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017153	ІР 135ДМР
64	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017154	ЛЦ
65	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017155	16309А
66	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017156	ЛЦ1093
67	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017157	97Ф25Р
68	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017158	99Д40Р
69	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017241	69В02
70	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017242	ОЛ1А
71	Соняшник однорічний – батьківський компонент	09017243	72С16
72	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017034	ІР138ДМР
73	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017044	ОА1069ДМР
74	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017046	ХС9002А
75	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017047	45П60
76	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017049	ІА1161
77	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017050	70004Р
78	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017052	38П50
79	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017054	ПХ650А
80	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017056	ІА983
81	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017057	31Г03А
82	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017058	ХС9040А
83	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017059	ІОА1333
84	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017060	ІОР172ДМР
85	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017061	ІОА1177ДМР
86	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017062	91Ф05Р
87	Соняшник однорічний – батьківський компонент	10017064	ОР4089
88	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017022	13К25
89	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017023	20М60
90	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017024	УК58
91	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017026	ІР134РРО
92	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017027	72В13
93	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017028	А899
94	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017029	63Г13

Відповідно до листа Мінагрополітики № 21-1331-09/28709 від 07.12.2023 «Про погодження внесення змін» по сортах згідно з додатком внесено зміни до електронної бази даних щодо зміни найменування представ-

ника та адреси для листування, а саме слова, цифри та символи «ТОВ Коссад Восток» замінено словами, цифрами та символами «ТОВ «Лідея Україна» (вул. Смольна, 9, м. Київ, 03022).

**Перелік сортів, щодо яких вносяться зміни до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні**

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
1	Кукурудза звичайна	04004082	Сеїді
2	Кукурудза звичайна	06004026	Бюрлі
3	Кукурудза звичайна	11004173	Галвані КС
4	Кукурудза звичайна	11004174	Деволві КС
5	Кукурудза звичайна	11004175	Лапері КС
6	Кукурудза звичайна	14009043	Остербі КС
7	Кукурудза звичайна	14009044	Трілджі ДУО
8	Кукурудза звичайна	14009045	Аркаді КС
9	Кукурудза звичайна	14009046	Трілджі КС
10	Кукурудза звичайна	14009047	Катарі КС
11	Кукурудза звичайна	14009048	Коріолі КС
12	Кукурудза звичайна	14009049	Тессалі КС
13	Кукурудза звичайна	14009050	Пінкі КС
14	Кукурудза звичайна	14009051	Белуджі КС
15	Кукурудза звичайна	14009200	Монлері КС
16	Кукурудза звичайна	14009201	ПОРТАЙЛ
17	Кукурудза звичайна	14009202	Спайсі КС
18	Кукурудза звичайна	14009203	Кампоні КС

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
19	Кукурудза звичайна	14009204	Пажані КС
20	Кукурудза звичайна	15009068	Тоніфі КС
21	Кукурудза звичайна	15009069	Конфетті КС
22	Кукурудза звичайна	15009070	БЕЛАМІ
23	Кукурудза звичайна	15009071	Евжені КС
24	Кукурудза звичайна	15009072	Шамбері КС
25	Кукурудза звичайна	15009073	Малаві КС
26	Кукурудза звичайна	16009091	Кодеос
27	Кукурудза звичайна	16009092	Глоріфі КС
28	Кукурудза звичайна	16009093	Анові КС
29	Кукурудза звичайна	17009094	Аденора
30	Кукурудза звичайна	17009095	Поезі КС
31	Кукурудза звичайна	17009096	Палізі КС
32	Кукурудза звичайна	17009097	Кіянті КС
33	Кукурудза звичайна	17009098	Наомі КС
34	Кукурудза звичайна	17009099	Гріґрі КС
35	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909062	446ЖА695
36	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909063	226УА988
37	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909064	227ЮБ148
38	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909065	249Д635Х 48А014
39	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909067	422М766СТР
40	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909068	422М766СТРХ 497Ц058СТР
41	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909069	427Ф567
42	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909070	497Ц058СТР
43	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909071	447ЦБ602
44	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909072	48А014
45	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909073	111В070
46	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909074	112К564
47	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909075	117ЦБ343
48	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909216	338БЦ439
49	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909217	277ХБ434
50	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909218	117ІБ602
51	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909219	427ББ498
52	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909220	447ЦБ671
53	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909221	111Х863
54	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909222	111Б791Х 111Х863
55	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909223	447ЦБ671Х 447ЦБ602
56	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	14909224	482Р867
57	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909110	427ББ498Х 247ББ319
58	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909111	247ББ319
59	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909112	441ГХ034
60	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909113	158ЕЦ474
61	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	15909114	118МЦ248
62	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909127	427ББ498Х 249Д635
63	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909128	431АГ044
64	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	16909129	279ЖД896
65	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909145	227ВБ025
66	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909147	262БХ503
67	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909148	156ЛА337Х 14Б001
68	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909149	156ЛА337
69	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909150	441ХФ006
70	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909158	444СХ118
71	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909159	483ЮХ037
72	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909160	223ДХ002
73	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	17909161	443УК319
74	Люцерна посівна	12058001	Рахель
75	Люцерна посівна	12058002	Ексквіз
76	Люцерна посівна	17196006	ЧАПКА
77	Пшениця м'яка (озима)	06007046	СО 207
78	Пшениця м'яка (озима)	16012047	СОФІ КС
79	Пшениця м'яка (озима)	16012048	СОФРУ
80	Пшениця м'яка (озима)	16012049	СОРРІАЛ
81	Ріпак (озимий)	09016186	Слакі КС
82	Ріпак (озимий)	09016187	Коррел
83	Ріпак (озимий)	12016025	Мазарі КС
84	Ріпак (озимий)	15040032	Меморі КС
85	Ріпак (озимий)	15040033	Сіртакі КС
86	Ріпак (озимий)	17040049	Селебріті КС

№ з/п	Назва ботанічного таксону	Номер заявки	Назва сорту
87	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016042	A97ЕД370
88	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016044	A97УЕ365
89	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016045	Р04ВМ067
90	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016046	Р04ТС083
91	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	12016047	Р02ГТ003
92	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	15940008	Р07НП137
93	Соняшник однорічний	06017011	Коралія КС
94	Соняшник однорічний	07017085	Фушія КЛ
95	Соняшник однорічний	07017086	Дюрбан
96	Соняшник однорічний	07017087	Імерія КС
97	Соняшник однорічний	08017020	Кларіса КЛ
98	Соняшник однорічний	08017024	Соларні КС
99	Соняшник однорічний	09017272	Кларіка КЛ
100	Соняшник однорічний	10017081	Велком
101	Соняшник однорічний	10017085	Хімалія КЛ
102	Соняшник однорічний	11017096	Шаркс
103	Соняшник однорічний	11017099	Марбелія КЛ
104	Соняшник однорічний	11017101	Генова КЛ
105	Соняшник однорічний	14039034	Тоскана КС
106	Соняшник однорічний	14039036	Крессідія КС
107	Соняшник однорічний	14039037	Європа КЛП
108	Соняшник однорічний	14039110	Патріція КЛ
109	Соняшник однорічний	15039069	Натюрела КС
110	Соняшник однорічний	15039070	Малага КС
111	Соняшник однорічний	16039079	Каледонія КЛ
112	Соняшник однорічний	17039100	Алабра КС
113	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017021	12Ф04
114	Соняшник однорічний – батьківський компонент	12017025	ІР152ДМР
115	Соняшник однорічний – батьківський компонент	14939029	85П10Р
116	Соняшник однорічний – батьківський компонент	15939041	20М60і
117	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939095	70004іс
118	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939096	20М60ісол
119	Соняшник однорічний – батьківський компонент	16939097	68Т10Р
120	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939066	56Ц20Р
121	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939067	63Г13іс
122	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939068	67К23Р
123	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939070	49Ц01А
124	Соя культурна	12018002	Банжо КС
125	Соя культурна	06018001	КСБ 938
126	Кукурудза звичайна	18009119	КС Луксурі
127	Кукурудза звичайна	18009124	Балі КС
128	Кукурудза звичайна	18009115	КС Кавані
129	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909067	263ФК318
130	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909068	271ХФ315
131	Ріпак (озимий) – батьківський компонент	18940008	А08ТЦ443
132	Соняшник однорічний	18039090	КС Канарія СУ
133	Соняшник однорічний	18039089	КС Клерія КЛ
134	Соняшник однорічний – батьківський компонент	18939091	20М60су
135	Кукурудза звичайна	19009181	КС Амалфі
136	Кукурудза звичайна – батьківський компонент	19909177	444ФЛ695
137	Люцерна посівна	19196003	ІДІЛЛЬ
138	Пшениця м'яка (озима)	20012044	НОВІК
139	Пшениця м'яка (озима)	19012086	СОЛІНДО КС
140	Пшениця м'яка (озима)	20012045	Соліфлор КС
141	Пшениця м'яка (озима)	19012087	СОМТЮ030 КС
142	Соняшник однорічний	19039068	КС МАГЕНТА
143	Соняшник однорічний – батьківський компонент	19939113	61Ф32Р

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2097 від 04.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для по-

ширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

**ПЕРЕЛІК  
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин,  
придатних для поширення в Україні**

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Змінена назва сорту	Підстава
1	Буряк цукровий	18069030	Смірнов (Smirnov)	Смірнов (Smirnov)	Клопотання ТОВ «Штрубе Україна ГмбХ» від 07.11.2023 № 23/19, що діє на підставі довіреності компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» від 25.08.2020
2	Буряк цукровий	19069010	Керролл (Carroll)	Керролл (Carroll)	Клопотання ТОВ «Штрубе Україна ГмбХ» від 07.11.2023 № 23/18, що діє на підставі довіреності компанії «Штрубе Д енд С ГмбХ» від 25.08.2020
3	Буряк цукровий	22045019	ОАЦ Хастінгс (OAC Hastings)	ОАЦ Хастінгс (OAC Hastings)	Клопотання ТОВ «Кенго Дженетікс Україна» від 24.11.2023 № 24/11, що діє на підставі довіреності компанії «Кен-Гро Дженетікс» від 19.12.2018

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2128 від 08.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, стосовно сортів кукурудзи звичайної ДКС3511ВХ (заявка № 10004218), ДКС4590ВХ (заявка № 18009112) щодо зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами), замінивши слова «Кукурудза звичайна (*Zea mays* L.)» словами «Кукурудза восковидна (*Zea mays* var. *ceratina* L.)».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2154 від 13.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться

в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сорту пшениці м'якої (озимої) Златогила (заявка № 07007031, рік реєстрації – 2010), замінивши слова «Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський Інститут Селекції і Технологій» словами «Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ЛІСТ».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2210 від 20.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослин стосовно сортів рослин згідно з переліком.

**ПЕРЕЛІК  
сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин,  
придатних для поширення в Україні**

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослин	
					зазначені відомості	запропоновані зміни до відомостей
1	Тютюн справжній	07019001	Спектр	2008	Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України	Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку Національної академії аграрних наук України
2	Тютюн справжній	07019002	Бравий 200	2008		
3	Тютюн справжній	02019001	Символ - 4	2004		
4	Тютюн справжній	02019002	ВМС-24	2004		
5	Цибуля шалот	08176002	Оксамит	2010		
6	Перець однорічний (гіркий)	11036001	Берегівський	2017		
7	Меліса лікарська	00356002	Цитронелла	2001		
8	Лофант ганусовий	00281001	Початок /Бакта/	2003		
9	Гісоп лікарський	05376001	Світанок	2008		
10	Любисток лікарський	13453001	Корал	2015		
11	Васильки справжні	14464001	Грін Голд	2017		
12	Собача кропива п'ятилопатева	15527001	Красуня	2018		
13	Картопля	97031012	Свалявська	2001		
14	Павловнія	18649003	Лілов	2020		
15	Павловнія	22649001	Лідея	2023		
16	Кукурудза звичайна	18009181	ДЗ Спалах	2020		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2213 від 20.12.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Украї-

ні, та Державному реєстрі патентів на сорти рослин» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо назв сортів рослин згідно з переліком.

**ПЕРЕЛІК  
сортів рослин, щодо яких змінюється назва сорту, зазначених у Державному реєстрі сортів рослин, придатних  
для поширення в Україні**

№ з/п	Ботанічний таксон	Номер заявки	Назва сорту	Запропонована нова назва сорту	Підстава
1	Кукурудза звичайна	17009013	ЛНЗ 3116 (LNZ 3116)	Говард (Hovard)	Клопотання Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» від 06.12.2023 № 278
2	Кукурудза звичайна	17009014	ЛНЗ 3518 (LNZ 3518)	Мелдон (Meldon)	Клопотання Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» від 06.12.2023 № 280
3	Кукурудза звичайна	17009015	ЛНЗ 3317 (LNZ 3317)	Терви (Tervy)	Клопотання Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» від 06.12.2023 № 279

**Відомості про відмову у державній реєстрації сорту  
та/або у державній реєстрації прав на сорт**  
Information on refusal of state registration of a variety and/or  
state registration of rights to a variety

**Відомості про відмову у державній реєстрації сорту**  
Information on refusal of state registration of the variety

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) a: Applicant (code) b: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відмови Date of refusal
<b>Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L.</b> <b>Soft Wheat (Spring)</b>					
20013007	04.12.2020	МІП Красава MIP Krasava	а: 1589 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.12.2023
<b>Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L.</b> <b>Rye (Winter)</b>					
20015002	13.05.2020	Антасія Antasiia	а: 1626 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.12.2023



## Відомості про відмову у державній реєстрації прав на сорт

### Information on refusal of state registration of rights to a variety

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Назва сорту Variety denomination	а: Заявник (код) б: Представник (код) а: Applicant (code) б: Representative (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Дата відмови Date of refusal
<b>Пшениця м'яка (яра)</b> <i>Triticum aestivum</i> L. <b>Soft Wheat (Spring)</b>					
20013007	04.12.2020	МІП Красава MIP Krasava	а: 1589 б:	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	14.12.2023

# Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

## List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

### Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Сільськогосподарські: злаки</b> Agricultural: Field cereal <b>Ячмінь звичайний (ярий)</b> <i>Hordeum vulgare</i> L. <b>Barley (Spring)</b> ( <i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum grex culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
23020005	CB Скорє CB Score / CB Score		1797	1797			2023				
<b>Кукурудза звичайна</b> <i>Zea mays</i> L. <b>Maize, Corn</b> ( <i>Zea americana</i> ; <i>Zea alba</i> ; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalisia mays</i> O. Kuntze.)											
© 20009136	EB3738 EW3738 / EW3738	F1	844	844	844		2023				
© 20009139	EB3077 EV3077 / EV3077	F1	844	844	844		2023				
© 20009140	ІНТЕРАКТИС INTERACTIS / INTERAKTIS	F1	844	844	844		2023				
© 20009134	ДКC4726 DKC4726 / DKC4726	F1	844	844	844		2023				
20009176	ЕС Філдголд ES Fieldgold / ES Fieldgold	F1	2890	2890			2023				
© 20009175	ЕС320103 ESZ20103 / ESZ20103	F1	806	806	806		2023				
20009198	Алатус Алатус / Alatus	F1	2676	2676			2023	СП			
20009172	ЛІДЗ306С LID3306C / LID3306C	F1	2890	2890			2023				
© 20009093	EB4665 EV4665 / EV4665	F1	844	844	844		2023				
© 20009095	ІНФЛЮЕНЦ INFLUENCE / INFLUENCE	F1	844	844	844		2023				
© 20009177	ЕС320208 ESZ20208 / ESZ20208	F1	806	806	806		2023				
© 20009226	A8810 A8810 / A8810	F1	2760	2760	2760		2023	СЛ			
© 19009202	ЕС ТРЕВЕЛЕР ES TRAVELER / ES TRAVELER	F1	806	806	806		2023				
© 19009200	ЕС СУБМАРИНА ES SUBMARINE / ES SUBMARINE	F1	806	806	806		2023				
21009082	БУРБОН BOURBON / BOURBON	F1	2720	2720			2023				
© 21009013	Арго Argo / Arho	F1	1581	1581	1581		2023				
© 21009016	Гарт Gart / Hart	F1	1581 2260	1581 2260	1581 2260		2023				
© 21009155	АФК Гроуз АФК Гроуз / AFK Hrouz	F1	655	655	655		2023	СЛ			
© 21009159	Рекольт Rekolt / Rekolt	F1	2849	2514	2514		2023				
© 21009160	Паттерн Pattern / Pattern	F1	2849	2514	2514		2023				
© 21009161	Коїн Koın / Koın	F1	2849	2514	2514		2023				
© 21009162	Клеонс Kleonc / Kleons	F1	2849	2514	2514		2023				
21009085	МАС 282К MAS 282K / MAS 282K	F1	2720	2720			2023				

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володієць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
22009019	ДН Фонд ДН Фонд / DN Fond	F1	2794	2260	2260		2023				
22009020	ДН Летава ДН Летава / DN Letava	F1	2794	2260	2260		2023				
22009001	Такт Такт / Takt	F1	2794 921	2260 921	2260 921		2023				
22009003	Мелодія Мелодія / Melodiia	F1	2794 921	921 2260	2260 921		2023				
22009024	ДМС Траян ДМС Траян / DMS Traian	F1	2558	2558	2558		2023	С			
22009002	Альт Альт / Alt	F1	2794 921	2260 921	2260 921		2023				
22009004	КМ 5960 КМ 5960 / KM 5960	F1	2257	2257	2257		2023				
21009089	Ерест Ерест / Ereest	F1	2742	2742	2742		2023				
22009029	ДМС Триод ДМС Триод / DMS Triod	F1	2558	2558	2558		2023	С			
22009009	ГРОВІКС ГРОВІКС / GROWIX	F1	2257	2257	2257		2023				
22009008	КМ 3490 КМ 3490 / KM 3490	F1	2257	2257	2257		2023				
22009005	КМ 2020 КМ 2020 / KM 2020	F1	2257	2257	2257		2023				
22009025	ДМС Таргет ДМС Таргет / DMS Tarhet	F1	2558	2558	2558		2023	СП			
21009080	ЦИТАДЕЛЬ CITADEL / CITADEL	F1	2720	2720			2023				
21009156	АФК Фреш АФК Фреш / AFK Fresh	F1	655	655	655		2023	С			
22009018	ДН Сінтоле ДН Сінтоле / DN Sintole	F1	2794	2260	2260		2023				
21009088	Ерекорт Ерекорт / Erekort	F1	2742	2742	2742		2023				
21009158	Голд 300 Голд 300 / Hold 300	F1	2251	2251			2023	СЛ			
21009157	Голд 220 Голд 220 / Hold 220	F1	2251	2251			2023	СЛ			
22009012	КМ 3131 КМ 3131 / KM 3131	F1	2257	2257	2257		2023				
22009011	КМ 2170 КМ 2170 / KM 2170	F1	2257	2257	2257		2023				
22009010	КМ 5710 КМ 5710 / KM 5710	F1	2257	2257	2257		2023				
22009007	КМ 3182 КМ 3182 / KM 3182	F1	2257	2257	2257		2023				
22009006	КМ 2165 КМ 2165 / KM 2165	F1	2257	2257	2257		2023				
20009091	ЕЮ4139 EU4139 / EU4139	F1	844	844	844		2023				
21009036	Хунта Хунта / Khunta	F1	2784 2785	2784 2785	2784 2785		2023				
21009094	СПЕКТРАЛ SPECTRAL / SPECTRAL	F1	2643	1219			2023				
23009006	Селеріна Celerina / Celerina	F1	2890	2890			2023				
21009126	Тоналіт Tonalit / Tonalit	F1	2890	2890			2023				
21009130	Коконат Coconut / Coconut	F1	2890	2890			2023				
21009132	Кінгстоун Kingstone / Kingstone	F1	2890	2890			2023				
23009069	РЖТ АЛІККС ДУО RGT ALYXX DUO / RGT ALYXX DUO	F1	1783	1783			2023				
23009085	БЛЕґДІН BLANDEEN / BLANDEEN	F1	793	793			2023				
23009102	ЛГ31280 LG31280 / LG31280	F1	793	793			2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
23009108	ЕГЛАНТИН EGLANTEEN / EGLANTEEN	F1	793	793			2023				
23009109	ЛГ30258 LG30258 / LG30258	F1	793	793			2023				
© 20009227	A9011 A9011 / A9011	F1	2760	2760	2760		2023	С			
© 21009041	Мірісса Mirissa / Mirissa	F1	2793	2793	2793		2023				
© 20009171	ЛІД3130Ц LID3130C / LID3130C	F1	806	806	806		2023				
21009081	МАС 333Т MAS 333T / MAS 333T	F1	2720	2720			2023				
© 22009026	ДМС Таллер DMS Taller / DMS Taller	F1	2558	2558	2558		2023	СЛП			
© 22009028	Гермес Hermes / Hermes	F1	2558 2761	2558 2761	2558 2761		2023	С			
© 21009154	ДОНЕРІККС DONERIXX / DONERIXX	F1	1783	1783	1783		2023	СЛ			
21009096	СИ ДІПЛОМАТ SY DIPLOMAT / SY DIPLOMAT	F1	2643	1219			2023				
21009093	СИ ЕЛЕНОР SY HELENOR / SY HELENOR	F1	2643	1219			2023				
22009034	Фармюллер Farmueller / Farmueller	F1	2569	2569			2023				
22009033	Візібл Visible / Visible	F1	2569	2569			2023				
© 22009040	АС 240 AS 240 / AS 240	F1	2871	2871	2871		2023	СЛП			
21009095	СИ ТОПАЗ SY TOPAZE / SY TOPAZE	F1	2643	1219			2023				
22009049	Рубікон Rubikon / Rubikon	F1	2873	2873			2023	С			
21009127	Санбїрд Sunbird / Sunbird	F1	2890	2890			2023				
21009134	Калькута Kalkuta / Kalkuta	F1	2890	2890			2023				
21009092	СИ АМФОРА SY AMFORA / SY AMFORA	F1	2644	1959			2023				
21009097	СИ ФАБІО SY FABIO / SY FABIO		2643	1219			2023				
23009082	ЕШЛІ ASHLEY / ASHLEY	F1	793	793			2023				
21009129	ЛІД4040Ц LID4040C / LID4040C	F1	2890	2890			2023				
21009135	Вінтерстоун Winterstone / Winterstone	F1	2890	2890			2023				
23009103	ЛГ31217 LG31217 / LG31217		793	793			2023				
23009099	ЛГ31228 LG31228 / LG31228		793	793			2023				
23009110	ЛГ31207 LG31207 / LG31207		793	793			2023				
23009083	КЛУНІ CLOONEY / CLOONEY		793	793			2023				
23009098	ЛГ21245 LG21245 / LG21245		793	793			2023				
<b>Кукурудза звичайна – батьківський компонент Zea mays L. Maize, Corn – parental component</b>											
20909111	СМС6466 CMS6466 / CMS6466	С3	2720	2720			2023				
20909113	ССС6475 CSC6475 / CSC6475	С3	2720	2720			2023				
© 20909143	М38403 M3840Z / M3840Z	С3	844	844	844		2023				
© 20909239	АК335 AK335 / AK335	С3	2760	2760	2760		2023				
© 20909238	АТ1635 AT1635 / AT1635	С3	2760	2760	2760		2023				

## Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 20909145	V46643 V4664Z / V4664Z	C3	844	844	844		2023				
® 20909106	V34363 V3436Z / V3436Z	C3	844	844	844		2023				
® 20909240	ZM446 ZM446 / ZM446	C3	2760	2760	2760		2023				
® 20909147	V42703 V4270Z / V4270Z	C3	844	844	844		2023				
21909027	БКс19С023 ВХ19S023 / ВХ19S023	C3	2569	2569			2023				
® 21909046	ДА 48 DA 48 / DA 48	C3	2787	2787	2787		2023				
® 21909045	БВМ 01 BVM 01 / BVM 01	C3	2784 2785	2784 2785	2784 2785		2023				
® 21909044	БВМ 465 BVM 465 / BVM 465	C3	2784 2785	2784 2785	2784 2785		2023				
® 21909066	КП 05 KP 05 / KP 05	C3	2793	2793	2793		2023				
21909135	ЛПХ3915 LPH3915 / LPH3915	C3	2720	2720			2023				
® 21909189	АФК 0321 AFK 0321 / AFK 0321	C3	655	655	655		2023				
® 21909198	СГ776 Мсм SH776 Mst / SH776 Mst	F1	2849	2514	2514		2023				
® 21909199	СГ292 Ссм SH292 Sst / SH292 Sst	F1	2849	2514	2514		2023				
® 22909017	ДК2239МВ DK2239MV / DK2239MV	C3	2794	2260	2260		2023				
21909132	ЛРБ6379 LRB6379 / LRB6379	C3	2720	2720			2023				
® 21909200	АФК 0221 AFK 0221 / AFK 0221	C3	655	655	655		2023				
® 21909138	В 781 СВ V 781 SV / V 781 SV	C3	2742	2742	2742		2023				
21909090	Дружба С Druzhba S / Druzhba S	F1	2204	2204			2023				
® 22909012	НКЗ 1206 NKZ 1206 / NKZ 1206	F1	2257	2257	2257		2023				
® 22909009	ПК 1931 PK 1931 / PK 1931	C3	2257	2257	2257		2023				
® 21909194	РЛ272 СВ RL272 SV / RL272 SV	C3	2849	2514	2514		2023				
® 21909195	РЛ2275 МВ RL2275 MV / RL2275 MV	C3	2849	2514	2514		2023				
® 21909196	С274 СВ S274 SV / S274 SV	C3	2849	2514	2514		2023				
® 21909197	С17 СВ S17 SV / S17 SV	C3	2849	2514	2514		2023				
® 21909065	КМ 234 KM 234 / KM 234	C3	2793	2793	2793		2023				
® 22909013	ПК 1838 PK 1838 / PK 1838	C3	2257	2257	2257		2023				
® 22909011	СМК 201 SMK 201 / SMK 201	C3	2257	2257	2257		2023				
21909134	ЛЮН2444 LJN2444 / LJN2444	C3	2720	2720			2023				
® 22909010	ПВК 1408 PVK 1408 / PVK 1408	C3	2257	2257	2257		2023				
® 21909146	В 1485 зс V 1485 zs / V 1485 zs	C3	2742	2742	2742		2023				
21909052	СМ 395 СМ 303 SM 395 SM 303 / SM 395 SM 303	F1	2569	2569			2023				
21909089	Союз М Soiuz M / Soiuz M	F1	2204	2204			2023				
21909136	ЛПФ3933 LPF3933 / LPF3933	C3	2720	2720			2023				
® 21909188	АФК 0121 AFK 0121 / AFK 0121	C3	655	655	655		2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
© 21909139	Ерена С Ерена С / Erena S	F1	2742	2742	2742		2023				
© 20909109	ДЖ13753 J1375Z / J1375Z	C3	844	844	844		2023				
© 22909033	МКВ01 МКВ01 / MKV01	C3	2558	2558	2558		2023				
© 21909140	В 753 зс В 753 зс / V 753 zs	C3	2742	2742	2742		2023				
© 21909141	В 772 с В 772 с / V 772 s		2742	2742	2742		2023				
© 21909142	В 7471 СВ В 7471 СВ / V 7471 SV	C3	2742	2742	2742		2023				
© 21909143	В 736 зс В 736 зс / V 736 zs	C3	2742	2742	2742		2023				
© 21909184	Р19013 R19013 / R19013	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909185	Р08053 Р08068 R08053 R08068 / R08053 R08068	F1	1783	1783	1783		2023				
© 21909151	ЦІД2457 ЦІД2455 CID2457 CID2455 / CID2457 CID2455	F1	2643	1219	1219		2023				
© 21909152	ЕГІД3959 EGID3959 / EGID3959	C3	2643	1219	1219		2023				
© 22909020	ДК2525СВ3М DK2525CB3M / DK2525SVZM	C3	2794	2260	2260		2023				
© 22909021	ДК3643СВ3М DK3643CB3M / DK3643SVZM	C3	2794	2260	2260		2023				
© 22909022	ДК2663С DK2663C / DK2663S		2794	2260	2260		2023				
© 22909024	Крос350С Kros350C / Kros350S	F1	2794	2260	2260		2023				
© 22909001	КІЮІА320В І00374 QIA320V IO0374 / QIA320V IO0374	F1	793	793	793		2023				
© 22909006	КЮЛБ34ІВ ПДА01ВІ QLB34IV PDA01VI / QLB34IV PDA01VI	F1	793	793	793		2023				
23909044	РВІ323 RVI323 / RVI323	C3	793	793			2023				
23909045	РВІ441 RVI441 / RVI441	C3	793	793			2023				
23909047	КЮКЮА28ВІ QQA28VI / QQA28VI	C3	793	793			2023				
© 23909050	СГ1035 SG1035 / SH1035	F1	2849	2514	2514		2023				
22909043	СМ 667 SM 667 / SM 667	C3	2569	2569			2023				
23909048	ЛІМІВВ957 LIMIVV957 / м	C3	793	793			2023				
© 23909052	СА1311 СВзМ SA1311 CBzM / SA1311 SVzM	C3	2849	2514	2514		2023				
© 22909002	КЮЛЦ99ФФ QLC99FF / QLC99FF	C3	793	793	793		2023				
22909053	СМ 224 SM 224 / SM 224	C3	2569	2569			2023				
© 23909051	С3025 МВ C3025 MB / S3025 MV	C3	2849	2514	2514		2023				
© 23909053	СГ1135 Мсм SG1135 Mcm / SH1135 Mst	F1	2849	2514	2514		2023				
22909051	СМ 360 SM 360 / SM 360	C3	2569	2569			2023				
23909042	ІВВ666 IVV666 / IVV666	C3	793	793			2023				
21909031	СМ395 СМ440 SM395 SM440 / SM395 SM440	F1	2569	2569			2023				
21909053	СМ 305 SM 305 / SM 305	C3	2569	2569			2023				
21909054	СМ 307 SM 307 / SM 307	C3	2569	2569			2023				

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21909055	SM 425 SM 425 / SM 425	C3	2569	2569			2023				
21909057	SM 636 SM 636 / SM 636	C3	2569	2569			2023				
21909058	SM 637 SM 637 / SM 637	C3	2569	2569			2023				
21909059	SM 658 SM 658 / SM 658	C3	2569	2569			2023				
21909036	БКс14Н037 BX14N037 / BX14N037	C3	2569	2569			2023				
21909087	НА 231BC НА 231BC / NA 231VS	C3	2204	2204			2023				
21909088	НА 380BM НА 380BM / NA 380VM	C3	2204	2204			2023				
© 22909029	СДМ74 СДМ74 / SDM74	C3	2558	2558	2558		2023				
© 22909030	МС744301 МС744301 / MS744301	C3	2558	2558	2558		2023				
© 22909031	МС306 МС306 / MS306	C3	2558	2558	2558		2023				
© 22909032	МС255 МС255 / MS255	C3	2558	2558	2558		2023				
© 21909144	В 772 зс В 772 зс / V 772 zs	C3	2742	2742	2742		2023				
© 21909145	Ерая С Ерая С / Eraia S	F1	2742	2742	2742		2023				
© 21909183	P21029 R21029 / R21029	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909150	ЦІД2455 CID2455 / CID2455	C3	2643	1219	1219		2023				
© 21909153	ФСАКС3928 FSAX3928 / FSAX3928	C3	2643	1219	1219		2023				
© 21909155	БАА1197 BAA1197 / BAA1197	C3	2643	1219	1219		2023				
© 22909018	ДК2329 ЗСЗМ DK2329 ZSZM / DK2329 ZSZM	C3	2794	2260	2260		2023				
© 21909186	P21028 R21028 / R21028	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909154	ФСІД3818 FSID3818 / FSID3818	C3	2643	1219	1219		2023				
© 22909137	P18021 R18021 / R18021	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909187	P10001 ЦМС R10001 CMS / R10001 CMS	C3	1783	1783	1783		2023				
© 22909138	P19017 R19017 / R19017	C3	1783	1783	1783		2023				
23909043	РВЛ173 RVL173 / RVL173	C3	793	793			2023				
© 22909005	ПРЦ12ФФ PRC12FF / PRC12FF	C3	793	793	793		2023				
© 22909007	РФЦ61ББ RFC61BB / RFC61BB	C3	793	793	793		2023				
22909050	СМ 306 SM 306 / SM 306	C3	2569	2569			2023				
22909059	АБ 25 AB 25 / AB 25	C3	2871	2871			2023				
22909060	АМ 15 AM 15 / AM 15	C3	2871	2871			2023				
© 21909176	Р07096 СМС R07096 SMS / R07096 SMS	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909177	P14010 P15076 R14010 R15076 / R14010 R15076	F1	1783	1783	1783		2023				
© 21909178	P18009 R18009 / R18009	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909180	P20009 R20009 / R20009	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909181	P21020 R21020 / R21020	C3	1783	1783	1783		2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володівець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
© 21909182	P21021 R21021 / R21021	C3	1783	1783	1783		2023				
© 21909149	ГЕІКС1770 GEIX1770 / GEIX1770	C3	2644	1959	1959		2023				
© 21909148	АРА2528 ARA2528 / ARA2528	C3	2644	1959	1959		2023				
© 22909019	Крос269С Крос269С / Kros269S	F1	2794	2260	2260		2023				
22909054	SM 360 SM 224 SM 360 SM 224 / SM 360 SM 224	F1	2569	2569			2023				
© 22909193	P11002 R11002 / R11002	C3	1783	1783	1783		2023				
© 22909194	P10034 R10034 / R10034	C3	1783	1783	1783		2023				
<b>Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse</b>											
<b>Квасоля звичайна (зернова) Phaseolus vulgaris L.</b>											
<b>French Bean (Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hort.; Phaseolus cruentus Hort.; Phaseolus zedra; Phaseolus subglobosus Fingerh.; Phaseolus vexillatus Blanco; Phaseolus melanospermus Fingerh.; Phaseolus dimidiatus Haberle; Phaseolus pictus Cav.; Phaseolus nigricans Haberle)</b>											
© 21025001	Садгорянка Садгорянка / Sadhorianka	C3	2723	2723	2723		2023	Л	СВЖ		
<b>Соя культурна Glycine max (L.) Merr.</b>											
<b>Soya Bean (Glycine max (L.) Merrill; Glycine hispida var. lutea Skvortsov; Glycine soja (L.) Merr.; Glycine hispida var. brunnea Skvortsov; Glycine gracilis Skvortsov; Phaseolus max L.; Dolichos soja L.; Soja hispida Moench; Phaseolus sordilis Salisb.; Soja japonica Savi; Soja angustifolia Miq.; Glycine tabacina; Glycine tomentosa Benth.; Glycine hispida (Moench) Maxim.; Soja soja Karst.; Soja max Piper)</b>											
© 21045001	Господиня Господиня / Hospodynja	C3	1581	1581	1581		2023	СП			
© 21045034	АФК Темпо АФК Темпо / AFK Tempo	C3	655	655	655		2023	СЛП			
© 21045033	АФК Фест АФК Фест / AFK Fest	C3	655	655	655		2023	С			
© 20045046	КСЖ 19005 CSJ 19005 / CSJ 19005	C3	2653	485	485		2023	СП			
23045018	ПРОЦЕРА 1020 PROCERA 1020 / PROCERA 1020	C3	2788	2788			2023				
20045052	Сахара Sahara / Sahara	C3	912	912			2023	СЛП			
© 21045035	АФК Спрін АФК Спрін / AFK Sprin	C3	655	655	655		2023	СЛП			
© 21045017	ПР2203 PR2203 / PR2203		142	142	142		2023	СЛП			
© 21045014	Мая Maia / Maia		142	142	142		2023	СЛП			
22045016	ФРИНЕ FRINE / FRINE		2863	2863			2023	СЛП			
23045020	САНКАРА SANKARA / SANKARA		1783	1783			2023				
22045017	ФІОРЕЛЛА FIORELLA / FIORELLA		2863	2863			2023	СЛ			
22045014	ДМ АМБАР DM AMBAR / DM AMBAR		2863	2863			2023	СЛП			
© 21045015	СВХ20Т00С4 SVX20T00S4 / SVX20T00S4		2061	2061	2061		2023	СЛП			
© 21045013	ПР2204 PR2204 / PR2204		142	142	142		2023	СЛ			
22045015	ФАНТИНЕ FANTINE / FANTINE		2863	2863			2023	СЛП			
© 21045016	ПР2202 PR2202 / PR2202		142	142	142		2023	СЛП			
22045018	ДМ ЕАСТИНА DM EASTINA / DM EASTINA		2863	2863			2023	СЛП			
<b>Сільськогосподарські: круп'яні Agricultural: Field groats</b>											
<b>Сорго звичайне (двокольорове) Sorghum bicolor L.</b>											
<b>Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench; Holcus sorghum; Holcus bicolor L.; Holcus arduini Gmel.; Andropogon bicolor Roxb.; Andropogon halepensis var. bicolor Vined et Druce.)</b>											
© 20018013	АДВ Ф7103 ADV F7103 / ADV F7103	F1	2834	2554	2554		2023				



Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
© 20018014	АДВГ 2168 ІГ ADVG 2168 IG / ADVG 2168 IG	F1	2834	2554	2554		2023				
21018004	ГІГАНТ GIGANT / GIGANT	F1	2838	2838			2023				
© 20018015	У55045 U55045 / U55045	F1	2834	2554	2554		2023				
20018010	ЕС МОНСУН ES MONSOON / ES MONSOON		806	806			2023				
© 20018002	АДВ Ф8322 ADV F8322 / ADV F8322	F1	2834	2554	2554		2023	СЛ			
© 20018003	АДВГ 1329 ADVG 1329 / ADVG 1329	F1	2834	2554	2554		2023	СЛ			
21018003	ДЖАМІ JAMI / JAMI	F1	2838	2838			2023				

**Сільськогосподарські: олійні та прядивні  
Соняшник однорічний  
Sunflower**

**Agricultural: Oil and Fibre  
*Helianthus annuus* L.  
(*Helianthus annuus* [unranked] *lenticularis* (Douglas) Cockerell; *Helianthus annuus* subsp. *annuus* L.; *Helianthus annuus* subsp. *jaegeri* (Heiser) Heiser; *Helianthus annuus* subsp. *lenticularis* (Douglas) Cockerell; *Helianthus annuus* subsp. *texanus* Heiser; *Helianthus annuus* var. *annuus* L.; *Helianthus annuus* var. *macrocarpus* (DC.) Cockerell; *Helianthus jaegeri* Heiser; *Helianthus lenticularis* Douglas; *Helianthus debilis* Nutt.; *Helianthus indicus* L.; *Helianthus tubaeformis* Nutt.; *Helianthus platycephalis*.; *Helianthus macrocarpus* DC.; *Helianthus ovatus* Lehm.; *Helianthus colossus* O. Ktze.; *Helianthus erythrocarpus* Bartl.; *Helianthus multiflorus* Hook.; *Helianthus grandiflorus* Wender.; *Helianthus cultus* Venzl.; *Helianthus ruderalis* Venzl.)**

© 21039005	Хорив Хорив / Khoryv	F1	1581	1581	1581		2023				
© 20039076	1003Л 1003Л / 1003L	F1	806	806	806		2023				
© 21039109	Ф4413В0 Ф4413В0 / F4413V0	C3 F1	2195	2195	2195		2023				
© 21039110	Ф2687 ЦЛ Ф2687 ЦЛ / F2687 TsL	C3	2195	2195	2195		2023				
21039020	НА Тасумо NA Tasumo / NA Tasumo	F1	2204	2204			2023				
21039025	НА Кайрос NA Kairos / NA Kairos	F1	2204	2204			2023				
21039028	НА Альтаір NA Altair / NA Altair	F1	2204	2204			2023				
© 22039004	КС 5210 KS 5210 / KS 5210	F1	2257	2257	2257		2023				
22039003	КС 4100 імі KS 4100 imi / KS 4100 imi	F1	2257	2257			2023				
21039024	НА Акрас NA Akras / NA Akras	F1	2204	2204			2023				
21039026	НА Тесан NA Tiesan / NA Tiesan	F1	2204	2204			2023				
© 21039113	Са Лана Sa Lana / Sa Lana	F1	1517	1517	1517		2023				
© 22039001	М94С35 M94S35 / M94S35	F1	273	273	273		2023				
21039019	НА Актар NA Aktar / NA Aktar	F1	2204	2204			2023				
© 21039098	Джерсі Jersey / Jersey	F1	1783	1783	1783		2023				
© 21039006	Яскравий Yaskravyy / Yaskravyy	F1	1581	1581	1581		2023				
21039027	НА Юміс NA Uumis / NA IUmis	F1	2204	2204			2023				
© 22039007	ХАЙСАН 151 HYSUN 151 / HYSUN 151	F1	2834	2554	2554		2023				
© 21039096	Людмила Ludmilla / Ludmilla	F1	1783	1783	1783		2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Соняшник однорічний – батьківський компонент</b> <b>Sunflower – parental component</b>											
<i>Helianthus annuus</i> L. ( <i>Helianthus annuus</i> [unranked] <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>jaegeri</i> (Heiser) Heiser; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>lenticularis</i> (Douglas) Cockerell; <i>Helianthus annuus</i> subsp. <i>texasus</i> Heiser; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>annuus</i> L.; <i>Helianthus annuus</i> var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell; <i>Helianthus jaegeri</i> Heiser; <i>Helianthus lenticularis</i> Douglas; <i>Helianthus debilis</i> Nutt.; <i>Helianthus indicus</i> L.; <i>Helianthus tubaeformis</i> Nutt.; <i>Helianthus platycephalis</i> .; <i>Helianthus macrocarpus</i> DC.; <i>Helianthus ovatus</i> Lehm.; <i>Helianthus colossus</i> O. Ktze.; <i>Helianthus erythrocarpus</i> Bartl.; <i>Helianthus multiflorus</i> Hook.; <i>Helianthus grandiflorus</i> Wender.; <i>Helianthus cultus</i> Venzl.; <i>Helianthus ruderalis</i> Venzl.)											
© 20939176	ДК 22 Б ДК 22 Б / DK 22 B		2766	2766	2766		2023				
20939122	ФР84259 FR84259 / FR84259	C3	2643	1219			2023				
21939020	НР 0111В NR 0111V / NR 0111V	C3	2204	2204			2023				
21939019	НР 0041В NR 0041V / NR 0041V	C3	2204	2204			2023				
© 21939058	Ф5ДН3М2А F5DN3M2A / F5DN3M2A	C3	1435	1435	1435		2023				
© 21939060	СФ2615МЖІА SF2615MJIA / SF2615MJIA	C3	1435	1435	1435		2023				
22939009	ХП3222ПР HP3222PR / HP3222PR	C3	2256	2256			2023				
© 21939061	Р16ЕІ3М R16EI3M / R16EI3M	C3	1435	1435	1435		2023				
© 21939063	Р4НП8М2Ж R4NP8M2J / R4NP8M2J	C3	1435	1435	1435		2023				
© 21939066	Р5ПЕ4МК R5PE4MK / R5PE4MK	C3	1435	1435	1435		2023				
© 22939001	СТ 1922 ST 1922 / ST 1922	C3	2257	2257	2257		2023				
21939021	НР 0031В NR 0031V / NR 0031V	C3	2204	2204			2023				
© 21939059	Ф10БЗ2М20А F10BZ2M20A / F10BZ2M20A	C3	1435	1435	1435		2023				
© 20939057	РГА ІР 3РФ RHA IR 3RF / RHA IR 3RF	C3	2743	2743	2743		2023				
© 20939058	РХА 5РФ ІР RHA 5RF IR / RHA 5RF IR	C3	2743	2743	2743		2023				
© 21939065	Р14ЗЕ2МЖО R14ZE2MJ0 / R14ZE2MJ0	C3	1435	1435	1435		2023				
© 21939067	Р4НХ1МІ R4NX1MI / R4NX1MI	C3	1435	1435	1435		2023				
© 22939006	33566 33566 / 33566	C3	2834	2554	2554		2023				
© 22939007	19303 19303 / 19303	F1	2834	2554	2554		2023				
© 20939175	ДК 22 А ДК 22 А / DK 22 А		2766	2766	2766		2023				
© 20939137	СС 2019 SS 2019 / SS 2019	C3	2257	2257	2257		2023				
© 21939116	РХ789СУЛ RH789SUL / RH789SUL	C3	2267	2267	2267		2023				
© 21939115	РХ569СУЛ RH569SUL / RH569SUL	C3	2267	2267	2267		2023				
23939042	70004Рсуол 70004RsuoL / 70004RsuoL	C3	2890	2890			2023				
© 20939054	ЛЦ658АІР LC658AIR / LC658AIR	C3	2743	2743	2743		2023				
20939105	Р13СС3МЖ R13SS3MJ / R13SS3MJ	C3	1435	1435			2023				
© 21939062	Р16ПС1МЖК R16PC1MJK / R16PC1MJK	C3	1435	1435	1435		2023				
© 21939064	Р5ПЕ4МЖ R5PE4MJ / R5PE4MJ	C3	1435	1435	1435		2023				
© 21939106	РТ7120 RT7120 / RT7120	F1	1783	1783	1783		2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 21939107	PT7220 RT7220 / RT7220	C3	1783	1783	1783		2023				
® 22939049	AT1119 AT1119 / AT1119	C3	1783	1783	1783		2023				
® 22939048	AT1720 AT1720 / AT1720	C3	1783	1783	1783		2023				
® 22939047	PT6920 RT6920 / RT6920	C3	1783	1783	1783		2023				
® 22939055	PT7521 RT7521 / RT7521	C3	1783	1783	1783		2023				
® 22939056	PT5919 RT5919 / RT5919	C3	1783	1783	1783		2023				
21939032	TRC5263P TRS5263R / TRS5263R		2720	2720			2023				
21939030	TRX5190P TRH5190R / TRH5190R		2720	2720			2023				
21939033	TRO5033P TRO5033R / TRO5033R		2720	2720			2023				
21939031	TRC5270P TRC5270R / TRC5270R		2720	2720			2023				
21939083	TRI5567P TRI5567R / TRI5567R		2720	2720			2023				
<b>Гірчиця біла Sinapis alba L.</b> <b>White Mustard (Raphanus albus Crantz; Sinapis hispida Tenore; Bonnania officinalis Presl; Napus leucosinapis Schimper et Sponner.; Sinapisrum album Chev.; Eruca alba Noulet; Brassica alba Rabenhorst; Crucifera lampsana Krause; Sinapis dissecta Lag.; Brassica dissecta Schmalh.)</b>											
23380002	САЛЬФА САЛЬФА / SALFA		3227	3227			2023				
<b>Конопля посівна Cannabis sativa L.</b> <b>Нерп (Cannabis chinensis Delile; Cannabis erratica Siev.; Cannabis foetens Gilib.; Cannabis lupulus Scop.; Cannabis macrosperma Stokes; Cannabis gigantea Hort.)</b>											
22080001	Орловські Орловські / Orlovski	П	2430	2430			2023	СЛП	ТХН		
<b>Гірчиця чорна Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch</b> <b>Black Mustard (Brassica nigra (L.) W. Koch; Brassica nigra var. abyssinica A. Braun; Sinapis nigra L.)</b>											
23219001	МЕДІВА MEDIVA / MEDIVA	С	3227	3227			2023				
<b>Сільськогосподарські: буряк Agricultural: Beet</b> <b>Буряк цукровий Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell</b> <b>Sugar Beet (Beta vulgaris L. ssp. europea convar. saccharifera (Alef.) Krass.; Beta vulgaris provar. altissima Doll.; Beta alba Langenthal.; Beta vulgaris L. ssp. saccharifera Alef.)</b>											
21069033	ФД Стартер Смарт FD Starter Smart / FD Starter Smart	F1	796	796			2023				
21069013	БТС 1920 BTS 1920 / BTS 1920	F1	1974	1974			2023	ЛП			
21069015	БТС 4685 Н BTS 4685 N / BTS 4685 N	F1	1974	1974			2023	ЛП			
21069023	ТОТЕМ TOTEM / TOTEM	F1	1628	1628			2023	ЛП			
21069022	МАРУН MAROON / MAROON	F1	1628	1628			2023	ЛП			
21069020	БТС 2645 BTS 2645 / BTS 2645	F1	1974	1974			2023	ЛП			
21069021	БТС СМАРТ 9685 BTS SMART 9685 / BTS SMART 9685	F1	1974	1974			2023	ЛП			
23069008	Ріголетто Rigoletto / Rigoletto	F1	2552	2552			2023				
23069009	СМАРТ ПЕРЛА КВС SMART PERLA KWS / SMART PERLA KWS	F1	2649	2649			2023				
23069007	Занна Zappa / Zappa	F1	2552	2552			2023				
® 21069032	ФД Крампон FD Crampon / FD Crampon	F1	796	796	796		2023	ЛП			
<b>Буряк кормовий Beta vulgaris L.</b> <b>Fodder Beet (Beta vulgaris L. ssp. europea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. virescens Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. lutea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. aurantia Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. rosea Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. rubidus Krass.; Beta vulgaris L. ssp. europea Krass. var. crassa Alef.)</b>											
23166001	ГУСТЕЯ КВС GUSTEA KWS / GUSTEA KWS	F1	2649	2649			2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Сільськогосподарські: кормові</b> Agricultural: Fodder											
<b>Сорго суданське</b> <i>Sorghum sudanense</i> (Piper.) Stapf											
<b>Sudan Grass</b> ( <i>Andropogon sorghum sudanensis</i> Piper; <i>Sorghum exiguum</i> auct., non Piper; <i>Andropogon sorghum</i> var. <i>sudanensis</i> )											
21227001	Альтура Альтура / Altura	П	2805 2806	2805 2806			2023	СЛП	Н, СД		
<b>Костриця овеча</b> <i>Festuca ovina</i> L.											
<b>Sheep's Fescue</b> ( <i>Festuca ovina</i> L. var. <i>ovina</i> ; <i>Festuca ovina</i> var. <i>vivipara</i> L.; <i>Bromus ovinus</i> Scop.; <i>Avena ovina</i> Salisb.; <i>Festuca sciaphila</i> Schur.; <i>Festuca guestphalica</i> Beenn.)											
© 21473002	Блискавка Блискавка / Blyskavka	П	1626	1626	1626		2023				
<b>Люцерна мішлява</b> <i>Medicago x varia</i> Martyn											
<b>Hybrid Lucerne</b> ( <i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> & <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> , <i>Medicago sativa</i> L. nothosubsp. <i>varia</i> (Martyn) Arcang.)											
© 20364004	Індіго Індіго / Indigo	С	1626	1626	1626		2023				
© 20364003	Янтарна Янтарна / Yantarna	С	1626	1626	1626		2023				
© 20364001	Струмочок Струмочок / Strumochok	П	3221	3221	3221		2023				
<b>Фацелія пижмолиста</b> <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.											
<b>Scorpion Weed, Lacy phacelia, California bluebell</b> ( <i>Phacelia tripinnata</i> Hort.)											
23161001	ФОЛІС ФОЛІС / FOLIS	С	3227	3227			2023				
<b>Сільськогосподарські: овочеві</b> Agricultural: Vegetable											
<b>Капуста броколі</b> <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.											
<b>Calabrese, Sprouting Broccoli</b> ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch. x <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabellica</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica oleracea</i> subvar. <i>cymosa</i> Duchesne, <i>Brassica oleracea</i> var. <i>cymosa</i> (Duchesne) DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Litzg. ssp. <i>simplex</i> Litzg.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cultiflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.)											
23136001	Тритон Тритон / Triton	F1	1833	1833			2023				
23136002	Арес Арес / Ares		1833	1833			2023				
<b>Квасоля звичайна (овочева)</b> <i>Phaseolus vulgaris</i> L.											
<b>French Bean</b> ( <i>Phaseolus vulgaris</i> (L.) Savi; <i>Phaseolus nanus</i> L.; <i>Phaseolus romanus</i> ; <i>Phaseolus gonospermus</i> ; <i>Phaseolus saponaceus</i> ; <i>Phaseolus sphaericus</i> ; <i>Phaseolus haematocarpus</i> Savi; <i>Phaseolus compressus</i> DC.; <i>Phaseolus angulosus</i> Schuebl. et Martens; <i>Phaseolus capensis</i> Hort.; <i>Phaseolus cruentus</i> Hort.; <i>Phaseolus zedra</i> ; <i>Phaseolus subglobosus</i> Fingerh.; <i>Phaseolus vexillatus</i> Blanco; <i>Phaseolus melanospermus</i> Fingerh.; <i>Phaseolus dimidiatus</i> Haberle; <i>Phaseolus pictus</i> Cav.; <i>Phaseolus nigricans</i> Haberle)											
23127003	Торскроп Торскроп / Торскроп	С3	1163	1163			2023	СЛПЗГр	свж		
23127002	Бергголд Бергголд / Berggold	С3	1163	1163			2023	ЗГр	свж, пер		
<b>Кукурудза цукрова</b> <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.											
<b>Sweet Corn</b> ( <i>Zea mays</i> L. <i>saccharata</i> Koern.)											
21103007	ФІРЕСТАР FIRESTAR / FIRESTAR	F1	2643	1219			2023	СЛП	свж		
<b>Морква</b> <i>Daucus carota</i> L.											
<b>Carrot</b> ( <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Arcang. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; <i>Daucus sativus</i> (Hoffm.) Roehl.; <i>Daucus carota</i> L. (pro parte); <i>Daucus carota</i> L. var. <i>sativus</i> Hoffm.; <i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> A. Наяк; <i>Daucus sativus</i> Zagor.)											
23109002	КУРОДА ПАУЕР KURODA POWER / KURODA POWER		1833	1833			2023				
23109005	Каталіна Catalina / Catalina		751	751			2023				
<b>Огірок посівний</b> <i>Cucumis sativus</i> L.											
<b>Cucumber</b> ( <i>Cucumis sativus</i> <i>chiar</i> Forsk.; <i>Cucumis esculentus</i> Salisb.; <i>Cucumis muricatus</i> Willd.)											
© 22110008	ФРОСТ FROST / FROST	F1	1852	1852	1852		2023	ЗГр	свж		
23110006	Хелен Helene / Helene	F1	1833	1833			2023	ЗГр	свж		
© 23110011	Герміна Hermina / Hermina	F1	1997	1997	1997		2023	ЗГр	свж		
<b>Пастернак</b> <i>Pastinaca sativa</i> L.											
<b>Parsnip</b> ( <i>Peucedanum sativum</i> S. Watson; <i>Anethum pastinaca</i> Wibel; <i>Peucedanum pastinaca</i> Baill.; <i>Selinum pastinaca</i> Crantz; <i>Heracleum polyphyllum</i> Peterm.; <i>Pastinaca germanica</i> Kirschl.; <i>Pastinaca vulgaris</i> Bubani.)											
23111001	Като Като / Kato	С3	1997	1997			2023	СЛП	свж		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володільць патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.</b> <b>Sweet Pepper, Paprika</b> ( <i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>annuum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> subsp. <i>annuum</i> var. <i>pomiferum</i> ; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>fasciculatum</i> (Sturtev.) Irish; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> (L.) Sendtn.; <i>Capsicum annuum</i> var. <i>longum</i> Sendtn.; <i>Capsicum indicum</i> Rumph.; <i>Capsicum frutescens</i> L.; <i>Capsicum grossum</i> ; <i>Capsicum baccatum</i> L.; <i>Capsicum corsicum</i> ; <i>Capsicum tetragonum</i> ; <i>Capsicum cerasiforme</i> ; <i>Capsicum olivaeformae</i> ; <i>Capsicum peramidale</i> ; <i>Capsicum conoides</i> ; <i>Capsicum minimum</i> Mill.; <i>Capsicum bicolor</i> Jacq.; <i>Capsicum longum</i> DC.; <i>Capsicum cordiforme</i> Mill.; <i>Capsicum mexicanum</i> Haz.)											
22113006	Раєн <i>Rajen / Rajen</i>	C3	1997	1997			2023				
22113007	Гранова <i>Granova / Granova</i>	C3	1997	1997			2023				
22113008	Онтара <i>Ontara / Ontara</i>	C3	1997	1997			2023				
22113009	Рела <i>Rela / Rela</i>	C3	1997	1997			2023				
23113006	Ред Феррарі <i>Red Ferrari / Red Ferrari</i>	F1	1833	1833			2023	ЗГр	свж		
22113010	Андреа <i>Andrea / Andrea</i>	C3	1997	1997			2023				
<b>Помідор їстівний Solanum lycopersicum L.</b> <b>Tomato</b> ( <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill.; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst. ex Farwell; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>esculentum</i> ; <i>Lycopersicon esculentum</i> P. Mill. nom. cons. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) A. Gray; <i>Lycopersicon pomumamori</i> Moench; <i>Solanum lirioides</i> Salisb.; <i>Solanum foliosum</i> Link; <i>Lycopersicon esculentum</i> Alef.; <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karst.; <i>Lycopersicon lycopersicon</i> Britt. et Brown; <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. ssp. <i>esculentum</i> Prokh.)											
23115025	Хайнц2123 <i>Heinz2123 / Heinz2123</i>	F1	3233	3233			2023				
23115026	Хайнц5108 <i>Heinz5108 / Heinz5108</i>		3233	3233			2023				
<b>Редька олійна Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.</b> <b>Fodder Radish</b> ( <i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC.) Metzg.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus hybernus</i> Alef.; <i>Raphanus sativus niger</i> Pers.; <i>Raphanus sativus major</i> Schublet et Mart.)											
23218001	САТІС <i>CATIC / SATIS</i>	C	3227	3227			2023				
<b>Цибуля городня Allium cepa L.</b> <b>Onion, Echalion</b> ( <i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> Helm; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i> (Metzg.) Alef.; <i>Allium esculentum</i> Salisb.; <i>Cepa vulgaris</i> Renault; <i>Cepa esculenta</i> Rafin; <i>Porrum cepa</i> (L.) Rchb.)											
18106002	Контадо <i>Contado / Contado</i>	F1	2086	2086			2023	СЛП			
19106006	Купідо <i>Cupido / Cupido</i>	F1	2086	2086			2023	СЛП			
<b>Цибуля шалот Allium oschaninii O. Fedtsch.</b> <b>Shallot, Grey Shallot</b> ( <i>Allium cepa</i> L. f. <i>ascalonicum</i> Heyne; <i>Porrum ascalonicum</i> (L.) Rchb.; <i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i> Backer.)											
23107001	Шелія <i>Schelia / Schelia</i>	C3	1997	1997	1997		2023	СЛП	свж		
<b>Шпинат городній Spinacia oleracea L.</b> <b>Spinach</b> ( <i>Spinacia domestica</i> Borkh.)											
23130002	Матадор <i>Matador / Matador</i>	П	1163	1163			2023	ЗГр	свж		
<b>Плодові та ягідні Fruit and Berry</b> <b>Груша звичайна Pyrus communis L.</b> <b>Pear</b> ( <i>Pyrus communis</i> L. var. <i>sativa</i> DC.; <i>Pyrus pyraeaster</i> Borkh.; <i>Pyrus sativa</i> Koch; <i>Pyrus achras</i> Gaertn.; <i>Pyrus domestica</i> Medic.)											
20258002	СХ 201 <i>CH 201 / CH 201</i>		2744	2744			2023	С	ун	пс	
<b>Абрикос звичайний Prunus armeniaca L.</b> <b>Apricot</b> ( <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.; <i>Prunus armeniaca</i> var. <i>typica</i> Maxim.; <i>Prunus tiliaefolia</i> Salisb.)											
23256001	Голдріч <i>Goldrich / Goldrich</i>		3218	3218			2023	СЛП	ун	сс	
<b>Черешня Prunus avium L.</b> <b>Sweet Cherry</b> ( <i>Prunus avium</i> (L.) L.; <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench; <i>Prunus avium</i> Moench; <i>Prunus cerasus</i> var. <i>avium</i> L.; <i>Cerasus nigra</i> Mill.; <i>Cerasus dulcis</i> Gaertn.; <i>Cerasus ruracina</i> DC.; <i>Cerasus juliana</i> DC.)											
23262001	Джаєнт Ред <i>Giant Red / Giant Red</i>		3208	3208			2023	СЛП	ун	пс	
<b>Калина звичайна Viburnum opulus L.</b> <b>Snowball Tree</b> ( <i>Viburnum trilobum</i> Marsh.; <i>Viburnum opulus</i> b. <i>americana</i> Ait.; <i>Viburnum americanum</i> Mill.; <i>Viburnum opulus</i> b. <i>pimina</i> Michx.; <i>Viburnum opuloides</i> Muhl.; <i>Viburnum pimina</i> Raf.; <i>Viburnum edule</i> Pursh; <i>Viburnum oxycoccus</i> Pursh; <i>Opulus oxycoccus</i> Bercht.)											
21303002	Гармонія <i>Harmonia / Harmonia</i>		1601	1601	1601		2023	ЛП	ун	сс	
21303001	Ярославна <i>Yaroslavna / Yaroslavna</i>		1601	1601	1601		2023	СЛП	тхн	сс	

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
<b>Обліпиха крушиновидна</b> <i>Hippophae rhamnoides</i> L. <b>Common Sea Buckthorn</b> ( <i>Hippophae rhamnoides</i> L.; <i>Hippophae littoralis</i> Salisb.; <i>Hippophae rhamnoides</i> var. <i>sibirica</i> Rgl.; <i>Hippophae rhamnoides</i> var. <i>angustifolia</i> Dipp.; <i>Hippophaes rhamnoides</i> St.-Lag.)											
© 21299003	Абориген Абориген / <i>Aboiyhen</i>		1601	1601	1601		2023	СЛП	зпл		
18299009	Оляна Оляна / <i>Oliana</i>		1601 2480	1601 2480			2023	СЛП	ун	пс	
<b>Декоративні та лікарські</b> <b>Ornamental and Healing</b> <b>Калістефус китайський</b> <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees <b>China Aster</b>											
© 23415001	Яскрава Яскрава / <i>Yaskrava</i>	СЗ	1601	1601	1601		2023	СЛП	ун		

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

*Кукурудза звичайна*

*Кукурудза звичайна – батьківський компонент*



# Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

## Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009090 Назва сорту: 4111Ц Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230916

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка №** 20009226 **Назва сорту:** A8810 **Заявник (код):** 2760 **Власник сорту (код):** 2760

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент №** 231016

**Дата пріоритету:** 29.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231449

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,24	8,22	7,18
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,58	8,64	6,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,34	0,42	-0,54
+, - до усередненої урожайності, %	6,5	5,1	-7,5
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,06	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	113	118	118
Висота рослини, см	200	226,1	223,5
Вихід зерна, %	78,3	79,5	81,6
Висота прикріплення качана, см	85,3	90,5	89,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	55,8	4	13,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,8	4,9
Вміст білка, %	9,9	8,6	9,2
Вміст крохмалю, %	72,2	72,8	72,9
Стійкість до посухи, бал	5	7	5
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	7	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009227 Назва сорту: A9011 Заявник (код): 2760 Власник сорту (код): 2760**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2023 Патент № 231017**

**Дата пріоритету: 29.12.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231450**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,64	8,78	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,67	7,07	6,20
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,03	-1,71	-1,80
+, - до усередненої урожайності, %	0,5	-19,5	-22,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,08	0,11
Тривалість періоду вегетації, діб	126	129	127
Висота рослини, см	219,6	236,5	216,1
Вихід зерна, %	78,3	79,1	81,4
Висота прикріплення качана, см	83,8	92,4	86,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	41,5	7,6	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	5,2	4,3
Вміст білка, %	9,9	8,6	8,8
Вміст крохмалю, %	72	72,8	72,2
Стійкість до посухи, бал	3	8	6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009198 Назва сорту: Алатус Заявник (код): 2676 Власник сорту (код): 2676

Дата пріоритету: 15.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231493

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,13	7,08	7,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,55	-1,43	0,31
+, - до усередненої урожайності, %	9,9	-16,8	4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	112	117	115
Висота рослини, см	215,5	251,8	227,4
Вихід зерна, %	79,6	74,3	80,8
Висота прикріплення качана, см	86,1	91	89,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,2	7,4	6,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,9	5,2	4,4
Вміст білка, %	9,9	9,3	8,7
Вміст крохмалю, %	71,4	71,7	71,8
Стійкість до посухи, бал	5	4	6
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	8	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспорузу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009002 Назва сорту: Альт Заявник (код): 2794 921 Власник сорту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230898

Дата пріоритету: 06.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231333

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,93	8,19	6,16
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,35	-0,32	-1,16
+, - до усередненої урожайності, %	24,2	-3,8	-15,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	117	120
Висота рослини, см	215,2	241,4	237,3
Вихід зерна, %	84,1	79,7	81,9
Висота прикріплення качана, см	90,5	103,8	91,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,3	12,8	16,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	6,5	4,1
Вміст білка, %	9,5	8,9	9
Вміст крохмалю, %	72,3	73	72,1
Стійкість до посухи, бал	6	6	7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	6	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009013 Назва сорту: Арго Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 Патент № 230257

Дата пріоритету: 21.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231190

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,17	8,78	7,02
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,14	-0,15	-0,98
+, - до усередненої урожайності, %	18,9	-1,7	-12,3
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	125	129	128
Висота рослини, см	230,6	244,4	243,8
Вихід зерна, %	82,1	78,2	82,1
Висота прикріплення качана, см	102,2	97,2	102,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,2	8,9	11,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,6	3,9	3,7
Вміст білка, %	9,2	8,1	8,2
Вміст крохмалю, %	72,5	73,1	72,1
Стійкість до посухи, бал	5	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	9	7
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009040 Назва сорту:** АС 240 **Заявник (код):** 2871 **Власник сорту (код):** 2871

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2023 **Патент № 240008**

**Дата пріоритету:** 31.03.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231496**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,92	8,76	7,40
+ , - до усередненої урожайності, т/га	1,34	0,25	0,08
+ , - до усередненої урожайності, %	24,0	2,9	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	111	117	119
Висота рослини, см	212,8	237,4	231,9
Вихід зерна, %	80,6	80,3	82,4
Висота прикріплення качана, см	75,2	87,4	85,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,5	12,4	7,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	4,6	3,6
Вміст білка, %	9,4	8,7	8,9
Вміст крохмалю, %	73,4	73	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість до вилягання, бал	7	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	8	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009155 Назва сорту: АФК Гроуз Заявник (код): 655 Власник сорту (код): 655

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.01.2023 Патент № 240003

Дата пріоритету: 21.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231503

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигаподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,86	8,94	7,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,83	0,01	-0,68
+, - до усередненої урожайності, %	30,3	0,1	-8,5
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	123	125	128
Висота рослини, см	224,5	254,5	241,8
Вихід зерна, %	84,1	81,7	80,2
Висота прикріплення качана, см	77,3	88,4	90
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34,2	15	13,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,3	5,2	4,4
Вміст білка, %	8,7	8	8,7
Вміст крохмалю, %	73,4	73,8	73,3
Стійкість до посухи, бал	4	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009156 Назва сорту:** АФК Фреш **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2023 **Патент № 240004**

**Дата пріоритету:** 21.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231504**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,53	8,74	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,50	-0,19	-0,77
+, - до усередненої урожайності, %	8,3	-2,1	-9,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	121	126	129
Висота рослини, см	223,2	236	246,5
Вихід зерна, %	83,1	82,1	83,3
Висота прикріплення качана, см	80,3	94,5	91,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,8	13,3	3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	5,1	3,6
Вміст білка, %	9,3	8,4	8,7
Вміст крохмалю, %	72,9	73,5	73,5
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспоруозу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009088 Назва сорту: БАДІАН Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230914

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230579

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009082 Назва сорту: БУРБОН Заявник (код): 2720 Власник сорту (код): 2720

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231362

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,87	8,06	6,73
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,70	8,18	6,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,83	0,12	-0,17
+, - до усередненої урожайності, %	37,6	1,5	-2,5
Довірчий інтервал, т/га	0,26	0,21	0,22
Тривалість періоду вегетації, діб	101	106	106
Висота рослини, см	209	262	238,9
Вихід зерна, %	79,7	81,5	83,6
Висота прикріплення качана, см	76,7	88,4	83,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	30	13	16
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7	5,1	4,5
Вміст білка, %	9,3	8,4	8,9
Вміст крохмалю, %	72,3	72,8	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009033 Назва сорту: Візібл Заявник (код): 2569 Власник сорту (код): 2569

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231198

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	



**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,32	7,44	7,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,74	-1,07	-0,27
+, - до усередненої урожайності, %	31,2	-12,6	-3,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	117	119
Висота рослини, см	205,3	231,3	235,4
Вихід зерна, %	80,7	79	81,6
Висота прикріплення качана, см	71,8	83	76,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,5	14,4	5,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,5	3,8
Вміст білка, %	9,8	8,5	9,2
Вміст крохмалю, %	72,2	72,8	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009016 Назва сорту: Гарт Заявник (код): 1581 2260 Власник сорту (код): 1581 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 Патент № 230258

Дата пріоритету: 25.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231191

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,01	9,01	7,76
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,43	0,50	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	43,5	5,9	6,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	118	117
Висота рослини, см	218,7	245	233,8
Вихід зерна, %	83,2	80,4	82,2
Висота прикріплення качана, см	101,5	101,9	99,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,8	9,8	7,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,6	4,4
Вміст білка, %	9,5	8,7	9,6
Вміст крохмалю, %	72,6	72,5	71,9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009028 Назва сорту:** Гермес **Заявник (код):** 2558 2761 **Власник сорту (код):** 2558 2761

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 230997**

**Дата пріоритету:** 22.02.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231457**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,85	9,37	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,57	8,05	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,28	-1,32	
+, - до усередненої урожайності, %	-4,1	-14,1	
Довірчий інтервал, т/га	2,03	1,18	
Тривалість періоду вегетації, днів	138	140	
Висота рослини, см	212,8	234,8	
Вихід зерна, %	81,8	80,5	
Висота прикріплення качана, см	83,2	93,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	36,5	6	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,4	4,2	
Вміст білка, %	9,7	7,5	
Вміст крохмалю, %	71,5	74,8	
Стійкість до посухи, бал	4	9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	5	5	
Напрямок використання	зерн	зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009157 Назва сорту: Голд 220 Заявник (код): 2251 Власник сорту (код): 2251

Дата пріоритету: 21.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231451

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,36	8,63	6,88
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,78	0,12	-0,44
+, - до усередненої урожайності, %	31,9	1,4	-6,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	115	120	118
Висота рослини, см	216	243,3	239,8
Вихід зерна, %	83,6	80,5	82,5
Висота прикріплення качана, см	83,3	91,6	88,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,5	8,4	24,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4,3	4
Вміст білка, %	9,5	8,2	8,4
Вміст крохмалю, %	72,4	74,2	73,9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспоруозу, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009158 Назва сорту: Голд 300 Заявник (код): 2251 Власник сорту (код): 2251

Дата пріоритету: 21.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231452

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,13	9,60	7,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,10	0,67	-0,63
+, - до усередненої урожайності, %	18,2	7,5	-7,9
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	123	126	128
Висота рослини, см	229,3	251,1	248,1
Вихід зерна, %	82,2	79,7	82,7
Висота прикріплення качана, см	81,8	96,6	98,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38	11,3	7,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	3,9	3,7
Вміст білка, %	9,6	8	8,3
Вміст крохмалю, %	72,5	74,3	73,9
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	7
Стійкість проти гельмінтоспорозю, бал	8	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009009 Назва сорту:** ГРОВІКС **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230966**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231369**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,12	9,82	6,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,09	0,89	-1,37
+, - до усередненої урожайності, %	18,1	10,0	-17,1
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	120	124	128
Висота рослини, см	220,3	248,8	241,6
Вихід зерна, %	84,9	81	83
Висота прикріплення качана, см	76,7	92,9	86
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,8	24,4	14,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,4	3,3
Вміст білка, %	9,4	7,5	8,3
Вміст крохмалю, %	72,5	75,1	73,8
Стійкість до посухи, бал	4	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009141 Назва сорту: ДКС3117 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230929

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230585

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заповнюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'їжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009098 Назва сорту:** ДКС3527 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230922**

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230583**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009092 Назва сорту: ДКС4010 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230918

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230581

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пияків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009142 Назва сорту: ДКС4125 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230930

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230586

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009143 Назва сорту: ДК4320 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230931

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230587

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусна	1	до конусно-циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	до помірного

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009134 Назва сорту:** ДКС4726 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230923

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231255

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	до помірного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,81	9,74	8,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,78	0,81	0,14
+, - до усередненої урожайності, %	46,1	9,1	1,8
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	125	129	127
Висота рослини, см	240,2	254,4	250,8
Вихід зерна, %	85	81,7	83,7
Висота прикріплення качана, см	100,6	95,3	102,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	44,2	15,9	14
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	3,7	3,7
Вміст білка, %	8,5	7,5	7,6
Вміст крохмалю, %	73,3	74,7	73,8
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009137 Назва сорту:** ДКС4728 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230925**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230584**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	до помірного

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009026 Назва сорту: ДМС Таллер Заявник (код): 2558 Власник сорту (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.12.2023 Патент № 230995

Дата пріоритету: 31.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231455

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,55	8,50	7,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,97	-0,01	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	17,4	-0,1	3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	115	118	119
Висота рослини, см	210,7	241,6	237,9
Вихід зерна, %	81,9	80,5	83,3
Висота прикріплення качана, см	81,7	97	85,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	39,3	19,6	12,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,4	3,5
Вміст білка, %	9,5	8,1	8,8
Вміст крохмалю, %	72,4	74	73,3
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	9
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009025 Назва сорту:** ДМС Таргет **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 230994**

**Дата пріоритету:** 31.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231454**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,09	8,22	7,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,51	-0,29	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	27,1	-3,4	3,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	117	116
Висота рослини, см	222	246,9	247,9
Вихід зерна, %	78,3	79,9	82,4
Висота прикріплення качана, см	79	94,9	96,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	36,2	5,5	16
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,1	5,4	4,4
Вміст білка, %	9,2	7,9	8,7
Вміст крохмалю, %	72,7	73,7	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	5	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009024 Назва сорту:** ДМС Траян **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 230993**

**Дата пріоритету:** 22.02.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231453**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,70	8,01	6,98
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,12	-0,50	-0,34
+, - до усередненої урожайності, %	20,1	-5,9	-4,6
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	116	120
Висота рослини, см	211,8	235,5	233,1
Вихід зерна, %	78	80,5	81,2
Висота прикріплення качана, см	82,3	93,6	89,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,7	15,6	15,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,5	3,6	3,8
Вміст білка, %	8,9	7,5	8,2
Вміст крохмалю, %	73,3	74,4	73,5
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	5	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009029 Назва сорту:** ДМС Тріод **Заявник (код):** 2558 **Власник сорту (код):** 2558

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 230998**

**Дата пріоритету:** 31.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231458**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,53	8,29	7,01
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,95	-0,22	-0,31
+, - до усередненої урожайності, %	34,9	-2,6	-4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	116	117	119
Висота рослини, см	205,3	244	233
Вихід зерна, %	82,5	78,2	83,8
Висота прикріплення качана, см	78,3	95	88,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,2	18,5	20,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	5,8	3,3
Вміст білка, %	9,2	7,9	8,3
Вміст крохмалю, %	73,3	74,7	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	8	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	6
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009020 Назва сорту:** ДН Летава **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230902**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231337**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	до великого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,53	8,46	6,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,50	-0,47	-1,26
+, - до усередненої урожайності, %	41,5	-5,3	-15,8
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	123	127	129
Висота рослини, см	226,7	259,4	251
Вихід зерна, %	84,3	80	82,3
Висота прикріплення качана, см	90	100,5	98,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,5	27,5	14,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,5	4,7	3,7
Вміст білка, %	9,3	7,6	8,7
Вміст крохмалю, %	72,7	74,3	72,8
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009018 Назва сорту:** ДН Сінтоле **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230900**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231335**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пияків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,57	9,18	6,25
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,99	0,67	-1,07
+, - до усередненої урожайності, %	35,7	7,9	-14,6
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	120	119
Висота рослини, см	219,3	244,4	237,1
Вихід зерна, %	84,1	79,4	82,2
Висота прикріплення качана, см	88	103,8	99,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,2	14,8	6,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	4,6	3,7
Вміст білка, %	9,4	8,5	8,7
Вміст крохмалю, %	72,8	73,3	73,4
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість до вилягання, бал	8	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	9
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009019 Назва сорту: ДН Фонд Заявник (код): 2794 Власник сорту (код): 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230901

Дата пріоритету: 13.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231336

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,87	8,06	6,73
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,23	7,37	6,07
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,36	-0,69	-0,66
+, - до усередненої урожайності, %	27,9	-8,6	-9,8
Довірчий інтервал, т/га	0,26	0,21	0,22
Тривалість періоду вегетації, днів	102	107	108
Висота рослини, см	196,2	249,5	228,6
Вихід зерна, %	81,8	80,6	83,6
Висота прикріплення качана, см	78,8	96,4	86,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	28,5	26	16,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	5,3	5
Вміст білка, %	10,2	8,4	8,8
Вміст крохмалю, %	71,8	73,4	72,2
Стійкість до посухи, бал	7	4	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	8
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009154 Назва сорту: ДОНЕРІККС Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230774

Дата пріоритету: 21.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231491

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	



## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,57	9,24	7,57
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,54	0,31	-0,43
+, - до усередненої урожайності, %	25,5	3,5	-5,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	124	124	127
Висота рослини, см	220	260,1	242,5
Вихід зерна, %	86,7	81,4	82,8
Висота прикріплення качана, см	80,8	102,5	95,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,5	20,4	11,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7	4,9	3,8
Вміст білка, %	9,6	7,9	8,1
Вміст крохмалю, %	71,8	73,7	73,2
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009139 Назва сорту: EB3077 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230927

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231257

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	до конусно-циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	до помірного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,50	7,97	8,32
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,92	-0,54	1,00
+, - до усередненої урожайності, %	34,4	-6,3	13,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	115	117
Висота рослини, см	229,8	250,9	253,4
Вихід зерна, %	85,1	79,8	83,5
Висота прикріплення качана, см	92,3	91,7	98,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	63,8	25,6	4,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,1	5,5	4,6
Вміст білка, %	8,7	7,7	8,1
Вміст крохмалю, %	73,9	73,7	73,2
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	7	8	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009136 Назва сорту:** EB3738 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230924**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231256**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,82	8,69	8,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,24	0,18	1,02
+, - до усередненої урожайності, %	40,1	2,1	13,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	117	117
Висота рослини, см	235,3	250,9	261,1
Вихід зерна, %	84,8	82,1	83,4
Висота прикріплення качана, см	95	103,9	110,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	12	11,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,6	3,7
Вміст білка, %	8,4	8,3	8,2
Вміст крохмалю, %	73,1	73,3	73,2
Стійкість до посухи, бал	7	5	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	7	7
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	8	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009093 Назва сорту: EB4665 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230919

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231253

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	ознака не визначалась	0	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,71	8,89	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,20	9,76	
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,49	0,87	
+, - до усередненої урожайності, %	37,1	9,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,24	
Тривалість періоду вегетації, днів	130	134	
Висота рослини, см	239,7	257,4	
Вихід зерна, %	84,7	83,1	
Висота прикріплення качана, см	91,7	97	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50,8	25,9	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	3,9	
Вміст білка, %	8,6	7,3	
Вміст крохмалю, %	73,3	74,6	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	
Група стиглості (ФАО)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009088 Назва сорту: Ерекорн Заявник (код): 2742 Власник сорту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.12.2023 Патент № 230991

Дата пріоритету: 16.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231330

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,17	9,46	6,97
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,59	0,95	-0,35
+, - до усередненої урожайності, %	28,5	11,2	-4,8
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	115	118
Висота рослини, см	217,2	253,3	238,5
Вихід зерна, %	81,4	81,3	81,7
Висота прикріплення качана, см	80,7	92,8	86,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,7	24,6	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,5	4
Вміст білка, %	9,4	8,2	8,6
Вміст крохмалю, %	72,5	73,8	72,7
Стійкість до посухи, бал	8	9	6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009089 Назва сорту: Ерест Заявник (код): 2742 Власник сорту (код): 2742

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.12.2023 Патент № 230992

Дата пріоритету: 16.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231331

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,71	8,71	7,40
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,13	0,20	0,08
+, - до усередненої урожайності, %	38,2	2,4	1,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	116	119
Висота рослини, см	210,3	252,2	249,6
Вихід зерна, %	81	80,6	83,9
Висота прикріплення качана, см	77	96,7	90,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,5	15,4	22,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	4,6	3,8
Вміст білка, %	9,4	7,9	8,6
Вміст крохмалю, %	72,5	74,1	73,4
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 19009200 Назва сорту: ЕС СУБМАРИНА Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.12.2022 Патент № 220895

Дата пріоритету: 06.12.2019

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231185

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,65	8,65	8,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,07	0,14	0,80
+, - до усередненої урожайності, %	37,1	1,6	10,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	109	116	116
Висота рослини, см	237,2	267,5	262,9
Вихід зерна, %	83,1	82,2	82,1
Висота прикріплення качана, см	88,2	97,7	102,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,2	17,8	4,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,2	3,6	3,9
Вміст білка, %	8,4	7,9	8,1
Вміст крохмалю, %	73,1	73,8	73
Стійкість до посухи, бал	6	7	6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 19009202 Назва сорту:** ЕС ТРЕВЕЛЕР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.12.2022 **Патент № 220896**

**Дата пріоритету:** 06.12.2019

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231186**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,98	7,94	8,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,40	-0,57	0,73
+, - до усередненої урожайності, %	25,1	-6,7	10,0
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	117	116
Висота рослини, см	241	264,3	263,8
Вихід зерна, %	82,6	81,3	82,7
Висота прикріплення качана, см	90,8	93,4	101,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	41,8	12,6	5,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6	4,4	3,9
Вміст білка, %	8,9	8,3	9,1
Вміст крохмалю, %	73,3	74,2	72,3
Стійкість до посухи, бал	6	5	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009176 Назва сорту: ЕС Філдголд Заявник (код): 2890 Власник сорту (код): 2890

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231189

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгого
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного



**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,86	8,05	8,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,28	-0,46	1,20
+, - до усередненої урожайності, %	22,9	-5,4	16,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	120	115
Висота рослини, см	239	263,6	250,1
Вихід зерна, %	84,1	80,6	81,4
Висота прикріплення качана, см	93,6	100,9	103,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,2	17,9	17,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	5,2	3,9
Вміст білка, %	8,5	7,8	8,6
Вміст крохмалю, %	73,5	74,5	73
Стійкість до посухи, бал	5	5	7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	6
Стійкість проти гельмінтоспоруозу, бал	8	9	7
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009175 Назва сорту:** ЕС320103 **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.12.2022 **Патент № 220900**

**Дата пріоритету:** 03.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231358**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середнього
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,77	8,67	7,36
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,19	0,16	0,04
+, - до усередненої урожайності, %	39,2	1,9	0,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	112	115	117
Висота рослини, см	237,3	267,9	258,5
Вихід зерна, %	85	81,8	83,1
Висота прикріплення качана, см	97,6	95,7	101,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	17,8	12,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,6	4
Вміст білка, %	8,4	7,7	8
Вміст крохмалю, %	74,1	74,3	74
Стійкість до посухи, бал	6	5	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	9
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009177 Назва сорту: ЕС320208 Заявник (код): 806 Власник сорту (код): 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 26.12.2022 Патент № 220901

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231359

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,70	8,51	7,95
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,67	-0,42	-0,05
+, - до усередненої урожайності, %	44,3	-4,7	-0,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	124	126	127
Висота рослини, см	244	266,5	253,5
Вихід зерна, %	86,2	82,8	82,8
Висота прикріплення качана, см	101,9	92,9	107,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	61,7	44,8	9,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,8	3,6	3,8
Вміст білка, %	9	7,7	9,1
Вміст крохмалю, %	73,2	75,2	73
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	9	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009091 Назва сорту: ЕЮ4139 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230917

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231252

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,37	9,64	9,13
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,34	0,71	1,13
+, - до усередненої урожайності, %	38,8	8,0	14,1
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	123	127	127
Висота рослини, см	231,9	252,6	241,8
Вихід зерна, %	85,7	81,8	82,6
Висота прикріплення качана, см	97,3	93,3	92
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	52,8	24,8	14
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,2	3,6
Вміст білка, %	8	7,1	7,9
Вміст крохмалю, %	73,9	74,3	73
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009087 Назва сорту: ІНІЦІАТОР Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230913

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230578

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009140 Назва сорту:** ІНТЕРАКТИС **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230928**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231258**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	9,06	9,45	8,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	3,03	0,52	0,86
+, - до усередненої урожайності, %	50,2	5,8	10,8
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	123	127	127
Висота рослини, см	237,1	251,7	264,4
Вихід зерна, %	85,1	80,5	83,5
Висота прикріплення качана, см	97,7	91,6	100,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	59,8	19,4	8,8
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,3	4,1	3,7
Вміст білка, %	8,3	7,6	8,3
Вміст крохмалю, %	73,5	73,6	72,3
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	7
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	9	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009095 Назва сорту:** ІНФЛЮЕНЦ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230920**

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231254**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,71	8,89	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,24	9,44	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,53	0,55	
+, - до усередненої урожайності, %	22,8	6,2	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,24	
Тривалість періоду вегетації, діб	131	135	
Висота рослини, см	246,5	265,9	
Вихід зерна, %	87	81	
Висота прикріплення качана, см	95,8	96,6	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,5	16,9	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	4,1	
Вміст білка, %	8,3	7,4	
Вміст крохмалю, %	73,4	74,1	
Стійкість до посухи, бал	5	8	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009124 Назва сорту:** КВС АКАДО **Заявник (код):** 2649 **Власник сорту (код):** 2649

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230765**

**Дата пріоритету:** 08.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231124**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,51	8,67	7,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,93	0,16	0,09
+, - до усередненої урожайності, %	34,6	1,9	1,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	116	117	120
Висота рослини, см	202,2	246,3	238,8
Вихід зерна, %	84,4	80,4	81,9
Висота прикріплення качана, см	73	88,4	80,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,2	15,9	19,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	5,3	3,5
Вміст білка, %	8,8	7,9	8,3
Вміст крохмалю, %	73,3	74,4	73,8
Стійкість до посухи, бал	8	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	5	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009162 Назва сорту:** Клеонс **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент №** 230868

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231264

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,26	8,60	6,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,68	0,09	-0,86
+, - до усередненої урожайності, %	12,2	1,1	-11,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	115	118	118
Висота рослини, см	211,5	253,7	237
Вихід зерна, %	83,3	81,4	82,5
Висота прикріплення качана, см	82,5	98,4	87,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	51,7	10,6	9,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	3,6	3,8
Вміст білка, %	9,7	8	9,2
Вміст крохмалю, %	71,8	74,2	72,6
Стійкість до посухи, бал	6	5	6
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	4	5
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009005 Назва сорту:** КМ 2020 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230962**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231365**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,29	9,30	7,01
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,71	0,79	-0,31
+, - до усередненої урожайності, %	30,6	9,3	-4,2
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	115	118	118
Висота рослини, см	212,5	241	231,6
Вихід зерна, %	85,1	80,2	82,3
Висота прикріплення качана, см	88,2	92	86,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	49,2	16,6	6,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	3,7	4,1
Вміст білка, %	9,4	7,8	8,4
Вміст крохмалю, %	72,4	74,2	73,6
Стійкість до посухи, бал	7	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	9	6
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009006 Назва сорту:** КМ 2165 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230963**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231366**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,65	8,86	7,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,07	0,35	-0,04
+, - до усередненої урожайності, %	37,1	4,1	-0,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	119	118
Висота рослини, см	216,3	241,9	239,8
Вихід зерна, %	85,7	82,3	83,9
Висота прикріплення качана, см	76,5	91,2	84,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	30	12,3	10,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,5	4,2	3,9
Вміст білка, %	9,2	8	8,3
Вміст крохмалю, %	72,4	73,5	73,6
Стійкість до посухи, бал	8	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009011 Назва сорту:** КМ 2170 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230968**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231371**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,10	8,57	7,11
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,52	0,06	-0,21
+, - до усередненої урожайності, %	27,2	0,7	-2,9
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	117	117
Висота рослини, см	209,8	247,6	238
Вихід зерна, %	86,3	80,7	81,8
Висота прикріплення качана, см	76,3	93,9	87,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40,8	14,4	11,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,9	4	3,9
Вміст білка, %	9,1	8,3	8,2
Вміст крохмалю, %	73	73,5	73,2
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	8	6
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	7	9	9
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009012 Назва сорту:** КМ 3131 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230969**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231372**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,65	9,10	7,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,07	0,59	-0,17
+, - до усередненої урожайності, %	37,1	6,9	-2,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	113	118	117
Висота рослини, см	216,7	242,3	239,4
Вихід зерна, %	84,2	82,6	83
Висота прикріплення качана, см	78,2	91,7	86,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	30,5	15,4	7,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,7	4,1	4
Вміст білка, %	9,2	8,1	8
Вміст крохмалю, %	72,6	73,7	73,7
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	6	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009007 Назва сорту:** КМ 3182 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230964**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231367**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,26	9,05	6,54
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,23	0,12	-1,46
+, - до усередненої урожайності, %	20,4	1,3	-18,3
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	122	125	126
Висота рослини, см	225,3	250,6	237,9
Вихід зерна, %	86,1	81,5	82,8
Висота прикріплення качана, см	77,3	94,5	85,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	48,2	24,6	6,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,3	4,2
Вміст білка, %	9,2	7,9	8,2
Вміст крохмалю, %	72,4	74,3	73,5
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	5
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009008 Назва сорту: КМ 3490 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.12.2023 Патент № 230965

Дата пріоритету: 12.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231368

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,24	8,78	6,65
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,21	-0,15	-1,35
+, - до усередненої урожайності, %	20,1	-1,7	-16,9
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	119	124	128
Висота рослини, см	229,2	249,3	240,9
Вихід зерна, %	83,6	81,9	82,7
Висота прикріплення качана, см	79,5	95	92,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	46,7	27,3	5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,2	4	3,8
Вміст білка, %	9,2	7,7	8,3
Вміст крохмалю, %	72,9	74,3	72,8
Стійкість до посухи, бал	5	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009010 Назва сорту: КМ 5710 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.12.2023 Патент № 230967

Дата пріоритету: 12.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231370

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,36	9,09	6,79
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,33	0,16	-1,21
+, - до усередненої урожайності, %	22,1	1,8	-15,1
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	122	125	127
Висота рослини, см	217,2	251	239,1
Вихід зерна, %	86,4	80,4	82,4
Висота прикріплення качана, см	77,8	95,8	88,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,2	16,9	17,5
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,8	4,1	4,5
Вміст білка, %	9,6	8	8,2
Вміст крохмалю, %	72,5	73,9	73,4
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	6	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009004 Назва сорту: КМ 5960 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.12.2023 Патент № 230961

Дата пріоритету: 11.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231364

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,63	7,82	6,77
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,60	-1,11	-1,23
+, - до усередненої урожайності, %	26,5	-12,4	-15,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	121	126	127
Висота рослини, см	213,8	246,5	238,9
Вихід зерна, %	85,4	81,4	82,1
Висота прикріплення качана, см	80,3	93,5	88,3
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	37,5	20,1	6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	3,3	4,3
Вміст білка, %	9,5	7,6	8,3
Вміст крохмалю, %	72,3	74,6	73,2
Стійкість до посухи, бал	4	7	6
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009161 Назва сорту: Коін Заявник (код): 2849 Власник сорту (код): 2514

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 Патент № 230867

Дата пріоритету: 22.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231263

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,81	8,27	6,69
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,78	-0,66	-1,31
+, - до усередненої урожайності, %	12,9	-7,4	-16,4
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	122	126	127
Висота рослини, см	215,8	248,4	229,6
Вихід зерна, %	85,1	80,7	82,6
Висота прикріплення качана, см	87,8	91,4	84,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50,4	25	10,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5	4,6	3,4
Вміст білка, %	9,4	7,8	8,6
Вміст крохмалю, %	72,6	74,1	73,1
Стійкість до посухи, бал	6	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	5
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	6	9	8
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009166 Назва сорту:** ЛГ31271 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230840**

**Дата пріоритету:** 29.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230712**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкого
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 20009171 Назва сорту:** ЛІД3130Ц **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.12.2022 **Патент № 220898**

**Дата пріоритету:** 03.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231187**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	до помірного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,03	10,25	7,92
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,00	1,32	-0,08
+, - до усередненої урожайності, %	33,2	14,8	-1,0
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	122	127	127
Висота рослини, см	235,3	262,6	256,1
Вихід зерна, %	84,3	82,6	81,9
Висота прикріплення качана, см	97,7	95,7	99,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	47,5	23,3	8,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,2	4,3	3,7
Вміст білка, %	9,2	7,9	8,3
Вміст крохмалю, %	73	73,8	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009172 Назва сорту: ЛІДЗ306Ц Заявник (код): 2890 Власник сорту (код): 2890

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231188

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,89	9,12	7,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,86	0,19	-0,53
+, - до усередненої урожайності, %	30,8	2,1	-6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	123	127	126
Висота рослини, см	243,2	260,5	257,5
Вихід зерна, %	85,2	80,8	81,9
Висота прикріплення качана, см	92,9	99,6	100,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	54,3	33,8	14,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,8	4,6	4
Вміст білка, %	8,6	7,6	8,1
Вміст крохмалю, %	73,5	73,8	73,4
Стійкість до посухи, бал	5	6	8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009089 Назва сорту: МАЙОРК Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230915

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230580

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009085 Назва сорту: MAC 282K Заявник (код): 2720 Власник сорту (код): 2720

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231363

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,24	8,97	7,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,66	0,46	0,42
+, - до усередненої урожайності, %	29,7	5,4	5,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	118	119
Висота рослини, см	210,7	249	240,4
Вихід зерна, %	83,9	81,1	82,2
Висота прикріплення качана, см	73	87,9	86,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	32,5	25,8	7,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,9	4,7	3,4
Вміст білка, %	8,7	7,6	8,1
Вміст крохмалю, %	73	74,7	73,7
Стійкість до посухи, бал	8	6	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	6	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009081 Назва сорту: МАС 333Т Заявник (код): 2720 Власник сорту (код): 2720

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231361

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,27	8,56	7,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,24	-0,37	-0,53
+, - до усередненої урожайності, %	37,1	-4,1	-6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	123	125	129
Висота рослини, см	213,8	247,3	247,9
Вихід зерна, %	83,3	79,1	83,1
Висота прикріплення качана, см	80,7	93,8	90,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	35,5	16,8	8,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,7	3,7	3,4
Вміст білка, %	9,5	8,1	8,6
Вміст крохмалю, %	72	74,2	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009003 Назва сорту:** Мелодія **Заявник (код):** 2794 921 **Власник сорту (код):** 921 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230899

**Дата пріоритету:** 06.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231334

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,13	7,57	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,55	-0,94	-0,24
+, - до усередненої урожайності, %	9,9	-11,0	-3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	119	119
Висота рослини, см	207,5	236,9	233,5
Вихід зерна, %	85,2	80,6	83,5
Висота прикріплення качана, см	82,5	93,9	89,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	60,5	18,1	19
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	8,7	4,6	4,4
Вміст білка, %	9,9	8,5	8,4
Вміст крохмалю, %	71,3	73,5	73,5
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	7	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009165 Назва сорту:** МІДНАЙТ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230775**

**Дата пріоритету:** 29.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.08.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230543**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої кількості
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009041 Назва сорту: Мірісса Заявник (код): 2793 Власник сорту (код): 2793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230932

Дата пріоритету: 07.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231260

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,02	7,99	7,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,56	-0,52	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	-10,0	-6,1	3,3
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	113	116	119
Висота рослини, см	201	243,9	232,9
Вихід зерна, %	80,3	81,7	83,4
Висота прикріплення качана, см	73	89,1	83,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	36,3	17,3	5,6
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,3	4,8	4
Вміст білка, %	10	8,5	9,4
Вміст крохмалю, %	71,2	73,7	72,7
Стійкість до посухи, бал	6	7	7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	6	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009027 Назва сорту:** Орман **Заявник (код):** 2558 2761 **Власник сорту (код):** 2558 2761

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент №** 230996

**Дата пріоритету:** 22.02.2031

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009160 Назва сорту: Паттерн Заявник (код): 2849 Власник сорту (код): 2514

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 Патент № 230866

Дата пріоритету: 22.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231262

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	



**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,13	8,42	6,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,55	-0,09	-0,86
+, - до усередненої урожайності, %	27,8	-1,1	-11,7
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	117	119
Висота рослини, см	209	237,7	221,8
Вихід зерна, %	86,4	81,5	82,1
Висота прикріплення качана, см	82,8	94	84,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	50	24	7,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,6	5,7	3,8
Вміст білка, %	9,6	8,3	9,4
Вміст крохмалю, %	72,2	73,6	71,6
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	5	5
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009138 Назва сорту: ПОПУЛЯРІО Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230926

Дата пріоритету: 23.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 20.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230655

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009159 Назва сорту:** Рекольт **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент №** 230865

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231261

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,17	7,36	6,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,59	-1,15	-0,91
+, - до усередненої урожайності, %	28,5	-13,5	-12,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	113	117
Висота рослини, см	208,5	242	226,1
Вихід зерна, %	83,9	80,2	82,8
Висота прикріплення качана, см	81,8	91,6	82,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40	20,1	17,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,7	3,3	4,1
Вміст білка, %	9,8	8,4	8,6
Вміст крохмалю, %	71,9	73,5	72,5
Стійкість до посухи, бал	8	4	8
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	4	6
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009153 Назва сорту: РЖТ Аксіональ Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230773

Дата пріоритету: 21.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до помірної щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009147 Назва сорту:** РЖТ Велюкксо **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230769**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231018**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009151 Назва сорту:** РЖТ Волкоккс **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230772**

**Дата пріоритету:** 21.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231021**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009149 Назва сорту:** РЖТ ЕЛЕККС **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230771**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231020**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009144 Назва сорту:** РЖТ ЗАНЕТИККС ДУО **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент №** 230768

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231017

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009148 Назва сорту: РЖТ ПРОДУКЦИОН Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230770

Дата пріоритету: 20.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 22009049 Назва сорту:** Рубікон **Заявник (код):** 2873 **Власник сорту (код):** 2873

**Дата пріоритету:** 08.04.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231492

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,41	7,89	6,70
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	-0,62	-0,62
+, - до усередненої урожайності, %	14,9	-7,3	-8,5
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	114	115	120
Висота рослини, см	209,3	241,8	218,9
Вихід зерна, %	79,8	81,1	82
Висота прикріплення качана, см	87,8	92,4	85,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45	17,3	8,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,4	4,7	4,4
Вміст білка, %	10,1	9,1	10,1
Вміст крохмалю, %	72,7	72,6	71,4
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009092 Назва сорту: СИ АМФОРА Заявник (код): 2644 Власник сорту (код): 1959

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231192

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,30	8,77	7,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,72	0,26	0,19
+, - до усередненої урожайності, %	12,9	3,1	2,6
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	111	117	118
Висота рослини, см	223,3	253,9	253
Вихід зерна, %	78,5	79,8	80,9
Висота прикріплення качана, см	72,5	93,9	94,9
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	40	18,6	15,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	5,1	3,8
Вміст білка, %	8,9	8,4	8,7
Вміст крохмалю, %	72,8	73,4	73,5
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	5	6	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009096 Назва сорту: СИ ДІПЛОМАТ Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231196

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,73	8,88	7,24
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,70	-0,05	-0,76
+, - до усередненої урожайності, %	28,2	-0,6	-9,5
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	123	127	128
Висота рослини, см	227,8	253,5	248,8
Вихід зерна, %	86,2	82,4	82,5
Висота прикріплення качана, см	82,7	99,9	89,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	58,7	22,4	9,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	3,5	3,5	4
Вміст білка, %	9,1	7,2	7,9
Вміст крохмалю, %	72,6	75,1	73,6
Стійкість до посухи, бал	5	9	7
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	3	6
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009093 Назва сорту: СИ ЕЛЕНОР Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231193

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,56	8,28	7,72
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	-0,65	-0,28
+, - до усередненої урожайності, %	8,8	-7,3	-3,5
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	120	126	127
Висота рослини, см	221,7	262,6	253,5
Вихід зерна, %	85,1	82	82,1
Висота прикріплення качана, см	74,7	94,3	90
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	34	20	10,4
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4	4,5	3,8
Вміст білка, %	8,9	8	7,9
Вміст крохмалю, %	73,6	74,2	74,1
Стійкість до посухи, бал	5	5	7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	5
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009095 Назва сорту: СИ ТОПАЗ Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231195

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,14	9,84	7,72
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,11	0,91	-0,28
+, - до усередненої урожайності, %	35,0	10,2	-3,5
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	121	126	129
Висота рослини, см	223	264,6	263,6
Вихід зерна, %	84,2	79,3	82,8
Висота прикріплення качана, см	83,3	100,8	99,6
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	26,5	15,6	8,1
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,4	4,4	4,2
Вміст білка, %	8,8	7,8	8
Вміст крохмалю, %	73,4	74,9	73,7
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	6	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	5	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009097 Назва сорту: СИ ФАБІО Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231197

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,71	8,89	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,82	9,88	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,11	0,99	
+, - до усередненої урожайності, %	16,5	11,1	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,24	
Тривалість періоду вегетації, днів	130	132	
Висота рослини, см	237	259,5	
Вихід зерна, %	82,8	81,3	
Висота прикріплення качана, см	92	101,1	
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	45,2	16,2	
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,2	4,2	
Вміст білка, %	9,4	7,8	
Вміст крохмалю, %	73,3	74,9	
Стійкість до посухи, бал	6	9	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	9	9	
Група стиглості (FAO)	4	4	
Напрямок використання	зерн	зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 20009096 Назва сорту: СИНОПСИС Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230921

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230582

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009143 Назва сорту:** СІКСТИНА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230767**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231016**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009091 Назва сорту:** CM Вавел **Заявник (код):** 2537 **Власник сорту (код):** 2537

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент №** 230813

**Дата пріоритету:** 22.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.08.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230542

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'яжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009094 Назва сорту: СПЕКТРАЛ Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231194

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,79	9,42	7,87
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,76	0,49	-0,13
+, - до усередненої урожайності, %	29,2	5,5	-1,6
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, днів	123	127	127
Висота рослини, см	221,7	259,5	253,3
Вихід зерна, %	86	82,1	81,6
Висота прикріплення качана, см	77,7	99,3	89,5
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	41,3	24,5	9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	4,1	3,5	4,2
Вміст білка, %	8,9	7,6	8,3
Вміст крохмалю, %	73,3	74,5	73,2
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	8	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	3	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	7
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009001 Назва сорту: Такт Заявник (код): 2794 921 Власник сорту (код): 2260 921

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230897

Дата пріоритету: 06.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231332

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	до середнього
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,31	7,73	6,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,73	-0,78	-0,81
+, - до усередненої урожайності, %	13,1	-9,2	-11,1
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	113	119	119
Висота рослини, см	212,8	235,3	229,4
Вихід зерна, %	80,6	78	81,6
Висота прикріплення качана, см	87,3	97,6	93,1
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	31,5	11,9	8,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	6,6	4,8	3,3
Вміст білка, %	9,3	8,3	9,1
Вміст крохмалю, %	72,7	73,3	72,8
Стійкість до посухи, бал	6	6	6
Стійкість до вилягання, бал	8	8	7
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	8	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	9	8
Група стиглості (ФАО)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 22009034 Назва сорту: Фармюллер Заявник (код): 2569 Власник сорту (код): 2569

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231199

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,58	8,51	7,32
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,34	8,85	7,35
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,76	0,34	0,03
+, - до усередненої урожайності, %	13,6	4,0	0,4
Довірчий інтервал, т/га	0,12	0,06	0,08
Тривалість періоду вегетації, днів	110	117	116
Висота рослини, см	192	234,5	232,9
Вихід зерна, %	81,8	80,4	82,5
Висота прикріплення качана, см	65,5	82,6	82,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	38,3	10,8	6,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	7,5	3,5	3,7
Вміст білка, %	9,7	8,5	8,3
Вміст крохмалю, %	71,8	72,8	73,3
Стійкість до посухи, бал	6	9	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	6	6	6
Стійкість проти гельмінтоспороюзу, бал	7	9	8
Група стиглості (FAO)	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009167 Назва сорту: ХОНОРІН Заявник (код): 793 Власник сорту (код): 793

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230776

Дата пріоритету: 29.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230544

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 21009036 Назва сорту:** Хунта **Заявник (код):** 2784 2785 **Власник сорту (код):** 2784 2785

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230864**

**Дата пріоритету:** 02.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231259**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заплілюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	до дуже сильного

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,95	9,05	7,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,92	0,12	-0,41
+, - до усередненої урожайності, %	15,3	1,3	-5,1
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	121	123	128
Висота рослини, см	222,5	257,9	243,6
Вихід зерна, %	83,4	80,7	83
Висота прикріплення качана, см	81	98,4	88,4
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	42,5	11	6,9
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,8	4,7	4,1
Вміст білка, %	9,5	7,6	7,9
Вміст крохмалю, %	72,9	74,5	73,1
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	5	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	8	9	9
Група стиглості (FAO)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009080 Назва сорту: ЦИТАДЕЛЬ Заявник (код): 2720 Власник сорту (код): 2720

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231360

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,03	8,93	8,00
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,76	9,09	7,42
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,73	0,16	-0,58
+, - до усередненої урожайності, %	12,1	1,8	-7,3
Довірчий інтервал, т/га	0,14	0,08	0,10
Тривалість періоду вегетації, діб	122	127	129
Висота рослини, см	218,3	259,3	250,1
Вихід зерна, %	84,3	80	81,3
Висота прикріплення качана, см	68,8	91,6	84,8
Відсоток рослин з пониклими качанами, %	43,2	14,9	7,3
Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см	5,3	4,6	4
Вміст білка, %	9,1	7,9	9
Вміст крохмалю, %	73	74,8	73,4
Стійкість до посухи, бал	4	8	7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість проти пухирчастої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти стеблової гнилі, бал	9	9	9
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	9	7
Група стиглості (ФАО)	3	3	3
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909107 Назва сорту:** A18643 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230936**

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230596**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	до малого
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909059 Назва сорту:** АБ 25 **Заявник (код):** 2871 **Власник сорту (код):** 2871

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2023 **Патент №** 240021

**Дата пріоритету:** 13.03.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231494

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 20909239 Назва сорту: АК335 Заявник (код): 2760

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2023 Патент № 231019

Дата пріоритету: 29.12.2020

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909060 Назва сорту:** AM 15 **Заявник (код):** 2871 **Власник сорту (код):** 2871

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2023 **Патент № 240022**

**Дата пріоритету:** 13.03.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231495**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909148 Назва сорту:** АРА2528 **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230814**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231210**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909238 Назва сорту:** АТ1635 **Заявник (код):** 2760

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент №** 231018

**Дата пріоритету:** 29.12.2020

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	оранжеве	5	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909188 Назва сорту:** АФК 0121 **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2024 **Патент № 240013**

**Дата пріоритету:** 21.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231500**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909200 Назва сорту:** АФК 0221 **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2024 **Патент №** 240015

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231502

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середнього
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909189 Назва сорту:** АФК 0321 **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.01.2024 **Патент № 240014**

**Дата пріоритету:** 21.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231501**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909155 Назва сорту:** БАА1197 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230821**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231217**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909045 Назва сорту:** БВМ 01 **Заявник (код):** 2784 2785 **Власник сорту (код):** 2784 2785

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230871**

**Дата пріоритету:** 02.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231271**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909044 Назва сорту:** БВМ 465 **Заявник (код):** 2784 2785 **Власник сорту (код):** 2784 2785

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230870**

**Дата пріоритету:** 02.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231270**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909036 Назва сорту:** БКс14Н037 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231202**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909027 Назва сорту:** БКс19С023 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231200**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовтувато-біле	2	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовтувато-біле	2	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909146 Назва сорту:** В 1485 зс **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231007**

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231346**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середнього
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909143 Назва сорту:** В 736 зс **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231004**

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231343**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середнього
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909142 Назва сорту:** В 7471 СВ **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231003**

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231342**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	до сильного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909140 Назва сорту:** В 753 зс **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231001**

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231340**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909144 Назва сорту:** В 772 зс **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231005**

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231344**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909141 Назва сорту:** В 772 с **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент №** 231002

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231341

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909138 Назва сорту:** В 781 СВ **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 230999**

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231338**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909106 Назва сорту:** В34363 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230935**

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231265**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	від округлої до лопатопо- дібної
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909147 Назва сорту: V42703 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230946**

**Дата пріоритету: 23.11.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231269**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	до дуже сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909145 Назва сорту:** V46643 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230944**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231268**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	до помірного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909104 Назва сорту: V89543 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230933**

**Дата пріоритету: 02.11.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230594**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909105 Назва сорту:** В93653 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230934**

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230595**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	до дуже сильного
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909149 Назва сорту:** ГЕІКС1770 **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230815**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231211**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	ознака не визначалась	0	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ознака не визначалась	0	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	ознака не визначалась	0	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909046 Назва сорту:** ДА 48 **Заявник (код):** 2787

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент № 231021**

**Дата пріоритету:** 01.03.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909140 Назва сорту:** ДЖ08563 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230939**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230598**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909109 Назва сорту:** ДЖ13753 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230938

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231266

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	довга	7	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909017 Назва сорту:** ДК2239МВ **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230903**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231347**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909018 Назва сорту:** ДК2329 ЗСЗМ **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230904

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231348

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909020 Назва сорту:** ДК2525СВ3М **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230906**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231350**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	циліндрична	3	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909022 Назва сорту:** ДК2663С **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230908**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231352**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	до дуже довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909021 Назва сорту:** ДК3643СВ3М **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230907**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231351**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909090 Назва сорту:** Дружба С **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 11.10.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231378

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	до сильної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909152 Назва сорту:** ЕГІД3959 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230818**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231214**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліваються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'їжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909145 Назва сорту:** Ерая С **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент №** 231006

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231345

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909139 Назва сорту:** Ерена С **Заявник (код):** 2742 **Власник сорту (код):** 2742

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент №** 231000

**Дата пріоритету:** 16.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231339

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільного
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909240 Назва сорту:** ЗМ446 **Заявник (код):** 2760

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент № 231020**

**Дата пріоритету:** 29.12.2020

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909164 Назва сорту:** KB 3Б3048 **Заявник (код):** 2649

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230778**

**Дата пріоритету:** 08.12.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	до конусно-циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909065 Назва сорту:** КМ 234 **Заявник (код):** 2793 **Власник сорту (код):** 2793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент №** 230872

**Дата пріоритету:** 07.04.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231272

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909066 Назва сорту:** КП 05 **Заявник (код):** 2793 **Власник сорту (код):** 2793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230873**

**Дата пріоритету:** 07.04.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231273**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909023 Назва сорту:** Крос202С **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230909

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231353

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909019 Назва сорту:** Крос269С **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230905**

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231349**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заповнюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909024 Назва сорту:** Крос350С **Заявник (код):** 2794 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230910

**Дата пріоритету:** 13.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231354

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	до щільного
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909001 Назва сорту:** КЮІА320В І00374 **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230841**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231280**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до довгої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909006 Назва сорту:** КЮЛБЗ4ІВ ПДА01ВІ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент №** 230844

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231283

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	до сильної
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909002 Назва сорту:** КЮЛЦ99ФФ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230842**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231281**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909136 Назва сорту:** ЛПФ3933 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 08.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231382

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909135 Назва сорту:** ЛПХ3915 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 08.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231381**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909132 Назва сорту:** ЛРБ6379 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 08.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231379**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909134 Назва сорту:** ЛЮН2444 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 05.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231380**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909108 Назва сорту:** M22303 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230937**

**Дата пріоритету:** 02.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230597**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	до помірної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	до малого
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середнього
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременисто-подібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909143 Назва сорту: M38403 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230942**

**Дата пріоритету: 23.11.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231267**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	ознака не визначалась	0	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909144 Назва сорту:** M58723 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230943**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230601**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	до конусно-циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909146 Назва сорту: M84583 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230945**

**Дата пріоритету: 23.11.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230602**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909148 Назва сорту:** M85823 **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230947**

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.09.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230603**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909141 Назва сорту: M98103 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230940**

**Дата пріоритету: 23.11.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230599**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже ранній	1	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	дуже ранній	1	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	до довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	до середнього
30	Качан: форма	конусна	1	до конусно-циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909033 Назва сорту:** МКВ01 **Заявник (код):** 2558

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент №** 231012

**Дата пріоритету:** 31.01.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	до малого
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	до середньої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909032 Назва сорту: МС255 Заявник (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.12.2023 Патент № 231011

Дата пріоритету: 31.01.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909031 Назва сорту:** МС306 **Заявник (код):** 2558

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231010**

**Дата пріоритету:** 31.01.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	сильне	7	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	до сильного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909030 Назва сорту:** МС744301 **Заявник (код):** 2558

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231009**

**Дата пріоритету:** 31.01.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909087 Назва сорту:** HA 231BC **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 11.10.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231375

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	до округлої
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	1	до помірної
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірнього
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	до жовтого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909088 Назва сорту:** НА 380ВМ **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 11.10.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231376**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'їжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909012 Назва сорту:** НКЗ 1206 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230973**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231386**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909010 Назва сорту:** ПВК 1408 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230971**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231384**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	до сильної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909013 Назва сорту:** ПК 1838 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230974**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231387**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірною
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірною
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909009 Назва сорту:** ПК 1931 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230970**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231383**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909005 Назва сорту:** ПРЦ12ФФ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230843**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231282**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Володь: час цвітіння	ранній	3	
9	Володь: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Володь: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Володь: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Володь: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Володь: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Володь: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Володь: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Володь: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Володь: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Володь: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	до конусно-циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909176 Назва сорту: P07096 СМС Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230790

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909185 Назва сорту:** P08053 P08068 **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230798**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірнього
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірнього
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909187 Назва сорту: P10001 ЦМС Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230800

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909194 Назва сорту: P10034 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.12.2023 Патент № 231038

Дата пріоритету: 14.12.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909193 Назва сорту: P11002 Заявник (код): 1783**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.12.2023 Патент № 231037**

**Дата пріоритету: 14.12.2022**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 21909177 Назва сорту:** P14010 P15076 **Заявник (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент №** 230791**Дата пріоритету:** 20.12.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запліюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909178 Назва сорту: P18009 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230792

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909137 Назва сорту:** P18021 **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.12.2023 **Патент №** 231035

**Дата пріоритету:** 14.12.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909184 Назва сорту: Р19013 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230797

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909138 Назва сорту:** P19017 **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.12.2023 **Патент № 231036**

**Дата пріоритету:** 14.12.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	пром'язаний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909180 Назва сорту: P20009 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230793

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909181 Назва сорту:** P21020 **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент №** 230794

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	до помірного

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909182 Назва сорту: P21021 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230795

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909186 Назва сорту: P21028 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230799

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909183 Назва сорту: P21029 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230796

Дата пріоритету: 20.12.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909195 Назва сорту:** РЛ2275 МВ **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230875**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231275**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909194 Назва сорту:** РЛ272 СВ **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230874**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231274**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівки зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909007 Назва сорту:** РФЦ61ББ **Заявник (код):** 793 **Власник сорту (код):** 793

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент №** 230845

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231284

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	до помірного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовтувато-біле	2	до жовтого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909197 Назва сорту:** С17 СВ **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230877**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231277**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909196 Назва сорту:** С274 СВ **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230876**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231276**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	до довгої
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	прямий	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 23909051 Назва сорту:** С3025 МВ **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231013**

**Дата пріоритету:** 02.03.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231285**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 23909052 Назва сорту:** СА1311 СВЗМ **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент №** 230881

**Дата пріоритету:** 02.03.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231287

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	дуже малий	1	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоць: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоць: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоць: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоць: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоць: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоць: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоць: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоць: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоць: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоць: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоць: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 23909050 Назва сорту:** СГ1035 **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230880**

**Дата пріоритету:** 02.03.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231286**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays L.*

**Заявка № 23909053 Назва сорту:** СГ1135 Мст **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент №** 230882

**Дата пріоритету:** 01.03.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231288

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ознака не визначається	0	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначається	0	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909199 Назва сорту:** СГ292 Ст **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230879**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231279**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	червоно-оранжеве	6	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909198 Назва сорту:** СГ776 Мст **Заявник (код):** 2849 **Власник сорту (код):** 2514

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230878**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231278**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	сильне	7	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної до великої
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909029 Назва сорту: СДМ74 Заявник (код): 2558

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.12.2023 Патент № 231008

Дата пріоритету: 31.01.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	до середньої кількості
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусна	1	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909053 Назва сорту:** SM 224 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231221**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	сильна	3	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабкого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	до зубовидно-подібної
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909053 Назва сорту:** SM 305 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231204**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909050 Назва сорту:** CM 306 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231219**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909054 Назва сорту:** SM 307 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231205**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909051 Назва сорту:** SM 360 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231220**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабе	3	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	до оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 22909054 Назва сорту: CM 360 CM 224 Заявник (код): 2569 Власник сорту (код): 2569

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231222

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909052 Назва сорту:** CM 395 CM 303 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231203**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	сильне	7	до дуже сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909055 Назва сорту:** SM 425 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231206**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	до дуже сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	до помірного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	сильне	7	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909057 Назва сорту:** SM 636 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231207**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909058 Назва сорту:** СМ 637 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231208**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909059 Назва сорту:** CM 658 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231209

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	помірне	5	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистий	1	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909043 Назва сорту:** SM 667 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231218**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	сильне	7	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	сильне	7	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	кременистоподібний	2	до проміжного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909031 Назва сорту:** CM395 CM440 **Заявник (код):** 2569 **Власник сорту (код):** 2569

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231201**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	пізній	7	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірного
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	до сильного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 22909011 Назва сорту:** СМК 201 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230972**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231385**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	коротка	3	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909111 Назва сорту:** СМС6466 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231373**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабе	3	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909089 Назва сорту:** Союз М **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 11.10.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231377**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	до сильного
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	до помірного
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	дуже довгий	9	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	велика	7	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовте	3	до жовто-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909113 Назва сорту:** ССС6475 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231374**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	до сильної
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	до сильного
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	до помірно похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабе	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	довгий	7	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	до зубовидного
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 20909142 Назва сорту: Ф25683 Заявник (код): 844 Власник сорту (код): 844**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230941**

**Дата пріоритету: 23.11.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230600**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	до середньої
27	Качан: ніжка за довжиною	дуже коротка	1	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	до сильного

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909153 Назва сорту:** ФСАКС3928 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230819**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231215**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	до ледь похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	до малого
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до помірного
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	до помірного
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909154 Назва сорту:** ФСІД3818 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230820**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231216**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	до помірного
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	до сильного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	дуже коротка	1	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	дуже коротка	1	до короткої
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	



**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909150 Назва сорту:** ЦІД2455 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент №** 230816

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231212

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	до сильного
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	до помірнього
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	до помірнього
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нешільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	до червоно-оранжевого
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**Вид:** Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

**Заявка № 21909151 Назва сорту:** ЦІД2457 ЦІД2455 **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230817**

**Дата пріоритету:** 29.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231213**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від середнього до пізнього	6	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабе	3	до помірного
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	до малої
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	до середньої щільності
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	до дуже великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	до циліндричної
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

*Квасоля звичайна (зернова)  
Соя культурна*



**Вид:** Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

**Заявка № 21025001 Назва сорту:** Садгорянка **Заявник (код):** 2723 **Власник сорту (код):** 2723

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.10.2023 **Патент № 230625**

**Дата пріоритету:** 07.09.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231251**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектонка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	округла	3	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно над листками	3	
15	Квітка: розмір приквітков	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	короткий	3	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	помірний	5	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	довгий	7	
34	Біб: вигин дзьобика	відсутній або дуже слабкий	1	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (в сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	велика	7	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	вузька	3	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	пізній	7	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> )	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> )	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,9. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 12. Тривалість періоду вегетації, дбб – 83. Кількість бобів на рослині, шт. – 12. Вміст білка, % – 23. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 9. Дружність досягання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 470. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8; аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045035 Назва сорту:** АФК Спрін **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230982**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231407**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,50	3,69	3,44
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,43	0,49	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	20,8	15,3	14,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	123	127	134
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	176,4	191,2	176,7
Висота рослини, см	77,3	97,5	104
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,7	13,2	14,3
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	5	9	9
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	39,3	40,4	36,7
Вміст олії, %	21,7	20,6	22,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045034 Назва сорту:** АФК Темпо **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230981**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231406**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янтжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,25	3,64	3,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,40	0,56	0,69
+, - до усередненої урожайності, %	75,7	18,2	23,5
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	121
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	200,2	188,5	178,1
Висота рослини, см	65	86,3	84
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,6	14,8	15
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	39,2	39,3	37,5
Вміст олії, %	22,5	22,1	23,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045033 Назва сорту:** АФК Фест **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230980**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231405**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,38	2,94	2,83
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,53	-0,14	-0,11
+, - до усередненої урожайності, %	28,6	-4,5	-3,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	105	114	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	177	194,1	181,3
Висота рослини, см	70,2	82,3	86,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,5	11,5	14
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	36,6	36,5	34,6
Вміст олії, %	24,1	23,3	24,3
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	нбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** С.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045001 Назва сорту:** Господиня **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.04.2023 **Патент № 230264**

**Дата пріоритету:** 04.01.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231243**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,02	2,83	2,99
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,17	-0,25	0,05
+ , - до усередненої урожайності, %	9,2	-8,1	1,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	98	109	116
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	154,3	197,9	168,5
Висота рослини, см	57,2	69	75
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	9	13,9
Стійкість до вилягання, бал	8	5	4
Стійкість до обсипання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	37,6	38,9	37,8
Вміст олії, %	21,7	20,1	20,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СП.



**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 22045014 Назва сорту:** ДМ АМБАР **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

**Дата пріоритету:** 07.02.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231505

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,89	3,28	3,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,04	0,20	0,43
+, - до усередненої урожайності, %	56,2	6,5	14,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	110	114	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	148,1	170,3	152,1
Висота рослини, см	53,3	70,3	77,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	8,8	11,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	37,3	38	35,5
Вміст олії, %	23,1	22,1	23,8
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напряма використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 22045018 Назва сорту:** ДМ ЕАСТІНА **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

**Дата пріоритету:** 07.02.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231509**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,83	3,18	3,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,98	0,10	0,35
+, - до усередненої урожайності, %	53,0	3,2	11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	110	116	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	182,1	199,1	176,2
Висота рослини, см	66,3	76,5	85,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,6	11,2	12,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37,3	40,4	36,8
Вміст олії, %	23,4	21,4	23,5
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 20045046 Назва сорту:** КСЖ 19005 **Заявник (код):** 2653 **Власник сорту (код):** 485

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.01.2023 **Патент № 230105**

**Дата пріоритету:** 03.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231404**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (триїчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,21	2,92	3,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	-0,16	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	19,5	-5,2	11,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	102	111	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	164,8	186,2	166,3
Висота рослини, см	59,6	93,7	99,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	13,2	14
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	41,4	42,1	40,8
Вміст олії, %	21,4	21	21,6
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045014 Назва сорту:** Мая **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230889**

**Дата пріоритету:** 02.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231316**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,47	3,24	3,24
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,40	0,04	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	19,3	1,3	8,0
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	119	121	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	174,1	197,8	180,5
Висота рослини, см	61,6	79	82,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	11,5	14,7
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	6
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	40,9	42,8	39,7
Вміст олії, %	20,7	19,7	21
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045016 Назва сорту:** ПР2202 **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент №** 230891

**Дата пріоритету:** 02.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231318

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,30	3,22	3,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,23	0,02	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	11,1	0,6	9,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	118	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	176,9	188,4	175,1
Висота рослини, см	62	79	80,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,5	12,2	13,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	7
Вміст білка, %	40	41,2	37,5
Вміст олії, %	22,2	21	23
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045017 Назва сорту: ПР2203 Заявник (код): 142 Власник сорту (код): 142

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 Патент № 230892

Дата пріоритету: 02.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231319

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,57	3,60	3,42
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,50	0,40	0,42
+ , - до усередненої урожайності, %	24,2	12,5	14,0
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	121	119	124
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	176	186	172,8
Висота рослини, см	60,4	85,8	81,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,8	12,5	13,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсипання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	7	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	9	9
Вміст білка, %	43,4	42,9	40,8
Вміст олії, %	20	20	21,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045013 Назва сорту:** ПР2204 **Заявник (код):** 142 **Власник сорту (код):** 142

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230888**

**Дата пріоритету:** 02.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231315**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	пізній	7	
20	Рослина: час досягання	пізній	7	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,83	3,23	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,78	3,25	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,95	0,02	
+, - до усередненої урожайності, %	51,9	0,6	
Довірчий інтервал, т/га	0,38	0,30	
Тривалість періоду вегетації, діб	129	131	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	206,2	222,4	
Висота рослини, см	68,4	87,5	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,8	14,2	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	
Вміст білка, %	38,8	40,6	
Вміст олії, %	22,4	21,5	
Блок (група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 20045052 Назва сорту:** Сахара **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231314**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,68	4,05	3,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,83	0,97	0,92
+, - до усередненої урожайності, %	44,9	31,5	31,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, дів	103	114	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	150,6	180,5	165,8
Висота рослини, см	61,8	87,8	87,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13	9,5	13,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсипання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	39,9	39,7	39,6
Вміст олії, %	21,8	21,2	21,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045031 Назва сорту:** Сахара **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.12.2023 **Патент № 231045**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045015 Назва сорту:** CBX20T00C4 **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230890**

**Дата пріоритету:** 02.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231317**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,57	3,47	3,01
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,50	0,27	0,01
+ , - до усередненої урожайності, %	24,2	8,4	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	121	122	127
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	196,5	214,6	204,4
Висота рослини, см	65,2	79,3	87,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,1	14	13
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	4	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	40,7	41,5	38,5
Вміст олії, %	22,3	21,6	22,9
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045032 Назва сорту:** СТЕПА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230810**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231033**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 22045015 Назва сорту:** ФАНТИНЕ **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

**Дата пріоритету:** 07.02.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231506**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,64	3,02	3,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,79	-0,06	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	42,7	-1,9	6,1
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, дб	106	112	120
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	190,8	195,3	185,8
Висота рослини, см	58,8	73,8	78,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	10,8	11,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38,7	39,6	36
Вміст олії, %	22	21,6	23,2
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 22045017 Назва сорту:** ФЙОРЕЛЛА **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

**Дата пріоритету:** 07.02.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231508

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	стріе	1	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,43	3,49	2,77
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,58	0,41	-0,17
+, - до усередненої урожайності, %	31,4	13,3	-5,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	110	115	120
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	202,3	207,5	185,7
Висота рослини, см	47	64	65,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,7	10,2	8,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	7
Стійкість до обсипання, бал	6	8	8
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	7	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	9	8
Вміст білка, %	37,8	38,8	35,6
Вміст олії, %	23	21,6	22,9
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 22045016 Назва сорту:** ФРІНЕ **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

**Дата пріоритету:** 07.02.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231507**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,60	3,50	3,16
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,75	0,42	0,22
+, - до усередненої урожайності, %	40,5	13,6	7,5
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, дб	108	113	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	158,7	170,9	167,6
Висота рослини, см	53,9	66,7	69,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,7	9,7	9,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	6	9	7
Вміст білка, %	35,2	37,2	35,9
Вміст олії, %	24	22,6	23,6
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

*Сорго звичайне (двокольорове)*



Вид: Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

Заявка № 20018013 Назва сорту: АДВ Ф7103 Заявник (код): 2834 Власник сорту (код): 2554

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230958

Дата пріоритету: 30.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231239

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	ознака не визначалась	0	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	дуже висока	9	
7	Листок: зелене забарвлення	дуже темне	5	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	темніше	3	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	зелене	2	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	жовте	3	
17	Приймочка: за довжиною	середня	5	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення	світло-жовте	1	
21	Рослина: за довжиною	середня	9	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	великий	7	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
29	Волоть: шийка за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	червоно-коричневе	8	
33	Маса 1000 зерен	велика	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зернівка: тип ендосперму	повністю крохмалистий	5	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, т/га	8,92	20,28	
Тривалість періоду вегетації, діб	92	97	
Висота рослин, см	197	247,3	
Стійкість до вилягання, бал	6	8	
Стійкість до посухи, бал	6	9	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гелмінтоспорузу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти попелиці, бал	7	7	
Вміст сирого протеїну, %	9,5	10,1	
Вміст сирової клітковини, %	27,5	26,6	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	корм	корм	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.



**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 20018002 Назва сорту:** АДВ Ф8322 **Заявник (код):** 2834 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.03.2023 **Патент № 230197**

**Дата пріоритету:** 09.01.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231236**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	слабка	3	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабка	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	пізній	7	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	дуже висока	9	
7	Листок: зелене забарвлення	дуже темне	5	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	світло-жовте	4	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	сіре	5	
17	Приймочка: за довжиною	довга	7	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення	помаранчеве	3	
21	Рослина: за довжиною	коротка	7	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	малий	3	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	довга	7	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	помірно щільна	5	
28	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
29	Волоть: шийка за довжиною	коротка	3	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	темно-коричневе	6	
31	Колоскова луска: за довжиною	довга	7	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	світло-коричневе	7	
33	Маса 1000 зерен	середня	5	
35	Зернівка: форма в профіль	вужкоеліптична	3	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зернівка: тип ендосперму	повністю крохмалистий	5	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, т/га	13,40	21,93	
Тривалість періоду вегетації, діб	109	116	
Висота рослин, см	159,3	177,9	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти попелиці, бал	7	7	
Вміст сирого протеїну, %	7,5	7,9	
Вміст сирової клітковини, %	28,2	28	
Блок (Група стиглості)	7	7	
Напрямок використання	корм	корм	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 20018003 Назва сорту:** АДВГ 1329 **Заявник (код):** 2834 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 09.03.2023 **Патент № 230198**

**Дата пріоритету:** 09.01.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231237**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	помірна	5	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	слабка	3	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	слабке	3	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	слабка	3	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	низька	3	
7	Листок: зелене забарвлення	дуже темне	5	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	біле	1	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	зелене	2	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	біле	1	
17	Приймочка: за довжиною	середня	5	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення	сірувато-рожеве	2	
21	Рослина: за довжиною	карликова	1	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	малий	3	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	довгі	7	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	помірно щільна	5	
28	Волоть: положення найширшої частини	низьке	2	
29	Волоть: шийка за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	світло-жовте	4	
33	Маса 1000 зерен	середня	5	
35	Зернівка: форма в профіль	вузкоеліптична	3	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	біле	1	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, т/га	7,96	11,40	
Тривалість періоду вегетації, діб	94	104	
Висота рослин, см	123,6	100,6	
Стійкість до вилягання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспорузу, бал	7	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти попелиці, бал	7	7	
Вміст сирого протеїну, %	10,2	7,8	
Вміст сирової клітковини, %	26,6	28,8	
Блок (Група стиглості)	5	5	
Напрямок використання	корм	корм	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 20018014 Назва сорту:** АДВГ 2168 ІГ **Заявник (код):** 2834 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230959

**Дата пріоритету:** 30.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231240

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутня або дуже слабка	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	дуже низька	1	
7	Листок: зелене забарвлення	помірне	3	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	світло-зелене	3	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	світло-зелене	1	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	жовте	3	
17	Приймочка: за довжиною	коротка	3	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	коротка	3	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення	червоно-коричневе	6	
21	Рослина: за довжиною	надзвичайно коротка	3	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	великий	7	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: положення найширшої частини	низьке	2	
29	Волоть: шийка за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною	коротка	3	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	червоно-коричневе	8	
33	Маса 1000 зерен	середня	5	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
39	Зернівка: тип ендосперму	повністю крохмалистий	5	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,47	6,83	
Довірчий інтервал, т/га	0,55	0,67	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,70	8,64	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	1,23	1,81	
+ , - до усередненої урожайності, %	27,5	26,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	109	109	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	27	26,3	
Висота рослини, см	102,4	112,1	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	4,9	6,9	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	6	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	7	
Стійкість проти попелиці, бал	8	7	
Вміст білка, %	10,3	10,1	
Вміст крохмалю, %	75,6	75,3	
Блок (група стиглості)	5	5	
Напрямок використання	зерн	зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 21018003 Назва сорту: ДЖАМІ Заявник (код): 2838 Власник сорту (код): 2838**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231242**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутня або дуже слабка	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутня або дуже слабка	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	середній	5	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	середня	5	
7	Листок: зелене забарвлення	дуже темне	5	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	велика	7	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	біле	1	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	зелене	2	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	слабке	3	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	сіре	5	
17	Приймочка: за довжиною	дуже коротка	1	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення	червоно-коричневе	6	
21	Рослина: за довжиною	дуже коротка	5	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	середній	5	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	довга	7	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	широка	7	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	дуже довга	9	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	довгі	7	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
29	Волоть: шийка за довжиною	середня	5	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	світло-коричневе	7	
33	Маса 1000 зерен	велика	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	середній	5	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	відсутній або дуже низький	1	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,44	6,11	
Довірчий інтервал, т/га	0,63	0,66	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,05	8,61	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,61	2,50	
+, - до усередненої урожайності, %	13,7	40,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	115	116	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	25,6	27,4	
Висота рослини, см	112,6	126,4	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	4,8	6,3	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспору, бал	7	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	8	8	
Стійкість проти попелиці, бал	6	8	
Вміст білка, %	10,6	9,9	
Вміст крохмалю, %	76,3	77	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	зерн	зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 20018010 Назва сорту:** ЕС МОНСУН **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата пріоритету:** 04.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231238**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптіля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутня або дуже слабка	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	середня	5	
7	Листок: зелене забарвлення	дуже темне	5	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	мала	3	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	світліше	1	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	біле	1	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	біле	1	
17	Приймочка: за довжиною	середня	5	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	щільна	7	
20	Сухі тичинки: забарвлення	червоно-коричневе	6	
21	Рослина: за довжиною	надзвичайно коротка	3	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	малий	3	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	середня	5	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	середня	5	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	щільна	7	
28	Волоть: положення найширшої частини	низьке	2	
29	Волоть: шийка за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	червонувато-коричневе	5	
31	Колоскова луска: за довжиною	середня	5	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	світло-коричневе	7	
33	Маса 1000 зерен	велика	7	
35	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	середня	5	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
40	Зернівка: забарвлення склоподібного ендосперму	жовте	2	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,44	6,11	
Довірчий інтервал, т/га	0,63	0,66	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,69	8,51	
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,25	2,40	
+, - до усередненої урожайності, %	28,2	39,3	
Тривалість періоду вегетації, діб	114	119	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	31,7	32,3	
Висота рослини, см	110,9	118,5	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	7	9	
Вирівняність за висотою, бал	6,5	6,7	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	8	9	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	9	8	
Стійкість проти попелиці, бал	8	6	
Вміст білка, %	9,7	9,5	
Вміст крохмалю, %	77	77,5	
Блок (група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	зерн	зерн	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.

**Вид:** Сорго звичайне (двокольорове) *Sorghum bicolor* L.

**Заявка № 20018015 Назва сорту: У55045 Заявник (код): 2834 Власник сорту (код): 2554**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230960**

**Дата пріоритету: 30.12.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231241**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення колеоптиля	відсутня або дуже слабка	1	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	відсутня або дуже слабка	1	
3	Паросток: антоціанове забарвлення піхви першого листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: час появи волоті (50% рослин з волоттю)	ранній	3	
6	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	дуже висока	9	
7	Листок: зелене забарвлення	дуже темне	5	
8	Листок: площа знебарвлення центральної жилки	середня	5	
9	Прапорцевий листок: зелене забарвлення середньої жилки в порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 7)	однакове	2	
10	Листок: забарвлення центральної жилки	середньо-жовте	5	
11	Колоскова луска: забарвлення в кінці цвітіння	жовто-зелене	3	
12	Колоскова луска: інтенсивність антоціанового забарвлення (повне цвітіння – кінець цвітіння)	відсутня або дуже слабка	1	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 12)	слабке	3	
14	Нижня квіткова луска: остюк за довжиною	відсутній або дуже короткий	1	
15	Приймочка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
16	Приймочка: забарвлення	сіре	5	
17	Приймочка: за довжиною	середня	5	
18	Квітка з квітконіжкою: квітка за довжиною	середня	5	
19	Волоть: за щільністю у кінці цвітіння	помірно щільна	5	
20	Сухі тичинки: забарвлення	світло-жовте	1	
21	Рослина: за довжиною	середня	9	
22	Стебло: діаметр (вище третього листка від верхівки рослини, за виключенням прапорцевого листка)	великий	7	
23	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за довжиною	коротка	3	
24	Листок: листкова пластинка третього листка від верхівки за шириною	середня	5	
25	Волоть: за довжиною (без шийки)	довга	7	
26	Волоть: бічні гілочки першого порядку за довжиною	середні	5	
27	Волоть: за щільністю (за досягання)	помірно щільна	5	
28	Волоть: положення найширшої частини	середнє	3	
29	Волоть: шийка за довжиною	відсутня або дуже коротка	1	
30	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4	
31	Колоскова луска: за довжиною	довга	7	
32	Зернівка: забарвлення за досягання	червоно-коричневе	8	
33	Маса 1000 зерен	велика	7	
35	Зернівка: форма в профіль	вузькоеліптична	3	
36	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
37	Зернівка: площа поверхні, вкрита плівкою	мала	3	
38	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, т/га	8,71	21,37	
Тривалість періоду вегетації, дів	94	97	
Висота рослин, см	202,1	232,5	
Стійкість до вилягання, бал	5	8	
Стійкість до посухи, бал	6	8	
Стійкість проти сажки, бал	9	9	
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	
Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал	7	7	
Стійкість проти попелиці, бал	7	7	
Вміст сирого протеїну, %	9,6	9,2	
Вміст сирого клітковини, %	27,6	27	
Блок (Група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	корм	корм	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

*Гірчиця біла*

*Гірчиця чорна*

*Коноплі посівні*

*Льон звичайний (ярий)*

*Ріпак (озимий) – батьківський компонент*

*Соняшник однорічний*

*Соняшник однорічний – батьківський компонент*





**Вид:** Гірчиця біла *Sinapis alba* L.

**Заявка № 23380002 Назва сорту:** САЛЬФА **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

**Дата пріоритету:** 08.12.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231511

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	від середньої до довгої	6	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Час цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	помірне	5	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	від середніх до довгих	6	
15	Квітка: пелюстки за шириною	від середніх до широких	6	
16	Рослина: за загальною довжиною	довга	7	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	широкий	7	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	велика	7	
22	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	сильний	7	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Висота рослин, см – 115. Тривалість періоду вегетації, дів – 95. Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га – 2,7. Маса 1000 насінин, г – 5,4. Вміст в насінні, %: олії – 34; білка – 30. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.-Mont.) – 8; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 7; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 8; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 8; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 7; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Гірчиця чорна *Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch

**Заявка № 23219001 Назва сорту:** МЕДІВА **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

**Дата пріоритету:** 08.12.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231512

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: кількість часток	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка разом із черешком)	довгий	7	
9	Листок: за шириною	широкий	7	
10	Черешок: за довжиною	довгий	7	
11	Час початку цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою (під час цвітіння)	висока	7	
13	Квітка: інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток	помірна	5	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
15	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
16	Рослина: розвиток генеративних органів у рік сівби	сильний	7	
17	Рослина: за загальною довжиною	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Носик: за довжиною	середній	5	
20	Стручок: за шириною	широкий	7	
21	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
22	Стручок: кількість насінин	велика	7	
23	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га – 1,8. Тривалість періоду вегетації, діб – 90. Висота рослин, см – 115. Маса 1000 насінин, г – 3,5. Вміст в насінні, %: олії – 30; білка – 23. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсипання насіння, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.-Mont.) – 9; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 9; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 9; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 9; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 9; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 9; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Коноплі посівні *Cannabis sativa* L.

Заявка № 22080001 Назва сорту: Орловські Заявник (код): 2430 Власник сорту (код): 2430

Дата пріоритету: 22.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231448

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: форма	середньообернено-яйцеподібна	2	
2	Сім'ядоля: забарвлення	світло-зелене	2	
3	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
6	Листок: черешок за довжиною	середній	2	
7	Листок: антоціанове забарвлення черешка	слабке	2	
8	Листок: кількість листочків	велика	3	
9	Центральна листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
10	Центральна листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Час цвітіння чоловічих суцвіть	середній	5	
12	Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	слабке	3	
13	Суцвіття: вміст ТГК	відсутній або дуже низький	1	
14	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	велике	5	
15	Рослина: співвідношення жіночих рослин	мале	1	
16	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	мале	1	
17	Рослина: за природною висотою	середня	5	
18	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2	
19	Головне стебло: міжвузля за довжиною	середні	5	
20	Головне стебло: за товщиною	середнє	2	
21	Головне стебло: боріздки за глибиною	мілкі	1	
22	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	відсутня або тонка	1	
23	Насіння: маса 1000 шт.	середня	3	
24	Насінина: забарвлення шкірки	сіро-коричнєве	3	
25	Насінина: мармуровість	помірна	5	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Тривалість періоду вегетації до технічної стиглості, діб – 110. Висота рослин, см – 277,0. Технічна довжина стебел, см – 263,0. Урожайність стебел, т/га – 9,72; волокна, т/га – 3,23. ТГК, % – не виявлено. Стабільність ознаки однодомності (вміст рослин плосконі), % – 0. Вміст волокна, % – 32,12. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (*Fusarium* spp.) – 7,1. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): конопляна блішка (*Psylliodes attenuata* Koch.) – 8,1; стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 7,5. Додаткова інформація: вміст каннабігеролу – 1,7–3,0.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

**Вид:** Льон звичайний (ярий) *Linum usitatissimum* L.

**Заявка № 22243001 Назва сорту:** Юстесс **Заявник (код):** 2865

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230911**

**Дата пріоритету:** 08.02.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	блакитно-фіолетове	3	
2	Час початку цвітіння	дуже ранній	1	
3	Віночок: розташування пелюсток	перекриваються	3	
4	Віночок: забарвлення	блакитно-фіолетове	6	
5	Квітка: розмір віночка	середній	5	
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	п'ятикутна	3	
7	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
8	Пелюстка: за шириною	широка	7	
9	Пелюстка: відношення довжина / ширина	помірно велике	7	
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	біле	1	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	біле	1	
12	Пиляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	біле	1	
14	Рослина: за висотою	середня	5	
15	Коробочка: розмір	середній	5	
16	Коробочка: в'ягатість несправжніх перетинок	наявна	9	
17	Коробочка: за довжиною	середня	5	
18	Коробочка: за шириною	середня	5	
19	Коробочка: відношення довжина / ширина	помірно мале	3	
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	коротке	3	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	коротке	3	
22	Насіння: маса 1000 шт	середня	5	
23	Насінина: забарвлення	коричнєве	3	
24	Насінина: за довжиною	довга	4	
25	Насінина: за шириною	середня	3	
26	Насінина: відношення довжина/ширина	помірно мале	2	

**Вид:** Ріпак (озимий) – батьківський компонент *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 21940014 Назва сорту:** РМОС9945Р **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231015**

**Дата пріоритету:** 13.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230457**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	до довгого
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція до формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція до формування суцвіть в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 20039076 **Назва сорту:** 1003Л **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.02.2023 **Патент №** 230127

**Дата пріоритету:** 03.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231423

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039092 Назва сорту:** Базаллът **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230801**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231029**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039098 Назва сорту: Джерсі Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230806

Дата пріоритету: 20.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231299

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,93	3,52	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,53	0,09	
+ , - до усередненої урожайності, %	22,1	2,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,6	59,9	
Діаметр кошика, см	14,8	17,5	
Висота рослини, см	133,1	178,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,1	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	117	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	7	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	50,5	51,2	
Вміст білка, %	16,6	17,4	
Лущинність, %	28	26,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	6		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**



**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22039006 Назва сорту:** КС 410 імі **Заявник (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230977**

**Дата пріоритету:** 12.01.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039003 Назва сорту: КС 4100 імі Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата пріоритету: 11.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231392

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,34	3,45	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,06	0,02	
+, - до усередненої урожайності, %	-2,5	0,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	50,3	59,6	
Діаметр кошика, см	15,6	18,2	
Висота рослини, см	145,1	173,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,4	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	117	
Стійкість до вилягання, бал	4	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	2	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	47,8	48,3	
Вміст білка, %	16,6	16,1	
Лушпинність, %	26,8	24,9	
Блок (група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	2		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039005 Назва сорту: КС 4213 алс Заявник (код): 2257

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.12.2023 Патент № 230976

Дата пріоритету: 11.01.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22039004 Назва сорту:** КС 5210 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230975**

**Дата пріоритету:** 11.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231393**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,33	3,53	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,07	0,10	
+ , - до усередненої урожайності, %	-2,9	2,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	55,3	60,5	
Діаметр кошика, см	17	18,7	
Висота рослини, см	138,9	170,9	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,9	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	117	116	
Стійкість до вилягання, бал	4	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	2	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	47,6	47,3	
Вміст білка, %	16,5	15,8	
Лущинність, %	28,4	26	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039096 Назва сорту: Людмила Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230804

Дата пріоритету: 20.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231298

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,74	3,33	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,34	-0,10	
+ , - до усередненої урожайності, %	14,2	-2,9	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	63,6	74,6	
Діаметр кошика, см	14,7	16,7	
Висота рослини, см	146,3	181,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,1	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	121	120	
Стійкість до вилягання, бал	9	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	51	50,5	
Вміст білка, %	16,6	15,2	
Лущинність, %	26,1	25,6	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039001 Назва сорту: M94C35 Заявник (код): 273 Власник сорту (код): 273

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2023 Патент № 231027

Дата пріоритету: 05.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231356

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,79	3,16	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,47	-0,22	
+ , - до усередненої урожайності, %	20,3	-6,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	61,9	61,9	
Діаметр кошика, см	14,8	17,7	
Висота рослини, см	143,1	176,1	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,6	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	110	110	
Стійкість до вилягання, бал	6	5	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	6	
Стійкість проти вовчка, бал	4	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	48,6	48,9	
Вміст білка, %	16,9	17,3	
Лущинність, %	27	25,3	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039097 Назва сорту: Мілос КЛП Заявник (код): 1783 Власник сорту (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.12.2023 Патент № 230805

Дата пріоритету: 20.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231032

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039024 Назва сорту:** НА Акрас **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 24.09.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231293**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямимстеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,63	3,79	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,20	
+, - до усередненої урожайності, %	8,7	5,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	60,8	66,2	
Діаметр кошика, см	14,1	17,7	
Висота рослини, см	146,8	183,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,6	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	122	123	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	44,5	44,6	
Вміст білка, %	17,3	17,1	
Лушпинність, %	29,1	28,7	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039019 Назва сорту:** НА Актар **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231291**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,34	3,10	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,08	-0,49	
+, - до усередненої урожайності, %	-3,3	-13,6	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	69,4	66,9	
Діаметр кошика, см	14,3	17	
Висота рослини, см	164	191,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,9	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	126	
Стійкість до вилягання, бал	8	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,6	46,4	
Вміст білка, %	17,8	17,7	
Лушпинність, %	28,6	28,7	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039028 Назва сорту: НА Альтаір Заявник (код): 2204 Власник сорту (код): 2204

Дата пріоритету: 24.09.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231297

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	



## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,34	3,44	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,08	-0,15	
+, - до усередненої урожайності, %	-3,3	-4,2	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	55	57,8	
Діаметр кошика, см	14,7	18	
Висота рослини, см	164,9	200,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	9	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	127	
Стійкість до вилягання, бал	5	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	8	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	5	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,6	46,1	
Вміст білка, %	16,4	17,5	
Лушпинність, %	29	27,6	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039025 Назва сорту: НА Кайрос Заявник (код): 2204 Власник сорту (код): 2204

Дата пріоритету: 24.09.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231294

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,70	3,71	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,28	0,12	
+, - до усередненої урожайності, %	11,6	3,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	68,9	66,5	
Діаметр кошика, см	14,7	17	
Висота рослини, см	140,4	187	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,3	7,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	123	126	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	5	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,4	46,1	
Вміст білка, %	15,4	15,6	
Лушпинність, %	29,5	26,2	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039020 Назва сорту: НА Тасумо Заявник (код): 2204 Власник сорту (код): 2204

Дата пріоритету: 24.09.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231292

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,36	3,26	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,06	-0,33	
+, - до усередненої урожайності, %	-2,5	-9,2	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	71,5	68,2	
Діаметр кошика, см	15,5	16,7	
Висота рослини, см	150,1	184,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	5,9	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	124	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	8	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	46,6	48	
Вміст білка, %	17	16,4	
Лушпинність, %	29,2	27,4	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	7		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039026 Назва сорту:** НА Тесан **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 24.09.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231295**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,53	3,43	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,11	-0,16	
+, - до усередненої урожайності, %	4,5	-4,5	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	66,8	71,8	
Діаметр кошика, см	14,8	16,1	
Висота рослини, см	155,5	190,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,4	8,5	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	125	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти вовчка, бал	6	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	47,9	48	
Вміст білка, %	17,7	16,8	
Лушпинність, %	29,5	27,2	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	5		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039027 Назва сорту: НА Юміс Заявник (код): 2204 Власник сорту (код): 2204

Дата пріоритету: 24.09.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231296

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно-коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cuman</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	



## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,42	3,59	
Довірчий інтервал, т/га	0,08	0,08	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,49	3,41	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,07	-0,18	
+, - до усередненої урожайності, %	2,9	-5,0	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,5	65,4	
Діаметр кошика, см	14,9	17,5	
Висота рослини, см	163,8	203,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	7	9	
Тривалість періоду вегетації, днів	125	127	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	5	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	45,6	45,3	
Вміст білка, %	16,4	16,5	
Лушпинність, %	28,7	27,4	
Блок (група стиглості)	4	4	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	3		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039094 Назва сорту:** Нобіліс КЛП **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230803**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231031**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039093 Назва сорту:** Овелл **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230802**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231030**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039028 Назва сорту: П64ГП630 Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230955

Дата пріоритету: 18.11.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка №** 22039020 **Назва сорту:** П64ЛЛ173 **Заявник (код):** 1688

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент №** 230952

**Дата пріоритету:** 18.11.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	зігнуте за довжиною	2	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22039024 Назва сорту:** П64ЛЛ264 **Заявник (код):** 1688

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230954**

**Дата пріоритету:** 18.11.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22039023 Назва сорту:** П64ЛП169 **Заявник (код):** 1688

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230953**

**Дата пріоритету:** 18.11.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039019 Назва сорту: П64ЛП655 Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230951

Дата пріоритету: 18.11.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039113 Назва сорту: Са Лана Заявник (код): 1517 Власник сорту (код): 1517

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 Патент № 230883

Дата пріоритету: 30.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231391

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,32	3,38	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,76	3,22	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,44	-0,16	
+ , - до усередненої урожайності, %	19,0	-4,7	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,1	57,4	
Діаметр кошика, см	15,6	18,3	
Висота рослини, см	138,2	162,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	108	112	
Стійкість до вилягання, бал	4	8	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти вовчка, бал	7	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	51,7	49	
Вміст білка, %	13,9	14,6	
Лущинність, %	27,1	28,2	
Блок (Група стиглості)	2	2	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	8		

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039110 Назва сорту:** Ф2687 ЦЛ **Заявник (код):** 2195 **Власник сорту (код):** 2195

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент № 231026**

**Дата пріоритету:** 29.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231228**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від ланцетної до вузькотрикутної	2	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	дуже охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,76	
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,22	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,28	3,26	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,03	-0,50	
+ , - до усередненої урожайності, %	-1,3	-13,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	61,8	61,7	
Діаметр кошика, см	14,8	18,3	
Висота рослини, см	150,7	194,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,6	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	110	113	
Стійкість до вилягання, бал	9	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	3	8	
Стійкість проти іржі, бал	8	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	9	7	
Вміст олії, %	48,2	51,3	
Вміст білка, %	17	16,2	
Лущинність, %	27,1	23,9	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		1	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	81,8	81,1	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039109 Назва сорту: Ф4413В0 Заявник (код): 2195 Власник сорту (код): 2195

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2023 Патент № 231025

Дата пріоритету: 29.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231227

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутих стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,76	
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,22	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,12	2,88	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,19	-0,88	
+ , - до усередненої урожайності, %	-8,2	-23,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	61,2	58,9	
Діаметр кошика, см	15,5	16,9	
Висота рослини, см	132,7	166,4	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,1	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	112	113	
Стійкість до вилягання, бал	5	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	5	
Стійкість проти вовчка, бал	4	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	7	
Стійкість проти фомозу, бал	9	8	
Вміст олії, %	49,8	51,2	
Вміст білка, %	18,2	15,9	
Лущинність, %	23,9	23,4	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		1	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	82,1	83,1	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22039007 Назва сорту: ХАЙСАН 151 Заявник (код): 2834 Власник сорту (код): 2554

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230950

Дата пріоритету: 14.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231300

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямимстеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабо виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmodium helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,62	3,25	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,22	-0,18	
+ , - до усередненої урожайності, %	9,2	-5,2	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	62,8	66,1	
Діаметр кошика, см	14,7	17,3	
Висота рослини, см	140	181,5	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	8,3	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	117	
Стійкість до вилягання, бал	7	7	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	8	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	8	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	6	
Стійкість проти фомозу, бал	8	8	
Вміст олії, %	46,3	46,4	
Вміст білка, %	17,6	17,1	
Лущинність, %	28,6	27	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	9		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.



Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21039005 Назва сорту: Хорив Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.04.2023 Патент № 230260

Дата пріоритету: 16.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231225

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутих стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,40	3,43	
Довірчий інтервал, т/га	0,05	0,05	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,23	3,82	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,17	0,39	
+ , - до усередненої урожайності, %	-7,1	11,4	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	46,5	65,1	
Діаметр кошика, см	15,4	18,6	
Висота рослини, см	167,9	175,8	
Ступінь нахилу кошика, бал	6,7	7,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	118	119	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	5	6	
Стійкість проти вовчка, бал	3	9	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	8	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти фомозу, бал	8	7	
Вміст олії, %	48,1	47,4	
Вміст білка, %	16,8	16,8	
Лущинність, %	27,4	26,5	
Блок (Група стиглості)	3	3	
Напрямок використання	олн	олн	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал	1		

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

**Вид:** Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21039006 Назва сорту:** Яскравий **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.04.2023 **Патент № 230261**

**Дата пріоритету:** 16.01.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231226**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямимстеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,31	3,76	
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,22	
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,18	3,56	
+ , - до усередненої урожайності, т/га	-0,13	-0,20	
+ , - до усередненої урожайності, %	-5,6	-5,3	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	56,4	68,8	
Діаметр кошика, см	15,7	18,7	
Висота рослини, см	163,8	180,6	
Ступінь нахилу кошика, бал	7,3	8	
Тривалість періоду вегетації, днів	109	110	
Стійкість до вилягання, бал	8	7	
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Стійкість проти вовчка, бал	3	8	
Стійкість проти іржі, бал	9	7	
Стійкість проти білої гнилі, бал	9	9	
Стійкість проти сірої гнилі, бал	9	8	
Стійкість проти фомозу, бал	7	7	
Вміст олії, %	48,2	49,6	
Вміст білка, %	15,7	14,2	
Лушпинність, %	23	23,8	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрямок використання	ВОЛ	ВОЛ	
Стійкість проти вовчка за штучного зараження, бал		1	
Вміст олеїнової кислоти (для ВОЛ), %	83,1	83	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22939007 Назва сорту:** 19303 **Заявник (код):** 2834 **Власник сорту (код):** 2554

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230957**

**Дата пріоритету:** 14.01.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231235**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22939006 Назва сорту: 33566 Заявник (код): 2834 Власник сорту (код): 2554**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2023 Патент № 230956**

**Дата пріоритету: 14.01.2022**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231234**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Сійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939049 Назва сорту: АТ1119 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.12.2023 Патент № 231042

Дата пріоритету: 14.12.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22939048 Назва сорту:** АТ1720 **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.12.2023 **Патент № 231041**

**Дата пріоритету:** 14.12.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 20939175 Назва сорту:** ДК 22 А **Заявник (код):** 2766

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент № 231028**

**Дата пріоритету:** 31.12.2020

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 20939176 Назва сорту: ДК 22 Б Заявник (код): 2766**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2023 Патент № 231029**

**Дата пріоритету: 31.12.2020**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939021 Назва сорту:** НР 0031В **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 30.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231397

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939019 Назва сорту:** НР 0041В **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 30.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231395

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	сильна	7	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	деформований	6	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939020 Назва сорту:** HP 0111В **Заявник (код):** 2204 **Власник сорту (код):** 2204

**Дата пріоритету:** 30.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231396**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939065 Назва сорту: P143E2MЖО Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2023 Патент № 230854**

**Дата пріоритету: 23.11.2021**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231308**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з сильно зігнутим стеблом	8	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Сійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939061 Назва сорту:** P16E13M **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230850**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231304**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Сійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939062 Назва сорту:** Р16ПС1МЖК **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230851**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231305**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939063 Назва сорту:** Р4НП8М2Ж **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230852**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231306**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжеве	5	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	стріе	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939067 Назва сорту:** Р4НХ1МІ **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230856**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231310**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939064 Назва сорту:** Р5ПЕ4МЖ **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230853**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231307**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	коричневе	3	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939066 Назва сорту: Р5ПЕ4МК Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2023 Патент № 230855**

**Дата пріоритету: 23.11.2021**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231309**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вухка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	темно-коричневе	6	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Сійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Сійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939056 Назва сорту: PT5919 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.12.2023 Патент № 231044

Дата пріоритету: 14.12.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	малі	3	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправної борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 22939047 Назва сорту:** РТ6920 **Заявник (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.12.2023 **Патент № 231040**

**Дата пріоритету:** 14.12.2022

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	сильно охоплює	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanchе cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939106 Назва сорту:** PT7120 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230807**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231311**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	сильно виражені	3	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутих стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939107 Назва сорту:** РТ7220 **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 04.12.2023 **Патент № 230808**

**Дата пріоритету:** 20.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231312**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	веретеноподібні	1	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	



Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939055 Назва сорту: РТ7521 Заявник (код): 1783

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.12.2023 Патент № 231043

Дата пріоритету: 14.12.2022

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939115 Назва сорту:** РХ569СУЛ **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230858**

**Дата пріоритету:** 28.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231232**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вухка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	сильно загнуте до задньої сторони кошика	5	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939116 Назва сорту:** PX789СУЛ **Заявник (код):** 2267 **Власник сорту (код):** 2267

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230859**

**Дата пріоритету:** 28.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231233**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 20939137 Назва сорту:** СС 2019 **Заявник (код):** 2257 **Власник сорту (код):** 2257

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230978**

**Дата пріоритету:** 24.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231394**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939001 Назва сорту: СТ 1922 Заявник (код): 2257 Власник сорту (код): 2257

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.12.2023 Патент № 230979

Дата пріоритету: 11.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231403

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко випукла	4	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	сильно виражені	3	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939060 Назва сорту:** СФ2615МЖІА **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230849**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231303**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	тупий	3	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939083 Назва сорту:** ТРІ5567Р **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 13.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231402

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плесканий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939033 Назва сорту:** TP05033P **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 05.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231401**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	великий	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	короткі	3	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cuman</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	



**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939032 Назва сорту:** TRC5263P **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 05.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231400

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	широкоюйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стійкість проти вочка ( <i>Orobanche cuman</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939031 Назва сорту:** TPC5270P **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 05.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231399**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	світла	3	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галузнення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галузнення (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939030 Назва сорту:** TRX5190P **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720

**Дата пріоритету:** 08.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231398

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	малий	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	вузькотрикутна	3	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	дуже пізній	9	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	видовжена	1	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка ( <i>Oryza sativa</i> )	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939059 Назва сорту: Ф10Б32М20А Заявник (код): 1435 Власник сорту (код): 1435**

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2023 Патент № 230848**

**Дата пріоритету: 23.11.2021**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231302**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	великі	7	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	нещільно	3	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	дуже зігнуте у напрямку кошика	4	
18	Язичкові квітки: за довжиною	довгі	7	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	великий	7	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. f. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 21939058 Назва сорту:** Ф5ДНЗМ2А **Заявник (код):** 1435 **Власник сорту (код):** 1435

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.12.2023 **Патент № 230847**

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231301**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	нижче	3	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	коротка	3	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу зі злегка зігнутим стеблом	7	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	сіре	3	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

**Вид:** Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

**Заявка № 20939122 Назва сорту: ФР84259 Заявник (код): 2643 Власник сорту (код): 1219**

**Дата пріоритету: 16.12.2020**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023**

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231510**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюяцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	тонка	3	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobanche cumana</i> )	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 22939009 Назва сорту: ХП3222ПР Заявник (код): 2256 Власник сорту (код): 2256

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231313

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	від вузькотрикутної до широкотрикутної	4	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	жовте	1	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	помірна	5	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	не охоплює або дуже злегка охоплює	1	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	за всією висотою	3	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	нижче	1	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	плескатий	3	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	слабко виражені	2	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпю	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )	наявна	9	
44	Стойкість проти несправньої борошнистої роси ( <i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БУРЯК (КОРМОВНИЙ, ЦУКРОВНИЙ)

*Буряк цукровий*





**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 21069013 Назва сорту:** БТС 1920 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974  
**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231442**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	короткий	3	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	короткий	3	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
11	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	сильний	7	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосна стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		17,90	16,36
+, - до усередненого збору цукру, т/га		4,93	4,89
+, - до усередненого збору цукру, %		38,0	42,6
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		90,71	85,69
+, - до усередненої урожайності, т/га		23,55	21,84
+, - до усередненої урожайності, %		35,1	34,2
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,5	18,8
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		84,7	70,7
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		3	9
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 21069020 Назва сорту:** БТС 2645 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231444**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	сильно гофрована	7	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 1/2	7	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,37	15,00
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,40	3,53
+, - до усередненого збору цукру, %		18,5	30,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		80,37	83,30
+, - до усередненої урожайності, т/га		13,21	19,45
+, - до усередненої урожайності, %		19,7	30,5
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19	17,9
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		84,8	67,8
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 21069015 Назва сорту:** БТС 4685 Н **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974  
**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231443**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосна стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	веретеноподібна	1	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		16,26	13,39
+, - до усередненого збору цукру, т/га		3,29	1,92
+, - до усередненого збору цукру, %		25,4	16,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		78,28	71,35
+, - до усередненої урожайності, т/га		11,12	7,50
+, - до усередненої урожайності, %		16,6	11,7
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		20,7	18,6
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		85,5	66,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	8
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	6
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 21069021 Назва сорту:** БТС СМАРТ 9685 **Заявник (код):** 1974 **Власник сорту (код):** 1974  
**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231445**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	напівпохила	7	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	наявне	9	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	наявні	9	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	середній	5	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	веретенноподібна	1	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,45	14,77
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,48	3,30
+, - до усередненого збору цукру, %		19,1	28,8
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		77,42	79,50
+, - до усередненої урожайності, т/га		10,26	15,65
+, - до усередненої урожайності, %		15,3	24,5
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,8	18,3
Придатність до механізованого збирання, бал		8	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		88,2	67,8
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	5
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		тхн	тхн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 21069022 Назва сорту:** МАРУН **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231446**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	довгий	7	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	довгий	7	
9	Листок: за розміром пластинки	великий	7	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	слабко гофрована	3	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	широкий	7	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,13	13,83
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,16	2,36
+, - до усередненого збору цукру, %		16,7	20,6
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		80,99	75,17
+, - до усередненої урожайності, т/га		13,83	11,32
+, - до усередненої урожайності, %		20,6	17,7
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		18,5	18,1
Придатність до механізованого збирання, бал		9	8
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		83	60,2
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	7
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 23069003 Назва сорту:** Огест **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230863**

**Дата пріоритету:** 06.01.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231039**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	рожеве	5	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	вузькоконічна	2	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell  
**Заявка № 21069023 Назва сорту:** TOTEM **Заявник (код):** 1628 **Власник сорту (код):** 1628  
**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231447**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	сильна	7	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	гладенька	1	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	повністю заглиблений	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,35	14,99
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,38	3,52
+, - до усередненого збору цукру, %		18,4	30,7
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		77,00	79,35
+, - до усередненої урожайності, т/га		9,84	15,50
+, - до усередненої урожайності, %		14,7	24,3
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,9	18,5
Придатність до механізованого збирання, бал		9	8
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		91,7	56,3
Стійкість до цвітушності, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		5	8
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 21069032 Назва сорту: ФД Крампон Заявник (код): 796 Власник сорту (код): 796

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231183

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	жовте	3	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	жовтувате	2	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		14,76	15,37
+, - до усередненого збору цукру, т/га		1,79	3,90
+, - до усередненого збору цукру, %		13,8	34,0
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		74,78	79,20
+, - до усередненої урожайності, т/га		7,62	15,35
+, - до усередненої урожайності, %		11,3	24,0
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		19,6	19,1
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		83,6	65,7
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдомом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		4	4
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напрямок використання		ТХН	ТХН

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.



**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 21069033 Назва сорту:** ФД Стартер Смарт **Заявник (код):** 796 **Власник сорту (код):** 796

**Дата пріоритету:** 23.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231184

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	оранжеве	4	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	слабкий	3	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	світло-оранжеве	3	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		12,97	11,47
Збір цукру, т/га		15,71	14,13
+, - до усередненого збору цукру, т/га		2,74	2,66
+, - до усередненого збору цукру, %		21,1	23,2
Довірчий інтервал (збір цукру), т/га		0,18	0,30
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		67,16	63,85
Урожайність, т/га		75,69	74,03
+, - до усередненої урожайності, т/га		8,53	10,18
+, - до усередненої урожайності, %		12,7	15,9
Довірчий інтервал, т/га		0,83	1,25
Цукристість, %		20,8	18,9
Придатність до механізованого збирання, бал		9	9
Заглиблення коренеплідів у ґрунт, %		91	69,8
Стійкість до цвітущості, бал		9	9
Ураженість коренеїдом, бал		1	1
Стійкість проти церкоспорозу, бал		5	3
Ураженість кореневими гнилями, бал		1	1
Напряв використання		ТХН	ТХН

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 23069005 Назва сорту: ФД22Б5006 Заявник (код): 796

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2023 Патент № 230839

Дата пріоритету: 16.01.2023

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	оранжеве	4	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	малий	3	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	слабка	3	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 23069004 Назва сорту: ФД23Б5063 Заявник (код): 796

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.12.2023 Патент № 230838

Дата пріоритету: 16.01.2023

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
5	Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%)	оранжеве	4	
6	Рослина: тип розетки	напіврозлога	3	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	біле	1	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	великий	7	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	циліндрично-конічна	4	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

**Вид:** Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

**Заявка № 23069002 Назва сорту:** Фредерік **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.12.2023 **Патент № 230862**

**Дата пріоритету:** 06.01.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 22.11.2023


**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231038**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9	
4	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
5	Паросток: переважюче забарвлення (понад 50%)	зелене	2	
6	Рослина: тип розетки	розлога	5	
7	Листок: за довжиною (черешок з пластинкою)	середній	5	
8	Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки)	середній	5	
9	Листок: за розміром пластинки	середній	5	
10	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
13	Листкова пластинка: хвилястість країв	помірна	5	
14	Листкова пластинка: характер поверхні	помірно гофрована	5	
15	Листкова пластинка: блиск	помірний	5	
16	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
17	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	2	
18	Черешок: за шириною	середній	5	
19	Черешок: забарвлення	зелене	2	
20	Черешок: забарвлення основи	білувато-зелене	1	
21	Рослина: квітконосні стебла	відсутні	1	
22	Час початку розвитку квітконосного стебла	ознака не визначається	0	
23	Коренеплід: розмір	середній	5	
24	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
25	Коренеплід: форма	ширококонічна	3	
26	Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт	заглиблений на 3/4	5	

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

*Костриця овеча*  
*Люцерна мінлива*  
*Сорго суданське*  
*Фацелія пижмолиста*



**Вид:** Костриця овеча *Festuca ovina* L.

**Заявка № 21473002 Назва сорту:** Блискавка **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230912**

**Дата пріоритету:** 12.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231357**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Піхва листка: антоціанове забарвлення (влітку в рік сівби)	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: за висотою	низька	3	
4	Рослина: габітус	сланкий	9	
5	Листок: за довжиною	короткий	3	
6	Лише для сортів костриці червоної. Листок: за шириною	ознака не визначена	0	
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	дуже світле	1	
8	Листок: сизий наліт	наявний	9	
9	Рослина: формування кореневища	середнє	2	
10	Рослина: час виявлення суцвіття	ранній	3	
11	Рослина: за висотою під час появи суцвіття (прапорцевий листок не враховують)	низька	3	
12	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3	
13	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: за шириною	ознака не визначена	0	
14	Тільки для сортів костриці червоної. Прапорцевий листок: відношення довжина / ширина	ознака не визначена	0	
15	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (суцвіття включно; наприкінці цвітіння)	коротке	3	
16	Рослина: довжина верхнього міжвузля	коротке	3	
17	Суцвіття: за довжиною	дуже коротке	1	
18	Суцвіття: антоціанове забарвлення волоті	відсутнє або дуже слабке	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 1,7. Збір сухої речовини, т/га – 4. Вміст у сухій речовині білка, % – 14; клітковини, % – 36. Висота рослин, см – 59. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 90. Період від сходів (весняного відростання) до збиральної стиглості насіння, діб – 101. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Маса 1000 насінин, г – 0,5. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса – 6; сажка – 7; стеблова іржа – 7; антракноз – 8; снігова пліснява – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

**Заявка № 20364004 Назва сорту:** Індіго **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230949**

**Дата пріоритету:** 06.10.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231389**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	низька	3	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожай насіння (за вологості 14%), т/га – 0,38. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 27/15,5. Вміст білка, % – 23; клітковини, % – 25,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 6; пероноспороз – 8; іржа – 7; чорна плямистість стебел – 9; аскохітоз – 8; бура плямистість – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

**Заявка № 20364001 Назва сорту:** Струмочок **Заявник (код):** 3221 **Власник сорту (код):** 3221

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230822**

**Дата пріоритету:** 02.01.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 18.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231355**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	довга	7	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	середня частота	5	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 1	1	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожай насіння (за вологості 14%), т/га – 0,59. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 90,0/19,4. Вміст білка, % – 20,7; клітковини, % – 27,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9; пероноспороз – 9; іржа – 7; чорна плямистість стебел – 9; аскохітоз – 7; бура плямистість – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.



**Вид:** Люцерна мінлива *Medicago x varia* Martyn

**Заявка № 20364003 Назва сорту:** Янтарна **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.12.2023 **Патент № 230948**

**Дата пріоритету:** 06.10.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231388**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3	
5	Час початку цвітіння	ранній	3	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	відсутня або дуже низька	1	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	середня	5	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	низька	3	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	низька	3	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	низька	3	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожай насіння (за вологості 14%), т/га – 0,35. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 24/13,5. Вміст білка, % – 24,0; клітковини, % – 25,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса – 6; пероноспороз – 9; іржа – 7; чорна плямистість стебел – 9; аскохітоз – 8; бура плямистість – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Сорго суданське *Sorghum sudanense* (Piper.) Stapf

**Заявка № 21227001 Назва сорту:** Альтура **Заявник (код):** 2805 2806 **Власник сорту (код):** 2805 2806

**Дата пріоритету:** 23.11.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231479**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення колеоптиля	помірне	5	
2	Паросток: антоціанове забарвлення дорсального боку першого листка	помірне	5	
3	Паросток: антоціанове забарвлення пазухи першого листка	слабке	3	
4	Листок: антоціанове забарвлення пластинки (стадія 3-4 листка)	слабке	3	
5	Рослина: час початку виявлення волоті (25% рослин з волотями)	дуже ранній	1	
6	Рослина: форма куща (перед виявленням волотей)	розлога	7	
7	Рослина: за висотою під час виявлення волоті	висока	7	
8	Листок: зелене забарвлення пластинки (за виявлення волоті)	світле	3	
9	Прапорцевий листок: поширення знебарвлення середньої жилки (як для 8)	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Прапорцевий листок: інтенсивність зеленого забарвлення середньої жилки у порівнянні з пластинкою листка (якщо не знебарвлена, як для 8)	світліше	1	
11	Прапорцевий листок: жовте забарвлення середньої жилки (як для 8)	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Колоскова луска: забарвлення під час цвітіння	зелено-жовте	4	
13	Колоскова луска: антоціанове забарвлення (під час цвітіння)	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Колоскова луска: антоціанове забарвлення опушення (як для 13)	помірне	5	
15	Нижня квіткова луска: розвиток остюка (як для 13)	сильний	7	
16	Приймочка: антоціанове забарвлення (як для 13)	слабке	3	
17	Приймочка: жовте забарвлення (як для 13)	помірне	5	
18	Приймочка: за довжиною (як для 13)	середня	5	
19	Квітка з квітконіжкою: за довжиною (як для 13)	середня	5	
20	Волоть: щільність наприкінці цвітіння	нещільна	3	
21	Сухі тичинки: забарвлення (після цвітіння)	оранжево-червоне	4	
22	Рослина: за висотою (за досягання)	дуже висока	9	
23	Стебло: за товщиною (верхньої третини рослини за досягання)	тонке	3	
24	Листок: за довжиною пластинки третього листка від верхівки (за досягання)	середній	5	
25	Листок: за шириною пластинки (як для 24)	вузький	3	
26	Волоть: за довжиною без шийки (як для 24)	середня	5	
27	Волоть: гілочки: за довжиною (у середній третині волоті)	довгі	7	
28	Волоть: щільність (за досягання)	нещільна	3	
29	Волоть: форма (за досягання)	поникла	6	
30	Шийка волоті: видима довжина над пазухою (обгорткою) (як для 22)	довга	7	
31	Колоскова луска: забарвлення за досягання	світло-коричневе	4	
32	Колоскова луска: за довжиною (за досягання)	дуже довга	9	
33	Зернівка: забарвлення після досягання	світло-коричневе	7	
34	Насіння: маса 1000 шт. (лише для суданської трави)	середня	5	
35	Зернівка: форма зі спинки	вузькоеліптична	3	
36	Зернівка: форма в профіль	еліптична	5	
37	Зернівка: розмір зародка	малий	3	
38	Зернівка: поверхня, вкрита насінневою шкіркою	мала	3	
39	Зернівка: вміст таніну	ознака не визначалась	0	
40	Зерно: структура ендосперму (у поздовжньому розрізі)	на 1/2 склоподібна	5	
41	Зерно: забарвлення склоподібного ендосперму	світло-жовте	2	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 2,7. Урожайність зеленої маси / збір сухої речовини, т/га – 73,1/17,6. Тривалість періоду від сходів до укїсної стиглості, дїб – 70. Тривалість періоду від сходів до збиральної стиглості насіння, дїб – 121. Кількість укосів, шт. – 3. Поживність зеленої маси, к. од./кг – 0,22. Вміст в зеленій масі, %: цукру – 10,1; білка – 17,3; клітковини – 35,1. Холодостійкість, бал (1–9) – 9. Стьйкість до обсіпання зерна, бал (1–9) – 9. Стьйкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стьйкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз (*Helminthosporium turcicum* Pass.) – 8; бактеріоз (*Pseudomonas andropogoni* Stapp.) – 8; летюча сажка (*Sorosporium Reilianum* McAlp. f. *sorghii* Geschele) – 9; вкрита сажка (*Sphacelotheca sorghii* Clint.) – 9. Стьйкість проти шкїдників, бал (1–9): попелиці (*Anoecia corni* F., *Tetraneura ulmi* L.) – 8; совки (*Noctuidae*) – 8; стебловий метелик (*Ostrinia nubilalis* Hb.) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Фацелія пижмолиста *Phacelia tanacetifolia* Benth.

**Заявка № 23161001 Назва сорту:** ФОЛІС **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

**Дата пріоритету:** 08.12.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231513

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
2	Насінина: забарвлення	світло-коричневе	1	
3	Рослина: габітус	прямий	3	
4	Рослина: за висотою	середня	5	
5	Стебло: галуження	помірне	5	
6	Стебло: забарвлення	зелене	1	
7	Стебло: опушення	відсутнє	1	
8	Листок: за довжиною	довгий	7	
9	Листок: за шириною	широкий	7	
10	Листок: забарвлення	світло-зелене	1	
11	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
12	Листок: опушення	наявне	9	
13	Суцвіття: кількість на рослині	велика	7	
14	Суцвіття: кількість квіток на квітконосі головного пагона	велика	7	
15	Квітка: забарвлення	блакитне	2	
16	Час початку цвітіння	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Напрямок використання: сидерат, зелена маса. Урожайність насіння, т/га – 0,55. Урожайність зеленої маси, т/га – 28,0. Тривалість періоду цвітіння, діб – 38,0. Тривалість періоду від появи сходів до досягання насіння, діб – 90,0. Вміст сирого протеїну в зеленій масі, % – 4,5. Облистяність, % – 59,0. Поживність зеленої маси, к. од./кг – 0,18. Декоративність, бал (11–99) – 85,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 8,0. Морозостійкість, бал (1–9) – 8,0.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

# СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

*Квасоля звичайна (овочева)*

*Кукурудза цукрова*

*Огірок посівний*

*Пастернак*

*Перець однорічний*

*Редька олійна*

*Цибуля шалот*

*Шпинат городній*



**Вид:** Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

**Заявка № 23127002 Назва сорту:** Бергголд **Заявник (код):** 1163

**Дата пріоритету:** 26.06.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231439**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	ромбічна	5	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітів	малий	3	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	помірно шерехата	5	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	сильне	3	
37	Насіння: маса	дуже мала	1	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	від округлої до еліптичної	2	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	округла	5	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насінина: за довжиною	середня	5	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насінина: вторинне забарвлення	жовте	2	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	навколо рубчика	1	
47	Насінина: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ): Паса б	наявна	9	
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ): Паса Кappa	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> )	наявна	9	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> )	наявна	9	

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 45. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 10. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 55. Тривалість плодоношення, діб – 30. Кількість бобів на рослині, шт. – 20. Вміст білка в бобах, % – 13,5; сухої речовини, % – 21,5; загального цукру, % – 2,53; вітаміну С, мг/100 г – 23,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8; аскохитоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

**Заявка № 23127003 Назва сорту:** Топкроп **Заявник (код):** 1163

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231440**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотіля	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотіля	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	відсутня або дуже слабка	1	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	від округлої до ромбічної	4	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1	
15	Квітка: розмір приквітків	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	рожевуато-біле	2	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	відсутній або дуже слабкий	1	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	помірне	2	
37	Насіння: маса	велика	7	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	еліптична	3	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	округла	5	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	довга	7	
43	Насіння: кількість кольорів	два	2	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	коричневе	6	
45	Насіння: вторинне забарвлення	бежеве	3	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	по всій насінині	3	
47	Насіння: вираження орнаменту	помірне	5	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49,1	Стійкість до антракнозу квасолі ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ): Паса б	наявна	9	
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> ): Паса Кappa	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i> )	наявна	9	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі ( <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> )	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 40. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 8. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 54. Тривалість плодоношення, діб – 35. Кількість бобів на рослині, шт. – 22. Вміст білка у бобах, % – 13,5; сухої речовини, % – 23,1; загального цукру, % – 2,55; вітаміну С, мг/100 г – 22,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8; аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.

**Вид:** Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

**Заявка № 21103007 Назва сорту:** ФАЕСТАР **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231223**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	до похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	дуже пізній	9	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	дуже пізній	9	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбридних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	вузька	3	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 20. Група стиглості: рання – 1. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 46. Вміст загального цукру, % – 21. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 8; сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 9; сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7; фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 23110011 Назва сорту:** Герміна **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент № 231024**

**Дата пріоритету:** 20.09.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231289**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	поникле	3	
5	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення стагі	гіноцеїність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	мале	3	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	велике	7	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	нешільний	3	
33	Лише сорти з білою зав'язю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	світло-коричневе	2	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	по всій довжині	5	
40	Плід: щільність плям	дуже щільна	9	
41	Плід: наліт	помірний	5	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	наявна	9	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV)	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 12,5. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 49. Тривалість періоду плодоношення, діб – 75.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** 3Гр.



**Вид:** Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

**Заявка № 22110008 Назва сорту:** ФРОСТ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023 **Патент № 230826**

**Дата пріоритету:** 01.12.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231390**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	заокруглена	4	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноеційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	ознака не визначалась	0	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошністої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошністої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 8. Вміст сухої речовини в плоді, % – 3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 52. Тривалість періоду плодоношення, діб – 135.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 23110006 Назва сорту: Хелен Заявник (код): 1833 Власник сорту (код): 1833

Дата пріоритету: 01.08.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231499

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партекарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	відсутні	1	
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначається	0	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначається	0	
40	Плід: щільність плям	ознака не визначається	0	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	високо стійкий	3	
46	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бруї плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка ( <i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> ) (CGMMV)	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 400. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 55. Тривалість періоду плодоношення, діб – 50.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.**

**Вид:** Пастернак *Pastinaca sativa* L.

**Заявка № 23111001 Назва сорту:** Камо **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

**Дата пріоритету:** 02.05.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231290**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: положення	напівпряме	3	
2	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листки: глянсуватість	слабка	3	
4	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
5	Листки: пухирчатість	слабка	3	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листок: за шириною	середній	5	
8	Листок: відстань від найширшого місця до верхівки	коротка	3	
9	Листок: розчленування	слабке	3	
10	Листочок: розділення	слабке	3	
11	Листочок: зубчастість краю	слабка	3	
12	Листочок: розмір	малий	3	
13	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
14	Черешок: за довжиною	короткий	3	
15	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
16	Коренеплід: за шириною	середній	5	
17	Коренеплід: відстань від найширшої точки до розетки	мала	3	
18	Коренеплід: форма	оберненотрикутна	2	
19	Коренеплід: глибина заглиблення розетки	мілка	3	
20	Коренеплід: ширина заглиблення розетки	вузька	3	
21	Коренеплід: забарвлення шкірки	білувато-кремове	2	
22	Коренеплід: за характером поверхні	середній	5	
23	Коренеплід: серцевина за шириною	вузька	3	
24	Коренеплід: забарвлення м'якоті	білувато-кремове	2	
25	Чоловіча стерильність	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 44,3. Тривалість періоду до товарного стану, дів – 220. Середня маса коренеплоду, г – 145,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe umbelliferarum* D.V. f. *pastinacae* Hamm.) – 7; гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.  
**Заявка № 23113006 Назва сорту:** Ред Феррарі **Заявник (код):** 1833 **Власник сорту (код):** 1833  
**Дата пріоритету:** 01.08.2023  
**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231498**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: за довжиною стебла	середня	5	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	середні	5	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильна	9	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	низька	3	
11	Листок: пластинка за довжиною	довга	7	
12	Листок: пластинка за шириною	широка	7	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: форма	овальна	2	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Листок: пухирчастість	слабка	3	
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3	
18	Листок: глянуватість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	помірна	5	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	довгий	7	
26	Плід: діаметр	великий	7	
27	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трапецієподібна	6	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2	
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3	
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутня або дуже слабка	1	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірна	5	
35	Плід: глянуватість	помірна	5	
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9	
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	мілка	3	
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4	
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5	
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4	
41	Плід: м'якість за товщиною	товста	7	
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7	
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортаюча	1	
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3	
47	Час досягання	ранній	3	
48,1	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus (TMV): Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	наявна	9	
48,2	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus (TMV): Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість проти Tobacco Mosaic Virus (TMV): Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	наявна	9	
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	наявна	9	
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	відсутня	1	
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9	
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	наявна	9	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 27. Тривалість періоду до досягання, діб – 80. Товщина стінки плоду, мм – 6. Середня маса плоду, г – 220. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 140; загального цукру, % – 3; клітковини, % – 2; сухої речовини, % – 7.  
**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

**Вид:** Редька олійна *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

**Заявка № 23218001 Назва сорту:** САТІС **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

**Дата пріоритету:** 08.12.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231514

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повністю розвинений листок)	велика	7	
7	Листок: зубчатість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
11	Рослина: за висотою (під час бутонізації)	висока	7	
12	Час цвітіння	дуже ранній	1	
13	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
14	Квітка: забарвлення пелюсток	біле	1	
15	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
16	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	довгий	7	
17	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
18	Стручок: за шириною	середній	5	
19	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
20	Стручок: кількість насінин	велика	7	
21	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	
22	Тенденція до формування суцвіття в рік сівби за пізньолітнього вирощування	сильна	7	
23	Корінь: забарвлення	біле	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння, т/га – 2,5. Тривалість періоду вегетації, діб – 65. Уміст олії в насінні, % – 49. Стійкість до обсіпання, бал – 9. Маса 1000 насінин, г – 9,0.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Цибуля шалот *Allium oschaninii* O. Fedtsch.

**Заявка № 23107001 Назва сорту:** Шелія **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2023 **Патент № 231032**

**Дата пріоритету:** 26.04.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231320**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	помірна	2	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	середній	5	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	малий	3	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	ознака не визначається	0	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	ознака не визначається	0	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	середня	5	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинка (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	слабкий	3	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: розмір	середній	5	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: за висотою	середня	5	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: діаметр	середній	5	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
16	Цибулина/цибулинка: позиція максимального діаметра	біля основи	3	
17	Цибулина/цибулинка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина/цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	широкояйцеподібна	5	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Цибулина/цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина/цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина/цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина/цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	рожеве	6	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина/цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина/цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	пурпуровий	8	
26	Цибулина/цибулинка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина/цибулинка: кількість точок зростання на кг	середня	5	
28	Цибулина/цибулинка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначається	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ознака не визначається	0	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	пізній	7	
35	Час проростання протягом зберігання цибулин	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 25. Урожайність листків, т/га – 15. Тривалість вегетації рослин, діб – 80. Вміст вітаміну С у листках, мг/100 г – 65,3. Вміст у цибулині: сухої речовини, % – 9,5; загального цукру, % – 3,6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7; несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

**Заявка № 23130002 Назва сорту:** Матадор **Заявник (код):** 1163

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231441**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	напівпряме	3	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	широкояйцеподібна	3	
9	Листкова пластинка: вигин краю	загнутий назовні	3	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	3	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	опукла	3	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	низьке	3	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	високе	7	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	середнє	5	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівки, 15% рослин)	середній	5	
16	Насіння: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9	
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	наявна	9	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 20,8. Товарна врожайність, т/га – 17,0. Період від сходів до збирання врожаю, дів – 45. Маса 1000 насінин, г – 10. Вміст у листках: сухої речовини, % – 2,3; загального цукру, % – 1,68; вітаміну С, мг/100 г с.р. – 21,54; нітратів, мг/100 г с.р. – 32.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.

# ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

*Абрикос звичайний*

*Груша звичайна*

*Калина звичайна*

*Обліпиха крушиновидна*

*Черешня*





**Вид:** Абрикос звичайний *Prunus armeniaca* L.

**Заявка № 23256001 Назва сорту:** Голдріч **Заявник (код):** 3218 **Власник сорту (код):** 3218

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231497**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: габітус	від прямого до розлогого	3	
3	Дерево: ступінь галузнення	помірний	5	
4	Дерево: розподіл квіткових бруньок	порівну на шпорках і однорічних пагонах	2	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період швидкого росту)	помірне	5	
6	Однорічний пагін: забарвлення з-під сонячного боку	червоно-коричневе	2	
7	Однорічний пагін: розмір основи бруньки	середній	5	
8	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
9	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
10	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
11	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
12	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
13	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	тупий	3	
14	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
15	Листкова пластинка: форма краю	зазублена	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5	
17	Листкова пластинка: профіль поперечного перерізу	увігнутий	2	
18	Черешок: за довжиною	середній	5	
19	Листок: відношення довжина листкової пластинки / довжина черешка	середнє	5	
20	Черешок: за товщиною	середній	5	
21	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Черешок: переважаюча кількість нектарників	відсутні або один	1	
23	Черешок: розмір нектарників	середній	5	
24	Квітка: діаметр	середній	5	
25	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	на одному рівні	2	
26	Пелюстка: форма (за винятком нігтика)	округла	2	
27	Пелюстка: забарвлення нижнього боку	світло-рожеве	2	
28	Плід: розмір	дуже великий	9	
29	Плід: форма (вигляд з боку)	еліптична	4	
30	Плід: форма (вигляд з черевця)	еліптична	4	
31	Плід: за висотою	високий	7	
32	Плід: за шириною (вигляд з боку)	середній	5	
33	Плід: за шириною (вигляд з черевця)	широкий	7	
34	Плід: відношення висота / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
35	Плід: відношення ширина (вигляд з боку) / ширина (вигляд з черевця)	середнє	5	
36	Плід: симетрія (вигляд з черевця)	симетричний	1	
37	Плід: шов	злегка запалий	2	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
40	Плід: шпичак	відсутній	1	
41	Плід: поверхня	гладенька	1	
42	Плід: опушення	наявне	9	
43	Лише сорти без опушення. Плід: глясуватість	ознака не визначається	0	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	світло-оранжеве	5	
45	Плід: відносна площа основного забарвлення	мала	3	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	оранжево-червоний	1	
47	Плід: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3	
48	Плід: характер основного забарвлення	окремлі плями	1	
49	Плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	5	
50	Плід: текстура м'якоті	пром'яжна	2	
51	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
52	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	велике	7	
53	Плід: зростання кісточки із м'якоттю	відсутнє або дуже слабке	1	
54	Кісточка: форма (вигляд з боку)	еліптична	3	
55	Кісточка: гіркота	помірна	2	
56	Час початку цвітіння	середній	5	
57	Час початку достигання плодів	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30,0. Середній урожай з дерева, кг – 55,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 10,5; загального цукру, % – 9,8; пектинових речовин, % – 0,64; сухих розчинних речовин у плодах, % – 11,2; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 87,0. Загальна кислотність, % – 0,83. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 5; моніліальний опік – 7; парша – 7; клястероспоріоз – 7. Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): попелиця – 7; кісточкова муха – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стилості – сс. Напряму використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 6,0 x 3,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка № 20258002 Назва сорту: CX 201 Заявник (код): 2744 Власник сорту (код): 2744

Дата пріоритету: 16.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231329

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	середнє	5	
2	Дерево: галузнення	помірне	5	
3	Дерево: габітус (форма крони)	розлогий	4	
4	Однорічний пагін: за формою	хвилястий	2	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: домінує забарвлення з-під сонячного боку	коричневе	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	тупа	2	
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	помітно відхилені	3	
10	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)	слабка	3	
13	Листкова пластинка: положення відносно пагона	горизонтальне	2	
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
15	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
17	Листкова пластинка: форма основи	прямокутна	2	
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	прямокутна	2	
19	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
20	Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини)	тупозазублена	3	
21	Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною	середні	5	
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5	
23	Черешок: за довжиною	середній	5	
24	Черешок: прилистки	наявні	9	
25	Прилистки: відстань від основи черешка	середня	5	
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на довгих пагонах	2	
27	Квіткова брунька: за довжиною	довга	7	
28	Чашолисток: за довжиною	довгий	7	
29	Чашолисток: положення відносно віночка	горизонтальне	2	
30	Квітка: положення країв пелюсток	доторкуються	2	
31	Приймочка: розташування відносно пиляків	вище (довгий стовпчик)	3	
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5	
33	Квітка: форма пелюстки (нігтик до уваги не беруть)	широкоюцеподібна	2	
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3	
35	Квітка: нігтик за довжиною	короткий	3	
36	Нестиглий плід: забарвлення чашолистків	червоно-коричневе	4	
37	Плід: за довжиною	середній	5	
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
39	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
40	Плід: місце максимального діаметра	ближче до чашечки	2	
41	Плід: за розміром	середній	5	
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	злегка асиметричний	2	
43	Плід: профіль боків	прямий	2	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	жовте	4	
45	Плід: відносно поширення основного забарвлення	помірне	5	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	світло-червоний	4	
47	Плід: відносно поширення червоно-коричневого забарвлення довкола чашолистків	відсутнє або дуже мале	1	
48	Плід: відносно поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках	відсутнє або дуже мале	1	
49	Плід: відносно поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
50	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
51	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5	
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	пряме	1	
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	м'лке	3	
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2	
56	Плід: блюдце (як для 55)	наявне	9	
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5	
58	Плід: блюдце за шириною (як для 55)	середнє	5	
59	Плід: форма зони навколо блюдця	злегка ребриста	2	
60	Плід: структура м'якоті	середньозерниста	5	
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
62	Плід: соковитість м'якоті	соковита	7	
63	Насінина: форма	еліптична	3	
64	Час початку цвітіння	середній	5	
65	Час збиральної стиглості	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 40,0. Середній урожай з дерева, кг – 16,0. Маса плоду (середня), г – 220,0. Маса плоду (максимальна), г – 350,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 4,0; загального цукру, % – 13,0; сухих розчинних речовин у плодах, % – 12,0. Загальна кислотність, % – 0,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 7; парша – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Група стиглості – пс. Напрямок використання – ун. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Дегустаційна оцінка бал (1–9) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**

**Вид:** Калина звичайна *Viburnum opulus* L.

**Заявка № 21303002 Назва сорту:** Гармонія **Заявник (код):** 1601

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 230990**

**Дата пріоритету:** 02.12.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Кущ: за висотою	високий	7	
2	Кущ: за шириною	широкий	7	
3	Кущ: відношення висота / ширина	середнє	5	
4	Кущ: кількість скелетних гілок	середня	5	
5	Пагін: за товщиною (однорічний)	середній	5	
6	Пагін: забарвлення кори	світло-зелене	1	
7	Листок: розмір	великий	7	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листок: форма краю листкової пластинки	пилчаста	1	
10	Листок: форма основи листкової пластинки	серцеподібна	3	
11	Листок: кількість лопатей	три	3	
12	Листок: прилистки	наявні	9	
13	Черешок листка: за довжиною	середній	5	
14	Квітка: розмір	середній	5	
15	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
16	Зав'язь: форма	округла	2	
17	Ягода: розмір	великий	7	
18	Ягода: форма	округла	1	
19	Ягода: основне забарвлення	темно-червоне	4	
20	Ягода: за твердістю	середня	5	
21	Час розвитку бруньок	середній	5	
22	Час початку цвітіння	середній	5	
23	Тільки для сортів із жовтим забарвленням. Ягода: покривне забарвлення (рум'янець)	ознака не визначається	0	
24	Тільки для сортів із жовтим забарвленням. Ягода: інтенсивність рум'янцю	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Життєва форма: 1 – кущ. Строк досягання: 2 – середній. Ступінь самоплідності, % – 50,0. Урожайність, т/га – 17,3. Середня маса плоду, г – 1,1. Соковитість ягід, % – 80,0. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 91,5; загального цукру, % – 6,3. Загальна кислотність, % – 1,5. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,5. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плодова гниль – 8; попелиці – 7,5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.

**Вид:** Обліпіха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L.

**Заявка № 21299003 Назва сорту:** Абориген **Заявник (код):** 1601

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 20.12.2023 **Патент № 231014**

**Дата пріоритету:** 02.12.2021

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	чоловіча	2	
2	Рослина: життєва форма	кущ	2	
3	Рослина: положення гілок	напіввертикальне	2	
4	Рослина: за силою росту	середня	5	
5	Рослина: щільність крони	помірної щільності	5	
6	Рослина: розташування суцвіть	на однорічних і старших пагонах	2	
7	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
8	Пагін: кількість колючок (від середньої частини до верхівки)	середня	5	
9	Пагін: колючки за довжиною	середні	5	
10	Листкова пластинка: форма	вузькоеліптична	2	
11	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	1	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	2	
15	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
16	Плід: розмір	ознака не визначається	0	
17	Плід: форма	ознака не визначається	0	
18	Плід: забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
19	Плід: опушення	ознака не визначається	0	
20	Плід: плодоніжка за довжиною	ознака не визначається	0	
21	Час початку цвітіння	пізній	7	
22	Час початку достигання плодів	ознака не визначається	0	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Життєва форма: 1 – кущ. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз – 9; парша – 8, некроз – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): галовий кліщ – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

**Вид:** Обліпиха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L.

**Заявка № 18299009 Назва сорту:** Оляна **Заявник (код):** 1601 2480 **Власник сорту (код):** 1601 2480

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231518**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: життєва форма	дерево	1	
3	Рослина: положення гілок	напіввертикальне	2	
4	Рослина: за силою росту	дуже сильна	9	
5	Рослина: щільність крони	помірної щільності	5	
6	Рослина: розташування суцвіть	на однорічних і старіших пагонах	2	
7	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
8	Пагін: кількість колючок (від середньої частини до верхівки)	мала	3	
9	Пагін: колючки за довжиною	короткі	3	
10	Листкова пластинка: форма	вужкоеліптична	2	
11	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	1	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	2	
15	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
16	Плід: розмір	великий	7	
17	Плід: форма	видовжена	6	
18	Плід: забарвлення шкірки	жовто-оранжеве	3	
19	Плід: опушення	слабке	3	
20	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	2	
21	Час початку цвітіння	середній	5	
22	Час початку достигання плодів	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Життєва форма: 9 – дерево. Група стиглості: 7 – пізня. Урожайність, т/га – 12,5. Середня маса ягід, г – 0,7. Вміст у ягоді: вітаміну С, мг/100 г – 68,4; вітаміну Р, мг/100 г – 22,5; каротину, мг/100 г – 12,7. Соковитість, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): ендомікоз плодів – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1 – 9): обліпихова муха – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 23262001 Назва сорту: Джаєнт Ред Заявник (код): 3208 Власник сорту (код): 3208

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231321

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: габітус	розлогий	3	
3	Дерево: розгалуження	помірне	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
5	Молодий пагін: опущення верхівки (під час активного росту)	слабке	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	типові	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: за товщиною (посередині)	середній	5	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
12	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
13	Листок: черешок за довжиною	довгий	7	
14	Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка	середнє	5	
15	Листок: нектарники	наявні	9	
16	Нектарники: забарвлення	оранжево-жовте	2	
17	Квітка: діаметр	середній	5	
18	Квітка: форма пелюстки	кругла	1	
19	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
20	Плід: розмір	дуже великий	9	
21	Плід: форма	округла	4	
22	Плід: маточковий кінець	плоский	2	
23	Плід: шов	відсутній або дуже слабо помітний	1	
24	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
25	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
26	Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом	наявний	9	
27	Плід: забарвлення шкірки	темно-червоне	7	
28	Плід: розмір сочевичок на шкірці	малий	3	
29	Плід: кількість сочевичок на шкірці	середня	5	
30	Плід: шкірка за товщиною	середня	2	
31	Плід: забарвлення м'якоті	помірно червоне	4	
32	Плід: забарвлення соку	червоне	4	
33	Плід: за твердістю	середній	5	
34	Плід: кислотність	низька	1	
35	Плід: цукристість	середня	5	
36	Плід: соковитість	середня	5	
37	Кісточка: розмір	середній	5	
38	Кісточка: форма (вид з черевного боку)	куляста	3	
39	Плід: відношення вага плоду / вага кісточки	велике	7	
40	Час початку цвітіння	ранній	3	
41	Час початку достигання плодів	ранній	3	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 3 – рання. Рік вступу у плодоношення – 4-ий. Урожайність, т/га – 50,0. Середній урожай з дерева, кг – 50,0. Середня маса плоду, г – 17,0. Середня маса кісточка, г – 1,05. Відокремлення кісточка від м'якоті: 3 – відокремлюється частково. Вміст у плодах: загального цукру, % – 9,5; вітаміну С, мг/100 г – 10,0; Р-активних речовин, мг/100 г – 181,5. Загальна кислотність, % – 0,71. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 6; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; кластероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 8; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**

## Інші відомості Other notifications

### Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

#### Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин провела засідання **06 грудня 2023 року**, в якому взяли участь: Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., с. д.; Лікар С. П.; Костенко Н. П., к. с.-г. н.; Хоменко Т. М., доцент, к. с.-г. н.; Гринів С. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Михайлик С. М., к. с.-г. н.; Цизь О. М., доцент, к. с.-г. н.; Захарчук О. В., д. е. н., професор.; Бобось І. М., доцент, к. с.-г. н.; Григор'єв В. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Король Л. В., к. с.-г. н.; Бугайов В. Д., к. с.-г. н.; Щербина О. З., к. с.-г. н.; Байдюк Т. О., к. с.-г. н.,

#### за Порядком денним:

1. Розгляд проекту Методики визначення відповідності сортів роду чебрецю (*Thymus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

2. Розгляд проекту Методики визначення відповідності сортів сливи верболистої (*Prunus salicina* Lindl.) та її гібридів критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

3. Перегляд Методики визначення відповідності сортів міскантусу гігантського (*Miscanthus* × *giganteus* J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize) критеріям відмінності, однорідності та стабільності щодо здійснених доповнень.

4. Перегляд Методики визначення відповідності сортів пирію видовженого (*Elytrigia elongata* (Host) Nevski), пирію середнього (*Elytrigia intermedia* (Host) Nevski), пирію волосистого (*Elytrigia trichophora* (Link) Nevski) критеріям відмінності, однорідності та стабільності щодо здійснених змін і доповнень.

5. Розгляд Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні для:

5.1 чебрецю (*Thymus* L.) лікарського, фармацевтичної промисловості та декоративного напрямів використання;

5.2 чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris* L.) лікарського, фармацевтичної промисловості та декоративного напрямів використання;

5.3 полину д'Аргі (*Artemisia argyi* H. Lév. & Vaniot) лікарського та декоративного напрямів використання;

5.4 сливи верболистої (*Prunus salicina* Lindl.) плодового напрямку використання.

6. Різне.

#### Схвалено:

1) Методику визначення відповідності сортів роду чебрецю (*Thymus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

2) Методику визначення відповідності сортів сливи верболистої (*Prunus salicina* Lindl.) та її гібридів критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

3) Методику визначення відповідності сортів міскантусу гігантського (*Miscanthus* × *giganteus* J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

4) Методику визначення відповідності сортів пирію видовженого (*Elytrigia elongata* (Host) Nevski), пирію середнього (*Elytrigia intermedia* (Host) Nevski), пирію волосистого (*Elytrigia trichophora* (Link) Nevski) критеріям відмінності, однорідності та стабільності.

5) Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні для:

5.1 чебрецю (*Thymus* L.) лікарського, фармацевтичної промисловості та декоративного напрямів використання;

5.2 чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris* L.) лікарського, фармацевтичної промисловості та декоративного напрямів використання;

5.3 полину д'Аргі (*Artemisia argyi* H. Lév. & Vaniot) декоративного напрямку використання;

5.4 сливи верболистої (*Prunus salicina* Lindl.) плодового напрямку використання;

5.5 жита посівного (озимого) (*Secale cereal* L.) біоенергетичного напрямку використання.

6) Визначник морфологічних ознак сортів огірка посівного (*Cucumis sativus* L.).



## Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
142	Семенсес Прогрейн ІНК. Semenses Prograïn INC.	Ранг Вас- Рівієр НОРД, Сант-цезар, Квебек Rang Du Bas-de-la- Riviere NORD, St-Cesair, Quebec, JOL 1 T0
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Йігітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa, Turkey
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziologii roslin i henetyky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasytkivska, 31/17, m. Kyiv, 03022
485	Коссад Семанс ЕС А Cussade Semences S A	З.І. Де Мо п/с 109 82303 Кассад Седекс Z.I.de Meaux, BR 109, 82303 Caussade Cedex
655	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Колос» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrofirma «Kolos»	вул. Ватутіна, 18А, с. Пустоварівка, Сквирський р-н, Київська обл., 09051 vul. Vatutina, 18A, s. Pustovarivka, Skvyrskiy r-n, Kyivska obl., 09051
736	Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Vseukrainskyi naukovyi instytut selektsii (VNIS)»	вул. Ломоносова 30/2, кв. 36, м. Київ, Україна, 03022 vul. Lomonosova 30/2, kv. 36, m. Kyiv, Ukraina, 03022
751	Бейо Заден Б.В. Bejo Zaden B.V.	П.О.Бокс 50, Трамбан 1, 1749 ЗХ Варменхьюзен, Голландія P.O. Box 50, Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, The Netherlands
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	Р.О. Бокс 4005,6080 АА Хаєлен, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
767	Піонер Семена Холдінг ГезмБХ Pioneer Semena Holding GesmbH	Індустрієланде, Піонерштрассе, А-7111, Парндорф, Австрія. Industriegelände, Pioneerstrasse, A-7111 Parndorf, Austria
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagraïn Europe	руе Генрі Мондор Біопольє Клермонт-Лімагнє 63360 Сент-Безузіє rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Депре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплєв, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
806	Євраліс Семанс Euralis Semences	Авеню Гастон Фоебюс, 64231 Лескар Седекс, Франція Avenue Gaston Phoebus, 64231 Lescar Cedex, France
844	Монсанта Технолоджі ЛТД MONSANTO TECHNOLOGY LLC	800Н; бульвар Ліндберґ, Сент Луїс, Міссурі, США, МО 636167 800 N; Lindbergh blvd. St. Louis Missouri MO 636167
912	Норддойче Пфланцензучт Ханс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
918	Доу АгроСайенсіс В.м.б.Х. Dow AgroSciences V.m.b.H.	Каєртнер Рінґ 5-7, А-1010 Вієн, Австрія Kaerntner Ring 5-7, A-1010 Wien, Austria
921	Товариство з обмеженою відповідальністю «Рост Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Rost Agro»	39027, Полтавська обл., Глобінський р-н, с. Кириаківка 39027, Poltavaska obl., Hlobynskiy r-n, s. Kyryiakivka
1055	Піонер Хай-Бред Свіццерленд СА Pioner Hi-Bred Switzerland SA	Віа Кантонале - Галлерія 3, СН - 6928 Манно, Швейцарія Via Cantonale - Galleria 3, CH - 6928 Manno, Switzerland tel. +1515/2484800, fax +1515/2484999
1059	Луганський інститут селекції і технологій у формі товариства з обмеженою відповідальністю Luhanskyi instytut selektsii i tekhnologii u formi tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu	91490, м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степова, 11 91490, m. Luhansk, s. Teplychne, vul. Stepova, 11
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Svytiaz»	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1435	Солтіс Soltis	Домаєн де Сандреау, F-31700 Мондонвілле - Франція Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1517	Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Українське насіння» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ahrofirma «Ukrainske nasinnia»	64032, Харківська область, Кегичівський район, с. Красне 64032, Kharkivska oblast, Kehychivskiy raion, s. Krasne
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. Iur'ieva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskiy, 142, m. Kharkiv, 61128
1589	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskiy instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 s. Tsentralne, Myronivskiy r-n, Kyivska obl, 08853
1591	Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Selektsiino-henetychniy instytut – Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopolska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Fastivskiy r-n, Kyivska obl., 08162
1628	СЕСВАНДЕРХАВЕ Н.В./С.А. SESVANDERHAVE NV/SA	Індустріпарк, 15 В-3300, м. Тінен, Бельгія Industriepark, 15, B-3300, Tienen, Belgium

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
1669	Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1708	Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia «Maiaк» Instytutu ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	Чернігівська обл., Ніжинський р-н, село Крути, вул. Незалежності, 39, Україна, 16645 Chernihivska obl., Nizhynskiy r-n, selo Kruty, vul. Nezalezhnosti, 39, Ukraina, 16645
1730	Рйк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхеместер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtannytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshche Seleksiine, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Руе Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1802	Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Cherkaska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy»	вул. Докучаєва 13, сел. Холодниське, Смілянського району, Черкаської області, 20731 vul. Dokuchaieva 13, sel. Kholodnianske, Smilianskoho raionu, Cherkaskoi oblasti, 20731
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЕУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеін де Саблас, вул. Моулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1852	Монсанта Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1891	Акерманн Заатцухт ГмБХ і Ко. КГ Ackermann Saatzzucht GmbH & Co. KG	Мариенhofстр. 13, 94342 Ірлбах, Німеччина Marienhofstr. 13, 94342 Irlbach, Germany
1974	Бетасід ГмБХ Betaseed GmbH	Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Germany
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2061	Севіта Генетик Sevita Genetics	1451 Камерон РД Інкерман, ОН Канада КОЕ 1J0 1451 Cameron Rd Inkerman, ON Canada KOE 1J0
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2094	Дюу АгроСайенсіс ГмБХ Dow AgroSciences GmbH	Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany Im Rheinfeld 7, 76437 Rastatt, Germany
2195	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Флора» Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова фірма «Флора»	вул. Спиридонівська, 26, кв. 3, м. Одеса, 65067 vul. Spurydonivska, 26, kv. 3, m. Odesa, 65067
2204	Товариство з обмеженою відповідальністю «Нертус Агро» Товариство з обмеженою відповідальністю «Nertus Agro»	вул. Северина Потоцького, 38А, кімн. 23, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38A, kimm. 23, m. Kharkiv, 61075
2251	Приватне підприємство «Агро-Голд» Pryvatne pidpriemstvo «Agro-Hold»	вул. Котовського, буд. 168, корпус А, с. Кирнички, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., 68650 vul. Kotovskoho, bud. 168, korpus A, s. Kyrnychky, Izmailskiy r-n, Odeska obl., 68650
2256	ПАНАМ Франс САС PANAM France SAS	544 РУТ ДЕ ВІЛЬБРЮМЬЕР - 31340 ВІЛЬМЮР-СЮР-ТАРН 544 RTE DE VILLEBRUMIER - 31340 VILLEMUR SUR TARN
2257	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕНЕКС УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «HENEKS UKRAINA»	вул. Гоголя, 12, оф. 610, м. Полтава, 36020 vul. Hoholia, 12, of. 610, m. Poltava, 36020
2260	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2265	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ЛНЗ-АГРО» Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «LNZ-AHRO»	вул. Заводська, 17, с. Лебедін, Шполянський р-н, Черкаська обл., 20635 vul. Zavodska, 17, s. Lebedyn, Shpolianskyy r-n, Cherkaska obl., 20635
2267	Хібрісол, С. Л. Hibrisol, S. L.	C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain C/Genaro Parlade, 2 bajo 41013 Sevilla, Spain
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Товариство з обмеженою відповідальністю «Evrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2302	Заатцухт Штрєнг-Енгелен ГмБХ і Ко. КГ Zaatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG	Аспачhof, D-97215 Uffenheim, Germany Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2430	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут органічного землеробства» Tovarystvo z obmezhenou vidpovidalnistiu «Instytut orhanichnoho zemlerobstva»	вул. Космонавтів, 9, м. Глобине, Полтавська обл., 39000 vul. Kosmonavtiv, 9, m. Hlobyne, Poltavska obl., 39000
2434	Юніверситі оф Гвелф University of Guelph	Catalyst Centre, Store Road 50, Ichthyology Building № 92 CA-N1G 2W1 Guelph, Ontario Catalyst Centre, Store Road 50, Ichthyology Building № 92 CA-N1G 2W1 Guelph, Ontario
2449	АМЕРИКАН ГЕНЕТИКС С.А. AMERICAN GENETICS S.A.	Filellinon 17, P.C. 57013, Thessaloniki, Greece Filellinon 17, P.C. 57013, Thessaloniki, Greece
2470	Дурбак Андрій Миронович Durbak Andrii Myronovych	просп. Голосіївський, 88, кв. 7, м. Київ, 03040 prosp. Holosiivskiy, 88, kv. 7, m. Kyiv, 03040
2480	Францішко Вячеслав Станіславович Frantsishko Viacheslav Stanislavovych	с. Мукша Китайгородська, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., 32319 s. Muksha Kytaihorodska, Kam'ianets-Podilskiy r-n, Khmelnytska obl., 32319
2534	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Z. I. de Meaux, BP 109, 82303 Caussade Cedex, France Z. I. de Meaux, BP 109, 82303 Caussade Cedex, France
2537	Заатен Уніон Румунія Срл. SAATEN UNION Romania Srl.	Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA Str. General Praporgescu Nr. 1-5, ap. 8, 020965, Bucharest, ROMANIA
2552	Штрубе Д енд С ГмбХ Strube D&S GmbH	Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany Hauptstrase 1, 38387 Sollingen, Germany
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada
2558	Науково-виробниче фермерське господарство «КОМПАНІЯ МАІС» Naukovo-vyrobnyche fermerske hospodarstvo «KOMPANIYA MAIS»	вул. Центральна, 50, с. Зайцеве, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., 52514 vul. Tsentralna, 50, s. Zaitseve, Synelnykivskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 52514
2569	ФармЗаат АГ FarmSaat AG	Rott 3 48351 Everswinkel Rott 3 48351 Everswinkel
2606	Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Stepu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 2, с. Созонівка, Кіровоградський р-н, Кіровоградська обл., 27602 vul. Tsentralna, 2, s. Sozonivka, Kirovohradskiy r-n, Kirovohradka obl., 27602
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2649	КВС ЗААТ СЕ та Ко. КГаА KWS SAAT SE & Co. KGaA	37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany 37555 Einbeck, Grimsehlstrasse, 31, Germany
2653	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France
2676	ТОВ «Грін Фемілі» TOV «Hrin Femili»	вул. Ломоносова, будинок 83 А, кв. 181, м. Київ, 03189, Україна vul. Lomonosova, budynok 83 A, kv. 181, m. Kyiv, 03189, Ukraina
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрисаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenou vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2723	Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Bukovynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Крижанівського Богдана, 21 а, м. Чернівці, 58025 vul. Kryzhanivskoho Bohdana, 21 a, m. Chernivtsi, 58025
2742	Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІКС Україна» Tovarystvo z obmezhenou vidpovidalnistiu «KhIKS Ukraina»	вул. Гурджуанська, буд. 5 м. Синельникове, Дніпропетровська обл., 52500 vul. Hurdzhuanska, bud. 5 m. Synelnykove, Dnipropetrovska obl., 52500
2743	ДОНАУ СААТ СРЛ DONAU SAAT SRL	Str. Jean Monnet, nr.35, bl.35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania Str. Jean Monnet, nr.35, bl.35, Ap.1, Sector 1, 011956 Bucarest, Romania
2744	Агроскоп Agroscope	Route des Eterpys 18, 1964 Conthey, Switzerland Route des Eterpys 18, 1964 Conthey, Switzerland
2760	Науменко Андрій Петрович Naumenko Andrii Petrovych	вулиця Мічуріна, будинок 10-а, кв. 9, село Крюківщина, Києво-Святошинський район, Київська область, 08136 vulytsia Michurina, budynok 10-a, kv. 9, selo Kriukivshchyna, Kyievo-Sviatoshynskiy raion, Kyivska oblast, 08136
2761	Приватне підприємство «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ПЛОДОРІЗСАДНИК» Privatne pidpriiemstvo «NOVOMOSKOVSKYI PLODOROZSADNYK»	с. Мар'янівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51261 s. Mar'ianivka, Novomoskovskiy raion, Dnipropetrovska oblast, 51261
2766	Науково-виробниче підприємство «Украгроселект» Naukovo-vyrobnyche pidpriiemstvo «Ukragroselect»	вул. Чорноморська, 54, м. Білгород-Дністровськ, 67700 vul. Chornomorska, 54, m. Bilhorod-Dnistrovsk, 67700
2784	Бодаш Володимир Миколайович Bodash Volodymyr Mykolaiovych	вул. Павлова, 26, м. Умань, Черкаська обл., 20305 vul. Pavlova, 26, m. Uman, Cherkaska obl., 20305
2785	Бодаш Владислав Володимирович Bodash Vladyslav Volodymyrovych	вул. Павлова, 26, м. Умань, Черкаська обл., 20305 vul. Pavlova, 26, m. Uman, Cherkaska obl., 20305

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2787	Товариство з обмеженою відповідальністю – науково-виробниче підприємство «УКРАГРОСЕЛЕКТ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu – naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo «UKRAHROSELEKT»	вул. Чорноморська, 54, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., Україна, 67700 vul. Chornomorska, 54, m. Bilhorod-Dnistrovskiy, Odeska obl., Ukraina, 67700
2788	СОЙТЕК С.Р.Л. SOYTEK S.R.L.	Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County Dinicu Golescu no2, Fundulea 915200, Calarasi County
2793	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агронасінняпром» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahronasinniaprom»	вул. Северина Потоцького, 38-А, кімн. 42, м. Харків, 61075 vul. Severyna Pototskoho, 38-A, kimn. 42, m. Kharkiv, 61075
2794	Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України Derzhavna ustanova Instytut zernovykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Володимира Вернадського, 14, м. Дніпро, 49009 vul. Volodymyra Vernadskoho, 14, m. Dnipro, 49009
2805	Філатов Віктор Михайлович Filatov Viktor Mykhailovych	вул. Лермонтовська, 38, квартира 20, місто Харків, 61024, Україна vul. Lermontovska, 38, kvartira 20, misto Kharkiv, 61024, Ukraina
2806	Д'яков Андрій Вікторович D'iakov Andrii Viktorovych	вул. Чайковська, 33 Б, квартира 60, м. Харків, 61024 vul. Chaikovska, 33 B, kvartira 60, m. Kharkiv, 61024
2813	ВІЛМОРИН-МІКАДО VILMORIN-MIKADO	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France
2816	Беррітек С.Р.Л. Berrytech S.R.L.	вул. Піаджі, 10, м. Базель-ді-Піне, ІТ-38042, Італія via Piagi 10, Baselga di Pine, IT-38042, Italy
2834	Аванта Сід Інтернешнал Advanta Seed International	6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis, Mauritius 6th Floor Suite 157B, Harbour Front Building, President John Kennedy Street, Port-Louis, Mauritius
2838	Альфасід Кфт. Alfaseed Kft.	1132 Budapest, Visergari ut 18A. IV. Em 46, Hungary 1132 Budapest, Visergari ut 18A. IV. Em 46, Hungary
2839	Юніверсіті оф Гуелф UNIVERSITY OF GUELPH	50 STONE ROAD EAST, GUELPH, ONTARIO, NIG 2W1, Canada 50 STONE ROAD EAST, GUELPH, ONTARIO, NIG 2W1, Canada
2849	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Naukovo-doslidnyi instytut ahrarynoho biznesu»	вул. Токова, 2а, с. Веселе, Синельниківський р-н., Дніпропетровська обл., 52502 vul. Tokova, 2a, s. Vesele, Synelnykivskiy r-n., Dnipropetrovska obl., 52502
2863	ГДМ Хангері Кфт. GDM Hungary Kft.	1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary 1117 Budapest, Fehervari ut 50-52. 3. em., Hungary
2865	ЛІНЕА Семанс де Лін LINEA Semences de Lin	20, avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, France 20, avenue Saget, 60210 GRANDVILLIERS, France
2871	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросідс» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrosids»	проспект Хіміків, 59, оф. 7, м. Черкаси, Черкаська обл., 18018 prospekt Khimikiv, 59, of. 7, m. Cherkasy, Cherkaska obl., 18018
2873	ТОВ «Бонсідс» TOV «Bonsids»	вул. Ломоносова, 26/20, м. Київ, 03022 vul. Lomonosova, 26/20, m. Kyiv, 03022
2890	Лідеа Франс САС Lidea France SAS	Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250 Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
3208	Фермерське господарство «Відродження» Fermerske hospodarstvo «Vidrodzhennia»	вул. Нагорна, 23а, с. Хутірське, Петриківський р-н., Дніпропетровська обл., 51822 vul. Nahorna, 23a, s. Khutirskе, Petrykivskiy r-n., Dnipropetrovska obl., 51822
3218	Ярмоліук Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна vul. Nahorna, 23 a, s. Khutirskе, Dniprovskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
3221	Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України Instytut klimatychno oriyentovanoho silskoho hospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, м. Київ, 01010 vul. Mykhaila Omelianovycha-Pavlenka, 9, m. Kyiv, 01010
3227	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНАГРО УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «SANAGRO UKRAINA»	вул. Є. Коновальця, буд. 44-Б, 1 під'їзд, 3 поверх, м. Київ, 01133 vul. IE. Konovaltsia, bud. 44-B, 1 pid'izd, 3 poverkh, m. Kyiv, 01133
3233	Крафт Хайнц Фудз Kraft Heinz Foods	1 PPG Place, Suite 3400, Pittsburgh, PA 15222 (USA) 1 PPG Place, Suite 3400, Pittsburgh, PA 15222 (USA)
3234	Фермерське господарство «Фруктовий сад АТ» Fermerske hospodarstvo «Fruktovyi sad AT»	вул. Київська, 12, с. Халеп'я, Обухівський р-н, Київська обл, 08741 vul. Kyivska, 12, s. Khalep'ya, Obukhivskiy r-n, Kyivska obl, 08741
3236	Вовк Жанна Миколаївна Vovk Zhanna Mykolaivna	вул. Л. Вольгемут, 4, кв. 165, м. Київ, 03194 vul. L. Volhemut, 4, kv. 165, m. Kyiv, 03194
3237	Парамонов Денис Юсупович Paramonov Denys IUsupovych	вул. Краснодарська, буд. 171-д, кв. 81, м. Харків vul. Krasnodarska, bud. 171-d, kv. 81, m. Kharkiv

**Загальноживані скорочення термінів**

## Common abbreviations

<p>У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальноживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).</p> <p><b>ПС</b> – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),</p> <p><b>РС</b> – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),</p> <p><b>АС</b> – свідоцтво про авторство на сорт рослин.</p>	<p>The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).</p> <p><b>PBR</b> – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder’s Rights),</p> <p><b>NLI</b> – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),</p> <p><b>AC</b> – Plant Variety Authorship Certificate.</p>
<p>Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:</p> <p><b>П</b> – Полісся,</p> <p><b>Л</b> – Лісостеп,</p> <p><b>С</b> – Степ,</p> <p><b>ЗГр</b> – захищений ґрунт.</p>	<p>Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:</p> <p><b>P</b> – Woodlands,</p> <p><b>L</b> – Forest-Steppe,</p> <p><b>C</b> – Steppe,</p> <p><b>ZGr</b> – covered ground.</p>

**Розподіл ботанічних таксонів за блоками****Кукурудза звичайна**

Група стиглості	ФАО	Тривалість періоду вегетації, діб
1 Ранньостигла	150–199	91–105
2 Середньоранньостигла	200–299	106–120
3 Середньостигла	300–399	121–130
4 Середньопізня	400–499	131–140
5 Пізньостигла	500–599	141–150

**Соняшник однорічний**

2 Ранньостиглий: 101–115 діб

3 Середньоранньостиглий: 116–125 діб

4 Середньостиглий: понад 125 діб

6 Високоолеїновий (ранньостиглий: 101–115 діб)

**Сорго звичайне (двокольорове)**

4 Ранньостиглий (до 100 діб)

5 Середньоранній (101–110 діб)

6 Середньостиглий (111–120 діб)

**Соя культурна**

6 Ранньостиглий (91–110 діб)

7 Середньостиглий (111–130 діб)

8 Пізньостиглий (131–150 діб)

© патент

/ значок рівнозначності

**Характеристика 1 – Напрямок використання**

пер переробка

зпл запилювач

зерн зерновий

олн олійний

ВОЛ високоолеїновий

тхн технічний

ун універсального призначення

свж споживання у свіжому вигляді

корм кормовий

сд сидерат  
н насіння

**Характеристика 2 – Група стиглості**

сс середньостиглий  
рс ранньостиглий  
пс пізньостиглий

**Характеристика 3 – Якість**

сбіл середньобілковий  
вл високоолійний  
сл середньоолійний

**Характеристика 4 – Метод створення**

СЗ самозапилення  
П перехресне запилення  
С сорт-синтетик  
F1 гібрид

**ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ**  
OFFICIAL PUBLICATION

**ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН**  
*PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION*

*Бюлетень*  
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Гайдай А. О, Золотар О. В., Каражбей Г. М.,  
Коляденко С. С., Костенко Н. П., Лашук С. О.,  
Сиплива Н. О., Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи  
та показники  
господарської  
придатності підготували: Данюк Ю. С., Ільченко Я. В., Києнко З. Б., Курочка Н. В.,  
Матус В. М., Михайлик С. М., Носуля А. М., Руденко О. А.,  
Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смульська І. В.,  
Сонець Т. Д., Таганцова М. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 12.01.2023

Дата друку

Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Officina.

Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..

Тираж 25 прим. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.

Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043

e-mail: [info@tvoru.com.ua](mailto:info@tvoru.com.ua)

<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» – офіційне видання, що містить офіційні відомості щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211