



In the 5<sup>th</sup> Edition of Mr. Lox's *Wisdom of God, in the Creation* 8<sup>o</sup> Lond. 1709  
page 245 is the following Paragraph.

Sixthly & lastly We shall only mention the Names of some other  
Vegetables which with eighteen or twenty Thousand more of that Kind,  
do manifest to Mankind the illustrious Bounty & Providence of the  
Almighty & Omniscient Creator towards his undeserving Creatures; as the  
Cotton Trees; the Mangoe or Cashava; the Potatoe; the Quinits bark Tree;  
the Poppy; the Rhubarb; the Scammony; the Galap; the Coloquintida;  
the China; Sassa; the Serpentaria Virginiana, or Snake-weed; the  
Nisi or Gonsog; the Numerous Balsam and Gum Trees, many of which  
are of late much illustrated by the great Industry & Skill of that most  
discovering Botanist D<sup>r</sup> Leonard Plukenet. Of what great Use all  
these and innumerable other Plants are to Mankind in the several  
Parts of Life, few or none can be ignorant; besides the known Uses  
in curing Diseases, in feeding & clothing the Poor, in building, in  
dying, in all Mechanicks there may be as many more not yet discovered,  
& which may be reserved on Purpose to exercise the Faculties  
bestowed on Man, to find out what is necessary, convenient, pleasant  
or profitable to him.



41636/c

Linnaeus in his Bibliotheca Botanica  
before his Hortus Cliffortianus N.º 8 has  
the following Paragraph. Phytoticae  
Plantas raras exoticas plures, quam  
alios ullus exhibuit, ut eo cavere  
noqueat ullus in exoticis Plantis.  
Opus incomparabile.

Makens was born  
in 1642 & died 1706

Linnaeus Phyt. V. Ph. Trans. 193  
p. 528

N.º 196 p. 618



Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

[https://archive.org/details/b30414829\\_0001](https://archive.org/details/b30414829_0001)

10 D 17 20995

John Innes

4754

Redland Court  
Glover

"Dr. Leonard Plukenet, born 1642; a learned, critical & laborious Botanist. He wanted that patronage to which his merit entitled him, & seems to have felt the want severely. Towards the close of his life, however, he is said to have obtained the Superintendency of the Garden at Hampton Court, & he was honored with the Title of Royal Professor of Botany. He probably died soon after the year 1705. Great part of his Herbarium came into the hands of Sir Hans Sloane, & is now in the British Museum. He made a Collection of 5000 Plants, which for his Time, was astonishing in case. Though he was in possession of so great a Number of Plants, yet he

was not systematic enough to make any  
great Improvements in the Science

— Wedale L.L.D. the Friend of  
Fellow-Collegiate of Pukerich, resided at  
Enfield, where he had a botanic Garden  
on the old walls of which, the *Asterium*  
*maurum* is now said to grow.  
His *Herbarium siccum* is now  
preserved in the British Museum  
Mr. A. Brown, has named a new  
Holland Plant, <sup>Wedalia</sup> of the Prop & Order  
*Didymium angiospermia*. We have  
no particulars of this domestic or  
herbarial History, only that his Name  
was popularly pronounced Coddle.  
Petiver established a Genus, *Wedalia*,  
now sunk in *Polygonia*. The Genus  
formed by Brown approaches *Mimulus*  
may, he himself suspects, it is scarcely  
distinct.

Linnaeus named a singular or odd-kind of Plant,  
*Plukenetia volubilis*, of the Cl. Monocia & Order  
*Adeltaea*, in <sup>remembrance</sup> ~~honour~~ of Pukerich, with a view to  
express the singularities of ~~his~~ his Ideas.









*LEONARDI PLUKENETII, M. D.*

OPERA OMNIA  
BOTANICA,

In SEX TOMOS Divisa.





41639/c

20493

LEONARDI PLUKENETII, M. D.

# OPERA OMNIA

## BOTANICA,

In SEX TOMOS Divisa;

VIZ.

I, II, III. PHYTOGRAPHIA,

IV. ALMAGESTUM BOTANICUM,

V. ALMAGESTI BOTANICI MANTISSA,

VI. AMALTHEUM BOTANICUM.

In quibus,

# S T I R P E S

Illustriores minus cognitæ, Exoticæ,

Rarioresque novissimè detectæ ad plures CHILIADAS describuntur,

Tum Iconibus TABULIS ÆNEIS CCCCLIV.

Summa Cura depictis figurantur.



LONDINI:

Apud GUIL. & JOAN. INNYS, Regiæ Societatis Typographos, in Areâ  
Occidentali Divi Pauli, MDCCLXX.

# OPERA OMNIA



IN 2 E 2 T O M 4 8 2 1 1 2

2 T 1 1 6 P E 2

*[Faint, illegible handwritten text]*





*Collins sculp.*

LEONARDI PLUKENETT. D.M.  
EFFIGIES *Ætat: sua 48 Añõ Dom: 1690*

LEONARDI PLUKENETJ.

PHYTOGRAPHIA.

Sive

*Stipium Illustrorum, & minus cognitarum  
ICONES,*

TABULIS ÆNEIS.

*Summâ diligentia elaboratæ;  
Quarum unaquæq; Titulis descriptorijs,  
ex Notis Suis proprijs, & Characteristicis  
desumptis, insignita; ab alijs ejusdem  
Sortis, facile discriminatur.*

PARS PRIOR.

MEMINISSE JUVABIT.



*J. Collins fecit*

*Εμπειρον. είναι συμβδιδω ιωσον ει διοντε  
παντων φυτων. Gal. de Antid ot. lib. 1. cap. 15.*

LONDINI. MDCXCI.  
SUMPTIBUS AUTORIS

W. H. H. H. H. H.

W. H. H. H. H. H.

W. H. H. H. H. H.

\* I have examined my collection in  
honour of Henry Compton, Bishop  
of London. He had a very notable  
collection of plants in his garden  
at Lambeth. See L'Herminier's *Herposiphonia*  
Tom 2 p. 57

*Compositae* - *Helianthus* - *U. mo...*  
*Triad. - Myrtus* *lobata*  
*affinis americana*, *foliis*  
*laevibus* *capitata* *modis* *diversis*  
Stat. *Blom.* 260 & 261 p. 17



The Henry Compton (D.D.)  
consecrated Bp of Oxford  
1674 & on the 18<sup>th</sup> of Dec<sup>r</sup>.  
was translated to the See  
of London & departed this Life  
at Chelsea July 7. 1713. & was  
buried in the Church Yards —

$$\begin{array}{r} 13.6 \\ 10 \\ \hline 4.3.6 \end{array}$$

HONORATISSIMO

et.

ÆTERNVM REVERENDO

PRÆSULI ac DOMINO.

DOMINO

HENRICO COMPTON

LONDINENSI EPISCOPO. &c. &c. &c.

*Omniū Botanophilorum MECÆNATI summè colendo.*

LEONARDUS PLUKENETIUS

*Has suas* TABULAS PHYTOGRAPHICAS *in*  
*priori Parte comprehensas.*

Quòd

*HUIUS FAVORE ut plurimum Illustrantur, submissà cum*  
*observantiâ; in devoti animi tesseram, gratæq; mentis*  
*symbolum, VOTIVAS reddit, jure meritoq;*

*Offert. Dicat. Consecrat.*



# LECTORI BENEVOLO.

Natura parens sui studiosa, conservatrix, artis & pulchritudinis suae, sibi conscia perditura fructum sui, si amplius hunc terrarum Orbem solitudini ostenderet, ut desiderium contemplandi fertilissimum stirpium apparatus, quem in ipsa superficie subministrat nobilissima haec quam pedibus calcamus Terra, in nobis exatet, & conservaret. Novitate animos nostros ad se allicit, dum indies e varijs Asiae Provincijs, & à Primoribus prorsus incognitas in apricum producit plantas. Quamplurimi etiam Europae loci à Majoribus nostris non rite examinati, Novas formas, Novasq; species, quotidie nobis suppeditant. Africa quoq; his nostris temporibus, monstra sua gignere non desijt, sed Novi aliquid ex Plantarum genere, semper ab extremis parturientis Africae oris, ad nos adportatur. Nec huic Natura subsistit, sed continuè Novas ex alieno Orbe, in lucem profert plantas. Novaeq; virtutes à filijs Artis, in salutem humani generis invenuntur. Vigilanter enim Saeculi nostri Botanici, qui (ut Cl. Ray verbis utar) nec Majorum inventis contenti, ad ulteriora tendunt, nec alios sibi inquisitionum terminos, & columnas figunt, quam quas Natura terris fixit, Universum Orbem curis suis complexi. Illi scilicet stimulo mihi fuere, ut nulli sudari, operae, ac sumptui parcerem, quin tam indigenas, quam exoticas stirpes inquirere, atq; colligere, quarum investigatio ab ipsa Adolescentia nobis amantissima varietate se commendavit; fateor equidem Botanica in omni aevoo, melioris luti quamplurimis excoli; et in Arte medendi vel antiquissima est ratio, per simplices Herbas, morbos abigendi; Hujus enim Cognitionem ad Principes, etiam & Magnates, pertinere, Salomonis (regum omnium quos Sol unquam aspexit Sapientissimi) Alexandri magni, Mithridatis, Dioclesiani, & aliorum docuere exempla; Imperatores & Reges non pauci, Heroesq; Indijt, Indagationem, & peritiam hujus Naturalis Philosophiae parvis se dignissimam judicaverunt, rati se Herbariae rei colendo studium, optimè de humano genere mereri, nec minus solidam, veramq; laudem inde, quam ex Triumphis, ad omnem Posteritatem, nomini suo libare posse; Hanc tanti fecerunt Ethnici, ut ejus Inventionem, Dijs dignam aestimarent, & licet dubitare videantur, de primo eorum Inventore, consentiunt, tamen tandem, Apollinem illà prerogativa maxime praereminere his Poetae verbis.

Inventum Medicina meum est, Opiferg, per Orbem  
Dicor, et Herbarum subjecta potentia Nobis.

et semper fuit adeo incredibili apud Antiquos existimationis Herbarum Scientia, ut aequalis censebatur gloria, Herbam invenisse, & Vitam juvasse. Quicquid enim hujus Saeculi sentiunt alij, nobis satis persuasum, Studium hoc Botanicum necessariam esse Physicae & Medicinae partem, multis jucunditatis, & Delectationum condimentis gratiosam, & toti generi humano, utilitate quam maxime commendabilem: Visum igitur fuit, ut Nobilissimae Botanicae Scientiae, ulterius inserვიam, Plantarum aliquot Icones non alibi expressae, periergâ manu, et emodulata ad Plantarum ipsarum dimensiones naturales, proportione: quâdam, effiguarè, & adumbrare, et earum plures, corperidij gratiâ in unam Tabellam conjeci; Opus non minus varium, quam ipsa est Natura, ubi Orientis & Occidentis Induce Montium, Sylvarum, Vallium, litorum & camporum, Stirpes nativae, & alumnae à nullo Classico Autore antea celebratae, sed prorsus Novae, & hactenus inaudita, oculis vestris observantur, singulis etiam hujusmodi Novis plantis, nomenclaturam, proprijs & genuinis Symbolis insignitam accommodavimus, ut quae rem ipsam aptissime notat, & clarior foret omnis earum Cognitio simul & Cognatio, quam insuper dissimilitudinis collationis & similitudinis ope, inter Congeneres, & simillimas, iteratè inspectioni, & ex Plantis ipsis expansioni, adaptavimus. Nam haec omnia ex avtopia didicerimus, non ut Nicander Colophonius, qui ab agro remotissimus, rustica aggredi, non veritus; neq; ut Pamphilus, quem Galenus reprehendit, quod cum non conspexerit; ne dum per Somnium viderit, de his tamen scripserit; Has nobis vidisse contigit omnes, & etiam nunc praemanibus sunt, quas in Herbario nostro vivo, impraesentiarum conspicerè licet, aliasq; per multas, & inditas habeo, quas tamen in praesenti non exhibeo, quia Chartae penuria, & typorum immodica deterrent impensa; neq; enim potest quis, ullam certam cognitionem sibi arrogare Vegetabilium, quae nunquam aspexit. Benevolus interim Lector has Tabulas Phyto-graphicas aequo suscipiet animo, donec Herbarij vivi Catalogus, Plantarum circiter Octo millium comprehendens consequatur, nec dubito quin candidi Rei Herbariae cultores, non solum admiraturi sint, sed grati recolent quod tot incognitas, (octingenti fere numerantur) in his Tabulis nostris duas in partes distributis, lucinunc damus, & si quid, vel etiam Viris eruditioribus, unquam Novitate sua, se commendavit; Tabulae nostrae Phyto-graphicae, Novi Orbis, Novis (ie) novissime detectis, & hucusq; ineditis stirpibus, sunt referatissimae, quibus amplius Ex scriptoribus campum damus, in quo plantas legere possunt, easq; generali Plantarum Indici, seu Pinaci inserere, quae in nostro Orbe jam dudum innatuèrunt; ex quibus omnibus non desperarem, nos Botanophilis perplacuisse, & plurimas ab ijs gratias promeruisse, tum ob ea, quae jam praestulimus in hoc opere nunc edito, tum ob ea, quae praestituri sumus in Catalogo nostro, brevi edendo, ut hac ratione, votis meis amplissime satisfactum iri arbitrarer. Utaris ergo Lector amice his nostris laboribus, quos amano huic operi impendimus, ac stirpes haec peregrinas rarissimas, & hactenus inauditas, quae nunc exactis Imaginibus Orbi panduntur, adspicias, & in omnibus inexhaustam Sapientiae profunditatem, & Majestatem divinam in ipsis Condendis, comperies; His nobiscum ad Dei gloriam, tuamq; ac ceterorum utilitatem, & oblectamentum paratis, fruerè pro otio, & incolumis age; Vale.



TAB. I.



1. *Abies Piceum* referens folijs ex omni parte prorumpentib *Abies* folijs proloq. *Picea* s. *Pinus*.  
 Hist. an *Picea minor* C. B. P. *Pinus maritima minor* ejurd. Cat. H. Ac. Lugd.  
 2. *Absinth. minus odoratu* (Sangeticum, floribus Chamæmeli solitarijs, e foliorum alis.  
 3. *Absinth. tenuifol. elegans* ex Hispania; D<sup>nis</sup> Turnefortij.  
 4. *Acacia* o *Spinosa* Wagæ. Malabar. Similis e *Maderaspatana*. lit. a. fol. ad justâ magnitudinem aenotat.  
 5. *Acaciæ similis* o *Spinosa* ramulis alternis *Maderaspatana*. an *Nili* camarâm. H. M. pro hujus Synonymo  
*Indicâ arborea* Zanon. ponitur à Breyn. Prod. i. cum *Nellikam* ejurd. hujc magis convenire videtur.  
 6. *Acaciæ* quodammodo accedens. s. *Ceratiæ* & *Acaciæ* media *Tamaicensis* spinosa bigemmis folijs,  
 flosculis stamin. a. tronitente fructu, Siliquis parùm intortis. lit. a. flosculos. b. Siliquâ et fructum vidigetur.  
 7. *Unguis Cati Arbor Americana* spinosa siliquosa Par. Batav. Prodr.







Fig. 1.



Fig. 3.



d.



Fig. 2.



Fig. 4.


1. *Acacia Maderaspatensis* spinosa Intsiae accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. a. folium ad natural. dimensionē exprimit.
2. *Acacia gloriosa* Leutisci fol. spinos. flore spicato luteo, viliquā magnā muricatā. Arbor exot. spinos. fol. Lentisci C.B.P. Inimboy Bras. Maregr. Bouduch Zanon. Caretti H.M. lit. a. folium ad verā magnitud. cum aculeo sursūm spectante. lit. b. lobum spinis crebriorib; armatū indicat.
3. *Acacia* spinosa minor ē Quaracoā s. Curassavica fl. alb. globoso. fortē Tehoaxin Mexicicens. Hernaud.
4. *Acer virginianum* folio majore subtus argenteo, supra viridi splendente. Acer floresc. Virginiana Vulgō. Arborē hanc magnitudine & proceritate eximiam in Hort. D. Ioh. Tradescanti Lambethæ ad Austrū jam olī enutritam sæpe conspexim; sed eam ibi unquam floruisse a nomine memoratum audijimus.






Tab. III.

1. *Acer Benghalense* Laurin. folijs fructu tergemino, totidem membranulis extantib; alato.
2. *Adianth. alb. floridū. s. Filicula petrea crispa* Ray Hist. *Adianth. album crispū Alpinū* Schwenckfeld II.
3. *Adianth. folijs minutim in oblongum scissis, pediculo viridi. C.B.P. Ad. alb. tennis. Rutæ murariæ accedens* I.B.
4. *Adianth. album florid. Cicutarie folio Virginianū nostrum.* D. Ray Hist. app.
5. *Adiant. radicos. humis parsu. s. Filicula pellucid. nostras Coriandri foliolis mollicellis globuliferum Adiant. petraum perpusillum Anglicū folijs bifid. vel trifid. Newtoni* Ray. Hist. fortè *Filicula saxatilis fol. Coriandri.* Mentz. pugil.
6. *Adianth. radicos. erectius foliolis imis bifectis, cæteris verò in-tegris tenuissimè crenatis. fortè Filicula saxatid. Coriandri folijs rotund. leviter serratis* Mentzel. pugil. Rarior. Pl.





- Tab. IV  
 1. *Adiantum nigrum* Chinens. tenuiter divisum, pinnulis minimis, obtusis, plerumque bifidis. Ray. Hist. app. an *Filix saxatilis crispa* Park? lit. a. ramulum ad justam magnitudinem denotat.  
 2. *Adiantum nigrum* s. *Dryopteris* Chinensis lanuginosa Ray. Hist. app. an *Loucheitis Maranthæ leterach ramosum* Quorund. Lob. Ic. s. *Polypodium Huons.* Hist. Lugd. quæ secundum utrosq. Bauhinas sunt unū & idem.  
 3. *Adiantum* Chinense perelegans ramos. folio flabelliformi cum rubedine perfuso. *Adiantum* folijs *Coriandri* ramosum Ray. Hist. app. has tres *Adiantorum* species habuit Cl. Rajus ab egregio Botanico & Pharmacopæo Londinensi D<sup>no</sup> Jacobo Petiver qui postea ad Icones exculpendas, nobis libenter concessit.  
 4. *Feschynomene mitis* s. *Mimosa* De Tunquin pinnulis amplioribus *Clanæ filici* marincæ æmulis. sub Ovali titulo recepimus, foliorum formâ *Tsjampangan* H. M. haud multum abluat.

J Collins Delin & sculp.





Fig. 1.



Fig. 4.




Fig. 3.



Fig. 2.

Tab. V.

- f. 1. *Æsch. mitis* Americ. foliatis *Acaciæ* breviorib; Br. Cent. à *Mimosa* Americ. supina veluti spinulis exasperata, pinnis *Acaciæ* latiorib; & brevioribus ejusd. Prodr. 2.
2. *Æschyn. mitis* s. *Mimosa* angustiori siliquâ folijs perexignis *Maderas-patana* *Æsch.* folijs minimis nostra. Ray. Hist. app.
3. *Alcea Indica* frutesc. folijs ad marginem exasperatis *Brijonie* albæ divisuris. è Sinu Bengalens. allata est nobis.
4. *Alcea spinos.* *Maderaspatana* fol. profunde laciniatis, *Cannabis* in modum *penta-phyllea*. saporis acidi à *Acetosa Indica* Bonti. Huj; meminit Cl. vir & sedulus exoticar. Pl. explorator D. Herman in Cat. HAc. Lugd. pag. 27.







1. *Alcea Cretica* flore immaculati candoris peranplo. in Hort. Medic. D. Morgan Londini Suburbano, jam olim exculta fuit.  
 2. *Alcea uetosa* India mitis folijs superioribus Gossipij in modum tripartito divisis. *Althæa Indica* Gossipij folio Acetose sapore CHAL.  
 3. *Alcea Indica* Ulmi folio prægrandis subtus incana flore amplo purpureo, *Althææ magna* 593. capsularis folijs integris subtus albicantibus, floribus magn. BANIST. Cæt. Virgin. apud. RAY Histor. inferiora enim hujus folia sunt prorsus integra superiora tamen in tertias ternas leviter uicisa, & aversâ parte albicantia.  
 4. *Alcea s. Baniâ* Americanæ parvo flore, petalis rotundioribus.  
 5. *Anchusa lutea minor* C. B. P. I B. Park. item *Symphytum angustifol.* Apuluni ejusd. Park. *Anchus. echinoid. lutea* Cerinthes flore, montana. Col. ecphr.





- Tab. VII.  
 1. *Alcea Ind.* fol. hastato, fl. parvo, purpur. longo petiola insidente, pericarp. compacto, duro in 5 qd  
 cellulas, totidem semina includentes dispersito.  
 2. *Althaea frutesc. Ind. Orient.* Populi albæ minoris fol. tenuiter dentato uolli. an *Althæa Americ. frutesc.* Populi alb. folijs Par. Bat.  
 3. *Alsine Caryophylloid. tenui fol.* fl. albo punctato. an *Als. Caryophylloid. tenuifol. montana Lini flore Ray Hist.* fortè etiam  
*Polygonum Caryophylli Holostei flore Cat. H.R. Bles. Betonica. s. Tunica minimæ similis Planta I. B.?*  
 4. *Alsine palustr. Ericæ folia Polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. Saxifraga palustr. Anglica Good-*  
*eneyi Park. item Alsine nodosa Germanic. ejusd. Park. Alsine nodosa Germanic. aliàs Arenaria. C.B.P. Arenaria I. B.*  
 5. *Alsine formis paludosa tricarpos flosculis albis inupertis. Alsine palustris Cortulacæ aquaticæ. similis. Ray. Hist. Alsine*  
*palustr. minima flosculis albis, fructu Coriandri exiguo Mentz. pu. zyl. Portulaca exigua. s. arvensis Camerary J.E.*  
 6. *Alsine spuria pusilla repens folijs Saxifragæ aureæ Ray. Cat. Pl. Angl. Hujus notitiam Doctiss. nostro Rains debemus,*  
*proinde miratus sum quo casu in Caleberrim. Auloris Histor. Universal. hæc plantula omissa fuit.*





Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

- Tab. VIII.  
 1. *Althæa frutesc. folio acuto virente molli, flore specioso.* au *Althæa frutesc. folio acuto flora magno* Schol. Botan. *Althæa profunde serrato. s. dentato folio* I.B. *Althæa flore majore* C.B.P. et fortassè eadem cum *Althæa arborea* Olbiæ *Provincialis* Advers. Lob. & Icon. *Malva sylvestr. perennis folio profunde laciniato & dentato* Moris. Hist.  
 2. *Althæa frutesc. Bryonice folio incano flore minore.* *Althæa species quibusdam arborea altera, vel Bryonice folio* I. B. *Alth. sempervirens Bryonice fol.* Park. *Alth. frutesc. Bryonice folio; item Alth. frutesc. folio acuto parvo flore* C.B.P. *Malva frutesc. folio acuto auriculato Hederae instar* Moris. Hist. *Althæa Olbiæ vulgò putata.*  
 3. *Althæa fruticans Hispanicæ Aceris Monspensulan. incanis folijs grandiflora saponis odore.* *Alth. frutesc. folio rotundiore incano* C.B.P. *Alth. arborese* I.B. *Alcea frutesc. folio rotundiore incano* Moris. Hist. item *Malva Hispan. folijs mollib; undulatis in margine superius micis sulphureis ad solem lucentibus donatis ejusd* Moris. Hist. quoad descriptionem; at in Tabul. huic Titulo alterius Icon substituitur, *Althæa Provincialis* Penæ. Advers. ex sententia, D. Rāj Hist. 603.





Tab. IX.  
 1. *Althea* facie *myosotis* *Bismagarica* frutescens flosculis pallidè flavescenti b; cujus folia sunt ad caulem alterno posita, (non per intervalla geminata) incana, hirsuta; flosculi quidem ut *Anagallidis*, non tamen caerulei, alioquin haud admodum diversi minis in caudè, est enim reverà *Convolvuli* minimi. species *Bismagarica*.  
 2. *Althea* Indica latiori folio cordiformi, ad summum sinuato. *Malva* Indica frutescens folio cordato P. B. P.  
 3. *Althea* rostrata Cormandeliens. *Pimpinella* major. fol. subrotundo.  
 4. *Althea* fruticosa minor Gaugetica folijs exiguis margine spinosis.  
 5. *Althea* Ind. floscul. parvis folliculatis (fortè fasciculatis) ramulis adfixis. Breyn. Prodr. i. *Malva* Americani Carpinii folio, florib; aureis fasciculatis parvis P. B. P. e Maderaspatan nobis allata est.  
 6. *Althea* Virginian. bideus *Pimpinella* maj. acutiore folio, flosculis minimis luteis. fortè *Alcea* Mori folio Virginian. min. Sch. Bot.



[Faint, illegible text, likely a caption or description of the plant illustration.]





I. Collins. de: & sc.

- Tab X.  
 1. Amaranthi, albus Gangeticus Salviae angustis folijs panicula conglomerata. an Amaranth. Alopecuroid. Indicus frutesc. lanuginos; folijs Salviae angustiorib; & longiorib; Bt. Prod. 2? Salvia Amaranthoides Mich. Nutij. Fascic. Herbar.  
 2. Amaranth. Ind. min. lanuginos. Sampsuchi folijs, spica alba ad foliorum exortum gemella. an Amaranth. Alopec. Ind. frutesc. lanuginos; folijs Salviae latiorib; & breviorib; Bt. Prod. 2?  
 3. Amaranth. verticillat; min. Bengalens. Serpijll. folijs incanis.  
 4. Amaranth. spicat; Dictamni Creticae folio Maderaspatis.  
 5. Ambrosia maxima inodora Marrubij aquatic. folijs tenuiter laciniatis Virginiana.  
 6. Ambrosia (forsan) e China Anguriae folijs acutens. a D.<sup>no</sup> Petiver recepi.





1. *Ammi majus* exoticum folijs per ambitum eleganter incis. an *Ammi* alterum semine *Apij* C.B.P. *Ammi* odore  
*Origani* I.B. nostra folijs à *Dauco* *Cretico* *Zanon.* haud multum abluunt.
2. *Amomum* *Virgii.* *Evonymo* *Virgii.* simile, florib; & fructu sparsim erumpentib; *Amomum* *Virginianum.* *Cornifemineæ*  
*facie* *Ray* *Hist.*
3. *Amygdalus* *Indica* *nana.* *Cat.* *H.R.* *Paris.* *Amygdalus* *pumila* *Cat.* *H.R.* *Bles.*
4. *Amygdalo-persica* *nana* *flore* *carneo* *pleno* *Africana.* *Persica* *Malus* *Africana* *nana* *flore* *incarnato* *pleno* *Cat.* *H.Ac.*  
*Lugd.* *hujus* *ramulum.* *a.* *floribus* *onustum* *denotat.* *munc* *Nobilissimi* *Domini* *Henrici* *Baronis* *de* *Colrane* *hanc* *primùm* *accepimus.*






- Tab. XII  
 1. *Angolan forte* H. M. *Arbor Indica* baccifera fructu umbilicato, rotundo, Cerasi magnitudine, dicocco. Ray Hist.  
 ē sinu Gangetico nobis advenit.  
 2. *Anisum Africanum* fruticescens folio, & caule, rore cæruleo tinctis. *Ferula fruticosa* sempervirens folijs Anisi  
*Galbanifera*, ex qua Galbanum Officinarum P. B. P.  
 3. *Anthyllis* s. *Alsine maritima* lignosior *Anthylloides*, folijs tomentosis *Bisnagaria*.  
 4. *Antirrhinum purpureum* multicaule, folijs tenuissimis, sursum inflexis, florib; sparsis, calyce spinulis asperato.



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



- Tab. XIII.
1. *Apocynum Canadense maximum* flore minimo herbaceo Cât. H.R. Bles. itém *Apocyn. Virgin.* flore herbaceo, siliquâ longissimâ, & tenuissimâ Morison. Prælud. Botan.
  2. *Arbor Aristolochiæ* folijs Maderaspatana fructu parvo, Medicæ adinstar involuto. an *Gummi Elemi* fundens *Arbor Orientalis*?
  3. *Arbor baccifera Orientalis*, folio rhomboide, fructu calyculato. *Cassia Cinamomen* s. *Canella* de mato. Linschot. part. 4. Ind. Orient.
  4. *Arbor è Cormandél vasculifera* folijs amplis *Mijrsinites rigidiorib;* nostra Ray. Hist.







1. *Arbuscula Bengalensis*, *Aceris* minore folio incano alternatim posito.  
 2. *Arbuscula* e *Maderaspaton* folijs *Aceris* alterna vice lucide virentibus.  
 3. *Arbuscula Zeylanica* *Aceris* folio baccifera, folijs e directo, magis angulosis.  
 4. *Arbuscula Bisnagarica* *Aceris* folio parvo aculeata, folijs e regione binis  
 5. *Arbor aromatica* e *Cormandel Laurinis* folijs binis ternisve. nostra D. Ray Hist.  
 6. *Arbor Prunifera*. sphaerulas saponarias ferens tetraphylla, ex Ind. Orient. an *Saponaria Arbor Zeylanica*  
 trifolia semine *Lupini*: *Coughas Zeylanensib;* P. B. P?  
 7. *Aster Americanus frutescens* *Satureice* folijs scabris floribus amplis, saturate Violaceis.





- Tab. LV.  
 1. *Artemisia Chinensis* cujus mollugo Moxa dicitur, forte Ytzeuinpatli Mexic. Hernand. an *Artemisia Virginiana* Park?  
 2. *Aristolochia Viote fruticos. folijs Virginiana*, cujus radix *Serpentaria* dicitur.  
 3. *Asarum* e Terrâ Mariana *Viola lutea* vel *Asarince folijs*, *Serpentaria nigra* Nostratib; dicta.  
 4. *Asparagus aculeatus minor sarmentosus* e *Maderaspatan*.  
 5. *Asparagus* (forte) *aculeatus major spinas plurimas ab eodem exortu pro folijs ferens. an Asparag; aculeatus Siculus* Ray Hist. an *Spina umbellâ folijs viduâ* C B P? *Drypis Theophrasti Anguillarce* I B?  
 6. *Aster exotius Hyoseridis folio minore noster* D. Ray Hist. app.  
 7. *Aster African; Stachadis inodore folijs incanis flore albicante. Aster Afric. Stachad. folio noster* Ray H. app.  
 8. *Aster Bengalensis omnium minutus, summo caule biflorus.*



TAB. XVI.



- Tab. XVI.  
 1. *Aster luteus* latifol. glaber folijs rigidis, & minutissimè crenatis. an *Aster luteus* folio glabro & crenato  
 C.B.P.<sup>2</sup> ubi Synonyma huic Plantæ à Cosp. Bauhin. malè sunt appropriata.  
 2. *Aster peregrinus* Cisti folio non crenato, flore magno luteo. an *Aster odoratus* flore luteo stellato exoticus  
 Cat. Pat. à Turre. fortè. *Aster Conyzoides luteus* perennis Icon Roberti.  
 3. *Aster luteus frigidus* Crithmi Chrysanthem. folio, florib; umbellatis. *Iacobaea Crithm. litorei* folijs Catal.  
 H. R. Bl. *Iacobaea frætida* Crithmi Chrysanth. facie Brunijeri. Cat. H. Ionq. *Iacob. Rosmar. fol. Quorund.*  
 4. *Atriplex maritima* Mauritanica frutescens, Polygoni folijs argenteis racemosa. *Atrip. marit. Mauritan. fol. Polygon.*  
*argent. semine amplo fusco vasculis rotundiorib; nostra* D. Ray Hist. append.






1. *Bellis montana incana & crenata folijs & crenis obtusis. an Bellis montana folio obtuso crenato. C B Pin 8. 11*  
*Prodr. 2 Bellis sylvestris folio crasso & villosa. Sch. Bot. ubi ponitur pro nondum descripto.*
2. *Bellis Americana procerior serotina ramosa flore amplissimo Cat. H. Ac. Lugd. an Bellis radice repente, folijs*  
*latis; serratis. Cat. H. R. Bles. sorte Tlally-yetl. No. Hispan. Hernand? Bellis Indica maxima C. H. Ac. Pat. Turc.*
3. *Bellis montana folijs Coronopi lacinijs s. denticulis rarioribus & magis extantibus; an Bellis Alpina folijs*  
*profunde dissectis Sch. Bot. Bellis leucanthenia (s. Anthemis) frutescens folijs profunde laciniatis Breyn.*  
*Prodr. 2. Bellis montana folijs Chrysanthemi D. Magnol ejusd Breyn. ibid. Bellis chrysanthemi segetu*  
*folio D. Hans Sloan. Ray Hist.*
4. *Bellis pumila crenata Agerati æmula, crenis bicornibus asperiusculis. Bellis maritima folijs Agerati C B P & in Pr.*
5. *Bellis montana Tanaceti folijs caule singulari annua. Chamæmelo affine Buphthalmum italicum segetum altissimum IB.*
6. *Bellis Alpina Parthenij folijs elatior.*







Tab. XVIII.

1. *Bliti Malabaricæ accedens Arbustula Maderaspatana flore peculiari.*  
 2. *Blitum Africanū Calthæ. palmistris folio caule nudo cubitali spicam pedalem & amplius sustinente. Petasites Africanus Calthæ palmistris folio Cat. Hac. Lugd. Petasitidis folio Bliti fructu D. Ray Hist append.*  
 3. *Bugula cœrulea Alpina Park. Consolida media cœrulea Alpina C B P. & I B. item Consolida media Genevensis ejusd I B. Histor. Universal.*



TAB. XIX.



Fig. 1.

Tab XIX

f. 1. *Carduus Andelusiacus* spinosissim; echino grandi  
aculeis rigidis armato noster D. Røyt. Hist.  
append. è Regno Andelusiæ, Cubi & ipse  
collegit) hanc elegantissimam Cardii  
speciem mittebat ad nos Ornatissimus Vir  
& nobis amicissim; D. Ioh. Fishwick.





Fig. J.

I. Collins. Delin. & Sculp.

Tab. XX.  
 f. 1 Christophoriana arbor aculeata Virginiensis. Angelica arborescens spinosa s. Arbor Indica Fraxini folijs cortice spinoso Ray Hist. Arbor spinosa Fraxini folijs Virginiana. D. Edward. Morgān. Angelica arbor vulgō. lit. a. folium hujus, naturali magnitudine dimidiatum. b. seminum Umbellas indicant.





Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 3.

- Tab. XXI  
 1. Chrysanthemum Americanum. Doronia fol. fl. Persici coloris, umbone magno prominente, ex albo purpureo, dividi, & aureo, subacuto. an Bellis Canadensis purpurea Ciasii Fascic. Herbær. Mich. May p. 22  
 2. Chrysanthem. Canadensis latifol. humulus. Motis. Præclud. Bot. Chrysanth. Canadensis. humulus. Boerhou de Pl. Sicul. Aster birgineus luteus alter minor. Park.  
 3. Chrysanth. African. Asteris facie, uno flore non folioso, capitulis duris.  
 4. Chrysanth. Bengulense angustifoliū pusillum. summo caule ramosum.  
 5. Chrysanth. segetum nostras folio glauco multiscisso maj; fl. minore.  
 6. Chrysanth. tenuifol. flore luteo subtus purpurascente. Bupthalmu. tenuifolium folio Millefolij ferè JB. Bupth. caule & folio purpurascente C.B.P. Bupth. flore purpurasc. Park.  
 7. Chrysanth. Smirnceum Colulæ folio, flore amplo nudo seminibus hispitis, ad capitula in orbem spirus circumscriptis, an Chrysanth. valentinum, Cus (ie) Bupthalmum lanuginosum folijs Millefolij C.B.P. Elegans hæc planta cujus folia aliquando lanugine obducta invenimus ex semine in Cabis & Corbulis quibus Ficus & Uva passæ v. Smirniâ ad nos transportantur, disperso & inde collecto, enata Angliæ primò & nostræ ilemum nobilitate accessit.







Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Deates. sc.

Tab. XXII


1. Chrysanth. Scrophulariaceae folijs Americanum.

2. Chrysanth. Cannabinum Virginian. hirsutum, disco nigro, petalis aureis radiato. Chrysanth. s. Flos solis laciniatus annuus; umbone nigricante D. Bobartian. Eupatorium Cannabinum Americanum flore aureo Cat. Hort. Reg. Bles. lit. a. a. summum ramulum suis floribus ornatum denotant.

3. Chrysanthemum Peruvianum flore albo Cat. Hort. Lips. olim. edit.


4. Chrysanth. Chinense folijs plurifariam divisis. Halicacabi peregrini cernulis; Chrys. fol. multifidis Cicutae nonnihil similibus Virginianum Cat. HAc. Lugd. Chrys. Cannabinum American. frutesc. Virginianum Sambuci laciniatae folijs & facie Breyer. Prodr. 2. à China ad D. Petiver allata est haec elegans planta, & ab illo nobis amicissimè communicata.





Tab. XXIII.  
 1. *Campanula Cymbalariae folio* Park. Camp. Cymbalar. fol. vel folio hederaceo CBP. Campanul. folio hederac; species Cantabrica Anguillare IB.  
 2. *Cicer Astragaloides* (forte) *virginianum*, hirsutie pubescens florib. amplis, subrubentibus. an *Cicer montan.* lanuginos. erectum CBP. D BANISTER Cat. Stirp. Virgin.  
 3. *Cistus American.* *Chamaenerij* folijs lucentib; ex Hort. D. Morgan. an *Tzatzouqua Mexicicus.* Hernandl.  
 4. *Cistus Chamærhododendros* folijs confertis, ferrèa rubigine nitentib; margine pilosis.  
 5. *Cistus Helianthemus argenteus* folio latiore, flore saturate luteo. *Helianthem. Alpin.* folio *Pilosellæ minoris* Fuchsij IB. ex sententia D. Ræ et forte *Cistus helianth.* folio *Polij. montan.* e jusd. item *Cistus pusillus* folio candido, flore luteo, e jusd. IB. ex mente ipsius Ræ. Hist. Brit. an *Chamaecist.* folijs *Myrti Tarentin.* canis & cinereis IB.  
 6. *Cistus humilis* *Alpinus durior*, *Polij nostralis* folio candicante, *Chamaecistus montan;* *Polij folio noster* D. Ræ. Synops. Stirp.  
 7. *Cisti Helianthemii* folijs, planta *Maderaspatana*, floribus ex alis. an *vitis Idæa Cisti helianthemii* folijs *Maderaspatana.*





- Tab. XXIV.
1. *Clinopodium virginianum angustifolium*. fl. amplis luteis, punctis purpureis. Clinopod. Virgini. angustif. flore luteo Cat. Hort. Ac. Lugd. *Origanum floribus amplis luteis purpureo-maculatis, cujus caulis sub quovis verticillo decem vel duodecim, foliis rubentibus est circumcinctus.* D. Banist. Cat. Stirp. Virgini.
  2. *Conserva reticulata crispa.* D. Doodij Rây Hist. app.
  3. *Convolvulus angustissimo folio nostras cum auriculis.* an *Convola. arvensis* minim; D. Dent Rây. Synops. Stirp. Brit.
  4. *Convolvulus maritimus.* s. *Soldanella* è Maderaspatan; folio in summitate sinuato. an *Convolv. marit.* Zeylanic; folio crasso cordiformi Cat. H. Ac. Lugd. Bintamburù Zeylan.
  5. *Convolv. maritimus*; majore folio Chinensis. an *Sarsa litoralis.* s. *Convolv. maxim;* Brasiliës. Pison.
  6. *Convolvuli instar Volubilis* è Coromandel umbilicatis folijs crassis acuminatis, villosa. an Pada-Valli, s. Pada Kelengi sive Muschega-Pada H. M. P. 7? fortè ad Brijonice genus, potiori jure releganda.





Tab. xxx.

1. *Convolvulus Americanus*; sub *Malapica* nomine receptus. an *Convolvulus*; *Coluhrinus* Pison? *Canpeba* s. *Convolvulus* Brasiliensis; flore octapetalo monococco Ray. *Histor?*
2. *Convolvulus*; s. *Volubilis* Americ. *Bryonia nigra* nervosis fol. vasculis seminiferis, triquetris. *Helxine frutescens* *Bryoniae nigrae* folijs, capsulis triquetris amplis, pergamenis. D. Bauist. *Cat. stirp. Virgin.* an *Capreolata* *Bryoniae nigrae* folijs Brasiliensis. *tricoeca* Marcgrav.
3. *Convolvulo* similis *Bryoniae albae* folijs villosis, ex India Orientali. an *Nehomeka* H. M. P. *Tab 19?* Haec etiam pro synonymo *Bryoniae Zeylan* folijs profunde laciniatis *Cat. H. Ac. Lugd. à Cl. Comelino* ponitur. *Annot. in loc.*
4. *Convolvulo* similis *villosa*, folijs crassis, subrotundis, è *Maderaspatan.*







Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 4.  
Collins sculp



Fig. 7.



Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 6.

Tab. XXVI

1. *Corallina latifolia* & *Opuntia marina* Cortus. *Fucus folio rotundo* C.B.P. *Sertolaria Imperati*, *Scutellaria* s. *Opuntia marina* I.B.  
 2. *Corallina fistulosa fragilis*, internodijs prælongis, lævibus, albis, *Farciminum* modo catenatis, *Corallina fistulosa fragilis* I.B.  
 3. *Cornus virginiana* flosculis plurimis albidis ex involucrio tetrapetalo rubro erumpentibus, D. Banist. Cat. Stirp. Virg. apud D. Ray. Hist.  
 4. *Cucumis Bryonioides* Bisnagarica fructu parvo, florum calyce muricato. an *Mucca Peri*. H.M.P. 8.  
 5. *Cuscuta ramis Arborum* inuascens Caroliniana filamentis lanugine tectis, Muscæi Courtenidi.  
 6. *Cuscuta lendiginosa* tenuissimis cirrhis à Terrâ Mariandâ. *Cuscuta Americana* super arbores se diffundens, Ray Hist. app.  
 7. *Cytisus Americanus* flore luteo spicato; folijs supra direntibus, glabris, subtus lanugine argentalis.





Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 3.



Fig. 5.

- Tab. XXVII.  
 1. *Elichryso* affinis *Peruviana* frutesc. Cât. H. Ac. Lugd. app. *Agerato* affinis *Perijana* frutescens Parad. Bat. Prod. *Quinquina*. s. *Arbor amara* & *Febrifuga* quibusd. falso & fastuosè nuncupata.  
 2. *Elichryso* affinis *virginiana* frutescens folijs *Chenopodij* glaucis. *Senecio* frutescens *virginiana* *Atriplicis* folio Ray Hist. & app.  
 3. *Ephemerū* *Bengalense* serpens folio subrotundo brevi phalangoides. an *Ephemerum* *Africanū* animum flore chpetalo Cât. H. Ac. Lugd. *Dipetalos* *virginiana* folijs *Gentianæ*, aut *Plantaginis* *Mæregi*. Ray Hist. ? fortè etiam *Gentianella* *Indica*. Bonty. p. 154.  
 4. *Ephemerū* *Phalangoides* *Maderaspatens*. minimum folijs perangustis persoliatum, fortè *Acaxacàn* s. *Potamogeton* *Mexiocan.* z. Her-  
 nand. *Planta palustris* & lenta, quæ statim comprimentib; cedit digitis, huc etiam pertinet *Tali-pullu*. HMP. T. 63. p. 123.  
 5. *Euphrasia* *lutea* *latifolia* *palustris*. Ray Hist. an *Cristæ* *Galli* affinis *planta Romana*. s. *Crista Galli* *major* *Italica* I. B. quærit & ipse *Eruditiss.* Rayus ubi. supra.






Tab. xxviii

1. *Euphrasia* s. *Cratogeomum* folijs brevibus obtusis Vestnorlandicum Ray Hist.
2. *Euphrasia pratensis minor purpurea* Park. *Euphr. purp. min.* C.B. Prodr. *Euphr. 3<sup>a</sup> non scripta* Fáb. Col. *ecuphr.*
3. *Erica* facie *Polygonoides* summitas cum floribus.
4. *Erica* facie *Polygonoides* Africana pentapetalos, viticulis in creberrima capillamenta squammulis constata diffusis, Limonium ferulaceo folio, Crisley Virid. L. usit. ut humanissime nos monuit D. Cuius Elm; Sherard. Collegij S.<sup>ti</sup> Johannis in Academ. Oxoniens. socius, & Phytognostes peritissimus, cujus munere summitatem accepi, ramulum autem à D. Johanne Fishwick. ad maritimas Africæ oras à seipso collectum & ad nos transmissum, obtinui.
5. *Evonymus virginianus*, rotundifol. capsulis coccineis elegantè baccatis Banist. Cat. Stirp. Virg. lit. a. semina ad natural. magnitud. demonstrant.
6. *Evonym. Tujubinis* folijs Caroliniensis, fructu parvo ferè umbellato. b. b. semina ad æqualem dimensionem significant. à foliorum similitudine in *Rhamno Cathartico* (ni fallor) hæc planta, *Spina Cervina* Barbadosibus nostratibus nominatur.





Tab. xxxix.

1. *Ficoides*. s. *Melocactus mamillaris* glabra, sulcis carens, fructum suum undiq; fundens. àn *Echino-melocactus minor lactescens* absq; tomento, cylindris laxiorib; *Parad. Bal. Prodr.*
2. *Ficoid.* s. *Melocactus minimi lanuginos;* spinis mitioribus fructu sparsim egrediente. àn *Echino-melocactus tuberosus*, s. *globularis min.* *Cal. H. R. P.*
3. *Ficoid. Americani.* s. *Cereus erectus cristatus* folijs triangularib; profunde canaliculatis. *Cereus spinis crebrioribus horridus* *Ray.* *Hist. Jamaicarũ prima* *Pison. Hist. Lusitan. Cardon.* àn *Planta pinnata arundinacea* *Park. Theatr.*
4. *Equisetum*. s. *Hippuris lacustris*, folijs mansu arenosis *Gesnero* *Ray.* *Hist. Hippuris coralloides* *Ger. emac.*
5. *Frutex* *Cormandelienis* *baccifer* *Mali.* *Granatce* folijs amphioribus. *noster* *Ray.* *Hist. 1801.*
6. *Frutex* *Gangetic;* *Alaterni* folio spinosus. *Frutex aculeatus* *Orientalis* *Slicis* folio *noster* *Ray.* *Hist.*
7. *Frutex* *Bisnagariensis* spinosus, *Coryli* folijs densis, spinis brevioribus crassis.








Fig. 4.



Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 2.

1. *Filix amplissima lobis foliorum laciniatis Cambrica. Polypodium Cambrobritanicum pinnulis, ad margines laciniatis Ray. Hist.*  
 2. *Filicis e Chinâ genus molle, auriculâ ad pinnulæ basim superne productâ, summo folio longius mucronato.*  
 3. *Filix s. Polypodium Indiarum folijs profunde sinuosis Marrubij aquaticæ. æmulis. an Filix Indica Osmundæ facie Bod. à Stapel. in Theophrastu Sim.*  
 - Paul. Quadripart. Botan. 302.  
 4. *Filicifolia, Conchitis aspera maxima Indorum.*





- Tab. XXXI.
1. Frutex bacifer. e. Cormandel Rorisnar. obtusis & veluti punctat. fol. plurimis, ex uno tuberculo provenientib, vid. Ray Hist. p. 1801. an bitis = Idacee spec. Indice Orientalis.
  2. Frutex bacifer folijs Lini, vel Cassiae Poeticæ Maderaspatisensis. noster. Ray Hist.
  3. Genista tinctoria Maderasp. Rorisnar. folijs ad caulem radiatis. an Legumen cuius siliquula. à D. Terentio ex Indiâ missa, & titulo herbae Anil inscripta fuit. CBP. Glasto affinis ejusd. CBP. Anil. s. Nil. Indorum color. IB. Anil herba folijs Mungiriqua similis Garziae. Annil. s. Indigo, gali. s. Nil. Herba Rorisnarini facie. Linscho t. part. 4. Ind. Orient. Genista Thensi Lugel (h. e.) Genist. radiatae, vel stellari IB. (i. e.) sparto triphylllo CBP. valde similis, si non eadem. Huic etiam proxima est Cytisus, acuminatis folijs, CBP. quoad D. Turnebortinū monente D. Sherard (i. e. nostrâ sententiâ) Cytisus Indicus flore luteo hirsutus Cat. Patav. à Turre. Cytisus folijs argenteis flore luteo vulgò. Nostra caulis angularis est, proinde eam ad Gemstarum genera magis proprie disponendâ. arbitramur; Quam ut audio præparât pro cœrulei coloris tincturâ in Regno Bisnâgar, alijsq, in locis Indice Orientalis.
  4. Geraniū pusillū supin. marit. Alth. aut Betonic folio nostras Ray Hist. Geran. minim. procumbens folijs Betonia. Moris Hist. 2.
  5. Gnaphal. Lusitan. cornis argenteis. an Chrysocome Syriaca candidiss. florib; Breijn. Pr. i. sorte etiam Gnaph. maj; angust. oblongo folio alterum CBP. Filago Germanic. altera secunduim folia florida. Lob. Icon.
  6. Gnaph. maj. lato oblongo fol. CBP. Gn. 2<sup>m</sup> Plateau. C. Hist. Gnaph. ad starchadem citriū, accedens IB. Elichryson silvestre latifol. capitulis conig; CB. Pliyt.
  7. Gnaph. impium. s. Filago dicta Cap. Bon. spei. Gnaphalio Plateau 3<sup>o</sup> simile genus, sed diversum.





Tab. xxxii.  
 1. Gramen Arundinaceum Halepense, Tragopogonis fol. paniculâ multicaâ huj; exemplar ex unij Botanici D. l.æ. Bobart Hort. Academiæ Oxon. Præfect. communicatione in Herbario nos. d.ivo servatur.  
 2. Gram. paniculat. Gallo-provinciale Aquilegiæ semine Schol. Botan. a. D. Gulielmo Sherard. accipiebam.  
 3. Gr. junceum aquat. paniculis cum fol. capillarib; simul etis, proliſerum. añ Gr. junce. capsulis triangul. caulicul. tenuib; folijs ad nodos, & panicularum divaricationes prælongis. Ray Hist.  
 4. Gr. Alopecuroid, spicâ max. Ind. Orient. Gr. Alopecuroid Indic. max. Ray Hist. est panici genus.  
 5. Gr. parvum repens.  $\delta\nu\sigma\alpha\delta\epsilon\ \delta\acute{o}\phi\omicron\sigma\omicron\nu$ . Jamaicense spicâ longiori compressâ.  
 6. Gr.  $\mu\epsilon\lambda\lambda\omicron\iota\kappa\acute{o}\phi\omicron\sigma\omicron\nu\ \delta\acute{z}\acute{\upsilon}\phi\upsilon\lambda\lambda\omicron\nu$ . Carolinianum, s. Gr. altissi panice maxima speciosa, e spicis majorib; compressisculis utriusq; pinnatis Blattam molendinariam, quodammodo referentibus, compositâ; folijs convolutis, mucrone, pungentib; añ Gr. marit. max. Curasavie. paniculis divisib; P. B. P. hujus ad exculpend. nobile specimen nobis dedit Insignis & in onui Naturali scientiâ. vir. magnâ judicij soliditate; si quis. alius præcedens D. Gulielm; Courteue, olii condiscipulus, & semper nci amicissimus.  
 7. Gr. exile duriusculi marit. foliis circumvolulis deluti junceis brevibus. Gr. pinnitum Loliaceo simile, Ray Synop. Stirp. Brit.



*[Faint, illegible text or a small table at the bottom of the page, possibly containing specimen details or a list of items.]*



- Tab. xxxiii.
1. *Gramen* spica *Brizæ* minus, C.B.P. I.B. Park.
  2. *Gr. hordeaceum* à maritimis pumulum *Gr. secalinum* palustre, & marit. Rây Hist. an *Gr. Hordeo disticho* simile C.B.P.
  3. *Gr. caninum* nigrit. spicatum C.B.P. *Gr. canmar.* spicat *Monspehens.* Park. *Gr. can. marit.* spicat. Casparo. Bauhino I B.
  4. *Gr. marit.* spica lobacea sol. pungentib; nostras. an *Gr. spartum* spicat sol. mucronatis. vel spica *Secalinâ* C.B.P. *Spartum* spicatum pungens Oceanicum I.B.
  5. *Gr. Phalaroid.* spica brevi reclinata ex utriculis prodeunte, an *Gr. Phalaroid Lusitanic.* Rây Hist.
  6. *Gramen Alopecuor;* accedens ex culmi geniculis, spicas cum petiolis longiusculis, promens. *Gr. serotinum* arvense spica loca pyramidalis, Rây Hist.
  7. *Gr. mont. hirsut.* foliis spica leucoghaea dirupta, *Gr. pumulum hirsut.* spica pur-puro-argentea molli nostras Rây Hist. His duob; novissimè manovatis - *Graminum* specie; multis annis nos ditavit ex propria collectione amicis unus vir D. Samuel Doodý. Pharmaceuticis & Rei - *Herbariæ* callentissimus.
  8. *Gr. typhinum* marit. minus Rây Hist. an *Gr. typhim.* Danicum minus Park. quarit & ipse Clariss. Râjus.
  9. *Gr. parvum præcox* spica laxa canescente Rây Cat. Pl. Angl.
  10. *Gr. paniculat. bromoid.* minus, paniculis aristat. unam partem, spectantib; Rây Hist.







- Tab. XXXIV.
1. *hr. acnaccum* parvum procumb. paniculis non aristatis Ray Hist. Pl. univers.
  2. *hr. capillaceum* locustellis hvernalis non aristatis. Ray Hist. *hr. junceum* Dalecham. pif. Hist. Angl. *hr. foliolis* purceis brevibus radice nigra & alba C. B. pin. & procl.
  3. *hr. cyperoid.* angustif. spicis parvis sessilib; in foliorum alis Ray Hist.
  4. *hr. cyp. elegans* spica composita. Ray Cat. Pl. Aug. ubi ad spicam (dicit) nullum apponitur folium, & in Hist. (spica composita usperiore) legitur. = nostri tamen spica mollis est, & foliolum ei subjectionem habet
  5. *hr. cyp. polystachion flavicans* spicis brevib; prope summitatem caulis Ray Hist.
  6. *hr. cyp. polystachion lanuginosum* Ray Hist. an *hr. cyperoid.* Norvegicum parvum lanosum Park.
  7. Gramini cyperoid. ex monte Ballon simile. spica total. e plurimis spicis composita Ray Hist. an *hr. cyp. elegans* multifora spica Park.
  8. Gramen cyper. ex monte Ballon simile humilis. in maritimis & arenosis nascens. Ray Hist.
  9. *hr. cyperoides* spica simplici compressa disticha D. Plukenet. Ray Synop. Stirp. Brit. & Hist.
  10. *hr. cyp. minimum* seminib; deorsum reflexis, pulvisformibus. Ray Hist.
  11. Gramini Luzula arceclens glabrum in palustribus proveniens paniculatum. an *hr. cyp. palustre leucanthemum* Ray Hist.





TAB. XXXV.

1. *Gr. junceum clavatum minus*, s. *Holosteum palustre repens*, folijs, capitulis, & seminib; Pajllij Râj; Synops. Stirp. Brit. & Hist. à Reverendo viro D. Mathæo Dodsworth, Evangelij prædicatore diligentissimo, & Botanicoorum numero nequaquam postremo, nobis primum ostenditur.
2. *Gram. junceum*, s. *Holosteum minus palustre* capitulis quatuor longissim. staminib; donatis Râj; Syn. Stirp. Br. & Hist.
3. *Guaiacum Jamaicense* *Lentisci* subrotundis folijs lætè viridib; flore albo. Guaiacū Officinar. Parad. Bat. Prod. Guaiac. folijs *Lentisci* C BP. Guaiaci ramulus Clus. ad Monardem. Guaiac. Terentij apud Hernãnde z.
4. *Guaiacū Jamaic.* folijs belati muria conditis, spissius viridib; flore subceruleo. an Guaiacum folijs *Ceratonicæ*, *Aceris*, s. *Burse pastoris* fructu, flore ceruleo Breyer. Prodr. 2.
5. *Gratiolæ affinis* *Coromandèl* folijs superiorib; *Rubice* quadrifolice crenatis, imis. *Coriandri* modo tenuissimè divisis.





Tab. xxxvi.  
 1. *Halimulus humilis* erecta semine folliculis membranaceis bivalvib; in latitudinem porrectis, & utrinque recurvis, longo pedunculo insidentib; clauso Hal. angustif. semin.  
 ib; singularib; basculis Bursa pastorice caulis bicornib; inclusis Ray Hist. app. an Halim; min. Germanic; Park Halim; min. CB. p. 10. et Halim; auri.  
 = arvi ejusd. prodr. hanc etiam in murib; Belgis nuper inno invenit Spectab. vir. et Rel. Herbarice amantissimus D. Carol. du Bois cui; ramuli summitate  
 snis inflexib; exsculpta apud Joh. Bauhin. ad Portulacae marinae fruticosae conon. appingi videtur. iteinq; apud Bodlaeum a Stapf. Annot. in Theophr. pag. 509.  
 2. *Hedera monophylla* Comolouli folijs virginiana. Clematis hederacea virginicae umbilicato folio flore papposo Cat. HRP. Hedera virginiana. Clematis fade, radice flavescere.  
 Cat. HAL. si huj; flores pappi coronantur ad Clematis generis autandari debet multoties hanc plantam nos florentem vidim; at nusquam nobis Pappus occurrit.  
 3. *Heliotrop. monosperm.* Ind. procumbens, glaucophyllon florib; albis, an Totey. Xochiuh Mexic. Hernand. ? Heliotrop. Americ. minus glabrum folio.  
 angusto glauco. Br. Pr. 2.  
 4. *Hemionitis American.* speciosa folio Scuris Romanae figuram annulante. *Hemionitis parva* Antegoana folio Platani sepe in modum diviso Ray Hist. app.  
 ab honestissimo viro D. G. Horsvel ex Antego Insula in Patriam reduce nos accepimus.  
 5. *Hemionit. Ind. Orient.* Phagis. Esculi folio aliquatenus accedens. an *Hemionitis multifida* Z. aplan. Costa sagittata s. Filix folijs integris Zeylanica pediculo alato. Breyn Prod. 2.  
 6. *Hemionitis pumila* folijs integris, trifidis, et quinq; folijs paria Cambrobritannica. *Hemionit. pumila* trifolia vel quinq; folia maritima. D. Lloyd. Ray Synop. Stirp. Brit.  
 7. *Hemionitidi* affinis Americana epiphyllanthos, folio simpliciter pinnato. Hippoglossi annulo, radice reptatrice lignosa, et foliorum et enas florida.





1. *Hesperis prodigiosa hortensis* Molluginis ad imaginem degenerans.  
 2. *Hieracium* folijs & floribus *Dentis Leonis* bulbosi sanitte curvo. Moris. *Ræhud. Dens Leon.* folijs radiatis Bot. Moussy. *Dens Leon.* minor folijs radiatis.  
 C.B. prodr. & pin. cui & *Frinciarella Italorum* Camerar. Hort. Med.  
 3. *Hieracium* s. *Riloselle* majoris species folijs varijs dentatis flore singulari nostras.  
 4. *Holosteum* s. *Coronopus serpentina* folijs betonicae angustis, spica *Rubice* spicatae gracili, an *Holost.* strictissimo folio minus, C B P. *Serpentina* omnium.  
 Lob. Icon. *Holosteum* nobis hic allatum optimè convenit cum Descriptione Plantæ quam Joh. Bauhin. in Hist. pro *Coronopo serpentina* omnium minima proposuit in qua tamèn foliola cauliculis adnexa non concedit.  
 5. *Hysocyanus pusillus aureus* Americanus *Antirrhini* folijs glabris. forte *Hysocyanus* albi *Aegyptij*. Veslingii dicitur, varietas minor ex America. hujus unam aut alteram plantam à seminibus, ex America de latibus curæ & vigilantia D. Georgij Loudon. Regij nunc Hortularii, & de Rebus Botanicis optimè meriti, pronatam conspexim; in Horto cultissimo novisq;ae rarioribus undiq; conquisitis stirpibus instructissimo, Honoratissimi Domini, & Reverendi admodum in Christo Patris Henrici Compton. Episcopi Londinensis, omnium Botanophilorum Meccenatis colandissimi.







Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 4.

Tab. XXXVIII.  
 1. *Jacea latifolia*. caule alato capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo & squamularum cuspidibus; orto. *Jacea latifolia spinosa*. capitulis pulchris flore purpureo. I.B. an *Jac. Cyanoid*, altera alato caule. *Cyanus creticus spinosus*. Belgarum, C&T. HRP. *Jacea folijs Seridis caudicantibus*; purpur. CBP. *Jacea purpurea valentina muricato capite* Clus. cui & ille attribuit folia *Seridis caudicantia*.  
 2. *Jacea montana*. alato caule purpurea & singulis capitulor. squamis spinosis. plurimis in Hemicyclum dispositis. *Jacea mont. purp. echinato capite* Park. *Jacea Cyanoid. echinato capite* CBP. *Jac. mont. capit. Clus.* forte etiam *Jacea capitulis hirsut.* Boelji Ger. emac. sub hoc enim titulo multis ab hinc annis et à D. Edvard. Morgân. viro in Rebus Botanicis haud insigne notre accepimus.  
 3. *Jacea spinosa* Sonchi angusto folio, maritima, minor, ad squamas capituli, spinulis plurimis.  
 4. *Jac. incana* *Cyani majoris* foliis in aequum desinente, squammis cum ciliis; nigris. an *Jac. nigr. angustif.* vel *Lithospermi arvens.* fol. CBP. quae. in prod. iton *Jac. nigra angustif.* alt. fol. longioribus; lamiginosis. ejusd. prodr. forte etiam *Jac. min. fol. aculeatis*, *Cyani majoris* nomine missa ejusd. Pin.  
 5. *Jac. Tingitana* Centaurid. echinato capite villosa, ex inaequali squama plurimis aculeis circulariter radiatis. Huic proxime accedit & mi fallor eadem est *Jac. capite longis aculeis spinoso* CBP. Quam iste vir magnus & in arte Botanica & *Ἰοισπέρα* S&C, à *Jac. mont. echinato capite* Clus. diversam esse, recte pronuntiabat. Centaurij marini nomine ad Casparu. Bauhinum D. Volatius misit.




TAB. XXXIX.




- Tab. xxx. ix.  
 1. *Jac. laciniato* Souchi fol. s. *latifolia* purp. capitulo spinos. C.B.P. ex capitulor. squamis spinulæ plures pulchro ordine stellam divindiatam referentes. atq. deorsum tendentes excurrunt, quarum media cæteris latior & longior evadit.  
 2. *Jac. min.* Stoebe Gallicæ & Austriacæ accedens, squamis capitulor. crebrioribus, quarum singulæ unico saltem aculeo sunt armatæ.  
 3. *Jac. min.* exotica ad foliorum margines spinulis donata.  
 4. *Jac. min.* Attica capitulis plurimis ex apicibus squamularum spinâ rectâ singulari, à cloctissimi pariter ac humanis. necnon Reverendi admodum viri D. Georgij Wheeler. Eq. aur. liberalitâ accepim.  
 5. *Jacobæa lanosa* folijs brevibus subrotundis Pilosellæ flore unguis flavo. an *Jacobæa lanata* folijs brevibus subrotund D. Bau. Cat. Stirp. Viçg.  
 6. *Jacob. pumila* Absinthij Umbelliferi folijs incanis, florib; velut in Umbellam positâ, an *Chrysanthemum Alpin.* i<sup>m</sup> Chus.  
 7. *Jacob. pumila* sinuatis folijs argentea, summo caule flore singulari. Ingenioso viro & Chirurgo Londinensi D. Paræo hujus communicationem debet.  
 8. *Iberis Americana* latiorib; serratis folijs, ad caulem verticillatis.





Tab. XL.  
 1. Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido, mucrone pungente, an Juncus acutus maritimus caule triangulo. CBP. 11. & Prodr. 22.  
 2. Juncus, acutus maritimus, caule triquetro maximo molli, & procerior nostras.  
 3. Juncus, acutus maritimus, caule triquetro molli, spicâ glomerata in Stylo sessili.  
 4. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis CBP. 11. Juncus acutus maritimus, alter Park.  
 5. Juncus minor acutus maritimus prolifer, s. ex uno capitulo multa.  
 6. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti, Ray Hist. Juncus mont. parvus cum parvis capitulis luteis IB. Gramen sparteum capitulis Equiseti, Merett. Pin. Rer. Nat. Brit.  
 7. Juncelli omnium minimi capitulis Equiset Ray Hist. primus ejus Inventor fuit amicissimus vir Reiq. Herbarie amantissimus S. Math. Godsworth, qui et jam olim hujus exemplar, optime exsiccatum, nobis benigne communicavit.  
 8. Juncus parvus calamo supra paniculam compactam longius producta Ray Hist. in Westmorlandiâ invenit ille Stirp. Britannicar. explorator, indefessus, D. Jacob; Newton, cujus munere accipiebam.  
 9. Juniperus Caroliniana Thuja ramulis fisis, & compressis, odoratior, an Cedrus folio Cupressi major, fructu flavescente CBP. Thuja genus 4<sup>ta</sup> Hist. Lugd. 61.





Tab. XLI.  
 1. *Lamium album* Parietaria folio virginianum. *Lamium Parietariae* facie Moris. Præclud. Bot. 278. *Lamiū Parietariae* folijs Ic. Roberti. sed hujus Icon minus placet. an *Lamium album* non satens folio oblongo minus cat. HRP. 99. *Lamium Parietariae* folio Bruynero Lonquet Hort. 69.  
 2. *Lamium pusillum* rubrum Parietariae facie Americanum. an *Lamium Novæ Angliæ Parietariae* folijs Ray Hist. 560.  
 3. *Lam. rubr.* minus folijs profunde incisjs Ray Hist. 560.  
 4. *Lam. Cannabinum* aculeatum flore specioso luteo, labijs purpureis. *Cannab. spuria* flor. specioso luteo, labro purpureo Ray Hist. 561. an *Cannabis altera spuria* Park. pag. 599. an *Urtica aculeata* folijs serratis altera CBP. 232. quaerit et ipse cl. Rayus.  
 5. *Lappula Bengalens.* tetraspermis Ribesij folio echinis orbicularib; ad folior exortus plurimis simul Sessilibus. an *Alcea Indiae Orientalis* fructu lappato folio Ribes Breyn. Pr. Nexpayan Mexicensium Hernand huc pertinere videtur.  
 6. *Centinula palustris* India foliis subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis.







- Tab. XLII.
1. *Lycium* s. *Synaria* basculo sublongo intorto. Ray Hist. 789.
  2. *Lichen* parvus erectus foliis profunde laciniatis. an. *Lichen* minimus; foliis laciniatis. Ray Hist. 726. in Umbrosis humidis ad parvulum fluentem juxta Fontes medicatos apud Dolyicum, quatuor circiter milliaria à Londino. diffusus, in agro Sueriensi, copiosissimum invenimus.
  3. *Lilio-narcissus*, s. *Narcissus liliiflorus Carolinianus* flore albo, singulari, cum rubedine diluta, ab honestis. Viri & Hortulano admodum industrio, D. Gulielm. Darby, recepit ad quem hujus radices plurimae ab amico suo à Carolina allatae sunt, & in dividiario suo jam nunc superbiunt apud, Hogsedem, vicum Loudini, ad aquilonem suburbanum. lit. a. capsulam triquetram seminibus; oppletam significat.
  4. *Limonium reticulatum supinum* Boecon. de Pl. Sicul. pag. 82.
  5. *Limonium minimum* comatum elegans. an. *Limon* minus densa caulis femisulcati deluti coma Læli. Trimanet. Catal. apud Fratrem. p. 65. forte etiam *Limon*. Ferula folio. Boely. Park. 1235.
  6. *Liquidambar arbor* s. *Styracifera Aceris* folio fructu tribuloide (si e) pericarpio orbiculari ex quatuordecim apicibus coagmentato semine recondens. Ocosol. Indorum Monard. apud Clus. 302. Xochicotzo. Quahuil Mexicæ. Hernand. *Styrax Aceris* folio Hon. Belli. CB. prodr. *Styrax arbor virginiana Aceris* fol. Ray Hist. nec *Acer* nec *Platanus* proprie dici potest; est enim quaedam *Heterodactyla* s. sui generis *Arbor*. lit. a. fructum muricatum; cujus et transversam secti. onem. b. indicat ccc. semina.
  7. *Lithospermum angustifol. umbellatum* CBP. 258 & in append. 521. Park. Paul. Boecon. de Pl. Sicul. pag. 77.
  8. *Lichnis Alpina* mucosus folijs densius stipatis, floribus parvis. Calyce duriore. ab *Ocymoides* mucoso Park. plurimum differt.



TAB. XLIII.



Tab XLIII.  
 1. Lotus argentea Cretica.  $\rho\sigma\kappa\upsilon\chi\epsilon\rho\alpha\lambda\omicron\varsigma$  fruticosa Cretica argentea, siliquis longis, propendentibus, rectis Moris. Hist. 2. (nostrae tamen siliqua pendula non sunt sed aursura rigescunt.) an Lotus incanus major s. Trifol. corniculatum siliqua grandi, incanum maritimum. Ray Hist.  
 2. Lotus fruticosior Africana, folijs incanis, floribus binis, amphis, Cocineis. a. D. Iohanne Fishwick accepimus.  
 3. Lotus tetralobos minor Creticus. s. Lotus parva, Cretica, procumbens, incana, quaternis siliquis cruciatim dispositis. Candie Lepocruce.  
 4. Lychnis Caryophyllaeus virginicus; gentiana folijs glabris, quatuor ex singulis gemulis caulem amplectantibus flore amplo subtriato. noster. Ray Hist. app. 1895. hic forte pertinet Eloquillie Mexicanae s. Herba gemiculatae Hernand. 210.  
 5. Lysimachiae Ephemerone dicta, genus Maderaspasense, Linnohij folijs subrotundis, caule crasso fungoso. lit. a. flore expansu ostendit.  
 6. Lysimachiae spicatae purpureae affinis Thymifolia, flosculis in caudine plurimis, quasi in nodis junctis. Anthyllis forte Prosp. Alpin. ex ot. hujus specimen Reverend. vir D. Geo. Wheeler. e Syria (qua invenit) rediens nobis munere donavit.  
 7. Pithymalus botryoid. Maderaspasens Hyperici folijs non venatis, floribus ex alis uno versu provenientibus. inter Lysimachias in Tabulis nostris per errorem transpositus.





- Tab. XLIV.
1. *Lysimachia non papposa* Meliophylla Maderaspatae. forte Melochiae genus siliqua quinq. capsulari.
  2. *Malva Tingitana*. flore caeruleo parva.
  3. *Malva rotundifolia*, glabra ex Hispania flore amplo rubello.
  4. *Malva Gallo-provincialis* laciniata s. *Alcea tenuifolia*. *Pulsatilla* folijs. flor. ampl. rubente, *Alcea tenuifolia* humil. maritimi. Gallo-provincialis fol. inferiorib; nonnulli ad *Geranium* accedentib; Sch. Bot.
  5. *Malva Oriental.* elatior longiori fol. fl. alb. minimo, capsulis conglomeratis. an *Malva frutesc.* *Melochia* angusto fol. florib; alb. fasciculatim congestis. Par. Bat. Prodr. inter addenda.
  6. *Mandarin Maderaspatae* folijs firmiorib; parvis bisulis, glabritie splendentib; ad Surculum densius stipatis.
  7. *Muscus polytrichoides* elatior folijs angustis pellucidis, & fere membranaceis noster Ray. Synops. Stirp. Brit.





Tab XLV.

1. Marrubium aquaticum s. aquatile. folijs tenuius dissectis Moris. Præclud. fortè Marrub. pedastro hirsut. tenuius laciniatum CD Pær. in P. odr. nostri tamen folia sunt omnino glabra.
2. Marrub. an potius Cardiacum foliorum apicibus; in prælongam barbulam extenuatis, verticillis florum petiolis in nitentibus. an Marrub. ex Aleppo verticillis longis pediculis insidentibus. Cat. Hort. Edinburg.
3. Matricariae Achaëna dicta similis, Erysimi folijs, Absinthij sapore Jamaïcensis.
4. Melilotus lutea Indiæ Orientalis erecta. folliculis rotundis, parvis, spicis florum ex foliorum alis multiplicatis.
5. Melilot. Indiæ humil. erecta floribus; æquis odorat. albis. pericarpis majoribus; spiculis densius stipatis. Sumadadi-pullu Hort. Malab. P. 9.
6. Mentha hirsutior Βεραχιδάτυον quidam ex oliua. à D. Doody. acceptimus.
7. Muscus polytrichoides humilior folijs lato subrotundis. Adiantum aurum humilior fol. lato subrot. Ray Hist. an Musc. Trichomanis facie Sangermanni folijs utrinque rotund. splendentibus. Cat. Aldrov.
8. Melilot. lutea minima prostrata folijs minoribus. crenatis. an Melilot. Mesopotamias. prostrata. folliculis rugosis sublong. spicis florum brevioribus; Ray Hist. Cat. Exorac.







TAB. XLVI.  
 1. *Mespilus aculeata* Aprifolia denticulata splendens fructu insigni rubro Virginiana, an *Mespil*, Virginia colore rubro CBP. hujus folia aliquando variant, et senescente multum laciniata evadunt, ut in Horto Nobiliss. viri D. Caroli Howard. prope oppidum Darkin in agro Sumensi observavimus. hujus folium ad lit. a. in Tab. exprimitur.  
 2. *Mespilus Prunifolia* Virginiana, non spinosa fructu nigricante. *Rhamnus virginiana* Prunifolia fructu nigro, osiculo compresso Banist. Cat. Stirp. Virgin. an *Mespilus*, s. *Sorbus torminalis* Virginiana folio latiori fructu nigro Sch. Botan. forte etiam *Mespilus spinosa*, s. *Oxyacantha virginiana* nigra Cat. HAL. si saltem aliquando invenitur spinosa, et ubi magis domestica spinosa caret, ut accidit in Anthedone Azarolo Casalp. Theophrasto. monente, nostram autem unquam spinosam esse, me haud persuadere possum, b. ramulum fructu onustum significat.  
 3. *Mespilus Virginiana*. Apij folio bulgari similis major grandioribus spinis.  
 4. *Mespil*, Apij folio Virginiana spinis horrida, fructu amplo cocanteo. *Mespilus Apij* folio Indica Sch. Bot. *Mespil*, spinos. s. *Oxyacantha maxima* Virginiana Cat. HAL. *Oxyacantha* osiculis binis fructu magno inclusis Banist. Cat. Stirp. Virg. *Oxyacantha* Americ. Galli calcar dicta. R.S. Flus. Razy Hist. hujus Arbor Spina Glasenburimisis, Spina Christi, et Spina Sancta per errorem dici solita est. lit. a. Surculum cum aculeo armatum b. b. osicula demonstrant.



TAB. XLVII.



- Tab. XLVII.
1. Millefolium Tanacetii folijs flore albo Moris. Prædud. an Corymbifera Millefolij Umbellâ, folio alato & laciniata Ray Hist.
  2. Muscus clavatus Ceranoides, segmentis loboribus. Compressis, eburneo nitens, nosler Ray, Syn. Stip. Brit. app.
  3. Musc. clavatus Ceranoides sagittatus iniqueline splendens, nosler Ray, Syn. St. Brit. append.
  4. Musc. montanus, gracilis ramosus, bibrachis longioribus glabris. an Muscus ramosus erectus minor CB. pin. & prod.
  5. Musc. Alpinus, ramosior, erectus, flagellis brevioribus lanuginosus. an Muscus terrestris ramosus erectus major CB. pin. & prode. Muscus montanus Tab. Icon. forte etiam Muscus lursutus capillaceus Merell. Binc.
  6. Muscus parvus stellaris CBP. Park. Adianthi capitulis. Muscus in ericetis proveniens IB. Hist. Lob. Icon. sed figura non placet.
  7. Muscus terrestris erectus minor, polyspermos Ray Hist. & Synopsis. Method. Stirp. Brit.
  8. Musc. terrestris repens pediculis foliiculis binis clavatis in altum se erigentibus. Muscus alius terrestris, Lycopodium Dodonæi Hist. Lugd. qui à Musco terrestri 2. quod. Histor. (se) terrestri repente à frago picto IB. plurimum differt in Synce suo Cusp. Barbat. ab illo non separat, sed planè utrumq. confundit.
  9. Muscus Lacyoniæ, erectus, perpetuo brens, in arboris proceritate crescens. an Quamiamath. s. Spica arboris Hernand. Hist. Mexic.
  10. Muscus Coralloides, multifido, capillaceo folio, Palmite pelagica nigra. Musc. capillac. multifid. nigra. CBP. addit. a. Palmite pelagica alba depingitur. Muscus capillac. multifido folio albedo. CBP. Corallina affinis s. Muscus marinus tenui capillo. IB. Muscus marinus vulgarissimè, Lob. Icon. p. 2.
  11. Muscus marinus denticulatus, procumbens, caule tenuissima, denticulis biquis Ray. Hist.
  12. Musc. pennatus, ramulis & capillamentis falcatis Ray Hist.
  13. Muscus marinus Neapolitanus Park. Coralloides lenta faniculæa IB. Fucus faniculatus colore livido nobis Ray Synop. app.





Tab. XLVIII.  
 1. Muscus aureus, capillaris, puberulis interfoliola folliculis rotandis (ex sententia D. Hooftij) quadrupartitis. Graminisfolia palustris repens, basculis granorum  
 Riperis serratis. Ray. Hist. et Synops.  
 2. Muscus pedagus, pennalis, rubens ramulis minoribus mollioribus; latus se spargentibus, an Muscus marinus; rubrus, pennalis nostras. Ray. Hist. item  
 Muscus marinus, purpur, parvus folijs oblongis, millefolij sepe divisura. ejusd. Hist.  
 3. Muscus marinus, denticulatus minor ramulis in creberrima capillamenta sparsis, an Muscus marinus denticulatus; minor, denticulis alternis Ray. Hist.  
 4. Muscus marinus geniculatus, eburneo nitore candicans, erectus, cauliculis permagis. Muscus marinus candidus coralloides Hist. Lugd. Bot. Icon. p. 2.  
 Corallina altera Tabern. Icon. sed figuræ mirus placet. Muscus coralloid, squammulis lorricatus. CBP.  
 5. Muscus marinus major, argute denticulatus Ray. Hist. Muscus coralloides alter albus, Icon. part. 2. Abies marina Belgica Clas Hist. Abietis similis maritima CBP.  
 6. Muscus marinus, coralloid, non ramosus, cretus, oraciatu coloris, Astacorua corniculi adinstar, geniculatus, Muscus marinus Equisetiformis non ramosus Ray. Hist.  
 7. Myrsotis Sceprioides, an pottius Heliotropium minus erectum, folijs subtilis incanis, è Mader aspalan.  
 8. Myrt; Brabantica acedatis Africana, baccis carens, Conifera. Arbor Conifera odorata folijs Salinis rigidis, leviter serratis Ray. Hist. an Laur, serrata  
 odora Promont. Bon. Spæ. Bod. à Stapel. in Theophr. p. 333. ex America quoq. nobis allata est, v. à Nostratibus, Insulam Bermudensium  
 videntibus, Laurus odorata, vulgè nominatur, ut ab honestis. dicit Jacobo Harlow. v. dicitur.  
 9. Myrt; Brabantica similis, Carolinensis, baccifera fructu racemoso, sessili, monopyrne, fructum fert beluli Sachara candidiss. iterustatum,  
 cujus ramulus cum fructu, ut per Microscopium apparuit, adpingitur. Flujus pulchri Sanz perari, & prorsus novi Arbustuli Americani  
 generis, munifirma Filustris viri, D. Gubelini Courtæne, compos factus sum.





Tab. XLIX.  
 1. *Miscus polytrichoides* angustifolius pubescens ramosus noster Rāj. Synops. Stirp. Brit.  
 2. *Njora* Hort. Malab. similis ē *M. Madagascariān.* Arbor ex ot. *Ceratix* fol. *Corymbosa.*  
 3. *Nir-Schulli* Hort. Malab. succans ē *Cormandel.* *Gratiola* affinis *Indiæ Orientalis, Digitalis armula.* ubi tres exhibentur species, seminum figurâ  
*discrepantes, ut literæ a. b. c. c. denotant.*  
 4. *Oenanthe aquatica, Pimpinella Saxifragæ* divisiurâ, nostras. *Oenanthe Staphylini* folio aliquatenus accedens IB. *Oenanthe Pastinacæ* Sylvestr.  
 folio semine *Atriplicis* CBP.  
 5. *Onobrychis Bisnagarica, Mimosa* folijs. siliquis ad unum solummodo latus distatis, et alis polyceratis.







Tab. L.  
 1. *Onobrychis minor*, flore parvo, purpureo, siliqua echinata, majoribus caulis. Ray Hist. *Onobrych. minor*, siliculis echinatis, cristatis, majorib; & crassiorib; aculis praeditis donata Moris. Hist. 2. an *Onobrych. fructu echinato minor*. CBP. item *Caput Gallinaceum minus* ejusd. pia. & prodr. *Onobrychis. s. Caput gallinaceum*, minus, fructu maximo, insigniter echinato, Loli; Trinacelli. Cat. apud fratrem.  
 2. *Onobrychis minor* foliis cordatis, siliquis magnis, asperis, compressis, veluti isthmo interceptis, floribus in globum congestis. an *Onobrychis folijs bicia*, fructu echinato major caulescens, & ramosa Schol. Botan. an *Onobrychis semine Clypato aspero minor* CB. Ant. & Prodr.  
 3. *Onobrychis Gongetica* monophyllos, siliculis singularibus, levibus, falcatis, per internodia discriminatis.  
 4. *Fai-paroca*, s. *Courachi* Hort. Malab. similis, sinon eadem. Frutex baccifer Malabaric; fructu plano rotundo piloso tetrapyrreno. Ray Hist.  
 5. *Perfoliata alpina angustifolia minor* CBP. quae 4.<sup>a</sup> in Prodrromo. Park. Thedr.  
 6. *Perfoliata minor angustifolia*, *Bupleuri folio* CBP. *Perfoliatum angustifolium montanum* Col. ecphr. 247. *Perfoliata angustifolia Alpina minima* Park. *Auricula leporis* affinis, *Odontitis lutea* Valerandi. & *Dalechampy*. IB. Hist. tom. 3. lib. 27. p. 201.






- Tab. LI.  
 1. Palma Jamaicens. non spinosa humilis, folio multisciso, flabelli formi, Atapanæ. Malabar. haud absimili.  
 2. Phaseolus maritimus purgans, radice bivaci, folijs crassis, subrotundis, Binagari; an Phaseolus Brasiliensis Florileg. Renovat. dit. p. Malib. Merianum. Kotu-  
 asjondi. H. Malab. p. 8.  
 3. Phaseolus Orientalis Anagyridis folio, siliquâ falcatâ glabrâ.  
 4. Phaseolus minimus Madraspatanz, florib; minutis Meliloti adinstâr spicatis, hinc forte pertinet Ystallalamat Mexiens. Herodot. Hist. 452.  
 5. Paronychia myosotis virginiana, folijs subrotundis, Nasturtium myosotis insipidum. Bonaï. (ca. Stirp. Virgin. à D. Bobet. amissimè communicata) m  
 fuit hujus optimè observatum exemplar.





1. *Ornithopodium majus* i Maderaspatali. folijs lanugine argentatis.  
 2. *Phaseolus purvus spicatus* Maderaspatalens. cordatis, & incanis folijs, siliqua utriculata nigra.  
 3. *Phaseolus minor* Viniagaricus folijs argenteo colore bilobis, siliquis torosis brevibus, spadicæa hirsutie pubescent. fructu parvo Scaraboide nigro. in Phaseoly Zeylan. *Salvia* folijs subrotund. mollib; & hirsutis Parad. Bat. Prodr. in Orob; *Phaseolus* de Zeylan. folijs *Salvia* rotundis inanis subtilis equal. P.B.P.  
 4. *Phaseolus Nevisensis*. folijs multangulis, tuberosa radice exulenta, *Phaseolus* perennis Martiniensis radice tuberosa exulenta, anguloso ornato folio P.B.P. nostratib; the Turnepitree vocatur.  
 5. *Phaseolus caudatus* Frutex *Saphnapalmis* spinosus, fructu Ovato, nigris & cinereis punctis, elegantè guttato. P.B.P.  
 6. *Pilosella minima*, Gnaphalij montani lanosis folijs, flore aureo, nondum descripto.  
 7. *Polygonum minus procumbens*, niveum, fascie glaucis exigue, *Polygonum minus* indicans supinum Botra. Monspel. *Polygala repens* nigra C.B.P. *Polygala repens* Nuperorum Obs. & Ic. Lob.



TAB. LIII.



Tab. LIII.  
 1. *Padi Malabarica* similis, Arbor ex Maderaspata. (h. e.) *Clematis arborea Indica* Juglandis folio, flore luteo, spicato, minimo siliquis longis, angustis, quadratis, atq. contortis, seminibus substantia lignosa obductis Breyer. Prodr. 2.  
 2. *Polygala affinis Africana*, glabra, floris calice binis cristis fimbriatis, ornata, ex involucrio magno dipetalo erumpente.  
 3. *Polygonum maritimum* longius radicatum nostras, *Serpilli* folio circinato, crasso, nitente, Synops. Stirp. Brit. app. forte *Polygon. minus* var. *foliosum* L. B. P. ex prodr. *Polygon. minus* Monspelienis. Park. huic proxime conveniret *Polygon. Herniariae* folijs, & saepe, per amplam radicem *Astragalus* A. dv. Lob. si haec herbula non esset tota incana, nostra autem glabritie splendet.  
 4. *Polygonum lignosum* a maritimis Africanum, raris coloris foliorum dice squamulis pellucidis ornatum. *Limonium* lignosum Gallas ferens Bocconi, huic pertinet, & forte idem est a D. Fishwick, nobis transmissum.  
 5. *Plarmia virginiana* *Scabiosa Austriaca* folijs indivisis. *Plarmia virginiana* folio Helenij Moris. Prodr. l. Pseudo costus virginiana, seu *Anonny-mos* *Corymbifera* virginiana flore albo Ray Hist. hujus specimen jam ante triginta annos in Horto D. Walker. apud Westmonasterium legitur, cujus filius hanc plantam cum alijs rariorib; ex virginia transmisit.








Tab. LIV

1. *Pentstemon Malabaricus* similis *Arbutus Maderaspensis* (i.e.) *Baccharis Indica* bacis oblongis in Umbella formam dispositis Ray Hist.
2. *Pulegium virginianum* angustifolium (Serpentaria dictum) flosculis in Cymis, an potius *Clinopodium Pulegi* angusto rigidoq. folio virginian. flosculis in Cymis. *Pulegium virginianum* Nonnullis, alijs *Serpentaria* aut *Celubrina virginiana* Ray Hist. *Satureia* floribus in summitate dispositis Cal. H. A. L. *Pulegium* Cervino quodammodo accedens, capitata *Chamaepitys Austriaca* caeruleae folijs; v. fauce Breyn. Prodr. 2.
3. *Quercus virginiana* castanea folijs, nostris Ray Hist. append.
4. *Quercus Esculet* divisa a folijs amplioribus aculeatis, an *Quercus alba virginiana* Park.
5. *Quercus virginiana* rubris venis nuncupata *Stee Scortii Oak* e. nostratib; dicta. in Horto. Comptoniensi. hujus plurimas, adollescentes Arbores observavimus.





Tab. LV.  
 1. Ranunculus hirsutus annuus flore minimo Ray Hist. v. Synopsis Method. Stirp. Brit.  
 2. Ranunc. aquatic; albus circumatis tenuissimè divisis folijs florib; ex alis. longis pediculis innixis Nobis Ray, Synopsis. Millefolium aquaticum cornutum  
 quoad figuram I B L. 3. item quoad figuram, ut & descriptionem C B. Prod. Millefolium aquaticum cornutum majus Park.  
 3. Ranunculus galatius folijs glabro folio Bismagarijus floribus aurantijs.  
 4. Reseda Mastiliensis folijs latè-itis crispis. Reseda irispè Gallica Roccou. 77. Reseda latifolia flore flavo Moris Præ lud. Botan.  
 5. Reseda minor India Orient. Pharmicoe prateris folio, crenis & asperata, s. Sesamoidea parvum Bengaleuse serratum.  
 6. Rhamnus Syri Myrsiniles sive Gargathius, folijs densis, ferè convolutis Jasmimi floribus, & spinis gemellis.  
 7. Rhamnus Oristulic spinis unanatis, albo-purpureis. Olea. s. Ligustri folio, cujus ad imum, petiolus umbilico inarticulatur, Rhamn; Oriental. Ligustri folio  
 spinis albo-purpureis nota Ray Hist. an Mahaleb genuinum Arabum?





Tab. Lvi.  
 1. Rhoi Obscuriorum similis Americana, summi candidum fundens non serrata, foliorum rachi medio alata. Rhus virginianum Lenthii folijs Rayi Hist. Baist. Cat. Sicp. Virg. Mfs. hæc est Copallifera Arbor, Errandi ansam nonnullis scriptoribus; hæc forte præbuit Arbor, quæm Lenticum nostrum Europæam Virginie plagis indigenam esse contendere velint Vid. Hoed. Geograph.  
 2. Riinus Indicus pilosus, trifidus, vel quinquifidus, flosculis atro purpureis, in Umbellâ aggregatis. Huapochotl. Huacacensis, si Riinus Novæ Hispaniæ Hernandez, Hist. Mexic. an Riinus Americanus folio Staphisagræ, CB. Pin. app.  
 3. Euphrasia Alsina angustiori folio, Rubiæ modo Spicata, Golconda, herbulam hæc exoticam sub Euphrasiarum vexillo militari, ab eximio Botanico D. Doody didicimus, ideoq. male hoc loco collocatur. ad Euphrasias ableganda sit.  
 4. Saamouna Pisonis. s. Siliquesera Brasiliensis arbor, digitatis folijs, serratis, floribus lævibus purpureis. Arbor pentaphylla virginiana floribus spicatis monopetalis Mus. Courtaian. Rayi Hist. hujus exemplar, cum multis alijs ex oltis, ab insigni viro D. Gulielmo Courtaene, dono accepimus.  
 5. Salix longiori folio hirsuta, rosea, nostras.





Tab. LVII.  
 f. 1. *Salvia perangustis sinuatis folijs, longis pediculis insidentibus, lanuginosa. an Salvia angustifolia serrata C.B.P. Salvia cretica angustifolia aurita Park. (sic) Salvia tenuifolia B. Hist. 1. 3.*  
 2. *Salvia cretica pomifera Clus. Hist. Salvia bacifera C.B.P. Salvia gallifera cretica I.B. Hist. 1. 3. Salvia major cretica latifolia & angustifolia, aurita & non aurita, pomifera & non pomifera Park. Theatr. huic folia sunt viridiora.*  
 3. *Salvia auriculata mucronatis folijs crassis, lanuginosa, appendicibus aucta.*  
 4. *Salvia trifoliata minor Indica.*  
 5. *Salvia cretica folio & Promontorio. Bon. Spei. forte Salvia Syriaca Cisti formis. folijs acutibus Malucca Breyn. hujus etiam Leonard; Radwolfius. nunciat in suo Hodæporio.*  
 6. *Salvia fruticosa Cisti folio haud in vano florib; purpureis. Verbasum verum flore rubro arborescens Cal. Hort. Groningens. Verbas. sylv. Salsifolium xolium folio rotundiore Ledeb. I.B. Hist. 1. 3. Verbasum subrotundo Salvia folio C.B.P. Verbas. Salsifol. ex oleum listoidis Park. et sub Verbaso listoides nomine ex Horto Cl. Coniarenti. habuit Caspar; Bauhinus. hujus flores L. obelio. videmus quædam contigit. et Cisti amulos appingit Parkinsonus. iteris pentapetalos esse, petalis subrot. colore flavo, staminulis rubentib; describit, sed hæc omnia pter signentum, nec minus erroneè à Cl. Herodianò in Cal. H. Ac. Lugd. append. elegans hinc & minus cognita species, Verbasii latis Salvia folijs C.B. Synonymo proponitur. Antè triginta circiter annos in Horto D. Morgani luxuriantem observavimus.*  
 7. *Saviula atroides tridactylites Alpina minor flore albo majore. Sedo Alpino tertio similis, altera Fab. Col. ephr. p. 1. Sedum Alpinum trifido folio C.B.P. Sedum Alpin. laciniatis Ajuge folijs. Park. Sedo affinis. trisulca Alpina. flore albo I.B. Hist. 1. 3.*








Tab. LVIII.  
 1. Sambucus humilis, s. Ebulus laciniata folio C.B.P. Ebulus laciniata Ponde Ital. a. flores b. fructum indicat.  
 2. Sanicula myosotis alpina, floribus albicanibus, serè Umbellatis. Saniculae Alpinae aliquatenus officinis I.B. 1. 3. Cotyledon hirsuta Phyl. Brit.  
 Ray: Hist. et Synops. an Saniculae montanae alterius species? Clus. Hist.  
 3. Sanicula s. Cortusa Americana, spicata, floribus squallide purpureis.  
 4. Scabiosa peregrina Thapsice majoris folio, squammatie capitulis, flore flavescente.  
 5. Scabiosa Bisnagaria, s. Globularia frutescens, rigidis folijs, ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autem mucrone praeditis.  
 6. Scabiosa Jamaicensis hyssopi folia s. Globularia capitulis adgenicula, folijs plurimis, stellatim ambientibus, verticillata. fortè, Tricatz on.  
 Teomall, s. Caput formicae Hernandez. Hist. Mexic.





*Ixon*  
*grandiflora* Fig. 2.  
*flora* Bot  
*Argentea*

*Hort. Linn.*

Fig. 3.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

a

b

Tab. LIX.  
 1. *Scaevola virginiana* alba folio oblongo mucronato. *Saxifraga alba* folio oblongo acuminato D. Bänist. Cat. Ills.  
 2. *Schelli* Hort. Malab. & Maderaspatan. *Josminum Indicum* Lauri folio inodorum. Umbellatum floribus coccineis P.B.P. *Josmin. arboreum*. Ind. flore tetrapetalo. Umbellato, phæniceo, folijs Laurinis. Breyn. Prod. 2. *Ratambala* Zeylanisum.  
 3. *Scorpioides* Bisnagarica folio singulari rigido. siliquis articulatis erectis. *Onobrychis* Zeylanica folio singulari oblongo rotunda D. Herarduo. D. Sherard.  
 4. *Scorzonera* bulbosa *Bistoria* minima folijs birginitana.  
 5. *Sirophularia* *Scorodonia* folijs Moris. Hist. 2. & Prælucl. Bot. Rāj. Hist. & Synops. læscæ. nostræ Angliæ. adjacentis Insulæ indigam esse à D. Sherard. nuperime Observata.  
 6. *Securidaca* Maderaspatis. siliquis falcatis, fubris, & villosis, plurimis circa ramulos stellatim positiss. Stella Orientalis fulgens. a. siliquam seorsum, b. semina denotant.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and blurriness of the scan. It appears to be organized into several lines or paragraphs within a rectangular frame.




Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Tab. LX.  
 1. Sena exigua Madraspatana s. Tetraphylla siliquisera glabra, florum pediculis intra foliorum exortum dispositis. an Absus Verlingy. Obs. in Alpin. Sena Oriental. Tetraphylla Absus dicta Cat. Hort. Ac. Lugd. Semen atro colore splendidum, parvis includit siliquis Cicerum similibus, ut ex Icone bidesis. a. semina r homit oide figurâ ostendit.  
 2. Sena tetraphylla. s. Absi congener hirsuta, è Mader aspatina flore flavo, siliquis punctatis scabris, folliculos sub terram condens. b. folliculum c. nucleum e folliculo exutum d. siliquam cum seminibus Pyri proximis ostendunt. an Arachidna India utriusq. tetraphylla P.B.F. Mandubi Pison.  
 3. Senajo pusillus Mader aspatanus folijs cr enatis, cr assis, v. hirsutis. Tlanpanxihuittl Nov. Hisp. Recch. huic haud prorsus dissimilis.  
 4. Seseli pratense folijs densius pilis pubescentibus.  
 5. Sinapistrum Indicum diphyllon. radiatis siliquis ad sinus foliorum ex adverso binis ad hujus Sinapistri genus accenseri debent. Cupa-Veela v. Arvia Veela Hort. Malab. p. 9. ut nobis videtur.





Tab. LXI.

1. *Sisynrichium caeruleum* parvum gladiato caule Virginian. Gladiol; caeruleus hex apetalos caule etiam gladiato Bernst. Cat. Ms.
2. *Sisynrichium Bermudense* florib; parvis ex caeruleo & aureo mixtis. Iris Phalangoides quorundam.
3. *Sium minimum umbellatum* folijs varijs. *Sium minimum* Ray Hist. *Sium minimum ferulaceis folijs* Moris. Prædud.
4. *Solda Malabarica* similis Arbor Maderaspatao aucamentis donata.
5. *Sonchus subrotundo folio* nostras, levissimis spinulis circa foliorum oras exasperatus, an *Sonchus asper subrotundo folio* C.B. P. Patr. k. *Sonchus asper* vulgi, flore Hieracij Monspelensib; Ray Hist. Monspelij sponte nascitur, & in Anglia.







Tab. LXII.

1. Solanum incanum Chinense minus spinosum, floribus parvis, sed umbellatis a. D. Pettever. accepi.
2. Solanum Indic, spinos atq virens, & undiq, glabrum, folijs Bracte Ursinæctis suis, an Solan. pomiferum spinos Indic, fructu echinato folijs cordatis. Acanthi spinosi Breyn. Rode 3. in Horto quodam Hollandicæ. celebriori collegit D. London, & nobis transmissit.
3. Solan, annuum nigricans Virginianum spinosiss, latè se spargens, flore cæruleo glabrum, Planta spinosiss, Virginiana Borraginis flore Tradescantio Ray Hist. 674. & in app. 1876. item Solanum pomiferum frutesc, African spinos nigricans Borraginis flore, folijs minus profundè laciniatis, spinis multò longioribus, majorib, & crebrioribus horridum Ray Hist. 1799. an Solan. American. laciniatum spinosiss. P. B. P.
4. Sonchus ἀφυλλόκαυλῶσ angusto & oblongo folio nostras, per foliorum ambitum creberrimis spinulis asperatus.
5. Sonchus angustifolius maritimus CB. Pin. & in Prodr.





Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

- Tab. LXIII.
1. Solano àq pelius Mirabilis Peruviana affinis tinctoria Betafolia scandens Cochina-Chinon. flosculis puriceis, mucosis, spiratis, fructu intus Cochleato. Solanum scandens Malabaric. Betafolia Comaelia, Hort. Amst. Solanum peregrin. Betafolia Ray' Hist. Beta baccifera aizoides rotundi folia Zeylanica Beryu. Dr. Br. 2. Bosia Zanon. Basella Hort. Malab. P. 7. ubi sub Bryonia genere (minus apte) racemari bellet Comaelia in Not. supra loc. Birtal Teglaricisib. & Cochina-Chinonibus Brotho-Condolo nominatur. succorez florib; non ex fructibus (ut vult Annotator) ex pressus commodissime pro muciditate utilis. in Horto Comptoniano apud Fulhamenses cum floribus, & fructu collegimus.
  2. Spiraea Theophrasti similis Frutex Indicus latiori folio, spicis florum & foliorum alis, hujus vartulum noster amicus Reverend. D. Doddero vlt. in horto cujusdam ingeniosi viri D. Wilkinson. Pharma copai Eboracensis collectum & optime reficatum absq; titulo nobis Londino transmissit, & forte Eodnyum nostrum a hujusmodi folijs Caroliniensis varietas haberi possit. an Frutex Virginianus floribus & lris instar Spiraea compactis Cal. Ills. Hort. Oxon. lit. a. significat flosculos per Microscopium visos, in perianthijs declusos & nondum explicatos.
  3. Sphondylium hircutum minus folijs tenuiter laciniatis semine lato. Sphondyl. mont. min. angustifol. tenuiter laciniat. nostrum Ray. Synops. an Sphondylium Alpinum parvum CB. pin. & prodv.
  4. Staphylo dendron Ethiopie. Μουραοιοκαδλιωοδνοφιδρον. singulari hirsuto folio nitente, Staphylo d. Afric. sempervirens folijs splenden. tib; Commel. Hort. Amst. Staphylo d. Afric. folio lucido P.B.P.





Tab. LXIV.

1. *Stachys angustifolia* Lychnitis, non crenata, *Stachys Cretica* C. B. P. *Stach. s. Pseudo Stachys Cretica* Park.
2. *Stachys Lychnitis angustifolia*, crenata, *Maderaspata*na, lit. a, imum folium cum ejus pediculo oblongo significat.
3. *Syringa Laurifolia* Tamaicensis floribus ex flavo-pallidioribus, hinc forte pertinet *Totoncapalli Mexicenses*; *Syringa lutea* Hernand. *Hist. Mexic.*  
 a. *Tamarind*; Americanus siliqua fere orbiculata monosperma Mus. Covert. *Tamarind*; Occidentalis siliqua subrotunda, *Carandas* forte
4. *Bontio* Ray *Hist.*
- b. *Tamarindus Bismagaricus* siliqua productione dispersos, seminibus, veluti isthmo interceptis, et semina siliquis exuta denolant.
5. *Terebinth minoris amula* folijs angustioribus, et rotundioribus, *Arbuscula Bismagarica*.
6. *Teucrij facie Bismagarica* tetracoccos rostrata, pilis scatis, folijs profunde venosis.





Tab. LXV.  
 1. *Teucrium lucidum* parvo folio flore venuste purpureo. *Chamaedrys Alpina lucida* Cal. H. R. P. *Chamaedrys Alpina latifolia elatior splendens* Sch. Bot. *Teucrium African.* fruticans folio viridi splendido D. Magnol. Mus. Courten.  
 2. *Teucrium Allium* molli lanugine incanum, an *Teucrium Creticum* Clas. Hist. P. & K. *Teucrium Creticum incanum* C. B. P. forte etiam *Scordium lanuginosum* ejusd. C. B. P. *Scordium lanuginos Creticum* Camer. munificentid. D. Wheeler. accepimus.  
 3. *Thalictrum pratense majus* *Monspelienium* folijs rugosis Cal. H. R. P.  
 4. *Thalictrum minimum* setidis. *Caspense* Bauhino I B. Hist. P. & K.  
 5. *Thalictrum minus lucidum* *Cyanotidis* *Caronarice* folijs, an *Thalictr. folijs lucid.* *Rorismarini* instar quorundam.  
 6. *Thalictr. angustif.* folio P. & K. *Thalictr. pratense angustif. folio* C. B. P. quod prim. in *Pro dr.*  
 7. *Thapsia latifolia* *Hispanica* P. & K. *Thaps. l. Clusij.* *latifolia* flore luteo, semine lato similis *Seseli Peloponensi* *Lebelio* I B. Hist. l. 3.  
 8. *Tithymalus s. Chamaesyce altera virginiana* folijs crenatis & macula fusca elegantè notatis, noster. Ray. Hist. *Commelin.* Hort. Amst. triginta ab hinc administratum annis in Horto D. Walker. observavimus.







Tab. LXVI.  
 1. *Thapsia glutinosa* segmentis densioribus, subhirsutis, alterno situ positis, àn *Seseli Peloponense* folia *Ciuta* Adv. & Icon. Lob.  
 2. *Thapsia Casalpini* semine candido crasso I B. Hist. t. 3.  
 3. *Thaps. latifol. villosa* C. B. P. *Seseli Peloponens. majus* Lob. Ic. *Thapsia quorund. hirsuta* & *aspera*, *Ciuta* folio, flore luteo, semine lato, alijs *Seseli Peloponensiacum* I B. Hist.  
 4. *Thapsia glutinosa Pimpinella Saxifraga* folijs venosis, ex Hispaniâ *Thapsia* 4<sup>a</sup>. *Tæro*. dicta *Clus.* Hist. *Thapsia* 4<sup>a</sup>. *Clusij*. *Tæro*. vocata folijs glutinosi, radice nigra foveis I B. Hist. t. 3. *Thapsia* folijs *Libanotidis* fetidissima C. B. P. item *Cicularia latifolia* fetidissima altera *Phytopin*.  
 5. *Thapsia Carotæ* facie I B. Hist. *Thapsia Carotæ* folio C. B. P. *Thaps. bulgaris Carotæ* effigie Adv. & Ic. Lob. lit. a. hujus umbellam seminibus ornata indicat.





Tab. LXVII.

1. *Thapsia* maximis folijs glutinosa, segmentis densioribus ex adverso sitis. *Thapsia Salmonticensis*. s. f. Clusij. magna flore luteo semine luto I. B. Hist. l. 3. *Thapsia maxima Hispanica* Park. *Thapsia maxima latissimo folio* C. B. P.
2. *Thapsia Libanotidis* folio glutinosa glabra *Thapsia Thalictri* folio Bot. Moersp. *Thapsia s. Turbith Garganicum*, semine latissimo I. B. Hist. l. 3. lit. a. appingitur Umbella.
3. *Thymelæa Africana* glabra floribus ruberrimis nostra Ray. Hist. app. an *Sanamunda* 4. s. folijs glabris acutis Breyn. Fascic.
4. *Tribulus terrestris Americanus* Argemones flore flavo. *Tribulus terrestris major* Curassavie; P. B. P. *Tribul. terrestris Americ. Chamacisti* flora, fructu spinoso maximo Breyn. Prod. 2. lit. a. fructum denotat, ab Insigni Botanico D. J. A. L. ed. Robinson. accepimus, qui in Floris Batavis collegit, sed absq. semine.
5. *Trifolium purpuraceum* Ebenus Cretica dictum, Lolo affinis folio v. facie Pentaphylloides fruticosi nostratis, floribus in spicam longiorum dispositis. *Cytisus Creticus* &  $\rho\chi\omega\nu\delta\alpha\zeta\upsilon\lambda\omicron\nu$ . Honor. Belli.





Tab. LXVIII.

1. *Trifolium siliquos* Loto affine, siliquis *Ornithopodij*. *Trifolium siliquis* *Ornithopodij* nostras Ray Synops. v. Hist.

2. *Trifolium pediculis* foliorum longissimis *Bisnagaricum*, forte *Trifolij Bituminosi* genus *Indiae Orientalis*.

3. *Tulipifera Caroliniana* folijs productionibus magis angulosis Mus. Coarctea, forte *Macpalxochie-Zuahuil* *Mexicensibus* Hernandez. Hist. lit. a. florem expansum indigitat.

4. *Tulipifera virginiana* Laurinis folijs aversa parte vire caruleo tinctis, Conibaccifera, *Laurus Tulipifera* baccis rubellis Cono erecto inclusis. Banist. Cat. *Laurus Tulipifera* folijs subtilis & cinereo aut argenteo purpurantibus Ray Hist. lit. b. baccas Cono capsulato per tenue filamentum appensas ostendit.



TAB. LXIX.




Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 1.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

- Tab. LXIX.  
 1. Trifolium pumilum Bismagaricum argenteo nitore sericeum capitulis oblongis hispida.  
 2. Trifolium Americanum - elatius holosericeum summo folio bifido suaveolens. Meliloti genus (forte) Indiarum.  
 3. Vitis Idæa species Maderaspatica Niruri forte Malabarensibus dicta Hort. Mal. P. 2. an Frutex Indicus baccifer. Vitis Idæa secundæ Clusij forte Breyer. Cent. 1.  
 4. Vitis Idæa Bengalensis Uva Uxi baccâ singulari, ad foliorum exortum barbulis donata.  
 5. Volubilis Gangetica, sapore acri, & aromatis, clarior autem Aristolochia Clematidis Gangetica folijs in aculeum abeuntibus radice odoratissima, an Aristolochia Clematidis Indica odorata F. B. P. Adclend. Careloe- Vengo Hort. Malab. Sasjanda Zeylanensib.  
 6. Volubilis, s. Aristolochia Clematidis. Bismagarica, spinis gemellis aculeata.  
 7. Wadoukæ Malabarica haud multum dispar, Frutex aculeatus e Maderaspatica Hort. Mal. P. 4.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and blurriness of the scan. It appears to be organized into several lines or paragraphs, but no specific words or numbers can be discerned.





Fig. 2.

Fig. 3.

Tab. LXX.

- f. 1. *Verbena Scutellarica*, *Cassida* folio, dispersis, *Americana*, an *Verbena Indica* Bontij. *Hist. Ind. Or.* forte etiam *Verbena Curassavica* *Scutellarica* folijs, flore purpurascente P. B. P.
2. *Veronica Virginiana* procerior, folijs ternis, quaternis, & etiam quinis, caulem amplectentibus, spicis florum candidissimis, an *Veronica Americana* erecta, frutescens, & ramosa folio *Verberce* P. B. P.





Fig. 1.

Fig. 2.

Tab LXXI.  
 f. 1. *Vicia multiflora* maxima perennis tetro odore, floribus albis, lineis caeruleis, striatis, *Vicia Sylvatica multiflora maxima* Phytol. Brit. Ray.  
 Synops & Hist. *Vicia perennis multiflora* aspicata major, floribus albis, lineis caeruleis notatis. Moris. Hist. 2.  
 2. *Vicia Lathyroides* nostras, s. *Lathyrus Viciae* formis Ray Hist. & Synops. *Lathyrus* ex caeruleo & rubro mixtus Merret. Pin.





Fig. 1.

Fig. 2.

1. *Vicia multiflora* major angustifolia glabra, floribus oblongis, & albo & ceruleo mixtis. à *Vicia Onobrychidis* flore C.B.P.  
 fortè *Vicia maritima multiflora alba Messanensis* Ray Hist. & Cat. Exter. fortè etiàm *Aracus minor Lunitanicus* Park.  
 Legumen pallidū Ulyssipponense Nonj. Brandouj. Ger. emac. app.

2. *Vicia multiflora* Casubica frutescens *Lentis siliquâ* Breyn. Prodr. 1. Cat. Hort. Ac. Lugd.



LEONARDI PLUKENETJ.

PHYTOGRAPHIA.

Seu

Stirpium *Εικονες* fideliter & exquisite ad vivum  
delineatae *Ανεγς* TABULIS illustratae

in Quibus

*Nova* plures & *Exoticae* *Plantae* à nemine hactenus  
animadvertente nunc primum proponuntur: Necnon  
aliquae quaedam apud *Neotericos* dubiae atq; obscurae  
(mutatis aliquando *Nominibus* prout res ipsa  
postulat) perspicua brevitate dilucidantur.

PARS ALTERA

ET SIC MEMINISSE JUVABIT



*Ea quae scimus, sunt pars minima  
eorum, quae Ignoram,*

LONDINI. MDCXCI.  
SUMPTIBUS AUTORIS.





INCLYTO HEROI

atq.  
3

ILLUSTRISSIMO DOMINO

DOMINO

à BENTINGK.

COMITL de PORTLANDIA. &c. &c. &c.

φιλοβουλήτων PATRONO longè Gratiōssimo.

LEONARDUS PLUKENETIUS

*Hortorum amœnitates, ac adumbratam VEGETANTIS  
ORBIS. Imaginem, Hisce TABULIS suis  
PHYTOGRAPHICIS in altera Parte  
contentis, exhibitam, summâ cum humilitate.*

Dat. Dicit. Dedicat.




TAB. LXXIII.



1. *Absinthium Ponticum repens* vel *supinum* C.B.P. *Absinthium Ponticum supinum* Herbariorum Obs. Lob. *Absinthium repens* Tab. Icon.
2. *Absinthium Halepense* sive *folium grati* odoris comâ deditiori. *Apsinthium Santonicum Arabicum* P. Bobart. forte *Seteha* Arabum. *Absinthium* genus circa Bethlechem R. & Wolff. Hist. J.ugd. app. Hac pulcherrima *Absinthii* species cum plurimis alijs novis & Illustrioribus Plantis quas summa diligentia ac inde- fessis peregrinationibus per totam fere Europam sibi conquisivit Ornatisimus vir. & hujus Botanice Scientiæ vere Ornamentum D. G. Rudolphi, Sherard. nos docuit.
3. *Acacia spinosa* siliquis per exiguis & vultu crispatis. *Maderaspatana* forte *Frutex folijs Acacia Mesopotamica*; Fib. Col. Nol. in Rechb. *Resina* similis *Mesopotamica* minutissimis folijs, siliqua integrâ contorta, crispâ, & obtusâ, s. Siliqua Nabathæa Breyer. Prodr. 1.
4. *Acacia* affinis *virginiana* spinosa, siliqua membranacea planâ, floribus albis, papilionac. Anagyr. modo in Uocam prope dentibus. *Acacia virginiana* siliquis glabris Ray Hist. Arber. siliquis virginiana spinosa, Legum. Nostr. affinis dicta R. & K. Anagyr. Americ. spinosa floribus albis odoratis P.R. P. itera *Laburnum* v. d. cast. *Caryocarpus folio Coluteæ* ejusd. P. R. E. *Laburnum spinosum* *Macedanicum* folijs glabris ita flore albo Breyer. Prodr. 1. *Glucosura hirsuta* siliquis ovatis. *Glucosura* affinis spinosa, arborescens, *Mauritanica* *Laburni* flore albo ejusd. Br. Prodr. 7. lit. a. siliquam indigitali.
5. *Adiantum* et *othium* *Rufum* varietate amulorum pinnae longis, angustis in summitate bipartitis, ad. *Fabro* habuimus.
6. *Adiantum maritimum* segmentis rotundioribus, Sch. Bol. *Adiantum* mas Tab. Ic. C. R. E. ubi plane factus, quia si hoc *Adiantum* genus se non adhiberet, a seque, *terrestris*, *Adglia* nostræ adjuventis *Insulae aluana* est, ut tantidē nos monuit, D. S. nec vcl.
7. *Alea* an *Malva polii* ex *volica*, *Pentstemon* folijs profunde secta purpurea floribus sine pediculis.





Tab. LXXIV.  
 1. *Alcea Indica* frutescens, lacinias baridè distatis, an *Alcea arborescens Japonica* folio *Quercus*, flore pleno carnea, in medio roseo. Cl. Breyn.  
 Prodit. 2. *Sansanqua Japonensis*.  
 2. *Alsine Saxifraga* Graminis folia, flosculis tetrapetalis herbicidis & mucosis, an *Saxifraga Anglica* annua *Alsine* folio D. Plot. Ray Hist. forte di am  
*Saxifraga graminea* pusilla, folijs brevioribus & rasi orib; & succulentioribus ejusd. Synops. Septentrionalibus Anglicis nostris a D. L. Dawson observat.  
 3. *Alsine Polygonoides* folijs tenuissimis per genicula binis ad summum caulium polyanthos. *Alsine Nudora* multiflora Sch. Bot. à nunquam satis  
 laudato biro D. Sherard habuimus.  
 4. *Alsine palustris* repens folijs lanceolatis, floribus albis per exiguis. *Alsine palustris* exigua folijs lanceolatis. *Plantaginella aquatica* in stâr,  
 flosculis albis bix conspicuis Martz. pegil. *Plantago aquat. minim.* Clus. Hist. P. B. K. *Plantaginella palustris* C. B. P.  
 5. *Alsine aquatica* major repens, folijs acuminatis. Virginiana.  
 6. *Althæa Indica* *Abutili* subrotundo folio, flore luteo spicato, forte *Malva Americ.* *Abutili* folio, flore luteo spicato, folijs incanis P. B. P.  
 7. *Althæa Scammonij* folio, flosculis albis Zeylanica P. B. P. *Nilaponghu* *Wissadula* Zeylanensis; dicitur in Hort. Regio. Hamptoniens. longe  
 celeberrimo, conspicimus, & in Horto Comptoniano collegimus.  
 8. *Althæa Americana* frutescens, *Melochia* folijs angustiorib; an *Malva frutesc.* *Melochia* angusto folio, florib; albis fasciculatim congestis P. B. P. inter  
 Addend. an *Tsjer-u-Uren*. Hort. Malab. P. 9.





Tab. LXXV.  
 1. *Alsine montana* capilla, v. folio. C. B. P. Pärk. an Alpina Salsifraga angustifolia, minima montana Col. ephr. quae parum differt ab *Alsine tenuis* folia mucosa ejusd. C. B. P.  
 2. *Alsine Caryophylloides* angustifolia, multiflora, glabra, purpurascens, radice Astragaliti, an Caryophyllus sylvestris, repens, multiflorus C. B. P. forte etiam Caryophyllus Saxatilis folijs graminibus, umbellatis corymbis ejusd. C. B. P. (i.e.) *Syrnhytum petraeum*, *Gypsophylon majus* Thaly. Hæry.  
 3. *Alsine Polygonoides tenuifolia* flosculis ad longitudinem cœulis belati in spicam dispositis nostræ R. ay. Synopsis. Polygonum angustissimo gramineo folio, erectum. Bot. Monsp. in Maritimis circa Bostoniam aqri Lincolnies.  
 4. *Alsine Polygonoides* herbacea minor Lariceis folijs capillatibus, ex uno pediculo plurimis. a. D. Sherard. habui.  
 5. *Alsine Alpina* glabra foliulis reflexis. an Saxifraga Boarica Pärk. ejusd. D. Sherard. humanitate accepi.  
 6. *Alsine Spermule* facie *Orthocentrus* folijs angustis ad guttula binis, flosculis autem plurimis, ad eulom radiatis, seminibus minutissimo fulvo.  
 7. *Alsine Anthericum* Nutt. folijs Pär ad. Bäläv. Prod. ab eodem D. Sherard. communicato.  
 8. *Amaranthus Indicus* verticillatus albus. *Origani* folijs lanugine incanis. an *Amaranthus* *Alopecuroides* Indicus herbaceus. *Atriplicis* folio. Breyn.  
 Prod. a forte etiam *Amaranthoides* humile *Curpsavicum* folijs Polygoni Pär. Bät. Pr. in Hort. Reg. Hampton. observavimus.  
 9. *Amaranthoides* humile *Curpsavicum* folijs *Cepaea* lucidis, capitulis albis. P.B. *Amaranthus* affinis *aroides*. *Amaranthoides* minor *Americana* pro cumbens. Sidi. *trifolij* folijs a facie floræ oblongo nivo. Breyn. Prod. 2. *Trifolij* spica *Crithmum* maritimum non spinosum. *Brazilense* R. ay. Hist. Per. ex. l. do Mar. Lusitanis. s. Caaponga 1. *Brazilianum* Pison. Hist.







Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.


Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 6.

1. *Angustica Charibbarum* elatior. Oculis atri folia flore albo, seminibus striatis, Cumini odore et sapore.  
 2. *Anchusa repens* Lithospermii facie, floribus caeruleis secundum folia prorumpentibus. Lithospermium virgatum Thaly; Hærcya. Lithosp. majus repens latifolium C.B.P. Lithosp. majus Dodonæi fl. purp. samine Anchusæ I.B. Hist. t. 3. l. 33. p. 592. ubi Icon minus fideliter excusplata per error em ad pag. 602. transposita est.  
 3. *Anchusa* ad generis facie India Orientalis, herba quadricepsularis.  
 4. *Anonis* purpurea procumbens bernas. s. præcox, fruticosa, annua, viscosa, siliquis crassis, lentiformibus, rarius dispositis. Moris. Hist. 2. forte Anonis Hispanica frutescens, folio Ciceris sylvestris triphylli, Sch. Bot. Anonicæ annua ramosa, folijs rotundis serratis Cat. Hort. Edinburg.  
 5. *Apocynum* hirsutum scandens, Americanum flore amplo, purpureo, an *Apocynum* scandens Africonum hirsutum L. D. P. 2. Spectabilissimi Viri D. Fosteri Horto pharinarum Plantarum exotiarum instructissimo, Umbellæ ad Austrum sita florentem didimus, habuimus.  
 6. *Apocynum* Guaysaivium fibrosa radice floribus aurantiis Chamænerij folijs angustioribus P. B. P. an *Apocyn.* er. eēt. minimum angustif. Americ. flore umbellata aurantiâ, petalis reflexis Breyer. Prod. 2. sed nostri florum petala non reflexa sunt, sed potius inflectuntur et ita disposita ut flosculum concavum efforment.





Tab. LXXX.  
 1. Balsamum Caprarium Anteguanum v. Nevisense fatidum. s. Arbuscula Americana Balloteolens, Scammonææ folijs punctatis, ferrugineâ lanugine  
 obductis, floribus parvis pentapetalis spiratis.  
 2. Brassica spuria exilis non laciniata, caule magis folioso hirsutior, folijs subrotundis. Brassica spuria minima, caule magis folioso hirsutior nostra.  
 Rayi. Synopsis. app.  
 3. Brunella Hyssopifolia C. B. P. Brunella minor folio rigido, integra, ejus d. Phytop. Prunella angustifol. IB.  
 4. Bugula non erecta tomentosa Stœbea seminibus albis. nuncere doctisfr. bini v. Divini Verbi Prædicatoris apud Londinates Reverendiss. D. G. Stoaestreet. prævisus  
 novum hoc Bugulae genus accepimus.  
 5. Buxus Africana rotundifolia serrata P. B. P. in Horto Regio Hamptoniens. collegimus.  
 6. Buxus Lauri Alex andrinæ folijs accedens Americana  
 7. Carduica minor angua Americana, flore argenteo. s. Leonuros Americana alba folio sideritidis longiore. è seminibus natali superiori anno in Horto  
 Complutano observavimus.





Tab. LXXVIII.  
 1. Aristolochia polyrrhiza, auriculatis folijs, Virginiana, forte Polyrrhizos Virginiana Park. Serpentaria altera Virginiana bulgo.  
 2. Asarum Virginianum Fistolochia folijs subrhundis Cyclaminum more maculatis. Asarum Cyclamini folijs Virginiana B. Anst. C. & A.  
 3. Asparagus deculeatus triphice spina Prom. Bon. Spei, an Asparagus sylvestr. spinosa Africana C. & H. Hort. August. editur in Hort. Reg. Hamptoniensis  
 4. Aster luteus Cisti hirsutis, u. arenatis folijs, summo cauleramero, floribus amplis. an Herb. Vulneraria, ad fluvium Pfrim. Hjer onym Tragi. Conyza affinis Germanica C. B. P. Consolida Saracenicæ 3<sup>a</sup> Tragi. Hist. Lugd. Conyza affinis, Herba Vulneraria, s. Solidago Saracenicæ 3<sup>a</sup> Trago hirsula I. B. Hist. i. 2. hujus exemplar nobis amicissime donavit D. Doody, qui & ipse inter Siccitas exoticas, & qui amplurimas rariores Plantas, in Horto Potavino jam dudum collectas, & in Chartis a se servatas, quas sibi impetravit. absq. titulo invenit.  
 5. Aster Americanus Belvideres folijs floribus ex cæruleo. albicantibus. spicius longioribus. an Aster Nova Anglia Tripoly floribus spicius longis dispositis P. B. P.  
 6. Aster Americanus multiflorus, flore albo Bellidis, disco luteo D. & F. Flines. Sch. Bot.






Fig. 2.




Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 5.

Tab. LXXIX.  
 1. Aster Americanus; albus latifolius caule ad summum brachyato, si color florum, & foliorum conjugata positio non obstarent, hanc Stellam  
 celoxochitl Nov. Hisp. Recch. eandem plantam esse suspicaremur.  
 2. Aster Americanus albus Mex. et Arabum exasperatis folijs, florum petalis reflexis.  
 3. Astragalus annuus folijs & siliquis hirsutis, plurimus in foliorum alis sessilibus. Astrag. siliq. & folijs hirsutis floribus parvis Moiss. Hist. 2. Foenus  
 græco sylvestri Tragin quibusdam accedens Planta I. B. Hist. t. 2. Astragalus marinus Baticus Patr. Vicia Sasamacca Apula Col. ecphr.  
 4. Astragalus hirsutus corniculis plurimis uno pediculo stellis formiter adaptis. Ornithopoda affinis hirsuta fructu stellato C. B. P. Stella leguminosa I. B.  
 Hist. t. 2. nunc et Ornatisimi Viri D. Patricij. Adstr. acceptimus.  
 5. Astragalus Pyrenæicus in caulis folijs Vicia flore sulphureo. Sch. Bol.  
 6. Auricula Ursi Virginiana floribus albis Borriginis instar rostratis Cyclaminum more reflexis. à Celeberrimo Botanico D. B. Aster. in Angliam  
 nuperrime lectus missa.







Tab. LXXXVII.

- 1. Apocynum Americana, erectum tuberosa radice non incanum folijs rigidioribus latis, subrotundis, florib; alb. intus purpureis summo cauli  
 corymbum magnam effor. munitibus. ad Apocyn. Americ. arbor escens. folijs rigidis, subrotundis, amplifimis. P. D. F. forte Apocynum  
 erectum non vniuersum, latior folio, Umbellis florum albicanibus B. A. N. S. C. A. T. S. S. S. V. i. g.
- 2. Arbor Americana Merifolia, vasculo. cinnabari var. rosacea. Coni annulo, oo ali. Balsamum olente. Cedrus spuria Jamaicenis; nostratibus dicta.
- 3. Arbor Orientalis Bellidis spinose solidioribus folijs, cupulis parvis quadrifloris. Kulu e Cingalonib; dicta hujus Specimen ex icatulo Ingu. P. A. M. S. S. S. V. i. g.
- 4. Arbor Americana triplylla, fructu Plalani quodammodo emulante. Lignum s'obularium (s'e) Bullou wood. Nostratib; dicta.
- 5. Arum triphyllum minus penguatior rubente Virgicianum. Arisarum triphyllum minus penguatior rubente B. A. N. S. C. A. T. S. S. V. i. g.
- 6. Arum Moschatum Ophioglossoides p. enudis Jamaicense. ac melius Ophioglossum Moschatum Jamaicense Lemonij folijs in caetero  
 Sinuatis. antriformum fluitans p. enudo Virgicianum. B. A. N. S. C. A. T. S. S. V. i. g.





Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 4.

1. *Cirsium ligura* Jamaicensis, cortice acri candicante. Canella alba Chury. *Laurifolia* Magellanica cortice acri C.B.P. Cortex Winteranus aervis, s. Canella alba l. B. an Ligni aromatici Monardis cortex.  
 2. *Cardus Tingitarius*, flore magno, caeruleo, folio *Altr. actylidis* divisurâ subtis incano, spinis durioribus horrido.  
 3. *Caryophyllus sylvestris* Alsiner holostea orovensis glabra folijs flore unico, calyce barbato *Armeria* species flore summo caules singulari nostra Raj. Synops. app. forte *Centaurium ciliare minus* Bisnagaricum *Origanum* folijs amplioribus, floribus in Umbellis.  
 4. *Chamaedryfolia* scandens claviculata v. *Corymbifera* Jamaicensis. huc forte pertinet *Bryonoides* s. *Ternscatl-Yauctepensis* Mexicensibus Heznand.

Date	Description	Amount
1890	Jan 1	100.00
1890	Feb 1	200.00
1890	Mar 1	300.00
1890	Apr 1	400.00
1890	May 1	500.00
1890	Jun 1	600.00
1890	Jul 1	700.00
1890	Aug 1	800.00
1890	Sep 1	900.00
1890	Oct 1	1000.00
1890	Nov 1	1100.00
1890	Dec 1	1200.00
1891	Jan 1	1300.00
1891	Feb 1	1400.00
1891	Mar 1	1500.00
1891	Apr 1	1600.00
1891	May 1	1700.00



Tab. LXXXII.  
 1. Bellis montana minor Tanacetii folijs, Noris. Præ lud. Tanacetum montan. inodorū. minori flore C. B. P. Tanacetum album I. B. Hist. l. 7.  
 2. Centaurium Ciliare minus, Circææ folijs firmitioribus, spicatis floribus in Maderaspalân.  
 3. Cerialia diphylla Antegoana Rivini majoris fructu ossea siliquâ grandi incluso, Arbor siliquosa ex Virginia Lobo fuscos cabro C. B. P. item Arbor siliquosa ex quâ Gummi Anime elicitur, ejusd. C. B. P. Jetaiba arbor Gummi Anime fundens Pison. Alariz quo dammodo accedens, Arbor Anime Gummi fundens Americana folijs magnis, acuminatis, in pediculo binis, Lobo magno crassissimo, eduli Breyner. Prodr. 2. Animifera arbor Brasiliana P. B. P. hujus siliqua est Lobus ille ex Wigandera orō, de quo Cluvius. in exot. Locus Nostralis, vulgò. aa. Lobum. bb. bb. fructum indicant.  
 4. Cerialia quo dammodo affinis Bengalensis, folijs biemellis, subrotundis, siliquis admodum intortis in orbem circumflexis, et minio nigricantibus fructu rubro, maculâ nigra insignito. an Avaramo-Temo Brasiliensibus Pisoni a. siliquam b. fructum indignant. in Horto Comptoniensi enutritam vidimus.


*Handwritten notes:* 5. Cerialia L. P. B. P. ...



# APPENDIX

*ad Rariorum Plantarum Icones*

*LEONARDI PLUKENETIJ.*

 Propter Literarij Sculptoris incuriam, aut saltē  
nostram in hoc opere properantiam contigit,  
Iconem Tab. 82. Fig. 5. adscriptam, absq;  
titulo exhiberi; hujus ergò Synonyma hiç  
subnectere lubet, ut suo loco reponantur. Viz.

5. Cerasa Hottentottorum; Lycium Africanum fructu  
Cerasi rubro. Parad. Batav. Prodr. 349. Rhamnus  
Africana Cerasi fructu ejusd. P. B. P. 369







Tab. LXXXIII.  
 1. Chrysanthemum minus Alpinum elegans, flor. magna albicante, folijs crassis, Saxifragia chelidonides accidentib; hæc elegans planta Chrysan.  
 2. Chrysanth. Or. Sausi folijs stipense scabris, Maderaspotonum, florum petalis quinque tetragonis, & calyce amplo biridi fistulosis.  
 3. Chrysanth. argulosis Platani folijs Virginianum. Doronium maxime American. latissimi, angulosis fol. radice transparent. Cal. H. Ac. Lugd. an Chrysanth.  
 4. Chrysanth. Virg. villosi disco luteo petalis quinque ovato. Chrysanthem. pentapetalis hilloso caule Banist. Cal. Mf.  
 5. Chrysanth. hirtulum Virg. auriculato Dulcamaræ folio velopetalon. Chrysanth. folio oblongo auriculato Banist. Cal. Mf.  
 6. Cistus humilis. Chamæcistus Erica folio ludæ & elatior C. B. P. Helianthemum tenuifol. glabrum flore luteo I. B. Hist. t. 2. Chamæcistus Erica folio Park. Cori  
 simillimus, Fruct. in maritimis Andr. Cæsalp.





1. *Chrysanth. Alpin. Bellidis folio caule singulari. Chrysanth. parvum s. Bellis lutea parva latifolia* B. Hist. f. 3. *Chrys. Alpestre Bellidis folio* Cat. H. Pat. à Turc.
2. *Chrysanth. Alpinum Bellidis folio ramosum.*
3. *Chrysanth. Americ. bidens alatum flore parvo aurantiaco. Chrys. conyoides alato caule Curassavicum* P. B. P. *Chrys. cannabinum American. alatum flore aphylo, glabro, aurantio, folijs Bauhavidis.* Breyn. Prodr. 2.
4. *Cistus Helianthemos frūa brevioribus folijs humilior.* C. B. P.
5. *Cistus Alpina humilis folijs Thymi minutissimis.*
6. *Cist. humilis Majori folijs Camphorata tenuissimis folijs glabris Chamæcist. Masiliens. Corruod. Coridis luteifolia* Schol. Bot. hanc Eandem esse plantam, cujus oia folia tenuissima Lamphorata similia, glabra quam Celeberrim; noster. R. apud circa Masiliam invenit, ab ornatisimo Botanico D. Sherard. merito confectur.
7. *Clematis Alpina Geranis folia* C. B. P. & Prodr. *Clematis cruciata Alpina* Ponce. Descript. Montis Baldi.
8. *Clinopodium minus ex olium Thymi folio majore. Clinopod. Cretilium* Pe. Alpina. *Thymum ex olium flosculis nunquam expansis.* Bobart.
9. *Conserva gemiculata minima nostras. Oculati sinus* D. Sherard. hanc esse Umbelliferam aliquando suspicabatur.





Tab. LXXXV.  
 1. *Clinopodium minus* exotikum *Thymi folio minor* e. *Clinopodium Thymi folio* & facie *Schol. Botan. Har* 59 plantarum novissimè recensitas, à D. Shevârd accepimus.  
 2. *Clinopodium Amaraci folio*, flore albo. Americanum *Dictamnus* sibi vocatum.  
 3. *Convolvulus Sagittarice folijs*, flore purpureo *Wheeleri*. ab Inventore habui.  
 4. *Convolvulus Sidamaneae* aditus in *Peru* de *hircis*, an *Scammonea* *maior* *hircos* *Pr. Alp. exot.* *Scammonea* *maior* *hircos*. *Cretica* *Pa. R.* hanc enutriti jam pridem in floribus suis. *D. Shevârd*. *Morgan*.  
 5. *Cucumis parva* repens *Virginiana* fructu minimo *Banist. Cat. M. S.* fructum d. d. semina denotant.  
 6. *Cupressus Virginiana* folijs *Acaëcia* *cornigera* *parvis* *deciduis*, *Cupressus* *Virginiana* folijs *Abietis* *mollis*; atq; *deciduis* *Breyer* *Pr. 2.* *Cupressus* *Americana* *Pa. R.* *Flatz.* *ans.* *Cupressus* *Americana* *sus* *Hellenica* *an* *Habhel.* *Paludans* *ajus* *fructus* *seu* *formam* *speleus* *seu* *quam* *marum* *amplitudinem* *ab* *hujus* *nuce* *haud* *multum* *ab* *ludit*, *ut* *recte* *notat* *Cl. R. A.* *jus* *ob* *loci* *tamen* *Natalis* *distantiam* *zandem* *non* *ausus* *est* *affirmare* *cl. a. a.* *hujus* *nucem* *integram* *diversimode* *dissectam*. *b. b.* *nucleos* *ostendunt*.



TAB. LXXXVI.



Tab. LXXXVI.  
 1. *Lytisus* folijs viridib; angustis quasi complicatis Monspeliens C.B.P.  
 2. *Cytisus procumbens* Americanus, fl. luteo ramosissimus qui *Asiis* suppeditalapud Barb adensium colonos. *Chama-Indigo* sylv  
 trifoliata Barb adensib; an *Cytisus humilis procumbens* P.B.  
 3. *Doronicis affinis longifolia* RAY Hist. *Tussilago Alpina* folio oblongo L.B. Hist. t. 7. *Tussilago Alpina* folio oblongo C.B.P. *Doronicium Pyrae-*  
*naic Persicæ* folijs glabrum Schol. Bôian. ubi pro non descript. ponitur.  
 4. *Elahines* foliis pilosissima papilionaceo flore Maderaspataua.  
 5. *Echiochryso* affinis Orientalis foliis adgenicula binis, flore pentapetaloide argenteo apicibus auris paleaceo.  
 6. *Echiochryso* affinis Oriental. ramosior foliis capitiurn nodos radiatim ambientib; Coma paleacea flore albo lituris auris striato.  
 7. *Erucæ sylvestris* minor lutea Bursa pastoris folio C. B.P. *Erucapumila* Bursa pastoris folio Boccon. *Erucæ Monensis* laciniata lutea Ray Hist.  
 8. *Erucæ Virginiana* Bellidis majoris folio Moris. Hist.







Tab. LXXXVII  
 f. 1. *Eupatoria conyzoides* Verbasii foliis, s. *Baccharis Americana* suaveolens, *Eardexylon* (is) *Sveestwood*. *Barbadensis* dita.  
 2. *Eupatoria conyzoides*, odorata foliis crenato, molli subincano. *Serratula* *Novboracensis*, folio leviter crenato, molli subincano P. B. P. fortè *Serratula Indica* major latifolia mollis Breyn. Prod. 2. *Jacca* v. *Serratula* affinis, capitulis *Baccharidis* foliis *Trachidij* *Ceylanica*, ejusd. Prod. 1. *Cattu-Schiragam* Hort. Malab. P. 2. forse, etiam *Conyza* *Syria* *Ravolty*. Hist. Lugd. app.  
 3. *Eupatorium Americanum*, *Melissa* foliis magis acuminatis, an *Eupatorium* *Novæ Angliæ*, *Stachidis*. *Betonica* foliis crenatis floribus; albis P. B. P. fortè etiam *Eupatorium Americanum*, *Nepeta* foliis latioribus albis brevioribus; Breyn. Prod. 2.  
 4. *Eupatoria conyzoides* maxima, *Caha* densis foliis caulis amplexantibus, *Conyza* major, alato caule foliis *Primula* veri longe amplioribus, graviter odoratis. *Laly* *Triumfetti*, apud *Fratre*, an *Virga* cur ea latissimo folio, *Canadensis* glabra, *Schol. Botag.*  
 5. *Eupatoria Conyzoid*, integro *Jacoba* folio glabro duriusculo, *Indiæ Orientalis*, foliis *Jacca* v. *Serratula* affinis Breynij. Cat. H. Ac. Lugd. app. hanc mirè cl. *Eruditissimo* D. *Slare* nobis hujus notitia debet.  
 6. *Eupatorium* *Virginiæ*, *Salvia* foliis longis, acuminatis perfoliatum. Hujus folia longam uero natam in oppositam ad basin ita continua invicem, ut ea caulis transdigantur, sinum quendam, et cavitatem peli aqua continenda similem, efformant.





Tab. LXXXVIII.  
 1. Eupatorium humile Africanum Senecionis fauce, folijs Lamij P.B.P. Senecio Africanus Lamij folia Acad. Reg. Paris. Senecio Americanus Lamij fauce Schol. Botan. fortè Virga aurea humilis Alpina Moris. Præclud. fortè dian. Virga aurea folio Veronica Menzely. Fasic.  
 2. Eupatoria hirsuta Hysopifoliorum annula Virginiana, an Nalchinol-Xochitl's Venerea Medicina 2<sup>a</sup>. Hernandez. Hist. Mexic. p. 238. & 415.  
 3. Eupatoria Valerianoides flore nido. Teycrij folijs cum pediculis Americana.  
 4. Eupatoria Valerianoides Trisraginis folio, absq; pediculis, Virginiana, Cacalia folijs rotundioribus, ad caulem sessilibus Banister. Cat. M.S. an Nlacochochil Nov. Hispanica Recch. p. 418. rijk.  
 5. Evonymus Canellæ albæ folijs Madraspatan. D. Frederici Slare favore, ad exsculpendam accepimus.  
 6. Evonymo adfinis Arbor Orientalis nucifer a flore roseo. Styraiv Evonymo media affinis The Sincensium, si de Tsja Iaponibus flores simplici. Broyn. Prod. 2 Thee. frutex Bontij hujus flores munerè D. Peltver accipi.





Tab. LXXXIX.  
 1. *Chepus Jamaicensis*. Arbuscula Buxi folijs spinosa flore luteo papilionaceo siliquisera.  
 2. *Filix saxatilis*, non variosa minima R. & Y. Cat. Ex ter ar ubi dubium movet an sit *Dryopteris Dalechampi* IB.  
 3. *Filix saxatilis*, omnium minima elegantissima. Cat. Hort. Reg. Paris.  
 4. *Filix Alpina* Myrrhidis facie Cambrobritanica an *Filicula fontana* Adianti facie latifolia dentata Schol. Botan.  
 5. *Filicula pumila* Lenchitidis Marantiaz species Cambrobritanica. an *Lenchitis aspera* Itmensis Hist. Lugd.  
 6. *Filix parva* Cambrobritanica pinnulis latis auriculatis, brevibus saepe alata, has tres novissime enumeratas Filices ab Inventore D. Lloyd. accepit insignis Botanicus D. Sherar d. a cujus liber a litate v ipse habui.  
 7. *Filix minor* Africana Lenchitidis foliis pinnulis auriculatis planis. *Filix Africana minor* Lenchitidis facie P. B. P. in Hort. Regio. Hamptonens. longe celeberrima. <sup>collegimus.</sup>  
 8. *Filix Virginiana* pinnulis oblongis, angustis, auriculatis, tenuissimis crenatis, longe ab invicem distantibus, non spinosa.  
 9. *Filix* folia s. *Polypodium tenuifolium minus* Virginianum.  
 10. *Fagi* folijs alterno positis alatis. Arbuscula Bisnagaria.





Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 4.

Fab. XC.  
 1. Foeniculum græcum Phaseoloides Virginianum, flore amplo ceruleo. Scruvidaca trifolia flore patulo ceruleo, radice Glycyrrhizæ sapore. Banister Cat. Mss.  
 2. Fumaria Tingitana, radice fibrosa perennis, flore ex albo flavescente, siliquis curtis. an Fumaria semper vivens v. florens ex Hortis Batavis Cat. H. R. P.  
 3. Fumaria siliquosa, radice grumosa, flore bicoloro, ad labia conjuncto. Virginiana. Fumaria siliquosa grumosa v. radice flore gemello monstroso. Banister Cat. Mss. an Fumaria Canadensis, radice tuberosa squammata. Acad. Reg. Paris.  
 4. Fungus congener, Actabulum petræum, s. Fungus minimus petræus, orbiculata crustula compositus. D. Lloyd Ray Synops.  
 5. Galega degenet, folio singulari floribus parvis herbis muscosis. Galega unifolia, flore herbaceo. Cat. Hort. Palav. Georg. à Turc.  
 6. Gentiana Maderaspensis, folijs Asclepiadis, caule arroso.







Tab. XCI.  
 1. Genistella Montis ventosi spinosa I.B. Hist. t. 2. Genistella Monspeliaca spinosa C.B. prodr.  
 2. Gramen cyperoides exiguum seminibus bullatis Ray Observat. 444. ex mente D. Sherar d. qui nobis ad exculpand. dedit.  
 3. Gram. Cyperoid. Americanum spicis speciosis plurimis compressis summo caule absq. pediculis adnatis. an Gramen maritimum Cyperoid. Curaf.  
 4. Gram. Cyperoid. Americanum spicis majoribus oblongo rotundis Sparghanij in modum echinatis ad summum caulempediculis longis inaequantibus.  
 5. Gram. dactylon Orientale mojos frumentaceum semine Napi. Coracum Lingalensibus D. Knox. l. linec. ar. p. 20.  
 6. Gram. parvum sangreticum spica gemella habitiori. an Gram. du sa Xuo qogov. Col. ecphr. 378. hujus spicae Amarai capitula squammata quo-  
 dammodo exprimit.  
 7. Gram. Cyperoid. folijs Caryophylla. spicae granis rarioribus & tenuioribus, conflata Ray Synops.  
 8. Gram. Cyperoid. tenuifolium spicis ad summum caulempediculis globulorum cernuis. Gr. Cup. folijs mollioribus tenuibus spicis brevibus & acroatis. tribus quatu-  
 orve in summitate caulis. Ray Hist. for. it. Gr. Cup. minimum Ranunculi capitulis rotundo. D. Bobdri. curad. Ray Synops. Stirp. Britan.





1. Gram. dactylon Siculum. multiplici paniculâ, spiciis ab eodem ex ortu geminis Ray Hist. an Festuca juncea foliospicâ geminâ C. B. P.
2. Gram. amoris alterum. paniculâ striyosioribus magisq. spuriis Ray. Cal. Exter. gr. in Historia autem omiſſa est.
3. Gram. American. spica echinatâ majoribus locustis Schol. Bolani. fortè etiam Gram. aculeatum Curassavicum P. B. P. seminibus à D. Sherard. communicatis in Horto D. Dooddy. ex amicorum referentissimo enatum primò observavimus.
4. Gram. Alopeuroides Indicum minus spica Sericeâ candidâ laxiori.
5. Gr. Indicum Alopeuroid. holosericeum majus spicâ longâ pappescente. an Gram. Alopeuroides Curassavie. spicâ longissimâ Sericeâ candidâ P. B. P.
6. Gramen Miliaceum Americanum minus paniculâ parvâ.
7. Gr. Miliaceum American. maximum. paniculâ minorè.
8. Gr. Miliaceum Americanum medium. paniculâ magis sparsâ & spensâ.
9. Gram. junceum elatius. pericarpijs obovatis Americanum.





Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 2.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 4.



Fig. 7.

Tab. XCIII.  
 1. Clematis Atragones singulari folio splendente Virginiae.  
 2. Helleborine Virginiae, Ophioglossi folio. D. Bauister. hujus Exemplar pulchre essiccatum nec non picturam propriam manu ad vivum appropinque delineatam Erubertissimus Invenitor non ita pridem amicis suis in Angliam transmisit.  
 3. Hieracium folijs in tenues lacinias profunde sectis, flore luteo. Chondrilla lutea I. B. L. 2. Chondrilla Coronopifolia aut Cyani facie tenuifolia lutea vinea rari Adv. Donchus. lappis in plurimas lacinias divisus C. B. Pin. 4. Prodr.  
 4. Hypericum fere orbiculato folio floribus amplis pallide luteis, petalis florum in ambitu crenatis. Hypericum Nummularia folio C. B. prod.  
 5. Hypericum Ericoides minimum folijs cineris ex Hispania, an Hypericum Francorum, non scriptum, tenuifolium, Belluc. In d. Hort. Pfl. au. Invenit in Hispania D. Turnesort.  
 6. Hypericum Alpinum, magno flore nigris punctis insignito Sch. Bot. forte Ascyron magno flore C. B. Prodr. Hastes proximè antecedentes, novas, aut saltem minus cognitas Hypericorum species, in unum exstantissimi viri D. Sherard accepimus.  
 7. Jacea tenuifolia purpurea capitulo Calcitrapae in modum aculeato. Capitulis spinosis Jacea Adv. Jacea cum spinosis capitulis, purpurea, tenuifolia I. B. L. 3. lib. 25. an. Stoebe squammis asperis C. B. P.





Tab. XCV. *See next Plate*  
 1. *Laureola latifolia* floribus albicantibus, odoratis, Americana, sub nomine *Jasmini Americ. Aurantia* folio collegimus in Hort. Reg. Hamptoniens.  
 2. *Imperatoria Ranunculoides* Africana cuneaphyllis, *Lasertij* lobatis folijs rigidis, margine spinosis, *Ranunculus per elegans* D. Frangueville, folijs aculeatis. Lob. Illustr. dt. 135. *Sphondylii* & *Panacis* rigido, hirtog, folio, *Planta Africana caustica* P. B. P. Nostra tamen folias sunt penitus glabra & lavore splendida, ideo qd sola planta *Lasertij* propius accedit quam *Sphondylio*, *Umbellifera aurea* Cap. Bon. Sp. bulgo. in Hort. Reg. Hampton. Observed.  
 3. *Juncus Orientalis* panicula spinosa & *Madraspata* Humanissimi Viri & Mercatoris Londinensis idem viri D. Hillard. favore accepimus.  
 4. *Kaliturafavidum* procumbens, folijs subrotundis P. B. P. 344.  
 5. *Kaka-Toddali* (forte) Malabarica, ex *Oris* Cormandel. H. M. p. 215. Frutex bacifer, Indicus, spinosus, trifolius, floribus spicatis, fructu plano, rotundo, tricocto Ray Hist.  
 6. *Limonium* (forte) peregrinum, folijs solidiori texture à in lacinas variè dissecto, à D. Edv. Morgan. jam olim exsiccatum accipi.  
 7. *Juncus elegantissimus* capitulis pectinatis Prom. Bon. Sp. D. Sherard amice nobis communicavit.







Tab. 84.  
 1. *Sacca major* Boissica Park. an *Sacca purpur* novitum. capitulo spinoso Neapolitana Ray Cat. Exter.  
 2. *Sacca peregrina* Vapifolia hirsutis capitulis alata. & seminibus à D. Sivey d. cum ab Exteris in Angliam rediret secum allatis, ab ipso communicatis, in Hortis quibusdam Curcosorum, apud Nostratru, natarit, & super vicinis crevit in Hort. Acad. Oxon. sub auspicijs D<sup>ni</sup> Bobart. qui hujus speciem non nihil resiculaque nobis amissis in se transtulit.  
 3. *Sacca fruticosa* Pini folio C. B. P. Stoebe capitula Rosmarino folio Penns. s. *Charapitys fruticosa* Cretica Belli. J. B. L. 3. *Stoebe fruticosa angustifolia* Mus. Cretica Park. an *Chamaepitys* Pr. Alpina. ex ot. typ. *Stoebe* hujus Plantae nobile specimen à Reverendis. D<sup>ni</sup> Wheeler. ad aesculpend. impetravit.  
 4. *Jasminum buigii* American. attractius Evonymo affinis Occidentalis, ablati R. usi folijs nucifera cortice adgenicula fungoso. *Guaiacum American.* alterum fructu Evonymi Eveya. Prod. r. Guoivauri folijs Lentis Horto Bagliano. ejusd Breyn. Prod. r. Paekhout Belgarum sub *Jasmini* titulo. in Hort. Reg. Nostratru. primum nobis innotuit. a fructu orbiculato, quatuor obtusis angulis constantem, ostendit.









1. *Lycium* minus, cor datis Buxi folijs Mader aspatarum, forte *Lycium* Hispanic. folijs Buxi C. B. P. Tamaia s. Lycion herum Fragos, an *Lycium* Buxi folijs angustioribus Syriacum. Breyer. Prodr. 2. *Lycium* Dioscoridis, Madhad Arabibus, & Layo a Incolis Montis Libani. R. & Wolfj. Itinerar.  
 2. *Lycium* Mader aspatarum, Indici Alpino pulati, emulurn, bijugis, & grandioribus aculeis, horridum.  
 3. *Lycium* Bisnagaricum, acuminatis, minus duriorib; folijs, & aculeis ex opposito binis. Tjerou-Kara Hort. Malab. simile, si non idem.  
 4. *Lycium* putatum Indici Orient. Capparis rotundiorib; folijs, & aculeis ex adverso gemellis.  
 5. *Lycium* Beloxylon, bigis aculeis in ramulorum fastigijs Americanum. ex hujus ligno sagittas, & fructibus Atramentum conficiunt Indigenae. Daxlvood & Inke-berry à Nostratis his nuncupatur à D. Sherard. specimen ad exculpandum datum est.  
 6. *Lycium* majus Americanum, Jasmimi. flore, folijs subrotundis, Americanum, ladescons, limbis foliorum argentatis.  
 7. *Lycium* Myrti folijs subrotundis, Americanum, ladescons, limbis foliorum argentatis.  
 8. *Lycium* (forte) non spinosum, ex assis & incanis folijs P. B. P. rectius autem, *Cerusus* *Sebestena* domestica, folijs, aliquatenus accedens. Prom. Bon. Spes. Capsi Carsi boorn bulgò Belgarum.  
 9. *Lychnidis*, aut potius *Alsinei* cognata dispermos; s. *Chamaejasme* tetrapetaloides ino dor a, quadrato caule Virginiana.





Tab. XCVIII  
 1. *Lychnidea umbellifera* Blattariae accedens Virginiae major. v. epens Pseudo-melanthij folijs pilosis, flore albo, pentapetaloides, fistuloso.  
 2. *Lychnidea Blattariae accedens* Virginiae a minor v. repens, hirsutis Camphoratae folijs, floribus fistulosis, in Umbellam positus.  
 3. *Lychnidea Blattariae accedens* Virginiae Camphoratae congeneris glabris folijs, flore ad summitatem ramularum singulari.  
 4. *Lysimachia purpurea* affinis Americanae procurrans, Anomidis verna frutescentis folio singulari glabro, Gratiolae affinis frutescens Americanae folijs Agerati.  
 5. *Veronica erecta* majoris Breyn. Prode 2. hanc plantam Capræ apud Belgas Curasavienses pro pabulo avidè petunt inde Capræ Curasavicae, Labrittae vulgo P. B. P. quam D. Wheeler, spontè nata in Lycia observavit, ubi Lusernobè à Turcis nuncupatur. Florem habet nivei coloris pentapetaloidem, capsulam cylindricam figurâ bipartito divisam seminibus parvis turgidam.  
 6. *Lysimachia purp.* affinis frutescens Anomidis singulari hirsuto folio Maderasensis.  
 7. *Malus lignata* Zeylanensis aculeata. Granata Malus Zeylanica spinosa P. B. P. an Rabu-narjam H. M. parl. 4. in Horto. Reg. Hampton. collegim.  
 8. *Melilotus Indiae* Orient. minima dispermos folliculis in summitate aduncis, an Melilotus minima, Syriaco Nephel, 5. Nephel. Itmbailhar, & Malafesa Breyn. Prode 2.  
 9. *Muscus polytrichoides* pellucidus fere, folijs denticulatis, ad margines badii crispis noster. Ray Synops. Stirp. Britan. append. an Polytrichum aureum medium ejusd Ray. Histor.  
 9. *Muscus denticulatus* minor C. B. P. Park. Muscus terrestris Lusitanicus I B. t. 7.







Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

- T. XCIX.  
 f. 1. *Melampyrum aquaticum*, fol. integris longis per angustis *Maderaspalanum* àn *Melampyrum palustre* et *canadense* *senensis* glabrum *Seli* *Bet.*  
 2. *Melampyrum cristatum* I. B. 3. àn *Melampyrum luteum* *angustifol.* C. B. P. *Park.* quærit et ipse *Cl. R. d. p. us*  
 3. *Melampyrum affinis* *tetraphylla* *songetica*, floribus inter folia sparsis, àn *Adel-* *Odagium* *H. M. p. v. i.* 9. hujus semen mellei coloris lucidum singulare nudum, grani  
*triticeum* *mulmum* *insidet* *super* *basem* *foliorum* *cristalorum* *dupli-* *ciserie* *pinas* *membranulas* *rigidiores* *alteram* *alteri* *longiorem* *circum* *ambientium* *constructa*  
 4. *Mercurialis tricoeca*, *hermaphrodita*, s. ad foliorum juncturas ex foliolis cristatis julifera simul & fructum ferens *B. anist.* *Cat. Stirp. Virg. a*  
*Mercurial.* *Zeyl.* *tricoeca*, cum acetabulis *Cat. H. Ac. Lugd.* *append.* plurimum differt, ut ex utriusque pictura cuius pateat.  
 5. *Mespilus Virginiana* spinis longioribus rectis, folijs quodammodo auriculatis..  
 6. *Millefolium palustre*, *galericulatum* *minus.* *R. ex erend.* *Vir & amicus noster singularis* *D. Dodsworth.* *in agro Eboracensi sponte natum invenit, &*  
*jam pridem nobis benigne communicavit.*





Tab. C.  
 1. *Mespilus Virginiana* *Grossularia* foliis.  
 2. *Muscus rupestris*, repens, *Virginianus*, clavis foliis, erectis, quadratis *Banister. Cat. Ms.*  
 3. *Muscus filicinus elegans*, *Beyouregis* *Prom. Bon. Sp. Pulturjoory* *Hottentottorum* *à D. Sherard. accepimus.*  
 4. *Myrrhis annua* *serotina* *rostrata*, *striata*, *aspera*, *nodosa* *Morison. Umb. Myrrhis sylvestr. Cretic. nodosa* *seminibus asperis* *Ray. Hist.*  
 5. *Myrrhis perennis* *lutea* *Daucoides* *Moris. Umb. v. Prælad.*  
 6. *Myrrhis Brabantica* *affinis Americana* *foliorum laevius Asplenij* *modo divisis* *quibus seorsimul & fructum ferens. forte Canambaya*  
*Brasiliensib; Marigrav. fortetiam Cardiacæ Mulleriana Indica. Bod. à Stæp. in Theophr. 320. hujus semina singularia*  
*capsulis bivalvib; extrâ globum echinatum emergentibus continentur.*  
 7. *Eodem cum ramulo conis, nucamentis, onusto.*





Tab. CI. Muscus palustris in Ericetis nascens floridus, noster. Ray, Synops. dpp. ut minus incaute floridum pronunciamus; capitula quidem hujus, pedicellis in mixta, hirsuta ramulorum apices, operculis eorum jam delapsis, flosculos tuum pulchre gemulantes, ut primo intuitu nobis imposuerit, ex quo demum agnosco, nihil aliud esse quam Muscus palustris terrestris similis Ray, Hist. Pl.

2. Nardus Americana procerior folijs serratis hinc proxime cognata est Teripeti bel. Insul. it. Nov. Hipp. Ant. Recch. p. 412.

3. Nasturtium petraeum Cambr. brythinnicum Joh. de M. Merc. Bot. part. alt. Passim in caecis rupibus Arvo. it. & Mervin. av. g. Moelyn. r. h. d. h. j. u. d. Phetiniog. y. l. o. g. v. in. du. y. r. Ard. h. y. Clogvin. y. Garnedh. prope Lhandbery. invenit. Plantarum Britannicarum sagacissimus Investigator D. Lloyd.

4. Nasturt. Bursa pastoris folijs serratis Christophoriae facit. B. P. in Hort. Reg. Hamptonic. collegimus.

5. Nasturt. African. floribus albis spicatis, et folijs serratis Christophoriae facit. B. P. in Hort. Reg. Hamptonic. collegimus.

6. Nil. s. An. syl. v. b. r. l. y. n. a. n. c. h. e. a. folijs Bisna garicum. an. Manneli Hort. Malab. P. g. quam heri in d. l. a. l. i. n. c. l. o. r. i. a. s. p. e. i. a. h. f. a. n. t. C. o. m. m. e. d. i. m. u. s. in Not. supt. loc.

7. Ninzin. s. Lingin. & Ginseng Radix genuina Indiae Orientalis, apud Miscell. Curios. Ephem. German. decur. 2. Ann. 51. p. 73. sub hujus titulo plurimas species videtis, inter quas Ginseng Cleyeri Japonensis Ferræ alumnae huc nostræ quam maxime accedit. Quum Ninzin, in Bontij ab hac planta plurimum differt hujus radicem munere Amici summi Viri D. Gedley accepim; frondium effigiem ope favore Cl. Viri D. Sancti R. Robinson.



1890



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 7.

at. C11.  
 1. *Onobrychis Madagascariensis* diphyllos, siliculis asperis. hujus nutritia humanis. eoque ac Claris. Viri Dr. F. Polierii S. A. e favori debemus.  
 2. *Onobrychis Medusorum* Cyprium Alpin. per canalicula glabra. fl. albo Seh. Bot. Onobrych. Cypria lavis. B. P. in Prod. ad. Sherard. habitus.  
 3. *Ornithogalo* affinis Virginian. flore purpureo pentapetalis de Bänist. Cat. Ms.  
 4. *Oxys purpurea* Virginiana, radice Lilij mor. enucleata, capitulis postquam defloravit bulbillis, ut in Albo corvino constat. Trifolium acutissimum, radice parva rotunda Lilij mor. imbricata Bänist. Cat. Ms. a. capitulum bulbillis suis gnatum in digitat.  
 5. *Pedicularis* s. *Criste-galli* affinis Virginiana. Ajuga multifida folio, apicibus corinceo floribus pallidissimis in spicam congestis. *Euphrasia Virginiana* cornis coccineis floribus albis theca foliacea inclusio Bänist. Cat. Ms.  
 6. *Phaseol*: tuberos. Cap. Bon. Speci sub Batatas Capensis trifoliata titulo ac cepimus.  
 7. *Potamogeto* similis Graminifolia ramosa, & ad genicula polyceratos. *Potamogeto* affinis Graminifolia aquatica Ray. Hist. Plantar.







Tab. CIII.  
 1. Palma Majori Park Theatr. Palmae facie Majori I. B. 1. Palma American. spinosa C. B. P. Palma Brasiliens. vi. s. Ayri Pison. p. 129. Polmistepinus Rochfortii p. 60. forte Macron Arbor Barbadosium Ligonis. hujus Arboris lignum marmorinquo sithile ferri modo in aqua fundum pelis exinde Ebeni speciem esse quidam autumant. plurimas haec ex Insula Jamaicensi allatas in Horto Comptoniano aliquando conspimus.  
 2. Palma American. folijs Polygonati brevioribus, leviter serratis, & nonnihil spinosis, trunco crasso Breyn. Prodr. Palma Americana non spinosa, crassis rigidisq. folijs caudices abro in caput protuberante P. B. P. in Horto. Reg. Hampton. bidim, & co. legim;  
 3. Periclymenon Hecti accedens Arbuscula Virgini ana siliquosa.  
 4. Pimpinella Sanguiforba rupestris minima, radice magna. hujus folia Pimpinellae, <sup>spinose</sup> foliolis haud majora, a Cl. D. Turnefortio in Hispan. collecta fuit, & a D. Sherard amicitissimi nobis communiata est.  
 5. Plantago Coronopus dicta maritima, brevis, latoq. & dentato folio pilosa. Coronopus Mafiliensis hirsutior latifolius Sch. Bot. Coronopus folijs acutis in margine dentatis Ray Hist. Pl. Plantagini affinis Babinella, Sicilie herbula I. B. 1. 3. Coronopus maritimus Prochytae Insulae Col. cephr. 2. 58. non autem est Coronopus maritima nostras, nec in multum similis ut Rerum oium Naturalium, Vir peritissim; & Botanices Scientiae Summus Arbiter & Praesidium singulare, D. Ioh. Rayus recte pronunciat. Cat. Exterar. quamvis Cass. Bauhin; eandem faciat. Plantago Apula bulbosa Park. Plantago Apula laciniata bulbosa Fab. Columna. Plantago pilosa bulbosa C. B. P. huc nostrae per similes est, forte eadem.  
 6. Polygonum Germanicum caule, folioso, flosculis in summitate. an Polygonum angustif, & acuto vel gramineo folio montanum, Sch. Bot. forte Polygonum angustifolium folijs C. B. P. Haemorrhoidalis quae ad Caryophylleorum umbrissylvestrium classem referri debet a Clusio putavit. Hist. app. altera. dd. lib. 6. forte siam Polygonum Polonicum coelestium I. B. 1. 3.





Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

Tab. Civ.


1. *Passiflora Vesicaria* hederacea folijs lanuginosis, odore tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. *Hedera Murutuice* species *Vesicaria lanuginosa*, odoris gravis *Marcgr. 73. Flos Passionis Curasavicus, Hederae hirsuto folio, flore purpureo variegato P. B. P.*
2. *Perichlymenum herbageum* rectum *Virginianum*. *D. Tinkarsweed*. ibi vulgò vocatum hujus generis esse videtur illa *Perichlymeni* species scandens, & corticibus Arborum radices emittens, *Itti-Canni Hort. Malab. dicta. part. 7.*
3. *Phaseolo affinis*. *Arbor Indica Coral dicta polyphyllos, non spinosa, folijs mollibus subhirsutis.*
4. *Piperi longo* similis *Pistlochice folijs abspectuiculis Maderaspata. Laborandi 4. Pisonis huic multum convenire videtur Hist Brasil. p. 216.*





Tab. Cv.  
 f. 2. Phaseolus unifolius Occidentalis Asari domos folio dispersos Orobus Americanus Asari folio singulari P. B. P. in Hort. Regio. Hampton. nutritum observavimus.  
 2. Phaseolus unifolius Orientalis summo folio sinuato monospermus. an Phaseolus minimus perennis Americanus flore albo Meliloti; folijs Asari lanuginosis solitarijs Breyer. Prodr. 2.  
 3. Phyllitis Parva Saxatilis Virginiana pro summitates foliorum radiosa Banist. Cal. Stirp. Virg. Herba der pira. hujus folium Phyllitis ramosa et Alpinii folium particulae sicut a amulatur et huic forson ista proxime cognata est, alterius, ramificationis defectum alteri per admissibilem Propogandi modo dum sibi ferè peculiarem suppediant beneficium Naturæ.  
 4. Portulaca Curassavica lanuginosa Kati folio brevitior, et latior flore rubente P. B. P. Portulaca Americ. erecta lanuginosa folijs Psyllij, florib; in caulum summo rubro obsoletis majorib; Breyer. Prodr. 2.  
 5. Portulaca lanuginosa procumbens Vermiculata folijs Americana. Portulaca Americana pro cumbens Sedi teretis folijs, v. facis floribus in ramos summo pulchre purpureasente De. Prodr. 2. Beldr. b. g. a. forte Cysitanis. s. Caaponga Brasiliana 3. Pisonius 2. 4. 4.  
 6. Portulaca affinis Americana, tripartita erecta flore albo, pediculis angustis, Portulac. Americ. 4. Curassavica, latifol. erect. florib; albis P. B. P. ex hujus capsula tripartito divisa semina per maturitatem impetu disseminant. has tres novissime enumeratas plantas in Horto. Regio. Hampton. oculis nostris summa Voluptate illustravimus atq; collegimus.






Tab. CVI.  
 1. Phario-Scorpiuro. s. Heliotropium Palmites spinosum. Polygonati angusti folijs Mader aspat. huc forte pertinet Alitar a Brasiliensibus Macq. lib. 2. p. 64.  
 2. Eiusd. summitas floribus ornata, que ne dosas vitiosas Scorpiionum cauda pulchre representat, ut in Heliotropio. favore Cla. D. Frederici Slare habuimus.  
 3. Ranunculus Nemorosus Fragariae folijs Virginianus Banister. Cat. Mss.  
 4. Ranunculus Nemorosus Aquilegiae folijs, Virginianus, Asphodeli radice. Ranunculus Thalictri folijs grumosâ radice Banister. Cat. Stirp. Virg. nuper edit.  
 5. Ranunculo ad finis Umbelliferis accedens, Chelidoni minoris folio, Zeylanica minor. Asarina minor Zeylanica P. B. P.  
 6. Ranunculo ad finis Umbelliferis accedens Chelidoni minoris folio, Curassavica major Asarina major Curassavica P. B. P.  
 7. Pentaphyllum Alpinum minus folijs tenuioribus altius serratis, cauliculis purpurâscente. an Pentaphyll. repens minus saueo flore Clus. Hist. Cui foliam magis billosa attribuit, nostrum equidem ne dixit hirsuta apparent, hujus exemplar amicissimus Vir & apud Londinenses Pharmacopaus peritissimus D. Philippus Schreikenfauchs nobis concessit.







Tab. CVII.  
 1. *Pyrola affinis Virginiana*, repens, fruticosa, folijs rigidis Scabrute asperatis, flore pentapetaloido fistuloso. *Pyrola repens* folijs scabris, flore pentapetaloido fistuloso. Bauister.  
 2. *Reseda Linariae folio* *Pyrenaea glauco folio* Sch. Bot. an *Reseda Linariae folio* C. B. P. item *Reseda alba minor* ejusd. C. B. P.  
 3. *Rhamnus Maderaspalanus* & *Boisnynti pallentib;* folijs brevibus duplicatis.  
 4. *Rhoi similis Trageo des. leptiphyllos*. Americana, spinosa, rachi medio appendicibus aucto. an *Coriaria Arbor spinosa* *Acaciae folijs & facie* P. B. P. inter Addend. sorte *Quauhqueopalli Pitzahuac*. *Copallifera leptiphylla* alia *Hernand.* p. 49. *Fingrego*, & *Sabina arbor* (sic) *Savin Tree* *Barbadensib;* nostratibus dicta.  
 5. *Ricinus parvus urens*, folijs *Luercinis* *Virginicus* *Bauist.* *Cat.* *Stirp.* *Virg.* an *Luercinis folijs* *Arbuscula spinosa lactescens* *Porto ricensis* P. B. P.  
 6. *Ricini fructu parvo, fruticosa*, *Curassavica*, folio *Phylli*, P. B. P.





Tab. CVIII.  
 1. Rhamnus Maderaspatanus Hyperici frutescentis foliis, spinis brevibus duplicatis.  
 2. Rhamnus anpotius lycium Fin. greg. Jamaicensibus dictum, forte Katu-Karu. Wall. H. M. spinarum autem posito huc parvis congruit.  
 3. Rhamnus Maderaspatanus quindisfidis duriorib. foliis in margine spinosis humanitate favore D. Fred. Sider. Obtinuit.  
 4. Rubus foliis eleganter dissectis D. Fagon. in Hort. Reg. Paris. collegit D. Sherard. & nobis commemoravit.  
 5. Sanicula Alpina angustiss. folio, flore carneo. Sedum Alpin. alterum Fransa. Gregor. Regiensis. Cappucini Tab. Columna. cephr. p. 2. Sedum Alpinum angustissimo folio, flore carneo C. B. P.  
 6. Sanicula Alpina angustissimis breviorib. foliis per intervalla confertis. Sedum Alpin. primum Columna. cephr. p. 2. Sedum Alp. ceteris foliis C. B. P. an. Sedum Alpinum minimum carneo flore, Sch. Bot.  
 7. Scabiosa capitulo, Chrysanthemi Myconi foliis, alato caule Maderaspatanensis.





Fig. 4



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

1. *Sabiosa longicaulis* Americana capitulis & floribus albidis parvis P. B. P.  
 2. *Schettia album*, s. *Jasminum* Indicum. Serris foliis in dorso, umbellatum floribus albidis parvis P. B. P. Bern. Schett. Hort. Malab. P. 2.  
 3. *Serratula* Novaeboracensis maxima s. *Doria* lentic serratis P. B. P. inter Addend. *Serratula* Virginiana, min. angustif. mollis Breyer. Prod. v. fort. Atzoyatl Cortic. Yri-  
 Roderit. Nov. Hisp. R. ubi. 35. s. *Senecio* gener. et *Tlalli-yatl* Nov. Hisp. ejusd. pag. 423.  
 4. *Sesamum* alterum foliis trifidis, s. *serotina*, semine obscuro. an *Car-Elu* Hort. Mal. P. 9. *Bidajam* Hitor. s. *Bidajam* nigrum Malaccensis *Sesamum* Indicum  
 folio amplo serratis, flore majore semine nigricante Comelin. Annot. in Hort. Malab.






Fig. 2.

Fig. 5.



Fig. 1.




Fig. 6.



Fig. 3.



Fig. 4.

Tab. CX.  
 1. Scutellaria Teucrij facie purpurea minor, flore amplissimo. Teucrium Astragloides Cassida minor Cal. H. R. P. 173.  
 2. Scutellaria major, Nepetae folijs Virginiana. an Scutellaria aquatica. major Americ. Cal. H. A. c. Lugd. forte Tochonzo chil. Nov. Hisp. Ant. Recch. 431.  
 3. Smilax Viticulis aspera folijs longis, angustis, mucronatis levibus, auriculis ad basim rotundioribus.  
 4. Smilax Viticulis asperis Virginiana, folijs angustis, levibus nullis auriculis praedita huic radice geniculata crassa & intorta, inde suspicamus Chinae Meccianae speciem esse, & forte Olchicatlan Hernand. p. 212. & Vaperainga altera Pison. forte etiam Radix Chinae A. cost. Hist. Lugd. app. 10.  
 5. Smilax Virginiana spiritus inno cuius armata latis Canella folijs radice arundinacea crassa & carnosâ, forte China spuria nodosa C. B. P. Pseudo-China radix ex Virginia Clusij, exot. China Michuacanensibus Phaco dicta Hernand. 213. Poyayo Nov. Hisp. Ant. Recch. 398. Vaperainga Brasilienib; Pison. 258. an Kari-Vilandi H. M. P. 7. Pochhout Belgis Orientalib; ut ibidem habetur. apud nos vates Virginiam habitantes, ex hujus Stipilib; parantur Scipiones, ut nobis affirmit Amplissimus & Senatoria Dignitate per honorandus Vir D. Byrd. Ultrag. viz haec simul & proximè praecedens Socpocangarym species, fructum acinusum ac racematim dependentem in summis caulibus copiose profert.  
 6. Smilax aspera Bermudensis grandiorib; folijs cordiformibus, radice surculosa. forte Quauhmeapalli. s. Zarza species cujus radices in Hispaniam tam transferrî solebant ut à Francisco Ximene narrat Marcgravius p. 12. Quauhmeapalli altera, Zarza 4. Hernand. 290. forte etiam Smilax aspera Zacynthi Alpino I. B. l. 2.







Tab. CXI.  
 f. 1. Smilax foliis latis in marginespinosis Carolinaiana, Stipitelemi, quadrato, hanc Generosissimus Dominus Courtèrenobis benignissimè concessit.  
 2. Smilax bibulky asperis Virginiaana folio hederaceo leni, Zarza nobilissima nobis. Merapathis. Zarza-parilla Fe. Hernand. 288. in Hort. instructissimo D. Fosterianum minus.  
 3. Smilax Carolinaiana, Stipite quadrato leni, folijs angustis, acutis, auriculis ad basim angulosis, ab illustri viro D. Guilielmo Courtèrenè accepimus.  
 4. Solanum Americanum, Strychno den duo accedens, fructu mecho (ante maturitatem) quasi fesso. an Solan. fructu. Brasilian. folio Capsici, bacis rubris P. B. P.  
 5. Solan. Curassavice vesicarium Solano Antiquorum simile, folijs Origani subincanis P. B. P. forte Solan. vesicarium Surinamense lanuginosum polycarpon Br. Prod. 2.  
 6. Solanum triphyllum flor et tripetalo. atro-purpureo, in foliorum sinu, absq; pediculo sessili. Banist. Catal. Stirp. Virgin. Hujus autem florem nobis bidetur.  
 sex foliis, sive pedalis constare, quorum tria subjecta tota viridia sunt, brevissia, tria vero superiora, longiora, ad o-purpurae sunt, quæne d-  
 modum in Solano triphylo Lana densi Cornuto: cui hæc est quam proximè cognata.





Taf. CXII  
 1. Senecio American, altissim, Blattaria del Hieracii folio Scl. Botân. Senecio Americ. maxim. Dipsau. s. Virga Pastoris folio P. B. P. an Senecio Cichora folio Virginiana, flore sulphurea, odore Pastinaca. Cat. Mss. H. Oxon.  
 2. Solan. Barbadosense aeternum minus tinctorium, circa folijs mollib, & incanis, forte Heliotropium Curasavicum Scammonij folijs mollib, subhirsutis. P. B. P. Heliotropium Americanum majus folijs Populi nigra lanuginosis, flore albo minimo. Breyn. Prodr. 2.  
 3. Spongia flaviabilis, an fractuosaperfragilis, ramosissima nostras, in Isi fludio prope Oxonium inveniit D. Sharard & nobis munere donavit.  
 4. Apocynum maritima fistulosa, maxima muricata, an Spongia ramosa fistulosa. C. B. P. dedit nobis D. Doodý.  
 5. Syringa Volubilis Virginiana Myrti majoris folio, alab. semine, florib; odoratis, luteis. Gelseminum s. Jaminum luteum odoratum Ray Hist. Glorin. s. Jamin Virginian. scandens & semper-virens Park. Theatr. Pseudo-Apocynum Myrti-folium Virginian. Banist. Cat. Stirp. Virg.  
 6. Tithymalus Curasavicus, Salicis & Atriplicis folijs varijs, caulib; viridantib; P. B. P. Tithymalus Indicus, Salicis & Atriplicis folijs Breyn. Prodr. 2.





Tab. CXIII.  
 1. *Tithymalus reoticus*; Carobfolijs aliquatenus acaloni. in Tithymalus Sicutus polymerico dicitur in Africa. P. B. P.  
 2. *Tithymus Indicus*; annuus dulcis, floribus albis, capsulis bincardantibus P. B. P.  
 3. *Thymelæa Africana* Linaria Joho, florib; albis in extremo caulium odoratissimis Thymel. Guss. hinc dicitur in Africa. P. B. P.  
 4. *Trifolium stellatum* glabrum Ger. emac. Trifol. capitulis Dipsaci quorundam Ray. Synops.  
 5. *Trifolium supinum* cum glomeratis adcaulium nodosorbiculatis florib; purpurantib; Ray. Fustol. an trifol. parvum rectum. Ray. quoniam dicitur in Europa. P. B. P.  
 I. B. L. 2. merito autem quaratur (in quibus dicitur, non ster. Rayus) cur rectum dicitur, eam in Descriptione caulium superius a 172 dicitur.  
 6. *Trifolium cochleatum* modiolis spinosis Ray. Synops. Stirp. Britan.  
 7. *Valerianella Curassavica* semine aspero viscoso P. B. P. in Hort. Reg. Hamptoniar. legimus.  
 8. *Trifolium siliquosum* Loto affine Maderaspatan. siliquis longis, ex adverso binis propeudentibus.





Fig. 4.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 7.




Fig. 2.

Fig. 8.

Tab. CXLV.  
 1. Verbascum congener, e Madagascari, in uero variis folijs, a versis partibus, longis, cinosis, flore parvo purpureo.  
 2. Veronica adfinitiva, in dicitur tenuifolia, foliis caulis, herbis, summo caulis, frum bellis, a. v. b. capsulam seminalem per Microscopium visam  
 exhibet. e Madagascari ad Ornatis, terram, in uero d. Hildard allate est, qui nobis humanissime communicavit.  
 3. Veronica saxatilis parva caulibus nudis R. 37. Obs. pag. 42. in uero d. Sherard accepimus.  
 4. Viburnum Americanum non spinosum, Melica folijs, floribus coccineis P. B. P. C. Lamarca flor rubro Marcey. p. 5. forte diuina Lamarca flor elideo ex ripa Fluyi S. ti  
 Fr. dicitur, ejusd. an Lamarca sub a. P. 5. h. 5. Matruum in torridum, & ca. lictum Hernand. v. b. nosti in m. flor. primus lutei, deinde aurati, &  
 lantem in uero, & ultimo tanquam coccineis coloris, in Her. Reg. Hist. p. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.  
 5. Viburnum Arnerie, odoratum, folio parvo orbiculato, floribus, bacis foliis interephi. P. B. P. 304.  
 6. Viola lathyroides s. Lathyrus Viciaoide, vexillo rubro, labiis, 7. palatis rostrum ambentibus, corulis Moris. Hist. 2. Lathyrus s. Cicercula Messanensis Ray. Hist.  
 7. Viola Virginiana tricolor, folijs multifidis, caudiculo aphylo. Banist. cat. Virgin. an Viola Alpina folio in plur. part. dissecta. C. B. P. Viola montana laciniato  
 folio Clus. Hist. Viola montana folio multifido I. B. Hist.  
 8. Virga aurea flore albo, spicato. Breyn. Prod. 2. Virga aurea Nouberaensis, floribus albis, folio Bellidis ramosa Canadensis Cornuti. P. B. P.








Tab. CXV.  
 1. Alni folia Americana serrata florib; pentapetalis albis in spicam dispositis.  
 2. Eiusdem Spica florum, cum in majorem perfectionem devenit.  
 3. Apocynum Virginianum Asclepiadis folio, erectum, floribus pallide coruleis, radice crassa, forte Moyotliayacatl Nov. Hispan. Ant. Recch. 388.  
 4. Chrysanthemum ex Insulis Charibaeis leucotri incanis, y sericeis folijs argenteis crassis.  
 5. Evonymus Virginianus, Pyracontha folijs, semper vivens, capsula verrucarium instar asperata rubente.  
 6. Fruticulus Americanus cordatis folijs pentapetaloides, radice lignosa.  
 7. Nymphaeae congeneri Anapodophyllum dicitur auctoribus, polyphylla. s. Dracanthij similis herba Americana pusilla.





1. *Thymus* magnus Hispanicum Park. Densiflor. class. tus. adams C. B. P. in Peds. Stirac. Pyramidum. Blatin. foliis minutissimum Sch. Bot.  
 2. *Loto* affinis hirsuta flore subrotunda C. B. P. Anthylli. hirsuta sapur yrasente flore. Clus. Hist. Loto affinis her. satia her. ba. flore su. me. v. c. b. Hort. Hist. 2.  
 3. *Mathonica* Malabarorum, Nierghala Leylunensis in Mys. Leyl. Cal. H. Ac. Long. app. Merdoni. Hort. Malab. Cuiusdam. Loto. hirsuta. sup. dum bulgò.  
 4. *Thymus capitatus* Cith. per a. foliis minutissimis confertis. in Thymus capitatus minoribus. Myriolotius. C. B. P. o. Loto. hirsuta. hirsuta.  
 5. *Thymum* majus longifolium. Stachida foliaceo capite. ut put. a. sc. t. pilosum. forte Thymum cap. loto. hirsuta. magno cap. per. v. c. b. P. in Peds. Stirac. Pyramidum. Blatin. foliis minutissimum Sch. Bot. quod apud Collatians Rectorum quas Cl. Turnerus ed. D. Nierghala de Lusitania. in. m. s. l. ut hoc. titulo aliquando. Loto. hirsuta.  
 6. *Virga aurea* Americana. Sarraceni. sarraceni. sapore. panicula. op. s. f. s. m. a. forte. I. loto. hirsuta. a. P. in Peds. Stirac. Pyramidum. Blatin. foliis minutissimum Sch. Bot. Her. n. d. Hist. Mexic. de hujus. s. l. genere. ad. d. m. s. d. e. non. d. u. d. e. o.  
 7. *Fungus* Virginianus ex Stercore Equino capillaceus. carnis. exp. u. l. o. v. m. i. d. a. m. g. r. o. p. u. n. c. t. u. l. o. i. n. s. u. e. r. n. i. t. a. l. o. n. o. t. a. t. a. Bani. irr. Cal. Skop. Virg. M. s.





- Tab. CXVII.
1. *Frioides* s. *Mesembrianthemum Africanum* frutescens floribus albis parvis umbellatis. à *Mesembrianthemum Afric.* frutescens minus triangularibus folijs viridib; cornuum taurinorum in medium reflexis, fructu turbinato, parvo, pentagono, lignescente *Breya Prodr.* 2.
  2. *Ros solis* *Lusitanicus* maximus folijs *Asphodeli* minoris *D.* *Forst.* *Chaetia leontidea* *Grislij* in *Epist. Dab. cat.* ad *Virid. Lusit.* muner. *D. Courteii* accepimus.
  3. *Serpentaria repens* florib; *Stammas* spicatis, *Bryonia nigra* folijs ampliore pingu *Virginianis*. hinc etiam pertinet *Mexico chil;* *Mexicanis;* *Herzand* 144. forte etiam *Caxahoa* *celli* *Nov. Hiép.* *Rech.* 438.
  4. *Ejusd.* spica flosculorum, cum ad justam explanationem assurgant.
  5. *Tulipifera Virginiana* tripartito *Aetris* folio, media laciniâ *belu* *absissa* *Raj.* *Hist. Tulipifera arbor Virginiana* *Cal. H. Ac. Lugd.* *Populus* aut potius *Alnus Tulipifera* *coris erectis.* *Banist. Cat. Stirp. Virginicis.*
  6. *Viscum arboreum* flore albo spicatos *Americanum* folijs forma *siliquarum Nerij.* *Nerij* *siliqua* effigie, *Kay Bakal B. Hist.* *Fructus Nerij* *siliqua* effigie *C.B.P.* per errorem.



ALTERA  
APPENDIX.

*ad Rariorum Plantarum Icones  
Quâ*

*Stirpes quasdam exoticas proponere nos placuit, quarum  
Exemplaria ex India Orientali humanissimus vir, ac Chi-  
rurgus peritissimus D. Richard, Sambach misit amico suo  
D. Iacobo Pettever Pharmacopæo, & apud Londinates Botanico  
meritissimo; à quo demum ad delineandas cereisq; typis  
exprimendas accepimus: Istis itaq; duobis cordatis viris  
grates agere de his debent qui studium  
Botanicum colunt*







Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 6.

Tab. C XVIII.  
 1. *Alstine*, *Spergula* facie *Maderaspateris*. folijs latioribus semine minutissimo nigro. an *Tzompili* *Huizpalli* Nov. *Hisp.* *Reckij.*  
 2. *Amaranthus* spica longa candidissima. Spicae folijs *Maderaspateris*.  
 3. *Antirrhino* affinis. pusilla planta. folijs scabris *Maderaspateris*.  
 4. *Cardiaca*. s. *Leonurus* *Hysopi* hirsutis folijs *Maderasp.* floribus dilute rubris, unico tantum verticillo in ramulorum cymis.  
 5. *Chrysanthemum* *Maderaspateris*, *Mentha* *arvensis*. folio & facie floribus bigemellis, ad foliorum alas, pediculis curvis.  
 6. *Tithymalus* *botryoides*, cordatis folijs, *Indiae* *Orientalis*.





1. Gramen geniculatum, et corymbosum, et spicam purpureo-sericeam Maderaspaticum.  
 2. Gram. dactylon Maderaspaticum, cum pluribus spicis paribus, ad summum caulis, velut in verticillas positus. folia magna sui parte, cubnum cum bagina complectuntur, reliquam, surrigunt, brevis ovata, surrigidam, marginibus crispam.  
 3. Gram. Cyperoid. Maderaspaticum, Junck Gesneri capitulis sparsis.  
 4. Lysimachia affinis Saturoica folio Maderaspaticum, capsulis in summitate ferè umbellatis.  
 5. Melampyro cognata Maderaspatica spinis horrida, an Coletta-Vectla, Hort. Malab. P. 9. Eryngium L. eylanium febrisugum florib. luteis Herbar. Vivi. Herem. Lingalensibus Kathu Karohit. fortissimè huc pertinet Bahd-Schulh Hort. Malab. p. 2. Geniste spinosa speciem facit, Camm. el. in Nohs.  
 6. Phaseolus arborescens intanus, monospermus, siliquis, lensi-formibus, Maderaspaticum.  
 7. Sinapistrum Indicum, diphyllon, siliquis ad alas ex uno pediculo binis. Cupa-Vectla forte Hort. Malab. P. 9.





- CXX.
1. *Mimosa pumila* Maderasp. pinnis tenuissimis, ad foliorum exortus innocuis spinulis obarmata.
  2. *Polygonum Solinoide* Maderasp. Thymi capitati folijs intricatum.
  3. *Portulaca* affinis *Polygonoides*, Bili folio yfacie Maderasp. tenens.
  4. *Rhamnus cordata* folijs subtus caespis Maderasp. tenens.
  5. *Rutrus Althaea* folio mollis intricato Maderasp. tenens.
  6. *Pinus vrens* Cannabinis folijs triphyllis e Maderasp. tenens. an *Urtica Indica* pentaphylla C. G. Mich. Nutt. Catal.
  7. *Tetiphan* Maderasp. tenens. caulis pilosis scandens, Pae flor a modo tributum. an *Com. s. Coenti*. Mexiensis; *Hernand. 252*. Apios American a triphyllis siliquis *Orbis*.
  8. *Nola surrecto* Maderasp. tenens. Lini facie, rotunda orbibus imis folijs.



LEONARDI PLUKENETII  
PHYTOGRAPHIA;

Seu

Plantarum quamplurimarum novarum, & literis hucusque  
Incognitarum, ex varijs, & remotissimis Provincijs,  
ipsisq; Indijs allatarum, Nominibus & Iconibus,

TABULIS AENEIS,

magna cum Industria, et insigni sanè  
in Successores beneficio, Illustrata.

PARS TERTIA.

VICES DEDIT AMULA VIRTVS.



J. Collins fecit

*Nihil vacat, nihil inane, Terra germinat,  
quod tibi putas inutile, alijs, immò tibi ipsi fre-  
quenter, alio usu est utile. D. Ambros.*

LONDINI MDCXCII.

SUMPTIBUS AUCTORIS.





Invictissimo, Potentissimoq.

GULIELMO III.

DEI GRATIA

MAJESTATI BRITANNIAE &c. &c. &c.

MONARCHAE semper AUGUSTO.

Leonardus Phokeneticus Perpetuos Triumphos, Immortalemq. Gloriam. P.

Tuis sub auspicijs, Augustissime Rex, prosperam Rerum Statum, & aurea plene Saecula nobis pollicemur; eoque certius, quo Te veluti fulgentissimo nascente Sole, Christiani Orbis caelum, Sacrilegae quidem impietatis, ac innumerarum calamitatum Stygia caligine oblectum, unde quaeq. clarescere intuemur. Ex cussu etenim quo premi capimus Servitutis iugo, in assuetis cervicibus intolerando, vitam libertatem jam reddidisti, Teq. brevi, tanquam invictum Heculem horrenda & infesta Fidei nostrae Oppugnatorem Monstra debellatum fore haud vanè speramus, Cum Prosperitas Tua divina annuente Providentia, indies magis, magisq. florescat. Strenuis enim laboribus Te consecutum constat, ne qua debilitas obrueret, aut Oblivio delere Tui Nominis amplitudinem possit: haud namq. censeri debet Gloriam illam unquam inter mortuorum, quae non lubrica Fortune partus, sed constantis Virtutis est filia, ut in Te deo propriè, cadat illud

— famam extendere factis

Hoc Virtutis opus. —

Imperium equidem fortunam expertum est, virtus supra fortunam ponitur, imò fortuna tandem etiam virtutem adoravit, et dum virtuti quod debuit, reddidit, reddidit et Imperio. Vidit Europa, Majestatem Tuam, maximis exercitibus, non per Legatos, sed Ipsam summam cum prudentia Imperantem, & Gloriam sudoribus suis merentem, quam alieno labore, alij sibi parant Principes; Pericula quae Celeris, minoribus subeunda relinquunt Ducibus, Ipsemet Strenuissime Rex, subire non dubitasti, nec sub aliena latens fortitudine, metum celsi, ac ignaviam, sed contra Tuorum (si quis in tanti Imperatoris militibus esse potuisset) timorem, invicto animi robore expulses Tuis validissimis armis, Gentes bellicosissimas, celerissime magnis atq. cruentis cladibus affectas, & nunquam hostem, a quo ferro, ac prudentia non superatum, adverteimus, quasi nulla Terrarum pars, Trophais Anglorum vacare conspecta sit. Tantè refert, a subjectis populis, belli, gloriaq. studio flagrantem Regem, pra oculis habitum perpetuo fuisse. Tu siquidem Parentum Tuorum, Avorum, Avorum gloriam, quantumvis splendidam, ac Imperatoria Dignitate ornata, longo superavit intervallo, tot inter Tuæ Illustrissimae Familiae sidera, clarissimam veluti solis lumen, eminere dispiceris. Heros hunc haec praclarissimus, imò. Heros ipse omnium Maximus; Tuæ Hollandiae, ut et Britanniae nostrae, totiusq. Europae sublevanda, novus Atlas, celsitudo datus, & feliciter designatus.

Par est O Rex, & silentij hic ubi rerum magnitudo dicendi parvitatem, infinitis partibus excedit, meminisse, & simul in praesentia, solum commemorare Clementiam, Haec enim Maximos quoq. etiam Principes, maxime decet, ut potè quae illi maxime ad Divina Naturae similitudinem, ipso quoq. Romanae eloquentiae Principe iudice, accedant. Haec verò virtus eximia, à Tuæ Celsitudinis sole, lumen ducens, inter reliquas virtutes Tuas, splendidissime lucet.

— Velut inter ignes

Luxa minores. —

Solem dico eum, quo praesulges, praecellentium omnium Virtutum concursum, unde Tibi longè melius quam Catoni Romano, ea laus adjuncta est, singulas singulorum hominum virtutes, in Te unum exornandum conspirasse. Innata Tibi est haec regia Clementiae virtus, Teq. caelo afferens, ut alterum Titum, amorem, & delicias generis humani per orbem celebrat. hanc arte Augustum imitatus, non tantum Tuorum, mutata licet feliciter ex usu Republicae Imperij forma, sed et Vicinorum, cunctorumq. Exterorum benevolentiam, & studium, Tibi conciliasti, omniumq. linguas, & stilos, Terra Marique, scisti Tibi devotales. Deniq. in Te, Regum Optime Prudentiam, Fortitudinem, Clementiam, ac reliquas omnes dotes, quibus tum ad bellum fortiter gerendum, tum ad fructus Victoriae uti decet colligendos, opus est, & nos miramur, & ultima mirabimur posteritas. Haec sunt enim verè, quae Principem exornant, quae conspicuum, & clarum reddunt, quae Regni aptum & Imperij. Quae quavis magna, praclarasq. sint, non in his tamen sunt oia, cum adhuc de Te, plura atq. majora suppetant, quare quidam Tibi, haud indecorum putasti, ad immortalem bellicae Tuæ virtutis gloriam, id quoq. laudis, quasi pro coronide pacate indolis accedere, nimirum inter armorum sonitus, tubarumq. clangores, aequè literas, ac arma tractantibus, multas, & non vulgaria Studia, quam libentissime praestitisse.

Et propter quam maximam submissionem, Te suppliciter rogo, ut ad Regium Solum Amplitudinis Tuæ, me pro volutum admittere, ne dedigneris, ut hoc, quod quidem est Operis, quod à nostrà tenuitate, profectum est, serenè fronte excipias, & clementer ignoscas. Res ipso est quidam memoria.



& Majestati Tuæ, sorte indigna. Ast etiã olim rebus minimis, rursus incolentes, Offensas Decorum placasse, notum satis. Argumentum tamen Operis, Tibi minime indecens, non quidem Reipublicæ, sed singulorum, qui partes ejus sunt, salutem spectans; de Herbarum, Stirpium, ac Plantarum cognitione agitur, quarum adeo multiplex sit varietas, & ferè inexplicabilis, tot odores, sapor, colores, quibus sensibus nostris blandiantur; tot figurarum elegantia, quibus intuitus oblectant, ut Natura ipsa, nos invitare videatur, ad eas contemplandas; Quod, Opusculo hoc Botanico, locupletissimis Stirpium exoticarum Iconibus, instructo, facillime faciamus. Præstantissimum, atq; adeo Te dignum est argumentum, Rex Sapientissime: Stirpium enim Contemplationi deditos, ob ingentem voluptatem, pariter & insignem quam secum trahit utilitatem, olim fuisse Reges, & Principes, hodieq; esse, extrã dubium est, ut veterum æquè celebratum monumentis, ac quotidiana, nullã succedentium sæculorum interrptione temerata, patet Historia. Illud autem primò me adduxit, ut Nijus tertiam, maximam, et extremam Phytographiæ Partem, de qua, quod Sapiens olim in genere, Rei finem meliorem esse Principio ejus, dicere ausim, omnium debitã submissione, Splendidissimo Nomini Tuo dedicarem, quod in Ipsã, exhibetur Materia, cujus studio, complures olim Imperatores, ac Reges sunt magnoperè delectati. Legimus, Regem omnium quotquot fuisse Sapientissimum, Salamonem, de Stirpibus scripsisse; Testantur Iubæ Mauritanie, Attali Pergamenorum, Mithridatis Pontis, Evacis Arabie Regum, de eadem Re Commentarij; ut mittam Agamemnonã, Masinissam, Archelaum, Herculem, aliosq; plurimos Viros, Majestate insignes; Rei herbaria peritissimos. Ideoq; eò libentius, id faciendum mihi proposui, quò certior sum, Majestatem Tuam, quoties à gravioribus Regnorum Tuorum Curis vacat, ex Plantarum lustratione, plurimum capere voluptatis: Hortorum amenitates adeo Serenitati Tuæ esse solet in delicijs, ut ausim, Artem Botanicam, suo quodam jure, singulariter ad Serenissimum Regem pertinere; Argumento sunt, Tuæ Aulae sumptuosissime apud Hamptonienses Viridaria, verè Regia, ad prodigium usq; insignia, & voluptatis, amenitatisq; gratiã parata, in quibus Temetsi reperis, nec credideris, Illa, vel India felicitate superari; is enim instruendis Stirpibus novis & exoticis, huc, non dico ex Gallia, aut Hispaniã, sed è Græciã, Syriã, Arabiã, Persiã, Ægypto, Barbariã, imò Ultimis tum Orientis, quam Occidentis Populis, India, & Americã, diversi generis Herba quotidie advchuntur, magno quidem sumptu, at majore cum gloriã, Aulae, & Urbis Tuæ, imò Orbis Universi salute.

Et hæc quidem, exemplo Romanorum Principum, hæud minus sibi gratulantium, ob raras peregrinis ex oris advectas Plantas, quam ob catenatam diversorum Regum ante Currus Triumphales seriem, Antiquorum etiam Regum ac Magnatum Corona, ac Diademata, ex Arboribus fuisse contexta, quibus se magis quam auro, quam gemmis, vel aliã quacumq; re pretiosiori, honoratos existimant. Triumphantium quoq; decus, Victoriarum gestamen, & in Sacris, ac Publicis certaminibus, præmiium, uti his Victores insignirentur, quod non Græciã tantum, sed et cujusq; alterius Regionis Illustres, ac Reges ipsi non detraxerunt; Gratum proinde, atq; jucundum, Tibi futurum spero hoc nostrum opusculum, quod totum Coronarium est, eo quòd Stirpes quam plurimas, novas, & inditas, eximie pulchritudinis, & elegantie, in Illo comprehensas, ex omni, ferè Terrarum Sinu, decerpisse curavimus, ut ubi Tibi semper concors Virtus, Trois præcinit Triumphos, Coronam Triumphalem, ex Floribus undiq; rarissimis, Imperatore Triumphanti hæud indignam nectamus: Has ob causas Potentissime Rex Augusto Nomini Tuo, hæc æcipita Botanices Pars offeritur; Quo cum exordiens, per totum versabitur Orbem, & Majestatem Tuam, inter Reges, et Principes cuiuscumq; Reipublicæ Mecenate, numerari valebit: Deus Opt. Max. Augustissime Rex, Majestatem Tuam, cum ex optatissima Tuã conjugè, Mariã 2.<sup>a</sup> Serenissimã nostrã Reginã, bonis artibus, præcipuè Botanicis, Nobis, Patriã, totiq; Orbi Christiano, diu servet incolumem, præclaroq; opera factibus jam incap-ta auspicijs, bene fortunat, Tuq; Nominis memoriam, gestarum, gerendarumq; rerum magnitudine, Sacram esse dignetur **ÆTERNITATI**, id aveo, id comprecor.

Sacratissima R. M. V. humillimus, et  
Obsequentissimus subditus, & Servus.

Leonardus Plukenetius.



## AD. STUDIOſOS. BOTANICOS.

Haec equidem paucas hâc die Vobis exhibemus Tabellas (benigni lectores) quae Ὑπόθεσις Βολωνικῆς Titulis & Iconibus. novâ supplectibile plenioribus q̄  
 Thesauris ditantur. Hoc enim Studium, ut ab incunte juvenitâ mihi cordi fuit, ita ad hunc usq̄ diem, prout Thema per juvenitatem nobis insensuit.  
 quod quidem τὸς θεοὺς ἐνεκεν planè divinum est. Itâ enim Veteres tam Hebraei, quàm Ethnici existimârunt; Isti, qui ut Deum τὸν  
 Opt. Max. πάντων ἐξέον δαήμεν merito Statuunt, itâ etiâ eidem Salutarem hanc & Scientiam acceptam ferunt; Hi, qui  
 Stirpium herbarumq̄ cognitionem ad ipsos Deos retulerunt, delictarum Inventores, divinis honoribus dignos consueverunt, imò ipsis  
 herbis quarum Deos Inventores opinati sunt, mutata ab ipsis nomina indiderunt. Et lucet enim in his omnibus Creatoris Majestas, Non  
 Thus neq̄ aliam victimam Antiqui, sed folia velut primam pubescentis Naturæ lanuginem, manibus decerptam Dijs adhibebant, quo  
 signo, Deum Creatorem testabantur, à quo Herbae, & quæcumq̄, in Terrâ, Orta sunt. Nec Stirpis ullius cognitionem, aut nomen contemnendum putes, dum  
 in his tam parvis, quanta diis, quàm inextricabilis perfectio, mirabilis enim in minimis est Natura, & dives. Hanc itaq̄, nostram Phytographiam tertiam Partem  
 Octingentas circiter reales, huc incognitas, & non omnino (aut alibi satis infeliciter) depictas, vel annotatas Plantas continentem, ab amicis nostris: Botanico-  
 philis toties expectatam excipite, suscipite inquam benigno & Sereno vultu, quoniam & varietate, & Novitate, Vos delectare mihi in animo fuit. Servantur autem  
 nobiscum adhuc plura, quæ si hæc placebunt, Vobis communicare etiâ brevi consuemus. Nec id agere ferendum spero, quòd in Novis, & inauditis Plantis, Voces  
 aliquando inusitatas usurpare cogimur, quòd eò libentius à me factum intelligatis, quoniam adronente Tullio, Aut Rerum novarum, nova faciendâ, aut  
 ex alijs transferenda Nomina, Inquirendum potius nâm legitima videatur Vocum sumptio, Note autem ipsæ, seu singulares animadversiones in Plantas, earum  
 Tesseræ, et Symbola genuina eis à Naturâ data, Conjugij ipsius Nominis, & Planta præcipua erunt Instrumenta, eòq̄ potiora quò magis peculiaribus,  
 & magis evidentibus signis, Collecta sunt. Neq̄ enim præcipua Naturæ Characteres obliterari facile que possunt, ac nostri, & juxta arbitrium vulgares  
 inditorum Nominum, qui facillimè ponuntur, & reponuntur, innovantur, alteruntur, dum isti, Rebus ipsis inherentes, eternum duraturo moment.  
 Harum igitur nostræ Appellationes si quibusdam minus arrideant, permittant quæso tales à Pluquentio Usurpare tantisper, donec magis apta  
 Nomina invenerint. Omnes deniq̄, hujus Facultatis cultores, & asseclas officiosissimè rogamus, ut ubi in his planè Novis, & Incognitis, quarum partes magis  
 essentielles, hucusq̄, nos latent, Nomina adscribendis, & ad proprias Classes relegandis, Nos lapsos animadvertent, amice & candidè moneant moniti, Ipsis  
 gratias agemus, errores nostros libentissimè agnosceremus, & emendabimus, imò si quid erroris non moniti, in dictis nostris animadvertent, ultro fale-  
 bimur; imitaturi Divinian nostrum Senem, qui (ut Celsi verbis utar) à Sutoris se deceptum esse memorie prodidit, more scilicet Magnorum Virorum, &  
 fiduciam Magnarum Rerum habentium, nâm levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt, Magna Ingenio, multaq̄, nihilo minus: habituro. Convoit  
 etiâ Simplex veri erroris Confessio, præcipueq̄, in eo ministerio, quod Utilitatis causa à Postoris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, quâ quis arte deceptus est.

Valete

Atq̄ hilari vultu frondenti tempora ramo

Cingite —

ex F. dib. nostr. ad Palatium  
 antiquum apud Westminster.  
 Anno à nato Mundi Sababre  
 MDCXCII.





Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 3.

TAB. CXXI. fig. 1. *Abies minor pectinatis folijs*. Virginiana, conis parvis, subrotundis. an Avezett & Ahochoetl. s. Tunpanum aqueum, *Abies Mexicana minor* Hernand. Hist. pag. 92.  
 2. *Abrotanum elatius subincanum*, folijs creberrimis secundum caulem in meta formam fastigiatis. an Abrotan. mas. trivido viridig folio, Lusitanicum. Parad. Batav. Prodr. 303.  
 3. *Acacia Maderaspatana* spinosa ramosior; cortice cinereo, ramulis plerumq; ex uno pediculo binis, aculeis brevioribus crassis.  
 4. *Acacia Maderaspatana* foliolis parvis, aculeis e regione binis pro grandibus horrida cortice cinereo.  
 5. *Acacia Maderaspatana* minuti spinis folijs, aculeis ferocibus alternis frondosa, cortice, itidem, cinereo.  
 6. *Acacia tenuifolia Maderaspatana*. spinis brevibus, recurvis, albicantibus cortice fusco. Hujus pinnulae nimis latae & obtuse punguntur; cetera studiose spinte celata. elegantior ejus ramulum in medio Tab. ulla seorsum pictum videat. an Mimosa arborea Javanens. spinos. tenuiss. pinnis. &c. Breyn. Pr. 2?








TAB. CXXII. *fi.* *Acacia Americana grandibus aculeis ad ramulorum exortum cornua bovina referentibus, siliqua rostrata.*  
*Acacia Americana cornigera, siliquis in spinam abeuntibus. Parad. Bat. Prodr. 303. Hoitmomaxalli. S.*  
*Arbor Cornigera Hernand. p. 86. Quercus Lusitanis. in Horto Regio Hamptoniensi collecta.*  
 2. *Acacia Maderaspatana spinosa pinnis veluti lunulatis scutioribus Myrti æmulis, nervis pinnularum ad unum latus, vergentibus, siliqua latâ an Sitsia Malabarorum H. Mal. Part. 6. Pag. 7.*  
 3. *Acacia Texanica minus spinosa, pinnularum costis, & caule, rufescente hirsutie, villosa in Hort Regio Hampton. anno retroacto, hujus ramulum collegimus.*  
 4. *Acacia forte cognatus e Maderaspatan Frutex Vitis Idææ Benzalensis, folijs, & ramulis alternis ad foliorum ortum spinis æquius asperatus. Hanc, & antepenultimam, cum elegantissimis Acaciarum speciebus, præcedenti Tabula enumeratis, necnon quamplurimis alijs Stirpibus novis, & exoticis quas nitide exsiccatas, & inter chartas repositas, a Fratris suo charissimo ex Orientali India sibi advectas habuit Ornatiſſimus & perhumanus Vir D. Carolus du Bois Londinensis Mercator celeberrimus et Hortoribus Cultor eximus, nobis ad excuspendum benignè concessit.*





Tab. CXXIII.  
 1. *Acacia Africana*, spinis candidantibus horrida, subrotundis folijs, odoratissima.  
 2. *Acacia Africana*, Abrua folijs, aculeata, spinis longissimis horrida. forte *Acacia Americana* spinosiss. floribus luteis, globosis, fructu leni, toroso, dulci, Breyn. Prodr. 2.  
 3. *Acacia Tavanica* non spinosa, folijs maximis, splendidibus. H. Bedum. Cadarvang - Indigenis dicta.  
 4. *Acer maximum* folijs trifidis, & quinquifidis, Virginianum. Negundo perperam dicta arbor, Virginiana Hort. Bedum. Ray. Hist.  
 5. Eiusd. Arboris folio quinquifidum, cum seminibus alatis, maturitatem adeptis.  
 6. *Adiantum Africanum*, Ruta murariae emulsum, secum tenuis longioribus acutis, ab amicissimo Vir. D. Patricio Adair. nobis communi.





Fig. 1. *Adiantum fruticos*. Bermudense, summis ramulis erectis, et in meta formam fastigiatis. a Peritissimo Botanico, D. Iacobo Petever habuimus.  
 2. *Adiantum fruticos*. American, summis ramulis resleccis et in Orbem expansis. *Adianth. Amer.* Cornuti de Pl. Canad. *Adianth. fruticos*. Braslian. CB Prodr. 150. varijs in Hortis circa Londinum.  
 3. *Adianth. Calomelanos* American. S. *Ad. nigr. fol. proñâ parte candidissimis. an Adianth. nigr. Americ. pulvere candidis. aspersum* Breyn. Cent. forte! Conambai-Miri S. Ad. Brasliam Species 2<sup>a</sup> Pison. p. 234. ex Insulis Imaicens. et Barbadenf. nobis advecta.  
 4. *Ad. Narbonense folijs longioribus, et acutioribus, pulverulentis, pediculo nigro.* Sch. Bot. Paris. munere D. Sherard accepimus.  
 5. *Ad. maritim. Segmentis angustioribus* Charibæarum. hujus exemplar, nobis Vir humanissimus D. Georgius London primò concessit.





1. *Adiant. S. Trichomanes Bermudense maxim. serratis folijs auriculatum. ex dono D. Petever accepimus.*  
 2. *Ad. Barbadense auriculatum, ramosum, segmentis crassioribus, minutissimè denticulatum.*  
 3. *Alcea pentacocos. Ranunculi auricomi folijs, et facie Maderas patensis. hujus ramulo superius laudatus Vir. D du Bois, munere nos ditavit.*  
 4. *Alsine Veronica affinis, Trisaginis folijs, et facie, Maderas patana.*  
 5. *Alsine Indica polyanthos tenuifolia è Maderas patan. hanc, ut et proximè præcedentem, à spectatissimo vir. et celeberrimo Botanico, D. Carolo du Bois accipi.*








Fig: 1.



Fig: 5.



Fig: 3.



Fig: 4.




Fig: 2.

S: Gribelin sculps.

Tab. CXXVI.  
 1. Alaternus Hysicanensis. s. Africana, Lauri serratæ odoratæ Stapelianæ folijs Cat. Hort. Beaumontian. pag. 3.  
 2. Alatern; Arbuti folijs lucidis, Promontory Bonæ Spei.  
 3. Alatern; sempervirens Africana, folijs lucidis spinosa. ē dicitur Cl. D. Herman.  
 4. Alcea fruticosa Pentaphylloides cœmula, floribus amœnissimè rubellis, calyce producto, è Maderaspatañ.  
 5. Alcea affinis Indica Abutilon dicta, flore flavo, folijs mollibus profundè venosis, siliculis lanuginosis. an Althœa Abutilon dicta Indica, flore luteo minori, Hort. Lugd. Anno da Zeylanensium.





Tab. CXXVII.  
 1. *Alcea moschata* villosissima folijs in profundiores laciniâs incisâs, ab honesto viro Iacobo Reede. ex Insula Barbados. allata est.  
 2. *Alcea Maderaspataria*, hastatis folijs glabris, pericarpio tantum villosa. e Collectaneis du Boisianis habuimus.  
 3. *Alcea cibaria*. s. *Corchorus Americana* Carpini folijs, sex luplici capsulâ longiore ornata. an *Corchorus Americanus minor*, Carpini folio, siliquâ angustiss. ex lateribus ranunculorum proveniente. Breyn. Prodr. 2. 36.  
 4. *Alcea olibarica*. s. *Corchorus Americana*, angusta, barbato folio, capsulâ strictiori.






Fig. 1.




Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 4.

S.G: sculps:

Tab. CXXVIII.

- 1. *Alni facie Americana* folijs non serratis. forte *Alni folio* & facie *Curassavica* P. B. P. 305.
- 2. *Alno affinis Americ. Ligustri folio*, fructu spicato, rubro. Breyn. Prodr. 2. *Manghala arbor Curassavica folijs Salignis* P. B. P. Frutex innominatus instar *Salicis pumilae folijs Salignis* Marcgr. p. 70. Ultramq. primum in *Comptoniano* deindè in *Horto Regio Hamptoniens.* observavimus.
- 3. *Alsine Maderaspātana Gallij folijs*, flosculis communi pediculo ternis. ab *Alsine procumbente Gallij facie Africana* Cl. Hermannii plurimum differt.
- 4. *Alsine Caryophylloides Africana*, radice magnā *Astragalite.* ex *Codice Comptoniano.*






Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.

S. Gribelin sculps.

Tab. CXXIX  
 1. Aloe Africana vulgaris similis floribus rubris, & paucioribus, e Dieterijs Cl. D. Herman.  
 2. Aloe Africana folijs erectis, superficie spinosis.  
 3. Aloe caulescens folijs reflexis, margine spinosis Africana.  
 4. Aloe spinosa, arborescens, ramosa, Promontory Bonae Spei. Harum omnium picturas, curiosissime delineatas, & ipso Promontorio vivis coloribus illustratas, Nobilissimi atq; Reverendiss. acmodum Henrici Episcopi Londinensis gratia, ad excuspendu impetravimus.







Tab. CXXX.  
 fig. 1. *Alsine Indica* Glauca maritima folio, flosculis ex alis longo pedunculo innixis. ab *Alsines* fluviatilis  
 Tabernamontani folijs, haud multum abluat.  
 2. *Alsine* veronicae affinis, *Gratiola* folijs Maderaspata.  
 3. *Alsine* holostea glabra, s. *Gramen* *Leucanthemum* Ind. Orient. *Anagallidis* aequalis. quarta Lob. folijs angustioribus.  
 4. *Alsine* holostea glabra, sive *Gram.* *Leucanth.* Indice Orientalis folio brevi.  
 5. *Alsine* Indica quadrisolia & quinq. folia. flosculis longiori pediculo insidentibus.  
 6. *Alsine* Holostea villosa folijs caulem ambientibus multiflora e Maderaspata. Omnes has novas *Alsinarum* species  
 a nunquam satis laudato viro D. Carolo du Bois saepius in his nostris Exoticorum Tabellis nominando accipiebam.  
 Hinc ultimus Schaefferi in pulvis W.M. P. 10. propius accitro videtur.





Fig. 2.




Fig. 1.



Fig. 4.



Fig. 3.

Tab. CXXXI

- fig 1 *Althæa arborescens* Americana amplissimis *Verbasci* folijs crassis & incanis, an *Althæa Americana* fl. luteo spicato lanuginosa major ex *Insulâ Curacao* Breyn Prodr. 2.  
 2 *Althæa Maderaspatana* subrotundo folio molli, & hirsuta, multipulis sive seminibus ad apicem crinitis nobis communiavit Spectatis. Vir D. Carolus du Bois.  
 3 *Althæa Brasiliensis* frutescens inamato flore *Jagopyris* emine PBP. *Alth. Brasilian* Pisonis.  
 4 *Althæa Americana* incana frutescens flore coccineo *Paradis Batav.* Prodr. in *Horto Aulæ Regis nostri* Lond. celeberrimo *Hamptoniens.* cum proxime precedenti sæpius Observavimus.






Fig: 3.

Fig: 4.

Fig: 2.

Fig: 5.

Fig: 1.

Fig: 6.

S. Gribelin. sculpsit.

Tab. CXXXIII.  
 1. *Amaranthioides humile* Maderasp. capitulis candidantibus, folio molli.  
 2. *Amaranthioid. Indicum*, globosum, ad caulum nodos floridum, folijs Solitarijs, summo apice barbatis.  
 3. *Amaranthioid. Indicum*, verticillatum, *Parietariae* hirsutis folijs, spinosum.  
 4. *Anchusa angustifolia* verticillis, longis, aculeis, armata, e Maderaspalan. Haec quatuor postea mihi, ex Plantis siccis liberalitate humanis. Viri D. Caroli du Bois, nobis Communicatae.  
 5. *Anagyris Africana*, angustis siliquis, flore caeruleo.  
 6. *Anagyris* flore luteo, angustis siliquis, Africana; e Curiosissimo Codice Comptoniano Reverendiss. Dom. Henrici Londinensis Episcopi favore, in nostras Tabellas translata.





Fig. 2.



Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 4.

S. Gribelin. sculps.

Tab. CXXXIV.

fig. 1. *Angelica montana* max. flosculis candidantib; ad caulum no do; umbellifera, fortè *Archangelica* I B. Dod. Clus. an *Ligusticum* quor undam folijs *Angelicae* ejusd I B. Schol. Botan. *Angelica Alpina* ad singulos no do; florida Flor. Batav. huic etiam referendam puto *Angelicam Silesiacam* max. s. *Archangelicam* Shwenckfeldy. Cat. Pl. Siles.  
 2. *Anona Indica latifol.* fructu squamato aspero seminibus ex flavo nigricantibus turgida, *Araticu = ape Brasiliensium* Pisonis. *Anona American.* sylvestr. folijs & fructu maximis P B P. fortè etiam *Fructus i. Garth.* s. *Aratacou* Clus. exot. Soortsack. *Belgarum.* Nostratibus colonis Sowers op nuncupata fortè *Guana = bana Nierenbergij.* p. 331.  
 3. *Anona Indica* fructu ex viridi & luteo cortice squamato aspero nucleis nigricantibus parvis. *Pyrò* similis fructus alter in novâ Hispaniâ C B P. *Guanabanus* Oviedi. fructu squamato I B. *Anona Curassavica* fructu dulci P B P. Honig. appel. *Belgarum.* *Sappa* quibusd. *Sugar apple & Sweetsop.* Nostratibus vulgò.  
 4. *Anona Indica* angustif. fructu caeruleo cortice squamato glabro. *Anona marcan* Kott. Malab. *Ahate de Panuco* vel *Ate Pannicensis* Terenty Not in Rec. *Anon* Oviedi. His partus *Mangier blanco Custard apple* Nostratib; dicta *Supin* fructu purpur. *Sinarum* Mich. *Boym* Flor. *Sinens.*








Fig. 1.





Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 5.

S. G. sculps.

Tab. CXXXV.

fig. 1. Anon. Americ. juxta Fluviorum ripas innascens pyriformi fructu Sarcodias muria conditas olente, semine ampliori pallido: forte Anona Americ. folio splendente ex Vera Crucē PBP. Nostratib; Anchovie & River Pear vocata: forte Araticu pana Pison. item Pyro similis fructus in Nova Hispan. nucleo magno CBP.  
 2. Anona Indica fructu conoide viridis, quavis deluti aculeato. Atamaram Hort. Malab. Araticu ponhe Marcogr. & Pison. forte diam Yata Sinensib; Boymy. Fl. Sin. Nostratib; Colonis the Prickley apple vulgò nuncupatur.  
 3. Anona (forte) Ind. Orient. fol. obl. & adverso binis plurimis, conspicuis venis in parallelas secundum latitudinem venuste discurrentibus. ejusd. Arboris folium (utro bis existimamus) & America delatum ad pingi nos curavimus: forte Mangaba Brasiliensium Pison. & satis proprie nominari possit. Anona Nutriusq; Indiae lavis, fructu Oviali aureo. parte soli obversa rubris punctis insignito.  
 4. Anonis non spinosa Cretica flore purpureo Hort. Patav.  
 5. Anonis lutea mitis oxytriphyllo, ad florum pediculos capreolata, folijs laevissimè serratis & Horto Patav. v. 110.



TAB. CXXXVI.




Fig: 1.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

S: Gribelin. sculps.

Tab. CXXXVI.

- Fig. 1. *Antholisthos* *Convolvulaceae* American; Barbadosibus Colonis Wilde Slip-blossomem nuncupatur. forte *Convolvuli* Species Americana floribus <sup>deciduis</sup> è Calyce cito.
2. *Anonymos* *Lijariæ* foliis Orientalis, Gallij luteifloræ, Herba capsularis verticillata. à D. du Bois habui.
3. *Anonymos* baccifera verticillata foliis molli & incano ex Americâ. hujus baccæ sunt lacte rubentes & quasi murice tinctæ.
4. *Anonymos* Americi. foliis *Parietariæ* scabris, floribus albis ad foliorum ortum vix conspicuis. Fœnugræci flore *Parietariæ* folio Planta Americana P. B. P. à n. Kali genus Americanum.






Tab. CXXXVII.  
 1. *Antirrhinum Saxatile* fol. Serpylli CBP. quod in Prodromo describitur.  
 2. *Apocynum scandens* Scammoniae Mospeliaca folijs Curasavicum ex Hort. Reg. Hamploniens.  
 3. *Apocyn. incanum* Scandens Maderaspitanum *Viola maritima* folijs, floribus purpureis.  
 4. *Apocyn. scandens* Americ. Corvolvuli minoris folio caule hirsuto. Apocyn. Americ. *Nummularia* folijs quibusdam.  
 5. *Apoc. Portoricense* frutesc. fol. crassis. hastae cuspidi similibus Hort. Bedumond *Tithymalus* Portoricens. fol. crassis. hastae cuspidi similibus PBP. in HRH. collegimus.  
 6. *Apoc. tuberos. angustif.* erectum flore ex luteo virescente folliculis pubescentibus Africanum. ē Cod. Comptoriano.  
 7. *Apoc. scorodoni* s. *Arbor Americana* triphylla Allij odore poma ferens. Arbor Americ. trifoliata porrifera seminibus reniformibus Hort. Bedumond  
*Therebinthus* *Verace* crucis latissimo folio, *Arach. vulgo* PBP. *Arach. Synnaron* (i.e) *Aurantium* sive *Indigenis* audit. an Nyroala HM. part. 3. & *Tapia* Marogy.

S. Gribelin sculpsit



TAB. CXXXVIII.



S. G. sculps.

Tab. CXXXVIII.

fig. 1. *Aphyllon aquaticum* Virginianense petraeum D. Barister.

2. *Apocyn. rectum* elatius, *Salicis* angusto fol. immaculatis; flosculis in umbellam, foliis pilosis. an *Apoc. Mysicanense* erect. *Salicis* folijs angustiorib; florib; <sup>Bearmant.</sup>

3. *Apocyn. erect.* *Salicis* latiori folio Umbellatum, florib; aurantijs. an *Apoc. Mysicanens.* erect. *Salicis* folijs latiorib; Hort. Beaum. *Apoc. Curass-*

*-avici.* fibrosâ radice florib; Aurantijs; *Chamaenerij* folijs latiorib; P. B. P. Hujus, ut et precedentis ramuli floribus ornatum Cl. Vir. et olim <sup>inuaas</sup>

Condiscipulus noster D. W. Dal. L. D. ex ejus Horto omnium stirpium exotiarum varietate, & copia instructissimo collectum, nobis amice suric commu.

4. *Apocyn. scandens* radice tuberosâ Promontorij Bon. Spei. è Cod. Comploniâno.








Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 7.

Fig. 5.

Fig. 2.


Fig. 6.

S: G. sculps.

Tab. CXXXIX.  
 1. Apocyn. Afric. tuberosum latiore folio erectum foliiculis hirsutis flore pallide puniceo. e Codice Comptonian.  
 2. Apocyn. Curassav. triphyllum flosculis albis PBP. in Hort. Reg. Hampton.  
 3. Arbor Virginiana Pisaminis foliobaccata Benzoinum redolens. forte Balsamum ex Perù IB. tom. 1. an Benzoinum cuius Arbor folio citri ejusd. IB Benzoinifera, aut Arbor Benecifera Garcia. Horti Comptoniani est singulare Ornamentum.  
 4. E jusd. ramulus sub Vernitempore exortum flosculis hexapetalis musconis ex luteo dividentibus; plurimis simul ad foliorum ortum onustus; quos succedat bacca mo.  
 5. Arbuscula Indica siliquosa Coryli folij parvis, serratis, summâ parte innuatis. an Uxana P. Amman. Charact. Pl. Karim Tagera HM. part. 6.  
 6. Arbor Americ. baccifera Myrtifolia a viminalibus virgibus. Flagellifera major. Barbadosibus Rodwood dicta.  
 7. Eadem longius muronatis. s. cuspidatis & punctatis folijs. s. Flagellifera minor.



TAB. CXL.



S.G. sculps.

Tab. CXL.  
 fig 1. Arbor Bisnagarica Myrti amplioribus fol. per siccitatem nigris Cubebae sapore. an Myrtidaru Hippocratis; forte Comacum Antiquor. non. s.  
 Cumuc Iavanensibus modernis, quo nomine & Cubebae ab ijs insigniuntur.  
 2. Arbor Orientalis baccifera laurifolij crassis & densioribus siccitatem atronitentibus quasi Vernicetinis polyperone. an Perin Parid Hort. Malab. P. 5  
 3. Arbor Americ. pinnatis fraxina folijs fructu reniformi Phaseolum exprimente Spanish Ashe (i.e) Ormus Hispanica Barbadosibus nostratibus dicta; est Balsamifera a forte, an Hoitziloxitl Mexicenisibus Hernand. p. 51.  
 4. Avoor Americanabaccata, cujus baccae Crapulariae (i.e) Tipple Berrys Barbadosibus; audiunt; eo (forte) quod in potu aliquandiu infusa crapulam inducunt.





Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

S. Gribelin sculps.

Tab. CXLI.  
 fig. 1. Arbuscula viscosa Elaeagnifolij late diversibus Americana tricoeca; ab alijs Rivini fructu Arbuscula Bermudens. folijs longioribus biscois Nostr. abbus  
 Colonis Broom nuncupata; an Saponaria tricoeca minor Americana.  
 2. Arbor siliquisera Faginis fol. Americ. fl. comos. an Arbor Sinus S. Angustini Fagi species quae fructum Fabis similem fert. I. onst. Dendr. olog. p. 209  
 forte etiam Frutex innotinatus ligno saligno, folijs ad Myrti folia accedentib; ; sed longemajoribus Mar. egr. p. 82. Spanish Oak  
 (ie) Quercus Hispanica Barbadosibus dicta.  
 3. Arbor Americ. lentisifolij ferenda an Holoquo huil. s. Arbor Chilli Mexicensium, Hernand. p. 50 Fustick wood Nevisensis perperam dicta.  
 4. Arbuscula Arbusti alatis folijs Africana, forte Tamboloris Park. p. 163 6. hujus exemplar apud Promontorium Bon. Sp. collectum singulari omnia  
 nobis communicavit Ornatis. nec non Clariss. Vir D. Patricius Adair. Medicinae & Chirurgiae facultatibus exercitatus. an Carandas  
 Garcia CBP 4. 50. Azuba Orted. &c.



TAB. CXLII.




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

S. Gribelin sculps.

Tab. CXLII.  
 1. Arbor Conchifolia Ind. Orient. comantib; floribus, et ferè Corymbosis. an Arbor Laurifolia Chinesis Martiny.  
 2. Arbor Indica Mali aurantiae folijs obtusioribus è Maderaspalen. an Akarà Putjolla Hort. Malab. p. 5.  
 3. Arbor Americ. Oleomelliflua cuspidatis folijs crenatis, & dilute virerentib; polypyrene. Wilde Honey-Tree (ie) Agriomelidendros Barbadiensib; dicta; eò (forte) quòd in hujus Arboris ramos, sylvestres Apes pro mellificijs suis, favos construunt. an Miatzontel Carnumia adtl. Nov. Hisp Recch. p. 333.  
 4. Arbor Americ. Mancinello dicta, fructu Pomòdanchato, nucleis septoris & pluribus in Ossiculo muricato, totidem loculis dispersito inclusis. Martynel Ligonis. nostri in Hist. Barbadi. p. 68. an Arbor venenata fructum ferens pile magnitudine visu speciosum sed venenatum Thevet. Hist. Lugd. 1784. forte. In glandis ferè facie, Fructus exoticus sulcatus tuberosus IB. t. 1. l. 3. p. 399. forte etiã Fructus peregrin; orbicularis novem nervis. distinctus minor cum Ossiculo an guboso ejusd. IB. Fructus Orbicularis minor novemdenis. ut et serriem distinctus CBP. Fructus Orbicularis peregrinus 2<sup>us</sup> nervis distinctus Clus exot. lib. 2. cap. 10.





TAB CXLIII



Tab. CXLIII.

fig. 1. Arbucula Maderaspata. Ligustri-facie Visci arboris color ex. consistentia; an Coddam-pulle Hort. Malab. P. 1.


2. Arbor Bisnagarica Tilia folijs Conschi Malabarica aliquatenus accedens.

3. Arbucula Vetadagu Malabarica similiti e Maderaspata.

4. Arbor Maderasp. Galatoxyli Americani foliorum amula. forte Tijola Malabarensium Hort. Malab. P. 3.


5. Arbor Tavarica Persica folijs Herm. Cat. Mss. e Maderaspata. forte Curutu-pala Hort. Malab. P. 1. an Arbor Indica Mali Persie folio Hort. Beaumont. p. 10.





Tab. CXLIV.  
 1. Arbor Siriamensis Lauri densiorib; fol. quinis ab uno exortu prodeuntib; hujus ramulum humanissim; vir D. Geo. London nobis amice communicavit, qui a Reverendiss. viro D. de Maxeas Hagæ Comiti in Hollandia, rerum Botanicarum æstimatore insigni, cum alijs quamplurimis resicatis plantis Siamensibus adhuc incognitis accipiebat.  
 2. Arbor Inga Brasilianæ folijs Africanæ tricoctosi; <sup>fructu</sup> Mehenbethone Cortusi Clusio accedente ex Codice Comptoniano.  
 3. Arbor venenata Lysimachia lutea in modum trifoliata. àn Tangaracas. Pison. pag. 301.  
 4. Arbuscula Barbaderis Cisti folijs ferrugineis, hirsutis, circa caulem adnatis valla confertis.





Tab. CXLV.

Fig. 1. Arbor Americana alatis folijs succo lacteo venenata (forte) Ahoay-miri Pison p. 308.

2. Arbor lactescens aculeata folijs Quercinis Americana. Bdellifera (forte) s. Arbor Bdellium ferens in America. Arbuscula Portoricensis lactescens folijs Quercinis, spinis geminis ad singulorum foliorum ortum exasperata Hort. Bedumont. Quercinis folijs Arbuscula spinosa lactescens Portoricensis PBP.

3. Arbor aculeata Barbados Insulae ramulis incurvis scenam topiariam efformans Lactarymifera. forte Arbor Stactofluus, s. Myrica liquidam fundens Americana. Nostratibus Colonis Weeping Bower nuncupata.

4. Arbuscula Barbadosensis amplexi caulistriphylla. Malabarica folijs inferioribus et petiolis alatis.

S.G. sculps.





Fig: 1




Fig: 2




Fig: 3

S. G. sculps

Tab. CXLVI.

Fig. 1. Arbor Americana convolvulacea Broad-leaf (ie) Platyphyllos Barbadosib; dicta; folijs serratis.

2. Arbusculum Americartum amplexicaule Cerasi folio corymbosum.


3. Arbuscula volubilis Americana subrotundis Cassiae fistulae folijs late dividentibus. Barbados Insula in sepibus frequens. an Colubrinum lignum 3<sup>m</sup>. Garciae folijs Lentisci IB. an Lauri facie Cas. asaviia volubilis fructu Mori radice crocea &c. Hort. Beaum. Rubi vel Mori fructu Americana Arbor folijs Laurinis Morillie dulgo PBP. hujus ramulorum ex Insula Barbadosi modo cum alijs compluribus exsicatis Plantis ab honesto divo Jacobo Reede in Angliam primo allatum Observavimus.








Tab. CXLVII.  
 fig. 1. Arbor Maderaspatisium Pavette s. Malle-amotho Malabarorum & Vasaveki quorund. haud abluens; folijs autem alternis. an Arbor Malabarensium fructu Lentisci C. B. P. & Poh. Nieuhof. Itiner. fol. 767.  
 2. Arbor Indica Tsjocalli Malabarensium haud abrimilis e Maderaspatis folijs autem non crenatis.  
 3. Arbor Indica Mali Medica amplioribus folijs Maderaspatisana; forte Ponna s. Ponnam aram Hort. Malab. P. 4. cujus Lacryma resinosa, an sit species Gulta Gambi quaritur a Cornelino in Not.  
 4. Arbor Americana teneriori folio floribus circa raculos veluti corymbosis. ex Insula Jamaicensi.  
 5. Arbor Jamaicensis densiori Tilia folio triphyllis, floribus Coactis s. spissius dispositis  
 6. Arbor Americana triphylla, numerosis staminibus purpureis apicibus praeditis floribus umbellatis. occupantibus. huius forte spectat Nyrrala Hort. Malab. P. 3.





Tab. CXLVIII.

- Fig. 1. Arbor spinosa rigidioribus Fraxinella fol. in aculeum abeuntibus Maderaspatica.
- 2. Arbor Indica Lauro-cerasifolia ē Maderaspatica. forte Kopang arbor Novānglicana antiarthritica PBP.
- 3. Arbuscula Ind. Orient. hexaphylla flosculis exiguis in spicam positis folio teneriori.
- 4. Arbuscula Ind. Orient. hexaphylla folijs firmioribus, spicatis floribus, calyce amplo.
- 5. Aristolochia Pistorochia s. Serpentaria Virginiana caule nodoso D. Banister Cat. Mss.
- 6. Arum humile Arisarum dictum Virginiense triphyllum. an Arum triphyllum humiliter et minus Parad. Bat. Pr.





Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

- Tab. CXLIX.  
 1. *Arum polyphyllum* *Dracunculus* & *Serpentaria dictum* *Sirinamense* caule atro-rubente glabro & eleganter variegato. Hort. Bedum. an *Arum polyphyll.*  
*Dracontium* et *Serpentaria dictum* folio ramoso *Paeonia* instar caule levi. Par ad. Bat. Prod.  
 2. *Arum minus* *Sagittaria folijs* ex Insula Barbados. an *Arum minus* *Zeylanicum* *Sagittaria folijs* PBP. forte etiam *Arum montanum* Pro sp. Alpin. exot. p. 335.  
 3. *Asperula* forte congener *Planta peregrina*; *Flujus picturam Illustrissimi Comitis Portlandi* de favore, ex Codice suo plus in rariorum & exoticarum  
*Plantarum* Iconibus divinis coloribus elegantissime marcupicari instructo accepimus.  
 4. *Aster Coryzoides* Ind. Orient. ramosior cauliculis sparsis.  
 5. *Aster Sirinamensis* subrotundis folijs integris larugine obductis; sub nomine *Tea ad humanissimum virum D<sup>nu</sup> Georgium Landon* primo missus est.  
 6. *Auricula Ursi montana* angustis & leviter crenatis folijs floribus purpureis. in Horto Patavino collecta.





Fig. 1.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

Tab. CL.  
 fig. 1. *Bellis ramosa Umbellifera* Cornubi. *Bellis major ramosa Umbellifera Americana* Park. semina fert longa, minimè papposa, utiurg, Cl.  
 Morisonus flores in pappo abire scribat in Prælud.  
 2. *Bellis Myrtifolia* humilis, caudiculo ad florem folioso. Promont. Bon. Spei. ex Codice Comploniâno.  
 3. *Betonica Virginiana* elatior *Scrophularia* a folio flore ochroleuo Hort. Oxoniens. *Betonica*. max. *Scrophularia* fol. flore lutes pallescente Sch. Bot.  
 4. *Betonica Alpina* latifolia major villosa flore luteo Hort. Reg. Par.  
 5. *Betonica arbor Maderaspatensis* villosa folijs profunde venosis. a D. du Bois habui.  
 6. Eadem a seminibus ex Insulâ Barbados allatis, in Horto Reg. Hampt. <sup>anno præterito</sup> nata.



Several lines of extremely faint, illegible text are visible at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side or a very light print.





Tab. CLI.

fig. 1. *Betula arbor Americana*, seminibus *Lithospermifrustracei* conulis. Birch-Tree Barbadosibus dicta.

2. *Bistorta media* folio minus rugoso IB. *Bistorta major* radice magis intorta CBP. *Bistorta magis intorta* radice Park.

3. *Blitum erectum* Barbadosense megasporon. an Cararū Brasilensium Pison. p. 243. Wylde-Spinach Nostratibus nuncupata.

4. *Bryonia Americana* fructu acido Cerasiparvi magnitudinis tetrapyrrenedonato, Barbadosibus nostratibus, Poyson-Wythe vocata. in Hort. Reg. Hamptoniens.

5. *Bryonia Africana* folijs Lupuli scabris, in Horto Comptoniano ex seminibus a Cl. Hermannno transmissis, enatarum, conspeximus.





Tab. CLII.  
 fig. 1. *Bryonia Sideritidis* folio multiplici, dispermo, flore caeruleo. Prom. Bon. Spei.  
 2. *Bryonoides trifoliatum* Indicum folijs succulentis, crassis, & crenatis. an *Bryonia* Curasavie. folio dentato crasso et succoso caule PBP. Append.  
 forte *Trifoliata* Portoricensis. Planta capreo lata folijs crassiusculis serratis. Hort. Beaumont. p. 45. in Hort. Reg. Hampt. succrescit.  
 3. *Bucanephyllon elatius* Virginianum. s. *Cimonio* congeneris altera species elatior. folijs triplo longioribus.  
 4. *Calabura alba* PBP. forte *Sebestena* similis Americana ejusd PBP.  
 5. *Campanula Alpina Sphaerocephalos* CBP. *Trachelium* majore pet. cao Pona simile, si non idem IB. t. 2. *Trachelium* majus pet. caum Pona. Descript. Mont. Baldi.  
 6. *Campanula Sphaerocephalos* pervenusta foliorum ad oras insigniter denticulata. forte *Campanula Alp. Sphaeroceph. caerulea*, magno  
 flore Schol. Botan. 76. hac elegantiss. *Campanularum* specie D<sup>r</sup>. Doody nos ditavit.





S. G. sculps:

Tab. CLIII.  
 1. *Catalpa Africana* Promont. Bon. Spei. ab amicissimo viro D<sup>no</sup> Doody communicata.  
 2. *Calamintha montana* longiorifolia, glabra, floribus pallide violaceis. Mentastrium glabrū. florib; violaceis Hort. Bles. an *Mentha sylvestris* longioribus, nigrioribus, & minoribus incanis folijs. C B P.  
 3. *Campanula hirsuta* folio angusto tenuiter serrato, florib; parvis spicatis, forte *Trachelium altissim.* hirsutum, asperius, folijs angustis, florib; parvis.  
 4. *Campanula minor* hirsuta, *Draba* folio. an *Campanula Draba minoris* folio C B P.  
 5. *Campanula hirsuta* *Bellidis* folio, forte *Trachelium parvum* folio *Bellidis* subrotundo Ray. Cat. Stirp. Exter.  
 6. *Campanula Alpina* asperius, folijs *Echij*, flore magno villosa. *Rapunculus* (forte) *montanus* folijs *Anchusæ* Moris. Hist. Pl. part. 2. *Rapunculus montan;* s. *Trachelium montan.* IB. tom. 2. forte etiam *Campanula minor* folijs *Succisæ* flore magno Ray. Hist. Pl.  
 7. *Carappa arbor* ex *Curafravia* P B P. inter exsiccatas in America collectas inscriptione *Sideroxyli* aliquando conspeximus. Hort. Reg. Hamp. alumna.





Tab. CLIV.  
 1. *Carduo - Cirsium alpinum* *Carlina vulgaris*, foliis & caule alato, spinis rigidioribus armatis. an *Carduus* dictus *Cirsium*, folio laciniato nigrius, & idem cum *Asphodeli* radicibus bulbosis I. B. tom. 3. hujus exemplar inos ditavit D. S. Herard.  
 2. *Carduo - Cirsium* maximè profunde laciniatum in folior. ambitu spinis mollibus hirtum. an *Carduus* *pratensis* folijs tenuibus laciniatis CBF. *Erisithales* Pliny. Hist. Lugd. nostri tamèn fls. non lutei: et, sed purpurei.  
 3. *Carduo - Cirsium* minus, Cambrò britannicum, floribus plurimis summo caule Coadgestis. *Cirsium* humile, montanum, *Cynoglossi* folio polyanthemum. Raj. Synops. 53. an *Carduus* mollis folio *Lepathi*. Clus. Hist.  
 4. *Carduo - Cirsium* minus, angustifol. capitulis plurimis amplioribus sparsis, Madra spatum.  
 5. *Carduus* tomentosus *Acanthium* dictus Arabicus. Hort. Oxon.  
 6. *Carlina* *Chrysanthemos*, Africana humilis ex Codice Compton. fortè *Carlina* *Chrysanthemoides*, flore lutea Capit. Bon. Spec. Bryn. Prod. 2.








S. Gribelin. sculpsit.

Tab. CLV.  
 Fig. 1. Caryophyllus aromaticus Ind. Or. fructu clavato, monopylene. Caryophylli aromatici fructu oblongo CBP. Caryophylli Indii 1 B. tom. 7. Thinka Maluc-  
 -censium Pison. Mant. Ar. om. hujus fructus, maturus & tumidus Medici & Pharmacopoli. Caryophyllus nuncupatur, qui in Ar. borea romanensis in seq-  
 uente anno, sponte cadit, usq. lan. quiescente licet di. aromatica, in pretio habetur, et loco seminis Plantationi dicitur; et tunc Matron fructuum vulgo appellat.  
 2. Caryophyllus aromaticus Americanus, folio & fructu oblongo polypyrene, acinis angulosis lvarum vinaceis similibus, forle Aushiba-  
 Brasiiliensium Pison. Laurus odorata Ligotus. Sweet. Bay Barbadiensibus dicta.  
 3. Caryoph. aromatic. Ind. Occid. folijs, & fructu rotundis, dipyrone, seminis ferè orbiculatis planis. Caryophyllon Plinij CBP. Amomum quorundam  
 odore Caryophylli. 1 B. tom. 2. Amomum aliud quorund. & Caryophyllon Plinij. Clusio suspicatum Park. Louxochill. s. Piper Tavasari Fr. Hernandez. p. 30. Piper  
 odoratum Tamaiensis Nostratib; Ray Hist. America de Chara Hispani Fr. Redi Exp. Nat. 168. Caryophylli folio et fructu rotundo Breyer Prod. 2. Alipice Barbadiensis  
 4. Caryoph. aromal. Americ. Lauri acuminatis folijs, fructu orbiculari. Myrtus arbor ea folijs Laurinis aromatica. D. Sloane; forle ytu iperquid  
 s. Laurus Mechuacanus Fr. Hernandez. od. America u. Jamaica Pepper Nostratibus nuncupata; hanc aulem ab Iconas loandria apud  
 Transact. Philsoph. exhibitâ depingi nos curavimus, ut ob oculos exposita, diversitas facilius delectet.  
 5. Caryophyllus Regius.





*Carya*

Fig: 1

Fig: 2

pp

Fig: 3

Fig: 4

S. G. sculps:

Tab. CLVI.  
 1. *Carpinus Virginiana* flore cens. *Fagus* flore cens. *Virginiana* *Carpini* folij; Hort. Bedum. ex seminib; a D. Barist. e Virg. transmissi. in Horto. Comp. copiose.  
 2. *Castanea Americana* folijs a versâ parte, argenteâ lanugine villons. an *Leucoma* Park. 1638. *Castanea Nova Angliæ* Mus. Soc. Reg. a *Castanea pumila* racemoso fructu parvo, in singulis capsulis echinatis unis. D. Barist. the Chinquapin-bush. Virginienibus nostrâ sententiâ plurimum differt.  
 3. *Lenchramidea* arbor piluliferâ fructu tuberculis inæquali, ex granulis coniformibus; in orbem glomerato, non capsulari. forte. Yez. amall, s. *Papyrus novacularis* Nieremberg. 360. forte etiâ *Gaivimâ* arbor quid. 295.  
 4. *Lenchramidea* loti arboris folio, capsulari fructu ordiæco, parvo, orbiculi, compr. glo, quâq; foriâ d.ovo, granulis Ficuum: similibus refero. forte *Amata* quill, s. *Uredo papyracea*, Nieremberg. 360. *Barbadensis* Bastard-Cedar (ie) *Cedrus* *puria* vulgò *nurcupator*.






Fig: 2

Fig: 3

Fig: 7

Fig: 4


Fig: 5

Fig: 6

S. Gribelin. sculp.

Tab. CLVII.  
 fig: 1. Cedrus Barbadoensis alatis Fr. axini folijs, d. venatis, fructu singulari, quinis, in obliquis crassis, validis, cochleato-cavis, totidem semina membranis  
 adhaerentibus, et Cochlearia canaliculata, pentagona, praegrandi adnata, oculudentibus, ornata.  
 2. Conchitamidea arbor Saxi adhaerens, obrotundo, pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capsulas, granula Ficiferae, Stylo Columnaris, hexagono, praeduro  
 adhaerentibus, contentis, diviso, Balsamum fundens, an Pitahaya, quae Saxorum Scissuris nascitur. Nicotiana g. 326. forte Amatorica. s. Papyrus lutea, s.  
 Tepamall, Sycomorvis Saxatilis Mexiceni sum. Hernand. apud Recch. 83. quae adhaeret Saxi non medio criteri spectando miraculo, (ut ipse loquitur) an  
 hujus sit Baddly fructus apud Lob. Icon part. 2. Balsom Apple (ie) Melo balsamum Barbadosibus bulgo. in Florulan Regium Hampton. cura  
 et industria Jacobi Reede, hujus arbor bipedalis, cum frustulo per q. cui adnascitur, nusq. invecita est.  
 3. Cerasus Africana raemoso fructu rubro, ab h. pediculis alio longioris, s. saliori. ex Codice Comptoniano.  
 4. Ceras. Americ. Myrti conjugatis fol. fructu acer b. h. trappo. an Ceras. Curasav. fructu drappo. Prudigenis Simmergucke Hort. Bedum. Sower. Cherry Barbadosibus dicta.  
 5. Ceras. Afric. fructu carilloo & Codice Compton. forte Cambui Brasilent. s. Myrtus Americana sylvestr. Pison. Lambui. Parrambucens. arbor etc. ion. s.  
 Dendrograph. Black Cherry (ie) Cerasus nigra. Barbadosibus dicta.  
 6. Ceraso affinis C.B.P. Mahalt Mallicoli, Hist. Lugd. et Aliorum.





Tab. CLVIII.  
 1. *Cerasus Americana rugosa*, folijs fructu viscoso. àn Copalcochitl Tepeacensium de Lælio. Ind. Occid. lib. 5. Copalcochotl, s. Arbor gummosa. Pruniformis Hernand. lib. 3. Barbadosibus Clammy-Cherry vocatur.  
 2. *Ceras. Africana* fol. plerumq. in summo sinuatis; fructu rubro, ex Codice Comptoniano.  
 3. *Ceras. Afric.* fructu rubro multiplici, folio longiori angusto. forte Carnubi Paruambucens. frutescens Jonst. Dendr. 243. item Capolin Mexicenisibus. *Cerasus dulcis* Indis Nieremberg. quoad Iconem 344.  
 4. *Ceras. racemosa* folijs Amygdalinis Americana. Capolin Nieremberg. quoad Descript. 349. Copalin. s. *Cerasus dulcis* Indica Hernand. pag. 95. Cluster-Cherry Barbadosibus dicta.  
 5. *Cerasus Africana*, fructu rubro, simplicis, folio brevioris, mono-coccos. ex Codice Comptoniano.  
 6. *Ceruus minima serpens Americana*. in Horto Reg. Hampton. collegimus.

S. Gribelin.  
 Sculpsit.







Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

S: Gribelin sculps.

Tab. CLIX.  
 1. *Christophoriana* Americ. Malabar. et h. folijs acuminatis, nervosis, dentata, forte Caaghiyayo Pison. p. 227. forte etiam Mutina Brasiliens. Macgr. nostr. a tenuior. folia sunt ubiq. glabra. à Loti Arboris similitudine ut suspicor. Nettle-Tree Barbadensibus nostratibus nuncupatur.  
 2. *Chrysanth. Americanum* Heloni Indii max. folio & flore s. Filos solis perennis. Helonium Indic. flore & semine maximis perenne. Hort. Acad. Lugd.  
 3. *Chrysanth. Virginianum*, caule alato ramosius flore minore.  
 4. *Chrysanth. Maderaspatanum*, latifolium, Scabiosae capitulis parvis. à D. du Bois habui.  
 5. *Chrysanth. Virginian. elatius angustifolium*, caule hirsuto, viridi. anbosacari quorundam; s. Helonium Canadense altissim. HRP.





Fig: 7

Fig: 2

Fig: 1

Fig 4

Fig: 3

Fig: 6 S: Gribelin sculps:

Fig: 5

Tab. CLXX.  
 Fig. 1. Chrysanth. ferulaceum, Elichryson dictum folijs mollioribus odoratum; Elichryson folijs Abrotani. CBP. Heliochrysum quorund. folijs Abrotani.  
 IB. Elichryson, s. Coma aurea Ger. emac. 645.  
 2. Chrysanth. Persicum Abrotani feminæ folijs, umbellatum Heliochrysum Abrotani fem. folijs P. Boc. 4. Abrotanum fem. verum Dioscoridi. Zanon.  
 3. Chrysanth. American. Gieris folio glabro flore Bellidis majoris PBE. 323.  
 4. Chrysanth. African. ad radicem Umbelliferarum more, comosum. an Ateopapallæ Mexicanibus. Hernand. p. 33. è Codice Complutiensi.  
 5. Chrysanth. parvum ramulosissimum, membranaceo caule Maderaspaten. e. à D. du Bois.  
 6. Chrysanth. Maderaspatrium, Oxycanthæ folijs, caespis, ad marginem spinosis, calyce argenteo. à D. dubois communicata est.  
 7. Cinamomum sylvestris Barbadensium; Arbor bacifer a fructu calyculato, tetrapylene, folio enervi.





Fig: 2



Fig: 3



Fig: 4



Fig: 5




Fig: 7

S: Gribelin sculps:

b. CLXI.  
 1. Chrysanth. Anoricum frutescens: Balsaminae lutea folijs, nigris maculis punctatis. Chrysanth. Curassavie frutescens: <sup>folijs</sup> Asperici nigris punctis notatis. PBP.  
 2. Cistus Chamarrhodendros, s. Cistum Orientale Hepaticum folijs brevioribus ferruginea, & molli lanugine villosis. an Datura India folijs Malabathri.  
 Breyn. Cent. Stramonium, s. Datura Cistoides frutescens hirsuta major, India, quod Prodr. 2. forte Katou-Kadali Hort. Malab. Part. 4. Zeylanensibus  
 Ki-moy, et Mahabothya, Singalensibus dicta. a Cl. viro D. Tancredo Robinsono. habui.  
 3. Cistus sempervirens, Laurifolia, florib; elegantè bullatis Virginiana. D. Banister.  
 4. Cistus Virginiana flore, & odor. Peruchimeri. D. Banister. In utraque propria manu accuratissime ad vivum delineavit, & Nobilissimum Patronum  
 Episcopi Londinens. in Angliam transmisit, cujus favore & nos obtinuimus.  
 5. Citharoxylum Americ. alteri viri folijs ad marginem dentatis. ab honesto viro Jacobo Beede, ex Insula Barbadosis, in Hort. Reg. Hampt. prater lapso curis allata est.






Tab. CLXII.  
 fig. 1. *Citharexylon* Arbor Americana foliorum bicornis late candiantibus. ex cuius ligno *Cithara* & *Pandura* fiunt. forte *Cocopia* *Brafilienfis*; Pison. Lusitanis *Pao de Sacra*. *Fiddlenwood* Nostratibus *Trusula* *Barbados* habitantibus dicta.  
 2. *Citharexylon*. s. *Luriodendros* *evva* Arbor Americana materialis, triphylla, e cuius ligno *Fiducula* fiunt. an *Tapia* *Marcgräv.* *Barbadensibus* nostratibus *Timber Fiddle-Tree* nuncupata.  
 3. *Coryli*. *Avellana* folio oblongo et acuminato *Frutex* *Convolvulaceus*, capreolatus, Americanus P. B. P. an *Hopwood* *Barbadensibus* dicta.  
 4. *Ulematis* *Peruviana*, *Digitalis* flore folio *Fraxini*. *Paradis* *Bata* v. *Pro dr.*







S. Cr. sculpsit

Tab. CLXIII.  
 Fig. 1. *Clematis triphylla*, arbor escens, e Maderaspatan, forte Tjori-Valli, Hort. Malab. Part. 7. an Colubrinae genus triphyllum, Ind. Orient. etc. exnucatas D. de Bois ex India missas, inveni.  
 2. *Clematis Myrsinoides*, ampliorib; folijs Americana, forte Tety-pole-iba Brasiliens & bita arbuscula, Risou. p. 250. an Topheola Capiteuxochil, Mexicana; Saxa volub. Hernan in  
 3. *Clematis* novum genus. Cucumerinis folijs, Virginianum. Planta peculiaris populi, non laetescens: Bonisteri.  
 4. *Clinopodium Craticum*, Pulegij odore, ex Horto Palatino HRP, rarius autem (mea sententia) *Calamintha Clinopodij Austriaci* folijs, odore Pulegij, sub priori tamen tibia, nobis communiavit. D. Sherard, qui in Horto Trivisfelti, apud Bononienses; collegit. an Calaminth. *Cattaria humilis*, Polij folio, Pulegij odore: PBE. append.  
 5. *Clinopodium Alpinum*, hirsutum, CBP. item *Teucrium Alpinum*, coma pubescente, quod CBP. *Chamaedri Vulgaris* falsae aliquatenus affinis; Alpinae & *Clusii* *podium Alpinum* Pona 1B. tom. 3.  
 6. *Clinopodium Pulegij Cervinifolij*, Maderaspatanum, Verticillis parvis, caulis per intervalla articulis.





Tab. CLXIV.  
 1. *Litrullus minor*, India Orientalis, apud Exsicatas du Boisianas invenimus.

2. *Linopodium Hyssopi* latioribus folijs, Maderaspitarum.


3. *Linopodium angustifolium*, non ramosum, flore caeruleo, labio trifido, ab oper purpuriis maculis notato. ex Virginia D. Barister.

4. *Linopodium fistulosum* pusillum, Ind. Occid. summo caule floridum.

5. *Lolua exotica* angustifolia, floribus luteis, aversa parte, elegantè punctatis. ex Cod. Bentingiano.

S. G. Sculps.





Tab. CLXXV.  
 fig. 1. *Colutea Javanica* folijs oblongis Par. ad. Bat. Prodr. Hamptonia in Plantarum rariorum ditissimo Horto Regio collegimus  
 2. *Colutea Sesban* Ægyptiaca folijs accedens Maderaspata.  
 3. *Colutea Veracruensis* vesicaria Par. Bat. Pr. in Horto Regis nostri longē celeberrimo Hamptonienii Observavimus :  
 4. *Colutea minima* species dispersos ex Indiā Orientali.  
 5. *Colutea siliquosa* Maderaspata ad nodos caulium siliquis bigemellis. forte *Colutea* folijs Aril. nominata in L.B. & pro adpeta hujus ut  
 et succedenti non notitiā; Rei Herbaria cultores unā mecum Spectatis. viro. D. Caro du Bois summo; debent gratias, utpote qui has quatuor  
 elegantiss. *Colutearum* species simul cum plurimis alijs vesicatis, quarum copia ejusdem humanitate nos quidem potis sumus, pro  
 -rito anno primū in Europam deferri curavit.





Tab. CLXVI.  
 fig. 1. *Colutea siliquosa* glabra ternis quinquefolijs, Maderaspata, semine rubello. an *Uzta* patli 9. Terent. apud Recch. 457.  
 2. *Colutea enneaphyllos* *Cotoidea* Ind. Orientalis siliculis conglomeratis.  
 3. *Colutea siliquosa* enneaphyllos Ind. Orient. siliquis & folijs a versa parte pubescentibus.  
 4. *Convolvulus monococcus* Virginianus D. Barist.  
 5. *Convolv.* Maderasp. purpur. *Viola Martia* folijs, floribus plurimis simul junctis.  
 6. *Convolv.* Maderaspatanus villosus, quinquifidis folijs, capitulis Scabiosa quodammodo mentientibus. an *Convolv. Zeylanicus*. villosus pentaphyllus et hexaphyllus minor Hort. Acad. Lugd. Bat. 787.







Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 4

Fig: 5

Fig: 6

Tab. CLXVII.  
 Fig: 1. Convolvulus Americanus Vulgaris folio, capsulis triquetris, numerosis ex uno puncto longis petiolis prope dentibus, semine lanugine  
 ferruginea dilloso. forte Fructus 3. Simon. Tovar. Clus. exot. (ie) Buenas nocher Hispanorum. ejus d. hujus Convolvuli species  
 est fructus majore. Mock-Climber Barbadosibus nostratibus dicitur.  
 2. Convolv. cerul. Mayosotis Indicus erectus Passerina minoris folio ramosissimus.  
 3. Convolvuli (forte) Species Platani Occidentalis folio Prom. Bon. Sp. a D. Patricio Adair. conomniata.  
 4. Convolv. Jamaicensis trilobatus folijs tomentosa lanugine densiori et longissima, ac veluti. ad instar utriusq; obductis. flore peramoeno purpureo.  
 5. Convolvulus minimus; procumbens Acetosella foliolis, barbulis ad inuicem quaternis, summo apice tricuspideatis.  
 6. Convolvulus quinquefolius glaber Americanus, in Hort. Comptonian. ex seminibus natus.





Tab. CLXVIII.  
 fig. 1. *Coryza major capitata*, seu *globoza*. Paul. Boccon. p. 14.  
 2. *Coryza Sicula*, annua, lutea, folijs atro-viridibus, caule rubente. Boccon. p. 62. *Coryz.* caulibus rubentibus, tenuioribus, flore luteo, nudo. Bojar. Monsp. 77.  
 3. *Corallina muscosa*, s. *Muscus marinus tenui capillo Sporophoros.* ad maritimas nostras invenit. D. Iacobus Petever. & amico nobis communicavit.  
 4. *Corallina geniculata*, mollis, Americana, segmentis latioribus compressis. ex Insula Jamaicensi.  
 5. *Cordis Indifolio*, & facie, frutescens, Portoricensis. PBP. Siliquosarum est de genere, ut audio.  
 6. *Cordis Indifolio*, et facie, frutescens, Curassavica, latifolia. PBP.





Tab. CLXIX.  
 Fig. 1. *Corallorhiza lignum* P.B.P. *Glycyrrhiza*, vel *Glycyrrhiza affinis* arborescens Americana, florib; ex luteo & rubro variegatis, foliis acuminatis, subque latis, sum. a Præ. mod.  
 2. *Coriandrum minus testiculatum*. C.B.P. *Coriandrum minus odoratum* IB. tom. 3.  
 3. *Lonicera Americana* sylvestris, Domestica similis, bacca cærulei coloris elegantissima. Anomum Nova Angliæ quorundam.  
 4. *Erithimum maritimum* Eryngij capitulis; folijs ex uno pediculo multis. *Erithimum sativa*, *Asparagus Gallicus*, Tab. et nœmon. *Erithimum species*.  
 3. Matthioli. Hist. Lugd. ex Oris Mediterraneis, à Dno. Fishwicke. ad nos transmissa est.  
 5. *Crotalaria Boreghalensis*, folijs Genista subhirsutis P.B.P. Kator-Tandale-Cotti. Hort. Malab. P. 9.  
 6. *Crotalaria hirsuta*, minor, Americana, herbacea, caule ad summum sagittato. Hort. Acad. Lugd.  
 7. *Crotalaria Americ. triphylla*, folijs firmioribus, glabris, frutescens, flore purpureo. in *Crotalaria Americana*, trifoliata, rotunda, glabra. P.B.P.





Tab. CLXX.  
 Fig. 1. *Coriandrum minus testiculatum*, seminibus verrucarum instar, asperatis, & debili saccharo incrustatis.  
 2. *Cucumis Maderaspatis* fructu mirissimo. atq; haec una ex Plantis sicris humanitate D<sup>ni</sup> Caroli duBois. communicata.  
 3. *Cucumis sylvestris*. Amer. Ind. *Anguria folio*, fructu Ovi figurâ, & magnitudine, ad maturitatem pallido, spinosis tuberculis, Momordica instar: muricat.  
 Quarero-Oba, s. *Cucumer Avinicus*. Pison. 264. in Hort. Comptonian. ex seminibus nocturni inventimus.  
 4. *Cucurbitifera arbor spinosa*, fructu mali aurifacie, aromatica, Barbadosibus, à similitudine fructus istius Ind. Orient. surrogissimè, Mungostans dicti  
 Mungo; fortè v. Nepite nuncupatur. an Chinae Theob. IB. tom. 1. fortè etiâ Arbor fructum Melonis facie proferens. quod IB. an Calabassier D. Rochforti.  
 5. *Cucurbitifera trifolia*, spinosa, India, fructus pulpâ Cydonij amulâ. Ray. Hist. Plant. tom. 2. Covalam Hort. Malab. P. 3. *Cydonia exotica* CBP. Malvern  
*Cydonium Indicum* Bonj. Belis. Serifole Bengalesium; *Cydonia eorundem* Garcie Clus. in Not ad Arom. Hist. lib. 2. c. 14. *Cydonium* è Bengala Acoctae  
 Mala Cotonea, s. Marmelacta, ex quo fructus quem Capotes, s. Chicocapotes nominant. Part. 9. Ind. Occid. lib. 4.







Tab. CLXXI  
 Fig. 1. Cucurbitifera arbor Americana, folio longo, mucronato, fructu orbiculari, granis cordiformibus, pubescentibus, involucris. Arbor Cucurbitifera folio longo, mucronato, s. Laurino Ray. Hist. Pl. Laurifolia Guianensis. CBP. Arbor folio Lauri fructu Cucurbitifera s. Squarrosa IB. tom. 1. Arbor peregrina ex Squarosa Chus. exot. item Macoquer Per gini anisum forte ejusd. Cusj. Fructus Orbicularis, granis Cordatis effigie. CBP. 134. hinc etiam spicet Tunjappocopia. Brasilianor. Chus. exot. Jacq. a. D. Rochfort & Herpat. Thevet. 2. Cucurbitifera arbor, subrotund. folijs confertis, fructu Orbis, seminibus cordatis, massula nigra inclusis, Americana Arbor Cucurbitifera Americana, folio subrotundo Ray. Hist. Laurifolia Americana pomis Capitis magnitudine CBP. item Arbor Indica, fructu Cucurbitifera forma & Sapore ejusd. forte etiam Ficus Nigra varietas similis, fructu magno Malabarici parvi, ejusd. CBP. Cujet. Mar. grav. & Pison. bulgò corrupte Cochine. lib. 1. Choyne Americana, cujus Historiam non male Squarosa habet quoad arbor Chusio videtur. Hist. iero Oriedo ejusd. IB. Cochyne Nieremb. g. 310. Cochyne Americana The God-Tree, (ie) Arbor Dei. Park. cujus fructum Maraka & Tomar. 3. Capi Malabarica accedens, Arbor Laurinis folijs, Maderaspata. 4. Laurinis (forte) prima species. s. Carim-Laurini Hort. Malab. P. 2. à Maderaspata. 5. Laurinis species Malderaspata, capsulis in baccam, Dielamra Græci folijs, villosa. Ultram. q. no. à D. du Bois impetravimus.





Tab. CLXXII.  
 1. *Cucumis Indicus*; striatus, operculo donatus, corticeo pulcherrime testus. in Picinna Horti Malab. P. 8. *Cucumis sylvestris*. Malabarice. fructu striato cornu. in Hort. Comptoniano. succedit praterito anno.  
 2. *Cuscuta bacifera* Barbadosium in Mauritius. forte Acajja-valli Horti Malab. P. 7.  
 3. *Cynoglossum procumbens*, glaucophyllum, maximum nostris; floribus purpureo-carulis, semine laevi. *Echium maritimum* Phytolog. Britan. Ray. Hist. Bur.  
 -sum dulce, ex Insulis Lancastriae Park. in *Cynoglossum* Africana. Martii folium Breyn. Fascic. forte etiam *Cynoglossum maritimum* Hort. Palav. a Turco.  
 4. *Cynophallophoros* s. *Penis Caninus*. Chew-bacaram, Arbor folijs subrotundis, rugosis, clavos pubiferos phalloides. prosiliquis gerens Dog-fruit. Barbados.  
 5. Eadem mucronatis folijs, folliculis clavatis, ex uno pediculo binis.  
 6. *Cynoxylum Americanum*, folio crassiusculo molli, & tenaci. forte Mangai-ba genus Americanum. in Kada-Kandel. Horti Malabarice. Hort. 6.  
*Cynoxylum nigrum* Americanum. nostratibus black dogwood vocati.





Tab. CLXXIII.  
 fig. 1. *Daucus montanus* Pimpinelle. Sorex fraga turcica folio nostras Dubrisensis. in April. pet. cum s. montanum albi 1B. tom. 3. *Daucus montanus* Apij folio maner CBP. in Prod. sate.  
 2. *Daucus Pyrenaicus* tenuifolius, folijs citri odore lucidie Dni. Fagon. Schol. Botan. a Dn. Sherard accipi.  
 3. *Ecbolium* s. *Adhatoda Ceylanensis*. Mus. Zeyl. Hort. Acad. Lugd. app. *Wanapala* Malabarorum.  
 4. *Echinophora Maderaspatica*, *Sideritidis* non serratis, nervosis folijs, fructu capsulari, *Caucalidis* arvensis. hujus forte sunt genera *Cordyle* apud Hort. Malab. P. 10. Tab. 8. & 9. ut et Tab. 59. Ingeniosiss. vir. Dn. du Bois. nobis communicavit.  
 5. *Elenisifera* *Curassavica* arbor. PBP. ex sententia D. Sherard a sorte Garab Maurorum Rawolky Hist. Lugd. append. *Garb Arabum* vicinar. *Salix Arabica*.  
 6. *Elichrysum latifol.* villosum, alato caule, odoratissimum. cujus autem esthae elegans *Elichrysi* species, nobis nondum innotuit in Hort. Reg. Harpt. prae istis anno flor. entere.





TAB. CLXXIV.  
 fig. 1. *Clathroso officinis* Africana arboresc. florib. purpureo-violaceis. *Sabia* folijs, odore *Rosmarini* H. Ac. Lugd. Compt. a. Afr. arboresc. *Sabias capreae* folijs, odore *Rosmarini* Dr. Pr. 2.  
 2. *Ephemer. unguis* Zeylan. Alsinae medicis folio, procumbens Parad. Bat. Prod.  
 3. *Ephemer. Phalangoides* Maderaspata. minimum, secundum caulem quasi ex utriculis floridum, huius forte spectat *Nir pullu* Hort. Mal. P. 10.  
 4. *Ephemer. Phalangoides* Virginian. majus erectum. Pseudo-phalangium ramosum majus erectum. D. Banus. Cat. Stirp. Virg.  
 5. *Ephemer. Phalangoid.* Virgin. florales Arbutis bullatis aureis in spicam dispositis. Phalangium spicatum flosculo Arbutis, bullato, aureo. D. Banister.  
 6. *Ephemer. Phalangoides* erectum, folijs Ciliaceis, bulbosum, flore flavo-roseo. Cap. Bon. Spei. ex Codice Comptoniano.  
 7. *Epidendron* *Lychnidis* flore African. ex Codice Comptoniano. Huius plurimum accedit *Ana Oueri* Ana *Varzea* Zanon. Islor. Bot. nostra tamen capreae des.







TAB. CLXXV.  
 Fig. 1. *Erica huoniki* Rosmarinifol. Uredonis flore. capsula Cistide. Lichon pubesce nostras tribus flore Rāj. Synop. Stirp Brit. Rosmarinum sylv. minus nostras Park. Vitis Idæa affinis Polifolia montana IB. tom. 1.  
 2. *Erica tenuifolia* flosculi saepe rubelli. Prom. Bon. Sp. an Micatlact-Pahoualli Nov. Hispan. Texent apud Reuch. 386. quæ primò ab amicis. viro D. Patricio Adair deinde a Doodo nobis. monstrata et.  
 3. *Erica* Hort. Malab. P. 2. Apocynum latifol. E. gypsiurn in canum, erectum, floribus magnis pallide violaceis. PBP. Beudabur Alpini. s. Apocyn. Syriac. IB. tom. 2. Capathum Aegyptiacæ lactesc. siliqua Esclepiad. CBP. ad Apocyna relegatur.  
 4. *Eryngium Americanum* Yucca folio, spinis ad oras mollibusculis. Eryng. campestr. Yucca folijs, spinis tenellis hinc indè marginibus, apponit D. Banist. Cat. Stirp Virg. an Ocopiaz. li. Mexic. ens. s. Scorpis spina Hornarid. p. 222.  
 5. *Erythroxyllum Americanum* Hydrolapathi folijs, maculas pyrarnidales filamentos cortice inclusas, radice ferè sic colore proferens, forte Brasili simile Cignum Verum hoc Sermaris dictum. Redwood Barb adensibus vulgò. Uvisera arbor Orientalis folio longo PBP. huic valde similit est si non idem.  
 6. *Escharoxyllum* s. lignum spiciale American. quod in foie ex troncato maxime usi latum, cui fructus Pyris foribus octobris striatus, Oxycantha Virgin magnitudinis per maturitatem lignescens. an Cignum spiciale videri præbens Clus. ex ot. l. 7. c. 8. Fere Sprigg Barb adensibus dicitur.





Fig: 2

Fig: 1

Fig: 3

Fig: 4

Tab. CLXXVI.  
 1. *Euedoxylon*, Lignum odoratum American. foliis amplo, subrotundis, profunde denticatis, fructu glandiformi Berberis instar, nullo calyce donato. Sertali forte  
 genus, aut Agallochi. Barbadosibus nostratis; Sweetwood nuncupatur. Lignis folia à Guajeri Brasiliensium Max egr. haud multum abluunt.  
 2. *Euedoxylon* Americanum foliis magis mucronato. Samborana forte Malabarica Gax eide apud Rajum. Hist. 1804. Sweet-smelling Wood (ie)  
 Lignum odore fragrans, Barbadosibus dictum.  
 3. *Evonymo* affinis Æthiopica sempervirens, fructu globoso scabro, folijs Saliis rigidis, serratis. Hort. Lugd. Laurus non odorata fructu globoso.  
 Africana Stebeck. Cistacul. Lauri serrata odorata Sid pelinax similis inobora. Capitis Bonae Spei. Breyer. Prodr. 2.  
 4. *Evonymus* Margaritifera pentacoccos Americana. Margaritifera arbor Surinamensis. P.B.P.





Tab. CLXXVII.  
 1. *Eupatoria Conyzoides*, integro Jacobaea folio molli & inzano. Ind. Or. forte *Tacea* & *Serratula affinis* Breyn. Prodr. 1.  
 2. *Eupatoria Conyzoid.* *Maderaspata* folijs glabris suavino caule ramosior. an *Nari-patja* Hort. Mal. Part. 30. *Sonyra Malabaric.* *Lanij* folio, flore purpureo. Comelin. in Nol.  
 3. *Eupatoria Conyzoides* folio molli, & inzano, capitulis magnis, Americana. Arch-angel. Barbaderibus dicta  
 4. *Eupatorio* adfinis Americana bulbosa, floribus scariosis, calycibus, contectis. Raric in capitulis saltem persimilis exhibetur, in Hist. Mexic. Recch. sub nomine *Xararo* ul *videsis* pag. 136. *Planta pappescons non lactescens Virginiana* D. Banister.  
 5. *Euphrasia angustis* & *tricuspidatis* folijs flore albo & purpureo. an *Euphrasia* *lenifolia* Fab. Column. *euphras.* Part. 2. p. 68. *Euphrasia* folijs *(via angustiorib.)*  
 6. *Euphrasia prateris* *Satorcia* folijs scabris, & *Maderaspata* an *Euphrasia* frutescens *Coridis* folio, flore albo spicato. Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.  
 7. *Fago triticum* & *volubile majus Virginianum.* *Convolvulus niger* *Virginianus* major Hort. Oxon. CBP.





Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Tab. CLXXVIII.  
 Fig. 1. *Ficus Americana*, latiori folio venoso ex Cuvæaco. in *Ficus arbor Barbadosium* Ligonis pag. 69. *Tajakela* (forte) Horti Mal. Part. 3. in Hort. Regio. Hampl. C. in *Arbutifolia*.  
 2. *Ficus Malabarens.* folio cuspidato, fructu rotundo, parvo, gemino. D. Syon. *Arbuti* Hort. Malab. P. 1. *Cingalensis* Bogah. estq. ex religione q. serunt in arborum adorare, quamobrem ab *Fræcis Christianis*, *Arbor Diaboli*, nominatur.  
 3. *Ficus Indica* *Tilia* folio, subtis albo, & viloso, polytrichos, s. filamentis è ramis ad terram missis, radicea, è Plinio. Theophrasto, & Strabone. descripta *Ficus Indica* Clus. exot. *Ficus Indica* folijs *Malæ Colonæ* similibus, fructu *ficibus* simili, in *Goa*. C. B. P. in *Ficus arborea*. *Bengalensis* folijs subrotundis, fructu orbiculato. *Pepal* *Bengalensis*. Hort. *Bedum*. *Broad-leafed Mangrove*, *Barbadosibus* no s. atibus, dicta.  
 4. *Ficus arbor Americana*, *Arbutifolia*, non serrata, fructu *Pis* magnitudine, funiculis è ramis ad terram demissis prolixa. forte *Ficus arborosa* in *Africæ*. *Arbutifolia*, non serrata. Hort. *Bedum*. in *Katou-abou* Hort. *Malab*. P. 3. que ipsissimam *Ficum Indicam* *Chusij* fuit tal. horum. *Cornutus*, in *Bet*. no tamen folia omnino sunt glabra, inferri quidem albicantia, non lanuginosa. *Bearded-Fig-Tree*, (sic) *Ficus barbata* *Barbadosibus* *decaia*.







Tab. CLXXIX.  
 Fig. 1. Filix Africana maxima Polypodij fide PBP. forte etiam Filix African. lobis profunde incisib. & mucronatis. ejus d. PBP. inter Addenda. primum in Hort. Reg. Hampt. Observavit.  
 2. Filix mas. Vulgari similis. pinnulis amplioribus, planis, nec crenatis, Virginiana. Consummatissimus ille Botanici D. Banister, manu sua, accuratissime delineavit. & in Angliam transmisit. quam R. everendissim. Dom. Episcopi Londinens. gratis accepimus.  
 3. Filix Saxatilis folijs non serratis. CBP. Filix minor non ramosa. LB. t. 3. Filicis genus parvum primum in Montibus Cæs alpiu.  
 4. Filix arborea s. Dryopteris Tragi. Hist. Lugd. 1605. 5. Filix querna. CBP. Filicis genus parvum alterum in Montibus Cæs alpinis.  
 5. Filix pumila Saxatilis altera. Clusij. Park. Filix non ramosa, nigris maculis punctata. CBP.  
 6. Filix mas. non ramosa, pinnulis, latis, auriculatis, spinosis. Ger. emac.





Tab. CLXXX.  
 fig. 1. *Filix mas aculeata nostras, abs expansis, muscosa lanugine aspersa. an Filix aculeata maj. CBP. Filix Conchitidis affinis. 1B. forte etiam Filix mas non ramosa, pinnulis, latis, densis, minutim dentatis. Ger. emac. 1129.*  
 2. *Filix Africana humilis, spinosa, pinnulis latoribus, minus patula. in Hort. Reg. Hampton. diget.*  
 3. *Filix aculeata Conchitidis amula nostras.*  
 4. *Filix mas non ramosa, pinnulis angustis, rarioribus, profunde dentatis. Ger. emac. 1130.*  
 5. *Filix Saxatilis caule tenui fragili. R. & J. Adiantum album folio Filicis. 1B. Filicula fontana major s. Adiant. Filicis folio. CBP. Dryopteris candida Dod. Hist. Lugd. 1227.*  
 6. *Filicula fontana latiori folio, ad unum solummodo ramosa. an Filicula fontana Adiantis facie, latifolia, dentata. Schol. Botan. pag. 3.*





Fig. 2.



Fig. 5



Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 4.

Tab. CLXXXI.  
 1. Filicula fontana Ruta murariae facie, tenerifolia. an Filicula fontana minor. CBP.  
 2. Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. Ger. emac. 1129.  
 3. Filix exotica, pro longis, & angustis ramulis, denticulata.  
 4. Filix Virginiana, non dentata, florida, folijs alternis, & in summo caule, seminibus occultatis.  
 5. Filix Africana, florida similis, in ambitu foliorum, argute denticulata. an Filix Africana, vcl Monomotapensis, ramosa, fontano Hort.  
 Beaumont. pag. 21. ab amico nostro, D. Patricio Adaxe. communicata est.





Tab. CLXXXII.  
 1. *Filix saxatilis, ramosa, maritima, nostras.* Ray. Hist. Pl. 151. *Filix Orubia ramosa* PBP. app. in Hort. Reg. Hampton.  
 2. *Filix saxatilis, ramosa, major.* ex Horto Patavino inter Collectanea: suas, ostendit nobis, Cl. Vir. D. D. More, annis, & Scientiâ gravis.  
 3. *Filix Acacia Cornigera* a folijs peregrina, nobis communicavit. amicus noster integerrimus, D<sup>r</sup>. Tancred Robinson.  
 4. *Fraxinus Alpensis.* Hort. Acad. Lugd. *Fraxinus* (forte) *rotundiore folio*, CBP. Ornus Galli Pressani, lib. de re rustica.  
 5. *Frutex Guineensis, Zyzyphi folijs, leviter serratis, & odoratis,* Hort. Beaumont. pag. 22.  
 6. *Fucus* s. *Alga viridis, capillaceo folio.* CBP. rectius autem *Conferva marina, s. Muscus marinus, brens, tenuifolius.*








Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

CLXXXIII.  
 Frutex Africanus ambram spirans, in Hort. Comptoniano. ex seminibus oritur, & in Codice Comptoniano depingitur.  
 Frutex Maderaspatae, Hyperici frutescentis facie, cortice cinereo. an Frutex Guineensis Hyperici arborescentis dicti, folijs majorib;. Hort. Beaumont 22.  
 Frutex baccifer Prunifolius, non serratus, e Maderaspatae.  
 Fruticulus capsularis, hexapetalos, Casia Poetarum folijs, e Maderaspatae. Frutex baccifer folijs Lini vel Casiae Poeticae Maderaspatae, noster. Phytograph  
 P. 1. Tab. 31. an Evonymo affinis, alatis folijs, alternis, pericarpio in sex loculamenta diviso.  
 Idem folijs brevioribus, subrotundis, & densius stipatis. in Hort. Reg. Hampton. e semine natus. forte Kirganeli. H. M. P. 10.  
 Idem breviorib; folijs & angustis. ex Plantis sicis du Boisiani, hos Fruticulos exerpimus. an Tjeru-Kirganeli. H. M. P. 10.









Tab. CLXXXV.  
 Fig. 1. Galactoxylon, s. Arbor Americana, baccifera, lacteum liquorem, ex ligno fundens; qui durus, instar Gummi evadit. an Musucagifera arbor. de Lact. Milk-wood Barbadosibus.  
 2. Genistella arborecens, Styracis folio major; flore caeruleo. Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. Grotalaria arbor Africa, Styracis folio molli incano, flore caeruleo. Ambr.  
 Charact. Pl. Arbor siliquosa, Africana, Genista semine. Bartholin. Act. Hafn. Anno 1673. Obs. 131. Hort. Comptoniani, insigne constat Ornamentum.  
 3. Genista similis, Frutex folijs cassij. (triphyllos) PBP. in Hort. Reg. Hamptoniens. colitur.  
 4. Genista Oleastri Germanici. folijs singularibus, Maderaspata.  
 5. Genista Capensis, spinosa, Ligustri folijs pentaphyllos, floribus spicatis, rubricâ Cl. D. Patricio A. dair. accipi.  
 6. Genisto-Spartium, bacciferum, Erica folijs, Africanum. ex Codice. Comptoniano.





Tab. CLXXXVI.

Fig. 1. *Geranium majus*, Virginiana, floribus amplis, Ochrroleucis.

2. *Geraniumella* Utriusq; Indis, impatiens, folijs Agerati; hujus capsula aqua aliquandiu immersa, cum strigite dissolvitur, & semen maturum, exiliendo vibrant, & inde ratio nominis, Snap-grass Barbadosibus vulgo.

3. *Geranium argenteum*, Alpinum. C.B.P. *Geran. argenteum*, Montis Baldi. IB. *Geran. arg. Alpin. longius radicans* Ponce Park.

4. *Geran. African. tenuifolium*, Robertiani divisiuris, flore magno striato, ex Codice Bentiniano.

5. *Geran. African. noctuolens*, flore ruberrimo, Anemones folio latiore.

6. *Geran. Africanum, noctuolens*, flore rubro, Anemones folio angustiori. Ultramq; ex Codice Comptoniano. transtulimus.







CLXXXVII  
*Geranium Africanum*, noctuolens, *Aquilegia* folio, flore incarnato rubente, ex Codice Comptoniano.  
*Gladiolus Phalangoides* Æthiopicum, floribus parvis, flavescens, ex Codice Benlingiano. *Sisyrinchij* (sorte) spec. Africana.  
*Gladiolus Phalangoides* Æthiopicum (sorte *Sisyrinchij* genus) flore pentapetalo, obsoleto coloris, ex Cod. Benlingiano.  
*Gladiolus Africanus*, angustissimo folio, dilute purpureo, ex Cod. Comptoniano. an *Gladiolus pumilus* Africanus, angustissimo folio. PBP.  
*Gnaphalium latifolium*, minus, ramosum, capitulis pallidibus, ex Maderaspata.  
*Gnaphalium supinum*, echinato semine, Lusitanicum, Grisej. Viridar. Lusitan.  
*Gnaphalium Americano* affinis, planta, capitulis conglomeratis. Hort. Reg. Paris.





Fig. 2

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 4

Tab. CLXXXVIII.  
 1. *Gossypium frutescens*, annuum folio trilobato, Barbadosense. *Gossypium frutescens*, semine albo. CBP. Xylon, s. *Gossypium herbaceum*. IB. an *Gossypium*  
*Brazilianum* flore flavo; Aniniju Indigenis, *Algodon Lusitanus* Marcgr.  
 2. *Gossypium frutescens*, annuum folio Vitis ampliori, quinquefido, Insule Providentiæ, an *Bambagia arborea*, de Pernambuco, Zanoni p. 40.  
 3. *Gossypium herbaceum*, s. Xylon Maderaspense, rubicundo flore pentaphylleum, an *Cudu-pariti* Hort. Malab. P. 2.  
 4. *Gossypium*, s. Xylon arbor. Oriental. digitatis folijs, laevibus, fructu quinq. capsulari, albâ & nitente lanugine facto. *Gossypium Javanense*, salicis folio,  
 CBP. *Lanigera arbor*, s. *Gossampinus Plinio*, Bonlij. *Panja Panjala* Hort. Malab. P. 5.  
 5. *Gramini folia aquatica* *Thlaspeos capitulis*, rotundis, septo medio, siliulam, dormiente, a D. Sherard Proentore ex Hiberniâ, in Angliam, nuper in me nobis transmissa.





Tab. CLXXXIX.  
 Fig. 1. *Coffispium*: Xylon arbor Occidentale, folijs digitatis, per marginem crenatis, fructu conoide quinq, capsulari, lanugine leucophæa, referto.  
 2. *Coffispium*: Xylon arbor eundem monte ditum, è Monte Serrato, Americanum, glumæ capsulari fructu cylindricoide, leucophæa lanugine sarcto; hujus tantum fructus Icon. exhibetur, quem ab Insigni Botanico D. Guilielmo Courtois habuimus.  
 3. *Gramen geniculatum* folijs brevibus, aculeos meritionibus, Mader aspatanum, forte Arundo graminea, aculeata. Pr. Alpin. exot.  
 4. *Gramm. miliaceum*, latiori folio, Mader aspatanum, apud exsiccatas du Boisianas. Observavimus.  
 5. *Gramm. panicum minus*, spicâ divulsâ, Insula Barbâdens. Pâgiter Grasse. & Pestis Coloni, nostratibus nuncupatur.  
 6. *Gramm. juncoide*, glomeratis, capitulis, Mader aspatense.  
 7. *Gramm. dactylon Americanum*, cruciatum, Barbâdensib; nostratibus, Dutch-Grasse, dictum; an *Grammen Stellatum*, Ægyptiacum Vesling. in Not. ad. Alpia. *Gramm. Tavanicum*, cruciatum, Lac. Bonjy.





Fig: 5

Fig: 2

Fig: 6

Fig: 3

Fig: 4

Fig: 8

Fig: 7

S:G: sculp:

CXC.  
 am. dactylon, aromatic., multiplici panicula, spicis brevibus; tomento candidantibus; ex eodem pediculo binis. Schoenanthos, s. Juncus odoratus. IB. Juncus odoratus aromaticus.  
 am. dactylon, maximum, Americanum. Hort. Reg. Par. Gram. dactylon, Indicum, esculentum, spica articulata. Ambrosini Phyt. Sesamum perenne, Indic. Zanoni. pag. 181  
 am. amoris, Indiae Orient. panicula sparsa, glomerum petiolis, hinc illuc undatim inflexis.  
 am. Mader aspatarum, panicula spicata, longa, speciosissima.  
 am. Mader aspatarum, spica interrupta, tota et pluribus spicis parvis villosis, elegantissime constructa.  
 am. Alopecurus oides Mader aspatarum, spica quasi geniculata, molli.  
 am. hor subum, Indic. glomeratis capitulis, Lagopi amulis, glomae squamulis plurimis, purpurascens, aristis roscis donatis, compactis.  
 am. Cyperoid, latiori folio, panicula in summitate caulis, Conglomerata, horum plerumq. novae, Graminearum species, Indianae, ex suis Plantis, obtulit nobis  
 D. Carolus du Bois. Stipium rariorum, Collector, & Cultor praestantissimus.

CBP.







- Tab. cxci.  
 1. Gram. panicum, multiplici spica, Maderaspatanum.  
 2. Gram. multiplici spica, Maderaspatanum, Calamo, secundum longitudinem, aculeis horrido.  
 3. Gram. avenaceum, Maderaspatanum, panicula sparsa, aristas longioribus, ornata.  
 4. Gram. avenaceum, Maderaspatanum, locustis rarioribus, turgidulis, aristas brevibus, donatis.  
 5. Gram. Secalinum, Indicum, spica, gracili, tomentoso, aristas longioribus, ad se invicem intortis.  
 6. Gram. Loliacum, majus, spicis in verticillas, multiplicatis, Maderaspatanum.  
 7. Gram. Cyperoides India Orient. elatius, panicula sparsa, pallescente.  
 8. Gram. Cyperoides, pumilum, elegans, e Maderaspatan.





Fig. 1

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 3

M. v. G. scul.

Tab. CXCII.  
 1. Gram. Cyperoides varius, et tenuius spicatum ē Maderaspater.  
 2. Gram. Cyperoides Maderaspaterum, panicula magis sparsa, & speciosa.  
 3. Gramen. Cyperoides, elegans, panicula spicis mollibus composita, Maderaspaterum.  
 4. Gram. Cyperoides, Maderaspaterum, spicis plurimis, summo caule, in orbem congestis.  
 5. Gram. Cyperoid. Maderaspaterum caule compresso, sparsa panicula Tunci.  
 6. Gram. Tuncum, s. Tuncus foliaceus, humilis, caule rotundo, Maderaspateris.  
 7. Gram. Tuncum, minus, ē Maderaspateri, s. Tuncus pumilus, capitulis in summitate, aphyllis, plurimorum variorum Graminum genera, ex Plantis suis, liberalitate Spedatiff. Viri, & Botanici Celeberr. D. Caroli duBois. nobis communicata sunt.





Tab. CXCIII.  
 1. *Gratiola Indica minor* vera s. *Hyssopoides* e *Maderaspatan*, inter *Collectaneas* du *Boisiana*s invenimus.  
 2. *Gratiola affinis* *Chamedryoides*, *Maderaspatensis*, *ibidem*.  
 3. *Gratiola affinis* *Maderaspatana*, *Digitalis ornula*, folio *Clinopodij*, capsulis in *verticillis* positis.  
 4. *Guaiava alba* acida, fructu rotundiori, *Ind. Or. Guyabo pomifera Indica* CBP. *Guaiava Indica*, fructu *Malifacie* [B. tom. 2. *Xabochoti* Mexi-  
 canis, s. *Pomum arenosum* *Hernand. Araca-Guacu* *Brasilens.* *Pison* hujus *taller a species*, viz. *Guaiava rubra* fructu *itidem* rotundiori;  
*Malacca-Pela* *Malabar* ensibus nuncupatur, de qua *consule Hort Malab. P. 3.*  
 5. *Heliotropium Gnaphaloides* *litorum*, fruticosum, *Americanum*. *Sea Lavender* *Barbadiensibus* dictum.  
 6. *Hippuris muscosus* sub aqua repens in *Hibernia*, ubi *insignis Botanicus, D. Sherard* invenit, & in *Angliam* ad nos *transmisit*.  
 7. *Hippuris exigua* *flavida* *petala nuda* *Virginiana*, *D. Barister.* a *Musco marino* *Equisetiformi*, non *ramoso* *D. Ray.* *haud multum*  
*abluat.* *cytus* *Icon ex hibalis*, *Phylogr. P. 1. T. 48.*






Tab. CXCIV.  
 Fig. 1. Hieracium Alpinum humile, Doronici facie, Schol. Botanic. pag. 190.  
 2. Hieracium Alpinum, latiore folio pilosum, flore majore, an Hieracium Alpin. latifol. villosum, magniflore. CBP. an Pibosella, s. Pulmonaria lutea, angustiori folio, valde pilosa. IB. tom. 2.  
 3. Hieracium pilosissimum parvis flore, non ramosum, an Pibosella Syriaca. CBP. Pibosella maxima, Syriaca. Lob. Hist. Lugd. sub quo titulo, in Herbarijs Vivis apud Patavinos compilatis, saepius invenimus.  
 4. Hieracium latifolium pilosum, coecineum, umbellatum, Indicum. Hort. Acad. Lugd. Pibosella Indica Cornuti. Canadens. Plantar. Hist.  
 5. Horminum rugoso, serruosoq. folio, cornu Cervinum exprimente. PBP. Horminum Syriacum tomentosum folijs Cronopii, s. profunde laciniatis. Breyer. Prodr. 2. Horminum rarum, folijs laciniatis. Rawolff. in Herbario vivo.  
 6. Horminum Arabicum, alatis, folijs, flore rubello. Hort. Oxoniens.  
 7. Hormino accedens, angustissimo folio, glabro, Madera spatensis, ex Plantis siccis du Bosianis habuimus.







Tab. CXCIV.

1. *Hyacintho affinis*, tuberosa radice, Africana, umbellâ caruleâ, inodorâ. H. Ac Lugd. 3 27. in Hort. Reg. Hampt. floruit, & elegantissime depingitur in Cod. Berlingiano.  
 2. *Hyacinthus Africanus*, folijs Colchici, floribus coccineis, major. ex Codice Berlingiano.  
 3. *Hyacinth. Coccineus*, Africanus, minor, flore longo, cornua ex Codice Berlingiano.  
 4. *Hyacinthus stellatus*, spicatus, floribus incarnatis, caule & folio Orchidei, ex Prom. Bon. Spei. Codic. Comptoniano.  
 5. *Hyacinth. Africanus*, Orchioides serpentarius, folio singulari, undato, pilis ciliaribus, fimbriato, floribus ex aureo purpurantibus. Codicis. Comptoniano.  
 6. *Hyacinthus Africanus*, Orchioides, triphyllus, flore croceo, Colchici *Fritillarii* folijs undatis, capsulâ inflatâ. ex Codice Comptoniano.





Tab. CXCVI.  
 Fig. 1. *Jacea lutea*, *Cichorei* folijs, minus laciniatis, Americana. ex seminibus, in Hortulo nostro per biennium floruit.  
 2. *Jacobaea Africana*, frutescens, folijs *Abrutani*, s. *Cithnii* minor. PBP. hujus ramulorum, à Prom. Bon. Spei. absq. titulo allatum, à Botanico exercitissimo D. Samuele Doody. accepimus; cujus varietas major, in Hort. Reg. Hampton. nunc colitur.  
 3. *Ilex folia Agri* folijs, Americana. forte *Agria*, s. *Aguifolia* *Glandifera* Angullar & IB. qualem autem sit, hoc ejus *Aguifolium*, ingenue fateatur se ignorare Bauhinus.  
 4. *Ilex aculeata*, sanguineis venis, radicibus tuberosis, Americana.  
 5. *Ilex fauce* folijs majoribus, leviter aculeatis, è *Madera spatani*. forte *Ahuapalli Titiacensis*. Hernand.  
 6. *Iris Virginiana purpura*, s. *Chamaeiris verna*, angustifolia, flore purpureo-caruleo, odorato. D. Bani ster.





Tab. CXCVII.  
 1. *Plex aculeata* folijs nigris amplissimis; forte *Phello-dryis nigra*, latissimo folio Hist. Lugd. 26. *Phello-dryis nigra* IB. in Horto Comptoniano, succrescit.  
 2. *Tuzuba*. s. *Liriodaphnus Zeylanica rotundifolia*, crenata, minor, folijs subtus lanuginosis, in Hort. Regio. Hampton. Observavimus.  
 3. *Tuzuba*. s. *Liriodaphnus Africana*, mucronatis folijs, spinâ gemellâ; forte *Tuzuba Africana longissima*, & acutissimis spinis horrida. Hort. Beaumont. 25.  
 4. *Juniperus Barbadenis*, Cupressi folio, & annulis quadratis. Sabin, or Cypress Tree, nostratibus dicta. ab honesto viro Jacobo Reede, in Insula Barbadae collectum & sicabam nos accepimus.  
 5. *Juniperi folijs Frutex Africanus*. PBP. in Hort. Reg. Hampton. conspeximus.  
 6. *Junus conglomeratus* Maderaspatis, acumine geniculato.  
 7. *Junellus* Maderaspatis, capitulis compactioribus, acumine bifido, longiori.  
 8. *Junus minor Barbadenis*, panicula compactiore, acumine bifido, brevi.





Tab. CXCVIII.  
 fig. 1. *Lamium purpureum*, foliis ovato, acuminato, flore majore. *Galopis*, s. *Urtica iners*, flore purpureo, majore, folio non maculato. IB. tom. 3.  
 an *Lamium*, folio oblongo, flore rubro Park. 606.  
 2. *Laserpitium majus*, segmentis longioribus, & indivisis. forte *Laserpitium angustifolium* non sinuatum Schol. Botan. 167.  
 3. *Laserpitium* lobis angustioribus, & dilute viridibus, conjugatim positis. Moris. ut. Umbel.  
 4. *Laserpitium tenuifolium*, lobis obscure viridibus, *Laserpitium Lobelij* simile, angustifolia IB. tom. 3. *Laserpitium Massiolicum* simile, angustifolia planta Chabrin  
 an *Laserpitium angustifolium* semine crispo, D. Fagon. HRP.  
 5. *Laserpitium* lobis angustioribus, lucide, uterque bidentibus, plurifariam divis. *Laserpitium Gallicum* CBP. *Laserpitium Massiolicum* Lobelij.  
*Laserpitium* e Regione Massilia allatum IB.  
 6. *Laserpitium* lobis angustioribus, longioribus, & dilute viridibus, plurifariam divis. Moris. Umbel. 64. Cl. Hermann; et Sutherlandus noster in  
 suis Catalogis, hanc speciem pro eodem cum *Laserpitio Gallico*, s. *Massiolio* ponunt. At ipse Moris onus in Bælid. clarè pronuntiat illam ab hæc  
 distinguere, quod folia producit dilutius viridibus, quam *Gallicum*, cujus folia sunt lucide atro-viridibus. an *Laserpitium Daucoides*, *Prutenicum*  
 viscoso semine Breyn. lent. 2.







Tab. CXCIX.  
 1. *Casertium angustiore folio, umbella contracta, & contracta.* Schol. Botan. 567.  
 2. *Laurus Maderensis angustifolia, pallida, odoratissima, venis foliorum, aversa parte, magis extantibus.*  
 3. *Laurus Arorica pallidioribus, & latioribus folijs, inodora.*  
 4. *Laurifacie Arbor, folijs superna parte, saturate viridibus, subis candore nitentibus, Americana. an Laurifolia arbor Americana PBP. in Hort. Reg. Martini.*  
 5. *Laurifacie Arbor, graveolens, folijs pallidioribus, foliaceis pediculis, Americana. an Arbor Indica Norij folijs, pluribus, ex clusterij.*  
 D. Hermán. sub eodem enim titulo aliquando Observavimus.  
 6. *Laurifacie Arbor, venustissime venosis folijs, lacte turgens, Americana. an Mangaiba Brasiliensium cognata. acenē.*  
 7. *Laurustinus floribus albidis, elegantè bullatis, Virginiana. D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.*





Tab. p. cc.  
 1. *Leucadendros Africana*, arbor tota argentea, sericea, folijs integris. Atlas Tree. D. Hermān. hujus ramulus ex Prom. Bon. Spei. ad D. Doodij Botanicum accuratum, allatus est, qui nobis ad excuspendum communicavit.  
 2. *Leucadendro similis Africana* arbor argentea, folio summo, crenatis florida. an *Leucadendros Africana*, folijs serratis. D. Hermān. a Promont. Bon. Sp. sibi allatum, ad me misit amicissimus Vir. D. Patricius Adair.  
 3. *Leucium African.* flore lili carulei, Molluginis folio. D. Hermān. forte *Chichimecapalli*, seu *Chichimeca Gentis Martiana* Hornand. e Codice Compluriar.  
 4. *Leucoxylum* arbor siliquosa, quinque folijs, floribus Nerij, alato semine Americana. Pseudo-Apocynigenus, quare, folium Barbadiensibus nostratibus, *Whiterwood*, *Tulip flower*, et aliquando *Trumpet Flower*, nuncupatur.  
 5. *Linonium fruticosum, minimum, glabrum.* forte *Linonium maritimum minimum* CB. prodr. cujus Iconem dideris: quod Boconiana.  
 6. *Lecus spuria, punctatis folijs.* Arbor Americana, fructu parvo Pruniformi, officulo sulcato. Barbadiensibus *Baslard-Lecus*, vocata, forte *Frutes arborescens, nominatus*, folijs oblongis, ovatois, leviter serratis, alternis, & veluti perforatis. Mar. egr. p. 81.  
 7. *Lobus Maderaspatarus villosus, Ornithopodij siliqua singulari.*

thus far 116A Figures





Tab. CCI  
 Fig 1. *Lotus polukéas* & incana flore majore viridi. Morison. Hist. 2. p. 178. *Lotus pentaphyllos* incanus. CBF. *Dorychnis* congener  
 Planta I. B. tom. 1. *Dorychnis* congener planta, Clusij. Hist. Lugd.  
 2. *Lotus tenuifolius* Maderaspalarum, si liqua singulari glabra. Marneti. Hort. Malab. huic proprius quam Anil sylvestri Bismagario hujus.  
 Phylograph. Tab. 101. accedere videtur.  
 3. *Lucinium* Tilia folijs minoribus, Americanum, forte Curupicaiba Brasiliensis. Maregg. p. 132. an Arbor Populo similis, resinosa. CBF. To col  
 Guebet (ie) Arbor desiderij. forte etiam Arbor lucens Jamaicensis nostras Raj. Hist. app. Arbor muscarum splendens. Iouston. Dendrol.  
 477. Barbadosibus nostratibus quibusdam Light-Wood, ab alijs Lignum Rhodium nuncupatur.  
 4. *Lupulus sylvestris* Americana, claviculari donata. Wilde Hop-seed. Barbadosibus dicta.  
 5. *Lupulo* vulgari similis India Orientalis, floribus in spicam, ex origine foliorum prodeuntem dispositis. an *Urtica* generis Indianum,  
 minusve pungens. forte Battii-Schorigenam Hort. Malab. p. 2.  
 6. *Lycium maximum*, cordatis folijs, Maderaspalarum, hamatis spinis, flosculis ex uno pediculo racemosis.  
 7. *Lycium* cordatis folijs, magis ramosum, spinis rectis e Maderaspalarum, ex Plantis sicis, Ultrag. liber altitate Spectatiffimis Viri D. Caroli du Bois. cominu.





Tab. CCII.  
 1. *Lycium ternis spinis, simul et non folijs, ad genicula prorumpentibus, forte Lycium Creticum Pro sp. Alpin. ex ot. Lycium Cretense. s. Berberis Cretica. IB. Berberis Alpina Cretica. CBP.*  
 2. *Lycium Mader aspatarium, Indici Alpino prutati, amulorum, bipedibus, & gracilibus aculeis, horridum.*  
 3. *Lycium Portoricense, Bice folijs angustioribus, Hort. Bedum. an Berberidiis facie, Arbutula Americana spinosa, folijs Lycio nonnihil similibus. PBP.*  
 4. *Lycium cordatis Buxi folijs, Mader aspatarium, ad singulorum foliorum sectionem, spinula ornatum. e du Boisianis.*  
 5. *Lycium Pyracantha, folijs latioribus, an ipsa Pyracantha e Mader aspatari.*  
 6. *Lycio cognatus Frutx, Polonij facie triphyllis e Mader aspatari. ex Herbario vivo du Boisianu.*  
 7. *Lysimachia lutea, corniculata, angustifolia, flore minore. an Lysimachia angustifolia Canadensis, altera caule rubro, flore minore Schol. Botan.*  
 8. *Lysimachia non papposa Virginiana, Tubera ut folijs hirsutis, flore tetrapetalo rubello. D. Banister.*







Tab. CCIII  
 1. *Lysimachia viscosa* Virginiana flore amplo, coccineo. s. *Muscipula Regia*. D. Banister.  
 2. *Lysimachia non papposa* flore luteo majore, siliquâ *Caryophylloide* minore, ex Virginia. D. Banister. forte *Lysimachia* a altera Brasiliensi.  
 3. *Lysimachia corniculata*, maritima, sinuatis, & pubescentibus folijs, Virginiana. D. Banister.  
 4. *Lysimachia viscosa*, glabra, *Parietaria* folijs, Virginiana. Hort. Oxon.  
 5. *Lysimachia non papposa*, humilis, *Madraspata*. *Clinopodij* lutei folijs non venatis, fructu *Caryophylloide* parvo.  
 6. *Lysimachia spicata* purpurea affinis, *Hyssopi* folia è *Madraspata*.  
 7. *Manga sylvestris* India Orientalis. Hort. Reg. Hampton. forte *Cat. Ambalam*. s. *Pec. Ambalam*. Hort. Malab. Pa. abiq. *Figura*.





Tab. CCIV.  
 Fig. 1. *Malus Peruvia dilaceratis folijs, & veluti circumrosis, Virginiana.* in Hort. Comptonian. per multos annos excolta.  
 2. *Mamee arbor Indice Occidentalis, Juglandis folio virifera. Marnaya.* IB. forte etiam *Arbor virifera, Courton Juglandis similis* ejusd. IB. tom. 1. *Arbor Indica Marnaya dicta.* CBP. *Mamee, Mornin, & Toddie Tree* Nostratibus appellata.  
 3. *Mangle arbor Pyrifolia, salis, & vuliginosis locis, in America, proveniens; fructu oblongo, tereti, summis carnis radiosa. Mangle;* *Pyrifolia, cum siliquis longis, Fici Indice affinis.* IB. *Manges, s. Mangles 3<sup>a</sup> species, Guaparai ba dicta Pisonis.* Pareto vir Rochfort. *Arbor de Raiz, Linschot. Ind. Or. P. 4. Ostreifer a arbor* que in Sierra Lionia, provenit. *Purchasj. Navigat. tom. 2. forte Kandel, Kari-Kandel, vel Pee-Kandel.* Hort. Malab. P. 6. *Swamp-Mangrove-Tree, Nostratibus dicta, et aliquando, Oyster-Tree.*  
 4. *Mangle alba, Coriaria, folio densiusculo subrotundo, glabro; fructu forma Caryophylli aromati majore. Mangle 2<sup>a</sup> species, s. Coriaria Brasiliensium Pisonis.* *Pou-Kandel.* forte Hort. Malab. P. 6. *White Mangrove Barbadosibus dicta.*  
 5. *Nasturtium Alpinum, tenuissime divisum.* IB. tom. 2. CBP. *Thlaspi mortuanum minimum.* Hist. Lugd.





Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

tab. ccv.  
 1. *Manihot Indorum*, s. *yuca folijs Cannabis*; CBP. *Manihot Theveti*. *Yucca*, & *Cassavi*. IB. *Huicca*. s. *Mandioca* ex qua *Cassavi* fit. Park. *Huica*. s. *Mirumait*. Nov.  
 Hisp. Texent. apud Hernandez. *Maniuba* & *Manduba*. *Brazilensis*; cujus radix *Mandiotoca*. Pison. & Max. cog. *Yucca* *Braziliana*, & *Americana* *stellato folio*, mucositate  
 2. *Melana* & *edyon* *Arbor Americana*, *Prunifolia*, baccas ab-amentarias proferens, ad ortum foliorum, spinulis barbata. *Stake-wood*, *Take-berry*, *Barbadosis*, dicta.  
 3. *Melanomma*, et *Melanoxydon*, *Arbor Laurifolia*, *Nucifera*, gemmis nigricantibus, *Americana*. *Andira* (forte) s. *Angelina* Pisonis. *Black-bud*, & *Black-wood* Barba-  
 4. *Mercurialis Maderaspatis*, *tricoctos*, acetabulis destituta. *folijs* Pee-Cup *Ameri Hort. Malab. P. 10.*  
 5. *Muscus terrestris*, repens, clavibus singularibus, foliosis, erectis. *Raj. Hist. Pl. 121.*  
 6. *Muscus coranoides*, albus, fungosus, apicibus nigris.  
 7. *Myrsotis*, folijs subrotundis, herba, *India Orientalis.*





Fig. 4



Fig. 5



Fig. 7



Fig. 3



Fig. 6



Fig. 2

M. V. G. scul.

CCVI.  
*Myagrurn monospermum minus* CBP. Park. 826. an *Myagrosimilis flore albo*. IB. tom. 2.  
*Myrrhis Cicutaria*. Tabern. Ic. 98. *Cicutaria bulbosa* CBP. *Bulbocastanum coniophyllon*. Camerac.  
*Nasturtium Alpinum insipidum*. CBP. *Cardamine Alpina insipida*, Column. rectius tamen, *Brassica Alpina spuria*, folijs *Bursa pastoris insipida*.  
*Nasturtium petræum*, anuum nostras. an potius *Thlaspeos*, genus, circa *Bristoliam*, an *Nasturt. petræum*, folijs *Bursa pastoris* CBP. *Nasturt. petræum* Tabern.  
*Negundo mas* Garcie, & *Acoskæ*. *Negundo arbor mas*, & *femina* IB. *Frutex Indius baccifer*, fructu calyculato, monopyræno, *Negundo dicta*, Ray. Hist. Pl. Japon.  
*similis*, *Fructus striatus*. CBP. *Bemnos* Hort. Malab.  
*Nex*, aut potius *Olea Laurinifolia*, *Portoricensis*, summo margine, crenato, nomine *Amygdali Brasiliænsis*, à *Cl. Mer.* aliquando recepta, ut audio, huius forte spectat *Kari-vetti* Nori. Mal.







Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3


Fig. 5

Fig. 6

M. Vander Gucht. scul.

Tab. CCVII.  
 1. *Nerium Americanum* maximum folio obtuso P. B. Prod. an *Nerium Americ. lactescens*, longissimo folio, flore albo, odoratissimo Hort. Bedum. in Hort. Reg. Hamp. succ. erat.  
 2. *Nerio affinis* Barbadosis Arbor latifolia, flore purpureo, Jasmini odore, Jossimye-Tree, Noibatibus dicta.  
 3. *Nerio affinis*, angustifolia lactescens, flore luteo, Americana.  
 4. *Nux Americana*, costis foliorum appendicibus aucta. *Nux Americana* folijs alatis hispida; Knippa. P. B. P.  
 5. *Nymphaea Maderaspata*, Nasturtij Indici scutato folio, solidiori, venis atris, pediculo spirulis asperato.  
 6. *Nymphaea minima* Maderaspata, folijs alas Papilionum, referentibus. huc forte May-alom-el-maovi, e. Sempervivum aquaticum. P. Alpini, & Stratiote: Egyptia. Dioscoridis. Veslingjii Not. ad Alpin. de Pl. Egypt. 44. Lutrarnqz e Collectaneis du Boisjanis accepimus.





Tab. CCVIII.  
 Fig. 1. Nux Venicaria Oleosa, folijs umbilicatis, ex Insula Barbadosi, Nux Zeylanica, umbilicatis folijs. Hort. Bedum. Arbuscula exotica, folijs umbilicatis, nuculam, nucula Indica Donara IB. similis ferens. Breyn. Prodr. 2. Althaea arborea Indica, folijs umbilicatis rubente. PBP. Tacke in a boxe, nostralibus dicta.  
 2. Nux Portoricensis, amplissimis folijs, venosis, & late virentibus.  
 3. Nux Zeylanica folio multijido, digitato, flore merdarn olente, Telabo Zeylanensium Parad. Batav. Prodr.  
 4. Ocimum Maderaspatarum, frutescens, gratissimii odoris, flore parvo, cauliculis villosis. an Ocimum frutescens pereme flore parvo. Brongn. Prodr. 2. forte etiam Xicoxi hoit. Nov. Hisp. Terentij. apud Recchum. an Herba Cidreira Lusitanis. Marcgr. 32.  
 5. Ocimum odoratissimum, calpicibus, ad verticillas deorsum tendentibus, absq; petiolis, e Maderaspattari.

M. V. G. scul.





M. Vander. Gucht sc.

Tab. CCIX.  
 Fig. 1. *Nux moschata* fructu rotundo. CBP. *Nux aromatica* femina. IB. *Nux Myristica*, Matthioli. hujus fructus, cortice denso, ut in nostris nucibus tegitur; cui alter tenuior, reticulatus, rubescens subest, qui *Macis* dicitur.  
 2. *Nymphæa* India minor floribus cum petiolis, ex foliorum pediculis nascentibus. à D. du Bois communicata.  
 3. *Olea sylvestris* Barbadosium, folio angusto pingui, leviter crenato. hujus Arbor gummi instar Elemi (ut audit) fundit.  
 4. *Oreana*, s. *Orellana*, s. *Uruçu* Marcgr. v. Risou. *Oreana*, s. *Orellana*, folliculi lappaceis. Hort. Lugd. Bat. *Achioti*, s. *Medicina tingendo apta*. Herndn. Hist. Mexic. <sup>Ches. ex gr.</sup> <sub>Dalmi.</sub>  
 5. *Orobanche* *Verbasculi* odore. D. Plot. Hist. Nat. Oxon.  
 6. *Orobanche* *Virginiana*, radice fibrosa à summo caule, foliis subrotundis.  
 7. *Orobanche* *Virginiana*, flore portulacalo, cernuo. D. Barister. Cat. Miss.






Tab. CCX.  
 Fig. 1. *Ophioxylum Americanum*, folijs oblongis, mucronatis, leviter serratis, Bar dani instar subius lanuginosis. Lignum Colubrinum, Barba-  
 densium. Snake wood ibi nuncupatum.  
 2. *Orobis Pyranicus*, latifolius, nervosus. Schol. Botan. p. 242.  
 3. *Passiflora* s. *Flos Passifloris Curassavicus*, folio glabro, & lobato, & angusto, flore flavescente omnium minimo. PBP. in Hort. Reg. Hampton. hujus  
 species cortice aeternum fungoso praedit est.  
 4. *Passiflora affinis*, Hederifolio, Americana. Nhandir-Oba Brahiensis. Pisonis. an Planta scandens, hederaceis folijs Zeylaric Breynij. Eph.  
 Germ. An. 4. & 5. Obs. 137. forte *Hedera* folijs Guineensis fruticosa scandens capreolis. Hort. Beaumont. p. 24.  
 5. *Pentaphylloides* erectum luteum, *Alchimilla Alpina* effigie, quibus folijs incanis, ad summitates trifidis.  
 6. *Pentaphylloides*, fruticosum, Alpinum, argenteis folijs flore purpureo, trifoliatum. *Trifolium alpinum* Ponae Ital. *Trifolium alpinum* argen-  
 teum *Persiciflorae*. CBP.  
 7. *Persicaria Maderaspata*, longiore folio, hirsuta, forte *Belutta-Modala-mucua* Hort. Malab. P. 10. forte etiam *Potinroba Brasiliensium*. Pisonis.







Tab. CXXI.  
 1. Drobanche Autumnalis, Virginiana radice dentata D. Banister.  
 2. Drobanche Verma radice dentata Virginiana D. Banister.  
 3. Passiflora arborea Laurinis folijs Americana. Cucumis. Flos Passionis dictus Quajavas folio majori Hort. Lugd. Clematis Americana Digitalis flore  
 siliquosa, monophyllos major. P.B.P. an verius Murucina s. Barbadoensis. Pisonis.  
 4. Periclymenis similis Myrsinella arbor Madagascariensis, Nipis-Nohil forte Malabar grum cognata; e Viridario sicc. du Boisiano  
 acceptimus. in Hort. Reg. Hampton. Arbuticulum pulcherrimum kurian a altitudine observavimus.  
 5. Phaseolus arborcus, tetraphyllos Zeylanicus Hort. Reg. Hampton.  
 6. Phaseolus Novi Orbis. Faba purgatrix latissima cordis figura. 1B. tom. 2. Fabas. Phaseoli purgantes Park. Faba purgatrix latissima ex Insula  
 D. Thomae. CBP. Cor S. Thoma. & Phaseolus major, Faba purgatrix nomine missus, Chus. Comment. ad Monard.  
 7. Phaseolus D. Thomae quodammodo ascendens, Frutex spinosus Hort. Reg. Itahip. an Cypro quodammodo affinis arbor quadrifida spinosa, Americana flore luteo  
 odorato sub qua planta membrana nasci per medium planit orbem secundum longitudinem Sericea leguminoza in modum se operiente: Breyer. Prod. 2.

M. V. G. scul.





Fig. 1

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 7

M. V. G. scul.

Tab. CCXII.  
 fig. 1. *Passiflora non crenata*, Americana, triphylla. ex Codice Beningiano.  
 2. *Pentaphragma palustre* rubrum, crassis, & villosis foliis Suevicum, & Hibernicum, hujus exemplar ex Sueviâ sibi allatum, nobis dedit Reverend. D. Stonestreet quod etiam Ornatissimus Vir D. Guleon Bonavent ex Hiberniâ (quâ invenit) rediens, nobis amice sibi communicavit.  
 3. *Pentaphragma* fruticosum minimum prostratum, flore albo, foliis serratis *Fragaria ternis*. *Fragaria affinis sericea incana*. CBP. *Fragaria sterilis sylvestris, sericea, incana* Morison. Hist. 2. *Incana Pentaphragmi* officie, an *Leucas Dioscoridi*. Adv. Lob. *Pentaphragmi* officie. *Leucas* quibusdam. LB. tom. 2. forte *Fragaria Helvetica nana*. Park.  
 4. *Periclymenum Americanum*, è ejus radice fit *Atramentum Lauri* facie *Curassavica*, è ejus radice *Atramentum* conficiunt Americani. PBP.  
 5. *Periclymenum surrectum Persica* foliis *Maderappatanum*. forte *Uti-Carni*. Hort. Mal. P. 7.  
 6. *Periclymenum Zeylanic*. herbaceum foliis variegatis diversi coloribus maculis ornatis. PBP. *Uti-Carni* Indica solo Persica. fructu *Periclymeni* CBP. *Lignum Colubrinum* Garcie ab Hort. ex ejusdem sententiâ *Ekarerija Zeylanicum*. an *Tjudamarum*. Hort. Mal. P. 6.  
 7. *Petasites minor folio Trifolaginis*. Hort. Blef. *Petasites minor* alter *Trifolaginis* folio. HRP. pag. 139.









Fig. 2

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

M. V. G. scul.

Tab. CCXIV.  
 Fig. 1. *Phaseolus Amer.* fol. molli lanugine obsitis, siliq. plur. im. hirsutis pungentibus, semine fusco, punctato. plantæ diversæ ut hæc *Phaseoligenus*, à Zwart.  
 tansi Ind. Or. s. Navi-Corana H.M. P. 8. ejus semina perpetuo sunt atronitentia, et propter eâ ab hæc nostris reperandus. *Couhage* vulgò,  
 2. *Ph. subhirsutus* Americ. eximiosus, siliquis longis cauliculis, insidentibus. forte Guaiana-Tinbo Brasilensib; Pison. Barbadosib; Kist-wench. et quibus  
 Fuddle-fishe nuncupatur.  
 3. *Phaseolus Madagascariensis* folijs glabris trilobatis, floribus eciquis, longis, petiolis ex eodem puncto gemellis.  
 4. *Ph. alatus* Arbor siliquosa Juglandis folio Brasilianus lobo longiss. Acaciæ siliqua instar distincto CBP. lobus Brasilianus ingens *Acacia* formâ B  
 tom. 2. an Perim. Kalswalli. H.M. P. 8. *Phas. alata* Ind. fructus fusco, orbiculato, max. lobis latiss. & longiss. H. Ac. Lugd.  
 5. *Ph. arboræus alata* & mag. Ind. Or. fructus coccineo, hilo nigro, notat. *Phas. Ind. ruber* Boaly. Pison Ind. minus coccineum. CBP. *Abrus* Alpina de *Ph. Egypt.*  
*Arachus* Ind. s. *Africanus* Park. Konni H.M. P. 8. *Glycyrrhiza* Ind. siliquis, & seminibus Pisi coccineis, hilo nigro notatis. PBP.  
 6. *Ph. alata* min. Americ. *Glycyrrhiza* saporis, siliquis & obis; seminibus nigris, hilo coccineo notatis. Leguminace Ind. sic *Glycyrrhiza* arbor Jamaicensibus ei  
 ejus semina Monkey-ver eyes Barbadosibus nuncupantur.








Fig. 3

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

M. V. G. scul:

Tab. CCXV.

Fig. 2. *Phytolobos Americarum* flore albo tetrapetalo, staminibus copiosis, fol. & ramulis per intervalia ternis. Iamdicen sibus. Sive etro eed dictum, forte  
*Tapicava* Brasiliensis. Scoparia. Pi. son. Ba. sourimha Lusitanis. ubi dicit tota planta manifestis sapore & odore carere debet, ut et nostra, ex una  
 seminis ignis, hura ditulum nostralibus adoptum moreri videatur, cum intelligam, quod scopas ex ea conficiunt Americani, quibus ad es  
 verres solent; quisquibus, & sor des ex ortunt, & hoc modo omnia sua, nitide & odore conservant. vnde per son rebo nominis.  
 3. Piper frutes Americ. spica longa gracili; Nhandu Brasiliens. Pi. sonis. Amalago. H. M. P. y. Piper ex Florida. IB. tom. 2. Planta peregrina  
 Olay. exot. Pericorda di. Indos a Lusitanis, vulgo. are. Thabane. yae Nos. Kisp. Mera. v. Nierent.  
 4. Planta seliquosa biyalis, unicapularis, silquis in pl. ramos v. ramulis salicatis diffusis, Cristini marini solumente quosdam modo mentionit. e Madras palen.  
 5. Plantaginis. Stellata folijs, florum spica ex utroque casulis exurgente, huius capsula a Phillo mari Ind. Z. dantoni haud disparis.  
 6. *Prasantho* sylvestre Ar. bor. bas. c. s. fra. caly. nitida, lobis perispermatis folijs Americ. Bar. badensis; Spirit-wood. v. cate.  
 7. *Portulaca* Americ. latifolia, lamugine obducta, longioribus aculeis horrida.





- Tab. CCXVI  
 Fig. 1. *Portulaca Curassavica*, angusta, longo, lucido, folio, procumbens, floribus albis. H. R. Hampt.  
 2. *Portulaca*, an foliis *Telopium* Affricanum, floribus aurantiaco. e. Cod. Benlingiano.  
 3. *Portulaca* similis, Planta Ind. Orient. an *Branis* Malabarorum HM. P. 10. *glauca* India. *Portulaca* folio, fl. majore, dilute caeruleo albicante colore. Commel. in Not.  
 4. *Potamogeton fluvialis*, Sargasso similis lucens, folijs margine dentatis. Fluvialis Pisana, folijs denticulatis. IB. tom. 3.  
 5. *Potamogeton maritimus* grandis, culti, capitulis, folio capillaceo nostras forte *Potam. pusillum* marit. folio gramineo Raj. Synop. s. an *Potam. minor*. capitulis fol. CBP. & Prodr. *Potamogeton* pusill. fluvialis. Boccon. p. 42.  
 6. *Prunus Zeylanica*, spinosa, longior, folio viridi, fructus officulo orbiculari serobiculis refero. H. R. H.  
 7. *Pr. sylv. Virginiana*, fructu luteo rubello, acerbis, vix edulis, officulo lato, & compr. q. an *Theca* xocol. s. *Prunus Cerivinus* Nieremb. 318. *Mora* 20. chotti. Hærnand. 384. *Pr. Curassav. Macaza* dicta. PBP.  
 8. *Prun. sylvestris*, cortice albicante punctatis, folijs Americana. *White Plumme* Barb. badm. s. d. m.





Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

M. V. G. scul.

Tab. C CXVII.  
 Fig. 1. Prunus sylv. Insula Barbados Martialis, fructu acerbo, & nigro, sapore.  
 2. Prunus Sebestena Matth. Hist. Lugd. Sebestena domestica subrotund. foliis, an Opuntia, & Acherozo, CBP. Sebestena domestica. Pr. Alp. de El. A. gypt. M. p. a domestica s. Sebesten. IB. tom. 1.  
 3. Prunus Sebestena longioris folio Maderaspalensis. Sebestena sylv. CBP. Sebesten. sylv. Pr. Alp. Victoriarum H. A. P. a. Prunus Muscibaricus fructus aceroso calyce excepto Ray. Hist. an Arb. arbor de Insula Solar. Zanon. L. stor. Bot.  
 4. Prunifera Fago similis arbor, summi Elemi fundens, figurâ, et longitudine Thoa ex Insula Barbadosensi, an Tucuraba Brasiliensium Pison. lib. 1. in hujus officina Veneris immunda verenda à Natalis penicillo figurantur.  
 5. Prunifera à el. Nuciifera s. Nuci-prunifera arbor Americana proae oblongis, saw folijs, bute terribibus. Muscibaricus odor utam foudens. Lenticularis arbor Barbadosium Lugonis, an Tamboliferâ Garc. Tambolins. Acost. Hist. Aron.  
 6. Prunifera s. Nuci-prunifera arbor Americana lauri subrotund. densioribus folijs, apicibus tantum mucronatis. Damocrus. Tese Barbadosibus dicta. Tiquia forte de Laet. lib. 15.  
 7. Prunif. s. Nuci-prunifera, Musc. Saponario, or bisulato, monoloco nigro, Americana, Nuci Brasiliens Pison. Tequitingaw arbor Laely. Ind. Occ. lib. 15. forte Nebo Ar. a. v. m. e. Comar. Persarum apud Oglethosium. Ait. p. 1. lib. 1.






Tab. C CXVIII.  
 fig. 1. *Prunifera* arbor. s. *Nucifera*, foliis de dracentali longitudine, levi mollitie praedito; Barbadosib; Bully. Bay nuruqais forte Katoa Tiperous. HM. Pa.  
 2. *Prunus* Javanica Atriplicis folijs. Commelin. Kakousa Iavanis. H. Beauv. *Elongifera* nostra Sher de dince Phyl. pr Tab. 173. exhibita, quam pro aximi axidi e vide.  
 3. *Prunus* Americanus officulo magno ex filamentis lignosis rai culatim confecto. Gul. Hughes p. 88. *Acacia* Brasilien. Pison. *Acacia* guae v. *Thamaleria*  
*Brasilienis* Max egg. *Prunus* Brasilienis fructu racemoso, ligno intus pro officulo. Ray. Hist. 1  
 4. *Prunus* pentaphyllos. Malabarica fructu calyci insidente. Ray. Hist. Karijl. Hort. Mal. P. 4.  
 5. *Prunus* sylvestri affinis Canadensis C.B.P. app. *Hypericum* frutesc. Americanum flore albo Park. Theatr. 576.  
 6. *Rhamnus* forte s. *Arbuscula* spinosa. *Evonymi* folio spinis singularibus Virginiana ab aruiffima Vir o. Pharoniacae Londineri priff. D. Charlwood. communis.  
 7. *Rhamnus* forte s. *Arbuscula* spinosa *Evonymi* folio spinis gemellis Maderaspatera.







Tab. CCXIX.  
 Fig. 1. *Plar mica* Virginiana Scabiosa Austriaca folijs, indiffertis. accuratior Non quare in Phytogr. Tab. 43. exhibere curavimus.  
 2. *Plar mica* Virginiana similis, Planta Arneti clava folijs sparsis, hexapetalis. ex Cod. Benedictino.  
 3. *Roseda latifolia* minor Alpina, flore albo flavo, oriente. forte *Roseda latifolia* flore flavo Moris. H. Bles. pro *tridactylites* Alpina, *padic*.  
 4. *Rhamnus* Maderasp. alarius, folijs, periculis, spitis longioribus nudis.  
 5. *Rhamnus* Maderasp. dependens folijs, spitis longissimis foliosis.  
 6. *Rhamnus* Afric. trifoliata major, folijs, subtilis argenteis, dentis, & marginibus ciliatis.  
 7. *Rhamnus* Afric. trifoliata major, folijs, obtusis, & ciliatis, hirsutis epulscantibus.  
 8. *Rhamnus* Afr. trifoliata major, folijs, subrotundo integro, molli, & inueno.  
 9. *Rhamnus* Afric. trifoliata minor, glabrum, splendentis folio subrotundo integro. forte *Lentiscus* Africana triphyllis, quorundam.

M. V. G. scul.





Fig. 2

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

M. V. G. scul.

Tab. CCXX. *Sagittaria* Mail. an schi diete simili è *Maderaspateri*. de qua vid. H.M. P. 2.  
 1. *Ricinus asperior* Alcaz Veneta folijs aliquantulis accedens *Maderaspateri*. ex Florario Vivo du Boissiano.  
 2. *Ricinus lactescens*. Fici folijs, spinulis mor dactibus armatus. D. Banist. *Ricinus Tichytrabido* Americanus lactescens, & urens. floribus albis. PBP. Fruter innominatus purgens, durans. Max. egv. Brantamo: Lusitanis.  
 3. *Ricinus*. *Maderaspateri*, fl. purpureo, trilobato folio, multibus densis, et ornato. in Ricinis Americanis lactescens trilobato folio, proennis flore nigricante. H. Bedum.  
 4. *Ricinus*, dulcis, arboreus Americanus. Populnea fronde argentea, folijs Peruvia nigra ar. gaudis Broyn. Prod. 2. *Ricini fructu* Arbor Linnæi folijs Zingib. argentea Zeyhera D.  
 5. *Ricophora Indica* Bryonia nigra simili, ad foliorum orbem verrucosa P.H. forte *Rabu* *Ratijil* H.M. P. 1.  
 6. *Sagittaria* folijs Planta glotno ato fructu, non copre ex orienti, i sero figurat, Ricophia. is forte genus è *Maderaspateri*.  
 7. *Sagittaria* quo dammodo simili, Planta in *Maderaspateri*, floribus meatis caule, quasi ex utroque prorumpens, ex Florario Vivo du Boissiano.





M. v. G. scul.

Tab. CCXXI.  
 1. *Salix arbor folliculifera*, obtusis folijs candidioribus, Americana White-Willow, Barbadosibus dicta.  
 2. *Salix arbor folliculifera* luteo-aphyllis lucide atrovirentibus, acutis folijs, Americana, blacke Sallow, Barbadosibus vulgo.  
 3. *Salvia Barbadosibus* dicta spica florum compactiori.  
 4. *Salvia folia Arbor Orientalis*, folijs tenuissimis venatis.  
 5. *Sambucus humilis* s. *Ebulus exotica Marrubij aquaticae*, laciniatis folijs H. Pat. à D. Doody accepimus.  
 6. *Sambucus Barbadosibus* dicta, folijs subincanis, forte *Aninga Perù Brasiliensibus*, & son. p. 228. forte dicta *Xumail Mexicoribus*. s. *Sambucus Hernand.* lib. 3. c. 81.  
 7. *Scabiosa Graminis folia nudicaulis*, capitulis argenteis s. *Statice minima Maderaspasina*, ex Herbario Vivo du Boissiano.





Tab. CCXXII.  
 fig. 1. *Sanicula montana* crenata, folio longiore, pediculis foliosis. Schol. Bot. pag. 27.  
 2. *Sanicula Alpina*, s. *Sedum Alpinum*. Fr. Gregor. R. hegiens. Column. secunda varietas.  
 3. *Sanicula Alpina*, s. *Sedum tridactylites Alpinum* majus album. CBP. *Saxifraga petraea* Ponde.  
 4. *Sanicula Myosotis* floribus albicantibus ferè umbellatis. Phytogr. Tab. 58. febricor Geon.  
 5. *Sanicula Virginiana* folio oblongo mucronato. Phytogr. Geon accuratior.  
 6. *Sassafras arbor* Monard. Hist. Lugd. *Sassafras*, s. *Lignum Pavanum*. IB. tom. 1. Arbor ex Florida *Ficulneo folio*. CBP. *Artusiba* *Brasilensium*, s. *Sassafras* Pison.  
 7. *Scabiosa affinis*, *Chrysanthemi facie*, *Lamiæ foliis* Americana. Archangel Barbadosibus dicta.  
 8. *Scortea arbor* Americana, ampliffimis folijs, avera parte nervis exantibus hirsutis ferruginis, et fortis. Leather coat. Tree Barbadosibus nostris.







Tab. CCXXIII.

- Fig. 1. *Sedum Africanum teretifolium*, flore Hemerocalicidis. ē Codice Compton.
- 2. *Sedum petraeum teretifolium Virginianum* D. Banister.
- 3. *Senecio humilis Americana* folijs herba Mimosa, siliquis erectis. à Charma cristà Pavonis Americana siliquis multiplici Breyriana admodum diversa.
- 4. *Senecio foetidus Africanus perennis*, folijs corforiteri nascituribus D. Syen. Conyza Africana Senecionis flore, retusis folijs H. Ac Lugd. an Conyza Maltensis retusis folijs Boeton.
- 5. *Senecio perennis latiorifolius* Prom. Bon. Spei. quo loco ad se missum nobis communicavit D. Doody.
- 6. *Sideroxylum Africanum*, s. lignum ferrea durissimofolio oblongo, lignum ferreum bulgò. PBP. in Hort. Reg. Hampt. colitur.
- 7. *Siler Aquilegiae folijs* Moris Umbel. 7. u. 8. Libanotis latifolia, Aquilegiae folijs CBP. Ligusticum Ravolij folijs Aquilegia. IB. tom. 3.









Tab. CCXXV.  
 1. *Sisyrinchium African. trichanthophorum* ē Codice Compton.  
 2. *Sisyrinchium minus polyanthemum* flore parvo luteo, & adijs aurantijs (seu phæniceo-aureis) elegantissimè striatis. Capit. Bon. Spei. Breyn.  
 Prod. 2. hanc lapidissimam plantulam in Hortulo D.<sup>ni</sup> Doodj, diu flor. entere summa cum voluptate conspeximus.  
 3. *Smilax claviculata* Hederae folia, tota levis ē Terrā Marianā.  
 4. *Solanum racemosum Americanum*. Ray Hist. *Solanum racemosum tinctorium*, Americ. folijs & seminib; Amar. anthi. H. Ac. Lugd. *Solan. magnum Virginianum rubrum* Paxk. forte *Cuechiltu Tomatu Mexicosis;* Hernand. *Pocan Virginienis;* ex monitu. Cl. D.<sup>ni</sup> Lister.  
 5. *Solanum Spiriferum frutescens, spinis igneis Americanum* forte *Huitu-Tomatruin, s. Tomal spinosa* Hernand. 108. nostri tamen ramulus imia tantum par tepinosus eo adit, superiora mitis est.  
 6. *Solanum Americanum* perente subincanum fructu Pyriformi longiore, spinis plurimis armatum.





Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6


Fig. 7

Fig. 8

Tab. cc. xxvi.  
 Fig. 2. Solanum Barbadosense spinosum, folijs villosis, fructu aureo rotundioris, Pyri parvi in versis formis et magnitudine. an Cucurbitacei generis, Fructus peregrinus, a Francisco Peniciao missus. Cass. exod. Fructus Indicus Pyri formis, per arboris intus nigris Cucurbitaria generis IB. huius forte etiam spatat. Malabar. Noo Hispania Terentij, apud Recch.  
 3. Solanum pomiferum, fructu incurvo. CBP. Curbi. Solanum Prine. Frid. Cae. sy. in Tab. Phytoscop. quoda Melongena vulgo, (ie) Nila-barudena Mala-barorum. HM. P. specie non differt, illius est tantum varietas. Potlijon Hortulanis nos et arabibus dicitur.  
 4. Solanum pomiferum magna fructu, ex albo & utroque purpureo nitente, folijs & calyce spinosis Solanum pomiferum fructu nigro spinosum CBP. Solanum species Fockij, dicta Tavanensis. Bonij. 223. Melantrana nigra Rawolf. Hist. Lugd. Brounjolly nostratibus vulgo.  
 5. Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro CBP. Mala F. thiopica. Dod.  
 6. Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro CBP. Mala F. thiopica. Dod.  
 7. Solanum Zeylanic spinosum, folio amplo in cano, ad pediculum strictiori. forte Solanum spinosum pomiferum Indicum album, s. folijs Hyosciami albimajoris Breyn. Prodr. 1.  
 8. Solanum bacciferum Americanum fructu corymboso, ex Insula Tarnaiensi.







TAB. CXXVII.  
 1. Solanum mor-dens s. Capsicum latifolium, Mal. Ethiopii fructu magno striato, compresso, Americarium, Donnet Pepper Barbadoensis is selgē.  
 2. Solanum Indicum Laurinis angustioribus folijs maximum Hort. Reg. Hampt. ubi datur et hujus species, alii a multis latioribus folijs ex America.  
 3. Sonchus levis Mader asparagus, forte Muel-Schev. HM. P. 10.  
 4. Symphytum maculosum s. Pulmonaria maxima, folijs quae si Saccharo incruscatis, aī Symphytum Alpinum latifolium maculatum asperius flore carulis HRJ.  
 5. Symphytum non maculatum asperius per elegans, flore multiplici.  
 6. Symphytum s. Pulmonaria non maculata folijs glabris Americarium flore pediculis carulis.  
 7. Symphytum micinum Aciri folijs bijugis Mader asparagum.  
 8. Syringa Babylonica indiviuis densioribus folijs confertis & minus acutis, sub ligustri C. orientalis acule in Hortis Patauini: sicis hancis semel Pulmonaria.





ab. CCXXXVIII.  
 1. *Syringa scandens* Maderaspata *Fraxini* folijs densioribus, clavibus donata.  
 2. *Tacamahaca* folijs crenatis, Sadelhout's. Cordon ad *ephippia* conficienda aptum PBP. *Tecomahaca* Mexic. Hern. in *Tacamahac*. *Populo* similis. fructu colore *Paeoniae* IB. Arbor *Populo* similis, resinoso altera. C.B.P. a Prom. Bon. Spei. accepimus. in HRH. antea collegimus.  
 3. *Telophium* max. Africanum flore curantiaco. ex Cod. Benting.  
 4. *Teucrij* folijs. Frutex *Curaçavicus*. PBP. *Teucrio* soritibus *Indica* fruticosa, folijs crassiusculis. H. Beatum.  
 5. *Teucrium* latiorifolio villosissimum, calyce ampliori è *Maderaspata*.  
 6. *Therobanthus* Americ. polyphylla, *Palama* dicta. PBP.  
 7. *Therobanthus* Americ. Sorbi cucupariis folijs, rachimedio appendicibus alata. Arbor Americ. resinosa, folijs ad *Rosarium* folia accedentibus H. Beatum.  
 8. *Thlaspi* Chalepense *Lenaria* folijs siliculis hirsutis.  
 9. *Thymelaea* Afric. *Sanamunda* facie, *Erica* fol. angustiss. PBP. item *Erica* Afr. arbor. corisfol. fl. flavo. ejusd. PBP. in HRH. collegimus.





Fig. 3



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 8



Fig. 4



Fig. 6



Fig. 5



Fig. 7

Tab. CCXXXIX.  
 Fig. 1. *Thorebinth*, Americ. trifolia lucida, Palamallata vulg. PBP. an. *Nyroala* M. p. 3. *Pomifera* Indis. trifol. fructu Pruni-fol. caudato Raji. forte *Tapia* Brasilens. Mart.  
 2. *Thymelaea* Alpina glabra fol. cretis subsessilis ad foliorum ordinem sessilibus an. *Sarantunda* glabr. & W. tom. 1. *Thymelaea* fol. Polygala glabris. CBP.  
 3. *Thymelaea* insularis Mart. et fol. & facie surculis admodum fragilibus. *Thym.* quaedam incho. *Sesuvium* Raji. L. & proxima hinc, si non eadem est *Chamaelira*  
 Alp. folio infero incho. CBP. *Chamaelira* hirsuta nomine data. IB. tom. 1. *Chamael.* Alp. incho. Adv. v. Leon. Lob. Belluc. Ind. Pis.  
 4. *Thym.* capensis sericeis brevioribus vacuatis fol. caule & orniculato piloso. an. *Thym.* *Thiopiae* *Paffonia* fol. Br. Cent. 1.  
 5. *Thym.* capensis Nepae *Thyris* fol. aculeatis. flor. parvo purpureo. forte *Thyrebra* Affric. fol. spinos. Barthol. Act. Med.  
 6. *Polygala* astragaloid. fr. vire. *Thymbra* facie & sp. flor. e minore purpur. fructu corniculato. Cap. Bon. Sp. Br. Prodr. 2.  
 7. *Thym.* capitata angustis *Salvia* fol. Ex om. Bon. Sp. an. *Salix* conop. hor. angust. mucronat. pl. glabr. PBP. forte *Frutex* *Thiopiae* conifer fol. *Greori*. *Salvia*  
 amulus Br. Cent. 1. h. tres nodi flor. e recensitas *Thymelaea* species D. Patricius Adair. Vir. boni humani. & Rei *Thyris* ballena. forte nobis amica. flor. d. m.  
 8. *Thymelaea* marit. Barb. adent. & Ber. muel. s. s. *Thyris* minor Americar. ramossissimus. Milk-weed. *Bermeudensis*. vulg.  
 9. *Thym.* arbor Americar. *Muli* *Medica* pl. amphoribus tenuissimè crenatis, sulc. maximè benoniato. subfoliorum basi ad pediculus *Sesuv*  
 (spiruarum instar) nascuntur appropinques. quod hinc *Thyris* peculiarè vitatur. *Telakia* Mexic. Nier emb. *Telakia* arbor. turons. & *Hailini* s.  
 Guao. *Heru*. *Poyson* Tree *Barb.* *Thyris*. vulg. *Hula* *Hamptonia* in *Plantar.* rari orum ditissimo *Hort. Reg.* collegit. vab. *Insula* *Barb.* *adentis* *Thyris* *Thyris*  
 accepimus.






Tab. CCXXX.  
 Fig. 1. *Tithym. arborus* Ethiopici *Morus germanici* folijs flor. pallido. H. Amst. an *Tithym. Monomatapens. Myrtis* folijs angustiorib. floribus  
 rubris purpureis. *H. Badiana* forte *Tirucalli* H. M. p. 2. in H. R. eg. Hamp. succrescit.  
 2. *Tithym. Cerasifolius* Myrtifolius flore papilionaceo, coequeo parvo. PBP. ex Cod. Benling.  
 3. *Tith. Cerasifolius* folijs latiori triphyllis floribus serratis. *Massinisa sylvestris* vulgo. PBP.  
 4. *Tithym. Ceylanicus* spinosus arbor. PBP. an *Ela-calli* H. M. part. 2. in HRH. flor. ens. insigni praebe Ornamentum.  
 5. *Tithym. Afric.* arborose squonato caule spinosus. ex Cod. Comp. *Tithym. mali* for. iugenus, *Plantalauteria Afric.* *Pini* fructuare facie. Br. Prod. 2.  
 an. *Tithym. Afr.* arbor. ex spinosus, folijs sus. lutesc. et *Euphorbium sordens* *Euphorbium Africanum* arbor. ex. folijs sus. spinosum H. Beau  
 6. *Tithym. Afric.* arbor. Americ. succas ferens tetra capsularis singulis capsulis bina sernina includentibus. Shagbark e *Bacbadonsibus*  
 dicitur. eo quod dicitur arbor. Cortex scabritie valde asperatus est.  
 7. *Tithym. altera Americana* folijs longis mucronatis.








Tab. CCXXI.  
 Fig. 1. *Tribulum Africanum spinosum*, *Cerei officinae* ex Cod. Compton. in *Tribulum Africanum* & *Mauritanicum* apud *Los Angeles* & *spinosum*, ex quo *Euphorbia* officinarum. H. A. C. Lugd. *Euphorbiae*. Dod. Lob. CBP.  
 2. *Tribulum purpureum* montanum ad *epitaphium* & *delicatum*, capitulum magno compresso. *Tribulum* *hyemalis*. Pax & *Tribulum* *dulce* montanum *Montpellier*. Ray.  
 3. *Tribulum* *lagopoides* majus *hercynicum*, capitulum brevi. *Lagopus* *hispanicus* major. Clus. Hist.  
 4. *Tribulum* *subquosum* rotundifolium glabrum, floribus luteis. *Maderaspatanum*.  
 5. *Tribulum* *corniculatum* minus, superuum, *vincianum*, siliqua singulari *Maderaspatanum*.  
 6. *Triticum* *Policicum*. H. Oxon. ab *ingeritissimo* *Hortulano* D. *Harrison* au *epimus*.  
 7. *Valeriana* *Alpina* minor, *plantaginis*. CBP. quae, si *prod.* in *Montana* *Nardus*. Lob. Icon.  
 8. *Valeriana* *Alpina* minima, *planta* ut plurimum *lenticularis* & *humilis*, ex *H. Paterino* collecta.





M. V. G. scul.

Tab. CCXXXII.  
 fig. 1. Valeriana max. Cacalia folio D. Fagon. Schol. Botan. Valeriana Cacalia folio Alpina D. Fagon. Raj. Hist. 1757. in floreulo billari cultissimo D. du Bois. ad Mitchamiam Vicum Agri Superioris collectam habuimus.  
 2. Valeriana Alpina parva Nardo Celtica similis inodora. Nardo Celtica similis inodora. CBP. hanc in Baldo & Alpibus Suiabio. conterminis legit Casp. Bauh. & monte Drawenstein. Austria D. Burserus collegit. & Valeriana Alpina parva latifolia titulo ad Bauhinium misit.  
 3. Valeriana rubra angustis & longioribus folijs. Valeriana rubra angu. Asfolia. IB. tom. 3. à Valeriana rubra angustifolia CB. Pin. & in Prod. descript. plurimum differt. Gchnudis rubra Valeriana rubra dicit alterum genus ob longo & angustifolio. CB. Phytop. an Valeriana marina angustifolia. s. minor rubra Moris. Umbel.  
 4. Verbenanodiflora incana, Curassavica latifolia. PBP. Hort. Bedum.  
 5. Veronica Alpina frutescens Serpyllina maj. folio longiori. Veronica Alpina frutescens. CBP. Veronica saxatilis IB. t. 3. Veronica frutescens. Clus.  
 6. Veronica frutescens Serpyllina minoris folio cinnato. forte Veronica Alpina minima Serpyllifolia Ponæ Deser. Mont. Bald.  
 7. Veronica affinis Indiæ Orientalis Pulegij facie, calycibus tomentosis.





Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 1

M. V. G. scul.

Tab. CCXXIII  
 fig. 1. *Veronica mas repens* Pyrenaea folio longiori glabro. Sch. Bot.  
 2. *Veronica* s. *Chamaedry* purialatifolia minor, non ramosa Pyrenaea, Sch. Bot.  
 3. *Veronica* p. *ca* sempervirens Poite ad *Chamaedry* vulgaris folio uncinato JB. 23. *Chamaedry* Montis Suanani. quod. ibid. *Chamaedry* Alpina saxatilis CBP.  
 4. *Veronica* pratensis Morroniaria folio flore caruleo Schol. Bot. parum nōt non omnino diff. la. *Belonica* Pauli's. *Veronica* pratensis, *Serpyllifolia* CBP.  
 5. *Viburnum* Americanum odorat. *Urtica* folij. *Sideritis* spinosum floribus mirisatis. PBP. Hort. Reg. Hampt. advenia.  
 6. *Vicia peregrina* angustifolia siliqua lata glabra. an *Vicia* angustifolia purpureo-violacea, siliqua lata glabra D. Magn. Bot. Mon. sp.  
 7. *Viola Alpina* rotunda folio minor Hort. Reg. Pax. Gramen Parnassiacud. Hist. Lugd.






Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

M. V. G. scul.

Tab. CCXXXIV.  
 fig. 1. *Viola rotundifolia montana major* s. *Petror. Valdensem* facie, floribus luteis, *Viola Alpina rotundifolia lutea*. CBP. *Viola Martia lutea* TB. tom. 3.  
 2. *Viola carulea maxima cucumerinis hirsutis folijs Virginiana*.  
 3. *Viola Virginiana tricolor folijs multifidis caulisculo apophyllo*. D. Banist. hujus Non nimis imperfecta cum Synonymia in Phytogr. Tab. 202. et 203. edita.  
 4. *Viola surrecta latiore folio, species peregrina*. ex Codice. Benling.  
 5. *Viola surrecta affinis Pinguiculae facie* Prom. Bon. Spei. ex Cod. Comploniano.







Tab. CCXXXV.  
 Fig. 1. *Virga aurea* s. *Solidago Saracenica latifolia serrata*. *Consolida Saracenica major* Hist. Lugd. forte *Virga aurea Solidago altera* folijs minoribus  
 spiffis. H. Bles. à *Virga aurea* s. *Solidagine Saracenica* IB. plurimum differt.  
 2. *Virga aurea Lemonifolia panicula uno versu disposita*. H. P. & H. Bles. an *Virga aurea Mexicana Lemonifolia*. Dodart. Mem. *Virga aurea*  
 Mexicana C.B.P. app. 57.  
 3. *Virga aurea montana Sirophularia folio* Leon. Robt. an *Virga aurea montana latiore folio glabro*. H. P.  
 4. *Virga aurea latissime folio Canadensis glabra*. Schol. Botan.  
 5. *Virga aurea* s. *Solidago procerior Americana*, caule multiplici. *Solidago maxima*. Cornudi. 168.  
 6. *Virga aurea Americ. frutescens glabra folijs subtilibus, comis ad summitatem in ramulis bractiatis, implicatis*. an *Tlalchichino*  
 Patlahoal Mexicenisibus, s. *Herba usita*. Hernandez. 292.  
 7. *Virga aurea montana biuncialis pumila folijs acuminatis*. an *Virga aurea humilis*. Alpina Moris. Præhud. 323.  
 8. *Eadem foliorum apicibus obtusis*.









M. V. G. scul.

b. c. cxxxvii  
 1. *Urtica* arborea Africana basi ferofloribus purpureis. *Urtica* arbuscula Aethiopiae ramulis alatis floribus purpureis. H. Beaum. *Urtica* arbor  
 Curassavica. PBP. in HRH. sup. ramo verofloruit & fructum tulit. v. a. Prom. Bon. Sp. ad O. Patricium Adair neper nimis allata est, qui & nobis amica forte  
 obbul. an Arbor folijs Urt. Mexicanis Nyaguieturamo Tacuisolquihuals. arbor picta; v. Ocelolquahuil. s. Arbor Tigridis. Nieremberg.  
 2. *Urtica* racemosa maj. Virginiana. mitior s. minus urans. *Urtica* racemosa Canadensis. Dodart Mem. Pin. Brasilensib. Rison Marg. forte Ana Schorigen.  
 3. *Urtica* vegetabilis Zeylonensium Bandura Cingalensib. dicta. Nepenthes Zeylonicum fl. minore. Breyh. Pr. 2. Planta mirabilis distillatoria. Grim. Ep. Germ.  
 Prap. vegetabilis Monarchus. Aman. Ch. Pl. Bandura Cingalensium Gentiane Indica species quod abid An amako. Flak. deser. Ins. Madag. Ogilb. deser. Afr. 685.  
 4. *Urtica* arbor Americana conobulacea fructu punctato Barbadosibus Chequer-Grape (s) Aloa tesulata nuncupatur. huius forte sp. utat Vall. Teregan. HM. p. 3.  
 an Ficus arbor etc. Afric. Lawi American. folijs majoribus fructu racemoso punctato. H. Beaum.  
 5. *Urtica* arbor Americ. per funiculos e summis ramis, ad terram usq. demissa. proflera. The Mangrove-Grape Barbadosibus dicta. an Nyala. HM. p. 4.  
 Sambucus; India Bonly.






Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 2 M. V. G. scul.

CCXXXVIII.  
 1. *Xylobotria* Arbor bacifera frondosa (Cauri pinguioribus folijs Americana. Beefwood (ie) lignum bovinum Barbadosibus dicta. Frutex innoxiosa  
 2. ligno saligno folijs ad Myrtifolia accidentibus. Mart. ex p. 82.  
 2. *Xylomasix* arbor Americana. Whip wood (ie) Arbor flagellifera Barbadosibus dicta a Xylomasice nostra. Erina. Tab. N. M. p. 7. haud multum ablutit.  
 3. *Xyloperistron* s. lignum Columbarium Coryli folio singulari, subtili lanuginoso. Barbadosibus. Pidgeon-wood nuncupatur. hujus arbor Ultraique Indiae abierit.  
 4. *Xyloperon* arbor Barbadosibus. Bitter wood (ie) lignum amarum, nominata haec & no visserit exosite Arborem multam alij rarioribus. ex Barbados  
 Insula in Angliam allata sunt ab honestissimo viro Jacobo Reede, qui Illustrissimi Mecanatis nostri Comitis Portlandice mandatu, in Charibaeas Insulas  
 plures delegatus erat ad explorandum plantas nobiliores Hortum Regium Anka Hamptoniensis in situendas.  
 Tauru par illa Virginis, nostris abbas dicta labalis Umbellifera folijs Americana. an Herbam Canadensium, s. Porace moschatum. hinc perit et alij  
 judicium duntaxat.





APPENDIX

AD

TERTIAM PARTEM

PHYTOGRAPHIÆ

LEONARDI BUKENETJ





Fig. 5



Fig. 6



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 2



Fig. 3

M. V. G. scul.

Tab. CCXXXIX.

fig. 1. *Danthian spinosum* Lusitanicum. PBE. appendice.

2. *Xylocarpus arbor* Americ. *Xylocarpus similis*, eujus ligno Cistas vel strinia conficiunt Barbadoses rostrates a quibus Pinco-wood, & Cabind-wood nominantur. Perichmanig.

3. *Zanthoxylum aculeatum* Carpinifolij, American. cortice cinereo. Telsiba Marogr. Fustick-wood Barbadosibus dicitur.

4. *Zanthoxylum aculeatum* Fraxini similis, & punctatis folijs, American. fructu Evonymis. Prickly Yellow-wood Barbadosibus dicitur. & interdum a foliorum vi caustica, Pellitory of Spain Tree.

5. *Zanthoxylum Pyrifolium*, Stipit spinosa, Americarum. Arbor flava Hercules minor, the lesser yellow Hercules Barbadosibus nominantur.

6. *Zanthoxylum* Americ. Hercules arbor aculeata major, Juglandis folijs alternis parum sinuosis. Arbor flava Hercules major, the greater yellow Hercules Tree Barbadosibus nominantur. dicta in *Muscat. id.* HM. part. 5.





Fig. 2

Fig. 5

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 6

Collins sculp

Tab. CCXL.  
 fig. 1. *Alcea Bengalensis Sabdariffae similis.* ex Cod. Bentiniano  
 2. *Alchimilla alpina pubescens minor.* HRP.  
 3. *Alnus maritima Myrtifolia Coriarijorum.* Bullon-wood Bermudensibus vulgò, à D. Jacobo Petre ex acceptus.  
 4. *Aloe Americana Anania folijs florib; suaverubentibus.* ex Cod. Bentiniano. in *Aloe Americ serrata floribus wvineis.* PBP.  
 5. *Althaa Maderaspata Melochie angustifolij, fructu ex abs foliorum pediculo curto.*  
 6. *Anona Americ. juxta Fluviorum ripas insuensis* ex River Pear Nost. alij. vulgò. hujus Hongensiana hoc loco adfringi curavimus. quae enim pro ea in Phytogr. Tab. 135. exhibetur. est reverè *Anona Americana* folijs splendens. ex Verà et succ. PBP. x ab hac plurimum distat.





Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Collins Sculp

Tab. CCXLI.

Fig. 1. *Anonymus Maderaspator*. Senecionis Hieracii folio similis, spica foliaceae & Normini asteris: quarnati an *Belutta* addeamari juu. HM. p. 10.<sup>o</sup>  
*Amarantho affinis* Ind. Ox. spicatus capruaris.

2. *Apocynum serrato* Salicis folio Americanum. ex Cod. Beningian.

3. *Arbor Americ-Faginis* folijs glabris, cronis rarioribus, p. marginem dentatis. ex Insula Barbadosi.

4. *Arbor Zeylanic*. Colicini folijs subtilis lanugine villis: floribus albis, Cuculi modo laciniatis. A. viro D. Jancrado Robinson accepimus.

5. *Arbor Americ*. Salicis folio frondosa, Bermudensib. Bir. et. Trea. (ie) *Betula dida*. forte Sabraf. Syronum. Rasvolfy. Hist. Lugd. app. ad D. Petevex. transmi.

6. *Carduus Solstitialis*, s. *Spina Solstitialis* quam Allobroges nominant Auxole. n. Cam. Hort. *Spina Solstitialis* IB. 3. *Carduus stellatus*, luteus folijs Cyani CBP. ubi confundit hanc *Spinam* cum *Carduo stellato* minore Column. qui et *Spina Solstitialis* melior *Agula* eidem nuncupatur.








Fig. 1

Fig. 2

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Collins sculp

Tab. CXXII.

- fig. 1. Arbor Americana folijs ad Chenopodij ampliora folia accedentibus ex Insula Barbadosi.
2. Chrysanthemum Helenij folio Urabone grandiusculo prominente. ex Horto Siccio humidissimo bivi D. Benjamen Charwood accipi.
3. Chrysanth. Virginian. villosum, disco luteo quinque petalo ornato.
4. Chrysanth. hirsutum, Virginianum auriculato Dulce amarum folio octo petalo. has Chrysanthemorum Teonici hoc loco adferimus, eo quod accuratius delineata sunt quam eadem planta in Phytogr. nostr. Tab. 83. adposita.
5. Doronicum Alpin. Pulmonariae aureae folio hirsuto, flore singulari. an Doronici Stiriaci Cursio. genus alterum ex H. Paterino collectu





Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Fig 7

Collins sculp

Tab. CCXLIII.

- Fig. 1. *Conyza* Afric. graveolens, capitulis argenteis, colligi apud Bromptonienses in Hort. cultissimo D. Georgij London. qui a Cl. D. Herman. neperri me accepit
2. *Eupatorium* Bermudense latifolium flosculis pallescentibus. Silverweed nostralibus vulgo.
3. *Eupatorium* angustiorifolium Bermudense floribus flavescens. Hogweed nostralibus; dictum. Habuimus a Sagacissimo Botanico D. Jacobo Petiver. & posteriori, a Senecione Africano latiorifolio nostro haud multum abluider copinatur.
4. *Ficus* arbor densioribus folijs parvis, integris Arbonensis.
5. *Ficus* Sirinamensis, multifido folio superna parte admodum scabra, aversa densa lanugine molli. Ambaiha altera species, Ambaitinga Brasiliensis. Piss.
6. *Filix* palustris mas, non ramosa, pinnulis obtusioribus planis. ex Insula Bermudensi.





Fig. 2



Fig. 3



Fig. 1



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 4

Tab. CCXLIV

Fig. 1. Filix Bermudensis, non ramosa, petraea, pinnulis acutioribus planis hirsutiae pubescentibus.  
 2. Filix Bermudensis elegans ramosa, pinnis rarioribus profunde dentatis spelunca rupium innascens cauliculis mucosâ lanugine refertis.  
 3. Filix ramosa proterior lacunis adnascens, platyphyllos ex insula Bermudensi novas has Filicum exoticarum species, cum alijs quibusdam rarioribus eximius ille Botanicus D. Jacobus Peter ad nos mittebat, & ex insula Bermudensi ab ingeniosissimo viro D. Joanne Dickinson Pharmacopaeo peritissimo, et amico suo integerrimo, illic pro tempore commorante, se accepisse significabat.  
 4. Frutex coralloides marinus Virginensis an Coralloides fruticos a Planta marina rectior I B tom. 3.  
 5. Guaiacana Loto arboris Guaiaco Patavino affinis Virginiana, Pishamin dicta Parkinsono suprenâ aetate floruit in Hort. Comptoniano Fulhamiae  
 6. Gramen Bermudense frumentaceum folijs brevibus obtusis spicâ crassiusculâ compressâ, antorsum gemino versu, velut in foveis gramifera G-op. Graese nostratibus vulgô. a D. Peter herbarii.





Tab. CCXLV.  
 1. *Gramen* Tschamnon Bermudense speciosius, folijs brevibus obtusis. ab eodem D. Peterer.  
 2. *Helicteris* arbor Ind. Ov. siliqua varicosa, & funiculi in modum contortuplicata. Boiss. Mar. r. H. M. p. 6. Fructus Ind. fructus e Styli apice egressi.  
 3. *Helicteris* arbor Ind. Occident. fructu majore. Tamaicensibus nostratibus. Button wood dicta.  
 4. *Helictropium* Americanum caruleum folijs Hermiri. Dodart. Mem. Tacua - Azanga Brasiliensium. Pison. Fedagosa Lusitanis.  
 5. *Helictropium* pumilum glabrum, Nasturtij foliis Americanum.  
 6. *Hypericum* Virginianum frutescens pilosissimum. an *Hypericum* frutescens flore tetra petalo decussato, s. Cruz S<sup>ti</sup> And. ae. D. Banister.  
 7. *Lappula* Bermudensis *Althaeoides* spicata, fructu orbiculari majore. a D. Peterer.  
 8. *Larix conifera* ex Promont. Bonae Spei. in H. D. Speer. gij London collegimus.







Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

M. V. G. scul.

Tab. CCXLVI.  
 Fig. 1. *Symphoricarpos* spicata similis, Persica folio. Planta Insulae Barbadosis, floribus ex luteo-albicantibus.  
 2. *Sitonia* narissus Indicus s. *Narissus* latiflorus aureus, strijs argenteis pictus, floribus ampliter natis, gemellis, caudem magno capite fistuloso. HRH.  
 3. *Melaleuca* acuta. Abrutensis, folijs tomentosis, an *Melaleuca* incanaum Grecorum. CBE. quod sub. 3. in Prod. descript. Strabo de Melaleuca Hon. Bell. eq. 2. ad Cus.  
 4. *Morifolia* Virginiana s. arbor. *Lab* arboris in dar ramosa, folijs amplifloris. *Morus* Virginiana laetescens latifloro folio. H. Beaur. *Corylus maxima* folio latifloro Virginiana. Hort. Compl. Ray. an *Quercus* latifolia in Mexicanibus, s. *Arbor* crepitans. 2. Hernand. p. 88.  
 5. *Nux* Juglandis folio minor e Vera cruce. HRH. for *Nux* Jugland. folio Curassavica fol. minorib; PBP.  
 6. *Onobrychis* Maderaspata, diphyllos minor, siliculis hirsutis, an *Nelam* mui. H. M. part. 9. a D. du Bois. accepimus.





Tab. ccxlvii.  
 Fig. 1. Olea Malabarica Fraxinifolia e Madraspatani Arbor India Fraxino similis, Olea fructu. CBP. Némbo Acosta. Aria topou H.M. part. 4.  
 2. Ophrys bifolia palustris nostras. Biflorum palustre. Park. hujus exemplar amississimum Viri et in rebus Botanicis ex er citatissimus D. Samuel Dale Pharmacopaus, & Medicus Braentrensensis, ad nos benigne transmisit.  
 3. Papaver Argemoni dictum flore flavo perpusillum. an Argemoni Alpina Coriandri folio. CBP. Argemone lutea. Pona.  
 4. Phyllanthos Americana angustiori & longiorifolia ramosa, caules cern. ab Homonitidi affris folio simpliciter pinnato. Phytogr. nostr. Tab. 36.  
 plurimum differt. forte Phyllanthos Americana frutes flore e singulis foliorum crebris proferens. PBP. H. Beaur. Hippoglossi fortisignata. figi Olandi serratis. Br.  
 5. Phyllanthos Americ. sinuosis folijs longis, crassis, carnosis. Opuntia in modo dum florifera. Opuntia forte affinis Sirinamensis e foliorum crebris nova folia produens.  
 H. Bedum. Nepaloch. Cuz. Altiquris Mexiensib. Toan. Texent. apud Reech. forte etiam Cancomaya Brasiliensis. Max e g. quoad descriptionem.  
 6. Portulaca curassavie lanuginosa Kali folio erectior. Phytogr. Tab. 106. cum adhaerente floribus perispermatis.  
 7. Portulaca lanuginosa pro umbra Vermiculato folijs, floribus tetrapetalis amonier ubonib. capsulis nonnihil acuminatis. ex Curassavie.





Tab. CCKLVIII.  
 1. Phyllitis. Lingua Cervina maxima undulato folio auriculato per basim. HRP. an Phyllitis crispata. IB. tom. 3.  
 2. Phyllitis seu Ling. cervina minor crispata. folio multifido ramosa. Lingua cervina minor crispata, uno pediculo trifolia. HRP.  
 3. Portulaca scandens Aceto sae subrotundis folijs caesis Americana.  
 4. Potamogeton maritimum pusillum alterum Ray. Hist. Potamogeton marit. pusillum alterum, seminibus singulis longis pediculis incidentibus. q. d. Ray. Syn.  
 5. Rubia quadrifolia lavis Graeca flore purpureo Patavinorum.  
 6. Rubia tetraphylla glabra latiore folio Bermudensis, seminibus binis atque purpureis. a D. Peterer. habitus.  
 7. Tulipifera Americana, exaltior Teonquama in Phytoge. nostra. Tab. 117. exhibetur.






Fig. 2



Fig. 5




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

M. V. G. scul.

TAB. CCXLIX

- fig. 1. *Vitis vinifera* sylvestris, Americana, folijs, aversâ parte, densâ lanugine, tectis. White Foxe<sup>sup</sup> Nostratibus dicta. hujus ramulum, singulari amicitia nobis communicavit. Botanicus ille exercitatissimus D. SAMUEL DOODY, qui tandem ad Horti Medici apud CHELSEIANOS, suburbani, ad AMPLISSIMA SEPLASTIARIORVM LONDINENSIVM SOCIETATE Prefecturam, jure meritisimo evocatus est.
2. Arbor Americ. folijs â Concursu nervorum, imâ parte, longius productis, Subtus lanugine candidante tomentosâ Rotennissade â SIRIVAMENSIBVS dicta.
3. Arbor Americana, Malabathri Subrotund. folijs, subtus lanugine ferruginea villosis. ex SIRIVAM.
4. Arbor Amenc. latiori & acuminato folio binervi, utrinq; glabro, & margine levitèr crenato, Mespilboom BELGIS SIRIVAMENSIBVS nuncupatur.
5. Arbor SIRIVAMENSIS Canella folio, maximo, utrinq; glabro.







Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

M. V. G. scul.

Tab. ccl.  
 Fig. 1. Arbor Sirināmensis & Antegoāna folijs venosis, supernā parte glabris, subtis densā lanugine veluti instar velatis. Pau-boom Belgarum.  
 2. Arbor Americ. ampliorifolio trinervi inferius albā lanugine incano forte Arbor racemosa Brasiliana folijs Malababiri Br. Cent. forte etiā Mūva Brasiliensis. Mart. p. 17.  
 3. Arbor Americana densioribus folijs, pronā parte villosis, supernā splendētibus glabris. Cinamomum putatum ex Sirinām.  
 4. Arbor Americ. fol. praegrandi, acuminato venuste denso, aver sā parte villosis & virētib. obsito, ad pedicellum strictiori.  
 5. Arbor Sirināmensis Hydrolapathi folijs, fulvā lanugine, pronā parte villosis. Gurume-boom ā Belgis Sirināmensibus nominatur.  
 6. Arbor Americ. praelongo & angusto mucronato folio, inter Garyophyllon & Piper Orientale medio sapore aromatico. ex Sirinām barice adhuc Arbores quibus folia sunt trinervia, & quodammodo etiā specie differentia, in Vividario nostro divo servantur. Haec autem accepta referimus Murificentia maxime Reverendi D. de Marees Stipium rariorum estimatoris eximij, & coronidis gratiā, huic Appendici adijcere nos curavimus.



# Abbreviata Hortorum, Librorum, Autorumque in *Phytographia* citatorum, Nomina, hic explicanda veniunt.

- A** *C. Reg. Par.* Academia Regia Parisiensis.  
*Acoft.* Christophori Acoftæ Historia Naturalis Ind. Or.  
*Act. Hafn.* Caspari Bartholini Acta Medica Hafniensium.  
*Adv.* Adversaria Penæ & Lobelii.  
*Alp. de Pl. Egypt.* Prosperus Alpinus de Plantis Ægypti.  
*Alp. de exot.* Prosper Alpinus de Plantis exoticis.  
*Aman. Charact. Pl.* Pauli Amanni Character Plantarum.  
*Aman. H. Bos.* Pauli Amanni Hortus Bosianus.  
*Andr. Cas.* Andreas Cæsalpinus de Plantis, lib. xvi.
- Banist.* Joannes Banister in Catalogo Stirp. Virginienf.  
*Belluc. Ind. H. Pis.* Thomæ Bellucii Index Horti Pisani.  
*Bocc.* Paulus Bocconus de Plantis rarioribus Siciliæ, &c.  
*Bod. à Stap.* Joannes Bodæus à Stapel. Comment. in Theophrast.  
*Bont.* Jacobus Bontius in Historia Naturali Ind. Orient.  
*Bot. Musp. D.* Magnol Botanicum Monspelienfè.  
*Boym.* Michaelis Boymii Flora Sinensis.  
*Br. Cent.* Jacobi Breynii Centuria prima.  
*Br. Prod.* 1 & 2. Jacobi Breynii Prodromus primus, & secundus.  
*Br. Fascic.* Jacobi Breynii Fasciculus rariorum Plantarum.
- C. B. P.* Caspari Bauhini Theatri Botanici Pinax.  
*C. B. Phyt. Casp.* Bauhini Phytopinax.  
*C. B. Prodr.* Caspari Bauhini Prodromus.  
*Cam. H. Med.* Joachimi Camerarii Hortus Medicus.  
*Cat. H. R. P.* Catalogus Horti Regii Parisiensis.  
*Cat. H. R. B.* Catalogus Horti Regii Blesensis.  
*Cat. H. Joncq.* Catalogus Horti Jonquetii.  
*Cat. MSS. H. Oxon.* Catalogus Manuscriptus Horti Oxoniens.  
*Cat. H. Ac. Lugd.* Catalogus Horti Academici Lugdunensis.  
*Cat. Amst.* Catalogus Horti Medici Amstelodamensis.  
*Cat. Edinb.* Catalogus Plantarum Horti Medici Edinburgensis.  
*Cat. H. Beaum.* Catalogus Rariorum, Horti Beaumontiani.  
*Cat. Altorf.* Catalogus Altorfienfis per Mauritium Hofmannum.  
*Cat. H. Lips.* Catalogus Horti Lipsiensis.  
*Cat. Groning.* Catalogus Plantarum Horti Groningensis.  
*Cat. Pat. à Tur.* Catalogus Patavinus Georgii à Turre.  
*Cat. Siles.* Catalogus Stirpium Silesiæ per Casp. Swenckfeldium.  
*Chab.* Chabræi Sciographia Stirpium.  
*Clus. Hist.* Carolus Clusius in Historia Rariorum.  
*Clus. Exot.* Carolus Clusius in Exoticarum Historia.  
*Cod. Bent.* Codex Bentingianus Illustriff. Comit. Portlandiæ.  
*Cod. Compt.* Codex Comptonianus Reverendiff. Episcopi Londinenf.  
*Col. Ecpb.* Fabii Columnæ Plantarum rariorum Ecphrasii.  
*Col. Phytob.* Fabii Columnæ Phytobasanos.  
*Corn. de Pl. Canad.* Jacobus Cornutus de Plantis Canadensibus.  
*Cort.* Jacobus Antonius Cortusius Horti Patavini Præfectus.
- Dod. Mem.* Dodarti Memoires. Gallicè.  
*Dod.* Dodonæi Pemptades Plantarum.
- Eph. Germ.* Ephemerides Medico-Physicæ Germanicæ.
- Flac. Descr. Madag.* Flacourt Descriptio Insulæ Madagafcar.  
*Fl. Bat.* Flora Batava.  
*Floril. Ren.* Florilegium Renovatum Joan. Theodori du Bry.  
*Frag.* Joannes Fragoſus de utriusque Ind. Simplicibus. Hispanicè.  
*Frid. Cas.* Fridericus Cæsius Princeps in Tabulis Phytoscopiciæ.  
*Fum. Hist.* Fumei Historia general. Ind. Occidentalis.
- Gall. Press.* Gallus Pressanus de Re Rusticâ.  
*Garz.* Garzias ab Horto de Aromatis.  
*Ger. Emac.* Joannes Gerardus Emaculatus à Jonfono.
- Hern.* Franciscus Hernandez. In Historia Mexicanâ.  
*Hist. Lugd.* Historia Lugdunensis. Volumina duo.  
*Hond.* Hondii Geographia.  
*Hon. Bell.* Honorii Belli Epistolæ de Plantis ad Clusium.  
*H. Mal.* Horti Malabarici. Volumina X.  
*H. Reg. Hampt.* Hortus Regius Hamptoniensis.  
*H. R. P.* Hortus Regius Parisiensis.  
*H. R. B.* Hortus Regius Blesensis.  
*H. Ac. Oxon.* Hortus Academicus Oxoniensis.  
*H. Ac. Lugd.* Hortus Academicus Lugdunensis.  
*H. Ac. Pat.* Hortus Academicus Patavinus.  
*H. Amst.* Hortus Medicus Amstelodamentis.  
*H. Compt.* Hortus Rariorum Comptonianus.  
*H. Morg.* Hortus Medicus D. Morgani apud Westmonasterium.
- H. Triumf.* Hortus Baptistæ Triumphetti apud Bononienses.  
*Hugh.* Gulielmi Hughessii Medicus Americanus. Anglicè.  
*Hyac. Ambr. Phyt.* Hyacinthi Ambrosini Phytologia.
- Ik. Lob.* Lobelius in Iconibus.  
*Ik. Rob.* Icones Roberti.  
*Imp.* Ferrantes Imperatus in suâ Historia Naturali. Italicè.  
*Ind. Or.* Indiæ Orientalis. Partes X.  
*Ind. Occid.* Indiæ Occidentalis. Partes X.  
*J. B.* Joannis Bauhini Historia Plantarum Universalis. Tribus Tomis.  
*Jonst.* Jonstoni Dendrologia.
- Knox.* Knox Historia Insulæ Zeylonensis. Anglicè.
- Lal. Triumf.* Lælii Triumphetti Catalogus apud Fratrem.  
*Laet.* Joannes Laëtius Historia Naturalis Indiæ Occident.  
*Lig.* Ligonis Historia Naturalis Insulæ Barbados. Anglicè.  
*Linsc.* Hugonis Linschoti Itinerarium in Orient. Indiam.  
*Lob. Obs.* Lobelii Observationes.  
*Lob. Ill.* Lobelii Stirpium Illustrationes à Gulielmo How editæ.
- Matth.* Matthiolus in Commentariis suis in Dioscoridem. ]  
*Mareg.* Georgius Marcgravius de Plantis Brasiliæ.  
*Martin.* Martini Atlas Chinenfis.  
*Mentz. Pug.* Christiani Mentzelii Pugillus Rariorum.  
*Merc. Bot.* Mercurius Botanicus Jonfoni.  
*Meret. Pin.* Christoph. Meretti Pinax Rer. Natural. Britannic.  
*Mich. Nut.* Michaelis Nutii Fasciculus Herbarum.  
*Morif. Hist.* Roberti Morisoni Historia Plantarum Oxoniensis.  
*Morif. Umb.* Roberti Morisoni Historia Umbelliferarum.  
*Morif. Pral. Bot.* Roberti Morisoni Præudia Botanica.  
*Mund. Biochr.* Henrici Mundy Biochrestologia.  
*Munting.* Abrahamus Muntingius de Re Herbariâ. Belgicè.  
*Mus. Reg. Soc.* Musæum Regiæ Societatis apud Londinenses.  
*Mus. Court.* Musæum Cortenianum Interioris Templi.  
*Mus. Zeyl.* Musæum Zeylanicum.
- Nieremb.* Eusebius Nierembergius in sua Historia Naturali.  
*Nieuh. Itin.* Nieuheuoof Itinerarium ad Chinam.
- Ogilb.* Joannis Ogilbeii Atlas Anglicè conscriptus.  
*Ovied. Consalv.* Ferdinandi Oviedi Ind. Occ. Histor. generalis.
- Park.* Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum.  
*P. B. P.* Paradisi Batavi Prodromus.  
*Phyt. Brit.* Phytologia Britannica.  
*Phytogr.* Phytographia Plukenetiana.  
*Pison. Hist.* Gulielmi Pisonis Historia Naturalis Brasiliæ.  
*Pison. Mant.* Gulielmi Pisonis Mantissa Aromatum.  
*Plot.* D. Plot. Historia Naturalis Agri Oxoniensis. Anglicè.  
*Pon. desc. M. Bald.* Joannis Ponæ descriptio Plantar. Montis Baldi.
- Raji. Hist.* Joannis Raji Historia Plantar. Universalis. Duobus Tomis.  
*Raji Cat.* Joannis Raji Catalogus Plantarum Angliæ, &c.  
*Raji Obs.* Joannis Raji Observationes Itinerariæ.  
*Raji Cat. Stirp. Ext.* Joannis Raji Stirpium Exterarum Catalogus.  
*Raji Syn. Joan.* Raji Synopsis Methodic. Stirpium Britannicar.  
*Rawolf.* Leonardi Rawolfii Itinerarium.  
*Recch.* Antonii Recchi Rerum Medicarum Novæ Hispan. Thesaurus.  
*Redi.* Francisci Redi Experimenta Naturalia.  
*Rochf.* Histoire des Antilles D. Rochforti. Gallicè.
- Sch. Bot.* Schola Botanica Horti Regii Parisiensis.  
*Sim. Paul.* Simonis Pauli Quadripartitum Botanicum.  
*Stirb. Citric.* Francisci van Stirbeeck Citricultura.
- Tab. & Tabern.* Jacobus Theodorus Tabernæmontanus in Iconibus.  
*Terent.* Terentii Notæ in Antonium Recchum.  
*Thal. Harc.* Joannes Thalius in Sylvâ suâ Hærcyniâ.  
*Thevet.* Andreas Thevetus in sua Cosmographiâ.  
*Trans. Phil.* Transactiones Philosophicæ apud Londinum editæ.  
*Triumf.* Joannis Baptistæ Triumphetti Observationes.
- Vesling Obs.* Veslingii Observationes in Prosperum Alpinum.  
*Viridar. Lusit.* Viridarium Lusitanicum. D. Griseii.
- Zanon.* Jacobus Zanonius in Historia Botanica. Italicè.

## Index Totius P H Y T O G R A P H I Æ.

- A** Bies. tab. 1. 21.  
 Abrotanum mas. tab. 121. foem. 160.  
 Absinthium. tab. 1. 73.  
 Acacia. tab. 1, 2. 73. 121, 122, 123.  
 Acer. tab. 2, 3. 123. Negundo perperam.  
 Adiantum. tab. 3, 4. 73. 123, 124, 125.  
 Æschynomene. tab. 4, 5.  
 Alaternus. tab. 126.  
 Alcea. tab. 5, 6, 7. 73, 74. 125, 126, 127. 240.  
 Alchimilla. tab. 240.  
 Alni facie. tab. 128.  
 Alni-folia. tab. 115.  
 Alno affinis. tab. 128.  
 Alnus. tab. 240.  
 Aloë. tab. 129. 240.  
 Alfine. tab. 7. 74, 75. 118. 125. 128. 130.  
 Althæa. tab. 7, 8, 9. 74. 131. 132. 240.  
 Amaranthus & Amaranthoides. tab. 10. 75. 118.  
 132, 133.  
 Ambrosia. tab. 10.  
 Ammi. tab. 11.  
 Amygdalus. tab. 11.  
 Anagyris. tab. 133.  
 Anchusa. tab. 6. 76.  
 Angelica. tab. 76. 134.  
 Angolam. tab. 12.  
 Animifera. tab. 82.  
 Anisum. tab. 12.  
 Anona. tab. 134, 135. 240.  
 Anonis. tab. 76. 135.  
 Anonymos. tab. 136. 241.  
 Antholifhos. tab. 136.  
 Anthyllis. tab. 12.  
 Antirrhinum. tab. 12. 118. 137.  
 Aphyllon aquaticum. tab. 138.  
 Apiofcorodon. tab. 137.  
 Apocynum. tab. 13. 76, 77. 115. 137, 138, 139. 241.  
 Arbores, & Arbusculæ. tab. 13, 14. 77. 139, 140,  
 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. 241,  
 242. 249, 250.  
 Aristolochia. tab. 15. 69. 78. 148.  
 Artemisia. tab. 15.  
 Arum. tab. 77. 148, 149.  
 Asarum. tab. 15. 78.  
 Asparagus. tab. 15. 78.  
 Asperulæ congener. tab. 149.  
 Aster. tab. 14, 15, 16. 78, 79. 149.  
 Astragalus. tab. 79.  
 Atriplex. tab. 16.  
 Auricula Urfi. tab. 79. 149.  
 Balsamum Caprarium. tab. 80. est Ricini genus.  
 Bandura V. Utricaria.  
 Bellis. tab. 17. 82. 150.  
 Betonica. tab. 150.  
 Betula. tab. 151. 241.  
 Bistorta. tab. 151.  
 Biti. tab. 18.  
 Blitum. tab. 18. 151.  
 Brassica spuria. tab. 80. 206.  
 Brunella. tab. 80.  
 Bryonia. tab. 151, 152.  
 Bryonioides. tab. 152.  
 Bucanephyllon. tab. 152.  
 Bugula. tab. 18. 80.  
 Buxus. tab. 80.  
 Cacalia. tab. 153.  
 Calabura alba. tab. 152.  
 Calamintha. tab. 153.  
 Campanula. tab. 23. 152, 153.  
 Carappa. tab. 153.  
 Cardiaca. tab. 80. 118.  
 Carduus. tab. 19. 81. 154. 241.  
 Carlina. tab. 154.  
 Carpinus. tab. 156.  
 Caryophyllus Sylvestris. tab. 81.  
 Caryophyllus aromaticus. tab. 155.  
 Cassia lignea. tab. 81.  
 Castanea. tab. 156.  
 Cedrus spuria Jamaicensibus. tab. 77.  
 Cedrus Barbadiensibus dicta. tab. 157.  
 Cenchræmidea. tab. 156, 157. & huc spectat fig. 2.  
 tab. 77.  
 Centaurium ciliare. tab. 81, 82.  
 Cerasus. tab. 82. 97. 157, 158.  
 Ceraso affinis. tab. 157.  
 Cereus. tab. 29. 158.  
 Ceratia & Ceratiæ affinis. tab. 1. 82.  
 Christophoriana. tab. 20. 159.  
 Chrysanthemum. tab. 21, 22. 83, 84. 115. 118.  
 159, 160, 161. 242.  
 Cicer Astragaloides. tab. 23.  
 Cinamomum Sylvestre Americ. tab. 160.  
 Cistus. tab. 23. 83, 84. 161.  
 Citharexylum. tab. 161, 162.  
 Citrullus Indica. tab. 164.  
 Clematis & Clematidis. tab. 84. 162, 163.  
 Clinopodium. tab. 24. 54. 84, 85. 163, 164.  
 Colutea. tab. 164, 165, 166.  
 Conferva. tab. 24. 84.  
 Convolvulus. tab. 9. 24, 25. 85. 166, 167.  
 Conyza. tab. 168. 243.  
 Corallina. tab. 26. 168.  
 Corallinum lignum. tab. 169.  
 Cordis Indi folio. tab. 168.  
 Coriandrum. tab. 169, 170.  
 Cornus. tab. 26. 169.  
 Coryli seu Avellanæ folio. tab. 162.  
 Crithmum. tab. 169.  
 Crotalaria. tab. 169.  
 Cucumis. tab. 26. 85. 170. 172.  
 Cucurbitifera. tab. 170, 171.  
 Cupi Malabaricæ accedens. tab. 171.  
 Cupressus. tab. 85.  
 Curini Species. tab. 171.  
 Cuscuta. tab. 26. 172.  
 Cynoglossum. tab. 172.  
 Cynophallophoros. tab. 172.  
 Cynoxylum. tab. 172.  
 Cytifus. tab. 26. 86.  
 Daucus. tab. 173.  
 Doronicum & Doronicis affinis. tab. 86. 242.  
 Ebenus Jamaicensis. tab. 89.  
 Ecbolium. tab. 173.  
 Echinophora Capsularis. tab. 173.  
 Elatines folio. tab. 86.  
 Elemnifera. tab. 173. 209. 217.  
 Elichrysum. tab. 173.  
 Elichryso affinis. tab. 27. 86. 174.  
 Ephemelum Phalangoides. tab. 27. 174.  
 Epidendron. tab. 174.  
 Equisetum. tab. 29. 193.  
 Erica. tab. 175.  
 Ericæ facie Polygonoides. tab. 28.  
 Ericú. tab. 175.

- Eruca. tab. 86.  
 Eryngium. tab. 175.  
 Erythroxyllum. tab. 175.  
 Escharoxyllum. tab. 175.  
 Euedexylum. tab. 176.  
 Euonymus & Eynonymo adfinis. tab. 28. 88. 94.  
 115. 176.  
 Eupatoria. tab. 87, 88. 177. 143.  
 Euphrasia. tab. 27, 28. 56. 177.  
 Fagi foliis arbuscula. tab. 89.  
 Fagotriticum Volubile. tab. 177.  
 Ferula. tab. 12.  
 Ficoides, seu Echinomelocactus. tab. 29.  
 Ficoides, seu Cereus. tab. 29.  
 Ficoides Mesembrianthemum. tab. 117.  
 Ficus. tab. 178. 243.  
 Filix, Filicula & Filicifolia. tab. 30. 89. 179. 180,  
 181, 182. 243, 244.  
 Flos Passionis. V. Passiflora.  
 Foenum-Græcum Phaseolodes. tab. 90.  
 Fraxinus Alepensis. tab. 182.  
 Frutex & Fruticulus. tab. 29. 31. 115. 182, 183,  
 184. 244.  
 Fucus. tab. 184.  
 Fumaria. tab. 90.  
 Fungus & Fungis congener. tab. 90. 116. 184.  
 Galactoxyllum, tab. 185.  
 Galega degener. tab. 90.  
 Genista, Genistella & Genistæ similis. tab. 31. 91.  
 185.  
 Genisto-Spartium bacciferum. tab. 185.  
 Gentiana & Gentianella. tab. 90. 186.  
 Geranium. tab. 31. 186, 187.  
 Gladiolus. tab. 187.  
 Gnaphalium & Gnaphalio affinis. tab. 31. 187.  
 Gossipium, tab. 188, 189.  
 Gramen & Graminifolia. tab. 32, 33, 34, 35. 91, 92.  
 119. 188, 189, 190, 191, 192. 244, 245.  
 Gratiola & Gratiolæ affinis. tab. 35. 193.  
 Guaiacum. tab. 35. 94.  
 Guaiava. tab. 193.  
 Halimus. tab. 36.  
 Hedera. tab. 36. 93.  
 Helicteres. tab. 245.  
 Heliotropium. tab. 36. 245.  
 Helleborine. tab. 93.  
 Hemionitis & Hemionitidi affinis. tab. 36. 247.  
 Hesperis prodigiosa. tab. 37.  
 Hieracium. tab. 37. 93. 116.  
 Hippuris. tab. 193, 194.  
 Holosteum. tab. 37.  
 Horminum & Hormino accedens. tab. 194.  
 Hyacinthus & Hyacintho affinis. tab. 195.  
 Hyoscyamus. tab. 37.  
 Hypericum. tab. 93. 245.  
 Jacea. tab. 38, 39. 93, 94. 196.  
 Jacobæa. tab. 39. 196.  
 Jasminum. tab. 94.  
 Iberis. tab. 39.  
 Ilex & Ilicis facie. tab. 196. 197.  
 Imperatoria. tab. 95.  
 Iris. tab. 196.  
 Jujuba & Jujubes. tab. 197.  
 Juncus & Juncellus. tab. 40. 95. 197.  
 Juniperus. tab. 40. 197.  
 Kaka-Toddali. tab. 95.  
 Kali. tab. 95.  
 Lamium. tab. 41. 198.  
 Lappula. tab. 41. 245.  
 Larix. tab. 245.  
 Laserpitium. tab. 96. 198, 199.  
 Laurifolia. tab. 96.  
 Laurus & Lauri facie. tab. 199.  
 Laurustinus. tab. 199.  
 Lenticula palustris. tab. 41.  
 Leucadendros & huic similis, fortè Tocanhoca Ogilb.  
 tab. 200.  
 Leucoium. tab. 42.  
 Leucoxyllum. tab. 200.  
 Lichen. tab. 42.  
 Ligusticum. tab. 96.  
 Lilio-narcissus. tab. 42. 246.  
 Limonium. tab. 42. 200.  
 Linaria. tab. 96.  
 Liquid-ambari arbor. tab. 42.  
 Lithospermum. tab. 42.  
 Locus Spuria. tab. 200.  
 Lotus & Loto affinis. tab. 43. 67. 96. 116. 201.  
 Lucinium. tab. 201.  
 Lupulus & Lupulo similis. tab. 201.  
 Lychnis & Lychnidis cognata. tab. 42, 43. 97. 203.  
 Lychnidea. tab. 98.  
 Lycium & Lycio cognatus Frutex. tab. 96, 97.  
 201, 202.  
 Lysimachia & huic affinis. tab. 43, 44. 98. 119.  
 202, 203.  
 Malva. tab. 44.  
 Malus Granata. tab. 98.  
 Malus Persica. tab. 203.  
 Mameé arbor. tab. 204.  
 Mandarú. tab. 44.  
 Mangle arbor. tab. 204.  
 Manihot Indorum. tab. 205.  
 Marrubium. tab. 45. 99.  
 Matricaria. tab. 45.  
 Melanacrodryon. tab. 205.  
 Melanomma & Melanoxyllon. tab. 205.  
 Melampyrum & Melampyro affinis. tab. 99. 119.  
 Mercurialis. tab. 99. 205.  
 Mespilus. tab. 46. 99. 100.  
 Methonica. tab. 116.  
 Millefolium. tab. 47. 99. 246.  
 Mimosa. tab. 120.  
 Mirabili Peruvianæ affinis. Basella dicta. tab. 63.  
 Muscus. tab. 44, 45. 47, 48, 49. 100, 101, 205.  
 Myagrum. tab. 206.  
 Myosotis foliis. tab. 205.  
 Myosotis Scorpioides. tab. 48.  
 Myrrhis. tab. 100. 206.  
 Myrtus Brabanticæ similis. tab. 48.  
 Nardus. tab. 101.  
 Nasturtium. tab. 101. 206.  
 Negundo. tab. 206. perpetam. 123.  
 Nerium & Nerio affinis. tab. 207.  
 Niara. tab. 49.  
 Nil. tab. 101.  
 Ninzin. tab. 101.  
 Nir Schulli. tab. 49.  
 Nux. tab. 206, 207, 208, 209. 246.  
 Nymphæa. tab. 207. 209.  
 Nymphææ congeneri accedens. tab. 115.  
 Ocimum. tab. 208.  
 Oenanthe. tab. 49.  
 Olea. tab. 207. 209. 247.  
 Onobrychis. tab. 49, 50. 102. 246.  
 Ophioxylum. tab. 210.  
 Ophrys bifolia. tab. 247.  
 Orleana. tab. 209.  
 Ornithogalo affinis. tab. 102.  
 Ornithopodium. tab. 52.  
 Orobanche. tab. 209. 211.

- Olobus. tab. 210.  
 Oxys. tab. 102.  
 Padri Malabaricæ similis. tab. 53.  
 Pai-paroea. tab. 50.  
 Palma. tab. 51. 103.  
 Pâpaver Argemone dictum. tab. 247.  
 Paronychia Myofotis. tab. 51.  
 Passiflora. tab. 104. 210, 211, 212.  
 Pedicularis. tab. 102.  
 Pentaphyllum & Pentaphylloides. tab. 106. 210. 212.  
 Perfoliata. tab. 50.  
 Periclymenum & Periclymeni similis. tab. 103, 104.  
 211, 212, 213.  
 Persicaria. tab. 210.  
 Petasites. tab. 212.  
 Phaseolus & Phaseolis accedens. tab. 51, 52. 102.  
 105. 119. 211. 213, 214.  
 Phœnico-Scorpiuros. tab. 106.  
 Phyllanthos. tab. 247.  
 Phyllitis. tab. 105. 248.  
 Phyteuôdes. tab. 215.  
 Pilosella minima. tab. 52.  
 Pimpinella Sanguisorba. tab. 103.  
 Piper frutex Americ. tab. 215.  
 Piperi longo simile & reverâ idem. tab. 104.  
 Planta bivalvis Ind. Or. tab. 215.  
 Plantago Coronopus dicta. tab. 103.  
 Plantaginis Stellatæ foliis. tab. 215.  
 Pneumatoxylum. tab. 215.  
 Polygalæ affinis. tab. 53.  
 Polygonum. tab. 52, 53. 103. 120.  
 Potamogiton & Potamogito similis. tab. 102. 216. 248.  
 Portulaca & Portulacæ affinis. tab. 105. 120. 215,  
 216. 247, 248.  
 Poutaletsjæ similis. tab. 54.  
 Pruno Sylvestri affinis. tab. 218.  
 Prunus, Prunifera & Nuci-prunifera. tab. 216, 217,  
 218.  
 Ptarmica & huic similis flore hexapetalo. tab. 53. 219.  
 Pulegium. tab. 54. est rectius Clinopodii Species.  
 Pyrola. tab. 107.  
 Quercus. tab. 54.  
 Ranunculus. tab. 55. 106. Ranunculo adfinis. tab. 106.  
 Rapunculus. tab. 55.  
 Refeda. tab. 55. 107. 219.  
 Rhamnus. tab. 55. 107, 108. 120. 218, 219, 220.  
 Rhus & Rhoi similis. tab. 56. 107. 219.  
 Ricinus & Ricini fructu. tab. 56. 107, 108. 120. 220.  
 Ricophora. tab. 220.  
 Ros Solis. tab. 117.  
 Rubia. tab. 248.  
 Rubiæ modo spicata Euphrasiæ genus. tab. 56.  
 Rubus. tab. 108.  
 Saamouna Pison. tab. 56.  
 Sagittariæ foliis & Sagittariæ similis. tab. 220.  
 Salix. tab. 56. 221.  
 Salvia. tab. 57. 221.  
 Sambucus. tab. 58. 221.  
 Sanicula. tab. 57, 58, 59. 108. 222.  
 Sassafras. tab. 222.  
 Scabiosa & Scabiosæ capitulis. tab. 58, 108, 109, 221.  
 Schetti Malabaric. tab. 59. 109.  
 Scorpioides. tab. 59.  
 Scortea arbor. tab. 222.  
 Scorzonera. tab. 59.  
 Scrophularia. tab. 59.  
 Scutellaria. tab. 110.  
 Securidaca. tab. 59.  
 Sedum. tab. 223.  
 Sena. tab. 60. 223.  
 Senecio. tab. 60. 112. 223.  
 Serpentaria repens. tab. 117.  
 Serratula. tab. 109.  
 Sefamum. tab. 109.  
 Sefeli. tab. 60.  
 Sideritidis facie. tab. 224.  
 Sideroxylum. tab. 223, 224.  
 Siler. tab. 223.  
 Sinapistrum. tab. 60. 119. 224.  
 Sifynrichium. tab. 61. 224, 225.  
 Sium. tab. 61.  
 Smilax aspera seu claviculata. tab. 110, 111. 225.  
 Solanum. tab. 62. 111, 112. 225, 226, 227.  
 Soldæ Malabaricæ similis. tab. 61.  
 Sonchus. tab. 61, 62. 227.  
 Spirææ Theophrasti similis. Hort. Oxon. tab. 63.  
 Sphondylium. tab. 63.  
 Spongia. tab. 112.  
 Stachys. tab. 64.  
 Staphylodendron. tab. 63.  
 Symphytum. tab. 227.  
 Syringa. tab. 64. 112. 228.  
 Tacamahaca. tab. 228.  
 Tamarindus. tab. 64.  
 Telephium. tab. 228.  
 Teucrii folio. tab. 64. 228.  
 Teucrium. tab. 65.  
 Thalictrum. tab. 65.  
 Thapsia. tab. 65, 66, 67.  
 Therebinthus. tab. 228, 229.  
 Therebinthi minoris æmula. tab. 64. est Tecomahaca  
 fol. non crenatis.  
 Thlaspi. tab. 228.  
 Thymelæa. tab. 67. 113. 228, 229.  
 Thymus & Thymum. tab. 116.  
 Tithymalus. tab. 43, 65. 112, 113. 118. 229, 230, 231.  
 Trachylepos arbor. tab. 230.  
 Tribulus terrestris. tab. 67.  
 Trifolium. tab. 67, 68, 69. 113. 120. 231.  
 Triticum. tab. 231.  
 Tulipifera. tab. 68. 117. 248.  
 Valeriana. tab. 231, 232.  
 Valerianella. tab. 113.  
 Verbasco congener. tab. 114.  
 Verbena. tab. 70. 232.  
 Veronica & Veronicæ affinis. tab. 70. 114. 232, 233.  
 Viburnum Americanum. tab. 114. 233.  
 Vicia. tab. 71, 72. 114. 233.  
 Viola. tab. 114. 120. 233, 234.  
 Virga aurea. tab. 114. 116. 235, 236.  
 Viscum arboreum. tab. 117.  
 Vitis alba Vinifera. tab. 249.  
 Vitis arbutina. tab. 236.  
 Vitis Idææ species. tab. 69. 236.  
 Ulmaria. tab. 236.  
 Ulmi-folia. tab. 237.  
 Volubilis. tab. 69. 236.  
 Urtica. tab. 237.  
 Utricularia Vegetabilis. Tab. 237. Bandura dicta.  
 Uvifera. tab. 236. 237.  
 Wadoukæ similis. tab. 69.  
 Xanthium. tab. 239.  
 Xyloboeion seu Lignum bovinum. tab. 238.  
 Xylociste. tab. 239.  
 Xylomastix arbor. tab. 238.  
 Xylopicron. tab. 238.  
 Zanthoxylum. tab. 239.  
 Zarzaparilla Virginiensibus dicta. tab. 238.

Ray in the second Volume of his *Historia*  
*Plantarum* speaking of Platanet, says,

"Proclarus Vir et in Scipiano cognicione  
nulli secundus."

