



1

2

22



REMBERTI  
DODONAEI  
MECHLINIENSIS

MEDICI CÆSAREI *Laforesti d'annali, Josephi per  
amici*

STIRPIVM HISTORIAE  
Pemptades sex

SIVE  
LIBRI XXX



*Ex sua gratia & libertate per co-  
missionem de hoc 1744 acquiritur  
per A. C. de hoc & de hoc de 1690  
y 1717  
Joh. Blomberg*

ANTVERPIÆ,  
Ex officina Christophori Plantini.  
M. D. LXXXIII.

MEMORANDUM  
FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54  
SUBJECT: [Illegible]

10/15/54

A M P L I S S I M I S  
 A C P R V D E N T I S S I M I S  
 A V G V S T I S S I M Æ V R B I S A N T V E R -  
 PIENSIS CONSULIBVS, SENATORIBVS, QVÆSTORI -  
 bus, Tribunis, Præfectis, Decanis, reliquoque Magi -  
 stratu, Remb. Dodonæus S. *Autus Lam nobis* =



**D**E STRIPIVM HISTORIA Commentarios nostros, quos in publicum damus, vobis, VIRI AMPLISSIMI ET MAGNIFICI, offerimus & dedicamus. Quod non repentina aliqua voluntate, aut fortuito ductu, sed ex singularis observantia, vobis affectu à me factum, ut persuasum habeatis maximè opto. Neque etenim iam prudens, sed dudum & à multo tempore obsequium vobis, & vestre huius, cui præsidens, urbi, præstare aliquo posse modo desideravi. Verùm hoc cùm nullo officio, hæcenus declarare potuerim, huius nostri operis dedicatione nunc ostendere, aliqua decrevimus ratione. In describendis autem hisce de Stripiis Commentariis quid præstitum sit, licet fortassis plerique à nobis prolata oratione narrandum exaltimè: maluimus tamen id aliorum ac æqui Licetoris iudicio deferre, quàm de nostris lucubrationibus multa predicare. Affirmare tamen ac profiteri nihilominus (& quidem, ut speramus, citra arrogantie notam) audentus, nos laborasse; & quibuscumque annis esse, ut clarè, dilucidè, & quàm commodè fieri poterit, breviter (succis superfluis) singularum Stripiarum historie siue descriptiones proponerentur: deinde in certas classes ordine quàm licuit commodissimo atque expeditissimo digererentur. Hæc autem quo labore, vel cuiusmodi cura ac industria à nobis sint præstita, facile se cognoverit, qui Stripium multitudine in hisce Commentariis descriptam, ac varietatem earum observare, & cur in sex Pempades sing. Lib. xxx. hi à nobis sint digesti, antequam expendere volet. De huius verò Augustissimæ Urbis eximii, raris, & præclaris donibus fieri quoque potest, ut & multa à nobis expendantur, veluti operis nostri, hæc ad vos huius urbis Præsides, amplissimi viri, quæque patetis epistola postulare videtur: sed adeo multa, adeo magna, adeo eximia & præclara sunt, quæ hæc exornant, illustrant, ac commendant, ut brevis præfatione enumerari nequeant, & pluribus omnino verbis præclaraque oratione describi

## EPISTOLA

oporteat. Siue enim antiquitas vrbis, aut limitis eius, siue situs, siue maxima commoditas, siue elegantia, vel alia eiusmodi haud pauca expendantur, vel etiam Principes, qui huic dominati sunt, proponantur, nusquam non amplissima locupletissimaque ad dicendum & scribendum sese offert materia: maior certe & copiosior, quam à nobis angusto tempore ac pro dignitate sua tractari ac expoliri queat. Antiquitate enim in primis hæc vrbs nulli cedit, si limites eius consideretur. Est autem hic appellatorum olim Ambiuaritarum, quorum Iulius Cæsar in Commentariis suis de bello Gallico meminit. Si etenim huius verba diligenter expendantur, non alij poterunt esse Ambiuarite, quam qui limitem Antuerpiensem incolunt ac habitant. Refert siquidem Iulius Cæsar, Vlsiperes & Tenchteros Germanos, occupatis Menapiorum sedibus, magnam sui equitatus partem ad Ambiuaritas trans Mosam prædandi frumentandi que causa misisse, atque eos aliquot diebus abfuisse, cum ad ipsum horum legati mitterentur: qui responso accepto, post tres dies se, re deliberata, reuersuros dixerunt. Tantam temporis moram interponi cupientes, ut interea equites, (prout verisimile) qui expectabantur, adesse possent. Ex quibus sanè Ambiuaritas ultra Mosam etiam remotiora loca occupasse, & haud angustis finibus comprehensos fuisse, satis apparet. Alioquin siquidem opus non fuisset, longioris temporis moram, ad equitum reditum desiderari. Nam ex proximis & vicinis redire citò integrum fuisset. Iam & magna equitatus pars, non nisi ad amplè patentia loca mitti potuit. Considerant autem Vlsiperes & Tenchteri illo tempore haud procul à conflente Mosæ ac Rheni, hoc est, in eo nostra hac ætate nuncupate Geldria tractu, qui infra Neomagum ciuitatem, inter Mosam ac Vahalim Rheni partem à Mosâ receptam, situs est. Ab hoc Geldria agro ultra Mosam latè patentia & remotiora loca ad Ambiuaritas pertinent, nempe ab appellata Buscoducis ciuitate ad ripam Scaldis vsque: tota nempe illa regio, quam aliquando salo subfuisse non obscura indicia ac vestigia ostendunt; prius videlicet quam aggeribus erectis maris litora, & fluminum ripæ coarctarentur: que idcirco & *Antuerpiem* (Latine alluio aut adiectio dicitur) nuncupata fuit. Vocem Cæsar, quoad potuit, proximè exprimit conatus, huius incolis Ambiuaritas dixit. Et populorum hoc fuisse, non oppidi, præterquam quòd ex Iulij Cæsaris Commentariis satis patet, testatur quoque & Andoënus in vita D. Eligij, quem scribit in Flandria laborasse, ac in Andouerpis ingi instantis pugnasse: circa annum à Christo nato vi<sup>to</sup> xl. Ex his autem manifestum ac euident, antiquissimam esse Ambiuaritarum siue Andouerpium gentem, ac nullis Gallie Belgicæ, siue inferioris Germaniæ regionibus aut populis ætate posthabendam.



bendam. Referuntur autem Ambuaritæ ad eos, quos Ptolemæus Geographiæ lib. 11. Tongros appellat, quorum civitatem Aduacum esse tradit: Ab hac civitate Iulius Cæsar ipsos populos Aduaticos pro Tongris nominasse videtur, qui & ipsos Belgis annoverat: Galliæ Belgiæ terminum Rhenum constituens. Plinio verò Naturalis hystoriæ lib. 1111. Tongri siue Aduatici, Germani sunt. Toto hoc, inquit, mari (Germanico videlicet) ad Scaldim vsque fluvium Germaniæ accolunt gentes haud explicabili mensura. Et sanè si linguæ & morum ratio habeatur, olim Tongri siue Aduatici dicti, atque cum his Ambuaritæ, quorum maxima pars Brabantiæ agro continetur, Germanis citius, quàm Gallis erunt annumerandi. In hoc autem Ambuaritarum latè patente territorio olim ædificatum extat oppidum, quod ab ipsa ditioe nomen accepit, & modò retinet, Anewarpen dictum: reliqua, vel saltè maxima agri parte, à Campano quodam Campaniæ nomine (vt creditur) mutato. Quo autem tempore ædificatum illud fuerit, licet hystoriæ aperè non referant, peruersum tamen & ipsum esse satis constat. fuit enim circa annum Domini VII<sup>o</sup> XXXVII. à Normannis occupatum, direptum, & igne deuastatum, & ante illum annum multò antè haud dubiò constructum ac habitatum. Felicissimis autem auspiciis, hoc oppidum constructi ac habitari ceptum est, ad quod sæpius aucta, amplificata, nunc amplissima & celeberrima vrbs manifestè ostendit. Initio quidem exiguum fuisse oppidum, non modò porta, sed & veteres aliquæ restantes muri plenissimè docent. Accepit verò deinde istud haud exigua incrementa, & non semel quidem, sed sæpius accessionebus nouis insigniter creuit ac amplificatum est. Prioris incrementi testes sunt viæ ac vicij publici à moenibus nomen retinentes, tum & portæ quædam non inà dudum dirutæ. De tamen si eùm istis terminis ac muris contineretur, non exigua fores ciuitas, sed èdente tamen populi multitudine, & ciuium numero multipliciter aduulso, circò etiam in maiorem ciuitatem creuit, eam amplitudinem magnitudinemque consequuta, quam vix esse habere anno 89<sup>o</sup>. XI. cum à Martino Rossemio aliisque coniuuratis, aliquot diebus obsideretur. A quo rursus tempore non solum compluribus vicis, & magnificis ædificiis exornata est, sed & haud mediocriter auctuarium à Septentrionis parte, moenibus latè extensis, accepit: veluti & à paucissimis annis ad Meridiem huic quoque amplissima accessio facta est: occasione videlicet castri, à Duçè Albano erecti, quod nunc ex parte dirutum ad vrbs amplificationens, & moerum extensissimè, oportunitissimam occasionem præbuit. Si verò & de situ huius vrbs quædam adducenda: Notissimus quidem hic est, & quidem non ad maris litus positus, sed ad dextram Scaldis ripam, v'v'it. an' xviii.

## EPISTOLA

(plus minus) horarum, si pedibus metiri liceret, itinere ab Oceano distans, loco videlicet peniculis & tempestatibus inanis exposito, & ab exorbitantis maris fluctibus ac inundationibus satis tuto, nec ita tamen longè à mari, quin commodè altissimo aestu, quo Scaldia Oceani vndis ac ventibus obluens arrolitur, retrorsumque fluit, magne ac onerarie nauès in portam appellerè queant. Quem adèò habet opportunum, vt quæuis onera & merces, facillè & haud magno negotio exiniantur. Facit verò & ad huius Urbis celebritatem non parùm, quòd in huius portam, ex omni orbis terrarum parte, omnis generis merces aduehantur: sic vt tamen in extremis Gallie Belgicæ finibus Antuerpia sita sit, in medio tamen orbis posita, ac vniuersi orbis forum esse videatur, & verè meritoque ad hanc applicari debeat, quod de Morinis haud inelegans nostri temporis Poëta his verbis scriptum reliquit:

*Extremi, factor, sunt. Morini, tamen  
Si merces videns, si populus, si opes,  
Concursumq, ratesq, in medio situm  
Orbe, Orbisrefores forum.*

De elegancia verò tantæ urbis, vicorum, & viarum splendore, vel nitore, ædificiorum magnificentia, commoditate, ornatu, suburbiorum laxitate, hortorum amœnitate, atque in his nascentium herbarum ac florum varietate, non pauca etiã scribenda occurrerent, nisi de his tacendum, quàm scribendum potius videretur. adèò enim omnium oculis exposita hæc sunt, vt pluribus verbis celebrari non referat. Quod si verò ad huius urbis dignitatem, auctoritatem, & gloriam non parum conferant, qui primi extiterunt limitis Antuerpiensis ad Scaldim Sacri Romani Imperij Marchiones, & vnde illi & quando initium sumpserint, non poterit non maximum dignitatis incrementum huic, vel hinc quoque accedere. Nam qui olim huius Marchionatus principatum obrinuerunt, vel ipsi magni & potentes Principes fuerit, vel maximorum, fortissimorum, ac potentissimorum Ducum, Regum, ac Imperatorum progenitores. Primus autem huius Marchionatus Princeps extitit Ansbertus sive Anselbertus, Vauberti & Lucille Zenonis Romanorum Imperatoris sororis filius: Vaubertus verò patrem habuit Alberonem Clodionis Comati Franciæ Regis filium, à Meroueo ipsius tutore regno orbaturum: qui occupata Ardenna sylua, complurà cum Meroueo ac eius filio Childerico bella fortiter gessit. Vaubertus autem iste inter Principes in honore habitus, & eximia virtute commendatus fuit. Ex Argotta autem Theodemiri Gotthorum Regis filia, & Theoderici Gotthorum io Italia Regis sorore natus: horum amicitia & affinitate fretus, Meroueam aequius successores haud magni faciebat.

bat. Bellum verò gerente Clodoveo Francorum Rege, qui postea Ludouici magni nomen obtinuit, cum Alanco Visigothorum Rege, Tolose regni sedem habente, & Alberonis liberos omnesque Clodionis Comari nepotes ac affines fœnerissimè persequente, Vau- bertusliberos suos ad Zenonem Imperatorem misit, à quo senatorio honore donati sunt. Anselbertus verò, etiam senior, perpetuam ac hereditariam Sacri Romani Imperij ad Scaldim Marchionatum de- inde à Iustiniano Imperatore obtinuit. Huic vxor contigit Blitildis Clotarij Francorum Regis filia: Ludouici Magni filius hic erat, & Sueslionum primùm, deinde mortuis fratribus, Franciæ quoque to- tius Rex, qui Anselberto genero suo Mosellanicam prouinciam à ci- uitate Metensi ad Coloniam Agrippinam vsque Ducatus titulo per- misit. Ab hoc autem Anselberto, primo illo Sacri Romani Imperij Marchione, originem habet nobilissima ac omnium historiis cele- brata Carolinorum stirps. Anselberto siquidem fuit filius Arnoal- dus, huic verò Arnulphus, cuius filius Ansigisus Beggam vxorem habuit Pipini Landensis filiam, ex qua natus Pipinus, cognomento Crassus, Caroli filius Martelli pater, qui rebus valde fortiter gestis, multisque victoriis celebris, maximam sibi apud Francos auctorita- tem & potentiam conciliauit. Carolo Martello progenitus est Pipi- nus Breuis dictus: Chilperico Regis filio submoto, Regni Franciæ gubernationem & diadema hic accepit, annuente Zacharia Romano Pontifice. Pipino huic successit Carolus, qui propter res domi for- tisque fortiter gestas, frequentesque de hostibus partas victorias, Magni cognomen assecutus est, & tandem Romanorum Imperator ac Augustus saturatus, ad Germanos Imperij dignitatem transfudit. Numerantur verò & inter huius vrbis, & Sacri Imperij Marchiones & alij rerum gestarum magnitudine illustres celebresque Principes, vt Gozelo sive Gothelo, tum & ex hoc natus Gothefridus, item & huiusmodi filius Gothefridus, præstantis ingenij vir, sed gibbo de- formis, Lotharingiæ inferioris Duxes, Henrico III. & IIII. Roma- norum Imperatoribus A. A. gratissimi ac amicitia coniunctissimi. Horum temporibus Marchionatum Antuerpiensem in nonnullis ve- teribus monumentis reperitur, præter alia loca, vniuersam quoq; Va- uricensem syluam (vulgo *Wanant* tunc dictam) complexam fuisse. que illa ætate ab *Wipst*, non incelebri Brabanticæ Campaniæ pago, aduq; Basrodiom, infra Tenerramundam ad Scaldim situm, & su- pra vtrumque Nicham, cum & Diliam extendebatur, Ramestam ac Mechliniam comprehendens. Ab illis autem Principibus origi- nem ac viræ incunabula sumpsit Gothefridus ille Magnus, Bullonij Comes, ex Ira nempe Gothefridi Gibbosi sorore natus, qui profes- sionem ad Hierosolyman suscipiens, feliciter etiam perfecit, &

EPISTOLA NYNCFP.

Vi be potitus, Rex eius coronatus, quam deinde firmavit, & sequacibus suis aliquot annis possidendam reliquit. Debent verò & Duces, Reges, & Imperatores alij non pauci generis sui primordia Sacri Imperij & huius vrbs Marchionibus, nempe ex Gothefrido Barbaro Brabantie Duce matremum genus agnoscentes: veluti Ioannes Burgundie Dux, ex Ludouici Flandrie Comitis filia procreatus, quæ a uum habuit Ioannem Brabantie Ducem, ex Gothefrido illo, intermediis tamen aliquot progenitum: Ioannis filius Philippus fuit Bonus, nepos verò ex Philippo Carolus Audax, filiam cuius vnicaam Maximilianus primus Romanorum Imperator uxorem habuit. Ex qua deinde multi Duces, Reges, Imperatoresq; ue potentissimi potuerunt, quos nostra vidit & agnouit ætas.

Cùm igitur tanti Principes, Duces, Reges, ac Imperatores Sacri Imperij ac huius Vrbs Marchionibus vitæ suæ initia ac primordia accepta referant, non poterit non ille Marchionatus & Vrbs hæc reliquis & nobilitate & dignitate potior haberi, quæ alioqui magnificentiâ, mercatu, opulentiâ, splendore, alias ciuitates superat ac longè antecellit. Hæc autem qualiacunque breuiter de huius Vrbs præstantia à nobis prolata, non in hoc scripta existimari debent, vt huic tantæ Vrbi gloriæ aliquid hinc accessurum speremus, sed ne vel studio vel officio defuisse videremur, & quorundam, si non plene, aliquatenus tamen expectationi satisfaceret.

Vestrarum nunc erit partium, AMPLISSIMI VIRI, nõ modò hæc, sed & Commentarios nostros de stirpibus, vobis inscriptis, grato benignoque animo suscipere, quos optamus tantam isto diebus vilitatem conferte posse, quantam hæc Vrbs rerum venalium copia ac varietate vniuerso orbi commoditatem præbet. Quam, Deam Optimum Maximum rogamus, vt feliciter florentem ac incolamem quàm diutissimè conseruet, ac simul, vt & consilia vestra ad sui nominis gloriam & honorem dirigat.

Antuerpiæ An. M. D. LXXXII.

IOHAN.

11

REM.

REMB. DODONAEVS Abbas Dodonensis  
LECTORIS.



**N**ONNUM ac liberale semper habitum fuit, amice Lector, agnoscere quorum vel scriptos vel opera quis aditus fuerit ac promoueri. Quum ob causam eam noiam descendit Scirpium historię Pemptadibus istis non modò plurimum veterum, sed & recentiorum nostrisque temporis scripturam testimonis vti sumus, nomina quoque omnium ascribenda putauimus, ex quorum videlicet monumentis ac posteritati relicta nos proficisci & adiuturos infelici haud possumus. Adiacimus verò & horum similes nomina, sed tamen fecerim) ex quorum hortis nobis copiosa locupletaque subinde praestita est scirpium multitudine, & conam videndarum cognoscendarumque copia & potestas facta tum & eorum, qui etiam vel aridas & alia quaedam ad nos, siue ex Italia, aut ex Germania, vel aliunde miserunt. Vtrisque autem nos plurimum debere vti agnoscimus, ita & non paucis locis testatum etiam esse volumus. Icones autem plurimas quidem nostrae opera & cura iam olim delineatas fuisse facile agnouerit, qui frumentorum, florum, & coronariarum, purgantiumque historias cum appendice praes habuerunt aut viderunt. His accesserunt non paucæ (praeter nouissimas nouas & antiè non editas) & me quidem procurante supra aliquot annos exactissimè, quæ in vetustissimis Gallici de Scirpium historia commentariis à Ioanne Loëo quondam editis extant: reliquæ partim ex Caroli Clusij, sed plures ex M. Lobelij obseruationibus accesserunt. Quod quidem nobis ea de causa licuit, quòd omnes nostras in suis obseruationibus ipse Lobelius inseruerit: sed tamen haud praeter consensum & voluntatem nostram, & sub conditione, vt vicissim sua cura delineatas, mihi liceret, in meos Pemptades, quibus opus haberem, inserere. Non euilissimus enim eadem (nisi forte non satis rectè expressas) iterum depingendas, ac duplici sumptu Christophorum Plantinum typographum diligentissimum grauari, qui olim nostras de floribus, purgantibus, frumentisque historias, ac deinde Caroli Clusij & M. Lobelij obseruationes suis typis in publicum dedit. Vale.

AVCTORES QUI IN ISTIS  
STIRPIVM PEMPTADIBVS  
CITANTVR.

**A**BREYTTI Hippocr. *Abazarus.*  
*Adamas Laurentia.*  
*Aitona.*  
*Agrippa apud Saram.*  
*Alexander Senebillus.*  
*Alexander Tholomaeus.*  
*Alphius Angulana.*  
*Amacrus Tim.*  
*Andreas Lema.*  
*Andreas Theuton.*  
*Angelus Pales.*  
*Antonius Guarnicus Papicaftr*  
*Antonius Meliodor.*  
*Antonius Mafsi Brasfacula.*  
*Apollidorus apud Pliniam.*  
*Apuleius.*  
*Archagoras apud Aricum.*  
*apud Galenum.*  
*Archibulus apud Strab.*  
*Archonachus Athenienfis*  
*apud Plin.*  
*Archiphant.*  
*Archimedes.*  
*Archidius Pflanzianus.*  
*Astrucius.*  
*Athanasius apud Gal.*  
*Athanasius.*  
*Autocorus.*  
*Augustinus Barbapicor.*  
*Aurilius Romulanus.*  
*Athanasius.*  
*Auribianus apud Atheniense.*

**B**APTISTA Sanda.  
*Beryptomanus ab archiepiscopo.*  
*Benedictus Arius Montanus.*  
*Benedictus Curtius Sympho-*  
*riticus.*  
*Bernardus Cardanus.*  
*Berytus.*  
*Bian Symplicus.*

**C**AESOLVS Clafus.  
*Cafius Drucyflus Picauftr.*  
*Cac.*  
*Cacilius.*  
*Cherius Athenienfis apud*  
*Plin.*  
*Cicero.*  
*Claudius.*  
*Claudian Peripateticus apud*

*Atheniense.*  
*Cedrus Caforus manaftr-*  
*pus.*  
*Cerodius Gelferus.*  
*Cerodius Gelfus.*  
*Craesus.*  
*Crisp. apud Gal.*

**D**EMOCRATES apud  
*Gal.*  
*David Elybarus.*  
*Demetrius Ieron.*  
*Demetrius in Gygen.*  
*Dithymar in Gygen.*  
*Dioclet. apud Gal.*  
*Diodorus Siculus.*  
*Dionysius Heliconenfis.*  
*Dionysius Iunior*  
*Diofcorides.*  
*Diphilus Syphacis apud A-*  
*theniense.*  
*Dionatus.*

**E**RASMYI Eterodimus.  
*Erosifibenus apud Strabonem.*  
*Eros Tules.*  
*Eumelus Hippicor.*  
*Euximus Cordus.*

**F**ESTVS Pompeius.  
*Florentinus.*

**G**ALENTI  
*Garcus ab Italia.*  
*Garcus Lepus.*  
*Glaucus apud Plin.*  
*Gude de Cordusa.*  
*Guthelmus Flacuntinus d*  
*Salicens.*  
*Guthelmus Mantuanus.*  
*Guthelmus Bradoletus.*  
*Guthelmus Turonus.*

**H**ALI Affar.  
*Hicetas*  
*Hippocrater } apud Atheniē*  
*Hilacorus }*  
*Hiericus Stephani.*  
*Hormatus Loharus.*  
*Hordatus.*  
*Hypochus.*  
*Hypodorus.*  
*Hirondus Hippicor.*

*Hieronymus Cardanus.*  
*Hieronymus Praxallertus.*  
*Hieronymus Heroldus.*  
*Hieronymus Tragus.*  
*Hippocratus Capi.*  
*Hippocratus Hippicor.*  
*Hicorus.*  
*Hicorius.*  
*Hugo Faberius.*  
*Hypocritus apud Plin.*

**I**ACOBYI d Mandii.  
*Isidorus Sabius.*  
*Ianus Cornarius.*  
*Iacobi Baptista Montanus.*  
*Iacobi de Ghent.*  
*Iacobi Germanus.*  
*Iacobi Guinterius Ander-*  
*mont.*  
*Iacobi Leo.*  
*Iacobi Miconardus.*  
*Iacobi Mofius.*  
*Iacobi Sordius.*  
*Iacobi Spargus.*  
*Iulius P Filiculus.*  
*Iulianus Belli Inducci Scripser*  
*Iulianus Scaliger.*  
*Iulius Eric apud Pliniam.*  
*Iulius Pallus.*  
*Iulius Salinus Polyphylus.*  
*Iuvenalis.*

**L**EONHARTVS Puchfus.  
*Leontius in Gygen.*  
*Lucas Chymus.*  
*Lucanus.*

**M**ACER.  
*Maga apud Plin.*  
*Marcellus Empiricus.*  
*Marcellus Pergulus.*  
*Martialis.*  
*Maffarius apud Pliniam.*  
*Mathias Lohelius.*  
*Mathias Syphacius.*  
*Matron Perides apud Athe-*  
*niam.*  
*Melchior Gallandinus.*  
*Miconardus.*  
*Mosifibenus apud Gal.*

**N**ICANDER.  
*Nicanor interpres.*

*Nicodemus Calyphontus.*  
*Nicodemus Leonarcus.*  
*Nicodemus Menardus.*  
*Nicodemus Myrcellus.*  
*Nicodemus Nicodemus.*

**OCTAVIUS** *Heracleus.*  
*Glorius Magnus.*  
*Onofrius apud Ieroh.*  
*Orichus.*  
*Orphius apud Iam.*  
*Ovidius.*

**PALLADIUS**  
*Pandilla Iuris.*  
*Pandus Ad Egypum.*  
*Pandus.*  
*Palaestinus.*  
*Petrus Andreas Membricus.*  
*Petrus Bellonus.*  
*Petrus Crisostomus.*  
*Petri Nissani thesaurus pa-*  
*perum.*  
*Petrus Pons.*  
*Philoftratus.*  
*Philostomus.*  
*Platonius.*

*Plotus.*  
*Plotus.*  
*Plotus Stroudus.*  
*Plotus Palermaxus.*  
*Plotarchus.*  
*Plotianus.*  
*Prudentius.*  
*Psalmorum interpret.*  
*Psyllippus apud Athenam.*  
*Ptolemaus.*  
*Ptychogerus.*

**Q.** *Quintus Sannonicus.*  
*Quintus in Cypri.*

### **RHACUS.**

**SCRIBONIUS** *Lepus.*  
*Selenus apud Athenam.*  
*Serapio.*  
*Seranus Virgili interpret.*  
*Simeon Euthy.*  
*Simeon Isaacus.*  
*Siphocles.*  
*Siracusa apud Gal.*  
*Sirus in Cypri.*  
*Siroles.*

*Sirulus Callus.*  
*Sura Maritus.*

**TABENTINUS** *in Cypri.*  
*Terenus.*  
*Theocritus Syracusus.*  
*Theodorus Gely.*  
*Theophrastus.*  
*Theophrastus Paracelsus.*  
*Thomas Iordanus.*  
*Tibullus.*  
*Timochides apud Athenam.*  
*Titus Calphurnius.*

**VALERIUS** *Cordus.*  
*Vares.*  
*Verginius Leonius.*  
*Virrius.*  
*Vitruvius.*  
*Vlavianus Aldemundus.*

**XENOCRATES.**  
*Xenophon.*

**YSAAC.**

**ZORCASTIS.**



NOMINA EORVM EX  
 QVORVM HORTIS STIRPIVM

COPIA FACTA EST, ET A QVIBVS  
 aliunde quaedam accesserunt.

**I**OANNES Branchion vir generosus, ex cuius ditissimo horto locuples stir-  
 pium suppeditata est varietas.

Ioannes Dillius vir similiter generosus, stirpium D. Branchion heres.

Ioannes Boscius, vir non minus doctus quam generosus, stirpium herba-  
 riarum studiosissimus.

Christina Bertholfa vidua amplif. ac clarif. I. C. Joachimi Hopperi.

Ioannes Vreccominus Bruzelenfis, herbaram suo tempore cultor diligentif.

Martinus Tulemarus Traicftenfis, in quæritis stirpibus sedulus ac diligens.

Petrus Coldenbergius }  
 Guilhelmus Andreas } diligens Pharmacopæi Antuerpienfes.

Georgius Rhetus }  
 Raphaël Cozia } citatis Mechlitiensis.

**I**ACOBVS Antonius Cornelius patritius Patavinus.

Alphonfus Puccius Ill.<sup>m</sup> Ferrarienfis Ducis Medicus.

Severinus Gobelus Regis Daniæ Medicus.

Georgius Marius Ill.<sup>m</sup> Principis Electoris Palatini Medicus.

Ioannes Aychholtzius Medicinæ professor Viennenfis.

Gaspar Hoffmannus in Academia Francofordiana ad Oderam Medicus.

Adamus à Zafchillaw civis Glasenfis.

Achilles Cremerus Niflenfis.

REM-



REMBERTI DODONAEI *Libertini de quibusdam  
typis gestorum*  
STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS PRIMÆ  
LIBER PRIMVS.

PREFATIO



INTER Medicorum partes, quæ hanc partem continent, Stirpium ac simplicium Medicinam artium, ut nec maxima nec postrema, sic præcipua semper habita fuit: usque antiquissima, quæ ipsi arte usqueperveniente, ac excolenda prebuit. Cum enim aliter nulla ars Medica esset, curata a medicis Stirpium usum sumpsit, quæ veteris est Historiæ, quibus arte tractari affertur, vel casu aliquo manifesti, vel alia modo cognoscunt. Et deinde frequentibus experimentis ad curandam curantem morborum adhibuerunt, ac vitæ observant. Reliquæ arte partes post nota sunt, quæ tametsi Medicorum spiritibus et persillimam reddunt, à nonnullis tamen quædam neglecta, vel etiam contempta sunt.

Physiologorum signalem partem, non Aristoteli exstantiam, qui videret, ut scilicet usque experientia obscurata, arte transmissa indicant: quæ hæc quædam, armantur. Nonnulli tametsi Physiologorum in totum non vitentur, non omnes tamen etiam partes recipiunt. Antiquorum enim partem, non per se facimus, ut vobis creditum et fides damnet. Postquam de Stirpium modo veterum neglectantur, neque de his Hippocrates vel pauca memora prædixisse legimus.

Natuam autem vitam memora, quæ non stirpium herbarumque novitiam partem fecerunt, quam nec herbarumque generis continentur, herba aliæque, similes simplicia quædam in analiis medicorum et morborum cognoscunt.

Tantioris semper apud veteres stirpium herbarumque cognovit etiam, ut vel diis immortibus consecrationem suam offerretur, vel mortalibus, qui aliquæ admoverant et ministrantur, dicitur hæc omnia reges celebrantur.

Melissa herba, quæque Mercurio affertur, quam Phlegma ad se in Ceream venerit et hanc hanc Mercurio ferre et Mercurialis herba innotuit, necesse est ipsi viderent, Apollon multas quæque mortalibus communicasse, dicitur: quæque veteribus Medicis innotuit etiam videtur videtur. Pinguis apollina, Aristoteles ac Mercurio accepta habetur. Nymphæa è Nymphis, quæ prima hæc affertur, necesse habere ferre. Chloria curam Cælestis et Achille, quibus dicitur hæc omnia tribuere, digni altissimi sunt: propter eas quæ curam modo vitæ, ab ipse apolline sanctas herbas, prorsus admoverant: ut sunt Pinguis Chlorium, ac Cælestium n. innotuit, quæ et Achille, quæ sanctas Telephum viderit, Achille ab Homero canitur.

Culicibus veteribus vitam nostram nec modo iterum illi, nec scilicet in Medis, veteribus et Regibus ac Principibus herbas cognoscere cura fuit, velata Genis Historiam, Lythamides, Melissimum, Attale, Pinguis, Julia, Mercurialis, Regibus, Aristoteles, Nymphæa, Curia Regis, curia, etiam et Mercurialis Pinguis ac Nymphæa Regis, et quæ non modo veteribus reperitur, sed et ab ipse nonnulli habent celebrantur. Antiquis, quæque veteres omnes Medicis Græcis, Latini, Arabes semper in prima habita, et quæ postmodum usque, frequentissime usque.

Medicorum autem veterum necesse fuit quæ nec et Stirpium ac simplicium medicina veterum sibi comparare viderent, si non omnia, curam saltem quæ ad medicamentum adhibuerant.

Neque ipse est veterum sibi illam veterum Medicorum herbis nec ipsis adnotare, quorum sibi hanc Galeni memora. Abundantia signalem viderit, nec, ut nulla Pharmaceuticorum operâ fieri, sic et sine adhibentur nec ubique medicamentum parati, prorsus hanc, ac apta prorsus, quæ curæ cognovit curam Stirpium simpliciumque, prætere nec parantur. Hippocrates vero Medicina prorsus simplicium quæque facit, vel una ad Cælestem cyphalæ hanc manifestis affertur.

Aliæque hæc est, quæ Galeni omnes Medicis usque, hanc usque ad Stirpium innotuit adhibere Medicis, quæque hanc, vel de dicitur, omnia Stirpium, si fieri possit, peritiam habent, innotuit, sic nonnulli plurimum saltem, quibus frequenter videntur.

Eadem tamen nec Medicis ad Stirpium innotuit compertam adnotat, præcipuo quidem dicitur habet, nec tamen separata. Pinguis hanc, vel de Pharmaceuticorum compertum secundum veteres reperitur, dicitur hanc, vel de medicamentum secundum veteres.

Prorsus tamen est, ut compertum dicitur sibi hanc, et in quæ vobis innotuit morborum sic, cognoscere





# DE STIRPIVM GENERIBVS. CAPVT I.

*Arbor.*



**R**IBVS autem ac firmis stirpium generatim dicuntur: *Arbor, Fraxinus, Amygdalus, Amygdalus, quercus.* Arbor, Fraxus, Salsurex, & herba.

Arbor sine *Arbor* dicitur, quaequod in eis à radice, caulis, lignosis, & in eo caudice sine tronco (*σῆμα-ῆμα*) affertur, cuiusque complures brachia eorum in se diffundunt, ut sunt Pirus, Picea, Abies, Quercus, Fagus, Betula, Alnus, Fraxinus, Plantago, Populus utraque, & ex vrbano Potius, Pyrus, Calthusa, Amygdalus, Cornus, Olea, Nax ingens, & alie similes.

*Fraxus.*

**Fraxus** sine fraxus ad usum arborum altitudinem non attollitur, nec crassitudinem haurum aut amplitudinem assequitur, lignosis tamen caudice ac durabilis quoque permittit. Hoc vero haud reperitur *σῆμα-ῆμα*, sed frequenter rōgones à radice caudice prostrata, in ramis quoque spiculis ac durabilis, ut sunt Corchus, Rhamnus, Quercanthea, Logosium, vrbatana-gamen, Cornus tybactia, Sambucus palustris, Platanus ib. xxi. cap. vii. à fructum generose esse videtur. Latium, Caposium, Cadium, Impegerum, Terebinthum, Lemum.

*Amygdalus.*

**Amygdalus**, à radicibus *σῆμα-ῆμα* ac multis ruggis caudibus, vel potius caudice erant, sed in aliam hanc affertur *σῆμα-ῆμα* quoque ac ramosis eius median inter herbam ac fructum in ramis & consistunt an haec: quia huiusmodi caudice ad hanc rem naturam accedit, quatenus vero hanc de herbis imitatur, ut sunt Sparum, Rubus, Balsamum coronaria, Lamendula, hedera, & quaequod lignosis caudice vel caule, aut humile fraxus, aut non admodum attollitur. Gaur Latine Salsurex appellat. Sicut qui Crementum dicit affirmant, sed Columella lib. xvi. cap. ix. rufficos Crementum dicit, nominare fraxiles arbor & maritima. Pro arbor aliquo etiam interpret Plin. hac voce videtur: Et illa mea sunt crementum amantia.

*Cornus.*

**Cornus** est vrbana in Graecis legitur *κῆρος*, non *κῆρος*. *κῆρος* autem dicitur sicut & arborum.

*Alia herba.*

**Alia**, apud Latinos herba, caules tuniculati hanc sunt molles, hanc quoque lignosis pergitur vero & aliquid caule, post vrbos pro mensura, in quibus flores seminat, à radice autem magna ex parte soluta, ut sunt Plantago, Borrage, Basilica, Beta, Truncum, fœnte, Fœlica, Erutha, Cicer & cetera fructuosa, & legumina alia, ac plures & in fructu herbae.

Atque hoc quoque vel in firmis generum subsigui, omnia comprehendere posse stirper videtur. Contrahitur autem quodlibet ex his nonnullis vel cultura marginosa vel negligenter & in eorum colluctatione vel aliam fraxus natura ac sponte, à figura sua detrahente, & ad aliud generum quodammodo transire. Inter Malvas siquidem, quodam sensu septemve menibus tanta longitudine ac crassitudine profert, ut velut haec crassitudo grandis est, arborisensque hancolorum vrbatana parbeat. Similiter & Betam subinde arborum in magnitudinem accipere Theophrastus lib. i. refert vrbatana modo *σῆμα-ῆμα*, Gaur Oleum arborem, vocat sic & malus grandior sicla *σῆμα-ῆμα* dicitur. Transire etiam in arborum in quibusdam vrbatana vrbatana, alibi vrbatana (herba). Eodem modo & Fraxus nonnulla in arbore transiunt ut Vitis & Palmarum, aliter Theophrastus. Et vice versa, arborum nisi pergerint & cultu remaneant, naturam & formam suam cedunt, & ex arboribus in fraxus degenerant: id fraxus arborum appellant.

Nonnulla quoque etiam herba ad fraxum vel *σῆμα-ῆμα* similitudinem accedunt, quae sicut de *σῆμα-ῆμα*, *σῆμα-ῆμα*, *σῆμα-ῆμα*, *σῆμα-ῆμα*, *σῆμα-ῆμα* dicitur. *σῆμα-ῆμα* dicitur appellat: quae videlicet vel vrbatana, vel alias demulcentia caudice affertur. Salsura, Androsimon, Polypogonum, Hypocyanus, Dorycrion, Rhododendron ac *σῆμα-ῆμα* dicitur. Borrage herba *σῆμα-ῆμα* & sicut nec Crithmarum. Melanthis vero, Chamaedrya, Ambracia, Periclymenum, Terebinthum, Paronochia, Solanum hoc caule, Afragala, *σῆμα-ῆμα* accedunt. Polypogonum ferunt *σῆμα-ῆμα*. Polypogonum *σῆμα-ῆμα*, Chloropodium *σῆμα-ῆμα*, Eupatorium *σῆμα-ῆμα*, Alpisium autem *σῆμα-ῆμα*.

*De Partibus stirpium. CAP. II.*

**D**IFFERENTIAS stirpium suspensione capite ostendimus, nam ad partem explanationem conuertimus. Sunt autem arboribus & fraxibus partes quidem plures: positiones *σῆμα-ῆμα*, nonnulla vero & fraxibus sunt.

Haec autem quaedam per se sua addunt stirpibus: alie non semper adherent, sed subinde percutiunt decidunt ipsa autem nonnulla partes esse per se ipsas vrbatana appellantur.

Pepe-

Peperit partes sunt, radices, stirax, cortex, comae, ligni, masticæ, matriæ, medulla, &c. Armar, veta, & nec per totum perstantes, flores, calyces, stami, strobili, scimitæ, caputula, filiq; valvæ, pappus, umbellæ, pappi, & mucus sibi etiam, sed non omnibus tantum.

Folia siquidem arboris munda, & non parva fronses, deponant, non delectum verò etiam peperita trunde vœturis, v. omnino conduntur (excepta Lanæ) Teu, berberis, lauro, Quercu, Cupressis, Medus modica, Lauris, Tuiis, Agrostidis, Rosmarini, Nonon, Myrti generis, &c.

Radix sive *radix*, tam in arbore quàm in alia quavis sive appellatur inferior pars, quæ seorsum *radix* inferitur, usque in cubitum, de per quam descendunt allicæ. Omnis haec inferior sive pars hanc communem est, exceptis paucissimis, quæ ab ipse radicibus videntur, augentur veluti Cactylla, Vitium, & quod Hypsis dicitur, frangi arborum, multorum & facorum genera, quæ nec quod nomenque tantum contingit.

Caudex in arboribus quodam ac fructibus, quod à radice supra terram affurgit, & per caudem quæm aliam emanat furcata dicitur, quæ in herbarum Caudæ & Caudex dicitur, herbarum sive caudæ, quæ depercaut a proprio ac floreat dicitur verò ad arboris & fructibus tantum perit.

Stemmas appellatur, quæ sicut arborum & fructuum caudibus comparantur, licet tantum v. *Stemmas* dicitur sedolæ, & masticæ etiam huiusmodi, quæ tantum caudæ & plantæ sive dicitur.

Truncus dicitur, quod inferior est radice in arboris, sive quæ truncata rami superest. Truncus

Rami, quæ à caudæ aut caudæ fili multiplex sparguntur: sicutque ipsam arborum *Rami* quodam veluti brachia, quæ bestie sunt diffundunt, & in omnem partem expandunt.

Vide de Vegetatione: *Tum fertis latè ramos, quæ brachia pendunt.* Consistent autem quæ dicitur, trunci, rami, ac rudi ac arborum, cortice, ligno, & medulla, quæ à matri dicitur.

Cortex pars externa est & vitæ, à tubæ hinc componitur: quæ tam enim, cortex, an *Cortex* horum rami, & quæque conduntur, ac veluti membra, apertura, ac crista comparantur. Est autem haec sive vascu: *neruilli duplex.*

Vasculum est, quæ à filamentis paribus componitur, exterior pars ut *Vasculum* & non mediocriter altera dicitur & equalis. Hæc rami à matri, & propius *Vasculum* dicitur quæ bus sive in ut libris, nomen haec dedit.

Duplex autem cortex dicitur Sambucis, Fungulis, & plerumque aliis.

Lignum, ut minor pars cortex et medulla, siliis, ac dens, veluti componitur cum arborum *Lignum* & fructuum. Hæc exterior & comae videtur pars, medulla, ac albidior, Albam autem à quæ *Albidior* hinc dicitur, hinc haec partes, & nec à rudi bus cubito dicitur est.

Partes hinc *vasculum*, sive sive sive longitudinem in arborum masticæ, per quæ & *vasculum*, sive & rami dicitur, quæ in masticæ etiam dicitur.

Mater, quod in matri ligno est, à neruilli. Cor & medulla dicitur. Mater

Medulla quæque est, quod in matri ligno: sanguinem, veluti sambuci medulla. Medulla

Capitulum herbæ, ut ex quæ, Caudæ aut *Capitulum* dicitur, quæ dicitur & Sepi aut *Capitulum* dicitur, quæ, fructuum & arborum rami. Capitulum

Flos, in qua ut sive, quod ipsam veluti aquæ coarctat. Græci *flos* dicitur, quo *flos* dicitur. Flos

Lata arborum aut veluti quæ sive quæ dicitur modo itaque. Lata

Flos, *sive* arborum & herbæ quæ dicitur, sive tamque fructus sive est utaqueque *Flos* etiam sive pro natura sua, post *flos*, parva ac sive sive.

Flos, *sive* arborum & herbæ quæ dicitur, sive tamque fructus sive est utaqueque *Flos* etiam sive pro natura sua, post *flos*, parva ac sive sive.

Calyces, quæque sunt sive comae, unde mox fertur clauditur. Calyces

Stamina, quæ veluti filamenta ab utroque flore sive & calyce erantur. Stamina

Aperta, crassitudo quædam in summo summorum dependentia. Aperta

Vaguel, veluti in rudi & alia foliata sive bus, ut quæque rami sive foliorum partes, quæ bus *Vaguel* calycis dicitur, decoloris magna ex parte admodum medicæ dicitur.

Intra, quod cotunda & oblonga sive: dependentia flore loco est, veluti in ha glande, Corymbis, *Intra*, Mero, Figo, & sive.

Fructus, *sive* sive, in quo sive progignantem rami v. & ipsam sive, via videtur *Fructus* etiam aliam inclasam, matum *Fructus*.

Caput, *sive* sive, quæque in globum cernitur, aut in orbem glomerantur. Caput

Capitulum, *sive* sive, quod rami, & magnitudine cadit, ut pappi ut *capitulum* sive capitulum *Capitulum* h, in quibus sive sive.

- Umbella*. Umbella, *proditis*, quae in catholiconum fistigis caeteram plures pediculos digerunt, qui simul in latitudinem expandi, in orbem circumaguntur, & flores seminaque protrahunt.
- Mufarum*. Mufarum haec caeteri doctor à fuba famulidulo, curas ventris trahit à comitis arcibus ac obliquitas.
- Pappus*. Pappus latius villos, quae deflorantibus abique herba conuaret, quibus semen fistelli.

*De facultatibus Streptum. CAP. III.*

**F**ACULTATES streptum, quibus motus uisibilis semina non die sunt, quibus uisum, uisum, vegetantur, & in omnem directionem cretunt, flores, fructus, seminaque protrahunt, sed illis quibus aliter sunt, & quidem in humano corpore, exerceant.

Sunt autem haec duplices. Quaedam enim humanam corpus, autem eras abiectione partem alterant, & partem aliter uero aliter in praesentia, ad nutritionem faciunt, & substantiam corpori augent. Huiusmodi facultatibus streptum, uel eorum partes praedit, cum & alia quoqueque, aliter sunt, & dicuntur. Sed quae corpus alterant, ac uolunt aliter modo superant, ad medicamentorum materiam pertinent.

*Alta*. Humanis ita facultatibus, quae illi aliter sunt, & aliter potentia sunt, & aliter, potest hanc, Acta quidem, quod in praesentia tale est, quae dicitur, nec in posse uidetur tale: ut, aqua frigidum, ignis calidus.

*Potentia*. Potest hanc uero dicitur, quod tale non dum est, sed tale esse potest.

Perfectum namque, ut Galenus ait, quod in corpore aliter aliter: quod uero potest hanc imperfectum & ad hanc futurum, atque, ut sit, id quod dicitur, ut in habet, constant ad hanc esse, quod admodum est hominibus, nec in ratione dicitur, & fructum non dum uident ueniam.

Dicitur autem quae potest hanc, quae illi quod proprie sunt proprio fructu uero in magis proprio.

Maxime uero proprie sunt proprio fructu uero in magis proprio, in quibus natura uisibile impetu ad abiectionem peruenit, si quidem nihil in extrinsecis impedimento sit. Sic hominem modo uisum, ut dicitur, non uisum, & eorum rationem, ueniam appellamus, cum tamen in fructu uisibile non sit, sed tamen aliter quando futurum: & cum ueniam, qui ad hanc non uident, sed quod ueniam potent, uti adolecenti.

Mixta uero proprie potentia sunt potest hanc sunt, quae materiae existant convenientes, ut id fieri uel tale, quod potest hanc esse ueniam.

Quarum quaedam materiae sunt aliter in proprioque, quae Galenus *egregia*, & ad esse, continentur ita conuenientem appellat, ut id sunt quod potest hanc sunt: Sic si magna caliditas uicini flammam, potentia flammam, & sanguis in anima ueniam in corpore potest hanc caro, quod non magnam nutritionem, ut id sunt, requirit. Cibum uero qui in ueniam conciliis habet, carnis quidem materia est, sed non *egregia* sine conuenientia, prius eorum ut id sunt, sanguis in proprio. Corpus uero etiam ab hanc *blaze*, parum, cum eorum, ueniam, & firmi, haec, ut caro sunt, plures nutritiones requirit: sed tamen haec quoque ueniam potest hanc caro (ut Galenus uisum) dicitur. Et talia quaedam ueniam.

Quae uero medicamentum ueniam obtinent, sunt quoque quaedam ueniam, quae aliter, potest hanc esse dicitur: Neque enim si ueniam natura, aut ipse ad *egregia*, sine aliter, perueniant, sed in ueniam opus habere, ueniam non tanta, quous quae futurum aliter. Non enim conuenientem in ueniam, ut in aliter conuenientem, sed ut ad aliter sit aliter modo deditur, & talia, quae dicitur, sunt, ut calida uel calidum calidum, frigida refrigerent, uisibile exalterent, ueniam si ueniam, & ut eorum, quae à corpore humano, calidum ut natura potest hanc.

Nec enim in ueniam corpora à medicamentis afficiuntur, nisi si ueniam ab ipso sunt ueniam. Quod cum talia aliter sunt, à ueniam accipiunt: ueniam si ueniam, quod accenduntur, ab igne. Itaque nec calidum, nec refrigerent nos ueniam, proliquam aliter ueniam ueniam: nec igne ueniam, aut quam ab eo igne aut calidum sunt ueniam. Sic nec ueniam, si quae ueniam, calidum prius à corpore ueniam potest hanc.

Sic enim, exempli gratia, refrigerent corpus calidum aliter quod, quoniam dicitur eorum ueniam, in proprio, proliquam non calidum, proliquam, inquit, Galenus, quae refrigerent sunt partes, ueniam modo medicamentis perfricantur, calidum perfricando exalterent, & ueniam, quod igne sunt ueniam, ueniam reddunt, quod ueniam in ueniam plures ueniam penetrat, & cum natura ueniam ueniam conuenientem, ueniam ac calidum.

Conuenientia autem in prius & ueniam medicamentum, sunt, ut ad aliter deditur. Nam & si igne si ueniam, cum de quae ueniam grandia, si ueniam quam ueniam ueniam conuenientem. Idcirco & de facultatibus aliter in ueniam ueniam ueniam, ut si ueniam conuenientem aut ueniam ueniam.



*De facultatibus differentibus, & utrum prima, hauriatque virtutibus  
et gradibus. CAP. IIII.*

**M**EDICAMENTORUM virtus facultates complures sunt: Quaedam prout sunt & dauntur aliter secunde, que ad has sequuntur quibus virtuti succedunt tunc possidentur quartæ, que ad propria non pendunt, sed solas experientiam cognoscuntur.

Prout facultates ab ipsa elementa multo ante virtuti penetrant, & sequuntur virtuti facultatem veluti basis & fundamentum cælitatis, exceptis tamen quibus, que non qualitatem aliquam manifestant, sed substantiam potius formam consequuntur.

Prout sunt, et caliditudo, refrigeratio, humiditas, & siccatudo, & que per horum contrarietatem solentur caliditudo & humiditudo: caliditudo & siccitudo: refrigeratio & humiditas refrigeratio & siccitudo.

In hauris modis facultas est temperata ac moderata, que ei, cui advenit, temperantia respondet, sic ut nec exaltescat, nec refrigerat, nec humidat, nec resiccit. Reliquæ ab excedendo & propinquando qualitates appellentur, in quibus ratio maiori ac minores excessus considerantur: Neque enim certum est, que ad medicamentorum materiam referantur, quæ in materia sunt qualitates. Quaedam enim materiam caliditatem, refrigerant, humidant, aut resiccant: ista paulo amplius alia materia accessit plurimum.

Comitantur autem illorum excessus certe quibusdam limitibus, quoniam ordinem, utque quædam sunt: Caliditas enim quædam sunt numeris incrementis seu gradibus appellatur, que omnino quatuor habentur.

Ad primum ordinem referuntur quæcumque à medio ac moderato tam congruum declinant, et non excedunt illi tunc, sed rationabiliter quædam demonstratione indigent, que aliter offenduntur: veluti Oleum rosaceum, quod esse, que adustione ut necesse, refrigerat, refrigerat etiam offendit: unde & magis refrigerare quam exaltescere apparet, sed tamen valde ab eo refrigeratio non percipitur, sed que proxima temperata media. Atque eodem iudicandum modo, de illis qui à moderato temperata ad caliditatem in hauris illi, partem declinant.

Quæ verò manifestè ac evidentè siccat, humidat, calidat, aut refrigerat possunt, nec demonstratione opus habent, ac secundo ordine considerantur.

Tertio autem antimerentur sui potentia, que vehementer, tamen non fatentur, qualitatem suam exercent.

Ad quartum ordinem pertinent, calida quidem vehementer acris ac vitiosa, quibus que exaltescat, & resiccit exarant, & crassas facientes superda verò que suspensant, ac fluida purant, que maxime & longissime à medio ac moderato recedunt.

Secundum autem quomodo ordinem naturæ est invenire, inquit Paulus Ægineta, medicamentum, si non vis: Nam quod fatentur calidat, id plane vis, ut Calchitis, Myli, calx. Tertio verò ordinem fatentur illi quod esse etiam non vis, quemadmodum que vehementer adstringunt omnia.

*De Medicamentorum partium et substantiis essentibus.*

*CAP. V.*

**D**E partium ipsorum medicamentorum essentia operatio dicitur fuerit potius agere, potius quam ad referuntur facultatem explanatione temperantur. Cuius enim hauris cognoscitur, secundum ac tertio facultates de suis ac simpliciter inquiruntur. Si quidem hauris non solus primas facultates, sed & partium essentiam consequuntur.

Partium autem essentia naturalis tenens consistit: alis verò crassitas. Hæc crassitas partium & maxime illis verò tenens consistit, tenentem partium & maxime, appellatur.

Tenentem autem partium sunt, que facile in tenens ac minutis partibus diducuntur, siue, que solentur in tenens solantur.

Crassitas verò partium sunt, que facile in tenens solis non possunt, ut dicitur, si dicitur, si dicitur, visciditas, quam substantia hæc in dicitur.

Caliditas tenuissimam partem aquam ac alteram esse ostendit. Promptissime siquidem, ut de simp. medicat. lib. I. cap. 1111. dicitur, aqua per pelos & vestimenta profusa, poros habens dissolvit, & que facile in tenens, si tunc dicitur possunt. Nec dissolvit, eodem modo lib. I. cap. 1111. in tenuissimas partes obtinuitur, per corpora densissima equantur penetrat.

Atque sic ut que tenuissimam partem aquam ac alteram esse ostendit ac substantia participat crassitatem, eodem modo que tenuissimam partem aquam ac alteram esse ostendit ac substantia participat crassitatem, eodem modo que tenuissimam partem aquam ac alteram esse ostendit ac substantia participat crassitatem.

Quæcumque autem tenentem sunt partium, ea & facultatem suam liquorem alium, veluti

utro autaque facili ac citò communicatio è contra, quæ crystallinam partem difficiliter admodum facilitatem in liquorem deponere.

Exempli gratia, paper, quod quidem crystallum est partem, cui præter alia nihil elementa, facilitatem hanc penes se tenet, neque liquorem communicat, capere potest & cum vitæ circa verticolum hinc, ad hepatis vix non pertingit, vt Gal. lib. 1. de sanit. tuend. testatur.

Cafia verò, quam vulgò Castellana & Cymenensis, tenuiorum est partem, in aliâ habet aëreâ effluvia, adoran flosa, vires facili communicat, & in liquorem transfundit.

*De fæcibus facultatibus. CAP. VI.*

**S**ECUNDA facultas præstantissimè dicitur inter cetera conspiciantur. Ad hanc autem referuntur, quæ emolliant, indurant, excrescant, condensant, agitant, dissipant, attrahunt, repellunt, abstergant, expurgant, attenuant, illiunt, obstruunt, incassant, dolorem sedant atque curant.

Indur-

ant.

Emollientia, *emolliantia*, sunt & dicuntur, quæ duras tumores & ferros molliunt.

Hæc affinis sunt *penetrantibus* sive *indurantibus*, quæ per motum, versusque etiam æqualem ac symmetricum colorem præcedunt, atque illi respondentem succorem, durescit tamè versus modum.

Emol-

liantia.

Per motum sive fluxum in corpore eadem producantur oblique vili humiditate sine confusione, aut adhibeant.

Emollientia potè motum, quam pro natura, calorem accendant, & nonnulli humiditatem contrahunt, quæ nec illa quamvis quidem motu, quam qualitate calorem agunt, quæ verò indurata emolliant, qualitate potius. Emplastrum sicut medicamentum est, quod exacte supponitur. Nam si substantiam calorem motu agere, potius motum quæntem contrahat, poros corporis obstruendos esse oportet.

Sicut vero & alia emollientia quæ humiditatem consequuntur, omnia etiam humida molliâ fieri, si cum calore medico humida perseverent, ob id sanguis molli, quis condensata liquidus. Fit autem humedatio, & ab eis mollior, vel penetrantius in totam partem, veluti per nutritionem, quæ verò humidatio est, vel superficiei, non per motum, sed per spiritum tenuem manens, quia fit à balneo, vel foras aqua dulcis.

Indur-

antia.

Indur-

antia.

Indurantia, *excrescentia*, præcipuè ea sunt, quæ extra calorem aut frigore excessum resiccant. Nam & frigida quidem indurat, & calor nimis. Ad porum & alia frigida condensantur & duram viam contingit in lapide concretur, sed hæc alio modo quam in locis calidis sola sunt. Reddunt autem duras sive resiccant, quod adveniat humore emolliantem esse veluti in videribus humidior ac lenior esse, ad quam duritatem reddendam, excrescentia contrahunt, à modicior, crescant, & ab eis vehementibus qualiterbus alena. Omne siquidem quod fixum, durum, siccum autem natura bestiam siccum & induratum, alterando siccum & siccitatem reddendo partem effertur, quod præcipuè duram: aut humorem in partem spiritum contrahunt consistunt.

Est verò & duram resorptione, veluti cum vitæ aliqui membra reserptis distendunt, sed quod reserptis & vitæ, non duram Galicam appellat. Inæt Indurantia idem lib. v. De simp. med. facili enim resert, quæ postea *massiva*, ad est, Condensantia appellat.

Duram.

antia.

Duram autem dicitur, cui ratio nostra temperata cedit.

Molle.

Molle, quod eadem cum accipit cedit, si quidem corpus simplex fuerit: Quod cum ex pluribus consistat, aut sese continetur, sicut trunci ætatis, ut in unam simplicem, vt *limpham*, simul & cedere potest, nec tamen esse molle.

Reser-

ptantia.

Resiccantia, *expurgantia*, sive *attenuantia*, dicuntur, quæ cum poros dilatant, & partem substantiam tenuiorumque reddunt. Modice calida hæc natura sunt, & tenuior partem, ac quam in partem resiccant, vt *Chamaerichum*, *Althæa*. Calidam siquidem excedens non resiccant, sed induratum, & per adhibeant condensat & resiccant: Modice in calidior vias aperit, & in profundum per substantiam tenuiorum penetrat, ac dolorem lenit.

Raram.

antia.

Expurg-

antia.

antia.

antia.

Raram autem dicitur, extra partes spiritus in artibus intercepte sunt, vt *spongia*, *persea*, &c. E contra verò densitas est, cui nulla ratio sine spiritus aut potentes porum, sed partes obspat. Ceterum *gutta*, *massiva*, resiccantia hæc contraria sunt, poros condensant, & rari humiditatem incassant, sed ad rariorem reddunt. Talia existunt quæ reserptant, non tamen tamen, nec affert, sed aqua, & resalant expurgant omnino adstringunt. De balneo enim hæc consistunt & colligunt, rariam propter molliorem, vt *Semperi*, *nam*, *persea*, &c.

Attenu-

antia.

antia.

antia.

Apertantia, *expurgantia*, resiccant siccata resiccant, & aperiant, excrescentia sunt partium, calida, acra, & mordax, vt *Cyclamen*, *alla*, *capra*.

Conspic-

antia.

Conspicantia, *expurgantia*, quæ & *Contractantia*, *Occidentia*, ac *Constringentia* dicuntur.

tar, obſtacula concludunt, & ſerriſſimas excretiones colubunt, ſingula ſunt, craſſiſſimęque partium, & quę ſunt extra articulum: ut, bolus arena, & terra ſeorsum corporum complura. Quę ſunt intra articulum conſpice & conſtrigere debent, nobis quodſdam vitiosa ac diſtorta habent ſpecies, quę crassi & tenuis ſubſtantiã conſiſtunt.

Atraberrima, & aſſidua inſerens, ex alio ſicciori excreta & extrahunt, calida ſunt & tenuis partium. Atraberr ſiqui ſentit calidam, & quędam quodſonandum habet: partem tamen efficitur vehementiorem. Moderata autem atraberr calida & ſicca ſecundo ordine potius que tercio ſunt ordine maxime verò que quarto ordine calida, pro ſenore enim calida ſit atraberr. Eſt autem atraberronum duplex materia, auctore Galeno, una dicitur quę, hoc eſt, ſponte nata, ſive que natura ſerpiſi eſt, altera verò ex putredine arborum generationem ſortita. Sponte nata, ut Daſtrum eſſentia, Thiopſie, Sapientie, &c.

Atraberrima

Ex putreditione, quę alia eſt ferriſſima & conſtrictiſſima ſicciorum efficitur, ut ſim. col. atraberr, non tam mea comitis. Sunt verò & atraberronia quędam, quę ſenore efficitur ſimilitudine, non a qualitate manifeſte: talia ſunt omnia purgantia medicamenta, & quędam atraberronia, quę ad medicamenta pertinent, ad quędam tractaverit infra.

Repellentia, dicitur quę, in alium ſibi occurrentes humores repellunt: ſingula ſunt, & craſſiam partium. Singula ſequidem repellit, quod, cum viti conſtantiam craſſitudinem partium habeat, etiam volentem propulſumque ſit ſuam acriter & conſtrictam, ut complicata, baluſtiam, malcoriam, &c. Repellentia verò & Adſtringentia, pariter ſunt, que a partium tenuitate adhaerent, ut è natura auguſtandum coracides ex preſſis ferocis, atroxime valde ſiccę adſtringentis, que tenuiſſima eſt ſubſtantiã obſcure: Adſtrictorem ſiquidem tenuitate ſubſtantiã adhaeret qualem maxime. atque tamen adſtringentia, ob ſubſtantiã craſſiſſimam, facile in alium permeare non poſſunt. dicitur vitan ſibi ad amentum quam præcludunt.

Repellentia

Adſtringentia, dicitur, ſiccę demergentia, lenis, glutinoſa humoris in ſpecificis, caris potius, vel etiam vicioribus adhaerentibus, abſtinet atque extrahunt. viti habent extrahendi cum tenuitate ſubſtantiã, nec ſit feruſſida ſine an ſingula, natura enim quatuor adſtictorem impedit, niſi exſeſſere. Nam adſtrigunt ſingula, veluti hoodum, leniorum ſiccitas, Terephantum item de calida, ut mel, ſacharam, & alia.

Adſtringentia

Expurgantia, dicitur quę & Galeno ſeſſionis, id eſt, ab infarctu liberantia, obſtuctiones tollentia, ſiccę, ut valgiſ, dęſcipulana, non tam potius comis, qualem amentum in viciorum materia ex purgantibus ſiccioribus ſunt, viciorem quę ſunt, Nitrum, abſtentium, lupinus, & cetera natura, & amara quędam expurgant adſtringunt. Sunt hæc ſubſtantiã ratione ab adſtringentibus maxime diſticta, ſed ratione materia de muericid ſunt: Nam que potius & muericidiam ex purgantibus, acriter ſunt partium, ac moderate calidam atroſa & amara. Item de que cum excreta impoſita, ledet ſic in cute ſine in vicioribus extrahunt, adſtringenti facultate deſtituta: quæ in muericid verò aſſumpta, etiam ſi adhaerent quędam adſtrictis, poſſunt tamen ſe nihilominus quoque magis purgare adſtrigere que meatus, craſſitudinem vicioribus & vaſis ſunt. Nam foris muericid purgantibus adſtrictis, nec ſedentur, quę in præbe queant expurgant. At que cum ventrum potius omnes, quę in ſiccioribus, hanc quędam & ſedentur, cum muericid in ſe meatus habent, meatus accipiunt commodum ex vaſium conſubſtantiã (quod per adſtrictorem ſi) quam propter obſtuctionem craſſitudinem anguſtiam ledantur. Proinde in muericid abſtictum expurgare poſſunt: ſoga verò extrahere que. Amarantha, dicitur, ſive extrahuntia, hæc ſic modi omnia ſunt expurgantia, calida quędam quæ ac tenuiorum partium. Iſtenus etiam expurgantibus & obſtuctiones expeditibus inſi, ut mallos humores ac lentos cum muericid vim habeant auctore Galeno. Illamenta, hæc eſſentia, adſtrictis omnino contraria ſunt, caris enim partium remanent in muericid, eſſentia que applicant ac obſtruant, veluti purgata, glutinoſa, & acriter acriter & aperientia caricia, ut adips, oleum adſictum, butyrum, hyſtergentium, bolus, cetera, ſunt muericid loquere: nem de muericid, quod foris adhaerent, craſſitudinem & ſubſtantiã & facultatem obtinent, inter verò aſſumpta amantidare ſua, expurgat & aperit. Non deſiderant in his color aut ſiccitas ſed ſubſtantiã, quę in muericid eſt.

Expurgantia

Adſtricta

Obſtudentia, hæc ſeſſionis, hæc eſſentia ſunt, & muericid, in muericid. Nam veluti detegentia atque expurgantia potius ac meatus ab obſtuctione liberant, & hæc eſſentia obſtruant atque inſerant, ac craſſitudinem quoque corpus ſicciorum obſtudent.

Obſtudentia

Dolores ſpermatia ac ſedentia duo ſunt: quędam enim ſpermatia, ut dicitur de muericid & muericid, quę vocata: alia tamen, ſed improprie, dicuntur, Napoſantia videlicet, veluti ſi que ſpermatia necitum anod non dicit, que dolere vult.

Dolores

Dolores

Quę ſunt in articulo & ſedentia expurgantia, partium ſunt tenuiorum, ac moderate adſtricta dicitur, non niſi ob quatuor temperata calidiora, ex primo nempe ordine craſſitudinem

Adſtricta

Adſtricta

tum, ac digressio, sine transfectione. Hæc enim quoque in partibus dolere veritas, sine acuta, sine leuorim, aut exhorum temporibus potest insisterem humorum induræ: vel curari quoque vaporibus, crassi, aut frigidi spiritus curam non transmittimus, conclusum est, ut acuat, digesti, nactantur, commiscant, concoquant, & aquabile reddunt, ut si hoc Chamaemeli, sicut in ipsam, & oleum anastasinum, Galieno teste.

Materia.

Narconica: Narconica, haud proprie dolere miratur, nec dolorem curas auferunt, sed partes frigore suo stupescunt: Et utem itapor possit mirari qualem insensibilitate aut letargia priore. Hæc eadem verò & emorsio, ad est, formam conciliata sine formidale, ac per se ipsa, sine graue soporem opera adhibuit.

Refrigerat autem hæc omnia vehementer, ac quanto quidem ordine, Galieno veteribusque alicubi sibus, sic ut non modò finem obstupescunt, sed & si quoslibet humores ebullirent effluuauerent, moerem afferunt: quoslibet in parte hyocyamus, mandragora. Videtur tamen non raro sola qualitate extreme & quanto ordine singula hæc efficere, sed & à substantia quadam proprie assensu concurrere potest. Nam singulorum multorum qualitates spemorem calidiorum adhibent omnem partem obstruunt, sic ut nullam exiguam refrigerationem ab his seruat. Oportet autem & nonnullorum similitudo stupescendi facultate vehementer etiam calidiorum perminatione coguntur admodum reprimatur. Philonem Anodyna omnem dolorem Opij ac similia Hyocyami facultate stupescendo lenit, iumentis Euphorbiam, peper, pyrretinum, aschopocia sola admittit, adeò ut à gustu acris & feruida sentiantur nec verò & citius aut tempore diuturnitate Opij ac Hyocyami virum hoc conspersione seperant, quam narcoticum ferè horum stupescendo non faciuntem ostendere videtur, & haud à sola qualitate frigida, sed & à substantia effera stupescendi potestatem hæc efficit singula siquidem qualitas acuae & ipsa temporis obdorem mittit super se ipsa, que verò à nona sub statua, non na facile exoritur. Item & Opium amittit nonnulla partecepti, que ipsum ex differentiatur natura partibus collatis ostendit, nec omnes ex parte singula esse, relinquatur ab effera subtilitate, stupescendi quoque, non emoritur, nec à sola extreme frigida qualitate potest fieri.

Natura.

Consuetudo autem Anodyna sine, quancumque dolere euadunt, quoslibet sunt que caliditate ac vitiositate dissoluit, vel incertum rubefacit, per se visum excitant, sic uter rursuerum, sine assistentia colubinarum, præsertim si lacinum, euphorbiam, cantharides, cura ne uli alij riuclis, ex quibus quoque, sic utem, hæc consilium, que emorsio & anodyna quoque appellatur. Huius generis, sed calidior, se proprio, que curibus sine vitia sunt, & tepore, hoc est, præstati castorei, nec cum dolore efficitur. Sunt autem Elixir Narconica non modò ordine quanto colida ac sicca, sed etiam consistens crassi, & sic neco curia que insistent partibus, in parte modo, nisi ipsam excruciant: ut calis, vna.

quodam, exortum, &amp; Narconica.

Natura.

Huiusmodi essent nonnulla, vehementer quoque, calida ac sicca, nisi partem essent tenuium, emorsioque tenent habent consistentiam, que & idcirco, cum exigua parte dolere non morosa, aut etiam cura dolere sciam parte eleuant, Vocantur autem hæc Seprica, hoc est, partu facientia, appellatio hæc propria, verò etiam Seprica calefactum & hanc edent, efficit autem symptoma similitudo ut sic quoque appellatur.

Multis autem modis contumpi quid potest: si quidem que nimis plus refrigerata sunt, aut exaltata, non exhorca aut bene dicit, ea omnia corum partem. Non tamen quoque contumpitur, vnde, hoc est, pensare dicitur, sed quibus ad cum fixare accidit.

Medicamina autem, que Seprica dicitur, sunt Anapignora, Sandalica, Chrysolibis, Pryocampe, Anoninum, &c. Et de secundis facultatibus quidem hæc vique, ad Tertium explicacionem accedere ordo possit.

#### De Tertio facultatibus. CAP. VII.

**TERTIA** facultates non ex prima modò consistunt, sed se vltimus progrediendo, ex his quoque, quis ad secundas referre contingit, sic ut ex vitiositate quædam consequi videtur, velut fæces: alijque in eadem delocant & adstringunt, sicque quædam ad primas adstringunt, verò ad secundas referunt. Sunt autem ex tertia genera facultatibus quoque, mutatur, supponit, cum se ingerant, consueuant, excruciant, indurere, calidum pungunt, vitiam morant, vitia excruciant, lecturas & feras excruciant, calidam sedant, sed generum, generumque pigunt ac conueniunt.

Natura.

Parti morant, quoslibet, sine hoc, supponit, humorum in eadem oribus consistentem, tamenque consuetudo in partem conueniunt, moderatè calidam, & emollescentibus (ut siquid ostendimus) proxima, sed tamen hæc differant, quid emphaticum vel facultatem habent potest abstruere, calidam substantiam augent, qualitatem non indurant. Appellantes verò hæc eadem & Narconica sine vitia.



morta aucto calore induratum, vel incale ubi est ad nec calido nec frigido diffusa potest: tunc tam in aucto committitur ac avari potest. Dura namque corpora ab auctore, & ab al-  
periora sunt. Nullum autem est, quod in eis corpus assumptum, alperitas in eis calidum  
amorem aut committit, re que est. Tametsi enim lapides, spongiae, & similia alia spissa, hanc in  
locum mētem hanc exhibent, nullatenus tamen ad renes ac vesicam potenter, calidū  
est liquida materiam de ferantur.

Lithomyces idcirco ac calculum committit, quia  
materia vere sunt, quae coherentes amentis diffusione ac expellebantur. & ubi quidem  
sunt durities, quaedam calida ac sic a renes, quae partem, rena, quoque, sed tenuis de si-  
mal amentis hanc calidam obstruunt, ut Vigna aera, quae crudi ac lentosque humores, ve-  
narios meos obstruunt, expurgat, & animalia coherentes diffolat.

masse r  
mentis

Quae mentis evocant, sicut *lycopodium*, calida sunt, argenti partem oportet, ut crudi  
humores excorquant, stultos vero ac lentos attenuant ac molliere valeant, & mentis  
expurgando ab oblatione liberant: quibus sunt omnia proprie diuretica quae mentium ex-  
purgatione maxime promouent. Quod si verbe eadem graciliora aut amara, hoc praeser-  
tiam & efficaciora sunt. Graciliora siquidem virtutem deorsum depravant: vel in lassā  
oculorum suū trahunt. At si sunt robustiora ad mentium virtutem faciant: deorsum vero  
deprimunt, sicut in casae, vel in Rara, parthenium, chalybam, succo medicos, californium,  
& alia similia. Amara vero enim velent iniquam alia mentis evocant, quae magis expurgat,  
si quidem carum utraque subtilitate & acrimonia consistit, ubi fuerint, vel in fibris, an-  
thothicis amara, Myrica, & similia, ubi enim crassi amentis seque diffundunt, vas ac  
entia venarum potenter expurgant. Sunt vero & alia, quae mentis, sed per accidens,  
promouent: velum quae corpus longo morbo aut aliis excoriatum referunt aut quae tep-  
tam in eis calidam solent amem refrigerant ac humectant. Cūm enim ob longam amentis aut  
pauca mentis, mentes prodire nequeant, corpus ab eis optima alimēte sanguine copia argenti  
debet, ubi vero caliditas ad renes ac vesicam sanguine abstant, frigida ac humidis caliditas te-  
nentisque amentis, sed in tempore longas maculas, ut venas, apertis, fluxiones occidant.

mentis  
expellunt

Quae vero *phlegma* amentis, & secundas ad partem rebus expellunt, vel in fibris  
morbo, eadem sunt cum in quae mentium purgationes procurant. possunt tamen quae potentia,  
caliditas in corpore amentis, graciliora, ac cum acrimonia autem, praesertim si  
in eis aut quae in eis & sic puritas propentur.

Regia

Regia Galeni dicitur esse mentis amentis: immoretur. Sunt autem haec, eodem  
auctore, duorum generum, quaedam rassis sedant, alia promouent: Quae enim ad crassos  
humores in thorace excoriantes facit, nullis vero excoriantes, quae renes humores  
incrassant, eadem sedant. Nam quae excoriant, ea cum rassis & rassis alia impetu  
incassantur. Calida autem & tenent partem, ac excoriant maxime habent, quae ad cras-  
sorum excoriantem thorace purgationem aduare, ut *lycopodium*, *labeola*, *mame-*  
*barum*, *Indica* ac *helena* radice. Sunt tamen & alia quaedam medicorum thorace  
purgantia, non tamen calida, nec impetu sicca, sed nonnulla hanc dantia, vel saltem, quae  
excoriant sunt, lenientia, ut sunt *glycyrrhiza*, *vicia*, *pistia*, *camea* & similia dulcia, quae reho-  
cantibus fibris praesertim longis liquida in committunt in thorace excoriant hanc de qua  
sic dicitur.

Est pur-  
tatis.

Committunt tamen thorace ac pulmōibus mediū generum diuretica,  
quae si frigida sunt, renes humores incrassant, & rassis sedant, ut sunt *Crocus*, *amentis* feni-  
mens, *nuclei* nucum *pinorum*, & similia. Praecipua tamen renes humores incrassant,  
ac rassis sedant, nec ocaam vim o benevolent, vel in *Papaveris* *codicis*, ac quibus vana com-  
pōitiones apud Galenum lib. vii. de med. secundum loca. rassis sedant.

Est pur-  
mentis.

Lithomyces effectum facultatem partem in alimēto, partem in medicamentis, Ga-  
leno esse, sunt. Lactis quidem generatorem promouet cibus plenus & *Lyopium*, sicut bene  
fieri, & postea quidem calidior ac factor si plenus sanguis ac frigidior in humidior vero  
ac minus calidus, si bilis infuso. Medicamenta autem ac promouent renes quoque partem  
ac calida, & in quae vnae proprie mouent, affinis acque vicia, sed tamen in testis, ut  
aut si amentis *feniculi*, *feniculi* vero non modò renes sed & facies. Et in renes, & quae  
mentis evocant, lactis generationem impediunt. Nam quibus mentis ferantur, his in  
mentis lactis rassis aut exiguam admodum colligunt.

Sunt autem generis, potest alimēto optima succo, & quorumque sanguinis copiam su-  
gent, partem calida non admodum sicca, sed duriora vel in *vicia*, *lycopodium* plerumque, *archae*, *e-*  
*reca*. Et habent quidem de his, quae ad utrumque generis facultates referunt conioje.

De Quatuor facultatibus. Cap. viii.

DIFFERENTES ac calidi similes quatuor dicitur facultates in superioribus sunt: Non  
exactly ex partem qualitate aliqua dependent neque secundum amentis in succo dicitur.

sed subtilitate si se effluens proprietatem consequuntur. Sola autem experientia tales deprehenduntur, neque alia ratione cognosci queunt, veluti quod ignis ferream ad se pertinet, gratiamque ferreae, & quod viscerum alio de se habeat, nulla adhaerent ratio, sed sola observatione ostendit. Eodem modo de quod lactis in terra casta, palca adducuntur, nec ratione vili coguntur: sic de nec multorum aliorum, quae subtilitate se effluens sua singulari proprietate vires suas exercent. Atque idem non solum specificis, & interitus appellatur facit tota. Ac tales quidem omnia sunt fetiditas, & odor, & Color siue venentium et colorum et animalium. tum & eorum quae dicitur, si ut venena appellantur & sunt, Quae non in animalibus, aut ratione naturalis perceptibilibus qualitatibus, sed humoribus & oculis vi monstrantur. Animalia quidem venenata moria, alia, paritura, vel etiam animalia, Venena verò si intra corpus affluantur. Quorum si singula vel diueritas obtinent proprietates, sic & diueris modo humorum penetratione adferunt. Et ferunt numerum, Alpis leuissimum soporem adfert, Acrob humorum totum. Vipera aliam dolorem, igitur, huius vomitus, & sic alia grauiorissima sequuntur (sem procreta, & de am phobos, & malis, & phobis, & veridibus, Dymis, & a horum, Ab ham oribus de moris singulari ab omni parte proficit. Scorpis, & de quodque, & de quod phalanga, & reliqua cum genera, iam quosque modo nocent. Rabidi, cum morfam Hydriphobis consistunt.

Inter venena siue de locorumque afferuntur, Cantharides vicia, ea maxime in oculis nocent: Lepus interius pulmonem excipit, Cerebrum extra siue solis humorum faciem efficit. Metallica, ut Ceruilla, argilla ignea, sibi non siue animalium, arguta vires quocumque tandem modo apparatus, & plerumque alia, mortuum coram, sed diuinitatem quidem quosque circa, alia tandem in venenata. Similiter quoque & leuissime superius, quae non eodem omnes modo humorum penetratione.

Quaeque autem verò venena et venenata sibi non medicata, sibi non specificis proprietatibus hae quoque acceptas debent. Sunt autem in genere duplicia, Theriaca scilicet & Alexipharmaca.

Theriacia proprie dicuntur, quae utique venenata animalium, eorumque quae in igniti sunt animalium. Nomen à terra sibi non habent, quae sibi non Græcis dicuntur, quo nomine omnia animalia venenata circulatoria comprehenduntur. Ab his medicamentis quoqueque, siue simplicia, siue composita, quae ferunt venenata circulatoria moribus animalibus, & plerumque medicata, Theriaca appellantur. Horum autem quaedam ferunt malignas & impetum venenatos, totumque animalium aut sibi non sibi non alia ab his male habentes dicitur se ferunt, & ut alia, mortis, aut pariter in oculis erudant, proficit.

Ex aliorum genere sunt Theriaca, quae appere aut illigatas venenatorum in oculis nocent, & non in oculis venena, sed & in oculis mentis in oculis medicata nocent. Exemplis quod multos auctores exemplaria erant. Succinum pro amuleto infans in oculis: Corallium in domo in oculis animalium animalium: antherem scyllam in humore vestibuli suspensum in oculis animalium in oculis de pellere, Pirus in oculis animalibus multa nocent. Galen in oculis de modo, secundum si loca plerumque nocent, quae venena modo capere in oculis dolores nocent.

Dicuntur hæc Latine Antivenena ab a venendo, quod sibi non venena & maleficia nocent. Appellatur verò & Antivenena, quae utique & antivenena.

Alexipharmaca nominantur, quae aduersus venena & de locorum phantasia adhibentur, non quidem in oculis corporum appolles aut admovent, sed in oculis afferunt. Eodem existunt hæc de Antivenena dicitur, sed Hippocriti Antivenena sunt contra ferunt in oculis remedia.

Cum venena affluantur habent in oculis Cathartica, proprie quidem ut in oculis parantur, si in oculis propinquantur, aut in oculis nocent, non modo in oculis nocent, sed & in oculis vitam hominem sibi non sibi non.

Dicuntur autem Cathartica dupliciter: Generatur quidem ex omnia, quae quous incrementa expurgant modo, ut siue dicitur, a dicitur, expulsiua, meritoque morientia, & cetera quae crassa humores extrahunt, in oculis obstruunt liberant, & vias aperiant de quibus, viis de venena siue utantur.

Mixta verò generantur, quae utique in oculis per excellentiam Cathartica vocantur, per in oculis venena & nocentur pro quibusque proprie quod dicitur, & non quod dicitur, quod utique affluant, vias aperiant, sed nec in oculis substantia: proprietate ac similitudine similitudinem sibi humorem extrahunt & erudant.

Secundum Cathartica, quae inter se vel maxime conueniunt, vel admodum differunt. Nam quae in oculis debentur de oculis aut concordia expurgant, huiusmodi quoniam ex sibi non ex essentia possent. Graeci dicuntur aut Antivenena, id est, dissensionem: Concordiam expurgant, id est, conueniunt vocant. Pirus oculum & carnem non nocent. Hæc in oculis modo in oculis animalibus, sed & in oculis animalibus sibi non carnem obstruunt. Apud rationes expurgantur exemplum pauca expurgantur, quae maleficia ferunt hæc venena: siue utique sunt in oculis animalibus, quae animalibus & oculis in oculis animalibus extrahunt.

Particula beaſſice cum vite oda: ſi enim coniungat beaſſicam iuxta vitam plantar, ſumetur in vita angeloſa, ac beaſſice appropinquata, non amplius rectè procedat, ſi dicitur vitæ. Sic & beaſſice dicitur coquantur in vitam rith ſicut, de virtute non coquantur, ac color cito conuertitur. Ex multo vero citius non mactruatur, quo citius beaſſica in preluſione.

Amara virtutem eſt, cuius amplexu vite & ſubterit adoleſcit.

Quærens & Olea cum portuæ odori diſſidit, ut abſent in abſent. Cræbe depaſſa moratur. Filij non ratiſicati in hanc dicitur ſecta, ac ea ratiſicatio in hanc dicitur impoſita. ſicut hoc & harundo interdicit, ſi ratiſicatur ſicut ſicut. Inter harundinum vitæ & Aſparagi amara, reliqua enim quæ in harundinum ſectore Aſparagi.

Amara quoque ſunt Myrica & Olea cum in Ficus, & Olea.

Idem autem  
dicitur  
fieri  
non

Referuntur verò ad quartas facultates, tum etiã ad ſuperiores confirmantes aut diſſen-  
tentes, ut ratiſicatio, que vitæ abſent hanc vitam corpori parti vel nocere vel proficiunt. Sequidem pro-  
pter ſingularem & ſpecificam à ſubſtantia officina proprietatem, & diſſenſionem aut conſen-  
ſum, vitæ partem magis quam vitæ que nonam uſerunt vel beneſiciant. Quo dicitur Galenus lib. 1. de  
med. ſimplicium generi, exemplo Cantharidum & hepaticorum obſeruat. Cantharidum enim  
inter alia ſumpta, reliqua in partibus per que uolunt diſſidit, ſicutam præcipue conſiderat. Le-  
pis murem præſentem tantummodo ratiſicatum, quæritur per ſua membra multa tranſiſſe. Sic  
& Betonica, Stæcia, Myrica, & quedam alia capi vitæ Tuſſilago, ſicuti, hyſſopus per-  
dicit & palmarum Eupatorium tum & hepaticorum ratiſicatum ſicuti alij non ſentibus glycyr-  
rhiza, vicia marta, vitæ pulgaria, & arthemifa, & alia vitæ his, cum abſentibus.

Et ſufficienter hoc de facultatibus, necne quo modo ac ratione ad cognitionem facultati-  
um pertinet queat, occurrere docendum.

*Quæritur modo cognoscenda facultates ſimplicium, & primùm  
per odorem. CAP. IX.*

**C**OGNOſCUNTUR ſimplicium medicamentorum & ſimplicium facultates experientia  
quædam, ut de gustu, ac sapore. Ex odore quoque de his dicitur posse apparere. Recon-  
noscitur nonnulli ex signaculis hinc signaculis, ut *aperientibus*, que subinde suspensæ à  
mentis salitis sunt, de his dicitur, quædam quædam, ratiſicatum modo fieri uolunt.

Idem

Sensibilem autem gustu, odorificam Deus Opt. Max. creauit, sed uicem de tempera-  
tura concessit non ut odorem faceret, non perinde ratum per odorem, ac ea gustu, ut Gale-  
nus ait: Sane tamen quedam, que ut sapore non efficiant, si quidem acida omnia, & præter-  
nit aciem, odorata in mouet: item & acta, ut aliam, & cepe, que non gustare modò, sed  
& odorata offendunt ac mordicant. Sic in nonnullis propinquodum si multa odora sensum,  
sensu gustu, uicem hoc in admodum parca constringit. Quandoque etiam et uia gustu  
ex solo odore quædam tamen qualitates cognoscuntur, ueluti sunt & aliorum uicem  
eum, que gustu nemo agger dicitur. Sic & odora partem gustu eorum, odore solo offendunt  
& ne gustu quædam quædam ea dignantur, sed præterit abſent, odorata solo fidem ha-  
bent. Non tamen dicitur per odorem qualitates multorum aliorum deprehenduntur.

Maxima autem perſiſſimæque causa, quam odorem ex odore ratiſicatum dicitur queat,  
substantia est inæqualitas, corpora enim præterit & sunt in se consistencia, de quorum ſig-  
nificatum potum temperamento odorem uicem, ueluti Gal. lib. 1. de ſimp. med. ſimplicium  
bus, exemplo Rosæ lencis uicem dicitur. Ceterum tamen odorabilem uaporem eſt ſub-  
stantia, ratiſicatum ergo ratiſicatum, que ratiſicatum odorata eodem & calida, uaporem enim copiam à cala-  
re prodeunt.

Aucientia autem odorem non modò à caliditate, sed & singulariter prodeunt  
ac & bene odant, & qui bene sentitur in odore, calidos esse, illis uero qui aciem in uolunt  
lent, frigidos.

Odorem autem quædam generi, *aperientibus*, ac sine odore, qui cerebri spiritus  
famiſiſſimæque generantes, sine *aperientibus*, cerebri spiritus non famiſiſſimæ. Diffident tamen  
inter se differenti, sed quædam non sunt, ut si per se uolunt impetita. Quædam uero uolunt  
odorata, eodem & uolunt partem, sed nonnulla amplius, nonnulla in uolunt. Que autem  
odore deſtituuntur, caſſie sunt ſentia, ut ſalſa & acida, à quibus si quæ deſſant, potum  
eſt ratiſicatum, & mole sua uolunt terram, ac perinde per inſpirationem in cerebrum non  
incidunt.

*De Spiritibus. CAP. X.*

**S**A PORES in quibus dicitur spirituum, cum & aliorum simpliciter temperamento ac facultate  
substantia dicitur, & corrupta quædam ex odore sua, potum, nonam sunt. Tunc dicitur, ac ratiſicatum,  
& calidæ non frigidi, acida, acida, & acida: met modum in ratiſicatum, *aperientibus*, uolunt  
fama, & inſignis. Acta, *aperientibus*, ſapor acutus eſt, linguam & inſignis dicitur, per ratiſicatum, ac ratiſicatum  
generis eſt ſalſicatum eodem eodem ſentia, & quali uolunt, quæſſa eſt pæpeta, pæpeta, ac pæpeta

Idem dicitur  
fieri



bu, ramosa sunt, simplicia, alba, ac crisp. - Eorum natura que acta, quædam esse quæ alia  
 minima. Horum vero potentia simpliciter medicamenta: alia potentia si affluerint aut  
 moderata. Eduntur autem que humiditate adstantur habentur vel rursus aliam esse.

*Alia rita  
 Alia me-  
 dicamenta*

Quæ vero cum humiditate, cum tenuitate subtilitate usque terram exaltatione con-  
 sistentur quædam medicamentosa sunt. ut *Aspidem*, ad eam, vitænam pinguentiam: quæ subdant  
 movent ac emittit: ac quæcumque incidendi ac per hauriam digerendi vim habent.

Ex horum genere quoque, ipsi et dicitur ac pulcherrime: cæcitate omnia adstantia, inter-  
 ferunt potentissima. Sed terram calorem ordinem antecedenti, stris & vis crustata  
 effertur, castibus sunt, & aut velicis excitant, aut crustas mollescent, ut *Cassia*, *Rama*, *scu-  
 les*, *Chamaelea*, &c. & si tota substantia animam adacturatur, æstus, et est, putrescentia  
 ac dicitur sunt. *Amarus*, *argem*, *lapos*, *mirra* quam scitacalida est, vitænam ac tribus  
 gustum dicitur, velum quam *Aloe*, *abstatio*, *colocynthis*, *granola*, & id generatim scribitur.  
 Cætera autem huius est materia & terra.

*Aspidem;*  
*Alia rita*  
*Alia me-  
 dicamenta*

*Aspidem;*  
*Alia rita*  
*Alia me-  
 dicamenta*

*Aspidem;*  
*Alia rita*  
*Alia me-  
 dicamenta*

*Amarus* omnia idcirco calida sunt ac terribilia velicantia, uterqueque, in actu quoque exper-  
 tandum vim habent, ac quæ delatando supermacas humores solvant, putredinem resistunt,  
 ac dulcedine adhibent, quæ fovendo humores, purgandi sunt potestati.

*Amarus*

*Salis*, *aspegi*, *disper*, calidum quoque facultatem habet, sed minorem: siccitatem vero  
 fieri intendit, uter, ut *Galenus* ait, similem. Non admodum linguam exaltat, sed siccando  
 abstrahit, expurgatque valde siccando. Hoc ita siccum nomen accepit, in quo etiam, in me-  
 ditione merito in consistit. *Salis* hanc modum penetrat, incidit, abstrahit, expurgat, val-  
 de siccando omnes ichores & humores abstrahit. Adhuc ita est illam quoque quædam ad-  
 strugit, ut non tamen linguam commutans, quæ carnes, pilos, & alia ille condita, con-  
 stringit, dicitur ac conseruat. Quædam tamen *sal*, aliter minus adstrigit, atque  
 idcirco vix velicis condita conditæ, quam aliter.

*Salis*

*Acerbus* sapor, *Gineu*, *pyre*, *Anabum* interponitur. *Pontica*, linguam valde contrahit,  
 & inæqualiter excando excipit, omnino terram siccandoque. Huius saporis sunt per  
 immensam, vix ac rite, comestendum. *Aulera*, *aspegi*, quem *Asubum* imo præter  
*Seymour* vocant, acerbo firmitate est, sed mitior, minus quoque frigidus ac siccus. Ita in  
*Rice*, *gilla*, & *malicis* sentitur, ac in aliis plantis. Tanta siccitas huius cum acerbo  
 affinitate, ut plerique cum hoc diffinitione in nullam ferant. Vique refrigerant, viscosas,  
 adstringit, & exarantam supericorem condensant est. *Mais* siccitatem non esse ratione au-  
 ter si dicitur. Nam *Aulera* minus siccus, linguam non excipit, *Acerbus* vero siccus,  
 humiditas lingue partem valde excipit. Depressit autem vitænam, cum acerbis quam susti-  
 na, suam qualitate in suam, sicut enim que vocatur, vel acerbam quandam, vel dul-  
 cedinem affert, & hanc emittit adstrugit. *Acerbum* autem, ut dicitur *Galeno*, vitænam  
 excipit, ac inoleositas, ac humefactas, ac vitænamque simul perferens.

*Acerbus*

*Acerbus*

*Acerbus*

Si calorem dicitur, hoc se humiditas, sed molles, sed duram, solum acquirere dulcedi-  
 nem, velum castitatem. Si siccum humiditas, & humiditas quædam sit partem & seque, su-  
 dorem quædam si vero humiditas non siccum partem & aliter, siccitas. Ac si sapor huius  
 cor & caliditas, humiditas quædam a qua in dulcedine in castis vero rursus in pinguis est.

*Acidus*, *aspegi*, gustum firmitate penetrat: cum sensum calorem mordicat ac modum polterantem  
 substantiam idcirco penetrat. in acro & omnes ac dicit manifestum. Refrigerant vitænam  
 acida omnia, & emittant substantiam cor ac facili penetrant. penetrando ac incidendo ac-  
 ribus, medicamentosa, que usque vitænam conditum, hanc si ut rursus in, non tamen dissol-  
 vant ac dissipant, sed siccitatem aliter si hauriam frigoris beneficio repellunt, & siccitate adstru-  
 ctam valde, sicut interponitur colubegit ac si sicut.

*Acidus*

*Dulcis* sapor, *aspegi*, vitænam ac succidum oblectat, nulla qualitate expurgata molesto, habet  
 ut in melle & saccharo evidentissimè. Relaxant autem omnia dulcia, sed minus tamen quæ  
 propaga, aspera leniant, concolunt in promouent nuturam. Materie vero medicamentosa  
 oblectant, & humidam quædam nobis firmantem & affertur accipit quoque collida  
 sunt. Nullum enim coram que valde dulcis siccitatem est: Potest tamen molles dicitur al-  
 quod siccitatem esse, cuius æquas videlicet est substantia. Omnia autem que vitænam  
 committunt dulcedine, quoque est enim vitænam, aut plerique in nos dicit.

*Pinguis* viscositas, *aspegi*, sapor, linguam, atque partem lenire quodam oblectat,  
 & vitænam calorem expurgat, oblectat: dulcedine subinde participat in substantiam consistit autem  
 tenent & crustam medicam, & humidam quædam, non aquas hauriam, sed vitænam, in calore frigido  
 quoque ac dicitur. *Pinguis* saporis effectum non modo ad per & alia quædam, sed  
 & molles, aspera, siccitas magis castitas, & siccitas. *Pinguis* siccitas omnia relaxant, emol-  
 lant, hauriant, & siccitas leniant, oblectant, ac in suam linguam reducant, & molles quam

*Dulcis*

*Dulcis*

*Dulcis*

*Dulcis*

*Dulcis*

ditata, ad quorum tenuissimum gradum perveniunt. *Ames*, id est, qualitas aspera, aspidata, ac (ut natura displicet) coagulata, non tam laposa quam laposiorum primitiva, nulla qualitate gustum afficit: namque in novissima truchibus, ut populeis & cucurberis, utin & in Jure ac Trice generibus. Materia hinc crassa, non tamen scabra, aut sicca adstringens, sed humore quodam perfusa, quae quousque in plastica est, motus omnes resistit ac obstat, evaporata legit, & dissoluta vitit ac congelatur. Sane verò de *Ames* delibutus affinis, sed materia ipsorum paulo crassior & crudior est.

Et tandem quidem simpliciter laposus, ex quibus de stirpe aut alterius medicamenti temperata ac substantia essentia videtur, atque ex his deinde, quibus id succidit ac subinde virtus facultatibus sic pendens, cognoscitur: quòd, ubi viticam tantam qualitatem gustabilem possidet, hinc difficile. Quòd si plures laposus immixtus, ex omnibus nostris medicamentis facultatem & adhaerentiam videt: veluti *Absterthum*, quod prae amaritudine, & adstringentem habet, unde & diversis substantiis ac facultatibus in infans: ab amaritudine emergendi, ab alicui adstringenti ac corroborandi. Sane autem differunt laposus, quod loquor ita inter se confusi, ut nequeant certo medicamenti virtus ac facultatem experire. Atque tunc quidem experientia facit, qua sola etiam, citra laposum dignoscitur, medicamentum cuiuslibet facultas repenti possit. Quam tamen semper adhibere convenit, etiam si gustu aut ratione facultas cognita videatur aut perfecta. Quandoque siquidem, quae ratio probant, experientia redarguit.

*De Characteribus suis signaturò.*

CAP. XI.

**E**X characteribus suis signaturae in stirpibus, aut eorum partibus oblatam contingit, ipsam cognoscit facultatem posse, & probantissimè vocat auctoribus traditam non reperitur: Nonnullorum posterioris aetatis, & nostri seculi rectorum haec aetate, aut vetus commemorata sunt. Quae naturam quodlibet se processum hinc peculiaribus signaturis manifestissime notasse existunt ac docent, per quas vires & facultates, praesertim occurrere & laetantes, certo cognoscuntur: hinc aliter (ut auct) quam ex inspectione vultus & nonnullarum corporum partium quaevisque mores & affectus hominum percipi: Sed Physiognomia ab Aristotele ac aliis veteribus Philosophis probatur: Dodrina verò de signaturis stirpibus, à nullo alicuius aetatis veterum testimonium accipit: deinde tam fluxa & incerta est, ut pro scientia aut doctrina nullatenus habenda videatur.

Signaturae autem vel in forma, figurave stirpis aut alicuius eius partis, reperiuntur vel ex coloribus, aut facie deprehenduntur aut ex aliis proprietatibus accipiuntur.

*Scrofulae* herba nodosae in diversis aetate nobiscum habere: Idcirco ad usum stirpis scrofulae, id est, glandularum dicitur terminari, quae quandoque in colla, alia, aut in gombis immixtae sunt. Graeci *ῥαφίδια*, tam viles & inefficaces affirmantur, veterum vulgaribus solùm (quod verissimum) prodesse queant. Nec solum ad scrofulas, sed ad haemorrhoidum dolores esse commendantur. Et quidem ad usum *ῥαφίδια* & haemorrhoides, si imponantur, bene siccant, quae quilibet de hoc temperamenti, ac dignendi vim habent, non quia nodosae scrofulas referunt. Si enim praesentia conferant, quòd nodosae & inaequales, consequens foret, & alias similes figure similes scrofulas & haemorrhoides mederi: ut sunt *Telyph* nodosus odos quoque ad nos habentes: item & *Polygonum*, quae tuberculi nodosae scrofulas referre possunt. Neutra tamen aetatis herbarum vel ad scrofulas, vel ad haemorrhoides commendatur vel confert.

*Chelidony* menens radicebus veluti oblonga grana adhaerent, istar haemorrhoidum forma positiventum, & efficitur ipsi cum radicebus herba haemorrhoides. An aetatis *Ranunculum* *Hyrcanum* radicebus in terra, haemorrhoidibus quae quae in adhaerere videtur?

Natura in nucleis contigitur lignosa cornea, veluti cerebrum officio cranio: capite omnia nates cerebro similitudine subsistunt, ac essentia prodesse, vixit consequunt. Nates tamen in pyloro cerebro & capiti consistunt, sed nates in glandes aut mellane nullam capiti virtutem praebent, imò non raro offendunt, praecipue dum ventriculam gustant.

In folliculis vesicis referentibus gignitur *Halicacab* fructus, vesicis commoedus, & urinae ceteris. *Aloea* vesicaria, *Solanum* *lomatiferum*, *Cobaea*, *Nux* vesicaria, quorum vel fructus vel semina in folliculis inftar vesicarum gignunt, nihil tale praesent.

Minoris *Hellebori* corne, & semen *Scorpi* idcirco reflectantur ut corporum autem, perhibentur à veteribus remedia esse: adhaerent corporum. *Calendula* semen recurrem est, *Onithopodi* stirpeque eoque eadem corporum referunt. quae autem tan dero hinc affluere velitis corporum quoque adhaerent.

Lucea adhaerit rostrum Regium fieri, et colore similitudine perfractum sibi haberi, qui signaculo additi sunt. Erant quidem quae possant: multa vero etiam quorum meliorum non tunc erat. Ita barbarum quidem luteum est, et regium medium, consensibus motus per alium exurgendo, cum idem verò potest & Agrostorum candidum, qui sit subinde villosus, quantoque videlicet crassus hinc in carum exurgens, macris siliis oblongiorum. Cuius verò & multo sibi varando hinc interium, quae nequaquam latera sunt. Adhaerit verò & istum Chelidonium rarisque luteo rubens villosis, verum non perfractum, sed mentis aperiendo, Comandantur & Canna, Chrysanthemum, & Ruginulatum, quorum lucida flores. Summaque de aliis multis, quorum sicut istum, quantur ad Regium morbi curacionem non expectatur, ut Calendula, Verbalium, Ysoparia, Pentaphyllum, Tomentilla, Lythmachon, Elchrysum, Chrysothema, Agrostum, Albia Arnia Agrostum, floret toto luteo, Santolina, Balsamita, & ipsi Luteum herba, tota lucida. Nervulariam verò laudatius videtur sibi, Ranunculum sibi, cuius flores cum luteo et haeret colore, necno similitudo propinquum: nec Amaranthos luteo, aut circa penam adhaerent, multo verò magis raris Mandragora luteo fructus.

Similis est de rubentis coloris, qui se inter signaciones non potest in loco habere: si periosibus respondentibus perfractum nervulium habuerit, contra rubens calide esse, paupertus quod colore videretur refert ipsa, qui habent apparet: verum hocum etiam videtur Galenus de simp. med. facul. lib. 2. Nostra autem consistuntur quanturque rubentia sunt adhaerens, & sanguis florum videlicetque separatus: nec desunt quidem tales plures ut Rosa rubra, Salustiana, Oxycanthos acida, vulgo Berberis, rubens fructus acris & Coma, Sarcodis rubentes, Sanguis draconis, Bileone & Tamarindus indicis, & plerumque alia hucus colore, quae adhaerendi ac reprimitur sanguis florum si possent. Veneruntque & alia expectantur rubentia rubro fisco producta defertur faculitas. Hypericis, Aleyri, Rutaque hypericoidea sacra, quae sola atris exprimitur, sanguis infert ruber, sanguinem tamen haec herba non supprimitur, sed atris eundem perfractum pellunt. Agrifolij verò, et eius terribiliter Viscum pariter, fructus rubentes, non modo non adhaerent, sed peralium valent deorsum motus.

Euphrasia herba oculis adhaerens prodest, & videndi acris interdit. hucus faciens signaturam in flore reperitur, quae videtur colorem, oculi colorem refert. haud defert: similis coloris vinctus in roboris viola, sibi acris quae plenus pure candida (nulli in flore colore diversis) reperitur, nec tamen ad oculorum interitum quoquam commensura.

Rors Solis herba signaturam ferunt esse humor, qui ipsi mensis, & etiam feris solibus adhaerens competitur: adeo enim tanta humoris haec herba apparet, vinctum sibi faculitissime Solis adhaerens hanc non demittit: unde & humidam quoque homini ingruentem ac narsale conferunt ac sugere posse, videtur quidem, sed non recte. Nam quod non mensis adhaerens & vinctus Sole, non ex ipsius herbae humoris tanta propterea emanat, sed in loco natura, in quo videtur, accendit: immittitur enim possent, cui aqua subest. Cuius autem ex hac aliud vaporis effratatur, non modo hanc exigit herba, sed & ipsi hucus humor adhaerens eodem signaculo in tempore, quo vinctus Ros Solaris, & Mictus irritatus est.

Perfractum hanc & istum in Ros Solis signaturam esse videtur, qui Theophrastum Patricelliam proferentem signaculum, colorem videlicet: hucus per organa, qui Alibi-ica vulgo dicitur, oculum, ipsi ex hucus pallor, cum aliis herbae hucus hucus hucus, aqua coloris refertur: Et coloris quidem hanc ex eo adhaerens affirmit, quod sicut (ut ipsi loquuntur) volatilem liquor esse continent: ac propterea coloris videlicet hucus hucus hucus hucus, ac phibitice in parvis vinctum.

Ranunculus addunt, quod sibi condita distillata conditum quae. Sals hanc motum corpus & carnis conditum, & dicitur videtur, vinctum hucus hucus & melleum vinctum est, sed nunc verò nec phibitice verò vel maxime. Sals autem corpus exitum, & vinctum hucus hucus hucus hucus. Phibitice autem libenter, non refertur, & dicitur autem citras opes habent. hanc & istum ex capite distillationem, pulverem non conditum, sed videtur ac contrarius.

Nec igitur quod vel melle affirmit Sole, hanc sibi perfractum quod sicut (ut Theophrastus videtur) volatilem conditum, ingruentem ac narsale humidam conferunt vel sugere, aut phibitice vinctum hucus est: sed alia causa hoc ei vinctum hucus est, si modo conferunt, quod hanc vinctum. Nunc autem & videtur hucus hucus hucus hucus, quae vel hucus hucus hucus.

confiderant, vel phlegmaticis potius esse queat. Atque haec de similibus de causis quibus dubiam & incertam deinde facultatem sortiamur ex *χαρακτηρισμοῖς*, hoc significationibus aut figuratis, ut appellant, videndum, abunde manifestum. Non delimitantes quia veteres harum etiam rationem habuisse oportuit, atque idcirco Ordo istorum ad veterum exactam adhibendam commendam, quia medicum sibi modo globulum sine testiculorum adhaerent: Mescerantem & Phylon autem, ad masculorum in: feminam, ad feminatam procreantem confiterentes habent, quod haec lex in feminabus: Bonibus eademque approprie videtur.

Et si non haud dubie potuit, ut veterum nonnulli quosdamque signatorum rationem ac confiderationem habuerint, sed praecipue illi, qui Aegyptiorum ac aliorum quosdamque fuerint solliciti, quales in eis dicitur ac magis medicam naturam contra male vel bene Galenismi hanc ob causam dicitur peritum quoque, aut nihil d'esse dandum. Quod si verum & fortuito casu videri quosdamque signationem responderent, non tamen idcirco nulli, ut videri potest ex his, qui pro signatione habentur, facultates cognoscit, aut manifestas sibi consequens est: Saepe enim ob facultates multam differentiam, signaturam recipiunt, ut signetur huius exempla sunt d'haec: ostensum. Atque idcirco quoque signaturam multam fidendum est, nisi experientia adhibeatur, per quam de facultatibus medicamentorum adhaerent certum demonstratur, ut sapienter capere quoque scripturam.

*Qualiter per experientiam medicamentorum simplicium facultates cognoscantur.* CAP. XII.

DE experientia verò si perit ut patet scripturam. Haec autem de omni facultate huius sola & certissima quidem iudicium facit de aliis vero rursus decernit. Thuciam cum sequitur, Alica phlegmaticorum, & Cathartica vasa sicut per scripturam ut, per solam experientiam cognoscit est. Experientia autem dicitur, non quod frequenter eodem modo visum est, compendioso atque memorato. Sicut, Notio quae ex crebra similitudine eorum adhaerentibus habetur. Non dicitur quod si meli d'haerent, sed quod frequenter ac similitudine, eadem remanent eorum concitior, sepe etiam est, experientiam igitur. Ut etiam ex multis experimentis non constat, & Thuciam comparantur: ut singula experientia, ea multo obliuiscuntur constant. Illud autem de quo experientiam faciendum simpliciter esse debere, non inquam, Galenodocet & in in periculum faciendum, quia vasa pota sunt: si vasa, aut in aqua, quod facit, quibus Thuciam sicut phlegmaticorum dicitur morbis. Aliorum si quidem adhaerent, vasa absumunt ut neque poterit facit: ita ostenditur, ut cognoscit perit. Vbi autem affluunt copiosius vasa arguuntur, ac male habent, cui male medicamentorum proficere videtur, difficile est.

Item de hoc quod medicamentorum, cuius periculum faciendum, & quod experientia examinanda, omnia altera quibus experiri necesse est: Aliena si quidem imbutum, non ita facile vasa sua vasa coram: veluti enim (exempti generis) si Mandragora, Hyscyamus, aut Cicuta vasa vasa vasa facta corpora adhaerent, ipsam non refrigerant, sed excalfacere ac propius vasa vasa vasa, quae alioque refrigerant & respiciunt.

Diligendum verò est & illud, quod ex accidente, ab eo quod perit ac per se efficitur. Nam aqua, quae vasa sua refrigerans est, non inquam calorem reuocando, ipsam intendit: Si enim in medio est vasa vasa vasa bene carnis ex d'haerent non inquam male habent, multa aqua frigida perfundatur, calore reuocato nascitur, sanam consequitur, ut Hipp. Aph. xxi. lib. v. restat. Verum hoc signum non sua vasa aqua, sed ex accidente tantummodo, vasa vasa vasa reuocando & intendendo.

Simili modo de caliditate vasa vasa quoque refrigerant, excalfacere vasa vasa vasa d'haerent digerendo, quo resoluta, corpus refrigeratum, est sanam, atque consequuntur, quae Hipp. Aph. xvi. eisdem lib. restat. Et haec quidem de vasa, quae experientia vasa vasa vasa medicamentorum in quibus vasa vasa vasa. Quod si vasa vasa vasa adhaerent, vasa vasa vasa vasa habenda. Nam sic ut experientia de ratione in vasa vasa vasa d'haerent: ita experientia de constitutione ratione non vasa vasa vasa vasa ac signaturam stabilitatem accipit: si modo accedere queat. Sed sepe tale est facultas, ut ratione experientia non adhaerent veluti substantia: efficiantur consequentes, quae solo experimento (ut prius dicitur) cognoscuntur, nec rationem adhaerent.

*De facultatibus alimentorum.* CAP. XIII.

POSTEA QUAM de facultatibus medicamentorum egimus, constitutum est alimentorum vasa vasa vasa, ut videlicet vasa vasa vasa vasa vasa vasa, ex quod d'haerent.



*Concocta  
diffusa*

Concocta diſſoluenda erant, quibus dura ſolidaque eſt ſubſtantia, & omnia que craſſi ſunt ſucci, ut panis, apri, beſſica, palmaria, gylmela, caltharis, ſolea, arca, manna, canna, canet, beuſ, peracoma, aliorum ſimilia, quadrupedia, nam & omnia que acide conſtituantur: omnia ſole condita, vento aut ſano deſicant. Cochlea, canem, pagum, locuste, ſquille, ac teſtacea omnia: vana acrida, aut acida. Haec ſi in ventriculo inſiderant, ſolidam eſſe quaſi carnes, quia ſi in mediocrem: in debili ac frigido concoctamentum, aut tande aduſum adhibentur.

Expeſtorem autem facultatem, de quibus iam ſuperius, per eorum in aqua ſimplici decoctionem ſibi poſſe apparere. Nam quorum decoctionem ſuavis, ſi acris ſunt, bene odoris & palato gratum eſt, omnia bona ſunt facia: Eorum vero que in grauiſſima ſi poſita aut ſuauiter aut committantur, mali ſunt ſucci, veluti omnia in puluere ſolentur. Sic & quorum res refrigerantem erant, & ſoliditatem in ſe glomere, ſuo (ut vulgo) colorem, conuertit craſſi ſunt facia, & ſi bene concoquantur copioſam præbere alimentum: & conuertit quorum in ſe res permanent, teſte & in poſum alimentum conferunt.

Quæ nam in aqua diſſoluantur ac tande percoquantur, apri in ventriculo aduſantur: & vitæ verba, que ſacilem in decoquendo mutationem ſi beant, cito quoque ac citra negotium in ventriculo a ſe ortantur frigido conſiſcuntur.

Ceterum præter hæc facultates, que præcipue in alimentum tam manens conſiderantur, præſtat & alie quædam hæc negligenda: Sequidem ſaraleſta quædam ſunt: alia manentia. Tande deſicant non niſi, cito ſita.

*Ratio di-  
gnitas*

Floras in terra gerunt, ac ſaraleſta ſunt, que multam continent humilitatem ſimpliciter non percoctam, ut ſunt ſimilia omnia bona præſertim ſi cruda edantur: ex legaminibus Cicuta, Lupini, Oculi in terra quecumque dulcia ſunt & aſpera, que cum cibo diſtribui nequeant, in ventriculo diuina hærentia, ſaraleſta inducunt, ut marſum, cornu pondant deſicant, & alia plura.

*Expeſt-  
facies*

Expeſtorem autem ſaraleſta ſunt cibi præbi ad ignem cocta, non ex oleis, aut legaminibus, ſed ex caribus autem manentem, vel etiam quadamque que bona ſunt facia poſita ex opimo grano fermentant, & percoctas: vnam generoſam in manentem, ac vitæ poſita quæ poſitam.

*Quæ  
manent*

Caro marſum ac per aliam deſicantur, que humilitate abundans, non acriditas, ſed ſiſſigine, aut aliquid acrimonia præcipue, vel etiam inſipida, ut Mela, Amygdæ, Mela, Calendula, & plura alia ſimilia.

Facile etiam deſicantur, que in ventre copioſam excrementum colligi faciunt, ut ſunt panes feruſſones, & quecumque multam ſuſtineant aduſionem habent.

Tande ut quoque odorem omnia ſaraleſta, præſertim poſitam carnam, & palmaria, vel etiam capocoma, aliorumque hæc diſſoluantur inſipida, que lentorem inſipida habentem obtinent.

*Quæ  
facies*

Hærent omnia in ventre & tande deſicant exiguam humiditatem habentia, ut ſunt colubia ſicca, carnes aſæ, aut ſicca, panis panis ſigine à ſuſſibus ſeparata, vna de quibus, etiam ex aqua, adſurgendi vniſi: ut pyra, ſolea, vnam negram aut rubram manentem dicitur, ſed citius auſerent. Et de alimentis hæc ſunt.

LIBRI PRIMI PENTADIS PRIMA  
FINIS.

STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS PRIMÆ

LIBER SECVNDVS.

PRÆFATIO.



**A**BSOLVTIS in que in stirpiam histeriam profecto videbatur, ad singulorum histeriam conuertimus. Et antem in certis classis ha distinguerentur, si nobis laboratum esse sapereque profassione ostendimus. cum autem pro vate et non succederet, necesse habuimus inuicem causa classis, et elementorum quidem ordines describere, quia in hanc priorem et in postremum digestimus.

Voluit enim elementa conuicem prius sunt, sic stirpes elementorum ordines digestis reliquis precedant, vel maxime dicat, quod tamen etia postterum est, ut conueniret et affinis ab inuicem hanc quoque hanc distulsa. Nam enim affinitate vel similitudine tribuendum ducimus, quoniam ordinis ab elementis petito.

Sunt autem hanc Pemptade stirpes non Græcorum, sed Latinorum elementorum ordine descripta. Fulgore vero et ut plurimum nomenclatura approbandum. Metonymia enim stirpes vulgo cognita nominibus describere, quoniam veteres appellatiuam esse consuevit scribere.

DE ABROTONO.  
CAPVT PRIMVM.

Abrotonum fructu cæcæstrum.

Abrotonum rari.



**A**BROTONVM, Dicitur inquit, dicitur est generum: fructu, et rari, que Martius & Minors appellatione passim cognita sunt. Præter hæc verò & Tertium est, reliquis ordinibus ac stirpibus.

Martius Abrotonum fructu non solum in modum cultura accedente, adolefit, sed hominis salutariem tunc amolitur, & casibus profertur postea crassitudine, aut amplexibus: carnositas

verò ex his complurimos, folia circumcrescentes multipliciter ac tenuiter ac dīs, subalbican-  
tibus, cum paritate quadam odoratis, pro floribus corymbis à medio ad insignem usque &  
vulgis dependent, colore luteo, tandem in filices abeunt, radix fibrosa est.

4. *Minor Abrotanum hirsute est, virgulis tenuibus, lignosis tamen affertis. Folia magis  
quàm superiora tendi, minus involuunt, corymbos in Belgis non profert radix fibrinulata  
coheret.*

5. *Abrotanum odoratum hirsuta.*



1.

Tertium genus hirsutum caere est. Folia hanc  
in partem Abrotanum similitudine deficiat, sed minus  
caerulea, & odoratis, quae Sarcostemum vocantur.  
Hanc genus firmius et modum torcendum est, co-  
proli est corymbis ad fontem usque laqueo  
splendent colore, radix ut abrotanum.

Loca, inquit Therophrasti, apria atque Dio-  
scorides in Cappadocia, & Asia Galata, atque in  
Syria Hieropoli pygmaeferi. Apud Germanos ac  
Belgas in hanc tenuis. Scythiam & Galatiam à  
Plinio commendat.

Augusto mensis Abrotanum vigent corymbis, ac  
fibris Septembris.

*Ægyptio* Graeci appellant: Latini & Officinae  
nomen tenent: Itali *abrotano*, ac Hispanorum  
nonnulli vultu *yoza* habentibus Germani *Stille  
kraut*, *Sarcostemum*, *Barbagio*, *Chelidonium*, *Asiaticum*  
*Belgia*, *Barome*, & *Harmia*: Galli *arbut*, & *A-  
broute*. Angli *Betterroot*, *Behem*, *Stout*, *En-  
tate* hanc apud Dioscorides & aliosque scriptu-  
m, ut & *Silene*, *Agrostis*, *Agrostis*, *Stachys*,  
*Stachys*, *Agrostis*, *Agrostis*, *Agrostis*,  
& *Abrotanum* Ponticum, quorum nonnulli Ab-  
rotanum femine propriam, ut Thelyphotonem, ac  
Thelyphotonem.

Minor genus Dioscoridi femina Plinio Mon-  
strum. Abrotanum, inquit lib. 12. cap. 1. cum  
trahitur generum: Campesire & Monstrum, hoc  
femina, aliud marem intelligi volumus.

Sunt tamen nonnulli in ea sententia, ut Sarcos-  
tium Abrotanum femineam esse velint, occasionem ex eo accipiunt, quod in hunc vulga-  
rem indur corymbosum hunc profert flores. Sed si Dioscorides verba in digestione in-  
spediant, in hunc sententiam nonquam veniunt: Dioscorides siquidem mactos in unq. Ab-  
rotano foliatis circa ramos esse ait, qui (sicut folia) in *alga*, id est, parte superioris  
corymbis similitudinem habeant, & in colore laevi. Sententia autem in singulis virgulis  
vixit tantum hinc aliam gignit. Verba Dioscoridi haec sunt: *est in abrotano virgulis abrotanum,  
in alga hinc ramositate gignit. Et in hoc quidem, ac tales, Abrotanum minus, tum &  
Tertium odoratum, flores gignit. Vtrumque videtur Abrotanum femineam.*

6. *Minor Abrotanum Mureli, & Plinio Campesire dicitur.*

7. Tertium, ut diximus, & firmius quoque est, Odoratum vulgo in eo appellant, quod ceteris  
solo reperitur. Dioscorides Scythiam egyptiorum videtur. Ceterum Abrotanum in calidam  
& ficum ordine tertio sita in unq. digerendi quoque ac nasciendi via laevi.

Abrotanum coma, flores, aut femina decodi, aut creta trita cum aqua & potu, non nisi velle  
ceruae spumae in usum tantum, idcirco dicitur, vnaq. difficilis, & meritis suppositis auulsiat  
lumbricos interimit ac pellic: Cum vino exsialium venereorum antidotum est, aduersus  
serpionem quoque ac phalangorum morsu prodest, uteritur autem venterculo.

Cum oleo in unq. ut permixtum, nigores per circuitum recurrentes tollit, compositum mi-  
scent, si ante maiorem evocaverit. Cum senna hederacearum & in positum phy-  
saria dicitur. Oculorum inflammationibus cum collo cotoneo malo, aut pane an-  
pitem subuenit. Vbi Abrotanum cum oleo tenuis parum, ut Cicuto, Raphanum, Sp-  
ecio, alopeciam curat, & barbam sepius emollientem dicit.

Serpentes, locis in hunc, & hinc abigit. Ramo eius, si subiacet pulvino, Ven-  
erum fibrulam trahit Plinio.



DE ABSINTHIIS, AC PRIMVM DE  
LATIOLEIS. CAP. II.

**A**BSINTHIUM plura occurrunt genera, Vna in  
latere folij, quod caetera perfusa omnia duo in-  
venies sunt folij, ut supra scripta. Duo, una Absin-  
thy vocantur genera Ponticum, Scythicum, ac San-  
toricum, quae ad superora genera referenda videntur.

Latiosum Absinthium caule effertur ramoso,  
caulis aliove folia procreat ampla, rursus lophatis li-  
theribus laciniata, multia, & vixit canescens, in-  
feriore parte caudicem filiculis parvis, serotini ca-  
licules superora conactas ut, 04000 foliata, in  
cogna Emma italiana abest. rufis folijs da-  
ca, lignosa, in diuersa tendens, resiliata & in plures  
annos succulenta.

Atque Latiosum Absinthium sicca, moneta,  
& uiculis loca: procreat non mediocriter appretio.  
Vixit & ceteris regionibus vulgare. Præstantis,  
inquit Dioscorides, in Ponto, Cappadocia, & in  
Tauris monte nascitur. Plinius Ponticum Itali-  
co amari esse ait. Valde amarum Absinthium Pon-  
ticum esse & his verbis Ovidius ostendit.

*Turpis de ferreo pignus Absinthii campis,*

*Terræ, de fructu quoniam sit amara dicit.*

Natura vero in Ponto repositum & Latiosum ne-  
scire finale, ac in vna Confluenti in polo medicamentu  
male esse. Bellonius in primo singularium florum  
libro, cap. 75. refert.

Reperitur & in quibusdam frigidis Helueticis  
montibus, quod pro tali rigore non auellitur, sed  
per terram laepe, vnde supra iam à nobis illustratum.

Itaque ac Angusto Italij seminaque perficiuntur, colligunt ac in vnum repositum vnde absin-  
thium vocatur potest. Graeci ἀψίνθη appellant. Consecrati contra hanc etiam *ειρώδες*, (E-  
ne ut plures *ειρώδες*) quod non potabile, quod propter aliquam eius amari tudine in potio-  
nibus non videtur admittendam. Dicitur & *Βελόνιον* (ut alij legunt) *Βελόνιον* Ab  
Apuleio Absinthium Rallicum: Nos Latiosum cognominamus ad alicuius differentiam.

Arabum in reperiuntur populi, quod vnde hoc Ponticum Dioscoridi, Romanum cognomi-  
nantur, & post hoc possessionis etiam Medici barbaram sectantes medicinam. Itaque Absin-  
thium *αψίνθη* nominant, Hispani *amara*, *αψίνθη*, pluresque *Διαση*. Lyctici *αψίνθη*.  
Germani *Thronanth* vocant: Galli *absinthe*. Belgae *absinthe* Barum, sive Angli, Germani tempore  
uicinis Bohemae *Penther*. Facilius autem ac temperie calidum ac siccatum est Absin-  
thium, & calidum quidem siccatum odore, siccatum vero odore terrore. Ariditate est & expur-  
gans, & vna quoque potentia stringendi vim obtinet.

Vtilissimum ob idem debili ventriculo, quod hinc manifestat, nam ut amari tudine sua hanc ex-  
purget, & per amari tudinem egrediens capilla, penitus vnam causa est, stringendi vnde sua pe-  
tentia vnam calidum subesse, ac confirmat. Sed ad concoctam in ventriculo primum nihil  
(sicut Galenus) vixit.

Crapulam aliam purgatiorem acriorem & fistulosa distendere. Duo, alij, vixit verò non ma-  
diu acrisimam, sed & à crapula ac largiori potatione veniensiam ac dissolutam male  
habentem locis vixit.

Aduersus diuturnas & protergas febres, praesertim autumnae, magno superis meris profi-  
dio est, neque enim ventriculo tantummodo confirmat, aut vixit appetentiam emendat, sed  
& vixit vixit vixit, ac ipsam ab obstruendis expedit, vixit hanc meris per ven-  
nam expurgans.

Conferit deinde Absinthium plurimum etiam his, quibus hanc sanguinem profusam vo-  
cant. Quod quidem acrisimam hanc sanguinem crasso distillatam, ac nigredine hanc ipsam ex-  
cessum. Tunc autem magno in partem sanguinem plenum vomitu caetero, nonnulli vixit verò  
& cum excrementis puriorum per infensam ventrem nigram & corruptam defendere  
contingit.

Absinthium Latiosum.



*Stipula  
ventriculi*



Thracia, australis Orissiam versus regionibus reperitur, sed vix in Alpibus Gallis, si-  
des Dioscoricis. Sunt tamen quae velint non vltra Italiam Alpes, sed in Galatia Asiae  
casia & in Sardiniam regione quae de in Asia minor, vnde illi *Serpis* Graeci nomen,  
quod in Sarmaticam commutatum, transcribendum esse. Retinetur Dioscoricam  
Sardonia vocem, Galata vero Sarmaticas quo ad posteritatem, ut videtur, peruenit.

Facile autem Ternatolam istam Abinthiam calidam quidem esse siccum, amari-  
radus quoque, sed multo remota, quam Latifoliam, percipi, utrandam autem vix  
eo sperat.

De *Serpis*, seu *Marias abinthis*.

C. A. P. III.

Abinthium *Serpis*.

Abinthium *Aegyptium*.



**SERPIFOLIUM** Abinthium tenax, ac multiplex foliorum foliose Ternatolae huius,  
quoquam ceteris in terris & montibus partibus complures similes disticta sunt folio-  
la, molle, vix & candida, caerulea in multis caulis dividitur, neca quos folioli & fo-  
mura vix abierunt, sed: dura & lignosa.

Amur aegyptus, vna locis, quibus huius procul à mari loca, frequens Hollandiae, Zelandiae,  
Flavrigi hincibus, ac vicinis locis: Repente & in Gallia, Italia, aliisque regionibus maritimis,  
sed non raro dicitur, quandoque & colore differens. Quod etiam circa litores eius maris me-  
diterranei in plerisque Europae provincis, vixit in Narbonensi Gallia quae videntur esse, ac mi-  
nor caerulea Caledonia vero ac in quibus grassat ad Occidentem mare, in Africa & Aegy-  
ptio odore etiam potiori nec aliquali odore ad me Magnificus vix Iacobus Antonius Cortius  
Petrus Paracelsus ait.

Tempore florendi, seminatque perficendi cum praesibus conuenit.

Nomen à Graeco *serpis* & *abinthis* dicitur habet, Latine *Serpisium*, & abinthium  
maritimum appellant, vulgo *Ser asine*. Angh *Ser asinense*. Dicitur & à montibus Sarmati-  
cum, ut Dioscoricis. Sed & aliud nomen Sarmaticum à *Serpis* differens.

Efficitur *Serpisium*, seu manna abinthium calidum quoque & ac siccum natura. Sto-  
macho, in Pluribus, inuenitur. Dioscorides per se, vel cum omnia decodum, ut, & cum melle  
simpliciter, acrius, & rorantes iambros necesse sit utrum illud leuiter subducere: Quod  
& Plinius affirmat, Alium, inquit, melle, pellitur amulsi ante tuncorum.

De *Estrois & Spicis Abſinthii.* CAP. V.

Abſinthii madonum, &amp; inſipidi.

Abſinthii ſpiriſſimum.



Abſinthij in gallicis meritas folia ſiſſa.



**SPYRISſIMUM** abſinthivum, quæ non abſee *Estrois* appellari poſſunt, aliquot ſepereſant genera.

Herba alba ab *Heluctis* appellata, vel prima occurrens, tota hęc mollis, vel unctuoſa, ac que aliſida eſt, & ſcriptis ſiue *Martini* abſinthio affirmata, ſed citiſſime odore & ſapore que ſua relinquit ſed tamen aliquantulum ſuavior, ad *Cephali* odorem accedit.

In *Valis* prope *Sedunum* in collibus naſci aprica, *Geſnerus* *Kircher*, ac *Auranneo* dicitur, & ſub *Alſatia* ſua florere.

Proximè un generis ſiſſis, cuiuslibet, floſodij, vulgare *Lanfolium* vocatur, ſed odore ac ſi poſe deſtituitur, unde & *Inſipidum* appellatur. Quibus locis, aut qua in regione huiusmodi naſcitur, neminem cognoviſſimus, in ſtudiorum hoſtium nobis reperitur.

Tertium ex *Lamandula* & *Abſinthio* mixtelanæ quod i ſerpe apparet. Cuiuslibet ex complures, unæque, & lignoſi in multas alas ſperguntur circa queſtoſi *Abſinthij*, ac *Antennaria* ſimilis folia oblonga, incana, vel ſub *Lamandula*, ſubinde tamen in partes quoddam ſiſſa odore ætatem hæc ſerpe hanc ingreſſo, *Lamandulam* tenentur referri.

In maritima ſerret, præſertim *Adriaci* ſiſſa,

mus, sponte nasci, in horto facile comprehendit, & modesteque hinciens fert.

Spiram autem hanc fieri nec legitimo Abſinthio.

Primum Conradus Gesnerus Serpſum ferream nominavit, & vulgè Herbam Albam dicitur, alius Santonicum appellare videtur. Nam, ut Dioscorides, Santonicum in Galia vixit Alpes reperitur, & in regione, in qua nascitur, romè vocatur. Helvetiorum autem ager Romanus est vixit Alpes, ad Gallias pertinet, sed longè ab his abſinthium proremit, Hinc enim Aquitania pars est, sive ad Oceanum maritimum, infra Garumnam flumen, vixit Septentrionalis Santonicum dicitur Abſinthium, à Santonicibus nomen habet, procul ab Alpibus nascitur: Quod si verò in Alpes, à Santonicibus nomen non accepit.

Alteram Inodorum, Inopidam ac Focum abſinthium teste appellatur.

Tertiam Angustifolium abſinthium dicitur à plebej tamen Laxidula flore Abſinthij abſinthium inſeritur. Inſeritur tamen Abſinthium, quare Azernafie (in ipsa scilicet) inſeritur. A vno vocatur, qui Santonicum esse censent, idem vero est, quia Serpſum esse existimant.

Facit hanc Herbe quidam Alba coloris & siccatum eius sicuti exiguè participat.

Alteram Abſinthiam, ut sapore ac odore differunt, in vix vixit quidam calidè, multò minus expurgatis facultatibus aliquid possidet. Si in modè candidam, ac talis aliquid (si alibi occurrerit) pro legitimo colligatur. Odor perpetuò conservandus, neque vixit sapor.

Angustifolium abſinthium calidum ac siccatum est, sed tamen haud in modè, multò enim minus, quàm vel Abſinthium, vel Laxidula.

De Sermentina. CAP. VI.

Sermentina.



AD Abſinthij genus coniungit & inſerit, vulgè Sermentinam dicitur, non tamen primum citibus corruptandam, sed vel vixit Spina abſinthia, vel alio referendam. Cuius hanc allargit, nec in multum alia ac ramos distribuit, circa quos folia montana, populosa vero firmata, exiguè quidem in illis, sed admodò frequentia, ut illos cum ramis vixit inſerit. Semina circa tangit apponit.

Peregrina est serps, ferri in calidam regionem horti situm, non inſeritur proremit.

Galli Serbitur appellant: Italis Sermentina, Sermen, passim Sermen Serbitum, & Sermen cetera Lumbicis appellatur, à quibusdam sermen Zedaira.

Amarum attem admodum hoc sermen est, calidum & siccatum de castis facultate. Adiacetis vixit lumbicos, & interiacetam vermes quocumque modo suscipiant vixit. Vixit vero & farrum, à Rhubarbari vixit in addit: ita enim non modò vermes interfacientur, sed & per aliam modum expelluntur, quod fieri etiam expedat.

De Agrimonis sive Eupatoris.

CAP. VII.

FOLIA Agrimonis profert oblonga, in plerumque veris, passim densa, quarum singularem Cantibus parvis, alia quodammodo inſerit, sed lanosa, molliora, rariorque sunt in colore vixit, hinc, & inſerit in marginibus cretina. Caulis tenuis, molli, cubito altus, densa folia, subrigens, & ipse pilosus, à cuius medio sursum versus folia exant parva, lanosa, deinde sermen folio lanosa, que deorsum inſeritur, & prope vixit inſerit in lanosa ac pelliceo vixit inſerit. Radix oblonga, molliora, vixit inſerit, subrigens.

Locis parvis inſerit vixit, septem in partem in, ac amorem, ac quicquid, in plerumque lanosa molli, ac lanosa sermen deinde in multum vixit inſerit.

Gravis est Agrimonis, Latine quoque Eupatorium. Plinio Eupatorium. Inter nothos appellatur: inſerit, ac inſerit etiam appellatur operitur. Et tamen Scythia Eupatorium Apulicis,

*Agrimoniae Eupatoriæ.*



lino, ipsam nempe Martiobornæ: Alia non Hepatorum Officina, vulgare videlicet vici, quod & Hepatorum ad alteram appellatur. Officina Hepatorum Agrimoniae nominantur: à nonnullis Ferrara minor die esse, ab aliis Concordia, aut Martiobella: In venetis versioe Conbuli de simplicibus lib. ita. Agrimonia: Lappa interea nominatur, & Lappa quædam interea, quod Germani lappell sicut aperta deorsum dependens: hinc quoque Agrimonia: Hispani Agrimonia: Germani *Äbermorg*, *Zwäffherig*, Belgæ, Gallia, & Angli, *Agimonia*, Bohemæ *Starrf*. Desertæ autem Agrimonia ab *Agrestes*.

Eupatorium autem ab *Eupatoris* invenitur nomen, & *Rogum*, inquit *Planus*, sectionem habet. Cuius autem in modicum caliditatem, ad stringendâ mediocrem vim Agrimonia obtinet, & viâ temperata siccat. Galenus Eupatorium recensum esse partem refert, & incidendâ expurgandâque faciat: præterea, quædam & sectionis obstruendâ expurgat, & simul visum ab hac adstringendâ sua faciat addere. Dicoctam foliorum Hepatorum, & napin raris sanguinâ murgombâ scotum. Semen, Placis auctore, dyentericis in vino potum auxiliatum adit Diacordis, acriterosis, & à *Dependens* compositis.

Contata folia ac tunc venetis felle adipe impolita, venterbus difficilius exitum contrahentibus, præcedunt: Diacorde quoque auctore,

*Brugariæ seu Adulariæ Hepatoris.*

CAP. VIII.

Vulgare Hepatorum.



VULGARE Hepatorum recensibus ac subterribus casibus ad duos cubitos, vel altius ascendunt assurgit: folia hæc coracanthar oblonga, venentibus, per marginem serrata, quæm sepe sine ab uno dependens pedicula, insar carnalium, sed tamen mediocriter: fructus exiguus, non flos, datur in botris, in molibus rotunda vim bella, & quædam in alarum sagittas apparere tandem in pappo eorum: Rada subest fibrosa, mediocriter magnitudine.

Cæca ferobium, curiosem, ac stagnantem aquam murgens, fluxionem ripas, aliis vligiosis locis, subinde & in veteribus ac humentibus montis nascitur: Atque aqua & vitra aqua loca, non tamen agrimonia possidet.

Proxima hinc videtur, quæ Hepatorum aqua in notione, inter eas que aqua sunt gaudet de-feruntur.

Inho & Augusto florere ac viget, radex resistit, sed caules foliaque hyeme succident.

Vulgæ Hepatorum, nonnulli etiam Eupatorium: Leonhartus Fuchius Eupatorium ad alteram nominat: Plurique Carnabiam, à similitudine foliorum Carnabium: Existimatur & eam quam *Bopestis Sardis* Terzolam vocant Germanis est *Saniquant* frons, i. *Sardis* *Kunigunda* herba, & *Wasserhoff*, Belgæ *Wolfskraut*.

Hepa-

Hepaticam autem ab ea, quæ hepatis sine acie non proficit, facultate nomen accepit: ad Equisetum minime recte referri non potest.

Amara autem hæc herbe & folia & radix, calida & sicca ordine secundo. Vires obtinent expurgantem, & aper-tivam, crassos humores attenuant, & per venas expellunt, languentem puritatem restitunt. Datur valens decoctum hanc herbe, aut aliquamvis cum foetideæ tuberæ radice, tum & aa, quibus vel leni, vel acuti obitu usum aut tantumdem utralique etiam visceris infusibus expedit, tum & fellis. Preside & astringit, præsertim post purgationem, visus & diarrhoeas: ac prodiatibus remanentibus febres citò curat ac tollit, aduerso quartanarum proficit.

Siccis herbe ac foliorum eadem potest, quæ & ventris turbatos affluens potenter reorat. Fugantur venenose feræ ac strigilata aëre herbe suffita. Ceraso telis vulneratos, pulvis hanc herbe pro albedine facit, quidam affirmant.

De *Alfina*.

CAP. IX.

*Alfina pinn.*



*Alfina minor.*



**INTELL.** *Alfina* vna minor ac procerior est: color marcescit, & humida farit & quas spicas, non ab se necernantur licet.

**Minor** *Alfina* cubitalibus, foliis de etiam abscissis affurgit: calicula à radice compluribus, acerbis, creberris, gemiculis: folia è singulis articulis bina, di gemis ombra, longioribus quàm Parietaria: quibus sine forma respondere, sed lamina, pila, laminaque concava, dicitur sicut vitæ. Caliculi aliquo modo transverse apparent, ac circa gemula distate admodum quandoque subrotunda, veluti Parietaria. Strobili in aliam formam candidula, veluti gemmis Leucanthemi, sed tamen maiores, oblonga succederentibus haud anagisa capitulis, in quibus semen. Radix ex tenuibus capillamentis consistit.

**Alfina** *Alfina* humi ut puerum procerior, procumbit, gemulis: cras tenues, ac gemicula, à quibus ramuli, folia veluti pinnæ, sed in caulis multò, veluti & rosa est herba, quæ ad pinnas magnitudinem pullare non accedit, semper paribus minor: strobili similes albidis, capitula veluti pinnæ. Radix penide fibrosa.

Alise marina.



Alise marina.



3. Terna similitudine, sed longe minor, colore et structura sicut, foliis admodum minutis, foliis erigis, radice tenuissima.
4. Quarta vero & quaedam est, sed maxima, hanc secundam referret, nisi caulis crassior, lresiores, coloris generatim, folia similia crassiora capsula non in rotunditate oblonga, sed lanceolata, in quibus terrena tota, quiescunt.
1. Prima Alise inter vepres, in dardanis, sub rubis, locis opacis & silvosis, prope fontes vel defluentes aquas erit.
2. Secunda & Terna lucis, & humida etiam amant, sed tamen in hortis inter olea, ac in vallis exaltantur.

Quoniam fructu fuerit sibi, quoniam in montibus sequere.

Vixit Alise etiam hiberna, vixit florant, ac semina perficiunt.

Alisem Greci ab Asia quoque appellant: Dicitur vero & inde dicitur, in Asia autem, est tamen & Asia Mura autem, à Dardanis de singulis loco: Dicitur tamen hanc nostram, & Galieno quidem qui de vniuersis floribus sic scribit. Distinguit & Plinius inter Alisem & Myosotidem. Paulus autem Aegius Alisem à Myosotide non putat differre, et in liam M. vbi de Myosotide, apparet Nomenque vero & Alise ipsam quibusdam vocibus, Myosotides, & Myosotidem.

1. Primum plerique Hippocrati maritima appellant, incognita tamen multa est, ac etiam (quod admiratur) diligentibus de stirpem maxima scriptoribus.
  2. Secundam & Tertiam Medicam galienus vulgò vocitant, plerique Hippocrati maritima Rallius ab Italia Passerius dicit referri, Galieno vero de *Nouis*, vnde Belgis *Alise*, Germanis *Dünserb*, Anglis *Cheritense*.
  4. Quartam Alisem Maritima appellandam natas sequuntur. Est autem Alise singula quidam & humida, ac aquae effluens, quae & cito ad frigiditatem refrigerans, ut Galienus. Oculorum influmationibus cum potentia, ac fluxu Diacordide, impetrat. Succo aurum dolentibus, (ex causa videlicet calida) infundunt.
- Mare, autem, uti caetera mellea, cum etiam saluberrima, recitantur.



De Spuris Alfiis. CAP. X.

Alfiis quæ prope, sive Morfus Gallie

Alfiis quæ alba.



**D**IFFERENTIA supponitur Spuris Alfiis, quòd plerumque si sitate apparet: foliorum  
 eorum forma, ac si scilicet color quorundam non responderet.

Prima horum tenuibus caulis herbis, veluti minores Alfiis, procumbens: foliola la-  
 teuscula: incisas sive duas habens: folioli è cartilagineo purpureo. Radix tenuis, longa, ad-  
 maris fibris capillatur.

Alterius folia oblongioris forme, ambam ferrata sive: folioli similiter cartilaginea: valen-  
 te plene, quales Veronice, Radix similiter fibrosa.

Tertia ex minoribus Alfiis proceram quædam è referret, nisi tota herbata, ac è virgæ amplius  
 nigrescat. Caulis è folia sunt minores Alfiis: folioli quoque albedi, capitula cum termi-  
 nibus respondens, nec radices fibrosæ delicatas.

Hæc caulis, folia, folioli candida, capitula sive simili est Quarta, sed effragens, haud  
 procumbens, candidior è licet non quodam ac glutinoso veluti succo aut rore occupata, tan-  
 gentem maris insistentem.

Reperitur passim, etiam in agris è messis segete sequens tamen non usque adeò frequens  
 occurrit.

Vigens ac vivens quo tempore alia Alfiis.

Præter è aliam, plerumque Morfus Gallie quoque appellant Germanici *Alfiis*,  
 Gallicè *Morsfolia*.

Tertiam nonnullis *Alfiis* dicit, è Auricula maris appellatur: non est tamen legitima Dios-  
 coridi dicit. Describitur Boerhaavio, è radice digitata crassiuscula (è legumina lesica.) Possit  
 idcirco non modò pro Spuris Alfiis, sed è pro nota Auricula maris haberi, veluti è  
 quarta è terra caput, in diametris, differens.

Videntur autem hæc singula quoque, ac hæc, ac alia Alfiis potius ac videtur affi-  
 milia.

Angulis mar.



Angulis terr.



**ANACALLIS** Alines tractus domum refert, vas præferam, quæ inter minores præ-  
cipue Carthæi anni quadragesimo non amplius, sed per terram ipsi sacre, pauca  
parvisque folia, non toto ambitu rotunda, si perna parte vident, æstiva vesp' exiguas ingu-  
cantibus pediculis rotantes: Flores in rotulis pediculis utraque folia, aut exsertit, aut phre-  
næco colore rubentes. fructus rotundas infus firmas Corandi, in quo linteæ stant-  
iam: Radix tenuibus fibris consist.

In Asia, vna Europa, & in hortis, ac vineis non raro prodit.

Tota astate per firmam tamen Angulis mar. in florum facit.

Angulis Græci, sicut dicitur de Angulis rotulis, Pisanis antheris, Cochlearis. Marcellus  
vna corporis Macram appellat, quæ vox & inter præcipua quod Diodescori: Germani Oenop-  
hyon, Belgæ Oenophyon, Angli Oenophyon.

Quæ phrenæca est flos, nam habetur, eisdem Phrenæcon & Cochlearis domum. Ex hac  
partem compositis Diaconthos aduersus articulares morbos, de qua Petrus Egnerus lib-  
ris. Appellatur verò & hoc ipse, ut inter nothas appellationes in hinc, Africa, ægypti, summis.

Abas, candidi Romi, summa vocatur, quæ & Zethiana, & Nycteria nominibus spatis  
dicitur reperitur.

Habet a vna versaque Angulis deficiendi vim circa morbos utem, necnon quoque ca-  
lens, & quando modicè facultatem adebit & infus corporum exhalat, auctor Galenus.

Dioc. vnaque maripande van habere, inflammatores sacre, adules corporum aculeos  
conducere, & necnon colidit tradit: Succum item caput gurgulitum purgare, naribus in-  
fusum dulcorum dentium lenare, si in aduersum natum miscetur, vtrius oculorum vna in-  
fusum, & aperta cum oleo expurgat contra vperatum morbum, in conuulsis, ac reman vna,  
si cum vino bibatur, prodest: adlet dicitur, quæ carolum flos præfert, prociatam fidem  
septimere, quæ verò phrenæcam, impostione euocare.

#### De Artemisa. CAP. XIII.

**ARTEMISA** generis Possentores completa florura, Maroccanam & Tanaocum ab  
quoque referentes. Fuchsius floram Apfricanam hac quoque adducere curatus fuit,  
de quo Peropander aberas lib. 111. Nolens propud Artemisia dicitur primam: de eode de  
alio congeritur agendum.

Hortis

Artemisia laciniata foliis.

Artemisia composita.



Florus interea Artemisiae genera d nosstram latioris foliis alteram tenuiora.

Proca Artemisiae folia lata sunt, loca rassa, ac varis disticta per utrumque usque, Absinthij 1.  
 Latifoliae magora, rase perinde albida, superius enim herbato colore vircent, inferiora parca modo  
 modo utal baculis casis vobis, scilicet barbatae, rorantib, striati, ac in partibus rorantibus distictis  
 subinde rubent, folia circa quos lignum a rorantibus: foliis parca, Absinthij striati,  
 factans veritas dignatur, radix multo firmitate sicut.

Artemisia striata disticta folia Absinthio magis arduantur, parvis tamen maiora, &  
 longiora: canaliculis tamen in tenuioribus alio distictantur, quibus praeter exigua inferiora folio-  
 la, & parca corporeis copiosi superius adherit, rorantibus qui in priora radice crassa alio disticta.

Proca Artemisia striata vna, agrovana, & arduantur magis, rorantibus frequenter, &  
 non modo in loca rassa vicina, sed & longissima ab eo distictantur, & rorantibus rorantibus  
 amplius hauriat, alio hauriat, pro folio videlicet, ac rorantibus rorantibus, quae ad superius  
 rorantibus rorantibus fieri.

Altera longius a mari tunc accedit, in Germania, Bohemia, Austria, ab utroque rorantibus, sicut 2.  
 rorantibus, rorantibus rorantibus, quandoque etiam in aprica occurrat.

Florent arbor, & firmis perficiunt rorantibus mensibus, rorantibus rorantibus, sed rorantibus  
 rorantibus.

Quae Graecis *Arsynia* apud Latinos nomen rorantibus, quod ab Artemisia Marfoli Carie  
 Regis rorantibus, hanc rorantibus, accepit, rorantibus rorantibus, dicitur: vbi Plantae rorantibus  
 rorantibus rorantibus dicitur rorantibus, apud quem & complures appellationes hanc rorantibus, quae  
 rorantibus rorantibus rorantibus apud Diole rorantibus. Hanc rorantibus rorantibus Artemisia rorantibus  
 rorantibus rorantibus, quae rorantibus Artemisia rorantibus rorantibus. Potest hanc rorantibus  
 & rorantibus non ab eo rorantibus, rorantibus rorantibus, & Valentini dicit.

Proca Artemisia rorantibus nomen illi Martini herbarum rorantibus: Germani *Drillij* & Sicut  
 rorantibus rorantibus: Hispani *Artemisia* rorantibus: Galli *Artemisia*: Belgae *Drillij*, Sicut  
 rorantibus rorantibus: Angli *Drillij*: Bohemi *Drillij*.

Altera Artemisia rorantibus cognominatur, sicut *Tenuifolia*. Hanc & in legitimo de  
 Artemisia apud Diole cap. tum & alio rorantibus rorantibus, nomen, & quae rorantibus de-  
 rorantibus

languis occurrat. Videtur autem hanc Manducal: pro Ambrosia altem deprecasse.

Hæc autem Arvensis vineæque, auctor Galenus, esse videtur, ac modico delectant, calida autem lacundo excocta, siqua primo aut secundo terra siccis, & vni modico venarum partium. Hinc spratum sempernam mole modica aut. Dicit ad ducendos menses, siquidam, & ferunt. nam ad praefationes, & infans in vena vna, ad infans in vna vna, vna, vna ipsi incipit. Item cum myrica subditam, eadem que in siccis possit. hinc & coniam decodum eorundem gratia. Item de pulvis in his acceptis finibus in postquam menses ducant.

Cum vero de eadem rememorata vineam, ac calculos committant, eodem auctore.

Plurima, vineorum, aut, qui illigantur herbam habent, infans in vna non ferunt, & ferunt habentem regni nocte mala modica vna, belluarum vna - & ne solum quidem. Hinc verò de ex vino adscitis opium.

De Berry.

CAP. XIII.

Berry.



**EXIOTA** herba Berry est, dicitur vna ab-  
trot, francis modo reddi, & vna quæ affe-  
gunt, in nonnullis tamen ramulis effuso, ac di-  
lumbum, quæ folia vnaque lacunata, atq. pro-  
fundius incisa, vna foliosam Engen, exomant  
femenin ramulos collectum, circa totos aut  
ramulos, modico in fibras ab. Tota herba per ma-  
turitatem in viride luteo largæci colore, odo-  
ratis est, & tota quoque purissimo lentore prodi-  
ta, quæ colligenda in vna vna aut verò quibus  
adolecent, ac quam purissimam prodi, folia infan-  
tore parte habent.

Nalotat in Italia & Gallia circa proficentes  
aqua, & ferunt reperitur verò, & in Italia, ac  
arab, in olivæ quibusdam, similitudine in hanc  
adolecent, amant.

Augusto ac Septembri mensis ad perfectiorem  
venit.

Græci Bery appellat. Latini eodem appella-  
tione vntur. Itali Berry: Germani Berris, &  
& ferunt, Galli Berry: Belgæ Berry: Hispani  
Berry: Angli Berry: & ferunt Hispani Berry  
Berry.

Dicitur verò de Arvensis, ac non modico Dico-  
condes, sed de Pharusculis apparat autem Ar-  
vensis illa species, quæ in Italia appellatur.

Præter etiam duas illas Arvensis, de quibus  
ea p. præcedente, & vna in Hispania Dico, & Ph-

namque ferunt. Quæ Dico, & Pharusculis, hinc vna vna Pharusculis, hinc vna Berry  
ac Ambrosiam vocari refert. Tota autem hæc descriptur herba, simpliciter, & in vna  
flos habet, hinc, hinc colore, quæ in vna vna quæ præcedentes Arvensis quæ odorem fan-  
dat quæ vna Berry est. Fuit hæc quod Berry, Dico, auctor, etiam Arvensis ac Am-  
brosia dicitur.

Ceterum Berry calida ac siqua est secundo excocta, vna habet amensandi, ac incidendi  
in vino pota, & quidem Dico, & Pharusculis, vna in vna vna quæ ferunt  
prodi, hinc possunt cum saccharo condita folia, Con ferunt vna appellat. Adhuc car-  
nibus, quæ cum vna vna vna, gratum adhuc ferunt.

Interponitur vna vna vna non modico ut ferunt odoris conculant ferunt ut &  
à vna ac vna conculant, quæ ipsa quoque prodi.

De Ambrosia.

CAP. XIII.

**AMBROSIA** vna ferunt casis, quæ non nihil in vna, francis casis modo affe-  
ret, dicitur tres palmos alto, qui in ramulis, ac vna conculant quoque diffundunt  
folia hinc magna, vna siccis, vna vna, vna vna, quæ Arvensis prodi, quæ vna vna  
vna vna vna, quæ vna vna vna vna, quæ vna vna vna vna, quæ vna vna vna vna

casulos

Ambrosia.



Martiana.



Receptorum aut, Dioscoridis Parthenium Marticarium appellat: Plerique Armoellum: Iul.

ramulos sublimis, rostrati, & matricosi, abique fructu perenne tubulose inferius angulosa, semeltris tribus usque echinatus capitulis æquus, nuncquam florentia, in quibus semen nigricans: infra gracilis, palmas ut dicitur e vitæ tota herba, & gratissimum odoratum spiritus.

In Cappodocia spontè nascitur, ubi sita in horti feliciter adolebit, ubi firma radice bitulosa quandoque lætissimè admodum tollitur.

Sub Æthiæ gestans, & flores, & semen Ambrosia in Germania perficitur.

Græcis est *ἀμβροσία*, Latine quoque Ambrosia, nec aliud nomen conveniunt. Plures Ambrosiam vix addunt esse, & ceteras alias herbas fuisse aut. Nam & Beryta, ut scripsimus, à nostris Ambrosia dicitur.

Martianus de alexandria quondam describit Ambrosiam, à nobis pro secunda ac tertia sicuti Artemisia descripta. Recensentur aut Ambrosiam quoque sicut Ambrosiam ab aliis nominat, quam sub Agrostis Salutar nomine capellatur.

Vixit autem Ambrosia ad ea, quæ repella de reperiuntur. Nam, ut Galenus, imposita vitæ habet adstringentem ac reprimentem.

De Martiana sive Parthenio.

CAP. XV.

**M**ARTICARIA plures subinde rusticulos prope rotundas, in alio ac ramulos quosdam subinde divinos folia tenens, raris sicuti ambrosiaque cernit, Comandis prope ac terra proxima emittitur, sed tamen rarisiora florat in fulgus rusticulorum eminent medio orbiculo sine dicio lani & quo candida foliola per marginem erumpunt, Chamaemeli floribus similes, raris de non admodum multo capillamento consistitur. Tota herba delato colore vix, grasset olet, ac gustu perquam amara est.

Nascitur in sylvibus, in horti, locus veteres natus, loci quædam rudensia subest sapienterico radice sicuti aliquæ, licet exigua, cetero, quem inter rudensia sicuti contingit reperiri, de quo Cardanus auges non nullas libri De subtilitate addit.

Æthiæ mensibus in vigore ac flore est.

Dioscoridi *ὑψηλόν* est, Galeno verò ac eius discipulo Paulo, *ἀμύρα* ac *ἀμύρα*. Testatur quæ Dioscoridis, Parthenium à nostris Amarcure dici & *ἀμύρα*.

Parthenium Galeno Perdicion sive Parthenia est, & similiter Plinio lib. 22. cap. 17.

Est & terram Parthenium Larocchia videlicet, sive Mercurialis, quam Dioscoridi aliquos Parthenium nominant, cui accedit & Plinio lib. 22. cap. 17. & similiter Apuleius.

Itali *Marsilia*, Hispani *Marcusina*: Germani *Welschlinne*, *Welschlinnen*: Belgae *Plant*, & *Marsilina*: Galli *Mervec*: Bohemi *Apambaba*: ac Angli *fenestr*, & *Potentilla*.

Est aut & heros inter Spectas voces nonnullae appellatur, ut *de Diosc.* *γασταλίδα*, *γασταλίδα*, *γασταλίδα*, *σπιδίδα*, *σπιδίδα*, *σπιδίδα*, Sals lacubum, Mallefolium. Passim hanc esse ea, quae ab Apuleio *Arenaria Triguera* vocatur: verum concepte hanc nullatenus exprimat, difficile est affirmare.

Encaustic autem Marciana insigniter, testis ordine castra, fœca verò secundo abfurgit, expungit, apert, & quaeque amara possunt fela non praestat, ad vitiosos aflectus non parum conferit: mentes temeritas, sedandas, & mortuos educit: ferus, siue eius decocto epoto, vel in balneo modico, aut etiam cataplasmati modo pibî imposita. Facit & ad suffocationes ex viro hanc in modum, & ad eosdem durat.

Dioscorides etiam Erysipelam, & inflammationibus, cum fœce imponit vitrea, usque Mem Potebantem etiam cum Oxyrinde, aut vino, aut sile, non fœca ac Equisetum, pavum, ac Silem etiam ducit, & inflammationem ac melancholicam eodem processu modo ut. Vult quoque in pora calculosa, eodem autore.

*De Tanacetis. CAP. XVI.*

Tanacetum



Tanacetum crispum.



- 1. TANACETUM vero aut altero, subinde etiam pluribus caulibus consistit firmis, in quoniam fithris atque ut umbelle, quoniam flores in Area medicis aut Pancheni orbiculatis persimiles, in his circum positis aut ambirentibus foliolis, cum lriso respicendum colores: folia oblonga sunt, veluti in pluribus ad vtrum congesitis pediculis composita, Agrimonum, aut Potentilla potius similia, floris natis satis arcta, sed tamen molliora ac miora, quorum particularia ut fithra, vnaque variegata firmata, modo lignosis in floribus hinc inde distribuitur libris, quibus fithra de latè script. Tota amara herba est, & cum viciè dicitur quadi generis coloris.
- 2. Heros & alia quaedam reperitur species, cuius folia frequentissima melleo dulcia, ac crispè, densam aliquam plantam videri videtur, pium & odorat, & sapore, acumen florè plus affinitè.

Est Tanacetum passim fœca agorum marginibus, aggencia, hororum scapulis. Crispè Angli ferat est.

Tanacetum scaberrimum.



Tanacetum minus.



Tanacetum species in Provincia ac Delphina in haud procul Valerina Galliae, Lebelus tradit, quod sicut primum Tanacetum, flore vero Mammillariam referat, utraque autem colore delphinium sit.

Flores hinc potius autem corpus Tanacetum, hinc ac Italia vigint meritis, dependet undelatum colore grana, faccedit fermen in aqua colobata, quod Augustus ad perfidiam venit.

Tanacetum nostris areas appellat: Norribi Arborescens, quod amari solem, quod non erit hoc anacetat, Germani Arnusum appellat Belgae Arbores, & Mammillariam Italiae Tanacetum Angli Tanis: Bohemi Thapsus. Non est Americae, sicut hinc, hinc vinctus, ut in nostris colligitur.

Facile est autem colligere, & sicum est Tanacetum, ut pro amari hinc partibus amari, non tamen secundum vinctusque ordinem longe excedens.

Semina in vinctus vulgi adhibent vinctus humilioris, ac tunc, quas expellunt. Ex amari herba erumpens dicitur, cum eius placentia vere conficiatur, on nec ingratum nec amara, vinctus vero etiam vinctus. Nam si quis in eo hinc vinctus hinc, hinc partem ad edocendum perducit, partem abfurgando decortum dicitur. Sicut hinc cum vino potus, aut vinctus decortum, vinctus prosoctat, dolores vinctus lenit, & vinctus stitudo vinctus: idem facies cum oleo rosaceo hinc ante accedentes dicitur, febrium rigores vinctus lenit cum quous tamen oleo, etiam vinctus comendationibus ac doleribus amari est.

Decortum de vinctus, quod cum melle aut fichto condas, ad vinctus pedisgram plurimum facit, si vinctus vinctus cum aliquantula part, vinctus aliquo tempore hinc.

De Tanacetum minus, fac alba.

CAP. XVII.

**O**DORE ac sapore primum hinc herba Tanacetum capitur, minus tamen odorata aut amara: Caudes eius humilioris, ad pedes altitudinem, aut non multo ampliorum acolluntur: folia cum circa caulis, vinctus quanta, vinctus dicitur aqua vinctus, Corandrym vinctus, vinctus vinctus ac vinctus, quam Mammillariam, ex albedo vinctus: Vinctus in vinctus caudicem, atque in hinc dicitur candidi, Milleria, vinctus, hinc vinctus, oblonga hinc vinctus, & vinctus in vinctus dicitur.

D In Ger.

In Germania ac Italia agris, plerisque reperitur locus.

In Io & Augusto, & quaedamque Septembri mense floribus ac sereno surgit.

Cetero, saporque, qualis Taraxaco, speciem cum quodam esse ostendunt.

Proinde non obest Taraxacum minus, vel Taraxacum cum albam romanam potest, proferunt eius nullam esse aliud nomen cognatum habentem. Nisi quod per Soderum de Achalla (si non fallimur) Martialis cum exhiberetur, in ea parte probare non possumus.

Achalla enim Soderus edita ratione exuperat, & ad longinqua eruptiones, dysenterias, & multo hebra profusa conquirat, ac Taraxacum suadere curas expurgandi ac aperienti esse oportet: nam Taraxaco via colere ac saporque, & reliqua facultatibus simile, tamen minus potest.

De Bardana, seu Lappa maior.

CAP. XVIII.

Bardana, seu Lappa maior.



**BARDANA** folia inter praemittit acutissima, & hirsuta, longaeque Cucurbitae majora, ac laeva, crassiora tamen & agrata, quae superiore parte fissurata vident, infirmo nonnulla inbecum Caudis angulosis, crassis, folia similibus, sed mucosius longe capitur, hoc in aliis; ramules quamplurimos d.riburibus lappi pignat grandae, globosa, purpuribus cingula aculeis recurvatis vndeque alperis, & transforantem vestitus inhaerent, a quibus superius hoc non flammens, colore purpureo: fomen. inter globosum capitulum per forat, quod delatkeribus lappis, vni cum lanolis pappi, impellente veros, astat. radix longa, inter candida, forte nigra.

Nuquam non obvia Bardana fecit vas r. locis inculat, de feris que sponte nascitur, nec lapidosa fuit.

Iunio mense caulis surgit, ab eo, ex quo nata est, anno, lappi succedant vni cum floribus ac fermen.

Gracis est *Αποβρατον* & *Αποβρατον* *Εσπεριον* Latinis *Perfonata*, *Perfonata*, & *Arcium* Officinis *Bardana*, & *Lappa maior*: Germanis *Preßkorn*, Belgis *Esset dille*: Italia *Lappa maggiore*: Gallis *Οβρατον*, aut *Οβρατον*: Hispanis *Bardana*: Anglis *Beet harr*: Bohemis *Kapitel*. Apulicus praeter seperiora, & alius quidam *Perfonata* appellacione refert, ut *Dardana*, *Bardana*, *Elephantaria*, *Nepheleon*, *Manifolium*.

Difert autem Arcium ab Artio, ut ex vniuersaque descriptione, quae & apud Dioscoridem & Plinium seperius locuerat, manifestum est tum & ex cap. xxxiii. lib. v. huius Plinij. ubi cum Arcio & descriptione habentur.

Proinde non parum salutaris, qui nominem viciniam decepi, Arcium idem cum Artio esse vult.

Facultate autem Bardanae folia moderatè ressecant, ac desiccant: radix nonnulla caliditas percipit est.

Prodant radicis huiusmodi, & perdecim experientibus cum parca modis, auctore Dioscorido. Apulicus est cum modico siliciuma maris caesi rabali vniuer impori, angus sic agrum d.iam libentis, ut.

Idem succum foliorum cum melle potui datum, vniuersam proouocet, & vesice dolores adfert: atque eundem cum vino vetere potum omnes serposumum molles in infuso facit. Ceterum huius herbarum cum sale miam, & super scabrationem cum fero sicilium angulicam, vniuersa vniuersa pellere ipsa vniuersa cum eundem radice cum conu. seperiora prodest, firmis item radices modis refert. Caudis autem Arcy, praesquam lappi pignat, demulso carice, emulsum si sale & pipere, aut in purgum canisum iure decoctus non infirmis edunt, sic sarpentem auger, & ad Venereum miam: aliamentum praesquam huiusmodi



multa corpori, præsertim decedens, confert, additque panes medicos amplius confert; Potest, & non aures quàm radix tabula ac hæmoptosis prodest.

De Lappa minore seu Xanthis

CAP. XIX.

Xanthis.



**L**APPÆ minoris folia quàm superioris, longiora, adunata videntur. Antheris accedens, arbutum mollius habet: i oculis cubatibus, angulatis, pendulis exiguisque notantur, & in aëre funduntur: Botanicæ autem lappæ verticillatis convolvulis æmulant, sed exigua ac crassa colla bene: lappæ minoris lappæ sine fructibus è foliis non differunt, ac in aliam foliis angulatis, Obiæ aut Corvi magnitudinis, veluti Platanus pilule æquæ, ac cornuta veluti adhami formæ, quæ hinc quoque delectantur, sed fructus contracti magis se præbent forma oblonga, radice plurima fibris firmata, ac laevi albi decore.

Lato & pingui solo, in fossilibus, & hincibus, ubi exarantur, facile præterit.

Lato & Augusto viget Xanthis Lappæ.

Græci est *Βάλες*. Latine nomen noster: Officinas Lappæ minor, Lappæ minoris, nonnulli in Stramano Galienorum *θεοπέλας* appellat aut. Repertur verò & *θεοπέλας* inter ipsas lappæ appellatone, proprie tamen *θεοπέλας* *βίβα* est. Germanis *Christenwurzel* seu *Christwurzel*, Belgis *Christ wortel*. Italia *Lappola minor*: Hispanis *Lappolera*: Gallis *petit allestere*: Anglis *Small wort* & *little wort*.

Medicæ aures ab effectu dulcori videntur fructibus squisidens, principium nona mensuræ, collodis, visus, & in sicca recensenda, ac deinde vitæ exigente acerbis in mensura in aqua tepida mactatibus, capite *Βαλες* infuso efficit, altem altem, capite tamen pitui nitro præparato, vt Dioscorides tradit.

defectus, capite *Βαλες* infuso efficit, altem altem, capite tamen pitui nitro præparato, vt Dioscorides tradit.

Xanthis semen, auctore Galieno, digerendi vim habet: proinde coctum ac siccatum.

Dioscorides fructum eodem modo eum tibus præparat.

De Beryonica CAP. XX.

**B**ERYONICA folis exilibus, lata, virentibus, aliquantulum asperis, per ambitum ferè modo canalis, que rousa non similibus, sed tamen minoribus caulis tenuis, quadrangulis, aliquantulum hirsutis, pediculis (plurimum) alius flores perferit spicatos, colores vt plurimum rubentes, albus tamen, sed raris, albidis fetore succida oblongam, angulatis, radice ex multis fibris, ab uno dependentibus capite, compositis.

Amarica epica, reperitur tamen & in præsenti foli expatis, sed humilibus, adolefit & in hortis.

Initio mensis præcipue floret.

Græci *βέρον*, & *βέρον*: Latine Beryonica: nonnulli Vetricia: Plinius lib. 29. cap. 8. in Italia contra Scythiam dicit affert: Recentior autem aliam offendit: Serena lappæ de qua auct. Est verò & aliam Beryonica à Paulo Aegineta descripta. Galenus lib. 7. De facultate medicis *βέρον*, id est, Beryonica, etiam *Σακκίαν* vocat tradit: Duo tamen omnino aliam *Σακκίαν* describit. Officinarum & Itali Latine nomen noster: Hispanis *Beryonica*: Germanis *Beamberron*: Gallis *Berone*, & *Berone* appellatur: Anglis *Berone*: Bohemis *Beamberron*.

Castula aures & sicca Beryonica est, & ordine quædam secunda. Incidendi, vt Galenus ait, vim habet. Cornuti marbo obnoxia, necnon & canoni, capite ex frigida casta male affectis, prodest: Pulmonem & pedusculum melle expurgat: locutionem, hanc, nec

Veronica.



Veronica montana.

non solum obstruendis moderatè Rego morbo laborantes reficit, concilians vermicis permotus, aculorum eruditionibus liberant, vimemque ad renem & vesicæ dolores vtilis, confilientes in renibus calculos rumpit, & expellit rotas præterea: vasa strangulata moderatè rapit, corollasque curat: adiculus serpentes & ferarum mors, Acropora, & vasa lacerata impetia conferit. Laudatur & adomitas Ichthyoceros dolores: Aluum drachmanam quatuor pondosum, ut quidem Dioscorid. in Libano, & floribus Carthago sit, ad multa vtilis, ad expulsi-  
nem dolores præcipuè confilient.

Radix Veronica reficcata, & cum hydro-  
lyte depur. pondos affumpta, vomitum cit, &  
crasus lentosque humores educit, ut quidem  
hæmatocæ nonnulli referunt.

De Veronica seu Veronica Padi.

CAP. XXX.

**V**ERONICA castibus dederuntibus, aut  
longioribus stirp. & quidem ut plurimum  
per terram: folia eius lanceolata, Chamædryos  
sepe non minus, eliditioraque, secundum mar-  
gines, ut illas, feram, & cogn. sanguine pabul-  
cant, foliis, ut pediculis ordine digesti, diluè  
caustica, fenes parum, rotandam, & graminis  
filiqua plantæ, & quæ locutus præ se ferunt.

Veronica allergens.



Veronica pastinaca



bus, & splente: multa terrae hinc illuc disseminat.  
 Locus apricus, si boscus, ac arenosus, non modo  
 nata rursus, ac aggeris, aggerum & parietum,  
 quorundamque & in faxis superiorem.

Huiusmodi & alia quaedam species non ac-  
 cumbens aut prostrata, sed effurgens, utque erig-  
 ta, priori formae satis similes, sed variis speciebus.

Est & in parte quorundam, ac humilibus, cu-  
 jus folia minora, vixituta, laeva, laminae ca-  
 rere, alia priora folia, ramulis superius, dila-  
 ti caruleis boscis, & thymis similia. Ignant  
 autem & nullas vites hinc habentur.

Junio ac Julio quidem flores, ac veget, reliquis  
 anni mensibus etiam vixit.

Recentior aetas Veronicam appellat Germani-  
 ca, & hancque & hancque Belgae & Compositi. Li-  
 non de hinc Bohemiae & Silesiae. Germanica autem  
 quae à Paulo Argemone lib. 7. describitur, & alia à  
 siepe est, convenire cum hac videtur: Scilicet si-  
 quidem velut Palegum, ramuli enim tenues  
 sunt: folia forma & magnitudine respondere,  
 gullabilis quatuor longi quatuor Palegi) inferior,  
 ut ut hanc comparatione nullam arbitror. De  
 hac Germanica sic Paulus, *herbae hanc*  
*est uti ad hunc vel ad hunc vel ad hunc*  
*est uti ad hunc vel ad hunc*  
*est uti ad hunc vel ad hunc*

Veronica  
 pastinaca

hae est ramuli calibus, Palego similibus, sed tenuioribus, ac prope modum, si & alia, nullam  
 qualitatem referentibus, ut hinc confirmari loca poterit.

Est autem Veronica, quorundam quidem galle agnoscit posse, calida & sicca, sed tamen  
 modicum.

Huius autem ad cruenta vulnere, diuturnas exulcerationes, conferre decoctum recen-  
 tiores affirmant. varietas eorum dicitur, praesertim colli & faciem ac hinc obducatas  
 apertae: vixit mense calidius expellere venas & vesicam expurgare: quorundam postea  
 de Romanis sua quoque Paulus in renem, inquit, me dicitur videri.

Aqua simplicis destillata pithifica, potenter, ac rursus, velle perhibetur. Arde  
 pulvis diachymi pseudo cum torridis thymis, adversus pestilentes febres commendatur.

De Veronica fennica dilla, seu Elatone.

CAP. XXXII.

**C**Y si Veronica legitur vix illam hanc simili radice habet, tota mollis, ac rursus hanc  
 gine contigit, vixit calida sine calidie alia compluribus hinc reperi: folia velut Veronicae,  
 sed magis acuminata, nec ambitu firmata: boscis & secundum folia hinc, rursus propendunt  
 habent comaculam vixit florem Linnaei, aut Rosa Regii: rotunda succedunt velut Ana-  
 gallis & capitulo quibus similia, raris fibris.

Rapum ac humida quae loca, inter se gine etiam erit.

Est autem mensibus hinc, ac deinde faciem perficit.

Leonhartus Fuchsius, & post eum Matthaeus Veronicam appellant ferocem, quibus si-  
 penos mense potius tamen ad Elatonem referenda videtur, quam Dioscorides & Plinius tamen  
 autem, folia habere Helictes minora, rotunda, pithifica, de hinc tamen alia quo et similia  
 à radice foliis, rursusque in se gine ac calid. Cum qua descriptione hanc herba convenit:  
 Folia si quidem eius misit, quom Parmentier (quae prope Helictes) minora ac rotunda,  
 pithifica quoque, vixit simpliciter, de hinc tamen etiam ramuli, foliis, non pithificis quoque  
 aut si quoque dividunt natae.

De facie partibus autem hanc Veronicae nihil apud Recentiores reperit.

Dioscorides & Plinios & hancque & hancque & hancque & hancque & hancque  
 D 1 Elati-



Elateris cruda & in potius usulari tradunt, Eadem cocta ( cum his ferulae Pliniana ) in febribus à dykrensi liberant.

Serrula.



De Serrula. CAP. XXIII.

QVAM Recensior aetas Serrulam vocat à Betonica differt, folia eius prima, ac à radicibus decurrentia lata, oblonga, & per margines serrae modo crenata, missa quàm Betonica: ramos vero caules laciniatos, profundius alii usque incisa, inflat ferè foliorum falsicola: Venique aeternum cum cauliculis modicoeriter fixatis colore viridi: caules ramosi congestos asurgunt, cubito altiores, in quorum sulcis e munita squamosis capitula, Aofculi purpurasci nites, radice fibrosa, multaxillat, singulari septentrionali, anna.

In sylvis, locis opaco, ac humicibus, veluti in pratis nascitur, & non modò in Bohemia, Anglia, ac Normannia, verùm & in Belgio.

Sub finem albata florat, ac deinde semen perdit.

Recensior aetas Serrulam appellat, differt, et dicitur à Betonica, quæ & Serrula: Alia eius norma, si que habet, nobis incognita.

Commoditate à medicinali valere, & etiam in oculis, sive in oculis, sive in oculis.

De Chamædy repente.

CAP. XXIII.

CHAMÆDYOS Venus nulla quidem generis fustate, nobis totum hunc abire nra, verumtamen, vult fieri, & excepta ea quidem,

*Chamaedrys cuneata repens.*

*Chamaedrys repens minor.*



dent, quoniam Fuchsius *Chamaedrys* feminam facit, *Chamaepryis* artem monendam. Est autem minor *Chamaedrys* eius procumbens sicut *Repens* ab eis *Desjussis*, ac exigui fructus scilicet affertur. Terna Sylvestris ac spuria.

Prior *Chamaedrys* compositissimis herbis (ut plurimum) procumbentibus, cum quibusdam resinosis, ac lignosis virgulis, hinc inde sparsis reperitur, quas foliola conossiliter exegit, lata, rotunda tamen subquatuor longam, ambros firmata, quatuor ex utraque similia, sed longi minoris, ad Aeneas Ceras particularis proxime accedentia. Flosculi, & summi folia, & in colliculorum fibris extraneis, perpauci. Item exiguum, nigricans, raris tentis, & fibrosis serpsit, ac subinde nova gemma emittit.

In parvis & asperis altis proventus verò & quibusdam alioquin, sed infolens in herbis facile comprehenditur. Germanis vineque, Italia, Gallia, Bohemia, aliisque provinciis familiaris, noster verò quibusdam locis amplioribus folia, ab his minoribus.

Julio & Augusto florere intelligitur verò, reflexum, & ad medicinas vix repositum, eam prorsus quem fecerat.

*Chamaedrys* hanc nostris sicuti Medici appellant Italia *Garosaria*, & *Chalcomandras* dicitur Hispanis *Chamaedrys* in Gallia *Chamaedrys* ac *Chamaedrys* Germanis sicuti *Chamaedrys* Sicut qui Triflorum minus, & que rosam minorum, aut feraculam minus vocent.

A Dioscoride appellatur *Chamaedrys*, esse confirmatur. Si tamen *Chamaedryos* descriptio diligenter expendatur, ac deinde *Teucon*, hanc non Dioscoridis *Chamaedrys*, sed *Teucon* esse. E mox apparet *Chamaedrys* esse *Chamaedrys* non *Chamaedrys* esse, *Chamaedrys* exigua est fructus, doctriamque, fructus autem spumae sanas sanguinis, & crudi nascuntur, quod hanc *Chamaedrys* hanc facit. *Teucon* verò ubi *Teucon* est, hoc est, *Teucon* hanc est virgulis plura folia. A quo & Plinius hanc est aliam lib. 27. cap. 7. *Teucon*, scribens, spargens in costis, quibus utique hanc reperit *Chamaedrys* in *Teucon*, quia raris exiguus hanc diffinitur dicitur possit, neque eam ob causam *Teucon* & descriptio magis accedat quam *Chamaedrys*.

Sed tamen non abscondit fuerit *Chamaedrys* etiam hanc appellari. Tunc siquidem Dioscoride, *Teucon* à nostris *Chamaedrys* nominatur. & vice verà *Chamaedrys* ab aliis *Teucon*, propter vixitalem similitudinem in foliis similitudinem.

Toucon autem, ut Plinius ait, Toucon incruat: addit à nonnullis Hemionion, ab alia Splenon dicit Sed hæc nomina ad Hemionidem herbam pertinere, non ad Toucon.

Hæc vero Chamædrys & alia similes species exat, cujus folia maiora aserla parte multibacis, cotyled, sine potius virgule du nove, caetera prout similia. Hæc fertur in Aulo brogam seu Sabaudia ac Delphinatum montibus videri.

*Comm.* Sicut qui velut Loricadem hanc esse, & quidem montanam, sicut duorum siquidem est generum, una species hæc montana, altera hæc in sine latina. Montana, ut Diosc tradit, latioribus est foliis, semine autem acuto, acrotylo, & omnino efficacior quam sit latina. In tanta autem veterum brevitate, quæ potius certum aliqual statueret?

At Chamædrys repens totam est partem, ac incidendi facultatem habet, calida & sicca ordine prope modum terrena, veluti de Toucono Galenus scribit, quæ amara & hæciosa confirmi sicca siquidem cum asperitate, ut Diosc ait unde decoditur, potius hæc nem absumit. Imponitur vtrò hæciosis cum aceto & sicibus: siquidem vtrò montibus cum aceto sola. Potest aceto carnis & quæ affurgens sine fructibus Chamædrys, quæ vnde & circa amorem pro Chamædrys accipit & vitæpan potest.

*De Chamædy altera, sine Asurgente.*

CAP. XXV.

*Chamædy altera.*



**C**HAMÆDREYS altera vnde, dextratili, aut si bende aliorum, lignosa, duroque cauleculo affurgit, hæciorum sine exiguæ fructu speciem referens, qui inde ac rursus compluribus diffusis, folia adicit ambere acuta ac serrata, minusquam quercus, aliter eadem emittit. repertis vtrò Chamædrys montana: foliis similitudinem folia, & ad carniciorum fastigia erant: subsparsa. radix multis fibris vnde spargitur.

Nascitur per tota & asperis: montes, loca acida, & aprea amat, nec horto refugit.

Eodem quo superior, tempore & illo & simon perferat: Legendam cum semine Dioscorides referat.

Græcæ est Τραχάκησι nonnullis Τραχάκησι & Λακωνία Latine Traxago, aut Trilago, nec dicitur qui Trilaper vocentur, Diosc & Plinio auctoribus. Fuchius & Manducius pro Toucono depingere: Germanis Sumpf Quersengel/ Sumpf Quersandern. Potest hæc Traxago maior, Sematula maior, Quercula maior dici.

Ex terro vnicui ordine est cocassificationem ac deficcationem, Chamædrys, Galeno iudice, cum amaritudine acrimoniae consistit particeps est: Lemna, eodem asserit, colligunt cum aceto, addit Plinius. Vnus ac melles carnat: crassis incidit hæciorum, visum ab obstruendis vnde apertis, ac quædam hydroperit acillita ut Plinius aduocant siquidem in maris cum vino & pota & imposita efficit.

Tritad siquidem dicitur, inquit Diosc dicitur in catapocis, siue, ut Plinius, in passillis. Purgat vetera vicia & hæciorum in melle, caliginem vnde oculorum si ferat cum oleo, addit Plinius.

*De Chamædy siliifera.*

CAP. XXVI.

**S**YLVESTRIS Chamædrys ramulis perennantibus, angulosis, veluti geniculis distans: dicitur, pedum aut si bende cubitum longos, circa quos per intervalla folia latiuscula, magis aut feruata, quibus repente siue prout Chamædrys parulis maiora, multioraque, quædam multo rariore: foliis eleganter ex quatuor foliis circa fastigia vel hæciorum ordine digesti, cum oleo amide colore, quibus vnde hæciorum succedat hæciorum, ac quibus feruata parua. radit tenuis, fibræ non debentur. Hæciorum calcule non ac alba vnde affurgit, nec sim per pro-

curantur

*Chamaepitys*



combrætes seipsum, sæpè in larva inclusantur, velum ea quæ *staphylea*. Theophrastus appellat, & rursus per viticem foliolis locustæ lincata.

Nascitur plantæ hæc in pratis vixta flumina, rivulos, fontes, subinde & in nemorosis: Et quædam loca asiorum folia, paucis verbis hæc rursus alibi describat.

Iuno, Julia, ac Augusto cum floribus viget.

Ante notum Chamaedryn vel etiam Teucron, hæc Chamaedrys in officinis nomine acciferat, ac pro Chamaedry in medicamentorum compositionibus admittitur, si per non habendam in officinis perditis, Syriacis ac Spuria Chamaedry appellatæ corpori, a normaliter vero etiam Teucron Palæste: Germani *Chamaedry*.

Non esse autem Teucron, nec legitimam Chamaedryn noscitur quoniam nihil opus habet, Vitis enim cognitam facile non perinde manifestam.

Videretur esse posse, vel omnino proxima ei, quæ Dros *Asiæ* comitibus, id est, faciam herbam appellat, si modo Herba sacra, & Verbena, quæ Græci *staphylea*, differretur sine sit quædam distincta Dioscorides, vnam post alteram sortem describens: utrum alij Anthora, Galenus videtur, Pallas, Acrius, & Orbulus, dum Herba sacra nullam faciant mentionem, sed *staphylea*: tantummodo, atque hæc ipsa *Asiæ* comitibus etiam truncata reperitur, vnam eandemque esse vnam appellationibus distinctam apparet. Quæ si ita se habent, Chamaedrys hæc Syriacis *Asiæ* comitibus cognata est.

Ceterum participat de hæc herba comitibus est ac sicentibus, aptissimi atque expurgandi vi non integre deservit. Potest inter ea, quæ lecturæ Licetiam operantur, admitti.

*De Chamaepitys. CAP. XXVII.*

**CHAMAEPYTIS** *max.* auctor legit Dioscoride.

Primum hinc per terram caucasicam quali reperit, folia è singulis geniculis protit oblonga, angusta, ac triparsitatis fissa. floribus ex aliis foliorum later. Tota herba nonnihil lutescens, odore nullum præcans, nec linguam refert.

Dioscorides hæc folia esse ait Sem peritum in montibus, rariis, iuris, ac purpureis: Atque hinc quædam folia, vone nulle videntur, mox esse apparet: Nam singula foliorum segmenta, ipsa Sem peritum in montibus folia, facit referunt, atque videtur, quod inter rariora Sem peritum præsum.

Altera species caucasicam est emissa, quadrangulis, ac geniculis raris nec raris, folia lata, & multiplex nec diuisa, dilata præparat: floribus, è calycibus velis Hysocyris, sed longi rariis in terra ac longa radice, adhaerent raris alij notis fibris. Et hæc hinc, subcaucasicam, & odore præcans aut præcans Resina, qui Chamaepytis hæc esse speciem ostendit, A vero idcirco recessit, qui Chamaepytis hinc in truncata præsumant.

Raris hæc Dioscorides esse ait in montibus in modum rariis. Mirum videtur cur Acrius eam præsumat, sed indicare voluit, repandas sibi in officinis opposita alia, in officinis quædam esse præsumant exhibere.

Tota Chamaepytis vixit omnino potest caucasicam, palmarum foliola peripalmarum exigua, floribus parvis, & luteo pallentibus, ad foliola caucasicam: radice firma, nec migrata, & tenuissima: caucasicam foliola cum raris, odore olei, qualis in *staphylea* reperitur.

Lata radice, fissa, libulosa, vixit, & non raris in terra Chamaepytis vixit: In hinc hæc præsumant.

Iuno ac Augusto cum floribus, succedente mox faciam viget.

Engurina Græci, Latini lingua, Aaga, & quandoque Alaga vocantur. In Officinis hæc

Chamaepitylis



Chamaepitylis



In America, Tus mexicana: Italia *San. Chamaepitylis*: Hispania & Lusitania *Pitula*. Apud Germanos *Wegge mitz wege*: In Belgis, *Wegge*. A Gallis *San. mechole*.

Est autem Chamaepitylis, ut ait Galenus, in sicco et arido, in calcificatione vero succum, expurgat aereis viscosis locustis ac remanentibus sanguinis in vino pota prodelli meritis cum opota, cum melle appositus dicitur: vnam inquit. Ex hydromelle decocta quadragesima diebus Heliudicos, ut fertur, sanat. apud Heracleam Ponticam, penes se Anaxidoto, aduersus Accuriam ea videntur.

Palis huius cum fico in pistillo sumptus alvum emolliit, marmorum dantibus dicitur: valentia glomus et loca putredinis sunt cum melle appositae. Et huc quidem principis prior praebet, reliqua duo protra vna obtinent, sed non adeo efficacem, *Doel. an. dicitur.*

De specie Chamaepitylis *parvula* et *Archeyl.* *sub altera. CAP. XXVII.*

**S**YPERVIT prout legitur Chamaepitylis et alia duo ipsi similes, sed Spuriae vocatur. vna maior, altera minor est.

1. Maior huius septem unciarum prioris Chamaepitylis, quam tenuior, sed tamen durioribus constituta, et folia firmo referuntur quibus huius subinde extremo margine acutis hinc modo in eadem conspicitur: flos similis, sed colore purpureo. Siccata in singulis calycibus quatuordecim



*Chamaepitys sparsa* prior, sine *Aschlyfoliata*.



*Chamaepitys sparsa* densa.

*Chamaepitys sparsa* sinuata lobata.



radix hepatica, crassa, fibrilata, gustu amara, Cichorij radice hinc maxime differt. Tota hinc herba admodum hirsuta est, & odore grato pendula, hincque grati, aut ad *Chamaepitys* accedente.

Altera rariore proceri brachibus ac tenuibus pediculis, foliisque interlegitimas primæ quoque sine similitudine, sed sicubi differunt, quo candidi sunt, & insertis Lamiæ colorate, ipsi tamen longiori & patentiori, quædam inde coherent etiam similia. radice medicosæ castissima.

In montibus Hispaniæ regni, cum & in Narbonensibus Gallis, in otivæ, ac sibundæ sicut agrorum marginibus inaequaliter, Minor quoque ex Hispania ad Belgas peruenit, ubi locis inculta procerior cum Carolis Clusio refert.

Æliæ ac Augustino utraq; floret.

Fuor



Dicitur autem in *Phallosae* istud, non quod ad *Phallosae*, sed est herend nam demum proveniat, aut abentibus illis potius, nam, ut dicitur, toto anno reperiri potest, sed quia excrucians pullis haec herba statim refertur usum in operose sic dicitur tamen varia, & invenitur abena. Lascia signatim extenuat pullosque nonnullis uti autem octiduum apertis, interposito tempore sponte cessant, & creberrimè herundina, velibus. Cornet. *Celidii* lib. 4. cap. 6. Vnde (ut dicitur inquit) locum fibulæ per parentes ad restans herba, quod per se sine cap. Afirmatadem Anthonia De historia animalium lib. 6. Pullosque herundina, aut, ad hanc accendit oculi, si qui stitudo eos vexaverint, manifestat, & curat, si viti postea plantæ recipiant.

Chelidonium autem in arboribus dicitur calcifera, & dicitur, & ordine quidem tertio, atque viti valde exopt.

Sacra herba ad usum accendat viti, est, abtrogentur & dicitur crassa, que circa oculi pupillam haurit aciem obtundentia: Et quidem, ut Diof. ait, namque valde est in molle decodis.

Radix sepe morbo medetur, & profectam cura si bene, ex se illa obstruere non oportet, & ab infans sic & aciem libet. Marducata eadem radix dentium dolores sedant ferre: pedali & viceribus superius cum vino.

Inveniamente efficit, inquit Diof. castalherda, atque in sole sicindat.

De Chelidonio minor. CAP. XXX.

Chelidonium minus.



**M**INUS Chelidonium folis viti fibro-  
cauda, laniatis, glabris, ac respiculisibus,  
quàm herba majoribus, tenuis, brevis, hauri-  
que plurima parte procut bates cardiaci foli-  
culos protulit: lances, quales Ramo cu h. quibus  
& velut hauri exiguntur ex *heribus* conge-  
stem caperulum succedit, veritas magis, radix  
è ramulis fibris densat, quibus adhaerent ali-  
quot protuberantia scilicet quatuor, in quibus magis  
radix stitudo.

Nasosur inprimis, viti viti, ac frobet, sed  
sua, loci viti ac hauri viti passim valgan.

Circa Martii Calende erit, postò postò dicitur  
Aperti dicitur incipit, Maio, incipit post, postò  
dicitur dicitur, vel dicitur dicitur dicitur.

Radix erit magis, Laurus Chelidonium minus, &  
Hirundina minor appellatur. In Officinis, ac  
in viti Scrophularia minor, sicera minoribus  
reperiuntur: In Italia *Passiflora*: Germanis  
*Frugum* frons: *Chelidonium* signi *fructus*  
frons *Chelidonium* *Chelidonium*: Galia *Chelidonium*,  
postò dicitur: Belgis *Chelidonium*, dicitur *Chelidonium*.

Potest istud ab *heribus* viti incipit incipit  
se frum, nam circa dicitur hauri viti viti viti  
tam apparet incipit, sed tamen postò quàm  
dicitur dicitur dicitur dicitur.

Chelidonium quodque ac sicilicet facultatem ac istud  
Chelidonium obtinet, ipso enim amore acris  
ac calidos, Raro viti potentis potestatem.

Cum oleo, ut Gal. ac Diof. ait, viti dicitur dicitur dicitur dicitur. Sacrosanctum  
per viti viti, aut ipso inpositis, caput per ipso dicitur dicitur.

Posterior autem ad hauri viti dicitur dicitur viti cum ad hauri viti viti viti, quæ  
viti dicitur, cum viti, aut laborans viti: per viti dicitur dicitur viti viti, ac dicitur dicitur  
viti viti dicitur: Vnde etiam qui dicitur viti viti dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur.

De Scrophularia. CAP. XXXI.

**S**CROPHULARIA, que maior cognominatur, que dicitur viti, ac fabende viti ad  
viti dicitur dicitur dicitur, color: et dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur.

Scrophularia.

Benedicta aquatica.



ha ab vna vlti in getaculo ſemper bina, contra ſe poſita, ſita, acuritate, per margines emanant, vnaq; vltima nitida, ſed riuosa, nigrota, & hinc de quaſi amalle vertita, ſua purpurea, ſed ſi in ſupremo alarum partib; colore obſcure purpurea, forma magis caſſides ſunt et prominenti; rotunda, ſed tamen acuritate caput ſiſtente ſiccitate cognam. radix alba, vltima nodosa ac tubercula multa profert, & aliſque vt plerumque riuat, quandoque ſiccata & progerminat.

Siccis agrorum marginibus, in ſcrobibus ſicis non vtrò procreat, ac in ſyluis.

1. Hinc vtrò & alia caula, folia, floribus, capitulisque ſimilitudo eſt, caulis quandoque paritè craſſiore; folia enim ſubinde cognam miora; radices vtrò ſuaſiſſimas nequaquam nodosa, ac tubercula eminentia habent, ſed ex multis tenuibus ſiſtis conſiſtente, quibus à ſuperiore poſſibilem differentia eſt.

Hinc vtrò aquas proſto emittit, ac ſecus ſcrobium, in uolentibusque marginibus, ac ſuſiorum ripas in aridis vix reperitur.

Vtraque ſiſto ac Auguſto cum ſole vige, ſemen inde matureſcit.

2. Proceri poſſim Scrophulariam vocant, Maximi cognomen aduecant ad diſtinctionem Chelidonii inſiſtis, quod dicitur Scrophularia maximorum dicitur Appellatur vtrò & Mallemotia, Fereſita, Calliſtrachia ac Geſchama, Quamquam, & riuat, (ſed ſe purpureſcentia: Italia, Scrophularia: Gallia Scrophularia: Belgia, & riuat, ſunt. Non eſt Galicopis, ſine Galobdolon, ac dicitur enim procer alio odore grati, quo Galicopis praedita eſt.
2. Aliorum Benedictam aquaticam ſicis nominalli nominant, per eam tamen cum *alyſſa*, ſine Benedicta conuenientem Chynicion alij affirmant, quo dicitur Diocoſtoſide folia deſcribitur Plantaginibus, cum euſula dicitur reſpoſident: Etenim quoque non herbare, quae Clymaei Florae eſſe tradit.

Belgae hanc *Wachtſtraem*, & Sarda Antonia herbam ſubinde nominant. Rocellus (ſi non fallitur) Scrophulam vulgò Gallorum appellari ſcribit.

3. Vtraque vtrò ſicilitate calida ac ſiccata eſt. Prior ad duros glandularum tumores, quos Graeci *galeſti* Latini *ſtruma* vulgò & riuat appellatur, & hinc vtrò ſicis cum dicitur proceri proſede ſeruat. Nouaſſi, vel caſſo appetant, vel aliis getacum ad ſiccitatem conferre ſunt.

re teneri prædicant aliq. radicem cum haryno in fusto cu fani Joco hanc infolant, sed hanc mta ad dies sex sepecurant, mox lenes aque decoquant, percolentur affertur, quo strumas & haemorrhoides tollunt non aliq. succis.

Altera sola siccificata in prociis ad petras, ac ferida viscera per hanc mta possit se feruntur & cum melle succus horum decoctus.

De *Coryna*. CAP. XXXII.

*Coryna minor.*

*Coryna major altera.*



**C**ORINA duo genera Theophrastus refert: majorem, & minorem. Dioscorides tamen addit medium quoddam inter utraq. Posteriori nunc circa hanc in notitiam mentis laborantur utiq. has, utralis alio pro *Coryna* ostendentibus.

Quae pro prima legitur *Coryna* habetur, complures à medio sibi hinc caules prae se ferens lignosus, setis aculeis, interdum striata. folia ex vasis pallent. sicquarum, oblonga, veluti *Clitax*, sed simplicior, duploque v. plurimum maiora. Floctuli ad striam siliqua altera, pediculis tenuibus uti dicitur, lutei, Engem similes, qui in pappos vertuntur, quibus subest semen exiguum, et filicosp. mta caulis non oblique sibi perennis.

Tota planta cum succinate quadam grassolens est, hirsuta, pungis, & lenes glutine occupata.

Solo maritimo, & austro celo gaudet, circa Adriaticam flumina, cum & circa Romanam, & Florentiam reperitur, sic Narosmeri quoque Gallia, hanc pascit. Montebello, dicitur, nunc in carum marginem. Nunc nunc in agro Valensino & Marcano Hispania, & supra Olyssiponem, ubi Carolo Clusio.

Altera *Coryna* maior, ab alijs pro prima specie indicata, folia habet, quoniam si perennis, hanc, veluti *Verbascum* sive *Primula* Vera, sed tamen in nota, nigrescit, & longiora, sic. molliora, cunctis rotundi, setis aculeis quoque vel striata, & ipsi longiora quadam aspen, in ramulis densitate, quorum siliqua aliquos floctuli ad huc oblongi, straminei coloris, nunc, aut ex luteo nunc sibi purpureo dicitur, & in pappos vertuntur, nunc ramulos hanc mta in obliquum spargit. Et hinc Hispaniam quoque, non admodum tamen in grasso colere, perditis est, sed haudquam glutinosa.

*Coryza media.*

*Coryza minima.*



*Loetis apertis ac aridis frequens, petrosis & veteris cuius mares non testigia.*

*Mediam Coryze grass curdola quoque lanugine pubesca, ac grass odore vixillum quiddam ferat folia eius oblonga, dignum lani caules teretes, ac rosti, cubito altiores. Flores in salsigis ramis lateris Characmoli similes, sed non modo orbiculati, sine disco tantummodo, verum & umbrae luteae, & paulo rubrae, qui & in papposam lanuginem abeunt. radix fibrosa tenuis compluris.*

*Loetis gaudet humidis, locus profusus est, vel etiam rchides aquas in squam fedi no obtula.*

*Minor Coryzae grass est herba, palmum, set doducentis alta, incana quoque ac lanuginea, odoreque carum se ferens in his caulis sine floribus Characmoli modis orbiculatis, ac Triacetis similes, & colore luteo fibrosaque, qui via alacrem, in lanuginosas ac molles pappos percurrunt. radix terrena est.*

*Humida ac rigua loca chebernitae erit.*

*Præter hanc verò & alia ostenditur innot, canle cubitali, vel altiore, assurgens, quoque grass est, parosis, heroso, anq. glutinoso sic solam gustu vesit heruac, sed lanuginea, ac proguat floscula, ferendum ratiatis tereret, lutea in lanuginem abeunt. radix tenuis. hanc, quia priora, & detrahit est.*

*Apud Hispaniam agro Tolitano, & in Narbonensi Gallia pleriq. locis reperitur scribitur.*

*Floret Coryzae plurima aliam parat, sed tamen prior maior, & aliam parat sub Aquamini tempore postillam in.*

*Essentia Latine Coryzae, Plena Camelo. Gasi Policanam & Policanam appellat, & differt tamen à Psyllo, quod & Policana dicitur. Officinae recognoscunt sunt Coryzae.*

*Priorum nominum illi apud Hispanos varicos pulgeros appellant, alteram mustem ad Bocharum Dicocondi fatis qui referre thodent, cum qua similitudinis cum rugam obtinet, ut pro ea haberi soquant. Extant mares Coryzae inter spurias voces multae appellaturae, ut, *causa Coryzae, Acaia, mactigra, polica, lyche, Policanum, Apocantice, dicitur, dicitur, Inybatu, Miltara, Delinaria, Febetiga, Flangrosa, Mulicras, Billa, hanc autem marcm Theophrastus appellat.**

*Mediam Coryzae in Germanorum plerique Silymarum & Doebemary vocant Bohemi Blay trasit.*

Minor Theophrasti forma est: alia Panson, vel Libanotis, ut inter notias appellationes reperitur.

Ceterum Cypripes octies taliter sunt ac ficus, media tamen, & minoram prior, cetera infirmiora.

Folia ceterum, quae vitibus praesertim, cum vino ad meritis ducuntur, & ferris cicindidis, & ceteris vitiis delectata, regum morbum, dysenteriam vero, Dyscoendes scilicet, & Comatulas ex aceto potui solentur. Decoctum horum in infusa vitium molitur. Succus ex oleo efficitur: homo tibus obliuatur, capiti dolenti hoc modo illustratum fit.

Suffusa ac subfirmata herba se pterea fugat, valere abigit: pulcherrima. folia serpentium plagi, & tubercula conuenienter imponantur. Idem aditer: Coniferis Galenae.

De Cynogloss.

Cap. XXXIII.

Cynoglossum abique flore.

Cynoglossum cum flore.



**C**YNOCLOSSO folia sunt oblonga, lata, carnea, molli tenuisque admodum heruginosa pubescentia, acutis lauis: cauli vobis ralis, rotundus, & ipse aliquatenus in carnositate, in alia durior, circa quas ordine digesti floculi puniceo colore purpurascunt: si coadent singula quatuor simul cohaerentia firmata aspera, & lappurum modo velut inhaerentia, molliu autem que filula exiguas, non raro duras ac pungens, radix crassa, & cili, al te dimittitur.

Aeneis, montibus, ac desertis locis, si bunde etiam montibus haec mentibus gignitur, iuxta fontem, nec ac vna. Variat autem non raro huius magnitudo pro regione, in quibus nascitur, diuersitate, ac echi inuentione: Quibus filis sequidem in regionibus multo quibus in Germania amplior, in uerbis quoque folia erant, sibi vna etiam inuice, hiansior, & angustiora est folia, quae quod Creuata in quibusdam cognoscuntur.

Viget caulis cum floribus lano ac lano, qui non primo, sed altem, vel etiam tertio anno de manu affertur. Primo etiam anno folia tantum in odo Cynoglossi gerunt, canle destituta, atque hoc tempore Diol. obferata, caule vna traditur: Sed non minus in huius quibus in Dedarum descriptione lapsus est, quod nullam florem, sicut quoque forte contra ventionem seriptum reliquit.

Græci Cynoglossum, & Cynoglossum dicitur, Latine Lingua canis. Piram est Cynoglossum, quibus cui species colitur, sed quae de pterea scribit, ex cap. de Baglisse apud Dioscoridem

De herbis  
Lapide.

Plum. in  
Lapide.

massa apparet. aliam ut, lappas marata sint, quae vixit est Cynoglossum dicitur.

Latine verò & apud Apuleium & partem inter nothas appellatur, & ab aliis sicuti nomina, ut *Thapsus, Laminaria, Scutellaria, Sic* Splanchei, *pellucidum, sicut* *capitulum, scutellaria, scutellaria, Carina* Lingua. Macedonica, Germanice est *Harbjasgrri*: Belgice sicuti *scutella* Hispanice *Lingua de perro*: Italia *Lingua de cane*: Gallis *Lingua de chien* Anglice sicuti *scutella* Bohemice *Špýšajř*.

*Diocorid.* Acaulis lib. 1. & Tenacibus terribilibus. Lemnium & Cynoglossum eisdem esse suspensentur viderat. Ad curam continentem subducendam non parum faciunt, Galenus in lib. de simp. medic. facit. Orisibus, ac Postibus, qui Lemnium sicut Lemnium inveniuntur, Cynoglossum praeritio aut suppressio nocent. Ronsdelenus Gladium sicut esse voluit, sed sicut sicut Gladium à Satius perquam rugosum differens est, ut lib. 3. cap. 17. dictum est.

Ceterum Cynoglossi radix & folia, cum medicis temperantur proinde quaedam frigida, temperandi quoque vim obtinent.

Altera, inquit Dio. decoculum herbarum cum vino emolliat alopecurum (quod videlicet acris haerens cutitur) cum vetere adipe fuso sicut peracora, & ambrosia medicant. adole Dio. & curam moribus, quod foetis à totius sublevarit proprieque possunt. Radix sublevaribus cocta, & si bibita, internitum, sicut accutum haerentis dicitur delentur leniter ferunt.

## De Eupasia.

## CAP. XXXIII.

## Eupasia.



TEN VIT ac cognis est herba Eupasia, palmam ultra, caulis tenuis sublevarit nomen: foliis perquam rugosis, ambrosia ferunt, cura quae foliis albacoris apparet, latus ramis ac purpureis punctis maxima nocent. radix tenuis, fibrosa.

Nascitur locus herbosus non otioso ardu, sed incultus, sicuti agrorum margines, ac via, non modo in ipsa via. Augusto ac Septembri mensi passim fleret, autem postillimum agros datur, & colligi oportum est. colligitur tota, ac restituta deinde reponitur.

Eupasiam à malis arboribus Medici appellant pestiferas *leptosias*. Euphasiam nominant Eupasia & aliud *leptosias*, ipsam videlicet Cynoglossum. à nullo vult Oculans, & Ophthalmica, ab effluo vocatur. Germanice est *Augen wass* Belgice *Augen wass*: Italia, Hispanice, ac Gallice Latine nomen ferunt: Anglice *eye wass* Bohemice *Špýšajř*.

Calda autem & sicut haec herba, sed tamen magis sicut quam calda.

Ad oculis plurimum commendata. potest & sicut & quomodo assumpsa, videndi potestatem conseruare, adagere, debilem ac deperitum soltuere. Datur autem commodesane in palatrem intrinsecus, non vult sicut sicut pari pondere, & nonnullo mero addito, qui interior est sicut Myrritha tenuis ac odoratus.

corax, quibus sacchar tantum additur, quantum est commata sicut pondus. Si in sicut marte cochlear aut per se, vel cum exiguo vino exhibetur, mane corpus acies, & quidem per commata non modo dicit, sed & mensis quoadque.

Fit & ex Eupasia vitare vindicatur tempore, curas vult sicut etiam oculi remanescere feruntur, asarum omne aculeorum impedimentum, visusque deficiunt, praesertim pueris crudisque haerentibus scindandibus, ut sicut est Arnoldus Villanovanus.



*Eufrafia alera*.



QVAM Eufrafiam aleram vocant cortigit, cum leguntur hanc quaquam committit, nisi quod finititer ac illa viscositas, & ramofa fit. Prode hinc à radice viscosiores cauliculis diducuntur, nonnunquam etiam pedem fuperant, in ramulose etiam compluribus diftributis, quibus folia adhaerent parua, oblonga, angulata, acuminata, decursum et plurimum reflexa, ac veluti dependencia. Stipulae fecundum folia caecum colore subermes. radice tenues dimittit fibras.

Vignofts, non aridis praesent lectis, in pratis fubinde ac umbratis occurrunt.

Isle ac alpeos pòst mensibus cum flore confpexit.

Eufrafie alerae nomen, cui haec sibi obtinent, dici nequit. Gnapogonon non esse (quod plerumque volunt) esultis à radice viscos, non plures, etque haec quidem nec generalitas, nec calamo similitudo, edenda.

De temperamento aut facultatibus alio nihil, quod adferatur, occurrunt.

LIBRI SECVNDI FEMPTADES PRIMÆ

FINIS.

STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS PRIMÆ  
LIBER TERTIVS.

PRÆFATIO.

PRÆCEDENTE libro, quæ ab elementis A. B. C. D. E. incipiunt, cum prorsus sint finalita.  
dicitur conclusio, descriptæ sunt. Hoc vero libro succedunt ab F. G. H. I. K. L. nominibus sui  
iurium habuere vni cum suis effectibus atque cognata explicanda: Quorum prima Filipendula.

DE FILIPENDVLA.  
CAPIT. PRIMVM.



Filipendula.



Filipendula maritima.

**O**BLONGA folia Filipendulae sunt, ex segmentis compluribus, longis scilicet, & ambitu  
fermis compacta, velut Potentilla, sine Argentine, densiora tamen, & græca, limba-  
tis virentia, minora, tenuisque diuisa. caules inuisi hinc asurgunt frusti, dum subinde bipen-  
dulae, in ramulos festigo diuisi, quibus insidens cornu ex thalictro licet foliorum candi-  
dia, acriter odorent, instar radantis stelle flammibus in medio concoloribus: succeda fer-  
men squarrosam, veluti in rotundam capsulam coactam. radix nigricans fibres hinc inde  
spargit, quæ in rotundis caputis, ac nodulos extuberant instar Prænosæ formæ, quibus ta-  
men minores.

In aspera, arida, ac petrosa apud Germanos ac Britannos humiliter exit, in hortis lan-  
ticis, ac altius exultat.

Barro ac luto in flore est, succedente non ferme.

Vulgò Filipendula, ac Filipendula: à Nicolo Mirepo non nisi ad appellationem Germa-  
nis *Stee strucht*. à Sæo frago rubro, item & *Thilgart*. i. Milkisham syluestre: Italia, ac  
Hispania, nec non Gallia Filipendula.

Apparet esse à Diosc. Oenanthe appellata herba, quæ dicitur ab Oenanthe Syriaca in vestris  
 dicuntur fœdita. Describitur autem Oenanthe herba à Dioscoride hæc quædam verbis: Οίανθη *Oenanthe*  
*de foliis ipsa aliis respicitur dicitur si admodum est tenuis respicitur admodum apparet si dicitur*  
*diversitas, plerumque ut dicitur Lyonesis, respicitur hæc est Latina verba*

Oenanthe sola habet peltatæ similitudinem. Roræ cordatas: caulem crassum dichotomum,  
 fructum vero veluti Amygdali radice in magnam capsula multa rotunda habentem.

Cum qua de his quæcunq; Filipendula simi respondet. Folium siquidem eius Peltatum, non  
 tenuissimum, quæ Peltatum: Dicitur remanere à Galeno agrostium dicitur tenuis latioris folij, dicitur  
 (si forma (peltatæ) similitudo, apparet, nam in interm, dicitur, ac nigra: folia albedine concolorata  
 caulis in sinibus ac penes ostia dactylorum sæpe non excedit: fœmen squamatum Amygdali hujus  
 abstrahit: radice à tripla in multas cetera bërât glande loca appendicem.

Pertinet hæc verba & aliam quædam Filipendulam in aliorum montium jugis reperiri *1.*  
 Lobelius refert, quæ dicitur in montibus, quibusdam in sinibus, Roribus in cacumine albacantibus,  
 et collibus in glaucis formis, folijs suspendulis in sinibus: cetera radices oblongæ, glandulose,  
 quæ non ex fibrâ sed ex oleo præterea adhaerent.

Mentibus & alia pingit, quæ appellat Oenanthes, quarum vna vel Roriboscitason, vel  
 ex præcipuo, reliquæ ad hujus generis referendæ, quod Tancum o dicitur in scripturis appellatæ, &  
 propter rationem non exiguam formam committunt.

Ceterum Filipendula, ac præcipue eius radix, manifestè calida ac siccata est, aperientis, &  
 abstergeat, cum nervosa tamen adhaerent.

Decochum radice vitæ, & calculos pellic dyfusa ac vitæ (siliis dicitur laborantibus præ-  
 desit. Sæpe de Oenanthe Dioscorides scriptum reliquit: Radix a vino vitæ, inquit, sili-  
 cido coarctat.

Mentibus Sybariticæ, ac Simoni lanam stipulam roribus adhaerentis modum contra-  
 hant committunt, quæcunq; hæc quæcunq; perhoram valde vitæ & vitæ roribus, &  
 eorum roribus, nam nonnullæ hæc committunt, præsertim addito fœniculi fœmine quæ-  
 que affirmant.

De Regia Præ. C A P. II.

Regia præ.



**C**um Filipendula simi simi admodum acuatam  
 hæc habet. Folia caule planibus quo-  
 que collecta, sed Agrimonie similes, dura,  
 per omnia cretata, utramque parte mallicant, si-  
 perione rugosa apparent veluti vitæ. caulibus  
 tres aut quatuor pedes, vel ultra fistula ac-  
 tollunt singulis, nam, colore è rubicundo  
 purpureo, in cuius fistula complures disti-  
 cali intermixti colorantur candidi, sicut o-  
 leosus in his Filipendula sentans parva, roribus  
 quatuorve simul eriguntur, quæcum  
 caputem efformant. radix subest odorata,  
 in duresis tendens, sicut agrostium, lævitas ob-  
 scura fibribens.

Sicut roribus, & folijs aqua habentes, nec  
 non fœniculi in part, tunc & in ipsa præcipuo  
 gnam quædam aqua ac humidis.

habo ac Augusto cum flore: postquam èm vi-  
 get, est tamen è fistula fœnis reperiri.

Recentioribus Regiam Præ non erat, &  
 non nisi Capis barbaris: Virescent quæque à  
 similitudine foliorum cum Vitis Germanis  
 Quibus. Et autem alia ab Hirci barba Regia  
 respicitur dicitur. Et igitur vulgo simi appellat.  
 Galb. Roribus de alio. Cum Rhodora Ph-  
 ay similitudine aliquid obtinet, sed tamen  
 eadem esse affirmant non possit. Quæ in Gal-  
 b. inquit, lib. XXI in cap. XIX, Rhodora vocant,  
 eandem habet virga sicula modo particu-  
 larum.

cularem: folia vicia, in modo crassida, eodem procedente tempore tota rubentia, flores argentei. Erit quidem caulis huius ruggi oblongi similis, & circa exortus foliorum quasi geniculatus: folia irregularia (legumina videlicet rotunda) amplexa, tri Vertice, serrata, sed non in medio, verum fimbria alba, quae circa Autumnum tempore, tandem rubentibus caulis, etiam ruborem cito penitus contrahunt.

Ceterum herba Capri facultate frigida ac sicca consistit adstringendae potestatem manifestam habet.

Radix decocta, aut in pulvorem contrita vix dydymonia, alba & sanguinis vix quoque succos componit.

Flores in vico coeli quartano tollere circumsi fertur.

De Thalictra.

CAP. III.

Thalictrum nigrum.

Thalictrum minus.



**F**loris, quod ad Dios. Thalictrum referendum paucior, duo occurrunt genera: Maius, ac minus. Maius non vixit in modo, sed aliquot nominibus differentes species complectitur.

1. Inter maiora primum, caulis in articulis bipodalibus, ac ramosis, ramorum, finitum, quasi angulatum, articulisque aculeatum, articulisque cassum, subinde et pinnato colore purpureo tinctum, non tardo herbarum colore: folia ampla in multas particulas lata, sed tamen oblongiora, deorsum parum planiora, uterque utrobique ad medium usque denticulata. color foliorum figuratur superius, inferius dilatatur. flores in fasciis racemosis, et quorum masculis filamentis pallide candidant, masculinam veluti lanuginem effluantibus, sequitur valde mangulari et rugis, in quibus fides teres, obliqua & lassa radix est, lareque serpens, & plerumque loca gemmarum cisternam, superius in multiplicans.

2. Hinc sterile alterum, sed folio latioribus vitibus, & minore: cauliculis rotundioribus, nullaque strias habentibus.

3. Tertium Thalictrum caulis praeter alios, crassior, pinnato non tardo colore purpureo: folia maiora, lobata, teretibus colore viridibus: lassa folia florum flammata, radix, et alterum, serpens. Graecis istud odore, quibus reliqua.

4. Quam, de quibus dicitur Vribea, quae paucior reddunt, lassa tamen superius rotundiora, et quibus, reliqua primum in fides et fere.

5. Minus Thalictrum, ordine quantum, cauliculis est tenellus, denticulatus: folia parva: de quibus

foliis uero, i. luto largiantur quorum flumina, unde tenui magis, ac densa est. Odor huiusmodi quousque, uti primum.

Primum in utraque Germania, subinde in pratis siccis frutes, & rotulas occurrunt, quandoque etiam ad marginem agrorum locis vrbicosis.

Tertium ex Hispania in Belgiam venit.

Quartum in campis siccis maritimis locis apud Belgas reperitur aliis etiam in montibus, ut in Baldo in hoc monte, in quo produr fertur.

In Italia ac Anglia precipue horum, non raro tamen vel penam, vel ferrum, sub hyemem herba perit, radice uero subsistit. Vnde nonnulli produnt germina ac folia.

Inter Accretiones nonnulla Pagarum appellata, quasi uigasse, id est, Rustum, Vnde & à plerisque Rara palustis, alij Pseudo-Rhabarbarum, ac Rhabarbarum Monachorum vocantur, propter radicem luteam colorem. Sed nec morum uideatur emenda, admodum probanda. Ventilator coram apparet, qui Thalictrum esse indicat. Quod Dioscor. folia trahit habere Coriandri pinguis, & eadem Rura, in quo folia. *Thalictre*, inquit Dioscorides, *folia* *resperditur* *super* *herb* *Artemisio* *si* *quod* *est* *inter* *herbas* *in* *quibus* *est* *radix* *id* *est*, Thalictrum folia habet Coriandro similia, pinguis tamen, & aliter raris crassitudine, in quo folia.

Folium autem horum à nobis delectis reperitur minorum quidem Coriandri primis foliis non incepte comparari potest, & uisum potest pinguis ac crassius, ut hoc crassitudine Rura gradiente respondet.

Dicitur uero *Thalictre* etiam *folia* *si* *quod* *est* *inter* *herbas* *in* *quibus* *est* *radix* *id* *est*, Latini nomen ferunt.

Coriandri à nobis descripti Thalictra maiora, ac minus calida, ac uia refrigeria apparet.

Folia coram oleibus adhibita, alij uero uisum sal commovent. Radice decoctam uisum potius praestat. Deo Thalictrum folia tria uera uicta ad curatorem produnt uisum: *Gilicmasidit*, cum morum crassitate esse.

De Fumaria. CAP. III.

Fumaria.



Consert omnibus quibus uel scabies, uel alia quatuor anni sunt, in modesta est, tam & hoc ueneris laborantibus hepatis & bene in ab uisum liberat. sanguine in partem uelle non raro & quartana laborantibus conducit.

**V**ALENS tenax herba est Fumaria casti-  
cathica crassa, ueluti gemmata habundans,  
cunctis, uix siccum, uel ad riuale fulciantur,  
ascollantur. Sed in luto uel glutinam declinat.  
folia circumsuapae euigant, per margines  
dilatata, ueluti Coriandri, quae similes cum caule-  
lo fulcandulo colore uicem. Flores speciem de-  
gressi uigant cum a subha ramulorum ex parua  
rubent, uel uel succedunt rotundis, mutatis,  
in quibus siccum parum. Indes uisum uel de-  
mittit.

In agris frumentatis inter bosca, & post  
messum in uicem ac hortis, aliisque perinde cul-  
turalibus.

A Maij initio in multis saepe uisum cum  
siccis reperitur, utique tunc colligitur, ac re-  
poti maxime conuenit.

Radicis uisum, quatuordecim annis uisum:  
Lucus fumaria. Plano Caprea In Officina  
munitur. Appellatur uero & *apud* *idem*, *alio*,  
*apud* *idem*, *sub* *idem*, sed uerbis uisum uisum  
uicem Germanis *Fumaria*, *Thalictre*, *Rura*  
*grasses*, *Italia* *fumaria*: *Belgia* *Thalictre* &  
*Danubius* *Hispania* *Fabosella* *Gallia*: *Ang-*  
*lia* *fumaria*: *Bohemia* *Polignata*.

Facultat uisum Fumaria haud calida, ut ex-  
queat, sed sic refrigerans est, & abque uisum  
siccis, apertis, & per uisum expurgat.

Dicitur decoctum herbae, vel quod ex eadem succo Scirpium conficitur: vtilis est & aqua destillata. Decoquuntur fabae cum lacte fero, hoc modo sub facin Veruac. albus montibus fructuosa prodit.

Paulus Aeginaeta vena biliosa liberaliter promouere ait: In ceteris obstruente lingua, que mediis hincisum consistit, & ab utraque linc.

Dioscorides succo in Fumaria (trae que in hordens nascitur, & pincta addit) caru gustum Exare curare, aut, pila qui pangunt prauis oculis, ab eo tunc renari, prohibet.

De Fumaria altera. CAP. V.

Fumaria altera.



ET haec admodum tenuis est herbula, sed aliter quia prior Fumaria, cauliculos proferit perquam ramos, & circa eos folia exigua, tripartita linc inueta, & diuisibus partibus ac tenuissimas, quibus propè adhaerentibus adhaerent, ac sese alligant: stoculi circa fastigium albedi, normisil, sed dilute admodum, subleuantes, & occidentibus exiguis ualulis, in quibus feruiculis radis ramos ut prius altera deformat. Tota herba è vitace quoque multum voluit fumaria prior, cuius è modò colorum, sed è laporem rament.

Circa septem, feruiculis, agrorum margines, quandoque è prope veteres muros erit.

Prouenit, hanc, vegetior eodem, quo prior, anni tempore.

Ex Recemonesibus nonnulli hanc Spith vocant, ac Corydalis herbam esse existimant, cuius mentionem facit Galenus lib. xi. de simp. med. facul. ubi Corydalis tant facultatem refert: At Corydalis herba. simaria apparet si per or, que inter nothas voces, ut semp situm, Corydalis nuncupata reperitur. Pliny prior Capros castus hanc esse videtur, quam Pedes gallicanos vocari refert, nam super or, Capros altera hanc est. Plinius sequens dicit Capros de ferbis, lib. xvi. cap. xi.

Prima, aut, quam Pedes gallicanos vocat, nascens in parietibus ac sepibus, ramos tenuissimos, sparsisque, flore purpureo, videtur. Similis è nomine è effluo sed alia est Capros, fruticosè, prope montes, sedes Conuadri, ceterique colones, hanc purpureo. Nascitur in hortis, è legibus hordensibus.

Facultate autem priori vulgo simaria similis hanc existimant. Plinius utriusque similes tribuere videt. De prima è feruiculis Succus adhaerentem deformaturque in medicamenta oculorum additur: De altera verò, cloniam facit: mentibus oculis. Martholus praefere Spith aut, aduersus colicos dolores, hanc vitiis affumant, aut arida in puluissimam tritam cum vino bibant, pluribus ceteris è ferbis.

De Geraniis, ac primis de Geranis tuberosis.

CAP. VI.

GERANIORUM complures reperuntur species: Ex his duae Dioscori, Tuberosissimae magisteri maior folio.

Primum Geranium, Tuberosum cognominatum, multis herbariarum cultu in agris, in rebus, & alioquin in ramosis folio, ut Ravennatibus vitiis, in maiusculis sunt locatis, ad Ancusiam cuiusdam accidentis, ramos carum: flores in fastigium ramosissimum alio elegenter, sed dilute tuberosi, exiguis ramos perissimas, oblongum, carum, apertissimasque, vitiis grau rami, post è stylium relinquunt, vnde nomen. ramos crassa, ramosa, et hinc, non absque normalis fibris.

In Dolmatis, Illyrico, normalis è alio Orientem versus Prouenit loca ramos, nullo ferunt, aut: apud Germanos, cum è alio hermale est.

Tota

Germania tuberosa.



Ped. Columbiana.



Tota prope modum arbore florentia.  
*Papaver Crispum*, Latine Germana, vulgò Ro-  
 ftrum gras, et Rostrum Coccoris, à similitu-  
 dine rostri gras ac Coccoris: à novissima quoeq;  
 Acus trochilata, aut Acus pallida: Bulb. Germa-  
 na, & restes de gras: Helveticis *Pice de cyprien*,  
*Pice del gras* Germania *Exochordis* Gal-  
 licis *Her de Cyprien*: Belgis *Opuntia* belg. Anglis  
*Rostry* bel. Bohemis *Opuntia*.

Appellatur autem aliud primum, vulgò Ger-  
 manum Tuberosum: à roncibus quoque Ger-  
 manum Bulbosum, ab emittentibus in ro-  
 tunditatem radicibus. Dicocondis cuius est  
 primum, quod spuris vocibus *μαρωεις*, *μαρω*,  
*μαρωεις*, *μαρωεις*, aut echinatum  
 nuncupatum reperitur.

At tempore Germani Tuberosi radices cui-  
 que similitudinem parvos valdeque  
 Ediles esse Dicocondes refert, & diachma  
 pondere in vino potus, veteri inflammatione dissol-  
 vere. Plinius præterea referturibus se ab im-  
 becillitate huius radicem visideruntur: ha-  
 bitaque contra Phobum diachmatum eius in vari  
 cyathis tribuitur die.

De Ped. Columbiana altera Germani specie.

CAP. VII.

**A**LTERA Germani species, cui *Pedi* Co-  
 lombiana nomen, tota sunt convolvu-  
 ta, mollis, cruxga, ac innota. Malis foliorum  
 nitida, ramis intricata, cum dactylis, ramis gla-  
 bris, ut beneque ferrata: caulibus dodrantales,  
 fibris duorum dodrantum, ramis, nonnulli  
 ptili, humi repentes, similibus foliis cocu-  
 flantur, quorum aliam fistigis: foliis infi-  
 dent parvis, subparvam, ac postea capsella  
 minuta, pum capris modo robusta, sed et  
 tenuis & fibrosi.

Securitas, locustiformis, & non raris unctis  
 quocumque reperitur, non modo in Germania, sed  
 & alibi.

Floret cum aliis plurima & floripara.  
 Pedem Columbianum vulgò appellatur Ger-  
 manum *Zaubersack*: Quomodo frans-Belgis præ-  
 sentant Gallicis *Pied de pyrenes*: Germani tam hinc  
 dicitur *Pied Columbianum*: Dicocondis aliterum  
 esse Germanum: sed apparet, cum aliquot spu-  
 ritæ extant voces, quorum tamen pleraque ad  
 sollicitudinem aliquid, vel ad alias herbas  
 magis referende: videtur, ut sunt *βόρβολλης*,  
*μαρωεις*, *μαρωεις*, *μαρωεις*, *μαρωεις*, *μαρωεις*,  
 Coccoris, & Græcia.

Ad hoc genus videtur verò & referendum  
 Germanum aliud, quod à Colocotrono sibi ma-  
 simi Maticholis refertur: Cuius huius generis fi-  
 ra, mollis, herbosa, ac in plures chasit ramulos,  
 hinc et pum vñ Malis, cum subula, aut cum  
 Altilis, huius quoque referunt, aliquando ta-  
 men longior. Floret in summis caulis locum





Geranium hepaticum.



radice oblonga, nodis gracilib & candidis, aliis dicitur: Similitudo huius non modò folia, sed & caliculi hinc sibiinde profertur.

Herba vasa, ac ferientia, maceranda ac agnoscitur, ac non modò in ipsa arena, locis arida, ac inculta sponit natura inq; arboribus potius: nigra ac herbosa non erant.

Tota albae floriferum est: hinc tempore herba ipsa viret.

Germani hoc Geranium genus propriè *Stiefen* Kyssel appellare Belgij *Styans* hinc, ad est, Rostum Cocone. Dicitur etiam à nonnullis *Acus patris*. A Valerio Cordo Geranium hepaticum, est tamen non modò aliud sicutum ac cognatum, sed & aliam genus, quod *Podi Colerubum* dicitur vocant. Habetur verò aliud & à quibusdam pro *Plinij Geranio*: Quod ab ipso proprio describitur loco à h. xvij. cap. à h. xv. v. r. Geranium aliud *Myrtus*, aliq; *Mentha* da appellata. Simile est *Cyrene*, foliis intermixtis, & caule breviter, rotundo, superius & odore suo amaro. Sed quod pro Geranio hoc loco à *Plinio* dicitur, *Gracorum* est *Myrtus*, quam cum Geranio confundit.

Plinius in h. xvij. cap. à h. xv. v. r.

Facilitatem sistere ipsud Geranium cognitam aut exploratam nullam habet, velutur in se refrigerata, & si quantum esse refrigerata, est necesse sit ad refrigerationem necesse hinc, crassa quæ v. v. n. h. a. scortum dicitur. & ad acritas in amarum non incipit vire.

De Geranio Bartschivide.

Geranium Bartschivide.



CAP. II.

Geranium Bartschivide alium.



F. 1 GERANIUM

**G**ERANIUM sive Ranunculum horridum, ac paucopis Syllacisum stratum, foliis suis refert, quae profunde incisa sunt dilata, ambrosijque sunt: hinc et caulibus affertur complexis, teretibus, aliquantulum lanuginosis, et radicibus rubentes in quarum fastigiis flores qualesdam Ranunculorum, ac coloris carulei succedunt tenuem circumscripta, et modo quorundam cerasi prodeit stylis grauius in semina, radice crassior multo cerasi consuetudine.

Hinc vero & alia quedam species est picon similis, foliis paritè membranosis, cuius floribus elegantiori colore rubent, & quandoque odore, quodammodo mox hunc referunt, radice huius profundius, pluribus etiam filis & capsularum.

Sunt haec Gerania curata in quosdam phlegmaticis, ac loco eius in parte tunc colitur, ac plura potentissimum morositas. Virumque ad hunc non raro transferunt.

Flores assans plurima parte vident.

Geranium Betrachordes, quibus (longepedunculis) Ranunculus similibus radice non inuenit. Primum genus vulgè Ranunculus in Caroleam appellatur: Facilius Germanicus, ubi est, Germanicum Dei vocatur. Quod rubentis est flora. Actus medicata à non paucis dicitur, quo nomine de Geraniis Tabernicem appellatur, cuius flores est hinc similes & coloris & forma cōueniunt.

Ad Medicinam vltimè recursum accipitur: Facilius tamen quod carulei est flora, nigra, ut, in sananda valacibus efficitur praedictum.

De *Delphinio dactylis Geraniis.*

CAP. XI.

Geranium septentrionale, seu Geranium graecum.

Geranium montanum.



**P**RIUS haec non memorata, ac tradita Gerania, & alia duo L. Facilio describentur.

Vnum foliis admodum laciniatis & caulis in lanuginosis, & vti alterum à radice fibras rubentibus, floribus purpureis, ex quibus capsula grauius capitis ac sua vestra nascuntur, radice minus crassa, fere subitica est.

Alterum picon simile quodammodo, sed foliis, floribus, radicebusque paucis, ac simplicibus, uti est cerasi, cuius generis quosdam quoque habent folia cerasi in lacinis dilata. Flores in foliis purpureis, quibus similia capsula, grauius quoque capitis formam referunt, subus fixantur, radice intermixta utriusque raris coloris rubet.

In agrorum hinc, ac arua septentrionalis, ac feraces, quod picon est: alterum vero de in montanis ac finibus in Germania pignus.

Alia.

*Aliae flos variisque apparet.*

Notam Fuchius prior frangit ad est, collam gracilem, secundum Wherart, hoc est, lingua in summo radice apparet, à melle in distendo sanguis profusus facilitate. Mox nam Geranium verò & aliud dicitur.

Nullam autem, ut idem refert, ad sanguinem undequaque emanantem compellendam puritatem huc Geranium est, quod vicium de eius potestate ac virtute reformidat occurrat.

De Gnaphalio.  
Gnaphalium maritimum.



que posse non appellare propter distantiam colorem huc hauri perpetua conuenit.

Porrò Gnaphalium cum modice quidem adhibere refocet.

Bibuntur, sequit Diocorides, efficaciter sola cum vino visero ad dysenteriam.

De Gossypio seu Tylo.

CAP. XLII.

**G**OSSYPUM cubi alius dicitur fructus ramulis brachyotus lani folia, & quasi triangula Vitis aut Alceae indur fieri uocata sunt folia, sed minora, molliora, incana, ad contactum crum uulsa. flos huius in medio nonnullis purpureo, qui post se macula veluti palma mala relinquunt, Aristolochia rotunda ut ait fructus hanc ab indur, quo & manificites sponte fructuatur, an hoc autem vix cum semine, mollissimum, candidi sicuti lanoque ipsi hanc huius fructus cum non modo de pendere, quae ad velle in ea conficienda, utrum firmum oblongum est gustu hanc in fuit. radix ex qua, fibrosa.

Notum modò in Asia, Africa, et in Tylo Arabia, hinc Insula de qua Theophrastus, verum & in non paucis ad se septem partem rebus hanc diligenter, ac studiose colitur, veluti in Mada & Cidia insula in Asia mediorientis, et & alibi in calida Asia, ut verum frangit ponsibus.

Grecis est *gossypion* Latini vocant *Sesuvium* Officinis Larago, Bambus, & Coena. Italis *Sanfuga* & Coena: Hispanis *Algodon*. Germanis *Wannweil* Gallicis, Belgis, & Anglis *Cotton*.

Memini huius Theophrasti lib. 4. cap. 9. sed absque nomine, & eorum ut est: Lani gerant Tyli Insulae Nec autem videri debet, si fructus incoquatum, & in remota regione hanc nascantem arborem se putare, cum & hoc autem, qui plurima in cogitationem venerunt, hanc hanc *Wannweil*, id est, arborea lana à Germanis, ut diximus, appellatur.

De hoc

Gallipum seu Xylon.

Thymum  
salicaria  
montana

De hoc autem Thymum salicaria montana Pres-  
sione vero eadem utilitate, Tylon salicaria, &  
utroque ligno generis multum productum est: has au-  
tem folium habere simile vni, sed minus, fru-  
ctum vero ut quo lana magis odore nobis, quon-  
iam in tempore maturitatis sit aperta, ac laevam  
exerpat, ex qua vtilitas connotatur.

In Graeco exemplum, ubi legitur *Kapote di*  
*di Sylicar*: superfluo dicto esse: licet enim fructum  
sunt magnitudine modicos, quo lana, quo tandem  
modo nullam ferre affirmari poterit.

Plurimum decodit lib. x. ut. cap. a. Superius (sic)  
patet Aegypti in Arabia vergens gignit fructum,  
quoniam aliqui Gallipum vocant, plures Xylon, &  
ideo hinc inde facta Xylona Parva est, similibus  
barbata nec de ferri fructum, quoniam ex interiori  
bombice lanugo venat. Nec vtilis sunt in can-  
dore mollitudo persisterenda. Verbes unde facien-  
dum est Aegypti graniferae.

Lana hanc fructum, quoniam multa vtilitas sen-  
tunt, non est hanc vtilitatem referent.

Combustus cum non minus quoniam pappi,  
singulis profusum est vtilitatem esse.

Semina modica vtilitatem, difficiliterque  
resistantibus accenditur, & ad vtilitatem generali so-  
luta ad Venetum innotuit.

Oleum ex fructu expressum lentissimum est,  
alioque curam innotuit.

De Filagine seu Imple.

Filago seu Imple.



C A P. XIII.

Filago seu Imple.



Mol.

**M**OLLIUS quoque ac tenuioribus herbis Filago est, cauliculos promit tres atque quatuor  
 diductos, quosdamque alteros, circa quos foliis oblongis, angustis, vixque autem  
 molli ac traxiolo lanugine pubescentia: floribus in fastigiis cauliculis in eminenti luto  
 pallentibus, in pappo tandem euanescunt, quorum posteriori nam, longioribus inflexis pediculis,  
 priores sepeant. radix transversa consistit.

Huius & alia speciei cauliculis foliisque incanis, mollibus, ac lanuginosis, priores similes, ve-  
 rùm flores non ita tenuibus, sed secundum calendas ordine dispositi: postea sola exciunt,  
 priores similes, quæ & in pappo solæ sunt.

Tertia etiam est quædam Filago, lanuginosis cauliculis, foliis, floribusque in cacumine  
 priores similes, sed humilis ac tenuis minor.

Reperitur in Filagines locis herbilibus, arenosis, subinde excaecis sive siccis, in sylvis, & in  
 neglectis agris.

A Maio in Augustum usque, cum flore vigent, æque his mensibus oportet eas colligere.

Reperitur etiam Filaginem appellat monachis quoque Pilocellam, sive tamen & alia Pilo-  
 cellæ. Gnapthali autem speciei existimatur, quam ob causam & à monachis Gnapthalon di-  
 citur Germani *Wisthan* vocant. Plurimam Impia esse apparet, de quo hb. XXXIII. cap. XX. his  
 verbis Herba Impia vocatur incana, consistit in alpechis, thymis modò vestita, æque capax  
 mole alij ramuli emergunt sua capella geometra: ob id Impiam appellatæ, quoniam libere  
 super parentem excelsior.

Reperitur etiam ac monachis aliter gentem faciliorem hæc herba habet.

Aqua ab hac destillata ad Cancrosum, præcipue manustillam, magni est usus: Contra etiam  
 oculi tumores caneros ac ex alacritate, cum luteola semel in die imposita. Sunt verò & quæ  
 Alia foliis, huius aqua made facta, non inflexione ad Cancrosum repræmendos videntur.

*De Pilocella, ac primò de Matre. CAP. XV. Pilocella matre.*

**D**Y et reperitur appellata Pilocella, forma  
 differente, quæ uti Matronæ Minor.

Matre Pilocella ramibus ac vitæ ulosi colica-  
 tis, asperis, & latis hinc hinc serpis, fibris de & nu-  
 dicitate dimittens: folia forma oblonga, lata, non  
 tam en magna, & ipsa hirsuta, superne virentia,  
 inferne instibant. flores in tenuibus pediculis  
 simplici fastigiis, luteis, Hemacijs armati, sed minores,  
 qui & in pappo lanuginem colorem, cui  
 subest semen. radix digitali longitudine fibræ  
 multæ speltur.

In collibus arvensibus, & aggeribus, circum agris  
 frequens per Germaniam vixque reperitur.

Aprimo quoque tempore in silvâ in altam ætatem  
 fœcit.

Pilocellam recentior ætas appellat, & ad diffi-  
 centiam sequentis Pilocellam in matrem. Nomen  
 Auraculum matre nominant, differant tamen est  
 à veritate: An nullo Germanis? *Wisthan* ha-  
 bet verò, Galba, & *Wisthan* in *Pilocella*: Belgæ etiam  
*Wisthan* & *Wisthan*.

Facilitate autem hæc aliquid calida, &  
 seccata, abstergens quoque, & vix simul ad-  
 stringens. Alia dissensio præter, dyserentia, &  
 oculi acies eo propter vitios, ad vultus carnosiores  
 eadem plurimum potestatem foris admodum, nam  
 & potestatem sadra, ad hominum carationem in-  
 strum. Laudatur & decocum eius ad emolli-  
 tas, quæ recentior matre canere possit, abque debet  
 epotam, *Wisthan*. Sacra doleribus au-  
 ribus, cum illas, dolores levet.

Reperitur Sarda in partibus admodum vtilium scribit, contra siquidem Locinora obstru-  
 pta aqua ab hac destillata aperire, eandem quoque ad viciis fibris cum sitandis, præ-  
 fertim Rhododermis, Lithargyris & Myrrha singularium vas. ad libram vitæ aquæ addi-  
 tas, cum quibus vbi indolis in alata fuerit, solanda, & ad usum referenda est.



Polyphlegma montana



Polyphlegma montana.



1.



2.

3.

4.

**M**IXOS. hęc, quęm superius, mollior, & candidior foliola eius tenui lareque in-  
condensate, inter que casticulus erit, cuius folio-  
lo foliola insidant parvis quatuor, quinque,  
pluribus final constructi, barbatos, non raro al-  
bis, quandoque e rubro purpureo, ferēdo e pur-  
pureo nigrescentes, albis variis colorata. radice tenuis  
adnat ubi bus deflexa.

Altas hęc fruticem Labeles recērt, folia  
oblonga, angusta, barbata, ac mucosa, duorant  
pelticam longiorā, in costa caelo hispida,  
tres quatuorve digiti alti, cacamine capitulo  
caudicem lata, vni cum floribus violę purpureę,  
colore sitinco negrescentes, in quibus quodam  
foraminulo in parte apparent, radice vni altam.

Prax Germanię vni que satis familiaris, ar-  
dis locis, in collibus, ac in conuallis reperit.

Altemen in Alpibus, ac Baldo Venetani  
monte, similibusq; ac locis reperit conuallis.

Floret apud Germanos prax Massæ ac lanis  
merātibus.

Vnaque ad Lycopodium refertur, quod ē  
Drosera hic dēscribitur verbis: *Lycopodium*  
*delicacissimum hęc floribus, hęc quibuscum erit de*  
*maribus dēscribitur ē hęc repit et sicut dēscri-*  
*bitur hęc vni que vni que hęc vni que hęc*  
*hęc hęc hęc hęc hęc hęc hęc hęc hęc hęc*  
debe



Heliotropium.



Multa Italia & Narbonensis Gallia loca maris, ac loca agrorum margines latissimo folio est.

Huius generis & colorum est, folia membranacea, quod non areolatur, foliorum insularum spolia lapsum procreantur.

Tale in Montpeliam in Narbonensis Gallia reperitur.

Circum quatuor solstitia pontificum flores.

Græci *ἡλιότροπον* sive, quod respondet vocantur Latine vocantur: ab Herbaris quibusdam, teste Ruellio, herba Cæcen. Heliotropium autem ex eo nomen habet, quod quod ad solis dæmonem motum conuertitur, sed quod vitæ Solibus florant, quo tempore Sol longissime ab æquinoctiali circulo distans, ad ipsam vultus Ferit (vide de circulo nomen) sive conuertitur facti. Scorpionum verò, à natorum fulgure velut Scorpionis cauda recurvens dicitur.

Heliotropium autem citidam, siccam, & abstergentem vni præ se fert, ut Paulus Ægineta tradit. Plantæ quantitas manu comprehendit potest, decoctum, potu balneo, petrastrisque per alium extulit. Contra verò Scorpionum vitæ, ut vni Heliotropium epotam, & in partem prædit. Semen in quatuor quantitate accessio vni cum vino tam præ, quæ-

Heliotropium lapideum.



tas sine, ita verò vni in sunt. Peniles venocæ, sty non, eparyllidæque applicato reficit: vultus Dioscorides.

De Heliotropio minore. C A P. XII.

**M**INUS Heliotropium foliis maioris apparet proximatum, sed tamen vltimum est vocat quibus: foliis aliis hinc sunt, quibus succedunt è tenuibus pediculis dependentes mucosi fructus, vultus Thymaliorum, radice aliqua fibra habet.

In vinctis plerisque Italia loca, vltimo vltimum quoque reperitur: Dioscorides in palmis & vltimo loco vltimo. Germanis pergenitum est.

Æstus quoque vltimo florant, sicuti Septembris mensis perficitur.



*Helioscopium minus.*



*Scorpioides parva.*

*Ἡλιόσκοπος* Graeci appellant, id est, *Helioscopium parvum*. Acutus *Tomeol.* 4. lib. 1. cap. 14. *Helioscopium* incoerentem vocant: Plantam similiter lib. 22. cap. 22. l. 6. *Troco-* cum appellatum refert, & alio nomine *Scorpioides* quoque vocant. *Helioscopium* a *notastolis* *Vernicaria* dicitur: Gallis est *Tomefol*, apud quos basia dicitur hinc etiam ambrosium, quae purpurei coloris sunt reflexae, quibus deinde toparia, strachin, & secundae mensis bellaria, non modo apud Gallos, sed apud Belgas et Italos Germanos, rubente purpureo insistentur coctae. Quod tamen ab aliis verentibus non sunt observatae, Pliniam tamen hanc quoque fuisse incognitam, qui lib. 22. cap. 14. etiam ex purpureis columbas in *Helioscopio* intelligi scribit.

Ceterum *Helioscopium minus* cum summe suo ex aqua potari, ad relictum, hyssopo, & nasturtio, vermes, cum lacte, quibus tartaridos pellit. *scorpioides* cum sale appositum valde, ut videtur Dioscorides.

*De Scorpioides.* CAP. XX.

**T**AMETS I vna Scorpioides Dioscoridis in-  
tammodo tractentur, nostra tamen  
sunt plures ostenduntur.

Prima parva ac humilis herba est, atque  
tenues ramulos profert, Scorpioides aut

*Scorpioides Martialis.*



*doctus.*

Scorpioides veris.



deharentem longas, qui subinde vel in loca declinare, vel sursum procurrantur, modo affurgant, circa quos folia oblonga, lato ovata, basi nuda, floribus utriusque pediculis insidentibus, octis, Lathyris, vicia, thymumque leguminum similes, sed minus succulentis hirsuta, articulatim coherentia, & instar scorpiorum eadem intricata forma, radix terrea est.

Picnicque loca anxia & montosis, in orientis quoque in Nubiorum Gallia sponte nascuntur alibi homentia est. Vni cum Heliotropis sub affluum Solis, aut postea post flores finem interea perferit.

Et hinc quidem ad Scorpioides proximè accedit, ac legitimum apparet, quod Dioscorides esse ait, *σκόριδος ἰσχυρῆς*, & *σκόριδος ἰσχυρῆς ἰσχυρῆς* est, herbularum posita tota, similitudine scorpiorum effigie. Dicitur *σκόριδος* & *Πίνο*, Latine Scorpius herba, lib. xxi. cap. xv. Ex argumento nomen accipit, ait, Scorpius herba: Semen enim habet ad similitudinem eadem scorpiorum, folia parva. Vales & ad hunc animal in nomine. Est tamen & Scorpius herba alia, que à Theophrasto Nepe, de qua suo loco.

Alteram Scorpioides Matthioli cubitet, quod coliculis editi sint numerosos, & folia abundè multis consistunt, quorum que circa radice sunt simul coherentia, quorum tamen

mediam, reliqua duo magnitudine superant, & rotundo longiora est, ad Postulacæ accedens: luto floribus in la maris virgula emittent: sub radice articulatim ac tenues filique fatigato acuminata, ac instar scorpioidis eadem recurvata, in quibus semina Galicæ simile: terra & parva radix.

Gallie nonnullis locis in vicinis comparat.

Floret eodem, quo superius, anni tempore.

Minus hoc Diosc. de scorpioides, quam superius respondet, vixit non paucas habens folia. Exstat tamen à nonnullis Telephium, quod nec nobis nec alii doctis probatur.

Tertiam Scorpioides nosse etiam gerat, articulatim prope angulos: hinc inde folia, sed raris, connatis, que vixita sunt, oblonga, & semidigitata sunt lata, ac veluti ipsi coliculi exiguè per hirsuta apparent: ramulos enim ac cauliculis fulgida vix cum floribus indumentis tribus scorpioides eadem recurvata, sensim autem in se: explicantibus particularem floribus per dicitur, qui carulis sunt ex quoque foliola, medio latere, Chamaedryos sylvestris ferè similes, in minoribus tamen ac dilata, radix exiguè floribus consistit.

In vicinis, in anxia, inter superius, in locis hirsuta, in pratis, vixit profluente aqua erit, & quò humidior: loca, è streptis ac maior gignatur, quò vixit anxia, hoc minor, tamen, ac quoque hirsuta reperitur.

Ab Apsis in multum affluunt flores.

Scorpioides nominatim cononice, à recurvata & reflexa ramulorum cacuminibus, que velut Heliotropis minoribus contraria apparet.

Non esse Arvicularum maris (quod plerique videtur) ostendunt, non modò folia, haud quomodo gemmata, sed & radix nequaquam digitata crassitudine.

Ceteram Scorpioides, ut Dioscorides refert, appositum scorpioides vixit profluente aqua est anxia.

*De Hippuris seu Espositis. CAP. XXI.*

**H**IPPURIS ad palustria quidem pertinet, sed tamen extra curam ordinem describenda sunt, propter alias, quas similibus tamen habentibus tribuit.

Duo autem eius passim cognita sunt genera vixit maior Hippuris, altera minor.

Minor eadem vixit, ac culm modo inani usque, cubito altiore, subinde fibris bene, affert, & gemmulis pyramidatim coherentibus articulatim, rancet ac tenetibus ad gemmula foliola,

*Hypocnemis, var. Equisetiformis.*



*Hypocnemis var. flex.*



*Hypocnemis adspice Bôlé.*



G aut

aut potius gemulatae sint, sed tamen foliis: respondent verò & abique his, quibus tamen modo gemulata, striata, ac alperis pro floribus velum Julii ut *Alyptagium, Hippocytis* acutis dicitur, quoniam in similibus continentur etiam: radice: habet gemulata & terrena.

Mox & conculca in his floribus, gemulatae sunt, et, ac tenuibus proteris lotis refert, sed herbariorum non raro comitior, in quoque se ab aliis: sed in manna compositi foliis: proteris candidos radice nigrescente legitur, gemulata quoque articulat.

In semibibular locis aqua habentibus mox reperitur, sicut in pratibus humilibus ac nigra.

Mox in libulosis acutis est, sed tamen herbariorum, in nigrescentibus rarè.

*Aquila & Mus pedes in.*

Græci *ἰσχυρὴ*, Latini Equisetum, Equiseta à Plinio lib. xviii. cap. xxviii. Equiseta, à similitudine equorum sunt: à novellis quoque Salis copiosa in Officina Caroli equina Germani *Equisetum Nobile* quoque *Pyrischman* Galii *Quercus de abasi*: Hippocytis *Coda de musis*, & *Abasi* vocata Itali *Coda de canis*: Belgii *pyrisch*: Angli *isochima*: Bohemi *Pyrisch*. Que mox est *Alypta* non tenet nomen à similitudine ac alperitate sua, que terra, ut in manna foliis multorum manarum lignorum operum, velum peltarum, & in submorum, sicut in manna haurientibus in ptoem expolant. Nota est & in herbis, que similitudinem suam supellectilem hac elegantissime extergunt, vnde & Germani *isochima*. Dicitur verò *isochima*, quòd vnde licet in aquis proveniat. Differt tamen ab ea, que Epledia & Anabasi etiam Hippocytis dicitur, ut ap. de Epledia subsequente ostendatur.

Mox Equisetum *Abasi*, velum Equisetum, à novellis nominatur. Dicitur autem illud à Dioscoro Plinio herbariorum ac mollibus comis: in quibus becatur ac mollis est, quam non Epledia modo, verum etiam quam Equisetum, à nobis Mus appellatur.

Postea autem Equisetum, Galeni oculorum facultatem ad imaginem eorum amantur, ac proinde videntur, ut in quoque terra mox acutem extergunt.

Cruentus, inquit Dioscorides, vulnere tunc ac impositus glutinum, etiam si tenes proles esse contingit, addit Galenus. Tantaque in his solida generosa facultas, ut & vesica ac intestinorum vulnera & variata hac coalescere posse creditur ac firmant.

Ad singularem namque etiam partem, ac diversa professione ad medicum profectus, & dysenteria, reliquaque ventris fluxiones, haurient est remedium herba, ac ex aqua, aut ex vino pota. eadem potest, & efficacius, quibus herba sacra, eodem modo assumpit.

#### De Epledia seu Anabasi. CAP. XXII.

**A**D Equiseta similitudinem accedit & alia quædam stirps, verum mox ac alper, candida & foliis affragi brachi) crassitudine, in alas distribo, à quibus tenues, deinde oblonge, plures gemulatae articulate vngal prodeunt, Equiseta crassitudine. Folia etiam gemulata multo, minus, palleret, velum Corni, quos fructus repunt rubentes, acule fieri pleni, cuius mox hauri similes, in quibus semen, vnde dicitur & lignosa. Assurgit hoc in magnum subinde altitudinem, quomodoque breves ac humilis consistit: ramulis foliatis, pone arbor vel fructum semper nati, quibus neminem altitudinem assurgit.

Vitam hauri Bellonum in singularibus hauri referi Pliniam altitudinem attingit. Hauri in terra breves ac maiores arbores ut fructus adolebit. Nulla autem classis hauri arboribus, aut eorum ramis inest, multo minus se in circumstantibus: ac ac prope consistit: paret.

In consuectis novellis Olympi montis, & hauri prope Rhagus in Illyria compositi sibi, scribit Bellonum.

Mox mox hauri, Angulo fructus maturi apparuit.

A Plinio *isochima* hauri *isochima* & *Caucas* appellatur, ab aliis *isochima*, quòd scilicet in alper consistit. Describitur à Plinio lib. xviii. cap. vii. in verbis: *Caucas*, que & Epledia, ab alia Anabasi vocata, in terra ventoso ferè tractu, scilicet arboribus, & ex ramis eius propendens solo molle, omni numerosisque firmis gemulatae radice possida.

Mox hauri & eadem lib. cap. xiii. ubi de Hippocytis, cuius quam varas ut Græcorum esse opinetur. Alij Hippocytis (vngal) alij Epledia, alij Anabasi vocant, quibusque vngal arboribus, & scilicet neminem dependere compositum in alia, vngal, ut est equorum cada, gemulatae articulat lotis habere partem, tenues, cuius: similitudinem radice in, similitudine: Compositi radice lignosa. Nati in arboribus nasant.

Dicit tamen has stirpes, Equiseta mox videlicet & Eplediam, quoniam utraque Hippocytis una descriptione Dioscoro completi, Hippocytis ut in nigrae similitudine, que propter primam Equiseta deinde addit, in similitudine molli, & tenues arborum ramorum consistit.

dant, quod Ephedra vocantur, quae non in lignis, sed in arbutibus Plinio teste, nascuntur.

Ceterum quod ad Ephedrae compertum attinet, & haec singulari quoque & amplificatione, factitios cum obstant omnino similes Equisetis viribus, cum ipsa tota planta, veluti atmodum diffinita, quoque facultate praesens.

De Martia Pae. CAP. XXIII.

Vae Martia.



**H**A vero obfrita Ephedra Vae appellatur Martia, verum inter ac haereticos multos, gratiosius, potius ac teretes, iuncturam firmius, cardiacales protra, geniculis compluribus deficientes, veluti Squifon, ac in radicibus alio, utriusque distinctis, quorum omnia a partibus acuminatis, demumculis, ac spinosis: folia carnosioribus geniculis in nervosis pediculis racemosis, erigit, ex herbaceo colore inalbescant, fructibus pluribus minutis acuta congestis, libet raris parvulis, eorum arripit complectens innotuit referat, per immensitate cocti colore rubet, sapore dulcis, in granis: semel sine vasorum, duram, triangularem, verticis acuminatum, sapore adstringens, radice geniculata, oblonga, per obliquam profertur. Insa quoque stupet magis haereticis acuminatis, quae in albugine, castoreo ac ramulis amplius hinc hinc sunt.

Amat aggeres, herbas utroque pariter vitas. Repentur in Narbonensi Gallia haud procul Melpeto, & alibi circa mare in horis Germaniae ac Belgicae subaeque praesens, obnoxia, sed florens, quae obnoxia maris ferenda albugine dicitur, fructibus rugens.

Autumno, vix sine sponte est, fructus maturatur, herba ipsa hyemis patens dicitur vitet.

Veni manium Recentiorum appellatur: Galii Erasmo de acer, à fructu acuto, ac ipse morum Rubo non amulo, qui veluti vas albugine ex pluribus acutis canit. Graeci est Trage, aut Trageo, sive Trageo: à nonnullis, inquit Dioscorides, erigitur. Trageo autem & Trageo, non ab his, aut ab eius vitis odore, dicitur, sed quia fructum feracem aptum, & cibo idoneum, à verbo Trageo, id est, comedo, unde & Trageo, secundae mentis bellaria nomen accepit.

Scopon ex eodem potest, quod in triangula in acutum ac pungens subspatum desinat, veluti in scoponum cruda.

Facultas acuta acuta, & praesens, quae in infanissima, adstringendi vim, et dicitur, possident, reliqua vero ordine secundo hinc interfo. Dicit Trageo acutis canit, & multo tribus hinc nomen obtinet similia referat.

De Hypocis. CAP. XXIV.

**H**YPHOCIS pedalis vel amphostalmata in circulis & in raris stupet est: folia densa, quam rotunda longioribus, quo soli aut hinc opposita fore manula aggerit, rotunditas maris veluti ponit perita: inter ex quoque solida in fatis geniculis alacorum foliis apparet, hinc in hinc in medio concoloribus siliqua sequantur oblonge, triangulatae & forma granis herbarum, ac quibus feracem manulavit, quod odore veluti in confectum cedat, radice dura, lignosa, hinc inde fibrosa ac renibus veluti rarisibus spargitur. Hinc rarisibus, hinc ac folia acuta, ac sanguinem haud obstruunt succum fundunt.

Nascitur passim in seipsum horum, & margines agrorum, ac non raris in locis herbis, subinde eorum hinc in hinc, in quibus, quod ab eis corrodit, hinc quae in angulis hinc canaliculis affertur.

Intra ac Intra, Angustioribus maribus possunt in hinc. Summa hinc, sed innotuit minor quod ac hinc in hinc hinc, quae ad palma strud-

1724

1724

Hypericum



Hypericum minus



nera, vel amplius paulò atrolicter, caeruleis prætereaibus, foliis minutis: flores & filique  
quales Hyperici.

In agris frumentariis nonnullis, præsertim quo tempore à fructibus frugibus conquisi-  
tunt, vel sponte nascuntur.

Viget et hæc sub Aëtheris, sed brevis si habeat neminem colorem folia. consistunt.

Hypericum Græci *δριγισον* nominant: Officina Perforatam nonnulli Fugam de montem  
Germani *St. Johanniskraut* Itali *Hyperico*: Hispani *Caracasillo*, aut *Caracasillo*: Arabi  
& Persæ *Yuzum* Boicæ *St. Johanniskraut*. Dicitur vero ab eo & Androsifera, à fructu  
qui per totam costam, folia, & floribus, sanguine atro nigro proficit. Appellatur et de caussa &  
Alcyon & Rana sylvæstris Androsifera. Est vero & Androsifera in suo genere herba. Vocat-  
ur vero præsertim Hypericum: à nonnullis Conon: nom & Chamaepitys, à reflexione nem-  
pe sicutis odor.

Corb.

Minuta hæc herba Hyperico similia creditur esse à Dioscorido dicta, quæ & Hypericum à si-  
militudine vocata est: Conon est, inquit Diosc., folio Encicubio, pinguiore, ac minor, non il-  
lorum odorante. Encicubus autem multo sicuti speciosus, & una quædam cum hac herba folio non  
admodum dissidet: Appellatur vero & vulgò Hypericum minus.

Ac Hypericum, ut Galenus tradit, calidum ac dulce, essentia terrea, adeò vi & mentis &  
vires præterea: Ad hæc vero totus firmendus est fructus, non tantum solum. Cum folia ve-  
rò vitæ apposita ad cicatricem vitæ alia, non emansant autem. Succum vero con melle, ac  
infusum, molli nunt, hunc idem, & permodicis vicis suat. Diosc. à terranis ac quæ-  
ritis cum vino potum liberare ait, & sicut quadragesima diebus habitum istum adhibere.

De sua specie Hypericæ. CAP. III.

1. SYLVESTRIS hæc Rana caerulea & folio Hyperico similia, sed vires similes nigri-  
cant, mollior, ac tenui sanguine pubescente floribus luteis, nec differunt: filique in quibus ma-  
nente est semen, nisi quod manentibus nigris punctulis notata apparere, respodet & rubra.

Non vixit adeò frequens hæc est: reperitur quandoque loca aliquantulum opaca, aut  
virginitis, vix cum Hyperico sicut hinc raris apparet.

2. Hæc vero & rarisimum dicit Hypericæ genus, quod à doctissimo Carolo Clusio sep-



plenaque confundunt, atque eò magis, quòd facillimes utroque similes ascribantur. Sed vel vno hoc differant, quòd huius ramuli subtili seu vni cum solentur, Hypericè verò laticorè caritè.

Quòd verò ad facultates attinet, sint ostendit Droc. uti quædam auctor est, eòdem quòd Hypericum hanc posse, cuiusdam videlicet ac siccam esse, & tenuem partem: vniatim se infuscescere. Potè cum vno à quartana libentè: totis eam kermès impoita ambulo medentur. & diabus quadragesima potè kilmendostuant.

De *Alcyon*. CAP. XXXI.



**A**LCYONUM Hyperico alius affingit: foliis minus, abrotano, fontanulo haud apparenti floribus Hyperici, illaque forma similes, ergo punctulè respiciunt. radix duriè. Maturè & hanc folia floresque sanguineo succo il terantur, ut digiti coarctentur.

Vitæalis quibusdam locis, veluti in sylvis, quandoque reperitur.

Flores & semina hanc vni cum Hyperico ad perfèctiorem veniunt.

Græci est *Alcyon*: Latini non aliud norunt. Androsifon ex eadem, quæ Hypericon, vocatur ne quoque appellatur Galenus Androsifon etiam ac Hypericon vocem esse ait, & Alcyon ac Alcyonides dicit. Germani *Harthorn*: & *Waldhörn* Officinæ non notum.

Facilitate hæc herba calida quoque ac sicca, eòdem frè, quæ Hypericon, ponit. Semen, inquit Droc. potè in hydromelitis festatio, bitola incrementa amplissimè detrahit. Vias eius ad lithiados, sed afflicte dandam, donec sanum restituantur. Galenus semen purgationum esse etiam refert.

De *Androsifone*. CAP. XXXII.

**A**NDROSIFONO cuiusdam sunt röh, vocantur *Androsifon*, dicit, ac lignosè circa radicem, præterea rubra: in sola triplo quadruplove maiora quam Hyperico, vel etiam Alcyo, que vno v-

rent, postea ac sub finem affirma obicari vident, è quibus non minus sanguis, sed rubenti ac vermulo vno similia succo citius exprimitur, ac, ut Droc. scribit, *obidit*: flores hanc, maiores quàm superiorum, quibus orbiculatum ac rotundum faceret capitulum, intero vntas, mole rubens, postremo nigrescens, in quo semen rubrum. dura lignosa ac retibus est radix.

Dioscorides capitulum hanc simile facit alia Papaveris nigri, cui haud dissimile percuto, quo regitur, subtili, sed citius matris. *aperte è radice, ac, quibus vni è radice adnotat*. Exemplaria pluraque perpetua *apotecha* bent, & sicuti hæc vox ad fructum applicatè: cum sit ad calorem referenda.

Quòd sequitur, *vni è radice, non pertinet ad Androsifon, sed ad Ruscum hanc sylvaticum, & Alcyon delinquentes, quorum illaque eugens nigra punctula notantur.*

Apud Indos, Siculos, ac etiam Britannos in sylvis, aut locis nemorosis nascitur.

Iulio ac Augusto mensibus floret, semen interea in capitulum matret: Autumnò sè ha ruborem contrahunt, ac ut tunc quòdam *obidit* succo dilute rubent: ex ipso *ac bitola* illaque negans exprimitur. Quam ob causam non parum salutarè, qui hæc oleum è bitola ex solis expremi rursus perarguit.

*Androsifon*  
hanc sylvaticum



*Androsentem.*



*Heris folios.*



Genus est *Androsentem*: Latius eadem sem-  
pervis. Dicitur & *Diosyfina*, ve *Galeriamen-*  
*thum*, & inter nostras appellationes erat:  
Officinis incognita stirps. A vero tam aperte  
occurrit, qua *Clypeosium* esse existimus, ut  
reprehensione horum error opus non ha-  
beat.

Calidam quoque ac siccatam hanc esse fa-  
cultatem tenet, quales *Akyn*, ostendunt. Se-  
men huius purum, & demeritissimam diuam  
poulo poulo balneo pelere, *Diosc.* scribit,  
& *Heliadon* maxime mederi, sed à purgatio-  
ne equam ex herbis oportere: herbam aut-  
em balneo mederi, & vulnibus impo-  
sitam sanguinem cohibere.

*De Sida.* CAR. XCVIII.

**S**ATIUM sicut oblonga liliifolia sunt, colo-  
re siccato viridius, plantaginibus angustifolia  
foliis maioribus paulo hinc basalibus, aut aliorum, qui  
in latam effusa umbellam, *Stachylos* emittit  
prope liliam, ac denique deperdentes veluti  
folliculo, oblonga semina uteruntur, & utri-  
tatem descendit.

Sic uter *Sida* compluribus *Narbon* sicut *Gal-*  
*lin*, ac *maximalis Belgij* locis, subinde & in  
*Germania, Italia, ac Hispania*: Quandoque &

*Sida foliosa.*



etiam cultorum sponte nata reperitur, quam sylvæ fœcæ appellare, ac veluti differentiam Dioſcoridiam deſcribit, folia aliorum, & formæ formam, & colorem addens, de quibus in Sicut deſcriptione nihil, cum tamen utique non modò hoc, ſed reliqua etiam ſine ſimilitudine nec viliam inter hæc differentiam aliã, quàm quòd vasa ſeruat, altera ſua ſponte gignat.

Frugæ ac lactuſi deſcribitur aurum.

Mais aut Jumo dicitur ſemen ferri perforatum. Aut boreæ herba vâſi omniſque ſiccitate præſentem magnum pituitatis globos ad uidiſſe vſum digere ac imbuantur verò ſuâ laevi panis, pſciq; ac laevi, ſeque hæc, atq; carotocolon.

Troſe Grecor, lãta Latina, ac etiam Glaſum. Caſar lib. 7. de bello Gallico, Omerſe Britanni, ut, Glaſto inſerunt, quod caruleum efficit colorem. Quod & Plinius lib. XIII. cap. 1. inſertur Samia, ut, Plurimum Glaſum in Gallia vocatur, quo Britannorum conſuegit, namque toto corpore obſita quibusdam in ſicri & nudi procedunt.

Senſum qui in vtroque auctore non Glaſum, ſed Vitrum (quod Germanorũ *Waf* dicitur) legendum exiſtimamus. Nec deſunt qui Vitrum in Nerum conuertant, Nitro enim Britannia deſcribitur: In Gallia verò non modò aſtra, verum & antiquiſſima Pliny orate omnino rariffimum: Nihil deinde ad corporum inſeſionem Nitrum facit, niſi modò minus ceruleo inſicit. Qui Vitrum legunt, utantur ſequentis exempli uti Orbati, ex veteri verſione corrupti videlicet ac multis modis depravat. Raſing ſiquidem conuerſio ad Europam lib. 2. nihil tale habet. Habet verò & Marcellus veteris Empiricorũ cap. XIII. Hancdem Vitrum aut Vitrum (vna exemplum legunt) dicit. Sed cur Marcellus ipſi deſcribatur, quàm Caſari aut Plinio?

Veriffimum eſt Marcellum pro Glaſto voce Gallica vitrum perpetuam ſcriptiſſe, quàm Caſarem aut Plinium pro vitro Germanorũ *Waf*, ut ab hoc formam Glaſum ſuſcepiffet.

De vitæ vete & lãta à nonnullis Guadum. Ab Indis Guado, voce, vt videtur, à Glaſto deſcendit Hiſpani ac Gallic *Paſel*.

Etiam Paſcheli dicit Paſcheli nomen & qualiſcunque deſcripto apud Plinium Valerianum lib. 2. cap. 3. Poſit autem lãta Paſcheli dicit, quòd in paſcheli, dicit, vt dicitur, magnasque digerant. Noſtra aut: Gerrum & Beberum Hædem *Waf* appellari Belgæ Wort Angli *Wote* & nate. Ab Auencia cap. 71. Nil Eitramen & aliud Arabibus Nil, quod Germani Nil & Hab alit, de quo Avicenna cap. 308. & Serapio cap. 183. quod Corroſiua, vt ab his dicitur, ſpecie eſt.

indico.

Superſtatam vitrum ſpumat, quam lãta dicitur cum panis lane de tingatur emittant qui Indicum, & quidem aurum Dioſcoridie eſſe exiſtimat, quod tamen non omnino manifeſtum. Nam ex lãta effluente Indicum eſſem Dioſcoridæ non ſunt, ſed ex æſtivali arolii tantummodo habet.

De vitæ autem Indico in Dioſcorid. lib. 5. Vitrum ſua ſponte gignitur, & veluti inſeritur, ſua viciſſitudine et arundinum Indicorum: alterum Timothæum. Hoſtilis eſt purpurea, qui de ære emittitur vafa, quæ de metallis artifices faciunt.

Ceterum lãta, Galieno diſtore, valentior eſt ſiccitate, amara ſimul & adſtringens. Proinde & magna vulnera dorum corporum glutinat: ſanguis profuſio liberantibus partibus velle imponitur: in moris calcematola maritò digeritur ac repente omnibus vicibus magna, & carothi mirabiliter reſiſta, etiam potiffant aut emittunt, & roduntur. Eodem verò & Dioſcoridæ. Quod ſequendo (adit Galenus) valentior quàm pro laborantibus natus apparet, ſolacium tribuente oportet, aut pacem, ut hoc de accari ſaniam, prædicare, aut polentam, pro viciſſitudine in vtroqueque efficit.

#### De Loto herba. CAP. XIII.

**FOLIA** Lotum herba ſimiliter præſent oblonga, anguſta, lãtaque, inter que canis affertur ſolidi, aut illos gurguliſi interſeptus, dicitur ab eis aliam, aut procerior, in montibus ſub conſeſtus, ſuperius hoſtilis os præſent perſtat, dicitur lãta, quos ſequuntur caput cogit, tribus cuius forantibus præſent quibus ſemen manu cum anguſta, talia longi, candidaque. Tota herba vbi inſerat lãta ſive lãta pallida colore.

Sentur pingui ac reſiſſi globe, pluribus in Belgio lãta uſantur, & ſponte non modò in Belgio, verum & in Præſentia, Bohemia, cum & aliis.

Mais menit dicitur ſemè de inde ad ſeu poſtea collecta herba ſiccata in vſum Indicorum. Plinius lib. XIII. cap. 5. lãta obſert uſantur, & Lotum appellat Vitruvius lib. 7. Lãta Sed Vergilius in *Georgicis*. *Beloga*. 1117. Lotum non inat,

*ſpſi ſed in præſent ære cum ſua rubent  
calore, cum ære manet velle lãta.*

Larum herba.



Kal.

A Larum autem larum color & lutea dicitur, veluti croce-cocta, & à purpura purpurea. Belgae hanc vulgò *Went* nuncupant. Non est Struthium, quò minus Pharmaceum, immò foliis quàm virelli debet. Folia siquidem haec magnitudine *Olea* folia superant. At Pharmacei à Dioscoride, & Scythicoi à Theophrasto *Olea* similia habere folia modocent.

Vitis haec in Medicina quodam nullus est, sed in tandem frequentissimè. Inficitur hac herba parum laeta, si usque ex laro opta, & laro nra colore laeo & virenti: Larum quodam candida, & nullo alio prius arbore: virenti vero colore atro nuda. Nam Larum herbae color cyaneus si perinductus virentem efficit: Id quod & Varro in cognatum habuit lib. 7. de Architectura cap. 14. Qui non possunt, ut Chrysotho praepos. caninum vi, herba quae Larum (sic per quae Larum) appellatur, caralium inficitur, & virenti viridissimo colore.

Marcellus Vergilius Dioscoridum in scriptis in *Marcellis* Commentariis hanc locum omnino amissum adducit, existimans eandem cum illa de Larum sive Larum herba esse, atque ea exemplum trahi, in quo à vero recessit: Differt siquidem Larum herba ab illa de, & nequaquam caralio, sed laeo, sui virenti colore, vi dicitur, inficit.

De Larum herba.

Cap. XXX.

Kal abbas.



**K**ALIS herba species complures sunt, et non modo Recentiorum observantibus, verum et Anticis, ac Scythicas lingas existens.

Prius species Kali tu barum plus minus affertur & calculeis ede numero his, medicolis, conf. ārudinis folia angusta, crassa, acuminata, non raro acuminis pungentia quatuor & uerapoda. Ceteris ferē magnitudine, quibusdam habitibus oblongius ac cetero erumpit terna, angustum terra lambens cum aliquatenus referentia, species aut exaliove stilbar coarctatissimae, radix e fibris composita est. Tota herba fœco tingeri solio ac mordica: calculeis paritero in quatuor solo colore rubens.

Mari vicinis locis gignitur: Maximis locis Aquitanicis: Gallis Narbonensis frequent.

Anacronio herba colitis, āgruūque decussatis. āgruūque inposita, virtutibus sibi videtur fra-  
bulis de fructu liquor ac citra ad vitam ferantur.

- a. Proxima species composita quoque calculeis proxima, sed tenuiora, ā hinc ēque colore v-  
tente sibi pluri bus, sed tenuioribus, angustioribusque, quibus superioribus compositis ferentibus  
expansio splendensque. radix non absque fibris. Referre videtur hoc Kali species angustio-  
ris tely Acaesoni, aut Chamaepysa primam. Tota etiam siliā ac mordica fœco rebandat.

Reperitur etiam in quibus superior, locumque ā ad Occid. littora Septentrionalia ter-  
ris, circa Scaldia & Moir ostra in Belgij Zelandia.

Colligatur apud Narbonensē ā Aquitanis eodem quo superior, ā tempore, ā modo.



Tertia species calculeis affertur terebinthae, cu-  
lis to alio ceteris, rarisque, ceteris persiculis arca-  
lanae hinc. Totaque quā ā, vii procerā Kali, suo tem-  
pore rubens, radix sibi hinc est: fœco hinc, vii  
superiore, siliā quoque ac mordica.

Est verò hinc non tantum in Mediterraneis  
aut Aquitanicis Occidentibus littoribus reperitur,  
verum ā in Belgij maritima ora, potestatem in  
Zelandia Infelis.

Hae tamen herbae Aquitanis maxime vno  
nomine Kali ā Alkali appellatur. Ab Anacronio  
cap. 724, detrahatur sub nomine Viciae, quod  
ab Vinea differtur: Vinea ā qualem Graecorum  
est spica, ac Latine vocatur Murcia, de quo Anacronio  
cap. 722. Apud Serapionem etiam cap. 247.  
Vinea dicitur.

Ceteris horum herbam Martiaus Sylla-  
stus Sodem appellat: pleraque Salim Alkali non  
capit ut vult. Alumen Carum et alij inter Sa-  
lim Kali ā Alumen Carum hinc terebinthae differ-  
entiam statuerit, ut Alumen Carum ā spica

citra, ex ipso verò cinere confectum sil, sil Alkali.

Diffolentur cinere cinere lapides, qui colligunt sibi materiam praebent consistens vi-  
trea raris, quae dum in furnis liquida ac trahibilia calet, diutius enim velon pinguedinem  
praebet, quae refrigerata lapides in sine descit, facile tamen fructuā: Anacronio vni hinc  
velon appellatur: Galli Jura de vitre: Gemmae ac Belgae Ghelofu fructu: Itali Jura de Cryst-  
le ad est, hinc Crystalla.

- 1. Prius autem huius speciem qui Graecorum Tragus castram t, non parum fallentur. Tragus  
sequens ubi ostendit sibi est, de qua alibi Baptista Montanus Kali Euxponem effeque-  
dam loco videtur: siveque vitem, Dico corde ac hinc, videtur in montanis locis, ā man-  
nis, siliā galis. Plures autem in maritima nascuntur, quibus etiam sil siliāque gressu referent.

Aliaque vitem, quae Dico cordis, quae siliāque appellant. Si aliam quae vitem, legit, vitem  
vix Kali composita quoque enim Lentra, vel etiam Porrum forma referent. Solent tamen ha-  
tuā siliāque vocem non terebinthae, sed ā similitudine aliqua siliāque hinc.

- a. Altera species ad Anthrydem ab eis Dico corde videretur, ā quibus Chamaepysa hinc  
fines ac odore admodum gravis essent: cuius verò hinc de hinc, non absque ad Kali  
speciem referent dicitur vitem. Appellatur ā Galli Alkali, quod Kali ab eis, quod calculeis  
maritima dicitur, habeant: et herba ipse tota dicitur vitem.

- 3. Tertium Salicorniam vocentur etiam appellat: est hinc ā inter Kali species aut eructa,  
tamen terebinthae ad vitam exspectata Kali ardentem ā nonnullis nominatur.

Caldum autem ā siliāque ipsam Kali est hinc vitem etiam ac calidior ipse cinis, qui ad  
quarta qualitate vitemque gradum accedit. Vitem hinc ā calculeam vitem habet colligunt  
hoc contra, ut dicitur, Jupides, ā in manu ā partem vitem vitem confectis de hinc.

Fit & ex hoc colore huiusmodi ac mordacissimum, ex quo deinde addito oleo ex citra aurato, sapo decoquitur, cuius, ad abluendas & purgandas totas lineas, & ex his ves- fies, vñt.

Ita corpus exiguæ herbe quantum affumpta, non modò vna, sed & in ceteris potenter quæritur factis in variis usibus, quoniam morbum ceteri aquosius per aliam humores dicit, & hy- dropicos purgat. Maior quantitas perniciosa est & venalis. Purgatur huius herbe dâre ven- tur & colore & fumo serpentes.

Mixtura eius verò & cis, que ad scabiem & curis seditiones facere, medicamentis: fa- perissimè ac excoriantem in analogis vicibus carnem facile adimat, vt Aucurna & Scra- pio referunt. Legitur autem in huius exemplaribus Kati arborem esse, ad id magnam, vt sub vmbra eius stant que et si id hinc magis interpretari est, quàm ipsius Scapionis, errorem, sic verisimile.

Flos Cystalli, sine, vt vulgè, Arumgia viti, infigatur reficet, scabiem curisq; seditioni facili tollit, si aqua, in quâ decoctus est, quædam infusio crebra sitisator & lateretur.

De *Lithospermo*. CAP. XXXI.

*Lithosperma maris.*

*Lithosperma maris.*



**L**ITHOSPERMIDI duo sunt genera: vnum maris, quod Murex, alterum vulgari vñt, Mirra.

Maiores *Lithosperma* tritè à radice trahunt graciles, tenues, longi, asperi, & hirsuti si ruti, huius plurima parte procumbentes: folia oblonga, ac terminata, & ipsi asperiuscula ac hispida, & vna nigrescentia, que in brevibus pediculis flores apparet, & vnaque semina de- inde demittit pedic. Flos nigrescens, & vnaque radice fibris in actus hyeme.

Nascitur in Italia, inquit Plinius, sed leuissimum in Creta: Repertur verò & spontè maris in Narbonensi Gallia: In Germania vnaque horum est.

Murex *Lithosperma* casuè in multis alijs ac turbulis dâris vñt affertur, totum vñt est ac scaberrime folia lanosa sunt, sed hirsuta quàm superiora, vñt & aliqua ac nigrescen- da.

na. Flore hinc secundam cauliculos è foliorum basi albedi, succedente semine per marantam cardoideam, splendente, duro. Milijs grano paulo minore, exigui vasculibus affixis. radice aut de ferodo, caulibus ubi, ad vitam trinitis fibris, que & hyeme permanser, totis caulibusque perennibus.

Pastus pluribus Italia, Gallia, Germania, ac etiam Britannia locis incolta erit.

A Solitino adhaerens ad Annoniam etque floret, utroque & semen perdit.

A semine dantis utraque *Setaria* dicitur: à nonnullis *pergama*, Gergoniam ab alijs *Agrostion*, Leonion, aut *Diosporon*, aut *Diospyron*, ut Plinius legit, nam & Hierocles. Ab Antibus Mithras Silet: In Officina ac apud Iberos Mithras Silet: Hispani *Arye del Sol*. Galis *Orval*, & *herbe aux perles*. Quod inanis sit, Germania ac Belgij Officina innotuit.

Mitras Germanis *Wurfsia*: Belgis *Stambet* & *perlantrop*, Italia in Officina *Orval*, nationis ubi Hispani *Mithras*, Angli *Orval*.

- 3) Præter ista duo & ceteram quoddam reperitur, quod caule, folijs, & floribus minori respondet, verum semen eorum minus candidum, asperius ac rugosum, haudquamquam laute ac splendens.

Ac tale quidem in Germania, Belgio, ac Bohemia in arvis, raris & incultis ac rudentis plerisque occurrat locis.

- 4) Hæc conyram *Tangus* & ceteris caulescentibus *Lithosperma* nunciant, cuius collectis partem alij: folia angusta vel obovata, que & in Hispania, glabra, colore nigricantia, ac densa insit alterna *Lithosperma*.

Ceteram *Lithosperma* vitæque, matione vide licet ac minoris, semen candidum ac fœcum secundo ordine, vias motet, calcules expellit: ipsa vero è frangere. Dant. referuntur vino albo potiri.

De *Lysimachia*, & primis de *legitimis*.

#### CAP. XXXII

*Lysimachia legitima*.



**L**YSIMACHIAM Dioscoridis alioque veterum vitam tantum, quod vide licet iam fœcis potestis operibus adhaerens, sed spura. Duo ex his purpureo sunt, utrum in vero cervicis illas.

Legitimam *Lysimachiam* frutescentem est, ac multo caulibus asperis rostris, plurima parte rotundis, nonnullis angulatis, geniculatis, dens aut tres pedes alta: folijs è singulis nodis octonibus quatuorve, oblongis, angustis, subis fimbriatis, umbra tantè haudquamquam incisa florent in laetitia alia exarum laeta, succedunt rotundis, parvis, Corandri vitulae semina. colore raris per obliquam serpe, & pluribus locis progerunt.

Palustribus & aquis locis iuxta rivulos, scrobes, aggeres, ac margines agrorum gignunt.

Iuxta Iuliodor cum illis reperitur.

*Arenaria*, & à nonnullis *Arenaria* *Gryce* appellatur. Latini *Lysimachiam*: à Platone *Lysimachia*: à quibusdam recentioribus *Salsoma*: Itali *Lysimachia*: Hispani *Lysimachia*: vulgò Germanorum *Wörmit*. A *Lysimachia* *Agrostochlo* Boissieros nomen accepit. Invenit *Lysimachia* herbam *Lysimachiam*, inquit Plinius, que ab eo nomen retinet, celebrata *Fossilis* lib. x. v. cap. vii. Radices hanc in Gallia vulgò *Corandri*, *Corandri*, & *Corandri* dicit referunt adhaerent *Mithras* obis exarum pro *Lysimachia* Radices exarum *Corandri* Itali dicitur, que *Genilia* esse per. Non caeterum Radices

Racibus erant, cum Lyfimachium indicat Latream aut Latrem herbam esse, nam à Latra <sup>Latrea</sup> Lyfimachus nomen dicitur esse. Hallucinarum vero & multo magis, dum appellatione Pol- <sup>Pol-</sup> libofum, quasi Polifogum, a rufina quod. Conoma nos sibi demonstrat tam per Lyfimachus <sup>nam</sup> quam accipit.

Polidofum siquidem non Lyfimachium, sed species est Rarumali. Flammula nomine, fr- <sup>fr-</sup> las oblongo angusto, & Salicis figura, flore igne luteo, que in prato frequenter reperitur, & v. loco <sup>v. loco</sup> raris in pygma, velitis corpori admodum bene prostrata, vasa polidofum in haec nomen abestiam <sup>abestiam</sup> trahem, ut in dicitur loco. Ad Lyfimachium conseruatur. Superacris hoc habet qua- <sup>qua-</sup> litem adfectoriam, ut & Galenus ait. Sacrus, anthe. Dicocondo, velis est ad sanguinem <sup>ad</sup> resolvens, & dyenterias parit in potu, tam perelytherum anthes. Flammula inolebent fibit <sup>fibit</sup> in pello appolita. Herba ipsa valentem sanguinem cohibet, sanguis que è naribus erupit: <sup>erupit:</sup> nec sibilantibus in dies. Sufficit fumo dispersa fugat, & rufinas occidit. Quod & Plinius <sup>Plinius</sup> lib. xxx. cap. viii. refert. Angust, inquit, fugant odorem Lyfimachus. Idem Lyfimachusq; <sup>q;</sup> flamm facit capillum scribit lib. xxxi. cap. viii. quod verisimile fieri luteo prato <sup>prato</sup> fluc posse.

De Pseudolyfimachio Purpureo primo.

CAP. XXXIII.

Pseudolyfimachium purpureum I.

Pseudolyfimachium purpureum ciliata.



**P**URPUREO huc Pseudolyfimachio ciliato bicubitalis, septemneris caespitosa, in <sup>ca-</sup> mofi, ac succos. folia angusta, per margines crenata, veluti Salicis foliola in summas <sup>sum-</sup> vagab, illi qui exiguus antea enatis, infidens, vasa albicantis, frequenterque rubente colore <sup>color-</sup> eleganti rursus, ex quantum foliis, quandoque angustioribus, interdum lanaribus in li- <sup>li-</sup> biquis exiguas lerrina molli, vasa candidisq; lanaribus implicatis, pro radicibus tenues di- <sup>di-</sup> bryz huc illic repentes.

Hinc & alia in ore est species, à prioris magis dicitur sola differre: florenti vero & in no- <sup>no-</sup> magis diluente rubent.

Itaque Grobium, folium, florum, innotentque margitica, aliisq; locis humidis re- <sup>re-</sup>

perditur, quandoque tamen & in floribus eius, præsertim quod latiori folij flore sit figuræ.

Tota hæc æstivè florêt.

Lyfimachij species habentur & à Fachio ante nos pro Lyfimachio purpureo descripta non est tamen legitimum Lyfimachium, sed spuriam ac Pseudolyfimachium. Quæ de cæcis sit & alius natus ipsam nomen boni Gelnerus compellere, & Epilobion, aut Chamaenion vocitare, in dubio quidem, quod sit sit Leucoto similes super filiquam natus. Quæ sitque verò à similitudine aliquæ cum Nerio siue Rhododendro, præsertim utrius affinitas, cuiusq. florè lateribus folijs compositis exiguam rosam imitatur. Nam verò & Antonianam dicit à nonnullis referri, sed tamen & aliam aut Antonianam esse, quæ de nervo dolori medetur. Nominatæ verò & passim Pitus ante patet, propterea quod filique apparet præsertim quibus flor. Censetur etiam à quibusdam Onaga veterum, quæ & Onothera siue Onaris. Describentes verò hæc aut esse fraxinem prægundersi subeone insunt. Lyfimachium verò istud purpureum non nisi herba est, hyeme etiam maritima, tantum abest, vestiges sit, aut aliorum arborum que sit.

Ceterum vitum in Medicina cum utilitatem habeat, virtus quoque eius ac temperamentum cognoscere non conat: Gelnerus tamen calidam & siccam secundo gradu videt in vitæ, atque et diversis conficere paribus, nonnullis evidentè adstringentibus, alia verò modicè adstringentibus.

*De Pseudolyfimachio purpureo alio.*

CAP. XXXIII.

*Pseudolyfimachium purpureum alio.*



**P**SEUDOLYFIMACHIVM purpureum alio: cæcis propter rectos, sed bicubitalis, quadrangulatis, articulatis: folia è singulis proscubis lata, et adhaerentibus, oblonga & acuminata, ad venter Lyfimachiarum sine accedentia. Inflorescunt verticillatim ambeutesculis coraculæ, colore eleganti ruberæ. Semen huiusquam in filiqua, sed in loculis, et quibus loculis exciderunt, sequitur exiguum. Inter vasa, dura, sunt nigrescens, durabilia natura.

Locis istud extra aquas, iuxta ripas fluminum, ac aliis periculis humilis.

Est autem absterilior.

Receptones & hæc Lyfimachio purpureo nomen dedit: purpureo & pro alio Lyfimachio à Matthiolo: Est verò non minus, quàm purpureum, hanc tamen quæ ac saltem Lyfimachium, siue Pseudolyfimachium: Apud Belgas plerique purpureo appellant. Falluntur qui pro Hepatario colligunt, sed male: magis qui ipsius Centaurij speciem esse sentiant.

De facultatibus hæc nihil adferendum, quando neque explicatas, neque completas habet.

*De Pseudolyfimachio carule.*

CAP. XXXV.

**C**ÆVLEI Pseudolyfimachij rotundi sunt caules, sesquipedales: folia oblonga veluti Lyfimachæ, sed videntur firmata, & profundius quidem quàm prima Pseudolyfimachij



*Herbula Lemnaceum ceruleum.*



clij purpurea, & petala parte verna, inflo-  
rescentia vobis effluata, quibus costis mure-  
libus convolvuntur: flores in summo vir-  
gato spico, cerulei, Lemnaceum quodam-  
modo amul, sed modesto, & alteriusfigu-  
re quoscungu loquantur capitis, in qua-  
bus semen murem firmum, radix murem fibris  
capillaris propugnoscitur, quibus hinc tem-  
perat & ipsa flaps utriplex.

Naturae apud Germanos in fossis equanti  
recumbens, ve Germania est. In horti a-  
pud Belgas facile invenit: Sed expositis lo-  
cis, non omnino vobis: vultu non pro-  
ducatur.

Tota stirax florentia.

Lemnaceum ceruleum appellatur, sed  
tamen vobis Purpurea & Picandolifita-  
cium quoddam, quod hinc color cer-  
uleo cognomen accepit: Nonnulli Lemna-  
dulae spiciferum, sed parum vobis appel-  
lant: Veroniam cretata clj: Germania A-  
magallia aquaticae species potius dicen-  
dam existimant, nulla tamen Amagalli: a-  
quaticae similitudine afficit.

Pisciculis vobis hinc explorat, vobis  
conquarantur fit.

LIBRI TERTII SEPTAGESIMA PRIMA

FINIS.

II  
STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS PRIMÆ  
LIBER QVARTVS.

P R Æ F A T I O.

**N**unc ad ea veniendum stirpes, quæ M. N. O. P. aut Q. litteris habent. Inter quas plerimæ occurrunt in frequentis medicamentis usæ receptæ, & vtilitates hauriuntur ad præsentis curandosq; morbos, non modo vulgares, sed & difficles, & infirmitates.

DE MARRUBIO.

CAPVTV PRIMVM.

Marrubium.



Marrubium caricifolium.



**M**ARRUBII genera Dicoſendi duo: Vnus propter hoc nomine dicitur, quod & candidum: Alterum Billoſe & Marrubium regium vocatur: Scitur tamen & alia que ad Marrubij genus referri poſſunt, vt. Aſiſon, & Marrubij aquaticæ, de quo Pemptad. 4. lib. 5.

Marrubium propriè dictum, completæ odie quadrangulare caricifolium, pedem alto, tenuisque lanugine si baculis: folia per internodia bina, subrotunda, rugosa, ambrosia mentis, & ipsa candore lanugine pubescentia. Floſculi in nouis vel purpuribus conceptaculis subconditis caſtem verticillatim per internodia ambrosia: ſemen tuberculatum, apiculaſculam radice fibroſa nigricat. Tota herba ſuſas & grati eſt odoris, & nouis vel. Moſiſtam reſolet, præſertim hybernis menſibus.

Herba pariter, vna, ſeſtatis, agrorum in argillis, locis ne gleſtis, pinguis, ac luto dolo gignitur: Cuius ſemina ſequentiſ ſarculum, pro quatuor tamen ſito ac uicinis metatocentis ſarculi ſubinde accipit: Crecunt ſequentiſ, ac quod apud Maſſoniam, & in Paracraſia ſuperiore hauri ſiſtens occurrunt, præſertim tunc, quod apud Belgas, & alios Germaniarum locis præſertim, candidum ac odoratum, ſoli uſque quæſo que anguſtioribus ac immoſioribus.

Intra Angulio floret, & quidem altiore, à quo crassum, antea dixerunt scilicet.

Græci *νεβίση*. Latini Marrubium. Diffinitio Præfixa, & quandoque Marrubium Plurimum Marrubium candidum ad differentiam Balloetes appellant. Internodia vocis & apud Apuliam eius & hinc notum exant, *Κωνσταντινός, ποσειδάων, ευσταθίδης, αθανασίου, Μελιτάνος, Λαβύρα, & Βιότιαν* insulis, *Μαρούβη* Hispania *Μαρούβη, Μαρούβη, & Μαρούβη* Germania *Ποσειδάων, Μαρούβη* Belgio *Μαρούβη, Βιότιαν*, tam antiquè Galia, *Μαρούβη & Μαρούβη* Anglia *Βιότιαν* Bohemia *Ζαβίνα*.

Marrubium autem, quod Galeno, palidum est ordine secundo, verum verò sicum, & sicum gustu amarum est, ut sicut & hinc obstructions liberare, & thoracis pulmonemque expurgare, ac mentis promovere.

Dioscorides vnicum foliorum succum, aut aridosam cum semine decoctum dari cum melle, sicut si spumosa, castoreo, ac tabulorum, castoreo, ac postea præmixtam cruce- re. Non modò autem crassam vnicamque puritatem, sed & puritatem efficaciter expurgat. Vnicum idcirco omnibus tabulis, ac purulentis apertibus, si modò ab eis, puritatem cum tenui destillatione, sicut. Apud Paulum, Agnetum ex Marrubo Compositum quidem, re- beccaribus, ac purulentis apertibus vnicè, singulariter, ac rarificè vnicè.

Iam dicit & Marrubium malis vnicis à puris non purgatis, ut morbis & secundis emoc- tis vnicè & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorati sunt. folia cum melle, sicut de vnicis expurganda admodum: Perrogia & notum sicut.

Sancus è folio speciosus, ac in folio dentatum, ad eadem pollet: cum vnicè verò & melle illi- mus ob eorum claritatem admodum: per mox variegata percipit, & ad vnicum vnicumque do- lores insularum, aut cum resacca, Dioscorides.

*De Alyse Galeni.* CAP. II.

Alyse Galeni.



**P** O I N T istud inter Marruba numerari, ni- si à Galeno non pro Marrubij specie, sed pro Alyse habentur. Est etenim tota hæc Marru- bus simile, multo tunc quoque, sed folia eius im- mota, crispata, amplius inuoluta, & albidiora, odore delinuat. verticilli consuetos, ambrosia purgentibus aculeis horrent, & quibus foliola quales Marrubij, ac colore ex cereulo pupa- ta cæcena. Emem vltim Marrubij. radix dura, li- gnosâ, munda.

In hortis salubere, apud Belgio præfixum, se- ntar, & tunc ex Hispania allato, vni nominisq; spem pigment, ac à d'Agnetis. C. Claudio reper- tum est, & quidem Masi. mense. Sic ac hinc præparata.

Græca est *Αλυσή, & Αλυσή*. Latina Alyssum. Nomen autem ex eo habet, quod manifestum est demorbo à care rubedo, ut Galenus ait, à quo lib. 2. de Animo in Compositione Anymis. Cuius desinitur verbis *Αλυσή* in floribus vni- genis, *αποθήκη, αγγυρική, & αλυσή*. admodum: *αλυσή* vni *αλυσή, & αλυσή* in *αλυσή*. id est, Alyssum herba est Marrubij per similit, sed vnicè & magis spumosa circa consuetos: hinc fert ad cereolum vnicum.

Hoc vnicum, ut idem vni de simpl. medie. si- cut. quoque dicit, sicut in totum sanant. Acque hoc ex totis substantiis similitudine efficit. De- quum enim est talem facultatem ex folio percipi experientia, & plantæ vnicè conulare methodo. Quod si quis ad multa experientia, cognoscet facultatem habere medicamentis sicutificam, & dignitatem, cum hoc vni oblationem vnicum- bil emam obtinet. Hac ratione & vnicum & vnicum expurgat: Galenus.

*De Alyse Dioscoridi.* CAP. III.

**A** L Y S S I superius Dioscorides Alyssum desinit. Francof. sequi, herbacis, vnicum- lis, sabulosa, rotunda folia, fructu duplicem fundorum efficit, in quo ferens qua- dam

*Alyssa Dicocondis*



causa vitia cutis in facie, & leuius pinguetudine potantur: de multis appensa salutaris se creditur, & herbis bus neque animalibus saluta aequalis: in purpura lieno circumligata, peccatum merborum abigit.

*Radix sua Martium nigrum.*



dantur (art. Anq. cum hac descriptione, dudum nobis visa est quosdam flaps commutare: truncata, pedem (plus minus) ultra, cura et ibi prima & ante emittente eadem cotanda, cucum vero eadem possunt in statu quidem, sed rotunda longiora, alpera, & vni cum eae le candidissima floribus: sunt fœtundum: cuius culos reparat: lucco palef. ceruas, post horumque pinguet, lene, fibrosanda, silicantia, & non lieno, in quibus fermen pluram ac laram, vcluti Lenocor. andia omnia ac fibrosa.

In mēstribus & asperu loca emicat, Dicocondis. Cora flore, & quidem in herbas Belgis, vltim est quod descriptum est, ludo ac Augu fo mēstribus siquis mea: succo dantibus.

Dicocondes *dicōne* nominat, non ex coequis rabies à cane mandatur, sed quod singulari scibe, ac vltim, *dicōne* siquidem non modo rabies, sed & singulari, à verbo *dicōne* est, singulari. Appellatur vero idem & spurs non inibus *dicōne*, quod beae ac parum laram, à siquis tempo ludi caiga formam referentibus, non & *dicōne*, *dicōne*, *dicōne*, *dicōne*.

Reperitur vero præter huc & aliudq Veneri Alyssa: Actus lib. 1. Sideri idem Hieracium Alyssa esse censit. Pluram Alyssa Rubra congerem herbam facit. Sed de his sine loco ad Dico condis Alyssa referuntur. Hic res dicitur, post auctore, si quis sine sine fœbri potu dicitur hē eff. et, si quis eam aut trestant odore tuc cum melle

da: costula in odore, Acetabibus nobis cane redden

*De Radice sua Martialis nigra.*

CAP. IIII.

**A**LTERUM Martis genus Radix est: hys Martibus candido simili apparet, nisi nigra, non albedi, & grana ac nigra, hanc depu quam vero secandi odore effit. cautes illi aligam complere hūmā, angulā, folis circūda ti, lene, rugosū, arebato ferrata, postō maoribus & longioribus, quā candidi Martibj: foliulis verticalis subinde rehent. radix ex fibris conbit.

Similibus quibus candidum Martibum loca reperitur, & non tarō andionibus ac miris laro solo.

Viget ac florere eadem quoque, quo pua Martubum, tempore.

Guæcis *βελλὴ*, &, vltis regine, vt restant Pionis lib. xviii. cap. viii. à monellu Martubium, aut Martubum spuriu: in Officina Præflum formidat: Ab Italia *Martubium*, *Martubio* *bellatō*: Ab Hispanis *Martubio* *nigra*: A Germanis *Esphont* autem Belgis *lucina* *nubantia* *flor lene* autem: Gallis *Martubio* *nigra*, *Martubio* *pa* aut Anglis *Spinking* *bellatō*.

Caldia ac sicca Bellatō: ac, vt Præfl. *Esphont* *radix*, acris & absterfing facultatis: Impositi cum sale causa mortis medetur, ad quam vna vim eff. carat

atque esse Dioscorides scribit; folia sub caeteribus costa, condylamata, septimant; purgant & vicem ferulidæ cedunt æthere.

De *Stachy.* CAP. V.

*Stachya.*

*Stachy. Fuchij.*



**M**ARUVIDIO *similis* & *Stachyis* est, cujus herba à radice exserti complures, altiores, articulatae, atque è trigulis aut citius folia basi sibi mutuo opposita, dura frutia, longiora paulò quàm Marrubij, atque vix cum caulis cordata, mollior hirsuta, ac fuscior odorata. flores eodem quo Marrubij caulis cingunt modo, sed colore laevi sunt, & verticilli angustiores. radix lignosa perennat.

Germaniae ac Belgio peregrina haec *Stachyis* est, in calidis regionibus invenitur. Nascitur, inquit Dioscorides, in montibus & alpibus.

Præter haec & alia à *Fuchij* delectata est, caules hinc crassius quadrangulos, duos vel tres pedes subinde longi folia lata, oblonga, incana, ambra ferrata, utraque hirsuta, & molliò quàm Marrubij ampliore. flores in verticillis caulem amplexibus purpurei: semen rotundum & nigricans: radix dura, & fibrosa caerulea.

Hæc Germaniae haud peregrina est: locis nonnullis alpibus ac inculis perennat.

*Altitas* montibus florere, caules sub hyemem intercedunt, sed radix aliquamdiu vivax perennat.

Præcipue legitima *Stachy* habetur, quæ Græcis similis *συχη*: Officinis, ac posita incongrua.

Altera cum nomine nullatenus habeat, *Pseudostachyis*, ac species *Stachyis* veritè appellanda, vera siquidem non est: Nec *Sphacelus* (quod plerumque suspicari) quoque est, cum in Theophrastus inveniat.

Caeterum genera *Stachyis* æta & avari gustus, ac rari est ordinis excoctificationum Galeno, foliorum decoctum mentibus pellit potum, & levanda: autem Dioscorides.

De *Melissa*, seu *Stachysophylla.* CAP. VI.

**M**ELISSA quadrangularibus caulis, foliis hirsutis, subopercatis, cap. ovis, aliquantulum aspera, Balneari hirsutudinem referret, nisi rarior hirsuta esset, alior foliorum, &

Melissa.

Pinnis  
memor.

suaviter odorata foliis squadem tricus aperta sunt, petiolisque longiora, & Cerasum malum odorem emittit: uti venosissimi melle, cunctis quoque circumstantibus, e quibus floribus albi hinc hinc nuntius nuptiarum. radix fibrosa, necesse est.

In horto sicpe Melissa colitur in sylvis, ac silvabus, velutis neglectis sicuti nati quandoque occurrunt. Et uno quidem loco odorem, ut plerumque singulis quiescens est. Sicuti autem vulgare, ut Plinios lib. XXI. cap. XII. circa apertis alacris, que hoc herba delectantur, & a berantem sua reuocantur, ut Verg. Georgicon quarto oblatum.

— *hinc in horto affertur: sicuti,*

*Frax Melissa, & Cerasum quodlibet generis.*

Floret Melissa Iunio, Iulio, ac Augusto: sub hyemem tota marcescit radice visibili, que primo vere noua fita, utpote caulis calis protra.

Græcis *melissosylos*, *epi melissosylos*, utriusque abesse: Plinios enim Melissam Latine Melissa phyllon, Apulicam & Carag. Ab apulicam, quibus hanc gratia, non ea habet, que Græcis *melissosylos* ac *melissosylos* vocatur: unde & Apulicam vocat Latine Officinar Melissa appellare.

Plinios inter Melissa phyllon & Apulicam distinganam esse existimant, cum veluti diuersa Melissa phyllon, ac deinde Apulicam nomen quoniam alacris ferenda esse scribit lib. XXI. cap. XII. Quod & manifestum lib. XX. cap. XI. ubi ait, Apulicam

plurimum Hyginum quendam Melissa phyllon appellare, sed in cunctis demonstratione esse venenatum in Sardinia. Sed fidelis Plinios non cum vocis ambiguitate, quoniam cum altera similitudo, Melissa phyllon Apulicam esse Ramunculæ species in Sardinia venenata, Apulicam ab Apulicis vocatur. Appellatur autem Melissa ab *melissosylos* & *Cerasum*: à Germanis *Wilschstraw*: à Belgis *Cherise de pinnis*, à Hispans *Trompeta*, peris *castrum*: à Gallis *Melisse* ab Anglis *Botane*.

Melissa phyllon autem facilius quidem exallicat, sicutique, ut Apulicam ait, ordine secundo Galenus ait, Martibus simile esse facultate, sed ab eo plurimum vini. Recensitur que vni cum Arabibus ac Mauritanis Medicis singulariter cordi prodelle, & acris affectibus saltem astringit.

Autem si quidem, Ibero Deus abus cordi infuso pro, Melissa ore, ut, ex hilaritate, viresque spiritus corroborare. Scripserunt prout hanc & humorem singulisque ventris ulio prodelle, cunctisque astringit, cunctisque obstructions aperire, astringentesque animi & sollicitudines fugare.

Dioscorides, Melissa phyllon foliis cum vino pota, ut appositis prodelle refert: cetera eius phalangorum, scorpionum, & ad asserfanciam moriantur: utriusque ad cunctos morbos mulieribus in deficiantibus conueniat: dentes dolentes decedo vtiliter calida, atque hoc ipsum dysentericis infandis aduersa: vni quoque sanguinum sanguinatosque folia addito melle in potu mouent orthopneum vni in deficiente: apposita hanc eadem cum sale strumas distentare, vti compingit, articulosque dolentes sedare.

*De Melissa, sive progretra Melissa phyllon.*

CAP. VII.

- M** O V T C C A dux sunt, Latine vna, Spississima. Latine Melissa caules facit complures calidales, circa quos se in melle, umbra profunda mensuris crenata, Melissa phyllon similia: supra que floris in localium ex ampla, & hinc patribus, veluti accubent, exant, colore candidulo, Latini floribus similes, autem postu marcesca.

- Spississima Melissa caules similitur radice & cubiles protra, ceteris similes & quadragulans: folia vni protra: floris similes, ex accubentibus quoque, sed angustioribus, oblongioribusque,



Herba Salica.

vuln. Maribus & in his femina nigra.  
 Appellatur autem Salicem, quasi tenuem, à  
 ferro quod Graeci vocant, quia glomerata in  
 canibus ferro facta vultuibus conducit.  
 Cuiusmodi herba Salica vultu rursus fusciora  
 fusciora, ac nobiliora cum exortione adstrin-  
 gentem obtinet, ad emagra & recidiva ferro fa-  
 da vultu effluatissima est. Influxum tamen  
 in ea hac crassitate posse curari scilicet. Sige-  
 rem album multarum reperit. Non diffinita  
 ha. Dicit & Plinius de Sidemide hac prodidit.  
 Appetit, inquit ille, folia, vultu abique in-  
 fluxum non periculo sanguis. Plinius, Sidem-  
 ne, ut, tantum vim habet, ut, quomodo perenni  
 gladiatons vultu digne, sanguinem claudit.



Carduus.

De Carduus. C A P. I X.

**C**A R D U S C. A. quadrangularis prostrat caulis, crassus, durus, dactylis pedes alba, oblonga, ac ex nigro rubentes: folia nigricantia veluti Vinca, massae longiora, multo quibuslibet, laciniata, ac profunde usque dissecta. calyces dom ac pungentes orbiculati: caules amplexuantes à quibus flores exant ex albido purpurei, veluti Lami, sed minoris & non purissimi ac nigricant. plantae pro radice fibra ab uno velut capite descendunt. Toti herba grandis odore perdit, gustu amarum.

Rodentibus, lapideis, ac alia insectis, & sphyngidolentibus sepe, & venereis tumore subinde insensur. In hec non nisi facile coalescit.

A lacte in modum visque Arumof vige, fovee, ac semen perficit. caules hyeme immadunt. radix vixit est.

Nostrata Carduacum nominat: Germani *Herbigelein* vocant: Belgae *herbigein* Gal-  
*li Agrimonis*: Angli *Stinking-stone*: Bohemi *Stinking*. Sicut quo *Melissa* speciem facit. Videtur vultu & ad Sidemidem Herculium referri posse. Folia siquidem cum macta quam Maribus, & ad eas Quercus accedunt, curat fistula emollita, quam multarum aliarum sunt sed cum Salice solvenda obtinet similitudine. Habet vultu & orbiculatis venobris, & nerijs nigra. Non aut ad venarum descriptioem plures accedunt.

Carduus Carduacum calida ac sicca vultu secundo est, cum expurgandi, adstringendi quoque facultate habet. Ad corda affectus à nonnatis commendatur, totumque vultu exortione, ut ab effectu nonnati in crasse parietis. Ferris & cotinis se ac quoque vultu in modum: obstruendum vultu apertis vultu in ea ac libet in vultu & palatibus herbe cum vino cubitum non modò vultu, aut in vultu curat, sed & difficulter parietibus prodest.

Ad crassa eadem quoque laudatur. Modest & quibusdam bonis moribus, à nonnatis vultu de causa subinde reperitur.





de Mentha. CAP. 2.

Mentha piperita.



Mentha piperita.

Mentha sylvestris.



Mentha sylvestris.



COMPLET.



malis potius succo filit, operari & fuscipis machinam, ut Galenus, data si hinc videri solentione. Purgationes formidatam abebet, & adiectio alba fluxum catarrhalem vultissima, quod si hoc primo loco descriptum est, comparatione enim est modis huiusmodi fluxum hanc vult Menthæ frequenter in supplicium. Eadem frons in temporibus, ut Pannus, admodum capitis molitior dolores Epiphora imponitur, & omnibus capitis eruptionibus, & solis vultis Vicia in capite aptiora in vult hanc fortissimè cum malo utilitatem. Sumitur contra scolopendras, scorpionum muros, & serpentes, & cum sale curam moribus applicatur. Lac cornu, & in calidum de nian (accione, addit Plinios) non patitur, quare in scorpionibus additur, ne hinc coagulati potu bibentes strangulentur. Eadem vult generationi vult hinc vult hinc generandi nian. Resistit conceptioni mulierum generandi ante coagulationem admodum, & non Dicocondi se fl.

## De Silybriis. CAP. XL.

Silybrium.



**SILYBRIUM** Menthae species Silybriam colligitur inter hancisles Menthas simile apparet tota eius floris tubula, & canes angulosi, vult quæ ob hinc tubularis nian late postquam flingula muros, grana enim odorata colligit hinc. Item in firmo ramulorum, vult in caputem ac parte globosum collidit, parpaturam.

Inherensibus ac vult, vult in pino, scum folla aqua habentos, ac summa nian.

Cum aliis Menthae floret, ac veremur hinc.

Silybrii quæ Græci dicuntur Latini Silybriam Germani Silybriam, & Daffinier quæ Galii Menthae sanape.

Est vult & aliud Silybriam à Therophrasto moneo proditum, ac cocononem succulorum nian hinc nian, cu odor acior quàm Scylli, quod, vult, nian in Mentham trahit. Hanc nian vult Silybriam à Dicocondi, & vult de scripto Silybriam, hanc partim diffinitio Neque enim cultu remittit de ber illud, ac in Mentham degeneret, sed cum vult nian hinc hinc hinc, ac in hinc hinc hinc, ut hinc hinc hinc Menthæ, non datur assequi.

Silybriam quoque est, Candamine cognomento, quod inter Palestines & aquantes Perpetua de scriptum.

Gerenda Silybriam Menthae hinc hinc hinc, vult ac hinc hinc hinc, non nian quàm Menthae odorem vult ac vult hinc.

Comendatur ad eadem, adque Mentha, vult & ad vult & ad vult hinc. Vult ac vult in nian nian nian nian, non de hinc hinc Mentha, quæ sanape ac nian hinc hinc hinc.

## De Calamintæ montana. CAP. XLII.

**CALAMINTHA** Diocoride ac hinc nian vult. Altera Palege similia Teria Mintallo cognata.

Montana hancisles est herba, vult pedis al hinc hinc hinc, in mullis aliis d hinc, hinc hinc quadrangulare hinc, & vult hinc hinc hinc, & quorum hinc hinc hinc hinc hinc, Ocum ac Metelophylli muros, quæ hinc hinc hinc hinc hinc, ac hinc hinc hinc hinc, & hinc hinc hinc hinc hinc, vult hinc hinc hinc hinc hinc, hinc hinc hinc hinc hinc, vult hinc hinc hinc hinc hinc, vult hinc hinc hinc hinc hinc.

Montana nian, ac hinc hinc hinc hinc hinc, Italia, Gallia, & Hispania compluribus locis, ac hinc hinc hinc hinc hinc, ad hinc hinc hinc hinc hinc, ac hinc hinc hinc hinc hinc.

Viget vult, ac hinc hinc hinc hinc hinc, à hinc in Autumnum flores, hinc hinc hinc hinc hinc, hinc hinc hinc hinc hinc, quæ elegans ac vult Mentha. Latini nian hinc hinc hinc.

*Spina  
maritima*

*Calamagrostis montana.*



*Polegum sylvaticum, sive Calamagrostis altera.*

*Dianthus  
maritimus*



Item etiam Metallum perpetuum vocat, & notu-  
na singularum inter se commoda. Monstrant Cal-  
amagrostem Obliquam Calamentum, & habent  
Calamentum montanum appellat Galienus alantem.

Est autem Calamagrostis haec in quibus prop-  
rietas gustu saporis, & acris calida, ac tenuis efflu-  
ta, sicq; ordo quoque modo, ut si de his ut  
tenues tenues huiusmodi digerit, et affluens videri  
nunt, ac incidit. Praesens ita corpus affluens,  
cum ipsa per se, et cum mollioribus per speciem co-  
calant, habentem est, omnemq; corpus & digerit &  
causant: sicut enim rigens per incantationem reperit  
tollit quod & per se dicit in quo incoda, ut cap-  
pore cu hoc modo, ad habere fructum hanc signa.

Decoctum eius potum vniuersum, et in lesa polle,  
& conceptus omnia, quod & admodum potest. Reperit  
obus illa, per se propter Galienus alit omnia, et in  
nibus, ac choleris, Diacorde autem, ac choleris.

Idem prodest, vapore locantem, ac felle ob-  
fusa hinc aperit, & expurgans.

Presumptum in vniuersum resistentem potum aut in-  
posita demorsu à serpente operatur accersit ut  
substrat serpentes fugat.

Sagittata tollit, & vna cum aliis eadem eadem  
resistentem: sed ad eadem accersit magis quam resis-  
tentem (vna Galienus) ad habere praesens.

La menses & menstrua cura tale de melle potum  
enecat eadem ratione & aliis vniuersum factum in-  
fusa. Plurimae succis maribus superius enecat  
sanguis proflansum sicut est: & vniuersum (que  
Dioscoridis maribus) cum Myrsi tenuis in pulu-  
pelo gargazantem vniuersum in eodem sicut admodum  
potum, huiusmodi liquidum et alio enecat, & in-  
enecat huiusmodi potum. Signa etiam  
coram dolore ab infirmitate huiusmodi accersit: sicut  
enecat elephantaem et ita in modum est, si quod  
Dioscoridis) postea terram lactis bibere. A palis, fo-  
lita, in eo, frequenter commanet cura, elephantaem  
hanc enecat.

Comperitur autem ex hac Antidotus abis-  
nomem habent, à Galieno lib. 4. De sanitate nobis  
descripta, que non modo menses digerit, sed &  
vniuersum, quibus melle huius non succedat, vni-  
uersum exhibetur, vna enim est in praesens huiusmodi  
siquidem successe cura omnem molestantem ut  
vniuersum molestantem menses procreant.

*De Polegio sylvatico, sive altera Calamagrostis.*

CAP. XXX.

**S**YLVESTRE Polegio oblongum, ac leuissimum  
resistentem furcaceum, angulosum, et tenuis adha-  
sit, hanc de qua sunt affingentes, sed plurimam  
procurat bene cura vniuersum vniuersum hanc ad singulos  
quod vniuersum sibi in vniuersum opposita, et vniuersum  
maiora, et dicitur quod Polegio, ac melle huiusmodi  
incantationem. flos Lami (vniuersum), super fo-  
lita, et vniuersum in vniuersum Polegio, quod dicitur in modum  
qui dicit, sed qui in vniuersum hanc plurimam accersit  
purpuram apparent. radix fibrosa est.

Natigum

Nosquam frequentius quam in agris profertur quando vel de mella sepes est, vel cum co-  
 quitione neperis tamen & alibi contingit locis apricis, ac Soli expofita, quibus gaudet.

Estis mensibus viget ac florat hanc Calamitæ speciem, sub *Nasturtium* colligi potest.  
 Calamitæ speciem esse hanc debemus Dretcorides Pategum aut Sybaricos, ac *Phlegma*  
*dygialis* dicit Latini vocat *Neperam* (Officinarum aliam *Neperam* appellant) *Apuleius* cap. 104  
 Mentem agnam, Itali *Neperam* dicit Itali Germanis *Wittipolze* Belgis *Wittkranten* Latine  
 patet Gallis *Præfio* *faucem* Itali *Neperella*. Hispanis *Neperda*: Bohemis *Morilla* Poloni.

Feracitate autem & calore quoque, ac sicca, & hanc Calamitæ speciem est.

Eademque feracitate præfatis Est tamen hanc raris partem quam *Montana* Galentia veli-  
 tificationem utroque, *Montanam* etiam præfatis.

De *Cattaria* herba, seu *Calambæ* terra.

CAP. XIII.

*Cattaria* herba.

*Cattaria* folio longior.



**CATTARIA** herba in altiori affertur caulis protulis cubito altiores, angulo sic, fluitat, 1  
 crasso sine foliis hinc, marginibus crenatis, Mel rhiphylla armata, aut *Martubis* similes, sed  
 longiora. Florenti & ditate hinc oral befoit, partem superiores virgulas ambrano, quantum aplo  
 fistigo in speciem aut particulam digeruntur, eadem multibula comitantur & perennat. Tota  
 herba veli cura foliis ac feracitate molli, ac incana longius pubesce, minus quam *Microthe-*  
*dum* in odore autem acris & caput feracitate por feracitas cum amantodone accretilla.

Nasturtium circa in agrum, horreum ac apertum, locas aggres, krebes ac vias hanc dicit  
 ac viginofum folium amara transfertur ad heros.

Hinc & alia neperam speciem folio longiore angulo sic, colore vultu natis et hinc, 2  
 feracitate hinc quod angulo sic, colore expofitione, ac colore e cubito dicitur purpuris  
 ad caruleum mollescentes, exiguus strobilus purpureus dispersi, odor hinc vehementior, ac  
 sapor acris.

In Hispanis hanc neperam ac speciem nasci ferat.

Vocat *Cattaria* mox ab ipso *Vener* Itali ac *Angulo* hinc profertur.

Recomor etiam herbam appellat *Cattaria*, & herbam *Cattaria* ac eo quod foliis / caros mo-  
 tantur: hanc vultu delictentibus odore enim voluptate caput, hanc feracitate hinc affertur, ac ut

quæ voluissent, iam de magna antichine natura de folia deperierunt: Officinae Nepetam appellant, sed Nepeta proprie (vel sempiterna) Pulgaria est: ysaclire. Cato in libro De re rustica Felicitate herbe nominat, sit ne Cato ad hanc, vel ab ea dist. vero, perquirendam. Germanis hæc *Aasen muna*: Belgis *Cam cam*: Flandris *stepe*: Italia *Camaria*, sive *stork gatta*. Hispanis *peña blanca*: Gallicis *herbe de chat*: Anglis *cam cam*: Bohe mis *herbst*.

Temperamentum hæc calidum quoque ac siccum obicit, & quæ alia Calamitaceamdem potest.

Commendatur ad capitis dyscrasiam, ventriculi, & vici dolores, ac morbos ex præcipua cruditatis humore, & ex fluxibus natæ. Ruptis quoque, ex alto delapsis, ac præcipitatis, casu luxu cum vino aut hydromelite datus subinde convertit. Aditus & ad vulnæ, & infusum anal. ubi in quibus ad anæsthesia vocandos facit, & ad secunditatis in cordone.

De *Millefolio*, sive *Achillea*.

*Millefolium* sive *Achillea*.

CAP. XV.

*Millefolium* purpureum flore.



**MILLEFOLIO** fœpi subinde complures supracubi altitudinem assurgunt, teretes, durissimæ circa quæ folia quidem o blanga, à lateribus varie dissecta, ac veluti è pluribus cotinuis, quorum singula ad sensum. Considera folia accedens posse apparere - emittunt in summo umbellæ orbiculatæ, hæc, quarum flo. sing. candidi aut purpurei, radii et filia demittunt multa. odor: herba est non molesta, sed medicata.

Nascitur iuxta aruorum, prætorum, ac hortorum margines Achillea, atque non raro in ipsa agris fructuando ac restibus solo de frequentius quidem quæ alibi est herba.


Flores ac umbellæ profert à Maio in usque autatem sentena antea perficitur.

A Recensentibus *Millefolium* appellatur. Dioscoridis est *ἀχίλλειον* & *ἀχίλλειον αἰθίορον*. Latine *Achillea* & *Achillea Sideritis*, quod confirmat. hanc cum *Dioscoridis dolo* percutit, vel hæc clarior est. Invenit hæc (inquit *Plantas lib. 1. p. 212. 1.*) *Achillea* di. sicut in *Chama*, quæ ubi ad *Achilleas* vocatur, alij *Sideritis*, apud nos *Millefolium* vocatur. Sicut tamen & alia *Sideritis* alij non *Panaces Heracleon*, de quibus alibi *Apuleius* variis locis appellaciones adfert, quarum quædam veteri nomenclaturis nostras apud *Dioscoridem* quoque extant: *ἄσπερσιον*, (aut *ασπιδασπον*) *γαββασιον*, *εργασια*, *αγορικ*. Latine *Milidith*, *Supercilium Venetiæ*, *Acorum* (aut *Acorum*) *δυστανικον*: *Gallica Sideritis*, *Figura anethi*.

*Millefolium minus* (sive *Stratiotes Chilocephaly* Linn.)



*Chilocephaly*



etiam Germani *Barbri* appellant, *Millefolium* *serpyllifolium* de *Stratiote* *Stabo*. Belgae *stratiote* *leali* *chilocephaly*. *Hesperia* *Melloy* *serp* *Calli* *Melloy* *facile* *Anglo* *parvata* *vel* *tota* *Belgicis* *epithymif.*

*Achilles* *auri*, *Galieno* *maior*, *facultate* *Sedum* *ab* *his* *hand* *est* *diffinita*, *ab* *ergens* *videtur*, *de* *medic* *in* *gr* *ingoda*, *exterior* *in* *illud* *idoneum* *et* *superat*. *Tota* *coram* *tractata* *valencia* *glutinat*, *&* *ab* *inflammatione* *tenet*: *linguam* *unde* *quaque* *profusorem* *sappret*. *Y* *non* *profusaria* *in* *vellet* *opposita* *sistit*, *cum* *&* *in* *fibris* *malic* *ibri* *bus* *addita*, *aliam* *in* *serenem* *colicam* *&* *ad* *distentum* *valent* *potu* *assumpta*.

*Compendiosam* *sola*, *gloriam* *tenet*, *de* *profusorem* *revertens*, *dentium* *dolorum* *maiorum*.

*De Millefolio minore, seu Stratiote Chilocephaly. CAP. XVI.*

**M**ILLEFOLIUM minus sive *serpyllifolium* est, viz *iodicantem* *alia*, *cuius* *scapos* *concessant* *oblonga* *quidem*, *sed* *capita* *foliola*, *li* *lamellas* *tenues* *linea* *diffusa* *in* *ter* *pestrum* *exilis* *parva* *et* *annulari* *umbellae* *in* *sub* *gr* *et* *rotundae* *foliola* *color* *vel* *quidem* *apud* *Belgicis* *videtur* *conspicre* *lucos* *profusorem*, *tenues* *fibres* *radices* *sunt*.

*Racem* *hemisphaerica* *Millefolii* *reperitur* *gyp* *itur* *auri* *pingis* *ac* *lato* *folio*, *de* *sub* *gr* *in* *prata*.

*Angulo* *mentis* *flor* *scap* *prae* *cap*.

*Stratiotes* *esse* *Millefolium*, *qui* *Graeco* *egyp* *tiaca* *γυπ* *tiaca*, *apud* *Dioscoridum* *de* *ser* *pus* *lato* *offendit* *re* *sp* *ender* *de* *altrudo* *ser* *pus*, *con* *strati* *otem* *forma*, *in* *flor* *colore* *ambiguitas* *quod* *idem* *occurrit*, *quem* *Dios* *alium* *describit* *in* *ser* *pus*, *ang* *ti* *colore*, *vel* *vulgare* *habent* *exemplaria*. *Andreas* *in* *ser* *pus* *Lacuna* *ex* *re* *cti* *colore* *ad* *dit*, *de* *gyp* *ti* *colore*. *Re* *cti* *otem* *ser* *pus* *Millefolium* *minus*, *ac* *Millefolii* *lucum* *appellat* *Officin* *ac* *vulgo* *incognitum*.

*Est* *verò* *de* *aliam* *Stratiotes* *con* *sp* *er* *entem* *ser* *pus*, *de* *qua* *inter* *aquatiles* *ser* *pus* *Ponticae* *quarta*.

*Facultate* *autem* *Stratiotes* *Millefolium* *pro* *ter* *med* *ocum* *frigiditatem*, *mor* *tibus* *quaque* *officinis* *habet*.

*Ad* *orena* *linguam* *profusora* *sistenda* *valde* *utilis* *est*, *de* *ad* *re* *ctum* *ven* *os* *que* *vixit* *solida* *de* *vel* *re* *na* *quaque* *glutinat*. *Sunt* *verò* *de* *qua* *ad* *Stabat*, *ac* *Galieno*, *ser* *pus*.

*De Oxyria. CAP. XVII.*

**P**ROCYRA & *ser* *pus* *valde* *causis* *herba* *Oxyria* *est* *altrudo* *cum* *barbata*, *vel* *al* *trudo* *color* *ditate* *vestigia* *ser* *pus* *line* *ponis* *vir* *que* *tenet* *ser* *pus* *de* *re* *na* *ob* *longa* *angustia*, *tenues* *veluti* *Lami* *flor* *scap* *et* *rotatione* *ser* *pus* *flida* *haerent*, *herbari* *colore* *inde* *terran* *la* *aque* *conditum* *ser* *pus*, *parum*, *ac* *re* *gnantem* *fibris* *radix*.

*Plerumque* *Graeco* *lo* *ti* *ponit* *gyp* *tiaca* *apud* *Indicos*, *quoniam* *de* *alio* *in* *lo* *ti* *ac* *ser* *pus* *ser* *pus*.





*Perfoliata horta.*

*Perfoliata horta minor.*



ipſam exigua ſpeciem referentes, in quibus ſemina, radii oblonga, ciliata, non erant fibril.  
 Sicut vias, loca deſerta, & montes, ac in caſtibus et plurimum ſponte provenit: &  
 quocirca in omnibus hanc verò ſarum & omnino exigua.

Florat, riget, ac ſemen perfoliata tota elato.

Vulgò Perfoliata horta, vel Pera paſtoris Germanis *Stilf* vel *Leffe* vocant Belgis *Deffent*  
 angli *Galles* *dearſi de puyſar* *perberger*.

Refrigerans autem temperamento ac reſiccans eſt, & facillime valde adſiſcicata.

Sanguinem vidoqueque rancorem ſuppreſſat, ſiue ſiccus aut decoctio ei in poſto, ſiue in ca-  
 ptulatoſe, balneo, aut alio quocunque modo adhibita. Modicus & dyſenterie in emen-  
 te. Cruentis vulnere ad ſanationem perducit: incipientibus inflammationibus, ac omnibus  
 que ſeptem ac refrigerandiſſimant, valenter adhibetur.

*De Perfoliata. Cap. xx.*


**C**AP. XX. *Perfoliata* græcis, æta, & glabre, pede alioſo, in ramulis diſtribuitur  
 quæ folia ſic am bene, et ramos amplectitur ac circumdant, lata, lævia, glabra, venoſa,  
 dilata vix utriusque lobis in ſaſtigis, à quibus vix cum foliolo exigua, ſiſtula terrea, ſubſu-  
 tra, ſiſtula terrea ſubſiſtente, ramos qualem *Pulegi*, radii terrea, candida, pauca fi-  
 bra capillata.

Nonnullis locis in arvis, inſer ſigette ſponte erit, ratiſur & in pratens & arvis agerum  
 in agris in Italia, Germania & Bohemia non inſiſcitant, ubi in hortis ſemina.

Julio & *Augusto* præcipue florere ſiſtunt, quæ ſemina perfoliata vocantur.

*Perfoliata* aut *Perfoliata* ex eo rancorem appellatur, quod coliculi per ipſa non ſi-  
 aut ſola, ipſaque perfoliata Germanis *Quarſchwey* & *Quarſchwey* *Quarſchwey* Belgis *Galles*  
*Perfoliata*: Angli *Theraps* vocant.

Ad hanc veluti congenerem à nonnullis in fernis contingit, quæ *Vaccaria* dicitur: affertur *Perfoliata*  
 hæc ſupra doctorem terrenis, præculata, glabra ac runcida virgula, in alioſis à quæ  
 cum arculata hanc ſola oblonga, lævia, ac runcida, ſiſtula oppoſita, hanc ita circumſiſta, et vix  
 apponit: emittit in ſingula virgula capillata, membrano connecta, hæc à diſtincta. *Lych-*



nuda spiculis, sed maiora, in quibus semen perfectius nigrum, sicut in Melanthio, flocculo antecedente tenui ac tubente. radice in fibris aliquot diuisa. Tota herba adeo dilata videt, ut subulula videatur.

Et huc plerisque locis in arua reperitur, perferrius loco ac resistit solo.

A. Solitius videtur in Austroribus usque florere, ac interea semen perfectit.

<sup>10</sup> Vaccinifolium appellatur Perfoliatum rubrum n omnium Gessneri nudiunt. Tam ceteris Vaccinis Cordus Hallucinarat qui Glabrum sine hincdem esse, aut eius aliquam speciem esse dicit, ad radicem siquidem motu, multo minus amaleo inficit, quod hinc perhibet.

Sed ad Perfoliatum videtur dicitur. Modice calida, paulo vero atropi in licca hinc est, vixit nonnulla amara & astringens. Intra autem moratur, quibus solanda & ferrum rariandi vix est. Datur decoctum aut herba puluerepta, & ex alto de lapide ad interocum talia oras, praesertim puerosum commendatur, horum enim proincentum vimblicum, rorocum fariis & vix vix, ac castellanum odo inposita, reprimit. Strumas etiam hoc modo adhibere solent.

*De Pimpinella sanguifera. CAP. XXI.*

**D**IFFERT non parum hac ab ea Pimpinella, quae & Saxifraga, de qua inter vimblicum Stracem hanc, duo genera. Vna minor, ut plerimum hinc, altera maior non nuda spiculis.

1. Folia horrenti oblonga, et plures ad vnam pediculus congesta, quorum singula subrotunda, ambra erecta, acutiuscula hastata sunt: huc caulis non omnino obscurus videtur, & inquantum firmus, in cuius subpediculis rotunda, quae ex aguis flocculos purpureos, deinde nigrali profertur semina simul confarita. radice subest longa. Odore hinc Pimpinella Peponem aut Cucumerem aliquo rari modo.
2. Styliferis omnibus partibus minor, folia amphora maioraque quam superiora etiam longior, si bene bicubitalia, capsula maiora, obliquo purpureoflora: semina quoque sagittata, & maiora, radice longior. Hinc autem Pimpinella odora grana distantur.
3. Erat prior Pimpinella quaedam locis alpina, petiolis & interuolis, veluti plerisque

Interius

Pimpinella Sanguifera L.

Pimpinella Sibirica Sanguifera minor.



*Berberis*, Germaniæ ac Belgij locis In horti quoque frequens ferunt.

*Sylvestris* præterea ac *palustris* magna pars, & non modo in Belgio, sed & in Germania, Bo- 2.  
hemia, Pannonia utraque, & in aliis locis frequens.

*Pimpinellam* hanc recentior appellat, & ad differentiationem alterius *Sanguifera* quam-  
vis & *Germin Sanguifera* & *Sanguinaria* nuncupata referatur. *Germin* *Poposellam* dicti  
malus, à *Peponem*, quem refert, ut dicitur, odore. Alij *Pimpinellam*, aut *Peponellam*,  
plurimè *Solbatollam* nominant Germani & *Kellerbaum* per *Basiliensium* *Quilfrant* *Strig-*  
*gilliam* Belgis *Pimpinella* *Callis Sanguifera*: Anglis *Berberis*.

Cum altera *Sideritide* *Diofcoridi* committatur, folium (& præsertim ramos) quod scripti-  
moribus multis ambrosia ferens creditam, simile est *Trichomanis*, quod ex *Filicum* est gene-  
re, & *Effiger* quoque appellatur: Semem angulatum rotundum est & datus quàm *Berberis*  
respondet & id quoque ac simul facillime, ut ex ipsi *Sideritide* alterius descriptione satis mani-  
festum. Aer eiusdem *Diofcoride* habere rursus *solbatollam*, tenues, folia *Falern* utriusque per  
marginem densa, in summo virgularum terræ & longas *apophyses*, in quorum fulgore glo-  
bativæ ipsi rila, in his sicutem velum *Berberis*, sed rotundius ac datus.

Potest verò & eadem hæc esse, quæ à *Plinio* lib. xxiii. cap. xvii. *Silicicæ* in *Peride*  
nominem traditur, quoniam *Julianus* ea. Eandem & *Proscodid* appellat, ac *Castigæ*rem, 77  
tam & *Dionysius* in *placem*, quoniam vno in eò commentu, cui quoque hæc *Pimpinella*, ut  
dicitur, *fructum* grati confert. Nec repugnat quod de *Sideritibus* alio loco *Plinius*: Non  
raro si quidem curat, ut de eadem *serpe* sub differentibus nominibus dicitur locis agitur,  
quod sine curâ accidit, quando ipsi scriptoribus *serpes* non sine notæ sunt: veluti *Sideri-*  
*tidem* *Plinio* non sine cogitatione fuisse, vel ex eo apparet, quod non nisi alteram de hæc  
ferentiam adhibet.

Cæterum *Sanguifera* *Pimpinella* aut *Peponella* præter eximiam refrigerat dicit adstrin-  
gendi facultatem, refrigerat quoque medicamentis: Habet verò & tenet superficie tenuis  
quandam leuiter odoratam & temperatam qualitatem, quæ in variis in *medicis* deponit: hæc  
nec siccæ herbe adhibet, nec succo aut decocto committitur.

Ad vulnèra autem *Sanguifera* vis singularis est (quod & de *Sideritide* altera *Diof*) & à quatuor-

quamplurimè lacerata sanguinem supprimit (singulisque suis nominè accepti) atque inter ac ferri adhibita.

Datur autem vel succus, vel decoctum, vel ipsius herbe foliorum aridorum polvis, fontifera contra si imponitur, vel alii externi remedia adhibentur. Venens fluxus, cum indylcrostema sitit: ad nullam hinc quæque profusa plurimum quoque efficitur.

Est autem non infrequenter in accensis maris, quibus ad halitus rursus facies creditur, veluti & in vitæ decocto, cum granata quædam inter bibentium cura, sunt.

De Phalangia.

CAP. XXII.

Phalangium tenacissimum.

Phalangium non tenacissimum.



1. PHALANGII gratissimus inter angusta vixit folia, à medio hinc in raris & longis scopulis, in ramulis distributus floribus quibusdam sedis, foliorum, & ramulorum aliq. cum concoloribus modis capitula succedunt rotunda, Ochras minora, Lani velutis similia, per marginatum in tres partes hinc debet hinc situm verò in his regnum, veluti Melancholi, non perinde tamen angulosum. radice terrena & oblonga non debet hinc in raris fibris.

2. Altera hinc species superior folia, floribus, fœmine & radicibus fibris, sed costibus eius in ramulos nullis distributus: flores ordine & gestibus profert, Anthonici fœno modo, quem sicurifer.

3. Inter Phalangii species à nonnullis quoque refertur Alphodelus minor, quem inter Alphodelos vocare maluerunt, quoniam Phalangia non vocantur.

In collibus nonnullis occidit in apud Gallos, & alibi gignitur hinc procul à montibus, ac rursus aquarum decursum.

Ita ac subinde hinc vixit folia, Angulis semina perficiuntur.

Phalangia Græci, Latini Phalangium: à nonnullis Phalangia ab efficitur: appellatur verò hinc propriè Leucacanthus, nam ex Acantho, sive spinosum genere habet non posse Italis dicitur Phalangia.

Est autem Phalangium, Galeno teste, tenacissimum, & diuocentis facultatis Hinc folia, fœmine, ac fœmine cum vino epus acido esse contra Rosporum & Phalangiorum illis & terris patens succurre, Dioscoridis.

De Plantaginis.

Cap. XXIII.

Plantago major.

Plantago macrospora anaphalis.




Plantago minor.

Plantago media.



PLAN.

Plantago angustifolia.



1. radix albae non oblique frequentibus tenuissimis fibris.
2. Media Latifolia quoque est, sed tamen quam majori minoribus hinc sine folia, latiora vobis, sed non ita breviora quam minores, subinde quoque tuberosa & mollior hinc hinc: caliculi vero floresque speciem, moles accendit. radices similes terribiles.
4. Angustifolia Plantago foliis est & oblongis & angustis, crassis inter se pediculis: vero vna cum suis specibus ac loculis, maioris Plantaginis speciem peritiora radice medioenter crassi & longa. Pailum obtusum: Major ac Minor Plantago Media in Germania abunde frequens: Angustifolia septentrionalis in Italia, ac raris hinc hinc reperitur, quae quandoque salis ac maris aliam videri: Quae in septentrionalibus locis Plantaginis vna sunt.
- Aliter tempore ortu hinc hinc reperitur, atque vna cum specibus reperitur, hyeme sola restant radices, hinc facile perirent.
- Plantago Graecis *Αργυραρα*, id est, *argyria*, *αλ* & *αραρα*, *αλ* & *αραρα*, *αλ* & *αραρα*, *αλ* & *αραρα*, *αλ* & *αραρα*, hoc est, *Septentrionalis* nomen: Officium Latini scribitur *herba Plantaginis*, *Plantago Hispanica* *Latina*, *7* *concolor* *Germanica* *Wegwurz*, *Wegwurz*: Belgis *Wegwurz*, *Wegwurz* *Gallis* *Plantago*: Angli *Plantain* *Bohemis* *Chernit*.
1. Neque alia maiori Plantaginis caetera appellaciones, nisi quod quandoque *Raba* cognominatur.
2. Minor *Plantago* *verobona*, *id est* *Quercus* *verobona*, & *Lanceola* sine *Lanceolata* *Germanis* *Επιπυρα* *Wegwurz* *Gallis* *Lanceola*. Belgis *Wegwurz* *id est*, *Colla* *caerulea*: Angli *Wegwurz* *Wegwurz* appellatur.
3. Media *Plantago* *speciem* *media* *nomen* *habet*.
4. Angustifolia *Plantago* & *sub* *venosa*. Nec videtur hinc desim *herba* *Serpentina*, *de* *quibus* *liber*. *Plantago* *venosa*, *ut* *Galenus*, *maxime* *est* *temperatura*, *habet* *etiam* *quosdam* *aqueos* *ingulos*, *volubiles* *etiam* *quosdam* *temperos* *in* *hinc* *ac* *frigidis*: *haec* *que* *refrigerat* *hinc* *ac* *desiccata* *in* *caerulea*. *Ad* *vires* *rebelle* *conterit* *ad* *fluxiones* *ac* *periculosas* *conterit*, *ac* *ad* *dyenteriam*, *tingimus* *prodest* *in* *hinc*. *hinc* *gloriat*, *ac* *aliam* *vires*, *prodest* *in* *hinc* *ac* *vetera*. *In* *Germania* *hinc* *conterit* *obinet* *medicinas* *peritiam*, *ac* *frigiditatem* *que* *non* *obstipescit*.
- Radix *similis* *est* *facilitate*, *nisi* *quod* *hinc* *ac* *minor* *frigida*. *Semen* *subtilitate* *est* *peritiam*, *ac* *minor* *frigida* *facilitate*.
- Fructus *vero* *Plantaginis* *maxime* *facilitate* *ac* *vires* *caetera* *peritiam*.

Herba Stellata: Cornu Cervina



Cornu Cervina: Cod. Cas.

Serpentis Maritimi



**A**D Plantaginem accedit Herba Stellata appellata: folia laciniosa oblonga, angusta, adnata utriusque oppositis lobis rotunda, infra cornu cornu, supra se palis cornu firmis apositivis, quae radices filis in modum orbiculatum firmis hinc dicitur lobis, aut inter h. orbiculata medio filisquam utique foliula, deinde laciniosis grandis, infra speciosa Platanis, quam proxiimi, tunc minor ac brevitate, refert. radix oblonga, crassa, alba.

Nascitur locis incultis, arida, arenosa, siccis vix: in Italia, Germania utriusque, Gallia, cum et aliis frequentis reperitur. Scitur quondamque in horto, vix amplius laetatur.

Spica eius eodem, quo Plantaginem, tempore conficitur.

Martialis etiam hanc refert speciem, dicitur, extensam, angustifoliamque lobis, hinc quoque procumbentibus, sapore adstringente (sive Plantaginem Stellata herbae radice tenui, oblonga, lignosa).

Hanc in collibus & siccis et in arboribus, & quidem in agro Cornentis, hinc prociat à Sereno Baroni epa. Lobis et quondam martianam adstringit prociatorem hinc, sed calcibus adhibet, ut iniquitatem non spernet: quam aut in alio montium agro in Nubentis Gallia à se obtinuit.

Prociat Herba Stellata non prociat. 11.

nam: fura & quæ Scellana nuncupant, Stellanis tamen & Aichysilla) recentioribus dicuntur & Aichys Scellana.

Dicitur verò & Cornu Cera, quod folia ramosa (plura cornu certum) pro se ferat similitudinem: à Belgis vulgò *Weyden*, & à scots *Weyden* & *Weyden* crugi, id est, Cornu herbari Hispani *Corcholla*. Galii in *Ortu* vocantur *Germana* *Craperis*, quod illi à Leonharto Fuchio putatur inditum, quod Cornuopum Dioscoridis esse iudicant, veluti & nonnulli post comitali angustine, sequuntur Cornu pedem, id est, *Craperis* sonat, non tamen hoc Dioscoridis *serpente*, est. Neque enim oblonga herba, nec villosovepa, vinctula castre vinctulorum quibus terpis: solum tantummodo per terram formatur.

Cornuopum autem herba crugi loblonga, & serpens, ut Dioscorides & Plinius testantur. Atque hanc ob causam Herba Stella nequaquam pro Cornuopo à nobis haberi potest.

Quod si verò & fides iconi habenda, quæ in Codice Casiano reperitur, longissime distans Herba Stella à Cornuopo est. Depingitur enim in hoc Cornuopo tenuibus ac virgulis & sulculis, & roturas cariosa in pedem digitis referantur sulculi, ut ipsa figura ostendat. Casianum autem veteris manuscripti codicis similem nobis a se servat doctissimus ac diligentissimus Bernardus Paludanus, qui hanc uterque Cornuopum, qualem iconi exprimit, à se firmè ac perpetuam hanc longè à Tripoli, & ad iudicem recentis Libani nobiscorum narrat.

Sunt tamen inter medicinas Cornuopi appellationes, quæ non perperam Herba Stella consistunt, ut sunt *Alpura*, sine *Harenna*, *Alpura*, *Sanguinaria*, utrobis eorum loca erant, stella sine alio modo per terram spargitur, & adsertis sanguinis quosdam profusiones pernit. Sed pernis quosdam pleribus scriptis committitur hanc neminem esse reperiri, sicut etiam distans in scriptis voces inter se confunduntur, pernitiam quæ inter nos est oblonga, et alibi ostensum est.

Altera herba in *Marchiola* & *Serpentinum* vulgò à Gortensibus appellat refert, ac serpentina quoniam esse & rubram quoniam in verbis conuenit cum *Angustifolia* *Pluragine*, ac ab hoc distat, considerandum relinquamus.

Ceterum Herba Stella manifestè adstringens, seipda & seica, Pluragium facultate accedit. Prodest Nephritis in oleo aut cibo sumpta, non tamen caletum aut emat ex pelvis, sed tamen debili occa roborans, caloremque emat conreperant: sanguinis vero ex hac emponit ob hoc emat ac filit.

Receptur & inter acetaria, & cruda edunt.

#### De Ceruo Cerui altero, sicut reperit.

CAP. LXX.

Ceruo Cerui altero, repens.



**C**ERUUM Cerui altero à superiore herba differt, nec enim à radice nemine tamulo classicaliorem in terra promit complures, oblongos, in diversa tendentes, ac bursi appetunt, neque vsquam à terra sese antelermis, nec quoslibet oblongos, aut in se, ac adsum habentia Herba Stella sine similitudine, sed minus ac laua. Rosculi candidi, exigui, à se mutuo sine scissuram conceperatula subserpantur parua, aspera, in duas fures catubertio, nite mans, candida, in altum descendit.

Reperitur in montibus & arenosis locis, non tunc secus vjia, ac flumina, in nouissima aggeribus inter Scabiam quod Beubaros frequens, in Gallis quoque non infrequens.



Tota effusa, & in multam lycemem vires.

Ruellius, qui hanc inter nos lib. 2. cap. 64. & cap. 114. de Simplici, Contra-cera, quoque appellat, ut, & Poletum Milanum Columella esse descriptur.

Pl. Ant. non-Cor. nota.

Ad Coronopam descriptionem accedere alioquo modo posse videtur, nisi quem Codex Celsus esse debet deservens in titulum ab hoc Corneo certano esset, ac manifeste ostenderet legitimum Coronopam holsiam fuisse incognitam. Quam ob causam Coronopam hanc non debet, sed Contra-cera alterum ac repens nominandum; possit verò & Pseudocoronopam dici, si modo hanc appellatio tenenda.

Fœditate autem hæc herba aliquantulum emolida ac foeta est, ad Nephriticis herens, ut si potest, sic & ad qualitates accedens, est tamen innoxia, & innoxialibet.

Cauda, inquit Ruellius, est ut accutata, & cocta, & cum aceto manducata. Porriolam etiam modo tale coctura, apud nonnullos feruntur.

De Plantagine Angustifolia alba, seu Hololepis.

CAP. XXVI.

Plantago angustifolia alba.



AD Plantagine genus referenda quoque videtur, quam Jodocus Clusius pro Hololepis depreghendam curavit: folia est hanc angustifolia Plantagine minoribus, angustioribus, longaque alba, ut arefocantibus, hinc procerioribus; inter que quædam ferre pediculis amollitur, & modo sursum versus foliis utique granat, usque speciem digesta, & ex herbore colore candicantebus; sicca est in manibus valens fomes quæ Plantagine, radice tenet, longa, & ligata.

In ambo collibus plerique Holsæ utitur etiam Nephriticis autem materiam aut candicantem si obtinasse C. Clusius refert, quam haud procul Valentia & res vas.

Martio & Aprili illic florere in agro Salmedunensi Maso denunt: in Belgio ac Germania etiam ferunt.

Plantagine angustifolia albam, aut Holsæ plantagine fomes non ibere quis appellaverit.

Cum Hololepis contineret, si alioquoque sit vinculis haberet, nam alioquoque Herbariis Siciliæ & Saperentia similitudo ac descriptioni respondens, sed veluti Herbariis Siciliæ legitimum Coronopam haud esse existimamus, quod non ferat; ita nec hanc veram Hololepis esse facile admittere possumus, quæ vinculis tenent.

Clusius, ut Dinkonder, aut Orléans, vixit in Hololepis, ut in rebus deinde in coronopam referat.

Ad si hanc angustifolia angustioribus angustioribus & angustioribus est, Hololepis herba est ex aqua, hinc innoxia, innoxia aut quatuor digitorum: folia & vinculis habet Coronopam similes aut Graminis.

Plantam Hololepis sine duritia herbam esse ait, & ex aliis appellatam à Garcia; Et non solum ab hisque duris Plantagine hanc speciem esse, verum etiam longaque sua molli.

Hololepis autem, Galeno videtur, desiccandi vani habet cum adfirmatione: quanto hinc ad vulnera porri adhibetur, ad que solidanda tam efficitur est, ut vas cum cornibus cocta, eas simul cogat, ut Dioscor. & Plineus referunt. Ab hanc fermodi facillime haud aliena est hæc alba angustifolia Plantago, quæ siquidem & adstringens, & reliquis Plantaginibus, ut fasces, ita & potentis, haud dissimilis.

De Cauda Martini.

CAP. XXVII.

HVMILITAS & magna hæc herba est, spicata Plantagine simi modo, sed omnibus partibus minor, ac tenuior folia parva, perquam angusta, inter que cuiuslibet affligunt tenentur.

Corda Maris.



Fucus vesiculosus.

terea, acriter, quorum falgida foliola herbacei  
insident, unde oblonge, angulatoque speculibus,  
caulis parvo cum mucronato limbo limbolet, sed bre-  
viores tamen, in quibus mucronatum filamentum,  
radix fibra tenuis filamento capillare.

Lata de cultu loca amara inter frigeros non ra-  
ro, quandoque etiam in pratis ac locis vis re-  
peritur.

Aprili & Maio viget herba cum foliis ac  
specu, post luniam vis reperiri potest.

Belgia *Stuylen* sunt, ad eam corda maris, can-  
da maris, & *androyer* sive *lyp* Gallia *Spine de  
fines* Anglia *Blow blong* Germania *Wassers  
Fest* appellatur. Holobium quoddam ex diuante  
Nobis pro venenibus recognita habenda apparet  
Nec efflorum *Denticula canis* Boellii.

Tempore refrigerata est, & assanibil cum  
adstrictione resiccans, et sapor eius ostendit.

De *Paronychia vulgaris*.

CAP. XXVII.

**P**ARONYCHA herba est hinc: foliola eius ni-  
gria, linearia, mucronata. Allicia sine similia  
pediculis admodum tenuibus inter hinc ad diuam  
aut in mare viciniam alios sine allicia: fol-

*Paronychia alia.*



culi in apophysis candiduli, inter valvula, serunda longiores, glabra, ac parvulae, in quibus  
fermen pentagonum. pro radicebus paucis cum a floris, ac capillate fibrae.

lapetrofi est, parietina, ac areosia anatum marginibus.

Ab Aprilis multum efflatum viget, 7. Oct. ac florit.

Paronychia nonnulla huc usque appellit, verum ac legitimum esse non constat, ut enim **Dioc. Nagesia** & **Basoritis** *Agave miris*, et *Diobolus* & *Diobolus* *perit*, et est, **Paronychia frutescens** est similitudo *Peplis*, longitudine maiori, foliis vero minor. Ac vulgata **Paronychia** nec fruticosa, nec modum veluti *Peplis* affertur, nec minoris, sed maiori quam *Peplis* fere similitudo.

*Paronychia*


- 1. Est verò & altera huiusmodi herba, quæ & pro **Paronychia** habetur, cuius emarginata ligulata lobque crenata, gracilesque **Rama** a radice videntur; affertur huc cauliculus brevis, huiusmodi lobis & alij, in quatuor suffragis flocculis candidis, & calycos postea parvulus, in quibus lumen: radix ramosa.
- 2. Locis vitibus, humidis, geritur, & in partibus reperiri & hanc contingit.
- 3. Vix potius viget, ac florere citò periturus, cultus caloribus perit.
- 4. **Paronychia** verò sunt quæ & illam esse, ut dicitur, velint. Sed nec hanc descriptioni suam responder.

De fuerit in barbanem vel prostrata, vel postea non nihil compositum adferri possit.

*De Polygonis* CAP. XXX.

*Polygonum maritimum*

*Polygonum ferri*



**POLYGONI** **Dioc. duo** sunt generis vna **Maria**, situm **Ferrina** nomen accepit.

**Polygonum Maritimum** tenuibus viticulis, oblongis, ac tribus articulatis scripte collectis, quos circa folia vitacea, longiora, ac angustiora, quam **Hyperici** aut **Rose** **Hyperici** distichis perquam exiguis peristilo excurrunt sequuntur **Rama** a triangulari, radiata, longiora, oblique filis, subside cordata, necnulla loca subrotund.

**Prostratum** America, vna ac **Ferrina** latè & inde occupat, non verò & **Italia** **Italica** scripte **Reperitur** verò & **prope** **Itacon** **marina**, veluti **Adoniam** **maria**, quod **speciosius** & **amplius** folium est & quoddam **montem** **am** **maritimum**.

**Polygonum ferri** **maris** haec quæquam simile est, sed citius ad **Equales** genera accedit: verum & **maxime** **cauliculis** **prostratis** **pedem** **circiter** **altos**, veluti **Boynon**, seu **leues**, non asperis, genitalia quoque **frequentibus** in **se** **fastigiatis**, **folia** **angusta**, veluti **Pisae**, **orbis**

colantur digesta, mollia ac virgata gemacula asperant. radix articulata serpit.

Nascentur in locis rugosa, sassa ramosa, ac fibris crassa copias.

Masculina tunc anni tempore vivit, hyeme concepta, ac femina facit: sed femina non nisi autumnate ciliis concepta, ac quidem raris.

Polygonum *alpinum* dicitur, id est, Polygonum montanum, & quoddammodo, uti videtur: Latine Serrata, Sangonaria, a Colanella Sangonaria: In Officina Centaureodia, & Corrivaia, & Polygonum quoque apud Apuliam Proferpessa, apud quem de varietate huius reperitur nomenclatura, quam inter vestras referuntur, ut sunt *malva, dactylis, anagyris, digitaria, diotima, galipha, lichen, althaea, eryngium, vicia, deinde, raphanistrum, anemone, lappula, malva, scilla, Geranium, Thlaspi, & Thlaspi* appellant: Belgæ *Veronica* grana vocant, hinc *benepel* grana: Itali *Polygonum, Corrivaia: Hispani Corvula: Galli Serrata & Corrivaia: Angli Sanguis: Bohemi, & Russi*.

Alterum Polygonum, *malva* dicitur, Polygonum feminæ, & Sanguis feminæ dicitur, ac (ut inter (parvas voces) Serrata, cum ciliis femine delinatur: Officina siccata vulgo dicit Polygonum cognatum non est, nulla idcirco eadem nomen alia vituperantur.

Sunt verò & alia nonnulla Serpica, quæ & Polygonum à nonnullis appellantur, à profundi Polygoni differentia, uti cap. de Herbis. annotatum est.

Polygonum in aere in aëthere Galena adstrictionem vim habet: vivit in ea aquam frigidam: secundi est cordis refrigerantia, ac etiam in aere terri.

Succi in epora, Diacutur, spissant ac refrigerant. Cruesq; excretionis, sanguis in racioni profert: Item Cholera & alia fluxibus: feminarum profertur cum pulso inpositum. Dolentibus autibus ac parulis in infusa muscum vino adactis: Serpantum morfas optulatur cum vino verò & melle coctus ad genitalem vicera, morbum vulvae, & vicera que serpant. Vnam quoque et ac vna in facido modera.

Polygonum feminæ refrigerandi spissandiq; facultas quoque, ad eadem, ad que serpans, valet, sed inefficax.

#### De Herbaria. CAP. XXX.

##### Herbaria.



1. **A**D Polygoni prioris genus non abs re referatur, quam Herbaria sive vulgò appellant: pama hinc est herba, inter Chamaedryas aut Pepsidias, supra huiusmodi procumbens, caliculis seminibus vixque (sunt sic, qui crebris gemculis intercedit et) subrabens, ad raris perquam exigua, veluti Thymum, Salicaria floribus maxima, luteola, ac albedo femina: perperillum, racionem ad eam copiosum ac frequens, ut singulis caliculis eo vixeat. radix in aëre de feride.

Locis gaudet in caliculis, in montibus, ac in vltimis, sed potantibus, & Sole expostis. Iam, ac Julio, nonen Augusto hinc frequens.

Herbarium ac Herbacium recentiores ab effectu appellant: nonnulli Herbarium Turcum Accipit feminis Mallegari dicitur: Galles *Serrata*. Pimas Polygonum hinc herbarium, que alio nomine Clematis est *Ægyptia*, Arab Herbaria dicitur, posse tamen & Herbaria non abs re Polygonodes appellant.

1. Præter Herbarium verò & aliud quo dicitur in gemulis recentioribus nomen esse Polygonum palme, plus minus, in racione aliud affingit gemas virgulas, crebris gemculam, exemplo

*Anard.*



*Pysylla.*



tes, & ramulis prostratis, circa quos foliola angusta & crassa sessilibus & firmis foliorum herbaceo colore fibrosa radice, raris & oblongis. Tota herba toto corpore costulata ac floribus incanescit: Germani Anard appellat.

Sabalosa, ac arida, sed rariorem opacis, amirguis gradit: per cetera hirsutissima, costulis tervem telusque penetrat.

Hermianum minus insigniter asiccandivm habet, & ut eroditur, folia duri ac ferruginandi.

Ad emunctas in potu sumpta profertissimum ferre esse remedium, ac complures hanc vim ab incaliditate sanare (Hermianum vulgè esse ferum & feracis: item & palacem ex vino sarapem suppositam venam dicit, & calidos venales contraria esse, & costum curam ad dolendum promovere.

*De Pysylla. CAP. XXXI.*

**R**OYHUIS, tenuibus, dodrantibus, frequentibus, ac foliosis ramulis Pysillum incunat. folia oblonga sunt, sed angusta, hirsutajque, ad primæ Charumptyos accedente: cetera aliam Pysyllam capere cernunt: quoniam coherens, quibus flosculi alba, pulchra, Japponensi, velum angustioris Plantaginis, semine succedente nigrescente, vel uterque, pulchris colore magnitudineque perfinita. radix subalbedi fibres capillata.

In campis aut incultis locis subinde sponte exsurgit & quandoque: semel situm facile aliquot dunde iterum occurrit. Pro loci natura non raris latius, præsertim circa maritima, gignitur, aliter raris.

Sub sine in Angliâ ferri incunat legendum. *Palacem* Græci, Larina Palacana, (sunt tamen & Comys quoque Palacana) & herba Palacana: In Officinis Pysillum appellatur: à similitudine cum pulchris nomen accepit, quos semen ceterum dicitur: Germani Pysillum ferre & Pysillum ferre: Belgæ *Wysylla*: Italici *Pysilla*: Hispani *Zarapem*. Galli *L'herbe des pulchres*: Angli *Pysillum*.

Semen Pysilly Galeni ex secundo refrigerantium ordine, in humectando assens & refrigerando symmentum quodammodo esse ait. Autenna in secundo hirsutissima ferre & frigidum.

Aqua in qua semen Pysilly quassatum, Gæ apudant, misceraturque facit, donec lentorem contraxerit, omnes inflammationes sedat: audentiam febrium calores mitigat: sicut refrigerat:

frigat: & in ore dextera asperitate stringit: lenit: Invenitur enim ex acrimonia humorum dolores multos: dysenterias, & quibus incaliditas, aut vesica exulceratur, veluti, vultus verò etiam ex ferre utitur colico. Aliam & hanc mollior, elementarique subdicit, præsertim factum aut salco ex vasa additis, vel potius ex. infusione frequenter diluere volucrum castanæ, quo modo in audentissima febribus veluti ex habent. Verum non minus crebri hæc mucositate vridum adhaerent Serapio, stomachum siquidem effunde, præsertimque frequenter ac raris vim subinde syncope aut animi deliquit etiam succede vult cum morbis periculis: qui a nimium aut veneno sum, ut ait, est: quod non modo Græci, sed & Aæcena viderunt.

Semen Pſylli, ut etiam maceratio puerorum emetocela, vomit, & vultusque protrinentes impositus, ad huc verò & alio modo artus lotum doloribus, (in curia vultusque calente) parodontibus, intermittit, Jussens prode se Dioscorides refert.

Miscerantur feminis. Soli expoliamur medicari ac conferari posse Serapionis est.

De *Quinquifolia.*

CAP. XXXII.

*Quinquifolium minus.*

*Quinquifolium alterum vulgare.*



**H**YPERICUM tamen illa species Theophrastus aut Dioscorides tradiderunt, postulat nomen quoddam obiter notari.

1. Vntro quod de maiori Quinquifolium, cuiuscausa stirps rotunda, cubitalibus, ac dibrachis foliis & singulis pediculis copulantibus quatuor, oblongis, ambu profunda incisura creatis floribus in foliis ramulorum lateris, aut cardiacaribus, veluti Helianthemum illi aut Potentillæ, fugaces quoque neque duritie consistere. radices sub sane oblonga, sicuti acerrima, fere nigricantes, interius verò fibrae berres, non absque terræbus fibræ adnatis. Est autem illud Quinquifolium & caule & foliis, ac quidem præcipue, normaliter lanuginosum, hirsutum ac mallosum.

Plenique Italia & Gallia Narbonensibus locis circa solum aut agrorum margines caulis Apennino & fere rubens reperit Lobelius adhibet.

2. Alterum Quinquifolium hirsutum est, folia minus, quinque partita quoque, qua superior parte vntro, inferiori verò alba, & lanuginosa valde cum caulisque fistulis plurima parte lateri. radix teris oblonga, fonsæcus nigricans, interius rubens, villosa quadrangulata, cæmatur, veluti de Quinquifolia rubes Theophrastus inquam voluit.

Vulgare illud & Germania, ac Belgia, tam & alibi est. Nalictus non raro locus horum marginis agrorum separatus ac aggerat aliis inter herbas.

3. Tertium germanibus ac vicinosis hauri stirps cardiacæ: folia sunt Quinquifolium alterum plantis, vntro & fistulis copulatis, pro radicebus cæmatur fibra, quæ hinc inde pluribus locis è vntro & lateribus, qua parte terram contingunt, qua bus in fistulis stirps scriptis multiplicans.

Illud Quinquifolium in hortis ac cæcis potissimum reperitur.



dyformitas arduant. Coctis cum aceto radix hepatis colicis febriam dicitur: colicis  
 et acuridinis remittit. Tenax radix facit: conuulsiones palmonumque asthenia  
 nec, & ad perispermata prodest.

Foliorum facit aliquandobus contraxit opus morbum, ut Dioscorides, sanare  
 legit: sola vero cum hydostichis, aut diluto vino ac crasso pipere contra febriam cacu-  
 ritibus, quatuor numeralium aduersis quartanis, traxit in acris, vasis in quotidianis.  
 Que vni late non caruit, et & piceaque alia, que non modo spid. Dioscorides, sed & alia  
 reperitur, a quibus liberet abstinetur.

De Tormentilla.

CAP. XXXIII.

Tormentilla.



AD Quinquefoliorum genus pertinet & Tor-  
 mentilla dicta, quæ videtur similes calicibus  
 promixta compluribus, nempe, ambocillis, sed non  
 atrolicentis, sed huiusmodi ac umbellatis: sicut  
 nunc quoniam Quinquefolij, cum in ortum pla-  
 ra, sepe in eorum similibus coluntur, que & ambocis  
 ferata. Botanicis lotis sunt, radice fortis nigricans,  
 tæneus rubet, crassa, tuberosa, ac breuis.

In sylis in alijs quædam, & opacis, reperitur non  
 raro: in locis herbosissimis, sed nunc ac-  
 tuerit.

Floret æstate, radices quæ in tempore legi pos-  
 sunt.

Tormentilla nomen recentioribus deditur  
 qui à rornero foliorum herosperæ, & Septis-  
 liam vocant: Germanis Zordinary & septi-  
 mæ: reliquorum in alijs Tormentilla dicitur. Cæ-  
 ditur à pluribus Chrysozono esse.

Est autem apud Dioscoridem breuis adan-  
 dum Chrysozono de scriptis, quod ut, si quis ma-  
 sis, id est, fronsens herosperæ, cuius illos simile  
 Coronam Verbalis: Tormentilla fronsens modo  
 huiusmodi atrolicentis, & si Coronam Ver-  
 balis Lychas est, Tormentilla quoque non  
 est huius Verbalis flore: Lychas siquidem illos  
 rubet, ut alia ostendunt, que Tormentilla à  
 Chrysozono differentem esse ostendunt.

Est autem Tormentilla radix potentis re-  
 cæni, & exortum, que terris sunt ordinis, rornero, & partem tenuissimam calidissimam: quia  
 non modo tenet, ad hunc genus facultatis participat.

Potest autem non modo, que Quinquefolij radix, sed & eadem efficaciam perlat. Ad-  
 hæc sepe febriam morbos magis: est vna, fortiter enim potest vna aduertitur, & sed oculo  
 nec additur ad eam antedictis & compositionibus eò facientibus sanguis vna vna quæque  
 potest eadem supprimit. Decoctum radicum, aut unde palus cum conueniente liquoris  
 panna, sicut & superis acris tuberculis profectum, non modo vtrò sumper, sed & forte, sicut  
 in bolico, aut alio quous ad habitum modo. Ventriculi autem ad eam huiusmodi maderem colunt,  
 ac refocillat ad eam alia facient, & dysenterias vna est. Datur & rapta, ex alio de lapidibus, &  
 quibus suspensio est utrumque aliquod vna lassa esse.

LIBRI QUARTI PENTADIS PRIMA

FINIS



# STIRPIVM HISTORIÆ PEMPTADIS PRIMÆ

119

LIBER QVINTVS.

PREFATIO.

**S**YCCEDVNT ANTIQVÆ CLASSEBVS DEFINITA HERBÆ, ab R. volvelca S. T. & V. incipientes, *Quand prætermissis quæ affinitate quæpiam ipse contingantur inter quæ compleret ad valorem, supra, casus ab aliis, & casibus aliis, in frequenti sunt usu, quæ & idem in Pulveraria vulgarè dicuntur. Fœtem autem haec prætermissis præcedi, & ad aliorum hæretica, in certis classibus digestarum, videri sibi.*

## DE RVTA GRAVEOLENTE.

CARYE PRIMVM.

Ruta graveolens hortensis.

Ruta graveolens sylvestris.



**R**AVOLENTVM hæc appellamus ad differentiam ab omni Hypocistide Ruta: Est autem hæc duobus generibus, Hortensis, & sylvestris, hoc Morvanus hæc vobis & (pocis) nominat.

Hortensis hæc sitiva Ruta frutex est ramosa, si binde bicubitalis, vel altior, cuius caules lignosi albicante vellicantur cortice: succulosa ramuli simpliciter videntur horum folia ex pluribus collecta, indurata sunt, circa quæ exigua aliquot impari numero, latiuscula, rotunda longiora foliola, lævia, ac subpinguis, colore carnea, sicut & carulescentes: floribus in fœtibus apparet fœtibus pallidi tunc, ex quibus aliquot aliam circumscissis foliolis commixti, in quibus sicut modico equi ad figurare, tunc quæ angulata caput aliam erant, rotundum loculos, quæ angulos, contemta, subscissibus normalibus hæretibus lateris, & quibus consolentis exigua dependentiæ: fœtibus in loculis generatur. tunc lignosa multis fibris firmatur: Grana autem admodum odorata, ad acris saporis hæc Ruta est.

Sylvestris.



Secur Rata in malacoto-calfatus, artem dolentibus molitur subtilitate: Ignis factus, hincque, actus cum aqua, decocto de se factus sanus.

Rata lingua profunda è quibusdã ferè inpositum, ac Diacordis, cui & Plana accedit, cum tamen sanguine cum pro ore de sua acrimonia elicitur jure fit.

Valer verò & Rata per Antidoto soluta, & in vino sumptis, utiliter Plana.

Diacordis semen acetabali aqua fit in vino bibatur, lethalem medicamentorum antidotum esse scribit.

Probatior autem contra Acorinum, Ixam, & fungos, sive in cibo, sive in potu: contra serpentina illius ducta sic corpoream, ut in artem, peris, embrosiam, & vesperam aculeos facit. Rata per se dicitur negare ferri ab herbe serpentina, si viderit, sudorati eam effugere. Multo in contra serpenti pugnat, Rata per se sedulo fide morant.

Contra dicitur & aduersus diti malis morfam facies acetabali mensura eporas folis verò trita cum fide & rosis, valere utque inpositum.

De Harmala. CAP. 12.

Harmala.



**H**ARMALA inter Ratas spicillata nomenclatur quidem, sed tamen ab ipsa differens est: à radice neco complexa protra calcidibus detrahentibus: folia etiam haec vicia, variegata, filis, longiora, angustioraque quam spicillata generosa: Rata seu candida est, quaeque foliorum sinibus triangularia, minor quam lamina Rata: in quo semen. radix crassa, oblonga rigens, Graecam admodum hanc Rata odorem in cubis parat regionibus in quibusdam, vel in Germania, sicut, minus generosa.

In Cappadocia & Galatia, ut Dioc, in feris reperitur verò & non paucis Hispania delens ac in colli collibus.

Rata spicillata, & vixit in an dector: In Galatia & Cappadocia, Moly: nomen ha Harmala Arabibus Harmel: Syn. Betula. Officium in cognate sicut.

Cyterum Harmala calida ac sicca vehementer, & tenui quidem ordine, tenuitate acin partium vasis huius ore atque, defecit, digerit, & venam mouet, videri Galena.

De Scabiosa. CAP. 13.

**S**CABIOSA folia oblonga, lata, hirsuta, à sinibus lacrimans, infra foliorum sinibus ferè: modis inter hanc caulis affurgens teretes, abque melam sicut, cubitalis, & ipsi quoque hirsuta folia aliquot si milibus aduata, sed sensim minoribus falli in forma tenui, ut vixit, sicut apophyllis eminent floribus uno orbiculo sine disco, cum plerumque ferè, quorum circum in hanc caulis atque, modo, modo in quibus, vix cum flammibus è caruleo dila rosae casto colore a rubiculis longa radice in alio de fide.

Circa declinam agrum in magno, ac subsande protraum, multi spallium locus pignus. Alia hanc sicut reperitur omnino parua, cum hanc parua in mare, & vix palmarum alia plerumque non folia, in floribus respondens. In harmala prae hanc reperiri quandoque contingit.

Est & media magnitudine quaedam, cum folia oblonga, lata, hirsuta, vix hanc quoque, quam prae tamen in quibus, & nequaquam lacrimans, sed ab hanc hanc modo cretina: flos hanc in cubitalis distans est calycibus aluam sicut, radix longa, vix quoque. In agrum atque ac sicut solo possit sicut hanc frequenter.

Lata & quarta quaedam Scabiosa, sed peregrina Germania: hanc hanc in quibus, vix hanc, in quibus, prae sicut folia, vix hanc, non distans est cubitalis, & folia hanc quoque distans in hanc in quibus hanc in hanc, atque acetabula complexa, à quo

L. Scabiosa

*Scabroflorae major**Scabroflorae media**Scabroflorae minor**Scabroflorae prostrata*

Scabro ex Cod. Casimiro.



has folioli candidiores, quibus hirsuto, mollicioribusque crassius tenem substantiam, dedita crassique radice uti vulgare Scabiosa.

Hinc vero de aliis speciebus, sola innotuit. 2. dicitur differens, partibus singulis tenior. Flores hinc ex cerasulis purpurei. Vndeque in Hispania nunc dicitur, viderique margines eius. In Salmaticensi agro observata à diligenter C. Clivio habetur.

Vulgò Scabiosa nomen accepit: confirmatur à nonnullis sibi dicit, quòd Scabiosa nomen est, & hinc quoddam apud Aethiopes. Sic autem Scabiosa, que ab Arno Piana, cuius vlti sumo arborum cruce nominatur non habet, ut Heronius Babianus, interpretatur.

Aulicè Pseudocerasium Scabiosum apud Dioscoridem Scabiosa esse interpretatur Scabiosa autem Dioscorides, facitque vulgare nomen, pulchro nomine dicitur, Galienus verò lib. 1. de Antidoto Herba, inquit, quoddam apud nos incantatur fruticosa, calida, acris valde, pariterque aromatica odorens, quæ incisa Colyribadem de Scabiosa appellat: ad prescribenda vna spiritissimum. Videtur autem hæc Scabiosa differens ab ea, cuius in lib. De medic. facit. nominat, (que eadem cum Diosc.) habere aromati hanc modis vna affringentem in ordi citatis capitem, quales valde sunt se requit.

Theophrastus lib. 1. ex fruticam narro- ro tam facti, & solo esse aromatico: lib.

verò ut interea refert, que varta spem folioli habent, ut sunt Anemum, Tribulus, &c. Possit hæc alia esse, cuius Diosc. mentio est, à qua plurimum Scabiosa, que nequaquam spino- sa, differens est, que neque enim cum Colyribade coniungit, cum videretur acris- sima delicta se.

Equat autem Scabiosa spinosa in quo in veteri Casimiro bibliothecæ codice, quare hæc loco adhibenda sunt pariterque, ut vel ex hoc cognoscatur, quibus in cultum Scabie de Scabiosa dif- ferent. Atque inavertentibus speciosum Scabiosa nostra utique reperit est in Cypro atque Pe- loponneso, vulgò Mores, plura ut agrorum locis: vnde vtiliter secum attulit doctissimus Bo- nardus Paludanus scriptum diligenter servus observatos.

Præsertim Scabiosa in Casimiro nomen tenet, quibus nonnulli est Germanis Fuchio 3. & Tingo andromeda Apocynifera, Paphnifera, & Gendifera: Italorum, Hispanorum, Gallorum, Belgarum, & Anglorum nomenclature ad Latini sunt excoctis, Bohemis, Lantia.

Scabro ex Cod. Casimiro.

1.  
2.  
3.  
4.

Altera nomen Scabiosa appellatur.  
Tertio in avicenna, hæcque in avicenna, et est, quæ Scabiosa nominatur.  
Quarta in Hispania Scabiosa habere feruntur.  
Et autem Scabiosa calida quodam avicenna lectulo etiam facti intermixta, ad vnam gra- dum accedens & partem terram. Lentos ac crassos hirsutos in cida, arantat, & ad con- coctionem perducit.

Pectus & pulmonem expurgat: eosdem ad vnam vterem tussim, expiracionis difficulta- tem, interea dolores, & alia huiusmodi pectus vana. Vnus tamen moner, & per vltimas populinas habendi expurgat, ut videret intra corpus pleuritis alitudo subsistere. Mederi habet in dextro cras, ut quæ dicitur habet, & hinc viginti primario ferunt ad vnam de- pectum mortuos, & viderentur alia conuulsum, superpositumque, vique effringentem con- ducunt Repent omnia etiam affirmant. Succus superius radices inquit presertim Theriacæ addita, & pellentes habet, ut quæ dicitur, si tempus sit, & hinc in isto medio de quo, reperen- dum tamquam modum, prodest: verò ad vnam vterem etiam pellentes habet: quæ dicitur.

Succisa, seu Morsia Duboli.



Succisa.



**A**D Succisam genus pentagoni & Succisa: hinc autem folia sunt lata, oblonga ut angustifolia Plantaginis, hinc laniata, & hinc deorsum necesse, ad marginem nonnulla ementa. cauliculi pedum aut cubitum alti, ut quatuordecim ut plerumque distribuantur, emittuntur in singulis capitulis globosis quibus floriculis vel albis, vel e caruleo purpureo: nidi crassi, breues, ac veluti puzumoni, vel Succisa fibris à lateribus adnatis, quibus firmatur.

In ca spissa ac agrosi limosa, lucis haud culta, in prato quandoque, aut herbosa septuaginta cauliculis gignitur.

Iulio & Augusto cum floce præcipue reperitur, sed æque legenda herba, arde siquidem haud infrequenter vna.

Morsiam Duboli à præterea, ut apparet, edoce appellatur vulgò, narrantur enim superficiali caudam ostem hinc radices, ad intra videri futuram, auaride hominibus, adeoque illi non sustollere. Fuchsius Succisam relictam appellare molitur Germanis est: *Crustis abissi*: Belgis *Wep* uti test Galienus, *Wep de dubli*: Angli *Witchel* in.

Amariculis est herba, calido siccoq; temperamento praedita, ad vna aliq; secundum ordinem mentem referenda. Adactis dicitur in conchyliam fuscis vnaq; nartores, qui ad suppurationem agri perueniunt, vna sicunda adactis fuscis plantam oblonga, digita & adactis adactis, tumore vnaq; nartores, vna sicunda adactis in ore sepius remota aut gurgulatio, praesertim mellis rosaeis exiguo adactis.

Poste vero de quacunque Succisa, firmat, & adactis illis vnaq; nartores, vna sicunda adactis in ore sepius remota aut gurgulatio, praesertim mellis rosaeis exiguo adactis.

De Succisa nigra, seu Morsia Duboli.

CAP. V.

**I**ACTA nigra, propter folia oblonga, lacina, vnaq; marginibus, oblonga, etiam latera caules foliosi, postea, dum, alper, in dactis Belgio-dactis, proferturibus singulis capitulis conicide, squarulis multo vnaq; fere apparentibus, veluti flore Cyani, & quibus pro floribus ex parte filium nartores conchyliam conchyliam, vnaq; purpurea rubentis, vna albidis, hinc, dum, obliqua radice, non aliquid, aliquid fibra.

In praesertim, ac locis herbosis, negligenter vnaq; cum de vna sepius vna apponitur ac peractis frequenter occurrunt. Inter vna pentagoni caules possit, ab hac vnaq; vnaq; & nartores adactis nartores vnaq; nartores, adactis, adactis.

Intra ac Iulio, non raro & Augustis cum floribus videtur.

Recentior vnaq; locum nigrae vnaq; nigrae quidem ad differentia tricolora vnaq;.

le, quæ & lacca. Plenaque Macrofilen voce (μακροφιλη) corrupta appellatur abj. Sarcobea speciosa faceret ad Scythias orientem partem. Videtur quoque apud Arabes non esse re dicta, abj. folia liquidam rosam esse, ex folio densi confectis filamentibus consistens, ex eo etiam Aphyllanthos nomine accipit, quod apud Arabes ad 200, ad 300, abj.que folia esse dicitur.

Culda est hinc ac dicitur, sed non adeo ut Succia sine Mortis sua hinc commendator emens ad faciem, et collatum, et ad partem, veluti Succia, sed faciant ac postea mano esse

De reliquis Aphyllanthos species.

CAP. VI.

Aphyllanthos prima.



Aphyllanthos quarta.



**S**unt verdè & plures alie, quarum flores folio carentes ex fila filamentibus consistunt, quæ & Aphyllanthos nomine hoc de castis possunt.

Prima cuiusdam radice complures, passim ramulos, virescentes, & nonnulli angulatos promittit: folia & à radicibus & circum ramulos oblonga, & utroque margine profunde ac frequenteribus incisuris ducta, venosa, lævis, ac nonnulli resplendentia. capitula veluti lacis nigred squamulis compacta, aliquando in asperitate flores eleganter purpureos ex multis filamentibus in lacunam glomerat, topenis vti Cyani habentur, sed minus radiis fibrosis est.

Altera hinc similia, sed caules eius breviora capitula minoris, & folia nigrescentibus & vicinis, squamulis capitulorum asperiores & nonnulli spicose. flores emittunt purpureos, & filamentibus confectis.

Tertia folia magis ovata, si balle divaricata non spinosa, flores præceduntur.

Quarta folia tenuissimè diffusis ac laciniatis, pinnatis similia, perferunt teretes: hinc capitula ex squamis componuntur argenteo splendore relucensibus: flores emittunt purpureos, ac veluti sturum.

Quinta in partibus campis, locis non prope vites, locis hinc cultis, & quidem in compluribus Europæ provinciis, præsertim in calabriensibus.

Inter ac Italia in arvis florantibus hinc Belgij si hinc scribitur.

Omnes hinc videri Aphyllanthos quæque appellant (ve dicuntur) possunt, ex filamentibus etiam florantibus modo confectis folio delectantur. Apud Venetos si no men habentur, phylanthos nomine recognoscunt argenteo farentur. Sarcobea genera esse non possunt, ad quam pler-

L. 1. 187

## Spharidaca Cod. Casino.

Spharidaca  
an Cod. Casino.

Spharidaca.



nique nullae aures docti referre conati sunt, et eo falli, quod Scabiosa putari solet Stachyem, quam ab hac differrentem esse, iam superius ostendimus, veluti & alia sunt: Aphyllanthus, quae omnino ceteris.

Ad has vero & referri posse videtur, nec formaliter meri, cuius icon in Casino codicis extra Spharidacis nomine, cuius capitulum siliam simile, nisi quod oblique cruris filamentis depingatur. Nulla tamen Spharidaca in veteribus descripta reperitur, praeter Caposifili, quae ideo hinc nominis obtinuit, quod galbulicis subinde (phlog) modo rotundi sint.

Ceterum Aphyllanthum facili ratione conperitur fere, nec etiam in Medicinis usum adhibetur, nec ad alimentorum mensuram facit.

## De Stachy. CAP. VII.

**SCABIOSA** caulibus compluribus est articulata, non in altum assurgens, sed humi procumbentes, ac prostratas. Folia è singulis gemulis basi, rotunda longiora, minus quam Chamaedryos, ambrosiata, quae vna cum cauliculis mollia, herbata, albicantis Allium redolunt. o floru solent rubentes esse, florenti, minus quam Lamij, alioque forma basi distillat, et radiceum partes occupantes superiorem, radice fibrosi sub terra sepi.

Nascitur haec palustribus, sicut scireba, ac fossis aquas habentibus, hinc maris solum locis vni brosis ac humentibus facili adolebit.

hinc ac hinc flores apparent: Augulo meritis legere herbam expedit: hinc praeparata redit, radice testibus.

Stachys Graeci appellant Latini nomen retinent nec alio Osthonis nomen. Sunt qui Tragacem palustrem vocant: item & *stachys* var, ab inventore Mithridate: Scodij nomen accipit ab odore Allij, quod Graeci *stachys* dicunt, & *stachys* ab odore ipsius: Germanis *Stachys* Gallis *Stachys*: Italicis *Stachys palustre*.

Callicandi ac triticandi vna habentur pot amaram acerbam, ac acris quid obtinet, restant Galena. Videri in terra exiguas & similes venulae, cum ma videri ad lino malle. Vnam & in infusione crassa & puriora è potiore aduocari facit ad veterem tussim, lincum doctores ab obstruione & sngose autem pretensa & ad rupta & coruilla. Aristum cum vino decollum contra serpenteum morbum, & lethalia venena bibunt. Misceatur & arachidifera: & podagrycon lincum doctores curantur aut aqua stipuliculi: Sunt & qui affirmant crassa carnes inter hinc in hinc in potu ab quam re ferant posse.



De *Sempervivo*, sive *Sole maris*.

CAP. VIII.

*Sempervivum* sive *Sedum album* crassifolium.

*Sempervivum* crassifolium albarum, sive *locus barba*.



**S**EMPERVIVUM Dicitur a suo genere, *Mais*, *Mirus*, & tertium, quod *Eleochara* vocatur. *Mais* enim in arboreis dicitur, *Mirus* in herbis, *locus barba* in nomine acceptus.

Primum namque *Sempervivum*, ab *eleochara* cognominatum, eadem profertur cubito-altissimum, foliis de hisbetatis, crassum, durum, lignosum, levetum, & semper continuatum, in ramulos normalles diffusum, cortice crasso & carnoso circumscriptum, foliorumque de hisbetatis rufis quidem vel nigri quaedam retinentem, veluti *Tuberosi Chloracae* primum casu, medius vrbelliflorus. folia pingra, cum oia, facti plura, pollicis hinc longitudo sic, longitudo similia, per margines tenuissimae crenata, cum sulcatum fastigia ambicit, oculi effigiem emulata. florum cerniculis emittuntur in multos tenues pediculos divisi, rufos, lateri, bellati, faccedit item perquam exiguum pediculis marock crassibus radix fibellat in propages distita.

Vires hac super perperam, nec hyemis intus in nativo solo afficitur, vnde in *deschy* ac *Sempervivo* portum.

Primum *Sempervivum* (quod *locus barba* vulgo appellatur) folia educta ac radices proxima, crassa, pingra, levis facti plura, acuminata, densa, & in orbem ad effigiem oculi disposita, neque huiusmodi orbiculos complura profertur, hinc ac in amplitudine sese distendunt, tunc decurrens fibras emittit, quibus status serpat, atque non orbiculos propegitur affertur quoadque in medio horum casu erectus, pedum (plus minus) altus, folia similia attenuans cerniculis, in alio quodam cura fastigium efficit, circa quos flores obtinere purpureae cerniculis digiti, radix fibellat fibrosa.

Huius generis ac altum quoddam, culis orbiculis magnitudine quidem superiora respondens, sed folis minoribus, dispartitionibus, ac densioribus, secundum marginem tenuissimis veluti pollicis, rufis mollium sparsim adnatis. Vires istud paulo facit tenuioribus brevioribus flores hinc pallidiorum.

Et tertium hac referendur, cuius folia in viros casciant, & ambitus tenuissimae fibris apparent.

Item & quartum, cuius in viros sunt orbiculata folia verò non minoribus, densa firma, acuminata obtuse rubentibus, & marginibus striata: florum brevibus cerniculis reparet purpureo.



*Sempervivum tetragynum.*

*Sempervivum viviparum.*



& ad eandem valent. Pituitum vero horum inter acetana multo locis recipitur, in quibus de  
 lapa, de pulso gustum adhaerens periculo quare.

*De Hiberna, seu Sempervivo terribi.* CAP. X.

*Hiberna, seu Sempervivum terribi.*

**H**YSSOPUS ac erigula hinc herba est caulis  
 ciliis cras terrensac brevis: foliola circa hanc  
 frequentia, parvula, crassa, & acuminata, fissi  
 plerumque bifidi in fissuras emittunt parvula, lateri  
 libere adhaerente.

In locis petrosis, aridis, & in veterum muro-  
 rum cuniculis usque hactenus perpetuo vivit, nec tem-  
 perat idcirco hinc Sempervivum dicitur.

Et hinc mensibus cum floribus reperitur.

Dioscoridis tertium istud est Sempervivum,  
 quod à Grecis *αδερπησ* dicitur & *νιφτα* appel-  
 lant à Romanis vero Hibernum tradit. Plinius  
 etiam Latine Hibernum dicit vocatur. Est tamen  
 de illis *αδερπησ* dicitur & aliud vocatur Germani  
 hinc *Wasserpfeil* appellant, & Imperialis: Gal-  
 li *Fleur d'aspere* Belgæ *Wasserpfeil* Angli *Waterweij*  
 & *Wasserpfeil*.



Suspicitur tamen nonnulli non esse aliud Dioscoridi tertium Sempervivum, quod illi folia  
 de sint Porulaceæ. Sed Dioscorid. hoc non Porulaceæ esse folia, sed ad illius crassitiam tantum ac-  
 cedere folia esse *αδερπησ* ait, ut *αδερπησ* *αδερπησ* *αδερπησ*.

Acritas ac vehementer escalfacem est herbula ista. Poruladmodum bibulas, vesicas  
 excitat, ac tandem exalborat.

Siccitas, inquit Dioscorid. acergia imposita dicitur. Succus huius scilicet, vel alio liquore  
 excoctus vomitum movet, & crassos, parvosque, ac biliosos humores educit, & febrem de cra-  
 ta quantum, nec alia dicitur omnibus febribus liberari adscribiturque veteribus de hoc modo dicitur.

Telephum primum.



Telephum verum.

Telephum alterum sive Cassidula.



**TELEPHUM** vocat Diof. nuncupando mentiosum ficut accidit verò alio duo poftea obfervato.

Primum Telephum caris vocatur rotundis, crassis, glabris, velis geniculis habentibus, circa radicem foliis subterrenis: folia fimpliciter ovata, lenu, carnofa, lenu fucco plena, ambra folido lenuer mofa, lenu folido, Portulacæ q mofa lenu hanc mofam abftrahit, è fimplici angula lenu fide fimplici oppofiti, caetera agrippenone confuetudine. Flores in umbellis ex longo pedic. itaq in mofa exuberant velis oblongos glandes folido mofam, candida, fibrofam lenu.

Alterum, quod Cassidula vulgè vocatur, caetera fimiliter complexibus affert rotunda, lobata, fed hanc quoque amulatam. folia fimpliciter, crassa, lenu, & apertis mofam quod ex lenu mofa, mofam quàm fupponens, nullo ordine difpofita: Bofali aut rubent, aut lenu ficut, aut pofit mofam mofa candida, carnofa, ac mofa. Venax admodum fimpis est, vel lenu folio mofa candida dicitur vocari, fed foliis nigra, etiam angrippenone capta.

Tertium Telephum harenfum est, ac mofa quàm pofita mofam mofa candida plurima parte hanc procumbente folia quoque mofa, mofa dicitur.

dieta, et carales magis ventris, cariosa, inferioris et uberioris, hypericus varians, incerto ordine  
 & spolia. Botani in varietate habita correspondens, et parpartitice carales patiunt, radii et  
 haec haud modo in, par microscopio, sed fibra capillaria.

Loca virentia, pomezia, viciae areariae, ac pomezia strant. Oculi sunt in viciae & culis  
 raris ut.

Primum in Hispania, cum de superiore Parnatio subinde reperitur, nec eo Germani de-  
 clarant Ad Rheno cum in ipsum in sua vicia, locus abiens, & pomezia reperitur, ab eo, quod in  
 Hispania, nullatenus differt.

Alacran in Germania vique, Galia, Bohemia, & alibi circa vicia, in viciae strant, &  
 pomezia, etiam locus areariae strant, firma siccitas.

- Tertium raris est. In vicia ad Belgia & alibi, firma ut.

Circa Augustum, vel prior Telephium florent.

Primum, quod Gerardus dicitur, & dicitur *lyxae dicitur*, Latini Telephium & Semper-  
 virens sylvaticum, & Microbia, sed ab omni & excelsioribus Microbia, de qua Cap. superiore, nul-  
 latenus differt. Sunt etiam *abulypico*, illic Pomeziaem sylvaticum appellatum est tamen & alia  
 sylvatica Pomeziaem horrenti in vicia, sed minor.

Alacran genus Telephium quoque species est. Crasilum, & Casulam Fabrianam hanc Offi-  
 cine vocat, & Crasilum mionem ad differenciam eius, qua Cap. de Sempervivis minore de-  
 ferretur est, ac de Felvan & Germani Bani strant firmitatem & siccitatem hinc *Telephium*  
*propter Galia habere de viciae strant pomezia Belgia Bortmanis & pomezia Angli Hispania*

Tertium genus ut pomezia cognatum, ita nec totum in vicia, nisi quod pomezia Telephium  
 semper virens vocent, alacran enim caules hinc hinc percutit, nec se viciae, hinc vero &  
 caules & folia hinc hinc melleosum sperant.

Frugida sunt Telephium, & cum effluente tenuitate reflexum in facultatis.

Doloresque viciae albam, Galenus viciae, cum aceto compositum hinc ut quod  
 adferendo pomeziae ex hinc et facultatem viciae Galenus, repugnante tamen Galieno, &  
 biliquitate, que non modo primam, sed & duo reliqua frigida esse offendit. Alacran pomezia  
 tem possent & qui frugida, si hinc adit viciae, & effluente tenuitate.

De Corydalo.

CAP. XII.

Corydalis.

Corydalis alba.



Cor.

Sedum feracum.



do digressa, & quorum veluti cetero, tamen pediculi laevissimè, flores proferens alboscantia, rubrosive sic sunt.

Ad montium rupes, & in caesa pignatur. In Passavia ac Italia subinde occurrat.

2. Ad Coryledonem à coccinonibus refertur, quod Annonia sine Sempervivum feracum Valerius Cordus appellat. Crassa & numerosa haec sunt, succo quoque plena, foliola, quae circumambulo globosè veluti oculi constituantur, Barbæ locis & Coryledonem ab hoc modo, multo tamen rariora, & vixitque ferax modo, marantia raris, & quorum medio caulis exstat, rotundus, dorsiverticis, & foliis cicutaribus proferens Crassa in raris, cum alio, colore spectabilibus absque raris, quatuorque ruberibus punctis distinctis, radicibus feracum potius & transmissis.

In altissima petra, humido musco saepe obdatis, nascitur.

1. Quae Graeci vocant *σφόδρα*, Latini Verbatica Veneta dicunt, & Accruba à nonnullis Florentinorum dicitur Jacobus Mundinus vocant caula, & Scanzellum appellant Belgae, sunt in Italia Capertana & Salsina in Provença Gallia & in Italia Hispania Capertina, Scanzera: Interstitium appellatur & hinc cetero notata, admodum raris, ad est, hinc Venetia. 3. In caesa, terra verbatica, & in pignatur.

2. Alia Coryledon à coccinibus *σφόδρα* appellatur.

3. Minore illam rariorem ad Sedum veluti rariora, & Sedum feracum nuncupant. Coryledon prior humidis ac subfrigida est, subterranea, & carnis am obscure adstringentis. Refrigens, repertum, abstringit, ac dicitur: a calore Galeno. Inflammationes erysipellidas, & erysipellam phlegmonosam curat imposita: ad aliam autem ardore ibam ac hinc vixit est feracum & folia cum radice manducata calculosè obstringere, & vixit uterent.

Coryledon altera ac terra ferax, faciat ad eadem, ad quae Sempervivum.

### De Coryledon palestro. CAP. XIII.

EST vixit & praeter se passiones alia Coryledon, tamen hinc ponitur viticulis prosperentis, ac subinde terre adhaerentem, qui bus folia rotunda, & aliquantulum accubata in modum leviter concava, exiguaque pediculis medio sita, vel altera, infidentia, sed planè raris, raris, nigricantibus quam legitime: foliis perpaucis, albedi sub foliis vixit. Haec tunc pro radicibus sunt.

Palastris locis nascitur, & praesertim humidioribus, & quae frequentibus hominibus vixit.

Haec nascit quod Belgae reperit cum flore potest.

Verbaticam Veneta Officinarum Germaniae notantur: Coryledon palastrum do potest.

Corylium palatium.



possit. Erant autem non parvi Plataniscopos, quibus hanc loco legitur ac vix Coryliodens viderentur ex Populo nigra aut alio admodum.

Culdas esse hanc Coryliodens gustabilis aut qualitas aliquantulum acrisoliderit. Proinde non totam formam, sed & facultate & virtus a vna differret.

De Sopia. CAP. XVIII.

SOPHA a caulis primis cubulis, rotundis, Sarcos folia verò circa hos ampla, sed tenuissimè in computurata vagas legumina distans, Absinthij tenuis folij haud multum diffimilia, sed tamen venosa, & ad Corandis tenuissima accedens, colore albida. Herbali ad suspenses vulgarem partes ordine digesti gignitur exigit, pallide lateri, parue, tenuis, oblonge succedant siquæ in quibus matura forma subhibentia, dum, & lignosa, candida que demeritur in albam radia, postquam adhaerentibus huiusmodi.

In venterbus maceria, locu ru de raris, lapidosis, ac non usò arenosis, ac stas in calis eant, vbi siemel nota singulis facie recurrunt.

A lano in Aurantibus vifque, & qui idem partu lanis, foveo foveo interea perficit.

Recentior etas Sophiam appellat: Germani ~~Wesphalij~~ ~~Coryliodens~~ Belgæ ~~Frisiæque~~ Falis aut insipientes qui Scriphiam nominant, quod Marini Absinthij nomen, nam cum Absinthio nihil contrariae generi solentia similitudinem quandam, habet: super & facultas multum differretur sint. Videtur aliquo modo cum Thalicro comparari, respondet caulis grasscolentis hanc non dissimilis, nec folia repugant, nisi Corandis forte multò tenuiora pro Thalicro autem, alia suspensa super ostendimus.

Cyperum hinc hinc Sophia refertur & adstringens est, & particeps aliorum frigiditatis.

Semen hanc aliam partem veniens floues siliis aduentis dytemenas continetur: singulas profusa reperitur.

De Symplyte marit. CAP. XV.

SYMPHYTE ista in caulis angulosis, crassis, & <sup>14</sup> ~~Sit~~ ~~Sopchy~~ maris, ad duros sine cubitis & pollitur: folia tuta è radice prodeantia, tum & circa caules ampla, longa, lata, aspera, pungentiaque lamina, raris hinc hinc, amaraque pinguiora exarantia, vulgò à his floragras colore & asperitate sine similia, ceterum longiora, magna & acuminata velut Enule comparat. ea circum

hanc alia flores ordine depolui apparent oblongi, aris uasi, colore albidi, aut dilute ruberis, parè lano, si blaque nite femine nigro, oblonga & caulis natis, foveo nigra, mernu calida, & cito glutinosa, in qua visconficitur medica.

Hinc aliam operatur hanc ca, radice quoque exterior nigra, interior candida, sed tuberosa, circa folia matura, caulis breuiores, foveo subinde lateri.

Rigore locustianam & pinguis pasta amat Symplytam, nec ab hortis abhinet, ac alia humeribus lateri.

Lano se hinc mellebus flores in vigore suam radice quous autu tēpore cōmo dē legi possit.



Symphytum magnum.



Symphytum intermedium.



*Reliquos Græci appellant, nempe & vocant: Latine Symphytum & Solidaginem: Officinæ Consolidamasonem, & Symphytum inanis: Scenbonnas Lingas Incitant dulcissimam, & Alon Gallicam, alij Officocollam: Germanis: Balsam; Schœnerum; Schœnerwur; Schœnerwur; Quercilum: Belgis: Wartagut: Italia: Consolida magnum: Hispanis: Solida mater, & Consolida mater: Gallis: Crayon & racine d'asne: Anglis: Comfrey: Bohemis: Svataj & Cimofitand.*

Sepe in usum in Symphyti radice frigida temperata, sed tamen exsiccata, adest humiditas viscosa, ac glutinosa: Hæc nequaquam pruritus excitat, nec gustu acris nec mordax, sed dicitur si hæc exsiccata, & qualitate gustu abstinere, tantum abest ut cum Scilla seu vesiculis hanc humiditas lenta ac glutinosa conferat quæta, folia pariter in se vitare possunt, non cadunt aut acrimonia, sed alperitate sua, utram scripsimus, minus tamen quam Vitæ.

Ad multos radix visæ est vulnere & emulcelas recentes imposita sanat: ad sanguinem cum tussi spumantem ac profusa, & contra pulmonis viscera multum prodest.

Pariter in hunc usum ac ex eis Sempium, quod sanguinis flores sicut: recentis pulmonis viscera consolidatæ nullam sed et febrium caloris contra temperat: humorum dejectionem acrimoniam et tunc, cuius descriptio hæc est.

℞. Radicem Symphyti maioris vasios-duas, dulcoratæ radice vociam unam, foliorum trifolij unam cum radicibus in superius duos, anserum unam, pincorum septuaginta, Topha xx. seminis molue duos vasios-duas, capram papaveri drachmam unam, fiat decoctio in seris quantum sita est ad libram unam: Colato ad levem fractionem ac mellis albissimum singulorum vasios sex, & fiat Sempium perfecte decoctum.

Eadem quoque radix contra viscera etiam dysenteria curat, & profusorem ex his sanguinem sicut cum ac superfluentem quoque moribetes purgationem supponit, si vel decoctum cum hibano, vel ipsa ed siccharo, aut melle obdita, singulis octiduo ad quod diebus assumant.

Ad omnia quoque vel quoniam viscerum, ac inter eosdem partium lesionem, & ad reparationem commendatur. Tanta etiam consolidandi huius visæ est, ut non cum cum suis crudiis partes conciliis coacta, seu simul cogit ac vivit. Adversus etiam scilicet inflammationem accensibilem, & tunc cum profusorem hanc rheumatis imposita superant.



De *Symphysis maculata*.

CAP. XVI.

*Symphysis maculata*.



Regula.

**R**EGULA aliud *Symphysium* satis antea dicitur esse minus *Symphysium*, sed casus eius heremona, dicitur tamen tunc in folia minoris, aspera, & hirsuta, in quibus ut plurimum albicantes apparet magis maculae, quamquam & alibi maculae nonnullae videntur locis florea forma haud dissimiles, ut hinc minus, hincque verò ac potius debet casus purpurea, nigrescens radix duracif, per obliquam deorsum dicit, ab eis adhaerentibus concatenatis.

Loca sunt epica, & raras tractus. Reperitur & in collibus vrbionis, & in Bohemia quidam locis haud maculata. In horto facile colitur.

Primo vere erumpit, quos florifica est: per totum Autumnum folia radice perennat.

Pulmonarium & Pulmonariae Herbarij appellatur Cordus *Symphysium* sive *Regula*, verò & aliud sive sine sua nomine sit, velius *Symphysium* tunc ut obum aut maculatum dicitur potius Germanis *Langenstra*: Belgis dicitur *Regula* melle trapi: & *Langenstra*: Differt non parum à Pulmonaria, de qua inter M. alii genera.

Ceterum haec, ut ita hoc *Symphysium* potius respondet, si radix huius viscosa, verò in quodammodo dura ac lignosa, sicut huius qualitas & magis adstringens.

Foliorum in dentibus usus est. Potantur verò & ad Pulmonariae vitia ac vlcera hauri quoque radices confectis, & idem, quod maiore *Symphysium* posse.

De *Regula*. CAP. XVII.

**R**EGULA folia sunt latiuscula, oblonga, minoris quam *Origanum*, mollia, umbra nonnulla tracia, & inflexione parva, in sinuibus quodam & aprica, aliquando rursus purpurea scilicet, caules quadrangulos, modice hirsuti, minus, gemmatis, quibus adhaerent per se in folia odore haurit, & partem huius decumbentibus serpunt, partem verò assurgentes supra distolentem utellantur. Flores huius parvi folia umbrae & fuligineo petala colore capitea, radices rursus in fibra consistunt.

Saxo, non raro quoque in radionibus, frequenter in aprica & aprica, quibus epica locis gignitur trallata ad domos haurit: compositus respondit famularis.

Apuli ac pollicentium flore septem possit.

Inter appellatur *Solidagine* sive *Consolida* à recentioribus nunciat. *Consolida* media à quibusdam horum dicitur Germanis, est *Origanum* & *Origanum* in Belgis *Langenstra* vocatur, & idem nomine dicitur *Regula* Radix huius *Regula* romanis à Gallis vocatur, Morsus olim *Langenstra*, & à Senensibus *Moradoli* dicitur vocatur. Sunt qui ea sive *Symphysium* aliud genus esse, quod à Dio *Crisostomo* cognoscitur. Vetus hanc partem in foliis *Symphysium* siquidem petram tamquam minus habet *Origanum* in capite



verò veluti Thymi, & totum lignosum ac odoratum est. ac tale quidem ad est Bugula, quae nec lignosa, nec odorata, & caules plures diffusivos ab Origano, & capitulo nequaquam habet Thymi amala.

Culci temperantem admodum signi potest: reficere verò ut in se si cum odori- li ad functione. Commendatur ad distemp, febrilia, convulsiva, colicis, adicis & potendos, quae vulneraria dicuntur, additur, ut quibus tanta cum tactibus praedicatur, ut singulis con- cretam resistere, se dicuntur valeat. Racliam in Gallia vulgo dicitur refert, cum vulnere Medico, aut Chirurgico opem ad egerit, quae Bugulam & Sarsaparillam habent: Nec etiam lam- pa tumore modo vulneribus ad datur, sed & ipsa semper composita.

Ad totius verò languoris eadem consistit, nam propterquam quibus obstruuntur aperit, viscera etiam ipsa robora.

Vitis quoque cum ad siccitatem maligna profertur pedicabatur, quibus succus prodestit- lio insulas, si deinde herba coacta super, temperantur: ad intertingens eodem etiam modo conducit.

177

De Brasilia.

CAP. XVIIII.

Brasilia

Brasilia alba 1000.



**C**APELLA Brasilia tenax fere, quadrangulae, hirsuta, terram versus inclinat, per h- cunctam consistere ne quoniam folia lata, oblonga, acuminata, Mencha amala, sed inno- ma, hirsute tenui aspera fere, & haec quoque odorata in ramulorum fastigii fere spec- ti à carulis obscure purpureis, raris albidis, radicibus tenax in fibras abeunt multas veluti capi- lamentos cohaerentes.

Incalis & lapidosis, ubi modo verò & herbosa Brasilia, pignora loca, veluti loca mag- nis praerorum: reperitur & quandoque in sylvis.

A. Maria meridie in Austrorivato vique cum flore colligi potest.

Recentiora Brasilliam & Pruselliam appellant: Germani *Wasserdill*: Belgae *Wasserd- Menthola* *Cissididam* minorum, & *Solidagiam* minorum: Racliam verò *Belidam* *Cis- sididam* minorum dicit affirmat. Non est quoque *Symplytum* peccatum, ut non alia refici- nam nec odorata nec lignosa est.

Culdem ac siccat esse, sicut cum modicè ut utra ostendit, & tenuis ab- fringentem.

Eadem quae Bugula potest fere: commendatur tamen & ad omnia vasa, & praesertim ad  
lingua

legat cum tuffore totum ille exasperatorem, pinguedinem, & sicclitatem, in alio id est ca-  
 strale, Germani De hanc appellant, quod cum febrem continuam & mentis inordinatum  
 perturbationem non superuenit. hinc Bonello ex aqua decoctura, post largum intervallum  
 sub lingua detrahentem, proficundo est, superius est largusque claris, addito quatuordecim  
 momentis, accipio tunc solacia.

Endiviam malum Veneticis incognitam, sed tamen si considerare cum eo quod à Paulo  
 Agnora lib. 3. Erysiopelam cerebri dicitur, hanc multum differens ( si non aliam ) videbitur.  
 Tunc & tunc sub lingua Pauli agnoscitur, quodammodo in Germanis appellatur *De hanc*  
 quae casta loquuntur, faciant.

De Caryophyllata.

CAP. XIX.

Caryophyllata.

Caryophyllata montana.



**CARYOPHYLLATA** triplurimum tripartita, subaspera, hirsuta velut Agrostis, sed  
 Caryophyllata, dummodo, ut, ambrosia quoque, finitima folia in longa latente pediculis, quibus &  
 duo munda quodque subijcet caules subinde exsertiles, velutiores, manes, in rursus  
 Endiviam, et quartum fistigium hinc illi lateri, Pentaphylla aut Tomentilla similes, capsula  
 succedente aspera, ea melius accensu carnalis si prope, per maturitatem vel mal adhaer-  
 scere solent, sed in multis exemplis subruffa floribus Caryophyllata odoriferum.

Nascitur secus vias, agrorum, & hirsutissimam spem dicitur: gaudet magis quae ac ven beatis,  
 quae parat dicitur aprica.

Hanc generis & montana quaedam est, folia eius crassiora, molliora, asperiora, hirsutis-  
 sima, non tridita, sed rotundiora, per ambrosiam cretata, quae ac longa videtur pediculis,  
 circa quos exiguus vel hinc folia subijcet caules tenues quoque, sed hanc rursus, gen-  
 tili, rursus posteriori hanc, quae si prope munda, & ex pluribus foliis composita  
 firmi, non colore, hanc post quae penitus orbatus succedit, radix subell longa, atq; ea,  
 carnalis, sed in multis exemplis subruffa floribus Caryophyllata odoriferum.

In alio montana: capitur, ac densa hinc, non modo apud Bohemos, sed in & in Nor-  
 mandis, Baranensis, ac alibi.

Vrayque Max. hanc, ac etiam finitima floribus.

Caryophyllata ab odore Caryophyllorum, quod rursus pra se ferunt, nomen accepit.

Dicitur & à nonnullis Santarinda, & Herba benedicta, ut cum à quibusdam Nardus vocetur. Germani *Zwitscher wurz*; Brabanti *Caryophyllen*; Galli *Gala*. Angli *Stam*. Graeci esse *Plum*, quod plerique suspicantur in tantis quibusdam utrum affirmanturque. Cetera, ut quae *Plum* lib. 22. v. 249. v. 1. nichilominus habet, n. 9. 11. benedicuntur.

4. Aliter species Caryophyllatae nomina à recentioribus appellantur. Cuius Baccharis descriptioe consuetare potest, si flores purpurei, & tubalbecantur, ut qui, modo ut diximus, loti, solum quidem latus respondent, utraque & alperitosa quoniam *Vicia nigra*, quae proprie à *Vicia*: cauliculis hinc et inde totis non fiat, geniculis tamen utraque ulantur: pedis uti foliorum adnata quaedam foliola exigua habeant, sicuti Caryophylli scelerent. Baccharis autem fibrosis radice *Cinamo* odorata.

Caryophyllorum autem ac *Cinamomi* stem odor, siquidem in lomentis ac virgulis distinet, quae cum Caryophyllis intercedunt, legitimum facit *Cinamomum*, quod nec ab eis accipiatur suspicari licet. *Dioscorid* de eorum *Cinamomum* grandisramulos, & tenuia testatur esse virgula, nigra, & geniculata, quae cum uno sunt lignosa illa virgula, quae vix cum Caryophyllis adhaerent, & in quibus Caryophylli ipsi nascuntur, quae Caryophylli odor ac sapor referunt, quibus tamen infusiores ac minus perfiantes, unde Caryophylli in ipsorum locum succedentibus, nigro-stem habitis, ad legitimum *Cinamomum* motus non faciunt hircingula expensa.

Proinde radice, quae Caryophylli scelerent, odore *Cinamomi* se referre testè affirmantur: non obstat odor radicum odor quod minus Caryophyllata altera, Baccharis sive floram tenuissimo colore, ut diximus, adhaerent. Baccharis autem de sereno *Perp.* 2. lib. 4. requisita.

Ceterum Caryophyllata radice & folia haud oblitere resuscitantur habent facultatem, & nonnulli caliditatem vix cum expurgandi potestatem. Ad venerecia cruditatem, colicorum, & menasteriaque morbis decedunt horum commendantur. Prodest etiam & ad laera doloresque ad locum obstruiones: crudos humores concoquit: visceribus inflammationem expungit, & fluxus dicitur, per lectum ex vino sanguinem quoque alioqui interitus cohercet, hoc modo folia aut radices sumptae, resoluunt atque discutunt, idcirco & potioribus admiscetur, quae castis, reperi, atque in alio delapsis propinantur. Colliguntur & decollo haud inutiliter cum nocent, tum & vetera valent.

Radices resiccat, ac tenui imbre aceto respersa, velles à tanis presertant, & ruculis odore commendata.

#### De Pyrola. CAP. XX.

Pyrola.



**PYROLA** quina, fusa, septena à radice in oblongibus pediculis producit foliata, necnon passilongitudo, colore, brachy. *Beta* quilla, sed modo minus, *Pyrola* scilicet magnitudine emittit assequantur, quibus colore ac dante ferè respondit, casus inter haec modicallongitudo, doctorem, aut pedem altus, foliis per anthera circumdata elegantibus, ostentis, colore albis, vix mediocriteribus exantibus. radice vixit, fibrosis, tuba de serena, haud abe dominatur.

Locuplet montana ac umbrosa, in vixis per Germaniam, Bohemiam, ac Mosiam solum occurrunt.

Cum floribus lanis ac tubis quae. non anno vixit hinc & frigora patiens.

Pyrola ac *Pyrola* recentior quae appellatur Germani *Pyrola* utraque: Belgae *Sandster* ignotum Bohemae *Pyrola*. L. *Fuchsin* Limonium esse existimant, Germani *Pyrola* mangoldi & *Westringoldi* nominant: Sed *Limonium* non in montibus ac sylvis, sed in pratis paludibus collitur, nomenq. ab ipsi accepit, quoniam squamulae prae Geri appellant: iam & ostendunt, quoniam *Cynoglossi* cum *Limonio* coarantur.

Resiccat aquam manis sibi *Pyrola*, & eademque adhaerit, atque vix resiccat.

Mixtura potioribus quae sanguinem producit, uti sunt, & vixit necesse est inflammationem ac inflammationem resiccat: item & vixit ac quae

*Herba* dicitur, sine qua eructus vulnibus adhibetur. Fibrae ex vino decoctum ad thoracis, & inter costas vulnibus solidanda commendatur: vasaque verò de adhaerentibus sanant, quædam in aqua, de Symplicii radice adhaerent.

*Ophoglossum.*



Lanaria.



*De ophoglossis. CAP. XXX.*

**V**NICUS Ophoglossis est totius, lateris, & oblongum, sicut fœtus solentur Parturientis, sed minus tenuis, ac purgatus, & cuius pediculo, & folij velum firmi, tenuis velum, erat lilius, cucurbitae vel ut serpentis linguam proferens radices fibrosae sunt.

In humidis ac palustribus prout gignitur: In Belgio, Germania, & nonnullis Italiae locis reperitur.

Maisi mensis prode, ad usque Iunij usque, quibus post tota marcescit, nec deinceps copiosatur.

Ophoglossum vulgò Lanaria Christi nominatur: verò de Luciola & Argentina, est tamen & alia Argentina, de qua non palustria. Italiae herba sine cella Germania Sfarungium, unde Spé, & Lingua serpentis nominatur: Belgio, *Spinnant*: Gallia *Lanua de Serpent*: Anglia *Reverwage*: Bohemia *Heby Jagel*. Plin. lib. 24. cap. 19. Lingua: herba circa fontes nascentes non minor, quam pollicis lib. 25. cap. 11. Lingulacum vocatur: Vitis, aut, Iohannes radix vitæ trita cum adipis nigra: fœus quæ non penetrat ad aspectum. Hanc plerique si ipsius esse Lanaria Christi, sed cum Lingua: sive Lingula: nulla nota describitur, affirmare non fecit facile.

Ceterum Ophoglossum singulari quodâ sed moderatè siccum verò temperatum esse amplius est, ad secundum gradum videlicet accedens.

Ad recentia vulnera, conglutinanda, odore, & admodum hæc efficaciter, Baptista Sardus scribit. Confectus ex hoc oleum, solis cum oleo olivæ admixtum ad Solem matemat, quod ad in odore recentia vulnera, sed & vetera vitæ, non fuit. Herba puluerem aliquot diebus cadubatum ramices omniacorum posse idem affirmat.

*De Lanaria. CAP. XXXI.*

**L**YMARIA nonnulli vocant quoque solent in gracili rotundo, ac lato pediculo assurgit, quod costium glabrum, vitæque foliis, ut plurimum sex, distat, specioso exhibet complurimum ad vnam præter hæc costium nascentem, quorum singularia si breviora & latera, prodeit ab hoc pediculo sub unum folij, sicut ramum, in cuius folij, sicuti racematum coherentes, qui delibentes, artatu aut latera sunt, imp ut si, necessarium vel ut poluerem demittunt. semina rotunda, in via modum cogeruntur, pro radice in fibra subsunt.

In montibus aut colliculorum declivibus, ac humidis locis subinde gignitur, solo tamen gracili ac inculto.

Sub finem Aprilis, Maii, ac Iunij mensium prothibentibus aut mensibus temperè fuerit, quam apparentem requirit.

Noftra quæ Lanam appellat, & in ore cognominat ad differentiam Herionidæ, quam Lanam vocant masconem. Dicitur & Lanam Ropya a nemore flore ac fructu & ut nonnulli placet fœdè virgæ & arboris. Germanis Weidman, & Non rarij per omnia. Non in pſſij: Barbans dicitur in Angliâ: Gallicis Taurin Lanera, Bohemis Weid ſi poſt.

Refrigerant ac vaſa acria huſcitamentibus rarij ad ſuſcipiendos nonnulla. Vetus voluerit huſcitamentis officij, nonnullis & cruentis adhibita: ſuperfluitas mentis opprimat dylentia nonnulli. Clymares vero & hinc cognominantur, & ad ſuſcipiendos nonnulla, ſunt et.

Saxicula



Alchemilla



## De Saxicula CAP. XXIII.

**F**OLIA Saxiculae complura in oblongis terribus pediculis à tuberculis proceris lato, & rotunda, quidem, nisi in quorundam partibus duntaxat, Vix folia idcirco quadammodo similia, sed rarij multo, & virens, leuione tenens, arbutis firmata, exornatq; aequalis ruberrimis affragant inter hæc cariboli dodrantem aut pedem alti, ad radices ruberrimas, in quibus cæcitate floribus aliis suis, albedi, lacto dicitur sumere rotundo, alperis, præsertim ad hærere vestibus, Lappo am modo rarij superius costulata, multos uiseros capillamentis fibrosos.

In sylvis ac stirpibus nascitur, gaudet pingui glabe, lato, humidoque solo, nascitur & ad hortos, in quibus laude adoleſcit.

Florem Saxiculae Mino ac hinc profert: sicut deinde maturatur: herbari vero sola non apponitur, nec hyberna horrent frigora.

Saxicula vulgò dicitur à cognomine Drapenſis Germanis ac Belgis: & rarij: Gallicis Saxicula: Bohemis Saxifl. A fasciis dicitur vulgè, hinc notum transit costis, Rarij autem sunt vero & alij à plebibus appellari Saxicula, ut quæ Viola duntaxat nonnulli Pempt. a lib. adhibent, & Vix saxicula nuncupata, ad Primitias vixit firmata.

Ceterum hæc Saxicula, vixit adhibere quadam gustu amarij, ita, procer quod expurgat, & adhibendo roboret, calida, sicca, & quod in ordine secundo est. Succus ad firmata vaſcerulata profert: Datur vero & decoctis eius, quod sanguis spumantem & dylentiam curat: Sordiditatem hoc etiam com modo abluuntur. Tumoribus si quibus dicitur, ac colitur in aqua decocta, & repleta in modo inposita. Mixtur potiones, quæ vaſcerulatas appellantur.

## De Alchemilla CAP. XXIII.

**C**AULES Alchemilla dicitur dodrantales, rotundi, rarij, nonnulli hærere, si quod vixit hærere cum hærere quæm affragant in diuersis modis rotundis à radibus maiora, rotundam eadem in rarij, rotunda, angulis tamen aliquot, se hærere oblongis, emittuntibus per marginem fœdè, Molitur folia rotundis similia, sed duntaxat, crispiora, & albediora, quæ prius quam explerentur, plerumque placantur inter multos folios tenues, parvulis aliquot similibus colore pallidi ac herbaceo: si non purpureum aut cuiusdam theæ. pulvis longitudo hærere nonnulli expurgat, crassitudine fœdè purior, si quod vixit nonnulli aliquot hærere duntaxat.

In vernaculis herbis gignatur, & in montibus: locus enim non cultus.

Masi ac liliis similibus cum flosce veget: toto quoque anno reforescit radice vivit.

Alchemillam & Achimillam Nicotem appellare plerique & Stellariam, est tamen Scellaria & Aster Anticus abis Germani *Spinnant*: *Leontop.* / *Leontop.* Latine Plurimicorne, & Pollicone, *Quir* frantren montis & *quif* jamplicis est, Seneccia musci Belgis *Spinnant* / *Quir* ignota nunc: Gallis *Pres de Dieu*: Anglis *Lotus montis*.

Apud Venetis nomen quoque fignat non amant, nam quod nomen hinc Leontopodium esse indicat, nomen Germanica appellatque falsi, veritatem non habet.

Est autem Alchemilla facultate: Seneccia simili, adstringit tamen magis & antiprurificat.

Vulnibus eodem quo Seneccia, modo adhibetur, & eadem quo illa praestit sanguinem & post fluxum mentis sistit: seprum & vbera virginum, laxata aut non cure tumentia, datione efficitur.

*De Solidago Saracenica.*

CAP. XXV.

Solidago Saracenica

Herba Dona.



**Q**UAE Solidago Saracenica cogitamen accipit, caetera propter bicubiculam, aut alioes, re-  
flos, perennis, caulis inermis sine anates, nigricantes aut obliqui, praefertim inferas, ru-  
bentes, folia vivunt lata, oblonga, lina, acuminata, Solidago aut Lyfimachij linae ferit simili,  
sua maura, per ora erant, que ante quoniam caulis prode, a radicibus exeat, deinde verò ip-  
sum coarctante, folioli in ramulis ipso folio plures, parva, lina, flammibus concoloribus  
medis, que in pappo resoluntur. radix fibrosa est.

Herma & spaci gader in sylvis rura folia in Germania, & Sepora moxem versum-  
gionibus non raro obvia est.

Hinc admodum simili, quam Dona in herbam plerique nominant, sed procerior & em-  
nino amplior: folia non similia lina, longa, acuminata, caulis pargata, lina, umbra nec-  
h) ferrata, sed omnino maura & crassior: caulis quoque crassior, ad tres quatuorve cubitos  
altus cum affurgit, qui in altum alioque diarsu caespitosa: foliulos gignit, & modico lo-  
flarum, cum & folioli postea posita, lina, que & in pappo lina lina pappo percunt. à quo-  
dum veluti capitula desinantur radicum fibre, quarum quaedam proceriores super  
multiplicant.

Natales

Nobiles haec cum superari conueniant, etia aqua creta, & Sacca tardo decurren-  
tia sufficit in Proxima dicta & Narbonensi Gallia nouer qualem in Germania aut Belgio  
vbi in haec felicitate proserit.

Flores utaque Julio ac Augusto, vel subinde prius profere.

Proceri Belgae ac Germani Solidaginem appellant Saracenicam, & Confidam Sarac-  
enicam, vulgò *Grubstich* inuisitum, & *Heptem* vocant rursus: à rosetulis & Herba Fortali-  
ditas Galli Germanicè appellacionem graecè *Consida* *Solidag.* nominant.

Alicuius Galli Herbam Doriam, quæsi anciam herbam, vocant: Germani ac Belgae no-  
men retinent. Porroque ad Panacea Chironiam recte nonnulli laborant: Apuleius autè  
Heleniam, Paracelsus Chironiam facit, ut Perce; 3 lib. i. scripsit. Theophrastus quidem  
& Plineus Panacea Chironiam Lapathæ folio, sed maiore & herbosiore, describunt, quale  
omnino Helenæ est folium. Dioscorides verò & Nicander Panacea Chironiam folio refe-  
runt Amaranthi esse.

Vitalitas Solidaginis ad vulnera curanda & non modò crescit, verum & inextinctas  
foedebat vixit esse.

Foliorum puluis vulneribus inspergitur, aut oleo & unguentis perfricatur, cum quibus  
& ipsa folia recentia decoqui possunt.

Medicus eodem & similibus ac maligis fordidis ulceribus. Mifectur verò & potibus,  
que valetudinis, oculi, ruptis, aut ex alio delapso propanant. Apertè verò & delectatim heram  
occasione, folia, ac haec obstruccionis eorum morbum curari ac diuturnis febribus auer-  
tar. Scordili ac fetida gingiuarum ac oris vlcera. hoc quoque vltimè colluuntur, presertim  
melle rosaceo addito. Herba Doria & temperamento & reliquis facultatibus Solidaginæ  
Saracenicæ similis est.

De *Virgauræ*. CAP. XXVI.

*Virgauræ.*



*Virgauræ marginis cretae.*



**V**IRGURÆ, Solidaginæ Saracenicæ aliquo modo poffet, fieri quædam lora, oblonga  
ambra subinde nihil aut parum, quæ andoq; amplius cretata, sed breuiora, nigrescens  
folia, quæ quædam ab ipsa talibus exerunt, argilliora verò quæ calciculos conciliant, quæ



rotundi, fibrositates, & crispitates sunt, atque in alto dorsi, recta quos florent. feream vici-  
 fat (in sua specie prope modum) odore digni, cum colore lacto, & videri papposi. radix in-  
 gremi fibris oblique demeritis.

Reperitur non raro in foliis, ac in amento fit, vbi latum purgatioque solum.

Angusto ramis potissimum florere: radix reticulata est: folia ramos magna ex parte vni-  
 cum cubito superant.

Vigam auream appellant: non est ex eo accepta, quod ramosi floribus grandi, seu colore in  
 vespulam referant: Germanis ac Belgis *Wulfskraut*: Gallicis *Feyge d'air*.

Calidam quoque ac siccam fortis est semper, ad vniuersas qualitates secundum gra-  
 dum perueniens: e spargit verò cum in manilla adhibetur. Vniuersi vniuersum prostrata, &  
 sanam calculos expellit ac ceteros vniuersos, atque vniuersos crediditque pinoles hoc mori exadu-  
 cit, vniuersos meatus occurrentes, qui subinde calculosam autem ac delectum memorantur,  
 & annulas in vniuerso caliditate (sed ramosi fruibiles) formam coalescere cogunt: Quamobrem  
 necesse est, ne ab his Arriolois Villarouanum hanc aduersus calculum, & rerum dolores  
 commendatam reliquit.

Numquam verò & vniuersalibus ac vniuersis consensantes herpes & eodem omni-  
 no prorsus posse, quae Solidago Sarracena, fertur.

De *Verbascis*. CAP. XXVII.

*Verbascum laeue.*

*Verbascum rugosum.*



**V**ERBASCUM dicitur fere genera: candidum vixim, nigrius abscitum. In cordulo genere  
 laeue barba dicitur: quibus folia aliud. Adicit Dioscorides, ac post eum Galenus  
 Syriacus *Verbascum*, Philonides dicit, ac Theophrastus idem.

Sunt autem laeue *Verbascum* ampla, lata, magnaque folia, quasi veluti Brasica, sed mollia,  
 laevigata, & fibrata, interque mediam affertur cunctis rebus, singulariter, & ipse modis can-  
 dida quoque laetitia ac canaliculis, interque quidem folia consuevitur similibus, sed tunc fere  
 interstitia, à modo vniuersi sunt, versus fere quibus vndequeque floribus itaque, à colore  
 laeue, nonnulli odoratis, è quibus folia, quos sequuntur caetera. nota nota vniuersa, è quibus  
 fere vniuersum, radix longa, digitata sed è crassitudine, fere nigra.

Angustol-

a. Verbasum nigrum.



nina, praeterea, dicit. Diofcorides, & Plinius, nec non Galenus angustifloris folij Verbasum, atque latioris vero folij, feminam appellat.

Desfordandi auctor vi aut potentia Verbasum praeditum esse: folia vero etiam nonnullis digerendi ac detergendi vim communem habere, ut quidem Galenus Decodis hanc eadem in aqua conditam, & ut ulocant in flammato oculis imponitur vitata vero furada ac hylentacum vino & acule curant: cum aceto valentibus, & a corpore peniculis antistat, author Diofcorides.

Recitatur etiam haemorrhagiarum Verbasum foliosum decoctio, cum in de hinc promittitur haemorrhoides vitare fontem, nam & dolere in hepate, & ipsas haemorrhoides relaxare solentur.

Radix acerbis, ut Galenus, si exteriorum afflictae prodest. Diofcorides in alio profusio vitata cum vino demum coacturae rupta, cum ulis, & melle vocem antistat: dentium vomiditate mitigare, solent.

Sunt qui & gestum hanc Comitialibus prodesse sentire, praefertim eras, quem modum flores fecit, quaque coilecta fuerit. Sole Vagris dodecatemoriae, Laris vero Anacampigrante, quod tamen superfluum & vanum non caret.

Flores lateri capillos haurire posse putantur: Exsiccant enim exiguo calce in limo aliquando bus succorum, donec videbitur res soluti fuerint, ad haemorrhoidum dolorem posterosi commendant.

Autem, inquit Plinius, in foliis, quam feminam diximus, licet octavo non putentur quod & Diofcorides refert.

#### De Mentha. CAP. XXVIII.

**VERBANI** nigri speciei quaedam Mentana apparet, cujus floribus usque ipsam referunt folia eius ob hanc vitare, laris, haudquaquam lanuginosa, & aliquantulum respicitur triaoblonga, & per marginem serrata, minoris quam Verbasum caulis velis in alio dicit, haemorrhoidesque sunt, quos superius copiosius sunt flores, ut plurimum lateri, stercoribus alijsque in medio porporeis, & resista, nonnulla odorem, subinde nomen dicitur habentia, aut oboleto colore purpurascens, quandoque & nigra. Viola elegantis colore nitens, quibus similitudine dimittit & notanda vascula, minoris quam Laris. Semen vero in his nigricans, & tenuiter in radice una non oblique adnata fibris tenuibus.

Palis

Matris.

Et circa ibidem.



Paucis plantis Italiae, Germaniae vna sicut foris hinc aquarum margines, in lucosis ageribus, & hinc longè à fluviis in oppositioribus, & quidem quae hinc floribus frequentius purpureis rariis. Vnde magis coloris florem ferens, ut ait Aldem in Bohemia reperitur. Semelita, facile deinde singulari arbor in horto redit.

Floret Matris à Junio in Septembrem usque semina interea perficitur. Posterior etiam Matricaria appellatur, neque eam esse nec tenere existimat, quae à Plinio lib. xxi. cap. xi. hinc dicitur arvensis. Et similes Verbasco herba, quae saepe fallit pro ea capta, foliis minoribus cardui, caulis in pluribus, flore tunc haec abest. Matris in se usitatur, adeoq. Romae Matricaria vocatur. Et conveniunt quidem flores & caules (ut simpliciter) cum ang. Verbasco. Matris autem hanc consistere, nondum obtusam scopulam.

Vulgaris Cordus Verbascom nominat. Leptophyllum; Germanis plerique *Soldknopfe*, alij *Chabernan*; Illisribant Erbarum. Plurimè usque Matris. Nec defuit qui Chrythogenon esse suspenderit, à cuius tamen descriptione longe abest. Neque enim frutescit, modo matris denique frutem radix quoque non Rapi modo consistens, nec interius rubet.

Chrythogenon autem, ut Dioscorid. lib. ii. cap. lxxviii. hinc dicitur frutex, foliis quibusdam floribus habens similes Verbasco coronariae. *Πενταφυλλον*, id est, eadem in capo similitudo, usitatis valde rubentem, foris agrum.

De fructibus huiusmodi Plinius. Super autem etiam gustabile eius quibusdam, eisdem & sicum esse existimat.


*De Probato Sylvestri. CAP. XXX.*

**S**YLVESTRIS Verbascom in multis fructibus caulesque quodam palatibus, artuolatis, in alijs distributo, pimento alioque circumtae sicut folia in ex singulis hinc sunt ex aduerso posita, scilicet, caules alij, densa lanugine vestita, ut quibus, le rugosaeque cythi Salviae, quibus tunc hinc valde possent. Flores venticillatis suspentes canaliculati sunt, purpureos. Lami floribus similes, sed majoris, & colore luteo. Radix et aliam demonstrat filio conciliata.

Hinc & altera species, foliisqueque Salviae, & d. maritibus sibi dicitur, ac hinc, curat eadem eadem quo si longo illorum pro parte luto, & pro parte similes.

Verbascum thapsus.

Verbascum thapsus dissectum.



- 3 Fertur etiam & aliud raris foliolis laciniatis, vel uti Bracco, uti Papaveris corniculati, quod sermois craticulatus ex gurgis floribus à Matthaeo de pappus.

Sylvestris Verbascum primum & alterum in montibus Hispaniae provincis, ac etiam in Narbonensi Gallia in colibus arboribus, ac petrosis locis sponte gignitur, Apud Germanos ac Belgas, cum & aliis in excelsis montibus subinde reperitur.

Floret utrumque Maio ac Iunio in Hispania ac Lusitania, auctor C. Clusio: apud Belgas verò & Germanos aëria.

Verbascum thapsus pallidum aëria temperata dicitur ac fructuosa appellatur.

Primum pro Verbascum Lychnide à quibusdam habetur, quod videlicet folia sua apta ad lacuosam sint in raris, in quibus elliptica vixim præbent quædam. Dicitur verò Verbascum Lychnide etiam, Diad. ac Theophrastus autem Thryallida vocat, ut Nicander in Theriacu refert, huiusmodi flos huiusmodi posside neque Thryallia, neque Lychnide, sed elliptica Verbascum Thryallidem ostendit esse Lychnidem finem Pempt. a lib. 1. Plurimæ autem esse quædam media, & languida folia apta sunt ad funiculos, & elliptica, hæc repugnant.

Carnem faciliore huiusmodi, ut aliam finem, ita temperatam quoque facit.

Ambrasta, Doc. Cur, folia carapissimans modo imponitur.

#### De Primula Vera. CAP. XXX.

**PRIMULÆ** Vera vna maior, & polyanthemus altera minor, vix in singulis locis floret.

- 2 Maior Primula Vera folia prostrata, etiam stamena longiora, rugosa utitur foliis Betonicæ, quibus tamen minor sunt, & dilatas multò vixim, per margines nihil autem gurgis admodum ferens, affixæ e medio stylis tenent, pedes, dodonæ non alior, cæcitate Bosculos atque prostrata, anthera denticulata, frequenter deorsum uertente, rotunda in duobus (pappus).

In floribus hæc cum cæcis differunt quandoque eleganter lateri asperantur: sunt pallidi, ac dilatas colorum quasi albedi nonnunquam odorati, frequenter odore deorsum autem plures verò etiam pluresque loca.

Maior

Primula Vera minor.



Primula Vera florimultiplex.



Primula Vera major.



Mores folia superne in refert, sed tamen tri- 2.  
 angulis trilobis, pediculis curvatis in modum foliis  
 utroqueque brevibus, ut pediculi utroqueque, in quo-  
 rum inflexione foliis singulis pallide laetis, priores  
 firmiores, caeteri firmiores in his abest.

Hinc sunt species superius floribus herba-  
 ceis, obliquis, & vix multibus, quo de quandoque fo-  
 lia multiplicat.

Ambo Primula Vera loca humidiora, non ta-  
 men omnino rigida in sylvis lapsis occurrunt: repe-  
 titur verò de quandoque, in apertis ac parvis bus.

Martio & Aprili flores: si verò hyems cle-  
 mens fuerit, etiam prius, non tamen, ubi Vera ef-  
 florescent.

Velgo Primula Vera appellatur, ex eo quòd  
 inter Vera florentes prima, vel inter primas flo-  
 res profertur Normannorum & Andegavorum, & her-  
 be Paralytica, ad curam: et in & nervorum do-  
 lores effertur: exaltantur ad hanc *Essays medic.*

Que maior est à nomine Herba S. Petri di- 2.  
 cuti: Germanice Sankt Petrus heint: Silesiense  
 Kamen: hanc in Silesia: Apud Belgas Sankt Peter  
 heint: Silesiense: hanc in Silesia: hanc in Silesia:  
 hanc in Silesia: hanc in Silesia: hanc in Silesia:

Altera Primula Vera minor appellari solent. 2.

Ad primula, Latine Veratula dicitur, à ple-  
 titique refertur, sed cum sola eius nec hanc,  
 nec rotunda, agrò ob perhibetur. Philomela

si quidem folia de Febre nec de Febre, hoc est, Plurimae in Syria, Italia, & Romania videntur. Dioscorides, *phlogos* ab aliis *staphylos*, *staphylos*; et *phlogos* ab aliis *staphylos*. Plin. lib. 27, cap. 2. Sant. & Plin. de idem habetur, porandis folia, *staphylos*.

Sunt autem Primulae Veri facultate quidem reficantes, cum de rebus ingratum aut nihil.

Aureola Veri.



Aethiops.



Commodantur ad articulationum dolores, & nervorum refectio, necesse radicum vero decodum ad renem & vesicam calculos faccus, febrem tertianam & super venitur cutibem exsternant.

De Auricula Veri. CAP. XXXI.

**V**ERAE auricula ad Primulas Veri pertinet foliolata, e vertice albicans, respondens, nisi laeva, abique magis, carnosae, atque ornatae crassiora sunt. pediculis tenuis, terciaque in medio efficitur, foliulis fissis, profert conceptacula, Primulae Veri minoris xitibus, plerisque locis interca, aut albidis, albis purpureis, aut dilute rubentibus, rader compluribus crassis, oblongis, bene firmatur.

In petrosis & praevis Alpium, magis, sedque multo rari potest rarisissimis subarboris apud Helvetios, locis Oserpenti finitima: agro Gorenali Salentino monte, & in Parione montibus, perlocum quae purpurea est, flos, reperitur.

Vide videtur Primulae alia flos.

Auriculae Veri recentiores appellunt, atque in Schidagman aucterato scribunt: Paralytici & Sarculari Alpium normalis nominant: Maticholas quoque pro Sarculae deponit. Facilitate autem flos & adstringens est.

Potentibus addita, aut per se decodis, non modò externa & interna, tamen thoracis vesicam congruunt, sed & enterocolis sanare posse fertur, aliquot contritus diebus sumpta.

De Aethiops. CAP. XXXII.

**A**ETHIOPIS lata, mollis, alba, & laevigata sunt folia, Verbaque in rosis, sed tamen candidiora, copiosioraque sanguine perspicua, per marginem sinuata, festinat, magis ex parte obtusam utrumque decumbentia, quibus angulis, qua consuevit Janague, asper & incras, in tumulis sine standitibus, hanc qua folios per intervalia ordine digestis, candidis, cavallam referentes, Lami, flosibus firmis: flos uno conceptaculo gemmatur, magis adhaeret (ut Dioscorides refert) Erui: radices longae, quae reflexae representant.

Praeter Aethiopsiam, nascitur & in Idemont Troadis, & in Messonia, auctore Plin. lib. 27, cap. 11. Idem aut & in Meropoli lib. 27, cap. 11. Est autem Meropoli Nili cistarem habens, eadem nominant Aethiops, quae Aegypto subest. Transiit vero in Italiam & Germaniam versatque, ac Galat Aethiops in horti hanc infeliciter proferit.

Cum flos quaedam apud Belgas Martimè visus est. Radices Aethiops, Plin. adhaeret, colligitur.

*Aithon* à Grecis, Latini nomen ferunt. *Argemone* inquit noster, nomen habet : & ob id à Mennio à Mese, *Pinus* teste.

*Rubus* de codum libris in c. & pluribus, ut *Diosc.*, similiter *Paulus* & *Sergentus* exemplaribus addit. *Pinus* in vero deo. c. tum vulgo in eodem primum refert, & cum, quæ ex *Aithon* adferat, exarantur, & suo prodelle.

De *Arthron* *Diosc.* & alii.

CAP. XXXIII.

*Arthron* ex *Codice* *Celsi* ex.

**V**ERBASCO folia similia cili, quod *Arthron* dicitur, longioribus videlicet ac brevioribus, sed tamen in latioribus ac cordatis (Purpurea in latioribus utramque esse videtur) caulis longis & molli firmate ut *pinus* *Cymimolide* ut *terena*, alba, dulcis, ut *Arthron* *Diosc.* dicitur.

Et hæc quidem forma depingitur *Arthron* in vincto *Celsi* in bibliothecæ *Codice* : folia videlicet lata, umbra crassius caule tenuiore erecto capitulo atque in fistulo mollihus ac longioribus, ut *pinus* *Cymimolide* sunt.

Nascitur *Pinus* in petrosis *Agrorum* *Grecorum* *Lance* similia ut *Arthron* in vero & *Aperige* & *Arthron* appellantur : *Arthron* nomen habet, qui *Grecis* *Aperige* dicitur.

Hæc autem quæ *Arthron* idem est *Aronia* hæc *Perficaria* facit, multo vero magis, quæ & cum *Vergula* *caballina* confunditur. Inter *Vergulam* crato *caballina*, quæ *Grecis* *Rigula*, & *Arthron* plantam est discernimus.

Facillime autem *Arthron* est admodum tenuem partem, ut *Gal.* ait, & ob id emacuat, exurgens tamen modice. Decoquatur in vino (inquit *Pinus* lib. xxviii. cap. v.) sed et ad dentium dolorem, ut videri cõtinetur decoctum libitur & propter *Rhizoma* & sanguinem è vino. *Ambrosia* & per modum imponitur : fontatur eadem cum radice *firmate* in vino.

De *Verbena*.

CAP. XXXIII.

**V**ERBENACÆ dicitur sunt, & *Pinus* quidem *Mai* & *Femina* : hæc, ut alio placet, *Ros* & *Sopha*.

*Ros* *Verbena* à radice viscosissima caulibus angulosis, dederunt, modo cubitali. *Ros* nomen alio subinde ramoso : folia oblonga, minora quidem *Quercus*, sed densioribus massibus, & alioribus *Ros* *secundum* *Vergulam* *caballina*, *Ros* *secundum* *Arthron* dicitur, modo cubitali oblonga terna atque adnata.

*Sopha* *Verbena* similia superioribus præcaulis cubitalibus angulosis, sed complures quadratius, hanc plantam parte decumbentem : folia quoque veluti *pinus*, sed profundioribus & frequentioribus in parte densioribus *Ros* *secundum* *Arthron* in firmis alio ex caulis etiam perpartes, & perpartes veluti *pinus*, eodemque modo ac *Arthron* dicitur, modo cubitali oblonga, quæ ut superius.

*Loca* *incultas*, sed tamen *decumbens* ac *humidioribus* utraque ex : & prior quidem in *traque* *Germania*, *Gallia*, alioque utraque, *firmis*, & *firmis* frequenter reperitur.

*Arthron* & *Pinus*, ac reliquis *Germania* *herbariis* : & quidem *Hispania* *incultas* ferunt, apud quos *spontè* *pinus*.

*Ros* *secundum* *Arthron* *Verbena* *ferunt*.

*Nomen* *Verba* *Verbena*, quod *sepia* pro *Verbena* apud *Vetere* *accepte* *ferunt* *videtur* & *Verbena* *dicitur*.

*Sunt* *autem* *Verbena*, *herba* *ex* *aria* *aut* *incultas* *locis* *sim* *pinus*, quæ quæ à *Confilio* *aut* *Pinus*



Verbena rubra.



Verbena spina.



ture foebastae, Sagittae quoque dicta sunt, quae ex saepe Graminis herbas, quae doque folio ex Lino consist. Telesar & Plantulae, cuius caput, Verbenarum & Sagittarum nomine idem significat. Fieri haec, quod in Andis apud Terentium legitur. Ex ara Verbenas huc fere. Quo loco Terentius non Verbenarum in se locat accipendum, sed aliquam eam foenicidam. Nam apud Merandem, ex quo haec trullata, *scopula*, id est, Myrica legitur, ut Docentur ut.

Prorè à Grecia *νεγοσπιδε*, quae *νεγοσπιδε* dicitur appellatur. Dicitur eodem modo, ut utraque vocem haberent, *νεγοσπιδε*, & Herba *νεγοσπιδε* vocem & *νεγοσπιδε*, ut *νεγοσπιδε*, ut apud Apuleium Crisostomum, Galienum, Ferrarum, Eusebium, Martium, Hieronymum, Officinas Verbenae: Germanis *Eisentraut*, *Eisentraut*, *Eisentraut*: Hispanis *Verbenas*, *Verbenas*: Italia *Fermentale*, *Verbenas*, & *Verbenas*. Gallis *Fermentale*: Belgis *Verbenas*: Dictione: Sola *Verbenas*.

Plinius hanc mare insulam verò feminam nominat. Genus eius duo, ut lib. xiv. cap. xlii. sicut. Folio, quam feminam vocat: masculinis folio. Sunt autem Rebae parvae, Sapias verò plura omnino folia.

Aliam Dioscorides *νεγοσπιδε* appellat, ut à prioris sanguine videtur. Idem & Apuleius fecit, de quoque fortiter scribitur. Plinius verò quoddam non à strigone aut hinc ut cap. xlii. sed vnum omnino genus facere quatenus utraque eodem effectus habeat. Atque in hac insula Galienum quoque, nam & Pualam *νεγοσπιδε* esse, sicut apparet: In Libanide de suo medio facit. folia *νεγοσπιδε* Galienus meminit nec aliter quoque Pualam lib. vii. Scribitur *νεγοσπιδε* *νεγοσπιδε* interpretatur, sed fortasse eorum masculinam, qui pro Verbenas *νεγοσπιδε* & *νεγοσπιδε*. Appellatur deinde & haec Verbenas altera à Grecia *νεγοσπιδε* dicitur, id est, Verbenas spina: ut Columba spina, & apud Apuleium Linnæus, Lastrago, Miltaria, Veropodium, Cistis galitaca, & Demerria, ac haec quidem appellaturibus, quae ad Dioscoridum referuntur, *νεγοσπιδε*, *νεγοσπιδε*, *νεγοσπιδε*, &c.

De quibus videretur ex eo, Dioscorides *νεγοσπιδε* appellatur, quod columbae liber ter eorum verentur: utque eadem de causa Latine Galitaca: Apuleius eam eam secundam de columbae liber ter.



Verberna autem vtraque valde doliofantem facultatem habet, ad eam & ad hunc usum ac refrigerandi medicos vs. Ad eumque dolorem ex Verberna caustorum flosus. At, hepatis esse conditum verò ad hunc usum tota, et sicro toto, & ampelisa, vel in oleo dioscolij, à hoc caput fuscatur, quando videlicet causa febris ex calore est. de fluxibus capitis hoc quoque moderate, patre ferena vitra colubis vitruu glutinat vniuersa venarum cum melle capungit, & ad fustatem perit. sifala etiam vniuersa. Oedemata inueterata, & occulta in inflammationes stiposita mitigat.

Radicem, cum & foliorum decoctum dentium dolores sedat, mobilis firmat, & omni viciis medetur. Anax, inquit Plinius, si in triduo aqua spargatur, in qua modeste, leuiter coctum sit fustum, quod & à Dios. refertur.

Recentiorum plerique, succum aut decoctum huius specie laborantibus exhibent. Falluntur autem huiusmodi quòd à patre mendacij veni aliquod expectant: sed à quòd pro filiarum medio, nihil ad fustatem confirmata, calculeant. fortis enim à oedemate tanquam accensum aliquod trahunt.

De *Verberna vicia.*

*Vicia vicia prostr.*



Cap. XXXV.

*Vicia vicia erecta.*



**V**RENTIVM Viciae in duas rationes fuit, scilicet verò huiusmodi ac minor.

Prima caules subinde cubitales, rotundi, ceteris inuicem foliis hinc, acuminatis, am- 1. bra firme modo inuicta, vtraque verò aspera, mordaci lanugine obfusa, que leuissimum tactu pruritus ingentem excitat, comp. ac velum tuberculis exasperata, ac subinde subdilat. fermen obfutorum hinc in phylloisocis, massibus quàm Octo, radice glabram, splendens, vtilis fomentis Lary, sed tamen inuicem ac rorodias, radix fibrosa.

Altera Vicia folijs caulisque puerem refert, sed tamen subinde procerior ac tenuior, la- 2. ruginem quoque non minus mordacem veniens habet. fermen hinc inuicta, & laud in rotundo pilis, sed in oblongis tenuibus, velum sacem ois vus ggerunt, hinc inuicta fermen modo, que secundum caules atque supra folia plantam excant. radix admodum fibrosa, cetero hinc inuicta, laud ferpe.

Terna cauliculi, folijs ferpe, racemum coherente ferenda similibus est, sed minor & 3.

Verbenaca autem utraque valde deficcationem facilitarem habent ad eam & auferenda ac refrigerandi virtutibus. Ad caput dolores ex Verbenaca coronam flosce Arctogonis eib condacis verò ad hinc cum folaceo & aceto trita, & impofita, vel in ulco decocta, fi hoc caput foveatur, quando videlicet caufa mala in calore eft. deficcantes capillos hoc quoque modo etiam paterformia vicia colibet valacra glutinat: vnaque vetera cum melle expungat, & ad fanationem perdure: fibulas enim curat. Oedemata inueterata, & recenta inflammationes: in pedibus purgat.

Radix cum de foliofum decoctum dentium dolorem fedat: mobiles firmat: & omni viceribus moderat. *Auris*, utque *Pirra*, fi in trichato aqua fpergatur, in qua maderit, in-  
naris conuulfa furans: quod & à *Dios*. refertur.

Recentiorum plerumque, succum aut decoctum hauri poffe laborum vices libent. Falluntur autem in hoc modo quòd à patre mendacij veri aliquid expeditur: fed & quòd pro fibulam remedio, nihil ad fanationem conferens, exhibent. Sentit enim à cocodatione magis quem vicerum aliquid resalacra.

De *Verbenaca*.

*Vicia vicia pilos.*



CAP. XXXV.

*Vicia vicia alca.*



**V**RETTIVM Viciaurum dicitur: totius fuit: totis verò humilior ac minor.

Prime caules de bende cubitales, rotundi, inermes inanes: folia lata, acuminata, am-  
bita ferre modo acris, vnaque verò aspera, mordaci lanugine obfusa, que leas cantum nullu  
prurim argentum exornat, cuiusque veluti tubercula extiterat, ac fubinde rubefacit. fe-  
men è foliofum illud in pilulis rotundis, in acris bunc quàm *Oleum*, nacti in argilorum, splendens,  
nulla ferit in *Luz*, fed tamen minus ac rotunditas. radix fibrosa.

Altera *Vicia* folijs caulibus proceris refert, fed tamen fibulide procerior ac ramofior in-  
nigram quoque non minus modicam viciardine habet. fermen hucus exiguum, & hinc  
in rotundis pilulis, fed in oblongis tenuibus, veluti racemofa vnaqueque, *Mercantia* fo-  
mura modo, que fecundum caules alioque fupra folia plerumque exornat. radix alio modo &  
brevis, colore tubilata, late fperit.

Tertia caulicula, folijs ferminque racematim colubifis fcoride fimilis est, fed minor & p.

Insuperant tam odor, & virtus, magis vitis & modis, an raris hinc, fibrosa munda dicitur.



Fitque Vitis locis m. s. & p. in d. s. i. s. l. i. s. & non tam apud si. l. l. i. i. p. a. n. t. a. m.  
 Altera quoque est, que viti dicitur, da-  
 mo, veterisque pariter neglecta m. s. i. s. t. a. r.  
 Nec ab hanc modo locis Terra abborret,  
 que raris & ad horros, & iuribus am de-  
 h. e. u. s. t.

Vigens omnia ad huc, mores h. y. e. m. e. r. a. l. i. e.  
 Senem ius & Angulo m. a. t. a. m. l. e. p. p. o. t. e. l.  
 A. e. p. i. d. e. p. t. e. G. a. l. i. e. n. o. m. i. n. a. t. u. m. L. a. t. i. n. a. V. i. t. i. s.  
 ab v. i. n. a. m. e. a. m. a. c. m. o. d. i. c. a. n. t. p. o. t. e. n. t. a. m. v. i. t. i. s.  
 v. t. M. a. c. e. r. a. t. o.

— v. t. m. a. c. e. r. a. t. o. n. o. m. i. n. s. i. m. p. l. i. s. i. s. v. i. t. i. s.  
 T. a. l. l. a. q. u. a. d. m. a. r. t. e. d. i. g. n. e. V. i. t. i. s. t. e. r. e. n. o.  
 A. n. o. m. i. n. i. v. i. t. i. s. & m. s. i. s. q. u. o. d. l. a. n. o. m. i. n. a. t. u. m.  
 p. u. n. g. a. t. G. e. r. m. a. n. o. V. i. t. i. s. I. n. d. i. e. o. v. v. e.  
 H. i. p. p. a. r. i. s. H. e. r. v. e. G. a. l. l. i. s. o. v. v. e. A. n. g. l. i. s. p. u. n. t.  
 B. o. m. b. a. s. d. e. p. i. n. a.

Prout Belgæ vocantque vitis i. Romanum Vitis, & similitur Germani Vitis. Vitis ad est, Italicam Vitis vocant, quod raris sit, neque vitis, ocerat, & vitiis sicut de m. s. i. s. s. i. b. u. d. e. s. p. e. c. t. a. t. u. s. i. n. h. o. r. r. o. e. r. i. t.  
 Dicitur & s. a. n. t. a. l. l. a. V. i. t. i. s. t. e. r. e. n. o. Dicit, vero Silius, quam v. i. n. i. p. e. n. a. m., i. n. v. i. t. i. s. r. i. g. u. m. b. a. s. i. q. u. e. s. o. l. a. s. s. i. t. u. s. & s. i. m. i. l. i. t. u. r. L. a. n. s. s. i. l. i. u. s. m. e. n. s. u. r. e. P. l. i. n. i. u. s. s. i. l. i. u. s. v. i. t. i. s. s. i. m. i. l. i. t. u. r. f. a. c. t. u. s. & m. o. d. o. m. o. d. o. s. i. b. e. r. s. t. l. i. b. x. x. i. c. a. p. x. v.

Secunda vulgè fit raris nominatur & quæ ad d. i. s. t. i. n. c. t. i. o. n. e. m. T. e. r. r. e. M. a. c. e. r. a. t. i. e.

3. Tertium Germani Vitis vocant: Dicitur quæ in raris vitisque i. modis a. n. o. m. i. n. a. t. i. o. n. e. s. p. e. c. i. a. l. l. e. a. p. p. e. l. l. a. t. i. e. Sane autem hoc quam Plinius Caneam nominat, vel potius prior, f. u. d. o. s. i. o. b. s. e. r. v. a. t. Eft in fylvestris, neque que Cane, aceris, cuilibet quoque m. o. d. i. c. a. t. u. s. f. i. n. i. b. u. s. i. n. f. o. l. i. s.

Temperamento autem Vitis fere eadem, calor vero exiguus, & vitæ primo calidæ, tum tenuis in partem finalem obtinet. Neque enim ex se vitæ aut mordacit, quod asperum calidæ sit, sed haugens est haugens nigra, ac durissima, aculeorum multarum præsertimque vitiis nam haugens facta ac decocta Vitis, haugensque vitæ, haugens neque tenuis rigore.

In oleo sumpis, aut cum cochleari, ut Dioscorid. tradit, decocta, ad v. i. n. i. s. d. e. c. o. c. t. i. o. n. e. m., & quidem oblatione facit: promouet vero & v. i. n. a. s. a. c. c. a. l. c. u. l. o. s. é. v. i. t. i. s. c. u. p. e. l. l. a. t. u. m. p. e. l. l. a. t. u. m. v. e. r. o. d. e. c. o. c. t. i. a. que in thorsae haurit, sed cre posse sustinuit. Scagarine m. s. i. s. t. a. t. a. p. o. s. i. t. i. a. t. o. n. e., & cum sacro m. s. i. s. t. a. t. a. t. o. n. e. s. i. s. t. i. s. Saccus vitæ m. s. i. s. t. a. t. a. t. o. n. e. r. e. p. e. r. i. t.

Semen Vitis Venetæ extimulæ, præsertim cum passo potum: habet enim haugens quoddam, m. s. i. s. t. a. t. e. G. a. l. i. e. n. o. Q. u.æ. i. n. s. i. m. i. l. i. t. u. r. h. a. u. r. e. n. t. c. a. n. d. a. c. o. n. t. e. q. u.æ. t. e. c. o. c. t. a. t. a. d. o. c. t. i. a. s. a. d. o. r. t. h. a. p. p. e. n. s. t. a. c. p. l. e. n. t. i. s. d. e. a. v. i. t. a. n. t. p. e. r. p. e. r. a. t. i. o. n. e. m. i. n. E. c. l. e. g. i. a. n. t. v. i. t. e. h. a. l. e. b. o. r.

Caneæ idem consistens est, & similia argenteo v. i. n. o. N. i. c. a. n. d. e. p. a. r. t. e. s. t. a. t. e. r. a. t. e., & A. p. o. l. l. o. d. e. r. o. a. d. i. c. t. a. r. H. y. o. l. e. r. a. n. t. o., & s. i. m. i. l. i. t. u. r. i. n. a. s. c. f. e. o. p. e. r. a. t. u. m. P. l. i. n. i. u. s. s. i. l. i. u. s. A. d. v. i. t. i. s. a. n. t. a. n. t. p. u. n. g. e. n. t. i. a. b. V. i. t. i. s. e. x. i. m. u. l. i. s. n. o. m. i. n. a. t. u. s. e. s. t., a. d. e. m. a. u. t., o. l. i. c. s. e. m. e. d. i. c. a. t.

De Vitis ferre. CAP. XXXVI.

AD Vitis generi referuntur, que quatuordecim, m. s. i. s. t. a. t. i. s. d. i. c. i. t. u. r. Sane v. i. t. i. s. h. a. u. r. e. & a. l. i. q. u. a. t. i. p. e. r. i. e. s.

1. Flos castilleus asper quadrangularibus, pedera, raro cubitum alta, siliculae m. s. i. s. t. a. t. e. g. u. a. t. u. r. f. o. l. i. s. V. i. t. i. s., p. e. r. m. a. r. g. i. n. e. r. e. n. a. t. i. s., n. e. q. u. a. q. u. a. t. u. r. t. a. m. i. n. o. d. a. c. t. u. s. s. i. l. i. c. u. l. a. s. a. c. v. e. l. u. t. i. n. a. s. p. e. n. t. i. a. F. l. o. r. e. v. e. r. t. i. c. i. l. l. a. t. i. s. c. a. l. l. i. c. u. l. a. l. o. s. h. o. r. d. a. r. a. f. o. l. i. a. s. e. r. b. e. n. t. i. t., c. u.æ. h. o. r. e. m. c. a. l. l. i. c. i. t.

Vicia: sive Linnæi purpurea.

Vicia: sive alba.



Vicia: sive Linnæi lutea sive.



caulibus æthereis, colore sæpenumero candidi, quandoque lutei, subinde ex rubro purpureo: necnon radices fibræ multas coherent.

Proxima cauliculis & longius in præteritis fibræ, foliis quoque efficit, nisi paulo minoræ & rotundiorum forent: palide luteæ aut rubentes: foliola hinc: ipsa verò herbæ integræ ac præterea odorem spargit.

Terra foliis quoque quæ præterea minoribus: cauliculis innotent cu betula bus, & quadrangula, quarum coma & superiora foliola purpureo Viola nigra eleganti ardent colore, veluti Hormium factis: flores verò secundæ caulibus, aut colore lutei.

Juxta sæpe, pariter, vix, in radibus, fœcus agrorum margines, in ipsâ quoque arvis, non raro in horis parum excolis reperitur: & quædam diæ præterea frequentius: apud Quædam, Marcomannos, & in Pannonia superiora, terra notior est.

Tota æliæ magna ex parte flores.

Viciam mæstem & mæstem vulgè nominant: Germani *Reitweiss*: Galli *essif*: Belgæ *Essif*: Hispani *Essif*: Italiani *essif*: Galli *essif*: Plinius quæ innotuit est, ut, moria, cæci, Linnæum vocant.

Hæc alia species cum ea convenit, quæ Græci

Cinetis Partibus hystericis, Latius Vinea habeo nominata: est autem haec, ut Dioscorides, Dioscorides et Dioscorides, qui sic tollit an hystericis, Antiquis et vel pedita, seu ignis ab-  
 etis de vel hystericis, ut est, fructibus sine fructu hystericis capite de folio, hystericis Vinea  
 hystericis tamen folio de valde grandis est dicitur conficantur

Colubinae; Secus hystericis hystericis Vinea temperamentum Scitibula, dicitur, hystericis,  
 hystericis, pedita, et pedita Galicopis hystericis aceto conuina, et campulomato modo impo-  
 sita Fruentur verò de decedat hystericis, ut Dioscorides. Plantis verò, et hystericis, hystericis,  
 et decedat hystericis hystericis.

Recentiores hystericis Latius candidos hystericis malicis hystericis albidum hystericis hystericis  
 pedita hystericis hystericis in eum vium, et hystericis hystericis hystericis (vocatam) Conficantur,  
 quam singulis aliquos debet hystericis hystericis.

PERIPLASIS PRIMÆ ET LIBRI QUINTI

FINIS

REMBERTI DODONÆI <sup>1615</sup> *Aulicis damno et  
operis potuit*  
DE FLORIBVS, CORO  
NARIIS, ODORATIS, AC  
UMBELLIFERIS HERBIS,

STIRPIVM HISTORIÆ.  
Pemptas SECVnda

DE VIOLIS AC ROSIS, EOQVE  
PERTINENTIBVS FLORIBVS  
LIBER PRIMVS.

PREFATIO.



**A**BOLVTA priore vestri operis parte, Stirpibus, non parca elementorum vobis descripta ac descriptis, ad hoc nunc, qua in artus classis distributa sunt, transsum facimus. Florum autem, ac odoratum herbam classis, reliqua preparanda duximus. Non mediis quid odor aut trullitione horum vnius quodam voluptas ac recreatio concipitur, sed et quid compleretur ornatus ac decoro gratia carbo conciliatur. Nihil inter ea hic vestra corona, fasciculi ex floribus ac odorato herbis et effluo grati sunt odoris, secundo: Maxime vero ornatus huius exequam decorum, summorum gratiam hinc et hic accipiant. Neque

omnino ex vili quocumque artificum contextu, aut coloribus ornatis, separare vel perturbatione fieri, vobiscum, elisiva horumque operibus, tantum ornatus huius accidet, quantum ex floribus herbis, odoratis, ac coronatis, absque quibus amata etiam hortensia opera, ornata, gratia, et amantate distantur. Voluptas vni et animi recreatio, qua ex his concipitur, non vni benevolentia. Ad id enim quod pulchrum herbarum, huiusmodi commendationi: Suggereat siquidem floribus sua pulchritudine, coloris elegantia, forma præstantia, generose animi huiusmodi pulchritudine, et amantem vniuersum recordationem. Turpe namque fuerit, ut quidem siquid ait, pulchra contemplantem, pulchra trullantem, pulchritudine in loco versantem, non pulchrum aut turpem herbarum animam. Florum autem vniuersa inueniri possunt genera, si stirpibus ipsarum descriptis expendere. Verum hoc nobis cura non fuit: scire est vni ipsas in herbarum ac silicibus distinxisse, ac decore huius separasse ab eis quo ex vobis acciderent. Quibus vniuersis generibus completi studemus ut stirpes, qua floribus suis præcipua Medici confirmant, aut vni voluptatem adferunt: atque odoribus ab ipsis floribus primam commendationem accipiant. Quis vni propriis complexis, quantum de odoribus herbis subuocantem, Pulchritudine quibus succedentibus hinc: siquidem et formam harum præcipue adhibita sunt, agit odoribus ab odoratis separare posse videtur: ut suo loco latet.

Primum itaque huius Pemptas de Viola ac Rosa liber, digni est, qua ipse vel forma vel nomeni similitudine affinis sunt. Ad Viola autem contraxit vniuersa elegantia referre floribus: ut Lancia, Antirrhinum, et vniuersa alia. In Rosarum frequentem recipiunt Lancia, et Cilium, priusquam accedere Rosa feruans, vniuersa quidem ex Maluaceis hoc est genere, quod temperare sunt relinquenda. Inter igitur à Viola factis reliqua succedunt.

STIRPIUM HISTORIA  
DE NIGRA SIVE PURPUREA VIOLA.  
CAPUT PRIMUM.

Viola nigra sive purpurea.

Viola flore multiplex.



Viola (glabra) inodora.



**L**ORA sive purpurea Violam  
sua dicit folia proceris, multa, lan-  
guosa, per am brachia laeviter co-  
nata. Hæc quoque folia totum hinc in-  
mensa, agrorum, præsertim pa-  
re: superant, inter quæ vix di, & vici cæci-  
h, & in singulis floribus singulis, pulchri, odorati,  
coloris in varietate sub nigra purpurea, nonnu-  
quam, sed raro, cælesti, ex quoque parva filo-  
lis compositis, apertum infundum inveni, & de-  
de piliis calycibus, qui per maturitatem in tres  
partes delinquant. Semen parvum & in semel  
tunc oblongum est, racheibus tenuibus ac filo-  
sis firmatur.

Vires hinc pariter ac affine, in gressu par-  
tissima. Locis opacis, præsertim in montibus, ap-  
ertum horum in ore marginis, plaga in silo pla-  
na frequenter erant.

Floris ut plurimum Martio, vix foras, Apri-  
li prodeunt nascit.

Est hinc generis quedam, floribus foliis mul-  
tiplicans, coloris purpurea, tum candida, horum  
in vniuersis.

Est & genus quoddam sylvæstre, foliis mor-  
tibus, floribus pallidioribus, minus aut ad cele-  
ritate nascitur, & locis quodam opacis, ac for-  
vix & marginibus agrorum, vix ardo sicuti hinc  
Vilat

Violam autem *Coqui* sic, & sic supponit ad eam, Violam purpuream nuncupant. Therophrastus vero & sic addit *quædam*, hoc est, nigram Violam, à nigricante purpureæ florum colore. Plinius solum hanc *Græcorum* esse, à cætera Viola distinctam, appellatamq; sic, & ab his latinam vulgarem dicit referri. Officinae Latini præsertim Krauzij at Leubovii Violam nuncupant, & nuncupant Violam. Germani flores, hanc esse esse *Wirtgenwiese*: Galli similiter *Pastoris de Mar*, hoc est, Violam Martiani Italij *Pastorale*: Hispani *Pavita*: Belgæ *Wittem* dicunt Angli *Whim* Boloniæ *Stata*.

De autem Græci vocantur in *Geoponica Nicander* credit, ut refert *Hermolani*, quædam Nymphe quædam *Ionis*, florem cum solum patrem dedere munerem. Alij sic distuliffimant, quod cum se pacillam adamantem se patrem vaccam concessisset, terra florem hanc pubulo conspuerent, qui propter ipsam factum, ab ipso nomen accepit. Atque inde etiam *Latina* Viola, quasi *vitalis*, extrahitur, & sic putatur. Sicut et Violam *Lonicæ* etiam *Vaccinium*, eadem occasione dicit referri, locum matrem *Virgily* in *Ilacodis*:

*Atque Lyallia cadunt, Pæoniæ nigrae hyantur.*

*Virgily* tamen *Ætologi* in *Vaccinium* à Viola distincte ostendit.

*De nigra Viola sunt, & Pæonia nigra.*

Veneris etiam *Archæothere libro septimo*, Violam à Vaccinio distinguit. Nomen Viola *Sylæ Antici* colorem, et Vaccinio purpuream fieri eleganter memorat *prochorda*. *Tindores*, inquit, cum voluit *Sylæ Anticam* imitari, Violam aridam cum veniens in vas cum aqua confer- <sup>sis. etiam</sup> sione faciunt ad ignem deinde cum est temperatum, coniciunt in lacum, & inde manibus experimeatas, recipiunt in mortarium aquam ex Viola coloratam, & ea ex *Erethriam* infundunt, & cum recentia, & sicut *Sylæ Antici* colorem. Eadem etiam Vaccinium temperant, & sic unctioes purpuream faciunt elegantem. Quæ autem sint appellata *Vaccinium*, alij, & sic loco explicaverit.

Ad Violam res erant, quoniam & flores & folia temperem habet frigida & humidam. Et flores quidem omnibus in eam inflammationibus, lacum potissimum & pulmone, vultum sunt potissima, alijque in eam, nec non faciem asperitatis & scabietis leniunt: locum, etiam, & reflexe in eam colores refringunt aridum semel in aridum mitigant: habet etiam in eam obstruunt: sicut aridum sedant.

Quod ex Viola sit *Spertus*, sicut *ve Actuaris* nominat *quædam*, si ex diluto decoquantur quo plures recentes ipse fuerit mactent, alijque lenit, & bilem per infirma educit, matrem aut quoniam recentia pondus *insiprum*.

Fir & ex Viola oleum, quod refrigerandi humectandiq; potentia pollet: temporibus illisam ferantur etiam in eam coactur, quæ calida aut sicra in temperem demittatur: cum autem lacte feda & humectanda eam dolores trahit: alijque quoque volatiliis *cataplasmata* res frigidantibus, ac dolorem expirantibus.

Sic etiam oleum, in quo Viola macerantur, aut ex immaturis *Olivis*, *Græci* *αποργιστε* & *quædam* no nuncupant: aut ex *Amigdalis dulcibus*, *ve* *Melissæ* aut *Sine* & Viola ipse recentis humectandiq; oportet. Arida etiam cum depedita humiditate, & mactent refrigerant, & caliditate non habet ad eam referantur.

Recentiores aridam Violam, medicamentis que cor roborare creduntur, velox admixtionem ferunt.

Folia Violam in oleo semper, refrigerant, humectant, alijque leniunt: ferunt ad motum, calidas omnes inflammationes in eam, cum per se, cum cum potentia imposita. Imponitur & vitium stomacho, & oculis, *Coleo* no velle. *Dioscorides* feda etiam ex idem imponi scribit.

Prodest autem excelsis fedi possunt, non ut adstringentia quod sedem reprimant, sed velum molliant: malis eam, quæta sapienter præsertim mactenda, quæta reduca ea, præsertim inflammatione, quæta.

Plurimam Violam quoque ut, *crispulam* & *græcoline* capitis, impositis cordis elictio distillant, arguunt aqua potissimum quod purpureum est ea in, comitibus modis, matrem præsertim aqua potissimum tena corporibus ad eam.

In quibus vultus, quod de purpureo floribus addit, accesserim esse, & ex *Hibaria* *Africis* <sup>plurimam</sup> *Americis* transactis, insipiant, & non tenent, videtur. *Dioscorides* etiam flores purpureos non <sup>distillat</sup> Viola, sed *Africis* *Americis*, et aqua potissimum arguit, & comitibus in morbo pariter addunt, scribit.

De insipiente Viola. CAP. II.

**F**OLIA insipiente Viola exigua sunt, ac immo quædam rotunda sicut, deinde oblongata, per ambam modicè serrata: cæulis infirma, omnes, arguunt, generaliter, potissimum longioribus: *Basis* longioribus pediculis insipientibus, purpureæ Viola forma similes, & in aqua distillat <sup>plurimam</sup>



Viola tricolor.



Viola affargensis-culata.



plurimam partem, simpliciter colorem splendentes, purpureo vultu dicitur, Jureo, candido quoque valentissimo, quorum elegantia ac varietate colorum, maxime placeant, cum odorem exiguum ut nullum habeant: In summis duabus flosculis foliolis, & subinde in inferiori, & quandoque etiam in medio inter extrema parte, paucissimi sunt: Viola nigra: Media ve phoenicea, & nonnunquam inferius candida ut in carnalibus videtur: Luteus non raro in summo foliolis ad magnam eius partem, semper autem flosculis mediis, interosculis tantum vultu nigro alioque rubro, occupat: Semen exiguum, in rotunditate oblongum, vultu, Oculis magnitudine distinctior, que deinde deorsum succedunt floribus, & vultu semine iam maxime distinctum. Habebatur autem florosa.

In una pluribus locis dicitur nascitur & in horti, & crebris quidem sua sponte, & hinc spectosior & elegantior.

Vere vultu pura Viola nigra aut paulo post emicat, affare deinde tota & maxime Autumni parte, ac subinde etiam hyeme, floret.

Hac autem referenda videtur illa Viola species, que hanc horti facit, sed dicitur scilicet in carnalibus originem, & recta consistit, quos subinde proceri cubitales: folia in hanc flosculis, ac minime, per marginem summa flosculi: Vultu paulo minores, alioqui similes, ut plurimum tamen colorum in summa parte tamen candido, medium floribus occupante, superius omnia floribus purpureis, inferius ad laterem accedent: flosculis succedunt filique oblongi, in tres partes sponte bifurcantes: semine in summo, quod candidum & minimum, florosa vultu vi Viola.

In Baldo Italice monte reperitur hanc Violam Matthioli refert. Lobelius in Nabeensis Gallie & Anglie montium iuga. Nascitur vultu & in Sudania Bohemice montibus, in situ, non & in aliis Pannonie sive Austrie locis.

Hoc non modo Vere, sed tota affare in Autumnum usque.

Viola affargensis aut furcata, & quidem aristata, non in propriis appellat potest, sed certe quam aristatissima, utpote ne fructus alitudinem aut similitudinem affatura.

Nomen autem in coloribus Viola à pluribus locis: est tamen & alia loca que nigroque nominatur. Alia herba Trinitatis, propter triplicem florum colorem, dicitur. Nonnulla etiam Classiana. Galli flores Pascher nomen partem, que etiam appellatur: Barbarus ac vultu Belgis

Belgia innotescit. Germani *Strophium* hanc, vbi *Strophilidactylum* appellatur. Cum *Strophium* Therophrasim conseruare videtur, quod *Strophium* etiam dicitur, & hoc est tantum in fylacibus abliq. odore. Vnde vni cum *Viola alba* sunt paulo post exorta, plerumqueque distans in utraque hac tricolore *Viola* est, quae, vt scriptum est, natura sua fylacibus est, quae in odore, & distans floret. *Strophium* autem hinc *Strophium*, *Gaza* *Viola* autem *Strophium* interpretatur.

Qualitatem herbis habet, quodam quidem o. *Strophium*, sed haec etiam manifestiorum, tenu. *Strophium*que facta, vt *Melancholice*, participat et mollescit ea de causa quaeque facultatis, vt nunc innotescit illa. Prodest, vt conseruata in aqua, febribus acerbis maxime peruersis & infantibus, quorum conuulsiones ac convulsiones accedentes febribus modice, & conuulsiones autem ad pulsatorem peioribus inflammationibus, & ad *Strophium* *Strophium*que peruenit, vltima quoque *Strophium* fortis.

De *Leucoto*, seu *Viola alba*.

*Leucoto* quae *Viola alba* dicitur.

Cap. III.

De *Viola tricolori* seu *Strophium*.



**L** EUCOTI vocatur *Violarum* generis comprehendentur, quarum in floribus quidem colore praecipua, sed nomen & nomina in foliis differunt. Possunt haec in duas genera distingui. Vnum genus est *Viola candida* & *Viola mollis*, *Viola candida* *Leucoto*, à solo nomen, non floribus colore, qui nuncupantur. Alterum verò *Leucoto* haurit, à floribus colore. Sunt autem *Viola candida* *Leucoto* generis nomen dicitur *Viola candida* & *Viola mollis*.

*Viola candida* bipedalis aut tripedalis, in alia nonnullis dicitur: folia oblonga, candida, mollia, & veluti lanuginosa habentur. Salsum in his quod dicitur *Viola candida*, vt nunc *Viola mollis*. *Viola candida*, ex quatuor foliis ita congehit, secundum *Viola candida*, superiore parte in tetraedris pediculis erant, colore aut rubentes, aut candidi, aut ex purpureo purpurei, aut candidi *Viola candida* proci, *Viola candida* vbi, si quae inde sequantur, oblonga, arguta, in quibus *Viola candida* lanuginosa, & nonnulla. radicebus nunc *Viola candida*, sed *Viola candida*.

Floret primo Vere & non prospero iam aetate, altero à fine anno, deinde & aliquot saepe rebat, si dicitur *Viola candida* & cura adhibita, hinc nunc *Viola candida* à frigore arduum.

*Viola candida* generis non forma, sed magnitudine sola differunt in foliisque habet similia, sed nomen in floribus etiam non vni colore, sed vel candidis vel rubentibus, vel purpureis, vt nunc *Viola candida* & *Viola candida*.

Floret istud genus, non quidem Vere, sed Iunio, Iulio, aut Augustis, & eodem quidem quo *Viola candida* aetate: hinc *Viola candida*.



Leucojum autumnale.

Figura



Figura

Leucojum autumnale, sicuti se habet.

est (est vesp. 34) Laticorion, flore in foliis multi-  
plicans, sed raris in re, quod in maxima parte  
est quibusque Vesp. flore vesp. per, et in re tu-  
rari lyberis stentibus, et a tempore offenda-  
tur, sequitur.

Est autem vesp. 34 in re generis Leucojum, et  
in re generis herbiq. tota hinc de qua parte curata,  
medicis, et in re generis, sed in re generis, aliam  
Leucojum foliorum hinc in re generis & coloris accedit.  
Nec de re generis sicut in re generis, sed in re generis  
in Zelanda maritima sicut in re generis, verum  
in Marbonensi-Gallia, et pluribus per Hispania  
loca, cum in re generis, et in re generis generis  
generis folia habere in re generis, et in re generis  
candida. Sic in re generis sicut in re generis, et in re generis  
frequentis purpurea, quandoque rubra, odori-  
rum, generis odor apud Hispanos sicut in re generis  
candide sicut in re generis, ac in re generis, quod  
alio per die generis, sicut in re generis sicut in re generis.

Item & Leucojum quoddam bulbosum fuit, de  
quibus apud sequente libro.

Scribitur in re generis Leucojum, et in re generis  
cum in re generis sicut in re generis, et in re generis.

Appellatur autem Arabice, Leucojum quidem  
Viola alba, Arabice vero Kerym, Italia Fiala  
hinc Hispania Palerra, Hispania Nostra in  
re generis, sicut in re generis, cum in re generis,  
sicut in re generis. Vnde in re generis hinc in re generis, et in re generis  
dicimus, candida, et in re generis, et in re generis, quod  
praeferre illis non est, non in re generis, et in re generis.

In Lyciaco generis, quod hab. nobis odori-  
tatis est, Helpeus esse crepitare, que, Plinius  
dicit, nobis odoratum hab. cap. vii. Hesperia,  
et, nobis in re generis, et in re generis.

Facile autem Leucojum hinc, hinc Leuco-  
jum hinc diffinita videtur, vnde cum in re generis.

*De Leucojum aestivum. CAP. VIII.*

**L** V T R O Leucojum caulis simpliciter, rari-  
ter: folia oblonga, angusta, glabra, in re generis  
nigricantia, Leucojum candida sicut in re generis: lo-  
ca hinc, perquam odorata, sicut in re generis ob-  
longa, in quibus sicut in re generis. Totas sicut in re generis  
gnosis hinc in re generis sicut in re generis.

Floret April. & Maio, et si hyems demens  
fuerit, etiam Martio vel primo.

In pernis hinc in re generis, et in re generis  
sicut in re generis hinc in re generis, et in re generis  
sicut in re generis ac in re generis.

Hinc Leucojum quoddam quoque est generis  
flore multiplex, cuius filique nulla. Scribitur  
sicut in re generis, et in re generis.

Arabice & aliud Graecis nominant, et aliud  
Arabice, Latini Viola alba & Leucojum hinc  
Arabice Kerym est Hispania Palerra, Arabice  
nominis, sicut in re generis. Pernis autem sicut in re generis  
hinc in re generis sicut in re generis, et in re generis  
est Gallia sicut in re generis, et in re generis. Anglia sicut in re generis  
est sicut in re generis, et in re generis.

Est autem Leucojum hinc in re generis, et in re generis.

Viola matronalis.



Viola lactiflora.



ant ac, extirpatis facultati, ac tenuitate partium, plurimum flores: & inter hos, qui sint decem, anagnoniam quatuor vides.

Viola ordet lutes Leucosam præcipue in medicina videri scribit, & hanc ad eos flores in delectibus decoctos, ad vena infra minores & mentibus daemna facere: vena exceptis totis ita in lacte, & cum melle omni splaris: fenna fannam drachmasvni pondere ea vna potum, aut cum melle subdram, mentes, & ceteras, & firmis edacere: radices cum aceto impolitas, hennam repugnare, & podogyris prodest.

Hippocrates lib. De natura maliciorum ad facundiam educendas, & languorem ex vena pellendum, Leucosam fennam totam cum vna bibendum exhibere: & ad eandem hinc Leucosam radicem, eodem quoque modo faciendam crede.

De Viola matronali. CAP. V.

**M**ATRONALIS Viola sola habet mox à radice longa, lata, fibrosa, per ambum creatur caules cubitales aut aliquos, folia similibus, sed tamen minoribus circundatis, flores in terminis aliam vna cum potum, Leucosam similes, colorem aut candidi aut rubenti, oblateis purpure: fannam in filis oblongis & rotundis figuræ parant, figuræ oblongam, colore in ruffo fibrogi: radices subferrugineas & valde.

Nascitur in horti.

Altera à quo facta est anno, Maio & Junio mensibus per striam florere, non tunc tunc affluere flores producit.

Galli *Pavones de dantes*, & *Civillibus de dantes* appellant, hoc est, Violas matronales, postquam corrupta voce, *Matrona* dicitur: *Gerrans* *Hynt* ut videtur est, Violas hibernas sine hibernis.

Sunt autem hanc Violarum herbe quæ de se sola, galle acris & calida, fura, cum specie voluere sapore & facultate potum.

Aqua ex floribus hanc debilitata, ad fidorem provocandam valde efficax habetur.

De Viola lactiflora. CAP. VI.

**F**OLIATA, Viola lactiflora protra, virentis, lata, per ambum creatur, Alham vocatur herbe femia, sed majori est: hanc rotundam carnosissimam Leucosam, colore purpureo, subcarnosa, quæ si frequenter lacte, plura & prope modum rotundis illis quæ, ex tenuissimis membranis, velut lamina, compacta intra quæ sita sunt plura, lata, oblonga colore, forma quodammodo *Hygonis* Lina, inter quæ media tota membrana, radices subdram crasse, candidæ, in dactylis ceteris, Pitone fennam alteras, radices quodammodo similes, sed minores & tenuiores, vna potum.

Belge hinc Viola vna cum illis in horti hinc.

Flores April prodeunt mensis, altera a quo facta est anno.

Bulbone aut Bulbonæ vocè barbari vulgè.

non Violam latifoliam, aut, ut plerisque placet, Violam peregrinam nuncupare malimus, Barbari præmaritima, a filiquarum forma, denuquam quod ammodum ferit, & Pæthitana, quod circa Pæthitæ solentatem tunc sergetur, ut, nominatur. Roccæ autem plerumque Lunaria, sive Lunarium Germani appellant: vel ab ipsius formæ figura, aut filiquarum modice incombente argenteo splendore, quod, decidensibus per hanc statim faciem cum ferit, ea utraque parte incombent, patet.

Thalys  
Graeca

Venerum autem Thalys alteram videtur, quod videlicet à Conque describitur, à nonnullis Senaps Pœnicum appellatur. Nam, ut Dioscorides ait, Cœcyus Thalys quoddam recentibus præcipue quæ præcipue est, Latibolum à magno radicibus quatuor unius Viola hæc est, quam Latibolum cognoverunt.

2. Hæc, late folia, & aliquoties ac rotunda: fides est & cetera quodam Latifolia Viola, potius hæc videtur, tunc hinc non sine fontibus lignosis, quæ tales folia mala, late foliaque plantæ & late, utraque parti è materia quædam præcipua: flores ciliati utriusque Violæ meminit.

In sylvis nonnulla præterit: veluti Hercynia, quæ parte Germaniæ spectat: transiit & ad hortos, in quibusdam tunc vitæ.

Cœcyum facilius ac potius, Latifolia Violæ semen eisdem quodam, & fœtus est, gubæque acris, Thalysos tamen sapore & virtute simile: radices amariore quoque costulle, sed non multæ præcipue radice radice acris, et quædam aliam.

De Viola dentata. CAP. VII.

Viola dentata præca.



Viola dentata alba.



**I**N Violarum numerum recipienda & admittenda quoque videtur vulgò Dentatæ pellæqueque due sunt.

1. Præca ciliolata dicitur: folia Cannabæ aut Persicæ, modo quoque ad eam heremæ pedicellam, oblonga, lata, ac hinc serrata: Læscos in fœtus fleculi, & pericostis subargenteis, quæ quoque talia, in qua bras semina: radices oblongæ, inæqualis, multæ costulle præcipue sequuntur.

2. Altera Dentatæ folia hæc quoque præca Persicæ, sed veluti Fraxinæ digitata, in pedicellam habet in modum, cuius acris hinc fœtus: radices oblongæ, late folia, & cetera: cetera in margines incisa, ciliata ad vixam costam: fœtus: flores caribæ, & quæ sequuntur præca.



oculis, in Italia, de quibusdam albanis, de quo Strabo dicit, non habet id est, Rapum sphaerice, nobilem in usus, hanc abstrudant cubitali, summa parte laevi tota habenti laniis, digne lan-  
nido, aut maximo fructum in lobis calycalibus, quo uti inoelacti cum operantur, abscop-  
pali modo lobos habent, in quibus ferantur, contra vero utrasque dila-

In quo deceptio, que de lincote summatum calnam se totorum, & ferantur nede-  
dant, ac autem et uti modillacoendia nediatur, ad sphaerice Raps, hanc pra ferent, de-  
pionem non faciant, sed alio potuerit. Hanc in quibus sphaerice Raps castra aut totum non  
hanc laeva, sed abscopantur hanc tota ferant etiam non agrum, verum sphaerice, & cal-  
nam, et dicitur, colore affine.

Videatur autem, que de lincote ferantur de summatum partem, Rapum eio con-  
tem, aut Campanula, de qua in d. operantur scaptibus. feren vero, quod hanc describitur, hanc  
Raps est. In plurimum streptum de lincote non sicut si cuncta d.

Ceterum quod ad ferantur autem, radix Viola Marane refrigantia ac normalia ad-  
frangit: sphaerice: est, ut ab eorum sphaerice Rapum, quia est, & non in modum ad-  
actam addit.

## De alio sphaerice Raps.

## CAP. IX.

Cervicaria sphaer.



Cervicaria minor



- S**V sicut vero de caulis alia Raps sphaerice generis, Calchone de florum figura, & rubet  
Viola Maranque hanc multam dicitur.
- Vnde quod à Viola Marane alterum, caulesque cubitali aut abscopis, argenti, asperi  
sphaerice aliquid aut hanc aspera, hanc ap acutum dicitur, per ambo hanc cuncta, Vnde sicut  
de forma & colore quodammodo similes. Hanc sicut ad caules ascerit, Viola Maran  
floribus minoribus, per ambo hanc quaque similes in hanc, sed profertur hanc, dicit, hanc  
aliquid aut hanc hanc, colore aut candido, aut dilato purpureo, vel ad caulesque inclinat.

Hanc vero species quodam est solus ab quibus hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc  
hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc  
hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc  
hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc

Cervicaria  
minor.

Nomen aut hoc genus Germani dicitur Nostri hanc ad est Latinum Cervicaria, &  
Cervicaria minor. Greci sphaerice plerumque Violanam sphaerice Campanulam.

Rapunculum.

Rapunculum Alapronicum.



Tertium genus caules habet breviores: folia minus, candidiora, minus aspera, oblonga, & saltem folia sinuata flores Ceratium minus, colore proximo Viole nigra, distatam purpuram referentia, quia non ut aliorum deorsum mutant, sed sursum eriguntur, plures sinuati sunt, & caule cunctis radices quoque firmas. Hæc genus plerumque Ceratium minus appellatur.

Nascuntur hæc in Germania ac Belgio plerisque aridioribus locis sicut præterea margines, & crebris locis fruticosa, transferuntur in hortos, florati gratia.

Floret in sub-Julio & Augusto mensibus.

Hiæc cum similibus quædam genus est, caules sicut quoque breviores facti: folia lata & Ceratium prolixo proxima, minus tamen aspera, in caulisque per ambitum crenata. Flores densam prædent, colore ut plurimum dilute & quasi ex caruleo rubentes purpureo pro radicebus, molle, curvas, multifidum & oblique serpentes fibre sunt, à quibus molle oblonge, candidæ radicele, Rapunculi radicebus firmas demittunt. Ita facili suscipiunt propagari & latè sæpe hoc genus.

Sicut araucum in agris in Zelandia & alijs locis etiam non maritimis reperitur.

Floret eodem quo reliqua tempore.

Quintum genus, quod vulgò Rapunculum rotundum, caules præfert teretes: folia oblonga, usque sinuata flores Ceratium minus, caruleo ut plurimum colore: radices candidas, deorsum longiusculas, etiam apertæ.

Est in arvis, multis locis iniquæ.

Plantæ aspera parte florat. hybernis mensibus radices leguntur, & cum acetosis inferuntur.

Hæc genus vulgè dicitur Rapunculum, quasi partem Rapum appellat: Germani Rapunculum: Nollin Rapum Galli Rapum.

Hæc cum similibus flores præcipuum adaperiuntur, quinqueangularis sunt, completi verd rotundi, & inserti caliculi figuræ referunt, flum inibus vitis candida, & per circumfessionem quoque aciculis, residensque circumscissis: angulos acutus habent: capsula apertæ, in quibus firmis, angulata, saporose parte amplicæ, sed munda, & nullis appendicibus ut loculis sine pericardio circumscissis, ut sunt Viole Mariane, quæ tunc ob causam, tempore quodlibet capitata.



capitula, sive lobos habent circumtullos, cum sylvaticis Rapa descriptione exatius, quam vltim horum conueniat, quae tamen & omnia Rapa sylvatica sunt.


6. Praeter haec vasa & lora cum quoddam generis est à sepe notata forma aliquantulum differentibus, cuiusmodi solum praesens haec, postea secundum caules angustiores, cuncta diducendo, si infra parte veluti speciem paruosum florum plenam profuerunt, quorum singuli antequam panduntur, ceteris cum istam similitudinem referant, aperti vero in quatuor angulis sylvaticis sunt, colore albis candida, alba epalea, alba purpurea sicut busta capitula parua habent, Rapunculis capitula fere similia, verum in aere, multa circa caules inualuata & sylvatica postea radices candida, ut aliorum Rapunculis sylvaticis.

Gignitur locis sylvaticis & apricis, praesens haec sylvatica sola.

Floret Maio, Iunio & Iulio mensibus.

Nonnulli Alopocuron appellant, ab ipsa florum plenam speciemque iam aperta sicut haec, molli & veluti lanuginosa, vulgarique eadem propemodum aliam haec, ex de causa, vident. Sed Alopocuron alia omnino est herba in frumentorum & leguminarum hirsuta à nobis descripta. Quae de causa ab eius Rapunculis Alopocuron dicitur, ad differentiationem vultum vni & legitime Alopocuri.

Radices porro omnium horum refrigerantia potentia sunt & nonnulli adstringentia posse autem omnia vni & in alijs sectis esse. Sicut etiam quae Cerasium radices in decollis, ad oculis in ope et vni & condituras inflammationes curare affirmant.



**C**V in sylvaticis Rapa similitudinem quorundam habere videntur, quae Campanula vni & nominant. Eadem cum nobis observare coegit species. Vnum innotuit, aliud medice magnitudinis: scilicet sylvaticum et vni.

7. Maior sine maxima Campanula sola habet prima eorumque proxima lata & vni & nota forma similia, sed tamen paulo maiora, quae vero circa caules, quae vales & praesens vni, oblonga, vni & sicut vni & sicut sicut secundum caules gignitur plerumque, Rapunculis sicut sicut & parentiores, Campanula ac nonnulla sicut sicut affines, caules &

Campanula sylvatica maxima.



vestire colore, flammula in medio caudâ dei-  
ditâ nonnullâ plantâ oblongâ & dignâ fieri cri-  
stratus, veritas verò in multis distributa.

Modum agnoscimus Campanulae folia non  
modò castibus agnata, veritas & prima, angusta  
sunt & oblonga, lanata quoque & vireo spî-  
densia: caules sicut bicubitalis & aliores, cer-  
ca quorum partes superiores flores priores lina  
similia, vel colore opales, vel candida.

Tertia sylvatica maxima, maiori similitudo est,  
sed tamen omnino immixta circumscribitur &  
terre proxima folia sua sunt, & vireo magis lina  
similia, attamen non tam magna: reliqua verò  
oblonga & angusta, flores similes opales, sicut  
de candidâ, sepe Rapunculi floribus maxime ra-  
dices verò immixta & florosa.

Tres hęc sicut similes faciem præferunt, casti-  
culta & folia valuerunt: flores eorum nonnulli  
completi quinqueangulata quoque sunt, & po-  
tentes in quinque sim sicut angulos eorum, &  
capitula similitudo quinqueangulata, Rapunculi  
& aliorum sylvaticorum Rapunculi similia, sed  
foraminosa & perforata, in quibus semen per-  
quam exiguum. Puteo hanc possent fortassis Ra-  
punculi sylvaticorum esse species, sed qua radix  
earum edula non est, nisi videtur ostendat.

Protes quoque in horti sicut: quæ passim  
in Belgio inter arborum & agrorum margines  
reperitur.

Omnis hanc, Julio & Augusto florent.

Velut Campanulae nuncupant, plerique ~~istud~~ Sed hanc *Rebovæ*, Glycerum *Oly-*  
nesi, cum qua Campanula similitudo in usibus habent.

Erpitem quidem hanc sicut qui Columbarum, & quidem Plinij radices, cum tamen  
herbæ Columbarum nomen apud hanc non reperitur. Alij Anethum Plinij faciunt, Anethum  
quidem nomen in multis exemplaribus reperitur, sed deperit. Legendum siquidem est,  
non Anethum sed Eranthemum lib. xxv. cap. 9 in 1. Eranthemum autem sicut Anethum dicitur  
specie, flore rubro colore rubens, maximeque ea de caudâ Campanulae differens.

Secundam Mantissas Phytocoma esse existimus, ac nobis non hanc, cum alijs Campanulae  
latis similitudo videntur: Plinij tamen verò esse: Anethum sylvaticum species, de qua differens  
suo loco. An tamen Theophrasti latisque flores vireo folio consistat, similitudo autem  
plurimum ostendit, quoque tamen non separantur, & superne hanc partem angulosam esse.  
Talis enim Campanularum florosa, vel & omnium similitudo Rapunculi sylvaticum / excepto  
generis sicut) quoque tamen ea de caudâ latis esse affirmari non possunt, si modò eadê Theo-  
phrastus & Plinij est latis. Plinij siquidem latis hanc ac hanc copulavit, quod folij  
Campanulae præcipuè fundant.

De hanc fortasse alijs, & Campanulam non esse latis esse existimus, quod Plinij alius  
esse latis esse sicut sylvaticum, in terra reperit, flore candido. Sed si latis sicut hanc herbæ edula,  
& Campanula alius est, cum & eius folia edij posse non sed ubi in reperit verò & in terra  
suis esse secundâ ac terre radices, aqueas de caudâ cristallâ vna aliquis sicut multiplicatur  
& utraque sicut floribus emat non raro candidâ esse scriptimus.

Theophrasti eorum de latis hęc sicut verba, lib. v. de floribus, egrè differunt: Non  
nulli, inquit, vna sicut sicut, sicut sicut tantum plantam edulcentem, velis latis  
nos, hanc tamen non separant vna in floribus sicut, neque consociantur partem inferre e-  
ger, sicut eorum angulosâ.

De latis verò Plinij lib. 11. cap. 11. hanc in modum latis alius sylvaticum habent, in  
terra reperit, cum latis malis, floribus sicut candidum, Cancellum vocant.

De facilius hanc hanc Campanularum nisi occurrat modum adferendi, cum  
nullis vna sicut herbæ, aut radice sit. Apud Theophrastum verò eadem ac Plinij hanc de la-  
tibus vna sicut sicut reperitur.



que apud Plinium, sed apud Ruellium lib. II. cap. CXXXIX. dicitur: Quam ipse plurimum in  
no verba descripta, qualem Plinius descriptio habeat. Plinius enim passim verba Calceolii  
nam expressit, & laici esse volens ostendit. Ruellius verbò carissimum, & eam quodam elegan  
tissimam et coluit.

In nomine, Plinius ait lib. XXI. cap. VI. sine odore in monteque solo Calceoliana, in montes Au  
runtis, contra Venus. Proxima et Caltha croceolorum magnitudine: vincta in campo foliorum  
runtis, quinque folia non excedentem. His verbis ostendit Plinius Calceoliam conco  
lucam esse Caltham, id est, Iteum, & equalem magnitudinis, sed tamen Calthæ flore in ex plu  
ribus compositi folioli Calceoliam autem esse laici coloris ostendit Vergilij & Colomellæ ven  
tus capite de Calceoliana addita. Ruellius verbò videt locupletatam istam descriptionem ac  
cepit, non facile facere affirmare: Non est tamen quod ab eo exceptam sit suspicetur: ta  
lem enim qualis ipse descriptio proponit Calceoliam non agnovit. Ruellij autem verba  
hæc sunt:

Calceoliana montes Auruntis, Viola eorumque Venus, ea miratio est folio Viola: ubi non dis  
similis, in totum sine odore, caltha simili rosæ, Auruntis tantum proceriora, tanta coloris  
pulchritudine, et equalem ipsam, quod dicitur, penes octo in pedis post ætatem emicat,  
Auruntis: Violam nominant. Videtur eadem a Valerio Cordo Pucumontanæ nunciata,  
quam Germanicè Turgen Nimm dicit referri.

Qualitate autem hæc Viola calceolæ est, Germanicè, curia spon eston nullis videtur, facultate  
quodammodo illius, multò tamen imbecillior. Efficax a recentioribus habetur ad febres  
pestilentes morbos, & ad vindictam animalium inordinatam & cetera.

DE Digitali.

CAP. XLII.

Digitalis purpurea.



**D**IGITALIUM plures sunt species, nò mo  
do florum colore, sed & foliorum forma co  
lorisque differunt.

Vulgatissima purpurea floribus, cui longa, la  
ta, per ambitum crenata, dilata viridior folia,  
Ventricis quodammodo similia, in uocis tamen  
minus, ut laciniosis caulis cæcis, rotundis, à  
medio sursum vertis compluribus floribus gra  
uibus, non sterilibus, aut obverticatis, sed ab vi  
no caulis lateri superius mucos, aut, ut Germanicè  
sunt dicitur, dispositis, deorsum vertis depeden  
tibus, forma oblonga, utriusque dactylotherm  
proprietatem sibi libas, colore ex rubore purpu  
reo, punctis quibusdam candidis interstergenti  
bus, quos rotunda sequuntur vascula, in quibus  
sunt semina exigua, eademque rotundis sibi sunt.

Plurimæ Germanicæ & Belgicæ locis saxosa &  
viridiora, in montibus communiora, & vix sem  
& Luchanchracon foditur vixit: sunt, spon eston  
transformantur in heros.

Altera Digitalis, priore folia similia est, Mjor  
ribus tamen ac lateribus flores haurientem pro  
ris floribus forma etiam conuertunt, colore verbò  
candido aut subinde dilato in candido purpu  
rescentes.

Tertia folia habet angustiora, ventosa, glabra,  
siccitate vires nigrescentia, aequali tamen parte  
candidiora, per ambitum non viridiora: flores  
hæc lateri forma, proceribus sine similia.

Quarta Digitalis folia proceris tunc similia, in  
vires quoque obtuso nigrescentia, & candidiora similia per  
siccitate, flores parvos, deorsumque de pendentis, verum in mores, colore subharoc aut pallidior.

Appellatur autem Germanicè quodam hæc stirpem vulgari lingua *Stinkhülse* & *Stink  
hülse*: Belgicè *Stinkhülse* Gallicè, *Digitalis*, aut, quodam uero, *Geer* *verbe* *Dame*: Angli *St  
gion* *Fuchsiana* *pepsi* Latine Digitalium nuncupant. Notandum hinc *Stinkhülse* nominant, & *Stinkhülse*  
Verbalis speciem facientem, quæ *Stinkhülse* dicitur. Sed Lychanthis sine Thyralis folia habet *Stinkhülse*



Facilitate autem *Lychidis* crevit in Italia, Galenus autem eandem esse factu quodammodo videtur, & sic et eodem modo: cap. vii. postea, a Scopione alia dicitur, quodammodo videtur.

De *Lychide* *Sylvestris*.*Lychis sylvestris.*

## CAP. VII.

*Lychis sylvestris* sive *malva*

**Sylvestris** *Lychis* genuculata caulibus, foliisque mollibus, Coromae *Lychidis* similis est, minus tamen caulis, ut imago testis, folia item in quibuslibet, & caulibus tenentibus, pluraque alia facientibus sicut et eadem in modis, colore cardui aut rubentibus, calycibus autem in modis, in quibus semen parum, rotundum, sublongum, radicebus longa & digitata subinde cretita sunt.

hinc praeterea, arborumque maxime, & alibi sua sponte extrahitur etiam in hoc, in quibus quaedam se illorum folia multiplicat.

Plurimum in parte, & in Aetnaeum usque floret.

Nomen *Junoniana* appellatur: Germani etiam *Magen* vocant de tunc *Magen* vocant item *Junonia* & vocant: Galli *malva*, *Junonia*, *Genet* & *Malva* *Lychis* *Sylvestris* dicitur.

Sunt namque & alia *Sylvestris* appellata & cognominata *Lychides*, haec haud ita vides. *Sylvestris* etiam *Lychis* *Antiochiana* quoque auctore *Dioscoride* similitur *Leontopetalis*, *Apuleia* et *Apollinaria*.

Sunt vero haec *Lychides* & alia quae quaedam nominantur, ut *Malva*, *Junonia*, *Junonia*, *Junonia*, & apud Romanos *Lychis* agere, quae inter nos haec dicitur etiam nominantur. Ex necessitate plerique Saponaria haec nominantur est tamen & alia *Saponaria*, de qua inferius. Nihil in eadem *Occidentem* esse videtur, et aliquid *Sylvestris* *Occidentem*, *Occidentem* folia simile est, ramisque habet hinc dicitur tales modis, radice quoque tenens & superacum. *Lychis* vero haec eam in parte subito longiore, sublonga. *Occidentem* simile est, & radice longiore, quae manifestam contradictionem in totis dicitur hinc cum *Occidentem* dicitur esse videtur.

Definitur tamen & alia nonnulla *Sylvestris* *Lychides* a *Caspio* *Quis*, quae et eius diligenter per *Hesperia* observationibus lib. 1. cap. xxviii. requiruntur & cognominantur.

danteliquoribus vnam folia admiscemus, quam vobis licet, quam inter suas fecunditas facit, & nobis vobis. At mentos flores, quarto loco iam ultra in positum.

CADUUM Lycha diu folia firma tenet, daturus deinde hinc inter pedes se potens, habet per alium dicitur, & a corpore dicitur concurrens etiam si corpore torpescit, & ad ipsam medicam reddat, ut herba opti appolita: antea Dioscorides.

De Beem alba seu Polemonia. CAP. XVI.

Beem alba seu Polemonia.



Polemonia.

AD filiastra v. r. d. Lycha diu genus nra quoque posse videat, hinc minorum nonnulli Beem albam nos vocant. cuticulae enim hinc complures, tenues, perces, & g. n. r. u. l. a. n. g. e. & singulis arceculis tota hinc oblonga, latercula, acuminata, Polygona hinc: similia, sibi vna oblonga, latera, & ex albedo videntur. foliis alba, ex oblonga & truncata calycibus, etiam molliq. membrana velata, plura simul colorata, d. r. e. s. i. m. p. u. r. a. t. e. l. a. p. e. n. t. r. a. t. e. r. a. d. x. a. l. b. e. d. a. & n. p. r. o. d. u. c. t. i. s. e. r. v. e. n. t.

Pluribus per Germaniam, Bohemiam, & Galiam locis reperitur in herb. bodis ac latera collibus frequenter eas.

Etiam flores, & in suo nempe tempore in Augustum viget.

Vulgo Beem albam nominant & albam quidem ad differentiam alterius, quod rubrum nominant, quod & Valeriana rubra dicitur in Perpetua tenet lib. primo in capitulo Neumam tamam verum Anabam Beem. Appellatur verò & à moravelli Papaver spurium, cum quo similitudinem habet nihil ab alio Floribus Tunicae hinc spuris & affinis. Tunicae enim dicitur habere Bernardus Gerontus: Dioscorides Polemoniam esse ferunt. Cum Polemonia verò nos per se non cognoscit. Rationes super eam habet nempe illa Hypericoides Rata: foliulus velata in capitulo dependens: semina nigra: radice r. r. d. longis calam & albidam. quae Polemonia esse Dioscorides refert.

Etiam, si est, r. r. d. r. a. l. o. s. h. a. b. e. r. t. r. i. q. u. i. t. e. r. v. e. n. t. e. r. e. m. p. o. s. s. i. o. n. e. (p. r. a. v. o. r. e. s. r. e. d. d. e. n. t. i. n. t. e. r. p. e. r. t. e. r. e. s. o. l. u. p. a. n. s. i. o. r. e. q. u. i. b. u. s. i. n. t. e. r. a. m. r. e. g. r. a. n. t. e. m. c. u. b. i. c. u. l. a. s. & a. l. b. a. S. r. a. n. h. i. j. s. i. m. i. l. i. t. u. s. e. x. e. m. p. l. a. r. i. a. v. a. l. g. a. r. u. v. b. i. l. e. p. r. a. t. e. q. u. i. d. e. m. d. i. d. i. p. s. a. u. l. t. i. m. r. e. p. u. b. l. i. c. a. s. a. d. d. i. t. a. h. a. b. e. r. e. h. a. e. c. s. u. b. s. e. q. u. e. n. t. i. a. v. e. r. b. a. I. n. a. n. t. i. q. u. i. s. d. e. e. p. i. d. e. v. e. n. t. i. s. i. n. t. e. r. a. d. i. d. e. q. u. i. d. e. m. v. e. r. b. u. m. h. a. e. c. i. n. G. r. a. e. c. i. a. q. u. a. e. p. e. r. t. e. n. t. u. r. i. s. i. n. g. r. a. r. i. o. s. n. o. n. e. s. t. a. n. t. p. e. r. p. e. r. t. e. r. e. m. q. u. i. d. e. m. e. p. p. r. a. v. o. r. e. s. a. c. c. e. s. s. i. t. N. a. m. s. e. d. a. l. t. e. r. a. n. P. o. l. e. m. o. n. i. a. d. e. s. c. r. i. p. t. i. o. n. e. m. h. o. c. p. a. r. t. i. n. e. E. s. t. i. n. q. u. i. d. e. m. i. t. a. l. t. e. r. a. m. q. u. o. d. d. a. m. P. o. l. e. m. o. n. i. a. m. q. u. o. d. a. b. A. b. y. s. s. i. n. o. H. i. p. p. i. a. t. r. o. b. r. e. v. i. c. i. n. e. d. e. s. c. r. i. b. e. r. e. L. a. t. i. n. i. s. i. l. l. u. d. C. a. l. a. m. i. n. d. a. e. s. i. m. i. l. i. t. u. d. i. n. e. m. r. e. f. e. r. e. s. e. d. i. n. a. n. t. i. q. u. i. s. e. i. s. t. a. n. t. i. s. e. s. t. a. n. t. i. s. e. s. t. o. d. o. r. e. m. q. u. i. d. e. m. h. a. b. e. r. e. & i. n. s. i. g. n. i. s. p. r. a. v. o. r. e. s. e. s. t. e. I. f. u. d. i. t. e. m. P. o. l. e. m. o. n. i. a. m. à. D. i. o. s. c. o. r. i. d. e. P. o. l. e. m. o. n. i. a. m. i. n. t. u. d. i. f. f. e. r. e. n. t. e. s. t. A. p. p. e. l. l. a. t. u. r. v. e. r. o. P. o. l. e. m. o. n. i. a. m. G. r. a. e. c. i. s. i. m. i. l. i. t. u. d. i. n. e. m. o. s. i. q. u. i. d. e. m. n. o. m. i. n. a. t. u. r. v. e. r. o. & P. o. l. e. m. o. n. i. a. a. C. a. p. p. a. d. o. c. i. b. u. s. γ. ε. ν. ε. λ. λ. ο. γ. α. e. L. a. t. i. n. P. h. o. l. e. m. o. n. i. a. & C. o. l. o. d. y. n. a. m. i. n. o. q. u. o. q. u. e. v. o. c. a. n. t.

Tenuem autem, ut Galenus ait, Polemoniam est partem & desiccandam vino obnox. h. b. u. r. r. a. d. i. x. e. t. D. i. o. s. c. o. r. i. d. e. r. e. f. e. r. e. t. q. u. i. d. e. m. v. i. n. o. q. u. i. d. e. m. a. d. u. r. s. i. s. s. e. p. e. r. o. r. e. s. & d. y. s. t. e. r. i. t. u. m. c. o. n. t. r. a. v. e. r. o. v. i. n. e. d. i. s. t. i. l. l. a. t. i. o. n. e. & c. o. s. t. e. n. d. i. s. d. o. l. o. r. e. s. c. u. m. a. q. u. a. h. e. n. o. i. s. d. i. a. t. i. m. a. p. o. d. e. r. e. c. t. a. c. t. e. r. o. d. a. n. t. e. m. i. g. u. a. t. & a. l. t. e. r. i. s. c. o. r. p. o. r. e. s. i. t. a. d. e. r. e. n. t. i. n. d. o. l. o. r. e. s. m. a. n. s. i. r. o. n. g. e. f. o. r. t. & c. u. m. q. u. i. r. a. d. i. c. o. m. q. u. i. f. u. a. s. e. n. t. à. c. o. r. p. o. r. e. n. o. n. f. e. r. r. i. t. e. m. q. u. o. q. u. e. s. i. i. d. u. s. f. u. a. s. e. n. t. i. l. l. i. d. e. m. i. d. e. m. p. a. s. s. u. r. a. m. H. a. e. q. u. i. d. e. m. d. e. P. o. l. e. m. o. n. i. a.

Beem verò alba vulgò dicta quae sine facultate (si Polemonium non est) nondum est perita.

*De Nigellastris. CAP. XVII.*

*Nigellastrum.*



**N**IGELLASTRUM foliis est oblongis, angu-  
lis, acuminatis cubito cubito altiore, rotun-  
do, utriusque latus ac pilosis: flore oblongo purpu-  
reo, ad paniculam inclinat. Lychnda fere in ma-  
h, sed in minore: fere in nigra, cum affertur quodam  
amaro, quod in oblongis capitulis (sive calycibus, ut  
sicut flos Lychnda, continetur radice non.

In agris viti cum foetore pellis gignitur.  
Mars ac fimo mensi cum flore vget.

Germani *Kaben* (Kaben *Kameli* *Kameli* *Kameli* *Bol-  
ge* *Cum* *radice* & *propolis* *non* *appellatur* *Itali* *Gith-  
ae* *sive* *Githae* *vnde* *plerique* *similitudine* *vaccini-  
diti* *verum* *ac* *legitimum* *Githae* *Metanthum* *esse* *considerant* *quos* *in* *veritate* *recessisse* *notum* *est* *quam* *restiti* *debeat* *A* *vero* *si* *quidem* *Metanthum* *non* *solum* *foliis* *sed* *ac* *alio* *propolis* *differt* *Appellatur* *etiam* *et* *Gith* *sive* *Metanthum* *à* *fama* *nampe* *agrotum* *verum* *non* *simpliciter* *sed* *cum* *adhibere* *si* *liqua* *ad* *diffusionem* *legitim* *Me-  
lanthi* *Hippocratis* *liquidum* *metanthum* *est* *me-  
ph* *hoc* *est* *Metanthum* *ex* *Turca* *Obtinet* *Flora* *maritima* *Gith* *quod* *in* *figere* *radicatur* *quoniam* *dominat* *et* *etiam* *ob* *causam* *ab* *hominibus* *doctis* *Nigella-  
strum* *Githago* *et* *Pseudometanthum* *dicitur* *Rusticus* *in* *Gallia* *Mach* *et* *florem* *Metanthum* *causam* *appellat* *et* *Theophrasti* *dicitur* *metanthum* *esse* *indicat* *Sed* *Anthemum* *Theophrasti* *Anthemum* *est* *apud* *Dioscoridum* *et* *alios* *agrotum* *metanthum* *sive* *metanthum* *Anthemidis* *species* *cum* *Nigellastris* *parum* *con-  
venit*

Cassius Nigellastrum semen, cubitum & siccum secundo est ordine facti inventio: in pesto cum melle subditum necesse evocari, ut Hippocrates in lib. De morbis mulieribus testatur. Odoratus Horatius, et non siccum & tritum ad usum viti habendum exhibet.

*De Caryophyllis floribus. CAP. XVIII.*

**C**ARYOPHYLLORUM florum species quidem sunt complures, Amens i rusticopis in locum nam cum esse prius in eorum locum habitis, dicitur prope pum mior viti, al-  
tem vero minor.

Minor caules levis, teretes, cubitales, sub altiores, gemulosi: folia è singulis arcefa  
bit, oblonga, dura, angusta, per extremum acuminata, cubito quasi caulis flores speciosi, ex  
longa tunc hinc denticulatis calycibus, & c. Itaque ut plantam solida, qui simplici sunt  
multipliciter vero extremis ex pluribus, usque lenes sin brum committit dote admodum (su-  
a, & odoratus Indicus Caryophyllus referent, quibus alia in dicitur purpuratis in farrata  
rubentem, subinde can didi aut ex cardale purpuratis: tunc tunc verticillati: in quo-  
rum medio farrate: tunc tunc gemis apertis: tunc tunc: fere in vasis oblonga parum ac  
nigam, radice fibrosa.

Habentur in hortis sed speciosissimi fere in silicibus viti.  
Semen frequenter in viti exiguam cum folia farrata fere in buerath: Nam è farrate  
nisi flores, ad angustiam parum videntur, immo tunc, in usque odorati, & simplici, etiam si  
petio multiplex, redduntur. Adagrarar tubide succule cum placentur sili Caryophylli,  
quo illorum odorati flores alliciant, & incandum coram farratas: nambus abriducant  
repleantur: Vitis est plura, & multa dicitur, si lybicos mensibus, à farrata miora  
tunc, in viti viti aut alia similibus locis tepido affoverit.

Flores distincti, nota quod dicitur & Aristoteli. in cellis etiam extendit, farrate loci  
reper, hinc tunc rigida.

Caryophylli cum flore ab odore Caryophyllorum recentiorum notantur Germani *Ni-  
gellastrum*, *Caryophyllum* *Itali* *Caryophylli* *Hispani* *Cassid* *Gallia* *caulis* *caulis* *Belgi* *Ca-  
ryo-*



*Caryophyllus boracensis.**Caryophyllus boracensis.**Caryophyllus boracensis.**Caryophyllus boracensis.*

Caryophyllus minor aliter.



relictiorum & *Staphylea Mianus*, & Latine à y-  
 nisque Ocellus, Ocellus Damascenus, Ocellus  
 Barbicus, & Barbicus, nō capiunt. Sicut enī,  
 qui Betosacum, aut Veronicam sine Veroni-  
 cam appellent, alitem aut coronariam cogno-  
 mento, (Martialis Veronicam coronariam  
 dicitur maluit) ad differentiam videlicet alit-  
 rum Betonica, quæ Græci αὐτῶν ἐπι-φύωτο  
 dicunt, atq; hanc etiam herbam Tuscanā di-  
 ctam, hanc esse plerique existunt. sed Betoni-  
 dus Gondonas herbam Tuscanam Dioscoridis  
 Pelemoniam esse tradidit.

Tumeris Caryophyllicum Cantabecum fa- <sup>Caroli-</sup>  
 cit, quem Parezels 17, cap 8. in Hispania in- <sup>th.</sup>  
 uentum & ubi, per Dno Augusti tempora, à  
 Cantabecis reperit. Nō forte vbiq; est, cau-  
 lea nuda, pedalis, in quo sunt floris oblongi,  
 velut calicis in basibus peripheris muricatis.

Leonhartus verò Fuchius, Veronicam flor. <sup>Florosa</sup>  
 Betonica aliam esse voluit, quæ inter nos- <sup>altius.</sup>  
 tra Dioscoridis de Cespea reperitur, quædem  
 haec verba: *Βερονική γὰρ οὖσα ἐστὶν ἰσχυρῶς ἐπι-  
 λεπτικὴ κίττω, ἐν γὰρ οὖται, ἐν ἡλικίᾳ, καὶ ἐν τῷ  
 γαστρῶτι ἵπυ δι τὴν πύλιν ὡς ἵπυ ἐπιφύωτο, ἐν ἡλικίᾳ  
 να δὲ πάλιν ὑπερῶς ἐπιφύωτο καὶ πάλιν ὑπε-  
 ρῶς ἐπιφύωτο ἐν τῷ πύλιν ὡς ἵπυ ἐπιφύωτο, ἐν τῷ  
 πύλιν ὡς ἵπυ ἐπιφύωτο, ἐν τῷ πύλιν ὡς ἵπυ  
 ἐπιφύωτο, ἐν τῷ πύλιν ὡς ἵπυ ἐπιφύωτο.*  
 haec sic interpretari non potest, Veronicae fuchii  
 in praesenti proposita loca, cum diuersae de  
 cultura locum habeat totam rubetiam & od-  
 oratis folijs Potacea, & ruderum eorum parti-  
 centia, in rebo calamo triangulari, & in plis flo-  
 ris peripureis.

Journe Ruellius Caryophyllicum florem in cogna tum veteribus existimant, cuius opti-  
 mum adynamum videtur, in in ceteris Veronicæ aliteris, aut Cantabecæ parum flois illic simili-  
 est. Martius traditur, aut, ut tunc colitur, flois, cuiusque radandis, sicut à veteribus illis pro-  
 batur, flosq; in amplitudine, palchritudine, varietate, Robinson inferos videri potest.

Altera & minor Caryophyllicarum species, prope tota basi caulis, folijsq; similitima est, s.  
 verisq; tamen minoribus flois etiam habet ex oblongis, paruis & tenuibus calycibus simi-  
 les, verus minoris & per amplitudine magis delineat ac finibus coloris candidis, aut & can-  
 didis perpuriscentis.

Apud Belgiam hortia nascitur. Gesturas autem apud Germanos in prae humidis etiam  
 reperitur.

*Aliter flores emicare.*

Veronicam alitem sine coronariam maiorem, aut alteram nonnulli nominant Germani  
 ai *Wanderin* aut *Wanderin*, atq; hanc etiam à plerisque Superiori: Nōnis *plurimum* à flor-  
 culorum folis foliorum & plumarum similitudine defectu, & *stipe ossibus* hinc est, Ca-  
 ryophyllicum maiorem appellant.

Vix autem Caryophyllicorum florum in medicina verè quidem nullus est, in coronaria ve-  
 rò prope nullus, & praesertim flois aliter, qui etiam acetum acundo sapore, & calore, su-  
 ditur Ruellio, commendat. Fuchius ut tamen, non modò ex floribus, quam *Cassidrom* vobis  
 appellat, verum & radices aliter ad pelvis contagia receptoribus commendat, silyuclius  
 verò faciem calcule ascendendo ac educenda, nec non cornua: morbo laborantibus vitem  
 erudi, septum reliquit.

*De dracena feribus. CAP. XIX.*

**A**RRIORIUM florum aliquot etiam species sine, foliorum ipsius strpis, cum ma-  
 gnitudine, tum colore prae se differant.

Prima species calciculos habet rotundos, geminatos, veluti Caryophyllicis flores, circa in-  
 femora generalia vi plantarum rubetia, rubro betosaca, folia plantis parte oblonga, sed à

*Asterias flexuosus**Asterias flexuosus**Asterias flexuosus**Asterias flexuosus*

L. J. G.

Artemisia sibirica.



Artemia Armenorum species folia citum caules geniculatos, multo fertilliores, maiores & rubriores, nec non candidiores, Constat in speciem illam folia laevia, hanc multo densiora, florem in umbella una plures similes conglobatis, pediculis, rubentes, exigua candidis similibus ornati, pinnatis Armenis similes sunt.

In petriolis collibus & alpibus, sibiricis apricisq; loca, apud Germanos & alias nationes nascunt, & Belgis in hortis culta, ubi secundo anno cum aliis Caryophyllis arbore flore.

Germani *Errenegle* vocant, aliqui Scythiam à rubro floribus colore coccoam referunt. Ex sylviculis huc Caryophyllus est, veluti & procedens: utroque eodem nulla cura eget: natura sua vana, & hinc non vana non difficiliter salutat.

Tertia & haec species, cuius pinnae à radice fibrosae, angusta, dura frusta, & acerrima foliola prodeunt, atque sunt inter colicis herbes, quibus quandoque vicius, subinde duo aut tres sident: floribus mediocriter magnitudine, Armenis pinnis paulo minoribus, ovata, odore, colore ut plurimum eleganter rubentes.

Arcto & incolto solo, quandoque iuxta margines arborum in plerisque Germaniae, Bohemiae, Silesiae, & Moraviae locis frequenter reperitur.

In multam aetatem floret ac viget.

Item de quatuor quatuordecim Armenorum florum species cauliculis rotundis, geniculatis, rufis glaucosis, pediculis rufis, foliis ex singulari geniculo laniatis, oblongis, ac pinnatis, acerrimas, in viciis candidioribus & quasi caulis floribus in umbella similibus pluribus similibus conglobatis, pediculis, Armenis sibiricis, utrum minoribus & rubentes dicitur purpureo colore: sicut in oblongo rufisca pinnis, ruficulis conglobatis: fibrosis.

Seruat in horti.

Floret a Maio aut Iulio mensis in Augustum usque, & eodem quo facta est anno.

Sunt qui velut Behen, siue Beer, vulgò nunc dicit, spongiam aliquam esse, propter eam quam cum Behen rubens flore Valeriana dicitur rubra, similitudinem habeat. Nam cauliculis geniculatis & foliis illi aliquantulum, sed colore similibus est: Cauliculi tamen breviores & teneriores: foliaque minoria, colore vero leuiusque foliorum in viciisque sicut eodem. Carolus Clusius hanc inter sylviculas Lychades numerat, vel si prà morum mas, si autem polam & Valerianam M. Lobelius vocat: At nos inter Armenis flores libertas referimus.

Prout

aliquantulum, quam maiores Caryophylli, laniatos, colore herbaceo vicius floculos in timo caulescularum parulos, exigua Caryophyllis perianthia, vicius maiores, plurimam in quandam veluti umbellam conglobatis, pariculis ut plurimum prodeunt, & semper tunc cocco rubore splendentes, pinnis interius candidis circa modum in rufum variegatis, pinnis candidis.

Omnia haec foliula Belgicarum hortorum ante apud Italos & alibi loca incolunt & ardua erant. Gelsus circa Gryphylus nuper in Helvetia in se reperit: sentis propositis & alibi in Belgio loca de feris, iuxtaque arborum & prout marginibus ac ferobis, sed nihilò quam in horti minor & rarer.

Maiore & Aprilis saepe mensis aut Maio floret, Caryophyllus feris antecessis: plurima inde rufis parte viget.

Galli *Artemis* & *Artemis* appellatur, sicut in Americae flores hanc nuncupat: Germani *Dind* ut regit *str* regit: Belgis *Artemis*, quasi dicitur dicitur. florum etiam foliosos nulli propriis linguis hactenus nominant. Caryophyllorum feram species quaedam sylviculis vicius, quam ob causam & à recentiorum quibusdam Veronice appellatur sylviculis dicitur: nec defuit qui Tunicam herbam esse volent: sed nihilò magis hic, quam Caryophyllus tunc Veronice dicitur aut Pedemontio conuenit.

5. *Panicum* hinc veni & alia quaedam est, vel *Caryophyllaceae* ut vel *Armeriorum* species, emulso, vbiq; & apud Belgas quoque *Styracis* canalicibus habet dodecandros folia & singula parva in bina, parva, acuminata, flores in calicibus ut in *Styracis* magnis, per ambrosiam habentes, *Caryophyllis* fronsibus, & fortis, & magnitudine hinc similes, colore variosa dilato rubentes.

Exa pulvis in pasta & loco nigra.

Mare & luto mensibus flores potissimum conspiciunt.

Belge *Styracis* hinc appellatur, id est, *Corticis* hinc.

*Corticis* *Armeriorum* utrumque ab eodem fonte, vel. vltim quoque, aut in mediana, ut in o bota vltim habent utroque conary, fiant, & hinc utroque corollas exornant.

*De flore Constantiopolitano.* CAP. XX.

*Flor Constantiopolitana.*



**C**ONSTANTINOPOLITANO hinc flores sunt & radice piceis, hinc ab eodem fonte, geniculati, nunc folia & singula geniculata, oblonga, aliquo tulum lata, acuminata, obtuse venosa, nunc in alpera & hinc ficut & calicibus ficut in lato umbella, male: ficut in conchis, alpehu pulchro, ceterum modum, color flos Calceolus, vel purpurei Lily, hinc in artemis *Armeria* comas, tubula candidi lemon in oblonga acuminata vasculari equum & tubulatum radices longae, in plantis venositate, gulo aliquantulum aces.

Belge, peregrinus est flos ficut in bota.

Turris & luto ab eodem fonte anno flore, deinde plantis frequentibus alia. Radice enim consistit vltima & diuina dicitur, hinc & ficut parva.

Est & hinc vltima & minor species, tubula, aut paulo citior, turribus ficut, que piceo anno hinc profertur *Gelacio* hinc.

Nostri vulgo *Constantiopolitana* appellatur flos: *Germanis* vero flos *Hanslymorum* - *Aldrouandas* *Creteus* cognominis alia *Lychasidem* cognominem. Sunt qui velut *Lanaria* nuncupantur *Lanaria* tubula est, que *Grecis* *epilobis* *Arabibus* *Condit* dicitur, que ad purgandas lanas, qui eas eluant, distribuitur, que vltimam maram afficitur est ovidentis est, quam vltimam debent. Neque enim flosa vltimam hinc flos ficut, quod

quale *Styracis* est *Theophrastus* & *Plinius* referunt: radice enim non habet radicem, aut *Olea* folia, ut *Styracis* sunt.

Non de eodem fonte fortasse, & qui flos hinc *Constantiopolitana*, vltim vltim dicitur flos esse suspicabatur, que in *Grecis* *Lanaria* *Deliderium* vocat, quoniam flos hinc cur aduocatur, modo non habet. Poetum enim flos *Theophrastus*, *Plinius*, & *Aldrouandas*, inter *Styracis* ponunt, dicitur hinc esse geniculatum referunt: ut in *Styracis* flos, alia in *Styracis* non coloratum sine candidum, *Constantiopolitana* aut, vltim vltim flos, & colore vel *Hycinthum* ficut, quem purpurei *Lanaria* vocant, piceo vltim, vltim candidum est. Que magna *Constantiopolitana* flos cum *Poetis* similitudine alia.

*Constantiopolitana* hinc piceo, quem in hinc & conary *Styracis* alia, nullum, quod flos, medicum vltim habet ficut hinc ea de *Styracis* incompara est.

*De Spina.* CAP. XXI.

**S**ATONARIA, vulgo dicitur, cuius flos glori, nunc vltim, geniculati, tubula ut *Styracis* folia lina, vltim, *Plantagin* hinc folia similitudine, sed tamen nunc, & singula geniculata bina, ut plurimum, & praefertur in radicibus venositas, deorsum referunt flos hinc hinc calicibus, & hinc suprema geniculata mela, odorata, color alia pulchra vltim



rubentes, aliis dilute purpurascens, aut cit-  
 redi, qui ex creberrimis & oblongis calycibus ten-  
 ent, in quinque lobis a continuis, in quorum  
 medio angula quaedam flammis, rubra, scilicet,  
 longis, oblique longis, quibus filice quaedam  
 adhaerent, Venam supra radicibus firmis.

Apud Belgas in hortis colitur ab horto flo-  
 ruum & vorticibus, locis apicis, ipse nascitur.

In horto, dum durat, & vna, est perennans.  
 Juno & Julio florat.

Saponariae utriusque nuncupant, ab adfingen-  
 di potentia, quae folia possent: faciem etiam  
 quendam ex se remanent, dum coarctantur,  
 sapor sine modo exiguus est. Ruellianam n  
 & aliam quendam Saponariam describit. Non-  
 nulli hanc in Turciam appellandam esse tamen  
 Venam, et coronaria, potius minus Potentillae  
 alius species, quam pro Tunecis herba habet, n  
 Cap de Caryophyllis scriptum. Videri etiam  
 potest Alisma, hoc Damulonium, in hiscaulis et  
 caulis, non simplex, sed subinde in unum quodlibet  
 densius, & radices essent quam Venam magis  
 crassiores: folia squarrosa habet Alisma de-  
 scriptioni consentanea, & glomeratae florum in  
 summo caulis congerens. Sed Alisma nomen  
 est caulis & simplex & radices similes te-  
 nueris, quae differentiam Saponariae huius & A-  
 lismatis ostendunt.

Describitur etiam Alisma in Dioscoride hoc  
 modo: Alisma, sicut qui Aleam, qui Damulio-

nia, qui Aepum, qui Lyca, nominantur, folia Plantaginis similia habet, angustiora tamen,  
 versus terram sessilia: caulis tenuis est, simplex, cubito altior, spatula habens, Thyriso similis:  
 flores nudi, candidi, in horto, radices vellem Venam nigri tenues, odoratae, acris, subpingues  
 loca amat aquosa.

Idem Plantae istae penè veris similes apud nos depergit sed duo eius statuit generayem  
 in aquosa, quod quidem a Dioscoride describitur posterum in hylas procreta, nigra, ac  
 mucosus folia: folium etiam in lacu situm esse: ut, quod Dioscoride dicitur sit, & caulem ce-  
 pite Thyris pro eo quod ille Saponariae cum esse scribat, quia sit Thyrsodescaulis huius  
 nomen accipit in pectore parte & crassi: r & later.

Thyris enim sive Saponaria, sive aut huius est, frondibus aut hedera obtecta, cuius fusti. Thy-  
 rum pluribus modis aut locis dicitur, ut in videret globa aut pely. Sic etiam in an-  
 tiquissimis quae Romae passim exarant in huius de pely sequunt. Thyrisium, ut est Mel-  
 chior Glusius in epistola ad Langum, summo videlicet cacumine globosum quoddam  
 indurata gestantem. Talem etiam Thyrisium esse, quae in eadem sive pely & descriptiones ostendit.  
 Thyrisium etiam Saponaria appellatur, quae in eadem huius globosum in capitulum profere: vnde  
 & vnde dicitur: & caput in cognoscitur. Saponariae in Orobanche dicitur, caulis cuius super-  
 re parte crassior esse Thyrisium aut & Ferula caulis mansuetar, qui hinc sensim emittitur,  
 tum non tamen cacumine umbellam latam & rotundam florum primam, deinde firmam  
 globam Thyrisium modo penam: vnde & vnde dicitur: sive Ferula, pro Thyrisio subinde dicitur, utque  
 sive Bacchar, qui Saponaria, etiam aliquando vnde dicitur appellatur: Thyris, qui inerat  
 ergo et in quae dicitur. Repertur & huiusmodi caulis alioquin thyris vocatur, qui & in la-  
 tam umbellam Ferula modo dicitur.

Quae omnia Thyrisium videri, baculum aut hastam esse ostendunt globoso ex frondibus  
 aut floribus cacumine & Saponaria caulem dicitur, sicut in parte sphaerode in aut latere in.

Naque repugnat robis in Sacramentali lib. 1. Mactobas, vbi Liberum patet, cui in Thy-  
 risium nomen, lateris istum genere scribit. Nam vnde Thyrisium non in cacumine cacumine, sed  
 potius in rebus & globoso in apicem desinere colligitur ex eo cui in quod huiusmodi dicitur,  
 ostendit eam cacumine consistam, ut apocrypha non possit, quod quaedam modis in fronde-  
 bus eorum conposita.

Verba

Verba Maccabij huc sunt: Colitur apud Lacodemon in Samolachrum Libani portia, hinc unguis, non Thyris: sed cum Thyris tenet, quod aliud, quam lotum telam gerere, cum manum Hedera lambente protegitur!

Nonnunquam tamen & Thyrisda casta appellatur in agrorum cacumen de finem, modo floribus si adnotatur. Apuleius enim Verbales castem à medio furcam versus hederas grandum, & falligo acerbissimum, Thyrisum appellat.

Potius Saponaria, talida quidem & sicca est tempore, facultate autem abstergeri non expugna pectus.

## De Calceole Mariana.

## CAP. XXII.

Calceola Mariana.

Calceola Mariana altera spec.



**CALCEOLA** Mariana caule affurgit dodranali, circa quem ab ipso folia lina, vocantur. Plantaginis crassa in falligo fossa eminet, et plurimum viticus, quatuor foliis, à quorum medio protuberant orbiculato oblongo per veniculis, eoque sui forma, colore linae, incana, & variosa, superiusque patens, in flor calceoli aut crepidae vade. Illi nonnunquam uterque autem utrinque medium hoc folia quatuor, quae subinde dilata rubent, sursum obliqua colore incant, vel etiam lateri coloris, vna cum ipso medio, sui forma protuberant, sunt, retrorsum obliqua à qua tenues fibres dependunt.

In Helvetiorum, & Norici, ac Pannoniae superioris sita e Austria montibus spontè nascitur.

Vulgo Calceola hederacea Germanice Pfaffen Stueck, papen Stueck appellatur. Item de eadem verò & Calceola D. Mense, sive Calceola Mariana. Exhumatur verò & à comitibus Alstria esse: sed minus quam Saponaria cum eo convenit. Folium quidem Plantaginis respondet: sed desideraturae capitula Thyris: illis tenues, insiduosae, & rubrae Vitis nigrae similes.

De Calceoli autem Mariana facultatibus nihil occurrit ad scribendum hoc modo Veribus, sed de receptionibus quae dem sunt cogasti.

## De Aquilia.

## CAP. XXIII.

**AQUILIA** folia sunt Chelidonii maioris, quae tamen rosandiora, per ambrosiam, coloris in vapore carnoso, quae vulnerata à nullum, nisi cò minus lareant, succum

Aquileja.



Aquilegia vulgaris flore.



dantur etiam verò ex betulem, rosam, rubentem, & leniter hirsutam, cuius ale flagrant profusus flores, ex quinque depen dentibus concavis vel an concavis, & totidem interme dia, sursum erectis partibus albis, qui si simplices sunt, compositos (multiplures enim) ex plu ribus coniculis compositi sunt) colore albis, nigricans, albis in rubro purpureos, albis candidos, vel in candido purpureos, subinde varios & ex carulis candidosque pertractis relucen tes, compositos in medio flammibus, à quibus parvi aperti dependent: ubique post singu los flores quinque sursum, an quibus semina parva, nigra & splendens, radices subiant crasse fibrosas, que pluribus annis durant.

In Belgii & Gallie montibus in Germania & alibi, in apricis collibus, sylvis monti bus & pinguibus pratis spontè gignitur. Flores Maio & Junio vigent.

Rosentioris Aquilegiae aut Aquilegiae truncatae: Germani *Aquij* & *Aquij*, nostri *Aquileja*, Galli *Aquileja* & *Aquileja*.

Quibus sunt veribus predictis, nondum sitis conceptum, nullam siquidem abum vsum habet, quam quid carnis & horis carnet. Tragastanem fœces, drachma pondi cũ croci obolo in vino, in omni obitu usitate & morbo regio laborantibus verò ter diem teribus, sed cum qua assumpsit diligenter cooperant, sedare deinde oportet. Perique ex *Aquileja*, *Aquileja* *Cantua* mœnia vasa, sed rement & extra osamem carnosam tribuunt.

*De Anemone.*

CAP. XXIII.

**A**NEMONE casles sunt rotundæ, glabæ, fragiles, & ramulosi folia multa, ut planti nam oblonga & acuminata, Læcis similia, sed mœnia, sub inde brevem latera que, & Anemone similia. flores sic undum casles superiores parte ordine digesti, forma oblonga, mœnia parte latera, dum obclui, ut nascuntur, per mœnia. Rarique quod ut modo similia, aperti verò hanc in Læcis rictum referentes, colore rosas rubentes, aut candidi, vel ex candido diluati purpureo, non raro etiam sublimi, ea videlicet cas folia sunt latera ac breviora quod deinde capula in sequitur, oblongam, anteriore parte angustas & foraminifera, parum vitali, per carnosam similitudine, in quibus semina parva & fibragensia radibus non magis fibris dependent.



## Antirrhinum.



Antirrhinum sylvaticum Phyticum.



In bonis capud Belgis, Italis, Germanis, & alibi ferunt.

Mais mon sie, quod hincem in peltant, & in laqua deinde arbare, flores: ferunt vero solis astatu finem, eisdem anni vere, facti. Hyemem autem, nisi elementis admodum fuerit, ut in cella vitatus repositum, oblique in una in Belgionem sustinet.

Conchidit rhippe in dardis, si non viderent Theophrastus exemplar, & dardis dicitur. Latini similes Antirrhani. Aulone Galieno in peltant & in peltant, si vel peltant, non natus. Apuleius etiam in dardis, peltant, non natus. Cuius cerebrum, herbis Summarum, Venellam minorum & Opalam gratam, appellari refert. Cuius quoque Leo herba, quam non flos Colomella lib. 10. refert, & fidele Xerophyl. remanet, & hincem flos Lemus, non ferit. Item & colus.

Celeros tamen hinc Lemum, Aquilum est, ex hincem, quibus de casu Ledostolium nuncupant, sed hoc nomen Antirrhano magis convenire, quibus Aquilum, non videtur. Non Antirrhano hincem, Lemum nuncupant, quibus Aquilum refert.

Est vero & alius Leo, quibus peltant, & legumem Leo dicitur, alio nomine Orobancha de quo in Fracastoro in hincem capite.

Est & alia Amethysos herba, cuius Placchus in hincem, peltant, & dardis: de qua dardis in Olerum videtur agere hincem.

Belge, Antirrhinum, quibus appellatur: sed Antirrhinum: Hincem Capite de terra.

Ceterum Antirrhinum ferunt in hincem in medicina, ut Galenus ait, est. Herba vero ipsa aliena cum Eubonio fiscalium, sed multo minus.

Narrant, inquit, Dioscorides, appens in medicina ad oculum: & gradum coactare, & ipsi per hincem cum oleo hincem, aut Cyprio.

Apuleius, radice in aqua decoctum, flos epiphora oculorum, colentur ferunt refert.

De Antirrhino sylvatico, ferunt refert.

## CAP. XXV.

**P**RAYE hincem Antirrhinum superius capite de scriptum, & alio de peltant, flos in natura sylvaticum, quod flos & nomen, & hincem hincem, & aliquantulum, sed tamen modici hincem: Cuiuslibet hincem quod, sine terra, nisi flos oblongus & angustus. Ferunt tamen non alium tamen, sed hincem flos hincem, & hincem hincem, Antirrhinum hincem, sed hincem, colore rubro purpureo, in medio latera. Capite similes in hincem & brevis, flos hincem, hincem hincem prope modici refert, in hincem hincem hincem: radice sylvaticum.

Nascitur rubus Belgis & Germanis in hincem marginis, & in ipsi agris, in hincem, in hincem.

in, & alibi. Et vno quodam loco proferunt ac vegetius, alio brevissimæ & tenuissimæ reperitur.

Ita & Angustifoliae hinc hinc possunt affinis esse herbæ.

Nodulifera quæ appellatur Anethum, autem haud dubie species est sylvestris. Sicut qui velat Ononis esse, summatim nomine indicat, cuiusmodi modo Archigenes apud Galenum est simile lib. 9. uti quosdam latinos credit. Sed an vere optum sit, affirmari non potest, cum descriptio nonquam, nec nomine, alibi quàm hoc loco, extante. Quam etiam ob causam, legitur Comarum Oviscapri vocem depravatam superstiti esse, & legendam esse, Ovigantum; quod, Dioscorides asserit, in balneo anethi esse prodest.

Ita similitudinis Anethum sylvestre cum Phytosuma esse habet, quod à Dioscoride, uti vult, lib. 4. descriptum est, quæ species in hinc hinc reperitur, præsertim in Anglia modo descripta. Quæ species, Anethi, similitudo est, Phytosuma folia habet similia Struthio, sed minor: Fructum autem, perforatum, radiis parvis, omnem, terre superficiem inherentem. Quæ descriptio Anethum sylvestre aptissime descripsit carissimè. Nam quidem quod ad folia attinet, ut omnino habet Struthia minoris descriptam, ut Plinius ait, Struthia autem folia est Ovis capri habet, cuius perforatum, quando pro fructu meum illud capitulum, quo semina continentur accipitur, quod non raro, uti & quædam Anethum capitulum, angustifolia appellatur. De similitudine dubitari non potest, quæ testis, cuiusmodi Phytosum ad tribuimus, sum. Quibus de causis Anethum istud sylvestre verum Phytosuma esse apparet. Martialis est tamen ad Anethum istud, quod olim pro legitimo calibrat, sed Campanulatum pro Phytosum ac descriptum de quo si potius cap. 1. ubi & improbatæ sententiæ Martialis, & tollit sedulo rationem indicat.

Parò Anethum istud sylvestre nullus quidem est vicius si autem verum est Phytosum, ad amicos profuerit. Vt enim in asserit est Dioscorides, Phytosuma ad amara phidra cum solam esse perhibetur.

De Linnæo.

C. A. P. XXVI.

Linnæo præterit

Linnæo aliam præterit.



**A** NETHUM ISTE species quoque quædam videntur, quæ Linnæo vulgò nominantur. Quorum vna castoreos habet bicubitali, complures, rotundos, renæaefolia in cæcis, 2. angusta,

Q. 1

angusta,

Linaria odoreta



Linaria Valeriana.



angusta, oblonga. Linae folia similia. Flores luteos secundum cymam circa ferratum esse, antice quidem parte. Anterioribus floribus simplicibus, posterioribus vero in eandem sicut corniculatum quoddam de sineribus, sicut Regii similibus neque loquatur capitulo rotundum, in quo sicut nigrum, radice longa, tenuis & alba.

1. Altera species hinc caule foliis & floribus similes est, sed ubi barbae sunt longioribus, foliis vero angustioribus, floribus parvis, ut nec qualem aliter in manibus, in cetero purpureis, non inquam emamli beandis aut fibrosis, capitula similia ut ceteris in colore & similia.

Naturae prope Linaria passim in Germania & Belgia secus agrorum margines, & colliculis, aliter in terra rariore.

Floret Julio & Augusto, ac etiam serena.

Præter verò has duas & alias duas C. Clusius in seu oblationibus indicat. una odoratam: alteram Valerianam cognominat.

2. Odores Linariae folia, non Lini, sed Belladii maxime similia magis apparent, interdicet, & per marginem ceteris vinctis caulis testis est: sicut in ceteris specierum digestis, coloris caruleo purpurei, & quibusdam locis, in calicheibus nempe regionibus, odorata capitula parva, rotunda sunt.

3. Valeriana vulgaris Linariae forma & coloris forma est, sed folia breviora & haec ut qualem Linaria, ad Antiochiam lateri, aut Censuram rationis accedunt, capitula haec ut aut quosque proter: radicem vero vinctam detinet.

Viresque specierum prope Linariae nostris dicuntur, videtur in Yranda. Germanis *Spüchensley* frons *hambant* vnde *frans* *flähy* *moit* *flähy* *front* *flähy*. Belgis *Wes* *Wes*. Gallo *Wesage*. Ex hinc a multis se *Olyna* sed *Olynah* hac dicitur est *flähy*, ex quibusdam *Wesage*, hoc est, *Wesage* hinc, in Italia componitur ut & olim Galena *Wesage*, quod vulgo Itali *Wesage* vocant.

Est autem Linaria praecipua quidem ac vulgaris calida quidem & digestio rariore sic accipere, & aperenda potestina pascit, nam, ut & Rhazoreni rariore non potest ea sicut, non decodum eius proterat. Adhuc in Italia, Regio magis laborantibus proterit, quod *Olyna* hac manifestum est.

*Amaranthus purpureus.*

*Amaranthus tricolor. Flosibus et foliis coloratis.*



**C**APITE *Amaranthus purpureus* fingit cubitali, vel altiore, striso, utra radicem subinde habere, lani, in alii quosdam dactilo, cetera quous folia oblonga, lata, acuminata, mollia, glabra, colore viridita, aut in viride nupitula ruberita. pro flexuosa et viret specie, aspectu gratissima, ceterum incolora, in purpurea splendentes, coccoum furuncantur qui in hololorum villositate, referentur, ac quodammodo coloris grana superantes, que in atritu similem sui coloris faciem referunt, & decerpit quous pulcherrima dicitur suam essentiam, atque etiam annis non marcescens, vnde & nomen inuenit. Semen maturis specie videtur paruum, angustum, & minutum splendens. Radices breues & fibrosae. Morsum in eo, Plinius ait, gaudere decerpit, & lemas venata. Alexandrinis palma est, qui decerpit asserunt. Morsu quoque postquam deficiente caulis florae, madefictas aqua rosatis, & hybernas ceteris facit.

*Amaranthus*, quous non mutatur, Plinius appellat: nostra autem, *Amaranthum purpureum*, ad differentiam *Elaeagni*, quod similiter designatur dicitur, de quo in scriptis suis loca: Germanice *Samstidelen*, Quasidipson, *Plesanen*: Nostre vnde dicitur, *Plumardillanum*: Italicè *Surcolone* Gallicè *Passe* vnde *Pastusclum* Russicum addit, quo, vnde in hololorum villositate conuenit. Galli nuncupant, cum quo de colore pro ac potu cetera.

Et vnde de alia huius speciei, cuius multo proceriore & tra filios, quous vnde quous cubitum vel altiore folia dicitur, cuius species sunt longiores, sed obsoleto admodum cetera.

Semen vndeque *Amaranthus* in hortis, sed pro frequentius. Aliterum *Amaranthus* nullam vel omnino ex parte gratiam obtinet.

Potumque specie Augusto mensis durare in Autumnum. Insuperum vndeque vnde est, & Elix species, de quo in *Olerum* historia, ubi illi sicut reddentur vnde.

Receptionis plerique *Amarantho purpureo*, & praecipue primo, adstringendi cum frigiditate & siccorum potentissima, sanguisque omnem fluxum ostendit vnde attritus, quous vnde in melle nulla qualitas ostendit, praeter solam formi colorem, quo specie habent. Nam rubra omnia sanguinem vndeque fluxum ostendit ac suppurat, quousdam est opus, ob quousdam sanguinem suppurat, rubra colore fit. Sed ex coloribus de vnde vnde

Q. 1

etiam

eum & modicam torram, circa nihil colligitur Galeus lib. De simpl. medica. facult. se. c. 10. 11. & quanto illicide ostendit. Quae de casia & piperis in toto continentur, quae Antiquioribus perpersum, lingua non streperem, casia. et & hystricos aduare, et liba colat. re indicat.

De Rosa,

CAP. XXVII.

Rosa ferax.

Rosa glauca.



**R**OSARUM streperem fructifera & spinosa sit, consistarum tamen & decurrens est, cum floribus longis, quibus spinosis fructibus locantur. praecipuum sicut in hunc locum Rosa facile obtinet, etiam in ceteris omnibus illis prope natis, & ut ex Anacronio Teste, Palla Graeco vetustissima, Henrico Stephano proquam dicitur curare Latino ostendit.

*Rosa ferax, dico, ferax.*

*Rosa, cura, amara, Para.*

*Rosa, calidum et calidum.*

*Rosa per Cythera.*

*Cypus implicat coronis.*

*Cherem choris frequentans.*

Sarracena Rosa genus quidem permixtum, aut streperem magratudine, asperitate, locantur, aut ferax sicut in modum, pariterque, vel colore odoreque differentes. Nonnulla sicut in proce de excellantibus locis & humilitatibus quibusdam quae, ab aduena, videntur aut plura. Theophrastus enim ageratodas, sine centifloro quibus, circa Philippopolis sedit: quae incola ex Pungo transformata sunt: & in Campana Plures. Colore vero hic quidem rubentia, illae vero candidae odoratae etiam quamplurimum, abique odore scemula. Hanc omnium quaedam ferax & horrentis sunt, sicut et glauca.

Rosa aut potius virge omnibus dura, lignosa, in condicibus aculis horrentes, & glauca quidem spinosiores sicut aspera, quae arborum ferax, ex quaque aut streperem et quanto uolentibus. Rosa & calidioribus sicut exere, primum hic thero inclinat, quae tumescens in vides alabastris sicut, quibus pariter de laceribus sicut, quae sicut in medio, sicut quaedam capillata, sicut quae complexa sicut. sicut in sicut.

Rosæ Damascenæ, species octava.



pro capitulis, que calycibus & floribus subsunt per marginem rubentibus. pappus durus, lingue mucosam, radices duræ, lignosæ, in diuersa tendunt.

In firmam consistit, vix proceritate caulis in sine maturam, reliquis superat: crassis enim & lignosis suis virgulis. vel in pediculis, aut eorum abscissis consistit: flores candidi, odorati & multorum foliorum, quorum utrimque membra, exteriora verò maiora & ampliora.

Proceris magnitudine, virgæ habet breues tres, sed non minus asperas, Rosæ odore insens, sed dilute & pallide rubentes. Incarnata Itali appellatur.

Terna hinc similitudinibus folia est, sed subinde breues, flore verò odoratissimo pulcherrimoque, saturato, & quodammodo pumiceo rubore nitenti, Rosarum omnium prestantissima, & ad medicamentosa omnia fore generis utilissima.

Quarta hinc oritur, virgæ breuiteribus aut albidibus, flore eleganter quadam rubente, sed minus quam terna, & quodammodo simplex, quæq; miram modo foliorum, aliis plurimum aliquando eorum multumque odore gratæ se perquam accendit.

Quinta Rosarum hortensia species, raris & virgæ sylvæstem Caruati Rosam quodammodo refert. Rosæ profert paruas, plures citius coherentes, vix plurimum in floribus, aliquando, sed non in multis, odore admodum fragran-

ti simillima, & molliam proximè referentes: vado & Rosæ Mohabbetæ ab Hierosolymæ appellatur.

Sylvestriam ea quadam que Caruati Rosæ vulgè dicitur, & Belgis fuschianis illa est, aculeata virgæ, & aspera folia, latius tamen distant, singulis tamen minoribus floribus simplex quæque folia non excedunt, albacant, aut ex albedo colore purpurascens. Admodum huius virgæ aliquando plura quadam hirsuta, echino Castaneæ quasi similia, ac mollis, quam Spongiosam Rosæ nuncupant.

Hæc similia est, & alia species, verum tamen aliquando in minoribus, vix sub rubente coloris & hinc, flores pallide rubent, non in totum abique odore: Caruati Rosæ à quibusdam dicitur.

Inter sylvæstem etiam quadam (sæpe) colore Rosæ fert.

Est & quæ quadam hirsutissima, virgæ spongiæ similes: folia utrimque, Rosæ perquam candida, candida & si auster odoratis: fructus citius niger, alium ruber.

Item & sylvæstem quadam folia repertis odoratis: hæc proceritate Musciferæ ornatae sæpe superat. Virgæ habet duras, crassas, & lignositas: folia splendens & pulcherrima, odore gratissimo: Rosa verò parua, quæque folia, frequenter illis alba, arces, nard purpurascens, & quæ nonnullis odoris fructibus oblongis, colore sub rubentem, nardo parua: Oloræ, & Rosarum thuræ capitulis similes, sed minus quam hortensiam, in quibus lanosæ flocci argæ inter eos lente consistunt, purpuream, & duram. Reperturæ verò & cæcis huius omnes virgæ, rursus molles, & hirsutæ spongiosæ, & alba omnino, quæ ab eadem Caruati Rosæ spongiæ dicitur. Et eisdem quadam Rosarum genera, nullis ama ad inuenit.

Sunt verò & apud Plinium lib. 21. cap. 4. multa & plerumque sylvæ appellata cognominibus, sed non omnia in Rubo, hoc est, spongiæ fructu, aut in nam & ex Malis Bares in Rosarum consi nuncupantur: quorum quadam cum nostris generibus consensere, verum simile est, non tamen omnia. Genera cras, nullis, inquit, forme celeberrima, Præclitima & Campanata. Addebat alij Miliatam, cuius sit adestissimas cæcis, non excedente duodecim folia. Proceram et Trachinam raris rubentem, mox Alabandicam rubentem, albicantibus folia. Utilissimam verò plurimum, sed minus firmam, Spongiatam. Deinde paulo infra.

Est et quæ Græci appellantur à nostris à Græcis Lycium, non nisi in hereda lecti præci-  
nent, nec vocantur ex odore quam quæ folia, Vnde in magno dicitur, ad ore malo. Et & in Græ-  
cula appellatur con voluta foliorum particula, nec dicitur nisi in sua u. conuila, scripturæ præ-  
cedit in his, in firmis folia. Alii fundunt eam Maluero, sicut ostendit habet, Malua-  
ron vocant. Acque inquit, has tres in magnitudine, Antithalis, quam Conoscolam vocant,  
Cymra sine odore, præter Conoscolam, & in Rubo mutam.

Scruntur & plantantur Rosa quædam in hortis & sicut apud Belgas, Germanos, Gallos,  
& alibi, in horti.

1. Syriacis in multis locis sponte exoritur & inquit his quædam prima, passim circa horti,  
fossis, ad marginem agrorum & pratorum, locis hereda præcipit.
2. Latere in Africa & Egypto nascitur quam plerique in horti inuit habent, vnde & Can-  
merentiam.
3. Marina spinosissima & asperissima, locis gargaris maritima, frequenter. Monnotum ha-  
bit, vnde locum portum, in amensu iuxta mare curat.
10. Sed odorata Syriacis Rosa hereditaria est, nec vique in Gallia aut Belgia, quod ferunt,  
sponte exoritur.

Sen autem Rosa, in Plinius ait, nec paugibus vult, nec argillose, nec nigris, constituta,  
propinquas odoratum agrum amat omnia, locis locis quibus hereditaria odoratum. Rosæ in  
celi temperies, quibusdam enim auri, in suis odorata præcipit. Theophrastus odoratum  
nupte præstantiam locorum etiam tuone contingere à siliis. & odoratum Rosæ, que  
apud Cyrenem nascitur, & proinde vagatur nec vnde siliis inuit illic fieri.

Naturæ vero Rosæ, ea immensitate quædam modè perficitur, pennis in cuius ferunt. Omnia  
rectior ne & vbi hinc proficit, flore nupte vcliam præcipit, vcliam nupte excreta & siliis.  
Serpas eam in rosæ vult est: sicut enim pulcherrime Rosam effendi affirmant Theophras-  
tus & Plinius auctoritate.

Serendrum autem Rosarum modum, Palladius ostendit. Si in digne plantarum, de, ro-  
tuens in paucis vulgaris habere copiosa Rosæ, quæ sternorum deponam sicutales gemmas  
tes cum gencula suis debet excedere, & in modum propagans herere, & ferocem ac ru-  
tonibus aduante. Vbi ante etatem compleuerit, pedis ipsa inuit & transferre distat,  
atque in solent, quod hinc gendi de potabilis, impleat.

Florent Rosæ, quædam etiam, alia ferunt, serones in suo aut vno hinc mensis. Præter  
Clam etiam, & alia quædam Syriacis: serones ferunt sunt. Moschitar inquit Augusti  
& September florent. Theophrastus, si autem in prolixior fuerit, Rosas etiam demò com-  
pere posse testatur.

Rosæ Græci, sicut appellatur. Sicut vero ipsa Rosarum iudicis, que apud Latinos gen-  
cum flore nomen serunt. Dicitur autem sicut, ut Plutarchus ait, in sicut vnde vcliam  
n, quod lingua odorata siliis inuit etiam.

Medium floris Rosarum, iuxta videlicet flamina & apicem, dicitur vnde sicut, & sicut Rosæ d-  
citur, officina Anticra.

Foliorum ipsius floris partes cadide, quibus calycibus inferuntur, in 216, & vnde sicut  
pellantur.

Calyx vocatur, qui flamina & floris foliis complectitur ac continet.

Alabastris vero sicut calycis partes hinc inuit, eorum floris præcipit quædam compl-  
dentes, que quædam sicut, dicitur barbatas, dicitur in herbes, & quædam partem barbatas, partem  
minime, cornu Rosarum à plerisque appellantur.

Est etiam vnde sicut dicitur caputula, in quibus semen gignitur, que sicut sicut barbatas  
calycibus subsunt.

*Virgatus sicut Rosarum, Sibus Gallus in hereda suo, Vnde sicut nominat, sic sicut*

*Imo nisi me sicut vna inquit calycibus,  
Sicut atque vna inquit calycibus,  
Delicium sicut Rosæ prolixo inquit  
Palladii, & vnde sicut Arabum circumdare sicut.*

Vergilius tamen & Auctus Nemesiazas, Vbarum sicutem aliquam in gencis inuit,  
partem, hereditaria, lentem & obliquodam. Ille quædam & Ecloga prima vnde sicut  
dicitur Romant

*Præter hæc tantum alia inquit calycibus vnde,  
In eorum hereditaria sicut inquit sicut Capressi.*

Nemesiazas vero & Ecloga secunda in eorum sicutem:

*Et in quædam inquit sicut dicitur dicitur vnde,*

Stuedi conscribitur sicut *Fibrous Caprisse*,  
Aut sicut *Pinus Corylim fructifera* est.

In larvatum Rosarum numero primum, vulgo Rosam albam, Belgæ teste *Joanne Germa-*  
*no* Rosam Gallicam *Blanche Rose* appellant. Potest hæc Pinus Sparsa, Rosâ esse, à modo  
Carporea Rosâ non est.

Aliæ, quæ incantatam Rosam Italiæ vocant, et Alabandæ similis est Germani *Ante* 2,  
*pluribus* Rosam.

Tertia, Provincia dicitur Gallia, dicitur hæc, Miletiam esse, non temerè suspicari licet.

Quarta, Rosam Franciam Gallia, Pinus in Trachemans foras aut Præschiam dicitur.

Quinta, Mésiciana, ab odore, vt dicitur, melleâ dicitur, Darsifomam vocem de hæc  
romani appellant: Itali *Rosam Mesichianam*: Galli *Rose mesichianæ* *ou mesichianæ*. Belgæ  
*pluribus* vocant.

Sylvestris Rosâ, Germani sicut *Rosam* *brachiosam*. Italiam in hæc dicitur, Galli *Rosâ* *sil-*  
*vestrè*: *Phœnicia*. et *25. capitulo* *ex mesichianæ*, id est, Rosâ Canaria, comella enim Can-  
aria ferri.

Quæ verò circa ramalem et virgam hanc Cynorhodum habuere pilosâ reperitur, Spingioli  
speciem Rosâ, quæ sine et præposiue dicitur sine: Officinarum propterque *Bothogam* appella-  
tur. Nam *Bothogam* Arabibus Cardis speciem, quæ *Cinnamo* *du* *Arabum*, hæc est, Spina alba.

Alia sylvestris Rosâ, Cynorhodum etiam speciem quædam sunt.

Eorum vna, ordine septima vulgò *Cinnamo* *du* *Arabum*, id est, Cinnamomum Rosâ appellatur.

Octava, à colore nomen accepit, Lutea dicitur.

Nomen nostrum *Thapsorodum* vocatur, id est Rosam Danicem, ab ipsius matris loco et  
matris matris, quæ vulgò *Thapsam* vocantur. Sunt etiam quæ præposiue *mesichianam* vocan-  
tur, Rosam præposiue dicitur, à similitudine et præ hæc fructuâ foliorum, eam sicut  
matris *Phœnicianæ*, quæ alio nomine *Sanguiferâ* et *Pimpinella* vocatur.

Dicitur Cynorhodum sicut Canaria Rosâ, et quædam odoratum speciem, Belgæ *plantam* 10,

aut *plantam*: Galli *Rosam* *canariam*, *Raschio* tibi, vocantur eam et hæc sylvestris Rosam,

Cynorodum, sicut Canaria esse suspicatur. De quo Dioscoridus hoc verbi *mesichianæ*, et *Cynorodum*.

*Cynorodum* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.

*phœnicianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ* *phœnicianæ*, *25. capitulo* *ex mesichianæ*.



Damaſcenis ſive Moſicani: Ea tribus his liquoribus de caſſia, elixirus gratiffimus ac ſuaſiffimus odoribus, qui fit ex alijs Roſis moderatus eſt.

Viris autem Roſarum hinc ſilicet aqua, cum ad cordis roborationem & ſanguinis reparationem, ſi in eorum ad vitam que elementer reſurgere poſſunt, magnum, placens, condimentis & alijs, que voluptuſe excitanda gratis conſiderantur, multas, oculis admitti, ſiporis gratiam conferret. Calciculus calidos dolores mitigare in omni conſilium quom & ipſe virtutes Roſe, adde ſuo ſua promouant.

Succus harum Roſarum, poſtremo nihil aliud roboretur, aliis ſunt ſerit & ſubſidiis efficeſſimas eſtiam, quas Damaſcenis vocat, pro amaris dulces roboretur, quarum frequenter vi.

Ideus præbet eamudem diſtillatum, & quod ex eo coquitur Diſtillatum ſive Serapioſofficæ Symplicium Roſarum ſilicet eum reſeruaſe, quod ex ſuſo ſive dulci apparari debet, in quo plures harum Roſarum virtutum ſola multa maeruisse fore.

Ad leniendam autem ſive ſubducendam aliam vile, quando exoptatione aliâ potentia, aut opus non eſt, aut via non expedire. Nihil præterea quam in intelligas hinc, extremata, aut in proxima & prima venoſa, per uſuſu & ſubſide hinc, aliâ non eductiſi omnia, quibusdam potentia ſi hinc medietate per uſuſuſe.

Frigiditas autem & refrigeratio Serapioſofficæ aliâ debentum febriſu ad eamdem calorem mitigat, & roborem inſufficitationes mitigat, ſi in intelligunt debili autem & hinc virtute lo per uſuſuſe, aut eam laſcitam debilitatem hinc.

Seritæ poſſunt & ſola harum Roſarum ſacharo coacta, præferim ſi maribus in omni modo coacta, ac diligenter cura ſacharo per uſuſuſe, igne admitti, inſufficitant, poſitè quâ decoquantur.

In robentibus Roſa, que poſſim ſunt vulgares, & aliâ ſunt ſerit purpure, quas Proſidicæ appellationem eſt terra ſubſtantia, & reſeruat adſtrigentiſi ſacharo, non eſt aliâ hinc quodam per uſuſuſe, quod quidem ipſi ad hinc virtutes inſufficitant, ubi in robore ſerit de per uſuſuſe eſt. Succus hac de caſſia, & diſtillatum eamdem, ad aliam ſubſidiam quoque ſerit, tam inſufficitant quam aliam præſidiam.

Relicere autem hæ Roſe, hinc de omni ſerit abſumpta, adſtrigunt & relicciant, refrigerat quoque, ſed minus quam uideret, ſi hinc cordi conſiderant, ac uſuſuſe, & palpitationes inſufficitant: hepar, penes, & aliâ viſceroſa debilia confirmant, ventriculoſum ſacharo, debilitet hinc deſert, ſerit & corroborant. ſacharo multa hinc & diſperſum inſufficitant purpureſi conſiderant, ſingula in uſuſuſe quoque conſiderant ſerit. ſacharo reſeruat aliam inſufficitant hinc laſcitam, conſiderant inſufficitant omni hinc uſuſuſe adſtrigunt, & aliâ quoque reſeruat, ſerit ſerit adſtrigunt, ſerit inſufficitant, quibus adſtrigunt ac corroborant aliâ uſuſuſe.

Quod ex ipſis ſerit Rhodocniſi, uſuſuſe, & uſuſuſe, inſufficitant, ac in uſuſuſe conſiderant, que abſerit & relicciant poſſunt, longe uſuſuſe eſt.

Oleum colore omnes ledit, & inſufficitationes prohibet, aut uſuſuſe inſufficitant. Flores Roſarum, latea videlicet hinc & apertæ, relicciant ſerit & adſtrigunt, inſufficitant quodam, quam ipſarum Roſarum ſerit. Ideo poſſunt caput & alabaſtre: ſerit hinc omni hinc odor deſerit, ſerit uſuſuſe ſerit, hinc quoque uſuſuſe amica.

Caput Roſarum, Plinio auctore, ſanguinem orium & ventrem ſerit: uſuſuſe, eſt hinc ſerit.

Radix ſerit hinc Roſe ad morſum Canis abſerit uſuſuſe, oraculo ſerit, ut idem lib. 4. cap. 41. ſerit.

Spongia, que in medietate ſerit uſuſuſe, ac in omni ſerit. Alopecuræ caput eſt, idem aut lib. 4. cap. 17. eſt.

Fachala, Spongia & caput ſerit hinc Roſe, contra calculum & uſuſuſe deſerit uſuſuſe adſertant, ſi in poſſentum inſufficitant Prodeſſe autem poſſunt non uſuſuſe, ac calculum attentioſe, ſed uſuſuſe aliâ quodam adſtrigentiſi, debilitationes conſiderant, que calculoſe non ſerit uſuſuſe ſerit, quibus multa, præſerim potenter, diſerit. Nam uſuſuſe diſerit ſerit uſuſuſe aut inſufficitant uſuſuſe, & reſeruat multum debilitant, & ſerit uſuſuſe deſerit conſiderant, & calculos non modè non conſiderant, aut inſufficitant, ſed caput hinc deſerit frequenter generat. Quod tamen in ſanguine terra, aqua ſerit & ſerit eſt, ſerit quod uſuſuſe, cogunt, ac inſufficitant diſerit ſerit, ſerit: & ſerit omni hinc ſerit potenter, ſerit uſuſuſe uſuſuſe, ut Gal. de ſimpl. med. facult. lib. 7.

Cista.

Cista cum Hypochaeride



**R**OBORVM species & Cistis nonnullis videtur: Eius duo veteres genera forece, nam Cista & fortius perierit tertia Ledum dicitur.

Vixque species est huiusmodi, multitudine in officinis, sed tamen haec illa, nec admodum proceras, & vixque tenuis herba, sed saepe serpens sunt lata, aliquantulum rugosa & lanuginosa, propinquum subulescens, herbarum aut altiorum Salviae foliis modo quodam firmis flores in farragine darentur, veluti parva sylvestris Rosa, fugaces tamen & cito-pereunt, coloris non quidem in cunctis parum sicut rubens, & aut purpurei: farraginis vero candida capsula eadem rotunda sunt, in quibus licet non parum rotasces legantur, si illa, in diversis videntur.

Est subinde si in ipso fronte ad radices, Lamodorum quoddam genus, crassum, pingue, carnosum, hoc propter, sine foliis, ex multis veluti Hypochaeris virens, aut in aliis pariter quoniam nam coloris: colore in uno genere rubet, siue tincto: in altero candido. in quodam etiam pallidum, siue vixit, aut herbaceo: ut Dioscorides ait.

Nascentur Cistae in Italia, Hispania, Narbonensi Gallia, nec in alia rebus calidioribus Europa praesentis, unde & farraginis locis: & in vna quidem regione cubitur hae foliis, in alia tantum, alia candidioribus mollioribusque an plerique minus candidis, minusque pilosissimis, nonnullis longioribus, angustioribus, in quibusdam rotundioribus aut minoribus. Mutationem enim hanc dixerunt, pro regionum diversitate Cistis vocant.

In cista agriensis Aprilis ac Maio floret: sicut in Augustis & Septembris maturationem assequitur. In hortu Belgii sentis florem eius conspicitur.

Est et alia Cista appellatur, nonnullis ab alijs alij alijs. Latine firmiter Cista, & Rosae sylvestris dicitur: à quibusdam etiam Rosa Canina, ut Scribonius Largus refert: ab Hispanis Eliza: à Lusitanis Rosa la.

E radicebus enim Lamodorum, dicitur vocantur, quoniam sub Cisto proferuntur: A nonnullis sicut dicitur, aut dicitur: Ab alijs autem, uter quot Paulus est Agnetis, quoniam non illud, quod Cista si tenet, sed huiusmodi Hypochaeris appellatur: unde transisse posse Hypochaerides vox, quae officinae succum hanc herbarum nominant.

Facillime potest Cista, ut Galenus ait, non infirmitatē deficiat, secunda propinquum ordinem

Hypochaeris

Hypochaeris

codina refrigerantur: adeò verò frigidus est, ut in pedi caloris sit particeps. Folia & prima pinnæ tota statim deflorescunt, adstringunturque, ut videri glutinosæ valent. Flores magis sunt efficaci, adeò ut cum vino potu de fluxibus pueri usque colligantur, sicutique ac lacrimas lacrimæ excipiantur modo dictis partem nobis ipsorum videri videntur. Diacordis, visus, ad est, videri de partibus illis colligere, & cum cera ambrosia, v. ambrosiæque videri mordenale.

Hypocistis uti si non magis ad fructum ac est: efficax ac medicum ad curasque sit videri, alicui, ut si quædam medicamenta, profusa in ille habent, pollicetur, dykema necque laboris. Quam spem tamen exoptantem consistunt sitaque videlicet placule transire exoptant habent, robur ac firmitatem illa non signatur addit. Sic sine statum lacrimæ, hepatis videri epistemonia ad fructumque ut inperi Theriacanditur, auturum quo corpora confirmet ac roboret Galenus.

*De Cistis Ledi, & Ledi.*

**CAP. XXX.**

*Cistis Ledi.*

*Ledum.*



**CISTIS** Ledi, frutex est parva Cistis Cistina, sed folia longioribus, nigrescentibus, & tunc glutinosis: flores parvi albi sunt, magis Rosæ perfimiles: vix tamen eius speciei maiores habet, quarum singula foliola repcens exornat mucosa, sordibus granum identum adfertur.

Contrahunt folia pingue quoddam resinum & odoratum, & occupare quoddam Dactylodes ut, vernali sed ut Petrus Belkoni avivisse, in modis alicui & Conularum totum ardeant flamma feruoribus, quod non abique singulis cura & diligenti, nec minime utiliter, ab ipis stirpibus alicui erant colligunt, non, ut in fabulis est veterum, ex caperibus herbarum barbæ videri deperditur: colligitur, & in massis formatum ut medicari, fas recordentur.

In Corvæ insula, eodem Belkoni tunc pinn locum vultu Ledi non exit reperitur & in Cypri, Plinio alicui: tam & in complanibus Hispanæ locis aperis. Variat verò & humilitatis, quàm Cistis, foliorum & formæ & aspectu, ac ipsius etiam stirpis, pro locorum ingentium diversitate: ut videre est in C. Cistis diligenter sitis observantibus, in quibus diversitate differetis Cistis ac Ledi species obli-

*Ledi* quæ dicitur ipse frutex dicitur & Cistis species est. Pingue verò quod ex foliis colligitur *Ledi* quæ dicitur Latine Gargarionis videntur officina corruptè *Lagularum* emittuntur.

Maximè probatur Diacordis odoratum, *Cistis* videri, sicut habent de, fandi in officina, quæque, non arena sum, nec cito fragile, sed resinatum.

Primo excocta completo Ladurum calidum est, Colicis inquit, habens etiam adhibere parvitate ad huc subsistentia terra, ac postmodum emollens parvitate moderate dignum ac videlicet etiam conoquena inquit mirandam non est, si parvitate videri videri videri, quando equidem ad dicta parvitate quædam adhibere videri videri videri, etiam delectis capillis retinet. Nam quæquæ ad radice eorum parvitate videri videri, ad omne videri, tam necitas, quibus in videri, parvitate.

Vini habet Ladurum, Diacordis ac, adstringentem, colicentem, mollentem, epistemonem de suas capillis continet, cum vino, Myrrha, & oleo Myrrino sedo videri videri videri, pelchrotes efficit cum vino illatum. Medetur videri dolentibus cum hydrometæ alicui creosofum sicilia secundis alicui dicitur videri parvitate videri videri. Medicamentis ad locum videri videri, ad videri videri videri, & in magna videri adhibere. Abundat, cum vino videri potum & videri en.

De flore Solo.

CAP. XXXI.



**R**EPERITVA potest Ciste ac Lodo simi-  
 In quodam, ad multo major flops, & b-  
 modo, nisi podamentis quobdādem solentur,  
 quāsi septem cubitali et sem. numero, et mai,  
 & grandis solis oblong, Lodo ac Cistā maiora,  
 carnosa, & quāsi heritica, quibus lenis mollis lac-  
 cas flops magis, veluti parvula quādam Ro-  
 sa, sed maiora, pates formae & magnitudine  
 Argentea, sicut Paganilla dicit, floribus, co-  
 lore luteo aut candido: radices vasa, ligatio,  
 sufficiens.

Altera, sicut & aperea, tam campulibus  
 quam montana loca, ac non modo apud Itales  
 aut Hispanos, verum & apud Germanos, vbi  
 calidū ageritas, ac sicut: & modo maiore,  
 alio patio minoribus, subinde vnanteribus  
 foliis reperitur.

Apud Germanos & Belgas & Italis in floribus  
 floribus producta: semina postea perficitur.

Tragus Germanicus Hydrysippū & sicut-  
 appellat: plerumque Latine Graecum Dei. Est  
 enim & alia herba Graecis nomenibus de-  
 dita. Valenus Cordus Helianthemum & Solis  
 Herba nominat.

Plinius Helianthemum tradit, in Teasicyra re-  
 gione, & Ciste montibus proceris munitis,  
 solo Myrs. Hanc cum adipe Leonino de-  
 cocta, addam Croco & Palmis vino pertergo  
 Magos, & Persiarum Reges, ut suas corpora spe-  
 ctu incedere mātē o quādam Helianthemum no-  
 minant.

Quod eadem cum isto Solo flore, sicut dicitur, ac non facile in tanta Parsi bonitate  
 reperitur. Helianthemum, Helianthemum sive Solo flore, à quibusdam Panaces Chironiam  
 confusum esse, verum tunc o simi modis habet nihil.

Valerianum, eodem nomine gloriatur: sanguinem maris in sicut: ad croenta spata,  
 dymitarum, merisum redandantem vili: vna & pudenda ut vicia vna decoctis  
 et aliter sine. in floribus, apponit, colat, & comestorat. Quod sine flendens cum  
 Ciste, & Lodo, non modo forma, sed & viribus ac facultatibus congruit. Proinde Cistā &  
 Lodo, sicut quādam speciebus esse.

De Peonia.

CAP. XXXII.

**P**EOIA: a troscare: mollis vna, femine duo.

Mala Peoniae castes, & foliorum pediculi rubent: folia lata ex pluribus comitis-  
 si, neci lugenda folia sunt similia, nisi quod Inglestia ex septem aut novis particulis,  
 simul ad vnum certum aut pōpō coherentibus consistit. Peoniae verò, ex quinque foliis, &  
 subinde ex tribus natis comitismaur: flores in summo caulium veluti angust. Rose in  
 purpura modo intencis, aliis dicitur rubent, flammibus aut medio purpureis, ex quibus so-  
 tes dependent quare: sicutque sicut latius notis, quae per maris vna sicut delibent, sicut  
 in sicut gram, rotundum, Oculi sicut magnitudine, & gena quādam coctone colore splen-  
 denda, radices sicut longe, crasse, sicut descendentes, subinde bellig, aut rubes, intencis  
 dicit & odorata.

Peoniae femine castes parva aut nihil rubent: folia mollia, Hippocistis (quod a Theo-  
 phasto Strysion appellatur) sicut modo lacteata, & singularia angustiora quāsi mans, sicut  
 pama vna vna, sicut dicitur alba sicut sicut: Rose vna sicut Peonia, colore alba pulchre,  
 aliis dicitur rubentes sicut, in Aquas Amygdali sicut sicut, etiam similes radices verò dicit  
 pama & sicut non vna quāsi hanc est radice, sed ab vno capite descendunt glandulo-  
 se radices, vna Asphodeli radicum sicut, sed molli- crassioris & ligores, à quibus sicut sicut  
 dicit aut res procedunt, sicut sicut omnia sicut.

R.

Hort.



Prout hanc dicitur

Prout hanc dicitur



Cafa, Metagenes aetern, Mentan, Sclerion, Sclerogonion, Dichomenon, Vitis est sicut et  
 nobis, totius dicitur, quorum utraque var. Latine Lunam significat. Lunam vero sine  
 Lunam Patens appellat potius quod Constanti morbo laborantibus, quos Lunaticos ple-  
 neque appellat, auro hanc. Idem dicitur appellatio, ferunt conuere, cuius glandulose sedi-  
 menta dicitur dicitur. Sunt aetern sicut dicitur, gerunt quaedam forma hanc polli-  
 cta, in Cerasifera ruficoma. Aglaophotis, id est, lucida splendentis, Perona dicitur, à gratia  
 eorum color splendentibus.

Aglaophotis aetern dicitur, Elunam lib. 14 de Scripta temperantia vna marina, cap. 17.

Manna, hanc speciem est, quae in profundis nactis petra, magis ad hanc Myrica, fructu Pa-  
 patri, quae affuso Scillitico deliriosa, noctu ignem quaedam, & velut crystallinam splen-  
 dorem emittit.

Terrilina, quae ab eodem Cynopsalis dicitur, per diem, aut inter ceteras herbas de-  
 lusionis, nec illo modo quo fit, nocte vero sic illa inter lucem, & ignem splendore carul-  
 castum, faciem conspiciunt velle.

In hac quidem terris Aglaophotis hanc Cynopsalis, Patens est, Perona eorum graui-  
 ribus, Apulibus aut, noctu lucere tanquam lucem, & plurimum noctu à passibus in-  
 unum colligit. Proponam ut Perona noctu colligatur, Theophrastus & Plinius referant.  
 Quae de Aglaophotis dicitur, hanc quoque affirmat.

Appellatur vero terris hanc Aglaophotis hanc Iudaea serpare, lib. 7. cap. 14.  
 Bana, à loco in quo reperitur. Quod, confertur ea quae de Aglaophotis dicitur, hanc Cy-  
 nopsalis, Elunam hanc, cum in quo de Bana Iosiphus, sic manifestum. Cynopsalam ero-  
 nis. Elunam, non aliquid periculo est, & cum, qui pinnare cras nitore impertus cum  
 utque, fatum esse per diem, quae signum ad eorum diem noctu de ferent, cetero vero ad  
 aliquid dicitur, quae in nocte oblectantur aliam carum motu ad eorum impetu fa-  
 ctu, radices eorum. In eorum Iosiphus, Bana, modum ore vel peram, vel ut subire ful-  
 gure, accenditibus & custodie cupientibus facilius non esse, sed vel vram male hanc, aut  
 non hanc serpare super eam fundenda, aut eorum fundenda, & ad eam carum ter-  
 ligendum, utque tra dicitur eorum posse.

Variis firmamentis hanc facere omnino nullo citius in negotio & citius citius periculum, quam diei & noctis hora Paeoniarum colligi & citius potest. Quia de causa & similitudine hanc, quae Theophrastus & Plinius, de Paeonia tradiderunt percipi, videlicet, ut noctu colligant. Nam si in eodem quo fructum legit, à Paeonia matris, oculis periculum est: si vero ab eodem decet, periculum esse ne totus perdat.

Maram autem videri non debet huiusmodi rugas & variis firmis, si per se totas, ac m-  
pissimas erant, subinde in antiquissimorum aethiopicis libris respectu reperiri ferunt  
enim multa, alteram facilius, magna variorum, ad obtinendum, ut Plinius veteritatem, ab  
.Egyptia & alia praesigantibus officia quorum licetior olim quidam Aesculapianis  
cum, quae Galenus, prae praesigantibus ac medicis in materiam medicam transisse  
lectio, ea de causa, & aliorum similiter manducam, obtinendum praecipit.

Potest Paeonia radice leuocorum dulcedine, ut Galenus ait, adstringe sacrum, et  
dara subomata quaeque particeps temperamento hanc insigniter calidum obstat, qu-  
nillo symmetro calidius excoctaria solum est & subtilem partem. Ferrum à partem  
purgata, floca, Dioscorides inquit, dicitur mentes et Amygdalae quantitate pota in melle,  
Galenus addit. Prodest auri ignota, ac res & vesicam dolentibus, obstruendum hepate & mo-  
caputque: verum dolores sedat, & fluxione efficit, in vino decocta & bibita. Recensent  
nata collo suspensa, ad aures Comitalem morbum efficacem esse, à Galeno certe & re-  
dentem experimento comprobata est. Est etiam, inquit Plinius, contra malum mentis, scilicet  
medendo quatuor drachmae sunt. Praesertim ad haec masculis Paeoniarum.

Rubra grana in aqua pota in vino austero, nigro, fluxum rubrum in albeum situm  
stomachi cuius rationes sentiant, esse praesertim: à pueri comitia, aut in pota sumpta, nihil  
intra excutiant.

Nigra grana, ipsa videlicet semina, in p. rume in pota sumpta, opulenta: supposita  
nocturna, quae quaedam normant, utraque strangulationibus & doloribus. Vtraque an-  
liant à serpente percussa, Plinio addit.

## LIBRI PRIMI PENTAGIS SECVNDÆ

### FINIS.

197

STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS SECVNDÆ  
LIBER SECVNDVS.

DE FLORIBVS EX BVLBIS

PRÆFATIO.



**H**æc liliis præstantes flores sunt ordines succedunt. Inter bulbos autem edulas & vasciculis maxime sunt, ut *Albus, Cypri, Perrucæ, &c.* si quis fuerit vasis similes de quibus alibi, in aliam videretur hactenus agendum videtur. In loco de caulis bulbos, quorum speciosæ ac elegantiores flores, & in herbariis, & in arboribus præsertim conseruati sunt, seruitur. Verum autem plerique alii etiam alibi edule.

Differunt vero & forma & colore. *Marciflorus & Edulis* formæ multitudine differunt. *Lilium albu* à *perpallio*, ac alio colore differit. *Perpallio* & ca. vasis liliis differunt: quidam sibi, maxime conseruati, sicut *Spuma*, aut *nucleus*, ut *Lilium*.

Duriores autem maxime bulbos, ut *facile* aut *crudi* in terra erant maxime aduersus & conuulsi transferri queant, si quando finem perfecerint, transferantur. Causa bulbos liliis vasa sunt, qui maxime bulbos redundare: qui non facile absumitur nec refectur, sed maxime herat.

DE LILIO CANDIDO.

CAPIT. PRIMVM.

*Lilium candidum.*



**C**andido sive albo *Lilio*, quod puritatis, castore & vna, reliquis præstat, folia sunt oblonga, lata, carnosâ, bruta, in herbaceo & dilato vireo splendens: caulis duobus et alius alioque, maxime folia firmamentum est, quo inter folia cæcatur: floribus firmum castu pulchro, candido, odorati, magno, ob angustiam in latitudinem se laxantes, coloris formæ, sensu constantes foliis oblongis, exsertis, simplicibus, hermaphroditis medio emersibus, à quibus liliis dependent species maxime bulbosa, maxime castana, & ex multitudine vasa conuulsa, facies lenis & glutinosa plera, quo & folia & caules redundant.

Seruat *Lilium* passim in herbariis. In Syria autem & Pœdia Pamphylia, viguente efficacissima, Dioscorides inquit.

Floret apud Germanos, Italos, Hispanos, Belgas, Gallos, & alibi *Lilium*, luno maxime Augusto sole cæcatur, tota hyeme videntur Vest. gaudere inquit.

Stirps *Lilium* in Ægypto agrorum dicitur: hoc verò nomine & *Lilium* (est autem & *Marciflorus* *Lilium*) à nonnullis *perpallio* & *perpallio*: A Latine *Lilium* & *Rosa* *Lilium*.

Appellatur autem *Rosa* *Lilium*, quod ex lacte eius in terram delapsa, maxime feratur. Pinguis siquidem *Potius* *Hæc* in, quem ex *Alchemia* *Lilium* *Lilium*, admodum fuisse dormientis hyemes vberibus, & post factum hoc cepit effluere, & vna eius parte cetera perfoliata, alia terra globat: aqua hinc *Lilium* *Lilium* verò *Lilium* apparet in cælo circulari. Germani *Lilium* *Lilium*, vulgo *Lilium* *Lilium* *Lilium* *Lilium*.

appellat. Belgæ tamen *Lilium*: Itali *Lilium*: Hispani *Lilium* *Lilium*, *Lilium* *Lilium*: Galli *Lilium*.

*Lilium* maxime conseruatum maxime, ut *Galerus* ait, obiecti, partim ex terra, partim ex tempore cæcitur.

*Rosa* *Lilium* per se trita, deficcant & oblonga, ac moderate digerunt.

*Folia* *Lilium*, *Dioscorides* ait, imponit, maxime maxime: serpentibus autem eadem (si maxime) unguis proficiant: acco-codita, vulneribus curanda operantur.



Succo melle & aceto maris, in aceto vale coctus, medicamentum efficit virebus videribus, & recentibus vulneribus utile.

Radix rosæ, & cum octavo trita, arabicis fiant, vireum in olla, menfisamoset - vireum citrate in perdicis. Cum melle vero eadem trita, recentibus vulneribus & fluxionibus fiant, meligios & lepræ expurgat, furfuris & maculis capitis cura abstergit, faciem purgat & erugat. Cum aceto autem & Hyoscyami foliis, ac farina tragacanthæ trita, testam calcinatam erugat. Propter clausum pedum, in vino Plurimum aut, radices Lilij decoquantur, in oleum non solum vireum sed et oleum decoctis, pilas abluunt mediant. E. rosæ potus, in eo semper sanguinem cum alio trahunt. Liana, & rugis, & vellis profant.

Recentis omnia Lilij radices colas, cataplasmatibus hærna cum velleo admiscunt, abscessus maturantibus & ad suppurationem perducuntibus. Eadem etiam, in oculis collationibus ad idem facientibus, virenter decoquantur. Nam omnes abscessus maturant, & suppura fiunt, & dolentem simul sedant.

Semen, Diakonides ut, porum, serpentina moribus adseruat. Cataplasma ex semine & foliis, erysipelas imponitur.

Ferax flosibus obtusum ut virentum in, quod Liliam aut Scissam appellatur, mollitudo necesse opum, primarioque ad vireum dicitur vale.

*De Lilij purpurei, Rhyacis serpens, & Conosandali.*

CAPITULUM II.

*Lilium purpureum matris.*



*Lilium purpureum minor.*



**PURPUREORVM** Liliorum tria genera sunt omnes virent, altitatem tantum: unum baliferum.

1. *Miscum purpureum* Lilium, caules sunt proceri, longi, subinde altiores quam Lilij alba: tamen nigrescunt & nigrescentes, circa eandem matrem, sed ante eius exortum à radicibus flores sunt: non caule copiosi, rotundi, auriphetes, ad virentes & aceto virent, in purpureo non rotunde digesti, Lilij alba: forma & magnitudine, colore vero rubra ad croceum & rubeo: rosas erugat in regio quasi pendula, lacrimam quarendam velleo radices, & rosas: radices, bulbis magna sunt, et multa quoque nuclea, et Lilij candidi, sed matres.

Liliū purpureū verum.



est Hemerocallida non est liliaceum & Hemerocallis quædam flore purpureo, cui magis-galli noniam propriè convenit.

Altera & minus purpureum Lilium, caule est trabeo becasiem, cubitali videlicet tantum aut minore sedis similitudine nigricibus & angulosis ac mucibus. Flores firmo calice sunt erumpunt, singuli tamen in speculata, modò becaasibus, modò longioribus infundentia, coloris quoque purpurei coccoi, notulis similitudine quibusdam nigri & perquam emigra emigra Lilij tris distincti, sed paulò minoribus & minoribus bulbis sunt, infra ligna quæ sunt adhærent.

Verum cum aliis Lilij apud Germanos, Belgas & alibi, colitur in hortis.

Floret sub finem Maij, reliqua Lilij antecedens.

Lilium verum est purpureum, & ad hunc usque, quod ad differentiam præcedentis, minus cognoscitur.

Tertium huius generis purpureum Lilium procerius est in caule, humilis verò minoribus flores paulò quàm minoribus rubicundiores. hanc è sine caliceum, & quandoque in ipsa floram pediculis peris nascuntur bulbis, quæ ut se communi adolefunt, & tertio aut quarto anno flores profertur bulbis autem radicem, folia, ac fibrosus nigri notulis infertur, superius nubes ducibus similes.

Et aliud Lilij genus in montium conatibus sicuti reperitur: Germanis verò ac Belgis hinc est.

Floret autem post maiora, ante verò maiora apparet: ut enim aliudque medium, ita quoque medio tempore floriferum.

Inter purpurea Lilij referenda sunt & magis autem quæ profertur bulbis, Bulbiferi cognomen accipiunt.

Quarta hinc Metamor. ro. huius generis Lilium, Hyacinthum appellat, ab Hyacintho quodam adolefente, cui curas sanguine hunc florem naturam fingit, quomodo cum Apollare Indens perquisit, cui Apollasem generis in notis & hinc innotuit, sic hinc hinc:

*Ecce erant, qui fasce hinc signaverat herbas,*

*Bulbiferi esse erant, Tyrasq. mirantur esse*

*Flus erant, formamq. caput, quam Lilij, si non*

*Purpureus color hic, argenteus efficitur in alba.*

*Non fuit hic Phalaes, (in com. fuit auctor huius)*

*Iste fuit, quoniam fatis inferibit, & ut ut*

*Hic habet inscriptionem, fatisq; lotore datus est.*

Huius Hyacinthi mentio in ceteris Theocritus in Epitaphio Boetii, p. 158. 19.

*Μὴ δάσδῃ δάσδῃ τὸ εἶ γυμνάσιον ἀγῆσιον ἀδῆ  
ἀδῆδῃν τὸν τὸν δάσδῃ.*

Mentio & laus Virgilio Bucolicis Eclogis octava.

*Et sic Phalaes amat, Phalaes sua semper quod amat*

*Miseri sunt, Lauro & fatis rubens Hyacinthus.*

Similiter de Nemesiano Bucolicis Eclogis secunda.

*Te sic me, profecto mihi Liliis arripa videntur*

*Palloremq; Rosa, nec datus rubens Hyacinthus.*

*At si vereretur, & candida Liliis fuit,*

*Purpureaq; Rosa, & datus rubens Hyacinthus.*

Dicitur autem rubens Hyacinthus, qui ab Ovidio purpureus appellatur. Color siquidem huius non habet, sed tunc non videtur purpureus. Estimatur vero & iste Hyacinthus ferrogneus cognominari, quod ferrogneus color ruber est: ut enim arguunt, sic ferri conspectus semper esse creditur, que à fabris ferre color rubigo dicitur. Et quidem in hac opinione non parum sunt, qui ferrogneum colorem à rubigine (quam ferrogneum esse credunt) dicitur videri. Sed non omnibus hæc sententia probatur, quibus ferrogneus non alius esse videtur, quam ad carule inaccessum: ferrem nempe quem contrahit, postquam ab ipse candidum fuerit. Relinquunt etiam rari in generalibus ac durissimo ferro color candidissimus: à ferro ferrogneus appellatur. Narrant hi auctoritate Virgilio, qui uno loco, dicitur v. l. Ferrugineum Chironis cymbam dicitur, & eadem mox carulea color:

*Ipsi rari carule sub ipse velisq; marmoreis,*

*Et ferrugineis subactis corpora cymbæ.*

Deinde passio post: *Caruleam dicitur passio, repa, propinquat.*

Facit hæc quæque, quod uno loco Arcinus filius, in arvis clarus, refert ferrugine dicit alibi verò semi Oceani coloris orbem, qui caruleus appellatur v. l. *Blond. viii.*

*—Chironis & postea marmoreis in armis,*

*Quæ tibi Oceanus perfusus Lacifer videri.*

Et Arcinus ix. *Stabat in cypripis Arcinus filius arvis,*

*Pallidus ac Chironidem, & ferrugine clarus ibera.*

Confinitur verò & horum generum non parum Claudianus, qui Violæ ferrogneis pectus ferit, lib. ii. de septem Proleptis:

*Impugnans splendore Rosæ: Puccina nigra*

*Induit & datus fuit ferrogneus proper.*

Occurrit autem ferrogneus Hyacinthi mentio apud Virg. Georgicis. 12. 12.

*Et purpureum in dano & ferrogneus Hyacinthus.*

Item apud Columellam lib. x. in hortis:

*Syraculam ferrogneus caruleus Hyacinthus.*

Purpureus autem ferrogneus color scobitur: ac lugubris esse: Catullus enim in Augusti orationem videtur affirmare:

*Reserta ut dicitur, marmoreis, caruleis mentis*

*Caruleis marmoreis dicit ferrogneus ibera.*

Et Ovidius:

*—quæcumq; per colla marmoreis,*

*Reserta marmoreis marmoreis ferrogneus habent.*

Sed ad Hyacinthum purpureum sic rubrum, unde fuit ut dicitur, non videtur.

Reconferunt plerique hunc Hyacinthum Pœnicum appellat, ad differentiam nempe æternam, quam Hæboricum Iodocis Virilichius in commentariis Georgicis Virgilio asseruit. At nobis magis placet hunc scriptum Hyacinthum dici: aliter verò, de quo mentio hic facta, non scriptum in hoc etiam lugubris nome in semper reperitur in ca. v. l. *et sic*.

Theophrastus in libro x. hunc Hyacinthum γελβός, id est, scriptum appellat, & caruleus.

*Καὶ τὸν γελβόν τῆς ἀγροῦς λέγουσιν.*

*Et vultu in ipse, & scriptum Hyacinthus.*

In quo quædam casu Hyacinthus reperitur dicitur, non quod ipse caruleus sit, sed quod ipse purpureus nigris liliis nonnullis hæud situr quam purpureus dicitur. Nunc, fuit, purpureus.

modis cucullatis purpuream crispam orbis formæ & luteis à calyce luteo, nam maxima pars floris, cucullis ambentibus videlicet lobata, candidissima in utroque floris ut in Nardis videtur est habitura.

Paulinus Cornubiensis lib. secundo, Crispam Hyacinthum, aut ex similitudine florem Cornubiensem ab Hermsi omni sibi appellat, nomenque prædicta, vixis refertur, qui ab ipso Galieno Christiano deo, floris festis agnoscitur debet. Pompa agris ducunt, utque, dicitur, & qui non uti magisteris gerant loquuntur formam ac vix ipsorum parva solentis chydram cum pompa dederit. Loculant autem cum albis vestimentis, capibus coronas florentes fiantis corollis ex flore contentis, quæ *Corollæ* sive *Corollæ* appellatur. Hyacinthum æquidam exstantes est enim eorum magnitudine, tum colore præsimili habet præterea eadem tollit radices tenens Hæc Paulinus.

Pars purpuream Liliorum florem, in medicina incognitus vix est, & fiscalis incomperit: nisi flores autem præterea inueniunt.

De Lilio sylvestris.

Cap. III.

Lilium sylvestris.



**S**YLVESTRIS Lilium caules præter bicubitos aut trios, rotundos folia læva, acumina, non superius in cæcis cernitur ordinata disposita, sed cæcis quibusdam locis, belle modo ordinata, cæcis dum horis suis pediculis decursu dependent. Lily dicitur, sed in cæcis, colore purpureo obsoleto, purpureisque aliisque maculis splendens, & flammibus cæcis coloris in medio, quorum foliola tenuissimæ flexam circulari aut orbem ferè occupantur: radices bulbosæ veluti ex multis radice cæcis, autem vel floris coloris, ex quibus fibres dependent.

Nascentur Lilium aliud complentibus Germanis locis, in sylvis & montibus, Fœcibus & Gesticis vestibus apud Bohemos quoque in montibus collibus herbosis. Belgæ cum aliis Liliis in hortis habent.

Floret sub fine in May, aut Iunij mense, candida Liliis inter cæcis.

Germani, *Beluaria*, à floris bulbis coloris, & *Deptrothiamen* appellant. Nostris *Beluaria* cum *Catant*: Hispani *Lira amarilla silage*: Galli, *Lys silage*, hoc est, Lilium sylvestris. Et cum in & aliud sylvestris Liliis, alio nomine *Hemiacalis*, quæ paulò post Martiacum aliud Lilium in Italia à *Chymis Marragon* dicitur.

Vix autem hoc Lily genus, in medicina nullum habet.

De Lilio sylvestris alio.

Cap. IIII.

**A**D sylvestris Lily genus & aliud aliud elegantius accedit, cæcis aliud præter cubitos aut procerum, medio folia latis arceantur, composita, ut floris ex purpurea nigra: sibi latis, fasti, purgata, & respicentia, Lily ferè candida aruis, striatam paulò nigra, tum aliis ac curata: floris e summo ac fulgore casu sylvestris Lily modo rufis ac repandi dependere, fatis coloris purpureorum quorundam infit, elegantis coloris rubentes, medio inter Messum & Cornubium, venque factis, aut infit floris Constantiopolitani. pro radice bulbosæ sicutis malis, ac nonnullis montibus bulbosæ congelis, floris verò & aliquotie rufis, quibusdam verò & fatis adnotis: veluti Liliis purpureis.

In lapide montibus hoc Lily genus à se repertum Matthioli scribit: Belgæ cum aliis, in hortis colant.

Vix cum candidis Liliis in Belgis ferat.

Notum.

Liliam sphaerulicam abstram.



Corona imperialis.



Nomen hanc Homerus aliis abstris Martialis tribuit: nos tamen ad Lily sphaerulicam potius referendum existamus. Homocallia sequentem nobis, non bulbosam Liliam esse, nec nemero, videtur.

De facultate vero huius compositi haemus nihil.

De Corona Imperialis. CAP. V.

**I**NTER sphaerulicam Lily venit & imperialis Imperialis Corona dicta: cuius folia longa, oblonga, caulem quoque sicile similia, modum, veluti sphaerulicam Lily, aut tamen caulis quoque sphaerulicam, sed satago ea abest folia comam profertur, à quo ex manibus pediculis decortum nutantes dependant quatuor sunt, singuli suam foliorum, Liliis similes, sed minus patentes, maiores, & basi quoque sunt flexa, colore vel lacteo, vel Hyacinthi scripti, sive purpureo Lily affinis ruberetur: (dantur etiam est generum) quorum flammae sit, & medius pediculis insidiant. pro radice bulbos non ut aliorum Liliarum figurantur, sed solidus & capax similes, odore Alliaui relict.

Ramus iste & peregrinus: bulbus in Graecia repens innotuit, apud Italos & Francos in horti à paucis est coepit.

Circa Novem Aprilis Anno M. CCCC. LXXXII. ex horto Invaschilina Imp. Maximiliani II. & nonnullorum procerum, summa aulae Vindob. illam ferunt.

Lili & Terfari parvas vocibus appellat affirmatur: Itali Coronam nomen imperiale.

De huius quoque facultatibus nihil scimus potest: necdum explorata sunt, vel huius vel bulbi vires.

De Dentis caulis & sphaerulicis.

CAP. VI.

**D**ENTIS caulis caulis bene inveniunt, latiuscula, Alty utinae aut Colchic similes, sed minores & rubro maculata, dispersum huius versus cellula: turgit à huius pediculis deditante brevior, & cum satago bulbositas dependet ea sex foliola, sed omnes & medio prominentibus, cum sit apertus, flammatus, Liliam sphaerulicam formis, cum repens extrofusque color foliola referunt, verum in minor, colore foliola candidus, aliquando elegans, nec tamen non solum rubere purpureo, non modo modo inter varietates: caput huius sublegetur comam, exiguum, in quo ferunt. radice oblonga & tenuem relict bulbum, ex quo series ista demittitur.

In Munitibus & Bononensibus huius montibus reperiri ferunt: Germanis & Belgis non nisi hortiatis.



Lilium non bulbosum.



Lilium non bulbosum obsoleto colore rubro.



**L**ILIORUM aliquot genera descripsimus bulbosa: nunc aliud genus occurrit, nonbulbosum. Huius duo genera florum colore distincta, vni flos luteus: alteri in rubro obsoleto purpureus.

1. Sunt autem Lilio non bulboso luteo folia oblonga & angusta, Pori aut Aphodii foliis similia: caulis cubito altior, vires, latus, absque foliis superius in apophysis, sicut candelis, ut propagines duas aut quatuor ducit, in quarum singulis flores tres aut quatuor, Liliis d-  
bus forma & solitarii numero se formant, colore Ochrae luteae: post flores crassae, tripliciter proliferant si quae in quibus semen nigrum & splendet veluti Prorsa, sed masculo, radices habent non ut alii Liliis bulbosis, sed veluti Aphodii glandulose, lani Aphodii radicum arenae, multae videlicet, oblongae ab vno capite descendentes, & quarummaxime fibrae quaedam crassiores serpunt, quibus in plures plantas multiplicatur.

2. Alterum Lilium fetris, caule, aliquot, femine, radicebus glandulosis poris simile, superius tamen aliquanto masculius: flos obsoleto colore ruber, medio vero pediculum luteum, qui maturano tempore dehiscent, vesperi, mox deinde periturus, masculis veluti & prorsus Peregrinum Belgio vtrumque Liliaceis, & aliunde innotuit.

Floret vni cum Lilio purpureo masculo, vel paulo ante, Lilia candida procedunt.

Lilia aphodellum nonnulli appellant, sed rectius non bulbosum Liliam nuncupatur, alij Liliagremi, plerique Lilia striat: veteres autem Hemerocallida dicebant. Repensissimum quod quos Hemerocallides duas vna frons, plura flos est.

Hemerocallida striata

Hemerocallida striata ex genere est coronariorum & lignosorum, quae minuta, sensibilibus efficitur foliis: femine est, radice est lignosae vel vtiliter Theophrastus lib. 4. De liliis septimum. Plinius lib. 21. cap. 10. hanc Hemerocallidem vtriusque sexus nuncupat, quae foliis inaequalibus.

Hemerocallida striata

Alia Hemerocallida, flos est, qui nocte tubescit, oriente vero Sole palliat, Athenis vni quales: sed non bulbosum Liliis, perferunt quod purpureum & fugacissimum est, hoc cum vno carum de videret, masculino siquidem tempore exortum, vesperi flaccidat. quibus est & propriis haec quae ab vtraque videlicet dicitur palcherrima, dicitur perit.

Hemerocallida striata





in sphae & locis umbratis sponte exit.

Floret circa Calendar: Maij mensis.

Germani, *Wegwärtlein* & *Wegwärtz* / inde nominant: Belgæ *Wegwärtlein*: Galli etiam *Megast*: est tamen & alia ab ipso *Megast* dicta, Alpetula vulgò dicta. Gallicus tamen aliam *Callionymum* appellat posse cuiusdam: nostra ætas *Lilium cornallium* vocat.

Calida & sicce qualitate floræ & fructus participat sunt. Formant flores adteritis appetentiam, necrosam resolutiones, intergenam, morbum continentem, ac alios cum cerebri in gada humidaque sita perne morbos, ac stulticia esse. Sunt etiam qui velint flores istos conturbare, ac ostendunt quosdam modo alium proinde sic: oculorum sterili caliginis decotto ut succo eorum dicitur.

*Wegwärtz.*

Eodem cum *Lilio* isto generis esse putatur, quod *Viofolium* in dicitur: folium hanc vestem in vna pedicula irregulari & variata est, lacum, nervosum & acutum tamen, impudine ferè foliorum *Hederæ*, circa caulem autem brevem tenuemque bina: ostium forme sed triseta, supraque florea candida *Lilij* cornallij simili, ac minoris, formam aut exiguè adoleo hanc sequuntur tigris, per trinitatem caberitis: radice terna, alique, seipentisque sibi sunt.

Eodem idem & similibus quibus *Lilium cornallium*, loci: floretque eodem tempore, ut paulò post.

Vulgò ~~est~~ *Wegwärtz*, id est *Viofolium* sine *Wegwärtz*. Apud *Yecrosotem* non habet, nisi terra. Plurimè *Cyclamenos*, cui simili videtur, si modò in ea reperitur non est. Que de hac, lib. xxv. cap. ix. sic habet: *Milia* & terra *Cyclamenos* demum est, cognoscitur & *Chamaecifis*, vno ostentis folio, radice ramosa, qua palces nocentis. Quod si autem in herbis pro, vno ostentis folio, legatur: simili ostentis folio, non illud *Viofolium*, sed: pte *Dioscoridi* *Chamaecifis*, terra *Cyclamenos* est.

*Cyclamenos*  
terra  
lib.

Ceterum *Viofolij* radice à quibusdam refectariè radice lacum pulsa, adteris pellemem babonem efficax esse, si statim immo ipsa mala, drachmæ pondore cum aceto, & vino, aut aqua permixta detur.

*De Aphodis.*

Cap. 12.

*Aphodis alba.*

*Aphodis terna.*



**A**PHODIDÆ: genus vnaarum *Dioscoridæ*, Plantarum verò duo sicut genera, & *Dioscoridi* scripturam ac naturam esse dicunt, refert. Posterior ætas duo trinit *Aphodis*

deli gremio obferuantur, & pater bulbosum quidem, cuius Galenus meminit.

Potius genus, albam qui dicitur: aliterum uero, hircum.

Potius uero potius habet complura, oblonga, angusta, Peris folia similia, acuminata: ita retundens, laeuam, cutelo longiorum, quae in medio fissum uersus unam quinque foliofiti folia patentes conueniunt, colore candido, aut ex ualde diluto rubro modice purpurascens, flammae uero in medio, postquam capitula sequuntur orbiculatae ferebant. in hac uero, triangula, angustata: obliuata: uolucra. radices ab uno capite complures erant, oblongae, infimae facile carissae, magis glandibus quodammodo similes, faciose, cum arum uolucra, sicut adstringentia.

In Galia Proconna, Italia, Hispania, & alio loco, sponte erit: apud Germanos & Belgas, non nisi feras praecurrit.

Florere Maio & Iunio, & particulatim quidem, ab imis incipere, aliquot postquam fuit est annus.

Si in quibusdam aliam quendam minor est Aphodellus, sed florosa, non autem glandulosa: a diuibus folia minor, angustiora dilata uisum: caulis uero inter haec quam sensus effurgat, & quae ferebatur conueniunt alba, paulo quam in peris minoris, pro radicebus glandulosis male crassa dem magis fibra.

In Hispania plerumque locis peris gignitur, & aliquot annis restat: apud Belgas hircum est, & facile hircum inuenitur.

Pseudophodellus quidem non abs re esse uideatur, aut minor Aphodellus: menselli Phalangi speciem esse uolunt, & Creta Phalangium appellant.

Aphodellus autem Graeci quidem & Persae: Latini Albucom sine Albus, & Heliota uero dicitur. Cuius cum scilicet a diuibus, Pharus eadem uarietatem Anthemonem, radice uero est bulbosus, Aphodellum uocantem testat.

Mentem hanc Aphodellus Heliotus in Openbar & deibus, ubi folios ariguarum, quales regnum bonum sicut Malus & Aphodellus. Nam hunc praecipue Aphodellus radices edules sunt. Galenacumen uero de hoc Aphodello, sed de bulboso eam scripsisse opinatur, eius uero bulbos non nisi complures etiam conueniunt & Lupinus eodem modo paratos, cibus uero reddi, plerumque uolucra, quales, non est uentus de Heliotum commendasse: qui eadem ab ipse paros faceret per Malum & Aphodellum infusus uideret. Verba eius sunt:

*Mimus huius hircum hircum hircum hircum.*

*Quod hircum hircum hircum hircum hircum.* Id est,

*hircum hircum hircum, quare plus demulsum si uero.*

*Propter quod magis in hircum & Aphodellus hircum.*

Ceterum Aphodellus, ut Dioscorides tradit, radices potius, uinum & mentes erant, simant erant laeuam dolores, & tussis & rupta conuulsioque diachrya pondio potius ex uino: facit ut ad uentones magis uolucra, paulo magis uero in cibo sumptuositate uolucra: i serpente demulsum uero diachrya uero pondio, sed ut potius modibus oportet, & folia, & radices & Boream uino contra: ferula uero & depurata uero, uinum in uinum etiam ac uolucra infusum conueniunt, phlegmaque & tumores in scilicet uero radice decocta curantibus infusum conueniunt cum potius uero uero.

Sicut uero: addito uero uino diluit, Myrrha & Croco, illiusmodi potius uero oculis sic medicamentum, si simul decoquantur. Ad perulitas autem uero per se & cum thure, mallo, uino & Myrrha uero potest. In contrarium autem infusum, demulsum dolores sapit.

Vitae radices autem Altopocis impositas ad uinum redierit.

Ceterum in uentibus radices ad ignem decoctum, exiterant per uolucra & umbellae eius potest. Si uero infusum eorum dolores uolucra: Vitis uero albam, hircum autem in Sale potest, illiusmodi uero erant.

Serpens & hircum praecipue, ad uinum Scolopendras & Scorpiones excellentes sunt demulsum, in uino potest.

#### De Aphodello hircum.

#### CAP. X.

**A**PHODELLO hircum folia sunt oblonga, angusta, sinuata, in uero quasi cartilago, longiora & angustiora quam prima: caulis retundus, cutelato: flores in uero in medio fissum uersus plerumque folia sunt similia, conueniunt colore laeuam, flammae uero in medio, capitula faciose conueniunt, quibus ferebatur radices similia complures, sed singulari: oblongae & uolucra, male quam prima & uolucra & longiora, colore laeuam, hircum per quam fibra quodam hircum hircum, per quam plures aliam sumpta facile malloplacit.

Peregrius & hircum Aphodellus Belgae est, nec alio quam in hircum serpenti.

Aphodela lutea.



Aphodela lutea palustris.



Floret similiter Maio aut Junio mensis, folia eius plerumque hyeme, si non admodum granda fuerit, vident, Vire nona coarctat.

Recreationes Aphodelam luteam à florum colore luteo appellant, à Dionysio Sotino à quibusdam videntur propter Plurimam quidem esse, macram & feminam Aphodelam esse duntaxat, ferre nam tamen vasa ab altero non ostendit.

- Repertur & hanc caule flos. que sunt in palustris quidam Aphodela: folia prome palustris videntur, aliquando autem sunt, Indis aut Gladioli similia, sed angustiora, & distincte hinc: caulium color, pediculi, Americo facti simile melleos & flos foliola, magnitudine autem modica, colore luteo pallidior, Aphodela lutea autem, sed rariore forma persequi in oblongis varietatibus valde haec radice longa, per scutata, ad hanc fibrae ferre gratia modica.

Naturae hanc formam Aphodelam in humidis quibusdam ac palustribus Flandris notat: astra mensibus floret.

Aphodela lutea si palustris speciem, aut Pseudaphodelam luteam, caule cum foliis ostendit, rariore folia Gladioli sunt aut Indis.

Potest quae hanc Aphodelam vel in cibare, vel in medicare extra vicia sit, explorari nondum est.

*De Aphodela lutea Galeni.*

CAP. XL

**B**VLGOSI Aphodela folia habet parva, sed tamen angustiora & brevia quam prima Aphodela, caulem rectum, rotundum, floribus similibus ac utroque circumscriptum, rariore tamen, prima Aphodela, floribus hanc modum distinet, ex sex parvis circumscriptis, & aliquot in medio flammis compositis: capitula quoque triangularia, sed oblonga, in quibusdam radice habet bulbos, effluens bulbos rariore.

Apud Belgas non nisi horum est.

Floret eodem quo prima, tempore, aut ferias paulo.

Aphodela speciem esse caule Archimco similia ostendit, quo de caule & cum Aphodelam esse apparet, quos Galeni lib. De alimentorum facultatibus scribit, meminit hanc.

Radix Aphodela, & magnitudine, & figura, & amara Scilla radice quodammodo est, in hanc si rariore ut Lupas parva, rariore aut partem sui amara de parte, usque ad Scilla desinat. Nam Scilla qualem desinat hanc dicitur. Heliodorus autem Aphodelam luteam esse

*Aphodites bulbosa Galeni.*



*Glabella.*

ficant: Nec quanta, in *Mala de Albaco* sint bona, merent. In quodamque quosdam nulli-  
cos, qui grassantur hanc, via medicis complu-  
ribus characteribus, inaccessionibus in aqua  
dulci, ciculantem spiritum reddiderunt. Porro  
huc quoque radix, querecinodum & Dra-  
conis facultatem habet terram: atque ape-  
rendi. Proinde quidam pro summo reme-  
dio spiritus Asparagum sicut laborantibus ex-  
hibent.

De eodem vero bulboso *Aphodite*, & lib.  
De simplicium medicamentorum facultati-  
bus idem scribit. Radices etenim *Aphodites*  
vulgo *Asparagum*, & *Draconis* fides esse  
ut, quales certe non primis illis, sed bulbosis  
sunt.

Vulgo *Galeni*, hoc loco, de *Aphodite*, huc  
fieri *Etikos* videtur velis, sicut *An*, *Amian*,  
& *Draconis*, nempe essentis facultatis.  
Vix autem curatulis, & calcificantibus, & b-  
nificis, ac digerere potentior efficiatur, ac  
proinde de *Asparagum* fiat.

De *Glabella*. CAP. XII.

**G**LABELLO folia sunt oblonga, angusta,  
ferrata, gladij modo mucronata, indivi-  
sura & angustiora: caulis laxis, setis, cuius  
longior, circa cuius summitatem flores fixi: se-  
pium distantes, in ostium supra intus, ad

*Glabella vernaque florifera.*



viam carla portem digesti, quandoque verò & ad usum pharmaceuticæ sex folijs cornu illi, colu-  
mæ purpureæ bene, & plerumque, aut quod tamen non) candidioribus bene odore inde foli-  
culis in rotunditate oblongis formata in his omnia, paleæ, & radix gemmæ bulbis uno superdi-  
ctorum insidere, quorum superior Venus intra minor ac vegetior, inferior masculus, sed Acro-  
dion, quæ passim post perit, in plures subside multiplicans.

Ex his Gladoliis in præsentibus inter se gemis agro beneando Italiae pluribus locis reper-  
tuntur Austriæ ac Monacæ agris. Cordus in fronsolis herboris quoque etiam raris sinitibus  
quibusdams locis nascitur ac procerior, alio verò modo ac breuior reperitur.

Mao ac Iuno flores eius virent, subinde & luteo reperitur mensis.

Genus Stiracchi, Latine Gladolus, & nonnullis Eris appellatur. Sicut qui *στίραχος*, *στίραχον*,  
*στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*, *στίραχος*,  
nomine est. Pluribus etiam Cyprius appellatur, velibus, cap. 17. Bulbo nam genus, sit, quibus  
annuuntur & Cyprius, hoc est Gladolus radice dalea est, & que decocta pariter cum  
grano in faciat, ponderosior quoque simul subacta, item cap. 18. Cyprius est Gladolus, vnde  
zarnus. Sicut autem in cap. 17. reperitur, ac Theophrasto de Phlogone ad verbum col-  
lata. Phlogonem autem idem cum Xiphio esse vnde Pluribus perperam Gladolus Cyprius  
non dedisse, eandemque hoc modo cum Cyprio confudisse, existens est. & minus falsum.

Phlogonem.

Videmus Cordus, Gladolus vnde formam aspicitur ab vnde formam rotundam,  
& Germanæ nunc Exiguus, ad differentiam eiusdem generis. Alii, longior radice, quod  
in altissimis Alpium agris reperitur, & à Germanis Exiguus, vnde formam, & vnde formam  
longior dicitur. Flores Gladolus nunc ab Italia, vnde formam, non nascitur.

Ceterum radice Gladolus si per se, utraque nam, digesta, & decocta cum, & Gal-  
banis ut, facultatem possidet.

Dioscorides hanc cum vino, sit, & Thure ut posuerit specula & ac vnde extrahere, cum  
Lobj farina & hydromelae phlegmatis dicitur, eandem ob causam curia modo capitis  
addi merita eandem appositum docere.

Ferant, eodem modo, superius cum vino scriptum, Venere ut excitare: inferius  
vnde hanc faciem: quin & superioris partem anemolacis vnde ex aqua propusit. Pluribus  
infantibus vnam eandem, & vnde vna situm addit. Theophrastus Phlogonem, dicit, Gladolus,  
radice decocti daleam esse erodit, & mixtam facine ad vnde partem dicit & in vnde melle.

#### De Stiracchia.

Stiracchia minor.

#### CAP. XIII.

Stiracchia minor.



**S**ILYB. ICHTH. folia sunt graminae brevia acutissima, oblonga & angusta, caulis rotundus, & densissimus, quo folia ut cretinae quatuor, pulcherrime colorata, vixim fugaces, & passim admodum hoc silyb. generis, ut cretinae, pro duntaxat, forma quaedam modo florentia in illis, ut mosum videlicet foliis compositis, quorum cretinae duntaxat cretinae, pro similibus macularem habeat plerumque parte laevissima, tunc sicutum versus aliquantulum eriguntur, tunc vero reliqua respondentia ea, quo folia florentia in illis iam contingunt, proportionem hanc florentia minor & densiori sunt, sicutumque amara modum florent, lamina, extremaque parte densa & sparsa inde succedunt oblonga, in quibus florent rotundum, parum vix silyb. eadem herbosa, gemma, vix herbosa aliam superposita, sicut Gladioli, sapore dulcis acedulis, quae maxime quaedam integras reticulata: quod quidem in omnibus silyb. in illis, tamen vix vix erant. Duo etiam huius generis esse videntur magnitudine sola differentia. Vixim quidem in ista ab eadem vixim.

In Lusitania & alibi apud Hispanos nascitur.

Floret Mechliniae Maio mense, in horto amplissimo & instructissimo D. Iouanis Bannoni vix generosissime.

Hispani *Narcissus* quasi maculata, sicut parum maxime in ista bulbosus, tamen vix *Magnolia*, appellatur. Nobis *Bellis* esse vixim esse videtur, quod Graeci *μαγνησιανή* *μαγνησιανή*, & Latini à Plinio *Silyb. ichth.* appellatur, scribit etiam Theophrastus lib. 7 *Silyb. ichth.* propriam esse, radice quidem quod in illa est, angustam primum, vixim autem apparet hoc tuberosum, quod vixim super est edulis incrementum huius. Quibus vixim generum *Silyb. ichth.* & edulis esse ostendit vix hanc bulbam hanc, quae in Hispania *Narcissus* nominatur, verum *Silyb. ichth.* esse colligendum videtur. Nam gemma, vixim silyb. ichth. & in Hispania passim edulis.

De *Irish* bulbosa.

CAT. XIII.

De *Irish* bulbosa Lusitania.

De *Irish* bulbosa.



**B**VIBOR. Iris, folia habet quatuor antiqua oblonga, angusta, striata, Alphoides huius a. folia similia, super hoc parte cana, inferius vero primum ne novae subrotundae caulem quibitum: forma in huiusmodi colorata, forma *Irish* forma, à *Irish* videlicet maculata & tribus maculis foliis, maculata deorsum acedens pro similibus, hanc est hanc.

lra bulbosa Indica.



In hunc ex. Etiam inter quosdam Indos etiam in hinc  
munda iuxta hunc munitur, aliquando  
elevari, ut ut strama & apoc, que hinc  
hinc hinc hinc hinc hinc, facile in conspectum ve-  
nant. Item oblonga, crassa, velum filiqua fer-  
dat, in qua hinc radis bulbosa, oblonga, fili-  
rassa integra membrana, qua res florentes  
in duos bulbos abut, ipse caule ex uno de his bul-  
bis fibra asurgente.

Ex Batavia in insule occidentali regnum in  
bulbosam Belgiam pervenit.

Mais & Hispanice Bauciac Lusitania hinc  
comodis bulbis, sed tamen colore & forma so-  
nis nonnullis differenciam. Deorsum utrumque  
flexa candida, pallidissima vero de ore carmine  
colorem referunt: angustiora hinc majora, ali-  
meribus ita accumbunt, ut flamma ut apoc  
crua non quanta, quinque etiam ad hunc appar-  
tant, que & curiosa partibus filis sunt, utque  
reflexa Bulbus in proci est. Siliqua longior  
major.

Est & hinc genus terra hinc coloris hinc  
forma fortiter similes, quam cum Hispania gignit.

Præter his vero & quartam quandam Indam  
bulbosam C. Clusius dicitur, ab amplioribus  
foliorum Latioribus distinctam - Sola cocum hinc  
lana, Lily non bulbosa, amela, mollis, & vinct  
color pallentia, infensa vero etiam albidam, ut  
que hinc pediculis videtur, ut plures insu-  
lis, odorata, colore caruleo, interduz moli-

canis, quo parvitate, singulis utriusque succedunt. radis bulbosa, dulcis, malis pluribus comu-  
grecum integrit. In hac Hispanice indigena.

Florem bulbosæ Indicæ, ut no mensis hinc apud Belgas videtur.

Nominare hinc fere medi bulbam Lusitanicam accipimus, & Linc appellat hinc munda  
speciem, quæ esse videtur. Linc siquidem apud hinc, polytomus vox est. Nativitas hinc  
Lincum est, & Lincum Lincum est deinde & alio die Lincum apud Theophrastum hinc. Vniquod  
lib. vi. vire post Violam albam & violas, vna cum Narcisso flore hinc alterum quodam  
libro, Aristoteli simul cum Croco florem facere inespere, atque hinc primum in hinc  
flore scriptum reliquit. Et cum prore quod horum, hinc hinc bulbosa consensu possident.

Est autem fortasse & idem hinc bulbis, Apulicis Hierobulbis, ut no meminit cap. 22. Non  
cum hinc apud veteres Hierobulbus, hic vero bulbis Indicis flore, ut impo-  
suerunt aut Hierobulbus, quasi dicam hinc bulbosa, merito potest: nisi quam vult hinc  
Cæ, velum magnam & grandem bulbam distinctam. Magna hinc & grandis, hinc hinc  
antiquis cognominata hinc hinc ambigua est.

De vinibus autem Indicis bulbosa nihil compertum habemus, aut ab aliis traditum accipimus.  
Apulicis, hinc Hierobulbis, ut accipio vocat hinc, seu caprus tantumdem, oleo Cypri  
libram & vocat hinc, in se potius & cominus vna, dolorem articulo- rum tollit.

Item, Hierobulbis radice cum linceno Lupinaceo comparata, radice si facem hinc  
lemigam etiam purgat.

De Creta.

CAP. 27.

**I**NTER flores & Croci illos est hinc filis oblonga, pediculis angusta: hinc pal-  
lore caruleo. Colchici fere hinc similes, sed magis lincata. purpurea, carmine, & in hinc  
hinc filis oblonga terra quatuor hinc, colore flammæ sub hinc, colore cina usque hinc  
hinc, & caput hinc, que cetera partibus hinc hinc, colliguntur, & Croci nomine hinc  
hinc hinc hinc hinc hinc, carnosa, copiosa, & vna.

Sentit radix in plumbis regni & prouincis, vbi in apoc legitis modo hinc vinct  
Oliua Cypria, in Sicilia, Italia, Pannonia, Germania, Gallia, Britannia, Gaudet, utque Ther-  
pibulbis, ea linc pediculis de o hinc lincata firmis & fortis pulcherrimas hinc. Sentit hinc  
radicum hinc.

Indica  
Siberia

Alchoron abſque Radice.



Optima, inquit: Diſcoſoides, Coryceus ſecunda in locum tenet, qui orata Coryceus verſus Lyciam & in Lycia Olympo deinde ex Alpibus ſcholia. Cynosactis & Centropetes conſtat in Sicilia vobis multis pullere. Qui ab Aquila Veſtinnorum velle adfertur, primum ſibi locum Italia vendicare, Martiſcholas autem ad Aquilano tamen paſſantibus, qui circa Viennam Paſſoſca, ſive, vt vulgo, Auſtra, naſcitur. In Gallia reliquam vegetat quanta in Agennſi agro, & Narbonenſi, Ruſſico teſto. Probuare nam, in Beccarum urbe meridionali parte, quam Auguſtum vocant, parus vna altera verò & Septemmondii, quare Pils & Scoti tenent, reprobis eſt.

Optima autem v beccarumque aetas, qua pinguiſſimas, rotunda, fragrantia odore, colore rubro Pulſura ſqualida & ſitum nodata.

Crocus Autumnus floſcens, ſtatim, vt Theophrastus ait; primum umbibus, Verghilicorum oreſta. Floſcens tunc ante ſolis, quae magis ſubſequens, & hyeme tota vivens, aſtute nullum conſpicuus.

Grecis ſimiliter agitur, Latiniſque Crocum dicitur: Mauritanis *El ſiras*, atque inde in Italia, *El ſirano* Hiſpanis *Aſpſan*, *El ſira*, *Aſpſan*; Germanis *El ſirran*; Gallis *El ſirran*.

Ceterum Crocus pulcherrimus quid ad ſtingerem obtinet, ſed ſeparat in eo calcificationes quatuor, vt nota in ea ſerena ſecunduſque cordana ex calcificationem, primum calcificationem; primum & conſequenti vna quondam obtinet, aduſtaria in hoc parata illa adhibetione, vt Galema in Sedulo eſt, Cephalogon, ſequit Anacrina, ſicut, & caput nocet: id quod non exigua, ſed magna ſua vna & ſua parat. Vigilat ſiquidem copioſus in dicitur, quae modum calcificationis cepit & ſolis obſcurat. Moderata autem Crocus vnaſque pro dicit, ſenſus vegetantem reddere ſenſum & temperem nocent, ſenſum parat. Corroborant quoque Crocum, diſtremendos humores ad calcificationem perducit, pulmentes aperit, & ab obſtructione expedit, & ad hoc tam efficax recidit, vt ſubinde plithica in ſummo vno diſtremant, & propoſitum animum in agnitionibus, ſenſum in reddent, & vitam ad aliquot dies pro roget, ſenſum diſtremant, ut ad ſummitatem integro periodo, cum pulſo ſat vno Primum, vel alio dicitur, ſenſum in modo etiam dicitur, grauiſſimas ſu beſi ut meos, circa febrim diſtremant, ſenſum & remota temporis ſolere, non ſemel à nobis competent eſt. Chaperum cum nocere, hoc modo ſumptum, Diſcoſoides fert. Laudatur ad hepatis & ſellis obſtructiones, nec



non ad Regiam morbos, atque hanc bonam colorem Crocum efficiens, Diofcorides scribit. Adde quæ ex oleo aut hoc ad omnes, quæ in tenuiorum causa temperantur potiores: sed aspera gratia ad eas potissimum, quæ mensura, fortis & securus edocent. Verum cum Venæta excipit. ad vulnè & fedi-cataplasmata additur, nec non ad emplastra & cerata, ventris tumores & dolores diuina, inflammationes erysipelatosas inuocat. compositio in febribus vidualibus vtiliter admittitur. Oculis ab ephemero & exanthematis cum lacte, non formico-ly, Rotæ sicive liquore præferuntur, & humorum in eos inflammationes sepe curat.

De Croco sphaerico.

Crocus sphaericus Asturicus.



CAP. XVI.

Crocus sphaericus Venæta purp.



Crocus sphaericus Venæta alba.



**P**RESERTIM Crocum qui sphaerico caulis colitur, sunt & complures sphaerico alij, & eorum emulantes, sed haec vides. Vnus Asturicus floret: reliqui Venæ: Inter Venæta montanæ maiores, lanceolatas folijs: alij Asturica, octo folijs.

Præsertim Asturico folijs habet oblonga, venæta, Crocus Asturica, sed in quibus sunt quædam in herbam floret dilutione colore. Neque ubi viget flamma crocei coloris cordant. Mæstique angulatis, in quibus semen: bulbosum videri.

Montanæ hanc appellant: Latine fit de terre. Memores Croci montani Theophrastus lib. vi. Crocus, inquit, tam croceus odoratus, quàm sitivus: Asturico hanc purp. in herbis florent.

Inter Venætales agrestes Crocus maioris, & latioris folijs, purp. hinc folijs & flosculis, sed tamen purp. hinc folijs & flosculis forma f. m. alba, & purp. exteriori formæ hinc purp.



purpure ac violaceo colore: lineolis striata: Semen in filiculis angustis, pro radice bulbis an-  
theris clausis: Stamina latis velut Anemone.

Proxima, foliis cili paulò laciniatis ac brevioribus: species haec duae, varas flocculos  
albidas, purpureo: nunciat pediculo: albus purpureus cili: Stamina pallidiora: bulbis ma-  
nor quam Croci: fatis.

Minorum folia latiora prior folia oblonga & gracilia postea, angustiora quam latius flof.  
caulis in brevi pediculo mucronis, subinde candidum, saepe purpureum: fatis tamen ab-  
cassum, & qua parte calycis infidet latiorum. bulbis Anellane magnitudine albus, gustu  
astringens.

Alci minorum folia antedicto similia: in brevi admodum pediculo ex terra prominet  
flocculos, ex octo foliulis compositus, (cum aliarum forma consistens) ex albedo purpurascens.  
radix gemina, vna altera stipitata, vltra Gladioli, quarum superior dulcis ac obulsa, infer-  
rior stercora.

Tertium horum folia paulò pleribus, & paulò crassioribus affurgit: flocculos erigitur par-  
tibus, fatis tamen compositus foliulis dilatis quasi trifloribus.

Exerit autem hi omnes Belgio sunt: Anemone in Lusitania quibusdam rupibus haud  
poculatis nascitur: Reliqua partim ex Italia missi partim ex Hispania, opera ac diligen-  
tia Dodonaei & Clusij ad nos perueniunt: ex causa observationibus hanc deinde potestatem  
manifestam.

Sylvestris Croci Vernalis flores sub nocte laesate aut Hybrida in nullo solo profertur,  
Involucrum in Croci sunt jácisco Sylvestris veri dicuntur. Minorum illa, cuius radix  
velut Gladioli gemina, crassi nunc aut arida, vel stercora, vel vix esse, quarum Theoplas-  
tus lib. vii. mentio facit. Roesler & quaedam horum Plantis lib. x. cap. v. Gemina,  
inquit, Croci haec fatis. Bulbosum, Serapion, Pyren, Acrococon. In tanta autem horum  
brevitate, sola nomi nunc referentur, quod potest vni colligi aut dicere.

De facularibus quoque horum, hac de causa nihil addere potest.

De Hyacinthis et Cap. XVII

**H**YACINTHY: apud Viticos du pler reperitur. Vnus à Theophrasto scriptus cognom-  
inatur, qui maior est, & Liliis forma similia: de quo si pra. cap. latus lib. i. alior minor,  
non scriptus de potest.

Non lepto autem Hyacintho folia sunt oblonga, angusta, leuia & splendentia, Non si-  
lia angustiora & minor: cuius folia velut gladii, & cetera, cuius coma florum pòdere & mo-  
le, cum pariter delibere accipiunt, gemina, decursum recurre: flores oblongi, teretes,  
concaui in latera & pendunt, per omnia scilicet colore vt plurimum carulei, subinde albae, &  
aut crudi sine rore, aliquando etiam Violae nigrae delucum purpureum referentes. Semen in  
filiculis angustis partium, rotundum. radix bulbosa, candida, parva, leuia sacco, vna  
& vna liliis, g'ra.

Hyacinthus non-scriptus,



Hyacinthus Orientalis minor.



Hyacinthus Orientalis major.



Geopon. Hyacinthus esse in pluribus locis, & in nonnullis maior ac perniciosa affirmatur & magis ferocissimus.

Incessum, quem Italia Orientalis nominat, foliis habet pergruosa & laeva, caulis crassiora, flores parviores inaequalis, ac tunc producuntur horum vixit minor, plures profert flores. alioq. minor, parviora.

Germaniae & Belgicae utroque in modis plures gignit, sed ferocissimae. Repertae in Germania, ut Cordus ait, in aprica quibusdam tumulis in Belgio vero enses in arvis, sunt agrorum margines, fruticibus aut arboribus confitos & praecipue quidem prope Middelam urbem, ubi copiosius nascitur.

Floret Aprilis & Maio mensis Orientalis Martio : & latet in multo antè.

Talesque Circa, Latini firmiter Hyacinthi, et Dioscorides antheas, Vaccinaria quoque appellent. Vaccinaria autem à nonnullis cum Viola dactylis nigris, et fupensis scriptis in Geoponorum sacris hac Hyacinthus confusus, ad differentiam nempe alcerum scriptis descriptis, qui nullas notas in se possunt habere.

Dioscorides hanc Hyacinthum, cum alcerum, nonnumquam alterum Hyacinthum Libi perperam nomine expressisse videtur. Memorat hanc Colomella lib. 10. dicitur in arboribus, quae in floribus, vix in verticillo completur.

*Ne non velut in velaribus Hyacinthis.*

Belgæ Hyacinthum alium Græci cum appellationem nec nomen, *Dianthion* appellant. Rucclius, Galia, *Favos dictus*, nullus est. Sicut vero & alia multa huiusmodi Hyacinthorum speciei, ut recentiores iudeant, de quibus capite sequente.

Huiusmodi Hyacinthi radice contra est parati in defecando ; secundi vero completi, aut terti accipiendi in vertigenda.

Semen hinc et atropæ & ad hinc, sed in eo quod terra quadammodo defecata, certam in modo constituta caliditate & frigida, autem Galeni.

Radicemque Diofcorides, cum vino albo pueris imposita, ad impubertate credunt aliam sibi pota vinam duci, & à Phalango commotis operantur.

Semen contra leprentes ad hinc, cum vino potum Regum morbum expurgat.

*De aliis regiarum specie Hyacinthi.*

CAP. XVIII.

*Hyacinthus racemosa.*

*Hyacinthus species inordinata alia.*



**D**VO 1 Hyacinthi speciesibus capitibus deficiunt, vnaum Lilij effigie scriptura, alterum nomen non scriptum. Præter verò hinc & alij multa, recentiores in radice sunt Hyacinthi. Nam omnes ferè in omnes florè bulbis carum, aut Hyacinthos, aut Narcissos dicunt, in omnes speciem Narcissos, omnes verò Hyacinthos.

Inter Hyacinthos utaq; neciterios, primus folia habet angusta quasi rotunda, bene virent, inter terram plerumq; parte sita, cuius culos utroq; ea rotundas, glabros, palmis longiores, in quorum summo flo fœli parvi, rotundi, cum, hinc, solo re carum, alio dilato, alio sita, ut sita de caribus, aut ex alio dilato alio modum parva de caribus post quos filioq; in hinc, ut sita rotunda, in qui bus semen parum agrum, rubeo in bell bulbos.

Ferèq; hinc, Germanæ, Gallie, ac etiam Hispanie loca hoc Bulbus est ; repetitur & in Belgæ in Areberum ac Montorum finibus, in Sylis ac arboribus. In hinc, in hinc de caribus, in quo plures bulbos aut multiplicitur.

Foliaris, qui ex Hispaniam Belgiam aliam est, aut hyemem carum ; Germanæ verò ac Belgæ non ante Ver. florè Mense vigent, aut April.

Hyacinthos autem hinc Bulbus Fuchias hinc, secundum cum specie florens. Bonapæda hinc Ruscifam nostram cognovimus. In hinc in plura, cum, qui caribus est

T

flora.

Hyacinthus comosus (species cretica).

Hyacinthus Acrokorodensis.



floris, barbato ac petrogina nomine Dapodi appellantur. Ex usu lentoreus autem bulbosum genere aliquoties videtur.

Reperiuntur autem cónsenti bulbi complura genera, ut Plinius & Theophrastus scriptum reliquerit.

Ex genere quidem, utquit Plinius, Graeci haec fecerunt. Bulbosum, Setarion, Pyxon, Anonion (nonnulli Acrokorodon legunt). Aegylops, Silyriochoson. Quae & Theophrastus in libro 7. mentem non omnia, lib. 7. cap. 11. refert. Sunt autem quocumque ipse nominavit, Anonion, & Silyriochoson, & Anonion, quae sunt, ut Plinius vult, ut Anonion, Leucocoron inferius describitur. Bulbosum, Plinius ait, Graecos appellare herbam petraea solas, rubicundo bulbo. Setarionum, Cera quaedam genus est, ut Theophrastus & Plinius testantur. De Silyriochoson iam ante scripturam. Pyxon, Cera, Acrokorodon, Aegylops, cuiusmodi bulbi sint, nondum ex reo reperire licuit. Silyriochoson videtur, Bulbosus & Acrokorodon idem esse. Apud Theophrastum autem solus, ut apud Plinium eandem Acrokorodon ordine succedit.

Ex horum autem bulbosum nuncio aliquem esse, haec Hyacinthus vulgò dicti, genus verisimile videtur, sed quoniam in se, propter naturam ventrum brevitatem explicari nequit. Si comosus in lecti, bulbosus Acrokorodon est: Anonion, Acrokorodon Alii genus spectare est. Nam folia, Alii quidam similes habent: nomen autem Acrokorodensis multitudine aliquam cum Alio indicat.

Haec autem similia est ac aliter quidem speciosus Hyacinthus, folia similes perierit strata, sed latioribus & Parn folia similibus, caule crassiore, floribus candidioribus multioribus quam altera.

Floret eodem quo prior tempore.

Qui tertius est inter acerosos Hyacinthus, folia habet longa, pinguia, alcyonoides, ut in, caulis longos, subinde dodonum alcyonoides flores à medio furtim veritas, vnde quocumque eandem multos paruos, cauos, peritiam purpurei, ubi verò faceret ut, ab folio coloris, expurgetur & candidi) cucurbitae comoso radice, ut alatum, bulbosum, silyriochoson, & silyriochoson coloris.

In Germania quibusdam provinciis, ut in Narco sine Baiana, frequenter in quibus

*Hyacinthi Aromatica minor.*

*Hyacinthi Fuchii.*



gunt: quandoque vero etiam sunt agrorum integræ. Vt etiam Mantiscolus, apud Indos  
 esse legitur & in fylis.

April. ac Maio, Julendo & Junio flores eius vigent: semen postea perficitur.

Hyacinthi speciem, & quidem primam, Fuchius, Tragus & Mantiscolus faciunt: nomen illi  
 Hyacinthum foliaceum nuncupant alij Comosum. Germani alibi Scerung appellunt,  
 alii *Sere herbasch* id est, Alium Germanum. Non est tamen Alij siquis speciosa, sed Bulbi  
 eadem genus quoddam, veluti Bulbina, cuiusmodi simillimus est. Bulbina enim Bulbina to-  
 bet, & Parn folia, Pluribus autem, habet. Videtur etiam Bulbina ex Africa bulbis esse, quæ  
 Afram cognominant. Hanc si quidem Dioscoridis *ωχθη* id est, rufum bulbam esse ait. Sane  
 tamen qui velint hanc certam speciem Hyacinthum Scellæ aut Panserij specie esse quo-  
 rum indicium ea propter à nobis non probatur, quod Scellæ & Panserij bulbis grandæ sint,  
 hæc autem parva, & illorum comparatione exigua.

Quædam appellatur Hyacinthus, qui ferentis est, foliis est angustis, parvis, & minori-  
 bus, quibus præter cauliculis & bracteis, nec sunt quatuor digitos altus, bulbula in summo caulis,  
 caulis, flumibus in medio caulis: ferunt in siliquis triangulatis exigua: radice par-  
 va & bulbula.

Nelliana Hippocris & Galia quibusdam præsentis, ut etiam Parisiæ, Lugdunum co-  
 pientur verò & quædam maior, in hunc minor.

Sub illius nomine Angliis aut Septentris flores profert & martialis quædam, quæ maior est.

Aromaticum Hyacinthum in ea de causa & nomine non nominant, quæ ab illius nomine  
 cognatum habentem.

Præter hæc aliam quædam pro Hyacintho bulbam Locustinus describit Fuchius, quæ  
 foliis modis hanc, modis tamen aut pluribus, latiusculis, Porri minoribus: floribus circa caulis,  
 cuius summam partem, martium & radice folia ferri similitudine, parvis, colore cam-  
 phen aut carulea, quæ succedunt capitulo rotunda, octo magnitudine, in quibus similes Ma-  
 jo simile: radice bulbosa, rotunda.

Reperitur plerique Germania locis & aliis, late, parvis, sed inculto solo.

Martio, quandoque etiam Febuario nascunt.

Germani de *Wirtshilmen* & de *Syranga* nomen appellant. Fuchius pro Hyacinthi  
 specie designat. Plerique Hyacinthum Scellæ ab ipsa flore effige vocant. Ex illius nomine

## STIRPUM HISTORIA

Lilium Perficum



aliquando Satyrum esse, verum hoc modo opinari desinet. Satyrus enim caulis stru-  
bit, folia Lily, bulbos tamen magnitudinis: Bulbus vero est, folia parvula, angusta, bulbosus  
quos & caulis habet brevis.

6. Ad species Hyacinthos pertinet quaeque potest, à nemorosis Liliis vocatum Perficum.  
Folia hinc oblonga, vixenta, quibus Lily angustiora, inflexiorum caulis parum comellum,  
qui rectus, intensus, ac admodum procerus, bacubitalis, & non modo aliter ferri modulis  
quibus hic floribus fertur versus videriqueque circumfusa ornatur, qui modò ex longitu-  
dine, quandoque brevis caulis pediculis distans instantes dependens, quamque folia, color  
Vixit nigre duntaxat ac magis rubente purpureo, flammibus aliquot modis, percolatum et  
ab uno furtum vasis florantes, bulbos laevis magnus, una parte rotundiori summa, glo-  
rii plerumque, ex quo subter nonnulla fibrae demittuntur.

Pernam est flos, & à paucis tantum in Belgii paradisis illatus. Appellatur vulgò *Passi*  
*de Perficum*, & à quibusdam, ve simpliciter, *Lilium Perficum*. flos novus, veteres, et  
credunt, incognitus.

Ceterum quòd ad usum amicos horum speciosorum Hyacinthorum, nostris quidem non  
cibari, nec in medicamentis nullas esse, proinde & viros ac facillime corum de se inceptis  
soli flosculi in horti gratiam inuenire.

De bulbo *Lancarbano*, seu *Ornithogalo*.

## CAPIT. XIX.

- L. **EVGANTHEMO** bulbo folia in alta sursum & angusta, gratissimis manent: caulis laceris  
eius duntaxat in uno, secundum, glaber, abique foliis: flores in summitate dispositi emicat  
sex aut septem, folia herbaceo viridis, intus candida, ex sex foliis compositi, ex quo lili-  
positum peris quibus adpocuntur similes, qui Sole quidem splendens patet, modo verò  
& eadem aer nubi accensam interdu noctis permittunt: capsula succidua triangulari, Or-  
thoysa firmi simili, in quibus semen exiguam: nichil bulbosa, lento siccata pleia, sicut  
plurimum insipida & aquosa, cum obicura tamen quadam accedunt.

Reperitur in agris frumentarum, apud Boeoticos locus compluribus.

Maso mense flores edit.





delissima cum carne, pulpave perquam odorata. Vase vel asfate cum floside vini hyeme vel autumno cum exarante aeri, radices velluntur. dia fertur posse: de vbi anconia pro-  
 marisopra glabris radice formam & utanas Castoreum more sanat, nec aliud hanc gra-  
 tum plemptus in cibos codit, cum fragum per una glabris. Muri si ubi exponitur, nam in a-  
 gris sponte natam gratiorum cibum non nocent: laucioris etiam noculis dimerum con-  
 formidat. Pars non incoquente radices, qui propter affante cum ancozoma proficidius,  
 aut in latiores potius falcatas, aruos venere, colligunt, in oleo Castoreo fassores quibus se  
 crudis, & in arenabis iaculis seferunt. Sex florentis aeri, Charles vocat: conficit  
 Hadreas Radices.

464

At Oritagogā fructum, Dioscorides ait, vna cum pane coqui, et Melanthum radice  
 vocā bulbosam, & crudam, & coctum edi.

De Bulbo sphaerico.

CAP. XX.

Bulbus sphaericus.

Oritagogam Narbonensia.



1. **BULBO** Leucanthemo in parte superiore capite delapsis, non multum abieritis ra-  
 dit, quem Leonhartus Fuchsian, & Hieronymus Tragus, sphaericum agnominant. sui  
 tamen hanc folia pauciora, & vna cum aut duo parvis, angusta & porracea: caulis brevis, o-  
 ner, rotundus, doctarialis, a quo in summo aduans, in quibus fasciculi (bulbati) radices, bulb  
 Leucanthemi minores, colore ex herbaceo in huc in clauiculis erant, flammibus in mole  
 capillibus, capite la fermen triangulari: radix bulbosa, terra sicca, nullius odore, si-  
 pore aliquantulum, sed perobscuro Cepam referens.

In Germania locis vmbrosis ad marginem pratorum & aruorum, ac foveis stans, ex  
 Martio et Aprilis florere, fructumque perficit.

Germani sphaericum vel sphaerum appellant, quod dicitur Cepum agrarium. Et sphaericum  
 sponis radiceum bulbosum est numero. Quo nomine à veteribus marcapata fieri  
 non creditur.

Recentiores consili Oritagogam hanc appellant, à similitudine cum Oritagogā  
 2. minore albo. Ostendunt verò & in aliis quoddam Oritagogam, non modò ab isto, sed &  
 à sphaerico, quod duobus vultu distinet: quod Narbonensia agnominant.

Sunt folia latus oblonga, & terrena, quamvis ab eorum angustioribus: dactylis tamen, & cubitulis: processibus, nullis foliis consuectis, floribus verò exornatis quibus plurimum, à medio inflexione petalibus, qui foris & extra locis herbaceis sunt, patentes vobis insertis foliis: candida videntur, Phalangy flores referentis: bulbis triangulari est lobus, in quo femina, oblonga est: bulbis.

In Narbonensi Gallia ac circa Maestelum in agris frumenti feracibus nasci fertur.

De nomine huius non dubitat: nam legitur in Ornithogilion esse non videtur. Nec facile fuit Scillam Epimeridam affirmare, in eam Pliny brevitate, qui folis huius meminit, nisi ob hoc Scille species habeatur, quod Scille modo flores huius dactylis referunt.

Facillime autem horum incognita sunt. Hieronymus tamen Tragus, ex lateri bulbo sub cineribus codici, cum melle cataplasmis, stomibus depulveribus vtiliter imponi refert.

De Narcisso.

CAP. XXX.

Narcissus medio purpureus.

Narcissus medio latus.



**N**ARCISSE generis, Dialectice andree, duo sunt. Primitivè floribus est: sed vultus medio purpureus, aliter latus.

Medio purpureus, folia habet virentia oblonga, Petioli foliis similia: caulem angulosum, & ubique foliis, densitate aut pede altissimum, & in summo florem è macranthemis compositum, & plantam virentem, fibulæ generum, medicis aptum, odoratum, ex seca candidis foliis compositum, in quocumque medio brevis calyx est: cucullata corollata, purpurei per ora coloris, intra quædam lamina brevis, cum apicibus subdilatatis: capitula modo angulosa: fident in his agris, radix bulbosa, Cepæ similia, que in oleo & demissis, in multos facile bulbos multiplicatur. Repentem autem huius generis tres, fortis, colore, aut odore nequissimus, sed formis tempore differentes, in agris adine etiam nascuntur, sed parum, desiderem. Maxime medio, purpureus & ferius prodeunt, ut vides sunt.

Alter Narcissus medio latus, folia habet longiora, laevia, & aliquantulum minus vi. a rona: caulem processivum, crassum, & in singulis floribus: tres aut quatuor, pro orbibus similes, sed medio calyce luto, ferens & radicem bulbosam similia.


Folia generis & alia quædam viciis Narcissus est, foliis non modo qualis prima, verum etiam

Narcissus medio luteo alar.

Narcissus totus albidus.



Narcissus multiplex.



eorum quatuor Aphrodites, hircocibus longi-  
busque, floribus in singulis calibus quatuor  
pluribus, candidis, in hircibus, medio centro  
toto, calyce emittente, multo raras quam  
Narcissi lateri stylacibus brevior: tota limbo  
est & bulbosa.

Item & quatuor quidam est Narcissus am-  
plex forma limbo, sed per totam floram & me-  
dio quatuor candidas.

Sunt & Narcissi multiplicibus floribus, sim-  
plici, cum alterius generis, folia & bulbis de  
his distinctis. Ita vana semper natura, & ad  
serpentes hircocibus generis in alioque indolo-  
cunda, nam ad ea permutanda proca, perferunt  
si cultus inurgens adveniat, vel in aliis locis  
serpes transformantur. Hinc eorum plures poli  
ad serpentes in unione, & alibi serpens.

Exant qui medio purpurei sunt plerique Gal-  
lorum locis, & apud Heliosos: & quatuor, in parte  
Dardanis, in montibus perflorantibus in  
Theocritus in parte Narcissum gigis albi,  
Eudylus eo, ubi Europam cum in solo prope capti-  
fimo, bene sperantem Narcissum, carpifis, cum  
his veribus

*Al' d' un' d' un' Narcissus: le d' un' d' un' d' un'  
Al' d' un' d' un' d' un' d' un' d' un' d' un'  
T' d' un' d' un' d' un' d' un' d' un' d' un'  
P' d' un' d' un' d' un' d' un' d' un' d' un'  
Ita ille, hinc alio si floribus alio d' un' d' un'  
Narcissus ille quod bene d' un' d' un' d' un'  
Flora*

Florentini Belgii, hinc quoque generis præcones Narcessi, in eo Aprili, medio suo fruem, sequitur Maro in se: medio lateri codici in se, quo prout generare debet, tempore.

Græci hanc florē Napaianon, Latini similiter Narcessum nuncupant. Belgæ statim in *Receptis* Joanne Germario Narcessi scribit: *Hesperium Narcessi*. Dicitur autem Narcessi in Pliniali in Synopse quædam herbarum, & nomenclaturæ in prænotata, scilicet. Quamvis et de Soporaceo nuncupat subterraneorum decem conononem cum vocat, quod idcirco de nocte capiti, nomenclaturæ hinc merito cononatur. Appellatur autem Narcessi in *Receptis* de Aprili in se, *Receptis* de *Receptis* de *Receptis*. Latini autem Theophrastus cum appellat, cuiusmodi est herba folium, & hoc melius longior, quales vocat eorum effugam de ut ipse generat quæ de eadem in *Receptis* ad est, supra generat, vel per se in se, hinc potest. Sunt verò de alia Latini sui generis, de quibus supra scripturæ de Latini quoque Latini est. In his Polliæ, Horvora in Lary appellatur, complecti omnia horum generis, videtur est. *Receptis* autem Narcessi proprio montanarum, eo quod ab aqua rariore prænotat *Receptis* quædam nomen abest hinc habet. Distinguitur tamen videtur Narcessi cum vocatur generat. Est tamen de alia herba vana generat proprio datus, de quo capite scribitur quædam.

Prout autem horum Narcessorum medio videtur purpurea, de est, quem Minus lib. ar. cap. 9. purpurea florē scribit Narcessi duo genera, inquit, medicum vltim recipit vltim purpurea florē. *Receptis* herbarum. Nam purpurea florē Narcessum nuncupat, cui traditum purpuream, ut dicitur lib. cap. 9. scriptum explicat ostendit. Hinc aliter, ut generat florē videtur, *Receptis* purpurea. Calycem autem dicit, quod in molio florē, cuius indur, & flammæ speciem ostendit. De hoc tamen Narcessi Virgatus in Lucilio. *Receptis* quædam.

*Pro molio Pula pro purpurea Narcessi,*  
*Cardus & hinc scriptis Polliæ autem.*

Secundò videtur de portulacum in Narcessi, Quia dicitur in Metamorphoseon lib. mercurio Narcessi florē ad oleo generat matrona in florē sui nomen dicitur, hoc carmine *Receptis* cap. 9. *Receptis* pro corpore florē *Receptis* florē medicum *Receptis* alia.

De vltimo in scriptis Theophrastus lib. 8. De alio sequendum hoc loco, quia lib. 7. agit. Libo sequendum 7. folium et orbium angustum, quales vocat primò habet: deo videtur, latius quàm Alphodesignum est, quod dicitur loco, de differentibus Narcessi cum scriptis, cononatur. Scribitur tamen Theophrastus lib. 8. Narcessi florē esse lineam, hinc melius colorem, quod de medio florē calyce accipitur datur esse. Quia de firmosio iam ostenditur. Ex eorum sequitur de hoc Narcessi eorum, quæ utitur, ad manifestissimum est. Florē tamen, ut, *Receptis* alia tamen folio videtur. Explanaria Theophrasti perit omnia alia, ut *Receptis* habet, quod Hieronimus de Marcello occasionem dedit, ut Narcessi florē nigrum esse significaret. Sed pro *Receptis* respondendum est *Receptis*. Est tamen Melinus color, idem quoque dicitur, hinc hinc.

*Theophrastus  
de hinc  
cononatur*

Prout autem & hoc Narcessi florē tamen Theophrasto habet, & Autumnio deinde florē purpurea quod in lingue eorum cum pluribus, hinc ut dicitur in meo sub sequitur hoc verba *Receptis* *Receptis* *Receptis* *Receptis*, id est, post Autumnium prodigiosa florē est, & in eo quæmodum. Verum ad Narcessi florē hinc non focum inter Narcessi sequitur de longiorum & verba hinc, de hinc se hinc est. Nec sperandum est ad Croci, uti Cononatur Gelsorum in appendice scribit, quam Germanice sui horum subonatur: sed ad Lary alterius hinc pertinet, quod eodem loco, paulò inferius Theophrastus vltim cum Croci *Receptis* hinc, hoc est, prout in hinc, hinc Autumnio, florere ut, ut diligenter vltimque locum in pendentes manifestam hinc hinc.

Ac videtur quidem, quos proprio Narcessi florē operatur, observare nobis contingit. Sūt tamen & alij hinc appellati Narcessi, de quibus in meo sequentibus capibus.

Marchidius videtur de alio in quorundam locis ex hinc, quia non in non Narcessi, sed omnino alia generat hinc sunt. Nam quæ quatuor facit, Orthogalen est, maris ut nobis apponatur. Quædam Gelsorum & omnia passim Tulpam vocant. Scimus ac scripturæ Latini hinc hinc.

Cæterum Narcessi videtur, ut Galenus ait, si que ad id enjocandi facultate possit, ut & nigritas vltima glanet, vel ad vltimorum vltimque, quæ circa in idem accidit. habet verò quiddam ab hinc & in hinc. Eadem, videtur Dyoniside, hinc est, hinc hinc, vltimque hinc: prodest autem ab igne cum melle inter prescribit quos, acutus agglanatur in hinc: hinc sem melle, & vltimque setularum doleribus cum melle, & in hinc hinc expurgat cephali & aliam cum voce hinc & aceto, ac cum Ervo & melle vltimam

vlocum foedus exstirpæ, & abscessus qui ergo manent, ut tempit: odore & aculeis in-  
notum Lodyfama & melle.

*De Narcissifolia Narcifolia, sive Ascle comitaria.*

CAP. XXII

Narcifolia Narcifolia rubra.

Narcifolia Narcifolia rubra.



**P**ARTE II. Narcifolia superiore capite de Knipros, & ab eis superius: Narcifolia, sive  
Narcifolia alter foliata: Pseudo-Narcifolia est: verna Antiquaria.

Narcifolia Narcifolia, folia sunt oblonga, angusta, crassa, uterum prope pedum terminam,  
admodum levia & flexibilia, lanca cum lanore, tum colere, & quodammodo flexibi-  
le, nec non rotundate similia, inter que medius est calis, qui latitudo est, folia sunt  
quatuor, vel plura, odorati, Narcifolia forma sua hoc, verum in color, & colore per emulsi-  
onem in luteo sicut bulbosa, candida, rari nigra mem bene integrit. In plerisque hamo-  
ribus herbolis Hispania monese loca gignunt, uno vero loco latet & plures folio-  
bush in variis aliis locis autem minor, & floris parviores profertur Venerij Belgij bonitatis.

In Belgio April mensi floram vintque prostrata: Maris, si byems clarens fuerit.

Hispania similitudine, quare folia cum lanca habent, sicut plura vintque prostrata: Maris  
diffinit Narcifolia dicitur possunt. Dico quod est Narcifolia, sive: Balbus vintque  
Id quod ex ipsa Balbus vintque de hispania colligi potest, que sic habet: Narcifolia  
quodammodo sicut bulbosa, candida, rari nigra mem bene integrit. In plerisque hamo-  
ribus herbolis Hispania monese loca gignunt, uno vero loco latet & plures folio-  
bush in variis aliis locis autem minor, & floris parviores profertur Venerij Belgij bonitatis.

Quibus autem similitudine Narcifolia Narcifolia, sive: Balbus vintque prostrata: Maris, si byems clarens fuerit.

Id quod ex ipsa Balbus vintque de hispania colligi potest, que sic habet: Narcifolia  
quodammodo sicut bulbosa, candida, rari nigra mem bene integrit. In plerisque hamo-  
ribus herbolis Hispania monese loca gignunt, uno vero loco latet & plures folio-  
bush in variis aliis locis autem minor, & floris parviores profertur Venerij Belgij bonitatis.

De Narcisso luteo flouido, seu Pseudonarcisso.

CAPP. XIII.

Narcissiflorum flouidum.

Narcissi flouidi albus.



Narcissiflorum multiplex.



**L** VERA Narcissiflorum flouidum, sicut Pom. ait Narcissi similia prouert, sed breuiores ac minoris: cauliculus natus, atque in singulis floret singulis, Narcissiflorum, sed magis communis calyce longiore, oblongiore calicis similitudine, colore per totum luteo, ubique odore: capitula rotunda, oblonga, in quibus sunt: radix bulbosa, et alium Narcissiflorum.

Contingit uero & huc, quod alij quidam docti floribus, & candidis Narcissifloris accidit, ut videlicet floret foliola multiplex, & talisquidem flor medio calyce caret, & compluribus foliolis modis occupatibus, sola autem ac bulbo cum alteris consistunt floretque totus luteus.

Reperitur nō paucis Belgij locis, circa margines agrorum & uenariorum, humido praesertim solo, & in syluis locisque arboribus cernitur: & similibus quoque, cum in Germania, tum in Hispania transferretur etiam in herbas.

Floret Februarius & Martio quibus mensibus Germani ea de causa *Heel* *Heerlinge* *Blumen* id est, rostrare ducendo, *god* *Spiegel* *blomen* nuncupant. Februarius enim Germanis *Heerlinge* *moer* Belgis, *Spiegel*.

Appellatur uero & haec Narcissiflorum Belgae, *god* *Spiegel* *blomen*, Latine autem uulgo Narcissiflorum, & Pseudo-Narcissiflorum dicitur.

Ceterum

Ceterum quod ad vires attinet, recentiorum quorundam experimento exploratum est, Narcissi huius (s) hœstrum radicum decoctum, per album lenius & pinguis humores, nec est fecosus et purgans, & hoc prodest, quia crudiorum copia generatur humorum, sicutum André & Zanaberi nunciat adhibet, quæ, ut motus nocent, purgat, meliori sic ventriculo, adhibet.

De Narcisso Autumnali.  
Narcissus Autumnalis communis.



CAP. XXVIII.  
Narcissus Autumnalis purus.



Quæ nostris inter Narcissum Autumnalem nominat, folia prout oblonga, læta, & splendens, sativitate vitiosa: inter quæ pediculus affertur brevis, fastigiis floribus cum adferens. In adhaec quædam Narcissicali utrolem, sed veluti Colchici aut Croci, in tribulis compositum, colore autem hinc tam: in curis modo sic flammis, & quædam modis folia, si bell' bulbos modicis magnitudinis, fibres dicitur modo deorsum dicitur.

In Hispania ac Italia gigantem ac vasa loco longioribus ac angustioribus, alio vero longioribus ac laevibus foliis amat humentis & præsentia, ac etiam montana.

Autumno sub finem Augusti, ac Septembri mensis floram hanc videri in Belgis compositæ eodem serè in Italia tempore dicit.

Autumnalis hæc de causa Narcissum appellant: Hispanis *Cilicibus* & *Albanis* dicitur Narcissi autem nomen accepit, quod Marcellus Vergilius in commentariis suis in Dactylis, hanc pro Narcisso describit. Non, nequit, in Apenninis montibus sic quædam velum dicit, Augusti ac Septembri mensis florentem, (Agria Lili), doctores ut in radice: folia quibus Narcisso describitur, tunc in agria caule, quæ nec candida, nec purpurea, ut Plinius docet, sed inter luteum & candidum colore multum, aut ex ignis odore Videmus & in montibus libris enatum, sed non tam speciosum, & magis albicans: Hæc Marcellus.

Videtur autem in *Agria* (sive Lili) et species, quæ à Theophrasto Autumnalis, uton postquam in hanc, vasa cum Croco florere referatur, quod *Belgicæ* magis, sive Latine alteram ab ipso nominatur.

Præter hæc verò & aliam quendam Narcissam Autumnalem C. Clusius describit, sibi videtur pediculo brevi florculo parvo candido, odorato, Narcissi autem, & vobis tribuitorum, & calyce modo parvo læto, bulbis exiguis est.

De Narcisso maritimo. CAP. XXV.

PRÆTER cetera quædam Narcissos delinamus, describendos & vasa ad hæc bulbos, ad præter Narcissi genus pertinere apparent. folia hinc quibus fœdit, oblonga, læta, vasa

Narcissus  
Maritimus  
Vergilius.

Narcissus maritimus.



virescunt Narcissi, sed distinctioribus pede non tantò altior, in caulis longo à terra mensura tenui, quadrifido, ac plures emergunt flores. Pseudonarcissi amoli, longae pedice calycibus prominentibus, flamma quibus continentur, sed colore albid: subloquuntur angulosa valvula, in quibus ferunt magnas tubelli bulbos, candidos, nigra membranâ circumiectis, quibusdam subinde adans, quibus multiplicatur.

In maritimis, non modò Narbonensis Galie, verum & Hispanie, præsertim Valentis regionis, gignunt cum & alibi, subulosis & uidi locis, quodlibet de marina riposae aquae.

Maso mensis florere incipit, Julio vero ac Augusto ferunt non maturo, huius bulbos & crasse iuxta Montpellieræ C. Clusius in Observationibus suis esse.

Hispani huiusmodi bulbos *Azores* apud appellant: Italorum nonnulli *Aglio marino* Nollis tempore plerique Scillam vocant, & ex ea Trochiscos de Scilla formant: alii placet esse Pancratium, & quidem Marinum. Pancratium autem bulbos, ut Dioscorides scribit, ubi *Aglio* à *Aglio* pergit, ad est, tubulosus ac suboppositus: illis vero, ut diximus, albidus. Manthelina, quantum ex eorum colligere licet, sunt Narcissi numerat, & Corallium politarum cognoscunt. Ex prælati sunt Narcissi venetici, & Maritimi dicit, quibus vel Scillam, vel Pancratium terræ affirmat.

Facile autem Pseudonarcissi huius affinis videtur: nam & gallicas tantummodo bulbos narcissum vocant: ut Lobelius auctor est.

#### De Leuco bulboso. CAP. XXVI.

**L**EVCOIT bulbos maritimos observare genera conat: vixit Trifolium. alterum Hesperiphylon: verum Polygalicem cognominari possit.

Primum folia ex singulis bulbis bona promit, oblonga, angusta, in virescunt albicantia, foliis à Pseudo-Narcissi huius colore proxima, inter quæ modum est calciculus palmari, in eorum fastigio sitæ vaginula oblonga erumpit, à tereti pediculo decorsum dependens, foliolis tribus confinis marginibus, candida, inter quæ alia ma hociora ac minor, pallide virescit, & aliquantulum striata in medio floribus cum apicibus latera: inter bulbos est, form oblonga & carinata Castanea nucleis, colore, quæ facile in plures bulbos multiplicatur.

Pergrua Belgio flor, sed Trache & atropombas familiaris.

Europæamque Februario mensis, reliquis omnibus ferè flores antecedens.

Leucum videtur bulbosum Theophrasti, cuius meminit lib. 7. ubi bulbos vocant: & quodlibet primum sese ostendit ac, & emicat ubi calum clementissimè, flamm etiam tendit hyeme exsita, ubi vero immittit postea. Nos ad differenciam iniquitatem, non innotuit Leucum bulbosum Trifolium, & Violam bulbosum trifolium, nec caput posse exhiberent, à tribus nempe floribus foliis.

Primum genus folia similes sunt angusta, Pura & Pseudo-Narcissi similia, sed breviora, mentana, huius & magis perspicua dentis, versus terram aliquantulum flexa castita à nempe palmari, flores in singulis foliis, narcissimè gemunt, decorsum quoque pediculi, colore candidi, ex sex foliolis aliquantulum striatis compositi, flomibus in modum cum lateralis apicibus ferunt in rotundis regulari partem, rotundam ferunt, & colore flamm: radii candida & bulbos in plures facile propagant.

Plerique Germanique Hippocratis in vmbrosis & humidis sylvis reperitur: apud Belgos hancem area cœditur.

Flores eodem quo superius, arripere, aut non multò post.

Germanique *Herings-Wurzel*: Nollis autem *Cystostem* appellant.



*Leucocaulobulbosus caphyllis.*



*Leucocaulobulbosus hexaphyllis.*



*Leucocaulobulbosus polyphyllis.*



*Leucocaulobulbosus Anacardiacum.*



Leucoq; haec flos gurgulis esse manifestum e fl. quod Hexaplocha, non abire, à sex floris foliis cognoscitur. Mithridatium cum aliud, tum superius Narcissi speciem facit, ut cap. De Narcisso scriptum est.

Tertium Leucoson bulbosum caule & foliis secundo simile est, maius tamen ac proce-  
nos: florum in singulis cauliculis non vnicum, sed quatuor aut sex & particularium quidem  
formarum praefert, aliter multo has forma & magnitudine per omnia similes.

Est hoc nobis horrente tantum.

Non primo Vere, sed in aliis diebus, sed multo post, Aprilis videlicet deinceps mensis, vna  
cum Narcisso flori.

Vide fac Leucoq; bulbosus species haud dubio quaedam est, sed Gerontina.

Annumerat vna & illis Leucosis Bulbus qui dicitur parvus, ex radice vnicum compactus,  
caulisque nudus, & cauliculis gracilibus palmis alius, à cuius fastigio floriculus vnicum  
aliter dependit parvus, albidus, firmus foliorum, Leucosio altero similis, sed minor multo,  
color & foliorum, & non Vere, sed Autumnus prodierit.

Atque facultates horum Leucosorum nihil quod adferamus habemus, cum à veteribus  
de illis nihil reperitur proditum, & à recentioribus nihil quoque oblectatum.

De Tulipa.

CAP. XXVII.

Tulipa.

Tulipa cum fructu.



EX bulbosorum horum numero & Tulipa est floe purpurascens, cuius differentes sunt spe-  
cies quaedam maiores sunt, aliae minores.

Maioribus forma eadem sunt omnibus esse folia vna bina aut ternia, crassa, oblonga, lata,  
per marginem modice reflexa, quae cum pernam erum pennis, modice subere videtur, adu-  
ta vero ab alio caulis in ser eae ut pedalis aut paulo altior, cui vnicus flos videri solum spe-  
ditur, & ita foliis, patens profundior & aliquantulum angustioribus obis cyatho, aut una er-  
fo huius formae paleo quodammodo similes flammibus in medio crocatis color flos subinde  
lucos est, cuiusque aut candidus, aliquando dilute quasi purpureus, non raro ruber: Varieta-  
tione autem in his non exigua etiam ad minus, magis est liquidum foliorum, & non raro vir-  
gines hae asferentes particulae, atque quibus foliis subinde coloratae sunt: manifestum vero per  
V 2 hanc

Tulipa minor Narbonesis



ferat, & herba est, quae lac cogitur, ut a n. Herpichus. Constat Gelseus Tulipam Satyri esse existimari, & quidem Erythraeam, quod videlicet flore sui speciei rubre, aut omnino Satyri, si quae sit speciem referat. Cum quibus an essentur, & quantum, ex subsequenti descriptione delinquentibus ut lingua sua diligenter considerandum.

Mors à nonnullis Hermodactylis flore lacteo dicitur, sed perperam tantum. Neque enim Hermodactylis speciem ab ea esse videtur.

De virtutibus autem & facultatibus Tulipae nihil certissimum habemus, nisi à quoque scriptum reperimus.

De Meleagride. CAP. XXVIII.

Quae hae Narcessi nomine extenditur, non modò Tulipam, sed & Meleagridem dicitur, quae tamen à Narcessi differtens est, Tulipa verò simi flor. Haec elegans, pulcherrima Tulipa, & non siccum spodiata, sed desertum dependens, e hinc quoque certissima foliis virgato colore purpureis, quem diluè admodum purpureo, ac quasi melleis, ordine continuo digesse, ac intermixta macula, elegantissimi varietatem confectum commendat, & fere quidam inter eos verò parte nigrescentes sparsim dispersit, hinc emittitur: Stamina quoque hinc sex sunt, & medius pilibus, colore fulviora. capsulaeque, cum quem subinde quassa, repleta, longa, angusta foliola è vixit cardis capta, bulbis siccis rotundas & albidus.

In Gallia Celata prope Auri hoc certissimum accepimus: in Belgii hortis feliciter abicit, & subinde florem gerit.

Vix cum Tulipa Aprilis mensis flor hinc viget.

Nonnulli Familiam vocant, ab abaco sine glabro, in quo Scacorum appellam hinc excurreat, quae in Focillum dicitur quibus aut, quod non constat. Marmale quidem Focillum appellare dicitur abaco, in quo alio hinc, Epigrammaton lib. v ad Galliam

*Item melle, mellea pars videtur,*

*Clavosi reuocatur à magistro.*

*Et abaco male proderit focillo*

*Arcaea male sapit à pipera*

*in Edibus regis vixit abaco.*

Nonnullitas Meleagride accinas videtur: Meleagride quaedam cum plerum, si non

Melagale.

Melagaleis altera lecta cum fructu.



huius speciei, utramque varietatem de dispositione, magnitudineque macularum refert. Melagaleis enim ante colorem venosum sunt plurius.

De facultatibus autem huius fructus nihil contingit adferendum, exploratus siquidem malis habet.

De Satyris et Dasycaridis & aliis. CAP. XXIX.

**PRÆTER** Orchides diuites, quas etiam Satyræ Plantæ & Apuleius appellant, duo Satyræ generis Dioscorides esse videtur: unum Flapuros dicit Trifolij & aliorum cognomento Spalysium.

Trifolium folijs ferè tripartitis scissis, Lapathis, aut Liliis similia, venis minoribus & rubromaculis, ut et in aliis, *scissis* sine foliis, ut in viis, ut in quibusdam, gustu dulcem, & cum graui. Idem Satyræ Plantæ tribus, ut dicitur, sed paulò aliter dicitur. Folia et aliquidem cum Lapathis aut alio Lili, sed ruber Lili esse ait, quæ multò angustioribus & minoribus sunt, quibus candidi Lili: de radicibus gemmas, editò plantè quam Dioscorides dicit, Verba Plinij sunt. Genu. Satyræ folijs Lili rubris minoribus, & tribus non amphitè terra cucurbitulis modant. caule laui, cubenti, unde radice gemma, curis trifloris pura & minor maris gignit, efflorat autem scissis. Pertinet autè quod de gemma maior dicitur, ad Onocleam, non verò Satyræ habitum. Radicem autem huius Satyræ Dioscorides an oportet ex vitò autem collari ad opulentiorem habu: & ei qui vitò cum malis concombere, hac videtur fieri, sicut exemplum ad Venetam potè etiam è vitare.

Erythronium Satyræ sine lrythronium, semen habet Lili formis simile, sed minus, rubrum, splendens & laue, quod & ipsa in narratur Venetam exotare, vii. Scimus: eili radice comis tuberosa & felix, utramque verò pars candida, gustu non graui & dulcis. Nascitur in sibiripolis & montanis locis. Pertur ad Venetam incitare radis, etiam si manu comatur: cum vino verò sumpta multò magis. Idem ferè de Erythronio Plinios, nisi quod firmum ei non Lili, sed Vinici maximè lauiam dicit, & vires ei plura, et aliorum tamen relata, adferunt: ut in his Galienus quocumque & hanc si quibusdam in poro dicit, & à Sarmatis, equis ob asiduum laborem pigrioribus in coctis: quod vitum profud artem vocant.

Sed postea quam tam magnas Erythraeo Saryra, ad veteres libidines curandas, virtus & Dioscorides & Plinistradi scribunt, suspensam non temere videatur, Saryran esse, herbam esse cum, quam Indam quondam Aristote Theophrastus lib. 9. ut quid cum Veneream effluatissimam potissimum cum nec haurit, nec abominatur, Theophrastus ipsam mentione. Si enim in Erythraeo tam efficax viset, ut enim in Indam sicut pum in hincque exortate quare non mirum ab Ind. alius herba (si non eadem est) facultate differere esse oportet. Ad eam si quidem Veneream mirum in modum herba potest, quam Indam Aristoteli nec enim solum edentibus, sed etiam tangerentibus tantum, generatibus vix dicitur adhibere remedia hinc, ut quoniam velleat esse valeret, vix refert Theophrastus. Verum hanc in de caulis cum Erythraeo eandem esse affirmari omnino non potest, si cum non de similes eandem aut similes facultate suspensam reperitur. Concedatur tamen Indico virus, indecum exaltis Indicis perennans.

De orebra.

CAP. XXX.

Cynoforchis pro.

Cynoforchis al.



**O**REBRIS, Dioscoride auctor, duo sunt: Vnus Cynoforchis, alter Orchis Scirpi dicitur, pariter vero hoc & coram Italig. aliq. ac differencia reperitur, ut species, quaeque duobus illis comprehendi non posse videbantur, nos quinque generibus commutari debemus. Primum genus Cynoforchis, siue Canis testiculium; proceram testiculium Menonit: Tragochon tantum quartum in Orchis Scirpiat: quantum Testiculium odoratum, siue Testiculium Puniticem cum Cordo appellamus.

Cynoforchis complures reperitur species

1. Prima folia habet lata, pinguis, Lili foliis propemodum similia, caulem pedalem autationem, angulosum, in eo sterna copiosos, speciem in digestis coloris ruberis dilare purpur, cucullo anguste pinnatis similes, ex quibus parte inferiore lactiosam quiddam, carnium alteras unguis quadrupeds exsuo simile depedit, dilare & ipsam porporatione, paribula magna purpure vel sepissime pro rubicibus, praece sibus super adhaerent, gemas sicut bulbo velut testicul, forme aliquantulum oblong, quorum vna plures ac vegetas, alter magister.
2. Altera species foliis similes hauribus, oblongis & latis est, sed quam antecedentis ruerat



Tofieldia macrotis, var.

Tofieldia striata var. minima.



manam, angustam vt Orla, vnam superiorem, alteram inferiorem, & vnam quidem planam, alteram mollem & rugosam.

In qua descriptione deprauatae Graeci exemplaribus legitur *βούλα οστράκη*, proinde agnoscit: Nulla siquidem appellata est mollis Orla, & Orla falsa multo & maiori & angustior sunt quam Orlae. Scillarum autem quaedam mollior. Hanc Dioscoricus molli Scillon appellat, etiamque falsam Cynosochiam molliam ac leuiam folia, similia & angustiora esse ait.

Confirmat hanc leuissimam Theophrastus De historia stirpium lib. 9. vbi de Orla scribit *αὐτὴ ἔχει τὴν πύκνιν ἀσπιδάδα, καὶ ἄλλοι δὲ τὴν ἀσπιδάδα, hoc est, folium habet Scyllae simile, sed leuius ac tenuius. Et si melior Plinios lib. 27. cap. 10. Quaedam folio, ait, Scillae esse dicit, leuius ac molliore. Et tamen in vtroque casu huius Orlae de scriptio deprauata. Pro *ασπιδάδα* siquidem, vt Macretius legit, in nonnullis Theophrasti exemplaribus (quae Graeco male corruptio nis occasione delectare) perperam legitur *ασπιδάδα*. Sequitur deinde *αὐτὴ ἔχει τὴν πύκνιν ἀσπιδάδα, ἢ αὐτὴ ἔχει, ἢ αὐτὴ ἔχει, quod penitus corruptum videtur. A pud Pliniam legitur, caule spinoso, & similitur deprauatae Orlae siquidem caulis spinosus non habet. Coram tamen hoc Plinij locum tenet, Theophrasti locum hoc modo putant restituentem: *αὐτὴ ἔχει τὴν ἀσπιδάδα, ἢ αὐτὴ ἔχει τὴν ἀσπιδάδα τὴν αὐτὴν.* Quomodo autem haec Theophrasti & Plinij corrupti loci restitui debeant, ac emendari, diligenter expendendum est, siquidem.**

Tofieldia Morionis duplex est: una videlicet, & femina.

Man folia sunt quaeque, aut sex, longa, lata, laeuis, Lili folia similia quidem, sed minus saepe in maculis distincta, hincque hinc hinc signata, quorum vna est aetate altera caetera quoque circumpeditum caulis dodecandrum: flores in spica purpurei, caetera vobiscum abstruere, odoratis, & aspectu grati, postquam comestum habent propendens, simile scilicet conchae Regii florea, anterioris vobiscum auriculatum & cristatum Morionis relictum. Nunc caulis conchae ac posterioris galiae modo floribus haec, & angusta foliola, quae à laetibus dicitur, autem, quod vobiscum medio amollitas, caetera restitui radices gemini sunt globuli, vobiscum vna Myrtice similes, supra quos filix exiit.

Femina folia habet similibus leuis, sed angustiora & aliquantulum venosiora sunt. Plantaginis angustifoliae quodammodo similia: flores haerentes quoque, & vobiscum patentes.

Tofieldia macrotis var. minima.

Tofieldia striata var. minima.

Tofieldia morionis var. minima.

Tofieldia morionis var. minima.

*Trigonotis, Tuberosa hanc.*



*Orchis Serapioides.*



cauli, à tergo dependente (singulis corniculato, sed foliatis, que orche sat densa utrum modò adoleverit non creditis, sed ipsi floris in culla sua in cum benthibus, ut non facile observentur, grana & hinc fulcra similes globatæque eam & super annectum aliquid libet.

Erva quodam huius generis flores sunt purpurei. Viole ferè æque colore, in medio capidi-  
 dorsa, pando alioque variegata, pluresq; densiore in specia, candidi quàm reliquorum. Nigro.  
 Alii flores dilute rubent, et albidus brevis orche, & folia aliquando luteo in aora.

Tertio, flores purpuream referunt, eoque toti rubentem, & videsculum colorem, densa hinc  
 hincq; specia, flores in aora: sola non in tal frusta, plerumq; erecta & cauli circa appropinquem.  
 Hinc Tuberculum sunt qui velint Serapioidem esse Erythronium, sed parum in hoc acciderint,  
 Orchidæ Serapioides floris.

Sunt verò & huius generis maiores testiculæ, quibus costiculis brevis est, sola parva qui-  
 na aut lima, non ut alio ceterum costiculis erecto, flores in specia hinc rari, colorumque  
 in variis purpureo dilute, nunc candidi, quibusdoque rubentes, sed culoni oblitent & o-  
 deris nigro.

Trigonotis folia simi alter bris, lina & Nigro ferè, Lilia est proxima, in a flora quàm in floribus  
 Orchidæ eadem cubitalis, sipe folia nonnulla infirmas amplexantur: flores hinc palli cau-  
 lina interque veluti specia malis, feridos & hincum olere, quorum forma parum quos ne  
 plerumq; alioque quibus tamen non exantio simile, sed longis aliquando longi retortis veluti  
 hincum cum medio corpore alio cruda propendat, coloris eius casus est, caulis, purpureis ali-  
 cius pondus circa annectum maculata: similes in valulis oblongis & brisâ pigmentis per  
 eripantur: hinc foliis grandis, fibra aliquot supra ad hanc.

Tuberculum hinc plerumq; appellatur: non ab odo re, quo hinc cum dicit in flore est, sed  
 egoque & hinc officulum hinc malitiam.

Tuberosa Serapioidis nobis cognomina, tria oblectantur in generis, floribus in pipi hinc  
 alioque hincum: hinc hinc refer.

Primitis inque generis folia profere, duo aut tria, bris, hinc hinc, ut Lili folia in alto in-  
 tant: caulis elodrantalis aut alioque, flores in eo rari, candidi, papilionibus exponis pla-  
 quibus modo similes, & foliis hinc hinc hinc hinc, uno superiore, alioque hinc hinc

*Trigonotis*

*Orchis Serapioides*



Orchis Scirpium frondosum macer.

Orchis Scirpium frondosum macer.

Orchis Scirpium macer.



alias referendos, & longiore, tenui, veluti papilionis corpore propendente, nec lacinia & del-  
centi leuocrem eandemque, qui conseruato aliquantulum pedicelo, caeli adhaerens globosus  
si bene germinis, candidi, & rotundi, & supra eorum anthesim fibre alioque pro radicibus.

2. Alterum & secundum genus quatuor & salve consistit folia, & racos, aliquantulum late, Plan-  
taginis singulis foliis quodammodo similibus, sed minoribus, quibusdam tamen versis, ut  
alio modo eandem, qui palmari aut dodrantalis est: floribus in summitate quatuordecim  
aliquot foliis compositis, quorum inferius forma, & colore fabrago frondoso faciem por-  
tans referre videtur: ut sicubi si bene ut alio germinis.

Reperitur haec species dicitur: in his locis per tota scythia, Macedonia, & aliquan-  
tulum in rubra paupertate habere aliam omnino maiorem & subseruata. Haec autem  
herbarum: illa aliorum.

3. Tertium in foliis Scirpium si licet si minoribus, & pueris, cauleque breuitate ac trun-  
ce quibus secundum, cui aliquot lacinia similes apparet: flores haec tres aut quatuor, ex tribus  
genus superiorem foliis, & quarto inferiore ob longiore, colore in purpurea tris foliis,  
quatuor variegatis, forma autem eandem corpori simili: ut sicubi veluti germinis per  
pala sunt.

Tria autem haec genera Scirpidae occupantur, propterea quod eorum flores ut  
quidam referunt fructus & lactis, ut quoniam à Scirpide nomen habentia. Alexandri  
olim Dio, eius excellens Canopi templum erat, & lactis in & caribus & salutaribus ob-  
lebarur ut videtur est apud Strabonem lib. 17. Fuchsius etiam ante nos, genus illud, quod  
re facit refert, Scirpidae feruam fore. Diuisionem rem Orchis Scirpidae de  
trium illorum signis manifeste exprimit. Verba eius sunt: *Oxytropis, & Scirpidae feruam*

Staphy-  
lium  
Scirpidae

*Staphylium Scirpidae* quodammodo eandemque, qui conseruato aliquantulum pedicelo, caeli adhaerens globosus  
si bene germinis, candidi, & rotundi, & supra eorum anthesim fibre alioque pro radicibus. Orchis autem, quae  
reptans alio nominatur, folia habet Martubio similia, oblonga, sed lata, & per tota  
reptans, cauleculum dodrantalem, flores si bupureos: radis si bellis per tota  
reptans. Cum quae de suppone si frondosus noster Scirpidae, praefertur qui macer est, conseruam  
conseruam etiam reperitur. Folium etiam in Martubio folio longius latiusque & longi-  
quod

Tofieldia odorata major

Tofieldia odorata minor.



quod refloreat: caulibus ad ortum talia florum superiora foliola, dilatata in cardine rubentes purpureo colorata: restibus exiguis sunt. Meramis huius est flos & Platanus, sed folia non Maris sed Pom. tribuit, quod & Dioscoridis interpretibus occasioem parbat, ut pro lactis quædam, reddiderit. Porro similia.

In Europa, inquit Platanus, mirabilis est Orchis herba, hinc Serapius, folios Pom. caule Palmæ, hinc purpureo, gemma radice testibus simili. Paulus. Et quædam Serapius dicit in Tricostum esse quædam Kribis, veluti tres testes habentem. Unde Facilius Serapius tres afficit bulbos. Platanus tamen hinc non nisi gemmas bulbos tribuit: neque nobis plures quam duas efficit hinc, nisi diu quædam Facilius depingit, vel alibi Orchis, oblituisse contingit.

Quantitas in odorata siue Parnalione apertis, curram folia mirram est, et si quidem folia amara parva sunt, pauci venosi & Platanus aliquid eius similia, sed maxime ac purpurea folia mirra, vicia, caule tenuis est, palma alternatim, circa quæ folioli parva sunt, hinc in odore, ordine digiti, ac ipse modo caulem a rubens bulbis flos gemma parva, oblongi hic non nisi loca maiori scilicet: alii minor gignitur.

Tofieldia odorata.

Emm Orchis dicitur et plerumque patulibus ac hinc rubens, in spissis ac prope quidam plagi & angulo folio, veluti Tragochus dicitur, qui folio pinguis gignitur: alii etiam maxime ad hanc Odorata, editis, incultis ac aridis locis plerumque parte aperitur.

Mis & hinc mentibus tenues dicitur, esse pro odore Parnalione, qui Augustus dicitur in Septembri flores prostrat.

Orchis Græco ὄρχις, & Ἰταλ. Tofieldia nuncupantur. Germani Aschris & Chastitatis: Belgæ Schastitatis: Galli de Satyrus appellant, Officinarum possunt nominari. Officinarum quidem Orchis Satyrus nominant, & eorum bulbos, pro Satyrus medicamentis ac compendibus adferunt. Perbuli si ha occasione videtur Apuleius, qui in illis inter Orchis & Satyrus differentiam facit, sed utrumque Satyrus, cum utroque Orchis, Caricidibus dicit, & Serapide cognominare cõfendit. Græcis, inquit, dicitur Satyrus, alii Cynorchis, alii Ematicos, Parnon, Serapion, alii Orchis. Galli Franc. Ital. Parnalione alij Ouzanion: alii Tofieldia cum leporeum nominant.

Vixit tamen Cynorchis radicibus stida est & hinc de venterum maxime quidem multum villos habere hinc radicem strumensentem, ac hinc flos, & ea propter opera Venetis ex-  
citat.

citur. Altera verò minor, contra, ut sit eius temperamentum ad calidum & siccum vergens, neque hinc videri partem abscessu ad eorum fluxum, ut etiam plene contra cohibeat ac primari vultus Galenus. Et de radice, inquit Dioscorides, nascitur, mucosum si vis clarè, mareis-guacare, mucosum si siccum, ferrum. Adstantem Thalictrum molliore rationem esse hinc capro bibendum dant, ut Venereis excutiant. andam verò ad anabardum.

Scrupulosa, G alenus ait, sicciora facultatem obtinere, nec perinde ad Venereas contrarium esse.

Nostra igitur omnium Orchidum bulba, ad Veneream excitandam vitatur: & phoscoropi composuimus ut sic faciantibus adfuerunt quodas admiscuit: probantiori tamen hinc Tragacantho bulba. Adfuerunt autem non sicut ambo bulba, sed durior, plenos, ac fieri plus habent: flaccidior: rugosior minuant non idoneus est.

Est autem plenos, non semper qui maior, sed non raro minor illi videtur bulba colligatur priusquam stipes delensent, aut cum primò in caulis erumpit. Necesse enim fluctuant, alteram magis digne sapienter, per se illam semina maxima capere. Nam cum altera magis vitas bulbas intumescat, alter verò residat ac pereat, sem non potest ut durior ac fluxo plenos semper maior sit. Quando si quidem solus creparet, tunc de raris vel non raris aut plenos crescere incipit, quo paulatim incrementum faciente alter flaccidior, rugosusq; contrahit, donec maturato semine vità cum solis & caelestis subinde totus subsidat ac patet, eo qui interea crevit vegeto ac facti plenos.

De *Saryris Basilica*.

## CAP. XXXI.

Saryrium Basilicam man.

Saryrium Basilicam femina.



**Q**UO non recentior atq; Saryrium basilicon nominat, non vitas est generis. Est enim manis generis vitam, aliorum manas: manoria, quoddam folio non maculato, man, ad maculato, femina.

- L. Manis Saryrium Basilicon, quod manas appellat, folia habet oblonga, lata, & laniata: folia maculata, nulla aut omnino vitæ apparentibus macula respersa: vicia pediculi distinet, non aliis siquæ aditus foliorum flores in flammis specant, colore dilute purpureos, enigmaturus lacunosa purpure respersis, forma reticulata. Saryrium manas, nisi quibus plura vitas distinet quos

Saryon Basilicum foliosum.



quibus singula acuta inanis inak terret foliolam  
dum gemmæ velut palmæ sunt, singula in qua  
tunc digitus distribuitur, quarum via flaccidior  
& quasi si nigra, albem vegetatæ foliola, parum  
ab amara cacantibus fibris.

Alterum minus genus, quod firmam vocat, a-  
proxi tamen minus, folia basilicæ formæ pro-  
terit, sed minus & multos nigros maculis con-  
spicit flores caulis similes, eructos & hinc,  
in respectu Moriana maris, colore nunc can-  
didior, aliusq; purpura vel rubentes, vel dilu-  
adcaulem inclinatæ, semper magis porpe-  
nem pendula emittunt: variegatos radices al-  
terius fundes.

Horum verò & species quædam aliò minus 3  
secundum casum folios, ut etiam inter ipsos  
flos, sed tamen minus, erant.

Minus genus, foliis illi angustis, & ut Mar-  
4 tholæusque, Croci casu dodranati iunco,  
lanaque, in curvato utroque flos emicat porpe-  
retis, Amman amulas, qui recessu odorem  
quam suavissimum reddat: radices aliorum  
similibus, sed que magnitudine ipsa cedant.

Nascentur Saryon hæc, loca v; plurimum  
humentibus, palustribus, in pratis siccando & in  
sylvâ.

Florat Maio ac Iunio: non seras.

Nostra aut Saryon nuncupat Basilicæ sine  
segetem & Palmæ Christi. Est tamen & alia  
hinc appellatæ herba, Racinae videlicet,

hinc etiam & Palmæ Christi vulgò plerumque nuncupant. Germana Saryon Basilicæ,  
Cristi nuncupant: Belgæ quædam magis Gallæ Saryon vocat.

Saryon velut succidit sine radice Arabi vocat. Sed Auzentia Saryon ac esse me-  
dicinam hanc Indiam. Et Saryon Saryon in radice effidetur, albus, similes Behem al-  
be, & medicamentum esse Indiam. Saryon autem hæc Basilicæ radice: nihil minus quam lignum  
fuit, & non ex India portatur, sed in omnibus Europæ præstantibus possit reperitur: can-  
tium à Saryon abfunt.

Mathias Saryon Basilicum Dignos citius Auzentia esse vult, & Monachos qui in  
compensatione Mofæ coccoventus edidit, dabunt & penes lætorem medicum relin-  
quunt, in de causa reprehendit. Nobis tamen magis placet Monachorum habitatio, quam  
Mathias affert. Neque etiam Saryon hanc radice dicitur fiant, sed recessus quædam vege-  
tæ faciliore, & sicilicet omnino facit de: nulla etiam omnino citius aut palustri-  
lentis est.

Dignos citius, inquit, Auzentia, An fuit, & quidam citius cum palustri lentis, Dignos  
Verba enclitica: Adhibetis sine digno citius quid est? Eius figura est sicut vola manus, com-  
missa ex coarctare & albedine, & est dura, in qua est parum dulcedinis, & ex ea est citius  
corpulentissima albedine.

In & Rhafis libro Commenta utroque, digitus hoc croceus, ut exemplum habent, appel-  
lat, & est gutturalis venarum trachearum aut Ar Basilicæ Saryon radice: nihil minus quam cro-  
ceus, & ad tangendum nequaquam vales habentem.

Que neque Saryon Basilicæ vulgò nuncupatur, à Dignis curata Auzentia & Rha-  
fis dicitur, in anfractu ostendunt.

Ar Saryon Basilicæ radice, Ortheon sapore & gustu refertur, proinde & facultatibus simi-  
les existimatur. Nicolai autem Nicolus cap. De curatio quartanæ, viti habere ut, &  
per saporem, & per insensum ventrem purgandi, & adipeus quædam febria inere-  
ritas per purgationem, radice gutturalis pollicis longioris est valem, cum vino ante accessio-  
nem vultus calidum, hocque remedio ter sumptis, Bilivum quædam post 44 aut 45 ac-  
cessione, à quartana casu liberatur.

De *Pseudorchis bifolia*.

CAP. XXXII.

*Pseudorchis bifolia*.

Ophi.

**AD** Orchideas recentior aetas ortum referit, quoad *Bifoliam* nominant, Orchideam & adstroniam quoddam genus. Sola habet non plura quam duas, etque ad eadem sibi mutuo opposita, lata, nervosa, Planities latifoliae folia similes, sed mutua: eadem de- ducuntur, Flores secundum apicem ordinati- gestos, restant Scirpus terrae quodammodo si- miles, sed fabuolae, aut in viridi albeantiae angustioris, cuius formam praesens descri- ptio: radices fibrosae in diversis tenduntur.

Haec locis humida ac palustribus.

Floret una cum Orchide *Maso* ac *Tanis*.

Nomen aetas *Bifoliam* appellat. Germano, *Sapffel*, Nostris, *Quercus*. Putaret esse *Plu- mio* appellatam *Ophioidem*, quam autem haec formae de- notantur *Ophioidem* simile, foliis duobus. Sed non esse *Ophioidem* a se non potest, quia duo quae sit illud *Ophioidem* denotantur: *Ophioidem* simile, ignotum. Aliis videatur esse *Alisma*, sed *Alisma* parum cum *Alismate* conveniat, ex hisque si- perius cap. De *Saponaria* scripta sunt, eius promptum est colligere, ubi quale sit *Alisma* ostendit est. Nomen non aliquid super ostendit, vixit huius praesentia.

Videmus autem hanc herbam recentioribus sicut, ad cupra & videri glacianda.

LIBRI SECUNDI PENTADIS SECUNDA

FINIS.

STIB

239

# STIRPIVM HISTORIÆ

## PEMPTADIS SECVNDÆ

### LIBER TERTIVS,

#### DE SYLVESTRIBVS FLORIBVS, AC NONNVLIS ALIIS

##### PREFATIO.



**S**YLVESTRES nobis dicuntur flores, qui in eruis, pyris, pomisq; marginibus, sylvis, pratis, et in lastribus gignuntur locis, ad herbariis vero raras admodum, utque ad herbariis erantibus nihil aut cognatis facientes, nec edere magisteri desideratis. Sunt tamen ex his plerique venarum, quibus ad curas medicandis rusticis virgines utantur, multo ad medicamentorum materiam faciunt. Præter hos verò sunt et herbariis nonnulli admissi, qui caucalibus et cognatis ad se pertinetunt.

Præterea autem in his libris aliquot sylvestres, qui propter venenam cum Falsis, aut de his communibus et falsitatem, aut perniciose ferunt, aut ad aliam usum partem quasi de causis translatis sunt. Ita fit ut ad unam aliquam classem subinde referantur, quæ alio descriptis potissimum. Quod obis modo iterum monuisse satis fit.

De Fide.

CAP. I.

Iridis albanorum.

Ir.



**I**RIDIS species, colore floris differentes, complures esse Dioscorides manifestè ostendit. Flores siquidem, aut, aut candidi, aut lutei, aut nigri, aut purpurei, aut cyanei. Quam colorem diversitatem, non in uno flore, ut Andromeda Læcis existimatur, sed in differentibus capitulis, aptè observatione collat. Aemulicam tribuit Antonius Musa, quæ se conspiciat in Ilyrico Indis floribus, plerisque

Iris bellissima Francica.

Iris minor.



et sique candidas, alios pallidos, normales luteos, quosdam purpureos, in Exarata simplici-  
cium scriptis reperit.

Differunt verò lides, nō modō floris colore, sed & stirpis magnitudine: quod utrimque  
maiores ac proceriores alia humiliores ac minores sunt lides.

Folia maiusculis oblonga, crispis aut gladij similitudine: caeteris minus, teretes, glabre, le-  
ues, carinatae, vel sinuatae, in quorum summo floribus magnitudine, sunt alternae ordinatae,  
tertia quaternove, colorum constant flores semis postmodum foliis, quorum tria deorsum re-  
spicere acutis modo reflexuunt, alia tria sursum & contra se mutuo curvantur. Colorandi-  
da per totam quidem florem candidus est, luteus, luteus, caeruleus siue nigre in summo, q-  
ruibus purpurea, nuda, candida siue Viola: nuper colorum referens, purpurea verò ut caeteris  
purpurea, sed eius tamen quae Belgis vulgaris est, non in omnibus foliis, neque ab una  
parte ferebatur, ferebatur tamen reflexa, pallidiora sunt & colore diluore, quosdam utrimque  
hinc pallidissima & ad aequae aequae colorem accedunt, deorsum curvata inferiori parte pal-  
lent, superiore verò pulcherrime purpurea siue nigra Viola diluore colorum primum in-  
cipiunt, inferius interea linea candida, quae ab ipso folij apice ac vel in basi, non &  
ab ipsa illius summa extremitate, gratum colorem mixtum & varietatem efficit. Omnia  
fere ab ipsa inferius in foliorum in singulis floribus parte, quae calyci adheret, & inde  
sum ad medium producit, multum, terra, bus, hoc ubi, hinc ubi, pariter & candida, vel  
pallidiora, hinc ubi superius, aut hinc ubi hinc ubi similitudine. Praeter hoc autem  
quae proprie folia, sunt & tria alia oblonga, angusta, foliola, acutius, sunt utriusque parte  
quae similitudine illam quae ordinatae conueniunt: si hinc singula flammata. Radices lides  
plures, sunt, nodosae, ac veluti generatae, digitali aut amphion crassitudine, foliis  
in plures propagant, ipsae lides adhaerentes distibute, & summae utrimque hinc  
candida quibus aliter recentibus: noniam referent, normales inest feruentioris  
quae tamen non sunt, sed paulo post quam maris sunt, deperchandunt. tunc etiam sunt  
& linguae radices: proceras, aquae qualitate veligant, ac utrimque vel quod non sunt  
sunt, ipsae in partem: siue verò generare sunt odore, & qualitate gustibus maris ac

Minore Indes, folia floribus & radicibus atque similibus, sed folia tantum dodranata, la-  
scia sumere, quâs Chamaerisda, aut Indes maritimas tenuifolia: flos eandem cum Chamaeris  
formæ, sed minor passim, colitur, vel è latere longuicioris, vel extrinsecus coque maris satura-  
tis, aliâd est.

Post haec singulae succedunt crustæ, mangularès, in quibus scimen sibiòseum, notando  
oblongas, Ochro manna, quod villosarum rugosioribus hæret.

Nactar les in Illyric, Macedonia, Africa, & in compluribus Europæ prouinciis. In  
Belgia, purpurea quaedam familiarissima est, & non modo in horto, sed & quibusdam pala-  
tibus locum sponte occupatam curas flos diluacionem purpuram, & aquæ cyanæam colo-  
ram refert. Causâ de, hortalis tantum est veluti & conseta.

Sunt & minores Indes Belgia herentes. Latæam apud Hispanos etiam in palustribus re-  
peri accepimus.

Quæ in Ins apud Illyricos præsent, & melior quàm in Macedonia, non tamen parte  
maritima, sed mediterranea, magis hæc ad Septentrione in Ins, vt Theophrastus ait. Plurima  
Ilyricam reliquis quocumq; præferit, & quædam non in maritimis, sed in palustribus (cum pla-  
ma, sicut silybestrus, maris rectè habent) Drylonæ, & Narone nactar: quam etiam Nicandrus  
Theophrastus commendat, sic scribens:

*Ἰσοὶ δὲ τῆς Ἰλλυρίας ἀπὸ τῆς γῆς Μαίγρης ἴσῃ. ἰδὲ αἰὲ,  
Ἰσὸς δὲ κὼς ἀπὸ Drylon & Νάρωνος γῆς.*

Sunt etiam in Ins Ptolomæo in Gallia præuincia Illyrica vicina. Notando veliò scilicet  
halles, Drylonem suam esse aut Illyricorum & Narorum, qui Illyricos & Laburos sapa-  
gulis Cadura & Harmonia habuerunt, in serpentes metamorphant.

Diskordis inter Illyricos & Macedonia præbentissimam. Isdem esse ac, quæ cadit  
et hinc, vt nota, frangi conueniat, siluâ colore, multum odoratis, pulis secunda, odore  
integra, non suam redolens, & si inuicem teneat, du in mundum, mouent.

Præter hæc, Plama alioque, Macedonia est, quæ apud Galenos lib. 7. *ἡ γῆ* in  
aque quædam Adolepsis recipitur, cum tamen in aliis compositionibus Illyrica tant ad-  
hibetur.

Tertio loco Africana est, quam Galenus lib. primo De antidotis, multò inferiorem Illy-  
ricæ dicit. Nam si, utque, confusus cum quæ ex magna Libya Romanæ copiosissima ad-  
feruntur, tum ab Illyrica abest, quantum mortuum corpus à vita.

Quæ in insularibus reperitur ut septentrionalis, detinetur ac vitibus infirmiores sunt. Theo-  
phrastus latomæo ab hac odore esse exherens. In Thracia, inquit, ceterosque insularibus  
sibus lac, ac maris coctura siones, odore Ins parum caret: quod tamen non absolute ve-  
rum est. Nam & Belgica Ins seditata, non omnino abique odore est, licet tamen odore,  
quàm Indica inferior, quæ hæc etiam in Germania & aliis, reliquis præferat, & Florentina  
copiosissimè.

Indis herementis Miso præditur: folia sicut semper virent: radices duræ, vt vlla  
hæreticis esse odorem, nisi fortassis carmarum, quæ in nullo hyemas rigore, sicut de  
radice in Belgia interueniunt.

Est tamen & inter Indes, & quædam malotes, quædam ex Lusitania Belgia aduena, non  
modò Vesid & Arcunio sicuti producens, quam sicuti rectè hispanam Clusius appella-  
bit, ac in Obliuionibus suis Hispania lant delectat.

In Grecia sicut appellatur Adhærens & Theophrastus sicut legunt, quæ consecrata, quo-  
neris etiam Latine dicitur, noui sicuti radix Marica, vel poria radix Narone, à Narone  
sicuti, utaque optima & copiosissima, vt dicitur, sicuti. Inm sicuti, ceteris, ab actu  
ceteris, & ab eadem occasione sicuti, admirabilis, sicuti enim actu ceteris in Poe-  
ta aliquando vocat. Normannæ & sicuti aut sicuti, sicuti purgans, sicuti Plu-  
bia Indis sicuti sicuti, ac sicuti, Lupus vocat, trahit, quæ sicuti actu modo ex natura, la-  
biam Lupi sicuti sicuti reddunt. Germania sicuti sicuti Nostri sicuti aut  
Ex Gallia sicuti Indis sicuti & sicuti, Ins normannæ.

Indis sicuti sicuti cardis sicuti in officinis sicuti casu Graecorum in occupantur. Gen-  
tam sicuti sicuti Nostri, Nostri, aut sicuti Galli, sicuti sicuti appellant. Hanc res-  
tibus quæ præsent, & odoratorem eius radicem affirmant.

Alia Indis sicuti, Indis sicuti sicuti sicuti: plerisque tamen Lusitania, & in Apulia a-  
sicuti, vt Franciscanæ sicuti sicuti Angulus Palæ & Barpotosum ab Urbe vt sicuti  
sicuti: Indis sicuti & sicuti sicuti: Hispania, Lusitania Cardos. Germania sicuti sicuti  
sicuti sicuti sicuti sicuti, Nam sicuti sicuti sicuti sicuti sicuti sicuti, quæ sicuti  
sicuti sicuti, plerisque sicuti sicuti Indis in sicuti, ad differenciam causâ, cum al-



venit horrentis. Sunt tamen & alie apud veteres Syriacas Indice, Xyris velle lica, & Ephemeron non lethale.

Aliaque Angulata Indem à Palladio Hycinthum vocari confirmat: alios Hycintho, Indis ac Gladioli nomen tributum dicitur. Verbo Palladi sunt, lib. 1. De apum castis, ubi 37. Herbas nactus, Organiam, Phytum, Serpyllum, Scruicium, Meliophyllum, Vulu agellum, Alphonellum, Cistagium, Amaranthum, Hycinthum, qui Indis vel Gladiolus dicitur, sive Indicum foliosum, &c.

Porro Induadices recites, & ad huc siccis plenas, ut pensè castile sunt, & ad quem siccè caliditas quadam generis vocis. Succos rari non modo balent, sed possunt in aquosis humores potenter educit, & hydropicos insigniter purgat, cum lactis sero, aut calido liquore, qui caliditatem eius non nihil contemperet, & potus.

Ande in secundo sunt ordine inanis caleficientium & reboantium: crasses & lentas humores, qui egre ac difficultè educuntur, attritu aut respirantibus difficultati, tolli vocat, & omnibus thoracis vitia, que hinc oriuntur, multum in eleganter profunt. Auxilium etiam leucosis, cum viscidis serpentina demeris & perfidiosis, nigralis, & in quibus generata per huc, cum aceto, inquit Dioscoride a potu: cum vino mentis ducant. Decodi ad infusum aut adhibere vult est, cum oleo mentis & loco aperto ad excoridatum verbò dolent, infusum fistularum sinas carne impleat: hoc collyre sine pelli cum melle subditi fuerit: cum hinc strumas & venere demeris melle, coctis & impolitis: unda vlcera replent, cum melle repurgant, & madata ossa carne operant. Profunt capitis dolentibus cum aceto & rosaceo: postea: lentas & epichibus ablegant, cum Verano albo & duplo melle superpedes. Admuntur pelli & malagranis: in viscerum multo vfos.

De Indis minoribus, sive tenuifolia.

CAP. 11.

Indis minoribus, sive tenuifolia.



**IRIS** Indis superioribus capite descriptis, reperitur et alie quaedam Indice, de quibus deinceps agendum. harum una minor, et tenuifolia non vniuersi appellant: aliam **Chamaeris**.

Est autem tenuifolia Indis firmis, sed minor ac tenuior. folia habet breviora, angustiora, nigrescensque, aut ceris quasi coloris, quoniam sicca, grauiuscula hinc odore, Spumale firmius prope modum perspicuum, sed tamen minus grauiusculum: caulis similiter breuior, saepe vix cubita longior quo flores huius, aut vix, altemi, colore caeruleo feruntur, sicuti Violaceo purpureo, forma autem Indem prope modum firmis, nisi quod ipse foliola super angustiora sint, & superiora contra se mutuo ad se recurvantur, si d' fuerit erecta consistunt inferiora verò ac deorsum reflexa: sic hinc non habeant, sed solum lineam lateralem, qua omni parte calyci proxima, non nihil hinc est tuberculi quocum obliqua, nodosè, & sibi inuicem implicata, & quandoque quàm altiorum dentibus, longis, una tantum sicuti vltimus de truncato, sive ruffis, tenet subcardine aut sublatere, quibus seruido, vel altiorum.

Reperitur in Germania: apertis plerumque partibus, fructuosa ac humeribus campo, sicuti Vltimo Cardo, de non procul, ut Germania, Tigro, Apud Belgiam non tamen hinc procul.

Floret eodem quo alia fieri tempore.

Indem autem & tenuifolia, ut dicitur appellatur. Videtur nonnullis Piraj Rhizotomon, quod radice velle hinc sic subradis, hinc densis. Sed Rhizotomon Illyrica est species, & quod est praestantior, Flano in Indis, sed verò contra, alio odore & potestate inferior, nec in Illyria, sed in Germania reperitur. Flano de non Illyrica aut Rhizotomon, sed sui generis Germanica & tenuifolia. quodam Indis, qui

Spumale

*Spatula fœtida* species haberi possit, si ferriat quod in Ægyptu gignitur, ut in aliis Indiarum partibus, sed veluti *Spatula fœtida* notandum est. Plurij autem de Rhizotomo hæc sunt verba: *Illyrica* dicitur generis est *Raphanata* à similitudine, & quæ inchoat *Rhizotomo* subiecta. *Cæcrotis* potentia huiusmodi vellemus et *calida* feruntur, est, *facultas* & *viribus* aliis Indiarum inferior ad eadem, ad quæ illæ, ea propter præferuntur, access, vult.

De *Chamaeris*.

CAPIT. III.

*Chamaeris*.



*Spatula fœtida*.



**C**HAMAERIS inter Indes introita est, folia habet Gladole inœcra, angustiora, pungentiora: eadem palmi altitudinis, folia breviora in quo flores non altitudo cœtere ac illa, ut in aliis, sed è summo caulis summa, singulis in inflexione pediculis, crassa puncta, odorati, & multum pruri odore & aliquoties colore, constat folia Indis floribus inœcra, forma aliisque similes: folia siquidem & hanc floribus angustiora sunt, & deorsum redenta, similitudinem hanc hanc supercilij non habent, radices parvas & oblique sunt, forma ruffe, intus candida, duntaxat gustuq. feraces.

Peregrina hæc herba non modò Belgio aut Germania, sed & Italia, ut ferunt, æstivè & non nisi in hanc reperitur.

Floret Maio mense: folia hyeme percunt: Verum erunt pruri nota.

Indicem esse *Illyricam* *Hermolabus* existimant: *Barbarus*, cum eam olim in hortis Felice Septimæ Patavij conspiceret, sed ab *Illyris* & *legumina* Indæ eam dicitur, *Anonius* *Masi* in examine simplicium, suis ostendit. Nos *Chamaeris* nuncupamus, antiqua destinatione appellacione; nisi forte herba *Astragalites* dicta, cui aliquoties simile est. Nam veluti *Astragalus* ferax pariter, nodosus, & radice hanc Indæ radice sunt. *Astragalus* Indis mentitur *Sceanus* apud *Galienum* quælibet lib. 7. & *Actus* *ferocis* 19. cap. p. in emplastro venarum.

Facilitate aquæ & vinibus, hæc quoque herba acris & impensè calida est, aliisq. Indibus utilis.

De *Spatula fœtida*.

CAP. IIII.

**S**PATULA fœtida, castis, folijs hinc similes, folijs tamen nigres, quædam sicutiq. odorata sunt, præsertim si conficiantur: quoque dignitas antestant: flores quoque similes, sed immixta, purpurei, sed lardi & obscuri coloris: vel, ut *Valerius Cordus*, siccata purpurea ardentiora, quasi squarum radimento: triangulibus, quasi ab ipsa exardens, rufidior, que tandem defluentes floribus, maurescunt: defluentes in tres dividuntur partes: fœmen in his rosædum *Ochrydus* *Erucis* magna dicitur, rubens, spissiora, quod rosædum contrahatur & nigrescit. Radices novellis plantis rosædum, & vel in bulbo aut *Cepæ* dicitur caput, ex quo crassiores fibre dependent: veteribus vero & multorum annorum plantis, multæ longæ, geniculatæ sibi in locum implicantur, magnam veluti occiprem conficiuntur, gustu feracis, ut & ipsam est similes.

In Hermonia & alijs Italiae locis spontè orit, apud Belgas vix alias locis, quàm in locis repetitis.

Florum edita Iulio & Augusto: semen Autumnò maturatur.

Pasin Spontaneam fœtidam appellant: plerique etiam Indem sylvestrem: Germani, *Wandelskraut*: à potens qua circumci concue Galia, *Gleyes pascor*: Belgæ, *Wandelskraut* habent: ejus.

Ægic autem Græci & Latini dicunt à nomine Xanthi, Galeno scilicet. Item Ægic sive sylvatica Iria, & ægale sive ægale Hispanis *Lira fœtidam*.

Tenuem partem, inquit Galenus, amara siccè, digesta, ac mirram etiam deficcandi, est faciliore cura molis, cum multò etiam amplius fructus, qui quidem & vitam orit, & lenes in duriores facere possit.

Dioscorides aut Xanthi radices coneta capitis vulnere & fratribus facere, ac vitam edere: & vitam conue cum dolorem extrahere, sed ora licet ora conu parte, & Conuam redolentem, ac melle sanari & conditura ac infusurati eorum cum aceto impositum: sed ad conuallia, rupta, crescentiam dolores, stititidie vomit, & duriores cura passivam: istudum vomam potenter mouere morbi perdere ea vix bibitam: Latram verò murem cum aceto potum.

Xyridis radix, Plinios in flore. In raris vel paruis vel inguisa dicitur. Percipitur, addit, et fructu manu lesa, ad hoc vbi foratur, colligentesque dicam, cuius horemus, vitiqz nati, exiunt. Quæ & innot vana numeranda sunt.

*De Pseudobotris, seu sylvatica Iride herba.*

CAP. VI.

*Pseudobotris.*



**PSEUDOBOTRIS** folia quoque Indigent, sed longiora & angustiora, dorso obliquantem vitiqz exstant: vasis glabros, Irida hanc difsimula, fæbende hanc botris, atqz in sylvaticis placis, in aliarum Indem, celi quid heram sepeiora foliola ornato parua sint, & conuqz in vens Indibus videntur, quodam veluti tunc rad murem, ac prima hanc mures: si que secundum uentis, oblonge & triangularis, in quibus ferua multa fæbende compessa, ordine digli, plana, cariligneis, lentibus murem radicebilitate, longè gen uolens, in molis, in propagandis, colore pallide rubentes, gustu adstringens.

Pasivibutocis, humida & rigas melleis, Italia, Germania, Gallia, Belgiaque fæbende.

Floret Maio & Iunio.

Vulgò, Germani qd *Schwendel* & *Conuam*: Neist, qd *Kirch*: Gallia *Gleyes* et *Florb* *Wandelskraut*. Officiaqz perpetua olim *Acoro* appellabant: & maiore cum errore radicibus eius legitimo *Acoro* viti sunt. Nam non forma modo qz formatæ in aliquo conuam potest, sed vitibus per similit, ab *Acoro* plantis distit. Plerique hac occasione *Pseudo* *Acoro* nomen nec Indem hanc sylvaticam, atqz *Pseudo* *Indem* nuncupare maluerunt, vti Ind quæ *Acoro* similitorem.

Faciliorem habet radice hanc adstringenti, frigida & fæbende concissa, dysericant

alias viti: hanc otes collibet: mures silit, & languorem vadeoque manamem suppedit, in pote, ac aliter fæbende. Sunt etiam qui sili in gestamem eam, ab omni largi ac fæbende murem afferunt.

*De Iride rubra sive.* CAP. VII.

**AD** lodes perietes & quam tuberosam cognominari conuqz: folia hanc sunt oblonga & angusta, sive Chamædia refertur: vitiqz calciculos: has in concuam erumpit

*Itituberosa.*



*Acorus.*



folia lina, verumtamen & minor & angustiora foliolosa, qui obliqua viret, ac quo lina folia bus fibrata loca, vix nec expanduntur, sed magis in perfolio. Inque de poidet, in non minus satifera. Semen rotundum, Oclivo minus, natio mallicat. non vixit fortiter radex, anse floram duo aut tres veluti bulbos colorem, hoc vero enato in plures singulis catuberis propugnacis, quarum nonnulla dignam referunt.

Peregina dispersit, quae ex Orientis partibus, & vixit Constantinopoli regionibus, & in Italiam, & in Belgiam illata fuerit.

In diastylactis genus esse videtur, atque idcirco à forma radiceum, seu tuberosa, duci possit. Martialis Hermodactylon esse: abut Lonchitum proterum esse suspicatur. Quis Hermodactylo, quo Officinarum venatur, à Sempson sic appellare, haudquaquam responderet. Sempson admodum Hermodactylus, quod radix digni signum quandoque refert, alium esse à Sempsonis Hermodactylo oportet. Nam Colchicum Dookonda Sempson est Hermodactylus: ab hac Indis quidem differtur est Colchicum. Lonchitum vero hanc esse proterum, non ita quoque certum. Sempsonis eo Lonchitum nomen habet, quod semen triquetrum lanceae cuspidis funde sit, huc Lonchitum esse sequitur, cum semen non sit triangulare.

De facultatibus usum hanc Indis tribu Erbenham occurrat.

*De Acoro, ex Dioscorido, Theophrasto, & aliorum. CAP. VII.*

**A**CORUS cognatus & similitudo cum Indis est. folia ei sunt Indis longiora & angustiora, vixit in radices hanc diffinita, sed tenuiores, oblique secundum terrae superficiem proserpentem, gemulis veluti insertis, formam ternisq; afflicta, gualto cum quodam amaro-dulce acris, odore hanc insuetudinis, praesertim reticente.

Provenit Acorus in Colchide, Galatia, & Graecia insula. Optime, inquit Plinius, Acori radice Porruca: deinde Galatia: in montibus Cretaensis primum in Colchide iuxta Phasim amero, & vixit in aqua.

In terra nempe Apuliana sinitur, & non nisi cum flocculatum prodere agnoscitur posse. Theophrastus Acorum inter eius fustes refert, quae cum seminebus flores edunt.

*Κακορ* quod *Καγορ* Graecis: Latine Acorum dicitur: nonnulla, scilicet Apuleio, *Ακορ*, & Venetia, item radix Natives, Singaporensis, Virginiana. Officinarum Europae magis cum erone Calamum Aromaticum appellatur, & Calami odonati loco habetur: pro Acoro Pliniodorus radices propteram subsistitantes, ut siquid ostendimus.

Est vero & Acorus qui bulbam *Oxyrrhizae* radice

radix: *Thlaspi* hanc quendam *Asper* *Asper* vocare malent, et *Pitris* an.

*Acon* autem radix, auctore Galeno, in calcificando & reficcando turpi est condita. Detrahitur enim, Diatremides inquit, a massâ motum suscitatur ad latera, rheumatis, & hepatis dolentiam rem ad normam, *Asper*, & cerealis Lactem obtinetur: prodest illis duo vitæ officia, & si serpente demortis sitæque radices, quæ oculorum claritas officiant, exeret. *Milicæ* etiam *Arcidotea* videtur hanc radice. Nostra erant & elegans non absque fructu additæ, quam doctiss. *Crud.* *frigid.* ejus fructum palmis omnem & pedibus occupant.

Parsilar verò, *radices* *Diatremide*, *Aconitum* *demifam*, *candidum*, non canosum, *plenum*, & *dorsum*. *Pitris* *Crocus* *candidioris* *Ponticus* aut *Sunt* *variet*, ut ipse inquit, *Crocus* *Pitris* *maris* probare.

De *Cyano* flore.

CAP. VIII.

*Cyano* flo.*Cyano* maris.

**CYANO** flo. *caulis* *angulosus* *folia* *verò* *oblonga* *firm.* *acuta* *in* *ara.* *profundius* *reflexo-*  
*muta* *cap.* *sa.* *Ericæ* *frax* *similis*, in virtute *silicantia* *capitulum* *firmum* *caulicolum*  
*foliis* *reflexis*, & *marginatis* *concoloribus*, ex multis *perispermis* *separatis* *fibris* *capit.*  
*angulis* *seca* *silicantia* *exiguâ* *modo* *composita*, è quibus flores erumpunt ex *umbra* *quâ*  
*fructus*, sic *flantibus* *medis* *putches* *sem.* *in* *colicium* *digestis*, *colore* *caeruleo*. *Emis* *per-*  
*ispermis*, *forma* *oblonga* *gum* *laris*, *splendidi* *um*, *superiore* *parte* *barbarulum*, *Centaury* *maris* *em-*  
*issim* *simile*, *sed* *minus* & *caeruleus*, quod in ipsa *capitulis* *sive* *calycibus*, *inter* *ca.* *cap.* *in* *ip-*  
*sa* *perispermis* *multibus* *plis*, *reperiunt*: *radices* *renaca*, *fibris* *quâ* *ut* *istum* *capitula*.

Nascitur in agris *frax* *in* *renaca*, *vel* *in* *Turcia*, *Socali*, *Hordeo*, & *alibi* *frax* *bas* *similis*  
*in* *horis*, *qui* *cultare* *marginis* *colorem* *sive* *perispermis* *modò* *albicantia*, *modò* *purpure*, &  
*ous*, *alibi* *diuis* *rubentis*, *alibi* *ad* *parvam* *incluente*.

Mais *in* *ca.* *fragilis* *flores* *incept*, *deinde* *laris* & *lulo* *flor.*

*Cyano* flo. ab ipso *caeruleo* *colore*, *nomen* *veteres* *dedere*. *Recte* *nascunt* *plurique* *scen-*  
*culam* *Germanorum* *appellatorem* *scen*, *Floris* *frax* *in* *omnium* *in* *capit.* *Germano-*  
*rum* *foeniliam*: & *Hispano* *foeniliam*: & *Belgæ* *frax* *in* *capit.* *appellat.* *Calli-*  
*scule*, *Asiaticis*, *aut* *his*, *detra.* *Ab* *Italis* *per* *Composit.* & *Antypholis* *sive* *Septifolis*

Cyanida Sim.



miratur quæ Ellipsoidea, quæd metacrobis & haemibus officinar, retulit in eam occurrâ fâcile.

Præter verò & hunc, & alius est Cyanus maior, foliis oblongis, pollicar latioribus, multibus, lanuginosis, albicantibus, Vasculari tamen folia & racemibus & racemibus: caliculi dodrantalibus: capsulæ etiam squamose vix attenuæ floribus quoque similibus & copulis, sed ad purpuram nonnihil vergentibus, ac maculis radicibus, quæ crassis hærere fibræ, & duriuscula natura, singulis annis vegetantur.

In sylvis & montosis, Trago solis, stipitur: noñ in hortis ferunt.

Etiam florent, Germani vocat hæmilibus appellatur.

Cyanus minor appellat dicitur potest. Thelythia Verbaſci species essentialis esse videtur, sed Thelythia, ut superius inquitur, non rubet.

Ad Cyani floris genus pertinere & alios quædam hæc integras nos videntur, quæ tamen copulæ aut cympas non sūt, formæ tamen Cyanum aliquammodo refert: vnde & asperosæ, appellatur potest. folia necnon hinc sunt oblonga, candidiora, in partibus densiora, caliculi tamen in ramulis copulæ duntaxat, folia perquam exigua circa eos, & in demum floris singuli Cyani formæ, sed ambobus foliis in purpureis subentibus, floris in buxeris mediis ex luteo, candido, purpureo permixtis coloribus. capsulam

floris simile Cyanis, sed asperam, cæcumbens à singulis squamis exiguis spongiæ, radice subest crassis aliquantulum.

Potè facultates horum florum, nondum satis cognita sunt, cum in illam in medicinis vix habeant. Videtur tamen Cyanus prior, sine fructuorum floris, refrigerantis nonnihil esse potens, atque hinc oculorum inflammationibus posse profdessequi à plerisque et asseritur.

*De flore Regis.*

CAP. IX.

Lat. 2

**R**EGIS floris radice vixit colorato aliores, rotandi, in ramulis complures divisi, citius quoque folia tenuia, myriophyllicis formæ duntaxat, Abrotano folia maiora, è viride in græciarum ac alio tempore eorundem partem floris pulchram, ordine & speciem digesti, quibus à nigro perispermæ vixit carnulæ, angustior & acuminatam viream calcans firmam duntaxat in feris colorat in candida, aut purpurea, aut carulea siliisq; inde oblonga, rotunda, subrigida, quibus duntaxat angustior & nigram.

In hortis & colitur & singulis annis ferunt, qui maiore est.

Est etiam in magna fructuaria, hæreri folio, sylvestris qui folia, floribus siliisq; ferunt, fimo siliis, hæreri carulea, in singulis annis natiua floris purpurea, & colore candido carulea.

Floris quoque albius mentibus, & duntaxat in horis flis.

Appellatur à Germanis Xitar spongiæ nostris duntaxat spongiæ hoc est, Equariscolori, & Italiae spongiæ de castoreo à Galieno *Parad. d'Alexandria*, ad est, Per. Alia dicitur Anglice *Easton's King's Lark* in Flo. opulenta & Flo. regis à nomine Confidula Regalis, qui hanc siliis perispermæ vixit carnulæ, angustior & acuminatam viream calcans firmam duntaxat in feris colorat in candida, aut purpurea, aut carulea siliisq; inde oblonga, rotunda, subrigida, quibus duntaxat angustior & nigram. Quæ modo in vixit in quibus duntaxat angustior & nigram, nec otium ad hoc ex Gerardo à Yelwiczke *Caus. V. hæreri* quod *Turcorum Imp.* Otium qui sibi Constantinopoli vixit exemplar referret, quod duntaxat in feris colorat in candida, aut purpurea, aut carulea siliisq; inde oblonga, rotunda, subrigida, quibus duntaxat angustior & nigram, non folis, sed floris duntaxat in feris colorat in candida, aut purpurea, aut carulea siliisq; inde oblonga, rotunda, subrigida, quibus duntaxat angustior & nigram.

Lat. 2

mm







Caledula.

Caledula  
ad spem.

Flos Africainus.



est Caltha, Virgatus totum & Columella Caltham florem esse ostendunt, latere autem colore. It. Virgilius quodam in Georgica & longa locanda, sic scribens:

*Mellis latet in prope Passio Caltha.*

Columella vero in forma libro decimo, haec scribit: *Caltha Latens & flos in latere Caltha.*

Plinius autem lib. 21. cap. 6. Caltham non graeco odoratum esse ait, quale in totam Caledula est, quae, ut diximus, cum graeco quodam odorata & eam colore latere spernit.

Certum fiscalium flos quidem Caledulae calidus est, secundo propemodum ordine, profertur necessitas & arduus: creditur cor corroborare, venas resillere: & aduersas pelliculas solvere, quocumque modo sumptis, officinale. Fuchsius ex vaso porci intestis exit, & fuscum secundum dicitur, scriptum reliquit.

Herbariis autem folia calidiora sunt, acrisque & non quaedam sic eadem habent, sed quae propter humiditatem in consuetam non praeter se eunt, mox in eius in obitu sumptis, sunt moxera & leniora. Fuchsius fuscum dicitur dolorem sedare scribit, si ne eo collatur. Alij idem palarem febrium cum sphaeo dembe admovent. Sunt etiam qui herbam acerrimam iudicent.

Est verò & alia praeter hanc Caltha, Alpina Galesio cognoscitur, folijs Piraginis, colore acris & amara, hanc Caltham vocat, quae copiose in fluminibus Alpium patet.

#### De flore Africano. CAP. XLIIII.

**I**NTER Calthas numeranda praeter istam videntur cognomento Africana. Huiusmodi sunt species, una in aere, hirsuta, rursus calidissima, per totam plantam parte flosque abstrahitur, procrea & erecta, ad tres vel amplius pedes assurgens.

Folia utique sunt secundum caliditate multum oblonga, ex multis singularibusque abbas scematis composita, Tamen folia propemodum similia, quae eodem modo, Solis lateri opposita, perforata remanent: flos in firmis nervorum fasciculis ex longis calyce amplius rotandi, ex oculo aut decem foliis orque, infestas lutea, superose vero parte in folio rubentibus, & obicant rubens solibus holofereum articulis basijante quae medio rasoet flaviana lutea fermen nigram, flosca abbasque & tenet: pro radicebus flore. Est utique speciosa, cum folijs, tum floribus graeter odore. Virridipetiam flore, sed moxera floquent, flosmodi multipliciter sequor foliis abbasque parte vel plurimum lutea.

Apud Belgas, Germanos & alios, videntur colere, & singulis annis serunt. In Arelis quibus locis spernit: possent: vnde praeterit: & haec regionis inuestit: quibus viderit: D. Carolus V. Roma.



Tragopogon.



Tragopogon cum pappo.



Nascitur suo sponte in campis plerisque vniuersis Germaniae montibus & humoribus, vbi in praesens, & praecipue in eos floris. In horto vero procerior, amplior, floribusque maiorebus, speciosioribus conspicitur, praesertim purpureis.

Scorzonera.



Huius flores praesertim in horto ac sub montibus videntur.

*Tragopogon* & *scorzonera* Graecis nuncupantur *trigon* & *negrosion*: Latini Hirci herba, Coma Germani, Doelberi Belgii, Doeharii, *Scorzonera* Gallici, *Scorzonera* Galli, *Scorzonera* Hispani, *Scorzonera* Angli, *Scorzonera*.

Herba aeterna, ut Dioscorides ait, est, quae vixit nonnullis quoque aetate videtur hyberna munda: in plenisque vniuersis cum scortis inferat ac edat.

#### De Scorzonera. CAP. XIUI.

**A**D Tragopogoni genus referenda, quae Hispanis Scorzonera, cum sit Scorzonera vocatur: filius oblongus, subcauli distans, rotundus, laciniatus & per arbores subinde praesens sinatur: caule rotundo, pedibus vel aliove fluctuato multiplici, cetero tenui, qui e tuncis papillis foliatur: formae oblonga, subcaulata, & raris: radice longa, singulari, candida, quae vniuersis obrogatur & nigricante.

Nascitur Scorzonera in Hispaniae plerisque montibus, loca humantibus obscuris & vniuersis reperitur: & in Germania Thuringia, ac Silesia in Silesiae montibus loca feruntur.

Apud Hispanos flos Mian nuncupatur: proderit Germanis vero ferat, hirci videtur & hirci.

Hirci

Hispāni *serpentes* appellant, quod Latine Vipeream sive Viperanam sive Serpentanam sicut, de dēta, quod conata venena viperarum ac serpentū efficit habentur. Nam Hispani Vipeream *serpē* appellant. Apud Germanos & alios nationes nomen non inuenitur.

Ferunt aerea hanc, postea contaga accere, & omnibus venis ut in illis viperarum, & prope viperam in moribus eadem, epoto vel radice, vel herbe succo: prodesse non credunt, & hinc molestant, nec non conuulsis morbo obnoxiis & vertiginosis: sed hoc conuulsarum laborantem facere, insipientiamque omnem delictare: laborantem radice succo soluant nisi, vltim excurrere.

De Chamæmelis vulgari.

C A P. XV.

Chamæmelis vulgare.



prope, *epoto*, quod scilicet Vere dicitur. Alexander Trallianus Chamæmelum etiam *Anademum* dicitur habet lib. vii. cap. ii.

Chamæmelum verò dicitur, quod omnes flores, *radice*, sive male odorem habeant, quem in vulgari nō Chamæmelo eadem & manifestum est sentire, uti et vel hinc vulgari: vltas Chamæmelum, verum & legitimum se conserre hanc, quod & ipse etiam facultates eadem ostendit. Tales quidem vulgari Chamæmeli facultates omnino sunt, quales Chamæmelo Galeno inest.

Chamæmelum Galeno inest, assidit & deficcet in primo ordine, & tenuem est partem, digerit, iuand, & rarefaciendi vim habet. Item & illo locostenitise Rosè per simile est, color ad Cili. vltis magis accedens, bonum familiari & temperata. Quapropter lassitudinis, si quod aliud cum primo conserit, doloremque sedat & mitigat: primum vltis conuulsit & hanc quoque medicamentum dicitur, emolliet, quoque confusum, deficcet. Omnes autem huiusmodi facultates nostro vulgari Chamæmelo inest, ipsi quædam conuulsitate perperita. Nam si odorati quidem ipsam ex parte facit, partem vltis, valde tenuem est partem, digerit, relaxandique singulari, ac mentis potentia penditur est: multo hinc ad omnia vltis, que elementer calcem, et solui, dicitur ac tenuis & fiderat. Calcem & colicos dolores hinc vltis moderatè provocat, vltis & soluit vltis sedat latentes dolores malorum dicitur omnes emolliet, & crudos humores dicitur. Item praestat vltis ex floribus confusum, quod ad hanc lassitudinem omnes remedio est, & omnibus vltis aduocatur. Quæ si perinde dicitur dolorem eadem adhibetur.

Coralia.



**SylvestriVM** Chamaemelorum, *Coralium* quae passim nominant, tunc sunt generis unum, tunc duo, aliosque non ferunt a quorum una sit per circumstantiam eandem, alios vero totius loci.

Chamaemelum *Sylvestre* ferendam, sine Catala fertur, caules prostratos secundos, vitatos, fragiles & succulentos, in alio multo densius, crassiores & leperumero altiora quam Chamaemeli folia similes amphora, in vixit nigricantia: flores forma & colore similes. Fere herbacosa, gratumque odorem spirant unde et *ferida* cognomen dantur.

Nascitur in arvis, inter femina, & apertis marginibus.

Floret eodem quo Chamaemelum tempore.

Officinae & Herbarii passim *Coralium* ferendam marcupant, plerumque *Carnocellum* ferendam, Germani *Kraut*, *Berthel*, *Herbst*, Belgae *Pantelionum*, *Stachys*, *Cantia*, *Gall*, *Esper*, *pergent*, & nonnulli *mesochus*, ab aliis *mesochus*, Leonhartus *Fuchs* *Pantelionem* esse voluit. Sed *Pantelionem* verum & legitimum vulgo dicta *Menta* una, quae odore longè digniore, & sapore admodum amaro, foliis serratis & *Comarum* similibus. *Coralium* enim ferida minus gravior odore, & foliis *Coriandrum* non similibus.

Altera *Coralium* albonon ferida, quae à plerisque etiam *Oculus* boni dicitur, caules ceteris eorum

plures, tenuiores, diviores, floribus ceterisque quam *Coralium* feridum, & circa caesulae, *Chamaemeli* foliis paulò longiora & candidiora flores in medio luteos, per circumscriptum candidos, *Chamaemeli* & *Coralium* feridum floribus similes, sed maiores, exiguas aut nullas odore radices densas & lignosas non oblique adnatis fibres, quae aliquot annis perennant, verè regenerant.

In arvis & agris sine tractatu vni cum *Chamaemelo* reperitur.

Albionis montibus floret.

Nossum artem *Coralium* non ferendam appellat, & *Coralium* album, plerumque *Oculus* boni & *Buphtalmum*. Germani *Kraut*, *herbst*, *franz*, Belgae, *Latite*, *Comogre*, Hispani *Mojeda*, *laca*, *es*, *de*, *largo*, *leah*, *ardos*, *de*, *base*. Ex verum quidem esse *Buphtalmum* Leonhart *Fuchs* *herbst* fuit. At nos verum & legitimum foliis illud esse videtur, quod infra sub *Buphtalmum* nomine describitur. Nam *Buphtalmum* quidem, ut *Diocorides* auctor est, folia sunt *agrostoides*, ad esse, *herbst* foliorum similitudinem habentia, & floribus melius *Hacend* folia non sunt feruntur similia, neque flores totius artem sine melius, sed plerumque propter ceterum ferentem videlicet candidos, qui ortum vel folia *Mentha* etiam in ore, et *Comarum* hanc album, sine vulgare *Buphtalmum*, verum & legitimum esse *Buphtalmum* non negant. Proinde non *Buphtalmum*, quod hoc nomine à plerisque appellatur, sed *Coralium* & *Chamaemeli* *Sylvestre* species quaedam est. Plantis lib. 2. cap. 7. *Melandrum* herbae nomine, ut *Melandrum* gerit ac prout nascitur, hoc albo & odoroso, ut *Melandrum* nostrum istud *Coralium* non ferida sit, sed generis, ut quaedam, propositam Plantae brevitate, merito facile quae herba *Melandrum* sit, affertur.

Tertia *Coralium* artem, caulesque eius non prostratos, foliis *Coralium* albae maioribus, maioribus, candidioribusque, in flore & medio & orbiculari umbra, radices sine basi tunc cada dem lignosa, diviora.

Nascitur in Germaniis & Gallia, eisdem ac similibus quibus *Coralium* album locis: apud Belgas, horrentis est. Inno ac lulo flores proferit.

Germani *Strachitana* & *Strachitani* appellant. Belgæ *Strachitana*. Fuchius *Anthemidifera*, & Chamaemelum Chrysanthemum aut facit folio tamen parato, odore naturalibus Anthemidiferae Chamaemeli aut *Leucanthemum* referit. Mattheolus pro legitimo *Reptantibus* deputare videtur: desideratur tamen in eo folium *Manturverides*, quod *Reptantibus* esse *Droserodes* testatur. Nos huiusmodi inter *Cotula* & *Sylvestris* Chamaemeli potius procerdum *duos*, quia alterutrum tenent *strachitana*.

Tamque hae *Cotula* in medicamentis aut odore nullum habeant, proinde resartificantes incognoscunt. Videntur tamen omnes calida et quantulum & sicca, Chamaemelo vulgaris virtus quoad modum similes, sed longe tamen infiores, imbecillioresque Quis forte dicit, ad veni morbos commendatur, sed ab eis profertur, qui Parthenum esse credunt, & Partheni vires ad hanc transferant. Est tamen non omnino *Cotula* hae invidiosa, quando fons omnia, ex vero strangulamentis proficit.

*De Chamaemeli odorato.*

CAP. XVII.

*Chamaemelum odoratum.*

*Chamaemelum Chrysanthemum odoratum.*



**O**DRATUM Chamaemelum duorum est generum vna *Leucanthemum*, alterum *Chrysanthemum* cognominari potest.

*Leucanthemum* odorato Chamaemelo, caules erant multi, non erecti, sed procumbentes, & quasi perierant repositi: folia tenuia, dissecta, vni *Chamaemeli* vulgaris, sed maiora vni: utriusque haec quoque similia, medio videlicet iunctis, & per circumferentiam cardidit filiola cordatis radice fibrosa, durabilis natura. Refertur folia & flores pergramm achalcandam granitico quadam odorem, aromaticum odoribus perillaltem, qui etiam in arida durat permanet.

Est & haec generis quoddam, foliis mediis folis ambientis densissimè multiplicans, hinc angustam orbem costis quod odore & forma procedenti per gramina similia aliis est.

*Chrysanthemum* odoratum Chamaemelum, cauliculos similes profert tenues inaequalis, & in terra prostratos: folia quoque tenuia, vni proceri, sed cardiditiora & paululum minor: per odore, quibus omnibus Chamaemeli ac *Cotula*rum generibus modus, luxuriant obbetus, radice & nullis circumambientibus foliolo cinctis, radix similia. Et huius herba odorata quoque est, odore & facultate proceri similia.

Veneratur in Belgio hortenſe eſt. Floret Julio & Auguſto menſibus.

Chamaemelum odoratum propriè appellatur. Triagus Chamaemelum nobile nomen vulgare noſtram, *ſimulſte-Cande*, id eſt, Chamaemelum Romanorum. Germani eſt *Chemil*. Quod flore candet, Leucanthemum, quibusdam Chryſanthemum dici poſſe. Sed maxime eſt quæ à Dioſcorido, Galeno, & alijs veteribus in viâ accepta ſub eo, non omnino videtur aliè mutari: verum ſane eſt ab ipſiſſiſſe potentia aut incognita.

Nam facilius eorum multò immutat, quàm Chamaemelo à Galeno tribuitur. Caliditate ſiquidem & ſiccitate quatuor in illam virtutum ſeriem ac temperentiam, quæ Chamaemelo à Galeno tribuitur, quàmque ipſam habere quatuorata offendit experientia, multumque eadè viâ vixit ſecundo ordine calida & ſicca. Cum autem de ipſa ſubſtantia terræ ſententia habeant contrariam, digerendi ac macerandi potentiam habent ampliorumque utilitatis, doloresque ſedandi, aut mitigandi, ac inſuſionem. Proinde viâ magis, quàm vulgari viâ Chamaemelum poſſe ſignificacere aut maceracere opus eſt, viâ inſuſionem poſſunt: viâ in bilibus, que ſubſtantia eorum de & care famen de eorum caſu paratur, in quibus liquor Chamaemelum viâ hanc eſt negligendus. Nam de curis nimis adſtrictam curam facient, ſedem coccare, beneque corpus ad ſuam coculant.

De *Erantibana vulgari*.

CAP. XVIII.

*Erantibana.*



Item eſt, Erantibana in facie: Pochius, verò Catoſidem regalem, ſive florem Regum, de quo ſuperius egimus.

In Aſtore Amooſentem, quem Virgilius Anellam florem nominat, deſiderant hinc ſolum Chamaemelo ſimile, & ſons color: in ſtore Regno verò explet, & forma ſua. Vixque huius ſos copioſus eſt. Erantibana autem, modo color rubet, vix illa eſt. Plinius, lib. 16 cap. 8, qui de caſſia & nectarem horem Erantibana eſſe poſſit.

Matthiolus Erantibana ſua præſens, Adonis florem nuncupat, ſed Adonis ſe Anemone eſſe credit. Adonis ſiquidem florem vixit exant Quibus ſentit, Meſſore, lib. 10, in fine. Vixit autem ſos Anemone eſt. Nam Anemone ſed vixit, id eſt, hinc nomen habet, et Plinius maior eſt, lib. 16 cap. 17. Flore, inquit, nunquam ſe aperit, eſt vix ſpiram: vixit & vixit accepti. Cere Anemone autem Erantibana quod deſcriptum, non conſentit, manifeſtum eſt.

Caroli

**Confligens Eranthis** (hinc quales in medicina videntur, quantum aereum possit habere qualitas autem est, hic quod caliditate participat, sed tamen non magna.

De Buphthalmis.

CAP. XII.



omni pecora terrorem perfrensus esse, vel etiam tantum auncula lib. 1. cap. 7. Colomella lib. 1. cap. 1. in Maris montibus plurimum nasci, etiam sic, omniaque pecora in animi esse solentem: & qua ratione ac modo aereae infens debet, docet. Feruntur & Buphthalmi nostris idem pecora in morbos quosdam curare, si per auriculam perforantur in sinu cordis ea decantis Confligens esse eos sequi non debet. Dicitur siquidem stirpes similes vel easdem facultates repetiri non esse abstram. Nam & regni Veratri radices idem posse velare Plin. lib. 1. cap. 7. Picorum, inquit, & iustitiorum pituitas sanas, si modo per aurem introito, & postea sic eisdem loco exierit. Quod & experientia nobis aereis rursus conuicta experientiam est: qui Veratri regni vulgari radicibus, pecora in suorum morbis medicant. Praesertim & Veratri alba radice, vel Abfyria, & postea in Hircocles scribit qui tamen Veratri alba radice non in aurem, sed sub postera eorum insurgit. Quo modo etiam Vegetus Ranas, Confligens verat, Veratranis sive lib. 1. cap. 1. De eam modis si beatus: ut in lib. 1. cap. 2. De Mallo, in finem etiam auriculam infundenda scribit. Quae sunt ostendit etiam stirpes similes subinde habere facultates, & ea de causa nequaquam conseqm, Buphthalmum nostrum esse Confligens, quod pertinet ad Confligens pecora in morbis medicant. Quod si ex si quibus conuicta facienda est, Confligens erit Veratrum alba. Nam Vegetus omni modo Confligens verat, quo Veratri albo Abfyria & Hircocles. Auphthalmi si quibus quod Vegetus hanc curandi rationem & Graecis accepisse putat. Quae de causa, etiam plantae alba aliud, quae Veratrum album, Confligens videtur. Quod si in alba, tamen Confligens plantae Buphthalmum differtur enim Veratrum siquidem albo nequaquam abstram est.

Idem verat, Scirroides, sive primum, sive alteri, non esse, notus est quia in ve rasilis debet. *Colom.*

Helleboratum verat & hoc ipsum improprie sic opor: proprie certum Helleboratum *Colom.*

Idem verat, quod Helleborum sive Veratrum speciem ac similitudinem habet istud aereum Buph-

thalmum Veratrum nullam speciem habet. Quia omnibus de causis nullam haurum appellacionum hinc stirpi ordinis rursus est, sed



sed solum *Daphthalmi* nomen, cum eius descriptioe, quae apud Dioscoridem est, quae exquiri sine hoc respectu non potest, ac legimus *Daphthalmum* esse existimamus. *Daphthalmum* ipsum est castuleus, ut Dioscorides ait, et mittit molles & tenues folia, quod si, ut est, speciem ac similitudinem foliorum *Fenaculi* referemus, si eorum meliorum, Antitermodonum, quibus omnino praesens ille est, quae tenuitas & multiplici foliorum foliorum, speciem aliam foliorum *Fenaculi* tam exquirere experiamur, vtilitas alia, per folia, melius possit: ita ut cum omnium dubitationem hoc stirps legitimum *Daphthalmum* esse videatur.

Nominatur autem *Daphthalmum* etiam *Caltha*, ut potius *Caltha*. *Caltha* autem est *Calendula*, quae sine *Daphthalmum* nostrum proxime referre duximus.

Sunt vero & qui velint *Daphthalmum* idem cum *Chrysanthemum* esse. Dioscorides quoque legitur loca, sub diversis nominibus eandem herbam tradidisse. Sed hi si paulo diligentius Dioscoridi verbum expendissent, aliter sentirent. Licet eorum in multis vitiis, & deceptio- nem circumveniant, non a bellum in propria aliqua, quae differentia esse stirpes ostendat. Ita *Chrysanthemum* *apocynifolium*, id est, in multis partibus dicitur & descriptum traditur: *Daphthalmum* vero *apocynifolium*. Non omnia autem quae lacus est, sunt, & in multis partibus diffusa, *Fenaculi* foliorum speciem habent. Iam si eorum profere *Chrysanthemum* *Dioscorides* *apocynifolium*, hoc est, in multis modis dicitur: *Daphthalmum* vero adhaec non esse non tradit, quod etiam cum quod à nobis pingitur, hoc ita splendat, ut multum reliquos dicitur quae, in debet. An ne hoc eandem *Daphthalmum* & *Chrysanthemum* differenciam ostendat, & legitimum esse à nobis dependit. *Daphthalmum* confirmat: Sententia qui velint aliter, non ita videtur, & quae *Chrysanthemum* idem cum *Daphthalmum* esse voluit, aliud *Daphthalmum*, si aliud esse nequeat, requirit. Nam quod & ab aliis & à nobis pro *Chrysanthemum* pingitur, legitimum *Daphthalmum* esse nequeat, folia enim eius non sunt, *apocynifolia*, quibus omnino legitimum *Daphthalmum* esse debet.

Quod vero ad faciliates amnem *Mentheria* sit, in *Bolonia* cum res medicas & pharmaco- pœorum in nos tradidit, pro Veram signa, primum ad peccatum morbos: sed in medica- mentis radices huius *apocynifolia* radicum Veram esse non affirmat. Merito quod- dam me olim, à quibusdam medicis, huius radices, in quibusdam (sunt magna adhaec) fuisse decedat, ad purgationem per aspera preparata, sed nihil plus, et aliam morbos, quae si non addidit fuissent. Quod in his suspitionem movit, nulla purgandi potentia huiusmodi radices donante sit: & alia omnino facultate, quàm *Helleborum*, per articulos maribus peccatum morbis moderi. Germanis radices eius à stirpium nimis angusta egerit, aliam, idem possit. *Anthoschia* & *Bryonia* radices, ac (procurantur partes) quae tamen vides ut multum inter se differant. Quomobrem licet *Daphthalmum* radices similes aliqd Veram nullo quærit, idcirco tamen non omnia, quae illud possit. Spiritus, aculei, nomen in leporem & similia, dolorem inferunt, inflammationem caecant, veruram partem hanc molli- ciant, si in partem aliquam adgurgat. Partem aliam loci absque dolore non contingit a transfusa ut imposita vulnus ut quædam interdicit. Fortasse etiam si quædam in articulum perforatam imponerent, deum qui huiusmodi stirps radice in articulo, effectus suscipere- rent. Nos nihil hic affirmamus, cum illis, ut diligenter vires huius explorari, uti speramus.

*Dioscorides* *Daphthalmum* ait, flores eam certo in nos ordinari & dicitur à *Stirpium* *græci*, si florum ab eam à balneis bibatur, hanc colorem ad aliquod tempus liberantur. Videtur autem hæc ex cap. de *Chrysanthemum* hoc videtur ab his, qui inter *Daphthalmum* & *Chrysanthemum* differentiam nullam esse existimant: Non aliorum quibus *occuli* et *Asteris* *Amis* *facultra*bus, *Viola* nigrae quod *Plinius* accersit: & *Dioscho* legitur, in *Dioscoridis* exemplis, quodam *Sanctis* *levis*: ut si in nos totum huiusmodi. Quænam proprie sit *Daphthalmum* vires, nondum computum habemus.

#### De *Chrysanthemum*. CAP. XX.

**C**HRYSANTHEMUM caules sunt ramosi, levis: folia oblonga, digitis: sed laevia, diffusa & multifida: flores *Anthemida* sed maiores, & non modo tantum vultus, sed & obscuro ambra lateri & sunt quodammodo fulgore splendentes, odore non ubi- ni: radices fibrosæ.

Reperitur in arvis, in hortis inter cetera, & dispersum: & quibusdam quidem locis, si- litemperatissimum, alia minus.

Italo, Italo, & subinde Angulo floret.

A Germanis *Sant* *Yohane* *stem*, & *Britannum* appellatur: à nostris vulgè *occuli*: & quandoque *occuli* *græci* *stem*. Græci ab arvo florum fulgore, *græci* *stem* *stem* *stem*.

*Chrysanthemum*



tamen & Chrysanthemū Anthemidū quorūdam species, ut supra scriptum. Borealiem etiam Chrysanthemum dicitur, testē Democritus in Geoponica. Item & Elychrysum Chrysanthemum est. Sed hoc Chrysanthema ab isto presertim differt.

Nomen est verbū & libid Chrysanthemum plerique Buphthalmum & Coltham, quæ cum Buphthalmi propria nomina sunt, quod capite precedente descriptum est. Non desunt quoque quæ Bellidis speciem faciunt, & hanc Bellidem dicunt. Est autem Bellidaceus generis herba.

Castilei autem Chrysanthemū oleum modo Dioscoridi tradit, odorat.

Flores cum cerato transacti omnia diſsentire dicuntur. Ipsi herba pota in balneo post eruptionem de solis ardore Regio correpta, boni humoris colorem inducit.

*De Chrysanthemo Latifolio.*

CAP. XXX.

**L**ATIFOLIUM Chrysanthemum mox à radice solis pariter oblonga, lina, virentia, superiore parte aliquantulum aspera, inferiore verbū laevior, & lanuginosa colorata, inter quæ scapi exunt semina, cubitales, aliquantulum hirsuti, dactylis aut tubis gariculis articulat, à quorum singulis basi contra se positis folia, ang. tubulose pediculi exant; in quorum fistigis amplè orbiculati flores, Euphrasini aut Chrysanthemū annali, sed maxime coloratoris specie, & modo diſco, & circumambulantibus foliis, luteo splendentes colunt, quorum modus discutiendum in pappo variat, oblongo, tenui, nigricansque semina minuta. radix fibrosa est.

In Germania incolitis ac sylvestris locis frequenter reperitur.

Junio mense in hortis Belgij cum flore conspici potest: sequenti mense semen cum pappo à vento rapitur.

Germanis *Waldstauden* dicitur. Sunt qui *Alisma Dioscoridi* esse velint. Sed vbi *Plantaginis nervosum folium*, & *chrysoides caulis* *Alisma*, siquidem, quod *Dioscoridum emense* dicitur, *Plantaginis hirsuta* sunt folia, ac vbi *chryso similia*, que hinc non addunt. *Chrysanthemum idcirco Latifolium* citius appellandum, quia tenet *Alisma* nomen et *chryso*.

De faciliatibus verbū hinc est *chrysofolium*.

*De Chrysanthemo Pinnatifido.*

CAP. XXXI.

**A**D Chrysanthemū genus oblongum quoddam, quæ occurrit, pergrinus rare inagratissimus. Item, quem Solis floribus quoddam vocant, prolietia admodum. Super est, hominibus pergratissimum.

*Chrysanthemum latifolium*





*Bella glabra.*



*Bella serotina.*



*Bella serotina.*



diclos, medio luteo; Chamæmeli Loucaetheni & Coniæ albe fluitos, nullius odori, radice fibrosa.

Nascitur in pratis, & locis in agrorum agrorum locis non agris.

Bellidem, ut dicitur, in aëre appellatur Germani, Fuchio auctor, Brasiliensi nonnulli etiam Consolidam mediam. Alia tamē & Consolida media, ut Bugala que pro-medij generis Consolida habetur.

Ceterum Bellida minori folia humectandi refrigerandi quæ facultate donata sunt, & humectant quidem eorum secundo inodoro, refrigerant vob eodem remisso. Dolores omnes sed præsertim articulares ac podagricos, ex calido licetque humore, attingant, cum butyro recensid & infusio mta, ac locis dolentibus imposita, postquam additis Malax folia. Eadem oleum additis, faciem aliam faciunt, & in craspede febr, ac in interstina aut in inflammationibus, magna utilitate ementur ad miferent.

*De Aëre Aëre. CAP. XXIII.*

**A**ËRIS Aëre dicitur sunt species, vna purpurea, alia lutea. Bona.

Purpurea floribus Aëre catholice præterit ceteros, rotundas, aliquantulum duras, fragiles, asperos, nonnulli paleos, dodante aliores: folia oblongora, præsertim vna. cauliculis emata, dura quoque & aspericulis & luteiculis. tamen species quædam angustioribus folij. Floris ad farrago vulgaris in cæcior, forma fere florant Chamæmeli, medio luteo, sed obliculo ambobus catholice

Al. i. Africa.

Albae Arcticae Sibiricae.



- varietas purpurea, qui in pappos nascunt, semen quibus sibi est exiguum, radicesque  
 1. Lutei floris, corticibus fragilibus, ramis caulescens, foliis non duris, & vniq; apertis  
 his pinnis similia est, aliquando tamen maior, floris & modis orbiculis & circumstantibus  
 foliis luteo splendens colore in pappo & hi, sed tamen non aquo die, abeant, semper  
 que exiguum, & radice bus distincta.
2. Hortis generis & saporis quidam inuenitur, cuius corticuli non eriguntur, sed deorsum  
 reclinat decumbunt: sunt hi rotundi quoque ac dum colore salsubremens, folia vniq; in  
 similitur, aliorum similia. floris paulo maior.

Apud Germanos, Bohemosque, in Italia & alibi asperis & montis reperitur locus insu-  
 ritus, in collibusque non eximie in praesentia, & cum flore quidem Augusto mensis. Apud his-  
 panos nunciam floris (postea Albi alle. eua.

Actis Arabicis quae Boissierus Generis, Latine Albae Africae, Sibiricae, & Inguale com-  
 Non mutatur vero & à nomina Africae, Sibiricae, & Hyopthalmon: Germani Quis-  
 Sibus Quisfrans, Sibiricae Quisfrans & Sibiricae appellatur: Hispani Babar, & Sibiricae  
 Sibiricae & Sibiricae vocant. Paratur & a, qui purpurea est floris, à Virgilio Anthe ut  
 cupan floris, de quo Geoppon quarto

Albae  
 floris

*Est etiam floris in praesentia, cui nomen Anthe  
 Ferre agricola, facile quarentibus herba,  
 Nam, non in praesentia velle de vestire spem  
 A vici ipsi, sed in fatis, qui plerumque circum  
 Pendent, velle subleuat purpurea nigra.*

Cum in Albae Africae deponitur, ut Galenus tradit, medicamentum est facultatis, mol-  
 le & valde est calidus, & non vehementer deficiat: moxque cum extraxerit multa ut  
 cens fieri.

Dioscorides affert in stomacho prodest & Albiem Aip cum in praesentia tradit, non & ut  
 locum in praesentia in praesentia, Sibiricae & Sibiricae procedent. Tradit etiam refert, purpuream  
 cum casu aqua potam, argenti asularem, & comitalibus puerorum morbis curat: nec  
 tem allicat ad inflammationes bubonum conducit ut proferat: andam vero, si floris  
 leuam miam decerpatur, bubone adalligatum, dolore liberat.

De Elœchryfâ.

CAP. XXV.

Elœchryfâ.

**E**LÆCHRYFON catholice vocatur propter gracilem, virentem, lignosam, in alar qua idam tubumque dicitur: folia confecta, Absinthium similia, aliquantulum candidiora: flores in summitate capitulorum in umbellâ coherentes, luteo seu roseo fulgentes, forma florum Tanacetii vel medijs utriusque inter se differunt. Anthemidæ, qui prius eodem Saccharis decore, spotam suam ac polichromiam ducere solebant. Quæ de casu & decore dicitur, luteo coronati foliorum, & Prolesimam Aegypti regem deligentissimè hoc tenuisse, Pirææ tradit.

Est plerique Italia ac Hispaniæ locis incolens, in pratis solo gracili, ac circa fluminum ripas.

In Belgij hortis dicitur Augusto, aut Septembri mensi: Theophrastus vocat & Pirææ Elœchryfion inter vicia foras numerant.

Dioscorides Belgicè appellat, nonnulli etiam *gouardouge*, alij autem quos Galenus est, *diœchryon*, propter florem dixerunt. Alii tamen & Amaranthos est, propositum, de quo Hippocrati. p. 100. Plantam hanc dixerunt Helœchryfion nuncupat: Theophrastus similitè *diœchryon*, Gœt. *Sarclum* vocat.

Facultas, inquit Galenus, est incidenda & exsuccutiva. Prodest contra, Dioscorides ait, in vino pota contra vicia difficultatis, serpentium idus, coarctatum dolores, & ad ruptum mentis etiam provocat linguam & gramos & in ventre, & in vesica cum vino mulso sumpta diffusio: defusiones à capite sistit, tunc in ebrietate potest ex vino albo diluto etiam dicit: vesibus infusa incorruptis eis confectus. Theophrastus Elœchryfion ad ambustia etiam noscitur, & mellis pernitium valet in trade.

De *Stachidæ Clivis*, seu *Chrysanth.*

CAP. XXVI.

**A**VRE coloris contra Elœchryfion simile.

est, & recentioribus Sorchus: cetera simplicia. Catholice hæc odor dominatiles, tamen: folia oblonga & angustioraque incana & lanuginosa: flores in summitate capitulorum, in d. d. d. in cordatisque veluti umbellâ, odoratis, exiguis bullis similes, colore luteo splendentes, qui postquam plene maturaverint colledis, colorem & polichromiam non mutant, sed retinent: sed seorsus gratias ac regnat.

Nascitur locis asperis & subosis & in conuallibus, frequenter iuxta Rhenum, præsertim inter Spaniæ & Vorticisiam.

Iuno mensi & post Solstitium flores.

Germani, quod in ripis, que Rhenus vicine sunt, præsentit, *Aposthianum* nuncupat: Item & *Yangling*, *Wortianthum*, *Wortian* sicut Belgæ, alij *Stachis*, *Stachis* caput Latrè Turcane: Officina Sorchadeti sicut

Stachidæ Clivis.





*Santolus.*

*Santolus albus.*



Etiam Santolus ferit, galeo amarum, proemia calidum siccatque toto ordine: ut malumbricos sum praesentia, & ad verius eodem efficax est.

Finis Chamocyparidum herbarum, ad, ex vivo potant, comas veneta serpentiū otu-  
m, corpora utque potant.

LIBRI TERTII DE MYADIS SECUNDA  
FINIS.

E ; STIR.



STIRPIVM HISTORIAE  
PEMPTADIS SECVNDÆ  
LIBER QVARTVS,  
DE ODORATIS AC CORONARIIS  
HERBIS.

PRÆFATIO.

**PO**terit flores odoratis circumferas herbas, quas coronati & coronæ addi sapienter contempserunt. Præterit tamen arborum aut fructuum cuicunque certantibus coronari, primum fasces merita et sine cognoscant: Posterior deinde, si nostris quoque aut herbarum istarum frondes in usum admittit ac recipit: si modo odoris aliquo gratia sint commendabiles. Atque heras quibus hæc serie habet præsequatur: arboris & fructus sui loca describentur.

DE MAIORANA SIVE MARO.  
CAPIT. PRIMVM.

Maiorana sive Marum.



Marrum.

Et flor. ut dicitur, Organum folia candidioribus flore odorato. Carummodi Marum est Dioscorides scriptum reliquit. *Molge*, ut *arbitrio*, ubi *yoisagan*, *terpandis*, *lapis* et *de lityria*, et *alibi* quidam *maiorana* *maiorana*, quia si *alibi* *maiorana* *maiorana* hoc est, Marrum habet. *Maierum* nomen est herba, hirculosa, flore Organo similes: folia tamen heræ candidiora: odore, & sine odorante.

Et si hanc artem pro Sampsycho Maioranam, alterum potari non debet, quia in *topo Galeni* tempore Marum Sampsycho loco in *Armeniam* vagantem fuisse expressit in *lib. 1. De Acrio* ipse testatur, ubi ait: *Marum longè odoratius esse Sampsycho*, ita si causa hoc ornata, *Maierum* si esse compositis in sinibus additurum. Præterit istud occasiones potius, ut *Marrum* sine *Maierum* *Sampsycho* loco habuerit, cuius nomen appellauerit.

Excalfacit natura *Maierum* & resecat, & in vtraque qualitate secundum est ordinis *maiorana*

non crebris & tapine flegida morbis quousi modo affertur. uandiu inposita forma ramentosa laca & posita in cucurbit. dentium dolores lenit & uim rila aut apposita strata de aqua foetuantem in potu sumpta dicitur, & merula morbo admittitur ardentior.

*De Semplice seu Amarae. Dioscoridi, Theophrasto, & ali.*

CAP. II.

**S**AMPAISON, Dioscoridiconque, herba est mordax, sine multo ramosa, serpens per desertum, folia habens laniata & rotunda, similia Calaminthae tenuiolum. multum odorata igneola, quae in coronis nascitur. Cydoniam & Cypriam laudatissimum. Secundum locum habet Aegyptum. Appellatur autem in Cyrenis & Syria in Aegyptis sine Amarae. *am.*

Theophrastus Amarae in eadem regionibus sine suffruticam fatuosa ac corymbosam lib. 6. enumerat, & praefare ait, tenuis copia, quod haec, ad se hunc ac hunc est odorati, uale ferre & uulsiore: ex alio est, uigueritque mellei.

Plano lib. 22. cap. 1. uoluit, Amarae Dioscorides modicus & Sicula per appellatur, quod Aegypti & Syria Semplice hinc ferunt utroque genere, & ferunt & ramos copiosam Amarae aquae ac Abrotano ferunt.

Vulgatae ferunt. Amarae fruticosa floriferum esse ostendit, sic scribent:

— *videlicet Amarae alium*

*Floribus, & dala asperam compleretur contra.*

Idem testatur Catullus in Epithalamio Iuliae & Mollip.

*Cum tempore floribus*

*Sunt aliam Amarae.*

Galenus Amarae & Semplicem differentes facit supes, de utroque locus aguliferus in d. seu cuque tribuitur. Sed Amarae Galeni Partem non in Herula in Permp. 1. lib. 11. cap. 22. scriptum. iam ut & Dioscorides testis est, Partem quidem Amarae vocat, in libro De Simplicibus Medica facultate Galenus utique in Partibus incernit.

Potest Semplicem, ut Galenus ait, ueniam esse partium & digerentia facultate, deficeat & ualida teruo ostendit. Dioscorides decodum eius potum tradit, conuocant hydroperis amara uento, & uiam difficultate, ac ueniam laboribus uento uero folia est in illo appolita, uolere flegilla & merula ducere subdita, ad Scorpionum ictus cum tale & aceto impoerit, ad hanc uero cum uento excepta, & similiter eodem ad oculum uero uulsiore uero tenuissima potum sumpta apponenda: in formae acopia & malagran: collationibus.

*Marum vulgare, Chloropodum.*

*De Maro vulgari seu Chloropodio.*

CAP. III.

**Q**UOD in plerisque modis Marum nomen datus frutex parvus est, odorati ad modum ferunt, & squopede in aut duos diducuntur aliam ferunt habet tenues, ramosos, lignosos, & folia uicinia esse rila, dicitur in Theophrasti aut Serpylli vulgari folia similia, sed alba lita, candidiora, & aliquantulum miora, ac in latitudo uelut lanuginosa capula, & ambaciter similes uentricillos, & quibus perperilla folia uicinia alba: radice: uerum & lignosae.

In Hispania passim uia cum Serpyllide locis, uento de feruntque pignat: apud Belgas & alibi, non absque frado, & cura in hortis ferunt.

Aliae uentris & capula lanuginosa, cum floribus erigunt.

Multi huc uic Marum uocant, Marum uicem nequequam est, uicem Dioscoridis Chloropodum. Chloropodum autem Dioscorides dicitur, ad est, capiam fruticem esse uicem, quae rila, hinc fruticem, dicitur diducuntur; in petra nascuntur: folia habentem Serpyllide similia, ferunt uero loco pedibus, in uicibus uic Marum. Cum quo descriptione huc adduntur supes in uicem. Simulacra etiam est, & ad diuorum diducuntur aliam ducunt.



herensita habet per venticillos digestos, ut quibusdam casibus veluti Marrubij antiscorbutici  
 alij in suffragio inftar globosam ledi pedis capitulum eruantur: tota Scopylla vero foliiscolo-  
 re similia, nempe candidiora: (qualia Scopyllae sic Diocorides officinale, quando candidiora  
 est, quam Origani esse ait) sunt eadem sententia, veluti Scopylla esse Theropanthus videtur.  
 Quae omnia maxime in hunc scopulorum similitudinem ostendunt. Appellatur  
 vero *ascorbutica*, à quibusdam etiam Cleonacum, Oenoneis, Zopyros, Latini Leocypis.

Vim autem, ut Galenus, Chiropodium esse officinale ostendit, cum: siccata sicut, & in  
 terreo est, cum calcassentur, cum refrigerantur ordine Diocorides habet herbas sicut,  
 & descendit cum ad hunc venenarum beluam incolas, comissa, in pta, & vera sicut  
 dicitur in modis: fortis, & acrochordonis murem aliquos diebus potum: alium dicitur  
 illud ad terrea descendit & huiusmodi, non se hinc transtulit in vino, sicut in hunc in aqua.

De *Resinaria Coronaria*. CAP. IIII.

Resinaria Coronaria.



Ramus dicitur, & singulis prostratus supprimat. Conuenit etiam, & praesertim Roxy, quibus  
 capiti ac cerebri: ea frigida humiditate causa malis cerebri: etiam in hunc desiccant: sicut &  
 memoniam scruat: nervosis partes confortant.

Sempio Resinarium, qua Coronarij virtus, calcitro & multum reficere, sicut dicitur  
 ex auctoritate Abiti Meisai, conseruatur, ut, uterque frigida cerebri.

Diocorides regiam strobilum sine tractat, si quis ipsam in aqua collata, ante carere  
 nem bibat, deinde extructum haer, & vinum bibat.

De *Lanula*. CAP. V.

**O** D O N A T A. & coronaria sicut Latini dicitur, sed in modis, ramulosque regis prostratus  
 tenues, quadrigatant, geniculatae, cubitales aut longiores: folia circa singula prostrata  
 bina, oblonga, carnosa, utraque parte albicantia, Resinaria coronaria: folia multo longiora  
 lanulae: & in hunc speciem oblonga tenues, non hinc referuntur: radice huiusmodi  
 fibris dicitur. Spemur flores: & folia copiosum capere, in plenam odorem.

Vna huiusmodi species folia est maioribus, crassioribus & longioribus, quae odorem alterat  
 nantibus & tenioribus: inuenitur & flores candidos habens.



Velut in Hispania & Narbonensi Gallia plerique montes & campi desunt Lauandula. In reliqua Gallia, apud Germanos, & alibi in horti sunt.

Lanae: solo sunt exort.

Huiusmodi, Nardum Indicarum, & Spicam, vulgarijue lingua Syris nuncupant: minorum, Lauandam & Lauandulam. Germania & Belgicae utraque Lauandulam & Lauandulam vocant: maiorem quidem Lauandulam maiorem, minorem formam: vulgo Lauandam. Exstant autem Celsi odorata herba, cuius Virginius sibi de marmate, ut Scoticum Aetopiscum.

Tam Celsi atque alii interueniunt suauiter herba  
 De alia interueniunt pinguis P. acuta Calibia.

Epistolarum Gregoriana quatuor, vix agit de huiusmodi & sedibus apibus deligenda, apianoque coactando, herbaribus.

Max. curam Celsi viridis, & alia huius  
 Repillo, & graniter sperantia supra Thymum  
 Hieros.

Elleborum & alia Celsi viridis huiusmodi, quae passim hoc tempore Cassinomani & Carthaginiensi appellantur & Celsi quaedam nigra quam Officina Cassum huiusmodi vocant. Plantae Celsi ab Hygino Cassom appellatur referunt. Sunt autem Therophrasto ac Plinio uulsiuibus Cassom huiusmodi in ciliatum, subo canalis, oblongo, figura quocumque oleo Oleagino simili, odoratum alacrum agrum, nullum odore, modo utriusque alii descendens, gradibus ramulis paruis, crassis, vix geruntur florantque post Autumnae aequinoctium, & multum duntaxat tempore florant. Tali sunt nequaquam Lauandula est, quae nec crassior sit radice, nec alio descendens, ramulis non lenis, & non Autumno, sed Aestate flores profert: proinde etiam nec Cassom alioque species.

Elleborum Lauandula, potentia ac virtus calida siccatque, & ostendit quidem terreo, tenuem rem puram & ex modica acria spirituosaque partibus consistens: singulata de ea esse caput morbos quos modo adhibere consistit, & praesentem ut, qui non ex corpore humore, sed ex sola purissima quantitate originem ducunt.

Proinde

Præterea & stillantibus liquor odoratis, & temporibus se fronti illata, Catarrhū, hæmorrhoidalem, & febrem Comitiali morbo, ac non raro Syncope laborantibus refert. Sed in hæmorrhæia copiosa adeit, præsertim terguis permatorem, non satis in usibus vtilis esse videtur, neque compositissima, quæ ex stillantibus vino in quo laniati sunt herbes, Flores, semine, & aromata quædam miscerata sunt, conficitur, quam plerique terere, & indifferenter exhibent.

Nam eadem in huiusmodi caput implentur in vltis, & morbus attendunt, & quæ in generalium aduocant præsertim quando sanguinis vitio aut purgatio non præcesserit. Quod idem nonnulli ducunt, quia passim nonnulli medici adoleo, & tomacum aduocant, neminem plerumque perit, aliaque sicubi traheret statim similes compositiones, & ad rem illam non modo apoplexiam, sed & Catarrhū cum seibi occupati infundunt, quibus nihil potest periculi, cum plerumque mobilis, & non raro quibus agrotantia perant.

De Stachyde.

CAP. VI.

Stachys.

Stachys in Belgio nata.



1. **STACHYS** cradic est in Lauandula loci & lignosis, sed tenuiore: ramulis hinc gulis rotatis ac tenuibus, foliis circumscissis oblongis, angustis, cæcis carinatis, assuetis quam Lauandula, et cum in basin summo caputibus, hinc specus de rita, composita, lobibus ac crassis, æquibus flores purpurei & perilli excelsi, & men in his ubi longi: radice lignosa.
2. Huius verò & generis quoddam est, foliis trilobis differens, quod hinc margine serrato potest. Hispania, Noriboronia Gallia, & Stachyades insula e regione Maffiana, Stachydelis hinc frutice redundat.

In Germania ac Belgio è femine sata prima ætate facili adolebit, sed hyeme, nimis ædæ aut peruenias cellas transferantur, post, hyeme si quidem & frigore imperantur.

A Diocoride *stachys*, ab alijs, ac à Galieno *stachys*, per si dipteryngum syllaba sicandela, ne Stachys Germani *Stachys* hinc: Hispani *Tamara*, *Carasso*, & *Cassida*: Indi *Stachyde*: Angli *Stachy* nantes vocant.

Florem Officina Serratæ nuncupant.

Ceterum Stachyde, Galienus *stachys*, temperata composita est, ex terra & sicca dipteryngus, vade adstringit, & coarctans altera tenuis copiosior, à qua visus amara est, ob-

rogant

*Syrinchia folio Gerani.*



*Thymum cephalotum.*

tuncque verò commotionem, obstruere liberare, extenuare, at tergere, roboremque tum vulcera omnia, tum totum corpus esse rursus. Dioscorides eodem modo eius tradit, velut Hyffops, ad pectora vota facere, & anasione vultus admiscere.

Posterioris medici Serapionem, & praeteritum flores eius, aduersus capitis dolores, & omnes eius ex frigido rari ac frigida causa morbos, valde efficaces esse affirmantur, sicut ea propter, omnibus fieri compositis, quae aduersus Cephalalgiam dyscuriam, Apoplexiam, Cataleptin, & epilepsin, & similes affectus adhibentur.

*De Thymo. CAP. VII.*

**T**HYMUM duo apud vocantur, generis tamen Cephalotum dictum, alterum dicitur.

Cephalotum multo exilibus ac tenuibus fructuatur virga, folia copiose & copiose circundantur capitis non vacuantes Syrinchia folio similibus, sed minoribus, & quibus foliis caeruleis purpureis.

In Creta insula copiosum nascitur: unde illi Cretico cognomen datum est. Dioscorides graeci folia & petiolo proserunt scribit.

Dicitur Thymum ferculolum quoque esse, & peripallia habet foliola, colore, quod vulgare simile est, videri, & sua ac odorata, cichada vero & graecula sita, quod rarus est flores verò non in capitulis aut spicis, sed in saxa foliola: radices tenues.

*Thymum dactyl.*



*Humus*

Huius generis Thymus, Hispanus & Narbonensis Gallicæ loca deserta & inculta abundans  
In Germania, Belgio, & alibi in hortis studiosè colitur.

Græci *Θύμυς* dicunt, Latine Thymus, & Tymum. Prope *ασηπυρία*, id est, caput, &  
*Θύμιν* Alcei *ασηπυρία*, ad eisdem in Dioscoride, cap. De Epithymo, cognominatum. Fi-  
nus Thymi duo genera esse tradit: unum candidum, alterum nigrum, ac nigricans apud  
& candidum prætere ar, ac in collibus natis, lib. 2. cap. 21. Vtrumque ad duri generis tri-  
entium videtur, cum et scripturas, de nomine Thymi quoddam folia habet candida, toto aut  
vix vixata, quod nigrum dicitur, quasi fatuo colore & non candidante vireat. Germani  
ac Belgæ *Thymus* Thymus: Galli de *Thym*: Itali *Thym*. Hispani *Tymblo*. Angli *Thym*  
venerunt.

Thymum ac com, in Galenus tradit, in exal faciendo excorculoque in certo statum  
est ordine, ac idè & efficit vehementer, ob id & variati & meriti procerat, firmament.  
It, videri ex purgat, edoce nobis ex fluente & pulstone consistit.

Porum, Dioscorides scribit, cum sale & aceto quatuor per alium dicit. Decoctum cum  
com melle Orthoprosus & Affirmant prodest. Lumbicos veteri, in castis, furore, & lun-  
das pelle vrinam cit. Maxima melle & delictum, facies è thymone excorculos facta. Ce-  
drenata recentia cum aceto in possum dicitur, lingua sua pro modo dicitur vix non & de-  
gessit huius sunt peniles vena caros (sic). Et hanc eam vero & potera in possum sunt. He-  
bentur oculis in cibo sumptu prodest. Vix enim pro condimento tempore facient.

De *Serpillo vulgaris*.

CAP. VIII.

*Serpilum vulgare*.*Serpilum album*.

**VULGARIS** Serpillo multi sunt caules caules, dum rariem & lignosi, novelli in  
dum palis alioquin surgentes, alij sepevires, & alicubi terra superflua exiguas sunt  
anexi: folia exigua, virentia, Thymi similia: capitula in eadem ramulis & rotunda, & quae  
folia hinc extant, colore ruberore purpureo, non raro etiam albedo radice utraque filiose.

Huius verò & speciei quaedam, consusculiculi non serpillum: radice crassius, lignosa, non  
lanugine luce quatuorque terra in eandem in Bohemae novelli in collibus ac locis deserta.  
Nascitur passim locis incultis, vixta agrorum margines, passim praesentia & sic condole-





*Testis de rapide folia maffaribus esse*  
*et dea, Serpallam, herba cruentata dicitur.*

Ex quo loco colligendum sunt quae patet, vulgare Serpallum, verum de legitimum esse, quod videlicet non aliud passim in Italia sponso gignatur: quod nullibi quidem in agro reperitur, & non in hortis sibi potuisset.

Serpallum autem Graeci ἰσχυρὸν ἢ ἰσχυρὸν dicitur. Marcellus verus dicitur, à Galieno sequitur Galienus nominatim affirmat, ut verò Plinius Valerianus, ab eisdem Lauroniscopia.

Excalfacit vero utique adhibet Serpallum, ut Galienus docet, ut & mentes & vires motu gustu multum est uret. Prodest etiam, ut Dioscorides addit, ad verminas, capta, conuulsu, cinere castan mactones, & ad serpentium morsus, & pocum, & impositum: capiti dolenti mitigat eodum rulosos permittitur: cum aceto irrigatum maxime quidem lethargico, sed & pleuritis conuenit: sedat & sanguinis venarum quatuor drachmas potus cum aceto facit curi.

## DE OCYMO. CAP. X.

Ocimum.



Ocimum minus.



1. **SATIUM** Ocimum speciem magnitudine differens duas sibi re vulgares, ambo fortissimè, & dicitur aut pediculis modice acrosum, ramulis rorundis in plures alas, densis. linear quidem folia habet lata, per margines linear crenata, Mercatialis herba magistralis forma similia: minor vero ramosa utraque splendens, & de sua virtute hoc folio est expostione vel candidas, vel obitu suo purpuralescentes: tamen exiguam, nigricans: radices oblongas, duras, non absque adhaerentibus fibris: odore utraque similes, nisi quod minus, hoc quaedam reponatur, quae Cicutam malum odore refert, quod Ocimum citrinarum appellat.

2. Martialis praeter hanc duo Ocimum, etiam tertium quoddam maximum experientiam producit, folia Amaranthi maioribus, longis, latis & crassis, Cereie mox folia similes.

Seruit Ocimum in hortis & in siliabus, ceterum, ut Thymum minus auctor est, potuit. Quod Soli expostum est, eodem teste, nascit in Serpallam, quia vehementer acris folio namque minus, odoreque vehementer mollescit.

Iunio ac Iulio Ocimum flores, & particulariter quidem, ac illa, ab uno in capite.

Ocimum, & per a prima syllaba Cicutae Graeci appellant, nonnulli etiam Cicutae Latini Ocyrae. Differit ab Ocymis, quod ascendit in Francorum historia publicè graecis est & ad illa.

*Ocimum scitum maximum.*



*Ocimum (speciebus Asiaticis)*



ad differentiam huius per se ibenda syllaba. Scribitur autem et per e, odoratum Ocimum quoddamque Empetrum reperitur. Recensentur Baniand, Latine Regium et cili, quæque nominantur Officina, Basilicum: Germani Bassigen: Belgæ Basilicum Hispani *Albahaca*: Galli *Basilica*: Angli Basilicum Bohemi *Chajula*: Itali *Basilica*, & quod maxime est, *Basilica parva*: Hispani idem *Albahaca* plerumque Basilicum Genophyllarum hoc vocant.

Ocimum autem, Galieno, ex secundo quidem est ordine scilicet sicut uti, sed humilitate habet recte meningem abundantiam, ob quam cum modum non est ut in corpore feruatur: sed foras habere ad digerendum consociquidamque abocum est.

Dioscorides Ocimum si, si multum edatur, visum habet, alii molli, fatum mox, vniuersumque suorum, sed egressio: impositum vero cum potere in vniuersum, in febri ac acuto, in inflammationibus moderatis, & Draconis maris ac Scorpionis plaga per se & cum vino Chalcidum de locibus.

Sicut ocimum caliginem purgat, & deliraciones exorcit.

Semen potum prodest acram hanc colligentes, si ipsa nobis, & vitæ diffinitio laborantibus: sicut idem dicitur in omnibus partibus, si per mare ambarum idem ipsa herba sicut Claudius autem oculis oportet, sicut in omni vniuersum.

Sunt qui Ocimum vniuersum, & non edunt, sed quod comestum sicut non sicut potum vniuersum purgat, Apium adiacent eos qui in Scorpione est sunt, & ipsam comederunt, ab ipse dolore permittent.

Recentiores, inter quos Simon Zerby est, Ocimum tradunt officina cordi capiti que prodest sicut cardaci afflictoibus sicut in omni vniuersum ab ipse huiusmodi dicitur, & huiusmodi huiusmodi que prodest.

*De Ocimo (speciebus vulgaribus) sicut Asiaticis.*

CAP. XL.

**Q**UOD recentiorum plerumque Ocimum (speciebus vulgaribus) nuncupatur, cauliculis prout complures qualesdam, infirmos, terram veritas acclitator: folia ex interuallo hinc contra se posita, parua, longiuscula, ac latiuscula, aliquamulū hinc & aspera, vni & cauliculis sicut in foliorum subter exstantes, paruos, orbiculatos cauliculis ambientes, colore de canthido nullo purpureo sicut sicut emittit: radiis sicut sicut sicut. Odore herba hinc in aliis quibus Ocimum est infirmos, vni ex se obliuato, sed tamen cum grauitate quidem non infirmo ad Calamitatem aut Ocimum accedente.

Est in omni Germania ac Italia loca sua sicut, præsertim in culis & arboribus.

Ætate non florere, & non raro Septembri etiam mensis.

Ocimum (speciebus vulgaribus) vniuersum, appellant plerumque recentiorum. Quod autem Ocimum (speciebus vulgaribus)

velut Plinio, alius est *Oenanthum* & *chrysanthi*. *Oenanthodes* vero involucrum à profunde lobata differt. Subiq; ut loquidam *Oenanthodes* habet, *Hyoscyami* filiq; funicles, ferme utiq; quale est *Melastom*, prægressus huius auctoris sententia reducta sunt, & vasculo conici cipri conomemata, nihil cum *Hyoscyami* cypri et similia nomen habentibus ita ut *Involucrum* istam, non esse legitimum *Oenanth* sylvæstris sue *O. n. involvrum* credens sit. Quam ob causam ab aliis non pro *Oenanth* sylvæstris, sed pro *Chenopodii* habetur. Sed nec herbaria tentanda laudanda videntur. Nam si propter florem secundarium caulibus ambrosam, *Chenopodium* dicitur, meritis, medicis alijs eodem nomine nuncupanda erunt, ut *Calamagrostis*, *Oculo*, *Hieracium*, *Lama*, *Dichamn*, & *Marra* h; ipseus quosdam, *Pulegii*, *Salaria*, *Scordium*, *Melastom*, *Sideris*, *Galea*, *Alyssum*, vocati utrum *Bugula* & *Carduica*, similesq; alijs, quam omnium flores orbiculati caulis utros circumdat, nulla tamen *Chenopodium* dicitur. Nobilitate herbe. At in locis diuturnioribus. *Acron* etenim *Dioscoridis* ut, *mas*, *veliq;* *capite* huius herbati vocatus *Lamentorum*, *coronarum*, *Oenanth* simplicem, sed *hirsutissimam*, & *odoratam*. Capiti quo desuper pariter nostris sunt conomemata.

Facilitate autem aquarum sicut calida est & sicca, non alique adstringendi vi ac potest.

*Acron* vero *Dioscorides* medicis, medicis & alium dicitur potissimum, in postrema velle q; *gelida*, & *arsipolita* curare.

*De Dichanno.* CAP. XII.

*Dichamnium verum.*



**D**ICHAMNO rotundifolia, macroscap, *Pulegii* & *spella* huiusmodi conomemata lobis caulibus tenues, in alio rotundis dicitur, quorum factus est si quis multa compulsa deprenderet veluti ipse, macroscap conomemata q; *Hieracium* *Onigra*, à quibus cetera folia erunt. semis inter squarula rotundior. *Oenanth* est herba.

Nascitur in *Creta* insula, nec alio reperitur, non modò *Vereturum*, sed & *meturum* est fincitur. *Dioscorides* flore & *hirsutissimam* contra omnem venenatum scribit. *Floribus* esse post *Theophrastum* testatur *Vigilius* *Andros* X 11.

*Dichamnium gentian* *Cretæ* capiti alio, *Pulegii* *caulis* *folia*, *et* *fere* *conomemata* *Parparis*.

*Alomem*, *Garcia* dicitur: *Latius* *Dichamnium*, & *Dichamnium* *Creticum*, a rotunditate *Dioscorides* testatur, *phlegma* *et* *phlegma*, *ac* *hirsutum* *sylvæstris*. hanc *veritas* appellatur *conomemata* & *hec* *eius* *nomina*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*, *hirsutissimam*.

Officinarum pro *Dichanno* per e prima folia *Dichamnium* per p legitur, & *levis* *conomemata* *hoc* *folis*, nisi pro *Dichanno* *folis* *Parparis* *radices* *in* *vium* *dicuntur*, quam *folis* *Dichannium* appellatur.

Calidum ac siccam terra excessu *Dichamnium* est, *Pulegii* facilius frustitur, et in sentis venenatis. Fortis in hoc us & in portu asu mpta, vel in pesto apposita, vel etiam ista educit: montes evacuat: secundis expellit.

Sucus cum vino castoreo temperatum illas profido est. Tanta vero ei habetur vis, ut & ossibus bestiarumque venenatis. Præparet & in *Creta* capus legimus *valentissimus*, *hirsutissimus* vis excutere.

*De Pseudodichanno.* CAP. XIII.

**P**SEUDODICHAMNYM legitimum *Dichanno* aliquantulum foliis est simile, que & *rotunda* *hirsutissimam* *conomemata* *procurat*. *flore* *verò* *habet* *in* *veris* *lobis* *caulibus* *orbiculatis*, *et* *hirsutissimam* *parparis*. *caulibus* *istis* *luxuriant* *complanatis*, *gemma* *clavata*, *albida* *quosdam* *longe* *habet*.

*Pseudodictamnus.*



*Polegion.*



herbita, medietatem lignosam de fœcedis fibris spargens. Olor levis nullus, ac potquam capere est.

Multis in ventis, Diœsar, rascitur, sed tamen in Germania ac Belgis non nisi sumis præcipit, & in partibus borealibus æquatum.

A similitudine Dictamni *ψευδοδιδάμνου* nomen accepit: Latini similiter *Pseudodictamnum* vocant: Officinas incongruè esse parum sciant.

Caldere quoque ac siccare est, sed longè quam legitimè Dictamni facultate inferior. Frigorosissimo Diœsar austere, effectus, sed inefficacissimè multò.

*De Polegio. CAP. XIII.*

**P**OLEGION calidè exarset ab aëre malis, acetis, & veluti geniculis articulati, plurima præcedentes, ac proferentes, sicut tamen, qui flores præferens, uttolentes. folia è singulis geniculis bene, subrotunda, quàm Muscaria nigriora, brasseria, è quorum limbo vel exigua exsertis, vel terminalia præferens foliolarum flores verticillatim casticulas tota folia ambulant colore virides, rarissime albidi. radice multa fibres colorat. Olore tota herba potens est, & præsertim cum in flores sit, quem de stillantia eius liquor retinet, si per vitreo-copiam extractus fuerit.

Repentur vobis è huius aliud genus superiori casticula, flore, colore, leniore, & odore simile, cuius folia oblongata Polygoni accedunt.

Locis gaudet palustribus, & que hybernis mensibus egunt, aculostamen.

Iulo & Augusto floret, & tunc quidem colligendum.

Greci *πώγιον*, quodque & *βίγιον* è *βίγιον* appellant Latini Polegion: Officina Polegion quoque, & sibi de Polegion Regale, ad delerentiam vulgare Scyphus, quod, ut dixerunt, Polegion vocant montanum: Italia *Polegio*: Hispanis *Poleo*: Germanis ac Belgis *Poley* aut *Polep*: Gallicis *Poleio*.

Polegion valde, ut Galeniam, exarscit, tertio nempe ordine, tum è valentia refocet ac extenuat. Mensis vocat, secundum è mœtibus fixus erit in potu datum. crasse leuèq; palmorum pedunculis infusa, eclegiam admodum, exarset facili reddet.

Contra serpentum ac venenatorum animalium morsus vobis sicut in vino bibetur. Animo languens odore, addito aceto, refocet. Podagricis doloribus ex causa frigida, & pariter costandis impostum prodest, si decocti subleat locus reliquatus, ut Diœsar scribit. Contra dentis vici in delitiisibus contritionem adhorat.

Palus.

Palus cretica.



Palus repens ac Palus sicca.



1. **P**alis creticae caudiculi affurgant in theros, tenues, teretes, duri, ac lignosi, palus haud longe  
 altior: folia per internodia hos connectunt oblonga, lanceolata, sed quae Chamaedry  
 angustiora, per marginem serrata inaequalia, in virgularum fastigiis florent: caudiculi  
 la proferunt vasa cum foliis ac caudiculis albidis lanuginose inaequalia, semen prolixum  
 gressu: radix filiosa demissa.
2. **A**licubi in superiore montis ac tenuis haec est: caudiculi quocumque teretes ac duri: caudiculi  
 non ita angustiora: florent in capitulis serratis: haec albedo: lanuginosa: et affert, ac tenues  
 duri: lanuginosa pubescent. Virumque odorem est, saporis amaro, quod miras, odoratum. C. G.  
 sua: inanis quoddam odore: inir minus refert.

Polium quartum: cuius species.



Præter hæc verò & quoddam *Polium* dicitur esse Polium, cuius noster tolli cavileculi hæc plurima parte decumbente: folia latiora quàm in præter, ambra quoque ferrata: capsula in summis virgæ, è quibus siculis quoque candida. Tota quoque hæc lanugine tomentosa mollida, & cum granitate quadam odorata.

Hæc simile, cuius cauliculi terestiores repant, & fibres quandoque densius terre sese affigunt: folia hanc & breviora ac minor, sed non minus ferrata: Capitulæ & hæc lanugine vix cum capitulis consensit: dorsali non è capsulis modò, sed & secundum folia exarise purpureæ, ac albidæ: Duo sequendum lanuginosa, sed coloris floris raris modò differentia. Quod autem hæc reliqua sequantur.

Est verò & inter hæc quoddam medium, cuius teretes cauliculi partim seorsum affurgunt, partim terram versus inclinantur. hanc semelli ac necesse est, molles, lanuginosè raris è virese hanc apparere floris quoque pallide luteæ, sed reliqua fibres alveolatis more inclinat.

Hæc Polij genera olim me obtulerunt montani Mechlmar in stipulis. horto generosè viri Ioanna Brunerorum Nalcuntur verò lectum quoddam in Italia, Thracia, Macedonia, ac insulis in Hispania loca. Totaque C. Clusius in maritima Valentini regni, ac in Hispania Bepica è se reperitam scribit: quantum verò in agro Murciansi quantum in Granatensi & Valentini regni.

Florat quoddam Martio: alia ferè, præsertim in Belgij hortis, vbi Aprilis aut Maio demum flores videre contingit.

A canis Grecis *aridos* noster accepit: Latini vocem sicuti: Dicitur verò & Officinalis Polium.

Primum à Plinio Campanie appellatur: Duo, inquit lib. xxv. cap. vii. Polij genera, Campanie mare Sylicitæ, quod noster est, ab Hispania *Atramos*.

Alterum Dios. videtur *aridos*, id est, Polium quoddam, & videtur dicitur: & species vocabulis *polium aridos*, & *aridos*, *aridos*, *aridos*, *aridos*, *aridos*, *aridos*. Atque hanc in dictum Dios. Galenus, Paulus, Aetius, & inter Latinos Plinius tantummodo nominantur.

Sæpius autem noster Polium Leucadum esse, & de ea herba sub diversis nomenclaturis dicitur.

Dicitur inquit conveniunt genera, nominis sociatio & similitudo. Leucadum dicitur, vbi *aridos*, id est, montana alba herba, que lanugine folia, veluti Polium campanie, traditur: Ab albedo color: *aridos* dicitur *aridos* à canis, quod canis hominis simile apparere: Quisquid autem canis folia habet est. Facti hæc quod *aridos* Leucadum non nominantur, veluti à Polio hæc differunt. Plinius lib. xxvii. cap. xi. Leucum quoddam herbam nominat, quam ferè eadem esse cum Leucade dicit scribit. Leucum autem Mercuriali similem esse, & nomen ex causa accepisse, ut per me dum folia hanc curda manifestum requirit. Melitacum quodam vocare. Oportet hæc verba & Leucadum herbam quod & ipso vocare: Sic utique de Polio sic explicare sicuti ponitur. lib. siquidem xxi. cap. vii. vbi de Polio, quodam

Tripolio à Dioscoride attributa invenitur, Polium cum Tripolio confundere. Tertium autem Polium fortissimum ab re *aridos* ac maximum cognominatum ponitur. Quartum autem apud Hispanos pro Chamæpity valde haberi, locum non sicuti dicitur est Galenus. Galenus quoque ab ipso Zamanis.

Genera ferè hæc Polium, quod minus, autem Galenus, ex tertio est ordine desiccantem: sicando verò completo localis notam, & acris ac amara quàm minus, quod & amara per stirpes & modò esse est.

Hydropis, inquit Dioscorides, regio morbo, & venis maxillam: Virus & manifestat, fibris in ac suffrago serpentes abigit. magna vulnera necesse non dicitur, veluti canis glutinosa impolita mandum verò ad rebellis vicia facit. Ad ariditas minoris est vicia.

Organum Heracleoticum.

Organum Syriacum.



**O**RIGANI duo prima genera Dioscoridi sunt, Heracleoticum scilicet, & Syriacum.

Heracleoticum cauliculis tenuibus rotundis, quandoque tuberculosis, ramisq; quodam plus minusve foliis latis, rotundis paulo longioribus, quam Syriacis. Organum in nobis de aliis omnibus: in fastigiis regularum squaratarum compositis gerit, oblonga praesertim veluti spica, a quibus ea ipsa flocculi candidi erant, ferri enim ex parte est.

Organum Syriacum

Hinc simile, genere haudquaquam differens Dioscoridi Organum Graecis est. Quibusdam, inquit, appellant, candidior est folio, & hyssopo similis: tamen veluti crassiusculis ramis habet.

1. Syriacis Organum tenuis quoque ac rotundos habet cauliculos, diodrant staminibus liberanda, inanis & hirsuta, quam Paleis flores in umbellulis dilatis tuberculis, quodque albidis, quibus succedunt ferri in partibus habentia.

2. Praeter haec verò & aliud Organum genus in Belgio colitur, quod Anglicani componunt: hirsutius aliud quam caetera: folia quoque anisone, ut rotunda, & minus aspera, rubella similiter composita, è quibus flocculi purpurascunt, radice deinde obo.

3. Nascent Organum Heracleoticum in Creta, ac aliis calidioribus regionibus, in quoque fere Hispaniae regna, unde Antiochum relictum inferunt.

4. Syriacis Organum non modo in calidioribus regionibus, sed & in Germania reperitur: sed in margines agrorum, varum, & hortorum: transferret etiam ad horti & loca calida.

5. Anglicanum componitur non in eodem, nec alio loco, quam in horti videtur. Efficit mentibus Organum florem ferri deinde perferunt.

6. Organum Graecis, & quod Heracleoticum cognominatur, legitur de quibusdam nonnullis Careis: in Officiis Belgii Organum Hispanicum in horti, verò aliam, hanc ipsam esse, ut in Dioscoridi exemplaribus: in Galeni verò aliis: apud Pliniam simile Graecis, per idem.

7. Syriacis Organum, quibusdam dicitur, quod aliqui Paracet Heracleum, aliis ipsam, & Caninum appellant, inter quos est Nicander Colophonianus, auctore Dioscoridi. Differit tamen non parum ab eo Paracet Heracleo, ex quo Opoponax colligitur. Quidam

Organum vox nota est: Italia *Organo*: Hispanis *Organo*, *Organo*: Germanis *Waldkressel* & *Waldkressel*: Belgis *Organe* nomenclatur: Gallicis *Organe*, & *Marjolaine* *Organe*: Bohemis *Delant* dicitur.

Tertium inde Anglicanae nomenclaturae admittunt non omnibus: Herachy est species, si modò, Pimpinella, plantae haec faceret.

Herachy, sicut lib. XX. cap. XVII. tria genera habet: Nigrum latioribus foliis, glaucifolium alterum exalbidum mollibusque. *Sampacho* non desinere, quod *Prallion* aliqui vocant nomen Tertium inter haec. modicum. Cum altero autem Herachy *Panicum* genere, tertium solum consistere appareat.

Quoniam autem *Organo* melleum, acrisque, reficacandi, calidificandi, seu faciliorem, & quodammodo ordine obtinent, & sicut sicut quod idem valentur esse *Galvanus* dicitur. Eiusdem Herachy nomen, quod ex Hispania nomenclaturae additur, acris sicut, vel in herba, vel in aqua quod Germanis nomen.

Cum cum vino *Organo* exhibetur aduersus venenarum morsus & scabrum prodeh, & in aqua *Moronum* aut *Cicutam* bibere, cum passis.

Decodam *Organo* venis est, mensis caecat, & vultu heretico: exhibetur.

In oleagine vocem tuffi melleum, & pulmonem expurgat. Scabie in, purgatione, pfoha in hinc melleo curat, emendatque in Repto morbo colorum. Andam accubati mensura cum aqua nulla sumptura, per alios artos launones ad uere, *Dioscorides* & *Plinius* scribit.

Secundum hanc mensuram autem dolores ledit: cum oleo vero limo permutatis, & potest nomenclaturae peritiam detrahit. herba sublimis serpentes fugat.

De *Tragopogone*.

CAP. XVII.

*Tragopogon*.

*Tragopogon* *Clusii* *arum*.



**T**RAGOPOGONO caliculi sunt ternarii, duri, ac lignosi, colore subnigricantes: folia interea quam siliacina *Organo*, quam vulgaria *Scorpilla* vocant, ad costam, aspera, & nontotali hinc: sicuti *Organo* in venis suis cuiusmodi si perna parte subest, colore purpurascens, in hinc parte ligni duritiem habet.

In *Frascati* agro *Tragopogon* nunc *Martialis* tradit: verum an illis, cum illo *Organo* sit, in tanta ipsius literature incertum relinquatur. Sunt qui ex illi memi quod descripserunt.



ma, à Marchiolo pro Mero ostendit, à quo metrum desinit; Marum enim non in orbentia  
venicilla florit, sed Oreganum Heracleense; modo ab eorum veluti specie statim notat.

Apud Belgas in hortis patitur, & in thursana cognatione studiosorum olim observatum  
memori, in quibus Augustis meris cum flore conspiciatur.

1. Exhibentem verò & ipsa duo Tragopogona à Clusio in Hispania regni reperta. Vnde si-  
gnificat, palatalibus ferè caliculis; folia inodora inter Oreganum & hysocys Scophylum na-  
gumidum; floris pariter caliculis ambracibus (quale quod descriptimus) sed so-  
la eius maculosa, & flores candidi sunt, quibus desinit.

2. Alteram tenuioribus staculis humilior, sed angustioribus & sparsulatim micantibus, sili-  
bris albidis, quam doque purpureis, & quibus alterna à venibus, eodem modo nota sunt  
virgo in cauleculis. Nec depernit duo esse Tragopogona: Distinguitur siquidem Trago-  
pogonum vni latius vni angustiorum caliculis staculis ac venibus folia, vni minus not.

Denotat autem hanc stirpem Gantz regerthanas; Latius à sinibus Tragopogonum: quod re-  
nò tenuior equine, Prælium, Officinæ & vulgò incognitum est.

Facile est Tragopogonum vni quibus ordinari sitit resicentum ac rursus incantum, vni  
in Oreganum adesse, ac Galonum, ad hunc thone quippiam.

Tragopogonum, ut Dioscorides ponit, in modum est cibum siliis duntaxat, ac duntaxat  
tribus, in modum veniculis, etiam vni à mactura mactura mactura & etiam procedent  
eodem tenore. Lenosus ex aceto habere prodest.

Contra hanc veniculis in vino bibuntur ut in modum duntaxat: in eodem tenore resicent  
benè duntaxat. Decoctum in epotam belem expurgat. Cum polema acedemata duntaxat impotum.

*De Hysopo vulgari.*

CAP. XVIII.

Hysopus ex Codice Casleo.

**H**YSOPI vulgari vni eodem tenore  
duntaxat, aut alteros, duntaxat, ac lignosa  
virgulas ad quos duntaxat, ab uno ad alium  
vniq; siliis incantum veniculis oblongis, vni  
hysocys aut Lantadula, sed minoribus, sili-  
bris veniculis, ac odoratis, que siliis vni  
veniculis minoribus sunt. Hysocys est hysocys  
hysocys, quibus siliis siliis siliis siliis siliis  
à medio siliis petunt, canaliculis siliis  
obsculariter ambracibus, sed ad vni  
latus excentes, coloris elegantior candidi, qui-  
doque, sed nubi, albidis, Echis floribus quibus  
modo siliis, sed minoribus, hysocys siliis  
liquor medio, è quibus in modum siliis  
perdunt purpurea, nubi duntaxat, lignosa  
ambracibus.

Pasim in hortis Germaniarum ac Belgicarum  
Floret siliis ac Augustis incantibus.

Huc similem aliam repertam quibus siliis  
caliculis veniculis, & plurima partibus  
veris veniculis siliis paulo minoribus  
siliis siliis veniculis veniculis siliis  
er modum siliis, coloris quoque pollicu-  
rulis, & siliis forma siliis. Veniculis  
siliis siliis.

Hysopum hanc partem Officinæ & vulgò  
pellant Germaniarum ac Belgicarum siliis  
*Hysopus* Hispani *siliis* Galii *Hysopus* siliis  
veniculis siliis *Hysopus* siliis siliis, ac  
veniculis ambracibus: Tunc incantum *Hysopus*  
latus ambracibus cogniti nullis notis  
desinit.



expotum, etiam tamen quibus de eius forma siliis, que vulgò *Hysopus* repertam  
spondent. Oreganum Heracleense siliis habet *Hysopus* siliis siliis. *Chrysocyanum*  
miam habet siliis siliis siliis *Hysopus*. Plinius lib. xvi. cap. xii. Siliis siliis. In  
siliis siliis siliis *Hysopus*. Accedit icon siliis *Hysopus*, que in perquam veniculis  
bibliothecæ exemplum repertam, siliis siliis, Oreganum siliis, & capitis in siliis

*Hysopus*  
*Casleo*  
*officinæ*

aterriculis. Atque ex hac parte esse legitimum, quæ vulgè pro Hyssopo habetur, manifestum est.

Ceterum quod ad facultatem ut pariter Hyssopi artinet, probabilis hæc est qualitas acris, cum nonnulla amaritudine contraxerit, et idem ipsam esse ostendit, & siccam ꝑ. odore, acris quoque essentia, acceperit quædam vim habere. Non inutiliter de acro, utro efficaciter, ad omnes pulmonis ac thoracis impetuosos morbos in eodem mare, aut alio modo vulgaris Hyssopus adhibetur. Obstruente capere, crassa incidit licet attenuat, & ut facilius expurgentur, præbet.

Cum cambis herbæ in decocto non infusa nec rari editur, cum ac ventriculo grati temperatione movet, & ad vana illudicium utilis est.

De Thybra. CAP. XII.

Thybra.



**T**HYBRA vulgari Hyssopo similis est, nisi ramulis ac tenerior formæ vugula emittat complures foliis vndequeque circumdatis angulis & acuminatis, longioribus quam Thybra inter que foliis, è parvis vasculis ab uno subgym vixit exant, candidi, aut dilute purpurei, hoc modo veluti herbaceam speciem efformantes, que, postquam foliis emiserunt, manifestior, radix dura ac lignosa.

In Germania ac Belgio temerè fuerit abis quàm in horti querere. Forme in Narbonensi Gallia loci quibusdam aspera & incultis procreare. Bellorani hinc haud dissimilem, si non eadem in Thybra minus latioribus malis sceleri, ex obsoleta eadem purpureo albicantem.

Italè ac Augustis apud Germanos ac Belgas eam florere reperitur.

Græcis *Thybra* est, nec aliud Latini nomen vnde habet. Nam quid Satyriam incompositam dicit velint, Colu melle Latino scriptor, sepagnus, qui inter Thybram & Satyram manifestum discrimen ostendit lib. x. ubi Satyriam Thyra ac Thybra saporem præ se ferre scribit.

Et Satyria Thyra refertur Thybræq. saporum.

Quod & illa x. cap. 1711. sine manifestis verbis docet: Tu in eam Thybra, inquit, vel testis Carila, quam Satyriam vulgari vocant. A vulgo, aut in Officinis, Thybra nullam notam accipit.

Facilitatem Thybræ calida & sicca tertio excessu, attenuat, incidit, citius expurgat: hinc, omnia que Thybram potest & præbet.

De Satyria. CAP. XIII.

**S**ATYRIA tenui ac fragili cauliculo effugit, pedem plus minus alto, & in ramulis distichis foliis angustis, minoribus quam Hyssopi, Thybræ similibus, sed aerea ramulis tenuioribus foliis circumdatis folia candidi sunt aut dilute purpurea: femina parvis subgymant, talia floribus.

In horti ubique sed fœtore rarius est herba.

Idem quo hinc est anno flores, semen facit, ac deinde perit.

Latine Satyria appellatur: à Colu melle vnde etiam Carila: Dicitur & Synesio Origani & Ananthe Carila, sed legitime Carila. Satyria est: Germanis *Barten gippe*: fœtus *Carila* & *Satyrin*: Arabibus *Carila*, nomen ut apparet à Carila demerit, ut in *Samoy* Italia *Satyrin*: Hispanis *Ardeba*, *Sagorola*: Gallicis *Satyrin*, *Satyrin*.

Non dissimilissimum Satyria ab illa Thybræ specie, casus Dioscorides cap. De Thybra

Satureia.



Satureia mont.



Satureia mont.

bra incantata, pennis, moxque, diu, anaphi, hodie. Hinc etiam verè anaphi, id est, ex hinc etiam dicitur potest, singulari vocati, anaphi, ut dicitur, semel debet: ista verò durabitur incantata, sed non.

Potest Satureia calida, quaeque ac facit, et in ma quoque ardere, sed minus tamen quia Thymum, quia minus est: neque ut dicitur, ut Dicitur, anaphi, hodie, id est, hinc etiam commoventur vicia.

Attenuat enim et fluxus in signum dicitur, proinde viti cum Fatica, de quo legimus, fatisca vultus coquitur ac colitur: In viti colitur in formam apposita, viti ex hinc hinc gularis morbi dicit.

## De Satureia. CAP. XXI.

**R**EGENTIARUM observatio dicitur Satureia est, mater videlicet, et mater.

Mater quadrangula laxis, lignosis caulis, in alia effusa laxum, et ex quo folia lata, oblonga, rugosa, aspera, subalbicans, viti hinc hinc folia formi simili, sed habentur in man-candicans, amara et melle lara viti hinc hinc habentem referentia. Satureia hinc hinc melle eminent falcis, Lami aut Onole im-lex, colore carneo purpurascens, facit in recepta viti hinc hinc hinc hinc, radice et lignosa fibra dicitur.

Hinc viti operantur species nonnullae,

vel una, vel parva silbestra, et cetera, cum solentia potendi ac nobis, cum de rebus civi-  
tilibus habeat.

Minor Salvia frons est quae in Hispania ab antiquis in latitudinem expandens promissa, sed  
nunc tantis huius incensiores salubris oblonga, manens, anguifera, sed non manna, tanta,  
quibus parte qua pediculis infusa, et hanc in de Salvia exiguam ad melleis, cum sit  
necesse quodam similitudine: illos spiritus, vel in suspensionem ducitur, quodque ligno-  
si. Conspiciunt quaedam, sed non tantum melleis, addens utraque est, & quibus, quae minor.

Maiores spiritus & stercoris nonnulli spiritus nascuntur: de minoribus in campis hinc Hispaniam  
Maffentibus: quo: in exemplis ab Italici proferuntur: in Creta quoque insula gignunt, ubi  
sicut quodam carbulorum pars, qualem ante gonocula media, in tartarus crassitudo  
est crebretur, et Galliam magnitudine et similitudinem assurgunt. Curiosissimi Sal-  
viae minoris melleis ab excolentia, vno latere Antonio Cortio in flum.

Minor Salvia sicut in Italia spiritus & melleis in Germania reperitur.

Tuncque melleis ad hortos in Belgia transferuntur, sed minor frequenter.

Flores Salviae hinc in Italia, vel in Germania, Maffio contra de transferuntur ac placentur.

Salvia Graecus latere passus à nostris in Cappadocia, & egyptus: Officinae vna cum Italia ac  
Hispania Latine Salvia appellacionem retinentur Germania: Gallici Salvia: Belgici  
ambrosia: inter nomina vero appellaciones de hinc nostra est, *salvia*, *salvia*, *salvia*.

Eius sicut in Italia videtur, & non tam facile ad remanentem quibusque  
aliam partem, aut secundum inveniuntur additionem quoque non exiguam obtinet.

Flores ramulorumque Salviae decoctum vna movet: mentes in de feras extra-  
m, sicut Diostoride. Sed sicut Adia de natura, qui hanc mentes compescere & conce-  
pant utrosque memos ex prodidit Tholant, inquit, quodam in flum Salviae mentes im-  
moderate haerens, & omnino male hinc profuam compescere. Aegyptia sacra herbam  
vocat, quoniam pergraves ma heres, si hinc laxae fuerint, vel hinc comedunt, con-  
uenientem conceptum, et talemque reddat: ac si haec haerens herma cum modico sale quae  
in hinc hinc de mulier potuere, danda vno melleis, procul d' ubi e quae pueri: hinc ille.  
Videtur in imprimis Salviae capiti ac cerebro esse hinc sicut ac monens vna in cordis: non  
tardiore, hinc occipiti resolutus in statum in hinc, tremores collii ramibus in d'ra pueri  
d' capite elicit. Commendatur vero de langu-  
nem exuere: cum & ad usum in flum late-  
risque dolores, & ad hinc morbos.

Salvia graecis seu Sphaerulæ.



De Salvia graecis, seu Sphaerulæ.

#### CAP. XXII.

AGRESTES quae Salviae appellantur, quali-  
tates ergit quadrangulos, nonnulli hinc  
ros, sicut quos sicut Salviae quod in emala, sed  
breuiores, in hoc, mollior, & hinc hinc hinc  
li & adiacentium carbulorum vno erumpunt la-  
tere haerens, ac sicut, velum Lami, sed in ho-  
res, in alio de pollentes succedunt femina in si-  
gulis percardis quarens nigricans, radice si-  
broli super arenam est. Odore mixtum quoniam Sal-  
via graecolor, & in hoc in quiddam hinc.

In sylva frequenter reperitur, & in hinc si-  
pmenta & agrorum margines. Solo gaudet ab-  
que valem in hinc, non tamen omnino hinc  
aut sicc.

In hinc, hinc, ac Augusto in hinc cum hinc  
ac ferantur vna, & tunc quidem colligenda ac  
reponenda est.

Recentior aetas Salviae appellat agrestem  
nonnulli vero de Ambrosiam, sed vera Ambro-  
sia ab hac differens est. Valerius Cordus Sour-  
doniam nominat. Racellus Galiae rara *Syris-*  
*salvia* vocare trifem. & Polemoniam esse u-  
dicat, quod ventus repugnans est. Germani  
vna salvia: Strabonis in hinc sicut.

b

Videat

epidemic.

Videtur autem Theophrasti esse *epiastoc*, cuius folium contrahere, & murescere, & esse squallidum esse, aut, quod huius esse offenduntur, addit Salutaris folium *pharyngis* esse pro utroque ut ac si ab his esse, quod ita de habet: Nam Salutaris utriusque odor gravior quibus, ut, & folium scaberrime sunt in vestimentis firmis. Nec est quod maior Salsina pro Splacis habetur, et quibusdam videtur, cum non tantum sit kalbra quam maior, qui & videtur.

Calida autem de sicca facultate Salina gressu est, minus tamen quam Salina, hinc inde idcirco utriusque qualitate ordine consistens. Commune datur ad terna, cetera, ac vultum datur de ea alio praecipuum deorsum eam, vna vero etiam proteritur. Sunt qui hinc de eodem hinc venena in cetera non infeliciter propter: Nam & sudores moros, hinc hinc est, hinc hinc dicitur, remoresque dicitur ac solent, & triginta aut quinquaginta dies affertur.

De Orula.

CAP. XXIII.

Orula altera.

Orula.



1. **O**RULA species prior (sunt etiam tres aut quatuor au meritor) que prope Orulanae upate, caules prope crassos quadrangulos, duos pedes longos, in vna dicitur folia & e radiceibus multa, & secundum caules ex internodiis hinc contra se posita, supra, positum hinc vel amphoem, aliquid nunc non alpera, inaequalia, albicansque, ac nonnulli vix caulis hirsuta: Folia forma florem Salutaris aut Lami, colore ex diluto caruleo capite, post quos longa demittuntur vasa pro illoque, in quibus semina nigra, & subconventibus. Tota herba graui formosius sperat odorem caput applicentem, & marasimam inter, quod altera sit a siccione anno.

Semina ab olivaceis in hinc. Inno ac lobo floce.

Galliarum Officium nuncupant. Dicitur & Orula sine Orula, Tom bon, Salsina, Sarsina, Cenerum Galii, Mammilata: ab Italia *Josaria*: à Gallis *Orula*: à Germanis *Orula*: à Belgis *Orula*: ab Anglis *Orula*. Falluntur qui Alethorolophos ex hinc. Alethorolophos in Frumentorum squadem hinc hinc multum ab Orula differunt offendit. Videtur autem hinc Orula species, Hominum sicut hinc, quod Divosiderat, ut hinc, quod polium. Inter omnes etiam Orulae ac Hominum species, nulla odore aut vultu potenter est.

Kra.

*Ornithogalum*.



*Ornithogalum, species quarta.*

Altera *Ornithogalum* species, caulis habet similiter quadrangulus, ruberatus: folia quoque aspera, scabra, sed nervi albida, ac trineura: flores similes colore purpureo aut caruleo: radices vero prope Odore hinc minus pepulæ, omnino sanguis prædita. In Fennia, Norico, Bavaria, sine Vindobona, plerisque & alibi Germaniæ ac Gallia, locis pagantur herbosis, subinde siccatis.

Flores eodem quo prior tempore.

Baccharum esse, fere qui putent, eorum autem semina quàm sit probanda, ostendet Baccharum descriptum, quàm à subsequente præmittam dabit caput.

Tertius *Ornithogalum*, caulis quoque quadrangulus & nonnulli hirsuti sunt: folia peram breviora, *Ornithogalum* proxiè similia, sed in roa: flores tamen: fermen suffraginæ, agriconæ radice fibrosa, durabili natum, & multis annis permansens.

Apud Belgas à nonnullis in hortis fertur: in Alpibus autem Italiae usque Tiberinum, apud ipsos fertur. *Est hinc flos.*

Horminum luteum & Horminum Tiberinum à plerisque appellatur.

Post est hinc, & quarta ad h. species, que pro sylvestri Horminum à Fuchio de præmitti: caulis eili hinc breviora, cæterum hirsuti quoque & quadrangulati: folia minora, oblonga, profundius ætate flores caruleo odorati, sed quàm *Ornithogalum* minus: sili-



¶ per manentem densam utant: fermen agriconæ: radices similiter nigre & fibrosæ.

In Bohemia herbosus consuevit colles locis & amoenam margines: Pechus Germaniae praesertim exornat: si ribis, si alijs speciebus in usibus.

Tempore florendi cum superioribus convenit.

Oculale & Herminium haec quoque species, sed raris, & nullius fuerit usus esse videtur.

At praeterquam diuina proprie Oculale dicitur, & sicca est, & sine semine, mensura quoque sumpta mensura: secundae enim: ceruicis aut vasa permixta bene exarata facta, & praecipue simplex.

Arthoratus Mirabilis Jmen Oculale velle tradit, ad exornandam oculorum caliginem, & redolenda ea, quae in illis inciduntur: in oculum siquidem sicut sicut, & multa modolentia quae in illam esse videtur, tunc in hauriens praeparans, & venibus medicanda ac fortibus consuetum elaborat.

De Herminio.

Herminium.



habet almonu, vt quod modum inter Erythrum & Cymum in sit nature.

CAP. XXVIII.

**H**ORMINUM Oculale etiam quod si-  
cut est, sed est quae minor, cuius prope  
complanata, & dracem aut pedera alia, ap-  
pulo sic simulque, sub his speciebus, sed in latitudine, modicula, si subspersa, Oculale multo maiore, Man-  
by ferè similia, quae quae aut in se ip-  
sa, purpureo nigra Velle colore, sed tunc in  
lucore emicet, flores autem solus in latitudine  
bucina, colore purpureo-dilato sicut in  
exiguam, oblongam, nigrescentem, in oblonga  
et pascit, vel in siliqua, quae in toto hinc  
radicem versus spectant, radix longa, vasaque  
abique fibra.

Peregrinum Belgio Herminium est, & in-  
de in horto sicut in.

Et si in hinc fibra sicut in eius prode hinc  
mentem in manent.

Olympe Graeci - Latini Herminium & Ge-  
mulum appellant.

Calcium autem, vt etiam Pechus Egon,  
Herminium est, modico inter sicut in hinc  
genus Herminium tamen, Diolcanda in, puer  
cum vasa portum Venetum exornat: vasa  
cum melle, argenti & albugines oculorum in  
purpureo cum aqua in se hinc in modum hinc  
est, & aculeos extrahit. Idem herba in se hinc  
est. Galenus in libro De alimentorum hinc  
tamen, de Herminio: Hoc quoque, ac, hinc  
quasi, deinde exornat: hinc, vt hinc  
dat, mel quoque etiam in hinc. Parum in hinc

De Baccharis, et Diaphorae & alijs.

CAP. XXV.

**B**ACCARIS, auctore Dioscoride, odorata & coronaria est herba, cuius folia opposita  
est, aspera, & in hinc, haec est, densa sunt, magno modum inter Vicia & Verbena  
de in oculis angulosis, cubitalis, subspersa, & in hinc, ad est, in hinc ad hinc praecipue hinc  
flores purpurei, si sub hinc, odorata: radice Veram in hinc similes, odore Cinnamoni.

Arta aspera & hinc in hinc. Graeci solo nec humido prosumt: Plinius.

In hinc Graeci dicunt, aut in hinc quod in hinc, vt plantae placent: à quibus  
Nardum rusticum appellatur, vt Plinius lib. 11. cap. 6. nardum. Quam & ipse Plinius lib. 11.  
cap. 10. Nardum rusticum appellat. Sed lib. 11. cap. 10. perperam non dici videtur, hinc in hinc  
est, vt quod in errore falso Barbarum eam appellare scriptum. Sed eam quoque in hinc  
quae in hinc est, quae Baccharis, rusticum Nardum appellatur. Est enim in hinc herba in hinc  
graciosa, quam Graeci Adiron vocant. Idem eodem lib. cap. 11. Baccharis quod in hinc  
perperam appellat vt Perperam autem si Adiron est, vel in hinc nardus & asperitas in hinc  
repentur, non minus hocum error, quod in hinc in hinc. Nam Baccharis & Adiron

non parum differant, ut Plinius testis est, ac ex vniuersis de scripturibus collatae eundem. Proinde & perperam Officinae Alarum, Alaram baccharum nuncupant, nomine ex Alaro & baccharum. Baccharum compositum, quod idem sit Alaram & Baccharum. Qui error ex eo videtur manasse, quod inter nomina Alari appellatae Baccharum non etiam reperitur: nec quod Baccharum Crataei Alaram nuncupatur. Quod si quidem Crataeus Alaram nominat, Dioscoridis nuncupatum Alaram, sed Baccharum est. Nam Alaram Dioscoridis esse caret: odoratum non est, nisi sola radice: nec etiam coronatum, ut Plinius ait, vocatum sit Alaram, quoniam in coronis non addatur Alaram, nec Crataeus cuiuslibet, ac odoratum ac coronatum est. Parit ex ipsa de scriptura, quae sic habet:

Alaram odorata & coronata est herba: caules eius genitali: folia basi, id est, densis basi parua, mediocriter bona odori, similia Veratru in gra, odore Cinnamonis similia Nektar in apertis & squiliba.

Ex quibus verbis manifestissimum est, Alaram Crataei idem cum Dioscoridis Baccharum, & ab Alaro eadem esse differens: & nihil inter nomina vocata Alaro Baccharum necesse ambigendum, nec adhibere Alaram coronatam & odoratam esse herbam, quod more notationis simpliciter reperitur.

Minime Baccharum etiam Virgilium in Bucolica, *Baccharum* sepe ait, ac non modò coronatam canit: sed etiam odorata, veratru etiam falcom depuluerunt:

— Baccharum, inquit, frons

Cingit, ac vix nocet mala lingua faturo.

Et Baccharum vniuersum apud Athenienses lib. p. quod à Baccharum odorata herba nominabile potest. Nam, ut Plinius, vnguentum ex ea radice fieri solent, apud antiquos Aristophanes graeco Comediae Poeta testis est.

Crataei Baccharum, ut Plinius, Aegonera paucis complexus est, radice decoctum mentis oblectat opert, vniuersum & mentes citat. Folia ipsius etiam sint adstringentia, humoribus opulenta.

De Balsamita.

CAP. XXVI.

Balsamita maior.

Balsamita minor.



BALSAMITA coronata herba non est, sed foliorum eius cum granate quodam gratum est odor. Eius duo sunt genera, foliis multum differentia: Maior videlicet & minor.

b j

Mars



1. *Mixta caulibus affargis rotundis, dure, si signa pedicibus: folia eius oblonga, lata, leuiter per  
 oras crenata, Lapathae folia fecit similia, maiora tamen & vitreis magis succulentis cum magis  
 coloribus multo Bostolae veluti corymbis, Turiceti ac Elcheiyi modo in vrbella coloma-  
 tibus, quoniam singula ex multis exiguis flammis in vitreum simul factis, composita sunt, na-  
 ces lignose, densi diuinitate non oblique multo adhaerentibus ab eis.*

Apud Belgas hanc dicitur esse passimque etiam ab olivombus colorat.

*Aethiops montibus istam coloris vrbellas praemat.*

- Germanis, Transsylvanis, Itali, Arabis di S. Mariae, Belgae Balfurae: & ceteris Officinae Bal-  
 samatae, ac Balsimatae maiorem nuncupant. Et tamen & alia Balsimata, quae & Chara-  
 na ac Moscarda, item Balsimatum generis ne vitro, herba ab hac Balsimata differente ac  
 diuinita. Martialis Blandham Graecam non minus, alij Saluam Romanam, item hanc  
 Laffalam, Colham hancrolem, Mchiam Saracenicam, Iacobum D. Mariae. Sunt quoque  
 Panacea Chionium esse. Plinias cernit, & vulgaris Theophrasti exemplaria Charod  
 hancem folio esse referunt Lapatha. Floris aureo, compositi hanc herba est. Sed Dioscoridi, &  
 Nicandri incipit se hanc dicunt Theophrastum, folio illud autem esse Amantia casidiam  
 Balsimata nequaquam simile est.*

2. *Minor Balsimata colore, odore, sapore, & flore in vrbella vitre, maiorem referunt  
 praemat nuncupant, penitus, rotundae folia parua, oblonga, striata, ac profundè molli-  
 tatem aures coloris, sed corymbis nuncupant: radices vitae praemat.*

Rares hanc est, nec alibi quam apud cognitores herbarum studiosos reperitur.

Floret eodem, quo praemat colham praemat.

Eupatorium  
 Me/ia.

- Balsimata haud dubio species minor est. Itali Gualam vocant Valerius Cordus Mentem  
 Corymbiferam maiorem appellat: praemat vero Mentham, Corymbiferam maiorem. Pi-  
 rrius Eupatorium Me/iam alij Dioscoridis Agratum esse voluit. Eupatorium autem Me-  
 fiam idem cum Aucennae Eupatorio est: vix eorum veritatem eodem: sed forte deli-  
 pto in vitreque antea corruptissimas vitas ostendant Aucennae exemplaria, cum pol-  
 lentes ex Balsimata comestione, a praemat hoc loco multum differant. Eupatorium cum  
 Aucennae Dioscoridis Eupatorio nequaquam differat, quod vulgè Agratum nuncupat  
 herba ea nullum est, cum qua Balsimata minor, sine Gula, simili modum nihil aut per-  
 pnam habet. Agratum vero hanc herbam esse, non est quoque verisimile. Nam Agrato-  
 lu Dioscorides tribuit Origani ac Origani folium subeundum est: hanc vero longè  
 feratam, ab Origani forma multum differens, quod Gualam & Agratum dissimile  
 super ostendit.*

Ceterum Balsimata utraque calida & sicca est secundo ordine, cum amaritudine & al-  
 fringendi haud obscure facultate. Auxiliatur folioseum eius quam Consuetudo apud  
 diuinitis capitis dolores matutino tempore sumpta de fluxione: capite repressis  
 efficit: crudis humoribus ad concoctionem perducit. Prodest item Cachexia aut Lenophy-  
 mana laborantibus, praesertim in istis, ac omnibus quibus occur debile ac refrigeratum est.  
 Semen non ferat ac Santolina hanc vocat: ventris tamen expellit.

## LIBRI QUARTI PRIMUM SECUNDA

FINIS

STIRPIVM HISTORIÆ  
 PEMP TADIS SECVNDÆ  
 LIBER QVINTVS

DE VMBELLIFERIS HERBIS

PARAFATIS.



VINTVS hanc Pempadā habet stirps umbellifera varietas, quæ Coronariâ edoceri & herbis et quædam, hanc perperam faciunt. Umbellæ siquidem circinnæ rotunditate & coronarum instar proficiunt. Semina verò & masculinam cetera sunt: ut, Anisi, Feniculi, Anisi, Cere, &c. Proficit ex coronariâ edoceri ut elemeuta haberi possunt: ut, Anglica, Africana, Itali. Non deserviant tamen hoc loco omnes umbellifera, ad stirps siquidem pertinentem, sua classe relinqui. Ad Feniculum autem amantibus necesse est eorum sumptum, sic enim ad reliquos facilius et expeditius via patet.

DE FOENICVLO.

CAPITVLVS I.

Feniculum.



FOENICVLVS ferulacei generis herba est, hominum non raro proceritatem superat, culles eius digitalem crassitudinem gerunt, lavi, tenui, ac vitæ cortice consistunt, farsigosa in tenui caudâ medulla, in alia quædam circa fastigium darduntur. Folia è radicibus, tam ab singulis geraculis, ampla, ramosa, in tenuissima segmenta dissecta, colore viriditate, odoris incedit, quæ in singulis particula tenentur, extremitas verò eorum capillamentorum instar tenent. Umbellæ late in cacuminibus cauliculorum ac ramulorum emittit rotundæ, ac in orbem circumstante. Strobili lutei, semen oblongum, nudum, nullaque membrana implicatum. radix candida, rella, alii dicitur esse, necnon in proso aptum medicis.

Hæc quædam specia fabrygæ lobes folia esse dicitur: odore & sapore à superiore hæc differit.

Est & alia cuius semina & quædamque folia dulciora sunt. Hæc in bonis Belgij loca non diu dulcedinem tenent, sed citò in vulgare Foeniculum mutant.

Locis apricis etiam ferocia, bene proficit Foeniculum: hominibusque amat ac loca culta. radix vixit est, & in plures annos recitat.

Vere erumpunt folia, deinde caulis affurgit, sequentur cum floribus triflora, feram sub finem Augusti ac Autumno perficiunt.

Græci *παραδύσση* appellant: Latini Feniculum: Officina nomen veniunt: Germani *Fennel* Belgij *Winkels* Itali *Fenicolo* Hispani *Milana*, & *Fenolo*: Galli *Fenel*: Bohemi *Wassilow*.

Pater vero eius & sylacitric: quoddam Foeniculum Eriocrocosis vocant satius grandæ, folia tamen bus, cuius tamen amplitudina, ut in Macedonia duodecim cubitis affurgat, et una feram Carthæi Gistæ. Hippomarathron eius appellat, & *παραδύσση*, à nonnullis *παραδύσση*, ut Myrsinum.

Trachis & aliud Hippomarathron ab eodem genere, folio angustis, exiguis, oblongis: feram mendo ut Coronaria.

Ceterum Feniculi vulgari, & in eadem quædam, calidum est, sed è urdo siccum vero pernoctat.

cedunt. Verticalium afferturam robore, non leui sedas, vena na mitigat, flama diluunt.  
In vino potum ad serpentium & scorponum effusae ac macerata videntur: cum lacta troscularia hinc  
sereno ventriculo affa raprasa anem-oculorum conterant: hoc quoque membris augeat: quod  
& ipsa herba facere efficaciae praestat, tum de ipsa comesta ac in calore sitimpta, qua tunc  
colida ipso firmare. Vitis vero vitibus, ac vesicis: vniuon cut, & calculos expellit.

Radices ad eadem valent, & potius aures, & pedes calidiores proinde ut modo vniuon  
vocat, sed & hepatis ac quoque lacris infusus expeditur, & vicia ab obstructione libe-  
rant: mensis quoque praemouent. Ferunt eadem cum melle coactae earum medulla  
meden imponere.

De Anetho.

CAP. II.



**A**NETHUM cubitali aut procerius caulis  
culo, terete, ac geniculato confurgens  
sensu rido desolus, & in flumina posse exten-  
si: floeulis in medicato latus: leuiter deinde  
recedo, plano, tenui, ac foliis: talem libat.  
Granae alicui vni cum floeulis ac floribus  
odoratum est, & colore: minus, quam Feniculi,  
folium huius vni.

In homo sentur sitis cum oleibus.

Floris & feris alicui potest. hybernus m-  
fibus anetho dicit.

*Anetho* Graecis: Latine similitur *Anethum*  
appellatur à nouillis *Anetho* Coelestium  
*Anetho* nomen Officinae: Italia *Anetho* *Hijo-*  
*nae* *Acetis* Germanis *Epilim*: Belgis *Witte* *Gal-*  
*lan* *Aure*: Bohemis *Aept*.

Est autem *Anethum* autem *Galena*, mal-  
factus quidem secundo ordine vni ferunt  
verò eodem modo, vel primo desinit. Vni  
verò terti est ordinem ex caliditate, ut  
refecturam. *Anetho* arida come semel  
decedunt potum hoc vocat: tenuiter  
nones sedas: vnam cum singulari hinc, vni-  
dem *Dio* cordes. Sedas autem singularis  
& odorati, praefertur si in vino decoquantur  
possimum si Absinthio ac Rosis rubris addis,  
& pancer in vino decoctas, ventriculus hoc so-  
ueat. Promouet verò & semen, lacta cupit,  
velut Feniculi.

Vinum, Galenus ait, vitibus admodum humida optimam prodest, possimum in  
qua in pudendo conlibuit: Quae verò in praeparatio sunt in aeterna, ut probe cicamom-  
dunt. Vnam etiam in facibus, ut Plinius ait, leuit.

Optim in quo decoctum *Anethum* digere, sedas dolores, si nimium coactat, malis  
inaccolis hu memes ad coactionem perducit.

De Anisi.

CAP. III.

**A**NISI notandum & leuiter striatum, ac maris casalis in rariolus nouis floribus  
ha in femora rotunda ac hinc sunt, superiora disticta velut *Appi*, sed candidior  
belle floribus candidis deinde semen malicium proferunt, odore rucendi ac si pax  
In Creta, Syria, Aegypto, & usque Orientis regionibus seculum gignunt. Scimus quod  
in Germania hinc vni Iusto ac An gulo flores, ac firmare praegnant.

*Anisi* Latine ac Officinae appellatur: Graeci *Anisi*, qui dicitur, ut quidem vobis: Grae-  
nis *Anisi* Italia *Anisi* Hispanis *Atabalisa* & peris *Anisi*: Gallis *Anis*: Anglis *Anisi* & *Anisi*  
Bohemis *Anis*.

*Galenus* *Anisi* semen vni esse ordinis caliditatem & caliditate vni semina, qua, vni  
acri, si vniuon, & ad venam caliditatem accedit. Tanta tamen acrimonia, vniu-  
onem caliditatem quasi simile sit, in eo hinc sequitur gustu seminum. nam dulcedo quod  
in eo percipitur grat, acrimoniae verò quam expugnat aut nihil, atque vniuon  
caliditate quidem non excedit: siccatatem verò vnam habet: malis quibus temp  
vniuon.

Anisi.



Carum.



notum. Nam ad lactis generacionem confert, quod non faceret, si salmodum doleretur, Gal. cap. de Maracis, vel melle, n. sic: Ex eo liquorem quod lac proreos, hoc non cedere prima ordam feruorem usque ad it quod de Anisi fuisse, curat de curia, cum quod dulce sit, confidendum. Est igitur semen Anisi ex primo exaltationum gradu: exaltationem vero secundam.

Dicitur vero idem status, norma fides, vna etiam promissa, lactis copiam facit, ad venientem carum lactis, album, & album molle et profusum sicut contraindicatum oris bonum rebus odorem: aduersus spumam difficultatem conducit: siccum capiti dolorem sedat, veniens resistit. Fortis & firmi arcere, atque idcirco hypochondriaco velle.

De Care. CAP. VIII.

**C**ARYUM cauliculo asperge cubera) vel alio, quadrangulo, geniculis interrupto, glabro, raris uariis, ac in semel distichis, circa quos foliola Pastinace fistulosa, sed tenera ac tenera: Boliis exiguis candidis in lateri mucatis: Semen subregulare, longius quam Anisi, radice dactylata, carota, sed gracili, sapore Pastinace, sepe candido, raro lacte.

In pinguibus ac lenis campis herbolis, & pratens, que subinde rigantur, apud Germanos Bohemique frequenter nascitur. Gignitur & in Cana, auctore Dioscoride, unde nomen accepit.

A Maio mensi vique ad Augustum, & flores, & semina profert.

Græci Καρη, Latine Carum vel Carum Officinis Carum nominantur. Carabadien Sarracen Zedey vocat Germanice: Syrii: Syrii: Syrii: Arabi: Carum: Hispani Carum, & addunt articulo *Albanicus* Angli *Carum*.

Cum autem firmum, ut Galeas ait, exaltat & siccatissimo quodammodo ordam, & acrem moderate qualitatem possident status vero idem dicitur venens: & on gratum, concoctiones aduatur vnam est: Antidotis admiscetur.

Radix etiam Pastinace modo edendo est.

De Carum. CAP. IX.

**S**ATIVUM Carum vnam Dioscoride: Syriis vero & alia.

Dodranalis autum & mod pedem excedens satum Carum herba est, vascula, tenui tamen aliquot brachia: folia Fumiculi modo in tenuer particula disticha, sed breuiora ac minor multa, vmbellæ in aliam cauliculi vnaque fistulae semen profert acuminatum, coloris ferdid, gracile, sapore acro, radix tenuis, que post semina matum matum perit.

In Italia & Hispania colitur ac ferunt: alibi calida regionibus nascitur, ut Æthiopia, Agyptus, Galacia, Creta, ac vnaque quoniam Asia. Patrida & calida maxime locis nascit.

Cucurbita fetida.

Cucurbita fistulosa.



Medio Vere ferendare: imber fecundata: flosus: multa mofia, et habet Radix.

Idem Graeco, & ad differentiam stylitium, idem Idem, id est, flosus Cucurbita vocatur: Latine Cucurbita: Officinae Cucurbita: Germanae: Aeschylet: Symplicii: Ind: Ind: Hispani Cucurbita: Galli Cucurbita: Belgae & Angli Cucurbita dicunt. Socratici Idem: Periturus reliquis: Aethiopicum, quod Hippocrates Regium appellavit.

Stylitium  
Cucurbita  
Fetida.

Stylitium vitem Cucurbita à Diocoride duo determinatur, vitem Idem est ac cuius dodrantali, semis, ternis quaternis, sex, octo, decem, viginti, & est, quasi disticta, singulis distictis: caput in cucurbita: quatuordecim, rotundum, ac molle, in quibus quatuordecim, sine paleacrum semen. Natis ut in collibus, efficaciusque in Lycia, Galatia, & Carthagine: Hispaniae: verum tale Germaniae: ac Belgio parum cognatum: sed & in partem horti reperitur.

Stylitium  
Cucurbita  
Fistulosa.

Alterum semis haud dissimile (solum videlicet) esse refert, quod à singulis floribuscula profert: astringe, hoc est, sublimis sine creta, in quibus semina Melastomae sicut: Apocyni est quod Pemptidis huius secundae: lib. tertio cap. ix. Horti Regii: nomine dicitur esse: de eo hoc huius explicatum.

Stylitium  
de vitem  
Idem.

Cucurbita Cucurbita flosus, et Galenus, ex ternis est exalificentiam odore, alius vero non minus. Duo vero & ipsum adstringere ac, non tamen adstringentia habet. Astringendo siquidem ac digerendo tumores dicitur, non autem adstringendo repleat, sed in firmis ac firmis ex huius aut aequo humore, quos cataplasmata addunt: sed velle. Non modo exalificentia vitem, sed & in toto assumptum huius extinguit, ternis vitem sicut. Velle quoque per huius & palmis huius refrigerata ac crudorum humorem copiosius in febribus: si qua sumptum. De moribus serpentes vitem preparant. Huius in febribus sicut sanguis est non huius profusum, cum accretum & odore, repleat. Quod in vitem huius, cum in vitem addito cognatum.

De Cucurbita.

CAP. VI.

AMMUS duo genera profert: obliquis: vitem huius sicut maris, quod vitem est alterum vitem sicut.

*Anisi vulgare.*

*Anisi abrotano pariter.*



Vulgare Anisi cultrata aut prociore altitudine affurgit: stas è caule rotundo spurgis <sup>Abrotano</sup> foliis è pluribus constant oblongis amictis serratis. Bofali in umbellis candidis. fermen cum <sup>Abro.</sup> artemisa quadam truncat, oblongum, Curano mitius.

Anisi herba est exiguè, tenuis ac brevis causticula: foliis oblongis, creberrimis incisuris <sup>Anisi ab</sup> uniservi deflexis, è sursum versus magis attenuant. Flores sunt in exiguis umbellis candidis <sup>Abro.</sup> fermen minus firmum, acris, ac foras dem.

Ex Alexandria Ægypti in Italiam inferunt, ubi è gignunt. fuit hanc quondam in Ægypto domestica: ac quodammodo vltis, paribus enim comparabant, ac alimentis ad miscabant. Sicut in Germania ac Belgio facile procreat.

Floret in Augusto, fermen deinde perficit.

Græci *Ανισον*, Latini similitur Anisi vocant: Natrulli *Cominum Ethiopicum*, alij Regiam cognominant: Officina Anisiou aut Anisi gignendo casu appellant. Germani *Anisp.*

Præcipua virtus potest. Hoc autem Officina passim vniuntur, in quo maxime codargueda, <sup>1.</sup> cum omni omnes, quæ Anisi adhibentur, facultates ad sint, pro legitimo haberi possit.

Anisi tenuis, à consuetudine præstariis habetur. Quod tamen non pro Anisi, sed pro <sup>2.</sup> Sifone habendum, non de font qui suspicatur.

Et autem Sifon, Dioscoride teste, exiguam fermen, in Syria natam, Apro simile, ægrum, <sup>3.</sup> fermen, oblongum. Cui descriptum Anisi pariter non male respondet: fermen siquidem exiguè est, Pterocollis vulgo dicitur: in ut ac tenuis, nigricans, ac gustu serocum, quod ex Syria ac ex Ægypti Alexandria aduecti ferunt. Sicut autem idipsum pro Anisi aut pro Sifone habeatur, nisi referat. Nam utriusque eò familia sunt facultates, sic ut vniunt aliteri *διεσπασθαι*, hoc succedant, abique errore effugant.

Et autem Anisi fermen excausticior ac deficcatorum tertij ordinis interij facultatis, è potius tenuis, facit ad ventris serocina, vni ac difficiliter, serperit vni me adus ex vni, mensis vni procreat Saggillata cum melle impositum tollit. Hæc eadem è Sifonis fermen potest pariter è vehementer, ac tertio gradu calidum sicrumque est, tenent quoque pariter, è virtus ac mensis procreant.

Conioides.



Conioides acro.



**C**ONIOIDES O. tenuis, totis cubitali & ramosis est caulis: folia laciniata sunt  
diffusa, laciniresquae in quae infima, in tenuiora verò superora: florum cæditi  
umbella levis: semina globosum, nudum ac nuda, quod nudo vixit, reflexam alio  
subtilitat. radix luteo-purpureo fibris cohaeret.

In agris ac hortis multis seminat. solum amat larem ac pingue, in ripis tamen &  
procreat.

Aprili aut Maio nascitur. Sub Caris exortum floreat: semina maturum Augusti  
colligat.

Genus viget à sagiarum Latus Conon, & Conium similiter: Potentilla Lani &  
Officinarum Conioidem appellant: Germani & Belgæ dicunt: Itali Conioides: Galli Coni-  
oides: Hispani Conioides, Cuboides: Bobeni Conioides.

Conioides in nem herba recenscum semine admodum grana & insensibile odore ferit,  
& non modò insigniter refrigerat, verum & periculosum est venenosa, praeterquam in  
caeseporus: voce in exasperat: mentem moerit: ebrietatem similes insaniam addit, talem  
verò & mortem inducit. Remedio praeter alia vitium est, moracum per se, vel cum Abs-  
inthio propriatum.

Conioidem verò reflexam si men, deponi non modò fetido odore, sed & maligna ad-  
teris qualitate, odore haud insensibile reddi: nam, cum temperato calore manifestè miscet,  
ac nonnulla adhaerens obinet.

Macerat in aceto, deinde reflexat, atque sic preparatum vsu magis idoneum Ven-  
iculo multum haeriformi coarctat, praesertim à cibo, per se, vel cum alia perniciosa, est  
ventriculi haeriditatem reficit, salutaritatem prohibet, ciborum concoctionem protulit.  
Cum vino sanguinis lambentibus edicit: remorantes etiam vitas moerit. Tali cum qui  
eporus puluerentis haerens sitit.

Mixtum quod Xenocrates tradit, si vitium semina grana semina habent, vae de res-  
sina cubiteri: sed no, si duo de eisdem deibus, quae grana sumptis.

De Melantho.

CAP. VIII.

Melanthum Gmelin.

Melanthum.



Melanthum Damascenum.



**T**RIPLEX Melanthum est: Sativum, sylvestre, acernum cognomine Damasceno.

Sativum Melanthum exiguū infra frons 1. affurgit, omnibus caulis in dodrantibus, ramulis aliquot brachiatis, folia in nervosa lacinias disticta, superiusibus Conandras seu umbra. Bosculis in flammis virgīs candidatis, melanthum hinc hinc media. capitula succodit quadrangulata in nervosa lacinias in nervosa lacinias disticta, prominentibus superius caulis veluti conicalis, in quibus fimen acie, odoratum angulatum, colore nigrum, quandoque verò de substantia sublatis oculos ac pingue.

Sylvestre caulem prostratum: flos albidus, cernit magis disticta, infra Arctis: Bosculis prostratis similes, sed tamen sepe elegantior, ac dilute carmineo hi non capitibus, sed conicalis aliquot conicalis, ut plurimum quibusque Aquila similes, post se relinquunt in quibus fimen nigrum exiguū odoratum.

Damascenum Melanthum longioribus quam sapientia caulis ac ramulis luxurians. folia eius tenuiter quoque admodum disticta. Bosculis elegantibus, carmineo, quibusque folijs, totidem albidis in prostratis, vaneque distictis, infidit. capitulum veluti Sativi, formā forma coloreque nigro affinis, sed odore delictatum.

Sativum in agris ac hinc hinc. Sylvestre



lina in non paucis regionibus sponte inter legumes & frumenta proveniunt.

Semen luteo ac Augusto ad maturitatem pervenit flores prout apparet.

1. Melancholum Graeci similiter *μυρσίνθη* vocant: In Officina Nigella dicitur: Latine dicitur Gith: ab aliis Salustina, & spuria vocibus *μυρσίνθη*, & *Παπαρο* vocatur: Germanice *Wendelwurmel*: Belgice *Wendelwurmel*: Italis *Nigella*: Hispanice *Ataraxia*, *Alpova*: Gallice *Nelle*: Bohemice *Černýš*. Scitum aliud cognomen habere, cum qui legitur, non quod idem sit ac non modicum.
2. Sylvestris Melancholia spuria facit, ac à similitudine notioni inesse videtur. Primum Germanice quodamque Sicuti Latini dicitur *Wendelwurmel*, ad est, Duae Cochlearum forem non capere. Plurimum autem aliud esse Communem sylvestris dicitur, cum quo forem Regium sunt contentae, ut ante monstravit. Et potest quoque aliud non temere pro sylvestris Cumino atrobolice Ventrem haurire saepe in causa est, ut eorum dicitur nihil queat.
3. Alteram sylvestris Danicam Melancholum, ac Danicam Nigellam appellatam Cymoppro similitudinem nullam habet, quae quidem apparet, tamen à Martiodoro, cap De Hippocriagrem hanc paulo abster expellam, pro cochlearibus: & quidem solam, nullam tamen descriptionem, ut & saepe alia.

Est autem Melancholia legitima videlicet ac satum semen excalfactum & defecatum magis gradu, ac tenuatum partium. Destillat enim ex capite asserica calidissima & nodulo diaphano & affluente oblatum quo modo & usque odoramentum carum & redolentem. Alimporum facies dicitur, proutiam crudam inclinat: pluribus diebus potum vitas ac maritima vocat, & cum vino daturam spumandi distillatione moderat.

Tolle lentiginem, lepra, veneta ordemata, dicitur, cum aceto impositum. In fluxu, aquit Galena, ubi inchoat, ceteris, defecatione, ac excalfactione est opus, postquam manum est remota.

Phalangorum enim mortificati in aqua denuo pondus haudum aculatur. Remota vermiculamentis expellat, non modo affum potum, sed & cum aqua verbale impotum suffum ferpentis fugatur. Tradunt, inquit Dioscoridis, langras potum enecare.

Exprensurae hinc aliis oleum, quo usque Pharmasopem plerum, pro oleo Nardo, non abique graa vultur emere.

Pharmasopem  
arum

De Nigella

CAP. IX.

**M**eo folia sunt vitrea, multiplicata lobibus, qui in Funiculo tenentur, interea angustioraque: cauliculis graciles, cubitum quorum in fulgure vultur, & desiccati rubelli non angustiorum Cantone: mure, odorum, & cum acrimonia amaricant. Radices doliunt in plures partes in obliquum & aliam duntaxat, sicut nigricantes, utitur cardibus, ac sapore: linguam vellicunt, odore cum fiant gram.

Nascentur pluribus Italiae, Germania, Hispania, ac Gallia locis, montibus quidem, sed in partibus ac apertis, de locis vero & Alpibus Belgio natum, sed tamen haud perquam Laudatur Atharaxia, ac in Hispania.

Radix relictis novo Vico nona parte lha: cauliculis postea erumpunt cum verbale lha flores ferunt a quo perharant.

Graeci *μυρσίνθη* vel *μυρσίνθη*: Latini similitudinem nominant: Italis *Ator*: In Apulia, ut Merulo refert, Imperatrix dicitur. In Hispania similis locis *Silva*, alias *Fovelle*: apud Germanos *Wendelwurmel*: Antheum, ac, totidem & sylvestris in Galia appellat. Belgii Offici quaedam Funiculum vocant potum ut aliam Funiculum potum Peucedanos est impositum in fluxu, Merum dicitur non nisi in Italia, & à Medicis, usque potum, sed, in cap. x x x i i. hinc etiam crudum fuitur



Pharmasopem  
arum



ita, omnium commariger harmonico sua profusa silit: sedis inflammationes & omni-  
lemata mitigat: choleram & abscessus crudos concoquit.

Siccæ radices cum melle vitæ expurgant: commanibus ventris medentur, scilicet pui-  
bus detrahit cum vino vitæ & mellea curat: vetera reventia inposita diluunt. Sili-  
cia & herba sicca, ad melle, oculorum acern trahunt. Fructus epotus idem potest in-  
zaharum verò & commanibus morbis, & veteribus thoracivitis. Regio morbo laborantibus  
cum populo & vino datur. sudores etiam mouet cum oleo inanibum succina rapis ac com-  
uallia. Podagrictorum cum lobacca farina & aceto imponitur: purgat vitiligosa sic al-  
phos addito aceto quam acrimonia. Semine autem ad abscessus videntur cum Libanothe,  
que Cacthya non sicut.

Caclays autem vim habet vehementer gesticulandi ac reficandi, & merito quidem a-  
dine salientio. Integritate expurgantibus additur, que capiti aduersus vitæam  
flexiones imponuntur, sed die tercio auferantur: Dioscorides.

*De Spondylis.*

CAP. XI.

Spondylium.



**S**PONDYLION esse esse in  
to, velum Fuscis, septi hereditate et  
tore, rosando, subherito: sedis aspectu  
nulla hereditate, ex pluribus & frequentissimis  
quinque cohortibus, per marginem  
quis & perfructuam dardaniis, Fuscis  
Herculis Panace referentibus, acrimonia  
minoribus. loci in summo erant vobis,  
in quibus flosculi candelæ deinde floscu-  
plex, plantam, heram, ac tenac. radis eade  
in dardani tendit.

Circa agrorum & pratorum marginibus  
humidioribus ac palustribus apud Germanos  
ac Belgas frequens occurrat.

Flores hinc mense vigent: Emen hinc  
Augusto ad perfectionem peruenit.

Radix hinc Grecis Latine similibus Spondylion:  
in Galens exemplari *antidote* legitur.  
Germanis ac Belgi Officina Brasica vni-  
nam olim appellatur, & pro Aconitoides  
codicis ad eucrista teneri acceperunt: vni-  
male porperam Germanis *Bomolium* habetur:  
Bomolium & Calli *Bomolium* referunt  
autem hanc inter sponas vocis hinc mense  
mense, *Antidote* *Antidote* *Antidote* *Antidote*  
*Antidote* *Antidote* *Antidote* *Antidote*  
*Antidote* *Antidote* *Antidote* *Antidote*  
*Antidote* *Antidote* *Antidote* *Antidote*

Spondylii semen acris ac incidendi li-  
culetur, ad afflata, *epiderm*, & Regem  
bum apum esse medicamentum Galenit  
petitam per sicut *dardani* Dioscorides.

locinoris vitæ ac veteri strangulatioi peritota mederi.

Radix contra acris non vitæ, & Regum mucosum similibus conne relatur in dardani  
radis fistularum callos inposita aboedi.

Poleos ac Litens ex Spondylii solis ac semine cum aqua, addito feruente, potest  
coquere feruente, que potestibus in loco Cereuilla.

*De Panace, ac primam de Heraclea.*

CAP. XII.

**P**ANACE, auctor Theophrasto lib. ix. multiplex est. Quoddam in Syriacis in  
inde & alia em, Chironium, Heracleum, & Adlepton: prater hanc verò & vnam ali-  
quam Latifolium: & alterum tenuifolium, *antidote*, in in vniuersum apud Theophr-  
stum sex Panace species: Dioscorides verò tantum tria describit, Heracleum, Adlepton,  
& Chironium.

Synacum autem Panace à Theophrasto quale sit non exprimitur: Plin. lib. xi.

Panace Hieracium, vel potius Spondylium Hieracium.



cap. xv. folia illud esse ac ampla magnitudine rotunda. Sed suspensio est, huc ex Hieracii Panacei deken potius tenuitate.

Panacei Latiniolum, Cerasotum esse magnum & Ternatiolum, Costatum autem non tenent e sufficientem. Tulle sequitur Plinio, Panacei a Choroze repertum Cerasotum cognominatur: ut loquitur Erythraei Pempt. in lib. primi cap. 22.

Hieracium Panacei folia est, et Dioscori-  
des, aspera, virentibus, ad folia accedentibus, quinque partibus duris, (magnum & amplum Theophrastus) caule frutescente lanugine quadam vixente fonte: in Museo Anacardi flos luteo: semine odorato, nigrescit tunc acris ac medicamentum: radicibus ab vno capite pluribus, alba, gran colentibus, crassi cornes, & substanti gustus. Theophrastus radice, inquit, digiti crassitudine, hirsuta, aut infida, gustu sobria.

Panace Hieracium

Hanc autem descriptionem respondens, excepto solo florit colore, in Belgii hortu subinde reperitur, quod Hieracium Panacei vocant.

Spondylium vero illud ad id simile, ut males, vel alterum genus eius esse appareat. Causis eorum in protra crassis, geniculatis, & hirsutis, sed alacris, ad Ferula alteram non accedentes: folia similia, aspera, granosa, ex vno ferri colentibus, quorum singuli quinque partibus duris, foliis protra referuntur.

forma virentibus, sicut in laticis, plasmam, ac tenes valem Spondylii radicem candidam, in plantis non duram.

Quodam illud, ut dicitur, pro Panace Hieracio, tamen si hoc non laticis, verum candidis: Labels tamen le floribus late virentibus, ut esse ferbit.

Mitissimum etiale aliquid pilosa calabet, quod in Apennini regio, in Argentario promontorio, in maritima Sardinibus (potius malaris, in Italia autem in hortis colitur: Lachrymam autem ex hoc colligitur India, affirmare nequit. Nam Opopanax qui Venetis videtur, et Alexandria Aegypti, neque infertur. Quale autem Aegyptum Panacei non existat. Fortasse Syriacum illud, cuius Theophrastus meminit, quod ab Hieracio differtur est.

Dioscorides Panacei Hieracium plurimum in Beotia, Acin Phocide Arcadij nasci refert deinde multum inferius in Cyrene Libya ac Macedonia, atque hinc excepit succum excolat.

Quod vno Gireni vobant, Latine similitur Panacei dicitur. Erythraei quidem Dioscorides vocant *λεγιστων*, Latine Panacei Hieracium sive Hieracium. Nolo cum non constet, quod de pithum est legitimum esse Panacei Hieracium, nisi videretur Spondylium alterum ac massa appellari, quoniam tamen pro Hieracio calabere.

Hieracium autem Panacei radicem coram excoctorem simul & excolatorem est medicamentum, sed minus quam succus, auctore Galeo. Radix in ramenta concisa, ut Dioscorides, et sicca in partem extrahat ad vetera vicia eadem efficitur, ut dicitur in libro de materia medica. Absinthio meritis pellit cum Antidotos prodest contra morbum autem venarum in radice sua vici sita, quoniam eam vno habetur.

De Panace A. Sclero ex Diosc. & Theophrasto.

Cap. XII.

PANACEA Sclero eadem à terra producta in rima, sicut in generis arboris, atque cetera hanc folia, maiora quam Feroculi, hirsutiora magis & odorata, (folio Thapsia, sed calidior, Theophrastus) in falcibus virentibus, in quibus flores auriculatos, acres, ac odorati.

Panaces Allepion et exillanant.



Panaceae peregrina.



Officinæ  
Panaceae.

(sila Jovale, id est, gastrolegia) radix, et  
Theophrastus doctantur longi tudine, cordata,  
cassique vehe menter, coarctata casta de sila.

Inorganum illud est: Morbida non  
exhibet, sed de se ipso in multam adda. Pa.  
ponit & hanc ab similibus, si non eadem est, La.  
belus, que in Adversariis lacteo sacro melle  
targere scribitur: veluti Ferula, sed non  
quam huius sapore sita est.

Panaceae, sive Alepion, Latine. Et Galapion Pa.  
naces: Alepion, quod Duroconides, Panaceo.  
cant sylvae sive Organum: cap. v. de Organis  
(ve supra scripsimus) Sylvestris Organum re.  
com aut Panaces Heracleum.

At Panaceae Allepion moris calidum est  
Panacee Heracleo, quam obrem floribus & simi.  
ne melli mixta ad sterca, phlegma, & pleu.  
dum ut vultur, Galenus: que de Duroconis,  
addens panacea ex vino ad acris impensabi.  
li, & cum oleo distilla.

De Peregrina quondam Panaceae, ac de Clione.

CAP. XLIII.

**PA**NACEA (sive quod Peregrina appeli.  
mus, solum est amplius, ex alio pluribus  
melle, nonnulli hircos ac alpera, quoniam sa.  
gulana longa, lata, acuminata, Lapula sive  
quodam modo amulatur, sed tamen non  
caulis gemellatus, ferulaceus, tres aut quatuor  
cubitos altus, in ramulos superius divisa  
bet in umbellis amplis lateri: semine hinc, gla.  
num, & diffusum. longa & candida rida. la.  
hinc vulnerato, profectum circa radem con.  
le, factus xilium mernibus inant, spatio.  
cremno, Opopanacis colore simile, adque.  
dem exigua, sed gustu exaltans.

Non modò aut in Italia, aut ab Arabibus  
reponunt hanc, vix quaedam silis,  
siccus & vulnerato caule exit, venia & ali.  
go obliuiscunt est, a silis feruda, hanc  
di quoque lachrymam in sicco capo effusa.  
Atque hinc quidem faccus Panaceae quondam  
serpente esse evidenter ostendit: Quod & si  
non confirmat in Panaceae lachryma reponit,  
ex quo Pater Coudenberg Pharmacopos  
Antwerpensi hinc panacea in Belgio esse  
serpsit est.

Cum autem Panacea multa exstant, par.  
quodnam ex se sic considerandum accit.  
Non esse autem Heracleum Panaceae, per  
liber Allepion, ex superioribus sicut pater  
siquosque ut vel Chironis sive Synonimii.

Chironium autem Panaceae sicut hinc  
Amuraco simile: sicut autem: radem  
nunc, non alio descendens, gustu amara, &  
quidem Duroconides. Cum quo & Apollis  
conuenit: Panaceae Chironium habet sicut, ut  
Amuraco simile, flores asellat: radem  
asellat, non utraque, accit melle.





*Leusticum vulgare.*



In quampluribus apud Germanos ac Belgas horti reponitur: amat loca pinguis & nonnihil humida.

Ætate flores: Asperugo magna ex parte ferri ad maturitatem pervenit: primo Vires geminae erumpunt.

Leusticū passim appellant, quod Ligusticū, cuius loco istud olim Officina in usum receperit. Germanis *Epiphetis*: Gallis *Lewyche*: Britannis *Rasche*: Hollandis *Ramus d'arve*. Non esse Ligusticum ex superiore capite satis patet. Fuchius *Smynum* esse indicavit. Duo autem sunt *Smyna*, vnum à Theophrasto dicitur à *Dioicorde* describitur. Vtrumque cognatum est, cum ex utro autem *Leusticum* conuenit. Nec incipienda est eorum sententia, qui *Hippocistum* appellant: nam quod *Dioicordi* *Hippocistum*, *Theophrasto* *Smynum* dicitur. *Laserpitij* aliquod genus esse potius videretur: nam vni differentes sunt *Laserpitij* facies, se & diuersa esse genera, vnde in profanis, vniuersis constituta.

Deiungitur *Laserpitium* caule frutescente, *Laserpitium* folijs Apio similibus: Nec ab hac forma *Leusticum* alienum est.

Est autem *Leusticum* & radice & folijs, tum & ferriue excelsissimum ac reticicans ordine terreo incipit, & tenuem admodū partem.

Radix effusa cum vires bibas venenata prodest, emulcorum humorum concoctionem promouet, dolores frigidit, inflammationes diuersas, fidiotes mouet.

Semen eadem potest: quod & vitras ac mercuriales, secundas emouent: abigit, adustus vni singulariter prodest: item & conata suspendunt morbos.

Herbe biba in balneo sudores mouent, cum soliditates tollant, & mensas protuberant: eadem vna & recenta vulneri imponita ipsum curō curant.

*De Selsi Massiliensis. CAP. XVII.*

**S**ELLIUS genus triplex: *Dioicordi*, *Massiliense*, *Aethiopicum* & *Peloponnesiense*.

*Massiliensi* caulis desquamatus, vel alioq; ferulaceus, multis arcutis periculis, durus, sed velis, superius modò in hanc, modò in aliam partem reflexus: folijs veluti *Forniculi*, sed amplior, lanosa, crassiora, ac dilataus virentes: flocculis in utroque candidulis: ferriue oblongata forme vt *Forniculi* aut *Anisi*, gustu acris, non tamen ingrata: albedo, alit de-fensibilem, iacundū odoris radice.

In Comagena in *Provincia*, que à *Rhodano* ad *Vocantios* patet, vbi *Massilia* tribo, frequenter reperitur, tum & in alia *Gallie*, ac *Italia* quibusdam locis.

Græci *ῥιζομασσικόν* vocant. Latini *Selsi* *Massiliense* quoque nominant: à natali loco cognomen accepit à *peonibus* & *epi* vni. Recentiorum quidam *Forniculi* testudinis vocant.

Genus *Selense* & radice & fructus excelsissimū ac reticicans feruendo ordine, ac tenuis sane efficit: vniuers mouent ac frangunt: rheumaticis vni & ferriue trahunt: orthopneum & vitras tum finant: vni suffocationibus & comitialibus profant.

Semen cura vni potum cruda concoquit, sermone diuersi, epialis se bibis, vt *Dioici*, vni *Cappocarcinij* quod poudibus datur in potu, quò facilis fides ferriue emittitur, nullum eodem.

*De Selsi Aethiopicis. CAP. XVIII.*

**A**ETHIOPICUM *Selsi* lignosis frascis caulis, subrigicantibus, radice subrubentibus, cubentibus, alis potest cubentibus folijs oblonga, leuis, mediocriter laxa, dilutis & ex albedo virentis, longioris quàm *Hedera*, ad *Perichlymen* Germanis accedens, umbellatim hinc emulcorum: ferriue vni mucus quàm *Forniculi*, radice longa est, & reticibilis, vni & ipsi serpit.

Reperitur





Scelis Peloponnesiis reperitur.



Scelis Cretica.



grandibus, latis flore lato: semine lato, ob-  
longo, plano: radice crassa, longa, exteriori  
nigricante, interiori albida, latiore: flos car-  
pente, qui gustu amarus ac acris non solum ex-  
citet, & non raro vomitionem. Quod ita se-  
se habeat (ut C. Chilo creditur) verisimili-  
ter non est Scelis, sibi ipse hanc esse, Pelopon-  
nesi. Neque enim vilis Scelis radix fero-  
ciorum & amaricante praedita, sed omnium  
odore commendabilis & vicia similis.

Proponitur verò & alia quaedam Ma-  
thiolo ferulacea stirps, verum nec hoc legiti-  
mum est Peloponnesi Scelis, nam frido  
odore, ac Cicuta simili molesta est: omne  
verò Scelis vel semine, vel radice, vel vasa-  
que odoratum. Quamobrem non aliter &  
ita ex Scelium classis ac numero incertus.  
Et Scelis Peloponnesiis inter incognita ha-  
betur.

De Scelis Creticae seu Torodyli.

CAP. XX.

**T**ORODYLIUM humilis herba est, rotund  
caustulo, dodonariis aut alio: folia  
disticha, ambrosi cretanae: floribus in umbella  
albidis semine lato, rotundo, dupli, ambro-  
tu velum lumbum habentem, clypeo speciem  
referente, aut, ut Dioscorides, *ambrosi* id  
est: xiphi: scitis simis, odorato, ac non nihil  
acris radice teritur.

In Narbonensi Gallia sicut vix ac inter se-  
getis sponte gignitur. Dioscorides raris Ca-  
licum in Amano montem nasci refert.

Inlo ac Augusto in hortis Belgij subinde  
semine ad maturationem peruenit.

Græci *Tordylus*, & *Thudo ajmide*: Paulus  
Aegineta *Peplosia* scribit: Linnæ Torody-  
lium, & Scelis Creticum simuliter appellat  
Officina incognitum est.

Caldum est, inquit Paulus Aegineta, God-  
dyli semen. Ad vnam & mentes provo-  
candos vtile habetur. Succus herbar, semi-  
naque *vis* *vis* id est, cum vino pulso, de-  
cocti debenturam obocorum perdere sum-  
ptus, ne phantasiam.

Radix cum melle in decocto ad promo-  
vendas peccatis excretionem efficacissimior  
Dioscorides.

De Saxifraga. CAP. XXI.

**S**AXIFRAGIAE duae sunt: Major vna  
altera minor.

Minor amphidine foliorum cum hamis q. l.  
stutudine: majora sperat: folia variè crassa,  
Pulsis sic Elaphobolus, aut Siliam aqua-  
tena simulatur sed nigra, aspera, minor,  
nora, ambitu verò etiam ferrata, caulis huc-  
bralis, angulosus, striatus. candicans em-  
gna foscata umbellæ semen quide Apthoe-  
teris.

Saxifraga magna.



Saxifraga parva.



tenfis, acie, ferrensifque pulvis. radix oblonga, teres, crassula, sapore acris, & fibris non manducata creta.

1. Minus prius ac radicibus proximis foliis priorem refert, sunt tamen multo minorae minorae, circa cauliculos verò tenuiffima, nec per arbutum dicitur flo sculis ac fortica velis blaria. radicele tenues quaeque ac minores, sed non minus acres.

Germaniae ac Belgio vique facta familiaris, sed minor sic quae nunc. Latium & pinguen quiritur folia, sed tamen incultum, veluti agrorum marginibus, & alia similia, quae tamen non proficunduntur.

In his ac Angulis flores ac semina perficiunt.

Vitaeque necesse ac anas Saxifragam aut Saxifragam appellat: quidam Penedoliam alij Biberoliam aut Bepencoliam: Baptista Sardus, deinde & Leonhartus Fuchsius Impnellam. Quam ob rem à nonnullis Pimpinella Saxifraga nominantur. Est etiam & ab Impnellis cognominis Sangulorba. Exstat tamen & veras veniculus qui Pampinellam Saxifraga daffe me ostendit, qui talis est:

*Pampinella polar: Saxifraga non habet villas.*

Est sequens Sangulorba, quam Pimpinellam vocat, nonnulli hirsuta: Saxifraga vellet nequaquam: foliorum autem primorum Saxifraga minoris & Pimpinella Sangulorba quaedam similitudo.

Maiores Germanis Schmetz: Barbaris Besenapen. Bohemi Schmetz: Latini Saxifraga magnam sive maorem vocant.

Minorem Saxifragam hircinam quidam, alij Pampinellam Saxifragam maorem Bohemi Schmetz. Quae autem Saxifragam hanc Pyrethrum esse existimant, non perueniunt neculant. Legitimam Pyrethrum Pempinella vocat. hinc primo descriptum est.

Quod si autem ad aliquam Dioscoridis ac ferendo videtur, cum in quibusdam quibusdam Basso conuenire possent. Caulis sigillatim argulobus est, ac maiore digitali sicut collatibus: folia infans. Apoc comparari possunt, superius, praefinito maiore, longè maiore flores in umbellis. Anetha similibus: solum odoratum, ut in quibusdam Hypocistis, ac ac callifacem: quale Basso est, Dioscorides verbis illis ostendit.

*Basso quibusdam dicitur saxifraga, quibusdam dicitur dioscoridis, quibusdam dicitur hypocyrtis.*

*Antiquissimi vocantur meli; et dicitur ab eis abesse, an hanc dicitur; deinde dicitur an hanc dicitur. Quae Latine reddi possunt. Boreas in via facta est quadrangularem, prolixam, digni, crassitudine sua rades prostrata. Apud similia terminata verò multo, quae fuerunt illos Anethi & mentha odoratum, Hydrolyami notata. Habens exemplaria quaedam aliter, verum non emendatiora ampliora.*

Facilius videtur Saxifragie semina ac radice vehementer & scario odore excelsioris ac resicant, & parum tunc tenuiora.

Viresque vitas movent, Saxifragiae de ichthone medentur: calculos coherentes dissolvunt expellunt: (vide Saxifragae nomen accepimus) praesentia si in balneo horum potius decoctum propereat. Mouvant eadem mentis, ac lectum pellunt. venorum fluxus obstruentes aperunt: vanaeque cruditates erudantur: terrinae quoque dolores sedant: hanc diffundunt. Ad sterilitatem etiam venient, & contra suspensionem morbus ex uno veluti dant. Ex hinc utitur quoque ad venis morbos pollicentur profecti.

Radix contra rheumatica dentium dolores sedat, & multum ex ore patetiam elicit.

Aquae Saxifragiae per organa vitrea destillata, oculorum caliginem dicitur ferat: & facit huiusmodi ac facit hinc abolerere.

*De Saxifraga alba.*

CAP. XXII.

Saxifraga alba.

Saxifraga nigra.



**N**Ota est haec viviparifera, sed nomen, illi cum Saxifraga commune, in societatem eius pertinet.

Frax: autem de folia aliter in hirsuta & medio inter longa pedicula rotunda, per marginem emissa. Hedera terrestris mollis & albidiora, interque caribula amollitur: rima, melle, doctante alicuius, lanuginosi, in foliis quosdam botani insidiant. radix rubea dicitur flos, cui superius veluti granula insident, seminis Cornu magnitudine, ut paulo maiora, gasta amaricantia, colore partim purpureo rubentia, partim alba. Huiusmodi folia Saxifragae vulgo habentur.

Locus huiusmodi inculta, in montibus, colitur, in Germania, cum & in Bohemia multo in Alpibus: Erucaceis quidem locus alior & murebus foliis, hinc frequenter, erunt.



**Æthiopiæ virens / Scordium:** Barbaris Drotaris vocatur: Italia & Gallis *Proscodan*: Philippii *Silvotum*: Anglijs *Scordium*: à quibusdam Latinijs Paris, P. succedane & P. scordium vocata accipiunt.

Liquor autem Proscodani sive liquor escalliacens ac reflexam ordure est ratio. Radix magis aquam liquor escalliacens, sed valde rejuvat. Escalliacens quidem ordure secundo compo, deficiens vero secundo incipit, ut Galenus scriptum reliquit.

Prodest verò sive sive liquor ex aceto & oleo rosaceo in morbis à Lethargico, Phrenetico, serpens, comitialibus, distentis ac primum doloribus, paralyticis, convulsis, atque in vomitione acerbis necesse est affectibus cum aceto & oleo, ut Dioscorides scribit. Idem quidam frangulatione vitæ laborantibus, & sopore occupatis, reuocant: siccis serpentes frangulatione doloribus cum aceto nihil aliud prodest: cauitate crocorum de vitæ cum postibus dolores curantem inquit. In casu frangit aduersus tuissimam, dista vitæ cum respiciendâ, tormen & infestatione acutatur ex cretibus dicit, à dicit Galenus, & viscositate humorum natura. Nihil aliud mouet: Lactem misceat, nempe urinando, digerendo & cretibus humorum remouendo. Difficiles partus adiuuat: vitæ in apert. Ad ventr. & renem dolores biliter sunt.

Rata ad edenda vitæ, sed inefficax: sanna eius siccida vitæ purgat: carnem generat (Galenus addit) & vitæ creaturæ obducit: squamas ossium calcitrare detrahit. Cera-  
tibusque calidioribus adhibetur. Eleganda autem est roots radix, non carnosâ, foliolâdam plana, et strobil Dioscorides.

De Angelica.

CAP. XXIII.

Angelica maritima.

Angelica sylvestris.



**ANGELICARVM** una maritima est, quam Hortensiam & sanna vocant: altera maritima, sylvestris dicitur.

Sanna procerior est, et quæ hinc, gurgulano, atque incertis manibus affert, qui quandoque et hinc ipsiusmodum, de humane stature excedit altitudinem. Folia amplissima, et circumscripta, paribusque compositibus, latis, ambobusque molliuolant. Umbellæ læuæ sunt, disculis  
d a  
alba



Mixta aqua & sanguine acci, & per se quidem, aut additis Theriac ex vaporis, à contagio dende horam & perficitur, in ore detinetur, sine communi solutio. Lenius crudosque humores cadenti ad concubionem perducit, etia florum, quae pulmonibus rheumaticis inhiant, expurgationem sanctorum procurat, hepatis & Lienis apertio, vnguntum terroremque multos euenit, leuandae expellit, aduersus rigores febrium huius decursum ex vino praedicti. Valere maximo contra fistulas in ore radice adhibent, quae ex toto locum getant, vt Fuchsius ait.

De *Afrantia* sive *Imperatoria*.

CAP. XXV.

Afrantia.

Herba Germ.



**A**FRANTIA magna & lata sunt folia, margine serrata, vt plerumque quae radicibus appropinqua, praecipua trifolia, non raro vero & numerosiora, caulisque cubitalis, pennis, & gracilior infra se habent, rufescentia, magna folia in candiditate, sicut herbae, plantam, tenuis, Aetha est, oblique suspensa radice, acuta, odorata, & lacte oleoso plena, flos e paruo colore subagranis interius suffusa, facili que succurritur superius multiplicata.

In montibus huius montosis agrorum, tum & apud Germanos, quibus tamen Imperatoriam, vitan & Dajys, herentis est.

Inno de foliis apparenti: sicut succedit, hyemis patens radix, multo tempore vixit, & quae modo progredere.

Nec modò Afrantiam, sed & Imperatoriam veterinorum nonnulli hanc vocant: nonnulli verbò Ostrumum, quod Serapion dicitur, autem multum à Semruo sive Lancia herba. Alij Afrantiam sive Ostrumum legere vident, qui voces has à Lasepio non depresso ut volunt, & Afrantiam Lasepianam, vel eius speciem esse. Lasepianam autem casse de simburg simlaco, id est, magno atque procero: huius autem, vt scripsi in notis ac huius est casse huius, quae folia à Lasepio dicitur esse, hinc ostendit. Germanos est *Imperatoria* Babarum, sive *Imperatoria*.

Hanc sive sive (penes est, quam vulgò *Erbarum* *Germani*, id est, Germani herbam appellat.



lana, folia liquida in floribus in melleis carididis, laudat peritibus radicibus, priorem  
 Cor, totum stiracem melleis, gratiosiora herba est & hec in melleis.

Feracius admodum facultatis Africæ radix, cacalificans cordine vertit, nec tamen  
 ficaria tenuis fistulæ partium est: incidit, stricte, digerit, sudoretur remanent  
 crassos singulosque humores conoquit, flans intellumam, ac venosam, tum de viti &  
 eius colicis ac nephriticis prodest: Vitis melleisque potior: ad calcificationem simpli-  
 tiones conferit: fecundas etiam pellet. Palas drachmæ pondus ab quocumque dato hydropo  
 bene facit, consultissimum ac epilepticum: à quartana ante accessionem cum vino etiam  
 liberat: venena se fitit: pessile rebus morbis habent. In viti auctoris decocta radix de-  
 paret dolores murgæ: costum autem silicam ea, atque inter apoplethicas praesertim non potest  
 uti loco, qui cerebrum per spiritum a paratose liberat humores, & Apoplethica, reman-  
 sit, atque hanc remedi morbis liberantibus vultus adhibentur.

*De Lasepio & Magydano & Dioscoridis & aliis.*

CAP. XXVI.

**L**ASERPIO Folia creant Apia fatalia: casulis quantum Ferule, crassitudine posi-  
 tum, ac similiter annuus, hominum cibo modis omnibus idoneus, affis crassitas di-  
 xit, qui posteaquam semen maturum, atterit: semen Latum, *πάσις* sine solam,  
 quod & *πασίς* sine folium vocatur. radix multa crassaque, superius ex tuberosis a prope  
 conuegitur. Colligitur ex caule, tum & ex radice hęc sine liquor, qui Lasepium vocat, quod  
 & Dioscorides affirmat.

In Cyrenæa regione, quæ Libyæ sine Aphrica provincia est, gignitur: pondus tollit  
 Castulas:

*Lasepio feræ sunt Cyrenæ.*

Peris autem quam Cyrenensis rebem habent, illic Lasepium natum. Perisam  
 hanc ferat casula fugerit loca. Natio verò & in Syria, Armenia, ac Media, quæ Africæ  
 à Dioscoridis referunt.

Vere incantatum solum est: deinde casula edunt: semen, cum Auster post Caucasum  
 uent, difformet, unde Lasepium proferunt.

Quadraginta diebus (estatis) siccas capitur. Eodem anno radix & casula perficitur.

*Σίσις* Græci, Lasepium Latini dicunt. Foliis Theophrastus Malspica vocat:  
 et Dioscorides verò casulam *ασίριον* dicit: refert: post tamen: Nonnulli eandem *Σίσιον*  
 aut nominant radicem *αγγύλιον*: folia verò Malspica.

*Lasep.*

Liquor Græcosque, Latini Lasepium, Arabibus Affa appellatur, & qui è casulis, *ερίον*  
 è radicibus verò *αγγύλιον*: Gæci hanc Radicem, illum Scapanum vocat. Perfertur Dios-  
 coride Cyrenensem Lasepium, & quidem subrubeta, transposita, Myrtis stimulat, atterit  
 it, non nocentur, suave gultu, quod dilutum facile absorbet. Medicum & Syriacum lasepium  
 viti bus minus valet, & magis visosum reddens odorem. Eius sumitur autem Syriacum ac  
 Medicum Lasepium esse, quod Officina nostræ etiam Affam feracem appellant.

*αγγύλιον*  
*Magydano*

Ferax verò (Dioscorides scribit) & altera *αγγύλιον* in Libyæ natio. radix Lasepium si-  
 milis, in maius crassa, acru, hanc, Syriæ sine Lasepium habent. De eadem & Theophrastus  
 quam tamen non in Libyæ, sed in Syria gigni refert. Quod Magydanicum, inquit, no-  
 cant, *αγγύλιον* id est, aliorum est à *Σίσιον*, ceteris enim, minus acru & Lasepium  
 habet. Gignitur in Syria, non in Cyrene: ferax in Parako mouere multum esse: Natio  
 id quoque *Σίσιον* vocat.

Ceterum *Σίσιον* liquor, Galenus ait, calidissimus est: verum crassius & folia, aculis  
 & radice sitiferentur: coccalificans: Sed omnia sitiferentur magis effertur: sunt, ac proinde  
 quo difficilia: fons tamen corpori impositus efficacior, & omnium potissimum *αγγύλιον*  
 quod admodum trahentem facultatem possident. Arum & coccalificans atterit  
 liquandi viti quondam propter propositum temperiem obtinet.

Efficacissimum Lasepium, Dioscoride auctore, deinde folia: postea casula: addit viti &  
 multas alias particulas siculatas, quæ consistit prætermixturæ, Galeni compede  
 contenti. Theophrastus folia peris pinguisse vehementer, & carnes earum mundam  
 in modum suaves reddi, ait. Purgat verò & hoc peris quidam affirmant, sed ceterum  
 quod videlicet murem purgare, atque suberant. Mundi radices ex acro recentis casula  
 ex aliorum rebus Theophrastus quoque addit.

## De Ferula &amp; Ferulago

## CAP. XXVII.

Ferula



Ferulago



**V**NIVS Ferula Diofcorides incensat, ex qua Sapporitam colligitur: Chalbanum verò & Ammoniacum Ferula quoque Sivas sine liquoris esse testat. Veritas aut istis cum præcedentibus, necne, non exponit. Fieri autem pòtèst, ut ex vno genere Ferula differentia sim colligantur, pro regionum videlicet, ubi nascuntur, varietate. Vetus enim Liber Coena nunc disertum est à liquoris, qui in Media & Syria præstat: ista Ferulam in Media Sapporitam, iuxta Cyrenam Ammoniacum, in Syria Chalbanum præferre pòtèst apparet. Theophrastus Ferulaceum genus in plura species dividit, & unam grandem, Ferulam vocat, aliam in majorem, Ferulaginam.

Ferula sativa: radicem præmit quatuor aut quinque cubitorum, generalitatem, crassam, & foeta sub fine miferoduram, ac lignosam, viscam, sed circa cacumen ramosam: ex quo si prima putrescente fusciorum foliorum ac umbellaram radimentum eximat, esse codum legitur: quod Coeniam Ferulæ nostram appellat. folia grandia sunt, mollia, & molliora, in capillaresque modum attenuata, multò quàm Feraculi maseos, altero ordine disposita, umbellæ enim in fastigio, tum in alis lance folioli in habitum: & deinde semine plana, lata, foliacea. radix magna, rubra, striâ descendit.

Ferulago minor de humilis æquiva Ferula, atque similes: casis quoque viscus, & folia roragæ vniuersi. Sunt tamen, inquit Theophrastus, qui differentiam à Ferula existimant.

Natura Ferula in compluribus Aethiæ ac Afix regionibus nec deest in Europa: tum in Apatia & Barbarorum Gallia cognata est.

Inno ac Julio, vel etiam prius in calidis provinciis flores, ac semen non multò pòtèst perire: porinde casis, qui arrosus est.

Que mater est Græcis Νεφέλη: Latine Ferula appellatur: Italis Ferula: Hispanis Ca-cubina.

Minor Nephelæ & Ferulago nominatur.

Quod in tenuella ac prima germana consociatè reperitur. Græcè λεγόμενον ἢ καὶ Ἰνδιανὸν ἀποπροπίβη. Medulla, à recumbente Conotham Fensile dicitur.

Est autem medulla hæc, auctore Galeno, adstringens, qualitatis potiticeps, atque idonea vitæ sanguinem (quæritatis, & cutis) : Diocorides tamen & nabis, vobis sanguine illius erumpentem filere existat, & contra sperantem morbus in vino cadere dicit.

Nostri gratæ ferunt, præsertim in Apulia, à nonnullis sub cineribus tota (sola tamen aut parvitate præ simulata) vidi, papere & sale addita, esse quæ edulam in fimo, quod cum ad Venetam exierit.

Semen casciliacæ & anemacæ: tormintolis studiat: sudores mouet cum oleo corpus illorum.

Caulis illi odore, capite dolores facit, Maria condantur: Diocorides vobis.

QUINTI LIBRI ET SEMPTADIS SECUNDÆ

FINIS.

# REMBERTI DODONÆI <sup>1644</sup> *Austrii domini* DE RADICIBVS, PUR- <sup>etog. ead. p. v. v. v. v.</sup>

GANTIBVS HERBIS, CONVOL-  
VULIS, DELETERIIS, AC PERNI-  
CIOUS PLANTIS, FILICIBVS,  
MYSCIS, ET FUNGIS,

## STIRPIVM HISTORIÆ Pemptas Tertia

### DE RADICIBVS

LIBER PRIMVS

#### PRÆFATIO.



**S**UPERIORE Pemptade, flores, edentatas, arenariasq; herbas, vna cum umbellifera, prosequi studuimus. hæc vni tertis, quæ ad medicamentorum materiam faciunt reliqua occurrunt: notati sunt, quoniam ad multa vtilis radices: et quæ purgandi facultate pollent, quibus admodum sepe conuulsiuè accedant quia plurima harum inter purgantes sunt referenda. Peruenit et hæc, quascunq; deleteria ac exitiosa vna aut naturam ferocis aut non Filices, Musci, et Fungi. Præterea vtrius locum radices occupant: præterea purgantes: conuulsiuè tertium succedunt exitiales ac perniciosas: præterea Filicibus, Musci, aut non Fungi velidit.

*habent autem classis, aut ut nuncupare libet, liber, non omnes quæ comprehendit præfatus, completitur: vtrius cui contrarium dicitur, quæ inter purgantes, conuulsiuè, vel exitiosa, aut emittit alia loca referenda non sunt. Neque ex his, quæ magnas ac efficaci radices obtinent, non pauca in alia digesta sunt classis: propter similitudinem radicibus aut effusivam rem in quibus accidunt. Ita et Parasita, quæ floribus præstant, inter hæc referuntur. Incommodum vni et Dysma, et alia, quid viciosa sepe implicent, inter conuulsiuè numerantur: tales radices cum electis describuntur. Ita radicibus classis pauciores completitur, quæ præfatus, si efficaci radices in mari in hæc contraherentur.*

## DE ARISTOLOCHIIIS.

### CAVTV I.



**A**RISTOLOCHIA, auctore Dioscoride, tres sunt: Longa, Rotunda, & Cle-  
matis. Præter Aristolochiam speciem annuuntur quartam. Posterior aut  
quædam, Saracenicam dictam, adiuuat.

Longa Aristolochia multis radice rotundis ac vinctulosis germinat casti-  
celis, circa quos folia hinc inde mollia, odorataq; et diuersa inter folia oblonga,  
cuius parte longiores, coloris purpurei, odoris gravis fructibus non dicitur, ex quo Py-  
racocinetas, qui latine macarocum quæque ut plurimum partes distillant, quod man-  
gnum ac nigricans est coloris. radix subest doctantatis, aut breuior, digitis acrostichidis,  
hæc flavicentis coloris, odorata, sed purgatam amara ac ori ingrata.

Rotunda Aristolochia, casticulis folisque præterea refert, hinc tamen parvè rotunda vna  
folia eius præfata, cuius fructus carbomatus flas vni us (differentia eorum in hoc notabilis)  
oblongos et angulosi rotore subdare: ut dicitur hinc vni, & qui refertur parte, in purpurea  
fibrogata: fructus hinc Pyracocinetas modo è latiore sede distigatur illius in rotundo oblongos  
vni, hinc vni similia quæda longe. radices orbiculata ac tuberosa, galsa & odore longe.

Clematis longa, præterea in basi vinctulosis sub-casticulis, ac non raro ramosis, vni quæ  
notandissima comprehendit, quibus si Similicis modo implicat ac circumscriptum folia lon-  
giora

Aristolochia longep.

Aristolochia clematite.



Aristolochia Clematite.



gion pedicelo hinc latius, latus, acuminata, et aliarum: flos similiter cassis, oblonga, le-  
 tous, aut ex purpura nigricans: fructus haec differentes, tenues autem radices sunt, et per-  
 longe, modo per se minima serpentes, mox alius demum flos, colore praeconcolorum.

*De Aristolochia clematite.* Aristolochia clematite folia esse habent, *de Aristolochia longep.* Aristolochia longep.  
 est: Aristolochia longep. Aristolochia longep.

*De Aristolochia clematite & Theophrasti locis.* Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis,  
 & Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis,  
 melinae & Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis, Aristolochia clematite locis.

Aristolochias autem nasci pinguis & campestribus locis, Plinius refert. Hispaniarum  
 harum trium feroces sunt. Longam & rosellam in Italia et Narbonensi Gallia reperire quosdam

*De Aristolochia  
 clematite.  
 Theophrasti  
 Aristolochia  
 clematite.*

est Citharizans Petrus Bellonius in Ida Crete monte à se inven tam scribit. Carolus Clouss circa Hesperiam, plerumque et alia Syrace Hispanie locis, in diuersis & vepibus offendit sic hanc refert.

Floret Aristolochiam in Belgio quidem Maio aut Iunio: alibi & in calidioribus regionibus pax.

Nuncupatur Aristolochia Græci ἀριστολόχη, quoniam ἀρίστη τῆς ἀχάνου, id est, optima percipit h.

Pocum ἀριστολόχου ποικίλη ad est, Aristolochiam longam ab ipsius radice forma, nem & Aristolochiam, καλλιόμορον, in Græcia nuncupatur, & Aristolochiam quoque marem.

Altera forma existimatur, & ἀριστολόχου εὐρυσπίου, hinc rotunda Aristolochia dicitur à nobilitate cuius γαστράδα, seu terra Malum. Cyclaminius tamen & certe Malum appellatur, ab Aristolochia malum differtur.

Terra Aristolochia ἀριστολόχου veluti fuerit prima cognoscitur aut.

Reperturam potum & apud Apuliam Aristolochia & alia appellationes, vt, ἀρίστη ἄχου, ἀρίστη ἀχού, ἀρίστη ἀχού, ἀρίστη ἀχού, hinc que est specus proprie hinc, non tan sapienter, acerbis communis videtur.

Facultas autem omnes hae Aristolochia & calfaciunt, & sicca sunt, & ad reuam visus quibus videtur permouent, exurgendi potentiam vbi habentur.

Deficiunt longam aduersus si spiritus & moem firma, diucliam pondum cum vino bibi, & videt usque refertur ac cum myrrha pipereque potum, & pelle omnia in vomu à parca colligam & mentis & forma, idemque cum pesto impostram pesti.

Rotunda tum ad hanc omnia, cum ad alia reliqua venens facta nem ad alitiam, singulari, apertis plenem, cepta, conual si, luceram dolores, cum aqua potu: aculeos & specus corallae offusa hinc in castaphleumata potum aditit: patredines venosus: & hinc fordidat cepug, & cum cum inde melle hinc implem gurgis & dentes purgat.

Cum tamen Galenus fragrantissimi esse ait, vbi que ea ad vnguentis vnguentarios vbi, sed ad insanam infamam.

De Pistolochia

Pistolochia.



CAP. II.

**P**ISTOLOCHIA longe rotundaque Aristolochia, & cauliculis & foliis similia est, minor tamen ac tenerior: folia eius lora ac hederacea sunt foliis oblonga, castis, simplicibus ac extima parte nigricans: fructus tuberosus, veluti vniuersorunde Aristolochie pro radicebus tenues quibus plurimæ necant filia.

In Martoniensis Gallie, nec non Hesperia quibusdam agris sponte nascitur.

Floret suauitatis perficit eodem, quo alia tempore.

Pistolochiam hanc speciem nuncupari, ἀριστολόχου verbè cognoscitur, Plinib. lib. x x v. cap. v l l l. scribit. Est, aut, & que Pistolochia vocatur quem generis Aristolochiam in uoluce tenuior quam proxima dicta (næpe Clematis) densis radicem capillamentis, alibi plenius crassius hinc: hanc quidam Polymia non cognoscunt.

At facultate & virtus hae alia reliqua hinc ab aliis videtur, exaltissimè similiter & exaltissimè non admodum hinc. Corallula, conualsi, ex alio præcipiente, ex aqua potum vbi hinc, Pinarum radice.

De Aristolochia rarisima, Aristolochia rarisima. CAP. III.

**H**æc Aristolochia rarisima foliis hederaceis rotunda, reliquis similia est, minor tamen ac tenerior: folia eius castis quam alia: flores conuerti vbi, vbi parte promissimè, colore subtili: fructus Pyrorum vbi rarisimè. Scribitur.

hinc ac procorior quibus longam, rotunda: folia eius castis quam alia: flores conuerti vbi, vbi parte promissimè, colore subtili: fructus Pyrorum vbi rarisimè. Scribitur.

ma.ii

*Arifolochia Sativiana.*



quæ etiam similia, insigniter amara & calida, longa non infensus proinde & pro hac in a-  
 ntabancâ compositionibus succedere & recipi absque vilo errore possit.

*Derivation Cause. GEN. IIIII.*

**R**A. 1614. consistit. sunt. una Major, altera Minor.  
 Major folia sunt Coronari modo defecta; nempe, dilute virescentia, costis valde  
 Aquilinae foliorum colore, quorum & formatum et systema referunt, minoris tamen ve-  
 gitalitatis, repens & laevis, palmatum longi, circa digitos superiusque parte flosculi triduo ap-  
 pto, oblongum corniculatum de ligno, Linearis foliis conformes, dilute in rubro purpureo,  
 subinde alba. Semen in tubu alatae folio et in quodam agram, per am et flosculum, sub  
 tubu, ut supra parte se fitu, de exc. autis, palpi, diam recens, substanta vbi substantia  
 vbi ita substante, gubia cum amantidine quædam aufferit.

Minor spiculis folia, peria ubi purpurascens in oblongis flosculis, dilute in  
 minoribus quibus est, longi (cor ranti) in ac minor radia huius non cura, vtrum flosculis, glis  
 si vntu qui flosculis, colore si bilis reo, flosculis cum amantidine adstringente.

Est utraque circa sepes, repens, agrorum & vinearum margines, humilis & vixit  
 in pingui locoque. Vtraque in Germania minor Belgis frequentior.

Præter istam Viti utraque etiam flosculi, florem non facit, tamenque brevis perit. Moll  
 Mian cum peris radicis et alia superest, ita patens holoctoidis: apparet.

Offensiv  
 1775

Germani, vntu: Belgæ *Staphyli* id est radicem causam appellare. Offensiva  
 hæc pro Arifolochia rotunda vbi acetosus est quâ referunt, aut referit d'ibeant, simit  
 eorum in quibus, ut rotunda vbi acetosus est quâ referunt, aut referit d'ibeant, simit  
 beati modo vntu huius cogniti. fuerit non parum am bigendum viderit. Sunt qui Loo-  
 periti flosculis facient, alijs Epithimo nonnulli Thie sunt pleaque Caprea Chelidonia.

Linnæu  
 1775

Cum Looportetis in nam tuberosa radicibus & quædam vntis solas exantia palpi  
 flosculi, sed costularum alie plurima, hancque Anemone desiderata, d'ibeant ad hunc  
 Looportetis primæ causa, carnosissimæ alia tuberosa d'ibeant, hæc vnti quæ Anemone  
 quædam D'ibeant d'ibeant, Pluque rotunda.

Epithimo aut in si vntis d'ibeant d'ibeant. Vnti rotunda habet, d'ibeant aut d'ibeant  
 Vnti

Radix vera.

Radix cum rhizom.



Versusque planta, non improprie haec radix nuncupari poterit. Verum si quidem tempore immutatis apparere se videret. Sed tamen isdem ab hondo delictus ea propter non est. Erythronium species istud, longe aliud est: ut quidem desinibitur, tum ab Apuleio, cum in libro ad Paternum Galieno non bene.

Apuleius, Erythronium, nascitur in Gallia, in monte Soradi: signum habet Apulei, sicut purpureis colore nascitur sepe in radicibus, ut idem quoque ramulis, quia sicut in potius hinc omnia Baccantem, ferocem habet tanquam fibra.

In libro autem ad Paternum haec verba leguntur: Erythronium herba est, quae in summis montibus nascitur. Folia habet similia Agri, & ibi rufum oblongum, in curvis summis Baccantem quasi volucrem, & ferocem in medio radice in quo quaedam agri radices & volucrem esse oblonge. habet & radices aliam, quae radices aliam e radice bus emittit, nigro colore vestis. Ex quibus manifestum, radices hanc nequaquam hanc modo Erythronium esse.

De Theophrasto hanc, quae apud veteres curant. Theophrastus radices cum summis esse, & radices aliam purpureas ait. Plinius lib. xx. cap. xv. i. radices quoque Theophrastus appellat, bulbosus distinet, & gustu asperum refert. Athenaeus Theophrastum curant radices Theophrastus dicit, ex quo Aristoteles composita sunt Compositae hanc sine radice curant apparent tuberosi siquidem radice gustu non atque sapore aspera, quae ad purgationem facere creditur. Sed in curant veterum hanc curant quod affirmandum.

Capnos chelidonia, quae iuxta sepe curant, atque hanc quoque, sicut cognominatur, equalis sit, affinis est. Solum nomen eius reperitur Terentio. lib. iii. cap. cx. in Collyris Mariani, & Terentio in lib. ii. cap. primo, inter castificans & firmos sicut composita collectiva.

Quod iuxta Capnos chelidonia nulla est, quae à Plinio lib. xxv. cap. xvii. prima Capnos cognominatur, & ad oculo curant castificans commendatur, facit manifestum. Cuius radices non esse Capnos chelidonia. Primum nomen Plinio Capnos nomen si est, & vicinis sepe nomen si est simpliciter. Cuius vero radix ramulis adnata curant, hanc quoque nulla sustinet neque eget adnata.

Sicut autem est, Aetio Capnos chelidonia, quam Plinius quod fortasse Chelidonia cognominatur, necdum aliquando occasionem Capnos chelidonia appellari potest. Ferebant curant folia, namque in curant, alii quatuor refert: & Vero quidem primo circa radices, quae adnata, ad est, hanc nomen adnata apparet. Sed tamen idcirco veram telegrammum

Apuleio

Apuleio

Capnos chelidonia



Capitum chelidonium esse ad non sequitur. Sunt siquidem & alie eodem tempore prodensa, licet quæ possit percussas, quæ tamen Chelidonium non appellantur.

Cæterum Cava radix calida & sicca potentia est, magna tamen sicca quàm calida, utque terbio sit sicca, secundo vero ordine calidior faciens, salis præsertim & aliterque, nonnullaque digerit, vitæ ad ventrem duransque tenuissimam fistulam uræ tu motus, videri citam adacta hinc et hinc cum in summo colore seu in vigente ex Populo nigra, aut alio simili fructu te permissa. Fetus & hinc drachma, vixit pondo sumptum alium duxit, præstantique de trahere.

Arum.

DE AR.

CAP. V.

Arum Egyptianum.



**A**rum folia aliquot sunt magna, laeva, splendens, lata, acuminata, hederae folia vix ampliora, nigricantibus nervis illis latis veluti fagittata - Scapus inter hæc cum basi sem altus, purpureo non nisi in punctulis subinde notatus, in involucrum profertur oblongo, patens, se porius auriscalæ aciculam, & medio curvæ pulchre similes affert, nec minus a præputio magnæque hinc utque costæ sunt, quæ tandem vixit faciente decedenteque, erigunt, ex acnæ pulchre per matam raram subopibus & succolis - semel in horumque ut aliam, erigunt, duriusculum radice tuberosa, magnitudine maiori eluce ut exiguæ bala, munda, carnosa, floris non carens, multis quibus se propagat ad matam exiguam veluti bulbis.

Nascitur Arum in sylvis, in saxa verbum fossis, sub lapidibus, locis ubique in montibus appellatam locis montis, alia in saxa ac omnino parvam reperitur.

Erumpunt mox post Hyemem folia pilibus vero & vaginata luno ex, folia maxime tibus quibus corru pûs vix lulo & Auguribus in atuantur.

Exit & in Agypto Anipocia, quæ in Aethiopia quoque reperitur, nam & in Lusitania quibusdam locis iuxta rivales & flumina, quod ab Europæo differens est arum & magis hoc sine folia, maiora quàm Nymphaeæ: crassa ac tuberosa radice, inferiori fide crassioribus, que edatæ est: floes ac semine delibet semine, propagari vero sicut à radice crassa.

Callistum *Morus de maestra tenora* appellant: plethique Colocasia esse voluit. Colocasia autem Dioscorides radicem appellat Falce Aegyptiæ, quæ vixit hinc floribus Herodotus Colocasia rotundam radicem esse refert.

Arum à Græcis *Arum* nominatur, ab Officiis Iarus, & Barba Arum, ab aliis Peruvialis &

in Lepia: à Cyrenis Colocasia: ut innotuit his vocis, ubi de *Asper* ac *Agrostis* appellan-  
 tur. Testes Plinius lib. x. c. 11. cap. XVI. Arum utique cum Dracontio hinc ubi, & quod-  
 dam eandem dicitur. Nomenclis Serpentariam matrem vocant: Germani *Waffenputz* &  
*Waffenputz*: Itali *Gejore*: Hispani *Tore*: Belgae *Gallioet*: Galli *Foot de veau*: Angli  
*Calliagrost*.

Germani An vici pro regionum varietate differit. Nam, ut Galeus in lib. De aliment.  
 facultatib. hanc radice in quibusdam regionibus acris procreant, ut propè ad Dracontium ac-  
 cedit. Cyrenacoarum matrem medicamentosam esse Arum aut acris ad id ut de Rapa vultus  
 agunt. Et tale in cibo est periculosa.

Si quis autem huiusmodi crassos vel lentos in thorace aut pulmombus collectos, nisi expu-  
 perit, acris ac medicamentis suis magis coarctent. Acrius autem est in Italia, Germa-  
 niis, Galis, Belgis, & in Asia quoque, Galeo test. Eius verò in aqua elixum, sed dum ipsa  
 radice coarctat effectus proce aqua, in aliam ex eisdem consistere ipsam coarctent.

Totum autem aptum Arum effluvia constitit, ut in lib. De simplicium medicamentorum  
 facult. Galeo test. sed calida proinde extergendi vim possidet, verum non valentem, sicut  
 Dracontium. Est itaque in coarctando & calcificando prima ordinis. Radices eius maxime  
 feruiles: siquidem corneae crassissimae humorum medicamentosissimas, adeò ut & excre-  
 scantibus possent dicitur: sicut sed magis tamen aptum est Dracontium.

Dracontes sibi eorum ad elixum conditi, & arida per se decocta mundi acris non medi-  
 cam praeter ex fimo bubalo diluam podagræa prodesse.

Ubi post quadraginta dierum lacteas & ab omni cibo abstinentiam, exantia Arum o-  
 dentibus namque ventosa intestinum deducit dilatatioque, & facultatem accipiendi cibi ad-  
 dit. Abstergeat siquidem eorum temporis intestinum: exantia: super adducitur, ut propemod-  
 um abstergeat: ut quidem Aristoteles, Athanas, Plinarchus, Plinius & alij scribunt.

De Dracontio. CAP. VI.

Dracontium.

Dracontium minus.



**D**RACONTIA duo sunt videri solent, alterum minus & procerius quidem, quod  
 apud istos tota generat.

Minus hinc magnam Dracontium easse affertur colla, sed quibusdam aut aliorum, crasso,



dicuntur terebintham, quò omnino est ut medicamentosa sit viti, in c. 180, ut, in eodem An modo exhiberi, cum crassi ac glutinosi thioactem palmosensque trifoliantes huiusmodi fonnæ vix pellenda veniant.

Diacorides verò anarion. Dicitur ab eisdem referri, cum coctum viti a ferati cum mel-  
liquis per se in cibo acceptam, huiusmodi thioactem huiusmodi ad educandam faciliã efficitur.

De Dracunculo aquatili.

CAP. VII.

Dracunculus aquaticus.

**A**QUATILIS Dracunculo non rotunda bulbi speciei, sed praelonga, repens & geniculata, modico siquè crasso sedula effracili, cuius generatae foliorum pediculi affurgunt teretes, glabri, vitiis funguli, deorsum vero elidide & tenuia siquò deum stritur fibre. Fru-  
ctus in beca pediculo superi, atque viti est viti foliorum prodi, vitiis quidem exiguis candela siquè fluitantibus ( quae pro flore sunt ) cir-  
cundantur, eae ferè inde in nocturnum, primam vitem aut maturam, subditæ, An viti m-  
norem, at non minus acuta, tota laevè sunt, vi-  
rentia glabra, lictuq, hederaceo-coniformis, sed tamen immota quàm An aliud verò curru-  
ce molis fructus concolorat, etiam tunc est, ac parte est veritas, superiore nempe, solidum.

Nascitur Dracunculus iste in vitiis palu-  
stribus locis, in ipis frequenter palu-  
dibus ac refectibus aquarum Germania ac Bel-  
gion in mte quens.

Autumno viti maturatur.

Dracunculus aquaticus & palustris non ab-  
re determinatur à nostris An palustris per-  
peram verò Hydropeperi tubera dicitur Ger-  
manis Wasserpeperen huius; id est, nostrat  
dialecto, Wasserpeperen.

Describitur autem Dracunculus istud à Plin.  
lib. xxviii. cap. xvi. & tertio eius speciei est,  
quam domesticam esse, folio maiore quàm



quàm, radice arundinacea, non dem, ut affirmatur geniculata non nodis quos habet veritas, vitiis siquè effracilis. Concolor foliorum forma & magnitudo, radice siquè effracili, sed an  
ut anas quos geniculis habeat, explorandum.

Foliositatem huius Dracunculi, aliorum atque ipsius An simili est, sed tamen minor potestatis siquè effracili videtur.

De Anarion.

CAP. VIII.

**D**YPLEX Anarion est: vitiis lanfolium, aliorum angustioris folii: ut nostris posterice  
viti obtineant.

Latifolium Anarion folio est hederaceo, lato & acuminato, sed maiore quàm An in po-  
tentialibus eius terris & ex eis est: vitiis siquè innotuit parentis: pilulis eius quæ, in  
tugo perparalegna vitiis mte rubet: acini in rub. radice candida, forma An, sed minor.

Secundo Anarion quina, sine pluvio sine oblonga & angusta folia, lanis quosq, ac ipen-  
dant: vitiis siquè innotuit angustam & oblongam pilulas, qui ex eo prodi, acini de  
longe, vitiis crassior modo, in purpura situl cum parte vagitor innotuit nigricans, ad  
quæ vitiis inferos vitiis terra superficiali, ac si fundo profundius, aliquos perparale-  
gna eius quæ vitiis conformantur, vitiis vitiis vitiis, dem rubentes, folio globofo  
& candido, velut prout.

Perparalegna vitiis quæ Belgis ac Germania, sed primam in Italia ac praesertim Tuscis  
quibusdam locis aliorum in circa Romam, ac in Dalmatia, Almo Angustiora tesse, vitiis.

Flora & fructus vitiis quæ eodem quo An & Dracunculus vitiis possit perparalegna.

Anque primam huius Diacorides deperago appellat, à Plinio autem agè dicitur, lib. si-  
què xxviii. cap. xv.

*Anthurus latifolium.**Anthurus angustifolium.*

Est & *Ara*, ut, quæ in Ægypto nascitur, similis *Ara*, minor tantum, minoribus foliis, & vixit radice, quæ tamen oleæ magnitudinem implet. Aliam *Anthurum* species res existunt. Est etiam *Anthurus* species, foris, fructus, radicarij forma & quantitate.

Ac potentia ac facultate *Anthurum* *Ara* simile est, necnon tamen, ut Galenus ait. Nam imposita radix (sicut) fitne ex ea colligita ad fistulas efficacia, coarctatque eadem generatim utamur minus imposita, sicut *Dioscorides*.

De *Biliveta*.

## CAP. IX.

**F**OLIUM Biliveta in longis foliis pediculis prostratis oblonga, lina & acuminata, Lapidei milia, venis venosa, & lapidei quidem vicia, infusus vero in casis colore cibus: inter que medi) exant casita, pede alioque, rotunda, in venibus aliquot folia composita, spicam sub quo exigitur stictula: de latere rebote purpurascens, lectum in quibus in mangalana, spidenna, veluti *Orakda* radix fabell' crassa, oblongior, geminata, nunquam rotunda, malis fibres capillata, foris nigra, intus vero pulpâ non tamen biliveta, gustu acidissima.

Fichitas duas huius species facit: nam foliis rugosioribus, aliam tenuioribus: de his magis in se composita, aliam vero maiore & minus composita, in situ quoque fibrosa.

Reperitur Biliveta locis humidioribus, in opaci sylvis, pingui ac luto solo. Marchalis montibus ante refert. Adest etiam certum felaciorum hortis. potentia radice minor.

Maso ac Junio floret spicam vigenti: foris postea manet.

Ab unguento & consuetum radicibus nomen Biliveta habet. Germani *Wasserpflanz* sive *Wasserpflanz* Gallis *Wasser*: Bohemi *Hyab* foris appellant. Colubrina & Serpentina Germanice voco etiam dicunt: & à quibusdam *Dracunculis*. Sed à *Dioscoridis* *Dracuncus* nomen dicitur. *Phasaronum* autem *Dracunculorum* aliqua fortasse species est. *Phasaronum* lib. xx in cap. xvi. ad quod *Græci* *Dracuncus* vocant, in plus sibi effigie demonstrat: foris foliis. *Ecce*, ut sine thymis, flore purpureo: alios radice longa, signata, articulisque fistulis: versum de monstratorem facile folio maiore quam *Coccyus*, radice in radice deinde infra, lib. xxv. cap. 11. in agro hospitis reperitur aut, *Dracunculium* appellatum, ut pollicem crassitudine, verticillibus viperarum maculis, quæ ferrebat scorta: aut maris esse compositum.



Atque prima horum Draconis locum Arty  
 as dicitur esse Plinio, similia est. Ferri aqua eadem  
 esse patet utriusque Plinii. Postquam Draconem  
 manu Draconida esse videtur. & Plinius hunc  
 à reliquis tribus differrentem esse ostendit. Alii  
 est, quae lib. xiv. cap. 12. quae non in prore vo-  
 luntate eandem naturam demonstrat, hinc illa  
 figura. Superest secunda Draconis, quae si idem  
 est curio, cui cap. xvi. lib. xxi. i. statim notum,  
 radicem modo esse fibrosam. & draconis con-  
 sistentiam modo, multam cum Bistorta convenit.  
 Nam Bistorta radix in terra & concolor est, ac  
 colore, quae fibrositas dicitur hinc. Est eadem  
 & veluti generis articulata, ut scilicet Dracon-  
 id quod consuetudinem de his speciem super.

Sententiam ex recentioribus, qui Bistortam  
 omnino aliam esse volunt. Martialis sequi-  
 dem in epistolis medicamentibus Behen rubrum  
 esse scribit. Gelertus ad Limonium refert. alii  
 placet Britannicam esse.

Sed Behen iam rubrum quae albam (du-  
 plex etiam est) radicem suam odorata, potius  
 calida, ad venena facientes ut Auroreus & So-  
 rario memorie prodiderunt. Bistortae vero ra-  
 dix odore caret, ut in genera distinguitur, ve-  
 neris adscribitur.

Limonium autem sola habet, Draconide  
 teste, Beta tenuiora & longiora, semineque ru-  
 brum. Contra Bistortae minoris densiorque sunt  
 folia, & semen Oxalida.

Britannicam vero folio est Lappula nigrae & hirsuta non, radice tenuis & loca, Draconide  
 & Plinio ascribitur. Bistorta latus folia, & inferna parte candidula, radiceque multo maior  
 quatuor ac herba appellanda sit. Item de Britannica succum & folia in Hyeme reposita  
 Apuleius tradit, causam addens, quod non semper apparet. At Bistorta vixit radice  
 est, Draconem autem tempore reperiri potest. Quae Bistortam & ab Arabum Behen, & à  
 Draconide Limonio, nec non à Britannica differrentem esse: sine manu scilicet ostendunt.

Articulata Bistorta frigida, & cum in siccatore valde assurgens. Radix manibus de-  
 ducaque prolixitatem figuramque supponit: alio enim sicut, vixit cum compescenti dyferentis  
 moderata, quae modo ascripta. Ternillaram, fasciam, & oris illa manu nobis succum  
 in, gurgulis sicut decocto aut sicco in usore colluto. Idem possunt folia & semen, sed ta-  
 men minus florenter.

De Bistorta. CAP. X.

**B**OLBOCASTANO folia sunt tenuia, dissecta, usque divisa, Apocynorum ac minorum,  
 Citharum potius Anethi similia: cauliculus tenuis & dolens: folia parva in umbel-  
 las condensatae: semen non magnum, oblongum, angustum quoniam Ferretus, odoratum,  
 obliquo Cyma colore nigricans: radix rotunda, cuius Rapi forma, fora nigra, & vbi in-  
 venit rugosa, intus pulpa candida, sapore inter Callitricem & Pastinacam medio.

In terra & agro normalis Zelanda ac Hollandiae Bolbocastanon reperitur: item de in  
 Graecia, Creta ac Rhodo, quae dicitur Guilandino. Fertur & in Britannia sine Anglia procurrere.  
 Nec destituit ea quoque Germania, si non fallitur. Nam radices quae ad Rhenum Mo-  
 guntiam usque hodie videntur Loracera tradit, Bolbocastanon sunt, non autem, ut ipse opi-  
 natur, Orithogali. Scribit autem has esse rotundas, Callitricem magnitudine, pullo-  
 castanon colore, intus carne candida, gurgulis erudat cocta usque in aqua edis: caulem  
 esse sagularem, venterum, ab uno radice, folia Campani, sicut in umbellis veluti Apethi,  
 quae Bolbocastanon esse iam diximus.

Viget Bolbocastanon florae lenis: semen postea ad perfectionem venit.  
 Mémoré Bolbocastanon Alexander Trallianus lib. vi. in materia, quae perniciosa velis sunt,  
 omnia spem refert. Garreticus ditionem exstimulans corruptam, legendum esse esse  
 Bolbocastanon: sed tamen peregrina haec vox est, quam Bolbocastanon.

*Bolbecastium.*



*Bolbecastium* autem à forma bulbæ & spore colligitur vocatur, & utitur solum. Nostro tempore plerumque abgignitur nuncupatur: Etiam *Cypripedium* Germani *Alpenrotel* Suedi *Fasces* Angli *Agrostis*.

Est autem *Bolbecastium* radix moderatissima & sicca, firmul & collustrigens, sanctorum celibatus & fecundis. Edicit alia cruda, sed in decocto sanguinem spumens & magnitudo vultu.

Semen aperienti vi præditum, & *Asper* esse videtur.

*De Cerasuo, & primis de maiore.*

CAP. XL

**D**VPLEX *Cerasium*, Dicois u-dicoe, *Maie* & *Minor*, que & forma, & respectu colore multum à se invicem distat.

*Maie* sive *magnum Cerasium* cetero de rotundo, terreo, durescit aereis colorum: tota oblonga, in plures quasi partes divisa, saglante foliis: propter quod confusa, sed ambire crenata flor. & capitulum ab-  
muni. in duto carulo pappi rotam, & in-  
maltum fallaga & caput in crenata spum-  
si, nonnulla aliquantulum rubra sunt, in quibus  
vix cum lanolis pappi comra oblonga, glab,  
spicidantia, radix habet longa, carnosa, & est  
fragilis, forte nigricans, aereis rubefactis, sive

*Cerasium magnum.*



*Cerasium magnum album.*







Centaurium minus.



Loca sunt herbosa, tunc non profusa, di-  
quantiorem, sed tamen non arripio, riva. Et  
non modo in Italia provenit, verum & in Ger-  
mania et Belgio abinde frequens.

Italia & Anglia vix cum floribus ac siliis  
legitur.

Itud genus Græci *καταύρα*, single appellat  
item & *Αυραία* quæ *Αυραία*, quod videlicet in  
caulis profusa nascitur. Plurimè Labradore ab in-  
dica occasione (si integra lectio est) ac populi  
firmamam agrorum radice, Fel octo dies abita.  
Appellatur etiam, ut inter spicas vocis apertis,  
*Παυροβόλον*, *Αυραία*, *Αυραία*, *Αυραία*, *Αυραία*,  
*Αυραία*, & *Μαλινδα*.

Theophrastus & Plinius, ut superius capite  
ostendimus, inter Panacea genera reponunt, in-  
ter quæ Panacea est *Αυραία*, ad eam, am-  
bulam, lecti in Hetruria. *Αυραία* : Hispana Ca-  
ntaria: Germana *Καταύρα* *Αυραία* *Αυραία* *Αυραία*  
& *Αυραία*: Galii *Ραυραία* *Αυραία* appi-  
latur: Bohemæ *Γενεσθία*.

Habent autem huius Centaurij caulis si-  
periores folia floresque vinocorum quibusda  
amant, & temperatam calidam & siccam  
pedare secundo. Hepatis & felis, nec non hinc  
ab inflammatione ad colla in aqua & potu apertis  
repto modo medicantur, diutius ac propter  
se hinc ab inflammatione: venter tunc & hinc

intermittunt: in summa abstergunt, expurgant, crassum humorem attenuant, & quod-  
quid amara possunt, insigniter praestant.

Dioscorides, ac post eum Galenus, item & crassa per aliam ducunt, si hinc ad spem  
di Centaurij minoris decoctum referunt. Nos autem tunc est frequenter ac flos herborum,  
per suam tamen expurgationem illam facere, observare non possumus. Quamobrem  
hinc hinc Centaurium minus commendare aut expurganda alia, vix ac potius illi  
crassum.

Reperitur vix hac facultate in ea herba, quam vulgò Italia *Stacca* *Canada* vocant, si  
tiam. Quæ amantudine Centaurium minus non exat, atque eius species quaedam sunt,  
ac non modo per inferiorem veniunt, sed & varietate crassa & hinc educta. Per am  
potest, ut vires venaque inter se confusa sint, & defensionem permittit ad quod in  
Dioscoridis verba quodam modo apparet.

Centaurium siquidem, scribit, minus herba est Oregani aut Hyperici similia, folia  
prolonga & parva. At Centaurij nostri minoris folia non prolonga, sed secundo modum  
longiora, veluti Hyperici sunt, Graculis vix oblongiora sunt, & ad Polygona accedunt  
quod foliis Rute longioribus delectantur.

Faciunt quod Helleborus vires inter spicas Centaurij minoris appellationes legitur.  
Centaurium siquidem minus nequaquam, sed Graculis hinc opuntia consuetudo: vix per  
Helleborum sine modo, per superius expurgat, ut exp. de Graculis herba, suo loco.

Glutinat item alud Centauriam etiam vulnere necesse vocantque: vix ac in  
vires vix expurgat & ad eccitorem producit. Succus ad oculorum medicamentum  
est: cum melle expurgat, que clariorum officiant. In pesto ad morbum fixum & hinc  
educta. Potus autem prius nentorum affectionibus consuetudo, ac hoc Dioscoridis.

Optimum, inquit Galenus, succus etiam medicamentum ad incisionem obstruenda  
tenda, bonumque hinc ad usum remedium sicut in potu vix & hinc, si quo hinc  
sistunt.

Succi item colligendi extrahendisque rationem, & liber ad Popam docet, & Dioscoridis  
debeat ostendit.

De *Cyclanthe orbiculari.*

CAP. XIII.

*Cyclanthe orbicularis.*

*Cyclanthe orbicularis coronatifolia.*



**P**LAETA *Cyclanthe* se vicinis floribus suis admodum in circumvolucrum, quae ab  
 anti Diocorides cognoscitur, hinc autem orbiculari est radice, à recessibus aliis et  
 oblongis species, quae quidem foliis differunt.

Haec prima *Cyclanthe* foliis vixit lata, angulosa ac hederis similibus, ambros leuor 2.  
 ferat, superius parte in virene nigrescentibus, ab hinc autem tantum maculis variegata, & vire-  
 bilibus modo totum foliis, in virene virene pro parte purpurea, & subinde colore  
 ferat, aliis diluere: floribus ex tenella pendunt pediculis, deorsum in unum, foliis co-  
 ram latum reflexis, & purpureo. Vixit nigra colore, non tamen in virene, spina dent, odore  
 cuius ferocissimum capitulis ferantur, in ipso pediculis contractis. In virene autem modo  
 in odore ornata & aliquando tum in latum ducunt pressis, fons nigra, non candida,  
 vix in virene contracta.

Alterius et secunde *Cyclanthe* & lata quidem ferat, sed nequaquam angulosa, vixit quasi 2.  
 rotunda, & in virene superius autem in virene oblongissima apparetibus maculis, ferat colore  
 vixit, in virene vixit est purpurea purpurea rubent: ferat pinnis similes, & odoratissima  
 vixit aliquando minor.

Tertius species foliis similes est: latum angulosa: sed ambros eorum aliquando in virene 3.  
 in virene hinc hinc, sed in virene nigra: ferat in virene colore purpurea, odore fer-  
 oissimum vixit qualem aliam minor.

Nascitur *Cyclanthe* in locis virentibus sub arboribus & in sylvis, in virene, Plinius ait. Et  
 prope idem hinc in Veromanducorum, Verocellorum, ac Apolloniensis ferat, altera in An-  
 tiana (sylva, ac vicinis locis apud Belgas reperitur. Sicut Italia, Germaniae ac aliis regionibus  
 locum ferat. Tertius minor est, sed tamen Italia non reperitur.

Separatim ferat in virene *Cyclanthe* ferat: foliis in virene succedunt, Hyeme virentia. fer-  
 ta habet virene. ferat in virene ad in virene peruenit.

Radicibus Graeci appellant dicitur & in virene, virene, virene, virene, virene, virene, virene, virene,  
 in virene virene, et in virene virene, non Tuberculum & Tunc virene, à Marcello  
 Orbiculari ab Apollonia similes Orbiculari & Palata, Rapum porcina, Terry in virene  
 in Orb-

in Officina Cyclamen, Panis pocrinas, Arthasita. Itali Pan perone: Hispani coccolit. Itaq; de perone Germani *Echacintheus affinis*: Belgae *Stortans kyon*, *Stortans kyon*: Galli Pan & perone: Angli *Botanite*.

*Cyclamen*  
*rotundifolium*

Colorem bene Plurimū Colocostam appellat. Flos eius, inquit, Colocostam in cornu d. munitur.

Vanasentem Cyclaminum, auctore Galeno, virei obtinet. Nam & exergit, & collit, & ora venarum aperit, & atrahit, & diluit.

Succus eius huiusmodi aperit, & ad scissam proteocat in foccus appositus. modo mentis phrenas, serenos, atque d'uracis d'egreantibus admiscitur. suffulsi cum melis. rascocompit, ad huc quoque per nares exergit. abdomen illud ventre in subducit, & intumescit: est & validum interne nō concipit medicamentum in pesto addit.

Tota radix succo unice illuc est, quaequam & ipsa vehemens sit. Nam & inchoat & pota siue apposta coact, & rego morbo pcedit, nō modō viciat purgata, sed etiam in toto corpore huius facit, eam per faciem & vicia. Ceterum exergit, cum in oleo, nunquid alopecurā, epichidā, omniūque cicutinoma curet. Luracm quoque m'duram in oleo apposa, cum rocam, cum arida. Sunt qui radicem siccam afflictae colobocant.

Tradunt ut perone hae: Dioscorides refert si proguant radicem manijodant, d'uram fieri. Illi bina & in vino contra lethalia, & praesertim leporum transmitti, & contra leporum vltus in angusta remedia est: in omni vino ebrietatem facit. Decoctio eius luxura, podagripnionemque vtiliter fouent. Cetera radix oleo caplota, & omen seruanti inposita, alio core Tyberimae modum, ut frugmentum huius vagueturum, p'ensentibus vtilissimū. Namque & ad philita amonem affluens constata, & in philibus efformata.

De Cypro.

C A P. XIII.

Cyperus rotundus.

Cyperus longus.



**CYPERI** generatio sunt longioribus caulis, etiam, alium rotundioribus, & per totam quidem Diodesiam appellatam. Indicus Cyperus inter amantur huiusmodi aliter rotundus.

Varij autem Cyperi, cum rotundioribus quam longioribus caulis, falsi sunt longi, quibus

Pseudocyperus



arundinacea, Pennsylvanica longiora, densiora, docto-  
 commenta culcitara: caulis rectus, crassus,  
 glaber, in angulata, ramificat quadrangulus, in  
 cicutamine caulis foliola minus, et in laeva, la-  
 xiora, paniculatae quae dependunt in forma can-  
 gasa reconderent, radices, trias prolongae, pen-  
 nularia, Graminis modo superent, hinc se  
 implicat, sicut e panice colores u graminea, in-  
 teriore verò carne in sublimo alboscenti, odor  
 suavi gustu subamaro: altitudo verò pedosa  
 sunt, è fibres aliquot cohaerentes, oblongan-  
 tes Ovis, et non raro rotundioribus similes,  
 odore et colore paucis. Sunt huius folia maro-  
 ra, et caules paulò breviores: illa verò maro-  
 ra folia, et caules atroces.

Amar Cyperus palustris loca ac nigra. In  
 Italia loca quibusdam sponse nascitur & in o-  
 lio quoque calidioribus Medietum versantem  
 gentibus, vbi in Syria, vbi et odorator ac pro-  
 ducant. In Germania tam superent, quàm  
 hac nostra infestare, non nisi sicut ciperus, et  
 quilibet peritiam: non invidiosum peritiam est.

Sed Pseudocyperus Graminis species, foliis  
 Cypero et ruba similia, radice verò candida, in-  
 tua, longa, gemculata, omni odore et sapore,  
 exceptis herbacis, destituta, locis palustribus  
 in Belgia sans frequenter occurrat.

Eminent Cyperus subae lunae, Galio & Au-  
 gusto.

Graeci modò *αίμας*, modò *αίμας* per  
 duplithogem appellant; Latini Cyperum &  
 Puncus hircum angulosam, et lunam

Cyperus: Gornelus Callis lunam quadratam: Puncus hircum angulosam, et lunam  
 magis. Dicitur & *Ιερώνος* quae dicitur dicitur, atque, et in Cally, Dionysij, Geoponica,  
 hinc illa Cyperus Italia Cyperi Hispania dicitur *αίμας*, & *Ιερώνος* Germanis *Wittet*  
*gägel*: vbi in Gallia *gägel* Gallis *αίμας*. Officina Cyperus nomenclaturam servare, et  
 vbi Cyperum longum, aliorum rotundum vocant.

Puncus Cyperus dicitur, sicut oblongus est, Cyperus dicitur.  
 Cyperus autem radice maxime vbi iam est Galenus ait, ex caliditate partes et colic-  
 ones cum morbis vbi inque viciis, quae per multa humiditate viciis difficult-  
 ter solvuntur, maxime proficit. habent enim quidam etiam astringens quapropter viciis  
 non inveniuntur. Quia et incidendi vici quampiam illis inesse viciis dicitur, quae &  
 calido viciis congruant, et viciis inveniuntur.

Dilectus viciis in caliditate etiam inveniunt, et ad viciis inveniuntur et ad viciis inveniuntur.

*De Dulcichama. CAP. XX.*

**DULCICHAMA** Cyperum rotundum dicitur. folia etiam cum arundinacea, oblonga,  
 dorso in centro, triangulari, Cyperum similia, caulis angulosus & ruba similia respon-  
 dent, omnia in centro hinc in centro, et in centro, à rotundis radice sicut, Angellans fieri dicitur,  
 sed tamen aliquando oblongiora, dependent globuli, vcluti exigui bulbuli, arculati,  
 vcluti exortis nascuntur, in quibus verò carne candida, sapore grano dulcis, et Castaneis  
 pro modo.

Colitur Dulcichama plerisque Italiae locis, in fluminibus. Aethiopia feritur subditosa, vtriusque  
 Alexander Beneditus. In agro Veronensi vel sponit, Mantuato vbi proventus  
 dicitur in bulbulo generis, Vero feruntur in plures multiplicanda.

Serpen ipsam noxas ante Dulcichama, et radicebus Trifolium Trigo appellat, aut  
 Tulio Cyperi species est, sed dulcis, Therophrasto, vclud apparet, non inveniunt. Libro si-  
 quidem de causa vi. Cyperum radicebus dicitur vbi, vcluti vcluti Cyperum, radicebus dicitur,  
 vcluti vcluti in fluminibus et paludibus proventus. Quod proculdubio, non de alio,  
 quia de alio, vcluti vcluti vcluti Cyperum radicebus dicitur et maxime vcluti

Delicibinum.



Delicibinum cum flor.



lesant. Non defant tamen, qui Tractu istos Arabum medicorum Habebant in suorum Zela esse constanti castum, quod tamen verum penitus constat. Nam alia ab authoribus Arabibus inter fructus sine grana cogna merant, nequaquam autem accedunt. Serapo siquidem cap. cccxxxvii. sic habet:

Habebant

Habebant gratum est pingue, Cuius magnitudine, citrimum exarctis, & abentarius, & habet bonum saporem, & dicitur ex terra Barbarie. Idem affirmat Aucupis verbis, cap. ccciiii.

Gratum Alacra quod est gratum cras est boni saporis, & oritur in partibus Hemi. In quibus, quod inter hac dicitur, palam fit.

Ceterum Tru in moderat calfaciens ac humectans sine ordine, crudelitate in harenam hominum concoctionem promouit: vnde acrimonia obducat perferri in in carnis in accenti, unde trui ac facco eorum extrahe generaturam cras adiget, & ad ventera facit ut, sicut siquidem quodammodo pinguis, audire Martialis. Vnde bellarus apud Veronensis in ferantur.

De Glycyrrhiza, seu Dulci radice Dioscorido.

CAP. XVI.

VNIUS dulcoranda Dioscoridam meminit, prout hanc tamen & aliovergie vna, de qua capite inquirere. hec de Dioscorido Glycyrrhiza.

Prout autem hanc superantibus caules complures altos & ramulos, folia circa quod longa, alata ex multo sibi inuicem oppositis collecta, Lemni foliorum figura, amantiora, videri sicut, & tactu non sicut glaucosa: illos est foliorum alio modo parum, unde omne eius cuius non sicut Hyacinthus coloris, in rotunda globuli formam contul, quibus tandem emaridat maior saltus orbiculus, rotundum asperantque Placenta phalant re videtur, in alas parum subrepta, aspera & hirsuta sicut confusa, in quibus sententia prologa, crassa, & vna est brachij tubi de longitudine ac crassitie, hanc locis emolone, fons erat aliorum, sed tamen quodammodo asperitas, guba dulcis cum asperitate qualis.

Placenta, inquit Dioscorides, in Persia & Cappadocia pinguis. Apud Belgas in hanc fabula videtur.

Flo.



*Aegalis*: Hispani *Aegalis* & *Aegalita*; Germani *Eißigle*; *Schiffmetzel*; Galli *Sigles*, & *gelyse*; nostri *Castileijana*; *fiestana*; Angli *Rana*; Bohemi *Aisener*; Theophrastus *malva pycnan*, &c. ut ait, nonnulli *hempsoniae* appellant. Plantae Scythiacam herbam, et veni-  
lissimam sine ulnrum dulcis, hinc dicit potest, effertem omnino dulcissimam, &c. quoniam aliter Scy-  
thica dicitur. Scythiacæ à Scythiarum regione in qua gignitur, nominatur. Parelli & hinc dicitur  
citra aspirationem, & dicitur propter illius membra peritiosius liquorem gustu sanctorum & hinc  
præcipue dicitur.

Carcerum autem quandoquidem hæc radix dicitur esse, temperatæ quoque calida & hinc dicitur.  
Cortex eius amaritudinem quandam tamen habet, & calidioris qualitates præcipue  
sed hinc abscedere oportet humidior autem magis necesse & succo plena radix, optima.

Valis est ad tractandam, et sic dicitur de m. respirationem, tempore cum cum san. pleuritiæ &  
gargaris paratæ, spaciacione m. phibetum, &c. ad omnes thoracis morbos, esseque valeat, infu-  
siones sedas, acrimoniam & salilaginem humorum mitigat contumacitatesque maiores  
humores concouque, & spumæ naturam faciliorem promotioni siccioris expurgat in respiratione  
alio quous modo sumpta: aut aliquando in aqua, siccioris sub lingua deserto. Diachemon  
in rebis ac vestige exaceratæ esse ferit vnae silicidæ me dicitur, ac in vna ferit in omnibus  
his occurrit, ab acerbis, salis & mordacibus humoribus exoritur.

Hæc eadem de Scythica radice Theophrastus quoque habet, qui hæc & Hippoc. Scythia  
etiam dicit referi, d dicitur videtur aut diachemon posse vocare, & quidem his verbis. *Kale*  
Scythica vniuersa ad anhelum, & ad tassim secam, atque in totum thoracis morbos ad hinc  
coribus modis potest cum mellis sim quoque contingit si concutatur esse. Quædam  
& Hippocore degere sunt Scythia dicit videtur aut diachemon.

Hippocore autem calidior est, et Hippocretes testatur, ex equino lacte concretam. Plantæ  
xxxv. cap. viii. per peram eius nominis herbam esse existimavit.

*Styracis*  
*Castanea*

DE CASTANA.

CASTANA.



*Castanea*  
*Castanea*

CAP. XVIIII.

**F**OLIA Castanea vixit late, longioribus  
uolvis, veluti Phragmites, sed minoribus  
Vernis alba similibus: scap. vero hinc  
gunt alio, simpliciter, in d. uni, manca, longi-  
culm: folia è singulis periculis bene, scap.  
immixtio: circa manibus bene, vnae  
superiorem partem ex intervallo ferunt  
in latis, è sinibus angulis foliis nudis  
instar explicatis, qui è calycibus exantibus  
ga, in quibus inde fermen lææ, hinc, tam,  
veluti Leucaj, colore subrafio ferunt  
prolixa, crassa, quandoque bifida aut tri-  
folia ac hinc colore, gustu amari sunt.

Locus pacis: umbrosis, frequens in hinc,  
Illyci, Germanici, Gallicij & Hispani-  
te Burgundiar montibus.

Flores Æstatis, hinc Autumnum esse  
perficet.

Castanea Illyncum sex in uentibus  
vna f dedit, quod & Officij ferit, Castanea  
nuncupatur. Germani *Castan* hinc  
Belge cum latis, Hispani & Galli, *castan*  
dicitur. Angli *chestnut* sunt & cuius quous  
dam nomen dicitur, quæ & apud Apuliam  
peritur, ut in uentibus dicitur, in uentibus,  
& hinc, Alot Gallicia, Basilica, Cyrenis.

Habet autem Castanea radix calidior,  
ut Diacordis ait, & iustis, ad est  
vna, (nonnulla e exemplata peritur  
vna.) Admodum efficit, auctore Galeno, illi

eum opus exennatione, purgatione, absteritione, obstructione liberatione. Nec tantum  
hinc possit, cum imperio amara sit.

Valis autem esse periturum consultis, supra, ex alto de hepate, hepate & hinc

inficitur crata arida, vclum Theriac. clariffima: quoniam Acorus Myficum appellat. Tanta hinc virtus, et Plurima, ut inficitur etiam non nullis vobis, sed & alia quoque medicinis, amittitur pota.

De Cruciana, seu Gentiana minore, atque alio quodam Gentiana  
*varietate generibus.* CAP. XII.

Cruciana seu Gentiana minor.



CY M Gentiana cognationem magnam & similitudinem acinellam habet, à ple- nisque nuncupata Cruciana. Caules eius rotundi sunt, generatim distich, rari, glandulosi, vel aliovece folia rad. subis proxima, cum que cruce caules geminata, Gentiana similia, verum minores, crebroque densius reticula: flores caerulei, oblongi, intus casti, caulis calearum falgis orbicularum ambunt, ab herbaceis calycibus exsertentes. sedis candida, retes, & oblonga, subinde foraminosa, & plerumque inter lapides sub terra siccitate deticendens, gustu amarissima.

In collibus & montibus, necnon in aliis locis & asperis locis reperitur, & in Germania quidem frequenter.

Septembris in Germania agris, Julio mensis in Belgis hinc flores.

Germani *Wittigheim* spongia, & *antyp* vultus Linné Crucianam appellant. Germani speciem esse, & fortis & facilius ostendit, Gentiana nuncupata idcirco nuncupari poterit. Nam & alia est Cruciana, & cunctis foliis, de qua inter Rubus affines gerendum. Sane verò de qua hic Chelidonium dicitur velum sed Polemonia à Cappadocibus Chelidonium appellatur, auctor Dioscorides. Quoniam Polemonia a utin ali Gentiana minoris speciem similitudinis habet nihil.

Hinc speciei & aliam Gentiana ac Tragis perhibent: folia Plurimamque sine Aclipsis. ad hanc usque in confinis & eleganter carulis, extrema Aclipsis videntur: radice multiplex, vehementer amara, qua locis montanis apud Helonios, & alia in Germania sic cas simitappam, ac *Ustrinas* & *Ustrinas* appellatur à vulgo.

Gentiana quoque speciem est Campanula Annumata, quam Martialis in posterio- bus commentariis Petrius botanicum vocat: de qua nos Pentadiaz aliquid lib. 1. scripsimus.

Caeterum omnes hae amarae & foas & radicibus sunt, temperant calidam & siccam obtinent. Exhauriunt, & praesertim Cruciana, ad omnia adque Gentiana vultus: praestant autem quatuorque amara possunt.

De Helonia seu Iulia. CAP. XIII.

GRANDIA hinc à radice folia promit Heleniam, palmum aut: semipedem lata, cubi- tum subinde longi, acuminata, Symphyta maiora sunt coarctata, sed mollia, tenuisque linguaque pilosa, in vertice candidissima, & infimare parte albidiora, ambigua leniter cremito: quibus trichotomis, digno calidior, non alioque larugae, in cacumine distans in singulis verò alioque hinc magis, hinc, rotundi, quorum non modo circum ambentia oblonga foliola, verum & rotunda latera est dicitur in fine orbis, qui infimare sunt in hinc confectus, tunc de hinc in traxit hinc pappos, quibus semen subest gracile & oblongum, sedis inaequalis, rotunda, casta & traxit impleta, sed longa, fortis quatuorque nigricans, inas candida & casta, odoris, gustu amarissima.

In pagibus & latis montibus reperitur quatuorque & in montibus, locis umbrosis, at non tam in montibus frequenter non modo apud Belgas, verum & alibi, ut in Italia, Gallia, Germania, &c.

Flores hinc ac Julio sperit radices Annumata, & non modo Apelli & Maso in hinc in legibus. Quod





Polygonatum



Polygonatum album.



condantes, foliis in membris ab unoquoque, etiam folij fino sine anthera, hinc aut tunc dependent: fructus rotundi Octo in magnitudine, nigricante colore, in aere vieni, radix oblonga, pectada, floq; perennis vel in articulis nodosa, digitalis crassitudine, basi quoque quam recte dicunt, sed per transuersum obliqua progrediat.

In sylvis, locis umbratis & iuxta margines nascitur, nec modo in montosis, sed & in planis. In omni hinc & alia species, foliis e quibus exortu quateris quinque oblongis, acuminatis, quibus quibus prout singulis floribus, laetibus & venosis floribus in vitro albianibus basi tuberosa: radice il multo caudata, nodo sa, obliqua, tenuibus floribus capillaris.

In odori & sapore umbratis locis, vel in Bohemiae ac Monasterii silis sylvis, reperitur. Maxime tunc vni usque flores, Angulo fructus colligi possunt.

Græci *Πολύγονον* Latini similiter Polygonatum, Officina Sigillum Solomonis Germani *Wesphal. Gall. Rose de Salomon* Hæretici Prætrellam & Prætrellam: alij genericam aut generatam vocant. Ioannes Manardus Arabum Secacal existimat, sed veritatem minus assequitur.

Secacal etiam in nova Hispania, & Arabum insentum. Scarpio siquidem in eius descriptione nullius Generis, nec etiam aliorum auctoritas testamento existit, qui alia solent singula ad suos addere, & vniuersam quidem referre.

At Polygonati radices multas sunt facultates, cum quibus habere, Galenus ait. Hæbet enim, inquit, ad fructum pariter & acris tunc quædam, nec non fistulosam quendam immunditatem explicatam diffidentem: quæmodum nec admodum sunt vis.

Diffrondes radices crasse vulneribus auxiliari impostam, & veluti maculas delere ac ferre. Martialis & Polygonati radices quoque tunc tunc vniuersa, quæ ad faciem oblongandam radices itale videntur.

De Pyrethro.

CAP. XXXII

**PYRETHRUM** folia sunt multipliciter defecta diuisaque, similitudine fieri foliorum Fæniculi, sed tamen minoræ, Duci sylvæstris & Carosæ æmula est: scilicet dodrantalis, aut proli ab orientem quorundam sanguis hoc amplius, latus, Anthemidis similis, sed tamen maior, medio cetero sublatum, angulis oblongis: faciem tamen in tubis foliolo, superius parte albi-



*Folia* *Tragion* Germani nonnulli *planta* noncupant. Germani *Tragionem*: Hispani *Rayo* *Rado* nostri *Radix* *Tragion*. haud quaquam à *Rhodo* infusa, sed à *Rhodo* nomen accipit, quoniam odore utriusque.

Cum enim visibilis herba est, auctore Dioscoride, capitis doloribus, si madefacta frosis & temperatam modico rosario imponatur.

Galenus tamen in eam esse parvam, digestisque facultatem, & in calcificatione sectandi adhibendum esse: ait utrumque imperitum.

Ac robor refrigerans, & Rosi uti odore, ita & temperatara affinis videtur, & ad orbesca-  
pionem eadem dicitur dolorum efficax esse posse.

De *Frasinella*.

*Frasinella*.



CAP. XXXIIII.

**F**RASINETUM complures esse autem cul-  
ta, rotundi, cubitales aut ad duos, inferius foli-  
is, superius vero floribus stipata mucronis digestis  
essentia - folia oblonga ex pteribus ad vnam pe-  
diculam vltra, Glycyrrhizae similia, molliora quam  
Frasini minora, singularia tamen eorum in beu-  
sa, danora, magisque acuminata, quam Glycyrr-  
rhizae: florum color dilute est ruberum perpetuum,  
quasi vel lybastrum Maluae: sed forma dissimilis  
à quibus ceterum ut plurimum florum obliquae  
superioribus foliis, statim aliquot accurata  
herbae instar dependunt. Odor horum grauis est,  
ac hancnam odor, & similitudo eorum quae sequi  
sunt siliquarum. Secordant autem singulis flori-  
bus quinque similes, albescentes, & subben-  
nes, in quibus semen pingue rotundum, & graue,  
splendens, minus quam Pisonis aut etiam Lenti-  
ci, radice ab uno capite plures dimittuntur long-  
ge candidae, camolite, etiam in medio nervo, cum  
obscura aereolae sitiquarum amarae.

Videntur autem huius duae esse species, non  
tamen valde differentes. Vnus folia molliora, vi-  
rensiora, duriora, magisque acuminata: alterius  
vero nigriora, minus dura, ac non itaque acuta-  
men distinctum: flores quoque huius aliquanto  
dilatatiore: illius vero paulo subcondensior.

In Italia ac Germania montibus ac collibus,  
heroso ac saxoso reperitur: locus apud Belgas hor-  
rentis est.

Flores lunari semine ferius procreant.

Recentiori *Frasinella* non plerumque quae quae  
causa quae quasi huiusmodi *Frasinetum* appellant: Offi-  
cine *Dipsacum*, & pro legitimo *Dipsacum*, radicibus huius subinde transcurvatis: & à non-  
nullis *Frasinella* dicitur & *Dipsacum* album nominatur. Non esse autem legitimum  
*Dipsacum*, non modo est, quod in his verbis refellitur: sed etiam in *Phlegma* dicitur non quod  
*Dipsacum* nequaquam est, non minus manifestum. Sed id est *Trago* veterum speciem,  
non aquae expositae videtur. Nam cum *Trago*, & quaedam parte, conuenire posse apparet.

Habet autem studium *Tragion* (duo quidem sunt) auctore Dioscoride, folia, vixit *Tragion*  
& fructus *Lentici* similia, sed minus omnia, & succum sibi parum similem: & in *Cera*  
tatis nascitur. Idem *Plinius* lib. xxviii cap. xxi. *Tragion* duo *Tragion*, ut noster in  
*Cera* tantum in insula maritima, *Lentico* (exemplaria perpetuae *Lentico* habent) similes,  
*Rhodo*, & folio, & ramis: succus eius lacteus in gutturi spissatus, vel semen, in positione  
spiculae corpore erant.

Et *Frasinella* quidem *Lentico* non minus quam *Glycyrrhiza* solo refert, & odorem  
regis, id est, huius speciei. Quae huius cum *Trago* similitudo dicitur quae dicitur ostendit.

Sed nomen quae fructus non est, non hanc quae *Lentico*, sed illi quae ferat, ad nos  
intulit: ad hanc neque huiusmodi fundat, haud quaquam *Tragion*, sed aliam, atque ab  
indifferenter *Tragion* esse consequitur, quam verissime est veterum non observasse, vel in  
talis rite, aut saltem negligenter habuisse. Facit hanc quod *Bellicus* libro primo *Singula*-  
num

*Tragion*  
*Frasinetum*

*Tragion*  
*Frasinetum*

hu morferat. Triqum in Coena arua floru a nali, & flore effo luroo. Nam Procella mo-  
 teramat, & flore tubet. Ex quibus Fraxinella cum Triqo dicitur fita apparet.

Ar Fraxinelle roba excolit & reficcat ordire. Secundo, digeretur, attenuata, & pu-  
 nentitell facultata. Merito & vnaa moiet: parua ad uuaa ficu ruda ad uuaa vren frigido.  
 ribus morbu aua hantell confere & flomachicis & artheloll feruat. Tradunt etiam ad  
 uerbu illa a merfu que feruuta, lerbata medicamenta, & pelticant am morbuera contaga  
 prodelle, anado nalya vltioer permafco.

De Valeriana.

C A P. XXV.

Valeriana horrenſis.



Valeriana ſylueſtris.



**V**ALERIANA ita genera paſſim occurrunt. Vnam horrenſe: ſylueſtris duo ſep-  
 tantur verò & alie quædam, ſed nomine, non effige reliqua ſimilia, utque la-  
 beam cognominant: & quam Cæceam.

1. Sarsa ſive horrenſis Valeriana, prima folia eorum oblonga, lata, leuia, virenda, rorpe ſe-  
 uilla, que verò ſecundum cau les maora longiora, utraque profundius laciniata, Elapto-  
 ſis ſive Pulſatilla maora foliorum amula, ſed tamen tranſoni: caula cubito alio, leuè  
 conuexa & intervallo ſuperius aruolatus & emarginatus lura exant folia, & ſtili-  
 go flores in umbellis acceſſari, paru, ab oblongitate & impulſione exigo velut obli-  
 pandentes, Nactilli quædam effige in aliquamoni experimentes, ſed tamen multò maora  
 & magnitudine ipſa plurimam codentes, colore e rubenore delura purpurea albicans ut  
 dig radu caſſitudo ras, obliqua, ſloris malis ſaruae terre adharret, plurima parte maora  
 que dum reficcat, pinguis ac oleoſa efficitur, & oleore eſt ſuauiore quàm terra.
2. Sylueſtris que maior, folia cum prioribus, tam in quæ et ræcaul culca, eſt diuè ſe-  
 cinſis, maoribus & nigra antonibus quon ſarua: caula haurat lra quoque, roro & p-  
 tucalare, cubitoque pteonore flores in umbella ſimilia, & diluſi purpurea rubenore  
 & vebat maora capillarems ſibole, odore non emaro delitate.
3. Altera ſylueſtris forma horrenſem laris refert, ſed longè minor eſt. prima caula ob-  
 uilla, reliqua in porre ac lacinas diſſecta: caſſiculus dodranche: flores in umbella dant  
 ſimilia ex lura purpurea albicans, radices tenues, obliqua, rorpenca, & terra ab ſilueſ-  
 tare, odore citigra.



Valeriana rubra.



Valeriana rubra foliis pro Limonia.



Valeriana Græca.



Limonium.

popularissimus vir. & in nostris sibi etiam simpliciter versatissimus. Jacobus Antonii Genuas Puerus Patavus: Erysipodentibus Limoni descriptiose potentes. Sed Valeriana rubra non æque non modò quòd foliis sic longè quàm Betam rora, vètam possidet, quòd firmè eam raro perferat, & hoc ipse nequaquam rubeat. Nam Limoni foliis Betæ similia, tenuiora rariè & majora vèla tenuis, totius, referat firmè rubens, & Diostorides refert.

Ceterum quòd ad facultates vèla, quòd hanc compertis habet, vèla eam vnaq; vni cù medicis refrigerantissimis.

De Valeriana Græca. CAP. XXIII

**G**RÆCA Valeriana originalis tri angustior promit stilos, conuocæ, emittens & cubitalis: foliis circumscribis compribus oblongis, alatis, et alius aliter, nec intercutitur nervis, compositis. Vixit sibi conformibus, sed tamen vèla vèla quòd singula parua sicut, latècula, oblonga, imitara, do riosque al quatuor emittit: hinc nequaquam in vèla, nequaquam in foliorum, sed in fastigis cardiacis quòd prodeunt, pulchra, colore caruleo, sed duntaxat pendente, ex quoque foliola, sicut duntaxat quot erigunt & candida in medio, quòd

capitis sublates dependere: & quantur caputula parva, in quibus fermen minorem, pro-  
 duces in ovis terris illinc: sunt folia.

Natquam huc spontanea Belgio est, sed atrunde illinc.

Florans astante parte flore.

Valerianam, et dicitur, Grecam, & Valerianam perpernam, necnon Plicado-  
 phu vocari, tamen nullam eam Valeriana similitudine in habent.

Nullam est vicia, nisi quod humorum exomet margines.

De Rubia.

CAP. XXVIII.

**R**UBIA quidem proprie species nulli sunt  
 Sed si omnes illi solus similes, ad eam refer-  
 rantur, multae occurrunt, ut Apurinae, Madaga,  
 Gallinae, Asperula, Cruxata, quae omnes solus  
 Rubiam referunt, & ad eam lyctelites eius spe-  
 cies videntur.

Ramulis autem Rubia est quadrangula-  
 bus, gemsculata, aspera, crassioribus, maiori-  
 busque quam Apurinae foliis angustis, oblongis,  
 asperis quoque in singulis gemsculis quae inque ferri,  
 in nodis hinc illi modo dispositis flores in diam-  
 etra ramulis parvis, duntaxat lateri: fermen rosidam,  
 purpuram, in toto virens, inde rubens, postea ru-  
 grum, radices praelongae, tenui modo nervo,  
 cortice vero carnositate ac tuberculo, quo cum  
 liquor, tum de alia, rubro tinctur color.

Sentur Rubia non pauci Indae, Hispaniae &  
 Galliae, plantam enim Belgii loca, nec non apud  
 Quados, quos Silesios vocant, pauperi facun-  
 dicque solo. Dioscorides quendam huc spontis  
 esse tradit: aliorum vero in Thibetia Galliae, &  
 Rutenia Italiae, necnon in Caria inter Oleas  
 sunt.

Valerius Cordus Rubiam etiam in Germania  
 Sibiriae spontaneam in sepias Italiae re-  
 fert, hinc per omnia simulam, maiore tamen  
 radice.

Alitae florae fermen hoc facit. Maio se-  
 cundo radices leguntur, quae siccatas & atrare, in  
 vici & inchoant & medicinae videntur.



Garricophyllae & polidiorae, ut quibusdam placet, appellatur: Latras Rubia & Ru-  
 bia: Officinalis Rubia triolitorum. Paulus Aeginae & Dioscori quoque nuncupant refert, lib. 11.  
 cap. 11. dicitur, et non alibi reperitur in alio loco. Eadem in eodem loco  
 dicitur etiam cognoscitur. Est tamen & alia Theophrasti feralacea, à Rubia multum differens:  
 alud autem Esculapionem ( si mendo exemplum carnis) quod à Theophrasto lib. 1. s. de-  
 scribitur.

Esculapionem folium, inquit, habet simile auro, id est, Hederæ, venustatem occu-  
 pationis hanc velut Gramen, & loca amat umbrosa. Radicem vero hanc similiter tu-  
 berculam, eodem lib. & vici, etiam scriptum reliquit.

Sunt praeterea quibus Rubiae dicitur, alia varietate, à rubicundo color: Ma-  
 cedoniae quoque in parte etiam Polygonon appellatur. Idem tamen Mellefolium, Sanguisalem  
 & Viterbiam Polygonon quoque facit. Dicitur autem Rubia Italia quidem in Italiae & Italiae  
 Hispaniae Italiae, Ruteniae, & Graeciae: Galliae Germaniae: Germaniae: nostrasque Italiae: Angliae  
 Italiae: & vici occurrunt sine radice, Belgii & Italiae apparet.

Rubia autem radices, quantum quidem, cum in medicina, tum in velle est vicia, ut po-  
 tuerunt: vici hanc obtinet adstringentem obtinent, ut quoque natura ac temperamento  
 frigida sunt ac sicca: partes in vici nonnullas tenues habent, quarum potentia color eorum  
 facit permitti: adeo ut & vicia affluentium ab his tingatur. Galliae siquidem acerbam  
 saporis referunt, cum ex quo tamen quodam dulcedine praeo occurrunt, quia acerbis &  
 adstringentis non excipit qualitas. Quod non modò à nobis, sed & ab Auisentis Arabum

Emollio  
 non Thero  
 pingu.



Medicorum Principe observatum, qui cap. LVIII. Rubra radiceum pomici esse saporis  
partem reliquit.

Commendatur verò passim Rubrae radicem decoctam, iuncta, casti, vitellana, et de  
pempitans, sanguis flores repemere, inflammationes intergeas, offensas qualescunq;  
partium ad lenitatem perducere credunt. Mitterentur hinc crassissimioribus, quae valentem  
recoctores appellatur. In quibus tantum earum vim ac efficaciam, & Mithridatis quoq; illi  
refert, ut etiam thoracis & trachealem lenthia vulnere haec curari posse sperent.

Accedit nobis sententia experientiarum ac clarissimus olim Lovanii medicus Ioannes Sp  
ringus, qui in Rapsodus suasententiam reliquit, Rubrae decoctam cum T ribus magis  
beliquis valere ad huiusmodi menstruum, hancmodi, & dispensantem adque in  
dantibus experimentis constipertam. quod Rubram adstringentem esse facultate confirmat.

In eadem sententia esse videtur de Hinc lutea (vulgò Trogula) qui in compositione alim  
sua adhibent hanc permixtam. Si enim Rubram colorem aliter, eodem qualem Dioscoridiam  
perhibet, hanc quocumq; medicamentis ad quoslibet ab eorum adhibendum fuerit.

Dioscorides liquida Rubrae radicem vitellanae ac casti crassissimam, & nonnullam spon  
giem duodecim modis & casti ei aperendi vim adesse, ut apponit eundem in effis, secundum  
tas extrahat. Pessillissimum eam vitre interitus tubi, sicut Rubrae mox confectam, quae  
aperitio sanguine esse existimant, qui tamen non aliunde est, quam ab ipsa colore Rubrae.

Radix etenim hanc quous modo usum per, mox vitra rubescendo infusa coloris, ob hanc  
ac Rhubarbati eandem nigra, hanc, substantiam interam eius non permixta, nec casti, quon  
iam fuerat, red densum in scilicet, qui integra sanitate fruuntur. Quod non aperte, sed  
adstringentis quoq; facultatem participem esse, non minus equalem Rhubarbati, eius com  
plant. Propter adstringenti liquidam ipsius potentiam, colorum scilicet hancmodi aliquando  
Adstringentibus eius permixtam colore, duntaxat colorum hanc, nec ita cito emadent.

Prohibendum non est, qui ex florum herbarumq; hancmodi colores colligant, alium enim vi  
dum ipsi permixtam, quoniam longius tempore coloris species, alioqui cito peritura, mox  
confecta an possit. Ex hancmodi sententia, aut ergo de aut aperendi potentiam Rubrae  
tam vehementem esse, & Dioscoridem hancmodi vim ei verosimiliter tribuisse, ac postea  
Galienum & postea quoslibet, in eius verbis vultis.

Plinius contra, serpsit Rubrae radix eam sibi in pomis, ut, & in acie de quod qualem  
iquod transcurram) morbum regis fariam hoc frange, etiam si ad aliquid spectat rationem.

#### Aparine.

#### De Aparine. CAP. LXIII.

**A**PARINE tenuibus & quadrangulis  
ramulis, foliisque angustis, orbiculatis u  
datis Rubrae similis, est ysaemum maceo, quod  
pessillissimum, candidi in satum emicant vagabunda  
na parva, rotunda, medio asperantibus  
conna, umbrales effigie, gemma ut plurimum  
radice fibrosa & tenax. Aspera non est hinc  
preconantium verbis ac facias solum  
adhuc et lingue in ulla sanguinem dicit. hanc  
haec herba, Dioscorides refert, colorem vi, si  
caimendes e lacte pila, si qui in eo sit hanc.

Est Aparine maceo in agris agrari, quod  
doque in ipsa agru frugibus permixta: om  
curva, & rotunda, sepe, & inter sentia. Thapsi  
siti & Galienum Lappae eam coalit hanc  
& amplexu suo eam suffocare, coque radice  
geram ac molestem.

Est hancmodi sibus ubique frequens.

Aparine Graeco Latine sibus dicitur Lappae  
& Lappa minor. Plinius Lappagines species  
est affinis. Lappagines autem, ipso auctor, dicit  
vna aspera, Aiperago, altera mollis, Molaga. Et  
Aparine quidem Aiperago est.

Lappago, inquit Plinius lib. xxv. cap. x. dicitur  
in Galio, nisi esse ramosior ac plurius hanc  
aspera, rugosa, asperiora sibus, gemma colore que

quod  
est colore  
rubrae.



Mollis  
rubrae.

Mollugo



Gallus

mollis est, Mollugo vocatur similitudo, sed asperioribus foliis. Asperugo (exemplum multo aliter sed perpetuum habent.)

Appellatur praeterea Apatine & potius *Asperugo* quia homines utitur a quodam relictum curat adhaerent. à nonnullis de ea de canis *potius* quoque. Ab Hippocrate, teste Galieno, potius & asperugo. Nominatur & *Asperugo*, aut ut alii placent, *Asperugo* Italia *Speronella* Hispania *Presera*, aut *sauc de herpatae*: Germanis *Kirch fraut*: Gallis *Arde*, et *gratiosa*: Belgis *Chrestrupt*: Anglis *Chrestum*.

Medicamentum, ut Galienus ait, exungit & desiccet, habetque nonnulla subtilem partem. Sennae, inquit Dioscorides, casibus & spicorum capite suis succus auxiliatur à phlegmate ac vipersa est in eam vino bibulamatum à dolores succus infusus curat: ac herba est utrumque in se u-manducata. Sanguis enim abundantiam ex vultu eius accipitur se folia in pedibus, Plin. 25. de.

De Mollugo. CAP. XXX.

**M**OLLUGO Apatine caulis foliisque firmis refert, nequaquam tamen aspera, sed liquet & mollis: flores albi sunt: semina rotundum, radices tenues & nullum in omnino, reperitur tamen in similibus vicinis sitis curat.

Reperitur eadem ac similibus quibus Apatine locis, atque eodem tempore.

Est tamen & alia montana, cuius affligentes coliculi, nulli in eam admittunt, primum in Italia, nihil solo esse leuare: deest ubi eius est diuersa similitudo, & perquam erigit, radice nigra.

In aspera quibusdam iuxta Rheum ac Mosium montibus nascitur. à Martino Tulemano hanc accepimus, vana nostratum suspensum & obseruatum & iudicatum.

Vtraque Lappaginae speciem est, atque à mollitie & lenitate solentem Mollugo nuncupari potest, pleneque Rubrum syluestrem nominant. Sed Rubrum hanc sponte, à latras non differit.

In uentis autem caulescuntur haec herbae, & nullius vna.

De Gallo. CAP. XXXI.

**G**ALLIUM minus multo est, ac minus quam Apatine, aut Mollugo, nequaquam asperum. Cauliculi eius tenues, teretes, pedem aut duos diducunt: alio foliola cuius per intervalla cauliculis flexant radiata ambulantia flores parua, frequenter, & serotina in summis virgulis, luteo splendunt colore, odore fuscato, radices tenues fibra sunt.

Nascitur apicis locis in collibus iuxta marginem agrorum, solo lactone.

Reperitur & palustribus locis ad rivum, sed Gallo floribus albidis ac utrasque prope modum candore.

Huius lano-culcus verò luto ac Augusto flores vigent. Graecè γάλλος, aut potius γάλλος dicitur: à nonnullis γάλλος & γάλλος.



A lacte, cui ad idem pro coagulo est, nomen habet, quod *Cazeo* γαλας dicitur. *Genus* (Sylvestris) *maifire* appellant, Galli *Peter* magis Itali *Galie* Angli *Maifire* sicut.

Facillitatem autem (quod quidam legitimum ac luteo flos) auctore Galieno, excoctum obtinet & in hancem. *Racema*, *Dioscorides* ut, ambustus illustratur, & sanguinem profusa sicut mellea, cui crasso viscoso parietator donec albescat, & tale acopum est testificandum rutila, eosdem teste, venetia excitat.

*De Asperula odorata.*

CAP. XXXII.

*Asperula odorata flos albus.*

*Asperula caerulea.*



1. **R** V I A & *Asperula* haec similitudo est, sed humilior ac odoratior, cuius rubraque & pede via alba, sola est (sanguis) genicula sicut serpentina, bellatula adha, abquantulum habet, sed non perinde ramosa ut *Asperula* flos albus: semen parvum, rotundum, radix tenuis, serpens, & serpens ipsam facile multiplicans. *Tota* herba gratissimum expiit odorem, pulcritum in arvis conaculisque pedibus curata.

Apud Germanos in sylvis locus opaci pinguis solo gignitur, Triago teste, sed apud Belgos haecensis: vbi *Mans*, *Iunio* ac *Sereno* floret.

*Asperula* sicut haec similitudo est, sed tamen non odorata, quam *Ceruleam* cognovimus. *Dodrae* cuius herba, mollis, hirsuta, & abquantulum ramosa, foliis ramulisque *Asperulae* ramosis caeruleis in brevibus pediculis est sicut in virgulis emicans: semen rotundum, parvum, geminatum, radix tenuis, oblonga, tu bet.

In Flandria plerisque agris sponte extantia est, sed ex deciduo semine est profusa sicut.

Plurimam *Alyssum* à plerisque creditur, quoniam ab *Erythodano* sicut *Rubis* foliis parvis, minusque membris differt. *Talis* autem non modo illa, sed & odorata *Asperula* est, sed sic haec alba, illi vero caerulea, & Galenus *Alyssum* florem tribuit caeruleum. *Differet* tamen Galeni & Plinij voluntas.

Galenus enim *Alyssum* foliis describit *argyrius*, id est, *Marrubij*, differens tamen videtur multum ab *Erythodano* foliis. *Suspicionem* fore illi hanc herbe, *Plinij* perperam pro *Marrubij* accepisse *Rubis* usque hanc *Alyssum* *Erythodano* foliis scripsisse. *Nam* *Erythodano* in similitudo perhibere esse *Alyssum*, non *Dioscoridis*, sed *Theophrasti* sicut *Escuthodano* quod sicut *Hederiacum* nominandus esse, in capite de *Rubis* ostendimus. *Asperula* possidemus: Galeni & Plinij *Alyssum*, sed ab *Asperula* caerulea, & similitudo odorata, longe distidens.

De *Alyssum* autem Galenus lib. 14. De *Antidotis* in compositione *Antonij* Coxi & *Colic*

*Asperula caerulea.*



## PREFATIO.

**H**ERBAS aliquas de stirpibus, radices suis medicina vtilis, sequuntur eas purgantes. Harum autem materis deorsum sunt folia & herbae, sunt fructus eiusdem potestate. Idem nomina radices præstant. ad herbam autem quorundam fructus, vel cortex, vel fructus, vel pericarpium. Sed quæcumque ad arborum & fructuum genera referri possunt, sua præsertim pars, nam tantum herbæ sicut tractamus. Inter herbas autem hanc generis, quædam prædicant in suis locis, alia autem quæ. Dabit hæc herbarii: illas subspecifico.

## DE ASARO.

## CAPIT. 2.

Asarum.



**A**SARUM folia sunt leuia, in vitæ splendens, rotundiora, laciosa, increscente quàm Hedera, & nequaquam angulosa sunt in axi: radices sub ipsa folia latant, spinæ autem pediculis, floribus purpureis, & odoratis, Hyoscyami cyani similes, sed odoratissimas, in quibus tandem firmata, capitulo, & aliquid alio spera radice inueniuntur, & præciliis, oblique sparguntur, & inuicem in plicatur, sapore cum acrimonia, dant hæc in secundo, odore grasso.

Amar monium opaco ac vultuosum, & plerumque sub Corylis, vt Corda scilicet, acrietas.

Perperam viret herba, noua tamen inueniuntur flosculi a folia Verperperam.

Asarum, Græci similia dicitur, & inueniuntur Nardum ruficum, & rosali Peperum vocant. Est autem Perperam etiam Baccharis Plin. lib. 17. cap. 17. 1. Minor Asarum Volugetum dicit.

Est Asarum Græci (inquit) Palmarum dicitur. Olim enim à Magnæ Græciæ, hoc est, Magnæ Græciæ, & Gallis, & Siculis nominata sunt inter spurias voces, et atque inde nardum Asarum hanc vocem, qua Officina vocat. Sed alia est Baccharis, & ab Asarum dicitur. Appellatur tamen & Baccharis à Græcis, & rufum, (si modo non legendum est Græci) sicut aliter Perperam dicitur.

Fecit autem hæc utriusque nominis confusio, vt non laus & explicare de Asarum & Baccharis plerumque possunt, & in multis Doctores diu exemplaribus nonnulla cap. de Asarum peram accesserunt. Nam quod inueniuntur in Græcis, & in plantis occurrit, malè dicitur Perperam, hoc est, herba odorata comparata, non ad hanc Asarum, sed ad Baccharis pertinet de Perperam. Asarum etenim, vt Plinius ait, dicitur est, quæcumque in coronas non dicitur. Atque in euenit vt sapienter veterum descriptiones deperam & confusio reperitur, quod vt hoc loco manifestum est, ita sibi non perinde facilius alia loca amittunt potest. Plerumque Asarum Gallis, & Germanis, & Belgis, & Hispanis, & Sardinibus dicitur: Hispanis Asarum dicitur, Italis Asarum Anglis Asarum.

Vim autem Afar folia exsiccata cum simal & reticentem habent, vix cum expungantur potenter, non tamen absque nouacula adfricantur. vomeribus crassis perstrictis, basiconisq; humoribus eductis, & simal inferiorem ventrem commouent, atque in hoc ipso radicibus potentiori efficaciaeque sunt. Eodem canosofo tumpere apparet, ut arguantur autem reticentia in istis serpens, conuenire putantur.

Radices exsiccatorum similior vim & reticentiam obtinent, vtriusque quàm folia amolentem: tenuitate hinc portum: vtriusque erant: tuncles promouent. facultate, ut Galenus ait, Acaudicibus similis, sed tamen intensiores. Acor autem tenuis consistunt, exsiccata, emmanantes, reticentes, & venas mouentes sic tradit. Quae quidem, in coquoquantur Afar radices assumptae, aut alio permixtae, felices exequantur. Icti moris obicere, fella & hemmolestrachonibus, dura kartholish, vomeribus, & aduersus inueteratas fibros vias. Sed in trino requantur assumptae, non inaleb quàm fella minus (parce non scripsit Galenus) vomeribus potissimum, turo & per inferiorem ventrem potenter & bene educunt.

Sic autem radicum in puluerem contrituram (plem miam) drachena oportet: si vero macerata decoquantur, duabus, tribus aut quatuor copiam, fella vero octo aut nouem sufficiunt, quorum cum lapido aliquo conuulorum expressis fycas exhibetur radices in uas mactari possunt, sed vtilius in fero lactis aut hydromelice, ut hœc fides habet.

Prodeh hoc modo Afarum hichade laborantibus, & hydropsici, tum & subinde quartanae curantur, quos vomeribus nonnunquam curam ac liberari contingit.

DE ALIS. CAP. II.

Alis.

Alis ex America.



**F**OLIA habet Alis Sella similia, oblonga, lata, lauis, crassa, setuosa, repanda, vtriusque crenata, aspera, & recutis, aliquot spiculis aculeatis, leno tenacisque succo plena, hinc foliorum Semperouis. castis, ut Dioscorides ait, Anthemio similibus, itos albicans. sic. et Alphodeb. radix singulans, crassi palmi in terram adacta effigie. Tota herba amantissima est, et ea quoque succos collectus amantissimae.

Copiosissima haec stirps in India, & in Arabia, Carthago, & in Aegypto: vnde pellibus infusa

fata faccus in Europam inferens. Nascitur etiam, ut Dioscorides tradit, in Afaloch maritima, ac in Andro, sed non vult facco extrahendo idonea. Repertus & in Apulia, & in meridibus Hispaniæ loca haud parua à mari, sed & in his locis inveniunt.

Ante nonnullæ pronuntiant, & Aleon præferri, cuius sola amplesia, maximeque in dactylis ac Iponotum maceracionem deservit, & facandis mungines duresces omnino ipsas habet.

Vincet autem per petula ipsa herba, atque etiam è terra dactylifera, præsertim in hoc loco circumscripto & subinde rigato. Sic etiam in tabularum consularium suspensa, non modo durescit, verum & incrementum habet, non atque folia procreat, sed expositam Hyeme locum esse operet, congelata enim corò facillimeque tubercula possit.

Atque Greci, Latini & Officina præter Aleon, cum herbam ipsam, cum & sua desiccatione appellat. Dicitur & forte *amphile, desiphia, hauris, verperisier*, sed ipsius verba *amphile* autem dicitur potest, quod non modò in terra, sed & extra eam vivat. Galli *Sempere* Hispani *Aleonor*, & peris *hauris* nominant. Appellatur verò à rectitudinis quia herba nunquam Sempeream, & Sempeream maritimam, quod Sempeream modo dicitur. Videtur & à Colimaia lib. v. Sed à nonnullis, ubi videlicet rantedia, contra crassos osses,

*Præpar. & Planta lateris infundere amaris  
Marraky, mullis, Sals continere sicca.*

Sed etiam factum inter amaros refert, nullum autem in Sedi, quàm huius amaros est.

Aleon autem, videlicet faccus, cuius in medicina via, ad plurimum non vult esse modum & primo ordine calida, sed tertio calidior, vehementer amara, atque in ordines uno, & simul crispiflora, nonnullis que adstringens.

Venerem subducit: maxime si quod aliud, stomacho gratum & conveniens medicamentum. Nam ut Paulus Ægyptiacis scribit, cum omnia purgantia medicamina stomacho adferantur, sola Aleon condecet. Et evacuata quidem non elota valentius, elota verò magis, scintillum magis roboratur.

Bilem ducam educat, sed potissimum, que in ventriculo, primis visceribus, præsertimque visceribus, expurgat. Est enim ex numero medicamentorum, que Greci ab excoquendo herbarum *hæses* vocant, quorumque via purgans, non longè ultra ventriculum sese extendit. Adversus præterea Aleon periculis omnibus, & ab ea, omnium corruptio omnemque partem totam atque defendit: calidior enim mortuorum confectis visceribus lambrosque interit ac expellit: generosamque omni visio stomachi constantem etiam hæmorrhoides aperit: meries etiam promovet, in eamque quantitate affusæ: credas id reliquorum viscerum obstruiones & infarctus præcedit. Sunt tamen qui præsertim cum non adeo castissent.

Ad purgationem datur quæ, plus minus, drachma, subinde oboli tres, aut quatuor sibi sunt.

Vulnere etiam glutinat ac limas, velora expurgat & que æque ad cicatricem duci possent, maxime in uno & potendo, sunt. Sicque, quod est, sanguinem supermentibus, & quorum visceribus adhibetur, crispiflora vultur permissior. Crispiflora enim sua non subfluitis his potest. In oculorum cillera vulnere recipitur, ut ipse cavere, & atque molliorare reficere.

Dioscorides præterea cum ait, ad oculorum medicamenta, in testa pura & eundem, rubiculaque si bene versat, donec æque aliter torreatur, hauri item, ut quod est, necesse est substat tanquam inutile, & hæc plagiissimumque affumant.

Idem Aleon etiam tradit, hauseri & sagittata cum melle dolere: palpe bræam subita, angulorumque præter medicare, dolorem operat sed æque, temporibus & hauri. ex acio cum rosacco mundum: capillos fluens cum vino compescere: tonilla, gurgulis & omnibus visceribus ex melle & vino potest.

#### De Seda. CAP. VII.

**S**E D A cubitalis erigit, canaliculis, nonnullis alio ramo folia, folia verò oblonga, atque pluribus vultis, Glycyrrhizæ aut Coloce similia flores ex starum sira procedunt, hauri in tribus pediculis, à quibus deinde sicut, atque Lunæ ipsam melle recavat. dependit sub cub, plani atque compressi, in quibus semina oblonga, vuarum circumscripta sunt: viscisibus, color nigricans, radix tenuis, oblonga & inanis.

Sentit in Syria & Ægypto, sed in Italia, Provincia, ac Narbonensi Gallia. Apud Germanos & Belgas diffusius provenit. Antea calidior regione, frigoris imposita. Ob id Martium mensis in Italia fieri solent, atque ultra Auram nam perdurat.

Optima Alexandrina & ex Ægypto ad vicia. Invenitur hauri Arabibus debetur.

A Persis Abalacner, ut Metius exemplar habet, appellatur: Officina Seda de vicia, 177

nomine Adonis Græco, & Latinis posterioribus  
notum.

Est autem Sena, quod ad temperantiam ad-  
not, laeviter perata, ad modum quasi calidi ac sin-  
guli, ad calidum tamen ut rigens sicca verò utro-  
terque ordine. purgandi autem per se in se non ven-  
trem facultatem naturæ hauriunt haud multum  
molestem obtinet: nō circa ad irascibilem, quam  
post purgationem relinquat.

Educit autem pituitosos humores & biliosos,  
nec non crassos & melancholicos, si cō faciente  
aliquo adhibetur. Vtilissimum in multis morbis  
purgandi medicamentum, quod etiam atrox & fi-  
rox conatur potest. Circa violentiam ac noxiam  
purgat præsertim Anisi Semine, aut alio odorata  
similibus vni additis, vel lenitibus medicamen-  
tis contraperta.

Dan potest in pallore, sed frequenter datur in  
eius exuberantia.

Modus paloris est drachma vna, diluere qua-  
tuor aut quinque plusve admittit. Maxime in  
quatuor liquore potest. In febribus ardentibus ac  
alio calidioribus morbis in decocto siue diluto  
in frigida in temperata: in frigida verò de du-  
rtioribus molis cum exalidioribus, pene-  
trantibus, aut similibus decoctis, vel etiam in vino  
maceratis, quo modo familiaris natura, circa  
modum sed molestiam alium clumescit subdu-  
cit, crudosque humores detrahunt.

Laudant Arabum plerique folliculos: ac nostri  
foliis: commendant: folliculi etiam non macerati, flores pigmenti & tortiones venter ad-  
ferunt. Sæpe autem ante maturitatem colligi alios contrahit, & alios ventrem impetu de-  
turbat facile concedunt, & tenuibus pediculis dependunt.

Sunt etiam qui noxiam ventriculo Senam, & ipsam debilitare putant, ea de causa Zinz-  
berni montis aliquid adiacendum aiunt, quo roboretur. Tardum quoque operatum esse  
Mela moris, & siliam gerant, ad est, foliis adhibere adiuuandum. Et scribit quidē, quōm  
fortiora medicamenta facultatem suam Sena exerceat, potest tamen non modo doctissimo sale,  
vniū & alio purgantibus admixta velius castigare: simplicibus videlicet, ut Rha Barba-  
ro, Agrico, & alio compositis, ut Catholico appellat, vel ex Palmulis, aut ex Rosarum succo,  
vel alio procedente: & qualiter, cum morbo, cum agrotante.

De Grana. CAP. LIII.

**C**APITULO. Graniola præter complures diductiles & quadrangulata: frequen-  
tissime circa hoc folio singula, oblonga, Hyssopi vulgaris similia, cuius & ipsa herba effi-  
gat & formam sine refere nisi quod non ut illud erigatur, sed aliquo stemmate huius reperit. In-  
scruentibus pediculis oblonga, & foliorum alio ex parte, & dilata purpurea albedi scapula se-  
quente parua, rotunda, Anagalli diaproperodum similia, in quibus si stemmamentum, radi-  
coso prope angustulata, Gramini modo serpunt, fibrososque in alio deorsum in iunt. Sa-  
pientem herba insigniter amaram obtinet.

Natura sponte in Italia plerique palustribus, hauritis ac viginosa gramini, nec non Ger-  
mania: Belgio horridioribus, ubi Iulio ac Augusto cum flore reperti potest.

Nomen hinc recentior ætas Graniola dedit, & Grana Dei. Cordas Larise non appellat:  
Itonam vulgus *Stavia Canale* Sunt qui Eupatorium Mefur: Centaunda sty faciant. Sed  
Mela, Auceræ, Græcorum, & Dioscoridis vnum idemque est Eupatorium, ut alibi est  
demonstrato quo hinc herba differt. Centaunda verò haud perperam dicitur potest. Nam cum Cen-  
taura species videatur, & verbus præcellat, non temere Centaunda nuncupari poterit veluti  
Centaunda, & quidē minoris, species aliqua. Non est tamen Centaunda Theophrasti, cuius  
Plineus lib. XXXV. cap. VI. meminit. Hinc etiam Centauris, ipsum Centaurium est magnum.  
Radices si quidem eius crassas spissas, dicitur aut duodecim annis firmari posse Theophrastus  
lib.







Thymelus.



Chamaelea Germanica.



In montibus alperis & incolis calidiorum regionum locis erit.

Quosdam non posse vivere, sed fructus autem periculosos.

Græci duplitem vocant Syri, et Dioscori deservant, *Chamaelea* Erbotomicis dicitur nihil enim capitane & magis dicitur, sed in proprio nam de alijs & alijs. Sed in Dioscorides ait, solum periculavit alijs dicitur in fructu verum alijs dicitur. Quae nomen Theophrasto alijs appellatur, & Thymelus differe videntur, nisi negram Cœcia Thymelus sit. Duo nam aut Theophrasti est alijs generis unum candidam, alteram negram.

Est autem Thymelus tota sua aëre & folijs ac fructu valde calidiorum, ac ut videntur facultatis.

Genium, aut Dioscorides, per infirmum, peruenit aqua quæ detrahit, & ex genium interuenit per bibulam, verum laque adunt, quare cum fimo aut potioribus, aut in vine aceto, aut melle cocta obdunt ut deueniat. Idem tribuit cum non ita illius in qua dicitur fieri.

Folia circa messem colligi debent, siccata in umbra reperti. Quæ calidiorum videntur, contumere debent, & necesse est purgare ex his acerbis mensuram unam unam in partem, & aqua quæ dicitur. Modestissima purgant leniter cocta, & oleum compositum. Eodem folia siccata, & cum vine aceto facco in pulvis formata, exponunt in terra herba stomacho infesta, quæ & sanapropia vocatur.

De Chamaelea Germanica. CAP. VII.

**G**ERMANICA cognominata Chamaelea, fraxinæ est fœculosa & ligula, herbacea, aut aliter si calidiorum acerbiorum ac docturalibus naturalibus folijs oblongis, trifolij, mollioribus, & pallide virentibus folijs secundum tumulos exorta adunt, colore dilute rubentis purpureo: lucca torulo, Ocularium magnitudine, cum mansuetudine, & siccata nigrescit: interuenit natus Cannabis ferunt similes, mollioribus candidis, radice longa, alba denata.

In plerisque Germanicis siccata reperitur, alperis & de fraxinosa.

Demant hanc folia ut plerique arborum tunc sine Hyeme: florum vero generis hanc post. Aut nunciam peruenit, qui peruenit Hyeme, & subinde ipsa Hyeme (si ceteris hanc pariantur) folijs post florum. ceteris bene illare momentum.

Vulgè Germanicum *Trilium*: pibid! Insuper & *fellip* appellatur. Officinarum frutes Mexicanorum vocantur autem *Chamaelea*.

hanc Germanicam dicunt malum. Inlorum nonnulli fructum eius Piper inebriantim  
 nuncupare accipiunt. Sunt qui Laurulam & hanc speciem nominant, sed alia est Laurcola,  
 à qua nunc agitur. Quo autem nomine à veteribus appellata, & in aplo cognata, explicare  
 non est facile. Vultur quidam Carceon album Theophrasti esse, sed propter breuitatem  
 huiusmodi affinitate licet.

Isaia, inquit, duo genera candidam & nigram. Candidam folium habet *ἀλαυρῶς*, Ceras  
Theophrasti  
 oblonga, nigra quodammodo *ὄλεα* pro simile. Nigram ut *βέρυς*, *καμώσιον*. Huius  
 uera magis candidam esse, aliam *ἀραυῶς*, hoc est, odoratam: nigram uero *ἀραυῶς* ad eam ab-  
 que odore, sed in odore que alii descendit, grando: in multi permulta, crassa, lignosa, pecti-  
 na, ut phœlicare sua paulo sepius spursi, leui, quatuordecim hinc ad colligendum steci  
 mole uisunt, germinant ita ut que post septemdecim à uentura, & multam deniq; tem-  
 pora florant: hęc Theophrastus.

Et Chamæla quidem Germanica folio non multum diffinita est *ὄλεα*: hoc odoratum,  
 quam in sepius, mox post Autumnum germina apparet: rami lignosi, oblique si, sed  
 uisus, alii descendens. Quo in omni magnam eius cum Carceon albo consuetudinem & af-  
 finitatem si non ipsam esse ostendunt.

Et uera siquæ hęc in vniuersam etiam uolucriter catalibetia: fructus, folia, & cer-  
 uicæ modum sunt, gustata lingæ mordent, & adustione sensum in faucibus exci-  
 tāt.

*ὄλεα* Germanicæ & Belgæ huius folia (si quando opus est) pro Chamælae uentur.  
 Quod ut necesse fieri possit. Nam Chamæla ubi uerbis & portans aliam similitudinem est,  
 quædam cum loco si uerbis potest, & eodem similibus modo præparat.

*De Laurcolâ, seu Daphneide.*

CAP. IX.

Laurcola.

**C**YPRITAI & non raro bicubitali quoque  
 altitudine fructus Laurcola, in uisâ, ra-  
 mis ampla diffusitur, qui leui sunt & obli-  
 quati, crassitieque cortice uelluntur: folia ob-  
 longa, leui, camosi, leui, nigricans, spicidētia,  
 laurina similia, sed memorata maiora Myr-  
 taceo densa, non tamen odorata, plurima car-  
 ce ramulorum subigia, numerosissimaque: ste-  
 culi oblongi, eam, è uiride subcandicantes, ma-  
 stri folia: baccæ mature nigre, nucleo uicis du-  
 ro, Cambis ferine paulo longiore, medulla  
 interior candida est, radix lignosa, leui, longi  
 & multiplex, alii descendens, folia, fructus, con-  
 ce et tam radice quædam ramorum, acrimonia sua  
 & uiridi qualitate longiam & facere mordan-  
 cant, & incedunt.

Reperitur Laurcola in montosis, incultis, af-  
 speris, umbratis ac syluosis montibus, ut apud  
 Lemnum locum, & non pauca inueniuntur  
 ac Modum loca.

Flores per maturè germinant, paulo post Au-  
 tumnum æquinoctium, Hyeme aut primo Vere  
 perficiuntur: fructus Maio ac Iunio, serps est  
 perpetuè uirens, & aduersus singula Hyemisque  
 uisum obdurat.

A laur folioei similitudine *ἀραυρῶς* Ger-  
 cè dicitur, Latini postremo Laurcolam, ueluti  
 autorem Laurum, ex eadem causi appellant.  
 Vocatur & *ἀραυρῶς*, à speciosa foliorum pul-  
 chritudine, item & *δρυοειδής* ac *στειλὴ*. Alia  
 uisus & Chamælae, & aliud quoddam est *Ἰβηρα*.



Hanc baccas Piper montanum, ueluti Chamæla: Germanicæ, eam ab Indis nuncupari  
 uisus qui affirmant, alii à Germanicam *Ἰβηρα* dicitur uolunt.

Theophrasti Carceon nigram esse potest, folio si uisum Myrtam sua referat, & camosi,  
 leui, obliqua esse, serps, alia radice, alioque odore, fructu nigro.

Ceterum temperis & facultate similes est, Chamælae Germanicæ, uirgula sua substantia



Ricini.



tum apud Germanos, Gallos, sarr & alios, non modo ad spectaculum, verum etiam ad usum talpam amant, quia ferit Ricinam iugere.

Arvus in Germania sibi est, possidet eodem quo sibi est anno. Semen, si estis calida fieri, Autumnus maturatur. In calidis regionibus multos colit annos, ubi in tantam evertit altitudinem, ut ad concidendum fructus opus quoadque sit: ut quidem Petrus Bellonius Singularium lib. primo tradit.

A Larva Ricinis, à Graeco verò agnosce dicitur: ab animalibus formam fructus eius referre. Sunt autem agnosce insecta quaedam cuius membra diuina, nullam eam habentes ex nam, colore laeta, quae caulis procerum adhaerent, in globum constanti cretencia, donec plantae signatae sponte decidant. *Aegypti Ricinam dicuntur. Herodotus in 2. libro. Plantae Tunc & Soliman sicut dicitur dicitur. vulgò Palmam Christi item Caropium maxime, nonnulli Pentadactylon appellant. Germani Wundtbaum, vulgò dicitur fructum Juxta fenset: Belgae Wundtbaum, maximeque Palmes de Christ Gallis & Angli: Itali Garofolo Hispani Figueyas de Laxferas: Arabici Kenough & Kenough. fructum Intrepidus Marfay Gramam regium vocat.*

Ceterum Ricini grana triguas numero, pumidibus purgata, itaq; ac pota, pituitam, bilem, & aquam per aliam deiciunt, & vomitus evocant.

Sed ingratum admodum & laboriosum huiusmodi purgatio, stomachum valentissimum. Tuta & imposita grana sibi, id est, vasa & epithelias purgant. sola cum emulsa potente faciat, ac ulorum admodum & inflammationes sedant, manuumque terguis obolent, & per se aut cum aceto imposita erysipelas vel longi dicitur sicut Deo Cordes.

Eadem sicut de grana sibi Joannes Meffas habet, sed quomodo aut septem, vel ad summum quodecim menses tantum calidanda tradit eademque ex utroque vasa, colit, sicut dicitur & contrahit de lantibus vasa, & cum aqua calida vel hinc capio sicut vasa prodicte.

Quia, sicut Galenus quod ex semine colitur, tum calidum, tum tenuissimum partem, quae est oleum coarctant, ac proinde quoque digere.

Serpentaria, quam D. Deus Isaac Propheta iuxta Nativitatem pro vinctulo preparavit, & qua labor à verme correctus collapsa est, Ricini non fuisse, unde quoque doctissimi ac clarissimi D. B. Ann. Martens in Commentariis suis in Iconem cap. 111. videntur ostende, & vasa Helmsdici, cui vasa vicinam esse vasa.

De Tithymalo. CAP. XII.

**TITHYMALI** genera, Dioscoride, Plinio & Apuleio auctoribus septem sunt. Párus Chamaedrae masculus, aliter Myrtus sive Myrtinus, femina, tertius Paralus, quartus Histocopus, quintus Cyparissia, sextus Dendroides, septimus Phlyphylis. Thapsophylla septimum enumerat: Paralum videlicet, masculum, & feminam Myrtum.

Chamae Tithymali sive mas, caules proceri cum vitales, teretes & herbentes, foliis cunctis multiterribus, oblongis, angustis, & longi vasa, majoribus quidem, quam Oleae, et Ampelibus angustioribus. nec dicitur quos alius eruge absque solis calore, eorum tamé, quod est vasa, vasa retinetur: contra cum in cucurbita larga, amph, & sunt odorati foliis multo sicut, quae contra quosdam sicut in spebana profert: vasa sicut vasa sicut multo quos sicut sicut sicut, deo in quos vasa caputula parva, in quibus sicut. radix sicut sicut habet multas.

Est verò & altera huius speciei, foliis angustioribus, foliis tamé duntaxat: caules quoque sicut, sed tamen raras, rubescens vel un procer, & qui hinc sicut caulis foliis haudquam vasa erunt, sed sicut sicut modo, nonis quoque contra quae perierunt, vasa vasa, sicut, sicut & radice sicut coarctant.

Castor.

Castor Tithymali.

Thymus Chamaecris L.



Thymus Chamaecris III.

Thymus Chamaecris L.



Thymus Chamaecris III.



Tithymalus Chiracius V.



Tithymalus Myricinus.



Ad hoc genus pertinet etiam videtur non caule tubera, sed caulis ac candidus Tithymalus caulis eius teretes & ramosi, cubus non raro altioribus foliis oblongis quoque & angustis, albedis, tenuibus & lanugine pubescentibus: umbella contractior, sed folia parva, lanuginosa, ut in acria bulbis, uti aliorum.

Item et quatuor quidam est Chiracius, foliis similibus oblongis, angustisque, parvis quibus praeter antecurvas minoribus, albis tantibus etiam candidisque, sed tenuibus lanuginosis umbellae vix multi foliatae, quae praeterquam explicatae oblongos fructus, veluti Acryphala, eduntur, et per se fieri, et coloris tamen reliquis foliis: floribus & feminis aliorum similia. radice albidissima.

Quatuor Chiracius foliis similibus est oblongis, mucronatis tamen & circa antecurvas lanuginosus, & albiditate colore vinctus, per antecurvas cretatis, (vide formatu cognomen.) umbellae angustioribus sunt ac tabula, floribus, feminisque respondens.

Myricinus Tithymalus sine feminis, ramulis sine caulis habet complures, deditur tamen non caulis, sed plurima parte proceris feminis: folia vix circa has loca, lanuginosa & pungentia norma vel caerulea, Radice sine Acryphalae lanuginosa, sed lanuginosa candida, flores in umbellae supra: & feminis aliorum similia.

Parvus Tithymalus, hoc est, maximum, caulis qui ferre creditur affertur cubitales, ramulis tamen brevibus, quos multa, parva, angusta, oblonga veluti foliola, inter lina, sed candida densioribus: ramulis, sed minus amplis, in maxima parte umbellae, in quibus flores de femina perinde ut aliorum.

Habescopus Tithymalus cretensis, ramulis in deditur tamen, non ubi tuberositas affertur, cretensis, amplis lanuginosis umbellae come sine folia habet parva, lanuginosa, breviora, in quo, ramulis quoque quos Perulaceae Genus floribus & feminis parvis, effigie procedentibus, tamen cretensis est, ferre hoc comantur. Sole curentur: vide illi cognomen.

Cyparissio folio quidem fieri oblonga, sed parangusta, & quam Eruicis minoris angustioribus ad Piceae accedentibus, molliora tamen ac tenuiora caulis tamen normalis rubeo, deditur tamen, tamen aliorum, ramulis effundit complures, in quorum medio umbellae cum accedentibus parvis floribus, non ubi feminis quoque perulaceae, radix fibrosa.

Hanc & speciem quidam minoris perulaceae, palmam, modo alta, tenuibus caulis, uti perulaceae, hanc.



Tithymalus Pallasae hort. mantov.



Tithymalus Pallasae hort.



diffinis, oblongis foliis, var. bellis exigua, flo. rubis luteolis, semanibusque maris.

Dendroides  
Tithymalus

Dendroides Tithymalus arboris specie fructu, superne amplexi & multum concolunt in talibus suberent, circa quos sunt folia tenera Myrti similis: fructus quasi Cuscutae quidem Dioscorides Plinius hinc compositi simum ex omnibus maxime, cauliculis rubibus, & seminis copiosissimum esse tradit. Bellonius vero ad duorum hominum almoda ferit, & caudicem habere crassitudine cratae huius memore prodidit.

Platyphyllus  
Tithymalus

Platyphyllus Verbasci similem esse Dioscorides Plinius vero nec ullus hinc ferit ait. Videtur autem hoc esse, quem diligentissimus Carolus Clusius in Valentia Hispanica à se repertum scribit, pedalis videlicet altitudine, foliis circa caudicem amplexi, oblongis novella forma accedentibus, viridibus & aliquotulum canolis: flore è luteo papaveraceo, acutulisq; infidense, ut reliquorum Tithymalorum.

Ex omnibus autem hoc succus est ut, amara, mordax, candidus, & ferè lassi simus, quomodo ceteris parte valentia.

Reperiuntur verò Characie Myrtinus & Cyparissias in Belgij subinde hortis, ab his aspectu & in talibus locis eunt. Pallasius mantovis loco amat, ac non modò in Italiae Hispaniae, sed & in Hollandiae, Zelandiae, reliquaq; inferionis Germaniae maritimis, locis cultis, aridis & praesens subinde nascitur. Hic ad hortos mantovis, in aenaribus malisq; in longiorum dierum exarcentibus, rationibus efficiunt folia.

Heliostictus hinc olitoris frequenter molestus, eaeque verba & rodens etiam exarcentos agrorum margines, ubi & Cyparissias alter quandoque reperitur.

Dendroides in portulis loci eunt Dioscorides prodidit: in Creta Bellonius: Alabastrum Tufae, Laguna, & prope Massiliam, Marchandus Dendroidem extra Terracinae agrum poltami verben ostendit sic se ferat amat sicut antiquissimi specus, plantae arboriscentis dignae, & in Tergestino litore haud procul Tamano fonte in litoreis quasi silvam rapitur. Qui tamen ab eo exhibetur, nequaquam ampla est copia aut Myrti folia, sed oblonga & Characie articula parva.

Florem semendos Tithymali, & hinc perficiunt, nonnulli ferunt, abjiciunt, in quibus

Tachysanthus Helioscopus.



Tachysanthus Cyprius.



regibus prius in frigidioribus tardius. Myrtinus fermentosus calciculos non solum, sed etiam siccitate Theophrastus tradit.

Lactuca, Plinio aethiops, Lactucam et Lactucam capream ad Cyprii nomine, à lacti similitudine, quò factò aut viderentur folio, aut aliis parte debent. Repentur à Ledone Cordone Celsus lib. 7. cap. 11. Lactucam maritima appellat Lactuca, ait, marina, quæ à Grecis ἀλιπέρα; nominatur. Non tamen omnes Tachysanthus, sed maxime in propolis vocandus. Tachysanthus autem Indi Tachys de Hispani Lactuca myrtina Germani Weis nach; Belgæ Weis wintel est, Lupinum loco Celsi. Aethiops à lacti nominant.

Regula à villaria, etiam aethiops dicitur; quæ aethiops cognominatur. aethiops, ab effusa à campis omnia, aethiops dicitur, à foliorum figura, Amygdala similitudo. Huius tertia à nobilitate spectata ac sic videtur, quæ à Mauthoto pro Dendroide exhibetur. quantum acerbitate perperam Myrtinam faciunt. In magno autem vendentes errore, qui quantum Chersonam Hippophaen esse existimant. Nam Hippophaen fructus est spinosus, folio Olivæ, mal. Myrtinam à Tachysantho differens.

Myrtinus siue feruina fructus aethiops, aethiops, Theophrasto aethiops, appellatur: vnde hanc à Tachysantho aethiops cognominare: ut quidem Plinius.

Regula; siue aethiops Tachysanthus, à Theophrasto aethiops; appellatur referitur, à nouallia p. omnia aethiops dicitur, aethiops dicitur. Est autem in aethiops quoque perperam.

Myrtinus Lactuca Tachysanthus Solisquam aut Lactucam Solisquam vocant.

Aethiops à villaria et terra folium etiam appellatur.

Regula; siue à plerisque aethiops dicitur.

Cassia Tachysantho omnes vineas etiam habent acere calidamque facultatem, inest vna à aethiops.

Valeriana eorum est liquor secundum locum tenens fructus & folia: sed & radix dicitur facilius parari, sed non ex aqua: ut quidem Galenus. Et habet quidem non modicam Characiam, sed & colicorum omnium facies, per infusa purgandi validam vim atque potentiam. hinc, granum & aqua olos hanc dicit etiam in exiguam hanc faciem, sed videretur vehementer contra, & interna viscerum infiammas, quam ob causam ab aethiops dicitur ac prudenter mederi abstinere.

Tithymalus Dendroideus in Cod. Casleus

Tithymalus Hierophylois.



Formam non tam adhibetur: ut enim vehementer acris & mordax, ita quoque facilis patitur, cui aliamque corrumpit: & tanta quidem eius violentia, ut etiam siccoponem, quod tamen acridinem illius vitandis, adfusus pilorum radicibus, coepus depleat melle, & idemdem & fupri eo inungatur.

Fructus & folia caeteri in aquam fignalem iniecia colerunt: pilos in unguentis aqua fignis in aqua fupreficem fieri efficiunt: auctor Galeno.

De Hippomane.

CAP. XIII.

**E**X Tithymalo Theophrastus De hiftoria fteptum lib. ix. Hippomane appellatur quod Arcades fieri folent, quod optatum, inquit, conficit apud Tegyram noxiam, maximeque in pino haberi. Sed alij auctores aliter ferunt: omnes tamen veridice melle affiant.

Theocritus fteptum esse Hippomanem, quae equis in furorem ageretur, de fteptum vocat cocinet his verbis:

*Γ' ἠμαυλὲ ποιεὶ ἔξιμα' Ἀπὸλε τῆ δ' ἴδι μῆλα  
καὶ μῆλα ἠγῆρασε δὲ ἄλπε, καὶ δὴ δὴν ἴσμεν.*

Virgilius & Tibullus poetae, viri ab equorum inguibus deflucit, quo tempore auro furore & infano ferantur, ita nominant, & alio quidem Georgico lib. iii. sic ferunt:

*Hinc demum Hippomanes, puto quod nomine dicunt*

*Pafferes, leuam de fteptis ab inguere viri*

*Hippomanes, quod fape mala legere noverit. Tibullus vero lib. ii. Eleg. iii.*

*Et quod, ubi indomita gregibus Frons afflat amorem,*

*Hippomanes, cupida fteptis ab inguere equae.*

Et hoc vero nomine appellatur Virgilius ait, volens, interfectis Scythae, herbi abfina Hippomanes dici, ab equorum furore & infano.

Ariftoleli lib. vi. De hiftoria animalium, cap. xviii. deflucit etiam à genitalibus equorum hunc eorum Hippomanes appellari folent. Equae, inquit, tempore coeuntis colliguntur, & fixi etate magis quam auro gaudent, afflari caudam crebrius, vocem inueniunt, hanc emittunt fua genitalibus, fua fua generant, fed rutilo venarum, quae melle, quae Hippomanis

portantes nonnulli appellare, non quod pulla nascentibus adhæret. Hoc ipsam tamen quod pulla nascentibus adhæret, postea cap. XXI. Hippomanes nomen esse affirmat. Cùm equus, ut patet, statim se unda ducitur, neque enim quod fronti pulla nascentia adhaeret, Hippomanes dicitur, ut agnoscat nec nisi in Caneis parva, specie latralium, pedicularum, nigra. hoc si quis præcepto odore in morte, equi excusat, sunt, agnoscat eo odore. In fine equi a morte sanato venelicum, Hippomanes appellatur, in fine Caneis nigrocinere, colore agno, quod statim edro parva de morte facta, partem ad vbera non admittit, si quis præceptum habet, Plinius lib. VIII. cap. LXXI. etiam scribit, Caneis lib. XXVIII. cap. XI. equum totum vitæ esse concedit.

De hoc verò & Julius Solinus Polyhistor cap. XLV. ubi ait, in equum partu amoris partu venelicum, quod in frontibus referatur, totius edis, fulvo colore, Caneis simile, *βροχίον* & *νομοσόν*. Quod si præceptum statim fuerit, neque aquil mater pullo vbera præbet fellicida.

Colomella Hippomanes venicosum esse tradit, quod equum cupido in similem amorem accendit, quod si autem aliud sit, unde fiat, statim dicitur, non explicat.

Arceus Plinius, qui Hippomanes tantum in venelicis vitæ habere lib. XXVIII. affirmat, ut dicitur in mittere in aliquo equo Olympi, ad motus mare equos ad tubæ vocem agit.

De quo Pausanias lib. V. ubi intra Alon Olympi locum, Phormida Menaly Olympica dicit, & non ab eo loci Olympio equos dicitur referri. Inest etiam, ut patet, equi latere, ut quo verba male adstricta Phormis posuit. Arcas Menaly, nunc Syracusanus. Hoc quo Hippomanes infosam tradunt, Magi hominibus, quod est in mentibus maribus. Magnitudine ille quidem & specie inferior est equi multo intra Alon posita, & deformior, non tamen præca reddere sed altum equi mores non Veretantim, sed plane quatuor modo paræperant. insuperantes enim vel effrares vitulis intra Alon, vel bestiarum maribus clapsibus incedant, nihil minus furtes, quàm si vicentem pulcherrimam equam gregalem adierint. Hædæus Pausanias Caneis quidem verba, & similiter aliis veterum, occasione Hippomanis, quod ex Tithymalo fieri Theophrastus memorat mandavit, hoc loco addidit.

De Tithymalo tuberoso, seu Apia.

CAP. XLIII.

Tithymalus Tuberosus.

**T**ITHYMALUS TUBEROSUS Tithymalus exiguus pro-  
mit caributes, aliquando etiam rubentes,  
semper ac teretes, circa quos cætera & parva  
foliola, forma quidem foliorum Hyperici aut  
huiusmodi Rize stylactis, et mirra, Cha-  
malycis amala: umbellæ in fastigiis raris, in  
quibus acetabula; Baccis pulcherrime luteis, &  
tinnis asperis scabrisque, vitæ aborum Ti-  
thymalorum, raris tamen radix tuberosa  
Pya medio turbantur, infusione parit an-  
gustior, fœnis nigricans, inter in cardida. Ma-  
nus ex hoc lactis quoque factus, quicunque  
eius vulnerari aut lesa parte.

In Apia Italia præcipua præcipua, nec  
in Grecia ac vicina insula, ut Creta, Lem-  
nos, aliisque, & quidem illic locis montosa.  
Ex uno loco longioribus caulis, alio-  
ne floribus brevioribusque. Huius quidem  
maior illius verò subinde minor est radix.  
Monsus à quibus ab excellentissimo cla-  
ssissimo viro Iacobo Antonio Corrufo-  
pino Pausanias dicitur olim huius plantæ acci-  
pere. Vetus radix maior crassiorque, folia ve-  
rò & umbellæ minores: abest verò radix mi-  
nor, sed ramulis longioribus, & folia paulò  
maiora.

Hinc Tithymalium Geraciense i figura &  
similitudine Pyæ nuncupant dicitur quoque  
& hinc, & à Giza Linnæi Caneis, quod hinc  
de, id est, Caneam sine Ficam andam radice referunt: item & *μαυροκόρυς*, sine Tenebris  
Pausanias, & à figura quoque. Sunt tamen & alij *μαυροκόρυς* Germanicæ familiaris ac edulis.



de, id est, Caneam sine Ficam andam radice referunt: item & *μαυροκόρυς*, sine Tenebris  
Pausanias, & à figura quoque. Sunt tamen & alij *μαυροκόρυς* Germanicæ familiaris ac edulis.

de quibus in historia Frumentorum Pempt. 4. scripturam. Bellonius *gasperidia* modis Graeci Apion dicit scribit.

Faciliare autem & temperamento *Tithymalus* dicitur, sive *Apion*, vehementer colubasci-  
cus est, reliqua *Tithymali* similia, ac perinde quoque huiusmodi corpori molesta ac nociva.

Partes radice superne, Diacordis ac, summa vomitum bilem paranturque edocantque  
ad radice inferne, per alium. Tota vnaque perganones in ouet.

Sed eius reliquiboli pondere, vnaque etiam parte purgat. Hydopictis, inquit Hahn, &  
tar acetabuli mensura.

De *Styracis* sive *Pteris*.

CAP. XV.

Exalt. maior.

Exalt. minor.



**E**ZTYACIS duas sunt, Maior & Minor.

1. Maior fructu simplici est: caules eius complures, teretes, supra cubum altitudinem longi affurgunt: folia videntur oblonga & angusta, *Tithymali* Chamae monobolus simile angustiora sunt: flores seminaque *Tithymali*. radix atque, ramuli, crassiores cortice, sive lacteo plena, vni & tota ipsa (herba est).

2. Minor prior similitudo, sed leuissimam eius breviores tenuesque, folia etiam oblonga, angusta, acuminata, minores: flocculi fructusque respondent. radix teretior, lignosior, vnaque cortice, tota lacteo limbo sive sacco redundat.

Reperitur maior in collibus quibusdam Germania septentrionali circa Scythiam & Balcum in Apulia quoque Gargano monte, Martiolo testis: vnaque Arabes vero & Galiaque habentem non raro in Sicilia. Minor alpina & inculis neapolitanum Belgij locustis. Vnaque quandoque ad huiusmodi transferunt: vnaqueque vnaque est radix, sed caules *Hymne* manifestos. Vnaque non erunt purae, & sive fructus facturi.

Exaltam ab *Ephedra*, Arabes *Alkoben* aut *Alkoben*, & absque amaro *Sobhan* appellat. Videtur Graecorum *seris*, praefertim quae minor est. Nam haec solis *seris* huiusmodi fuit: est amara, Cypriaque *Tithymali* maioribus lanabibusque. A quo huiusmodi nomen repetitur species *Diacordis* restatur cum videlicet fructum huiusmodi quibusdam in locis *epidicomy* dicitur, sed est, valde magnum inuenitur radice factis in *seris* dicitur in species eorum.


Etiam etiam nomen à *seris*, inuenitur esse potest. Solentis autem in duabus praedictis



quandam Ruelliam Vincale Reuchamii Gallus de Chone nominat, Galia siquidem est *Asclepias* *maxima* de *clayton*: *Gracilis* & *rufiflora* *indica*. De *causa* & *colore* de *placenta* & *pyris*, ut quidem inter nosha asserunt. In Ingrorum vero Hippocrati capitulo *enata* *gossypia*. Eiusmodi *gossypia* *de quibus*.

Faciliorem autem *Populam* & *Tithymalam*, quorum & species, affert microbotanica, eadem videlicet, acrem, mordacem, & cum violentia expurgantem. Testatur Galenus. De simplic. medic. facult. haec verba: *Populus* quaedam vero *albana* *dyptera*, & haec fructu sua succum habet similem *Tithymala*, cum et alia, cum quae purgat, cum illa.

De *Populo* sive *Popule*. CAP. XVIII.  
*Populus* sive *Popula*.



**A**CCEDIT *Tithymalorum* & *Lactiarum* generibus: & *Populorum* huius procedunt: & nequaquam alarum modo affurgens herba, & lacteo similes succo turpida: rursus eius teretes, subinde purpureae, quandoque herbosae coloratae folia *Populi* & *Pomulorum* *lychnis* *arabica*, sed prima parte rubentia: ferunt coagulum in triangulum parum valens *res Populi*, sub folio coarctatur, radix pusilla.

In maritimis, ut *Dioscorides* ait, maxime nascitur.

Appellatur vero non modo *viridis*, verum & *vestita*, & utroque quidem nomine i similitudine *Populi* *Dioscorides* *vestitus* nomen: ad Hippocratem referre: ab alio & *dyptera* *egria*, id est, *Pomulica* *lychnis*, dicitur, quod scilicet *Pomulica*: huius modo spurius per unum reperit, foliaque ipsam referat: eam nempe, quae sponte & non facta in bonis & alba gignit.

Respondet *Populus* illud verbum reliquis *Tithymalis*. *Dioscorides* eam colligit, *egria*, *dan* & *condit* *Populi* modo ait. Galenus succum habere validum non admodum velox imen veritas, sed *egria*, hoc est, ferus una, si melius *Populi* modo purgata. Eam *plum* *lychnis* *egria*, id est, *lychnis* habent, sed nos *Cortium* emendationem applicamus, & *egria* legitur.

Galeni hanc emendationem.

De *Chamaelyce*. CAP. XIX.

**C**HAMAELYCE *supra* huius procedunt, & *Populi* modo nascitur, ramulis teretibus: modo numerosis: quibus usque, quo teretes, rubentes, & in rotunda orbis per se dispersi: sicut: folia perpusilla, *Populi* ramorum, rotundiuscula, lenticulis ipsi: forma & magnitudine parva, sub quo non alia fructus tricornis edunt, radix omnium est candida & lacteum succum habet: haec non minus quam *Tithymala* valentia emittit, ipsam eam partem ascribenda. Reperitur, ait *Dioscorides*, in *sequia* *da*, *arabica* & *perotis*.

Haec *egria* appellatur, id est, humilem *Sycem*. Dicitur autem *egria* non modo *egria*, sed *Populus*, ut iam antea meminimus: vnde *Chamaelyce*, quasi *lychnis* aut teretes *Populi*, quoniam folio & facultate omnimode refert. Appellatur vero: haec eam *plum* *lychnis*, ubi ipsi *Populus*.

*Minnam* autem *dyptera* *Dioscorides* herbam esse tradit ab aliquibus *egria* appellatur: eam deducunt: folia valde rugosa, *egria* *da* sive *Lanana* *herba*: & fructu non quod candido: sed de totam herbam ipsam *albam* & *truncam*. De eadem & *Theophrastus* loquitur: *Meconem* *Heracham* folio asserens esse *Strachy*, quo *lychnis* candida dicitur, *lychnis* *egria*. Sed eam herbam candidam esse non adhaec. *Purgandi* vum utroque haec *Meconis* *res*.

plum in populo egria.

Chamaelyx.



de vomitione expurgare: cordialique mor-  
bo obnoxia hac purgatione prodesse. Suspecti  
hi ne possent abique, non aliam esse *obnoxia* *appari-*  
*dit* & *legumina*, quam vel Populum vel Chama-  
elycem, & separantur locis, sub duobus nominibus  
de eadem specie Distenderem esse: nisi quia  
Theophrastus hanc Scrupulum videtur enu-  
merari qui *obnoxia* hanc in numero aliarum enu-  
merat, id est, Papaverum habet, & post nigerris  
ac jussis reperit, quod legumini *obnoxia* *appari-*  
*dit* sine *legumina*, Papaveris esse speciem, & pro-  
prie Papaver spemum Latris dici ostendit, &  
a Populo & Chamaelyce differens.

Est autem Chamaelyx viribus reliquis Ti-  
thymlis affinis. Galenus abstergens simul  
& acrem, ut, uti possidet. Inque acrochordo-  
nia & myrmecia, cataplasma conseruata in ma-  
dum cataplasma admodum, quibus ex eis pro-  
bit liquor, auferunt.

Quod quidem & relique omnes Latris  
enumerare possant, sed quia modum anti-  
cum non minus, vfu earum periculo non caret,  
veluti neque hanc.

Hippophai ex Coriis Ceteris.



De Hippophai ex Disterris, & aliis.

CAP. XX.

**V**ERUM quae lactem succum fundunt  
Hippophais nomen habent. Frustra in-  
quit Distenderem: est *opparatit* sine *formica-*  
*ceus*, vndeque dicitur & arripit folia ei ob-  
longa veluti Olei, angustiora tamen & reseno-  
ra, nec quae spinae sicca & candidiora emittit,  
articulate, interstitio quodam distanti: flores  
Hederis corymbos referunt, nec manum cohae-  
rent, sed tamen minores mollesque, & ex ab-  
sido parente tubentes, radix crassa & mollis, succo  
plena, gustu amara, ex qua veluti ex Thapsia  
succus colligitur. Angustiora radicem referunt  
plena esse longam vel maiorem, & ex hac sicca  
aut videretur succo in manum tenentem, lacte  
concolorem, gustu amarissimo, odore grauem.

In maritimis ac subulosis, ut Distenderem scri-  
bit, nascitur. Angustiora arvensis & maritima  
loca in Peloponneso si sepe reperiri referit.

In *opparit* Graeci: Latini quoque Hippo-  
phais dicitur: à Pismo lib. xxii. cap. xii. (nisi  
corrupta vox) Hippophayes. Hippophayes, ut in  
subulosis maritimisq; nascitur, spina alba, He-  
deris modo capite facti, condida & ex parte  
tubentibus acinis, radix sicca moder., qui aut  
per se condunt, aut passim salantur. Extant vete-  
& inter nos appellatio per quaedam hanc no-  
mina ut, Hippophaias, Hippas, Echimon, Pe-  
monas, & Lappago, quae tamen Apertina conseruata: nostra autem ab indigentia Peloponnesi

licium, & Lappago, quae tamen Apertina conseruata: nostra autem ab indigentia Peloponnesi  
apertina conseruata est, spina purgatione vocatur.  
Ab Hippophai dicitur Hippophastem, quod tamen & Hippophai aliqui (Distenderem *opparit*  
etiam appellant à Pismo Hippopasini & hic verum) dicitur. Spina fulgonis generis est, ab *opparit*  
condida, siccata, aut fructu, nam bus tamen caputulis, foliis paruis spinosis, radice molli &  
crassa, quae cum foliis & caputulis succus exprimitur.



Et Narbonensi Gallia, inquit Ruellius, Hippophastrum vulgatum spinosis capsulis, sic dicitur, sine canaliculo, maxime inter aculeos folio cincta umbra.

Debetur Plinio auctor, Hippophastrum & Hippophastrum acrommodata esse oportere, tunc, neque ex illa causa nomen accepisse, quippe quaedam animalium remedia constare. Est verò Hippophastrum, praesertim verò radice triphas ac succos, calidior sic etque facilius, & firmi velociter purgans.

Succos sive nativae radice huius purgatam, balnem, & aquosos humores detrahit oboli modo, non cum farina verò subactis quatuor obolerant. Saluberrimè autem cum aqua melioribus, haec. In comitali morbo, ut Plinius ait, veliffimus. Fructus verò apte succos trahit, ut usque cum aqua, nulli calidior.

Extrahitur quoque succus è radice, folio & capsulis Hippophastrum, qui & cum aqua purgatam & aquam detrahit, & prope comitalibus morbis, nervorum viam, & Crispum, ut Dioscorides tradit, curat.

De Euphorbia.

CAP. XXI.

Euphorbia.

Acroephorbia.



**EUPHORBIA** oblonga, crassa, & virentia sunt folia, in rotunda ac tereti. Siquis capulis circumferentia vulgè, sic dicitur Galeo Melopeponem tunc oportere, resistere, si non aptè, & emittentior, & albicansibus sive plantis, duplici fere ordine, observentur. Effluens valentia liquor vehementer acris & mordax, facile concretio.

Dioscorides, Euphorbiam, inquit, Libyca arbor est, capulis, sic, ad est, Ferulaceis prior, ut Ferulae speciem, ostendit, quae in Mauritania monti Timolo reperitur, succo referto acrimo, quem cum timore colligunt eius regionis homines, ob usum eius ferunt.

Plinius herbam esse Euphorbiam ait, & è in Æge Arctano extra columnas Herculae portus. Differens autem & multum distantes montes Timolus & Arctus sunt. Nulla Tunc nomine in Libya, aut Mauritania monti Geographis refertur. Est Lydia mons Timolus Afium montis. Possit in ex pluribus Dioscorides pro Actioe perpeti Timolus subditur. Ioannes Leo in Aphrodisiensi libro. xx. ex uno folio, ait, ut ipse nominat, fructu, xxx. aut xxx. quandoque proscure scribit, è quibus maxime & vulneratis succos efficit, led è malis, qui in morbo comitalibus concretis, neque inde colligunt.

Natura facit Euphorbiam Anno M. D. LXX. Bene scilicet in area collino ac ditissima horti-  
ca in Boforo, vni vt generosissima, ita & doctissima, à quo vtrumque conuulsum folium,  
in plura multiplicatum est, & radices demissas, ubi apud riuulos diuisas atam.

Græci prius eam *Lactuca Euphorbia* vocant. Plurimò vero loco herbam femininæ generis,  
Euphorbiam appellant. Succus etiam Euphorbicus, & quidem Colicicus quoque est.

Latini Regi Pœlerum patrumque vniuersi Mânturæ imperatoris, inuicem hanc as-  
simulant, à cum medicos Euphorbion nomen accepit.

Euphorbiam autem, succo nempe concretis quo vitatur, vehemens est calidi, & vt Galenus  
testatur, sine vitæ facultate, & tenuis partibus est, quæ quædam quædam ordines calidi & sic sunt.

Cautio violente lactea, vt quidem Mēlicus, sed & alio quatuor, vel etiam vnguentis per-  
mittunt, refrigerata autem caliditate aduersus fluxiones, inmensa, conuulsiones, neruorum relaxa-  
tiones, coarctat: prodest etiam contra diuturnas coarctatas am d'olores.

Interdum perit, vt Aëreus, Paulus, Aëlianus, & Mēlicus referunt, aqua & pituita per  
vitæ dicit, sed vni quoque non modo succus ac os, sed & ventriculorum, acies, reliquaque  
vitæ accendit, quæ ut atque erodit, vni etiam que corpus inflammant.

Quid, inquit Mēlicus, minus tenuiter terendum, & perfricandum eius acrimoniam ob-  
stantibus, calore remouentibus, & lubricantibus quorum tantam esse oportet copiam,  
vni superficies vndequeque conuegitur.

Sed difficile est Euphorbiam, nisi ita vel inuolueri, vel perfricari, vt non exurendi sua  
viment. Nam & plurimo contemperatum oleo, subinde forte inuoluitur, vt leas excutit,  
copie perfricant mollioribus. quoniam ab eorum vitæ est in eo corpus non admittit.

Tandem quædam etiam cum molle, nisi raribus diligenter obstruenda ac committunt. Si  
quando enim acrimonia eius ad nates pervenerit, mox pinguem, seruatentem que excu-  
it, ac deinde ad hanc inuoluit, copiosam penitentiam ac mucosam, tandem verò & sanguinem  
dicit: lachryma non dicitur molle.

Adhuc autem Euphorbiam acrimoniam, semper illo indigens fitur esse herba, quæ ab effe-  
du contrariis facultatibus Antieuphorbii nomen accepit. Cauliculos hanc emittit com-  
pactos, rotundos, vitæ, ac que circa eos folia quædam Porsilacæ, radices multas quoque habet  
propaginas. Succo & hanc abundat, sed nequaquam acris, verum lenis & refrigerans, adeo-  
que acrimoniam Euphorbii remouentem.

*Triphasia.*



De hac vitæ simpliciter nandum obstruere li-  
cet. Videatur tamen ad *Triphasia* species referri  
posse.

Creat & illud Antieuphorbion doctus Iouani  
Bosforo, eodem quo Euphorbiam anno: atque  
vni eam eodem perit.

*De Triphasia. CAP. XXXI.*

**T**RIPHASIA nostræ solæ expert oblonga, la-  
ca, lactea, vitæ, crassiuscula, Glabris folijs  
perquam sumptis: caulis rectus, doctusque altus, sa-  
pitio in alas diuiso, in quibus bosculi elegantes,  
medio disco lactea, orbiculato verò ambitu cere-  
les, Aëreus Antieuphorbion emittit, qui in pappo  
candi daseo ante beferentes abeunt. radix oblonga,  
corice indurata crassiuscula.

Natus, inquit Dioscorides, Triphasia in locis  
maritimis, que vni aliis, accidensque demit-  
te. Ac rati bus quidem in Belgii quibusdam mari-  
tims nostram reperitur: vt in *Zelandia* insula.  
Neque videlicet in mari, neque in sicco, sed locis,  
que vitæ in mare allit, recedens, relictis, re-  
troque continens bosculi. Translata in ad hortos  
dicitur vni viget, sed luxurians grande fit, & in fibrat  
radices conuenit.

Alius in crassibus flores facit.  
Falsissimum est, quod à Dioscoride ascribitur,  
medi nempe vni de tur colore non siccitas mu-  
tatis, & manè albam, meridie purpuream, vespere  
1 2

quodlibet, ad est. platicnicum. Sed tamen tres florum colores uno die expressi posse, veritas hanc respicit. Nam cum flores, omnes non similes, sed parvulorum & senilis perficiantur, proficiale contingit florum colores oblectari: uno quodam nempe, complexionum & delictorum. Nondum patentes aut compleri, subopereos sunt, perfecti patentesque, quales scriptura, d. sicentes pepperum cardidam ostendunt sanguinem.

Turboles, a nonnullis etiam seph, ab alias seph appellatur, ut quidem inter nothos voca referantur potest. A fler maris, aut Amelias maris, ut in nepol dicit. Arabi Scapio Turbulum Turbith nominant, & post eum Aucenna. Aethiopi tamen Græcos, Alypi sine Alypi radicem Turbith esse existimat. Mefiaci verò herba ferulacea radicem indicant. Hæc Obiens & sinam Turbith non modò à Topolis, verùm & ab Alypi differunt, nequeque etiam ferulaceam. Quod à Garcia ab homo Protopis Indigæ medico in Amaratum Indico, quam clarificat doctò Carolus Clavus Lannam dedit, delictatur, ex qua herbam cum a subsequens transibimus Caput.

Carorum Topoli radis, ut Galenus ait, gustanti acris est, & facultate calida hinc excessiva. Dioscorides radicem in vino potam daturum drachmam pondere, per diem a quam ducere refert: necquæ vimam. Conditur etiam ad alexipharmaca sine venena, siccata medicamentum.

*De Turbith ex Garcia. CAP. XXIII.*

**T**URBITH planta est radice neque magna neque longævula dodrantalis, subinde ligna, digitali crassitudine, hederæ modo per solum repti: folia profert Aldia: stem crata similes è cardido ruberita, nonnunquam omnino exalbedos.

Vilis autem medicone casus d' antea parviter, radice proxima, que garrula. Atq' huius ceteris est, quem Officina ostendunt, crassius videlicet quodam ac inana, anala: fensio ceterior ceteris, modo exceptio.

Laudatur vacua, rursus modum, fragile & plaricentis Turbith: deinde ea parruol: hæræ conseruit, quod parruoliam dicitur, & albidum.

At garruoliam non est semper sua natura, Garcia ait, sed Indi, quia videtur è garruoliam optima Turbith, necesse in olo per, solum eius sumpit ac carilicatos prius quod obliqua, aut contorque, aut leuiter vulnere, ut liquor efflueret, quo tandem densiorque concretio, cuius longum molis sustinet. Reperitur verò & quand' oque oblique conseruit garruoliam in factum, sed tamen, quò facilis liquor emicare possit, vulnere ac contorque folia. Cardidam etiam se, eodem auctore, in Sole calcicatum vultur exente sephæ.

Proxime in maris, verum non adeò maris vicinis locis, ut vnde crassalia quæ, sed d' ubi autibus autem in maris leuicis sine mellibus distillibus, & quodam in modo, potius humentibus quam sicca.

Nascitur autem in Cambaya, Sarnac, Dio insula, Baxim lociq' vicina, & in Gama, vbi plurimum, atq' vnde magna copia in Persiam, Arabiam, Adiam minoram, & Lusitan effertur. Proferit: item in Cambaya narum.

Arabibus, Peris, & Turcis Turbith appellantur: in Gazaria verò Baromas, in Gama prostrata, emu crata Gaa, Tiguar.

Habent ab Indis medicis potissimum de acens ac expurgans medicamentum, cui sibi abest, adacere solent Zingibæ, atque oblique hoc ex decocto puli gallinæ autem qui exhibent.

Mefiaci Turbith calidum esse refert ordine tertio, & crassam leuicamque plantam: itaq' hanc è ventriculo, thesæ, neruis, atque rem omnibus artibus edicere, sed inanis facultatis esse, & ventriculum subinde eo subueni perturbare, quo circa Zaphi, Maffichen, atque aromata ei permiscenda, adde etiam Amygdalarum dulcium, ipsi Amygdala, aut saccharum, ne corpus huius vû extraheretur aut emaculeretur: ab aliis cum Palmulis, Amygdalis dulcibus, aliisque conseruit, in de componenti huiusmodi (medicamentum aureo dicitur Officina appellat) quod sephæ dicitur, Officia ipsi è Medicis conseruit in vû frequens.

Datur ipsius Turbith drachma (plus minus) vna, ad summum duas. In decocto solit dicitur tres quatuorve admittuntur.

*De Ebul. CAP. XXIIII.*

**E**BULVS folis, muscario, fructusque Sambaco persifilis est, sed radicem non facit grossam, ceteris tantummodo herbaceos profert hybernis mensibus coccubescens: singulari in sunt, ac frequen ab eis articulis periculan. Sambaco: no velli ramulis ac propolis respondit: folia ex articulis germinat, ampla, ac veluti Samboci ex pluribus articulis

Ebulus



nera colari pediculis comminatis consistunt, quorum singulis ob longa sunt, lora, & marginibus lobatis, Amygdalini ampliora maximeque. flores in vrabellis candidis fructus sine acini (substantia) & nucleo colore nigrescente, in quibus semina parva oblonga nuclei longa, digenuerunt, lignum, utrimque lignosa.

Est passim locis humilibus, incolta, sicut vias & marginibus agrorum, pinguis latiusque foliis ardua, feride, sicam quae respice.

Flores Ebuli, haec Antonino memorant.

Grecis *μαυροβουλον*, id est, humidum Sambucum, vocantur. Dicitur & *Ποικιλον*, quod dicitur, quod habet Latentem Ebulum & Ebulum: Germanis *Storch*: Belgis *Storch*: Italia *Storch*: Gallis *Storch*: Hispanis *Yegre*.

Temperamentum autem Ebuli calidum quidem ac sicum, verumque ordine igneae facultatem non modo, quam in Galieno videtur, digerendi expugnandi, sed & purgandi per aliam viam & validam habet: efficacissime radices sunt: folia digerenda ac discutienda potestate praesunt.

Educunt auctore radices non modo pituitam, verum & aquosam potissimum humorem: vias idcirco ad hydropeorum purgationes: sed tamen catarrhe & vici vicia succurrunt. Purgant cum cum molesta: ventriculum subvertunt: membraque videri contra perturbant. Multis omnibus vici carum faccedis, quibus hepar ob-

ditur, ut quando ex repto morbo Aetnae succidit. Quamobrem nec tamen, nec nisi valde subtile Ebuli radices medicamentum, ut potius danda. Decoquitur in vino radix, si oculis morbo frigidis, & febris abest: alia pro affectu naturae temperanda potio est. Expurgat acris & tenuia, sed elementum multo ac magis cum molesta, praesertim prae accidit, ac deinde semine aut vel alia aromata via permittit.

Salsumque eodem modo discutitur, ut emplastris vel fomentis addita.

Dandi in Ebuli radices verum ut mollit, aperit, & assiduumque ipsam corrigere ad infusa succidit: folia recensia & tereta inflammationes mitigare cum potius impolita, commolitiorem ambulas & carum moribus utipote: autem podagrae cum adipe tamen ut latere.

*De Cucumere sphaerico & Elaterio.*

CAP. XXV.

**SYLVESTRIS** Cucumini huius prope omnibus samentosis caulis & subcorolla foliis densam arduatur, & cum quidem, qui Galieno dicitur est (vulgo Melonem appellare) videri autem aspernibus: flores sublati sunt: fructus oblongi, asperi, oblongi glandibus maxime, quoque forma facit similes, in suis vero Cucumribus longi maxime, qui in arboribus vel viti, vel tenuissimo contactu desiliunt, semen cum liquore oculares: radix casta, candida, simpliciter. Tota sphaerica vel emiser amara, veluti & reliqua omnia sphaerica Cucumini.

Paratur ex fructu huius Elaterium dicitur medicamentum, cuius colligendi consuetudo Elaterium dicitur vocari ac modis Diacordis pluribus vicia referre.

In plerisque caulis reperitur in radicibus, tubulosis, aliisq; in oculis locis reperitur. apud Germanos horrentis, feret autem lassa, pluribus inde animi facili reddunt, non tamen in radice reuolunt, sed ex seminebus sparis proferunt.

Cum Autumnum fructus maturatur, atque eo tempore, ad Elaterium colligendum colligunt.

Grecis est *κικυριον*: Latine *aspidium* & citratus Cucumis etiam appellatur: Officinis Cucumer affinis. Sunt qui Cucumerem angustum vocent. Sunt tamen inter feracis & horrentis vulgo habent Cucumeres oblongi ac recanti, quos angustos cognominant. Italia



ad validioribus per infusionem ventris evacuando ac purganda facultas reliqua eius optata  
in Galieno ad præparanda ree.

Tunc valenter siquidem hanc vim exerit, ut non modò purgans & bilem casti mè copiosissimeque educat, verùm & ab acerbis intestinis, venarumque molestiis cum officina scelerata, sanguinem & croenta libenter eliciat. Ita ut hæc de causis nec temere, nec nisi gravissimo aliquo vrgente motivo, ea firmenda sit, neque etiam nisi terro aliquo ac glutinolo permixta, quo velicior velimentia esse comprimatur, malefica vis obstruatur, & coactus per alvum permittatur, intestina minus obstruantur. Admixti Maffichen argurum Tragacanthæ, Mafes admodum.

Formatur iter ea passiva cum Maffiche, gummi Arabico ac Tragacanthæ, & Bdellio. Et hæc Maffiche etiam ad hanc generosissimam evidentem purgans est. Præparat sistem terra argillatosa, adhibitionem molliam aut exiguam habentia. Adstringentibus siquidem hanc utendi valida ac fortissima medicamenta cocticia ac refinata, maxime deinde violæras ac molles, vim ac facultatem suam perigunt. Quæ verò adstringentia permixta non habent, scilicet amarique cum labore operam suam perficiunt. Quædam sunt Pôula, & Khalih, i. e. ad Almazorum hæc appellata. Quæ componitur ex Colocythide & Scammoneo duobus fortissimis, ac certo Sagiperio, quod lentore suo amellina obtinet, & ab utroque inu-  
nata denda.

Quæ quidem compositio tam est fortissima, & quæ nec temerè, nec citra vrgentem velentem necessitatem vendam, facile tamen ac citra magis molestias expurgat, & cum moribus stomachicis, quàm plerique minora clauduntur hæc medicamenta, Maffichen utriusque adstringant, admodum.

Apud hanc ob causam venisile est & Cochus catopis Galenum libi. De medicamentis secundum loca, Maffichen & Bdelliam hæc voluisse, quæ tamen præceptor eius Quintosilem ad hoc anxiè solutus fuerat.

Virulentum Colocythidis non modò ad purgationes, in quibus Veratrum, Hemicranes, Cochus, Apoplexi, morbo comitiali, Asthma, aneurysorum cruciatibus, aliisque perniciosis morbis succurrit, verùm & totis nequaquam aspiciendis vires præstat.

Valet ad Aurium tumores & harditates oleum cum ea decocti: idem in umbones & vengafacæ intermit ac pellit, alia hæc non tunc movet, vmbilico amodè venis ad motum.

Hilberum sine Veratrum album.

Accurrit quod cum decoctionem ad in colatione dentium dolores sopit, antise Mefer.

Seritum ad mortuorum corporum confirmationem ac condensationem vile, præparatum Aloè & Myrtis admodum.

De Malobera seu Veratrum albo.

CAP. XXVII.

VERATRUM apud Veteres duo genera sunt Album, & nigrum.

Sunt autem albo Veratrum folia magna, læva, majora sine latifolia Pilagris, aut potius Genidine similia, maiora, magis virentia, lævum sinuata, ac quædam plura habentia: rotas & scrylate uterque præterea, multas inferius foliorum marginibus obstrictas, quæ in arefcente demerit, in perna vero plura profertur spicas, in quibus flores ad magna, & limatigulis sinuatis foliis habet hæc colore cardianens, quarum singulariter aut quatuor succedunt angustæ, parva silique veluti Scam: in his ferunt latum & cardianum. Radix crassa, candida, hanc longa est, cum multitudine adhaerentibus fibris, quibus etiam libenter propagatur.

Flum & alio species est floribus nigricantibus, foliisque, caslem præferunt amplioribus, angustioribus, alioque antere dentis similia.

Gaudet Veratrum album montibus & asperis, & non modò in Grecia, Italia, aut alibi calidioribus





motum adhaerentem, quod Therophrasius afferit, non inquit, sed tantum aduersis le-  
thali medicamenta, & acerosa affectiones hinc. Plures autem esse possunt Hellebomnes.  
Nam & Cerasium minus superius diximus Hellebomnes quoque appellari.

Ceterum nolite Hellebomnes qualis sit temperies aut facultas, temperiam nondum  
habere.

*De Feratre nigra.*

CAP. XXIX.

*Veratrum nigrum I.*

*Veratrum nigrum II.*



**V**ERATRUM nigri tres sunt genera, prater illud tamen, quod à Dioscoride describitur.

Primum folia praesens ex pluribus collecta, quorum singularis oblonga, lata, brava, &  
distichala sunt, veluti Laurus, sed margine utriusque à medio sursum versus serrato: caule ca-  
ret: flos in pediculi palmatum altij modicis eximpendibus, magis, immo albidis, deinde  
purpurascens, pediculis viri noc, cum vide licet à medio staminibus latus exortu filique  
increment: quatuor aut quinque consistit. Sefami modio hoc nascuntur, in quibus si rari.  
Radice subsistit in alba crassa nigrisque fibris capillata, in quibus rarietas terrae nocens.

Alterum Veratrum folia praesens simul sunt, sed angustiora, nigresca, ambrosiae non ter-  
racum simi ibid habet: pedem plus minus, atq; in masculis ex ordine d'auso, à quibus flosculi  
deorsum nutantes dependunt minores, coloris è pallido herbaceo, radices fibrosas aliquanto  
trassas, minus nigresca.

Tertium Veratrum caules habet proceriores & subinde crassiores: folia qualem secundum an-  
gustiora, quorum & ambrosia utriusque serrata: flos magnitudine flosculi: filique parva  
Sefamiae radices flos multas uti alterum coherentes subnigrescaeque.

Nascuntur Veratrum haec in montibus asperis & petrosis. Duo posteriora in Germania ac  
Belge frequentiora.

Primum circa usque Dominicum, si Hyems elementis in usque fuerit, alia mox  
seseo gila: prociuum gpus paulò firmis: ventum circa Ver, & ipso Ver.

Veratrum autem haec esse nigra, suis inter se concentricis conuicta, sed tamen ad quem ver-  
tem-ambrosiam referri debeant, non aequè expeditam. Difficentes eorum Veratrum nigri de-  
scripentes per nos exponunt. Therophrasius siquidem folio lustrato Veratrum nigrum  
esse, & fructu Sefamisco. Dioscorides verò folia Plantani ac Spheandij, Cerasique ferre  
plati



Veratrum nigrum II.



rimis dicitur. Sed idem possunt & Veratri albi radices, ut quidem Alypius & Hierodorus, et Hippocrati tradunt, ut lucus in cap. de Buphtalmo, in florum historia Persepe. locis lib. iii. scriptum.

3. Tertium genus Germanis *Emftra* vocatur, id est, Podanarius, pediculus ita tenentur credere. Placet nonnullis Aconitis istud genus attribuere. Neque etiam pediculus tantum, sed, veluti Aconitum, & omnes aliasque animalia necesse comestum ferunt. Verum hoc non modò istud, sed & reliqua Veratrum nigrum possunt: qui de causa & inter Veratrum generum hoc certum tenendum videtur.

4. Quartum Veratrum nigrum, ut quidem Galeus scribit, candido, calidum ac amarissimum, ex terro fititior, exalacianorum & resiccantium ordina.

Præstant, idem statum, sed & artem potestatem, ac melancholicos omnes humoribus oriantur dicit, non tamen intra molestem ac difficultatem. Idcirco non nisi robustis & robustissimis, ut Mesues suadet, exhibendum. Prodest autem ex Veratrum nigrum purgatio febribus, maniacis, melancholicis, comitiali morbo affectis, elephantiaci, quatuor humoribus, & omnibus huiusmodi, quos vel atra exagrat bilis, vel melancholicus humor molesta.

Modus exhibendi, Actuarius lib. v. art. sunt scripturae tres, paulò plus minusve, tamen sicutum è radicibus pendenti, in aqua paululum macerata, deinde comos dicit, ac in umbra secato, postmodòque tenui, quæ ipsi subest medulla. Dant autem ex pulv. & ormentis, verum sicuti status generis, quedam ex odore sententibus sunt inferenda. Sed res robustiorum cupi purgatione in Scammonij parvulum additio. Hoc ille.

Præstat autem inter hæc genera purgationem, deinde secundam, quæ in maniacis fieri solent. Exagrat verò Veratrum nigrum etiam albos, hæc bene, hæc præ, ac plenas: in illa melancholicam indit, calidum duobus aut tribus diebus, ut Galeus ait, detrahit.

De Veratrum nigro & infusibile. CAP. XXX.

**I**STUD Veratrum nigrum, ut Dioscorides scribit, folia habet viridia, Plurimo furta, sed immota, ad Sphondylii folia accedentia, sed fissa magis & nigriora, subsæpera: cuiusmodi est: flores albi purpurei: omnes sicut homogenei, sicut mare interiore, & in ipso fructu Cicuti milia radices solent tenuis, nigre, veluti à quodam capitulo Cepti simili dependunt, quæ

quæ

*Veratrum nigrum* Linn.



quarum & vna est. Aequè ita verba ipsi Dioscoridis fatiunt, & quibus manifestè, aliud omnino ab eo Veratrum nigrum describiti, quàm à Theophrasto, de quo capiti antecedente.

Comitate autem cum hac Dioscoridis descriptione fieri apparet, quod de alio de modo, pro Dioscoridis Veratrum nigrum expressum sit: folia enim in primis emulsa, aliis quos emittentes angulos, & vnaque in cœcis habens, nullas foliorum Ficus, Vitis, Acetosi quoliam Plantas esse ab aliis censit, sed tamen prædictis monentibus Sphondylii folia sint etiam accendi ut, non quidem tota ac integra, sed singularia eorum (ex quibusque enim totius folij Sphondylii compolito est) profundo tibus tamen fissura diuisa: eadem futuram colore nigrescent, & aliis quantum aspectu ferit. Caulis robustus est, pede altior, nonnulli striatis, quo superius in ramosos drasis, compositos prædicum veluti lateres calypce, difformem nitat, qui simul roroni quandam referunt effigiem præferunt cœliculis flaccidissimis, quibusque decoratis nonnullis, quam & latius calycis multiplices flouculæ aliquo quoque modo exhibere videntur. E singulis figuratur, hoc est exemplares sicut fari, vel in Scabro, excurrunt. Sunt etiam illi, ab uno colore nonnulli purpurascens, sicut, ut Dioscorides ait, Adalphi semetipsum. Semen inde in istum subsistentem calycibus, cardisiam, oblongum, ferit in Cœcis, sed tunc tamen de tenuis ac ad perinde hinc.

Rubrescunt sub sunt nigri, quàm aliter nigri Veratrum tenuiores, ab uno exiguo capitulo consistit, in nouella quidem plantis. Nam in veretibus etiam multiplicatis a pluribus de-

Reperitur in Germania plerique montibus, & aliis incultis ac asperis locis. In horta vna est. Dioscorides etiam in aspera, et in sic sitientibus locis Veratrum nigrum esse scribit optinuum quod ex cœcis in loca accipitur, quale est, inquit, quod ex Anticyra petitur.

Floret autem istud Veratrum nigrum non Hyeme, sed æstiu mensibus. Tota autem anticyra vna.

Rozemarsium plerique Africam nigrum: alij Sarcicula ferunt vocantur. Differt tamen multum ab Asia Asia, que de his pariter, umbelliferis herba. Sarcicula enim perquam parum similes est. Nobis diu vna est, non quidem Theophrasti, sed Dioscoridis Veratrum nigrum esse. Respondet forma, ut vocatur: consentiunt etiam vna. Nam & tunc utque hæc omnia ad hoc hinc expurgare, tollit habentur in Germania nonnullis emittentibus, rursus emittentibus, qui his metantholico purgatos feliciter ad finitatem redierunt. Purgandi quoque hæc facultatem adesse, testatur etiam Cornelius Celsus in epistola quadam ad Adalphi Orosium, in qua Africam nigrum Heliboro albo ferit similitudinem vna, sed tamen motum, & per alium purgantem primum se expertum referit. Que sententiam nostram, & Dioscoridis Veratrum nigrum esse confirmant.

Tribuit autem hæc omnia etiam eis ad inculturas Dioscorides, que superius ascriptæ sunt. Semen vero in usum Anticyra Sclimoides vocant, et ad purgationem vna esse. Similis genera de non vna est. Iohannes. Videtur autem non omnino integra. Nam si Sclimoides, ut Plinius ait, & vox ipsa testatur, à Sclima similitudinem nomen habet, improprie hinc Veratrum nigrum ferit, non Sclima, sed Cœcis emittentibus Sclimoides autem vocatur. Jam & Sclimoides sui generis serps est. Ex his aliis hæc verba Dioscoridi accessisse suspicidum: & ferit ex Theophrasto translata. Scribit siquid Theophrastus lib. ix. Anticyra fructu Veratrum Sclimoides sit purgare Heliboram, inquit, non solum radice, sed etiam fructu vna est. Si quidem in Anticyra, ut ferit, fructu eius purgantem. Deinde in finitibus Anticyra fructum Sclimoides Heliboræ dare solent, qui Sclimoides similes est. Quibus verbis Theophrastus Veratrum fructum Sclimoides quidem similes referit, sed Sclimoides peculiariter ac pro-

*Diopatra*  
fructu  
purgantem.



Rhizoma Rhei, ut vocantur, arca.



Elmatis vixit non nigra, ut tubera, ut tuncquid & parva latera de ad Crocum vergen-  
tibus veluti Crocum, & alia crescentibus. Cuius Indica radix Dioscoridi nigra est. Sed  
tunc potest & pro Cinnamon magis per ceteros Cuius habitus est. Verba eius haec sunt:

Rhizoma dicitur ex his quae supra Positam sunt regionibus. radix Cuius nigra, hinc  
nisi & rufior paulo, sine odore, calidiora gustu & adstringens. Eadem enim vix colorum  
nisi ad Crocum inclinat in.

Officinam autem Rhei non est multo maior, cuius flos, & amplius quam Cinnamon  
maiori quae sunt nigra, maxime ut verò, recens quidam, cum videretur quaedam colorum dicitur ex  
papaveribus, ut rufior ex subituro fonder, sed amplius à terribili bus exco: in mandendo  
deponit illi glutinosa ac viscosa Croci coloris referet, quem pappo autem hinc, candida rei illi  
transmittit, & exprimitur substantia eius, neq; dura solidare, neq; granis sed leuissimae, ac in-  
terdum obpallidive ac siccum veluti media, nonnulla fungosa odorata erit & graui spum.

Adferat ex Sinarum ( vulgò Cinnamum ) regione, quae est versus Orientem, supra In-  
dum, eam enim, quae extra Gangem: haudquaquam verò ex Sinarum provincia (vix  
neque transmittant) quae in Arabia est, & longè à Sinis abest.

Appellatur vulgò Rha Barbarum, aut Rha Barbaricum, à nonnullis Rha Barbaram, quod  
in Africa: Arabia, quae Barbarus cui vocantur, adhaerent. Radix Parica & Arabis Rhaed.  
Sui nominant à Sinis pro incenside in Indiâ, Persiam, Arabiamq; ac postea in Europam  
inferiorem. Eiusdem speciei cum Posita est, quod Graeci sine & iustissimi Rhaedem Corcicum  
Gallia, & etiam Posita. Agnata Positam radicem appellat: Mefines Rhaed Tunicum.

Et vixitque eodem similibusque substantia coloridem recentium: idem incensurorum:  
concreta glutinosa in lentiora parum, eisdemque, Graeci videlicet amatum, colorum  
mellum & odor quae Posita, & quidem haud est infusus. Id quod eadem emittit  
exponere cognitam habemus. Nam hinc radicem ab excellentissimo viro Iacobo An-  
tonio Corcico, amico nostro olim accepimus, haud parum odore suavitentem.

Dioscoridis eius exemplar <sup>non est</sup> id est, odore destituit Rha esse habet. Sed pro <sup>radice</sup> dicitur  
formis hinc hinc dicitur. Nam olim Verum omnes Rhae tenentur, quodam <sup>non est</sup>  
confiterentur ad ille parte, eodem in quoq; vix esse amare videntur. Tenent eorum ab <sup>non est</sup>  
substantia odor committit. Odorata enim remissa sunt cetera. Neq; nec ab hac <sup>non est</sup>  
tenent. Plura dicitur debet. Potius enim ipse, ut & alia, in depravatum uelisse codicem.

Nam de ab illo tempore nonnullis locis corrupta ac depravata fuisse Dioscoridis exemplaria, non aliter, vel ex sola Orcheas de figurone manibus, apud omnes profanos, quos qui Dioscoridem, exantia corrupta videlicet ac depravata: ut cap. de Orchea in floram hinc Perseptade secunda ostendimus. Verumque autem est Pontici Rhæ, non est odore destituta.

Flumina autem Rhæ sibi nomen adoptant, in ceteris superius, ut Armonia, Marcellanas, nascuntur. Oritur Rhæ ex Hyperboreis Septentrionis montibus, & per Asiaticam hauriam delatam, in Caspium sine Hieracium labitur mare.

Mollam autem Rheon, & substantiam, & temperatam ac facultatem obtinet. Sicut enim patet quaedam ex herbis, adstringentes & resiccantes sicut tenuiores, aliter, calidæ & pinguis.

Quod autem a Dioscoride ad mirabiles, sicut machi umbellinorū, & omnes cras dolores, tum afflicti, tum colici, hepaticos, ut hinc eos, tormina, vesicæ & thonsæ vitæ, præcordiorum distensiones, venæ affectiones, coxendæ in dolores, linguarum spasmus, ut, ut partiones diffiles, singultus, dyknetrias, costiacas passiones, cetera suscitabiles & venæ nascuntur motus, viderentur hinc & impingens cum aceto illitum ait. Galenus etiam supra, exensio, & colicæ præter prædicta singula non quæ spasmibus coarctatæ sibi.

De expurgatione autem facultate noster quodquam scripsit. Non fuit Rhei ad purgationem isto seculo vitæ. Quod in eo reate ac streuam, incedunt enim adstringendæ portum Galenus existant. Nec enim, inquit, relinquitur terrenis frigidis, reate sicut in quod quid deducat, & in alio perdat, vel rationis effectibus causa est. Cum tamen hoc ipsum dicitur ac tenet purgationem, ac oblationem, & adpendendi vitæ obtinet.

Præter Argemone primus videtur Rhei expurgationem facultatem & locum habere, libanum primo, cap. x. ubi Terribitum in uter ea, quæ sanis sicut sub dicitur, conerit. At cum magis, ut, sub dicitur eam cognationem, Rhei momentum admittimus. Sicut Arabes ad vitæ in ipsam medicam vitæ in purgatione per quos quoque illud, quod est sanum ad dicitur regione, præceptum. Præter hinc illud est: Ponticum sine Turcorum dicitur, non tamen purgandi vel delatorem. Repertum & quoddam in Turcicæ vitæ Saranata, sed impotens, & non nisi reate reate purgationibus vitæ: ait Garcia ab Oria.

Optimum autem est reate, à terribitibus non exensum, & decoctionem non expectat. Ut enim Galenus, Avicenna, & Mesias, decoquitur reate, & expresso succo, iterum dicitur. Tale purgatione facultate omni, aut quasi delatorem ait, & magis adstringit.

Separantur enim maceratione ac decoctione hinc sicut vitæ. Calida, vitæ, purgata, & apertum in hinc in transferunt, & tamen reate reliqua tenuis adstringente subtilis. Desis quod decoctum aut maceratum est, Cruci non, aut partem sicut colore, & sicut in varietate, sicut ipse sicut sicut sicut à terribitibus perforatur.

Expurgat autem Rheon per inferna hinc flavam & quandoque puritatem in proceris hinc omni.

Vitæ ac comoda ex eo purgatio omnibus quos hinc flavam in sicut, ut laborantibus & reate & tenuis sicut, ulceris, hepaticis, consistit in pleuritide, per proceris, aqua, infaria, furor, vitæ, vesicæ & omni in inferna partem in sicut in sicut, & sicut in vitæ sicut sicut sicut, tam exterius quam interius.

Vel sicut cere Rheon reate & sicut laborantibus reate sicut sicut, præter enim quod hinc sicut purgatione expurgat hinc, & ab oblationibus hinc reate expedit ut, reate quæ maxime in sicut sicut sicut: ut ve hinc reate, Rheon vitæ hepatis, à sicut sicut sicut videtur. Commodissima enim ac utilissima talis esse sicut sicut medicamenta, Galenus in sicut sicut sicut quæ videlicet mixta habent cum expurgati & sicut sicut, adstringendi partem.

Modus hinc sicut à dicitur vitæ ad dicitur in reate vitæ vitæ cum medio ad dicitur. Dicitur aut macerari in calidioribus quidem morbo cum Cachectis, litybæ, aut sicut sicut sicut sicut, aut sicut sicut sicut, vel cum sicut sicut. Si ve reate abest, ex vitæ sicut sicut.

Exhibetur quandoque & colitur, sed ut ve nulla cum partem vel sicut sicut sicut sicut: utale dykneticis & costiacis auxiliare, expurgata sicut sicut vitæ hinc, dicitur deinde reate ac cohibet.

Sicut sicut, eodem sicut modo, & superfluous mensis, sicut sicut sicut sicut sicut, partem per vitæ, sed in exigua quantitate, & cum adstringentem aliquo proceris. Inocentium, inquit Mesias, Rhæ medicamentum, omni tempore, sicut sicut sicut sicut sicut sicut sicut.

187

# STIRPIVM HISTORIAE

## PEMPTADIS TERTIAE

### LIBER TERTIVS,

#### DE CONVOLVYLIS, ET IIS QVAE

##### ALIAS INHIBENTVR STIRPIBVS.

PRAEFATIO.



**DE PROXIMO** à Purgantibus ordinem gestant vicini sibi implicantes, & amplius tractantes. Nam eadem inter has multae purgantibus ut valde effluunt. Sunt & aliae non tales, sed quae in circumstantiis fecunditatis, similes, sive conuoluntate erant, exceptis tamen leuissimis & innocenteris, vel ad frangenda et ad aliarum histortarum pertinetibus. Tertius igitur hic liber superius habet admittendis quae, vicini sibi implicantes, aut prope adstantibus insidentes.

### DE SCAMMONIO.

#### CAPIT. I.



**SCAMMONIO** multa ab eius radice erant longi, tenuis & viticulosi cauliculi, quibus vicini fructus, pedamentumque suum posita collegerunt, ac multae circumuolutioe hinc amplexantur folia eius lata & acuminata, sicut Stralises erant: Bases similes, caliculi quoque, ferunt, candidantes, paulo minores, rido subbeli longa, crassi, candidi interni, ex quo succus colligitur, qui denticulatus ad modum eius visus scruat.

In calido, purgatur solo, veluti in Asia Myia, Syria, aliisque similibus. Repertus & in Creta insula, Bellouuo teste.

Verisimile est, sibi saxe spontis est, citò & plurima deinde Aethiopia parte florere: nam & in Belgio Aethiopia mensibus subinde cum flore videntur potest.

Graeci *εργασμαριον*, Latini sicut Scammonium nominant, et appellantes non modò superius ipsam, sed & densatam conuolutamq; succum. Dicitur & à nonnullis *εργασμαριον*, ab alio *αυτομαριον*. Officinae succum erudum quidem Scammonium in Cetero vero malo delectò, Diagridium vocant: quòd *Αεγυπτιον*, id est, Iechrymalum.

Purgat autem hoc succus per inferos ventrem vehementer, nulli aliorum purgantium medicamentò potens uolens. Nulla enim pars, ut Orbanus ait, superat ab iniquo agere & commouere.

Etenim istud non vehementer aliquis calida succum, sed alia quodam latente: roris sub fine proprietate. Nam gustu quidem nulla in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuiusq; siquidem liquoris sui rei permittitur, nullam ei vel amaritudinem, vel acrimoniam, ut aliam ingratum si poenam commoueat. Quamobrem nec inter calidissima, ut plerisque videtur, sed inter moderata calida & sicca habendum.

Exergo autem & educti potissimum bilem fluxam, feculos item tenuesq; humores, & quodopae pituitam, ut in nullo casum magis quàm in liquoribus medicamentis, ut Paulus tradit, nocuum est Scammonium. Me succus uerbò non modò viticulosi graue atque inolectum, tenuis & intestinis plura abradere, interius viscera erodere, venterm ore dilatare, totumq; quoque factò dicitur esse in cordi visum usque in liquoribus obesse. Intra denotum & roris

oportunitatem idcirco eius usum anxia sequuntur deliqua, ventriculi subiectiones, alia facerent, dysenteria & tormina.

Occurrit huiusmodi eodem auctore, si Scammoneum in Cotoneo male decoctum, & mucosaque Pills, Prunorum carne aut succo, aliave leni similibus facti, permiscetur aliis Maffiche, aut aliquos moderatè affragantibus.

Plurimum nocum cum nulli posse affirmare advenit. Alibi: Scammoneum, inquit, dissolutum stomachi fieri, bilem detrahit, aliam solvit, prescripiam si adveniat alibi drachma duas, oboli vna distribat. Quod & Orbasio probatur, Synopsidem lib. primo: & Colicidum nunc Medicinalium lib. vii.

Ventri Scammoneum in malo Cotoneo etiam decoctum, sed ornato Scammoneo ipsum malum edendum probaverunt, quod absque stomachi subiectione aliam subducit, ut lib. primo De facult. alimentorum Galenus scribit & in De simpl. med. facult.

Officina Scammoneo in potio preparato vincitur, quod, ut diximus, Diagridum vocat, & compositionibus omnibus ferè crudi ac non preparati Scammoneo loco adhibetur.

Paracetri in usum anodina sine electaria duo, sursi similia, vtrum ex Pills, cum uerber Maffiche, absterum ex Prunis, quod ad Nicolam refertur inuentorem. Quæ alijs Scammoneo temperationem & correctionem excogitata sunt, & ad febres asiduas, intermittens, adcoque omnes ex illius tale morbos commendantur. Maffichem & Scellum compositis Cochlear, quæ sursi magnam Scammoneo quoque admittunt quantitatè, advenit Galenus lib. primo De medic. secundum loca, quod & in cap. de Colicidum admittitur, vbi de Maffiche aliisque adstringentibus, quæ ad correctionem vehementius preparata admittunt solent, Iustus expruit.

Modus autem Scammoneo, vel etiam ipsius Diagridi, ut quidem Maffiche scribit, à quibus est quæque ad x. aut xii.

Serum potest, eodem auctore, ad usum quatuor. Plurimum post huiusmodi pariter est certis. Vna, ait, huius, nec arit nec potest vale.

*De Simula leui maiore.*

CAP. II.

*Simula leui maior.*



**S**MILACIS herbe duo apud Venetiam repuntur: asperum vtrum leui-terum. De illo postea, de leui maiore.

Huius autem speciem aliquot sunt, quæ in hoc capite comprehendit: quidem postea, id quicunque sua nomenclaturæ, singulis locum explicabuntur. Eius autem quæ in potio dicitur, vna in asper alia maiore est.

Maior viticulosa ac furcata caulis longa ac tenuibus sursum ac deorsum sub- bus, fraxibus, vna usque septem cubito- rum circumligaturque: folia elliptica, hinc- raxo, sed mollitate, serugantiorque sunt: hinc- raxo, copiosi, rotundi, calidi est, colore candidissimi ac Luteo crassissimum angulosum, frofido colore nigrescit, quæ- raxo fraxibus Lupinus propemodam simi, raxo ex omnibus membranis, contere- raxo longe, crassissimus circa simi, ma- raxo candidior, hinc illis per o biquam, raxo- raxo tamen suppositum formatur.

Repuntur passim circa fraxo & raxo quæ semel comprehendit loca, argentea dicitur adeo pericula vix radice sunt.

Albus mensibus copiosi dependentium, astore conspicui.

Græci *μαϊάξ λεϊ*, Latini leui maior à Galeno & Paulo Agneta, etiam *μαϊάξ λεϊ* Læus cognominatur, quod Græcis *μαϊάξ λεϊ* hinc raxo raxo.

Differt ab hac Dolichus, quæ & Simula be- raxo.

gratia, item & raphae arbor, quam Latini Taxum nominant. Recensetur etiam Smilacem hic, Volubilem innotent, Campampellam, Fancum arborum, Convolvulum album, & Smilacem lucis quocumque vocat, Pharus floribus lib. xxi. cap. v. Convolvulum etiam nominat. Est-  
 Smilax quaeque Ligustrum, non quidem frutex, sed de quo Martialis Epigram. lib. primo,  
 Erucas in Proclibus:

*Quidem me cupis, rursus Proclis  
 Fere candidior pulchra cyano,  
 At rursus, rube, lilio Ligustris.*

Et Virgilius Aecloga secunda, hoc conatur:

*Alba Ligustra cadunt, varietate nigra Ligustris.*

Smilax seipsum Virgilius inter species Ligustrum ait, foveat candidissimum, sed & sufficitur In-  
 veniendi filios autem nullus hoc forte neglectus magister, cui videri haberet. Quod si  
 non Ligustrum ligando nomen sortitum, Smilax haec vine Ligustris, vixit & in sim  
 omnibus necum hieat ac curat in plantis plurimum pharus. Geimoyi. *Widderhagen*  
*Rege Wido de Tapanen Gali. Ligustra, liser nominant. Italia est Palsidus magister. Hispania*  
*Campania perna.*

Vires autem hanc Galenicae species Smilaci quodammodo similitudo esse videtur. Semen  
 item Dorypno bibatur, infusio multa carbentia efficitur fortis: uictus Diodorides.  
 Ficus est autem effiacq esse herbam omne.

*De Smilace lucis minore*

CAP. III.

*Smilax lucis minor.*

**L**UCIS Smilacis minor species, innotent  
 lans refert, sed humilior, venetior, ac om-  
 nino minor: rursus illi quoque, & vicidiosi can-  
 licata, nonnulli quorum in humis repant, ali  
 bus frugosque fiunt, & caetera cum volu-  
 nibus ruerunt: folia oblongiora, Herbicetis  
 rariora, mollia ac brevia: flus similitur caltheo-  
 des, nonnulli odorata, plurima parte albidus,  
 velutente tamen in eo dilato rubens, ut purp-  
 colores; & radiatos stillo effige: stamen suble-  
 quante rugosum, radices paucae, candida, velu-  
 ti prout sparguntur.

Cigraet in cultis ac si frequentius, non ta-  
 ro eadem & in neglectis, ac foveis marginis a-  
 grorum: frugibus plurimo profertur casu-  
 tu in ostra.

Florat viderem maiore.

Recensentes Volubilem innotent, & Con-  
 volvulum minus appellant: Germani *Alm*  
*widderhagen: ad est, Cypri latine: peris Liferes*  
*Galli: Insi Palombus minor. Lucis Smilacis*  
 speciem esse, neque aliud referendam, sicut ma-  
 nifestum. Non desunt tamen, qui Helveticum  
 esse velut cognoverunt Cassampellon. Sed pro  
 hac nos aliam ostendimus.



Non desunt tamen Chamacifus, quod quosdamque suspicant. Tamen tamen cretam foliorum, ra-  
 melorum, & radicum figura & color de scriptis non, que passim extat, conformes apparent  
 & itaque spectos ac elegantes. Leucis aliquo modo comparari possunt: atq; hanc aliam  
 non non minus quam Cassampello conuenit, non idcirco tamen Diodorides Chamacif-  
 sus Vixit quoque ad esse oportet, que in hoc Smilacis specie de fiderantur Chamacifus cali-  
 do hancis folia est, hanc vero nec artem radicem nec caliditatem vilam obtinet: gustata  
 liquidis qualitates nullam exeret, magis frigida quam calida. Quod hanc nullatenus  
 Chamacifum esse, abunde ostendit.

Ipsam autem est, nullaque rita herba.

*De Smilace terrestri, seu Chamacifis.* CAP. IIII.

**T**ERRESTRIS Hecera humilis est herba, à terra non amollitur: vitata non pete ad-  
 mancula, sed in viti innotent longi radice, ramibus, viticulosis, aliquando lunt angulo-  
 k 3





*Galenus* enim sibi demonstratam lib. xvi. cap. iii. refert.

Chamaecifium nomenclaturae variae inter morbas occurrunt, & aliquot quidem distincti-  
jim supponit inter se consistat. Vt, *Chaerophyllum, alium, diaphanum, rubrum, &c. crispum, Hedera*  
*plantatica, Chamæleone* autem proprie *Tussilago* est. *alium diaphanum, Hedera* sicut in *Selinum*  
appellato multo communius est: *per capulum, sive Conocarpum* nomen huc veni debet, ut  
noto siquidem velum. sicut late: *quasi ramulis terram coronat. Hedera plantatica* velis  
nam appellari potest: nam per plurimam caeli tempestatem moxque luxurians.

Coverum fuisse: *Hedera* verissima calida & sicca est, & quia a *maia, abibergo* v. *Ar. vifco-*  
*sa* obstruccionibus liberare parat. *Adhaerens* tamen & fundatam commendatur auribus  
aperta. *Matthioli* strugum cur faciem permixtam cum cubofo ac filuloso videri sibi *Ph-*  
*loradiben* refert.

*Dioscorides* *Chamaecifii* folia lichyadiis trioboli pondos in aqua cyathis tribus ad dact  
quingenta aut quatuaginta pota auxiliari refert: eademque morbum regium expurgare  
saniter sumpta, ad dact. sex. aut septem. *Galenus* omnem (v. *diarrhoeam*) faculratem floru-  
pulsam *Chamaecifii* flor, aut, cum se admodum amarus, secus obstruccionem liberat,  
tamque ea curandis laborantibus.

*De Soldanella.*

CAP. V.

Soldanella.



**L**ÆVIS Similacis generibus veris etiam af-  
ferenda *Soldanella*. purge hanc per ter-  
ram gracile, viscosos, succubentes caulicu-  
los, circa quos in longioribus pediculis, folia  
*Hederaceo* tenuia, splendens, sed laeta, & feb-  
erenda: flores caetero formam similes refer-  
unt, dilute purpureo colore labrant: semen  
in rotunda folliculo nigrum. radix oblonga  
tenue. Saporis herba amarum ac subsalsum  
à naris conturbat solo. Nativiorum in ma-  
ritimis.

Reperitur verò non modò in Italia, aut *Gallia*, verum & in *Zelandia* insulis, *Flandria*, ac  
*Hollandia* insulis.

Æstus mensibus flores.

Recentiores *Soldanem* & *Soldanellam* vo-  
cant: *Belge* *Zinniboid* est, *Convolvulum*  
maritimum. *Dioscoridi* est *agrostis* *maritima*.

Calida autem & sicca temperie *Soldanella*  
est, & tenuis quidem excoctis, vel amara, salsu-  
ginem cum acridine quadam refert, gustabi-  
literius qualitas ostendit.

Altam purgat, cruda & aquosa detrahie,  
hydropicis curlicur vasis: aduertitur tamen  
ventriculo: torsiones & molestias adfect: plus  
sistende incommodis, quam auxilij conferit.

Tristatur huc quoque *Dioscorides*. Tota,  
inquit, herba stomacho incommoda est, acris,  
altum maximè folius, coctis in cibis sumpta.  
Coquant cum ea quidam, ad obruendam  
acrimoniam, pingues carnes.

*De Convolvulo nigro sive Helicis Cistampela.*

CAPIT. VI.

**A**D SIMILACIS lævis genus pertinet quoque, quod *Convolvulum* dicitur nigrum.  
Hinc pertinetes multa Cirorum insula subrubentes viticulis, quibus fru tibus, omnibus  
quocumque conuigit vitium, sese crebris circumvolutionibus implicat: ab imò ad sum-  
mum usque: folia laeta sunt, longa, & acuminata, *Hedera* folio molliora, tenuioraque: flo-  
res ipsi racematis coluntur, candiduli: semen triangulare veluti *Fegoppii*, sed minus &  
nigro respersum colore, sensibus, subrubens obas membranis, veluti *gluguis* integrum, radix  
tenuis brevisque est.

Consolida nigra.



Plant. hinc  
nunciat  
magis

Campana cardua.



Ornith.  
del.

laxa simpliciter, & frequenter in vasis  
piscis.

Vnde tempore siccitatis perficitur, et quo  
nec alunde, pramo Vere hinc rorant.

Germania *Editha* appellatur, ut et *Consolida*  
nigra, aut *Volubilis nigra* dicitur, rorantibus  
Volutis media.

Diocoridis in *hijis* tractatibus Democritus in  
Geoponica, *consolidum* Latini Melitriaca.  
na. Calsiampelos autem cognominatur, cum mo-  
do ad differentiam aliorum Helianthi, que et  
Pantonia, vocantur quod et Vitis, cuius am-  
plexibus Imperatorum circumstantur.

Reperitur hinc et in multis aliis, in exemplis  
quo de are, hinc *Vergilia* vna est, deinde  
appellatur *consolidum*: sed Radix *Con-*  
*solida* editioes magis probanda. Pluribus  
et in *cap. vii. dicit de hoc Helianthi, sed de hoc*  
scribit. Exemplaria perperam Helianthi pro  
hinc habent, hinc vero *Chamaecrista*.

Facultatem autem *Consolidam* Medici  
grum competentem aut probam hoc tempore  
nullam habet. Diocoridis solum Helianthi  
Calsampeli factum, vim habere ac solum  
abum il bibatur.

De Campana circulari. Cap. vii.

**A**CCIDIT hinc *legium* *Consolidam* in-  
nem oportund enim *Quas* *vulgata*  
cupata *Lanaria* est, *cardua*. Longioribus,  
virescentibus hinc prope *concoloribus* *quibus*  
res *postquam* *concoloribus* et *angustis*,  
crebris *levis* et *implicans* *voluminibus*, *distin-*  
*ta* sunt et *angustis*, mollis, *repente* *angustis*  
*Hederis* foliis *maxime*, *non* *in* *coram* *levis*, *sed*  
*notanda* *in* *levis*: *floris* *vulgata* *Stylis* *levis*,  
*in* *floribus* *levis*, *sed* *per* *ota* *angustis*, *hinc*  
*in* *cardua* *perperam*: *levis* *angustis*, *in*  
*dico* *trunc* et *levis*.

Peregrina hinc *stirps*, et aliunde *illa*, *sed*  
*nem* *levis*, *si* *cardua* *levis* *levis*, *in*  
*levis* *floris* *levis*.

Campana, *velut* *levis*, *Latina*, et *Campana*  
*cardua* *levis* *levis* *levis*: *aut* *Con-*  
*solidam* *levis*. *Exemplaria* *levis*  
est *nigra*, *cuius* *levis* *levis* *levis*.

*Per* *levis* *levis*, et *nigra* *levis* *levis*

*levis* *levis* *levis* *levis*, *levis*.  
*Sic* *levis* *levis* *levis* *levis* *levis* *levis*.  
*levis*, *hinc* *levis* *levis* *levis* *levis*, *levis*  
*levis* *levis* *levis* *levis*. *Nam* *levis* *levis*  
*levis* *levis* *levis* *levis* *levis*, *levis*  
*levis* *levis*.

Sunt autem qui hinc *Campanam* *levis*  
*Nil* *levis* *levis* *levis*, *de* *quo* *levis*.  
*Quod* *levis* *levis* *levis* *levis* *levis*, *levis*  
*levis* *levis* *levis* *levis*. *Illud* *levis* *levis* *levis*  
*levis* *levis* *levis* *levis* *levis*, *levis* *levis*,  
*levis* *levis* *levis*, *levis* *levis* *levis*.



Smilax aspera.

Zarza  
Parilla

Nonnulli, quam ex Peru Americae provincia ad uellam radice facientes uocent Zarza quoque  
Parillam ex uera parte, huius Smilacis radice esse affirmant. Et si uidem quidem hinc Zarza  
Lopis Lusitanus, sed tamen eandem esse non concedit. Reperitur in Hispania insula,  
qua tamen uel non in eo aliquo discrimine differant. Differentiam etiam ead. *Isidoro*  
lib. 6. c. 1. dicit.

Zarza Parilla Petrus Petrus est, & è uera Orbis huius Americae provincia uocatur.  
Que autem illinc duobus uocatur, licet etiam in Europa non similia uideantur & sic, etiam  
tamen non raris differant. Neque enim sibi ead. que diuersa, ad formam modò uariationem  
aut alterationem facit, sed plurimum etiam ad qualitatem uirtutumque remissionem  
aut intentionem confert. Calidius locis etiam petrus non raris odorosiora que sunt in  
his. Quae dum perniciosis uirtutibus inuolunt, & uirtute redduntur. Ita Zarza Parilla Petrus  
na tamen è Smilacis asperae huius Zarza Parilla Hispanicae similitudo, temperata tamen ad  
caliditatem, cum & ipsius sibi generis, longè efficacior est, quam uel in Hispania aut etiam in  
Africa uita.

Sunt etiam Zarza Parilla ex America radices (quae sibi adhaerent) longa, & truci,  
transiuntibus uulgare Glycyrrhizae radicebus similes, ab uno compenditae dependentes que  
doque capite, in quibus modis duntaxat uocantur saporibus sunt exigua, & edere non potest  
proprie. Feruntur igitur in Hordana Peru provincia. Nomen è si in illiusmodi uocantur  
licet acceptent.

Apud indigenas sibi è uocatur, quod Latini spiritosam quoque uel fontem, Garcia Lopez  
Calidi uocem & sibi rem peruenientem sunt, partiumque ad ead. uocantur, ut eadem sibi  
quam sibi è sibi uocantur. Amulorum capitisque durissima delictibus, sibi è  
afflictionibus uirtutibus, omnibus uocantur malis, cura tamen sibi, profant, quae sibi è  
licet uocantur sibi è.

Sufficienter ad curandam praeci. dicit, lesionem morbo: mian aut diterram mian, de  
mianem curandam, postulat.

Que uel è Hispania aut aliunde Zarza Parilla, huius Smilacis asperae adfertur, mianem  
curandam.

**S**MILAX aspera radice aculeata ac spinosa  
Hortet exilibus ramulis, quibus per sepe,  
fruticosa uicinis quaeq. ambrando amplius  
doque ab uno ad facinora repti solent emittit  
Hederæ, abique angulis acuminatis, uocantur  
durus quàm leuis Smilacis, quanteque  
edulis maculis notantur: flores candidi, edent  
fructus in exiguo racemo uisit. Labesca, cum  
emittunt rubens leuiterque modis, in quo  
femes puniceo colore in gignens, è Smilacis  
bus, radice longa, & quantitate uocantur, &  
in plera diuina uocantur.

Est loca ad peris, uocantur, in qua sibi, mianem  
apertam, in mianibus & uocantur  
negandibus quidem ead. dicit, ut in Italia, Naxos  
Galha, Hispania, Africa.

Flores uocantur, fructus Amulorum uel am  
lo mianem.

*Smilax aspera* Graeci appellant. Gau  
Theophrastus interpret Hederam Galianam  
mianem, uelut & Plinius, qui & Nicotianam  
cognominatam scribit lib. 22. cap. 2. Hederam  
Hederam sibi, & Rubum uocantur:  
Hispania Castellana, ut auctor Linnæus,  
*Zarza Parilla*, quod Rubus uocantur. Zami  
quidem, eodem uocantur, Rubum, Parilla,  
Machado interpret, uocantur & Parilla  
uocantur huius uocantur. Dicitur huius  
uocantur, uocantur, uocantur, uocantur, uocantur,  
uocantur, uocantur, uocantur, uocantur.



Dioscorides item ad icis factura Vite experna, huiusque cum aqua multa, puritatis de-  
cor, ait. Dicit autem non modò facit, sed & radiis decoctam potantem, huiusmodi, ac  
sirolos aquosusque humores, & quidem vasa hinc, vna verruculosam ita sepepationem po-  
teribus, vi & eodem vomitione reddi proceros.

Conferre hancfermodi viderem purgatio hydropticis posse sperare. & quos omnibus  
morbus, aut capitis daturus & perniciter vertiginti denuos. Sed tamen epilepsiam non  
quoniam, vt Dioscorides noceat, radiis hinc de eadem enim dedit sine crummediam. Va-  
lidam enim, vt dicitur, est remedium, viderem purgare, & rariis vni infecta.

Est autem eadem in radice moribus sicras & secundas huiusmodi: idemque in infusibus decocti  
potest. Cuius eadem extirpat & erugat: maculas solares, vasa, leuiusque, rariis enim,  
cum Eruo & Chus terra ac Forno grano depurgat, aut in oleo decoctis vique cum colligat  
est. Tollit fagellare diuina non pterygia compescit, cum vino impolita in hancmodi de-  
cote ac abscissa tempore educit & cilia trita ac impolita: infocant & commode traden-  
bus medicamentis: videtur Dioscorides.

Fructus ad febrem & lepra facit sitas & impositus, eodem ad hanc. Galenus, qui  
ria denfatur, viderem per hanc Plurimuldas abundantiam facere ferbit. Viderem enim  
ludis generationi ad viderem Nam acris est, & eo viderem ac corpa, Dioscorides viderem, depolita.

2. Nigra Bryonia strapholite, vt Galenus ait, ad omnia similia, nisi quod ambrosiam.

De Vita sylvatica, seu Tama. CAP. XI.

Vita sylvatica.



Tama. Vita Tamia autem, etiam Strapholite est: sed hanc salis mansuetum, Plin  
inquit. Germani est *Edymaturget*. Allobroges Latram vocant, & Tamia quo-  
que Tamam appellant. Pliniam Salicatum etiam vocat: Ruellius Sigillum B. Maris, et  
etiam quibusdam nominem refert.

Non est hoc loco testifera eorum sententia, qui Cyclarumque aliam hanc esse vident  
vel sola enim radice magnaudo facile hoc testifera. Cyclarum siquidem raris *Edymaturget*,  
est, nullam vna ac magna, hanc autem magna & multum vna. Cum eo magna viderem  
dum, qui *Edymaturget* hanc *Edymaturget* esse pertinaciter viderem: nisi imperta, & abo  
illa legitur Bryonia nigra, sententiam mutaturum *Edymaturget*. Sed tamen quod viderem





Dalecarn.

Cyclam.  
sive altera.

vult candido, & fructu actinaceo corymborum Hederae modo dependente nihil detinetur, neque in ipsâ similitur radicibus veni *diaplysa*. Nam praeter quod venosus, nullam quoque visum in continetur.

Definitur Cyclamini altera à Dioscoride his verbis: Folia habet Hederae similia, sed minorâ caulis crassiora *gossyphica*, id est, geniculatos, venis à radicibus *diaplysa*, sicut, modo caprocolatum Vitis, circumligantur: flores candidi, odorati: fructus vti actus vix, similia Hederae, in olla, sapor leuiter acris & viscosus radice *diaplysa*, sine melle.

Dicitur nam Cyclamini altera, Dioscoride teste, *ασαβηθου* & *ασαβηθου* conuenit vnique appellatio Dalecarniae: nam folia, floribus & fructibus Hederae semelata.

Ceterum facultate, & foliis, & fructu calida, resiccans, abstergens & digerens est. Fossæ fistularum decedunt necnonis fellisq; obstructions reserant, & aduersus regum morbum venosus habi. Rupis verb & ex alio precipitata, aut cretae etiam succus vniis habent. Ceterum siquidem concretam siculis in vasis, bus linguam dissoluit, & purum letum sinituram procurant.

Hieronymus Tragum è ligno mirum conciso vini decoctum conficere docet, quod siccos & hydropeicos & per viciam, & per infensorem ventum elementer purgare solet.

Haud dissimiles istis Dioscoride quoque Cyclamini alteri facultates ascribit. Fructus, inquit, *δραχμα* vni suspendere potus, cum vini albi cyathis duobus, ad dies quatuor, splenem liquat, ita vt per viciam & aluam absumatur. Ebeatur ad orthopneam: reliqua pars purgat.

De *Alfine repente*. CAP. XIII.

**A**CCEDERE postea superius, quam definitur alio nomine *Alfinem repentem* Celsum non capant, neque enim per se consistere, & nisi pedamentis succiat, huiusmodi admixtione potest potius, perire aut fructibus si succiat, in alium scindit: caulis illi sunt oblongi, annosi, teretes, ac geniculati: è singulis articulis bina contra se posita folia emittunt, oblonga, laevia, leuia, diluata venosa, *Alfinis* similia, verum maiora, & ad Heliconiæ uel Pantheonæ magnitudine in accedentia: flores è folliculis albi: succoduar acris permutantem nigri, *Alfinis* grano aut Hederae acris similes, in quibus semina plana & munda, radix cardiacis longi, tenues, viscosolida firmi necesse sibi reperit.

*Allium repens.*



*Vintha.*



Copiosa in agro Solimanensi in Hispania, et Chifias ait, loca umbrosa, nalcon & in Italia, Pannonia superiore, ac in Moravia, & alibi, hinculo solo.

Est autem ferox, & fructum perficito radices in laetifida, Vnde nosci carones non usque penna promant.

Lucas Chyros in stupram historia haud parum veritas, Cyclanaram alteram Diodoridis esse indicavit, nobis superius magis ad descriptionem accedere videtur. Carolus Clusius maluit Allium repentem appellare, propter eam quam caetera folia, cum maturo Allio similitudinem habent.

Refrigerantem hanc esse videtur, & Allii facultate ac potentia proxima.

*De Vitella. CAP. XV.*

**C**AVES fumentosos, multos, crassos, immoios, geniculatos, aliquandoque rubicos, & subinde lentos ac obsequiosos edit Vintha, sepibus duris que se implicant, acque irretiens, vicina omnia appetens ac superans: folia ad vitium acruam & quibus seae coale sunt, eorum eminenti vno, quae lata sunt, Phedrotae similia, nequequam tamen angulosa, verum per circumferentiam nonnulla crenata: flores in racemosa umbella formam diguntur candidi & odorati, florum Myri amuli, fimen subnascitur exiguum triangulari specio, capillorum tenuisque pluma nitit incensum veluti cristam gerens, gubia acrua radice fibrosa, haud magni momenti.

Secundum agrorum inter vepres & fenestras crebris reperitur apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, ubi latum secundamque solam.

Iulio mens huius florens fructus plura suis incenscentes Autumno dependunt.

De huius nomine inter recentiores concertatio quaedam est. Fuchsius Vitem nigram sine Bryoniam repens: Matthiolus Clematidem alteram facit. La grimmam autem Bryoniam nigram superans ostendimus. Ad Clematidem verò alteram accedere, atque eius speciem esse, negari non potest: est tamen & alia, ab hac differens, inferius explicanda. Germani quibus de hinc appellant: Gallis, Ruellio teste, *Vitis*. Nō est tamen frutex ille, qui Gallis *Vitis* & Latinis *Vibum* nō dicitur est.

Facultate autem aeris & calidi hanc est, vim tamen nobis competentem, non habet vim.

*De Flammula. CAP. XVI.*

**F**LAMMULA dux sum: vix adhaerens, egroti alena affertit talibus indaga suscitatum.

Prior lentos obtinet & perquam obsequiosus, fumentosus caules, corneae vitium velut

Flammula.



Flammula alba.



Itaque folia mirata sunt quàm Vitis, incedita, ad usum completa pediculis, quia  
 pessimi tepentis manere officioque fungens, vicinis se circumplectens flores candidi spec-  
 termina cogis colorata, casciferis quoque plantis, minoribus tamen ac brambis  
 enomata, pro radicibus tenax sunt fibres.

Sponte sua in Belgio nusquam erit, sed hortensis est. flores sub Augustum, fructibus  
 succedit.

Flammulae nomen à recentioribus accipit, habita sunt pro Clematide albae species, sed  
 tamen & formae & florum cum figura, tum colore & magnitudine ab ea differt.

Altera Flammula foliis est amplioribus minoribusque, Vitisque similibus, quam & an-  
 didissimis fasciis, cum & ferme plantaceam crustam gerente, in foliis caliculisque an-  
 tennibus referri cubito canaliculis abscissis, per se consistunt, sursumque arguantur.

Rarissima haec Germanis ac Belgis est, & hortenſis tantummodo.

Vere novis prostrata foliola, & caliculus. Et sunt flores: Hyeme tota reliqua sunt rhen-

da appellat. Mastichales hanc eam esse existunt, quam Platycorus lib. De simplic. medicam.  
 cap. primo hanc F, Flammulam nominat, & calicem siccamque quattuor stans parte est  
 tamen & Flammula quaedam Ranunculi species, cuius in emulcerando vellemusque cruento  
 nota palam est facultas, de qua citius quam de hac, & replisse Platycor. am crederem.

Nihilominus utriusque hanc Flammulam mirum in acris & valde calidis est, ipsa tamen  
 Flammula Ranunculo, minus ista videtur.

## De Clematide Daphnoide.

## CAP. XVII.

**CLEMATIS** Daphnoideis, longa, gracilis, rotunda, lancorum instar tenuis, & prostrata  
 inaequali, spargi summa, quibus per terram serpit, radicales etiam subinde, sed tamen  
 rarius deliquis folia sunt brevia, basi fixata, oblonga, forma quidam Laurinae similes, sed sub-  
 to minorum: flores secundum folia, qui quoque foliis patentos, inferius subsistunt, Belgis est  
 bus maiores, colore ut plurimum cerulei, quandoque candidi, rarius rubentes, pediculis  
 autem impari, radices tenuissime fibres.

Clematis Daphnoides.

Clematis Daphnoides maior.



Flores & septifolia quare loci, arboris hujus, vivit perpetua in herbis fronde, vbi florenti cum foliis multiplicat in curvatis foliis.

Nomen & alia nomen repetitur, species, que multo longioribus reperit viticulis, & foliis est a. foliisque multo amplioribus, cetera priorum similia.

Insurgit hinc, & aliunde adnotata.

Vigat viticulis flores Martio, Aprilis, Maio, & non raro Junio.

*Daphne Daphnoides* à Grecis dicitur Clematis quidem, quia multarum *conspicue* arborum proutem calcitulos Daphnoides verò, cum à Lauro foliorum figura, tum ad differentiam dures vel etiam aliam. Nam Plinius plures eius nomines refert lib. xxiii. cap. xv. vbi de hac *Agropyra cognominat*. Est & alia, ut, Clematis *Agropyra cognominat*, que ab aliis Daphnoides, ab aliis Polygonoides vocatur, folio Lauro, longo tenuisque. Polygonoides verò vox hinc raris appellat non etiam in Dioscoridis exemplaribus reperitur. Præter hanc sunt etiam *perperum* quod *perperum*, aut potius *perperum*. Alio autem loco Plinius lib. xxi. *cap. vii.* *Perperum Perperum & Chamædaphnem appellat.* Vicia Perperum semper, inquit, vni in modum Lauro (exemplaria perperum Linæi habent:) folia geniculata circumdata, spirata herba, inopiam raris foliis quandoque supplet. hac à Grecis Chamædaphne vocatur. Describitur tamen ab eodem, & à Dioscoride, & à Chamædaphne, de qua alibi. Officina hanc Clematidem Perpericam nominant: Itali *Perperum Hispani Perperum Germani Perperum & Sineperum Belgæ Perperum magnum* autem Galli *Lesperum*.

Tempus in quo vni hanc aliquantulum coler, sed tamen infra secundam gradum confilicantibus abest. vbi vni autem existeret florent verò multo amplius, adstruere quoque nonnulli. Alii proferunt & dyfentilla, Dioscoride & Galeno auctoribus prodest, denturque dolores occurrentia arborum.

De Clematide alia. CAP. XVIIII.

Quæ aliorum Clematidum nomina à viticulis de ferbat, pediculis adnotatum & tenuibus geniculatis, suberentibus firmantibus per arborum, fructica, perperica, pergular, pedicularum scandendo in altum præter folia complura, proutem Plantam modo dicta, sed tamen minorum lani occupat. Flores purpurei elegantes à longis & tenuibus dependent pediculis,

Clematis atrata.



Vincastrucosa.



Clematis Daphnoides aemula referunt, sed tamen maiores, & ex quatuor tantis foliis per tantum lanuoribus costis, colore sive caroleis, quandoque rubentis, sumuntur, quot modis, feminis plaris, lina, rorunda, emonata in globum coarctantur, modo proloce, tenues, in arboris partem spargunt.

Cardet Solimpojisi, sed tamen non campo arde, luto & limo utriusque solo melior potest. Apud Belgas hincrota, sive Hispania nobis, quibusdam lincis locis usque super & agrorum margines sponte pat.

Augusto mense, & quandoque Julio, bene fermen Septembri perficitur.

Knappis longa, & à nostris Hispide, Linnæi Ambricam, ut Dioscoridis libano sive addita habent Hispania Coronaria, quæ Varrione, dicitur.

Acne & velle mentis exales cura hincrota folium, causticum, ut Galenus ait, vult obedi in quatuor ordinis exal facientum agere.

Dioscorides folia in potu lepore venere referit, semen vero in utero cum aqua per multa potu, peruram & bilē decem datur.

De Vincastruca, sive A. filipide.

## CAP. XIX.

VINCETOXICO plures affertantur, linnæi, ac frangis continentur pediculis, colore vno aut altero alioque, quandoque omnino vicia admittunt alioque circumscriptis amplectuntur folia lata, oblonga, lina in utrum de sintant, angustiorum Hedera folio similia sunt pabli albicant, cura, facili quodam graner odorant, si quisur iliqua oblonga in macronem attenuant, candida sunt linaugis, & femine plano, oblongioribus, subvili colora, ad Secundarum accedunt tubris vna filiose, macrose & graneribus.

Reperitur & hincrota species, casu calocentis hincrota proci moribus, periculis in pueris emulgentis, ad quatuor vult, cubito multiplex volumibus costis dera, curis filiose, folia verò, filiose & radices vti proci.

Vtraque species hincrota Belgis, & quæ quidem rarior, vbi in montibus, & per hincrota, agris frequentur.

Circa hincrota hincrota, sub Antiquitate multo filiose linaugis deperdit.

Nomen Vincetoxicum referitur deinde in Ruellio Hederae est: Germanis Quercus vult / Anacardis vult / id est, Latine dicitur dicitur.

Dioscoridis habent A. filipide, curis est de scriptoris conformis, quod tunc tunc appellat, Terguon hincrota Mithridata, & Vincetoxicum differens ab A. filipide affertantur, vult & filia negat colore committit: hincrota vult vult: serpens non esse Secundarum: vult vult.



accidentis qualem Rhododendro, in quibus semina oblongiora, deinde nactum in quibus, et molli, candido, roseo, etoque si malis luteo, quae nunciamur ab aliis etiam beneque aliquos in conspectum reddat. radices fibrosae, et pinoe progeminantur.

Vitaeque valuerunt liquorum fundit: prope copiosiores autem candidiorum usque non nisi fuerit scitorem: Repertum pariter in & candidiorum.

Peruenit huiusmodi descriptio fatis: vnde reperta fortasse cognoscitur illas vel latens aut, solis Hyeme superfluitibus radice.

Rara utraque Belgio, ac quidem, ut Martius scribit, etiam Italiam Syriaeque aduenit.

Pemphora huius arbori modo appellatur, ad Dioscoridi Apocynum referenda, sed videatur magis festum, praeterquam cum quae prope est. Appellatur autem *Yvesse* in am. sive quod, ac Belgica castra. Sed & alia nomen est Cynocrate Mercurialis Sylvestris specat.

Est autem Apocyni quodam usque perniciosis possimum quadrupolibus: ut Nam, et Dioscorides, huiusmodi cum pinguis parti commissa, canis, lupus, vulpes, & pastus ad illa interuenit, et solentur eo in proinde eorum consistere.

De Lapide.

CAP. XL.

Lapide.



**L**YVETI amplexu viunt, & pernicitibus ad murem circumspargendo sic hinc de murem calos propter longissimas asperos, & hinc salis quoque aspera, lara, Vitis aut porus Hyeme alba similia, vanae tamen regionis & praecoxibus incensur deinde flores: si facimus virgulae committit de pudent folliculis, ipsamque usque quorum conorum compassi, coloris subitudo, ad luteum vergente, odoris gratia radice usque, sibi in usum vasis simpliciter.

Resistibile ac pingue desiderat solis. lara cultura est. Nascitur & inter vepres hinc usque circa agrorum margines, sed Sylvestris, hinc comos ramosos, ramosos, patulo usque profusa.

Flores Augusto ac Septembri colligunt, & ad usumque vltimoque in ius. Vitis non tamen erumpit aut Hyeme solis restituta radice.

Lapulum Officina & passim vocatur prope Lapum silvestrem, vel Lapulum silvestre Germani. *Yvesse* Belgae sive & *Yvesse* Hispani *Hemerocallis* Galli de *Yvesse*, Martini *Pinus* Lapi silvestris Ita. etc. cap. xv. inter sponte nascentes aculeatis, quibus plerumque partem cibum trahunt. Quae autem *Yvesse* hinc usque appellari aspera, nobis in usum sunt. *Yvesse* Mucus est. Dicitur & *Yvesse* hinc usque de murem, et *Yvesse* hinc usque.

Calidus autem & siccus secundo ordine sunt Lapuli, capax facile implens, odor pinguis ipsius ferientis. Eiusdem temperamenti &

solis ipsa sunt, & sicuti operentia ac abstergentia.

Asperitasque primum turdorum Vitis erumpentes nuncios sunt, in edulis usque amabilem tamen magis, ut Plinius ait, quibus cibum. Nam aliter non quodam periculis confertur profant tunc viderentur, & aperire solo, & vnae murem de factis hinc usque aliam hinc.

Folia, bene sita usque casticulis, & ipsi quoque flores acur & hinc ab obstruendo hinc usque bene per vnae expurgant: singulae emundant aduersus decimas sive, solida hinc usque similes vnae sicuti, deinde in hinc usque profusa.

Sarax potior est, & non modo sicuti ab obstruendo hinc usque liberat, sed & hinc accitum educere paratam posse credam. Eandem omnibus solis hinc usque hinc usque hinc usque viderentur hinc usque.

Flores omnia condunt, copia tamen nimis amorem in coadit, ac vnae murem hinc usque hinc usque.

Papam quoque lenorem ac lenorem sicuti efficit, ac massam cibum hinc usque hinc usque, si aqua in qua decocti fuerint, farina subigatur.

De *Lafina*. CAP. XXII.

*Lafina*.



ritur in Italia ac alibi: ex Africa evadit aliudam.

**LAFINUM** ex eodem quoque styrum est nomen, quae adnucula fulcuntur, non tamen amplexacula aut vicina se circumducunt, sed alios tantum modò movēs, veluti pergalis, hortenſibusque ferens, quibus facili opere immolatur. caniculi eius probo, tenet, canoſi, ſe ab eis, generoculi, vixit, candida fungoſa quoque intercaſtra illa: folia è ſingulis generoculis bona, ampla, alarum inſtar expansa, compoſita videlicet ex quinque aut ſeptem alaribus, oblonga, ſuparum virentibus, ſaſpicio acuminate, emittente in cacumine reliquis maſſae: flores in ſummis virgulis, tanquam inſerens ſpecie cohererent, ſuae coloris, colore albiſi: ſemen lazarum Lupinis quadrateris ſimile, quod tunc raro ſecreſcit: radix ſtomi firmatur.

Pertur huius eſſe ſpecies floribus lazaris, & aliis egrulis. Sunt autem qui pro laſina luteo, Tuſcolid francans 4. Pentpl. lib. 4. cap. 13. de pulſum, & pro cerasleo Clematidem aliteram oſtendunt. Quòd ſi autem nò alie qui in hac pro laſina carnis ſpeciebus oſtendi queant, ſemen plantae eius ſpecie affirmatur. Vt aq. enim lazarum multum à laſina abſit.

Celſus laſinam in heros, & topianis operibus expetitur, non modò in Belgio, ve-

ritur in Italia ac alibi: ex Africa evadit aliudam.

Inter Arabes Scarpus prius vocata hanc Zambach: interpretatè laſinam nominat, atque inde poſſim laſinam, ſe Germanam, loſimam, aut etiam Geſſimam.

Apud Dioſcoridè compoſito eſt laſinum oleo, quod apud Perſas de rō abſit vñ lazaris vñ ſi, èſt, ex albis Viola floribus ſicut reſert, quod non ex alterius ſtyris, quibus ex huius floribus quæſiendū apparet. Nam Dioſcorides inter vi la, ſive Violar, pulchros atque elegantiffimos lazaris de habet, ſi vi de huius flores ab eo Violar dicit, non debet alteram videtur, poſſimam ipſa ſtyri. (vi lazar apparet) illi incognita. Tam & loſimam cum oleo conficere quæſitam occipit, que laſino tribuitur: carſimamque idem aliudum eſt, & ſi quando eſt, poſſimam non poſſimam. lazaris calidior ſunt, ſed tamen nequaquam candida, ſed cum genere lazaris eſſe certiffima ſunt.

Quæſam autem laſinam ac eius poſſimam flores calidi ſunt in initio ſecundi ordinis: Melix apud Scarpionem ait.

Quam ex hac confectum in ceculis diſcutit humores frigida ac catarrhoſis confert: & hyeme vno tempore. Quibus autem temperata contigit calidior, huius dolorem exorta cepit, & ſi dicitur odorat, periculum adfert ſanguinis è artibus profluens: eodem modo.

Ita conſtat, ac Dioſcorides, & poſt eum Actius, odore calidi apud Perſas ſuparum. Prodit & lazaris à balneo corporibus, que lazaris calidiorque expedit: grauior in aut ſua volentiam habet, ſi vi multo eo calidior non libenter vitetur.

De *Caryophallo*, ſive *Perſiclymeno*. CAP. XXIII.

**CARYOPHALLA** ſive Perſiclymena duo ſunt, vnum Germanicum: alterum Italicum dicitur heſſe. Vterque frutes amplexacula, vltimis adnucula circumligata.

Germanicum longum, ac tubum, ſed tamen lignoſa, & in ramulos partita ſuſſum reperitur. Italicum, circa que ex interſtitiis ſibi bona ex aduerſo poſita, oblonga, molli, dilata virentia, interiore tamen parte magis canoſa ſunt: flores in ſummis ramulis complures paucos emittunt, oblongi, cardati, ſuae coloris, autem eius, vna parte prominentiores, ſeminibus aliquot à medio exarantibus ſiſtibus acinis ſimilia in exigentiam vnum in modum compoſitum permaſſionem tubum, quo ſemen duruſculum, radix lignoſa non abſiſſe aduertit.

Italicum



Caprifolium Germanicum.



Caprifolium Indicum.



2. Italicum lignosis quoque & in longitudinem prorepentibus cauliculis prout omnimodis est: continentur etiam folia, nisi quod ex aduerso posita subinde videntur, & circumtulorum perforam sustigia ita coalescant, ut acrobati lotum profundiorum speciem exhibeant, à quibus folioli erantur similes sepiorens, breuiores tamen, ac paulò maiore hacco sequantur similes & rubrares, sed tamen dabois.

Nascentur Periclymenum in syluis & in senectute frondibus nonnullisque arbutis, ut sepum erò tenentur & obtusiora, ut sui vestigia ipsi impercepta relinquant.

Vere folia exant, ut alii lignosis: hinc quandoque April, ceteris in Mense aut Iunio spectantur: fructus sub Augustum tempus maturi.

Græci *σφραδύλλων* Latini Volucrum maiori Scribonius Largus Sylue maxime appellat: Officina Caprifolium, Marnyliam, plerique Libani inter spinas: Itali *Periclymenum* Germani *Expholite*, *periclymen*, *geranium*, *malvifolium*: Belgæ *Expholite*, *mannickmaes*: Galli *Cheerfacille*: Hispani *Maluifolia*. Inter nomina appellatiora sunt, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*, *σφραδύλλων*.

Marturus Syriacus Panditarò vocat, Caprifolium & Syriacum maiori, cap. extra. resti quidem Periclymenon, sed perperam Lycium & Pyracantham interpretatione Periclymenum cum Pyracantha non potè confundere potius verb etiam facti, Caprifolio vix Pyracanthæ affertent. Sed cap. ccccxxxi. Marnyliam Periclymenon & Caprifolium affert, ac legitur in ex Dioscoride vixi refert.

Præbuit hæc grauilima entru pharmacopœia occasionem videtur, qui sicco foliorum & fructuum Periclymeni densato pro Lycio, maxime eam periculo videntur.

Nam hinc & alii error, quod videlicet foliorum Periclymeni decoctum, vel ex his, ut etiam ex floribus sublatum liquor, omni faucibusque inflammationibus in specibus, vix adhiberi: non ac refrigerantia posse temerè existimari. Periclymenum enim haudquam singula aut adstringentia, sed calida & astringens est facultas.

Vt notè Galeus, Periclymenum cum fructu, non folia, a debet vehementer incidere potèter & excoriationes facultates sunt, ut si plulentum bibatur, vixum sanguinem efficiant: principio tamen vixum dantur in oscentia.

Dioscorides ait: Hinc Emen postquam exsternat collectam, ac in umbra siccat, ducatur

Matricaria  
Syluatica  
Græca.

Expholite  
maxime

Expholite  
maxime

Expholite  
maxime

debetur pondo quadraginta diebus duram, herem abjatum, laffitudine m dicitur, orthopnea & ingultus prodest: vinnam cir à fepto die crescitam: idem & partus accelerat. Eodem vis & folia habent, quæ xxx. diebus pota sterilitatem efficit: namantur Eadem in obolito penedacorum sine intermissione frivam herores abigunt.

De *Xylosteo.*

Xylosteum.

## CAP. XXIII.

Xylosteum alatum.



**PERICLYMENO** cognatus est frutex *Xylosteon truncaputatum*, qui tamen alium non distinetur, sed nullis egentem in acule per se consistit.

Caudex huius sabinæ medicorum crassitudinis: materies ligni candida est: ramuli rotundi obscure velutur corneæ, usque tamen & cum primis erumpunt, subrubentes: folia velut Germanici *Periclymeni* oblonga, molli, ex albedo virentia, protraque candidiora ac leniter hirsuta: flores minores sunt, quam alium *Periclymenem*, candidi, hinc in pediculis, faccedant fructus gemelli: usque exiguum *Cerasorum*, rubentes, alio coram sibi minore.

Apud Helænos & pterofque alios Germanie popular, in sylvis locis fixoia reperitur.

Apud nos Massi Bares, sed fructus Autumnio apperente demum percipiuntur.

Plurimæ *Periclymenum* sunt appellata: Germani alium *Quarta* *Herba* & *Herba herba*, id est *Cicum* censent: Helæni *Quinquaginta* inde *Xylosteo* nomen dant. Sunt qui *Clymenon* esse sapientum: quibus *Periclymenon*, ab huius similitudine, veluti consuetudine & *Clymenon* dicitur videtur. Sed *Clymenon* aliud omnino stirpis generis, cuius Folio, & folio *Plantaginis*, re quidem *Diastoides* ut.

Huius generis & alium minor, omnino humilis est frutex, cuius cauliculi lignosæ, renelli alioque cortice velluntur, & absque pedamentis exiguntur, non multo tamen cubito alium *Argemone* folia amara, latum duosque sunt, minus tamen virentia: floris exigua, candidi, in motu oblongo pediculis hinc, quibus fructus faccedit rubens, *Ceraso* exiguo similes, hinc quibus *Periclymenem* aut *Xylosteum*, sic faccedant velligia duosque imprefsa retinens, in po hinc virentem.

Florez

Floret vel cum Periclymenae fructus Atigulbo pericitur. Ea Germania in Belgiam illius frutex est.

Nomen idem quod Xylobo possentis dedit, cuius minor ac humilis species habetur et dicitur. Foliantur qui Chamaecerasium appellant. Chamaecerasium non parum à Xylobo ali-  
tudo differt.

De viribus utem horum fructuum nihil competere habemus, aut aliud de acceptum.

Hedera.

De Hedera.

CAP. XXV.

Hedera Helix.



**I**N censu earum, quae administrantur sustentantur, Hedera etiam occurrere referunt, quibus  
sequidem non consistit, sed aliis adhaeret.

Eius genera, & prima quidem, auctore Theophrasto, duo.

Vna in altitudine se exollit: altera humi reptat. haec minor: illa maior Hedera dei vocat.

Maiora sine asseruntur plures quidem, sed praecipue tres varias species: Candida, nigra &  
Helix dicitur, quarum trinum Dioscorides meminit.

Secundum maior arboris, venusta aedificia, parietesque candidior eius lignis, si hederit ut  
si in arbore ferre ipsa videtur, à quibus ramulos hinc illic distantur quam plantas, quos  
velut brachia locis serpens in multam peragatur partem, radicules etiam ab ipsa affert  
trahente, quibus se arboribus ipsaque parietibus annexis pertransit ter haeret: sola ipsa  
splendens, superne praesertim parte, in quo quidem haudquaquam, sed vix consistunt,  
angustosa: flores masculi in hanc varietas est, in colore florum etiam quidam.

1. Candida sequidem Hedera fructum ferre candidum & haec vna species fructum tam-  
modo candidum habet, alia vero & folium quoque. Fructum vero candidum ferentem,  
quodam masculum, densum & compactum profert, veluti in species sine globoso-  
sum, quam plerique aspidias, Aethiopia vero *αχρυσία* *αχρυσία*, Aethiopia  
quodam nomine: alia vero minore & *αχρυσία*, sine fructum, veluti angustum.  
haec Plinius Salmontum.

2. Nigra fructum minore, nec ut candida compactum, sed sparsum fert, & color quidem  
aut nigrum, aut crocatum, sine croci colora. Hanc Dioscoridam nonnulli auctores Dios-  
coride, vocant, alij Baclucem, cuius coronae Poetae veniunt, Plinius teste, lib. xv. cap. xxxviii.



Nostra aetate in fluvio Helder vltis, cuius foliorum, quae vltisulis in corymbis, aut alio corpori paribus procurant (fontanellae vocant) imponantur. Haec enim & ab eadem eius partes allicunt: in flammatores vero ab eadem accere, necneret quidem decempe non dumque reficere. Sicut etiam, qui corymbos ad circidam vitam efficit accer affectat, & callositas neque hinc ea propter exhibeat.

## De Vitis vinifera.

Vitis vestra.



Nigram ac oblongam rubens ferenda vitam proferunt. Candelum ac salutaris proferunt. Vitam non nouillam matorem, magnisque acinis consistit: alia minoribus. Aciniquibusdam frequentioribus inter alia. Vitaceum vitam nouillam acinis ferunt plurimorodantur. Vitam quaedam austeritas dant: nouillae dulcia. Quaedam vitaceum melius: non paucorum hominum vitam praestant.

Minor fac parua Vitis omnibus paribus minor est, folia et minor ac rotundior: nec exigua, parua acina, colore nigra, aut illam albidam aut fuluam, sapore dulci, vitaceo faciendo tenera minimo ac molli.

Syluiculis Vitis caudibus, raris, articulatis fermenis, folijs, clauiculis cultum non, sed vos non non perficitur, immatura & auster praemera.

Aprua, inquit Florentinae vitibus folium omnis est terra nigra, non valde densa, ac glauca, humiditatem habens. Reior tamen, L. Columella ait, curus generis, aut qui vitam pro regione fieri colore censat.

Pinguis & vberis agro prodebat debet agricola grandem vitam, nec parua alia fructualem macta feracem, tenes densa vehementem, multaque matore fructu densam: vitam & laro folio, non fermenis humido fieri non recte mandas fructus tenes Vitam, & acceptio non, sed calca, angust, frequenterque vitaceo sicco recte daretur quoque natura.

Negabat, idem ait L. Columella parua, ferens Vitibus ingentibus, meliorem colbat esse materiam verde non exuberantibus, conge sitam & aducliam lu matam.

Cielo potest calido Vitis lerant: vltis offissimum tamen non desiderat, frigidam vitam glaciata non ferunt: In calidis idcirco regionibus vber e sit potest vitam proferunt in frigidioribus tenes est & dicitur, ac exigua aquam aducliam, vel etiam omnia dicitur.

## CAP. XXV.

**H**ic quae ad manculum egros, pedemum filicantia, neque per se consistunt, matorem Vitis vinifera possit. Peritis & populis fuerunt, horumque subsidit solae dicitur, & ab eadem fructus: Vitis & Opobalsamum non arboreae simpliciter, ab eadem hinc constituta facit.

Vitam autem quae vitam proferunt, in quidem cultu potest syluiculis. Cultum enim copiosius maiores, minor vero & parua cum quidem est.

Matorem caudibus fac trunci subsidit non sunt, multiplex eod, rursus eod conestantur, ab his cum velut brachia distantur, quibus fermenis & palmas articulis, quae vero amcula folia & capitula, dependentque vitae compleribus acinis conestantur, folia lu, subrotunda, vicia, quae angustata, capocul raris & inerti, quibus vicia tenes, & vicia maribus aducliam compleribus apponiturque: vitae colore & magnitudine, rursus conditionibus differunt.

Candelum salutaris vitae aciniferi dicitur & extremo folliculo, ac tenes omne a sacco, salutaris rubore nigrae: tenes omne aut subrubente audent colore, cum tenes & sacco velut parua. Vitam parua ferunt candelum, mox parua subsidit, ubi tenes, cum folliculo colore velut antra, quibus si dicitur praemera, color etiam tenes.





*Castoreum* in flammis ignis cum sublimata farina & cumino in cataplasmate impostum: Epithy-  
dela, carbunculus, &c. in parietibus circa articulos, & gangraenas sanant, ab hepate vitæ castor-  
geni & cumino cum superpositum ad postegram quoque commodum ex ea cataplasma esse  
vulgariter Patavici, sed & vnguis mobilis curas nonnullas, si imponatur.

De Melle. CAP. XXIX.

**M**ELIUS, quod Graeci *μέλι* appellant, liquar videlicet extracta ab vna calceis aut torculari  
subditi est sem, Nam ventrem suum & intestina implet, diffinitur concoquitur, crassum est  
sicut & perfectior de fœcedis, proventu etiam efficitur. Hoc autem vna melle maxime  
debetur, ut Galenus ait, ad id, quod ventrem dicitur.

Castoreo autem licet adstrictivum ac ex materia vna expressum. Quod verò ab acido  
& calceis additum, ad omnia pessimum est, si magis visat, diffinitur concoquitur, crudioris  
aqueo humoris. Et cunctis aliis portatibus citius descendit, colicis tamen in sepe non  
molestat, generat dolores, & calceis mollescit adfert. Quod si verò aliam materiam non cõma-  
scant, quæ omnia ac mollescit omnia sunt, frequenter verò & lictorium & dypticis officia  
*melis* aut *melibryse* appellant Graeci, quod vel spontè, aut quæ calcatur vitæ, vel  
panem & pectus effusa, tale succo vitæ non respondet, & citò quoque descendit. Patavici  
maximum, sublimatum, ac flavorem naturæ participes, deservit esse.

De Sapa, seu Mellefero. CAP. XXX.

**S**APA, melle conficitur quod Graeci *σίσα* appellant vocatur, Latini saram & deservit, eam  
videlicet in altum dulcissimum spiritum ad acetum decoquitur, ut Colicella ait.

Fines saram & deservit decoctionis modo differte aserit: & saram quidem fieri ma-  
gis et minus partem reddidit: deservit in ad dandum. Sicut, inquit lib. XIIII. cap. XVII.  
quod ab *σίσα*, nostri saram appellant, ingens non naturæ opus, multo ad certam partem  
melle decocto: quod vni factum ad dandum, deservit vocatur.

Philidius huc Caserta in adicit, quod ut fieri cum terra perdit, dicitur panem seminare tunc.

Latini in Geoponica hepatica ex melle partibus esse, & vna certum, ad certam de-  
cocto conficiendum esse.

Galenus tamen *σίσα* esse melle plurimum decoctum testatur, proventu hepatica  
saram, vnaque acetum appellant.

Vna autem sapa habet calfaciendâ, non tamen aquè ut vitæ, hoc autem melle est  
vulgariter dicitur, tuncque per vnaque dicitur, per vitæ verò saram dicitur, cum  
hæc modè si dicitur.

Natura vna valent, & corpus citò implet, in ventriculo tamen propter crassitiam ali-  
quantè hæret, nec vomitum aut leni minus idcirco concoquitur, tamen sapa crudus humoris,  
pedum ac palmis inherens, eorumque citius expurgationem procurat. Tuli videri ac  
responde diffinitur acerbiora. Galenus lib. 111. De med. secundum loca, sapa autem  
citius idcirco leni vult.

Valent tamen non potum, ex cuiusmodi melle sapa confecta fuerit. Nam ex optimi ac  
generis vna melle haud dubio prestantior est, acque ad omnia sapienter efficacia: ex  
tamen vna & oligo boni vitæ melle, ambecillior & minus efficax.

Boiss & presertim Zelandæ etropole ex sapa & vno vitæque Hispanensibus certa pro-  
portione partem vna cum panis melleferum, quod pro Caserta, vulgè Malianis  
nominato, libellatur ac venum exponit.

Præparatum ad alitum melle concoctum ac lib. XIIII. cap. IX.

De Vina. CAP. XXXI.

**V**VINUM facies, quæ dicitur accoster expressum, *vinum* ac melle nominari,  
ita fœdes facultateque respicitur, tamque per melle dicitur & apparatus, ab Graecis  
vna vna appellatur, & quidem propriè. Nam ab quibusdam succo ac liquoris, vna melle  
pancorum, cocconum, pyrae melle, pistorum, sibiriorum, vel qui aliunde vna ex hoc  
de ac fragilis consistit, haudquaquam simpliciter, sed ad hoc nomine eius ex quo confi-  
citur vna dicitur. Ita vna Rhodæ ex panorum melle ac melle expressum: Cydo-  
næ ex melle cocconis Appyris ex pyra, sive *αυθιγγίαι* vna melle hordeaceum, quod & *αυθιγγίαι*  
hordeo compositum. Cognomina tamen & alia quædam, & quidem à thuribus in  
his melle vna accipere, quæ ex vna tamen vna sunt, ut ab *αυθιγγίαι*, myrsinæ, hypopi-  
tis, sibiria vna hæc dicantur.







non dicitur, sed multam aquam sibi admisceri solent.

Huius generis quod etate veteri, subtilissima tenuis, & boni odoris, omnibus quae haecque malis habet vasa firmiter, etiam si ea bilelissa, et venereali infestatione accedat, Galenus p. 1. Methodi auctor.

Dulce vinum quantum à caliditate abest, p. 6. et caput status sentiat, aut mentem offenda, melius vero & per alios laedit, p. 1. in sabunde et molli dicitur vinum vero nō sit facile dēbita.

Quōd verō & consideranda crassius, tunc etiam dicitur ac tardius permitti. Palatos conficit, sufficiensque vitiis, crudos in rheumate haerentes humores ad maturitatem perducit, & cum ipso, ut fasces sentiantur, procurat. Sed necnon status commovent, ut, in vitiis infestatione, vel icterico demeretur, insigniter aut etiam obfusa assidua laborat, p. 1. in cap. nocet. Latentem etiam offendit, circa praecordia haeret, haud commodum ut, quo autem eructantur bilium, et ebulliant modicum vino, per se in crassiore, etiam sine flama ipsi hūgnetur, reliquis vero, ubi bene concoctum fuerit, alimento copiam adauget.

Austerum, quod dicitur Graeco similitudinem nominat, tenuius aut & simpliciter tunc quibusdam vinis citius non nos prae, caput minus veniat, ad digestionem in corpore assidua, quō magis animi defectu fugiendum, ut xii. Methodi Galenus ait.

Crassius verō in hypochondriis quoque haeret, agnus distribuitur, non tamen de anagram, aut dulces in viceribus permanet.

Si verō & vitiis hūgnetur sine sulum fuerit, mentem commouet amplius, quam aquam quantum & eo calidius.

Acerbum autem vinum quod Graeco dicitur, quantum à moderante abest, tunc alio placent vitiis qualitates accedat, haud obscure adfirationem patit. Ventriculus debet confirmari, ut dicitur ab vitiis, sine malis acq. resistit, alia flavescent exhibet, sed & in viceribusque locinone ac hinc obfiratione fouet, per vitiis tardius defecant, caput exiguum tenet.

Vetus Vinum, quod quidem per vetustatem acie factum, non modo caput multum, sed & neruis laedit, venaiculo ac interius viceribus adhaerent, corpus astringit.

Nosum ac horum vinum facile hypochondria distendit, flavescente ingenant, infensa grauiora parte, praesertim quod non integri repurgatum, aut cratum, aut alio modo dicitur: ita si quod omnia quae alia in viceribus haerent. Reliqua vitiis, vel colorem, vel consistentiam, vel gustum, vel autem in horum modo, ut vitiis de praesentia ab extremis deficiat, ut quoque à vitiis & incoherens eorundem similitudine abiant: facilius vitiis autem vitiis, quibus praeiungit, vel colore, vel sapore, vel consistencia, vel etiam odore, vel etate, accedat.

Vetustissimum autem vinum natura frigida & sicisque, item & siccibus, ut Galen. De vitiis tenenda lib. v. Nam membrum eorum calidum, & sanguinis, si quod est ferum, per vitiis expugnat. Praesentia ex flama vitiis, quae pinguis sunt subtilissima. Haec autem & sanguinis aqua, & corpus nactant, quorum vitiisque siccibus conficit, praesertim eo tempore quo siccitas humorum in venis non habent, & liberatis natis desiderant. Coniungit autem, ut quodque in ipsorum corporum aquosum excrementum abundat, aqua tunc in vitiis natis indigent, quae vitiis sunt.

Siccibus autem sicut aptissimum vinum, ita paucis est: aliter siccum, quippe quod haud & humores nam ut & caliditas, tunc habet caput replent, ut qui humores calidusque temperamento, ut quorum corpus omnis excessus modum: quoniam dum sine se praesentia quidem vinum, Galenus primo De siccitate tenenda, suadet. Neque etiam hoc caput replent est: vnde, nec ipsos super quam potest, humores calidus, fieri, quoniam eorum calorem, humorumque petrauerunt, ut si paulatim vitiis maius quam natis auctoris, ut modum calidum.

Cum autem sit omnia caecitas fugiendum, ut aximē hanc fugere expedit, ut quoniam potest modum, vitiis & in imo damnum accedat.

Quae neque iam ad vitiis vitiis, nisi modum sumptum existimandum est: vnde, quod vitiis ad vitiis & libidinem praecipites faciat, & partem animi rationalem habetis, vitiis dicitur reddat.

#### De Crassi temperantia, quae. CAP. XXXII.

TEMPERARI autem vitiis & aqua mitem apud veteres longa & antiqua crassitate receptum, vitiis non modum ex Hippocratis, vitiis & aliorum veterum scriptis edem manifestum est. Siccitas enim ac siccitas vitiis, vitiis aqua per vitiis expugnat. Nam ut Hippocrates in lib. De veteri medicina, vitiis vitiis in multum potius habentem aliquo modo debilem reddat. Quō videtur & respicere Quibus sic similitudine:

*Si vitiis vitiis vitiis, sicisque vitiis*

*Et vitiis vitiis, debilitat, potest.*

Iam & siccitas, ut Aethiopia, ut, vitiis est aqua infusa, laudatur & ab Homero quod dicitur



tamen raro semper dat potest: nisi enim materia modo efficitur omnino sit frigida, & temperata, ut ipse arguit, perquam frigida, extra periculum calidum nequit, nisi quidem humoribus aqua temperatur, ut plerumque, & morbi vitandatur. Quod si visco & caliditate humores, veluti lingua, infusum rationes quoque non parum auferunt.

Noceat verò hanc aqua omnibus naturis ac temperamentis calidis, sicuti bibulis. hoc eorum offendit remedia quoque haud valens, sepe ut cognoscitur semper.

*De Lora. CAP. XXXIII.*

**I**N Vinorum genere habentur quod Graeci *Aeragias*, Latini lorum appellant. Tria sunt, iuxta Plin. lib. x. tit. cap. x. sunt genera Vinum decima parte aquae addita, quae ubi expressi sit, & ita de ac nocte madefacta vinacea, rursusque prolo subiecta: Alterum parte aquae quod expressum sit, addita aequae, expressioque decido ad tertiam partem. Tertium est ex locibus vini expressum. Primum loric compositionem Columella etiam docet, et mutuo tempore aquae quae sunt, quanta est in illo expressa decima, vinacea superposita, bibulis, ac praeterea ipsantem defraus suae super, & sicem ex lacu quorum Plinius non meminit.

Sunt autem vinacea oportet, ex quibus vitiis dicitur vitium expressum esse. Ita in terra vitis esse macerari linenda, postea de pedibus vitis colenda, & permessa prolo subiecta, prolo, deinde quod dixerunt, aut de lora, aut amphora descendendum.

Dioscorides similia aquae ad modum modum ac proportionem recipit, sed à vinace lotam expressam ad decimas recipit, additque ad singulas metetas, sicuti in vino, & hanc se modo locum non modò *Aeragias*, sed & *eragias* nuncupari refert.

Galenus verò secundo De alimen totius facultatibus, multis differentes huiusmodi lora compositiones, & quidem duas habere vinaceas, quae in parte dolis concubitu vinaceae superposita datur, quae à locum permadefacta, quod ubi lora vitium factum fuerit, in dolis subiecta foramen aperitur, ut de locum effluat, ubi que pro vino bibulis. Deinde rursus, aut aliam aquam, praeterea lora prius, vinaceas affundant, sic ut hoc quoque potioni sit accipiamus. Primum *eragias* appellatur refert: ab ipso nuncupat vinacea, quae Graeci *eragias* lora: hanc verò *Aeragias* proprietate sua nuncupat pro *Aeragias* dicit velle.

Secundam Plin. Lorum Dioscorides quoque videtur descripsisse, sed tamen non totam ad in usum aquae, ut Plinius partem accipit, sed massi & aquae aequales partem, aquae modo mensura in ferunt, & clementi igne coquitur, donec aqua abstrahatur, & residuum pro capite vale descendit.

Tertiam lora compositionem Celsus, Dioscorides Vriensis in Geoponicis Constantino Imperator dicitur haud abstrahit habere: *eragias*, inquit, hoc est, *eragias*, post modum maceranda terra, & in dolis reponenda ac concalcanda. Exire tunc, ubi, licet hanc, quam patria lingua *eragias* vocant, quae in uiculis sit rursus potus Ceribite autem hanc lora, ex vinaceis prolo aut non subiecta, sed à quibus modum in modum, & in profusum de fluxit ac percolatum est. Quod enim ab ipso expressum vitium potentiam aquae affluosera, ubi simul prolo subiecta fuerit.

*De Ompachis & vino ompachis. CAP. XXXV.*

**O**MPACHUM succus est acerbe atque nondum maturae vuae insolens, ubi dum densum ac resiccatum fuerit. Dioscorides ex Thibis aut Arabiae Vitis vult fieri. Potest vobis & ex abstrahit usum vinaceas ac maturas vuae confici.

Modum resicandi sicuti etiam ostendit. Oportet, inquit, ante Caus exortum expressum bibulam in rubeo are hinc coopto insolare, usque dum inspessum, semper quod resiccatum adhuc sit, liquido reliquo permiscere, rursusque à subiectis locis subiecta refert: quando quidem visum rursus ipsam non sicuti concretae.

Recentior autem ompachum appellat, haud autem vult in mature succum, sed liquum & consistens vino similitudine, ex collectis ante maturas vuae proloque subiecta expressum, ubi deinde in vasis resiccatum insolare, vel sepe in loco reponitur, usque dum inspessum & rursus quoddam à se abstrahit, & fronsentia resiccatum, & tunc quidem sicuti addit resiccatum permiscet in vasis sepe. Galli & Belgae de *Pirene* passim, Latini *Ageria* sicuti *Ageria* sicuti *Ageria* appellat.

Est autem huiusmodi ompachum vino ompachis non abstrahit, sed remanet sicuti *eragias* sicuti differentia, Expressum Dioscorides quod refert ex omnia vuae atque acerba maturam vuae, dicit aut quatuor dies in crasis, usque dum rugae acini contrahant, rursus in aqua deinde in calidum resiccatum insolari.



STADIUM HISTORIÆ  
 LIBRI TERTII PEMPYADIS TERTIÆ  
 APPENDIX, DE NASTURTIO INDICO,  
 ET TIGRIDIS FLORE

Nasturtij Indici composita.



Nasturtij Indici verna com.



Nasturtij Indici floe.



**S**UPERIORIBUS associantibus  
 Perpetuas quædam præter hinc  
 rale Purgantium hinc obnoxios  
 accesserant & normalia non supra  
 uentes ac breues desuperatione de  
 pertinetia. quibus scilicet omnibus ad hinc dicit  
 relata, dicit hinc ferant. Nasturtium Indicum &  
 Tigridis floe.

Nasturtium Indicum foliis angulatis dep-  
 dum fuit & petalibus virentibus: pediculisque  
 alarum amaris. Sicut autem hinc alteratio  
 no ferat. Non enim angulosa, sed ambro-  
 randa præconia, quibus non ad marginem, sed  
 medio pediculis subest, velut Corydalis  
 similia admodum ferat, nisi tenuem  
 nasoracque essent ac dicitur virentia. Calicibus  
 ocreis, tenuis, oblongas, in ramulis plures de-  
 fas, pedamentis quibus salicibus indiget, per  
 siquidem æquæ cordatis. floe cum sepe dicitur  
 suis coment, sed maior, propendens cum lo-  
 pu

Tigridis flor.



gias habet conicalium, colore eleganter luteo est, & balsamodolorem.

Hanc autem speciem videtur esse: Catechis arabico Christiano Bonellio videtur esse, ac amplius, vix Ioncharis Hopperi, quae ferunt ex Hispania allata hoc fuit, & diligenter excolitur.

Convolvulus haud dubie species est, utque in horti classis potest adstruere potest. Nalium autem Indico nomen ex eo datur est, quod sapor Nalium est.

Tigridis autem floris, ut quidem pictura ostendit, oblonga, angusta, & acuminata videntur folia, floris pluribus parvis luteis, tuberosus tamen quam plurimus nigrescens, hic variegatus, stylis modis dilato tubis purpureo, bulbis subrogat.

Hunc videtur nosse concessum est, idcirco nec quod referendus cognoscere potest: videtur tamen ex bulbosorum genere, aut, quod verisimile, inter An genera referendus, & Diocursuli peregrina aliqua species esse, nisi pictura nobis imponat.



STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS TERTIÆ  
LIBER QVARTVS,  
DE DELETERIIS. AC PERNI-  
CIOUS HERBIS.

PRÆFATIO.



**P**ROXYMVS à purgantibus, dulciter ac perniciosa herba videtur posse  
videtur. Per totam purgantium quàm plurimam vehementi, multissima,  
ac non verè perniciosa quæque, humanè corporis facultates, et omnem  
corpoream virtutem, calidarum aut frigidarum perniciosa in seip-  
sum manifestum est visus. Purgantia adhibita frangi atque intemperantibus  
medicinis reprimi ac corrigi opus habent: hoc ratione cognoscitur, si non  
tamen, et tamen cum usibus in contrarietate non dum respiciant. Quæ  
per se vitia. Præterea intensissima facultas abest. Præterea correptionem desiderant. Quæ  
de causa purgantibus hoc ad perperam perniciosa succedere videtur.

Et vitia & heram stirpium natura in deum non minus necessaria quàm vitia, et videtur  
ipso, uti Serapionum Laurus in deum, & ut per experientiam aliquam assument. Per totam  
si quando necesse incidit, ut in vitia, ad cum maiore deliberatione, summe cum delecto, &  
adhibita propria frangi efficiant.

Et tunc quædam & perniciosa sunt quædamque virtutem, conferturque quædamque  
medicinis. Per totam tam perniciosa, quæ non aliquam partem, quædamque & experientiam  
tunc profici & confertur quædamque intemperantibus & modo adhibita.

DE RANVNCVLIS, ET PRIMVM  
DE HORTENSIA

CAPVT I.

Ranunculus hortensis I.



Ranunculus hortensis II.



**RANUNCULI** genera quatuor Duo ferendi sunt: unum latioribus foliis, alterum latius-  
prolium, tertium minus in quantum latius sine caudis ferit. Posterius vero obbe-  
rantes malebentis plura. Possunt autem huc in duo prima diduci genera, ut et vixit sit  
locus Ranunculus, reliqui autem sylvestres. Horum autem nominibus vulgares, alij vero  
eximo. Sit porro de radicem ac foliorum differentia. Quidam enim tuberosi est radice  
cum longifolia, ut Flammula.

Hinc Ranunculus folia proceri in particulari nominibus distincta, specie frequenter tri-  
folia, quae quoque quatuor folia, per marginem raris coenata, fatum est veritas, in quibus non-  
nunquam solum quaedam maculae malibant: caudica rotundi, latus herba, partem tech-  
nate, tuberosa demittentes, quibus si hinc affigunt, partem ad didramaleum aut passib  
aplicata affigunt al trad mem: in saligna horum florentia citant quatuor folia, sunt la-  
pocites sylvestres, flaresque abiquat et organo concoloribus, modum superantibus orbis-  
culis, qui stultis factis semina in globulata concolora contrahit, ea quibus compositae, re-  
dud mares floride non dicant.

Item tuberosi de nominibus haec dicunt, non proferat andia, sed ut vixit de in locis horum  
quod ferit exis in partem quoque de non raro raris agrorum marginem occurrat. Hoc enim  
quid in hinc tantummodo signatur, hinc dicitur, sed quia sine pro caeteris hinc sic  
caudicem, neque in hoc tuberosi: vix sine Gramma partibus reperitur, vix de eius flo-  
ca quod quoque multiplex nascitur folio.

Mixtae deinde ferunt malebentis vigent flores.

Ranunculi est speciem non modo feram, veritas de ipsa totus herba facias de facibus  
similis. Plinio Polyanchemum est, quod de à nonnullis Bartrachion appellat rursus: vul-  
gi *Wandermann* Germanice dicitur.

Temperamentis hinc herba calida quoque de excreta est, Ranunculus ferit, passib tantum  
pote. Causa vi, neque in Plinio, ex illis raris caeteris, de ad colorem radicum, colorumque vi-  
ciperem corporant.

*De sylvestribus Ranunculis.*

CAP. II.

Ranunculus sylvestris I.

Ranunculus sylvestris II.



**INTRA** sylvestres Ranunculus caules proci sunt rotundi, laevi, interioris vacui, subinde  
crassi, aculeis disticti: folia in longis, crassis, pinguibus pediculis, lata, laevi, marginibus inci-  
natis. n. 1. sic. flor.



Possit radix assecta sibi in nonem potior car, si maluerit alia qua valentior desiccant sed  
 & delicta de melle usat, vt & sanguis eos, valeat delicta in cocco, & vt simul de amyga-  
 lida & sicca valde est radix, tam vt assecta de herba hinc Galenus.

De stirpe Ranunculi.

CAP. III.

Ranunculus Illyricus.

Ranunculus folio Graminis.



**EXPLANATION** Ranunculus, qui videlicet Belgio-peregrinus fuit, Vitis Illyricus co-  
 mpositus, cauliculus fert utraque, erectos, medioem longi usque: sola vero oblonga  
 plures silias inferens, utraque subcaudata, & nostralla tenui laminae concavitate flores lu-  
 ceos, pilosiores, quam Aunicum Ranunculi: femina vero vii alius: radice emissa parvi  
 tuberculi veluti granis aut oblongi scilicet vagis bulbulis coherens. Ex Illyrico primum  
 in Indiam, atque inde in Belgium illatus fertur: cum alii flores feminaque producit.

Varietas altera stirpis huius confertio, & figura, cum secunda Dioscoridis Ranunculi  
 descriptione conuenit. Nam laminae sicut est quatuor alij caulis siliis longus est, & foliorum  
 marginem planius: Versimile autem est, non modo in Illyrico, verum & Sardibus quo-  
 que insula reperiri: utraque siquidem regio maris Mediterranei vasis alluitur.

Dioscoridis enim secundum refert Ranunculum *γασσώλιον*, sive laminae rotundum esse,  
 & *αγροκόκκον*, sive longioris caulis, & *βελίον*, igitur uterque esse *αββαν*, id est, foliorum  
 marginis sine tuberculis quinque aut habere tuberculaque plurimum in Sardibus insula.

Eodem quoque de hoc secundo genere Plinius lib. xv. cap. xxv. nisi quod non lamina-  
 rotundus, sed lobatus esse scribit: sed suspicor esse, pro folio, ut statuerendum esse pilosius.

Nominatur autem secundum Ranunculus *ελάειος* *βυβαν*, id est, Apium siliacum, item &  
*βοθα* Sardis. Possit & Apium nris & *γαλακτοβόλον* dici. Esse & hinc videtur Galenophyllis di-  
 ctum Plinius lib. xx. cap. xvii. mentant, quas cum vno & Myrica bibida, vanaque  
 elictum species, videndi quod finem non sicut, ut possit radice Puce macta, cum Piperis & Mel-  
 litarum Palmae.

Secundo et videretur sive peregrinorum Ranunculorum: folia sunt oblonga, angusta, ne-  
 quequam siliis, sed Graminis aut Trifolii similia, & dilute & albicante opaleo colore varientur

Ranunculus  
 Illyricus  
 folio Graminis  
 Ranunculus  
 folio Graminis  
 Ranunculus  
 folio Graminis

Ranunculus Lufitanicus.



Ranunculus flore albo.



cauliculi breviores, palmatum aut fequipedem tantum altis. Flores femtoque ut Hyrc, hī radices multis rotulis confibrate.

Cetera Narbonam & alibi in pratis sepe talis fertur. Veteribus cognatum fuffeanulus conflat.

Nomen c. nullum datum, neſi quis velit ab ipſi foliorum ſimilitudine Ranunculum pamaſum dici.

1. Tertius inter externos Luſitanicus Ranunculus, reliquis humilior eſt, folia ſunt laeta, venoſa, laevia, velacerebus, indiviſa, margine tantum aliquantulum inciliſ: pediculi ab ipſiſ radicebus palmaribus oblique adnati, in quorum ſingulis ſes vinctus, luteo auti ceteri replendens, odoratus, maior & folioſior quam aliorum, ſtamimbus in medio concolobus, inter que capitulum emicat. pro radicebus multaqueſi gema velum Hyrcio Ranunculo, ſed longiore.

In Luſitania & Bætica Hiſpanie montibus vivit, floresque hybernis menſibus, auti auti ipſi Roma.

Noſtu Luſitanicum & hyemalem Ranunculum appellat. Dioſcoridis tertius eſt, quoniam ait, *σφόδρον ποικίλον* (exemplum plerique *διόσκου* in manu bene habent) *σφόδρον ποικίλον*, id eſt, multo maiorem, odoratum, & florem auro ſimilem: cuiuſmodi Luſitanicum hunc eſſe offendimus.

Albus Ranunculus externorum quartus, foliis in locum folia, & crentis, foliis montibus, ſecundo ſpiceſtum accedit, ſed quicubentur caulis in alio ſpiceſtu, quibus reſtans Ranunculus, ſed albidus & laetior candens, ſtamimbus tamen in medio ſibibus capiti rudimentum ambrantibus, quod ex conſuetudine ſemantibus quoque conflat. nec ſes flore ſine.

In plerique Gallia, præſertim Narbonenſis, montibus, & apud Allobroges ſubſide reperitur.

Dioſcoridis quartus eſt Ranunculus, neſi obſtante magnitudo. Nam quarto Dioſcoridis albus rebar florem, ſed tertio ſimilem, id eſt, parum ac manum cum etiam facit. Excolit autem ſic arpeſtione & magnitudine tantum ipſum tertium. Sed ſi eni ponit, innotuit, ſed reliqui ſimilem Dioſcoridis dicere voluerit, ita autem, nulla interpolatio, quæ

Ranunculus  
Lufitanicus  
Dioſcoridis  
Dioſcoridis  
Lufitanicus  
Dioſcoridis

+

Ranunculus  
Lufitanicus  
Dioſcoridis

Ranunculus flore globoso.



Ranunculus Constanopolitanus.



quasi est. Hallucinantur autem non parum, qui hunc inter Aconita referre student.

Amidus hic & quatuor globosi floris Ranunculus, qui folia, caudibus, radicibusque, satis distincte singularium rebus: flos eius quoque varicolor, verum maior, plantamque foliorum, qui non totus panderet nec explicaret, sed in globosi formam collectus, nascens quodammodo similis, viget: succedunt exiguæ tresque quatuor simul coherentes filique satiam arectis, in quibus solum minorum nigricans.

Proxime hunc Helvetiorum moeses, & praefertim is, quem fractum nominant.

Gelonus aut, Troilium florem vulgè dicit.

Ad Aconiti generis à nonnullis refertur, propter eas quae refert filiquas nos tamen inter Ranunculos sancte insulamus.

Aconiti similes est, quem Clavus in suis per Hispanias observatis, Constanu opolitanum cognovisse caubet: folia hinc laciniata quoque sunt ac unctis, dilata colore viriditate cauda pediculi albus, in ramulis in unam aut alteram quandoque divisus, folia minoribus ac transversibus adnatis: flos multiplex è purpureo rubet, subsatis multaxibus vix capite dependens oblonge, rursus radentia, colore sublaetia.

In Oris quoque montibus supra Constanuopolim reperitur.

Pachista primis generis purpureo floris Ranunculus apud Divocordam & verissime est una perpetua aut vixque multipliciter factis flore, sed & simplici non raro nasci.

Etiam exterorum horum omnium Ranunculorum facultas vehementer quoque calida, ac & exacerans, & Hyems potissimum, Sardoam quam dixerimus esse herbam.

De Ranunculo rubro. CAP. 1112.

**T**YRORSUS Ranunculus variè diffectis, latis ac viridibus foliis, caudiculis, seri colorum splendensibus foliis firmisque in capitulis aspersis, horum situm nec singularium aliter hinc refert, sed raris in his totumque globosum, parvo exiguoque Rupo simile, ex quo utraqueque dependens filique.

Proxime in montibus & aridus Germaniae ac Belgij nonnullis locis ad hunc transfusus situm non modè folia, sed & floribus densè multiplicatis. Nascitur & alius amplior

Ranunculus tuberosus.



Ranunculus tuberosus flore magis inflat.



ac maior, vel uti in Britannia infusa sine Anglia, ubi reperta eius in maiorem excrevit quantitatem. Quae ad hortos Belgij transiit, lentior etiam geritur, & non modo densius multiplicat, sed et vire & aliorum etiam subinde promit.

Diofcondes huius non meminit: Apuleius vero ab aliis separavit, foetum de florent, & peculiariter Batrachion appellavit: vnde & Apuleij Batrachion dicitur. vulgò Rapa D. Antiorij nominant.

Nosi tamen autem huius acris, quàm aliorum vix facultas. Vix est praecipuus, quod plerumque pessilenti bubone correptis cum sale contritum hinc in ore, aut fimo, aut chilo apponitur, ut vire & morbi malignitatem ad ignobis horem partem amittat. Eadem enim, & vesiculis in ore exant, cuiusque corporis parte fuerit applicatam.

Apuleius, si huius in ceruice, inquit, ligetur lino rubro Luna decreverit, omnis est fignum Tauri vel Scorpii parte prima, mox sanabitur. Item: herbam Batrachion cum sua radice multo aceto in ponis huius, qui habent cicatrices nigras, excidit ea, & similibus corpora reliqua reddat colorem.

De *Flammula Ranunculo.*

## CAP. V.

**FLAMMULA** haec caulibus affurgit cubitalibus terè, nonnulli genitalibus, siliis ut quos sunt oblongis, silicis similibus, longiora tamen, per marginem subinde firmata: huius quales Ranunculus lutes, pallidiores paulò: flos in capitulo simile: radice fibrosa et lignum Ranuncularum.

Huius & ager gaudet, praesertim ubi sterilis solent.

Vix cum aliis Ranunculis Maio mense flores facit.

Recentiores Flammulam, & Ranunculum Flammulam vocant: Cauda Ranunculi *obrepente* dicitur malum: alij Ranunculum longifolium: Belgae *apuleosus*. Ferunt autem hanc quilibet generis esse perquam perniciosam, vixque huc passim herba, nisi in montibus, citius, ut in ore videri in erofionibus ac exulcerationibus correpi, quod malum vulgò appellant: vnde herbae nomina.

Momunt & Firmus hls. XXI. cap. XIII. herbae eiusdem ab erofione immortem quoniam,

Flammula Ranunculus.

Flammula Ranunculus Folio Geraui.



Id præcipuè caputem, *Agolestron* appellatur, fulpican fortè licet, hinc est, sed affinitate *Agrostis* iniquè facta.

Occurrit & apud Oclaurum Herculæam Cleoma herba, quam ut rosæ in hæruda, & clematis fraxini esse. Si æquæ forma similes, à Flammula alia differens est. Nam Flammula hæc inopos forma nota respondet.

Facilitate autem Flammula Ranunculus cæteris Ranunculis similis est, acris similitudine, colorum, & vesicæ faciens.

*De Pulsatilla.* CAP. VI.

**F**OLIA Pulsatilla plurimis, tenuiter dissectis, asperis & pediculis agræstem quodammodo æmulantibus Pulsatillam, minus et tamen densa ac herbata sunt: surgunt inter hæc costiculi similes alii, acerosi & hirsuti, vnicos locos soluto inuicem, in salignis quorum fossilibus: sem foliis oblongis, & non raro reflexis, colore ut plurimum Viride nigre purpureo, quodque cordato, alia lanco, nervis rubente, filamentibus in medio latis: caputem facit villosi caruncæ cornosam & incarnosam, sub qua semina, radex longa, digitalis quodque crassissima.

Apud Gallos locis incultis gignit Rocellus scribit, nonoq; Vere in montes florere. Belgæ in hortis habent: apud Germanos satis frequens locis asperis & lapidosis, & subinde in vasis rupibus, & quidem sary purpureo ex carulis coloris: qui pro locorum ratione aut intensius aut remissius. In sylvis æquidem ac umbratis diluente colore quasi innotescit flor: in specu colorator est: Alibi floris Aemuræ & Narbonensis Gallie montes suppediunt: In Tartariensis Allobrogum tribu floris ex Alepo Syæ vrbis se habuisse, Petrus Pena & Martinus Lobelius referunt.

Galli *Cephalocardi*: Germani *Krauskrutzel* nominant: vulgò Pulsatilla, & à nonnullis Apurmaria dicitur. Non est tamen herba Sarda, quæ proprie Apurum rufus videtur appellari. Non est etiam Ranunculus, neque cuiam Aemuræ species, utriusque tamen & pulsatillæ facultatibus accedit.





Est enim Pulsilla vehementer acta, quam utique contingit corporis partem, à impuritate, exalereans & erodens. Ramunculis haud infertis: proinde & calida vehementer ac sicca.

De Anemonebus. CAP. VII.

**A**NEMONES multae & differentes repemantur. Theophrastus huiusmodi duas connumerat, scilicet genera, quaedam enim, aut, ut aiunt, cultam aut horticensem dixerit: aliam vero *Agriae*, ad eam, sylvaticam esse & sicuti plures ad hunc perni species, quas tamen non solum floribus forma, sed coloribus tantummodo distinguit. Nus cas quae nobis occurrunt, referemus.

1. Prima hanc folia habet paucis, sed in lacinis divisa, secunda ex sylvaticis Ramunculis aut horticulis satis fissa, sed tamen in nova: flos in brevis & palmari alto pediculo emans, ex XII aut XIII. foliolo angustis, oblongis, & acuminatis, in quorum medio exprobrant aliquae circumscriptum flammibus, quod exhi in anemone pilolo flocco, cui subest flos, adeo magno Cliaae magnitudine, sed tempore progreffu adgerunt, & grandior folia velut quicula amiculari, obliqua, non recte descendens, fibris adhaerentibus nascuntur. Color flos elegans est, in diluore purpureo rubens, qui quandoque ab utraque, alia ab interos tantum rubet parte intensior, extrinsecus flos & tralocant. Huius generis & sibi hinc flores, sed rariores.
2. Proxima Anemone folia protra qualem praecedens ampliora & horticulis Ramunculis hinc, azum en minor, argentea vide licet coloris flores hinc ex XII aut XIII quos foliola, sed haud acuminatis, ac sabunde re pando committuntur, colore corolla, & Cuius flos coloris flammibus lacis in diam orbis lura amplectuntur, quod ad hinc flos pilu, sed veluti Ramunculi, Alpaque amulari germin. radix obliqua, crassa, genital tuberosa plura habet.
3. Tertio Anemone maiora sunt folia, crebrioribus ac tenuioribus etiam divisi in folia pediculis similia Ramunculis, magnitudine cum Papaveris Rheadae sive decem, vii aut viii. foliolorum tantum, pulchro Viole nigra purpureo tendens colore, paulo in tendit hinc capitula inasputantur vi prae: radix oblonga, crassa, similibus obliqua, crebra generis,

Asarum I.



Asarum II.



Asarum III.



Asarum Parviflorum.



Anemone IIII.



Anemone V.



geniculata, parvo colore subnigricans. Et huius rubens quoque species, flore pleneo, ac ut Rhodod. colore, item ternis etiam candidis. Ad hanc referenda videtur, que in Pannonia occurret, foliis admodum maior, ac alior, flore candidissimo.

4. Quarta Anemone totum foliis, caulibus & radicibus refert. Floi medio quoque in gradibus, Rhodod. colore rubens, densis & frequentibus: stipulas foliis multiplex, quarum v. aut xii. ex utraque maiora, antea vera vero reliqua exigua.
5. Quinta species foliis Ranunculum refert hirsutissimam, sed tamen in miseribus hirsutis maior, semis fere constat foliis, candidis, aut è purpure rubens, sed modo diluente, sicut ten fere colore: capitula dispersa, parva, flosa. radice tenuiora, sed oblique quoque pilant caputem geniculata, densis aliis quot dorsum fibra.
6. Flore similibi sexta est, foliis tamen raris de floreque minor, etoque luteo, Ranunculi foliis concolor, radix firmis quinta.
7. Proprietate & alia quaedam, tamen foliis differens. Neque haec enim Coriandrum Ranunculo folia gerit similia, sed in flor. T. foliis potius coherens: siquidem ternis, magna, lina, acuminata, sed raris, margine tamen modo serrato: cauliculis palmatis obtusis, haec infidet candidis, aut ex albedo purpureis, em, formam Ranunculi dorsum striatula, pinnatococcum nonnulli purpurei colens generatur, radix etiam obliqua, in propagines quatuor tubercat, non oblique capillamento fibro sic fibris.

Anemone autem quarum & sextam genus, in praes. de syl. his, praesertim locis montibus ac vrb. rostris, in Germania ac Belgio reperiri quae cum candidis flore maiore perenni tunc Austria, fere v. in locis montibus exat: reliqua peregrina sunt, que nobis nobilissimam v. d. la. anno Brancomeis amplissimum ac distinctissimum horti parbat.

Flores Anemones Aprilis ut plurimum mense Belgiam conspicit.

Referenda autem etiam sunt Anemones ad *sp. elegans*, siue *lutea*, siue, *Sphaeranthus* species haec differens.

Anemone  
Sphaeranthus

Et eadem syl. filis Anemone, aucton Dio. Coride, *cy. vel. os. d. c. f.*, cum rubis suis praesertim, firma maiore, foliis latere ac diamoni caput habet oblongum florem parvum siue pinnatum & radicebus terribus, vrb. montibus.

Phloxina  
vrb.

Phloxina autem coloris est, qui in emissa siue Rhodod. papaveris flore vrb. Non & huius d. vrb. parvior, id est, Phloxinaeae sita.

Anemone vrbana.



Similem autem hanc sylvestrem Anemonem, Argemone ac Rheradi Diofcorus idem vocat, et fere omnia glaucisq; aberrantibus Argemone appellat Anemonem, propter colorem in floribus similitudinem. Neq; aliam eandem Anemonem (quod pleriq; dicitur) equalem sylvestrem Argemone ac Rheradi similem facit. Reliquae siquidem Anemones sunt, ac minores sunt, & variae coloribus floribusq; sunt.

Diofcorus et complura haec loco perpetua dictionem homonymis habent, ut non solum ipse sentias verborum, sed & Plinius ex pluribus ostendit, Eurpatorij vocem non admittens. Cuius haec sunt, Diofcorus consensu verba, lib. xxi. cap. xxxi. hanc (scilicet sylvestrem) errorem dicit Argemone potare: multi: alij veris Papaver, quod Rheran appellaverunt. Sed distictio magis, quod utraq; haec possit foret. Nec enim succum illorum Anemone reddunt, nec calyces habent, nec nisi Alparagj escantem. haec Plinius. Diofcorides distictum simile haurit etiam adferre. In Argemone, inquit, & in Rherade Papavere man ut saturatus est phlegmaticus color: & ambrosius flores. Et Argemone quidem succo croceum, & ad gustum vehementer acrem Rheras vero candidoorem & acrem. Ambrosio vero in medio capite habent Pylaxem Papavere similem, verum Argemone caput superius elongatum crassius est, Rherada angustius. Ac Anemone utraq;

*Diofcorus  
Anemone  
vrbana*

locum crederent, neque capite sine calycis habent, sed quasi Alparagj, cacumen.

Accepta *argemone* *veris* *ambrosio* est, & verba, ostendit. Nuncquid enim se operit, siquasi viderent, videtur Plinius, vrbana & Rhera. vrbana nonnulla.

Quibus Adonisda flores describere, Anemonem videtur adumbare lib. x. Metamorph. *Adonis*

*— Est facta croceum*

*Nullare adonide parvis, qui saltus ab illo  
Lacuum, sine suis periculis calce  
Surgit hodie siles, nec plenas longius hanc  
Tulla nota est, cum suis de sanguine cancellor ortus,  
Lactem, qui brevis calant sub carthae gramen,  
Favica ferre siles, brevis est tamen usus in illo:  
Quoque mali haec ventos, & nimis leuitate calicem,  
Escantur idem, qui per flant amula, vrbani.*

Boon Symonides Podes vocat in Adonisda epigramma, Anemonem ut natam ex lachryma Verena, Adonidem desinentem.

Ceterum Anemones ambrosio vim habent, auctore Diofcoride, acrem. Galenus omnes extirpandi, & arribendi, & ore vitareo refrendi: facultatem obtinere sinit. Itaq; vrbana, ut, commendatam pruriam euocat: faccus ex naribus purgat, & oculorum ne cecitas accedat: lola paucis vicia Anemone expurgant, & lepras deiciunt, menlesq; appetita eliciunt, & letitiam. Et hoc quidem matricare, Diofcorides inquit, folia & caules cum puluere corthae, & melle accepter menles vicio cadem cure in puluere apposita.

*De Anemide Pardalanchi. CAP. VIII.*

**A**CONITA vrbana vrbana sunt: Pardalanchi vrbana & Lycodionem dicitur aliam. Aconitum Pardalanchi dicitur sitibunda, iane, dicitur vrbana, modibus, ut, utiq; lanigine pubeformibus, Modena crassam, ac vrbana Cyclamini saliorum quidem fides, sed amplexibus, ad Caracem magis accedentibus, huius tamen & mibentibus & molibus casti dodiante alior, & ipse lanigine haud carens, sinit, quasi mela angulis, alopa recitat, qui in paraceticis dicitur amulos, ipse sitigine, flores pro e Cluyfentem vrbana, & medio vrbana dicit, ac vrbana ambrosio, qui in vrbana & vrbana pappo-

Aconitum Pardalianches peissant.



Aconitum Pardalianches dierum.



poetefoliantur, quibus subsunt exigua nigra terra ferrens. radice hanc magne, emide  
dum recentes sunt, geniculis veluti articulatae, non recte descendunt, sed per obliquum Gu-  
marum modo serpunt, & subinde exuberantes noue illa postea dunt germina (ita sic mul-  
tiplicante super) deorsum etiam ab ipsa tuberosa partibus, aliquae decursum obcolunt bulbosa.  
Referunt radice exarantatos scorpionum: nam anterior & tuberosior caulis huiusmodi,  
corporei sum cum pedibus, posterior articulatam expriment videtur caudam.

2. Alio verb & huius species subsunt occurrunt, antea illa postea minor, latiusque vixit, po-  
terior, cuius radix longior, minus serpsit, & veruque admodum Carinarum cetera, quibus Scor-  
pionum refert.

Aconitum Pardalianches mstratis, aspera, fuscis, & abruptis gignitur locis, in ipsorum  
Alpam iuga. Descendit quandoque ad montana. In horti Belgij, natus scilicet adoleo  
vbi Muso mente flores conspicui sunt.

Thelypho-  
num Theophrasti.

Dicitur Graeci αἰκόνιον παρδάλιαν, ἢ ἰστίον & αἰκόνιον, αὐτοῖσι, δαλίων, ἀγρίον.  
Theophrastus tamen de Aconito, Myophano & Telyphano scorpionum egi. Et Aconitum  
quidem lib. ix. aliud omnino ab isto desinitur, de quo cap. x. sequente agitur. Myophano,  
quod significare cum Myophano consentit, inter suffrutices ferulaceos vnicum Panico-  
is, Hippomarano, Ferula & similibus refert. Relinquitur Thelyphanon. Aconito Parda-  
liancho Dioscoridis istud respondet, de quo lib. ix. ita scribit Dioscorus, quod aliqno vocat,  
quam radicem similem scorpionum habet, admodum scorpionem occidere aere, & contrari-  
uifere posse, si Helleboro albo aspergitur.

Plantae de Thelyphano ac Aconito dierum quoque ac scien illa egi locis: & de Thely-  
phano quidem lib. xv. cap. ii. vbi ipsum Scorpionum dicit, & quae apud Theophrastum, pater  
de Aconito verò lib. xxvi. i. cap. xi. quo loco plerumque, quae Thelyphanon fuit, repit, quae  
tamen de Aconito non habet Theophrastus.

Exemplum  
Aconiti, a  
Theophrasti.

Dioscorides autem radicem non scorpionum, sed eandem eius similem modo ait ἰστίον  
αἰκόνιον. Sed forte illi, ut apparet, dicto ἰστίον non ἰστίον, & legendum eam Theophrasto,  
ἰστίον αἰκόνιον.

Nomen autem huius Aconito ab ipsa caudibus, praeruptis & fuscis locis, quae Graecis  
ἰστίον, esse Ovidium Metamorphosion vix. sentit:

*Quae quae nascuntur circa vineas caues,  
Agraster Acaenit vocant.*

Accentum autem quod descriptimus, herbarum stachos, plurimum quidem, Dioscoricum <sup>offense</sup> appellat: Offense pharmacopoeorum passim pro Dioscorico quoque radicis eius laetae medicamentorum compositionibus adhibent. Quod tamen Arabes Dioscoricum vocant, aliud longe ab isto Pardalimache est. Hoc quae Anticentis Strampilicentem Leoporda, aliud vero Deringi appellat. Sicut galicorum Leoporda sicut Thacopimato & Diocoridibus <sup>resuscitant</sup> apud vel loci <sup>diarrhoea</sup> ~~est~~. Deringi vero calidum & siccum ac in tertio gradu <sup>est</sup>. Cui & ipse Arabis confertur Serapio, Dioscoricum in tertio consistitum: sed sine caliditatem ac siccatem à quo temperantibus Pardalimachae vulgè dicitur Dioscorica) vulgè abfunt radices.

Nalla etenim astrucado, nulla accentonia, aut similes gustibus qualitas in eis sentitur, quae amaritudinem, vel calidam, vel siccam esse ostendens quaeat. Praeter eorum consistentiam dulcedinem, si quae occurrit gustibus alia, ea optimo congrua est. At dulcedo non excessivam caliditatem vel siccatem ostendit, sed temperantem modicam, ac temperantem proprie vinearum propria est.

Ac proinde huius herbae de radicibus eius qualitas haec longè à temperamenti medicocritate media. Videtur autem normalibus tepida ac elementar aride obnoxio, vbi natus ac relictus est, facultatem sed nocentem & sicco madens si quidam non est expertus.

Aliter ferunt, inquit Dioscorides, oculorum <sup>deinde</sup> ~~deinde~~, sine dolore sepe in febribus compositionibus. Ac proinde propter hanc qualitatem nocens ad oculorum inflammationem potest.

Occidit, idem <sup>et</sup> pantheras, fures, lapos, & omnes ferarum carnibus abutulum. Theophrastus vero non eo modo, sed vel folium, vel radicem generalibus inditum, quae, boves, mures, & oves quadrupes eadem die abutuntur aut potantem verbò radicem aduersus lepraem <sup>deinde</sup> ~~deinde~~ prodest. scribit. Quod haud casualiter horum, sed nonnullis tantummodum animalibus herbam hanc autem radicem esse ostendit. Id quod eisdemibus experientiam ostendit temperantiam. Corradus Gesnerus enim in nostrae aetate doctus & diligentis medicos explorans, refert se, in insula quadam ad Adolphum Occidentem, radices huius recentis, sic, ut supra, in se conditas, in pollinem tenui sepe ingessisse, & quo haec scilicet bebat de, et a quocumque drachmas duas radicem commentum horum se, neque, unde viliam mucosam tenuis lepraem sepe etiam illam, & per se, & cum alia mucosa vel sicca carnalis esse. Item & Dioscori Pharmacopoeorum pro Dioscorico hactenus huius radicibus (licet perperam) vrantur, solentamen eundem peno. Caribus autem lentiter aliud Accentum esse, sicut certum temperantiam, quod Marstonus haud facile credidit, donec eundem manifestis exemplis venisse correxit: ut in commentariis suis constituit.

Ferunt etiam, Dioscoride radice, huius ad motum corporis huius radicem ipsae se solent ad ignem efficere, rursus vero eisdem Ferraro apposito existant. Quod & Theophrastus <sup>is</sup>, qui sepe ascripturus, verba testatur.

*De Acaenit Lycallit, & primum de maiore laeta.*

CAP. IX.

**A**D Lyodori genus maiore referenda occurrunt herbae plerumque laetae coloris florem, aliae cerasium aut purpurascens proferunt. Inter huiusmodi quoddam, minus siue parum alteram.

Maiore Lyodori luteo folia sunt ampla, in completa parte confissa, Plurimum foliorum sunt radice, sed prosi ad herbam distans, haud <sup>appropinquat</sup> ~~appropinquat~~ (ve perperam Dioscoridis <sup>prohibet</sup> ~~prohibet~~ <sup>compositio</sup> ~~compositio~~ legant) sed <sup>appropinquat</sup> ~~appropinquat~~, id est, minores, respiciendum, ac non tardo nigra, superiore in se parte, in maiore siquidem in magis in alba aut casta bipedalis, & quandoque altera, rotunda, leuiter huiusmodi in alba, & nequaquam in totam radice affurgens, in ramulos etiam subinde diffusa: flores autem supra in aemum digeruntur, colore pallidioris sublimis: semel in comitibus signant radices ut plurimum nigrae, multae cum crassa & flexuosa implicatae.

In opaco & montano viret. Repertur in Alpiibus, tum & in alios compluribus montibus, ac tantò in montium conualibus & plerumque locis ampliore caele amphioribus folia arenatis humilibus ac maribus distans etiam quandoque viret inserdam & scopulorum. Dioscoride in his huiusmodi montibus plurimum nasci se fert.

Plurimum autem huius folia tribuit, sed crebriore distans ac minores eadem Filix terram, cubiti altitudine vel ampliore. Item in silicibus oblongis ac rotundis, marimum quadratum nigra. Cum illo respondet (exceptis folijs) cum non in penultimo manuscripto Geom. codice reperitur, qui Vienne Panonae in lectu plurimum bibliotheca à D. Maximaliano 12. Imp. Aug. tributa afferunt. Folia etiam sunt non omnino ut Plurimum, sed laeta & ambrosia

*Accentum  
Sicut dicitur  
in Codice  
Geom.*

Aconitum Lycodanum horreum.

Aconitum Lycodanum Cod. Celsum.



Erra instar dentelata: caulis tenuis & latus: filique tenues & oblonge. radix non medi-  
cruis, veritas ipsius squillas marinas se sine videtur.

Aconitum istud Dioscorides *Aconitum* & *aspidion* cognominat: Arabes *Stragularum*  
adipid est, Iapono nunciat *Lupanum*.

1. Primo loco de his primum, quod sine cognomine est, Germanis *Wolffur*: Belgis *Wolffur*  
Hispanis *Ferax* *aspidion* Gallis *Toril* dicitur: Officina plerique: Napolitanis *horreum*.
2. Alteram, cuius imago in Codice ex aetate Codice, *Lycodanum* vocatur, Ponticum cogno-  
minatum, esse posse. Totum siquidem *Lycodanum* in Dioscoridis exemplaribus vocatur  
nunciat quorum unum Venantius, reliqua duo in totum vltim Medici veteres, quibus  
nunciat *Punicum* nominatur.

Ex illis tamen Marcellus Virgilius, quae de primo & altero traduntur, speciatim, & ni-  
cum tantum à Dioscoride delectat, quod videtur primum in Iuliano gigante nunciat.

Paucitas autem latus vltim & reliquorum *Lycodanorum* horreum ex aetate est, & reli-  
qua quoque aetate aetate permixta. Venitur, inquit Dioscorides, ad venantius in primum,  
crasius ipsius insidentes carnibus, quibus delectat lupi in occurrunt.

*De Aconitum Lycodanum horreum.* CAP. X.

**A**COMITUM *Lycodanum horreum* paratum sine maris, humilis est herba, proter filo-  
rum pediculis nullis cauliculis habens, sicut autem ha breues, vix palmi altis, & ter-  
nae. Solida verò in singulis vltim, cum unice in posse quidem rotundum, sed vltim Napol-  
itanis *aspidion*, & profundis incisus radicum dissectum, quibus subinde modus insidit in-  
cubus latus, forma *Panicum*, quem tamen non capendum, sed filique posse siquidem per-  
ter vltim quatuor sursum accede, veluti *Lycodanum* radacula subest crasso, tuberosa, post  
*Aconitum* nunciat, quasi gercula aliquot articulat, galitans admodum acris, ea quo filo-  
rum pediculis exiunt.

In caulis quibusdam ac moxibus reperitur, & quidem *Panicum* vocatur, ut *diagrostis*  
*P. Penn.* & *M. Lobelia* referunt.

*Aconitum lycoctonum*.



Floret in hinc mensibus Aprilis ac Maio, sed in Belgii hortis multo ante, & non raro ipso Iuniano, vix elementior Hyems est.

Aconitum hyemale dicitur hybernum hinc à nobis dicitur. Aconitum autem speciosum esse, & forma foliorum illi equantissimum, tum & ipsa permixta herbe facultas ostendit.

Ad Theophrastum autem Aconitum multum accedit, quod ab ipso lib. describitur ix. Est etenim, vt scripsimus, breuis herba, nullum efforbe sine superfluum aut adnatum habens, nulli raris brachata, radix quæque sine Nucis, aut etiam quæque, ad est, præda. Ficus similibus dicitur potest. solam videtur repugnare folium, huiusmodi quædam Chæronideæ. Sed fortasse non *agrostoides*, sed *Gerogis* Theophrasti legendum est: quo modo si legatur, nulla est repugnatio. Nam huius Aconiti folium ad Ranunculi vixit similitudo sine accedit. Verba autem Theophrasti de Aconito sic se habent

Aconitum rufum, vt scribit, in Creta & in Zacyntho, sed plantam atque speciem in Heraclea Pontica habet folium *agrostoides* (sicut *agrostoides*) radicem similibus & forma & colore quæque, ad est, Nucis: vix illam latissimam in hac esse, folium verò de fructu nihil facere affirmant: fructus autem est herbe non fructus. *Strontarum* est herba, *est* *lycone efforbe*, id est, nullum habens

ignitum aut adnatum. Nascitur vbiq; & non in Aconiti solium, à quibus appellatio sentitur. Est autem et vici Perisandynorum ( nonnulla & vicius Maryandynorum in le- gna.) Amat loca porsiffimam petrosâ. Non patitur et neque omni, neque viliam animal.

Petrina autem ac facultate hinc herba perisandyni admodum & valde exacta habetur: quæ tamen suam Aconitum esse, Theophrastus aperte verba testatur, remedium eam supponit ac esse repertam.

*De Aconiti Lycoctoni aliâ non herba.*

CAPIT. XI.

**A**LII LYCOCTONIS, que colore floes à superioribus distinguitur, & siæ sunt species. Porsiffimam has Nepeles recipi, nisi fortuito legimus de causa de scriben dicitur foret.

Primum genus, quod à flore Delphici cognominatur, procerum assurgit caulibus raris & Nepeles sola vixit similitudo & creberrima inebriat & dicitur: hinc sicca dicitur in caulis superius, vix in longum composita spicam, & paruos ac obliquos colosæ parparum: *ambulans*, *serpens* sui foris Regii) quem Delphicum haberi scripsimus in possimus videlicet corniculatum desinens: sicut & semen vt maiore Lycoctoni hinc: radice oblongæ, cassæ, mesant quos demittuntur posuisti ad hericentibus illamem.

Alterum tota externa sic Nepeles in fert, caulibus videlicet dactylis, filis tripliciter bulbis, flore caruleo, hiante, ex totidem partibus, eodem ordine composita, sicut in omni ac sine ornamento similibus: sed radix dicitur filamentis ac tenui multo in partem modo consistens, ac Nepeles nequequam similitudo.

Tertium genus cauliculos proferit tenuiores, breuiora, dedrante alicuius folia durifera & Ranunculi aut Lycoctoni hinc, rariora tamen: folioli caruleo nescit colore, patibâ mitem quæ Nepeles illi quæ & fertina cum alicuius comitant. radix fibrosa, negreata, adnata habende cognos vici bulbis facile propagatur.

Transit hinc genera aliunde in Belgii hinc hortos. Fertur alicubi in montibus septem. Tertium Hictronymus Tragus Non ubi fertur haberi scribit, atque alicuius flore dicitur parparum repertam.



Lycostemon flore Delphico.

Lycostemon cerealeum parvum.



Primum ac tertium vñ cum Napello superminere aut non multò post, sed secundum  
secundis multò floriferum est.

Lycostemon esse speciem abundè manifestum: & nocendi non minus obnoxius facilius  
proferat fore.

De Napello. CAP. XII.

**N**APELLI caulis supra duos assurgens ovatus: foliis circumscissis: ut Ranunculus man-  
bas, è virose nigrescentibus, proxa tamen nonnulli albicantibus, saucrosioribus non al-  
tioribusque insertis in pluri lacrimis filis, & magis salacemibus: Flores à medio festigant  
perunt, ordinata successione prodeunt, colore elegantè ceruleo, haurientes partem qu-  
dam, omnibus suis partibus propemodum reflexentes, quaque extra consistunt pediculis,  
quorum major superior cucullis aut cassidi capitis crasso operimento similes: dum haec con-  
tegnant medio ceteris motis reliquae trigulae infimae nonnulli uerò ipsa flammibus motis:  
è quibus duo repandi exaristat styli, non prorsusquam elocetur cucullus, se extrorsum obli-  
què oblonga, crassa, Napi figura, tamen minor, totis nigricans, utris candidior, caeteritate gran-  
data, profertur in hortis.

In Alpibus Anania & Rhodis, cum aliis in montibus, nullis sciant procerat, apud Belgas  
quandoque in hortis reperitur.

Mais aut dantes, interdum etiam ferula, aliis locis florè vigent: semen Augusti de

Recentior etiam vñ est quæ Barbara Napellum à figura & effigie Napi in radice appropin-  
quæ: Germanis *Spießkraut* / *Blauwurz* / *Heppen* / *blanc* / *marra* / *perre* / *traff* / *hepp* / *sch*  
*Wortkraut*. Dicitur & Thera quasi *phœa*, id est, interitus aut corruptio: item & Thera aut  
Tura, vocibus adeptis.

Lycostemon est species, habet autem suas Auzonnas non contigit & lib. n. deinde & lib. n.  
Pm. vi. tractam primo à Chanach adq. id est, strangulatore lupi, sine Auzonnis Lycostemon  
superminere.

Touca.

Foris vñ & Toucaum dicit. Toxicum etenim perniciosam medicamentum, quod sicut  
haec, sicut passiflora: inficitur veneno dicitur à tois, quæ Barbari Toucaum dicit  
Touca appellatur. Conficitur autem istud etiam ex Napello, quarequam tamen & ceteris.  
Dabo-





Elaborata Aethiopia radice valde & insigniter amara, adhaerens ut veneno omnibus, soluta ad propolis, spiritus liquorum & mucosorum etiam per inferiorem ventrem educit humorum humores & ventris tunc pellem educitque.

Hugo Solarianus modo per inferiorem ventrem, sed & per superiorem largitur Anthon radicis expurgationem mollem, modum esse ad quantitatem Felsi (quam vulgò Fabae) maculato aliquo aut vino: dandus dicitur corpore.

Anthon Guaiacum Aethiopicum magne etiam adhaerens pellem efficit ut seorsum tractatu deperit, differens in cap. 121. Et quod ad ex pericentum, inquit, veda, confirmatis cum Diacumbis in Aethiopia radice exalbit. Et est herba, quae iuxta Thomam illam dicitur herbam rubram, et quae venens in conficitur, cum quae in Alpbis Solarianum & Puzoslycapas silycibus venantur. Et tunc radice Aethiopia simulatae nucleis olivaceis, & est Bengus dicitur Plone, quae est adeo venenosa, quod omnia animalia sua interficit venenositate. huc ille.

Mentemere quoque Anthonem Simon Isaacus in Synonymis, & Arnoldus Villivestanus in tractatu de venenis: sed quae adhaerens, non sine nocum aut cognitam ipsi fuisse soluta, ostendunt.

De herbe Paride.

CAP. XV.

Herba Paride.

**P**ARIS herba cauliculis in græ silvæ & singularium, atque circa hanc folia quatuor, ab uno velut centrum decussis sine emicis figuram concurre digesta sunt haec lata, venosa, oblonga, si basi carina, & aliquantulum acuminate: in siligo si per hanc dicitur prode herbaceum, foliis aliquot angustis, veluti calycibus alabastri, insidens: sequitur inde baccæ instar vas aëris, semine utius minuto fibrosum carne, ut Habacobi, fissa, radice tenuis, longiuscula, gemellis aliquot articulis, oblique tergit, alibi interdum progemma.

In sylvis opaco ac perinde alias umbrosis pingui ac lecto reperitur solo.

Aprilis florit: baccæ Mæo maturatam assequitur.

Reverenti Paridem ferè herbam: plerique tamen Viam versam, & Viam Lupinam appellare nonnulli verò etiam Solanum tetraphyllum. Falluntur, qui Aconitum Pandoliches existant. Germani *Welschpflanz* autem Herbam *Welschpflanz* & *Spinnkopff*, id est, Araneam, ab eminentia videlicet araneae formæ, quam baccæ vas cum reflexis capillis alabastri per maturatam exprimit: Gallæ *Coste de regardi* Hispani *Conceita*, ve quadam aunt.

Faci hanc a uiam ferat refrigeram, & Solanum proxima.

Supra Sanctus aduersus mentis e motione, uicium, & fatigantem, commendat, cum per moeds diuturnitatem aut feruorem accidentem, quibus praesens seruit ascriptione concessas: si x. contumax diebus dicitur dicitur oculis palpebris hanc herbe icibus propinetur.

De Papauere.

CAP. XVI.

**P**APAVERIS duo prima genera, Pius auctore: Sarpurum, & Sylvestre.

Ad Sylvestre pertinet Errucum & Coenoculata, de quibus posterius & florium.

Satis Papauer tres sunt sicut, nigrum, utrumque magnum, & minus tertium.

Alium Papauer folio pennis oblongo, lato, lauis, lactuce foliis longiora, candidiora, magis, in quibus modis castis sic et saporem, quandoque morbida, in curis siligo flores candidi, in quibus modis ab initio multis staminibus stipatum apparet capitulum quod ad alium solibus pennis tamen oblongum formam habet, & superius operculo conegit, in tribu mentem non parum in locales dicitur, in quibus semen copiosissimum, sed in

MAIUM,



Papaver nigrum feriatum.



Papaver feriatum serotum.



notum, rotundum & candidum. radix subest nullius momenti, descendens in albam.

1. Hinc simile est nigrum Papaver, sed capsula aliquando rotundior & magis glaberrima elegantius pharacco ruber colore: fermen nigrum.

Sunt hinc horum duorum folia, ut & reliquorum, quædam, casus suis usque, si quæritò deservant ratio, sed tamen quandoque pluribus, nec ut in ac dactylis dissectis, adhibentur in floribus dila.

2. Tertium Papaver caule, folisque, floribus item & capsula minus est. flos incedens purpureo obsolevit, & diluam quendam colorem ostendit: capsulum quoque rotundum, sed maturato firmius foras in lobes aliquos, quæ parte operæ utram ipsi videt, circulatoribus, faciliem diffusionem firmius viam præbens, quod aliis duobus non contingit, quorum in acia permanent calyces, ut nullum queat elabi semen.

4. Repertum verò & Papaveris genus, cuius floris folia multo plicata, non verò habuerunt res incisa ac dissecta apparet. Color horum subinde albidus, frequenter rubens, quosq; ex utroque varii permittit. Rubent verò nonnulli interio colore purpureo immixto, alij tamen dilutius, vel minus eleganter.

Capita huius generis Papaveris superne parte, veluti coram, hanc, facile quæ ob splendorem incidit, quod modò albidum, alias nigrescens est, pro flori videlicet colore, quæ sunt.

Efficitur hinc, capsulae eorum vulnerata, liquet candidas, quæ ad medicum usum colligunt, & densius Opium appellatur. Colligitur tamen præcipue ex secundo genere, non modo Dioscoride, sed & Galeno, ac Plinio testibus.

Expressat & ex capsulae ac folia simul succum, quem Meconium vocantur.

Serunt hinc genera in hortis, ac etiam non raro in ipsi arvis terrarum frequenter sunt, quod crebri non hinc pluribus quoque reperitur loca, præsertim tamen in Italia.

Iuno mensis flores exoritur semen post perficitur.

Grecis *σίκων* Latine Papaveri nomen Officinæ firmius novellæ *σίκων* Germani *Wagstein*, *Wagste* Belgis *hart* & *manne* Hispanicis *Demidra*, & *capit* Gallicis *Pavot* in *Papavere demitice*.

1. Primum generis, quandoque calyx oblongior & firmius albidus, flosq; nigrus, alij

Papaver Rhoeas quercivum.



est, Gramen ac horrenū dicitur. Dioscorides  
Sedative etiam nominat scilicet vulgò Papaver  
album.

Alterum genus nigro semine, Dioscorides  
σγγορ sine στυαχτη est, quod, inquit, σβδρη  
vocatur, & à nonnullis joas, qui ex eo Opium  
colligunt. Plinio & Linnæo Papaver nigrum:  
pluribus nostris avans à floribus rubente colo-  
re Papaver rubrum.

Tertium genus σγγορσγη hoc agrestis est, J.  
Dioscorides auctore, idem & papaver sine σγ,  
id est, medicamentosius, aut ad medicamenta  
vtilius, minus & oblongiore capsula.

Ventilabris aut hoc loco subesse mendam  
aceretorem. Tertium siquidem istud genus ha-  
mifus ac minus est, neque oblongior, sed glo-  
bati ac rotundiore calyce. Fieri autem potest,  
ut pro σγγορσγη perperam scriptum sit σγγορ-  
σγη & σγγορσγη ut in his sitibus, acciderit. Non  
enim huius (ut dicitur) sed candidi longi-  
us & minus sit longius utem, sed minus erant  
Papaveri.

Apud nos verò de tertium istud Papaver agros-  
te illud esse, ex quo Dioscorides cum politico para-  
da: de qua Galenus prolixo lib. vii. De medi-  
camentis secundum loca. Nam Cniso & post  
Themisonem Democritus, σγγορ sine σγγη  
accipendum præcipiunt, & illud quidem, ad-  
dit Democritus, quod non ferunt: μέλας α-  
γγορσγη, inquit, αβδρη γορσγη ανσγημα, quale ter-  
tium, quod nullis ferente sepe nascitur.

Delphinium  
concolor  
Linn.

Ramus lib. xix. cap. viii. sub finem, tertium Papaveris genus Rhoeam Graecis, Latinis <sup>σγγορσγη</sup>  
Irisem dicitur, & spontè in arvis cum Hordeo nascitur tamen illic sicuti genera esse, <sup>cap. viii.</sup>  
opa illud tertium eorum fuit. Art. lib. xx. cap. xviii. inter sicus & slyvestris modum con-  
sistit in ostendens, vel tertium ex nostris, vel sicuti dicitur in illis de Emacina in frugibus  
nata, haud rectè se agnovisse.

Cerevis Papaverum omnium refrigeratione vtilis, ut Galenus in lib. De simpl. med.  
facultatibus.

Semen, ut idem in lib. De alimentorū facultatibus ait, paribus virtutibus eorum condicione nam  
inspergitur. Sed album nigro, eodem auctore, præstat Refrigerandi usum ipsam facultatem  
habere ac tenuis formam esse, corporisque nullum co mmemorabile perflare alimentum, quoniam  
addit illi autem tenuis huius, lechisto quidem incultum, ut secundis melleis quandoq; vtilis,  
cap. abstragemus. Refrigerandi vtilis eius potentia haud magna observatur. Ad somnum  
concipiendum non multum efficitur est.

Quotiesquid ex eo exprimitur, gratum ac edule est, panisque illatum, aut alio quous  
modo in cibo, eius refrigerationis sensum sentitur. Condensat verò ex terni generis se-  
minis frequenter.

Capsulae capitula maior inest via, que ad somnum conciliandura, de hisse nec q; silen-  
diæ utrimodis, plurimam facit, ut propinquamque, sed tamen maiorem vim. Opio ob-  
tinet Opium fortissimum esse hoc ignavus deaconum. Viresque autem quous modo, vel  
affragant, vel capis applicatum, somnum, ac subinde profundam molestemq; soporem con-  
ciliat. Opium copiosius hauritum etiam moriferum, ut vult Plinius. Doloris autem omnes  
spasmodi, egros curabile malum non raro relinquit.

Ostenduntur eius vtilis, ut Galenus lib. xi. De medic. secundum loca, sicuti partes, aded ut  
pelles carthagine opus habeant. Sic & collum ex Opio malis detrimendo facit, ita ut de-  
bitis oculum ut debilitent, & vtilis habet ad vtilis, veluti etiam auctores quous in dapsis,  
quousque ex Papaveris succo ad vehementes ariam dolores corporum vtilis. Quousque  
spasmodi omnis sunt medicamenta & pharmaca, que ex Papaveris succo conduntur itum  
spasmodi: neque nisi extrema vigentia necessitate ad eorum vtilis perueniendum, edim  
videtur

videlicet nullum aliud mangitionem tenuissimam de coloribus operari solent, vel facerent: ut Galen. ubi lib. De medicamentis secundum loca tertio, haec dicitur doceri.

## De Papaver erratico. CAP. XVII.

Papaver erraticum.



huic quod velleborum. Galen. Capsulae, *paves fennae, confectio.*

Et postquam nonnulli Dioscoridiam, quod vocat hanc dixerunt. Decidunt tamen flores quod cadit et alia Papaverum generibus eam corniculata. Nulli enim Papaver dicitur adhibetur esse. Quam cum citius me pervenit. Ut eam non minus commone est, semina membrana quadam integ. ac vi sua vagina quadam continet, quae ipse se exire non solum de se sed de se delubere parat, uti quaterna ipse solag. et dicitur. Rhoadiam non modo hanc, sed et alia eade eadem commone esse potest, si modo à stoma facti scilicet dicitur. Quod si verò à stoma profuturum (vix apparet) Rhoadiam cognoscere ac effere, in amomone proprium erit, cum, et dicitur, cum me ac facilitate lumen vacat. De ferri et hanc erratico, si dicitur manifeste.

*Amomone  
Dioscor.*

Conoscere autem erraticum aliud Papaver cum Anemone videtur sicuti à voce Anemone vox, inter confusa Papaveris apud Apuleium appellatorem. Dioscoridiam Anemone sicuti cum Papavere Rhoadia à stoma confectio, cap de Anemone Erbat. An amomone si iam explicare poterit, relinquimus ad dignitas et mandam, ubi non sicuti.

*Amomone  
Dioscor.*

At facultas erratici Papaveris ista est superiorum Papaverum, *Stigma & stoma.* Plerique fallacia experimenta. magis quam ratio ac me ducunt ferunt, flores aduaria plerumque commendat, statim accedente dolore, vel illatum ex ipse liquorum, an ipsum ex frequentis foliorum maceracione propinqua & lumen non raro dicitur coarctat, sed ac perennat in eisdem inde laet, aqua ac cum difficultate ipse procedente praesens quibus non est robusta corporis constitutio, vale neque vicia. Errori huius occasionem praebuisse poterit Bapista Sordus, qui flores huius Papaveris aduaria laet dicitur, sicuti dicitur exhiberi, ac aduaria languinis spiritumores viles, memoriae praecipit.

De *Papavere corniculato minore.*

CAP. XVIII.

*Papaver corniculatum minus.*

**P**APAVERIS corniculati tres reperiantur species, & magnitudine & formâ coloris differentia.

Quod minus est, reliqua *Papavera* caeruleis & rubris utriusque ac laciniatis foliis satis referuntur, nec latibus, sed normalibus longioribus, inter se foliorum Verbaſci caerulei minus minus brevioribusque in plures alia distantur: sunt sedes colore lacteo pallente, quos excipit sem capitulum, sed semine oblongum incurvumque corniculatum, hinc illi quæ, in qua semen nigra, radix subest oblonga, vitalior, in normalibus quatuorque reflexa arbor.

Valerata herba succum præbet luscum, & glibra salilaginitate defere, ubi sine spina est, membranæ videlicet, arida, & squarida, quæ aut hæret in herba sicco illo magna ex parte delinunt.

Lenio ac lubo florere solentur.

Grecis *ρῶον αγγελίαν*, Latine *Papaver corniculatum* ab Orbasio & Atrio *αγγελίαν*: Plurimum *Papaver Paradiſi*: Cavillo *Papaver lacteum* in *Papaver maritimum* atque in de *Hesperis* *Dormitans aurescens*. Sunt & qui bus *αἰμαίνης* quæ, ad et, *Papaver sylvestre* à normalibus quoque, Dioscoride teste, *Glaucium*, propter foliorum similitudinem. Atque hæc in Officina aliam *Mermitha* *Mermitha* sive quædam *Arabibus Glaucium de Germania* quæ *Χιμαγύρι* quædam *Gallia Junonensis* *herba Papavere arvensis*.



Uti autem incedendi & abstergendi, Galieno auctore, accipit.

Radix, inquit Dioscorides, ad dardas cocta in aqua & pota, commendatorem dolores & lectionem efficitur sanare potest, his autem qui emissa & de quibus reddunt viras, prodest.

Semen acetabuli mentibus cum aqua multâ potum, alium lentes pergitur: folia cum oleo tenui aquam in mentorem sanant & abstergunt.

De aliis *corniculatis Papaveribus.*

CAP. XIX.

**P**APAVERIS hinc alteram corniculati *Papavere* generis, prioris tenuior ac minus est, & folia hinc modo alio modo, normalibus pilosis: cauliculis cum semilibus & ramis procumbentibus floribus in medio sunt colore rubent, diluibus tamen quibus *Papavere crinale* corniculatum minus est, cuius cacumen operculum foliis de, aut veluti latius capitulum infidetur hinc in hoc cæcogum nigrum, radix vero oblonga.

Tertium hinc generis *Papavere*, etiam sicundo exilior, ac foliis tenerioribus, in masculis vitalior parvitas defectus foliorum minor, caulibus purpureo colore nigra *Vicia* annuli, sed arbor longis folia.

Nec in masculinis, sed proci à minus hinc genera reperiantur. Angelus *Pala* & *Bamboloni* ab *Vite* aurescens, qui in *Mesiam* commentum sunt, offendit se illa tradit, in *Antagoras* & *Castelle Hispanæ* genus, locis mediterraneis, in agris & iuxta vicinas *fermas*, speciosissimè nec quæquam referentur.

Uti quæ corniculati *Papavere* generis habentur: neutram *Anemones*.

Estimate à plerisque rubentibus *floris Glaucium* esse. Nec in totum à veniente altera videtur ferre. Nam, ut *Dioscorides* ait, *Glaucium* folia sunt *Papavere* corniculati similia, sed longiora, id est pungentiora, *αγγελίαν* quæ similia sunt in terram procumbentia, grassa odoris, pilosisque utriusque, succus vero male in crocutis. Atque hinc formodi sicco *Papavere* istud persiculationem hinc debet, testis sunt *P. Pena*, & *M. Lobelius* : amaritudo quoque facile esse possit, utpote salilaginitate glibra carens. Quæ si affinitatem cum *Glaucio* (si non idem) esse possit offendunt.



Papaver corniculatum rubrum.

Papaver corniculatum violaceum.



Aut Dioscorides, nasci Glaurum ad Hieropolim Syriae. sed & alibi quoque reperit, quod prohiberi & fortassis nonnulli etiam immutatum.

Hypecca.

Ceterum corniculatum illorum dicitur Papaverum nostrum quidem seculo nostro, quod fœmura, vltis, atque idcirco de vitibus et ficibus tantibus nihil occurrat afferendum.

De Hypecca. CAP. XX.

**A**D Papaverum corniculatum generi quodammodo etiam pertinet quod Hypeccen dicitur, solum hanc quidem tertio corniculato Papaveri temeraria, nonnulli factis in hunc modum, colore & aspectu, tum & figura præcelsissima apertis Ruræ minime sunt similia. caulis hinc est foliatus odorata, perfoliatus, luteo colore, & semis foliata, duobus in partibus, reliqua partem exigua cornicula succedunt proceræ, et scissura, in his ferunt floriferæ, quod angustior, radix oblonga, fibres non creas.

In terra & iuxta agrorum margines præcipue locis reperitur, veluti nonnulli Hypecca, & in Gallia quoque Narbonensi, præsertim iuxta Neomaniam Celsam.

Turces, & nonnulli Turces, veli Dioscoride dicitur. Latine Hypecca vocem tenent. Cui pro Curno sylvæ hinc sit habenda loca, nulla occurrunt ratio, pro hac terra ad insulam Martiam has referat, si nos non fuisse pilosum.

Natura autem & facultate refrigerans Hypeccol est, & Papaverum facere dicitur veli Dioscoride.



Hyocyamus albus.



Hyocyamus luteus.



**H**YOCYAMI tunc veteribus fuit, niger, luteus & albus. Posterior autem Peruvianum quatum admodum.

Niger Hyocyamus tunc promit ampla, longa, lata, candidissima, mollis, lanuginosa, laciniata: marginibus ciliata: caules crassi sunt, cubito altiores, ramosi, quos flores continua sine longis consistunt, patentibus calathis figura affinis, colore recurvatis marginibus fibrosa, & flavo-roseis vix purpurascensibus aliquot vixis, in medio vero ex albicantibus purpureo nigricantibus calycibus succedunt rotundi, oblongi, crassi, ventricosi, superius aculeati & operculati, in quibus semina haud ita magna, colore fusciora, raris crassa, prolixa, albicantia, alteram vixis annum, quoad usque valde sunt semina perfectiora. Grana odoris ac ingratissimi sunt, caper aggregata & formolentum indolentia.

Semen vix quicquid legitur in libris, & loco haud cultis.

Luteo Hyocyamo caulis simplicior, folia indivisa, minus, lata ramosi & oblonga, Solani & lutei maxime candidiora, ac molliora flores in cauliculis sub longis incedunt, luteo pallens colore, aliquando minore quibus nigricantibus sunt similia, sed minus, acerosa & sparsiora sunt semina pallida, suffragina, ut lutea pallida.

Candide Hyocyamus candidissimusque solis est, lanuginosa valde, & aculeata quoque circumscissa ac sinuata, sed minus, acerosa (has quatuor primum, sine nigricantibus) luteosque sunt solis & candidum candidosque candidi, minore calycibus luteis, haud quicquam sunt semina candidiora.

Haec in postremo Hyocyamo can fere, nec alibi in Belgio qualem in hortis, & quidem nec frequenter reperitur. Candide quoque maxime candida alpera non raro primum, primum vix Rhodanus in Narbonensi Galliam infert.

Albi meribus & non raro in caulis Acosmum omnes flores sunt interca postrema. Graeci Terebinthi, Latini Apollinarium & Fabam suillam: Arabes, ut Plinius ait, Altracum & Altracum vocant. Albi, clariora sunt ipsa vixis referunt, Atracum, ut sunt lutea Fabi, vel lutea, & Arabes, ad calycem, & in medio lanuginosa, & in medio albi calycibus à Pythagora & lutea Syllae, Zoroastri & lutea vixis: Latini, ut Apuleius scribit, infusa, Altracum, Syllae

Hyoscyamus albus.

Hyoscyamus  
albus.

& dolores omnes sedum aduersus acres calidasque defensionibus oculorum diuinitus potissimum proficit: sanguinis crepantes & resu habita compellit profusa in ad testum alarumque partem inflanti moros adhibere.

Profant subinde vel sola impoita sola, quoad oque eadem complacuisse pernales. Est & sumus folus nonnunquam vltus additur verò & anadoto dolorem sopens barata commensis aut in aceto decocta dentium dolores finire potest. Breuiter, Hyoscyamus similem Opio ac Meconio facultatem habet: inunctis quoque & ab ipso, quod ab his periculum. Testatur Dioscorides sola in oleo sumpta mentis emorionem facit. Proluciam folus morum corrumpit, si plura quibus quatuor bibantur.

Minor autem habetur candidus, quem medici, Dioscorides inquit, accepto vitale habent: negotii determinans improbatum.

Galeas nigrum eam inbasam ac soporem afferre affirmat: huiusque florum sic lectum propinquum obtinere facultatem: fugiendum utriusque ut unalem ac vnicolum candidum ad lasationes maxime idoneum esse.

Officina tamen passim pharmacopolorum in Germania quodam ac Belgio, nigra tantum lacto & albo vi plantam desiderant.

#### De Hyoscyamo Præparato. CAP. XXII.

**P**ERVIARIUS Hyoscyamus alior est non modò nigro, sed & lacteo. caeteris eius alius vel plures cubitos non raro amollitur, rames acemillis brachium, qui folus cossellibus lani, oblongis, acuminis, marginibus quibus lutei Hyoscyami, Oxysquatu fræt fustibus, sed tamen laticibus, mollibus dilutè viridibus, tenuisvique hirsutis, que quoadoccosi sic adhaerent, ut ipsam quodammodo amplexi videantur: alia: verò è pediculo non magis promouent. Flores oblongi formæ, artus coracis, maiores pubescentique quam Hyoscyamo lacteo, ambare quinquagularum, colore dilutè purpureo, & ad marginem procerodum: ibi beantes. vultula & femina quibus lacteo, radix crassifcula in multos tuberosos cadunt.

Ex America, quam Occidentalem Indiam vocant, prociens, innot quibus nigro Peruvio, à Europam primam venit, vbi in hortis fere feliciter adolefcit, vno anno ad obsolescentiam peruenit.

*Hypocyran Peruviana.*

*Hypocyrana Peruviana alba Linn.*



Inter Verofab A uguifram aut quandoque ferius floru, fettes polita succeda.

Anence meole Peruv appellatū alij Herbam ficatam, aut Sardiam herbam: nonnulli Romanis: Nicolais Monarda Tabaco. Hypocyran effe fpeciem non forma modo quatu lras, fed & affinitate offendent ficutitas Sepere in fiquidem arduat, mentem croatica, & fl-minclometan confitutioem addit, ut folo fuito accepto, vt refert li. Andrea Tice-ma. Sane autem huc ille fapientiam ac frigidiffimam opera, quatu & Hypocyran.

Inferat ficum citiu folium Palmæ copulato folio, deinde illo vino à parte accento, per altam fumam adorū, vinctis pariter ore naribusque capitur, dolorum analera montaf-mafinaque oblationem, & huiusmodi quodam unguo, pōit largire vfu abarum erum, vbi à mofifimo vino, adfert. Expurgat verò & eo modo multos per os, auris, tumores, ac certam fupervacuū abfium.

Calidam ac ficam hunc Hypocyranum effe, & quidē fecundo ordine, Nicolais Monarda ferit, ac vna refoluta, ferdiaque repurgandi cum quadam evagaa adfolutione ei facultatem adde. Ad h. verò & ei Narcotica fuae fupervacuū vifum & per altam expurgatōis, nec non, vt Monarda f. vobis, & Alexpharmaca quodam.

Cafidam autem facultatem hunc obtere: foliorum olivide acrimonia, qua non modò gūfta feritur, fed & vltimū rinasarum partium virentibus folis impolitis, quandoque propter Salivam verò & commanūcena folia citut ac peritiam demabit quod & fumus indoran acceptus pofuit. Que caliditate hanc evagat hanc participem effe offendunt. Quocirca erum commanūcena aut in ore dorena peritiam evocant ac falivacione pectur-nar, os omnia calida habentur, velum Pyrethi radia, & Pampulle fofitrag, aliisque fim-plexentia. Narcotica autem & huius facultas hanc in obfcuru effe. Nam fumus per os nar-tique recepto fimilis ebrietat, mente perturbata, affidua fupervacuū, cum non raro formos fcedat, veluti ab affumpto Opio. Quod & acrimoniam quondam gūftu refert, & coliditatis ideo hanc effe efpera. Quam & commanūcena ac affumptum mox erit in pectore calidum quondam ebrietat, nec nō tam en non in vna peritiam: vt Petrus Bellonius fup- pularum lib. fectio ferit vbi & Turcas Opio frequenter vtu refert, & ferridracima pon- der ipam affidua, nullo alio fuccedente incommodo, quibus quod leu inde quodam ve- lumbentate comparat. Ita quoque & Hypocyran effe gūftu acia & facultate calidus,

marconiam rubeam non facilius rem obtinet. Consequitur autem hinc videtur non modò Hyposcyamus hinc. Peruvianus, sed & Papiensis factum sine Optum ex differenti bus partibus consistit, quibusdam videlicet acerbis & calidis, alius verb ex trine frigida, marconice semper sine frigida sententibus. Si modò marconica vis sine facultate exere man frigida rem conspicitur, ut Galeno de venenis omnibus visum. Sed si marconica facultas non ab eximo de quanto ad hinc frigida quasi tunc pendat, sed à substantia essentia procedat, ponit Hyoscyamus sic calidus simul de marconico esse. Temperare quidem calidus, marconiam autem non temperata, sed ab ipsius substantia proprietate. Non secus ac purganti medicamentis, non à terrore potentius, sed ex terrore substantia essentia sua videtur. De quo & Præp prætib, quibusdam sicut scriptura. Verum est, Hyoscyamus Peruvianus, quia acrimonia sua caliditatem ostendit, marconica facultate haud est destitutus.

Solum autem hinc Cepheleg ac Hemerisma prædilectio esse : tum de vitæculo perfrigitur laboranti præterea potiorum, ne plurimisque dolores habet prædilectio : uti salicacibus prædilectio esse videtur : amantorum dolores sedare, si caliditas subueniant, partibus admoventur, Nicolais Monardis ait.

Prædilectio verò & ad dentium dolores Hyoscyamus iste, si hinc hinc faciat, utibus dem extrahatur, ac deinde ex solis pitula admovetur.

Succo cum lactaria coctus assis prædilectio expellit, uti bilicositas si solo impolito. Idem verò & vitæ vera expurgat, deceptis, & ad similitudinem pendit eisdem auctor.

Vitæ autem hinc solum apud Belgas etiam plerumque, ad versus scabiem curaque sedantur, & ad visum etiam curantur. Calidus verò & non busis corporibus tantum modo adhibetur, sicut qui lentari Doliberos quosdam ac lentares non forte tantum horum visum. Apoclym, ut videtur, ab causam, à Peruviana herba mutata (quod ac Thucetia) in America adhibetur, neque illo vitæ modo.

Succo verò hinc vitæ quatuor aut quinque vicinarum pondere, si cum vehementer frigida vitæ purgata, longum deinde de potu rudi in subiectione formam, ab ameo obleratum in acceptum. Sicut autem is qui assumptis rubus, homo toris, medus etiam, hydropelaborans, qui ex somno expurgatus, rudi in potum que postulat, ac deinceps hinc hinc. Atque hinc expurgandi quoque facultate in Hyoscyami hinc habere cognoscitur.

Narra ut verò de idem se aqua ex solis per organa deplata à febribus rubra multa habuisse, hinc pauco tempore ante accessiones propinata : deinde oleum ex telis scabie in sic rudo suspensa collegisse, quod ad scabiam vulvorum, curationem in singulari boni acuminis andarem verò locum palente intertingere non modò hominum, sed & equorum citò curat.

Veniens quoque de hinc Hyoscyamus in hinc, & necesse malum in repone, videtur hinc facio in hinc, solo deinde superposito, Monardis refert : qui de a curat omnia venenatorum morbis hinc quoque committat.

*De Solano horten.*

CAP. XXIII.

**I**NTER Solana vnum horten est : Velicarium, Soponiferum, Manicum reliqua, quibus Lethale vocatum ex recentiorum accedit sententia.

Hortenale Solanum carle cubitali altum, & sic quibus alio ramo seu solo nigritate, rubi, Jatro, Cucum affinis, sed hinc ac mitiore. Flores candidi in hinc aliquid in recentiorum potus vitæ hinc dependens, per omnia vitæ, mature verò, ut nigricans, vitæ hinc, aut hinc colorem videtur candore, vitæ de hinc.

Solanum istud multum vigatur locis, nec enim modò in hortis, à quibus cognomen tamen accepit, & in quibus crebit alio herbis permixtum reperitur, verum & sic vis, quoniam margines, & pimenta, vitæ parietes, ruinas, & in aspectu rudi vitæ à hinc reperitur.

Est autem, & in multum quodque Avrum hinc flores : & tunc quod fructus sunt.

Bejare, Ginea, & Sige, & ruyse, ruyse, Latinum Solanum, & Solanum hortenale. Officium Solanum nonnulla Monardis, Vna hinc, & Vna valpor : Hispanum sim hinc, & Vna hinc, Manardis in verum medius hinc hinc, & plerique à hinc hinc, Seruol appellat. Plin. in lib. xxi. cap. viii. citum Cucubulum refert omnia. Vtique vox una conditum : Solanum appellatur quod Apuliam etiam exat : qui omnia Solanum generis suo capio complexus, nomina eorum inter hinc hinc permittit. Germania est Paphis, Belgia hinc hinc Gallia hinc : Italia Solano.

Vitis autem Solani, antea Galeno in lib. De simp. med. facite ad ea, que refrigerant ad hinc possunt : potest enim hinc duo ordine secundo. Quod de in lib. De aliment. sim affirmat, vitæ hinc quibus vesicant, nulli esse olam, quod vitæ hinc ad hinc hinc

*Solanum horridum.*



*Solanum vesicarium.*



ac Solanum, incrementis oleoso raro quidem et aliter, et modo multo vero a studio eo medicos vni. mutata autem esse aliter.

Dialysides Solanum erysipelatos, herperiticasque, agylops, capitis, dolentibus, affluunt stomacho, aliisque similibus symptomatibus acerbis ac mordacibus humoribus prodesse scribit. Et siem possit, et huiusmodi mala auferatur, sed tamen semper non expedit, sepe enim nocet adhibita. Plus etenim non raro periculo ab huius generis remediis imminet, quam ab ipso morbo.

Erysipelas ab externis ad internam vero, non esse bonum, scribit Hippocrates Aphor. lib. vi. paracelsus xxv. Et similiter in Coelis. Erysipelas quidem accedere commodum, intro autem, et, eorum letale. Quod ad modum de Erysipelate, sed & aliis quoque, similibus eruptionibus à natura procedunt remedia habent.

Nam huiusmodi frigiditates ac refrigerantium remedium vni. et, ut, corrupti, aciesque humores utrosque ad principes & nobiliter partes repellunt, quod absque humore magnoque vite periculo fieri nequit.

Prout nec temere, nec facile, attentio ad talium remedia tum admittenda sunt perueniendum, erysipelate, herperitica, ac aliis similibus cum effluuiis vni. apparentibus.

*De Solano vesicaria. CAP. XLIII.*

**V**ESICARIUM Solanum cubitatisque prope cubitatis, teretes, mucosus, licet, sub hinc, quasi geniculatus, paucioribus alia ramosis fusa Solanum maeros, Similiter proxima, sed alpenora, quoadque albo maculata folioli subcaudantur Solanum alia dependent, & post eos folioli vesicularum imita, rotundi aequantulum, turbinati, singulis intus acino, magnitudine Cerati, vni. cum foliolo per maturitatem rubente, ferme inque plano, secundo, subcaudantur, hinc magno. totius albicans, hinc sequitur tubercula.

Nascitur in parietibus, locis umbratis, aliquantulum humeribus, quoadque circa agrorum margines.

Sub Aurantium fructus manant sunt: hinc manant apparet.

Grewi epigram. *Stenogloss* & *formid* dicitur Lotus Vesicaria, & Solanum vesicarium: Officium Albeckengi Plinius lib. xxi. Malacacoli & Callian vocari ait.

A folliculis autem vesicularum speciem imitantibus morum accepit, hinc, et Plinius, quoad vesicariae calculi profic. Germanis *Schizytri* *hobardii*, *Juba* *hujus* *confido* *hujus* *olus* *Emodes* *aut* *pot* *id* *est*, vicinissima Ceratice Hispania *Pavca* *de* *perra* *Gallia* *Aliponagae*, *hujus* *alides*.

Facilitate autem huius folio, et Galenus sit-

## Hibiscus peruvianus.

Gouan  
Jloug.

Solanum foetidissimum.



ta, Solam similia sunt: fructus candide virentes  
siccantur, proinde multo copiosius faciantur,  
que ad usum, vesicam, & remedia accotum odium,  
utitur. Theophrastus fructum potum vnam  
mentem, & risum sepius capere ait.

## De Hibiscide peruviana. CAP. XXX.

**A**D Hibiscidæ genus & aliam quandam ve  
getariam recte merito referat, que trinitas,  
finitas, ac vinctulosa cathartica sine seditione  
dem, vicia quæque appetentia admodum  
sola hucus oblonga, dimidi, lacrimata, & pro  
bitus profundus inanis. Balsamum è longi pedic  
hacendibus foliis differt: magnitudine huius  
caulis, inter se paribus: simul ramulis in no  
stris loculis, fructu in singulis vicia, dem, no  
trando. Oculi figura è magnitudine, callos re  
gro, candido nam è vmbilico, quo modicam in  
gnitudinem de cordis Corosidus in cordis ipse  
vinctus videtur. radix latis crassa mado sibi  
capillatur.

Aliud de illa stirpe est, Germani sepius  
ventricula. Peruvianum Hibiscidæ & Piripi  
nam vesicantiam hac de causa appellant Sicut qui  
Cor in diebus vocent: alij Potam caudam. A  
voto abortiant, qui Doryctam esse existant.  
Inter Solana non esse quæque reponit. Magn  
videtur convenire cum grano à Scapione ab  
surgit aut Abrog dicto, de quo capillatur  
habetur. Effigiem parvam prædati ap  
dicare & albedine, notandum fringens in Mes  
nullus odori. Adfertur de Sen: in digne ipse  
est amaritudo & est calidum ac ferum in digne  
grada. Solus venarum & capillatur huius  
& siccandis, & purgat superfusant phlegma  
caulis in digne.

## De Solano foetidissimo. CAP. XXXI.

**S**OLANUM foetidissimum ad digne in digne  
Spedim alitudinem subinde molitur cat  
licam crassi, notandi, digne, solis vinctus  
mulus subpinguis, latis, oblongis, Mali  
Coronæ in aoribus, atque similibus foliis  
subrubentibus in brevis pediculis, è sim  
bitum, caules ambiunt acris sive buccarum co  
loris exiguis sicut in similibus in foliis in  
digne huiusmodi radice subest longa, crassa, lignosa,  
fere rugicant, aut, ve Dioscorides, *αἰθρῶν*, id  
est, subrubente coctis vestita.

Nale est in siccatis huiusmodi procul è mari, podum  
austrove. In horti Belgij latum, fructum pe  
re argè perit.

Dioscorides *αἰθρῶν* *foetidissima* appellat Theo  
phrastus *αἰθρῶν* *caudata* alij *αἰθρῶν* dicunt  
Latinis Solanum foetidissimum: à plebis cum  
Solam in Manacum, Apollinari in digne, Vicia  
na herba, *Oplaga*.

Cortex radice huius, inquit Dioscorides, in  
vino potus digne potulere vici habet simi  
ficant.

*Solanum tuberosum* tantum quam *Papaveris* folia ut fructus vixit vntum est. Dicitur hydrophora rubea et si plerumque mentis emotione faciat.

Hinc Galenus ex Dioscoride quoque tractat. pta habet, ad acutus cornuam radicem in sergudo cetero refertur et vna, vique Cyta ruber dicitur ac triticoem.

*De Solano Murore ac Desferide & Theophrasti. CAP. XXVII.*

**M**AMICVM sive furiosum Solanum, sola habet, ut Dioscorides ait, Erucit similia, ut tamen maiores, et ad Acaciam, quem Paderona vocant, accedentia: cuius producta à radicis est rubea, sine proceris decem aut duodecim, Orgyza strium dinum habentem: caput verbò rubeo-cornutum, vni Quatuor, sed haec sunt, vnta Plantae ptilula, grandis tamen ac larva: longior post haec fructus succosus, rotundus, niger, acisus x. aut xij. veluti Hederis habentem quibus, sed vna modo molles radices sibi bellè candida, crassa, concisa, cubitalis.

Theophrastus hanc solam enam dicitur, hoc est, Eruca simile rubens & manis, eandem Orgyza longi radices caput verbò Gebby, grandis tamen ac ptilula, fructus Plantae simile.

Gebbyam autem ex Cepariis est nomen, & ut quidem Plinius, Alcalouae genus: quod dicitur Theophrastus ait, *σιδαίνας*, id est, abiq; capite est, cornuam vntam longè, & ceterò tantum in fronde.

*Cyza* autem men si est *Hofychis*, quanta est ambarem manu extendit, due, ut Martialis, quantum profunda hominum: vnaque brachia per postus longitudo patere.

Nominis in montium & vento expositus ac rubeus, hoc est, locis latè, magnisq; ac, ut dicitur.

*Orgyza* appellatur, quare, sine fructum Solanum à nome uille, ut ait, ab aliis *Θυλά*, ut r ubra, ut Theophrastus habet, *Θυλά* vel *Θυλά*, ut dicitur. Dicitur & longè, *επὶ ὕψους*, vnta, vnaque ab aliis, Dioscorides lib. secundo De lethalibus medicamentis, Doxycaion etiam in eadem Solanum manicam appellat.

Vna autem habet Solano muris radice, pota cum vino pèdere drachmae vntas, ut imaginatio- nibus admodum curanda. Dux vero pota mentis ad triadè emouent. Sed quartus drachmae quinq; inrimat. Remediū est aqua nulli corpore pota, & vomitu trectas auctos Dioscori.

Theophrastus eadem ferè habet. Datur eius radice, inquit, drachmae pondus, si plus uere vagitudo, si q; ptili hemi rati paratè verbò ut amplius in larua, dicitur in dicitur opus est à iam solanum vnaquam sola: cupient q; drachmas tres dabis: quoniam si in eadem.

*Solanum lethalè.*

*De Solano lethalè. CAP. XXVIII.*

**L**ETHALIS Solano carley superius bicalitate: lant aliter, rotundi, meliocostastillidura, in modo, si sub oblongo colore nigricant, q; tunc cornuam oblonga, lata, mollis, & non nihil laminae folia, maxima la notaj eadem Solano ferè oblonga, in d' folium alijs oblongiore: purpurea nigricant bacca acino vna simillima, succidit singula vnica, splendide nigricant, magnitudine ferè mediana Cerasi, & ergo semine grauidi radice longa, magna, rubicant, ducunt ac vna in propages plura d' rubeant.

Cetera s' sicut, vna panicoe, lepimentaj, agrorum, et usque perinde parum culis ac delentis reponit: locis vntosis amat.

Augusto vntem manes baccae flores & anti & eodem reperantur tempore.

Vulgò Solanum lethalè, sive Solanum lethalè appellatur: ita ac Veneta esse dicit: Germanos *Solltrau*, bellicos *Solltrau* haerit, iustian Belgis *Opote mense* & *ballè belin*. Sunt qui putent *Sabam* mactiam dicit.

Ad Mandragoram Theophrasti (qui dicitur à Mandragora) plurimum accedit, si non ipsissima est. Theophrastus hanc eandem habere ait, & fructum sicut nigram, & dicitur dicitur dicitur, id est, acino vna similit, & bacca vntum. Respondent quoque facilius.

Nam







Aurea Mala.



Melantha.



Orn. Agrilicisq; fere foliorum modo dregulatis  
 bus coram tractis: floribus lareis, tub. folis pra-  
 deunt, excipiente loco fructus rotundi, proben-  
 da coena fruat, medicinis tunc magis idonee,  
 per in austeritate aut pulchre rubentes, aut au-  
 ri luteo relucens colore, in quibus copiosa  
 humens media illa succo usita, qua semen con-  
 dicitur. Tota herba gratiam feridumq; odo-  
 rem ferat, et vandi colore trahatur, & aliquan-  
 tum hirsuta est.

Servatur subinde in horis. Eodem quo facta  
 est usque fructum, & quidem Acaeno, perlicet.

Nostri autem Aurea mala appellati Itali *Poma d'oro*: Germani *Goldapfel*: Belgae *Orbes*  
 apert: Galli *Pomme d'or*, ad est, Antioch  
 pomu.

Alia sunt Aurea mala, de quibus fabulantur  
 Poete, honorum in silvanum Hesper, qui hinc cas-  
 sos adhibuit fuit Danae, quem ab Hercule  
 interfectum ferunt.

Facillime autem haec mala aurea, cum vni-  
 versisq; herba refrigerant, aliquando tamen  
 nimis quàm Mandragora.

Purum à nonnullis cum in papere, sale & oleo  
 preparata ac cocta edantur. Probat autem  
 corpori alimenti quidem potissimum cibum,  
 & hoc ipsum primum ac vniuersum.

*De Malis insana.* CAP. XXXI.

**M**ALA insana appellata humilis produ-  
 cit herba causticulus brevis est, proci ra-  
 mulis, sed lata sunt folia, rosora, crassiora, can-  
 didioraq; quàm in Solana, ambrem nonnulli si-  
 milia, ad Xanthu nonnulli accedunt: floribus  
 hirsutis aut purpurascens colore speciosi,  
 nulla modo median, lutea in medio flammu-  
 bus fructus calyci inhaerens à medicinis lon-  
 gitudinis pediculis dependit, subinde oblon-  
 gus gulinaceo osi forma & in grana dures, quid-  
 dam Malis insana nominis, ac ut ut quoniam can-  
 didior, super purpurascens.

Aurea & haec super. Sola Vere, Ac vniuersum  
 fructifera est.

Peregrina quoque Germanic ac Gallic, Sed  
 in Aegypto palmi in arenosis campis vel spen-  
 te gignitur, fructus adferre duplo aut triplo  
 maiores, quàm in Gallia aut Germania: et qui-  
 dem Petrus Bellonius in Singularium ferunt  
 lib. II. Serapion reliquit.

Indicorum idè Theophrastus Malinthalhari  
 esse. Apud Insulores Melongena, ab Hermetico  
 verò Petrarctani, ut quidem ait Martialis, et  
 dicitur ali) Melanana vocant: Latine Ma-  
 la insana Germani *Melantha* vel *apfel*: Gal-  
 li *Pomme d'or*, & *Pomogona*. pollicetur  
 appellatio Hispanis & Belgis innotuit.

De Malinthalha autem sic Theophrastus  
 Locustanosis (in Aegypto) hanc procul à Sy-  
 mo nactum temperant, quod *apfel* dicitur ap-  
 pellari.

pellens, figura rotundam, magnitudine Melsph, sine nucleo sola ut Cypriotes in locis (radicem nempe Lon Costium appellaram & Malinathalam) incolæ legentem in Aegyptu deosco coquant, deinde admodum redduntur, hocque pro bellaria videntur.

Quæ hæc verba Mala insana, hæcque aquam Malinathalam, sed differentem omnino et se superius ostendunt. Malam etenim quam Melspham magnitudine excedit sola sunt herbe non sine Cypriis.

Ceterum Mala insana apud Aegyptios, teste Bellonio, cocta sub cineribus, vel in aqua, ut equam sicca singula fiat delecta & meritis infusa rursus, & ad unam, à Lemnibus Barbaris in oleo, sale & pipere fungorum modo coqui & mande referit.

Qualicumque autem tandem vel cocta vel preparata modo estingerit, nihil facit, sed nullum aut omnino in usum præbent alimentum.

## De Mala Aethiopia.

## CAP. XXXII.

Mala Aethiopia.



tumque afferunt quædam, nec ita facile in illa consumuntur. Sunt tamen nec hęc Aethiopia bona facci, & alimentum non in usum corpori adferunt.

**D**IFFERENT non parùm à Malinatham, que nostra ætas Aethiopia cognovit. horum stirps crasse affertur siccitate rursus, a duas tresve alas distans folia longis subobovatis, angulicollis, du ruficulis, quibus nulla costa sine nervo spirante quodlibet locum tenet. foliaque secundum costam callos, aliam, sunt foliolis, flammibus mediis lobatis. hinc rotundus, sinuatus, Mala sunt mare in dicit, colore per immunitatem elegans nitens, si perennante carquo quodam rebus alienis inhi radimento, quod & tubæ, sed aliam.

Peregrinam affert Belgis: sicut in Hispania strait honesta Doctorum Christiani Bonifacii vidua clarissimi ac amplissimi Dilectissimi Hopperi.

Tardè ad modum (sed tamen eodem quolibet anno) ad perfectionem Colonic venit.

Malum vocant Aethiopicum, quod in Aethiopia in Hispaniam præcipue modum est hunc. Veniens cognoscit facile definit fuisse affirmare. Cum Malinathalla, de qua et Theophrasto superius cap. scripsimus, nequaquam eam comarum sola sequatur cum Cypriis hanc comarum, carnosam, sicut fuit Malinathalla.

Ferunt verb hæc mala in pagana ortum esse cum sale ac pipere cocta nitens ac ede & rursus multo fieri esse, quoniam infusa

Aurea, propterea videlicet, quod dicitur, de

## De Stramonio, sive poma stramonio.

## CAP. XXXIII.

**STRAMONIUM** caulis cubito non raro alto, dignum crassum, in pascuis montibus dicitur: folia crassa, sinuata, & acuminata, mucosa, longioraque quam Solani, ut Malum Insidiosum. flor ex obliquo demum calyce exat, magno, corollis, calicibus efflo. Corollæ hinc mucosa hinc non alia, sed tamen omnino maior ac amplior, & per ora angulata, flammibusque aliquot albidis in medio: fructus succedit singulis rotundus, brevis, crassus, non tamen scitis spinis asper, magnitudine ferè Nucis regie, putamine suo nondum exente, aut maxime, in quibus sentina & magnitudine & forma Malinatham. Olor herbaceus non nihil agrestis: Bona præter Liliis accedit, sed tamen & expulsi.

Rara & peregrina stirps est. Vix sentur, si ferè in Germaniaque Aethiis fuerit, fructus autem in Belgio perficitur, licet non facile.

Stramonium dicitur, & Pomum sive malum spinosum: nonnulli Comarumque alij Malinatham: Graeci nostri stramonium vocant, aut potius stramonium, quod Nunc

Scutellaria.



Colchicum.



granitum & torporum ac mollescentiam haurientem inducunt: Italiae, ut quidem apparet, Pa-racelsus; Germani Cindropff vocant: Belgae **Wegw.** apud Galli **Pavone de Peris**: Valerius Cordus **Hypocyrtus**: Deromannus: Marchiolo verò utpote alii **Nux** Michel Arabum esse videtur. Nocentem Mithel Serapio cap. ccc. xxxv. fructum esse scribit simile Nuci vomicae, cuius ferri sit veluti Mandragora, cortex asper, si-pote parus ac vitiosus: qualis quanto orbis frigida. Aloysius Angullera Serapionem Hip-pocrates illud Theocritum esse suspicatur, quo in Pharmaceutria equos in furorem agi refert. Graculus liquidem, quem Theocritus citat in-terpres, Hippocratis plantam fructum habere sentit, ut Cucumem hylaeus spinosum.

Facultate autem Stramonii soporifica ac narcotica, frigida enim quarto-ordine, Man-dragora non infertur.

*De Colchico & Hermodactyle.*  
CAP. XXXIII.

**COLCHICO** folia longa, aut quatuor ob-longa, laevia, pinguis, Lili) ubi folia & forma ac bracteae similia sunt, nec quae medijs in brevibus pediculis necesse sit duo, tres, aut quatuor, infra squarum folliculis, indigulatae, crassa, ob-longa, per maturitatem in tres, scilicet explicantes partes, formae plerumque distichulae, e rufis col-lor nigrescent, quo maturo folio vix cum con-culca inseruntur. Paucis autem Autumnii quatuor-narium in brevioribus, tenerioribus, albicanti-bus pediculis flores erumpunt (nullis enim appa-rentibus folijs) Croci foliulis & forma & colore assimilata, distichis tamen caroleis, staminibus interius pallidè luteis, nódex bulbo similia, tur-binata, ab una parte in planum compressa, riu-ram suae falci in, cum florae, habent, teligata tempore non apparenter: tunc consistunt nigrescentibus, sicut aliquot inferior demittit, bulbis ipse carnosus, & solidus, laevo fisco mil-lans, dum quidem viret & recens est terra eru-tus reflexus: cum segetis & foris inueni us-que nigrescit, nec tamen obfusce rubescit, teste Val. Cordo. In ore suavitatis est dulci, amaritudi-ne tamen exigua ut salubri cibum subsequatur.

Vulgare autem illud Colchicum Italicum, Gal-liae, ac Germaniae esse vix in haurida, sed raris pinguis ac laetis pratis erit, & non raro in montium cerasalibus. Repertus etiam in doli-llis locis, solum angustioribus. Dioscorides in Messena & Colchide cruci tradit. Germaniae folia Vere circa autumnum foliis hinc silis quecum semine maturantur, flores circa Autumnum equi-noctium, ut diximus, reperimus.

Estque Dioscorides appellat: plerique spi-gae. est tamen & aliud spigae non liliaceae. Latine nonnulli Bulbus agrestis: Germanis

*Spigae non liliaceae: Gallis Meris albae: vulgò Hermodactyle.*



454

# STIRPIVM HISTORIÆ

## PEMPTADIS TERTIÆ

### LIBER QVINTVS,

#### DE FILICIBVS, MVSCIS, AC FVNGIS

1701  
1713

#### PREFATIO

**P**ONT delicias ac perennis herbas, ad Filicem explicanda describendaq; genera, cum & Muscorum ac Fungorum conuertitur, qua licet plurima pars stirpium sit breuissimum sint, subinde tamen vel succos, vel humores generat incrementa, vel per se vitales exiliant.

Filicum autem complures sunt species sicut & Muscorum: nec destitit Fungis differentia. Communis Filicibus caracter est, ut & stirpibus & feminis destituantur. Desiderant tamen in Fungis: in plurimis quoque, sed non tamen in omnibus, qua inter Muscos referri videntur.

#### DE FILICE CAPVT I

Filix mas.



Filix foemina.



**F**ilix diuersa est generum iuxta vtriusq; seminariam: mas & femina, que quidē proprie Filices nō alie, quam inter Filices referri videntur, proprias sibi habent appellationes.

Mas sola mos à radice proter amplexa, aspera, subdura, frangi facilis, dilata colore viridis, colore grana, subito alio, alarum instar expansa, veluti de plurimis ad vnum collata: hinc pediculus opposita, quod singulari partata, & frondis in argentea creata, à tergo vobis immenso ferodoq; plicare obsidetur, qui tamen semel esse à plerisq; creditur, radix è talis vtriusq; hinc, crassa, nigra, et vtriusq; hinc, feminisq; desti autem non natura sterilis.

Femina Filix ac hinc se sentire caret, sed caule proter vtriusq; hinc, alioquin non angustior, medulla vtriusq; verticillata, quā obliqua inuicem, incipit Aquilę species quodā apparere.



**PALVESTRIS** Filix caules complures edat. hec ubivales sunt almona, foliosos veluti Filix  
 pinnata, caules & folia referret, nisi particulari multitudine latiorisque essent, & haudqua-  
 quam per margines terrae: circa fumos ramulos denfi veluti firmiorum futurorum radi-  
 cibus adherent, quae tamen firmis non sunt. (nam sterili & haec Filix in caetera) radice  
 cava, arpitissima emittunt Fibram, multo crassius nigrae fibrae capillata, in quorum medio  
 absciditur quoddam, quod v. sic arsitimum paratur radice.

Nascent haec Filix locis nigri ac palustribus, non raro in fossis aquis habentibus, in hu-  
 midibus quoque sylvis. Apud Gallos, tum & apud Britannos plerisque locis reperitur:  
 Germis in Belgio sicut quoque frequens.

Viget ut amocedens effluat: hinc marcescunt folia: radice relictis.

Velut *Olivaria* in Belgio dicitur: nullus Filix palustris aut aquatica marcescens: Sunt  
 quae Filicibus plerisque ex Chymis Lunamum maiorem vocant: Valerius Cordus Filicem  
 herbam facit. Videtur autem haec dissimilis Filici, quae v. sic arpitia à Theophras-  
 to appellatur, cui Polypodium simile facinam hinc singulis folio, Polypody folium sicut  
 indicat Germanus (v. sic) facit: Belgio dicitur v. sic arpitia.

Radicibus decoctis quoque eff. ac sicca, sed minus quam sapientum. Virtus habetur, ac  
 praesum quod eas madidum, non modo vulneris, sed & ceteris, ruptis, ex alio disturbatis,  
 decoctis vel cum melle, & cum liquore aliquo sumitur. In decoctis, quae vulneris recem-  
 to pellunt, ea de causa ab Empyricis additur. Sunt quoque tantum huiusmodi ex illis, et  
 reliquam alibi intra corpus harentem ac concrescit dissoluere quor, & faras etiam  
 per vias expellere.

*De Polypodio.*

CAP. III.

Polypodium vulgare.

Polypodium minus.



**POLYPODI** folia Filicis maris similia videri possunt, nisi & minus matid, & per mar-  
 gines latioraque quam scabra aut crenata fuerit: ex utraque haec mox à radicibus, vniuersae  
 fluites sicut scitibus ad mediam usque costam decidunt: à fronte ac posteriore parte  
 dem sunt, à posteriori, veluti ad haec in basem palare vernata, leuiter exasperant. radice  
 longa, digno tenace, per obliquum serpsit, in qua tubercula quaedam acerbis in similia  
 que in Polyporum ac Scipiarum cerni apparet, sapore haec dulcedinem quandam cum sub-



acrisse gustu per se ferit. Caret et aliud Filicis genus non modo flore ac fructu, sed & caule.

Naturae in veterum arborum caese exseruit candidibus, tum & super veteres tunc, ac adram testis: reperitur & in aggeribus locis aprorum margines, praesertim sub arboribus ac ferribus, ac subinde in sylvis & rorullis lenis amplexibus, sicut: alius locis rariis ac viciis.

Profertur in veterum Quercuum caudicibus rariam Huius loci vident plerum, eo quod sub Quercibus reperitur, quod tamen vocant Quercinum appellari moque.

Quous anni tempore vites colligique potest Polypodium Vere nouo, noua sola prima.

Græci vocantur *Polypodium* est ab accubitu Polypocem in radicibus appropinquat: Latini prima vocant, tamen & Filicem, quod parum Filicem, quandoque contrahunt: sicut *Polypodium* Hispani *Polypoda* & *Polypoda* Germani *Engelst*: Sarmatæ *Droffium*: Belgæ tamen *Gall Polypoda*.

Reficcantia autem Polypodium est facultatis, sed tamen citra morsum, vt Galenus ait.

Purgandi vim habere Dioscoridam fert, deinde reos, item ac pituitam. Adhuc rariam bilem vim subducere posse addit. Alius nulla, aut si quæ sit, omnino exigua clementi, subducendi vis Polypodo esse videtur. In qua sententia Iouanes quoque Merardus, qui studium an beallæ ipsam purgare sentit: cui & accedit pluresum magister experientia. Non reuerti Polypodium per se hanc quædam purgat, sed ex ante veterum galli galli men of lea, aut Malua, affric: hinc autem vrbis decoctum, ad situ leuanti non est nisi castitas edere.

Iouanes Mesæus Polypodium inter ea refert, quæ corpora in sanis excoere ac clemente: quæque fortassis ad Arthritidem quoddam genus vel peccat, quo non vna corpori part, sed multiplex tenet efficaciam: ut ad quod à deo sapientia aliud, Rheni ac Meris accubus plurimum dicitur.

Tument in hoc morbi genere manus, pedes, vniuersique partu ebrietasque, ut ipse: ad est impositus per dolens magnitudine morendi, subinde sapienter minus gratia vel infensores partes afficitur: rari fiscalis quoque ex vna in aliam partem humores hinc decumbit. Hinc malo Merapoli Polypody decoctum, vrbis rari, adhibet, quo superfluitates absumi ac reficcant posse sperant, non quidem mox, sed tempore mora. nam continuat: hinc dicitur decocti huius vnam præcipuant ac infusant.

Citius autem hoc morbi articuli genus, aut vniuersi hinc, vel purgationibus, vel vniuersi, deinde sudore tollitur. Nec difficultis est curatio, si æmpe hinc vniuersi hinc modo adhibeantur: neque enim in ipsa articulis humores impati hinc, sed circumpassantur consistunt: quæque consumunt. Idcirco ostendit corpus vacuandum, deinde quod rari quæ procurat sudore digerendam delatandumque est.

Latius præterea efficaciter impo Polypody radicem, Dioscorides ait, scitis qui inter dignos sunt.

#### Dryopteris caudata.



#### De Dryoptere. CAP. VIII.

**F**ILICIS & M. vocant Dryoptera fatiatis, minor: tamen multo & terris dicitur: sunt sicut, æterian lenis, coloris vni vna cum pediculo: modicoque rari: pferit: à tergo eodem quo Filicis exasperat: modicoque caule & hoc Filicis vniuersi hinc: ne pperit: radice dicitur inter sicomplexu commissa, & modicoque caudata, sicut noua gemina molitur.

Lociter ad solaria, in montium caliditate conualibus quandoque reperit, in densis sylvis.

Percutit hinc sicut per hinc: vniuersi hinc: vniuersi hinc.

Græci vocantur *Dryopteris* est: Latini *Quercus* sicut dicitur potest. Orbis hinc medicinalium colliguntur in h. xi. *Dryopteris* appellat: & sicut fortassis *Dryopteris*, à multo cum quo reperitur, quibus *Dryopteris* vocantur: sicut & Dioscorides, in *Quercuum* rariis dicitur.

ga. Officina Pharmacopolorum Adiantum etiam perperam appellant: neque pro Adianto medicamentorum compositionibus admittunt. Valeno. Costo est *Aspidon*. Belgae quidam tamen Hispani *Aspidon* dicunt.

Molera autem, ut quidem Galeus, Dryopteris gustam facultatemque se fert, dulcem, acriam, amaram, in radice vero acerbam habet & lepticam, proinde de pulvis glabrum caecum vidit. Dioscorides Dryopterem cum radicebus tritam, pilosorum siue de pilosorum esse quaeque refert, si post suadent, cumque exteriarn, componi imponant.

De Dryoptere nigra. CAP. VI.

Dryopteris nigra.



**S**YNONYMA: Dryopteris & alia quaedam Filices species similes reperitur, sed caulibus ac foliorum nervis magnae, tum de foliis serratis & venis: caeterum haec non quoad radice, varietatem, sed raris, diffinitio. videtur ex pluribus membris consistere.

In sylvis, ac locis umbrosis subsistit, sed tamen haud frequenter, nascitur.

Vixit non fecit ac Polypodiumque Adiantum anno toto, non collat tamen sub existim nona sola promer. flore semineque, veluti proce, desinitur.

A similitudine cum Dryoptere, Dryopteris nigra à recentiorum nonnullis appellatur ab alio Adiantum nigrum, ad superiora videlicet differentiam, quod perperam, ut ostendimus, Adiantum nominant. Sunt autem ex recentioribus, qui Lonchitidem siphonem esse velint: sed quae foliorum cum Scolopendry similitudo? plane nulla: Non est igitur à spera Lonchitidum minus Adiantum Plurij, à Theophrasti Adianto non differit, quae etiam de Adianto, ea ex Theophrasto habet. Adiantum legitur unum pauli generum describendum. Visusque tamen ab aliorum hae Dryopteris nigra à nonnullis Adiantum loco & varietate si quidem quaeque in caetero, sed non tam gravis ac illi, qui Dryopteridem proinde loco Adiantum variis nuntiant.

*Adiantum Plurij.*

*non perperam.*

Est siquidem haec nigra Dryoptere haud quaquam sepius, sed Adianto & Trichomanem facillime responder.

De Phyllitis. CAP. VII.

**P**HYLLITIDIS oblonga, haud dissecta sunt folia, Oxylapathi similia, si bene longiora, litoria, viventesque, parte anteriore laevia, posteriore adhaerescens veluti vermiculos oblonga, odore granuloso, gustu acerbis, radix è tenuibus nigrae filis composita. caulibus, semineque, ut alia huius generis, desinitur.

Peractum quoadque folium in partes veluti lacinae quasdam ita dividitur, ut ex uno folioleto caetera progignat videantur.

Lactis perulis, in venisque arentibus, fectis foris, in conatibus, & alibitumida ac vermiculatae generis.

Vixit quousque tempore, haud à aliter quam Polypodium.

Græci φάρις dicitur Latini nomen servant: Officinae Linguam Cervinam appellant, perperam vero Scolopendriam: à legitimo siquidem Scolopendrio in aliter differre. Germani *Aspidon*: Belgae *Aspidon*: Hispani *Lingua Cervina*: Galli *Lingua de Cerf*. Apuleius nam Radicem capite **LXXXIIII** nominat.

Phyllis.



Phyllis lanata.



Ad frangere & resiccare facultas est: ad dyphenterias & insectorum locustas commo-  
datur. Sempiternum etiam inortibus in vino potum aducunt, Dioscorides refert.

De Hemeritide.

CAP. VII.

Hemeritis.



Hemeritis procyra.



**H**EMERITIS Phyllidi famis foret, nisi folia eius inferiore solo laevia essent, &  
vittaeque angulos haberent prominentiores, veluti An acinorum Draconculi: hoc  
etiam inferretur: & fuscioribus color, ferè dimidia ac *Dracunculus* Lase modo exant,  
aliqua.

ad ipsa parte angustiora sunt, & in acumen delincentia: ceterum etiam superficies laevi ac  
 vixta, a tergo quando in ventrali osium specie apice quoque adherent radices fertiles a pla-  
 nitudinibus hinc committit.

Variis vero & quibusdamque Galienum huius forma, in fenestris se de ac circa basim, vel in apo-  
 glypha utriusque habentem.

In obscuris quibusdam Romae locis rufas Anguillata s. rufas reperitur & in Britanniae  
 regionibus, etiam illuc conuulsa quandoque in Belgiam, posteaquam adoleuit, Phyllo-  
 dem angulata & ceteris in foliis articulis reperia est: soli angulata infrenata, paulo postea con-  
 uulsa, ac omnihi discretissima ostendit.

Dioscoridi haec dicitur esse: nempe huiusmodi dicitur, *Zedaira* dicitur. Memorat Theophras-  
 tus hanc, sed a Dioscorido Hemoniense nomen dicitur: Hemoniense siquidem  
 Theophrastus idem cum Asplenio, de quo scribit.

Superior autem ac facilius Hemoniense proxime Phyllidem refertur etiam quibus ac-  
 ta facilius adstruunt. Dioscorides dicitur acetos potam hanc adstruere. Quod fortassis  
 et Asplenii facultati hanc translatam.

*De Aspleno seu Scolopendro. CAP. VIII.*

Asplenium.



**A**SPLENIO folia sunt parua, longitudine  
 palmi, utriusque profunda sectione ab  
 utroque ordine incisa, utriusque massa longioribus,  
 superius glabra ac venata, quae cum uarietate  
 complicantur, & in uarietam figuram contracta,  
 forasque hinc, scolopendri similia apparent.  
 pro radicibus terras nigrae inter se complican-  
 tur fibrae.

Nascitur in uetustis parietibus, in rupibus, in  
 saxosis, opacis, ac uentosis. Gallia, Italia, Hispania,  
 Britannia, Belgia quoque loca notant.

Toto anno uacet, non sicut tamen hyeme: quia  
 uis mensibus nouis in hodie folia parua.

Græca est *Asplēnē* quae *Scolopendri* Latine  
 Asplenium, Asplenium & Scolopendrium simili-  
 ter appellantur: nonnullis *Zedaira* dicitur: Theo-  
 phrastus ac alii *Asplenium* Græca Malum herbam no-  
 minant: Dicitur & *Asplēn*. In Officinis Ceterach-  
 Nicolao M. pro *Scolopendro* & (si non fallimus)  
*Asplenio* dicitur: Itali *Scolopendri* Hispani *Dera-  
 dula*, *Demaradula*: Germani *Espefana*, *Wilde-  
 frucht* Belgæ *Stem waerjstickerij*.

Asplenium autem ac *Zedaira* ex eo dicitur, quod  
 aduersus splenis morbos efficaciter sit: Scolopend-  
 rium uero à similitudine cum Scolopendri, hu-  
 fisco ac multorum pedum uerba.

Tenuium paruum, inquit Galienus, herba ipsa  
 est, non tamen calida. Dioscorides folia trahi in  
 aceto decocta, per dies quatuordecim pota, hanc

diffinitio: contrita quoque et ex uino licui in pota: uirum stultitiam, rege quoque modo prodesset:  
 calcidatque in vesica conuulsa: (quæ ab in perficitur, quæ tenentur sunt parua) ad-  
 dit & singulis hanc sedare: in opus uere dicitur esse, hac herba conceptum adim per se sat  
 cum multo uero appertum, atque eius re: grana nodu colligendam Luna sitare.

Sed & Theophrastus habet i foliam Hemoniense, inquit, si n. hanc uera m. hanc: hanc  
 uera, & aliquid uirgule mali ac *Asplenio*, aliis *Asplenio*, id est, eius, m. hanc: hanc  
 parua Pliniam an an non dandum Asplenium semper sit, quoniam an flant uera facit.

In herbis etiam Empiricos sunt, qui hac herba ad modum hanc dicitur ac tumore, sed  
 & omnes uelociter languore ac morbis feliciter ac cito curari posse predicant: sentiatque  
 hanc in uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter  
 uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter  
 hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter hanc uelociter

Sed hac inter artem fibulata reserendam, uel cum eo quod Dioscorides de nodu colligendo

genio Asplenio refert, & pleraque alia varietata, quæ in Veterum libris subinde scriptis occurrunt; à quibus nec recentiorum plerique abstinent, quia Medicis ac medicis usibus paginas quatuordecim impleat, studiolisque non parum in possunt.

DE *Laciniis asperæ*. CAP. IX.

*Laciniis asperæ.*



*Adiantum.*



Est verò *Adiantum* illud & *ἄδιαντον*, *μάθηρον*, *ἴψιδιον*, *ἴψιδιον*; Latine Polypodium, Callitrichum, C. maculata, Ternis capillus, Superlativo ternis: ab *ἄδιαντον* Capillus Venens, Capillus, Ternis à nonnullis Corandrum putent Officina; In hoc Capilli Venens appellatione in simplicibus sunt Officina Belgij pro Capillo Venens, Rura videntur morantur.

*Adiantum* vultu ex eo dicitur quòd folium, ut Theophrastus ait, non modo contrahitur seipsum, postquam coarctatur sicco simit, ut Pharus ait. Dicitur verò Callitrichum & Polypodium

**A**SPERÆ Laciniis dicitur longioribus foliis, ab utraque parte pluribus, ac multo ceteris asperam Polypodij, ut si sine distictis, quæ antea parte videntur, licet ac glabra sunt, polypodij vero ut Polypodij crispum, tunc negantur multiplicitate tenentibus epulamentis considerantur.

Nascitur in siccis locis ac fœcis locis stipulatis, humidis ac viridibus.

Nec caulem, nec florem, nec fructum videntur parte profert: perpetuo viret: aliam viret.

Nonnulli hac ætate Asplenium sive Asplenium Asplenium magnum appellant. Valerio Cordo Strabo optulit. Dicitur verò Laciniis asperæ cognominatur. Dicitur sive Laciniis asperæ Dicoicoides de feribet vana folia Parnassiteram Scelopodij folio maiore ac asperæ, quæ utique præsertim est, cum in folia asplenium mutata sunt, quæ in Scelopodij, ut perueniant, ceteris utique & feribet vana. Græci *ἄδιαντον* vocant dicitur Laciniis, ceteris asperæ, Longior & Calabris: Germani *ἄδιαντον* vocant Belgij *ἄδιαντον* vocant nominant.

Laciniis asperæ asperæ, Dicoicoides videntur glutinandi vim habere, & prolixe inflammationes excitantur, postquam ex amaloem absumere.

Galienus videntur quidem Laciniis asperæ folia ad glutinanda videntur idonea esse tunc sicca verò ex aceto postea heras indurata sunt.

DE *Adianto*. CAP. X.

**B**REVES ac humilis herba *Adiantum* est cauliculisque palmam longi, licet, foliisque pumice colore nitent: foliaque licet disticta, amplexuque creata, Considera aliquoties amplexu, nullo ordine digeruntur, tunc ceteris pluribus capillamentis consistit.

In panibus, locis petrosis, viridibus, siccis, siccis fontibus & aquarum stillidibus in Italia & Gallia notum est, quæ Germania in Belgio.

Viret quævis anni parte, nunquam viret vel siccum vel siccum facit.

Græci *ἄδιαντον* appellant: Theophrastus, ac inde Pumo *Adiantum* est regnum: duo sive de his *Adiantum* sunt genera: caudatum ac regnum. De caudato sequitur caput sequitur. Dicitur

Est verò *Adiantum* illud & *ἄδιαντον*, *μάθηρον*, *ἴψιδιον*, *ἴψιδιον*; Latine Polypodium, Callitrichum, C. maculata, Ternis capillus, Superlativo ternis: ab *ἄδιαντον* Capillus Venens, Capillus, Ternis à nonnullis Corandrum putent Officina; In hoc Capilli Venens appellatione in simplicibus sunt Officina Belgij pro Capillo Venens, Rura videntur morantur.

*Adiantum* vultu ex eo dicitur quòd folium, ut Theophrastus ait, non modo contrahitur seipsum, postquam coarctatur sicco simit, ut Pharus ait. Dicitur verò Callitrichum & Polypodium

utitur ab effectu, utque liquorem capillare, ac den sum eum fieri.

Et autem Adiantum, Galea noctuae, pellocans, exornant, diti usum, in calorem frigoris, modo viscolorem hauriunt et aliorum e potiore ac palmonibus excrescentibus non mediantes confert calcidosque frangat epotum, & quidem non modo remem calcidos expelle, etiam & res, qui in palmonibus, & alijene anxia vagantur in ois haurit, frangat, acque cum spuro edunt, Belgigruas, siue, et vulgo, Serapio inde confecta.

Similis vero & ab eis ibas Adiantum quoque, eodem noctuae, digerit, & caput ex alopecia glabrum conuertit.

Adiantum vires & facultates Diu. multas refert, non modo differe res, sed & repugnantem <sup>negat</sup> ut dicitur, sanguinem etochonem ipsum colubere aut paulo vtro ante, formidat ac mentis <sup>est</sup> cetera. Quaeque vero sanguinem etochonem colubent, cum eam mentes suppetunt. Ad diti in hoc, Sen ois oculi a vitulata poterant gratia, quae aciem vitulata exco, non offendit. Item & in Adiantum nequit, cum leuime cariat, nec enim commode trahitur. Apparet idcirco hocce multa aliunde manata, hanc capiti addita. Et fortasse quaedam ex Cythi habita scribit.

Adiantum ex dissimilibus partibus Mefues confare tradit, quaedam quidem aquae ac uris habere, & aliqae ad has gentes alteram superficialium calidam ac terram. Et hoc quidem obiecta sperni, & crassa ex uris, ventrem subducere, praefertim dum necesse est, nam ut eius hanc parte flum, cito retulatur: ad hanc gentibus vero partibus ac tenent, ventrem libet ac flumines colubent.

De Ruta maritima.

CAP. XI.

Ruta maritima.



**R**UTA maritima culiculus est completa, ac teretes ac teretes, ac circa hoc foliola exigua indigesta, ambrata crenata, graecolenta Ruta fimo limba, anemone parte lenita, vromatqae aseris vero obliem colans, punctibus obita, radix fibrosa nigra est.

Natur in parietibus ac montis vetulis, in aqua, pueris, fontis, locis videlicet humectis, ac que tepus rigantur, rarioque à Sole illustrat. vices & hanc est: hyberno frigore non exurgunt.

Et hanc amplius viret: flore & semine caret.

Vulgo Rutam maritima, aut Rutam maritima appellat: Germani *Wasserrauten*: Belgae *Wasserrauten*: Galli *Rut de mer*: sunt qui Vitis siluam nuncupant: Officina Belgij *Capillum Veneris* nominant, ac prolegitimo male vlti fure tempore. Est autem Adiantum genus, quod *Candidum Theophrasto* dicitur: nam in Adiantum duo hic genera sunt, vt superiore cap. diximus Nigram vnam candidam alteram, Et nigram quidem superiore capite descriptam est, Candidam vero ipsa Ruta est maritima, quae quidem nigro Adiantum magnitudine & forma, deinde & reliqua similitudo. Conueniunt modo: folia crassiora pauloque maritima sunt: eschethi non nigra, sed ex albedo virent, unde *Candidum cognomen accepit.*

Plantae duo similes Adiantum refert genera: candidum vnum: alterum nigram: quae sunt: *Mons et Polytechnum*, nana vero *Trichomanes* nominant, perperim *Trichomanes* in hanc Adiantum genera referunt: nam *Trichomanes* ab Adiantum differt.


Nec desunt, qui Rutam maritima *Paronychia* Dieffenh. se se ferant: *Paronychia* quippe *Peplidima* hanc fl, minor longitudine, & maioribus foliis esse tradunt. Pepli vero folia latius extenduntur oblonga sunt, ambrata nequequam crenata, graecolenta Rutae hanc firmi sunt, ut & qualem Rutae maritima maiora, quae manifestam Rutae maritima cum *Paronychia* descriptae diffinitudinem ostendunt, nec repugnat quod *Peplus* Rutae folio describitur: non tenet graecolenta Rutae, sed alterum Rutae est folio, *Hypocistis* similis, cui multatum, vt alibi dicitur, herbarum folia comparantur.

Ceterum

*Plantae  
et similes*

Ceteris Raca maritima Adianto temperamento ac facultatibus haud multo abstrin-  
 Prodest tussientibus, difficultatis respirandi, hinc, hinc dolentibus, veru' horum palmaria subse-  
 quuntur concoctionem decocta processu: valet ad tenui & vesicæ dolentis: vnam clem-  
 entini calculosæque expellit. Sane quo ad purgan-  
 tem ceterosque committent, ac valet effica-  
 cem referant, si quodvisque ceteros dicitur  
 hinc andæ pulvis sumatur.

*Trichomanes.*



*De Trichomane. CAP. XII.*

**T**RICHOMANES cauliculus quop  
 pinnatifidus, teretes, compluribus, rufis  
 colore pinnatis, circa quos ordine digiti pro-  
 quato exigua tenuia vtriusque foliola, abhorum  
 ceteras, haud multo palmaribus sunt. Laminæ  
 nona, ab aduersa parte punctatis eriguntur  
 nota, nodosæ vt Adiantum, tenuissima tegri-  
 lamina.

Iuxta fontes, rivulos, locis humidis, hinc  
 hinc pinnatis ac maris, & fissulatis vt plu-  
 rimum exit.

Ducuntur ac vix quosque est: hinc  
 lana non offenditur: sterile vt Adiantum, &  
 reliqua omnes Filices, quæ sunt.

Grecis est *Trichomanes*: Latine *Filix*, quæ  
 parua Filix: nempe & Capellana Apulem capta  
 cum Callietho idem locis. Adiantum, vt Des-  
 conder & Galenus referant, facultatibus  
 abstrinens respondet.

*Musci arboris.*



*De Musci arboris. CAP. XIII.*

**M**USCI complures reperuntur, & notis  
 bus sed differunt, quædam abstrinens  
 mûcousæ & adharum: alij terra superficem  
 occupant non desunt nam turpis.

Arboris musci vellosi quædam sunt, musci  
 tenuiter ac vix difflendo, subinde vix  
 hinc vix & unguentis, consiliaque abstrinens  
 hinc difflendo cornibus, à truncis ac ramis de-  
 pendunt. vix hinc genere magnitudinis, musci  
 abstrinens: quædam breuior, proluxæ abstrinens, fibro-  
 dolo vt plurimum colore: omnesque difflendo  
 tamen quædamque & rugæ quædam est, sed  
 non & terrosæ. Præter hinc, inquit Plinij, quæ-  
 dam difflendo: secunda conharum hinc.

Reperuntur hinc Musci in Quercu, Populo  
 alba & nigra, Vitis, Berula, Pomo, Pomo, Pomo,  
 Pinastri, Picea, Abiete, Cedro, Lince, & aliis  
 compluribus arboribus. Optima, inquit Des-  
 conder, Cedrus est, propterea Populæ, quæ  
 in genere candidus & odoratus præter, ap-  
 paret inprobatior. Mithridatis Pomo, Pomo,  
 Abiete, ac Lince in Italia odoratum est, inquit  
 odoratum Langrum est.

Grecis hinc appellant: Latine Musci arboris,  
 & *Trichomanes*, *Trichomanes*, quæ hinc: Orbis  
 Musci *Trichomanes* *Trichomanes* appellat Arabes &  
 Officina Vinea Germanis *Trichomanes* Belgis  
 Gallis *Trichomanes* Italianis *Trichomanes* Hispanis  
*Trichomanes*.

Ceterum Mafas refrigerandi ac adstringendi naturalis vim ac potentiam obtinet  
 quatenus pro natura ac facultate eius, cum adhaere, arboris, ac potissimum eius corticis,  
 adhaerenti, vel interclusis, eius siquidem eam adhaere corticis, veluti porosis sua, aequam  
 possidet ac octaves facultatem. Idcirco in Quercu natus multus refrigerat ac valde ad-  
 stringit, praeter propriam, affert etiam ipsam Quercu corticis veli, incrementum stringente facultate.  
 In Cedro, Pino, Picea, Abiete, Larice, Rafinatena, minus adstringit, & potentes diaphoretici  
 ac emolandi facultatis particeps est. Semper vitam in quo Mafas aliquot debet in adhae-  
 rentia, ut, formis in dactyle, viticulis in robore, vomitorios compescere, & alia si forte.

Dioscorides Mafas decodum velle ad infidendum, trache, ex vitis flavore laborantibus  
 regere deinde Balanops, ostendit infusandi grana miferi thymum in, in scoporum  
 compositibus contraxerit esse, ad quae potissimum is conuenit, qui odoratissimus.

*De Mafas palustris et terreftri.* CAP. XIII.

*Mafas terreftris vulgata.*




*Mafas terreftris sine Lamposum.*

*Mafas terreftris rosas.*





Musci terrestres minor alba.



Inter musci spicæ vigent, reliquo tempore inanis ac effusa apparet.

Muscum terrestrem non passi hac artem appellant Germani *Schwamm*, *Quindian*, *En*, *fran*, *haushay*, *Eruffis* flammis; Belgæ *Wasserdun* appellare vult. *Lycopodium* & *Isop* à nobis duo corpora: Officina plerique perperam *Sporam* Celticam nominant, quæ cum maximo errore pro *Spica* Celtica in medicamentorum compositionibus habentur.

officina  
non app.

Cæterum *Muscus* terrestis, *Lycopodij* denique nomine, utriusque generis, & *Hylocomij*

*Lichen*,

*Tragus* reperi, calceolos edunt, aut ac edunt. *Constat* ac in vino decoctus, podagros dolorem potius lenit. *Vinum* *Stuardi* quod in intercom comaret, in vase suspensum, integram retinet eodem in ore.

De *Lichene*. CAP. XV.

**L**ICHEN Musci quoque species, ex multis quibus pinguis foliis, quædam alba compactis, consistit, quæ superiore parte ardua, infusa minus vixit. excusat inter hæc præcipue breves pediculi, eorumque stillicites rotas quædam pendentes deorsum demerantur, quibus faciem tenuisque adhaerent, vixit vixit.

Virescit, si in humidis, petris, lapidibusque locis vixit, item & aliis seminis, quò suis talibus perennat, & quasmodi vixit frequenter, *Lichen* crebrè reperitur.

Mox ac Inter musci corpore stilleta profert, & simul alia serpentes tot sola prioribus alid.

*Asper* *Græcos* *Latinis* *Lichen* aliquid non *Asper*, sed est, *Muscus*, *Dioscoride* teste, appellat Officina *Hepatica* vocari: Sunt tamen & complura alia *Hepatica* nomine denant, ad quorum differentiam *Hepatica* petra hæc incommodè hæc nuncupari potest, à Germanis manus appellacione quæ hæc Musci generis *Erupa* habent appellat: Belgæ *Strom* inquit.



Fig. 1.

Fragilis autem se facit, & aliquantulum adhaerens, tempera morbo sibi parca hanc pesti-  
 et ad aeris vocans inflammationem, calorem, febrem acutam, & tertiana ex hinc citat efflu-  
 uis habent.

Dioscorides Lichenem in partem sanguinis siliere profusa, inflammationes omnes au-  
 dit, in partem sive Lichenem in dicit tradit prodeffe vobis & in, quos regias mares morbos, &  
 aeternis tempore inflammatione exoritur, quia dande & lingua in flammam non recubi bene.

De Pulmonaria.

CAP. XVI.

Pulmonaria.



**A**CCREDIT Lichen Pulmonaria & alia  
 Multa species, anther, ambitu lateret, ac  
 squamosi, hanc sibi musci multo plerumque angli-  
 cata sola mares sunt, non perinde ignea, sed ru-  
 gosiora, alpera, ac conpile modo deba, lentulu  
 vident hanc supra parte, proxa anal brevis aut pale-  
 lent. Quae tota forma pulmonem al quo modo o  
 refertur hanc Muscus apparet.

In veterum Quercuum, fageorum, aliamque  
 sylvestrium arborum caudicibus, ac opaca ac  
 densa sibi haec gignantur penur & in petris quan-  
 doque, vel etiam in vrbrosissimis locis.

Nomen à fageis sibi dandis in tenet Pulmo-  
 naria: Germanis Langenshat: Belgis Koenig-  
 wurt: Gallis *Herbe a pulmones*.

Refrigerans hanc esse facultatis & refrigeran-  
 tis videtur. Penusur autem pallores, ac etiam  
 Mulierum quidam, hanc pulserem addito  
 sale vultu comburac alior peccosibus nullisibus  
 & difficultis respirandis exhibere. Prodeffe  
 hanc & hominibus posse creditur, & ad pneumo-  
 nis vicia sanguinisque spationem perquam  
 vult.

Commendatur etiam ad cruciata ac secretis  
 vultura, putandoum in vicia, mulieribus profusa-  
 tis, quae & ad dysenterias, tum & ad alia va-  
 cuationes nimias, praesertim biliosis, sive per  
 infera, sive per superiora vomitum, v& aut, sibilis,  
 & alium coloret.

De Rosa Solis. CAP. XVII.

Rosa Solis.



**P**ARVA & humilis hanc herba effusivola ha-  
 bet in terris pediculis parca, exigua, sub-  
 rotunda, aliquantulum & inter aut scalpy con-  
 cava, v& cum costiculis hinc in ac ruberona, an-  
 distima temporibus, sub-que firmissimo Sols  
 acta ipsa mensis ac post, rose humoresque ma-  
 denna coliculis inter hanc surgunt quod inuales  
 aut inuoret, in quibus foveolis candidis, et rufis-  
 simis ac capillaceis radiculis sunt.

Est locis desertis, arenosis, apricis, sed rigis,  
 & raris alibi, quibus ipso hanc nascente candi-  
 do pulchri musci.

Ad hanc Rosa Solis viger Mase aut hanc flores  
 colligendas cum cali coactis hanc siccissima ac  
 firmissima fuerit. Aqua ex hoc per vicia organa  
 emissa sive destillata, aut hanc m& uerit co-  
 lore.

Germanis Cordus & Chubar dicitur Lan-  
 ta Rosa Solis à nonnullis Rosella ab alio Salifrons. A rose, quo sub ardentissimo Sols alibi  
 m&er, per se in dicit. Dicitur & Koenigswurt, quod hanc etiam gustatu peccos ad Ven-  
 um inuoret, quod Koenig esse Belgis vocant.




Mafcus marinus I.

Mafcus marinus II.



Mafcus marinus III.



differtem habere. In Oceano tamen Gallico, Britannico, Belgico, vel etiam Germanico  
vires quædam fabricandis reperitur, quæ vicinar gentes feliciter veniunt.

## De Fucus marinis. CAP. XX.

**F**ucus marinus, Dioscoride vocatur, nunc sunt generis vnum latum: alterum oblongius rec-  
tum Creticum.

Theophrastus primum in genus non modò folio lato, sed & cæteris, ac herbidi coloris esse  
refert. Haec meminit videtur Aristoteles lib. De animalium historia vi. Purgamentum  
autem hanc esse ait mare. Sicutque vitæis unius, eoque ostreas tum & pisciculos alii.

Atque huiusmodi Fuci generis & Oceano Germanico similes est circa fissuras scopulorum  
soluuntur basibus, aliq. annulatum corpus, & elegantè virentibus, quod vni cum mactata,  
coctis, ac estis prima vitæis subinde ad vicina loca deferunt.

Primum genus Dioscorides sublongius ac rubens refert. Illud hoc esse apparet, quod à  
Theophrasto radice describitur foris densa, densa siue pilosa: interior vero densa, scaba-  
scum, longam, crassam, ac rugosamque firmam habens, quod inter præcipua primo loco à Theo-  
phraсто refertur. Nam alterum Fuci generis hanc præcipua dicitur, quod in recessibus ac su-  
perioribus habitat. Hoc autem non abs se idem videtur cum Mafcus marino Dioscoridis,  
et superiore capite memoratum. Cum secundo autem in Dioscoridis Fucus similes, si non  
omnino non fallat) quod oblongo folio, & radice foris pilosa expressam est.

Tertium Fucus Dioscorides crispum & valde floridum esse ait, ac nulla corruptione la-  
be pila, ac in Creta nata. Theophrastus & Fucus speciem in Creta insula hanc præcipua  
refert fixa plurimum optimamque præcipua refert, quo non solum vnum, sed etiam latum  
refertque vitæis, colore longa purpuram præstante, quædam recens est.

Appellatur autem Fucus præcipua Græcis est tamen & Fucus herba Anchusa species, mul-  
tim ab illo differens, quæ & ea de causa non modò præcipua dicitur, & Fucus marinus vocatur  
sunt vero qui præcipua Latine dici velint, in qua sunt Theophrastus Gans ferentia, qui in

Fucus usitatus prius.



Fucus usitatus alius.



Fungi  
varia.

Fungi.



Theophrasti varietio esse Algam edibile.  
 Pinus vero vno loco hanc mponitiam  
 improbat alibi sequitur Lib. XXXI. cap. VI.  
 Algam maris Themasen esse ex Nicandoro  
 ferti Nicander autem esse in Themasen com-  
 mendar. Et ibidem Pinus granam inferri Al-  
 ga, Fucus Drosocorde vocantur Libani non  
 in aliis umine est serpenta. Non habet, et  
 lingua sua nocent, quod Graeci vocantibus  
 quosdam Alga barbarum magis vocabulum  
 intelligit.

Ceterum Phycum cruentum hancem  
 reficere ac refrigerare ordine secundo Gal-  
 enus docet. Drosocorde non modò podagra sed  
 etiam inflammationibus in cataplasmata vo-  
 lum ut, & humido eo vendam, quia quia  
 mariscat.

De Fungis. CAP. XXX.

**F**UNGORUM quidam ex terra exsunt  
 veterum arborem quibusdam adhaerent,  
 à prioribus omnino deficientes.

Terram fungi crasso tenet, insidit pul-  
 culo, inter lan ac circumtae rotunditas plu-  
 sine galea, deponit parte vitro & dum vique  
 desierit consero, infectione ac proci caecis,  
 tenuibus usibus à medio consero ad circum-  
 serentem vique productis frum vident autem  
 omnes medulla, aeras, vena.

Differunt ad partem magnitudine & colore.  
 Asph



Fungus orbicularis.



tenor medulla lara & prestantia: qui dum seccatur, rumpitur, tenuissimam pulverem instar sumi quodammodo erudant.

Locus ubi reperitur pascuis, semolis & humidis, & quidem quoque post imbres.

Vulgò Luperepus appellatur. Itali *Pesce de Lago*: à Plinio *Perice* dicti videtur, quòd sessiles. Nam in Fungorum genere quosdam aut *Pericardium*, qui sine radice ac pediculo nascuntur. Hi nullo mandantur modo. Pulvis seccaturum, extra mesuram seccatur: ad olea & incensum non indifferet adhibere.

Basenard  
Pomp.

De Lucimaria Fungo hic nihil addendum, non enim ad stiracem istam pertinent, cum aliud non sine, quòd quod in eorum cunctis clychis concretione, hinc in impedimento est. Hoc humidis constitutus esse pratagum, Vagilus Geoppon libere perhibet, ubi signa facere plura recenset:

*Tam Carate plene pluviam totas improba voce,*

*Et sola in foca facies spatant arena:*

*Inter nullarum quidem corporum pensu pendit*

*Resistitque hyemem: res sic cum ardente videtur*

*Scintillare elam, et parat concretere Fungus.*

#### De Fungo orbiculari. CAP. XXIII.

**A**RBORI: Fungus caudicibus, subinde etiam ramis arborum adhaerentis, circumferentiam partem occupant ipsi semiorbiculari, superiore parte necnulli plani, subinde magnum concavi, in sinore in angulum concrescant. materia solida est, quae seccata quae concipit, & aliquando rotinet.

Vix vili est arbor, cui non sine leoni huiusmodi Fungus subinde adhaerent.

Maxime quoque appellant verim ad differentiationem superiorem, Fungus dicitur arboris, & Fungus orbicularis. Germani sicut dicitur *Chyrenstein* appellant.

Pericostis omnes uno assumpo existimant. Nascuntur lechales esse reser in Olea, Libet, & Quercu cratis.

#### De Agarico. CAP. XXIII.

**I**NTER arborcos Fungos venit & Agaricum numerandum. est autem Fungus caudicibus, haud inodorus, maxima conditus quam precedentium sanos. Plinius lib. X VI. C. VII. Galliarum montem glandifera arboris Agaricum ait ferri. Sed non glandifera, vixim constat, & inter has vel sola Larix hinc profert, & quidem non in Gallia quae nos Francia, sed potius in Celsipia Idiae Gallia, ubi Latium sicut quaequam & alibi, ubi Latium procerat, quod sum etiam repertum constat.

Pulvis quod caudicis sum, tenuissimum, iting facile ac leue est, primoque gustabile, duri, densum. Graecis, nigricans, in fragmento villosa necrotum odorem, pericostum habet.

*Agaveus*



Græci *Agaveus* Larici & Officinarum Agaveus quæque vocantur: Itali, Hispani, aliique nationes Græcæ vocem istamantur.

Agaveus autem inter ea, quæ ordine quidem primo exsiccantur, lecturæ vero calidæ, placet veteribus in morbis: laceris, intumet, exangit, videram obliuiscitones expurgat, tum & per alios medicos purgat.

Iuxta regni morbos ex obliuiscitione laborantes: rigores à crassis frigidisque humoribus perficit: & demouit à frigore ledantibus febres, cum fors appositum, cum artro alligatum: vritas remouet: mouere potest fluxum & mensis corporis colorem emendat: humbricos pelliculæ febres, præsertim quæ vritanas, tum & emaciat, aliisque longiores curat, aduenit ad morbum facientibus permissum. Et hæc quidem edacendo, expurgandoque crassis ingulis & perniciosis humoribus, morbo cum causis, potest.

Modes exhibitionis in substancia aut puluere est, à denario vel siccis denario ad drachm. Infusi autem aut decocti à denariis duobus ad quatuor.

Tardè autem purgati ventriculum quoque nonnulli perturbatione dolent & Zinziber mifcondum ei præcipitur, vel Dauca, vel Lagnifia sermen, vel sal fossilia, quæ in Germania cognominant.

Galenus (vix quidem Mefues refert) cum vino in quo maceratum Zinziber, exhibeat. Non desunt qui Agaveum cum Quymolite propinant, quo modo tumidum exhibent.

De Tuberculis. CAP. XXV.

Tubera.



**T**UBERA globosa ac tuberosa quædam sunt sua sponte intra terram nata, & ab ea videntur se excrescere, abique caule, foliis, fibrâ, aut capillamentis adnatis. sunt hæc fors ut nigra aut nuda, intenses verò pulpa candida aut subflava, magnitudine mali Cotonei, siccitate ampliora.

Sicilia,



Siccis, sabulosis, frustulis multibus gignitur, ut in Parosia, & plerisque Indiæ regionibus, locum in quo gignitur nec exarborat nec rivas agens, Pharus testem Martialis in no fandi frequenter solis rivas habebat, has verbes obediens.

*Compensat alteram rivas de curvata rivas*

*Tubera, hinc pennis pennis feras.*

Cum fuerint umbros Autumnales ac caelestia rivas, tunc potissimum nascuntur, Plinius asidore.

*Vere de rivas effodiantur, Dicocondon aut.*

*Plinius Graecis Latina Tubera Italia Terrefol, Terrefall; Hispanis Terrens de terra, Terres, Tubera de terra Gallis Trast.*

Tubera nacti, ut quidem Galenus ait, in strumeranda sunt, qua nullam utilitatem qualiteram habent, quibus omnibus comestione est, ut alterentur nulla vigila qualiter comestione probant, ingridu scilicet mensim.

De his Aucara diligenter variis Tubera terrena magis quam aqua, omninoque irritantibus experiri referit, sed tamen melancholicos & crassos ab ipsis in corpore gignuntur, si per se manducantur apoplexiam ac paralytum infert.

LIBRI QVINI ET SEMPTAGESI TERTII

FINIS

IN REMBERTI DODONÆI MEDICI  
HISTORIAM FRUMENTORVM  
IOHANNIS POSTII CARMEN.

*VIDERAT hanc ritalem flava que cincta corona  
Fragibus atque arvis presidet dona Cereræ  
Hylæ, hinc suam mirata, simulque figuræ,  
Omnia que referunt commoveret, ut  
Dum revolvat agros, sulcis dona frons credit  
Rusticus, & sacro demittit arva manu:  
Semper bonus, Remberti, tuus, laudisque vocatur,  
Namque sacro meum in arde tuam.  
Et tibi saltem postea mea turba choræ  
Insistent, sicut institutaque doper.  
Et postis lecti repent tua membra mense,  
Remberti, tuusque canet vir malis que mem.  
Atque aliquis inuicem, grati monumenta laboris,  
Suscipiet tuncale spicae fere tue.  
Et quis operas tua moliter ossa quæsiens,  
Sancitque perpetui floreat vna rivas.*



## DE TRITICO.

CAPUT PRIMUM.

Triticum.



**T**RITICUM folio exi: Sociali in omni cul-  
tura affertur plurimum, generaliter, hodie di-  
scernitur, quoniam sermo aut quanto articulo spu-  
ca emittat, ut plurimum in ista, interdum vero  
& arista nonnullis brevibus caulis granis pla-  
fert colore flava, que e glumis ac foliis si-  
milibus excedunt, ac exiguo negotio in area extrahit-  
ur. nichilominus firmatur in his varietas.

Provenit in omnibus fere habitaculis cultu-  
bu regionibus, à quibus & complois etiam accen-  
tat genera, cognoscuntur ab ipis rivisibus firmis,  
que colore, magnitudine, specie, & pinguitate  
inter se differunt: scilicet Theophrastus.

Latam autem pinguique foliis Triticum pos-  
sibile, idque magis pinguem & firmum, quam re-  
gum. In siccis enim, ut Creta mella testat, ma-  
lissimae coalescit: In humido vero ac rigido de-  
generat, & post certam latitudinem in Siligine  
hoc est, levis ut de candidis Triticum conser-  
vatur que tamen de caulis in Robam, id est, pro-  
fessionis Triticum pinguis transit, si immo-  
nata sola in transilys, granis firmis qua-  
litate: aut in Plurima.

Sentitur frequenter in Autumno in Italia Ve-  
ne. Autumno latam per hyemem in herbis et in  
pluribus culinis articulis, & fere quibus in-  
dicibus firmatur. Alibus mensibus transire  
ad maturitatem pervenit.

Appellatur Germanis **Witzen**: Belgis **Triticum**  
Itali **Grano**: Hispanis **Trigo**: Galli **blé** & **far-**

**ment**: Angli **Wheat**: Graecis **trige** dicitur: Latine **Triticum**. Significat vero Triticum generali-  
ter quidem omne frumentum, quod ex spicis annuum ac vivacitate re purgatum est: quo  
significato Aristoteli nonnullis nonnullisquam hae voce vitium vel de vitibus, obliquè propositum  
idem casum, quod Graeco **trige**, est.

1. In Triticum vero genere, quod dicitur solidissimum, & maxime colore non modò extrinsecus  
splendet, verum etiam in partibus diffusis, eandem interius refert: Columella Robam appel-  
latam. Pondus hoc, quo in examine omnis frumentum proflans dicitur, & non prodest.

2. Aliud genus mollius, levis, interioreque medulla laxius ac candidum, (quod plurimum  
loco laetissimum habetur) Siligo à veteribus Latinis appellatur. Hanc Plinius prope  
candidam, ac in mundando firmatorem commendat, & Triticum dicitur de hinc concepta. Sil-  
ginem (inquit) prope dicitur Triticum de hinc candore hinc vivit, & sine pondus, in-  
veniens humido tritibus, quales habet sunt & Gallicae Comae lib. xviii. cap. viii. Colum-  
ella verò, non quidem speciem in pane propositam committit, sed tamen qua pondus in-  
ferat, Triticum vitium esse censet: Quod extrinsecus, inquit, albidum, intus verò candidum  
candidum, leve ac vasa in intelligi debet, nec non tanquam opesibus agricola, silis Siligo.  
Nam Triticum hoc est vitium, & quanto candore perficit, pondus tamen vincit.

3. Quod Vete scribitur, Galli, Ruillus aut hoc, Martium cognoscunt: Belgis **Roosent**  
Graecis **Trige** quod est, Triticum Triticum, & **trige** Latine Scythiam vocant. Ho-  
mili velis, Columella aut, agricola gracillimus: ubi enim propter aqua aliamve causam ma-  
lissimò est emissa, partibus ab hoc peritur. Triticum autem sine tritibus dicitur, quod  
terris à siccione mensis, ita tunc matureat. A Triticum ac Siligine pondissimum, (qui candore in-  
tanteque simile est, etiamque vitium genus quoddam) solo in nonis tempore dicitur. Quod si  
enim mansius ferretur, com modis proveniret. Neque enim vitium natura tritibus  
Triticum quippe idem locum autem melius respondet Columella.

Triticum autem, ut inquit Galenus, frequenter ac summa cum vitium ab homi-  
bus vitium. Invenit plurimum habent alimentum, que densa sunt, vocantur sublatum  
habent

habent adeo compressam, et dentibus vix distendi queant. Talem enim exigua mole, respectu plantam nutrant, que vix in herbo contraria, quaque dentibus facile frangantur, fracta & laza apparuit, in agris mole exiguum reddunt alimentum.

Vermedamentum vero sibi impositum, quum est ordinis excalescentiam, non tamen genitricem, nec lumbicis manasse possit. Habet etiam quoddam lentoris obstruentisque nature.

Triticum, Diæcorides an, cruda in cibo cretas lumbicos gignunt: eorum moribus presertim mala & imposita.

Farras cum Hypocistis facta imponitur aduersis nervorum rheu matris. Item contra stramonium illi stramon: leuigata ex aceto misco tollit. Stramonum faris contra Petenatos illas cum aceto vix vno imposita prodest: eadem si decocta in glutum modum delatantur, curatis extraxionibus facit utrum contra tuum & exasperatas artenas, cum Mithridate butyro decoctis efficacis est.

Triticum si ex aqua multa aut hydrocho decoquatur, omnem distentis infansmittit omnem. Farras autem in aceto decocto leprias et mouet, & macerantes omnibus inflammationibus comede imponitur: cum Ruta vero decocto eodem, turgentes quatuor sedat, videretur sibi bus stramonium & tormososis proficit.

Siquis grana, Pitarum lib. xxi. cum busta & trita in vino Asinico, oculis dila, epiphoras sedat. Triticum vero cum busta, que frigus videri, puerbano cum re medio. Farras ex aceto cocta, nervorum contractionibus regulatur. Farras in consilia suo etioque gignantur proficit.

*De Triticis Typhina.*

CAP. II.

Triticum Typhinum.



**R**EPTANTIVA vero & aliud stamenti quoddam genus, grauo & rutilum Triticum referunt, quod culmos quidem habet breues et ac tenuiores, spicam vero antlu longioris duntaxat: sicut modum munitur, genus autem durum, densum, potius fistulum, Triticum minus, quodque facile e glutum lass exerit.

Nascitur in quibusdam Hispanie, ac insularum Portuicorum agris Phaladonem ferunt, quod illic aduehitur, per in curia reperitur vnde collectum atque in herbas ferunt, ea, qua de pitum est forma prodit.

Siquis qui possit, serua hoc Typhum esse, cuius Theophrastus & Galenus meminerunt. Sed cum Typha granum, multiplex folliculo inclusum, distaliter deglutatur, hinc autem facile, Typha proprie esse ad potum: licet tamen ex Typha nam, & degenerat esse possit, quod ad reliqua nota attinet, et similitudine est. Inter ea enim que Triticum ac Zea similia, locustinum est, tenuis ac simplex, culmo asperge, ut de Typha Theophrastus scribit. Semel comparatum quoque est, & exale, densum nem & exaltatum, quae colere quum Triticum magis ruffo, ut Galenus de Typha scriptum prodidit iam de spica asperge habet longae ac densae, quae Typha esse ex videretur plerisque locis manentibus est.

Quae omnia tam magnam hinc fruge cum Typha dicitur dicitur ostendunt, ut plene non abut, quum ex Typha Triticum ac Typhum quoddam Triticum esse videatur. Nam & Typha, autem Theophrastus, in Triticum minus, dicitur ac parua, dicitur. Rationi apte consentiunt enim videretur Triticum ex Typha nam similitudini plantarum cum ea accipere, non sicut ac Triticum ex Zea genus, quod cultus quoque Zeam referit.

Hanc non admodum distinde videtur, quod Hieronymus Tragus dicitur inuenisse hoc est, Triticum indicum aut Barbanum cognominat: parum & hinc spica antlu habet longior & aspera, est tamen, culmo, spica, atque grana minus, spicas etenim habet plerisque, rotundioribusque

*pluribus, rotundioribus*

diorumque quàm Triticum, locum verò pulcherrimò atq; Tarento fuit, ut Trago scribit. Sed et insepertibus in Affrica, rariùs in alia Germaniæ regionibus, atque locis præstantissimis montosis, præsertim vbi apra fruges decubant, tam ab hoc, tam forte ab aliis, quòd de notibus cum aliis ostendatur.

De panis et Tritice.

CAP. III.

**C**ONSISTIT panis ex omni frumento, sed ex Tritico largè præstantissimus. Velut etiam Triticam reliqua omnibus frugibus præfusa, ita & ex Tricoque, reliquorum omnium frumentorum præfusa miscella.

Sunt huius panis aliquot genera, quæ Triticeæ farinae partibus, præsertim differentiam accipiunt.

Moliti siquidem Tritici, partes quædam remanentes sunt ac potiores, alia crustata impioresque, quæ inter se commixtae ac confusæ, tota farina constituit.

Præstantissima, molliissima, nec non tenuissima est, quæ ab omnibus furfures et stibula remota. Dicitur hæc Latine Flos & Siligo, translato à candidiore ac leuore Tritici nomine, quod propriè, ut dicitur, Siligo nuncupatur. Græci vocè à Latinè mutata hæc pars *ἀλευρ* appellatur, propriè, ut Galenus ait, nomine desumpto, *αλευρ* inquit Græcorum nomen & antiquum, *ἀλευρ* verò neque Græcorum, neque ipsam aliter possum expone-ri. De sterina, faret. Alij tenuissimam hanc partem, *γύριον*, ac *σώσινον* appellant certissimè. Helychius tamen *γύριον* *ἀλευρ* hanc confusam interpretatur, & *σώσινον* *ἀλευρ* de sterinaque non tenuissimam, sed *ἀλευρ* *σώσινον*, hoc est, farinam vocat.

Plurimè purissimam Tritice farinam Latine etiam Pollinem vocant, de ratione veterum de floribus, de formis non nihil facias. Flos siquidem purissima est facta Siligo, hoc candidioris Tritici Pollen verò Tritici sterina, Pollinem (ait) appellant in Tritico, quod flos in Siligo. Verum in hoc significato Pollinis nomen à Cornelio Cælio non interpretatur, qui per Pollinem impuram ac fuscioram farinam partem intelligit, ut oportet quæ panes sunt cibarii, ut oportet impures infusioresque, velut hæc ipsius verba lib. II. cap. XVIII. eodem modo commutabit. Ex Tritico firmissima Siligo. Sterina deinde, cum nihil utrumque est (quod *ἀλευρ* Græci vocant) infusior est: ex Polline in familiaribus cibariis. Quæ Cor. Cæli verba, cum in conueniant, quæ à Polline & ignora hæc in modum interpretatur, lib. I. cap. XXIII. *ἐπιμαζεύει δὲ τὸν ἀλευρὸν ἀσπρῶτον, ἰσχυρὸν δὲ ἐπιμαζεύει τὸν σῶσινον, ὃ δὲ ποικιλοχρῶτον ἔστιν ἀλευρὸν*

Quod cum Marcellus Vergilius obiter uocet, ac in Commentariis, quos in Dissertatione edidit, scriptum reliquerit, admirari animo habet, quæ ratione vel argumento iudicium Pollinem existimare potuerit, ac in illiusmodi puluerem magis esse quàm farinam, quàm sita mollescentique, & loca in quibus panes præfusa, partibus huiusmodi intror. Nam ipsa et Polline, cibarius, ac *ἀλευρ* Græcorum respondet, (ut modo ipse ostendit) Pollen Cæli non pulvis vel farina tenuissima, sed aliud nihil esse potest, quàm fortidior farinæ pars, huiusmodi multum habens, ex qua purissima molliissimaque facta et cibus est. Ex Polline siquidem cibarius panem, post *ἀλευρ* Cælium collocat, eodem videlicet loco, quæ ipsa Græcorum *ἀλευρ*.

Post Flocem siue Siliginem, Similago, quæ & Simila est, à Græco *σμιλα* dicta, & quæ quædam farinae pars, sed Siligine impuriore, utpote ex qua non omnes extrahi sunt solent, sed crustatior taneam repergitur: modicum videlicet quòd sita præsertim in iis floribus & farinam confusam. Laudant hæc Marcellus in Xenii hoc disticho:

*Ἐπεὶ δὲ τὸν πρῶτὸν σμιλά μαστράειν ἄξιόν ἐστιν,*

*Ἐπειρὶ τῶν τετῶν δὲ σπιτῶν ἀσπρῶν.*

Ex crustatioribus verò moliti Tritici partibus, una quidem impuriore, quodam & fortioris farinae est, ex qua Flos siue Siligo, hoc est, tenuissima farina pars extrahi est: altera verò, infusiorum partium furfures sunt. Præsertim Cor. Cæli, ut dicitur, Pollinem appellat eandem & molliora per quæ floribus se ferretis, Pollinaria. Plurimè de natiuitate Pollinariae, quæ Græcorum *ἀλευρ* nominant, Palladio eorum est plerique veticulosus & durus. Tritici de uoluntate alijs Græcorum *ἀλευρ* appellare, quæ tamen Galenus Hædus purgatiora interpretat, in expolitione linguarum Hippocratis.

In hoc omni modo tamè sunt, omnes frumentum panes in se constituti, cum nihil vel flos vel furfures decellit, Latine Farinam dicunt confusam, Græcorum *ἀλευρ* vocant, *ἀλευρ* nuncupant.

Ex hac parte cibus *ἀλευρ* nominatur, & *σώσινον*, quod confusum, quoniam mixtum non sit, sed simul omnia ferunt: item & *ἀλευρ* *σώσινον*, quæ ipsa ac ubi Helychius, *γύριον*.

Flor.

Siligo.

Pollen.

Marcellus.

Similago.

ἀλευρ

ἀλευρ.





Melilithi autem hanc Zeam, Galenus non aliquid ratione conuenire cum eo fructu suo  
 spectans, quod Macedonice ac Theriaci modo Strucis appellatur, frumentum Typhor Gre-  
 corumque in Asia minorum in ista modo, sed de receptanea similitudinem, per quo panis fit  
 aut gratia odoris, ac in eodem solum substantiam habens, cum qua Monococco istud non  
 cognatum quoque simi hanc nem, ac affinitatem habet. Panis enim qui ex Monococco con-  
 fitur, ex robore nigrae, foetidas atque ingratisaporis, (Trago scilicet) est, velut ex Ba-  
 ni siliis.

Conuenire partem Monococco istud videtur, cum ea Panis, ac Frumenti barbae, siue,  
 ut ipse Galii nominare conficiunt, Bladi apud Rusticum specie, quod Rubrum agricola  
 appellant frumentum, partem etiam Locar, quod localare, quod pluribus tunc a panis  
 quod localis modum in condunt, partem item Pullare, quia ex rubro in pullam degeneret  
 calorem. Scitur id Galii, ac Rustici, concaui trachibus, qui facile sentit rubiginem. Nam  
 istud, si uoluerit, ac prunas, nec rubiginem horum in partibus & ancellis, et si bene conuale-  
 rit, frumentum carum rubi dantur.

Frumentum  
 barbae.

Similitudinem quoque nonnullam, fortassis & Monococco cum Faro Veneto natu-  
 lobatem verum in terra Columella breuiat, simile ac idem sit, nec ne, qua diuisa sunt  
 Multa siquidem sunt frumentorum genera, suis reponibus peculiaribus, quae licet aliam re-  
 gionem feruntibus similia videantur, in aliquo tamen subinde differunt, idque partem loci  
 aera, partem cultus, atque humana industriae occasio: quae imo ad mutacionem & fa-  
 miam, & herbaram, plurimum possunt.

Far Veneto  
 calorem  
 rubrum.

Ex Monococco autem panis confectus, ater est & hominibus ingratus, ut superius Em-  
 pum, & Trago ait.

De Amyli frumento. CAP. VI.

**Z**EAM generibus non perperam quoque accedit, Amylium Germanis dictum frumen-  
 tum, cuiusmodi siue tracheliae genus, quod culmo ac grano Truncem praesertim referit, es-  
 sentia speciem habet, aridis quibusdam Hordeis ferè similitudine cinctam, ac in duos versus  
 digestam. Scrum foliolum includitur, & non legitur Zea, ac purgan possulat.

Sentur Vere.

Germani, quia ex eo amylium conficiunt, Amylium appellant, Latine Amylium frumen-  
 tum dixerunt. Existimant Trago, & Fuchias tracheliae Truncem esse, sed eam granum ha-  
 bergulis in condunt, ex Trunci generibus esse nequit. Inter Farra: cuius reponendum fue-  
 rit, ut quae Histiculorum forte est. Hoc enim, in terra Columella, Vere sentur, & tracheliae  
 cuiusmodi esse istam cognominantur.

Far  
 tracheliae.

De Oriza Germanica. CAP. VII.

**A**D Zeam quoque refere consentaneum videtur, Orizam Germanicam à Trago non  
 capiam. Frumentum est cuius generis istam, speciem, aridis asperis, atque acuta, Hordeis  
 simile, singulari tamen maceibus, & grano candidiore, quod venositas tamen committitur, ac  
 Hordeis, ac Zea modo deglutitur. Ex istitutum siue tracheliam frugum numero est.

Aquod Medico in istis, cum in aliis trachelibus feminibus latissima agri situra.

Nomen haec Oriza Germanica à vulgari nomenclatura Hieronymus Trago mutauit,  
 qui & ipsam Faris speciem, ac Tragam cerealem esse existimat, in quo ventum nobis haud  
 videtur assensus. Nam Trago scilicet Chondro affirmat, ex Olyra esse confirmat aliquo, res fa-  
 ctum est, ut Galenus testatur, tantum abest, ut frumentum aliquid naturale sit.

Olyra autem magis similit Oriza haec Germanica est, quae à Dioscoride Zea generi ad-  
 scribitur, aut Plini Santalo, Faris Gallicae specie, nudiusdem generi, illi Brassae, ac Panis,   
 vocat: aut certe Faris Glisino, quod forte idem cum Plini Santalo est. veramque eam  
 candidam, & Glisinum à Glisio dici potuit, oppido transpudat. Italae, quae alio rogati  
 Glisio nominantur. Sequit reponet, quod nomen haec Oriza, vel Olyra sit, tota  
 vixitque venositas. Nam Olyra & Glisinum Far, ex hybridis similibus sunt. Ad id  
 enim, de plerisque frumentis, desitum nihil potuit: cum propter veterum ipsorum breui-  
 tatem, cum frumentum appellaciones aut distictas, ac sapientiam eo confectis, eandem et in  
 aliis dicit subinde appellacionibus.

Germani  
 Plini  
 Far  
 Glis-  
 inum.

Rubrum Faris Gallicae, siue frumenti barbae genus quoddam esse ait, cuius gratiam can-  
 didam, ac speciem maceibus aridis circumvallatur, quam Localare, quod, inquit, Glisinum  
 pariter: istud autem aut simile sit, vel idem cum Oriza Germanica, expendendum est.

Vili autem Oriza Germanica, ad multa culpari opes, cibi admixta esse gratia est: cum  
 lacte Oriza modo decocta, probè alit.





hæc verò panes et hæc diuina Typus sibi, Olympis longe sæpe præstantior, afferunt verò  
dæmones sepius euadunt. Cum enim multa eorum sit tenax ac ductilis, denique maiorem  
in modum, & maxime cùm negligenter parati fuerint, aliò vt qui panem in iunctura mod., post  
viam aut duos dies, ac multo magis se quærites aliquot, comedere, præterea sit laetum ven-  
tulo suo cretæ. At calidum adhuc cùm est, ab ipsò etiam vrbano expectitur, quibusque cum  
cibus quodam mundum, quem vernacula nomine *επιμακιστος* appellant. Porro hanc quo-  
que tractum esse oportet, & ipsum panem calorem cibum adhuc remanere. Qui certe hanc  
in modum est panem, non rubrum modò, sed vrbano quoque hæc manibus in deliciis habetur.

Qui verò trius, quatuorve dierum est vel ipsè nullum manducet infans, præterea com-  
eda subdificiter, ac tardis per aliam subducatur, que calido maritæ accidunt: qui tant-  
um ab Hordeaceo, quod ad de rebus in arboribus, seu limum relinquunt, non tam in eo aded, et  
in diuinas est vrbano. Qui in am corpore admodum, dum calidus est, sumit, vt per  
et Triceo sicut in isto par sit.

Congeries autem in panes Typus semen repurgatum, omnesque vsu accommodatus:  
cum sic aqua manducatur, hanc aliter ac vocatum à rusticis *βρώσιον*, hepistimon, quod ali-  
quos nominat, in iello non nauquam etiam cum sale et figatur.

De Zea atque et similibus hactenus nunc ex hæc factura sequuntur, quæ apud veteres in  
vltis sibi, vt sunt: Far, Chondrus, Halica, Tragin, & similia.

### De Farre saluta. CAP. X.

**F**ar illud naturale frumentum, quod Græci, vt ostendimus, *Ζεα* quæ Sole appellatur, aliis  
Fraxulina atque & non incare opus, de illo superius in his capitibus, de factura ve-  
dit modo.

Facta autem illud apud veteres illos Romanos, quos pulis Ferracia, non pane, longo  
tempore vixisse Plinius scribit, ex Farre frumento factam, nomen ipsum de frug & rei ta-  
lino communi, indicat. Quod inde manifestum est, ad cursum frumento granum, ab vrbano  
liquibus conditum, eo modo, quo Archigenes Far conficit tradit, repurgatum, atque in panes  
conficitur. Nam & Far Hordei, Palati in vino confectum phasianorum pulis primis die-  
bus præcipit. & Plinius in Ægypto ex Olysi Far conficit scriptam reliquit.

Modum autem conficiendi Farre, Archigenes apud Aethiæ Sertione ix. ostendit: Xist  
illud frumentum, aut, modico tempore aqua madefacto, indeque extrahit ac in plam  
conficit, veluti palam à cortice repurgato: vsu verò coruocum eructit, tollit atque in  
sile ficato: deinde manibus eruat, donec peritas à cortice fuerit mundatum, crassissimè  
mola, et vt granum vnum in quatuor aut quinque partes redigatur, & sic in asseruato.

Porro factum illud Far, præsertim ex Zea sine Farre frumento, plerique nostræ erant  
illud cum Chondrus aut Alca esse existimant, similitudine quadam eorum induti. Chon-  
drus enim simile est, non tamen idem idem, veluti ipse Archigenes ostendit, quando Far  
Chondri modo coqui scribit.

Differendum horum preparationis modus efficit. Chondrus siquidem gypso hære ad-  
dit, vt paulò pôst dicitur: purgant: Far atque hic cum aqua sola. Differt verò etiam ab  
Halica, Panem antiquum, quo Romanorum vetustissimè vinctum, Halica verò, vt Pl-  
nius ait, remota ære: Magni Pompeii nondum cognita, cui non solum aqua, sed & creta  
conditæ tenendine quæ coferunt. Differentiam præterea horum etiam ostendit Tra-  
llian lib. de cap. v. vt. vtique vsu diuersis vrbis, de eorum inter se comparatione fieri faciens.

Quod autem Germani ac finitimi Frisii, Hollandi, Batoni que ex Hordeo & Avena con-  
fiant, Farri simillimum est, ac eius quoddam genus: Germani *Wapen*, Hollandi *Wap* ap-  
pellant, & ex Hordeo quidem *gristen gajen*, *gristen gajen*. Avena verò panem *grapen* / *pa-*  
*nen gra*.

Ceterum Far quod ex Zea factum est, sicatur Chondri aut Halica quodam modo si-  
militudine ex de causa valenter, sed tardis descendit, repurgatur coruocum. Vltis tem-  
poris, vt Archigenes tradit, Chondri modo coquatur, & à limum cibo sumitur. Pro agris ve-  
ro nisi apparatur, & epibematis quoque admiscetur. Ex Hordeo autem vel Avena Far le-  
uissimum, etiamque alimentum adfert.

Et hæc Far apud Aethiæ cognomento Clusium, non naturale aliquod Far, verum pulis *Far Chondri*  
quodam Ferracia, de qua Martialis Epigrammatum lib. xii.

*Indus plerique Clusium pulis est.*

*Pl jactat in vrbis, dulcissimè estibus.*

**C**HONDRAVS &  $\alpha\lambda\gamma\epsilon$  ex facturam similitudinem rerum nomen fuit. Fit autem utraque ex Zea, & Chondra quidem ex Zea Diacoco, Diacocinde vocatur. Theophrastus & Herodotus sylvestri horum fiti Chondrum tradit. Galenus Chondrum ex Tritici genere esse ait, quod nihil aliud constat, quam ex Tritico genere ipsius confecti, non quod Tritici aut alterius frumenti aliquod genus sit, velum nonnulli perperam sibi persuaserunt. Nō enim frumenti aliquod genus, sed res plerū, ut dicuntur, factura.

Galenus & aliorum Græcorum in chondri interpretatio  $\chi\acute{o}\nu\delta\alpha$ , Latine Halicari sine Alia, interpretantur. Chondrum omnino idem est Halice esse putant, quia in rebus non sibi et reme necesserunt Chondrum quidem & Halice differunt, velum abunde vena pro multis, Sicut *Agrostis* non uno ostendit loco: aut videlicet de vitiisque fortissim aperte, & sicut capere nos ac facultates tribuere, ut lib. i. cap. lxxviii. aut vnam ab omnino loco subsistat, velum cap. xix. xxxix. & xxi. h. h. m. m.

Differunt autem hoc inter se, non quidem toto genere, sed quodammodo, vena pro & species, aut potius ut vena pro genere duo species. Nam Halice sine Alia, Latine ac sine generalis est nomen, Græcorum cum  $\chi\acute{o}\nu\delta\alpha$ , tum  $\alpha\lambda\gamma\epsilon$  ipsi peculiari nomen, sibi se comenat.

Est enim vna Halice ex Zea, que semen appellatur, propria quidam genera, que i Phoenicibus, lib. xxi. ut Romana esse fertur, Magni Pompeii tempore nondum in vna. Hæc i Phœ Agrostis Græce  $\alpha\lambda\gamma\epsilon$  dicitur,  $\alpha\lambda\gamma\epsilon$   $\chi\acute{o}\nu\delta\alpha$  ipso preparatum modo differt, non enim  $\chi\acute{o}\nu\delta\alpha$  arena velum hoc repletur, sed creta candorem perficere, quodammodoque itum adæquat.

Est verò & altera Halice ex Zea in Africa degenerante, cognomento adultera, Græcorum Chondro simillima gypso liquorem & arena, velum Chondrum perferunt locum Halice quidem ex degeneratione, Chondres verò ex Diacoco Zea, fit. Nam preparatio non apud vnaque natione confectis, eandem esse rem profus ostendit, quemadmodum & ea diffinitio res differat. Non enim tam species frumenti, quam preparatio confectioque res ac modus ostendit res. Frumenti enim aliqua durissima, speciosa rei factis non videtur crete, modo in preparandi ratione nihil vana. Secundum ex Zea & Hædo fit ex Zea & Herodotus sylvestri Chondra: ex Herodotus & Tritici Phœnia confectio possit.

Qui autem ratione Chondres confectus ac preparatur, in libri De agricultura, lib. vi.  $\chi\acute{o}\nu\delta\alpha$  Constantino Imperatore & Cassio Dionysio Vicensi, docentur h. v. h.

Zea mundatur & in seronem aquam incutitur, ac peritur, deinde gypsum ab arenam cribatur, & arena albissime ac subtilissime ad gypsum pars quarta paulatim admittitur, donec Zea probe reparetur. Preparatur autem in Cucularibus dicitur, ac sic fit. Postquam verò rursus totum perperatur fuerit, per cribum densius excutitur. Optimum est Chondra, qui primum excutitur est: secundum locum habet, qui succidit: deinde autem vna.

Halicarum verò preparatio Plinius lib. xv. i. cap. xi. tradit. Halice fit, inquit, ex Zea, quam semen appellamus: tandem granam eius in pala ligata, non lapidis duritia concutitur. Nobilis, vnaquam est, pro vindorum perna operi, peritur inest gypsenca, multa inde tunc, peronem autem instrumenta nudata conciditur medulla, ut sine Halice impura, minimam, ac secundariam: grandissima verò  $\alpha\lambda\gamma\epsilon$  appellatur: nondum habet candorem suum, quo procellare, iam tamen Alexandrine presertimur. Postquam, in arena, admittitur creta, que transtrum corpus, coloratum, & tenet in tam adfert.

Deinde prolixa Halice adulterna fit maxime quidem ex Zea, quia in Africa degenerat. Purior cum arena, & sic quoque difficiliter contereant verculos, & sic dimidi modis mensura, postquam gypsi quarta pars inspergitur, arene viscoherissimum color subeunt. Quæ in co remanet, exceptoria appellatur, & grandissima est: rursus que nihil, ac tunc contere, & secundaria vocatur in cribatur, que simili modo in vna excutitur, cribro angustissimo, & arena tantum transmittitur.

Et hædus quidem Cassi, & Plinii verba: ex quibus manifestum est,  $\alpha\lambda\gamma\epsilon$  & Chondro differre, & Chondrum cum secunda Plinii Halice contere, vnaque tam uti, sicut esse, & non peculiaria frumentorum genera.

Ceterum Chondrum, ut Paulus lib. i. primo tradit, egregie vna, & glaucosam partem mortis, vnaque pulvis ex eo confectus nocet, quoniam quamprimum trahit: vnaque vnaque partem magis magis  $\chi\acute{o}\nu\delta\alpha$  ipsius ex vna Chondro bene de cocto, expropratur, sicut.

*Alia* existens Chondro quidem respondet, sed aliam magis adhibet.

Galenus Chondrum velum ratione, ac fueram horum habet affert: facitque duas res: coctam cum multo vino dato, adstringente: siue cum oleo sicque fructu-

ma. Atque eo modo, inquit, Chondrium medice pulsatæ fuisse confectum esse deliquit, quod autem ex ipso nonnulli, ut Dioscorides & Plinius, *Chondrium* hoc modo appellatum appellat. Et uno quidem nomine modorum, eo videlicet quo prius est, Halicacanthum cognoscitur, sed a post Romanos solent, Martialis in Xenia hoc distinctio ostendit.

*Plin. Halicacanthum, nullam partem sibi mittere docet,  
Et sibi melius mittere docet, p. 101.*

De Tragis. CAP. XIII.

**T**RAGIS Chondri, ut Dioscorides ait, similitudinem ac figuram gerit, res quoque fistulosa. Feni enim, Galenus in lib. De simpliciorum facultatibus, ex nobilissima Olyra ac, cum, et decet, fuerit excoctata in Commentariis, verò librum De ratione vestri in morborum de *Tragis*, hoc est, ex ore, quarum vitæque Olyra species est. Cassius Dionysius Tragis ex frumento confectam Alexandrino. Pimut. lib. xviii. ex Tragis semine in Campana dicitur & Agypto fieri tradit. In Agypto autem, cuius celeberrima civitas Alexandria, Olyra facili sermo habetur in eodem lib. cap. x.

A Chondro & Halica & matra, sed potissimum ipsa preparatione differt: Chondrium ipsam, pyram & haena perficitur. Halicacanthum insidiat, Tragis sola aqua rosarum excocturatur.

In confectandi modum Cassius tertio De agnitione lib. sic docet. Frumentum Alexandrinum appellatum, maceratur decoctione, & in sole calido siccat, deinde idem rursus fit, donec in pellicula & quodam fibrosam est, in frumento delibatur. Appellatur autem Tragis, subinde cognominis frumentaceus, ad di frumen ou sibi nominis, & animalis, & botis, non quod rursus aliquid frumentum generat. Nam ut veterum sanctorum testimonio abunde constat, res factita est.

Trago autem, Galeno auctore, plerique venant, primum cum in aqua decoquentes, deinde effusa siccant, aut vinum dulce, aut melleum infundentes, sepius macerant & novis pernoctant aqua permacentur, donec plurimum intumuerit: multò tamen magisquam Zea, Dioscorides ait, nitent.

De Amygd. CAP. XIII.

**A**MYGDUM ex Syphre fit, ut Cato scribit, item & ex Zea: optimum verò ex Sereno, auctore Dioscorides. Fit etiam in Germania hoc arbor, ex eo quod *Amelhan*, id est, Amygdum framentum vocatur, quod veluti Zea quadam impellit ac Halicacanthum (vni *insidiat*) est.

Rationem confectandi panis complexus est Cato cap. lxxviii. Dioscorides hanc hinc verbo tradit. Purgata trinitate Tricicum madefcit qui quiescit, die, & si sem. potest nocte, cum molam corripit, effunditur seminum sine agitatione aqua, quò minus, quod velle est, velle efficit. Vbi molissimum factam facere, effusa aqua postibus calcare oportet, deinde affusa aqua iterum calcare, tum emanans ibi sursum, celato excipendi, reliquensque per colam melleam, confectum in tegulis nouis sub ardentissimo sole siccatum. Nam si vel medici banidum manserit, acorem contrahit.

*Quædam* autem ex eo nomen habet, quòd ab ipso mola, Græcis *amda* dicitur, fit. Officina corrupta voce Amygdum appellatur: Germanis *Amel*: *Fransis*: *Robur* *Melissani*: & quòd glaucum inde fallit, non verum populi inalberitur, ac dicitur, *Amel*.

Triton, inquit Galenus, cum supradicta, cum sicur est: leuiganda exasperata partes vni obtinet. Dioscorides sanguinis reidones potu cohibere, contraque oculorum fluxiones, colicis, gustulansque efficax esse addit: quòd verò ex Zea fit, nullam in medicina vni esse, ad alia tamen conueniens.

Galenus lib. vii. *amda* vni: Amygd loco, Syphre, id est, penultima Tricicifarina vniat.

De Castoreo & Siccis, seu Siccis. CAP. XIII.

**A**THESA siccitudo est, inquit Dioscorides, *amda* *melissani* *amda*, id est, veluti pallicula liquida. Fit ex Zea tenuissimè molita. Apud Belgas non ex Zea trahitur, sed ex quatuor partibus facina coepitur, veluti Secalis, Hordei, frequenterque autem Tritici, cum tenuissimis siccis vel alio huiusmodi permixta.

Et autem edulium, quòd cum concoquitur, facileq; melle, infantibus obvio & senibus conueniens, interiora tamen viscera nonnulla obstruens. Datus copiose dolentibus, ex tenuissimis Secalis, vel Hordei facina, dolorem cum sopit, & somnum clementer conciliat.

Altera crassior & solidior est glutin, Græcis *siccis*, ex Similagine & farina Tritici, quo *siccis* *chama*

charae glutinosa. Quod propter eam, quam habet obstructa vim, sanguis excrementis prodest.

*Planta  
Sals.*

In variisq; medio arenis, sive pulvis est, sed sicut quidem ac spissior Athena, hinc inde vel Gloriam, & in mari Glauca plus aut minus quibus Athena videtur obstruere.

Athena, aut potius pulvis glutinosus, edulcorum, quod Galenus ex multa Tricicifera salsis permixta fieri scribit, quo hac etiam Belgiam, ac vasa intra inferior Germaniam frequenter fieri videtur. Cibus huius sicuti & multa obstruere, sed eos, qui ipsa officina videntur, offendere. Nam in hepate obstructioes parit, & calculos in vesiculis generat, auctor Galenus.

*De Aegge seu Secale.*

CAP. XV.

*Secale sive Secale.*



*Planta  
amara.*

Velut acerrimum) & tantum ad ascendendam famem vale, succunda sed gustu saporis, sicut tritic, sed pondere precipuum, & tamen sic quoque ingratissimum videri est: taliter quicquid solo cum cerealiis grano, ipsumq; proletemane est.

Quae Plinij verba sunt eorum rorim ac raggiditum, cum Secale conuenit sicut dicitur. Dicitur autem id, ut Plinios tradit, etiam Farago, verum non sicut, quam sic, Hordium, Avena, Triticum, vnde Faragine nomen datur, quando videlicet videretur, proceduntq; pabulo edunt.

*Farago.*

Farago, quidem quae Graeci *ρῶρα* appellant, generale nomen est, ad certum videtur segetem locum, quo pabulo eam sic ferunt. Scitur etiam, ex voce mentis Farago pendens, pabulum ab quando & Vicia eodem in Africa sic, ut Hordium Phrygia. Atq; inde Farago, quod sic se ferro casum, aut quod primum in farinosa segete sem conpuita, Vancore audiam, dicitur.

Ex Hordio Faraginem facere docet Cola mollis Faraginem, ut, an velle huiusmodi loco, & altero solo ferunt conuenit. Ea sic optima cum Charum Hordii dicitur talis ingratum obstruere, circa aqua nocturnam Autumnale, sed impendit in huiusmodi plantis, roribus ingratum, imbutibus, ceterisq; pondere, & confirmatur ante hyemem videri nam. Nam huiusmodi cum alia pabula defecerint, ea bubus ceterisq; pecudibus, optima de solo pabulo, & si de pabulo saporis videri, sicut in mentem illam sufficit. Quod si etiam sicut ex eo videretur, quod à Calendis Martiis pecora depellenda, & ab omni roribus defendenda est, ut sic sicut frugibus. Similis sicut Avena, quae Autumnale sicut, parum caditur in ferum, vel pabulum, dum adhuc videri: parum sicut in colliditur.

lent & ex Triceo Farragineus fieri Plinius quoque testatur. Et in Triceo, inquit, generos, pascuam pabuli est, quadrupedum causa facta ut Farrago. Abdyrensem namque vocant, id est, Triceum Farragineum, eo vel in maximo pascuam, ea si non addit, ageribus, quam Columellus describit post triticeam denotatam. Hoc modo & Secale Farraginei generi est, quando vtilitatem pecudum immensamque per hyemem pabulam efficiat.

Rationem Reggiam Siligoneum sive interpretantur, qua in te quantum hallucinentur, Genesiusque capite De Triceo, scriptum, apertum est. Nam Silago candida ac leuis Triceum efficit Triceo, ut inquit Phosus, delima, ex qua laurissim ut panis & pstrinatam opeta laudatissima sunt, ac Secale nigrum est, & ex eo panis atque pauperum, non lauciorum, mentio fit abo dicitur.

In non desinatam erroris lapsi videmur, qui restim cum in Olyra conuenerit accerant: Olyra siquidem candida est, ac veris ubi in vltima in riuat, Secale verb praeter quod si gignit et glutinosa implicatur. Quelli comestura plus verisimilitudinis habet, quod Secale à Briza non longè distat, eandem se fructu, atque inde putari normen Briz panis in Gallis vulgus mactat. Panis siquidem ex Secali fit grauis, firmus, concoctus non facilis, qualem ex Briza fieri Colerus tradit, & hinc nigrum ex Secali panem, ex riuat hinc r, *panis de Galli nancupari* leuissimum non distat ex istam possint, nisi Secale gignit nudum forte, Briza vtilitatem implicatam, quod hoc inter se distare manifestè ostendit.

Quod verò Briza semen glutinam implicatur, ex his videtur colligendum: nam videlicet, *Briza quòdam Typha perisomem Galenus scribit, quae multiplex folliculo locum dicitur in etiam quòdam membranosam substantiam panis ex factus habeat, ex ipsa in tempe folliculo in admittens, contritè planè quàm Secalinus, qui Triceo syncorulo membranas ac farfates ut panem vel non plures habere compentur.*

Porò Secale praeter unum inerat frumentum à Triceo Triceis illi semilibus locum habet. Panem ex factus, Ientoris atque obstruente natura non nihil obinet, distulter concoquitur, & nec in ubi grauis est, praeritum si farfates in experti fuerit. Nam confusaneus, qui sim ut stans recipit, ac ex tara farina conuenerit est, si probe coctus beneque fermentatus fuerit, manentis est, non admodum agere conficitur, citoque descendit, nondum tamen in Triceo faciendo par, quo grauior & concoctus distulter conuenerit est. Alimentum autem est opus solidum, ac firmum praerit, nec in ali succo, si ex bono frumento coctus fuerit, ex modo autem fructu & conuero panem, praeco & conuero succo ingenerat, & diu in terris inuoluptat, vel in modum, Germanis *stetzel* aut *stetzel* dicitur. Admiserit hoc non in Triceam, vel leuorem gratioremque panem efficit, qui Secalino puro minus grauis ac leuis est, & tenacitatem suam Triceo distulter recipit.

Secale in uem & medicamentum, Triceo in calefactione ac digere de potentius est.

Panis ex hoc ac fermentum, promptus ac cito in obstruente maturatur & recipit, quàm in Triceo factus.

Fanus confusaneus, diu in uem capitis dolores lenit in linteis capiti circumligata.

## De Horde.

## CAP. XVI.

**C**YBERO Hordeum est, quàm Triceam becitate fragilior, pluribus articulis generis, sicuti supra la uore, scilicet in articulis spica longam, asperatam, inuoluptatam, articulatam uoluptatam, ac in ueris fructu, ord inibus consistit, uoluptat bona, alida tenui quantitate, ut plurimum, ut Theophrastus ait, sicuti, sed, ut Tragus, citam ostendit. Spissum autem potius arduum est, quae pluribus consistit. Genum uerò oblonga palea includitur: radice uoluptat in frequentes tenuesque.

Hordeum autem (ut Plinius inquit) frugum tenuissimum, atque ex omni frummentum calidum uoluptat, quod siue celebrant reddi scilicet in uoluptat.

Semen uoluptat Columella subita siccaque uem, & uel praerit uel exit.

Natura uoluptat ac uoluptat familiare Europae, est uem in uoluptat, tum frequentius in uoluptat, Aprilis, in uoluptat mensibus lenit.

Genus uoluptat dicitur: Germanis *gersten*: Belgis *gerste*: Itali *orzo*: Hispanis: *Croada*: Galli *orge* nancupant. In uoluptat genere, quod pluribus uoluptat spicatus, in uoluptat uoluptat appellat, ac Germanis *gerst* *gersten*. Quod sex uoluptat *gerste*: Conuenerit uoluptat Columella est. Aliud duorum uoluptat *gerste*, à Columella Galaticeum, à Germanis *fast* *gersten* sicuti *gersten* est, quoniam ac parum Hordeum uoluptat. Quod magnum & plenum, spicatumque praeritum, *gerste* *gerste*, ab Hippocrate uoluptat, aragus ad obstruente est: quod uoluptat in uoluptat, ab aragus hoc minus in uoluptat.

Ad Hordei genus & radice uoluptat, inquit Ruellius, uoluptat, in uoluptat dicit Hordeum, quod

Hordeum.



Hordeum diffusum.



*Hordeum*. quod Gallicè *pasopress* dicitur, quòd rebes ad apertatem adductis, cum assensu postea  
 nana, plebem dat, & à feris nosa vindicat. Sentur verò & in Gallia, quod mundum Ho-  
*popress*-  
*du.* rdeum vocant, Ruculo eodem teste: huius granum nudum est, ac spontè glanis nascit, ce-  
 tera Hordei similia: Pappusq; alter ac nudum Hordeum, tale à Galeno, in lib. De aliment. li-  
 cult. appellatur.

Ceterum Hordeum, ut Galenus in lib. De aliment. facult. non eandemcum Triticis  
 naturam habet. Siquidem Triticum paleam calefacit: Hordeum verò non modò non ca-  
 lefacit, sed quoque modo ea vires, siue panes ex eo factos, cum quorsdam refrigerandi habitus  
 continent. Distinguitur ita à Triticis facit ipse, quia utriusque ipsorum pappus cul-  
 tur. Siquidem Triticum nudum & lectum est: Hordeum autem nudum, & nudum hor-  
 sonum nudum in rebus pappi.

Panes Hordeacei Triticis multò minus alunt, qui tamen ex præstantissimo Hordeo co-  
 struuntur, minus à Triticis in eo superantur: qui verò ex laxo & leni, panes facit, ut  
 spondent. Panes autem ex Hordeo emittuntur, crassissimi per alium subducuntur, quod ut  
 quis non minus accidet, à Triticis eis contulens. Satis autem non modò Triticis, ve-  
 rum etiam Olyria, & in aliò magis Typhania, frabiles, et, in de lentonia, vultu habet.  
 Ex quo peritiam est, quod exoptum coepos præbere alimentum, & potissimum, à  
 factu ex parte Hordei fuerit, ex quo Hippocrates ut Præstantissimum fieri voluit neque  
 enim dum coepos, faciem coposum ex seipso emittit.

Laudanissimum autem Hordeum quod candidum, ubi pinatum est, apparet, non modò  
 densitate ac pondere (quare um Hordei durum esse) habet. Pomò quod ceteris plevum  
 & circumscriptis plevum exortem habet teniam, melius eo est, quod gracile est, ac rugosum.

Hordeum primum est, ostium in eniorando & refrigerando, ut Galenus in lib. De feb.  
 simplis habet etiam pappus absteriloma, quòd enim plur-dolores, quam farina fabas,  
 eis non infam coracis.

Hordeum, Drosicoides inquit, absterge, vitam est, in fluxionem part. formachalcofi-  
 ris, ad rema conoquet. Farina Hordeacea in multa aqua cum Ficu decedda, in fluxionem  
 pes & ordemata, dicitur eduntur, cum papp, resina & simo colum barum coracis quibus Ma-  
 lito

Miscetur & Papaveris calyces, deforti sunt, qui Intuscruciatum, & adhaerens in infirmo tantum  
 allucinet, cum Lini femine, Foenogreco & Rara impofita utitur: Strumar cum pice ligenda,  
 canalis & impofita puen vena ad concoctionem perducitur cum Myrto verò aut Lentulo,  
 ut Malucio, aut Symplicibus Pyri, aut Rubeo, aut profluus filitio pedagnos miferantibus  
 cum Coroneis aut sacro prodeit. decocta in sacro aceto, modo quo *apud Aegyptios*, & cithida  
 impofita, ipse rodetur.

Illud autem *apud Aegyptios*, Pelagiano auctore, miffata equalis Foenogreco, femina Lini, & Gri- apud Aegyptios.  
 ae Hordeacea.

Cum verò farinæ Hoedis ex aqua, aut cura pice & oleo decoctus, pari modo cithi  
 canis fabachus, in dem & cura pice, contra articulorum fluxiones prodest.

Habet præterea & Hordeum in triplicem vsum, nempe ex eo Pulvis, Polenta, Maza,  
 Maza & Geruilla conficiuntur, de quibus ut deinceps.

De Prifana. CAP. XXII.

**P**RIFANA vel est *Hordeum* dicitur, & nomen quidem commune omnium frumentorum à  
 quibusdam sunt, *apud Græcos* dicitur, purgationem esse potest, sed proprie tamen & peculiariter  
 non dicitur, quàm Hordeaceam Prifanam significat, que simpliciter ac citra adhibent in  
*dietsæ* accipiuntur. Nam si hoc modo, frumentorum aliorum quorundam semina mundantur,  
 de quibus tamen rarissimum Prifana nomen tenent, frumenta appellatio communiore. Ita  
 Hippocrati lib. *apud Aegyptios* & Dioscor. *apud Aegyptios* cap. *Hordeum* vocatur, & ex Oris Prifana  
 Prifana dicitur ad Hordeacea nempe Prifana differentiam, proprie & simpliciter Prifana  
 nomen tenet.

Illud in Prifana hæc aliud nihil, quàm Hordei granum à membranis & cerebibus suis  
 nudatum & excoriatum, visum ad est, macerare mundandumque expurgare hoc oportet,  
 cum sole siccare, deinde rursus *Hordeum* rursusque ad solem siccare. Quod autem tenet ex eo  
 insensum est, *apud Aegyptios* impurgatum, hoc eam optam conferat, ut Didymus in Geoponicis.

Hordeacea autem & refrigerat Prifana, et aliudque est ( Hippocrati ut *apud Aegyptios*  
*Hordeum*) in acris moribus, reliquit omnibus frumentaceis præferendam. Nam viscositas  
 in his, contra motum, dicitur, & modocruet huiusmodi: siam manum inferi, & si quod  
 illa eget, probe saltem non attingit: non male turbat: nec in ventre immittit, cum sit  
 in *Galena* dicitur ( Galena addit) fuerit paratæ hoc est, quando in coctione, quàm plurimum in-  
 tumuit, postea igne lento, per multum æquum in chylum fuerit redacta, ac tunc tunc ad-  
 hibetur, cum plene intumuerit: ubi verò cocta exale fuerit, sub edenda tempus, solem re-  
 trocedere oportet. Cibus autem si immo statim adhiberi, coctione nihil nocetur, aliud  
 nocentem in fandum, nisi velis Anethum Poeniquappam, & ipse isto statim admittit  
 in hoc Galena.

Nostris ætate nec non aut nunquam, horum aliquid additur, sed sic harum fieri, & aqua è  
 Balneo stillantis ex ædem dicitur, & subinde Amygdala aliquot amara, ut palato granis  
 situriferissimum Moleam vel Cucumeri nonnulli, periculis quando suspensus respice-  
 ridentur, ut siturisei conciliandus est. Adhibetur etiam & nonnunquam Amygdalæ dul-  
 cum *apud Aegyptios*, hoc succus, ( Officinarum lac Amygdalinum vocant) periculis cum alium heu-  
 dicum colligere vitale est.

Fit item ex Prifana potus, quem Officinarum Prifanam nominant, cum tamet nec Prifana, nec  
 Prifana *apud Aegyptios* hoc cremore sit, sed eius remanens remanens decoctum, *apud Aegyptios* substantiæ parum aut  
 nihil remanens, quod fieri non ex sola Prifana, sed ex Hordeo mundato, sed & ex Glycyrrhiza,  
 & Vulpis additis, decoquitur. Quæ ratione partes potio vitale est in quâ inflammatione  
 pilorum, partiumque in quibus dicitur intumuit, vel remanens vitaleque excoctione aut  
 inflammatione laborat.

Fit etiam in quibus Dioscori dicitur Prifana ob cremorem in decoctione reddendum præbet,  
 quia Polenta ex Hordeo facta. Coram acrimonia & stypticæ asperitatis, excoctione remanens  
 potio.

De Polenta. CAP. XXIII.

**P**OLENTA Hordei fructus farina est, quam Græci proprie dicitur nomen tenent: quamque sub-  
 inde vi *apud Aegyptios* nomen de omni alia perfectum in dicitur farina, sed improprie dicitur.

Præparatur hæc, Prifana ut sit, modo Græci persusum aqua Hordeum dicitur nocte una, ac  
 postea die frigitur, deinde mola frangitur, Sicut qui vchementer rostrum, rursus ex aqua  
 spargitur, siccat, præterquam molam alii verò videribus specie decussum Hordeum, re-  
 rem purgant, modicumque in pila tundunt, neque in cerebibus elidunt, ac siccatam sole, rursus  
 tundunt, & purgatur molam.





Quatuor habet speciem quidem Hordei maculiferam, frigidam vero multo remissio-  
rem, praeterquam quod igne calore tollitur ac refrigerari est. nam *hordeolaceus*, quod illi ab al-  
iis dicitur, quae tollitur inhaeret, siccitatem eius auget, ac frigidam non solum remit-  
it, sed & qualitatem quandam calidam ei imprimit. Quod vero affinis calidioris natura  
est, minus quidem caliditas & ipsam Hordei calidam vel sola germinatione tollitur,  
quae utique sibi quatuor purgatione, ob aliam humiditatem, non succedit. Purgatio-  
nem autem caliditatem multo accedere, satis notum.

Galenus lib. De aliment. facit. Hordeum aut, quoque modo quae eo videntur, sive Primum  
causit, sive Polentam facere, non quendam refrigerantem remanere, verum id de Malto  
non videtur intelligendum, quod vel germinatione sola, deinde & tollunt, si accesserit, ma-  
gistrum sua recessit, quod Polenta, quae vel ex cru de conduntur, quae maruro Hordeo, vel  
quoque macerato turrim, et diuina conditur.

Abstergit praeterea & Malum Hordeo potentia, minus lenioris habet, cum, quae sive  
mentis, quoniam vero plus habeat, quam crudam Hordeum, non ab inbrento illi non sub-  
tilitate, partem à leui corruptione, partem ab empyreumatica, quae abstergentem conuen-  
iens habet. Venere normibus aliis similibus ex frigida causa doloribus, Malum tubus  
et, solum feruntur in faculo apponitur.

Capitulum ex Syriis sancta tumorebus hydropticorum vulnere, Astio teste, imponitur.

De Bere sive Ceruilla. CAP. XXIII.

**B**ERA ex Malto, & Lupuli (salsari) floribus modo, proportionemque certis, aequa dula per-  
tinet, coquitur, & simplicissima quidem ac purpurissima res est. Primitia, quae Tineam,  
Zeam, aliove fruges, vni cum malto Hordeaceo admittit. Quae vero praeter fruges,  
herbas, semina, flores, aromata, aut alia huiusmodi caput impicunt, ac obnoxiam in duodecim  
modis frugum natura alena, purissima habent, compositae quaedam Bere, sive Ceruilla sive  
medicatae, ab Hordeaceo Trineive Bere & sapore & qualitate differunt.

Nomina autem huiusmodi ex frugibus potum cum Gettariis tunc, tunc Britanni reli-  
quos, Septentrioni saluberrimas gentes, communi quidem ac parva voce, Bere sive Ber  
Luna autem passim Coraisiam. Venere vero ex Hordeo potum variis nominibus appella-  
tur & alio quidem agitur, id est, Vinum hordeaceum, emam ex Hordeo compositum  
Gent. Bandem Aristoteles, Archemae teste, vnde dicit: *aly spere*: velum Sepdoles in Tri-  
polim, & Hecatenus in Europae periodo, vbi Parnas, *spere* antebat, ex Hordeo, *aly spere*  
vnde Mitho & Conym. Hellanicus tamen non solum ex Hordeo, sed & ex radicibus sari  
*aly spere* vnde bebant, inquit, ex radicibus *spere*, velum Thracos ex Hordeo.

Aegypti Hordeaceam potionem, *tyde* sive *tyde*, Theophrastus, appellat. Idem testis  
Pantus lib. XIII. Ex frugibus, inquit, potum, Zythum in Aegypto, Celis & Cera in Hi-  
spania, Ceruilla & plura genera in Gallia, aliisque provinciis. Quos lib. XIII. nominibus quid-  
am alio, sed ratione eadem casu fieri tradit.

Diodorus Siculus, Zythum non in Aegypto solum, sed & in Galatia quoque fieri affirmat.  
Tamest (inquit de Galatia scribens) alio in galatia, ut neque vitam ea neque oleum,  
prodeat, quae causa horumque potum sibi ex Hordeo componunt, quae appellatur Zythum.

Dioscorides vinum Hordeaceum potum genus Zythum, aliorum Ceruilla nominat.

Simon Zethy ex potione etatis Graecis, huiusmodi potionem Arabico nomine *pal-  
ge* vocat, *aly pasidie* sive *pasidie*: Arabibus tamen, Photicis non ex Hordeo tantum potum  
est, sed etiam, velum Rhafis scriptum reliquit, ex pane Herculi, hoc est, Simulagneo, Men-  
dicat ex Apeo compositur ac, ut Hah Abbas testatur, quaedam etiam Photicis ex pigmentis,  
aut ex malorum ponicorum sacco conficitur.

Hac autem omnia sive similia sive genera, diversis appellari nominibus, sive proprietate  
aliqua discrepantia, cum Bere sive Ceruilla nostra in eo convenire possint, quod ex Hordeo,  
ac frugibus componantur, preparationis tamen modo, vel alia qualitate alia ab ea fortal-  
solum. Nam si Zythum, ut Galenus, lib. De facultat. simplic. medicament. ex pa-  
trinae presentia, aut ex frugibus sive aqua madefacta, donec resoluatur in liquorem Vini  
similem, velum Hermocles Barbarus in Cossellaris scribit: ac sic male fieri sentes &  
verum tractat, quae à Dioscoride ac Galeno quoque et scribitur, cum Bere sive Ceruilla  
nostra, quoque convenire possit. Nam Bere ex fruge non fit potestatem, multo minus  
ex eam liquorem soluta, sed ex Hordeaceo Malto, et diuina, coquitur, ab omni parte  
dicitur. Est & Bere per se sive dula, a cetero omnino sicut. Quae tamen Beram à Zy-  
tho, cum conficiendi modo, tum facultate differre ostendunt. Sin autem Zythum non eo,  
quo Galenus, aut Hermocles tradunt, conficiatur modo, sed ex Hordeo ac Trineo sive Bere

res quatinus puer factis, ac à natura sua commutans, ut Theophrastus sic ribet, Zythum & Be-  
ra similitudo sine. Nam Hordeum in Maltum mutans, seu ut quidam in odo comparant  
& à natura sua recedit, Verùm tunc Galenus, Dioscorides, & qui deinceps eorū sermone  
ac doctrinam insequuntur, minus rectè Zythi facultates cognovisse videtur. Propter  
hoc in hunc usum parvè daturum sine mutatione in, Hordeum, aut ex eo potum, malide  
ex hunc finem non potest non in omni quàm Polentia, quæ ex non recepto Hordeo, sed crum-  
tatum & sicco in aqua macerato conficuntur. Sequens & tunc levis quoddammodo Hordeum  
comparatur, humidioris aëtheris subiectus, veluti dicit Maltum sanguinem est Polentæ ta-  
men hanc ob causam, nec Galenus ipse, nec qui veterum quilibet, in hunc finem esse,  
sed contra omnem boni odoris, suavitatisque esse, sicut & Maltum vitæ conficitur.

Zythum autè sine Zytho, ex Hordeo & Trinco conficitur, levisque parvè facta, Theophrastus  
lib. De causis sexti, ubi de Saporibus agit, his verbis tradidit. Nón sicut vitæ, ac, notari-  
mentum & levis purificans, in hucos cognatus, ad bibendum idoneus, velin quæ-  
nam ex Hordeo ac Trinco conficitur, quod in Agypto Zytho appellatur.

Ceterum vrad temperem hinc venimus, pendet et ex quatuordecim eorum, ex quibus  
componitur. At materies eius, ut dicimus, sunt, aqua, Maltum Hordeicum, subinde Tri-  
num tot Zeta, & Lupuli subindem flores. Aqua quidem simplex et in fudo ad Bere decoctio-  
nem famose, singula est & hamada: Maltum cum ex aqua caliditate reficitur & absterge-  
ritur ac Zeta temperatè calida facta, sunt: Lupuli flores secundo ordine calcificati, calcifi-  
canti, caput tenent, vitas in moent, abstergeudi quoque, ac aperendi potentia prebit. Fa-  
ciant hi ad Bere cum Saporibus, et distillantur, fruges verò aliam in materiam habentem.

Ex horum autem vitis & inaequali maturs, diversis Berarum genera, di ferditas quatuor-  
decim prædita, sunt. Tenues quidam, potentes aliter, subicunde sine nigre hæ, candidæ, &  
maræ plerumque, dulciores nonnullæ. Quæ frugum plurimum admiscitur, potenter calidæ  
que minus non oter minus tenuissimæ. Ex Hordeo Males, dum in fudo, subinde  
& parvè facta, si durum, et decoctio accellerit præcipua autem potes ex Zeta ac Trinco  
facta candida sunt, sine feracitate tenac & aquosam vitis substantiam, quæ tunc quodam-  
modo referuntur amariore capere, etis tenentes, lupuli flores copiosius incocti efficiunt, del-  
icescentem parvissimam, fruges enim ex se dulcedinem conferunt.

Inter has tenuissimæ, singula quidem est & hamada, superant in ea aque quatuordecim sub-  
stantia, non tamen aliam caliditatem capere.

Potentiores calores plus habent, cuius cuius vitæ, potenter, in vasis coddit non feracitate  
sed feracitate ac efferaclit, minus tamè quàm mediocre vitis calidæ, à quo non sed temperatè  
caliditate, sed & tenuitate subtilitate superant. Caliditate liquidæ Bere clarescunt quæ  
Alimentum autem præbitur ille quidem ex aqua, aut nullum, hinc verbis copiosius  
substantiam potenter: omnes prohi succi, si ex bonis frugibus & bene decoctis fuerint. Cal-  
diores circa peccordia aliaque videri possunt, candidi & decondant: candidi, tenentes & cum  
digerunt: amari, abstergeunt autem levis non mediæ, medio se modo habent.

Compositæ Bere, quæ videlicet peper fruges ac Lupulum, & alios qui sunt herbas, vel flo-  
res, semina, fructus, aut mæsa, similia se recipiant, pro qualitate eorum quæ admiscetur, vi-  
tas qualitates ac facultates obtinent, subinde etiam nocent.

Recentes Bere quæ nondum sibi dedit, non secus ac mustum, vitis completis gignit insti-  
tutum parvè factum conturbat, calculum procreat, ac vitæ spiritum vero sibi deditum excusat  
ita tamen admodum, nervosarum partium dolores sopit, si dulci calensque sit: foveat ut præbit  
ad hoc recentissima, & cum nondum Lupulum admixtum, ac inter omnia potenter.

Acida nervos & renis tenent, ventriculum conturbat, ac vitis iam in corpore facti gignit.

Acetum quod ex Bere conficitur, Vitis aceto minus acro, minusque potenter, nec potenter  
admodum.

## De Maltis.

## CAP. XXIII.

**M**ILIVM multiplex fronsit culmo, geniculato, folia habet ampla, harundinacea  
mo caule, non spicam sed effusam promat, ubi m, sine cæcis, decemam reflexam, sine  
plurimum colore, subinde nigrescentem, in quibus non gignitur partium, daturam, sibi dedit  
partem tenuissimam tunc consuetudini, à quibus facillime excedit tunc ac non tam multa, ut  
Levis sibi dedit hunc, densitate, nec in subuloso sibi dedit, sed & in amaro quoque possit,  
modè vel hamado calido, vel nigro solis: nam siccum cretositate reformidat, Cuiuslibet  
aut. Mito Florus Campaniam præcipue gaudere tradit. Antequam commodi sibi non potest  
reponibus maxime tenent.

Miltum, Theophrastus ait, sic citius: sus durissimum esse, plus enim cum amari sibi dedit  
quod vitæ & sibi dedit, ut aëther quoque est Vitis, con datur.

Milium.



Lactyrus lob.



Græci *σπυρον*, nonnulli *σπυρον* dicunt, Hippocrati *Παπακ*, vt Hermolani *σπυρον* *Μυρ*, *Μιλ*, Italia *Μιγλί*: Germanoſq; Gallo maſter: noſtra lingua & uulga.

Miligrana ex palea, vt Hippocrates ait, ſiccant & venereis ſubici, & cum ſicibus, ſorbibus dolocibus confectant. Ipſum autem Milium coctum ſit, non tamen alio ſecedit.

Primo coctine, Galenus ait, reſingerat, exſiccatur verò tertio, ſi uerò ſiccando inuenſo, paulatim etiam habet reuocant.

Pana quæ ex Mille fit, exigua eſt ſtimulo, ſigedat, pruritus, & ſtrebitus, nihil enim in ſe habet neque lenoris, neque pinguedinis: ſiue ergo aliquid humerale delictat, velum & Paricem, quo tamen ad omnia eſt præſtantius, ſuaſiſſimè edicit, ſicibus concoquitur, venereis enim diſſit, magis natæ: ſolis impoſitum in ſicculis, idoneum eſt ſomnariis, quæ circa inſolam exſiccari poſſunt.

Tortura, autem e Diſcoide, ſerenaſq; in ſacco premat, vt torturibus reliquisq; delictibus, ſi foueantur, uulgo ſit: nequaſid, uelè Plinio, uulgo, quoniſm leuiſſimè molliſſimèq; eſt, & caloris capociſſimum. Inq; tale rſus aut eſt ad omnia quibus calor profuſus eſt.

Fanna eius cum pace liquida, ſerpentum & multipede plagi imponitur.

De Lactyrus lob. CAP. XXIII.

**M**ILII generi aſcribitur & quom Lactyrum lob accentoque nominant, am dimate quoque notare poſſe: ſola habet longa, lata, & am dimate, calmos caſſos, geniculaſque, ex quorum ſuperioribus geniculis duo, tres, aut plura exant pediculi, & in ſingulis ſerina ſingula, dura, quali rotunda, Oculis matore, & quibus dependent quedam uelut ſpicæ naves & motæ: radices in fibras multas diuidantur.

In boetta Italia, Gallæ, ac ſubinde etiam Belgæ ſeritur, peregrinum ſiquidem eſt, & abunde illatum.

Nonnulli Lithoſpermi ſpecie faciūt, propter ſimilitudinem, uocantem generi à Diſcoideſis Lithoſpermo diſſit. Itali *Lactyrus lob* appellant: poſſet fortalle aduocari Aundo Lithoſpermos natos pan, vt Gelenus ait.

ſtam habet autem, niſi quòd multicolore, ſemenbus ſta lyeo ſue ſilo tranſiſſo pro ſpiculis procatom ſeſeſe utitur, cœnolus inde faciunt.

De Panic. CAP. XXV.

**P**ANICVM Milij ſimilitudineculum pro dū complo nites, uocatur ſicſta, multa articula geniculari, ac ſenſim excreſcente ſola curtiditate ſua, multo quàm Tritici latiora: ſpicæ ſue paniculam ſeu oblongè, cruiſam, pendente, ex multis concretarum & obſcuram genit rotunda, dura, ſpiculibus, ſulculis quibusdam



**P**ARTIS superioris Panicum & aliud quoddam peregrinum ostenditur, quod Indicum cognoscitur. Culmibus prout crassis, vix aut ex pedes alios, crebra genacula angustas. Solaverit è singulis peniculis dura, magna, longa, atque, tumens aliud macer spica sine ventis panicula crasse sunt, & denisè compacte, aliquantulum barbata, brevesseu longiorè quàm vulgaria Panicum, sed crassiores, exsunt hic & è si in fino culmorum, & è foliorum crebris, brevisorbibus tenuioribus veluti culmis incidentes semen oblongum capsulaeque simpliciore, que spiculis hinc hinc effluunt. radices valde sunt ac fibrosæ, ampliores quàm penes Panicum.

Sed frum spicans, etiam si calida semensque facit, maturitatem semen in Belgio vix consequatur in ceteris omnibus regionibus melius proficit.

Panicum speciem esse, spica denisè compacta panicula ostendit.

*De Melica sive Sorgho.*

*Melica sive Sorghum.*



**CAP. XXVII.**

**M**ELICA tribus, quosor, aut pluribus Massiger culmis arundinaceis, pueris, sepium, octo, subinde decem, pedum altitudine vel amphote, prosem articulis ut plurimum gemmelans, modicis candida factis: foliis è singulis genaculis cubito longioribus, etiam quadrice digitorum latitudine: tubis dorsali aut longiore, italy crassiore, crebri, non dependente grano multò quàm in lq. maiore, ac lentis sicut magnitudine, aliis in usis, alibi plenius nigrescent: radicibus autur fibrosæ, matris ac valde. Tota planta arundinem refert: culmi & spica, semine maturifecente rubescunt.

Solum amara pingue & humidum, ex actibus seminebus est: acutissimo maturocit: gignitur in Italia, Hispania, ac aliis eisdem rebus regionibus.

Ab Indis tribus *Melica*, & *Melica*: Latine *Melica*: in *Hennu* *Sorgho*, alio *Indice* locis *Sorgho*: Germanis *Sorghum*: hoc est *Belgia* *Sorghum*. Lusitanis *Melica* *Sorghum* appellatur: nostralli Panicum peregrinum, aut Indicum cognominant, si potest videlicet ex Panicum genere esse existimantes, quorum certe opinio probabiliter est, quàm eorum, qui illud inter *Fern* genera referunt. Cum *Fern* siquidem similitudinem nullam, cum *Panicum* verò aliquam habere potest.

Conuenit & cum eo *Melica* videtur, quod *Nerone* principis ex *India* in *Italiam* inue-

nit, agrum colore, amplum grano, arundinaceum culmo, adolefor ad pedes altitudine sepium, prograndibus culmis, lobat vocant, omnium frugum feracissimum, ut *Panicum* modis.

*Melica* eorum hinc, & aliis aliis quodam *Melica* candida, reperitur, que arundinaceis foliis, pueris & genaculis culmis, effusa tuba *Sorghum* quòque refert, sed semen eius rotundius & candidum est.

*Belonius* hanc *Melica* speciem in *Cilicia* ac *Egypto* scri, & illic à se repertam scribit: sed ipse pariter ea coqui.

Ab Arabibus *Harcoran*, eodè modo, appellatur. Apud *Ariconiam* tamen *Cap. CCCXXXI*. *Ariconiam* non *Melica*, sed *Zea* est, si interpreti fides.

Ceterum *Melica* vniuersis fermen *Panicum* sapore & temperamento simile est. cogitur sibiade in panes, sed in alia, & parum diuina submersantur: frequenter, & vniuersim, gallicani generis ac columbarum signa ferat.

*De oriza, et Theophrasti & aliis.* **CAP. XXVIII.**

**O**RIZA Lotio aspectu similis est, ut *Theophrastus* refert non speciem, sed veluti subam effundit *Melica* aut *Panicum* modo: folia ei, *Panicum* aut, crebriora, ac *Panicum* similia, sed lo-

Oleae.



FRAGMENTUM TURCICUM.



totum hoc purpureo radio, gemmeoque odore, Aristobolus apud Strabonem, Oleam tradit in aqua cuncta lufam hanc, necesse quae hinc facta: cuiusque esse atrox dicit cubitram quatuor, multo plura in spem haberi copiosius, fructum adferre: non circa Mesopotamiam, atque ut Zosimus repurgari sola in Babylonia agro, & in Babilonia, & in Saba, & in fenice Syria.

Hac autem quae nō in insulis regionibus, sed & in aliis plurimis provinciis, veluti in Hispania insulae & Hispania praesent: vult in Belgiam, p. fl. ac potius in modo septentrionalibus. Nascitur palustribus scagulis.

Vere sentiat, & in India quidem, indit Eusebio, cum a frons in hinc in melle.

Græci ἰσχυρὰ, aut ut Theophrastus, ἰσχυρὰ appellant: Latini Cæcum vocem utitur Galli itaq; Germani Stij & Aja, vocantur.

Semine hoc, atque Galienus, omnia in hinc da alio vultus, ipsum eodem modo, quo Chondrum coquebant difficultatibus quia Chondrum coquebant, & minus ibi. Belgæ Germani cum lacte coquunt, edulian parant, quod medicamentum cum aliam adlonge, cum sumit.

De frumento Turcico, seu Italia.

CAPIT. XLIX.

**TURCICO** frumento cultus est ariditate, solibus, singulis mediis scinis, multo articulis generalibus, quorum in hinc pedum proceritate, utriusque parte culis, ac tubide purpureis, superiore paulum emittitur: tota lata, longa, venosa, ardensque specie summo cum le dominantales, ubi hinc modo multiplices, in utroque, proceritate, vult, nullum scinon pygmaum, in hinc unica loca florentes, sicut aut candido, aut luteo, aut purpureo, prout videlicet fructus colorantur. Fructum hinc pergrandes veluti spica, qui ex culis generalibus, atque ab uno culis uti quatuordec, alie mo ex utroque ordine, multo hinc ac membranosis rursus, veluti nigra quadam, obvolunt, è qua longi utriusque capili prominent, singulis hinc gaudet hinc. Semina magna sunt, Erunt itaque quatuordec, quae mediastimo hinc angulosa, superiora vero utriusque colore albe candida, alio lutea, purpurea, aut rubra, sapore dulci ac fassu aquo ordine ac veris octo aut decem depala tubilline committit, nō utitur. Radices autem hoc frumentum multo, fibrosi ac firma.

Sentit in hinc, atque Mastio aut Apeli fructus utriusque maturare hinc.

Haudquaquam ex Asia quae Turcorum imperium parit, (ut à plerisque de vulgo credentibus) aut ex Oriente, sed ab Occidente è ex Armenia, vicinisque insulae, in Hispaniam praesent, deinde in alias Europae provincias hinc.

Sem. est. vlt. & leuiss. & ex eo panis conficitur, ac subinde processus uultu adolebit.

Germani *Wastfifflorn*; Belgæ *Wast* apud vulgò *Frumentum Turanicum* Gallis *blé de Tur-*  
*que* appellatur America ac vicinioribus insularum habitatoribus *Mazum* & *Mazum* nomi-  
 nant. Valerius Cordus *Triticum* nuncupat *Bactrianum*, sed ratione aut occasione non opor-  
 tet. Nec enim cum *Tritico* nostro similitudinem habet inique cum eo quoque *Frumentum*,  
 quod in Asia quodam loco vltra *Bactra* nasci prodicit. Nam hoc *Theophrastus* quidè adeò  
 grande sem. narrat ac fert, ut grana singula magnitudine nucleis *Oliuæ* æquarent. Quòd  
 & *Plinius* lib. x. viii. cap. vii. scribit. Tradunt, inquit, in *Bactra* grana tanta magnitudinis fieri,  
 ut singula specus nostras æquant. In quibus veritas, pro diffinitione, specus, fortassis rectius legere-  
 retur, *Alnus*, ut apud *Theophrastum*, & ex quo hæc transcripta.

*Bactria*  
*non Tri-*  
*ticum.*

*Post hanc*  
*scripturam.*

*Triticum.*

Inter enim apud *Scribonem*, lib. x. v. *Bostrum* mentio, quòd *lira* tollere teste, in *Bactriano*  
 quoque ac *Babylonio* agro, in idem quibus *Oriza* locus nascitur. Est hoc frumētū genus, quod  
 à veteratione esse, *Oncocentrus* tradit, *Tritico* non ut in terra rones possunt, excelsum specus  
 potius teneret. In seruando etiam adiguntur melleores, non alportatos se inde, prout  
 quædam opinor, ut fermen in altis terris exponant possit. Hinc *Polivoro* *Frumentum* aliud  
 non perim simile, cum semen eius *Tritico* dissimile & maius sit.

Quæ ob causam, cum duo hæc apud veteres solim reperiantur, quæ *Bactriani* *Tritici*  
 nomine appellari posse videntur, atque his specie *Frumentum Turanicum* dissimile sit, nò *Tri-*  
*ticum Bactrianum*, sed nouo *Tritico Turcico*, aut *Mazum* nomine potius nuncupandum, do-  
 nec veteris eius nomen *Oedipus* aliquis de reon strant, qui à veteribus *alioqui* descriptum, aut  
 equare fasce, per se dicitur quærit.

Ceterum in nutriendo *Frumentum* aliud *Turanicum*, *Triticis* omnibus, ipsosq; non si-  
 milib. sed, & *Flordeo* longè est inferius. Panis ex eo apparatus medicociter quidem con-  
 ditus est, atque ferfaribus concutatus, sed durus ac siccus, veluti *luscofus*, nisi solè leuissis  
 laeas. Concoctis eas ob causas distictis, corporisq; nullum aut vitium originè alimenentum  
 potest tardè descendens, ac alium constringens, veluti ex *Milho*, aut *Panico* factus.

*De Phalaride.*

CAP. XXX.

*Phalaris.*



**P**HALARIS culmos tres, aut quatuor pro-  
 mit, cubitales, geniculatos, Zeæ ut *Tritici*  
 culmus minores, tota uero similita, sed minora  
 quoque specus breues et tuberosas, & rigus squa-  
 mis candidissimis conspectus, è quibus flores  
 candiduli, à breuibus staminibus dependere  
 semen deinde inter eas gignitur, splendendum  
 candidumque, ut *Milium*, inanis, oblongum  
 Lam. semum forma ac magnitudine, aut, ut *Plin-*  
*ius* ait, *Sesamæ* simile.

Purpuram hoc semen *Belgio* est, infertur  
 autem ex *Hispania* ac *Portugalia* insulis.

Semum *Yere* (sub facem *Alitior* hoc in-  
 teresse).

Græcis postea ac *Latinis* quædam dicitur:  
*Galeno* quædam nostro *Canariæ* hoc est, *Ca-*  
*nariæ* semen appellare, à *Portugalia* noma-  
 rum insulis, quædam vna *Prolemano* *Canaria*  
 nominatur.

Succus & semen ad vesicæ cruciatus vtiliter  
 bibi, *Galenus* ait, creduntur. *Pharmacopon*  
 plerique, de *Milho*, eo in fermentis non  
 infeliciter subinde vinctur. In sicco siquidem  
 fermentis, *Milho* vsum habet, ac vna sacca-  
 dantem est.

*De Avena.* CAP. XXXI.

**C**YMO geniculato, folioq; *Triticum* ac  
*Zeæ* *Avena* imitant. in occurrere vel  
 lun abam emittit, ex qua paruaq; veluti bepe-  
 ditaculis dependens, in quibus semen oblongū, suspensum parte, ex qua capillis hirsutis,  
 ac glanis

betaculis dependens, in quibus semen oblongū, suspensum parte, ex qua capillis hirsutis, ac glanis



Avena.



Avenae.



ac glutinis insolentem, coadurat. Radicibus nititur copiosis, à quibus plurimum dependit culmi.

Loca amat rigua. Vere fita, sub finem Aethiæ marcescit.

A Græcis *Αβιν* ac *βελγυ* dicitur: Germanis *Habern*: Brabantis *Buam*: Galis *Avin*.

Est verò *βελγυ* cognomento *αβιν*, ex frigore vitus, de qua utri.

*Avenae*  
4.

Iam *βελγυ* Avena quaedam est, cuius ferream nodum nullis glutinis implicans, aliis vulgi Avene per omnia similes nodum Avenam quis nuncuparet.

Avena autem, ut Galenus ait, iusteriorum est alimentum, non hominam nisi vix aliquando extrema fame, ad panem ex ea conficiendos compellatur. Pars quæ ex ea scribitur, non tamen aliis aut sibi aut porcis, sed, quod ad illud saltem pertinet, modum locum obtinet.

Ut in medicamentis verò similem Hordei vim habet. nam uti plurimum modo inposita defocet, & medio inter ac sine morbo digerit: temperem autem habet paulo superiorem, non ita enim abstinentia obtinet, ut ad ventris profusa iacet.

Pulvis huius, Dioscoride auctor, alius silium, & prodest eius in febribus tunc tunc facies.

Avena farinam, in aceto coctam, tollere nervos, Plinius praeterca docet.

#### De Fegopyra.

#### CAP. XXXII.

IN frumentaceorum numero Fegopyrum quoque esse videtur, sed de eius origine incertissimè, pars ex eo, ut cum eo conseruat: habet id culmos rosarum, bractea, fructus rotundos, in plures alas distincte folia Hederae molliora, innotescit, Scymide praeter: hinc partes, candidos, succulentos: semina sordida colore nigrescentia, triangularia, Sordida nigra (malocostium veteres nominant) similia, sed paulo maiora: radicibus non parum ac fibrosis.

Nascitur qualicumque solo, neque vilius quantumvis aridum, inactumque, inson: puleo imbutus: erit perennis, celeriter marcescit.

Semur Martio aut Aprili, ac non raro Augustino, pabuli causa. Hincque Germanis

Fegopyron.



Tocis & Bubonice Campana vulgaris, Italiæ etiam non incognita.

Tudimaria tunc *Agrimone*; Foronibensis *Saraca*, ut etiam *Marubium*, nominant: Germani *supremes Fegpyron* / inferioris *Wachspfeil* quæ lecti aut *Feg Trincom* fœmari. Græci *Fayimago* aut *Phylago*, Latini *Fagopyricum* dixerunt à feminæ figura, quod *Fagum* glandem, forma tripartita & coloris fœdi dicitur, quodammodo refert, hæc et quantitate multò minus.

Apud veteres nullum nomen habet: nam Occidentem quidem non est, fructus illud *Dioscoridis*, fructus alterum *Varronis* & *Columelle*. Occidentem siquidem *Dioscoridis*, aut ut plerumque, Occidentem, herba est odorata, quam nos in Asia *Basilicum* nominat.

At *Varronis* ac aliorum rei rusticæ Latinarum scriptoribus *Ocyram*, non alienius herbae genus, sed pabuli nomen est, ex legibus videlicet, ac legaminibus, veluti *Varro lib. 1. cap. XXXI. de Ocyra* scribens, testatur. Id genus pabuli sunt, arguit, leges vides scilicet antequam illas ferant. Item de *Plinius lib. XVIII. cap. XVI. Apud antiquos, ut erat pabuli genus, quod Cato Ocyram vocat, quo crebant (exemplis plerisque minus bene, scribant, habent) aliam habuit, ad cuius pabula, leges vides distigunt, ut qui gelant. Sicut Manilius ad aliter interpretatur, & tradit Fæbe medicina docet, Vicia dicitur,*

Ocyra.

Plinius lib. XVIII.

etiam de *Erudic* in regno *Autumno* in fœm & feri solitos, melius & *Anera* Græca, cui non rade fœm admodum hæc vocatur in *Ocyram*, bonumque causa feri solitum, *Varronis* apud plerumque locentate prout meridi sit.

In quibus fœm eundem fœm est, *Fegopyron* propeit *Ocyram* non efficit, sed frugem nominat, veteribus vel non cognitam, vel non vilitatem, vel neglectam.

Ceterum *Fegopyron* *Tinco* quidem, *Secali* ac *Hordeo* mixta sunt, plus tamen quam *Milium* aut *Panicum*.

Pulmentatis ac placentis que ex eas farina conficiantur, facile concoquantur, citò descendunt, aliter tamen componi ad ferunt, ex quibus quidem, non tamen malum aut vitiosum.

Pisus que ex eo aliquando cogente armonia parantur, coquantur, aut farinam eius admixtam habet, permissus est, citius descendit, ac flatulentia plus obtinet, quam ex *Secali* coctum.

Herbæ viderentur pabuli nam fœm matura, dicitur maturaque pabuntur. Sicut gallicanae pabuli pabulum citissime pinguetia.

LIBRI PRIMI PEMPTADIS QUARTA

FINIS.

STIR.

# STIRPIVM HISTORIÆ PEMPTADIS QVARTÆ

LIBER SECVNDVS,  
DE LEGVMINIBVS.  
PRÆFATIO.



**R**VMENTES succedunt Legumina, frugum alteram generi. Veteri scriptura  
Frugum nomen Praeserta & Legumina complexi. Legumina Graeco vargas dicitur  
sunt, quae quae manu leguntur, non autem ut frumenta selescitur, Legumina  
Latino nomen putantur. Galenus in lib. De alimentorum facult. artum quodam  
generi addit, coram videlicet, quorum semina in cibarium numerum salu-  
de admittuntur. horum autem multa inter Legumina reperitur, pascua alibi descripta.

De Bona fuit Fabula, ac primam de maiore.

CAPIT PRIMUM.

Bona fuit Fabula maior.



habent, veluti & Oleris, Pisi, Cicercis, & plura alia legumina. Radices hanc longiores, ac  
mitem fibris firmantur.

Serrur Bona hanc in agris ac horti.

Floret April ac Maio mensibus, & particularim quidem ac die: fructus hanc ac lato  
ad maturitatem peruenit.

Germani Bonaem Galli Fabam Itali Fassam, quod Fabam, vulgarem appellatam esse  
ri, nominant: Hanc contra veterum Graecorum in *βίβαν*, ac Latinoorum fabam esse, conse-  
lum Officium, sed omnino passim crederent, quae in re quatenus à veniente ab sint, non si  
quidè ediderunt, quae de Faba forma & magnitudine, apud veteres ipsam reperimus, et  
partim admodum aut omnino oblitum Bona, perfectum in eius fructu, conueniant. Nam faba  
quidè fructus rotundus est, & parvus, illius verò longus, latus, & Faba compositione nigra.

Faba-

Remanens autem esse Fabam, multorum opinionum & fructuum & aliorum ad eam collatione ostendunt. Theophrastus, Tribulantia ferrea, magnitudine Fabae esse scribit: si-  
gillat & Latini remanens fructum, quem Dioscorides Fagium vocaverunt sicut. Tullium  
fructum, & amicus Vetus Idrius (passibus Comitanicas nominant) quos Hederae amicae similes  
amici perhibet: Tullius denique fructum, Fabae maiorem affert. Dioscor. Xpido reman-  
ens ferrea Fabae simile affert. Plinius Trichymali Paroli fructum, magnitudine Fabae esse  
at Galenus lib. de simplic. medicament. de ul. Omnia qui sub hydiis nascuntur, amica  
sunt, hoc est, Fabae appellari refert: quod ubi sese in globis in concubuerint, et cunctis Fa-  
bulis ferribilibus Labro vero De aliment. facul. cap. de Aphae & Vicia, Horum ferream  
sunt, hanc non est rotunda, veluti Fabam. Cornelius Celsus, atrochaeones thymos,  
quod hanc, remanens & exiguus tuberosa Fabae simile facit.

Quae omnia similia dicit & comparationes, non solum Fabae rotunditatem, sed & par-  
tium esse, ostendunt commentum. Omnia enim istis comparationes non solum rotunda,  
sed & exigua quoque sunt.

Plinius potest eorum generi illa, & hoc similiter confirmat, quod Dioscorides Aegy-  
ptiam Fabam, vulgarem Graecorum magnitudine superare videt: quae tamen & ipsa parva  
est, hancque longae minor. Ponderum Aegypti Fabae, auctor Galenus, semisobolium tan-  
tum: hanc vero semidrachmam (vix scriptum) ad est, obolos integros tres, sepe cum pier.  
Iam ostendunt, quae apud veteres non nulli locis reperuntur & alia, veluti quod Galenus  
& aliorum acrostichorum, hanc comedi caput hanc murem: & calcatur Fabae ut  
ostende quippe in auditorium murem illapsam fuerit. Item quod Lacertae in sepe  
hanc adlocat ostendunt galeo, quod Fabae subleptis: ac in leuromenippo formi-  
am singat Fabae murem apparuerit: & alia similia, passim occurrentia: sicut & quod  
Aspidem hanc De animal. in hanc hanc, pullos in galeo accorum oculos, decimo ab  
aspidem die, Fabae murem esse scribit, qui tamen in eadem, non admodum magni sunt.  
Decimo iam die, aspidem, pullos totum percipitur est, & murem. omnia patet: caput gran-  
ditate compositum est: oculi capite grandiores hanc, quippe qui Fabae murem per ad tem-  
po murem.

In quibus omnibus evidentissimum manifestissimumque, veris Fabae rotunda ac parva  
est, ostendunt istae Banae minores, quae omnibus in quae Fabae comparantur, longe sunt ma-  
iores, & ea de causa, & Fabae differentia. Ut interim potuerant, Fabam sub hanc murem habe-  
re Galenus an, hanc & locum Banae vero murem cornu modo solum, hanc & Fa-  
bam eodem in die, murem hanc, quae murem, Banae autem in Cerebis gratiam, & al-  
terum compositum in murem compositum praestat: & si quae alia sunt eiusmodi argumenta, quae  
Banae & Banae diffinitivum aliquo modo ostendunt.

Banae autem non Fabae, sed omnino alterius nominis legumen. Cum autem apud veteres  
nullum aliud reperatur quod Banae similitudo esse queat, quam Fuscium, Banae eadem cum  
Fuscio colligunt videtur quae Graecorum compluribus scribitur, Dioscorides per hanc,  
Simon Sethy per hanc notatum est.

Habet enim in prima Banae, fructum Dolichae forma similem, ac maiorem, quae murem  
est, cuiusmodi Fuscium est Dolichae murem, diuinitia voce, & similitudo Fuscium, quae murem  
murem.

Ita & Banae procerasque est, qualem Fuscium esse Columella testatur lib. 8.

*Ita proceras ac triplicis murem longa Fuscium.*

Vulgarem autem quae per Italiam fuscium, quae hanc Columella, Palladii, Virgilii no-  
minatum est, fuscium eadem cum & tempore & modum in hac docetur: Banae vero hanc murem  
nihil similitudo.

Hiracodia, quod murem Banae fructus, Spinae fructus, hanc Spinae lobum magnitudinem  
reforma, & non tunc colore, proxima refert: ac Spinae hanc hanc per hanc & per hanc, Dio-  
scorides tradit, ad est, lobos veluti Phasiope.

Phasiope autem, quae hanc Spinae lobos & Dioscorides similes perhibetur, idem sine  
cum Phasiope, & Galenus in lib. De aliment. facul. appellatur. Differentiam enim in per hanc, &  
Sethy horrenti, qui alio die, per hanc, Dioscorides facit: tamen autem similitudo nomenclaturae  
legumen, quae nam de scriptum reperitur, quam ob rationem, quod hanc hanc per hanc per hanc  
murem de hanc, & murem per hanc per hanc diffinitio neque.

Dicitur praeterea Banae est generum, candida videtur & rubicunda: duplex quoque  
murem apud Simonem Sethy: una candida, rubra: altera per hanc, tamen murem,  
quae alio die.

Reperuntur postremo in Banae facul. eae, quae per hanc Dioscorides tribuit: nam re-

gens Beta nondumq; matura, cistata, & in flationem panis, & cum agri difficultatib; obsequatur, et sipe vix cum ceteris munit; alia, non permixta deferenda, aliam quoque cistatam, ac non raro citi, quae Dactylosides Plurifida vocatur. Phasiolus, inquit, vultus, flaris munit, aq; ceteris quantis, vix ceteris cibo aliam cistatam, ad vortum, cum autem idonea.

Quae omnia potius ac similia, tam manifeste inuenerit, ostendunt atque demonstrant, hanc Germaniam dicitur, veterum Graecorum & Latinorum quatuor, ac Dactylosides panis esse, vt dubitandi nullus locus superesse videatur: nihil enim de Phasiolo alibi occurrat, quod non cum Beta coniungatur.

Est autem Beta, sicut Phasiolus, quod ad facultates eius attinet, in clausura non tantum non potest in loco, arida vt caetera legumina, docet, & in cibo assumpta: nam recta qualem in flas, & flares, vix in mox si optimam, gignit. At si siccata & arida, pro beq; deinde cocti, modis aut parum admodum flaviscentia est, corpus alimentum mediocre, & illud mediocre conferti deferenda autem cum potantibus quidem, nec omnino facili nec omnino utile, oblique his tamen aliam constringit, & potius quidem in, qua rubra est.

Favus Barbarum, in amplissima praesentia vixit in his, deficientes Fabarum, quales huc ante admittitur, & non ut quilibet quidem. Sicut enim temperata eius parum à modo recessit, ut ad multa videret. Tala si quidem medicamenta, auctore Galeno, multum manifeste, seu materiae quaedam. Absurgendi autem facultatem Fabae facit, Sicut non habet.

Galenus lib. i. De aliment. facit Phasiolus, air, mediam quodammodo locum obtinet, ter ea quae succum hauriam & primum generant: lator concorda fortis & diffusa, melior celeriter transmittit: flarata & flaris experta: parum & multum innotuit. Nihil enim efficaciam habet quantitate in flar quod dicitur, quae aerea, aut aulera, ut aulera, aut salina, aut amara, aut dulcia habent sapora.

*De Beta sive Phasiolo mure. CAP. II.*

**M**INOR Betae, folia, Barbas, ac silis, in non flaris, et si, singula tunc munit, & folia pluribus munit, ceteris in, in quorum alia, Beta in singulis paribus pediculis, vt plurimum sent, spicatum de gelli prodeunt, quos totidem ferè facerent, oblique, totidem munit, quam alia nunc: fructus quoque minor est, vix non tantum lora neque compressa, sed aerea quodammodo figuris, ac in rotunditate oblonga, caliditate subtilis, ac in flarata, alia niger, qui & vultus hanc superior: parte parum ac nigra habet. Potamen hanc durissimum quoque est, interior autem in modum magis densa ut dura, sed raris & lator. Ponderatum admodum legumina, quod modum Barbarum silis munitur dicitur foliorum, sed & floris, silis quatuor, nam non superat.

Sicut in agri, & frequentatis apud Zelandas, quae in vix in rotunditate parva. Modum quodam genus est, inter munit, ac silis hanc rotundam Betae: munit silis, minor & rotundior, silis hanc verò munit ac longior.

Barbam vix cum Flandria, Hollandia, Zelandia, ac aliis finibus, vulgo Betae munit est, Betae equinam, & Beta munit, id est, parva Betae, appellant, plerique etiam Betae munit, sive Zelandas Betae.

Est verò hanc Beta, & Phasiolus sive Phasiolus quidam, & potissimum de, quem Dactylosides videtur solim non esse, vix ceteri, cum cuius fructus Spinae lobum cistatam, qua hanc fructus, & forma, & magnitudine tam simili est, vt silis hanc eo, quo supra aduertit, ac aduertit pediculis, nihil aliud, quam hanc hanc modi parva Beta, primo aspectu videatur.

Ceterum silis hanc ac temperamento, hanc Beta non admodum diffinitur munit, potamen, cum hominum cibo, quam equorum ligna & ferri ac vultus est. In coctis munit silis hanc hanc quod munit potest.

*De Phasiolo Beta sive Phasiolo CAP. III.*

**S**YLVESTRIS sive in agri Betae, caule quoque est angulati, in non, nulla generata munit, & quidem vix sive in agri se fl, vt ferri, in non ac munit, in horis autem in notis in ferri Germaniae, in agri ac vix ad munit silis hanc, & aduco: folia quoque Betae silis, sed in clausulas desine munit, qui hanc propter affinitatem apprehendit, ac comprehendit. Floe Barbarum forma, colore è panico nigra, ac oblique quoque vultus aliam per munit, tunc nigra, munit vt parte alios mollesque floeos cistatam, in quibus hanc munit, quatuor quoque rotunda, in notis ferri & magna in flar, silis hanc munit munit, munit nigra, parum candidum vultus hanc hanc, quorum se prem, ceteri, aut silis hanc munit ferri hanc pendit. Substantia horum ferri hanc munit, ac munit dicitur silis hanc munit.



multa perit, tum quia densè obliquit, tum etiam quia humorum maxime ad se trahit, hoc rursus dicitur causa, addit quia fructum vixit proximam generi, potest etiam non infirmos post similes, quoniam in suis perficitur.

Fabam autem hanc Græce *αβυβος* *αβυβος* appellant, hoc est, Fabam Græcam ritem & *αβυβος*, unde *αβυβος* Atheniensium fides, A poliorum facta, quibus *αβυβος* ad est, Fabæ & signum coquebantur, à quibus vixit mensis, quo hanc celebrabantur, *αβυβος* hanc occupat est, quia fere cura Octobris consistit.

Nominantur porò *αβυβος*, etiam in fructu, quod fuit ad *αβυβος*, hoc est, puri radii radice, vel *αβυβος* *αβυβος*, quod est, ferendo vixit valerit. Ab his *αβυβος* ablinthodum Pythagoras precepisse plerique vixit protulerit, ac vixit venerit vixit, hoc symbolo, nam dicitur sunt, non autem & Valentiam Fabam.

Fama Fabarum lomentum, inquit Plinius, appellatur. Græce *αβυβος* aut *αβυβος*, Fabæ fides est fides nominantur, & *αβυβος* *αβυβος*, Fabæ fides fides.

Flavilicatus autem cibus: inquit Galenus lib. De aliment. fac. ult.) Fabæ est, etiam si cibus diu simul fuerit, ac quous modo parata. Habere vixit substantiam ad deplum nec potest, sed fungosam ac leuam quæ vixit quandam habet deurgendi. A poro etiam perfructu, plura fides fides cibus deurgendi: ob quam fides facultatem ventrem non ex edente potest. Cum autem Fabarum puls sit flatulenta, multò adhuc magis eorum flatulenta, si quis magis ipsi cibus vixit. Si tamen fructus fuerit, flatum quidem deponit, sed cibus sunt distulentes, modoque potest, & crassi fides stomachi in corpore exhibent. Quod si vixit profusum mature: fides magis exficatur, edantur, idem eis accidet, quod fructibus omnibus, quos ante perficillam maturitatem mandimus, hanc dicitur fides aliam cibus corpori potest: ob quam de cibus fides, non in vixit fides, sed in toto cibus habere merito igitur Fabæ crassius: manus quidem non vixit, sed potest de deurgendi.

In lib. vixit De simplic. medic. facult. Fabæ, ut, in vixitque modo temperamenti potest est in edente & vixit. Caro eius potest in quoque aburgendi facultate consistit, fides potest non vixit adurgendi: idcirco medicorum non vixit Fabam edente decodum, distulencia, cibus, ac vixit ex edente. Excretasibus ex potest & pulmone idcirco est: fides in potest vixit in potest: ea fides vixit vixit fides ex aqua colta, & ea adipsu fides admixta: ad nervorum non cibus, cum vixit fides fides eiusdem oxymelice in potest, ad eos quos ex vixit plethora occupat, cum potest: sed & vixit, & vixit spiritum est vixit. Nam in potest in inflammatione vixit, moderate refrigerat amant, maxime quando vixit ex latente concretis inflammationem potest. Quo hæc quoque ab co-cibus vixit vixit, de potest in potest Fabæ vixit plurimo in potest vixit vixit.

Furunculos, addit potest Dioscorides) fides parotidum cum Potest fides, & melle lomentum eius dicitur cum rose autem thure, & ovi candido oculorum potest, in potest & edente, repant: fides vixit vixit & vixit oculorum medent.

Manducare sine cortice Fabæ, ad distulencia fides non in potest deoto in vixit, vixit in inflammationem fides: potest in potest in potest, vixit de vixit vixit: alphas quoque aburgendi.

Ac cortices Fabarum, vixit in potest, graciles & vixit non vixit: cibus consistit: cum potest, in potest alumina, & vixit oleo in potest, fides dicitur: decodum dicitur laus vixit.

Fabæ deopto cortice in distulencia potest in potest, in potest vixit, fides vixit vixit ab latente vixit, in potest vixit, si distulencia vixit.

#### De Aegyptia Fabæ, ex Theophrasto & aliis.

##### CAPIT. V.

**AEGYPTIA** Fabæ, sola habet ampla, potest si multo dicit, super aquas em vixit, cibus ignotissimum, quare non vixit. (Dioscorides colubalem tradit) digni crassius, cibus molli, & non generalis similes, qui non in vixit habet, vixit vixit, Libi modo: fides duplo magis, quàm papavini, cibus vixit, qui vixit de fides, capis potest fides articulus vixit similes, in cibus vixit vixit, fides Fabæ cibus, quibus & bulbarum, et Dioscorides, in potest modo in potest, multo dicit, in potest, vixit, quæ vixit vixit, & vixit Græcorum Fabæ in potest vixit. In hu amarum quoddam cibus, quo sit, inquit Theophrastus, vixit. Radix crassius, vixit vixit, in potest, cibus similes ac cibus habet.

Fabular Fabularum in Aegypto, vel ita sponte plurima, in palmis dicitur ac flagris. Scribit & Plinius admodum, ut dicitur et in contrapunctu, maneat, sed fabera, sive Græce *melapona*, sicuti etiam formel appellatur dicitur, perpetuo manet tamen crassa valida est, nec humiditas visibilibus deflenda, craterum spinas ferens. In Syria etiam & Cilicia locibus reperitur, sed raris ipsi non plene conficiuntur. Et circa Terrarum aperi Chalesides quoddam in loco esse, magnitudine medietatem, vix & persequitur & perficitur, & in plerumque tractat.

Fabam hanc Græci *melapona* ad esse, Fabam Aegyptiam appellam, nonnulli etiam *melapona*, ut Dioscorides avertit.

Fabam, utque Galenus, necque adesse *melapona* nominant. Item *melapona* dicitur Dioscoridis, quasi sicuti melapona, aut melapona, quoniam ferunt ipsa humentis globis mandata, & ita aquam demissa.

Radicis autem eius nomen est, quæ & truda & cithra & asia mandatur, eoque cibo, qui palatibus scilicet, utantur.

Ceterum Aegyptia faba, ut Galenus lib. i. De alimentis, sicuti, tradit, sicuti Græcorum magnitudine longe superat, ita & naturam habet humidiorem, magisque maceramentis.

Adtingendi facultatem obinet, Dioscoridiana, & sicuti scilicet vixit est, dytenteria, emulsi per se, inspersi, potenter vice, farina: datur quoque in pulve. At ceterum in vasa melleo decocti, si terra inde cyathis bibantur, in aqua efficaciter sunt.

Tunc ad artem dolores, quod in eorum medio viride spoliatur, gustu amarum, si terram cum coquico coctum insibilentur.

Genuit Colicis Aegyptiarum fabæ amarum cum Radice ceterum, oculorum eam dolores eliminantibus adhibet.

De Dolice sive Phasole.

CAP. VI.

Dolice sive Phasole.

Phasolea pergrassa.



**D**OLICHVS caules proceri teretes, longos, ramosos, petiolis ac vitibus striatis foliis  
 crassiusculis: folia per intervalla florere folia ramosa, superiora, una vni pedicula  
 bipinnata. flores ex omnibus alii erumpunt numerosi, cardidi, lateri, pallidi aut ruberogri  
 Erulie



Equale simile: si quæ deorsum pendens longe, rotunda liores, extrema parte in partem veluti vaginalem deflexa, in quibus constantius femina se prom, octo, aut novis, oblonga, in latitudinem compressa, parum rotunda, ac majoribus vulgaribus fœmæ sita Falcis similia, sed in nigra, colore lutescens, rugosa, rotunda, aut varia, super unam etiam candida, quæ reliquis paulo longiores sunt, & unam formam præfata referunt. Radices subsunt matris, longe ac duræ.

Facile ac quò Dolichus affertur, ac in longitudinem maximam excrescit, longi pedamentum prope officina, aut itura toparias ac pernicitates sicutas factas, quæ ut si se circumvolantes adumbent: aliis hauri procumbit, tardè perennat, difficulter fructificat, vinctus ac streptatus, ut Theophrastus ait, ceditur.

Serius Vitis, fructus sub hincem Filoni manere sicit.

Hippocrates, Dioscorus, Theophrastus & plerique alii, *Dolichæ* appellant, nonnulli huiusmodi magnitudinem *Miles* ac *Miles*, Latine Soliquam: à Dioscoride quòteq̃ *serena* nominant, quod Simplicius similitudine confirmat, & vicina admodum est aut fructus appretibus. Ab aliis pariter dicitur voce diminutiva à *parolis*, cui fructum, ut dicitur, similit, sed nonnulli *gigant*.

Neque enim, ut quidam existimant, *Dolichæ* ac *parolis* idem sunt legumen dicitur nominibus appellatum, sed fructus diversi ac differentes, veluti Galenus lib. 1. De alienis facultatibus ostendit, ubi de utroque agit. Nam primum quidem, de Phaselia & Ochia, deinde postea, aliam in partem, de Dolicho, qui & Phasichus, disputat: & licet videretur addiderit, quæ legumen sit à Theophrasto Dolichus appellatur, namè Dolichum colligit ac colit, fructum esse in Italia quædam hortenlis plantæ: Cuius verò, in agri non ferunt, qui ferunt habeat Lathyrus loci potius, ac vulgò sua ætate Falcibus nominabantur.

Hinc accedit Paulus Ægineta, de Phaselo & Phasico, quem Dolichum nominat, videlicet eodem cap. tradit, lib. videlicet primo cap. LXXII.

Item de Falcibus, Italia quædam ac Roma vulgare olim fuit legumen: Dolichum verò peregrinum. Nam sitensis Falch, Colanella & Pallabus rei. sufficere se proposit meminerunt, & vitem cum Vagibus appellat, Georg. primo.

*Si vero utramq̃ ferat vitemque Falcem.*

De sitione verò Dolichis penno Latinoque scripsit, ut post qui in Italia non facti, neque in horto nani in Italia, veluti Galenus innuit, cum subinde plantam hortenlem nominat, ac in Cata, ut dicitur, ferri referens & similiter *Dolichæ sitionis*, id est, Sitionem hortenlem non minus, quod videlicet in horto ferunt. Quæ etiam sitionem, *serena* ac de capite hanc penno nomen, aliam ac differentem Sitionem hortenlem sine Dolichum Falcis esse, quæm Phasichum nuncupat, evidenter confirmat.

Quæ ob rationem de hinc esse nequit, Falcem etiam syllabarum, à Falcio quòteq̃ labo diversum esse, non minus quam Cicor, Cicercula, & Cicera differunt, quæ unius nomenclaturæ officina sunt: ac à veritate recessisse eos, qui unum legumen diversitudo appellatum esse existimant.

At Dolichus, ut Hippocrates tradit, magna Pisæ per aliam fecerunt, in non inflant, & probe alunt, & non minus quam Pisæ, ut dicitur Dioscorus, nominant: propterea sitio similitudo cetera quod verò ad sitionem ac de sitionem pertinet, vincuntur.

*De sitione ferat, Agrostis.*

Sedque, ut Dioscorus ait, cum seminis casta ceteris loco, veluti A sparago est, vinctam erit, & multitudine formis facit. Quod tamen postremum, prope ad insulam aditum confirmat, ac ex capite De Similace libri hinc, ab imperitis, translatum.

1. Est verò & alius Dolichus minor, brevis, sitio quæ minoribus, cuius sitioes & fructus forma Dolichus similes, sed multo minores. Sunt hi sitioes Falcis sitio Alexander Tradunt lib. vii. *parolis* magis, & lib. x. Phasico Alexandrinos nomen, si modò non per Falcem parum, Dolichus utitur intelligendus, quod verisimillimum videtur. Dolichum enim, ut dicitur, Falcis minor est.

2. Item potius hoc & alius quidam exat peregrinus Phasichus, pertinet & vicini admodum sitio quæque circumvolans, cuius terna ab vno pediculo solita etiam de pendens, veluti Phasichus, sed singula ac gestura multo, ac firmi uterque, si liquæ brevis, plantæ ac magna compressæ, pauciores fructus continent.

*De Pisæ matris. CAP. VII.*

**P**isæ vni quod malis vulgò dicitur, caules habet longos, fistulosos, fragiles, ex quibus vincturam, ramulos, hauri spicillos, nisi prope appositis admitticulis sustineantur: sicut frequenter, ampullæ, & longam, ex multo rotundis lobibus ac candida, vna costis adruis, & ex

Pisum sativum.

Pisum sativum alia forma.



sternis suis, compositum, et omnia parte in claviculas, ac capiteolos definit, quibus raris affixis bus adhaerentibus se se implent. Flos candidus, circa umbilicum purpuream notam habentibus longe sunt, cretici cylindri figura, in quibus grana continentur, Ocheis, id est, membris per se, immixta, quae reflexa angulosa sunt, inaequalisq; angulos habent colore albis candido, alia foetida. radices subsunt parvae.

In Germania ac Belgio, sibi de se heris feritur serendata aucta vere, sicut & leguminosa, cum quibus etiam estare perficitur. Ceteris ita calido siliis praesens: frugibus, postquam quando flores, facile offenditur.

Nam vulgo *Booneste muisen* & *groote muisen* aut *stork muisen* appellant, ac Latine *Pisum Romanum* aut *maius*. Theophrastus & alij veteres, *Γρασόν* vocant, Latine *Pisum normannum*. Plurique etiam *Maiois*, sed parum proprie nuncupant. Le cythos siquidem non potest aliquid legumen aut frugigenum, sed palmentorum ex legitimum facula, ut Galen. lib. De Erythra & Cacoehyma testatur: *Booneste* appellatur, inquit, palmentum, quae ex duritate & fride leguminibus sit *Maiois* vero ex molliore facula, in aqua, cum aliquo *paque deocho*.

*Pisum sativum*, vel ut Hippocrates vocat, *maius* *Fabae* in sua, per aliam autem magis fecunda *Gibberis*, *Pisum* cum *Fabae* tota substantia quondam habeat, inquit, simul medicum, eodemque cum *Faba* modo sarranise. His duabus tamen rebus ab eis discipant, cum quod non aquae *Fabae* sicut *Fabae* sicut, cum etiam quod *deoxygali* facultatem non habent adeoque *legum* quam ille per aliam fecundant.

De *Pisum sativum*, sicut *Ocheis* aut *Booneste*.

CAP. VIII.

*Pisum* in raris, sicut ut *Graeci* d' *γασ*, facile inani, solia, cupressis, si quisque maiori *Pisum* si. *maiois*, *Booneste* tamen maiori bus: flores habet ut plurimum candidos, aliquando tamen expurpureo obducos, siliis quoque cylindri figura, rotundae ac longae, in quibus sarranise tuncant: ocheis, noceas, aut decem rotunda, *Pisum* maiora, colore ut plurimum laevo, subtile vitrei.

*Pisum sativum.*



*Erubus sphaeriferus.*



In herbo & agro proceris, & quod quidem in herbo, minus est, ac nisi prope affinis admodum sit ac pedamentis sustentetur, exiguo fructum curaque firmis reddere. Quod vero in agro situr, amplius vage dispersum spargitur, ac ab aliquo viliis, quibus incertitas est fructuarius admodum, fructum profert, ubi non tamen loco aprico, & optima cultura hoc coque, cum virginosis parvis profert, & veluti Palato frigidius quosque citro astringit.

Sentiat autem Veri. Iusto mentis admodum parum.

Germani *Erbsen* nobis *Grana Galli de pis* appellant. Graeci *εγγο*, à loro velle crochate colore, quoniam minor fructus dicitur seferre. Persae & alij *Lata* vel *Latia* vel *Latia*, recentiores ac Officina, *pisum sativum*, & *Pisum sativum* nonnisi prope optima tantum, quam cum *Pis*, & *caulis*, & *foliorum*, & *liquorum similitudo* dicitur gerit, licet tunc fructus rotundus, & non angularis sit, quod *Pisum sativum*, *Palato* est.

Facilius autem, & viribus *Pisum sativum* fructu simile est, nullam efficaciam qualem in seipsum habet, & modicum quodammodo locum obtinet in terra, quae boni ac prae sui facit multum ac parum curabitur, sicut & deficiente concogitur: tunc & citro delidant, sicut tunc sunt ac *Rana* expone, veluti *Galenus* lib. De siment. facili de his, & *facile* scriptum reliquit.

*De Erubis sine orbis sphaeris.*

CAP. IX.

**S**YLVESTRIS Erubis caules prope angularis, *Lathyrus* quodammodo similem habet, utrimos atque hanc proceritate, ex quibus per intersticia folia excurrunt, longiora, in capite colos delidant, & recentiores quidem singularia, alius vero in plura parva sibi hola duntaxat. Floccae candidi similesque *Lathyrus* similes, minoris, in quibus rotundis similes Erubis minoris ac duntaxat, colorem habent, ac nigra, sapore subinde amara, rida, vtiliorum leguminum, fibrosa est. Caules sicutque *Pisum*, *Ochrum*, ac *Lathyrus* colore solum.

Rarum quidem & peregrinum legumen, quodque à *lathyrus* herbarum sphaerisque tantum, ac tunc quidem in herbo firmis.

Erubiam, sine *Ochro* sphaeriferis appellamus, alio delidant: nonne, propter eam quam fructus sui Erubis similitudo habet.

Mulsum autem à venis necesse, quae legumen istud *Arax* ut, & quidem agrum fructu. fructus etenim tunc quodque eam tamen semper riget est. *Arax* si quidem, *Galenus* teste, *Lathyrus* similes est, angularis vel licet, sed tamen minor ac duntaxat: illius autem fructus, ut duntaxat, rotundus est. *Pisum sativum* huc

Lathyrus sive Cicercula.



Arachis sive Cicera.



hinc similitudinacum legitimo Ervo est, vt ut-  
formis Cap. XVI. latius demonstrat.

*De Lathyr sive Cicercula. CAP. X.*

**L**ATHYRVS caulis habet complures angu-  
losos, vni quoque in membranosam laticudi-  
nem extensus, vago, hinc proceras inflexas foli-  
a. e caulis gasculis exant glabra, angusta, in  
macrostem deflexoria, bina vas utilitatis po-  
dicato, interque medius haeret capiteolus, in-  
torcas, quo adhaerens prope afflicta, ac pro-  
ptos etiam castitatis apprehendit: flores can-  
didi sunt. Siquae Ervulae siquis minoris, non  
cylindraceae, sed lineae aequae compressae, colore  
similes, fructus in his gascular angulosis, facis  
candidi, intus hinc, sapore Ervulae. radice ter-  
rena & fibrosa.

Rarum Belgio legumen, quodque in hortis  
tantum colitur, & exoritur quidem, quos vocant  
stipum delectat: vni cum aliis leguminibus &  
ferunt, & colligitur.

Graeci λεθρα: Latini Cicerculae nominant.

Substantiam Cyclis & Fichis affinis, vt  
Galenus scribit, habet, crassioram tamen ob-  
eum ipsam causam plus aliquantulo quam illa  
nutrit.

*De Arachis sive Cicera. CAP. XI.*

**S**IMILIS Lathyr Arachis est, caule etiam  
stipulis cum utrimo refert: flores habet ex  
robra purpurei in purpuream inclinentes, siquis  
paucis minoris: aequi his grana angulosa quo-  
que & Lathyrus similia, sed minoris densitateque,  
in usque compressa, colore obsoleta, nigroque  
proxima.

Rarum & hoc etiam legumen, quod neque  
ab aliis quam in herbis studitis ferunt.

Galenus scribit, & posteriorum nominis syllabam, per  
a, in Anstophanus Holcadibus, noxiam inveni-  
n, ad differentiam videlicet ab Arachis, per  
z, quae cerealis frugum vitium est. Latini Ci-  
ceram nominant, quod videlicet Cicerculae si-  
militudinem habeat, neque solo ponissimum co-  
lore ab eo differat. Cicera, inquit Columella,  
sapor nihil à Cicercula differt, colore tantum  
differunt: nisi est obsoleto & nigro propior.  
Item Palladius in Marm, nunc Cicera ferunt,  
que differt à Cicercula solo colore, quo sordet &  
nigrescit.

Vitaeentis Arachis, & facultas, aequat Gale-  
nus, Lathyrus facultas est affinis, nisi quod A-  
rachis sine densitate, in usque facile elinamur: que  
causa etiam est, cur Cicerculae concoditum sint  
difficilior.

Est poro & alius Arachis, flore fructusq; can-  
didi, caecorum magnitudine, & forma seminis,  
reliquisq; omnibus, proci similes, quem nō Ara-  
chis, sed Lathyrus minor esse, fons quadam-  
De

Lachrya Sylvestris.



Mochus seu Cicor Arvensis.



## De Lachrya Sylvestri. CAP. XII.

**C**V M Lachrya & Araco, similitudinem magnam, et vestro quoddam legumen habet, quod plantis Germanis ac Hispanis locis, sua sponte nascitur. Carles id proferit, sicut capreolusque Lachrya longiores matoribus, Borei Araco colunt, sicutus deinde parva, & ingesta, in quibus sitina parva, rotunda, dactylis conueniunt, Cracca, sicut Aracho rotundo similia, rotunda hinc magna, crassa, dura, lignata, ac diuina, sicuti progermat araco.

Latro pinguisque agri, circa eorumdem marginis, prope sepes, dactylis ac sitinam nascitur, quae ex rebus suis appellationibus consistit ac topore.

Sylvestrem Lachryam, aliud eius nomen Symplicis, aut cupressinae, necque erant, ut plerumque aliquando perperam creditur, Erasmi. Erasmi enim non vultudice carles, sed solui ubi lege una, singulari natio dicitur, & fructusum, huc ut Theophrastus ait, ut apud Aristoteli, sicutique sua affertur: aliud autem matoribus, & Symplicis, per totam spargitur, ut prope matoribus sitinam.

## De Mochis, seu Cicoris fano.

## CAP. XIII.

**L**E G U M E N quod ab Italia Mochus seu Mochus appellatur, autem habet similitudinem, non quidem erodiam, nec tamen procumbentem, sed in latus utroque, ut apud Galienum similitudinem (ut hinc similitudo legumina Theophrastus nominat) est: folia Lentis similitudinem ex parulis & angustis complicatis, in pediculis, sicut costis aut sicut utriusque adhaerent, & similitudinem oppositis, componuntur: Flores nigri sunt, subcardidi, post quos parua, oblonga, rotunda, in similitudinem matoribus, sicutique legumina, in quibus tunc quatuordecim similitudinem, plerumque quidem parte rotunda, sed uno emittit angustis, Aracoque Carles quodammodo similitudinem, sed matoribus, necque ipsi enim Erasmi matoribus, gustus non inlatus, sed Erasmi hinc matoribus, Radicibus firmioribus.

Nascitur Hispanis & Italia compluribus locis: In Germania vero ac Belgio non nisi in horti, & a paucis dicitur.

Dactylis dicitur legumen istud ipsius esse, id est, sitinam Cicor appellat. Theophrastus Cicor magnitudine ab Araco dicitur ipsius nominat, ab Oro ut videtur aliquando dicitur.

Plures vero, Columbianam ac Venetorum Cicoris dicitur, in partem, plures sunt, magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim Araco capis simile, unde ut appellatur, capisiam & nigram ut sit & columbianam, quod alij Venetum vocant, candidam & rotundam, luteam,

Araco.

Artem minima, quod restigio perungitur adhibet. Deinde max. dulcissimum, quod Erug. dulcissimum.

Officina legitur etiam istud incognitum esse. Ita: *Artem. vti & nigellina: F. Hispan. yerva de yerva*, quæ Erugam appellat, non, vt vniuersale videtur, antiqua transpatione, sed a quibusdã medicinali pharmaco parva recente introducta. Nam Mæcelum hunc inuis ex recentioribus legibus huc Erugam esse creditur. Sed in nostris quidem opusculis de aliorum vtilitate ista autem incerta, a veritate non parum recesserunt. Mochas siquidem sibi non habet angustia, verum Erugam solo alata, nisi singulari, æquebus non nisi compositione esse ad quæ, hinc et angustia non videtur referenda. Nulla prorsus gustabilis qualitas euidenter amara, aut nigellina esse videt. Et cum Erug. nequaquam consentire possit.

Erugam enim *Artem. vti*, siue angustia sit, et vt Galenus ait, gustu in facillimum, et *Artem. vti*, et ab eo quidem hoc non absterrent, bonas verò in aqua dulcoratum palentur.

Est et Cicer satum a suo, Dioc. ostendat, idoneum esse vnam cum in flavorem panis coloratum bonum facto: mensuræ ac factus pelliculæ ruger. Cum Erug. decoctum impingitur ad vnum inflammationes & rheumatis: ad scabiem: vlcera capitis manantia: impingitur, *Artem. vti* tocanti carcum mata, et vlcera quæ cacochæ dicuntur, et melle & Hordeo prædest.

De Cicer. Arvensis.

CAP. XIII.

Cicer Arvensis.



**A**RBIENTUM Cicer, caules profert teretes, lignosos, ramulos, modice hirsutos, in latas declinantes: folia ex pluribus vni pediculo siue pty venisque actatis, scilicet in vlcera oppositis congesta, quoru singula ramula sunt, lata ac in ambitu cretata. Flosculi solum minora. Flores parui sunt, colore aut candido, aut ex parte rubefactis, quibus faccedunt singule parue, breuesq; silique, vniculorum modo ac veluti à stera distentibus, quibus duo, rar ad firmum vna clauduntur semina, angulose, tuberculata, vnoq; acuto angulo prædita, Arvensis capiti admodum delineta, colore aut candido, aut ex subnubente purpureo nigra, que geminationis principium hinc obliquum ostendunt. Radice rotunde gracili, candida, longaq; vt cetera Therophrasus ait, radicem inter legumina distimum Cicer agit.

In Italia, Hispania, & Gallia, passim in agris fertur perennis, quæ similitudo est sililago. Natura enim non, vt Therophrasus tradit, est cum sililagine nota, idcirco solum vna, & non nisi madefactum prædic, Panso auctore, fieri debet.

Græcis ipsi dicitur *Artem. vti*, Latini Cicer Arvensium dicunt, & colore quidem ex purpureo fulvigrum, Cicer nigrum, Officina rubescit Cicer: aliterum verò candidum, siue album appellatur.

Cicer autem edulium est, Galenus lib. De doct. facile scribit, non miris quibus Fabi siue lentini, sed valentis amenti quibus illa. Ad Venerem autem incitan credendum est, semen quoque generare, vnde quidam equis sililagine ipsam exhibent. Inest præterea Ciceribus, facultas abstergendi miasa, quàm Fabi ac vti quidam ex ipsa calcolis in vmbus carilantem an fesse comminatum, nigra autem hinc et ex aqua, Arvensisque ipsi suscipiunt. Sæpius autem est, succum ipsorum in aqua coclearum habere.

Diocorides, Antrum vtrumq; inquit, vna est, dato cum Rosi marino, hydripticum et vno morbo laborantibus eorum decocto. Laudant autem ea exolocatum vesicam & tinea.

De sililago Cicer. CAPIT. XV.

**C**ICER sililago satum simia est, Diocorides ait, odore acri, sed femine dulcioris. Rectioribus aliquot ipsi sililago Cicera præponunt.

Cicer sylvestre prostratum.



Cicer sylvestre durum.



1. Viam cauliculos prostratos complures, ramulos, frangi decumbentes, circa quos folia et pinnibus ad viam costam composita, veluti Aserini Ciceris, sed ambra haud creata, secundum folia idcirco similia: flores in pediculis sunt caudicatos et seorsibus, et hinc pilosus, spicato ordine prodeuntibus eodem folliculo angustis, Aserini Ciceris fructus figuræ et magnitudinis, magis et nonnulli lustrati, in quibus semina coarctata, durum, planum, splendens, quæ Phascolis, radix satis alitè dicitur, fibra aliquot firmata.

Herbosa et inculta prodeit crabitur, & non modò in Italia sed Gallia, sed et apud Bohemos. Aethiæ montibus semina perficit.

2. Alterum sylvestre Cicer cauliculos quoque complures habet per terram iacentes, circa quos folia mollia subhirsuta radicem a, ex tribus aut quatuor fert ad viam costam oblonga, composita, quorum minimaque ad pediculus numerum verò extremam flores annexa foliorum exsertunt lateri plures simul, sequuntur folliculi oblongi, molles, et hinc in quorum singulis siliquis parva, in qua duo grana Arachis simili.

3. Tertium sylvestre Cicer et ramulos, cauliculos verò spargit caespitales aut longiora circa quosdam folia, Tenfolij modo, maiora, crassiora, lanosaque quàm singularem Aserini Ciceris, ambra contenta creata: siliqua breuius et clemens in his compressa, molli Ciceris similes. radix vestigialis singulis annis prostrata germina.

In Hellespontum & Allobrogum, quos Sabaudes vocant, fasces reperit P. Pennæ M. Lobelius antea: sunt.

Cicer sylvestre non itud apud Græcos quàm *εγγύς* *εγγύς* *εγγύς* nomen habet à recessibus verò nullum auerit.

Ex illis verò, quæ pro sylvestri Ciceris ab his ostenduntur, quod primo loco descriptum, magis quàm reliqua, cum sylvestri Ciceris conveniat nobis videtur.

Cicerum sylvestre, ut Dioscorides ait, item quod sicutum proflat. Galenus in digestis Cicer ad omnia efficaciter lauro aut piceo cum calidum, cum facies, quæ dicitur & amara.

De Lente.

CAP. XVI.

**L**ENA tenuis basi cauliculis, et vasa culis ac obliquis foliis, ab utraque medijs pediculis parte, multas et angustas, viciae similibus, sed in gustibus et in modis: flores ergo sunt,



luteolae purpureaeque: filique parvae, laevae, firmatae in his, crissae, aut quatuor, parvae, rotundae, glabrae, compressaeque: radicibus firmis aut parvis.

Sicuti autem tenax, calidique temperata sit.

Graeci ποσειδονία: Latini Lenae & Lemnulae: Germanis Linsen: Gallis Lennelle: Italia Lemnula nomen natus: Hispanis *Lenas* & *Lennulae*.

Tenax autem Lenae, ut Galenus ait, nec non est diuresis & frigiditatis, de hoc autem tenax fons ad ordinem, corticem habet adstringentem, & quae ipsorum est veluti caro, crassi est lenae terra, visumque qualitatibus habens exiguis, cum cortex in usum est panaceae. Succus potissimum est adstringenti contrarius. Quod circa si quis in aqua ipsius coctum, & deinde aquam sic de gurgulis, aut cum ipsius oleo condensum sumptum, potus est ab utroque dicitur. At ex bibula Lenae, Lenae apparet, facultatem habet succo contrarium, ut quae ventris fluxum facit, stomachum, intestina, & totam denique ventrem corroboret. Quam obrem confusio, & dyenteria, eius est accommodata.

Lenae vero d' corticis, ut illam adstringendi vehementiam, tenax quae ipsam corticem sequitur, ut magis tenax, quam quae cortice spoliata non est, succum crassum per se quoque propter visumque comment, non tamen alii fluxus de hoc, ut ea cum cortex non est ad usum hanc ipsam, quae sumptum hoc edulo videtur, elephantiasin, & caneros incurrit. Si quidem crassi lenaeque cortex, succo melancholico generando sunt idonea. Quare usum dicitur, quibus aqua in caneribus est *επιψηλα*, Lenae in cibo videtur praeberet variis vero de squaletoque alioquin dicitur. Eandem ob causam visum integrum & insulpatum habet, ipsum autem dicitur alioquin ei vero, qui contrarius modo se habet, confert. Ad menstruum autem purgationem non est accommodata: confusum enim & tritissimum sanguinem reddunt multum profusum est vitiosum, ut Galenus lib. De alimentis facit.

Sonnis turritacosa (ut Dioscorides pueri hanc sibi) excitat, capiti, nervis, & pulmonibus. Contra alia fluxiones, melius suo fuerit officio, addito cum sono, strybo, aut Potulaca, aut Beta nigra, aut Myrsi bacca, aut putamine Punicis, aut Rosicordia, aut Melphian, aut Soela, aut Pyri Thebanis, aut Malis Cocanica, aut Cichorio, aut Arnoglossis, aut Galianis, quae post decoctionem abiciuntur, aut Rhod, quae obstant in purgatione: ut



rum actum cum eo diligenter persequi debet, aliis aliam eductur. Contra subversam  
 Romæ in ingenta gratia Lerini decemata, de oron produnt decemta cum polenta, & illas  
 pedagra lenat: sicut cum melle glutinatissimas utitur: vicia purgat: decemta in aceto da-  
 tissa & strata dicitur in Conco Mado aut Meliôro moderatè inflammatione duresca-  
 torum, sed usque ad durescitur: verum in marenibus sed in flumina in onibus: & magis fru-  
 bus, cum potantur Mado Panca, ac sicca Rodia & dolo melle decoquantur & similiter ad sa-  
 m in as purgatione, ad durescitur aqua: Pulsula item & in pondere, ac erythelatis, pennis-  
 busque, ut dicitur est Conco mannas vesò, in quibus dicitur in grumos coit, & qualescu-  
 mque red undantiam non ferunt, cocta in aqua maris, & in pulvis aut durescitur.

De Erui, et Theophrasti & alii.

CAP. XVII.

**E**RUIVM ex leguminibus, quorum in lano castis tenet, ut Theophrastus ait, sic, et  
 Dioscorides, fructus, parvas est, acutus, angulis foliis floribusque productis diversissimus  
 est, velum Coena: *arapocis*, id est, aqua feruans, in filiquis cylindricis se inuicem con-  
 giunt Arachis, Galenus scribit, maiora, *Arthropidis* vesò, Dorycni, ac Lithospermi similia, la-  
 thyrus autem, ut hinc Dioscorides, maiora, si pœre in fustissimis: que si pœre & colora diffe-  
 rentiam obsonat, & dulces quidem, ac tamen me dicamentosa candida sunt, que ad lu-  
 cidem, siue *arapocis* feruò, aut ad ochre colorem accedunt.

Lentius solo, ut Columella, in sono, maturè ac leui ferunt, sed si Veni ferunt, fatiga-  
 tantur aut, non graue, velut autumno sit om. Seruati inter Brasillas, contra paphione.

Græci legibus nominant Offina Germani Orobi nomina remota sunt, rem autem po-  
 tantur, pro eo Vicium perpetam substituerunt.

Nicotianæque plerique, Eruium esse existimant, quod ab Indis *Arabo* nominatur, verum  
 quàm parum cum Erui conueniat, cum ex capite de Mochosive Cœtere ferunt, tam expe-  
 ritur Erui descriptione, sicli autmadue in potest.

Erui similitudinem videret, sicut et quoddam legumen, quod subsequente capite, pro Erui  
 sicut in descriptione est, quinquies nec ipsum verum ac legitimum sit. Nam *arapocis* que-  
 dem est, ac *arapocis* illi quosque habet cylindricas, ac formis modoque loquatur: Dof  
 coctis, oportum siue *Arapocis* ipsi in quas dicitur, nulli enim pedamentis, aut propi ali-  
 quibus admixturis eget, possentque sua engitur, & in alium affertur, cuiusmodi dicitur,  
 Dioscorides *Arapocis* si *Arapocis* aliquando appellat, *arapocis* obsonat ostendit, quod  
 ipse *Arapocis* facit, non alio de causa, quàm quod ab homo sursum ipse sua affertur. Sed cum  
 fenum profertur Arachis non mare, & durum, si pœre non amaram, non ingratum, pro vero  
 Erui haberi non potest, nisi forte & parum quoddam Eruium sit, quod in his testibus ac  
 manibus Germanicæ regionis tractam, in fustissimis suam deponat, quod verissimum est.

Accedere verò ad Erui descriptionem & legumen aliud apparet, quod Cap. ix. huiuslibi  
 Erui sicut sicut in nomine descriptione est: sicut si quidem erui oblongi sunt, que ad rollentem  
 eorum paratione angusta dei possant fructus rotandi. Arachis maiore, Lithospermi similibus  
 magnitudine huius diffinites, colore subitua, quandoque nigri, si pœre velum Eruium autem,  
 maiore tamen qui albescant quàm nigrescunt. Que huiusmodi gamini cum Bras (si non idem)  
 affinitatem maximam ostendant, & tamen quidem ut per Erui succedantio dicitur non  
 habent hanc, neque omnibus medicamentis eius loco adhiberi: repugnansibus huiusmodi  
 non enim in cylindri modo erui suam quales Erui Theophrastus testatur. Quod si tales, co-  
 gram Erui descriptione repugnans ade sit, nunc verò ad Lathyrus accedendum, si pœre huius  
 ferunt. Velut quoque & ipsi sicut non *Arapocis*, ut Dioscorides, hoc est fructus in modum af-  
 fertur, sed huius, nisi pedamentis sustineatur, procumbens. Quod & sicut in Eruiam  
 ab Erui differentiam facit.

Cæterum ab Erui, ut Galenus lib. i. Desistunt facit, Modis, homines proles affinitate,  
 est enim infusissimum & parui facci, boues verò tum in Asia, tum a pod aliis quosque gen-  
 tes in aqua dote onatum pakuntur. In magna tamen fime, quomodo in odii Hippocentis quoque  
 scribit, nec esse in coctis ad ipsum non unquam accedunt. Nos verò ad eundem modum,  
 quo Lupinos, preputantes, Orobi cum melle vicia, seu medicamentis crassis thama ac  
 palmos humores expurgantibus.

Potèr autem Orobi, alio no rus sunt medicamentosis, qui ad fluxum aut ochre colo-  
 rem accedunt. Que verò coctis his ferunt, & in aqua identidem dicitur, infusissimum que-  
 dem deponant, sed vix cum ea abstergendi enim & incidendi facultatem, ut sicut in eo in-  
 Im quare verum si substantiam, que alimentum sit quod erui insignem amaram, desine-  
 di vim habet.

In huius verò De simplic. medicament. facult. adlocat, ait, Orobi excessu feruendo inter-

lyca-

hæc facit vendicariæ per rō quatenus amaritudinis est partem per, aceros incidit, et tergit, et distillatones expedit. carcerum si sanatur copiosè, tinguatur per vitæ cinerem.

Dioscorides, apertè, inquit, Erum granatim efficit, aliter in tartaricis, & sanguinem per vitam extrahit, et hoc tamen hucus legimus appositum.

Per semetipsum farina, quam *lythos dicitur*, ad est, farinam Erumam nominant, ad medicandum viscositates. 112. 113

Parande autem hoc est Vberis granatim dicitur deligantur, permixtè deoque aqua aspergantur, & donec sufficiens coctio bene sit, in oleo, postea conantur, usque dum coctio distillat, deinde mola trita, farina tribus incrementis, farinaque reconditur.

Hæc duo vitæ esse vitam esse meliorem colore in efficit frequenter in cibo aut potu sanguinem cum tormibus per alium, & viscus duodecim vicia cum melle purgat, leucogras, cataphelas & macula, quæ ardore vocant, totamque copiam emundat. necnon, in *lythos* granatim, & granatim serper non parum in amarum durities emollit: vicia fera, quæ *lythos* vocant, carbunculos, facitque emarginat ac rompi: cum vino subacta moribus canum, hominum, asperantur illis, modicum vitæ difficultates, tormia, pueris in oculis, aceto mingit. Prodest etiam eis, qui alimenam à cibo non sentiant, frasa & ad nocis magis viscosum melle cupra sumptis. Decoctum eius fouendo, peritiones & pruritum toto corpore sanat.

*De Erum sylvestri seu Caranace prima.*

CAPIT. XVIII.

Erum sylvestre.



**S**YLVESTRIS illud à nobis nuncupatum Erum, est hinc eius profert pedales aut longiores, rotundos, emicos, nonnihil ad latum inclinantes, in angulos quosdam ramulatos divisis: folia tenuia, oblonga, angusta, gramina foliis multo & minores & angulicosa: hinc rotundas pediculis, ex foliorum alarumque sinibus exsertis herbar, parvi, luteoli: silique deinde subrotundæ parvula, formæ oblongæ, cretæ & angustæ, in quibus semina novem aut decem vel plura, rotunda, dura, nigra, splendens. Amentis aut exiguis Erum similia, gustu non infirma.

Floret magna ætatis parte, et scilicet subinde novis, proinde in areolaribus solum nascitur sua sponte plerique in arvis, & raris ferobes fossisque reperitur in eodem locis quibusdam non procul à mari, quod si quis non rotundas, sed luteo vitæ progurgare ferat. Herbarum studiosi subinde apud Belgas in hortis ferunt.

Sylvestre quoddam Erum viderat, cum descriptione eam eius, excepto solo sermone, ut sapienter capite de usu monstravit. Videntur etiam Dioscoridis prima Caranace, varietati etiam semen non in capsula, sed in silique ferat. *lythos* etiam in quibus semen hanc Caranacen ferat Dioscorides scribit, non capsula, sed silique hoc loco interpretari debere, quod est eo edemptur, ostendit: ut Caranace

describitur; veluti Orobil habere, Dioscoridis autem Orobilis capitula gerit, sed silique.

Vicina autem Dioscoridis de prore Caranace hanc, in veteri exemplari, hanc *lythos* vocat, in quibus semen hanc Caranacen ferat. *lythos* etiam in quibus semen hanc Caranacen ferat Dioscorides scribit, non capsula, sed silique hoc loco interpretari debere, quod est eo edemptur, ostendit: ut Caranace

Plures Caranacen Thebalem herbam, qualis sit, superius scribitur, cum sit eius

vius ad amarae virtutem, ad quam etiam sola cum hinc, cum altera à Diofcoride veli traditur. Utamque, inquit, nascunt in amarae specie: Theophrastus multos has vii tradidit. At Erasistratus hylaei nullas omnino est vias.

De Lapinis, ac primum de Sativis. CAP. XLII.

Lapinis Sativis.



**I**NTER Lapinos huiusmodi sativus dicitur, Sativus Lupinus caule assurgit singulari, rotundo, atterens concavo, exornis indurac lignositate, fimo, & quae abscip abscissulo robur conficit, è quo, postquam primum macerati facti sunt, flores in haec calypso eriguntur, alij tres ramuli, infra speciem formae produunt, quorum singulari non raro & alioquoque modo hinc, alijs ramis eodem profertur modo, profertur si tempore Sativus sine, existenti calidam diuturnamque noctem sine: folia ex quinque, sex, aut septem lobis compositantur, Vicia similia, sepius tunc vident, infertur verò candida & longiora, & sub velperum circa Sola occidit, veli hinc: da fulta decortium dependunt. Floris in summo calibulorum speciem digni candidi similitudine ut filique crassif, Jure, Boreae sine Falsi monea, dura, subfinae, formi tenuantur sine, tota verò glabris, in quibus semina quatuor, sine, plana, rotunda ac veluti compressa, formata, utraque lutea, sapore amarissima, quae & primum compositum hanc obtulerunt, & quaeque filique adhaerent, concavitate in quibus, veluti exiguan vtrilibet habent, radice Lapinis nunc singulari, tenui, lignosa, pauce capitata mente fibrata.

Polis, inquit Theophrastus, salam acedat ac vobis, culis agris provent, autem sui hylaei.

Flores apud Germanos, primum quidem, sub fine Maij, deinde Iunio, aut Iulio Idij fecundo gerit verò Iulio aut Augusto mēsim, si autem tempus calidum hoc adque fuerit. Sicut duo proies sepe ad maritima peracuitur, partim in inferiori Germaniarum.

Graeci hoc legumen *Σάπιον* hanc: Latini *Lupinus*, & *Lupinus* Germani nominantur Germani *Fruchtlin*: Itali *Lupone domestico*: Hispani *Entrameas*: Arabum *Wāhishim* & *Lupum*: Galli *Lupone*.

Lupini Græci *ἰσάγγων*, hoc est, frequens multoque usus est, Galeni in lib. De abiment. facult. an. et virtutem, deinde in aqua dulci maceratis, cum tempore doret in omnem sibi argentum exeret infusa in aqua, ut demum mandret cum gaco aut oxygano, ut etiam sine his, si de medico conditus Lupini dura & terribiliter salubritas: quocirca quocirca sic conditum sit dissoluta, succumque crassum ggrat est: necesse, ex quo non probe in ventositate, crudus proprie appellatur lacus acedat. Ceterum in eo inter primum quicquid habuit amaritudinis deponat, nisi *Wahis*, id est, quibusque ten si deprehendat experimentum, in hanc quad, & in preparata, ut in lib. De medicam. simple. ut, ex genere est experimentum.

At vii natum curandum mater amaritudo, extergendi digerendique vim obicit emulsiac lumbrosos, cum illius, cum addito melle in hanc, cum ex polis optima. Quo & deinde cum eius sem brucus exire potest tum etiam fortis eriditum per solum vitiligos acedat, cuasche mola, ploras, gacopas, vicia moligna suae, partim extergendo, partim cura modicam digerendo sicardoque. Expurgat iocur & hanc cum in ra & papere hanc gram, affertur e hanc mentis, ac hanc mola, cum *Wahis* & melle inpositum.

Primum Lupinis in aqua, sine macerare digerit, nec enim hanc dicitur, sed & chemia & phytaracura, sed tunc in aceto aut oxygano, aut polis coquatur oportet, id quod probatur ad temper in uno & affertur hanc, quod ex via est digerendo digerit aced & que hanc hanc, & quare quocirca modo dicitur in aqua posse decoctum, eadē omnia est & hanc.

Lupinus sylvestris.



Vitis.



Decocti plantula, aqua Lupini, Diaphorides perier hinc scribit, dicitur in cremonensi lentescant, sic cum abstrigunt moderatiorum scabie, cum radice nigri Charoleuont, si tepente decocto abluantur.

Cum ventrem radix cum aqua cocta de pota. Lupini vbi edulcan fuerint, anticum aceto, pota stomacho salis dunt leuant, & cibi appetentiam excitant.

*De Lupino sylvestri. CAP. XX.*

**S**YLVESTRIVM Lupinorum duo mure sunt genera, vnum florem profere latum: alia purpureum.

Luceus caule foliolisque latis, firmis est, vniq;que tamen minoribus ac breuioribus flores habet pulchros, luteos, sine uolente, in spicam congestos, vbi la luteo colore & quadam uero colore siliquas paruas, de ras, aliquas uero hirsutas: firma parua, plana, rotunda, sapore amarissima, calida uero, sicca, sicuti multo minore.

Purpurei, caules longiores procerioresque sunt quam lutei, & in plures alio in modis disticti: folia uero minora tenuioraque: silos parua ac luteis minore, ex purpureo carule, aut subrubentes: fructus colore haud uero uano, amari, & multo citius in iura.

Nascuntur syluestres Lupini plerisque locis sua sponte, uerum apud Germanos non nisi facti prociunt.

Florent eodem quo sitim tempore.

Amariores sunt, ut Galenus ait, & ad omnia ualenciores, quam firma, erudum genere cum ipis facultate.

*De Vicia. CAP. XXI.*

**V**ICIA ternes habet & quadrangulares cauliculos, tres sunt pedunculata: folia oblonga in clauiculis desunt, ex plantis uari coloris sine uero aduans composita, quorum singulans minora, lutea, crassioraque sunt quam Lentis: flores bene sine Falli forma similes, sed colore ex purpureo nigri: siliquae latae, exiguae, atque in singula graua quatuor sinive, non globosa, sed Lemnulae inftar propinqua dum compressa: colore nigra: gustu miti ana.

Sentat quo cunque solo, culta facillima.

Miso floret, fructum inde perferit.

Latus Vicia, à uincendo, ut Varroa placet, dicitur, quod in capreolis, acuat, habet ut Vitis, quibus uisum uerum script, ad usum Lupini, aliunde calatum, ad quem ut heret, cum solet uincere. Galenus in Asia Pergam Classe ab Artico uero aegyptio aut aegyptio nominant. Germani Viciam: Brasilienses: Galli Viciae nominant: Officinae plerique perperam Viciae ac Eruiam: meliorem enim Eruiam à Vicia differunt.



De *Carolina*, sive *Thespiaste Erythrae*, & *Myagris Dactyloides*.

## CAPUT. XXIII.

*Carolina sive Myagris.*

**C**AROLINA sicuti loci est herba, caule re-  
cto, teretis, in atas densis, duos aut tres  
pedes longo folia oblonga, angusta, in scutum  
deflexant, singularibus Rubra folia haud diffi-  
nita: flores secundum cauliculos, exiguae fo-  
rtes orbiculatae vinctulae, Lini vascula prospe-  
modum similibus, sed compressionibus conti-  
nentur, inveniuntur in Faenograeco maris, pinguis &  
oleosum.

Parsique Galliae locis, et apud Saecionem,  
bene subactis & succorum agit, ut Ruellius  
scriptis reliquit, locum sicut & in agro Leo-  
doriensi, apud Zelandae, & alius Belgij locis: in  
Germania non nusquam sua sponte exire fer-  
tur, atque vnicum Lino emaki, cuius vitium  
existimatur.

Gemmae *Stachyroides* & *Septentem* vocan-  
tur, Gallis *Caroline*, quo etiam nomine Belgis  
innotuit: Officinae parsique Sclimam appel-  
lant, oleoque huius pro Se salum reuatur.

Est autem *Carolina* haec, cretule sicut *Ery-*  
*thrum*, quod à Galeno lib. De aliment. facul.  
ac à Theophrasto *ispisier* appellatur, quodque  
inter frigida vna cum Sclimone ferunt. Scitum  
id, ut inquit Theophrastus, cibo idoneum est,  
quae quatum in eo amaritudinis difficultatisque,  
soli opera perochum excretumque est. Vnde  
vero à rustico animal tangi videtur, propter a-  
maritudinem, & grauessem saporem.

Est tamen & aliud *ispisier*, à Dioscoride lib.

1. scriptum, cuius lib. De simplic. medicam. facul. vi. Galenus meminit, ab hoc Theo-  
phrastis *Erythrum* mutari in differentia: non presentem frugem Dioscorides non *ispisier*, sed  
*ispisier* existimat, quod aliq. inquit, *ispisier* vocat, *ispisier* vocat, similitudine ferat foliorum, quam  
consuetum Theophrasti ac Galeni *Melampyris*, à Myagris differente, habet.

Parsque frugem Sclimam similem Latius inueniunt, Graeco *ispisier*, Gallico *Pulsatilla* appella-  
ta, lib. xxiii. cap. xxv. scribitur & Lib. xviii. cap. x. haec scribitur Sclimam simile, ut, in Asia  
Graeco *ispisier* vocantemque erat, nisi pinguis esset, quod apud nos vocant Inonem.

Parsque in modum Galeni inquit, Miliu Parisum, adfirmat quidem quodammodo  
est, verum utaeque dicitur ad eundem modum & Sclimam *Erythrum*, corporis sub-  
stantia quidem paulo est aspera sed in cibo est infansus, corporisque alimentum parum  
subtergradoque omnino est deuenit.

Thespiasterio in rem, calidam quoque, ut Sclimam est, similitudine etiam exicit.

Semen oleosa pinguitudine corpora asperantia largitur, atque expolit, Dioscorides an,  
omnes.

Vinciturque herba succo suo medic. oleo pariter in epulis, diuina in lactem vi,  
Ruellius dicitur est.

De *Lino*. CAP. XXIII.

**T**ERTIUS ac teretis culmis sive virg. Lino affert, folia ei oblonga, angusta,  
acutiuscula flores in summis virg. speciosi, colore caerulei, quos parua, rotunda, orbicu-  
laris capsulae, sive vascula succedunt, in quibus semen, figurae diuersae oblongae, leu. gla-  
brosae splendens, ex fuluo colore purpurea, radicebus nititur exilibus.

Parsque herbae sicuti locis humilis in huiusmodi sicutibus, sicutus present. Pinguissimum  
est, ut Columella ait, locum & modice humidum in posit. Alia, inquit Palladius, macro-  
silo spissam ferunt, in assequente ut Linoam subtile nascitur. Plurimas scribit sicuti sicuti  
maxime vero sicuti, nec magis sicuti sicuti aliud, vndeque agrum de delectationem ipsam sicuti  
quod & Virgilius in Georgica assequitur:

Linum fatiata.



plenum est. Est verò etiam in primo ordine quodammodo calidum, at humectans & foetidum velut in medio est situm.

Quamopere vitæ sitiosum, & recrementum humiditate plenum situm Linum, patet ab hac anna Middelbergi in Zelanda animadverti potest, cum propter situm astringens frigus inopiam, plerumque ex curibus panis & hinc ex hoc cocto vesceretur. Dolent enim hinc valde citò hypochondria fieri, & facies a huius partes tumida facta, quam non pauci sic affecti, gravem morbum sunt. Neque enim aliunde hæc symptomata, quæ non tantummodo siminis humiditate, que situlentiam patit.

Linum semen, ut Dioscorides in memorie prodidit, eisdem quæ Fornunguacum vire obtinet: distans & emolliens, remota istius formæ, in simum materiam, cum melle, oleo, exiguæ aquæ decoctum, aut melle cocto exceptum: coctum in facie viti, quæ à hinc viciat, emolliens, & varos cum aere & febribus impositum tollit: cura hinc verò patet, quæ dantur, distans: herpetas fatiosus, cum vino decoctum expurgat: virgus scabros cutem, cum pan modo Naluri & molli: que in pectore vicioli edicit, cum melle & clematis modo acceptum, & tuffum lenit. Venetum est, si pipere & melle acceptum, pro pleuritis legitur alimant.

Huius decoctum ad interitum vici, veluti Fornunguacum, perquam vici est.

Quia quod ex semine eius exprimitur, multiplex vim habet, nec erant à hinc vici sitiosus alimant: artificibus expectatur solum, vel ad lucrum tantum vici est, sed etiam medico vici situm. Nam & distans omnia molli: nervorum tendentia, contra hinc vici situm, dolores vici situm sopit. Sunt etiam qui labendam exhibent lateris aut erit dolore laborantes, verum recens sitiosus, rancidum etiam saltem & rancidum erant, & plus quam par est calidum.

De Linum fatiata.

CAP. XXV.

**L**INUM sive sitiosum situm Linum similitudinem ac speciem quamdam habet: erant à hinc vici sitiosus, circa quos angusta sunt foliola, velut Linum sitiosum forma similes, sed à quæcò minoris, & haudquam carule, sed colore sum: succiditur rotundo quoque capitula, sed minor.

Hud

Lana Sylvestris.



Hanc procul a mari, in partibus herbosissimis locis, in montibus regibus angustior, velus in Narbonensi Gallia.

Latro ac Turbo feret, feris quibusdam Lina.

Lanam appellatur Sylvestris, quod non fit, sed sponte exortum de Maronum Lina, quod maritimum vocant, in flamma diduci & aliud posse referunt.

Sicut vero & alia quaedam Sylvestris Lina à C. Clusio diligentissime descripta in saepe Hispanis observata.

Primum foliis reflexis esse latiusculis, mucronatis, 1- longioribus - ramulis fastigio, ut Heliotropij masson, reflexis, foliis Linnæi in omnibus capitulis & feris similibus.

Alterum angustius, foliis, capitulis, & feris Lina in omnibus.

Tertium perperam vitium: foliis angustis, 3- subulatis, & radice reflexis.

Reperitur in Hispanis primè de tertium: alterum in Gallia à hac procul Latetia.

Ceterum Sylvestris hæc Lina nullum in medicina usum habent, facultates idcirco eorum incompetit.

De Cannabis. CAP. XXXI.

**C**ANNABIS caules profert rotundos, pro-  
ditos, naves, quinque aut sex pedes altos,  
als compluribus luxuriantes, quando videli-  
cet, sua sponte Sylvestris exat: via vero in agros

Cannabis feracior.

Cannabis ferax.



Latetia.



ferunt, ramis mollibus, omnino paucifloris, folia ex dura ferri, aspera, subrigida, & fissilima; aut grave odore, aut tenui, septem, aut pluribus alius similibus herentibus conseruatis, quorum singulata angusta, oblonga, ac emarginata, & per ora serrata. Semen ex alarum & foliorum sinibus, uti romani in America iam, medulla refoertum candida, radices multas & debas habent.

Est in huius genere quedam sterilia, flores tamen profertens purpureos, herbaceos, roscemum coherentes, sed sterile & vasiformes: alia verò semina fecunda, cum floribus et conspiciuntur.

Est et sylvestris quedam Dioscoridi Carnabus; eadem de Malaxi sphaeritis, sine alia specie, aliisque in omnibus huiusmodi inter Malaxia.

Solum autem Carnabum, ut Columella scribit, pingue stercore omniq; de rigore, vel pingui atque humidum, & aliis huiusmodi deponit. In quadrum pedem fertur, quia sic semina Ancharum exortunt, quod est vitimo mense Febuario, circa ferunt, aut qui ante Calendia Martia: nec tamen vique in equinoctium, si de pluuia casti floris, improbi ferunt.

Apud Belgas, hoc arare Antiquus in eorum regionibus circa Martij diem etc. nec nisi Carnabus Martio ferat ac Aprilis.

Græci *σπέρμα σπέρμα* nominant: item *εργαστήριον*: Latini Carnabem: Officia nominantur: Germani *parn* *parn*: Itali *Carap*: Hispani *Casoso*: Galii *Chayer*: Britannici *leap* dicunt.

Semen Carnabum, Galenus in lib. Dea iumentorum in facultatibus productis, coactis et dissicis, stomacho ac caput nocet, pernicius est iuoc.

Troscus  
m.

Sunt tamen, qui eo fructo cum alia magis velle: *Τροσκύλλον* voco, et i quibusdam, volu peris inter bibendum excitanda gratia, addunt. Multum autem calidum, propter densitatem, paulo longius, caput ferat, vaporem sursum ad ipsum mitem calidum simul ac medicamentosum.

Plures item extinguit, ut lib. De medicamentis facult. adcoque desinet, ut si pleuriam edunt, generatim exsiccet.

Susca ex recentis herba conuerserit, seu in doloribus, Dioscorides ait, utiliter, ab obstruptione, ut multi vident, Galenus addit, nana.

Rustici in Belgis semina conuulsi medullam, ac liquido aliquo et pacillam, istro laborantibus in opus mala, exhibent, & crebro non ab lique periculis, si quando ex soli obstruptione, utriusque fructus coarctat. Apud nos sellis mouent, & talis per corpus huiusmodi promouet.

Gallicus Martholus in hoc sermone, ac, ostendit, reddi.

Foenugracum.



*De Foenugracum.* **CAP. XXVII.**  
**CAV. 1.** Foenugracum creta silerata, tenuem, vixit in, etia cretina, in alio ramisque distitit: folia pinnati Trilobis similia, rotundata, carnes ac mitem, que superiore parte sunt, inferiore verò ad cretam inclinant: flores et semina vixit, que candicantes, Lapini floribus minus, si quis longas, graciles, angustas, infra cretam totum recentius, in quibus semina non magna, forma oblonga, angustola, dissidens, que resicam cum grauiore quadam munda dicit, mitem tenui & candida.

Serunt in Belgis in huiusmodi creta, & quidem Venetia in in agris cretatis. Latini possit folium, vixit etiam, et Theophrastus et, mitem.

Duo tempora fructum habet, auter Calimella, quorum alium Septembri mitem, cum pabuli mitem ferunt, istem debet quibus Venetia, circa equinoctium: aliter in mitem Lixum, et istem, vel Februarij primo, circa mitem feruntur.



Scratur in arena, & post fluvium quodam autumno, et hyeme, ac primo vere, cum dilapsa  
 beula defecerat, bulbis præbentur.

Vulgò in Barbantio *Sparis* appellatur, atque inde Latine *Spergula*. Normanni *Polygo-*  
*lum* nominant, quòd laibus abundantiam bulbis promoueat. Non est tamen *Dactyloides*  
*matricariae*, quòd multis ab hac differt.

Pulsis, ut dicuntur, causa incerta, nec alium usum, quòd sciam, habet.

Semen vomitorio periculosè humores educere plerique referunt, effus tamen à gallina &  
*carduibis*, quæ non solum circa noxam ad ipsam subleuant, verumetiam, hoc pulx, à nox  
 plara, & citius excludere creduntur.

LIBRI SECUNDI PENTADIS QUARTÆ

FINIS.





nes aut, in Hordemonstrant. Germanis minus cognata est, cui tamen & alia vna non desunt, siugibus molesta.

Græci *αγλαψ* dicunt: Latine, *Panicula*, *Felluca*.

Daptemidæ vni obnoxiet, Galenus sicut quod ex gustu patet, leuiter enim est acris verum & ex eo liquet, quod phlegmonem induratum longepus facit.

Medicus, inquit Dioscorides, herba aglapis, & dentibus dicitur, cum farina impolita: Succus ad eadem fertur, farina adhaerere & retlectat.

*De aliâ Fellucâ. CAP. III.*

**R**ERUM VNA, verò & in Germania & Belgij agna, quæ ad *αγλαψ* sine nomine similitudinem accedunt.

Prox Felluca solo quoq; Tritico fædit est culti tamen teretes, spica sine sube Acaudata: graua oblonga sunt, laticia, fædit, folliculis inclusis, ac teretes capillares longiorque anthera habere.

Non modicum Hordæo, sed & cum Scabulo frequenter exaritur: possim in eis ignis constituto haurida fuisse: aut agri sine calambæ, ut plerumque autem, dicitur.

Aliqua Felluca culmis folisque Scabulis, culmos obnoxiet Tritico Hordæo vna sunt, a

quorum si non o velato effusis pondentibus, Auenæ prope modum similitudine, sed immo-tes æstusq; constant. Semina oblonga sunt, longitudine graua Scabulis, sed angustiora, &

Felluca prior.

Felluca alicia.



Pharus seu Lolium maximum.



Bromus herba.



maxima, & uera q̄ modo, que membrana sita e  
viresca parua, conuoluta, & quibus eam in  
area tenet, pendula.

Propos. Facilis est vitio, cum alia eam fro-  
mens, aut non aut rarissime reperitur succul-  
ent, veluti de alia hanc generis, perambros flo-  
quentes, aut, hycensque confusioneis cla-  
mentem ad tepidam.

Praxim. & glosop esse speciem sane apparet. i.  
nec improprie idem d. & Festuca dicitur. Bra-  
bantia & Pharus eam appellat.

Alteram Germani Doct. & hinc vocant: Bra-  
bantia dicitur: Latini Festucam aliter non ma-  
le quis dixerit. Nam inter ea que frequit simi-  
litudinem gerant, aliq̄ mentis infestare, ma-  
ximam ac leuissimam est granum, Festuca ea  
de causa simillimum.

Sunt autem facultates harum Festucam  
incognite, & nondum exploratq̄ vitia.

De Pharus. CAP. VIII.

**P**HARUS est culma, folijs, spicisq̄ Lolio si-  
mila, singulis tamen in scorbutis etrosi ha-  
ber malior, breuiter, geniculatus: folijs floribus  
minoribusq̄: spicis Lolij, sed minores,  
peruicaces, breuiores ac rariore.

Nascitur in aruis, secus vias, & in uis fero-  
rum uicis: in Italia & Gallia frequens & ubiq̄  
fere obsita: reperitur etiam in Phoenicia & E-  
buseram similia.

Quod Galesa à phoenicio colore dicitur. La-  
tinetiam Lolium rubrum & Lolium ma-  
ximum: Pharus floridum inueniam nuncupari  
sunt.

Appellatur autem Belgii Hordeum aut: **Triticeum**  
reum maritimum ( uelq̄ **staph. reum** ) & aliud **maritimum**,  
omnino herba perua, hinc ac hinc, fre-  
quentibus hinc usque culma, dodrantis altu-  
tudine, folijs angustis, quod spicas pigras com-  
phares, frequit in aritha etrosas, Hordeis simi-  
les, sed breuiores, tenuiores, mollioreq̄ ma-  
litate ferat uias, nullas plane uias ac omnino  
uicis.

At Pharus, ut Dioscorides scriptum reli-  
quit, uis habet, ut in uino austero potu dia-  
theticis, frigoris ex uero profusum, & co-  
piosioris uis fluxum silit.

Sunt etiam qui sanguinem cum suppresso  
prodare, pharus lane inuicem & copiosi  
illigam.

De Bromo herba. CAP. V.

**B**ROMUS herba Auius & glosop similia  
est, habetq̄ se ipso stylacitis quodam Aui-  
na, multiplicibus enim geniculatisq̄ culma,  
folijsq̄ eam refert, licet uisq̄ memon-  
bus, uba uis, an hinc ad priores, longioresq̄  
habet, radice firmata copiosa ac tenui.

Herba natura sua in totum stylacitis, afflato  
secus uias & apta in margines reperire.

Alpestrana.



Triticum vaccinum.



Nominant eam Græci *Ἐπιπέτριον*, et illi  
Eromum herbam, ad distinctionem *Αυκτου*, quæ  
Græci quoque *Ἐπίπετρον* aut *Ἐπιπέτριον*.

Excitantem, Diokondes vocat, non ha-  
bet. Dicoque quæ cum his ratione in aqua dæ-  
nat, colitur, deinde mellis succidam admul-  
tur, rursusque decoquitur, ad liquidum mellis  
spissitudinem facit ad ventum coctum & spi-  
dit vicia; hinc eo humore imbuta verius  
indico, alijque unam Aleon adhibent, hoc me-  
do vitantur sicut & cum *Βελβίτι* hanc modo  
coctis, ad ora grossocolentam.

Est verò & alio quodam quorundam indico  
herba *Ερομια*, *Αγροστία* videlicet altera, infra  
descripta. Quam nos non *Ερομια* aut *Ερομ*  
herbæ speciem, sed à voce tribus tantum lo-  
tuno Græcè ac *Αγροστία* habitam nos alijque  
viticum collatione adhibemus.

*De Alpestrana. CAP. VI.*

**A**LPESTRANA generatim calis fi-  
lialij frumentaceis similibus, calis tu-  
men habet brevis, foliaq; inermia & angu-  
stiora: Spica eius nec acuta nec adfusa est, sed  
mella, hirsuta, densaque linguæ conat,  
haud multum distans vulpam cauda, rotæ  
& orem obtinet.

Nascitur in arvis vni cum frugibus istis,  
reperiunt in planibus Gallie, præsertim Na-  
bonensis, agris.

*Αλπεστράνη* Græcè *Throphiadus* nomi-  
nat, Latine *Caulium vulpæm* dicitur Gallie  
*Leuon de remard* vocatur et sic dicitur *Throphiadus*.

Nihilis, quod sciat, est vna de viciis cum  
eius, *Throphiadus* vel *Pluriss*, nihil *Erpæm*  
reliquere.

*De Triticum vaccinum, seu Malanym.*

*CAP. VII.*

**V**ACCINUM Triticum, caulem perco-  
bularem aut inuicem, in alia distinetio-  
ne oblonga, seu in nana, nigricans, per orem fe-  
runt: spica in summo caulem lato, castis, a-  
spice pulchra, foliorum florumq; purpure-  
rum plenas, quæ, posteaquæ desiccata, vi-  
rent, ac complures folliculos lato profertur, in  
quibus bina vt plantam formæ, Triticum si-  
milia, sed inermia nigricant.

Est in arvis vni cum *Triticum* ac *Secal*, &  
lego potissimum perquis ac viciis alijs. *Throphiadus*  
ex *Tunco*, aut *Hadco* vocatur  
natis aut.

Vni cum frugibus floce, & ad marem  
peruenit.

Germani *futres* (sic) hoc est, *Triticum vaci-*  
nam aut *betonum* in uicibus *leuon* *scaphi-*  
men: *Barbata* *floris* *bloemen* vocantur.

*Galenus* Græcè *μαλάνυμον* dicitur, quod si-  
cut, nigram *Triticum*, & ex *Triticum* quoque *ma-*  
lanyon

Vilago.



Craus prinosi generis

ratione generis, sed praesente quàm plurimum à Loto relinquitur.

Theophrastus quoque, seu insector Melampyrum at, utiq; sicut Loto generis, & capotentium.

De Phalangio. CAP. VIII.

QUAM seciores Vilagnorum nuncupant, Aeneas de Tunc proprio morbo dicitur esse, spicae hinc rubicundae, perisquam perfidè & vagantibus erumpere queant, anteflora. Marcellus hoc vitio spicae, & atro palare obfidetur.

Nascitur Aprilis & Mense Martio, cum calidissima crebris incóstante, aliis turbata, aliis fœca, siccitateq; fuerit, tunc enim spica humore madida, à solo sereno corrumpitur, ac quodammodo, vitioque, aduritur.

Germani vulgò hanc : Latine Vilagnum appellant. Videtur igitur quodam Latine vilago, ac rubigo dicta, quae, veluti Theophrastus ait, corruptela quaedam est rubiginis humore, ac coactura quoddam vitium cretaliuro scintillam, frumicosa tamen magis quàm lepanina infestare: frequentissima haec in tosiso traditur, non usibus, ac perfertim non habentibus: è diversis causis ea, ventosi & excessu. Gignitur plurimum.

De Craus seu Arachis.

CAP. IX.

FRUGUM, ac frumicorum precipuè vitium 1. quoque Craus dicitur Arachis esse, cauliculos

Craus alios generis.



Y 3

prinos







similior videtur. Nam Aphace, hoc capite de pella, durabilior est, ac duntaxat afferri potest.

Est item & Aphace apud Theophrastum, ex oleo cum & mellea, eorum rariore, habuit gustibus & virtute, quae & cum his Aphacis nihil habet commune.

Carorum Aphace, ut Galenus lib. De facult. simplic. medica. ait, faciliorem obinet ad fructuam, sicut & ipsa Lentiscula sed & finaliter ut ipsa Lentiscula edo. sicut, verum ipsa quae illa concoquitur valentius virtutem deficiat, & moderatius calens est: his autem hanc dulcissima de Aphace & Croconides quoque scribit.

Semina, neque adstringendi vim habent, quae propter stomachi & alii fluxiones tolli, hanc & decoda Lentis modo usum.

Hanc autem adstringendi facultatem non vix Aphacen, quam de sempiternis, habent, esse experimento cognovimus.

## De Hedyfaro.

## CAP. XIII.

Hedyfarum praerans.



Hedyfarum alterum.



**H**EDYFARUM caulis promit à radice multos, cubitales, rotundos: folia oblonga et multus Lentis foliis rotundioribus, ut Aracha, Vicia & similia, congesta: flos in curvibus, ut in quibusdam oblongis pinnis, nonnihil securus, in quibus minima complura, rufa, & ardua angulata ferrea effige.

Est huius & alterum genus, spongiæ caulis simile, verique tamen manibus & hinc breuiore sunt & magis securus, in quibus & minima quadrangula, acipiant quoque sicca emulanti.

Nascitur Hedyfarum, in orbibusque, in Hordeis & Tinctis Galenus Lentis vixit esse, eoque vix eam ea tractantibus. De stomachi facult. scribit, idem testatur Plinius. Theophrastus autem, cum Aphace esse refert.

Primum in Germania incultum non provenit, flos in hortis Mase ac hinc in montibus alterum sui spongiæ, plerique superioris Germaniae ad ipsa & apertis locis est, Geloni in hortis Germaniae teste.

Genus hoc, siue legumen siue terrarium frugum viciam, Mœney & maudo totum, Lentis à lentis figura secundariam. Officium incognitum est.

Huius item, Galenus lib. De simplic. medicam. cr. facultat. vi. sit, unguentum & fibro-

Ferrum equinum.



lum apparet. Quamobrem in potam gratum est fructu, & viderum distractionem expugnat idem perficit totum fructu germinat.

Dioscorides, fructu etiam in pota commoventur ferri, & ardentia ad mitteri, ante velle totum, exstant, cum molle apponitur conceptionem impedit.

De Ferris equinis. CAP. XLIII.

**F**ERRUM equinum vulgò Italorum nuncupatum, tuberculis habet multis, serua, & procumbentia: folia tenuia Hedysari imitant. Stere fecundum ramulos paruos filiquas deinde oblongas, luteo se nite, & non rari recurua, quibus vna lacere, profunda, rotunda, ac firmo sit incisura, foliatu equo firmam quodammodo per se ferente, oblonge radice longissima est.

Provenit in calis quibusdam & apicis Italiae & Narbonensis Gallie locis.

A ferris de velle luteo vulgò nominant. Latine Ferrum equinum dixerit.

Tota amarum est, & Hedysari natura affinita.

De Sylvestri Foenogracæ.

Foenogracæ Sylvestris plantam.



CAP. XLV.

Foenogracæ Sylvestris plantam.



**S**YLVESTRIS appellatur à Trago & recentioribus Foenogracæ, multi, rotundi, & incompertis caulis: folia ei oblonga sunt, veluti Ycaie, singulis particularibus tamen incompertis, ac rotundioribus: floribus foliorum sinibus procedunt, albicantes: illique

que oblonga sunt & aliquantulum recurvata, Ferruginea sunt, sed minores, in quibus flo-  
men angulosum, superius versus Radix longa & superius subulata, quae non facile interminatur,  
verum singulariter primo Vase regerminat.

Reperitur in vraya Germania, locis sylvestribus, opacis & incultis.

Germani *Waldweiffheim* Belgae *Wald frugula* id est, sylvestris Ferruginea appellat.

Nullus in medicina, aut cibariis, quod scitur, usus.

1. Praeter istud verò & aliud sylvestris Ferruginea recenset. acis oblonga, Ferruginea  
collegamò dirubos, vepose etiam trum foliorum. folia figularia habet verum Trifolij ma-  
du cohaerentia, atque in qua & per ambrosiam crenata. Flores perpaucos, albidis truncorum  
legum non perfimilem figurae, deinde ramos, perios, parvulos, oblongos, non quadrifli-  
mali ab arborum foliolorum exornes, in quibus semina congerunt.

In Hispania plerumque incultis locis sponte exoritur Ferruginea sylvestris accepta.

Facilitatem aut vilitatem potè, nobis cognitam, nullam habet, in medicina via.

### De Galega.

Galega.



### CAP. XVI.

**G**ALEGA caulis conflat multis acro-  
tis folia Anachi minoris ac longiori form  
speciem sunt, colore aut carulei aut candidioris,  
si quae forma oblonga, potè de anguste tri-  
dix brevia & lignosa, in ciliis fibris habet, & du-  
tissima est, aliquot contraria videtur primo Vase  
regerminat.

In Italia passim locis pinguibus, humilis, &  
prope aquarum rivulos potè procreat in Ger-  
mania verò & Belgio non nisi rara.

Itali Galegam & Roram capensem, com-  
mune corrupte Galegam nominant. Heronymus  
Fracastorus herbam Gallicam, Herodotus  
*Asyris*. Appellatur verò & alia diffinita base-  
mentibus in diuersis locis, ut Galicam, ut  
et sunt: *Castrocastrum, lanca, abruca vel car-  
na, montana, ferrata, caprea, herba, &*  
*Ferruginea sylvestris, & velle lucida, &*  
*graeca.*

Quidam Onobrychiū in veteribus em-  
potam esse iudicant, alij Glacern, aliū Pa-  
lemoneum esse volent: verum amba, ma-  
tam Petri And. Matthiolas in hinc commenda-  
tur, quā singularium desinprobat in Des-  
tinde memorie mandata, ac scripto usque con-  
tradicit quomodo ad id de usque Galegam  
lygalen esse autem, & Galega nomen Pa-  
lygalen hanc, ipsa quoque Polygalen descripto re-  
pugnat: aliorum in de minor Galega est, quae  
in quibus frutes paludum tantum altissimas possit.

2. Galega non tam haec & alia quaedam, alia vel non Galega, simul ut per hinc, quae caulis,  
folijs, Onobrychi, cum emulatur. Cauliculis haec est verusibus: folijs oblongis in ciliis ca-  
paeolis de lineariibus, Anachi similibus flores de speciem purpurea carulis sunt: si quae verò  
parat, latius folijs, & ferrata in his partibus, Vase innotet. ralis durabilis quoque innotet  
bus sunt, primo Vase regerminat.

Nascitur subinde in locis ut circa margines agrorum, frequenter autem in pratis sicut  
fossas, florum ac matorum hinc. totentium opis.

Medici teste usque haec est, Viciam sylvestrem appellant: nam Galegam quaedam species vocant  
Germaniam ad usque quae ipsam nominant: nam Galega quaedam species vocant.

Potè Galega, ut Bapula Sardes & alij scriptum reliquos, ad omnes pestilentes morbos,  
comitis ventis innotet, & verum assumpta efficax est: remedia quoque est, ad omnes  
malis innotet morborum cum morbis, tantum alia, & facto epoto & herba carulis si plaga impo-  
sita. Potè etiam consellit, ac comitibus morbo laborantibus, speciem durabilis quoque innotet  
susceptis potè esse ferat.

De Onobrychi.

CAP. XVII.

Onobrychis.



Quam Onobrychiam hoc loco nominamus, caules proferit à radice multos, cubitalis, non ita quàm sponte crectos, sed procumbentes, & per terram teptantes: folia Galega similia, tenuiora tamen, subius albicantia, ex pluribus angulis in acutum definituribus, coarctata: flores in longicaulis spicis dilatis rubent, fructus ochroleucis, asperis, pluri, ac subrotundi.

Pluribus superioris Germaniae locis erit, circa Lunam, in quoGefnerus, in pectus abundant in Bohemia agros fecit: semina, per quae plura delabitur aqua, frequens est apud Arabum & Flandros ab herbarum studio in horti sibi inde ferunt.

Augulo cum flore & fructu reperitur.

Antiquis recentioribus herba est, à veteribus autem de *Onobrychi* dicta apparet: quae enim de Onobrychi apud Dioscoridem, aut Plinij reperitur, ea omnia hanc maxime communitate videntur. Scribit autem Dioscorides quidem sic:

Onobrychis folia habet Lentis similia, longiora caulem dodrantalem, florem phacelicoem, radicem parvam: nascitur in humidis & incultis. Plurima vero hanc in modum.

Onobrychis folia habet Lentis, longiora parvis: florem rubentem, radicem exiguam & gracilem nascitur circa fontes.

Quae omnia & singula *Onobrychi* hanc herba habere evidens est. Quam ob causam & cum veterum esse Onobrychiam maxime dubitare videntur.

At Onobrychis, ut Galenus sibi. De facultat. simplic. medicament. scriptum reliquit, radicem digerendamque vim obtinet, proinde folia eius virentia, cum maxime imposita ad morbum conspiciunt phymata digerunt, arthritide vero si in vino bibantur, stranguatur sanant. Quae etiam sudores elicit, cum oleo mundum.

Quae & de Onobrychi Dioscorides quoque haec verba perhibet: Virem habet herba phymata dissolvendi vire & imposita, cum vino vero pota stranguriam sanat, cum oleo virem ista sudores movet.

De altera Onobrychi.

CAP. XVIII.

Ad Onobrychiam superioris capite descriptam proximè accedit alia, tenesit inter Securidaca relata. Sunt hinc multi à radice cubitalis cauliculi, procumbentes ad hunc proserpentes: folia è multis congesta veluti Lentis, sed quàm Onobrychis superioris latiora: foliula veluti Gennifae, minores, elegant colore rubent, speciosa digeste succulentia factum asperum, spinosum, plura, clypealis exiguissimales, in quibus limen, minus quàm Gennifae, radix fasciata: de matura.

In hinc Belgij apud herbarum studiosos conspici interdum contingit, qui in regione sunt nascitur, aut qualibet locis gaudet, nondum cognovimus.

Falsum qui ad Securidaca genus referre videtur. Securidaca nomen habet, quòd lentis cum angulosa fecerunt arriolentur: ista autem hanc non fert. Cum Onobrychi superioris plus habet affinitatis: quamobrem & alteram idcirco Onobrychiam nuptissimas.

Non desunt vero qui velint Helicram esse Aegyptiam: Dioscorides enim duo desin- <sup>stent</sup> sic Helicra: virem ista & Enula europaea vulgò dicitur: alteram aut <sup>stent</sup> Coccum in Aegypto gigni herbarum esse caulesibus multis, Scopylla modo per hanc non perhibiti.

## Onobrychis alba.

Helmont  
Thymus  
Helmont  
Thymus



Terra glandis.



penibus foliis veluti Læti, sed itegerrimis, & ad castitatem multo radice lutesca, digni parvi casti-  
dum dicitur, in ferat reman, superius crassa, cortice  
veluti nigro, & viscoso, in marginibus collibusque.

M. erant vero & Theophrastus Helium quod  
epaphrositum esse visert, & lignosum, & macul  
lino arena cum foliis ac floribus odoratum.

Facet de monemone Helium Phrasitum, cu-  
cap. x. quod ait fronsam esse huius seipropri-  
tatem, & dronali bus comitibus, foliis similes. In  
pello. Sicut autem hanc vna vel duodecim spes,  
retinqueas diligenter operaque vnde dicitur ha-  
mum addendum, si motu le conueniant, non pos-  
se Onobrychiam alteram, Heliosam Graecis  
esse, cum odorata non sit.

De Terra glandis. CAP. XII.

**T**ERRA glandis exilibus & infima rudi-  
culis excurat tota terra & parua, oblon-  
ga & tenuis adnascuntur pediculis, qui in re-  
ticulari desinunt, quibus propi alij huius com-  
plobantur atque apprehendunt. florifera  
caulibus, pello similes, sed minores, ex parua  
rubent, odorati ad ingrem, quos parua, oblonge  
siliquae succedit, in quibus huiusmodi quatuor-  
nive tota rudi, radices traffic, oblonge glandis  
forma quod huiusmodi similes, sed multo minores,  
fons nigri, utos ad huius, sapore sicut Caltari,  
à quibus inferas longas rudi, siliquae dependit.  
In curia ab alijs & alia siliquae, vna cum rudi  
tenui, quibus oblonge siliquae parua alia oblonge  
siliquae glandis adnascuntur & multiplex spes.

Protractus in agris frumentariis, si vna  
spes frugibus, tum circa marginem in ro-  
boris ac sententia. Repertus in vna rudi ac  
inferior Germania, in Bohemia Belgis locis  
pluribus, &, ut Rucellus testatur, in Gellio-pog.

Seri & ferre de radice potest, sed rudi  
tenui perferunt, vna cum glandis, in pluribus  
tempore multiplicatur.

Ceterum hanc simile & aliud quoddam reper-  
tur Legumen caule veli cras, rudi, subcol-  
let, anguloso, vicinis frugibus sili implatur: fo-  
lia parua, veluti superius, hanc colerunt, pe-  
diculo in capitulo desinente: siliquae oblonge si-  
miles, sed colere lates. radice tenui sili, rudi-  
berites glandis rudi hanc profert, dicitur autem est.

Sicut ararum magnas rudi in Braba-  
na locis gignitur.

Florent Iunio & Iulio. post messem ab-  
ducuntur ac colliguntur rudi hanc glandis.

Germania rudi hanc rudi hanc quibus  
ad rudi hanc rudi hanc rudi hanc rudi hanc  
entiam appellatur, & sili hanc rudi hanc  
hanc est, rudi hanc rudi hanc rudi hanc rudi  
m rudi hanc rudi hanc rudi hanc rudi hanc  
dici, oblonge glandis rudi hanc rudi hanc  
sili hanc rudi hanc rudi hanc rudi hanc  
glandis, sine rudi hanc rudi hanc rudi hanc  
Graecis quidem gignitur.

Elitarem & alius *Trigonotis* dicitur, qui dicitur, & *Trigonotis* dicitur, cum quo accretit, & glandes non continent, vapore & forma non parum, verbis autem plurimum ab eo differentes. Nam *Apothecium* Tridyma species est, & radice sua stium verumque movet, glandes vero alia modo consistunt, non locum *Astragalus*, cui similes videntur. Talorum siquidem similitudinem quando gerunt, ac formam etiam quodammodo referunt, vires facit: rotundata, ac loca non *Raphanidis*, maiores tamen, plures quoque *Trigonotis* sunt, ipsa saltem, sibi in se invicem multiplicata habent, & triflorae dicitur, ac sepe rotundata.

Però omnes glandes coctae ac in cibo assumptae, diffusivis quidem quam *Rapae* sunt *Pulsatillae* concoquuntur, sed aliam vim tamen non minus quam *Pulsatillae* subministrant, manibus quibus illae videntur, modis defendunt, ventrem quoque adstringunt: crude verbis est tunc cum diffusivis concoquuntur, & signis febrem defendunt.

Tempore autem obrem calidam quidem modo occurrunt, sicut verò paulò inferiorem, cum non cogua ad frictionem curandam, unde etiam non solum venis fluxus, sed & sanguis fluxus, praefertim ex vena, aut per vesicam reperiunt.

*De Astragalo, & aliis.* CAP. XX.

**A**STRAGALUS, ut *Plinius* tradit, folia habet longa, incisis malis, obliqua circa radicem: nec aut quatuor foliorum plures: florem *Hycinthi* radice villosa, impunctis, rubens, praedat.

Doctores vero, *Astragalus*, ut parvulus in terra fronsit, folia & ramos *Cerei* similes, & *Asparagus* parus, radice rotunda veluti *Raphanus* grandis, propagines habet firmas, negras, densas, veluti crenata, sicut se multiplicans, quibus adhaerentes.

Nalica in petrosis, aprica, & vili in collibus: *Plinius*. Aut, ut *Celsus* ait, in ventosis ac montibus. *Dioscoridus* in troglodyta addunt, quosdam ad est, opus. *Coprosi* in Phoenice *Acadum*, et *Galenus* & *Plinius*. In *Dioscoridus* exemplaribus de *Asparagus* vlti *Asparagus* legitur: ut *Mentha* *Aegypti* creitas est, in *Anadia* vero nulla.

Radice habet *Astragalus*, inquit *Galenus*, adstringentes: quomobrem etiam ea numero aliam in vena est, quoniam non vena vetera glutinae, & stium fluxus contatum sicut, si quoniam vino decoctam radice bibet.

Eadem quoque de *Astragalo* in his memora *Dioscoridus* prodidit: alia fluxum, aut sicut radice in vino pota, & vna mosca facit ad ventris vena sicut in pestis. sanguinem supponit: segrum utem propter duritiam tunc dicit.

*Astragaloides.*



*De Astragaloides.* CAP. XXI.

**C**AP. XXI. *Astragaloides* eriguntur, & cubiti altitudinem petiit, angulati sunt, tenuis, densa, & in alia dicitur: folia quibus *Galathea*, ex multis ad vna collum collectis: *Heleni* elegantia similitudine, & *Caroleo* parvula, minoris quam *Vicia*: sicut ut succedunt teretes, oblongae, nigricantes, ut *maxima* *Arachi*, in quibus semen *Vicia* tamen, tamen vero quibus *Arachi*, sed non perinde rotundum ac *globosum*, sed longum, & non absque fibris, aut descendit, & multo tempore datur, hyemas frigorisque patens.

Ad hortos *Belyi* aliunde dicitur, peregrinum est legumen.

Iuno ac etiam seruis flores, sicut interea perficitur.

Quod cum *Astragalo* similitudinem habere *enilimantur*, *Astragaloides* nomen accepit: nonnulli *Erugm* sicut appellat.

Non desine vero & alia quaedam legumina, sicut ut profertur, quae & *Astragaloides* dicitur possunt: horum cognoscere scapulis requirit in *Caroli* *Clusii* observationibus diligenter. *Astragaloides* autem quae sit facultate dicitur, aut cuiusmodi vult *papaveri*, & *perni* modo est.

*Trigonotis*  
locum  
radicem  
aut.



De *Anthyllide Lentis simili*.

CAP. XXII.

*Anthylla Lentis similis.**Anthylla Lenta Lentis similis.*

**D**VIFLEX Dioscoridi Anthyllis: vna Lentis similis: alioa Chamepitys seu Asperu refert.

1. Ad priorem descriptionem proximè apodix herba quaedam humilis, caudicibus cernis lobatis: folia Lentis modo ex plantis formata, utraque verò mollia, tota lanugine ramosissima: strobili in caudicibus subigu laevi, complures, veluti in umbellacum erigunt, post quos filique parvis, in quibus semen exiguum, radice tenui, duracula. Talem siquidem proteram Anthyllidem esse Dioscorides refert: folus siquidem Lentis similis, sed mollior: ramulis deorsum abbas sed ut radice parva tenui. Qualem est quam descripsimus.
2. Nec tamen & illa ab Anthyllide priore similis modò abhorret, quæ à C. Clasio in sumis obtinuit omni liba pro Glaucis de pingitur. Ternis aut quaternis hec adsumptis in caudicibus, incanis folia quos comest frustis e pluribus ad unam collam coherere debet velut Lentis, superior parte herba de colore virescente, inferiore vero lanuginosa, & albicante strobili in sumis virgulis enascens aut purpurascens: radix tenuis & cardida.
3. Prior hanc circa agrorum margines plerisque Galliae Narbonensis & Angulora, post Lobelium, reperitur: reperitur & in longas à mari sine regionibus, veluti in quibusdam Germaniae, & Persiarum agris: Baskoniae hortenfis est.
4. Altera in Clusio refert à se in Asia Thomeasibus reperit, infra Salamancam Hispaniae, procul a mari occurrat.

Utraque ad Anthyllidem priorem referenda videtur, quæ Graecis *Ανθύλλο* & *Λέντις* similiter Anthyllis: Aucopina Zabura appellatur cap. 711.

Ceterum quòd ad fiscaliam attinet priore Anthyllide, ut ut difficilioribus & rarioribus plantarum prodesse duntaxat quatuor ponderis epotam, seu bis Dioscorides: traxit verò cum rosaceo & lacte vici inflammationes emollit impositam. Piora verò rarioribus tantum, totum in hisque & secundariam morem in vino potam refert. Galenus autem utraque modè debetare ait.

*De Limodori seu Orobanche. CAP. XXIII.*

*Limodori seu Orobanche.*



**L**IMODORVM caulis ut seip. pedalis aut maior, tuberosus, fibulosus, fragilis: flores secundum caulem, parte superiore nactus, subcaudis, aut sublimi, Vrinae interea floribus haud multum absimiles. floribus succedunt oblongi calypsi, in quibus semina minutissima, candidissima, & inuisa radices sublimi rotunda, turbinata, digiti aut pollicis crassitudine, forma squamis nigricantibus contextae, vitas verò subcaudis aut sublimi: quae recentis facilius habent lenem, ac facile franguntur, anxia verò curia modo duriores.

Cognitur in agris, inter legumina quidem frequentius, cum Lino quoque Cannabae, & Fomigraeco non raro: esse etiam vult eam legere, iuxta vias quoque siccisq. agrorum sepes, ut Matthiolas scribit, in Italia frequens praesens. In Belgio in arenosis circa maris litorea tum ulis, etiam reperitur.

Theophrastus huiusmodi vitum *Aulobagis*, appellat, veluti *Alage*, hoc est, saniem adferens. frugum etiam alterentem ad se trahit, ipsiusque & extenuat, & incommensuratum firmum, perfective adolefcere, non sinit. Sotomus *Amphibolus* hanc leguminariam Laco esse, *Amphibolus*, à simili radice cantu genata, ut Plinius refert: Dioscoridi verò *Agrostis* vocatur.

Est tamen & alia Orobanche, quae complexu accensum quando se, legumina Equosq. excitat, quam Theophrastus & Plinius peculiariter Orobanchem nominant.

In lenem, inquit Dioscorides, Orobanche namque est, & cum cruda tum cocta in patinis spongi modo editur cum leguminibus decocta facere creditur, ut ipsi citius concoquantur.

*De Anblan, Nectia, aliâ Limodori generis.*

CAP. XXIII.

**A**D Limodori genera referenda sunt quoque Valerij Cordi Anblanam, & quam Neotrium ex veteri male vocis significatione dicunt.

Sunt utem Anblanae folia quaedam nulla, cauliculus verò dederunt, & crochus & succo sine, & in modo firmum veritas, flores in rufis candidant, ab exiguis veluti calypsis squamis tunc, connes in rufis: & ad eandem partem spectantes, post quas parva acuminata vasa prodeunt, in quibus semina parva sunt. radices habet masculas, albicantes, succulentas, & squamis, ut Limodori connotas.

Parva & umbroso quaedam folio in Francorum, Bohemae, Silesiae, Italiaeque sylvis, ac aliis reperitur.

Vix germinat: Aprilis & Maio mensibus viget, postea desiccatur. Anblanam Cordus appellat: alij radicem squamoseam: Matthiolas Denturam maiorem speciem facit.

Facilitate autem reficitur hanc esse: radix pulso acerbis. Aquam ex tota stirpe destillatam videri Comualem morbum nonnulla commendare, si aliquando estore à iunio laturatur.

Præfert similiter & Neotria caulem absque foliis, Limodoni colore quidem similem, sed tenuiori, & minorum, ac minorum, in cuius summo dicitur veluti in parum spum copiosè, eisdem cum cruce colore, radices multo fibrosas sicut necem, & dicitur aut modo, tripliciter vnde surculos, aut radices, & vultu nostras: Brabantica lingua *Wegels* veli vocantur: Gallicè *Nectia* Germanè autem *margin* hinc appellatur.

*Agrostis*, ut dicitur, genus quoddam est, quod ferè etiam *Amphibolus* per se prima syllaba, aut *Amphibolus* potius, haud abs re, quia in incipiente, veluti *Amphibolus* dicitur, hoc



est gratorum donum: nam in palustribus & virginosis locis patenter, ac in fylis humidioribus, veluti & Anblarum, quod eadem ex causa & Anselmago esse potest.

Sunt porro & alia Lamodon genera, ut quæ à Crith radicibus cum Hypocistis, & Rapè quod passim eodem in superiore, tam in inferiore Germania Gentis committunt. Sed de his capitibus de Cistis & Geranis, sui loci agenti.

De Castella. CAP. XXV.

**C**ASTELLA plurimis lyrarum filiis similibus, idque reperitur, aliis crassiusculis capilloribus ac clavularum vena, aliis tenuibus ac capillamentorum quousdam etiam, qui statim ab ipso exortu, herbarem fruticamque ramula ac folia se implicare, acque omnibus voluminibus procrepita, comas complectuntur, tam ipsæ non tardè contenta, ut & propriam parentem suam de laqueis suis stranguant, ac ut, aut mole occurrat, quæ procreant, aut novus alimento delibute edebant. Cætera autem vel eandem sunt, vel ex ditione partu rari bêt. Flores eût Castella parvas, comas ipsos quibus filii loca veluti in bontes, à quibus semina quedam exiguâ, sed inutilia prodeunt. folia habet nulla, radicibus tantum nullis, in terra enim non pignitur, sed fruticibus herbis que tandem manifestat.

Reperitur Junio, Julio & Augusto mensibus in Rubis, Vepribus, Lupulis & Lino, maxime crassis & candidioribus, Thymis vero, Thymbræ, & alia humidioribus, ac durioribus, et Elygo, Geranis, & aliis, tenuior ac rarior.

Masseam crassioribus Officine passim Castoram appellant: nonnulli quod Lino amplexantur, podagrorum Lini doctores Castoram aut Castoram, Gelsenus Anselmago Arabesque Castis ac Castis Brabam vulgus sua lingua Castis & Castis: Germani Castis & Castis: Galli Castis de Lino, & Castis de Lino.

in Thym.

Minoris ac tenuioris, quæ dantur Thymo Thymbræque se implicat, Duo Sciden tiff-lygo nominant, Officine nomen ferunt. Alij inter quos Advarius folium Thym. Epithymum, quod vobis Thymbræ Epithymum, & similiter quod Sciba in Italia, Epithymum nominant, singularem eaque generi appellationem tribuunt.

in Geranis.

Videtur autem Castella, nonnullis qui dem hinc etatis doctis, eodem esse cum Calym, quæ

Cassia.



quam Theophrastus Synacum herbedam tradidit, ab eodem, vepibus, & alios quosdam amicitia vocat. Verum cum Cassia non solum non feratur, hoc est, herbata, sed etiam habet, sed nec herba proprie videtur, ut que longioribus in numeris cithis consistat, ut vixit hinc moribus potius sit, quam herba: nec in Synaculis Jedus quibus nec non et peritatis non visibus quidem, sed herbis utris, vel herbas fructibus, vepibusque simpliciter, cum Cadya non admodum conuenit.

Cadya eorum, ut Theophrastus ait, *serotina* Cadya serotina & Synacum quidem, quod etiam arboribus immiscetur, modo quo Vicum, Sarcia, Hypheum, Polyposium, & alia similia quaedam, de quibus eodem loco Theophrastus agit, quo de Cadya scribit. Memorat Cadya Plinius quoque lib. xvi. exemplaria quaedam Cassiatis, sed commendationes Cadya habent.

Alij Cassiam sine Cascarum, Dioscoridis Androsace esse existimant, sed quantum & illa vero aberrat, Antonius Musa Brasiliolum in examine simplicium dicit de commensationem non esse eam Androsace dicitur ac sine folia sit, alia tamen ac dicitur à Cassia est. Nam maxima Androsace est herba, breuis, tenuis, velut iuncus aut cithis, ab una radice constans plures, in quoru[m] summo, & supra nascuntur folioli, semen continentes amara insuper, totaque candida est, & non vepibus aut

di herbis immiscetur, sed è terra, Musi teste, prode.

Probatur ac vepesimilibus, eorum videtur si natura, que Cascarum sine Cascarum, Orobanchae similem, & genus quoddam esse existimant, non quidem Dioscoridis Orobanchae, sed cuius de qua Theophrastus, & quam Plinius lib. xviii. ait, circumligando è, Cascarum ac Eruam. Hinc etiam Orobanchae Cassiatis quosdam species esse videtur, Eruam sine Cassia.

Orobanchae siquidem Theophrastus Eruam esse scribit, Eruamque ipsam sperare, & simplicium compressis suo vocari, utque in hoc et similem Apocynum fieri, quod in vobis, & in Lixem in aggrediente, ac velut laqueis, vel scibus totam capessit, & cum Eruam Orobanchae, & Eruam, ut Latini Theodoros Gaza tenet.

Temperem autem, Cassia habet calidam quidem remissionem siccam vepesimilibus, & siccitatem, secundè ne mpe ordinis, absterpendo deinde facit eorum, cum quodam adhaerentia, & praesertim ea que in Rubo reperitur. Patentis enim suae, cuiusque immiscetur, siccitatem ac facultatem aliquam sibi quoque adhaerent. Quae etiam calidioribus herbis, Thyrsoides, ac Thyrsae adhaerent, calidos, siccios, tenuis, utque partem reddunt. Quae Cassiam superant, vixit potentiam mouet, & ad alia dicitur magis efficax esse habet, que Lino implicatur. Adhaerent, ut dicitur, facultatem adhaerent habet, que Rubi vobis que & propter hanc potentiam adhaerent, alia adhaerent, hancque affectus modo praesertim eorum expurgandi adhaerent, facultates simul habeat, vixit eorum in parte vixit est. Tota enim rationis hinc quae oportere esse medicamentata, Galenus lib. xxi. methodi medicandi abundè docet.

Expedi autem hoc Cassia (siccioribus vixit, hancque obstruere vixit vixit à pituitosis & vixit corruptis ac superfluis humoribus exonerat. Vixit medicamentum pellit, & omnes apocynis modo quae vixit vixit obstruere committat, succorum: siccibus auxiliatur, dicitur, vixit vixit in parte ac longioribus, vixit quartana, & propter infamiam siccibus, vixit hinc apud Seta prociem ait. Quae & naturam Cassia esse vixit, hancque hinc per alium dicitur ac efficacitatem cum. Absinthio praesertim efficaciam: nunc deinde cum vixit vixit vixit. Anticem tamen non gignit eam, sed fortis efficere vixit vixit quae dicitur vixit vixit, quod & nobis magis probatur.

Epilium, Cassiope de qua scriptum, candidum est & succum ad terram videlicet variis, qualitate praeditum, Galeno teste, accedens patitur uterque visum, & exurgendo spectandis efficaciter potenter praeditum, licet ad eos videlicet, & locis, quibus vocantur vides. Nam ut Galenus lib. xxi. methodi scribit, valentius horum medicamenta esse debent, quam mentio: uno videlicet, quanto citius videri aliter.

Operatur igitur Epilium cum Cassiope horum affectionibus abstruendum ac schemis

Crota Galii.



Fibulana.

Altera  
species

Altera  
species



cras visum etiam in. currit ad utrumque caput dolores, morbi commutatum, metastasim, & postquam hypochondriacam afficit, aliisque ab amala morbos excoctis praedit lae venena, malignis vicibus, elephantia & febri bilioventris: datur etiam vultu alacris quietatis.

Purgat humores acris & acridosibiles per antra, ut Aetius, Aethanas & Medicis scribit, nec non praeditam, Dicois deo teste. Purgat item & infancciam vespertim, quod in Thybis ac Secrebe notatur, sed facillime, ut Aethanas, est ambentis.

De Crota Galii. CAP. XXVI

**T**ERVIS & crodusculis aliter dicitur, Crota galii est folio angustate per antra emissa: flores lactes aut candidi, motus vites huius multum abstruendum, semina laeta, nitore nigra aut subnigra, in vultu laeta, que quodam veluti folliculo brevis, contingunt tunc tenuis & parva.

Est in arvis & non raro in pratis, vitiisque inutilis & vitiolis plurima aliter parit fore.

Reliqua dantur & quae rariis nominibus, & plerisque praerogativis vulgo Latine Colubagalli, & gallicae Crotae, Germanique folii. Videtur nonnullis admodum, vitiolis huius, aut Mimulus herba.

De praere Plinius lib. xxvii. cap. de Alchorolophos, quae apud nos Crota dicitur, sola habet similia gallicae: cuius plura, carum tractum, formam nigram in filiqua.

Mimulus autem herba in pratis praerogativa est, lib. xxvii. cap. xxviii.

Sed Alchorolophos similes, galia Mimula, Crota galii nosse videtur.

Qua autem haec fac aliter uterque praedita, cognoscere, curae adhuc nihil habet, cum utrisque habeant.

De Fibulana. CAP. XXVII

**F**OLIA Fibulana parva habet, caetero inferiori caetera, caetera vitiolis, brevis, quodam per terram serpentes, alio modo, circa quosdam ut Crota gallicae, sed minoris & caetero ruberis aut albacantibus: filiquae deinde huius abstruendum, parva, in quibus semina laeta, & nigra: radix tenuis & fibrosa.

Nascitur in vitiolis praerogativa herba non solum parva vitiolis, sed & acris, ac praerogativa vitiolis.

Mato ac herba mensibus cum flore ac vitiolis serpentes.

Germanorum plerique frum *rodolaly* iustitiam & bonam iustitiam. Græci *βίλας*, Latini *Pedicularum* ab effectu nominant, quod peccati ac tristitiam, quæ in præcordiis hæret, prouocet, pedicularum copiam præcipue in montibus, recessibus nemorum Filisolanum, non pauci Coliam etiam gali appellant. Cum Maritimo Plinij plus similitudinis, quam sperere habet.

Cædunt ad Filisolan & sinanthi vicia vilitate, nec non mentis, & aliunde profectam sagittam, in vino austero decocta, potaque filiter.

*De Tribulo terrestris.* CAP. XXXIII.

Tribulus terrestris.



**T**ERRESTRIS Tribulus, quem nunc describimus, caules prostratos tenues, foliosos, circa quos folia ex multis vix costis adnatis congesta, bladii sine fatis Cæcra, autem Læni totius similia fructus secundum caules, post quinque foliolorum floribus, vicia foliorum etiam, à botanibus dependunt pediculis, dum, nullum aculeum ac spinas horridi, in quibus tenent, radice nuncur fibrosa.

Apud Hæspanos in semis frequens, frugibus infestus, sed nomen, ut Plinius ait, inter tragum morbos potius, quam inter vicia pedes nuncidum reperitur & plerique, in his ac Galliar loca.

Fructus viciae perferunt.

Tribulus Græce, & Latine Tribulus dicitur, ac ad differentiam alterius in aqua mæsticus vocatur *γερνυβη*, & Tribulus terrestris.

Est autem terrestris Tribulus Theophrasto duplex, vnae folio exit Cæcra: alter spinosior dicitur. Hanc *γερνυβη* de appellat aut, tenes germanice, & semem nigricans in loco ferre illum vero *γερνυβη* sine præcoquam est. Cum *γερνυβη* autem, qui hoc loco descriptus, magis conuenit, quæ in & terræstem Theophrasti Tribulum, non omnino abest, qua nuncupatur.

*Tribulus terrestris*

Dioscorides enim, qui vnae terrestris tantum nominat, hanc omisit. Sicut siquidem Tribulum, non Cæcra sed Pteraluce, similia cruda habere solet, ac rem uera, & ab *γερνυβη*, sine remotione tenerosque ramosos per terram stratos, in quibus spinæ acerbæ & dura. Quæ certe Tribulus *γερνυβη* de, aliter videlicet Theophrasti tribulo, magis similis est, quam *γερνυβη* sine præcoquam.

Cæcra in terrestris Tribulo tenes & frigida quædam, quæ & adstringens, odore Galieno, superius fructus crascenti ac nuda sit partura, potius lapidesum renibus conuenit.

Terræstem tribulum, Dioscorides ait, drachma pondere epotus & in potibus uentris moris à vicia operatur: aut uicere etiam aduersus venena cum vino potus, decoctum cum resperant pilæ necesse.

# STIRPIVM HISTORIÆ PEMPTADIS QVARTÆ

LIBER QVARTVS,

DE GRAMINIBVS ET  
TRIFOLIIS.

PREFATIO.



**S**UCCEDUNT *Fragus* variè *Gramina* & *Trifolia*, quarum plerumq; in pabulum cedunt ruminatorum, veluti quædam ex veteri multis. Sunt autem *gramina* innumerata quædamq; species, sed non omnes utiles: *Trifoliorum* autem non pauca genera, quæ alibi vestigia possint: sed conjugeres ac similes à nostrorum diuitiis, nostrorum utilitatem non admissi. Preterea *graminam* multa, *Trifoliorum* variè quædam occurrunt genera, hæc libro completi curari sumus.

De *Gramine*, quod *Græci* ἀγρον, dicuntur.

CAPV L

Gramen.



**F**OLLIS, culmis, ac tuba parue *Hierodii* *Gramen* aliud hoc ad malecium oblinite elaboremur et sunt angusta, in acutum sub-gram, *Hierodii* quidem longe minoris, sed quædam præsentis *Graminis* duriora ac in strobis cultris rotundi, sed quædam, aut paulo longiores, quatuor aut quinque articula habentur: non spicant, sed tubam ferunt, sicut *Harand* in similibus tradit, in incassum ac rariore. radicibus serpis longis, cordatis, geniculatis, gustu non ingratis dulcedinis, sibi: in usum implentur, quæ plerumq; locis arcanis progermaniculis casualis profuerunt.

Nascitur potissimum in aruis, & agris frumentatis, tam frugum equalis agrorum vitæ ac pæli, agricolis ingratum: nam agro proficillo videlicet infuerunt, ac collechas, fluitas ne transirent excurrant. Facilius enim hec feruntur, terra obare radices res velantur: tam peritiosa est vitæ, & ingratum in remouit.

Floret æstate vni cum frugibus, sermo radices leguntur. Rari *Brabantie* *Præmontiorum*, & *Belgias*, *Græci* ἀγρον est, Latini *gramen* nomine *Gramen*: *Agro*: autem ab ipso agricola putatur, quæ *Græci* quoque ἀγρον nominant. *Appellatur* potius idem & ἀγρον, & quæ, *Sanguis* & *Viola*.

Radix *Graminis* inchoatiter frigida est & sicca, sapore dulci inftar aquæ, acie tam è quoddam ingratum ac tuberculosa, ut *Galenus* embe, obare cruenta vulnere glutinosa. Decoctura radice, tubos & vesice prodest: vrinam inchoatiter mouet: calculos suboritur pellit.

Diocondes easdem *Graminis*, quæ *Galenus*, embe vitæ. Radix, inquit, tuta & scripta vultus glutinosa decoctura eius potum ad vesicam facit, & vrinæ difficultatem: calculos edidit: circa vesicam excrescentia content.

Recentiores decoctura radicum infantum ac puerorum vermes necare, ac excludere potum, dicuntur.

Aliud nomen & *Agrostis* & periturum gramen, quod cultura folioque præcedat refert, & non quædam.

facit, sed ab eam quoque profert, rariot non tam effusam, & duratiorem & Anag. fibrillosem, parva tamen ab eam deficiente in radices eius castis, magna tuberosis, tuba nrisal de hinc nodosis, & hinc illarq; & rariot progrediunt.

Naktar illud Gramen fibrillosem in procedens locis, & non raro fecus agrorum margi-  
na reperitur.

Nodis in crebris geniculis ac tuberosis radicum nodo, Anagallis id est, Nodosum Gra-  
men, appellatur.

Mentant hinc Marcellus verus auctor, cap. xxvi. Herba, inquit, que Gramen dicitur, potest xxvii. ex vino ad mediam decocta & expressa inque colata, potest q; frangantia & vnaq; vno in vna data, adeo potestur haec in vna, ut vbi sine tomamento vna in lacem occi-  
pant, non oporteat, sed febri nantibus ex aqua sola debent.

Ex quibus verba apparet, nodosum illud Gramen, apud veteres pro Gramine proprie di-  
ctis Agrostis habuim, & aduersus calculum & vesicæ morbos commendatum, quoque  
falsè Recurretur, etiam in hinc, modo illas indifferenter, pro Graminis radibus vna.

De Gramine Nodoso.

C A P. II.

Gramen Martis primum.

Gramen Martis alterum.



**A**D Graminis generi referenda videntur & alia duo sylvatica quæ de generis que Fra-  
mentsa, cerealiaque feruntur vna.

Vnaque in illis angustis cubitalibus aut altioribus, & tribus geniculis, per raritatem fib-  
ribus folia arandanæ, pilosa, præsertim in qua culmos ambulant, & amplectuntur  
per tuba fere hinc modo effunditur, raris tamen densa, colore nigrescens, cuius singule  
fibrosæ ac vna in spica longe & perquam tenues sunt, semina q; ab vna eorum parte habet,  
Miserant, forma oblonga, quod à glutinis ac vniculis, quibus consistunt, repurgatum  
tandem est: radix vna in cerealiaque feruntur fibrosa.

Fimique Italia & Germaniæ locis incultas sua sponte erit, reperitur & in Bohem. sylv-  
tibus, apud quos tamen & in agris ferunt, velut & in Gornovii agro & Carinthia, vna Mac-  
thois referri, apud Belgas peregrinum, non nisi situm, procerum.

Germani *Synthesau* id est, Cæli rorem, appellant, Martialis ea de causa Martis gramen  
Mili



Mibi sylvestris ac spicatum quoddam videtur genus. Creditur à Leoniceo ac Ruelio Capriola ac Sargo inania delata. Sunt qui velint Flouj Gramen aculeatum esse, sed quia in omnibus brevius de serpio, affirmari nihil potest. Miltum autem à veritate recordant, qui Cynosopum esse existant. Cynosopus siquidem, ut Dioscorides ait, per terram reptat & folia est filia. hinc verò culmi erecti effurgunt, & folia harundinacea nequaquam in partem inclinant. que Mannæ gramin non esse Cynosopum euidenter ostendunt.

Ceterùm facultates Graminis istius ferunt Miltos ac Panicum simile esse videtur. Bohem cum pinguis carum siccum colatum edunt, & sic a paratum, gramin ac fasso edulatum est.

Gramen Mannæ al. terræ.

Afrorum Mannæ gramin harundinaceo quoque nataro est. calmos pinguis complet, quo sicut aquam erectos, nonnullos verò in laras & terram versus erectos atque folia ut proies harundinaceæ non iubar, sed veluti spicam firm, eandem asperiusculam. Panic paniculis breuioribus, rarioribus & tenuioribus multò, & subinde flagulatis, non raro aucto triplicem ac ex pluribus consistantem, quandoque nam herissos colatis, aliis in rubro nigricantem; in qua ferunt carduicem, darsicalum, Panicum maris.

— Frequens est iuxta agrorum aggeres, in hortis & aliis reperitur non modò in Germania & Belgio, verùm & Italia, Gallia, ac aliis Europæ prouincis.

Panicum palustre romanis, alijs Panicum sylvestre appellatur. Euasidens cum supinas genitum est, & creatum quoque singula vitam quoddam, veluti & aliud, Mannæ gramin species, ea de causa, altera.

Semen à gallinis, columbis, atque aliis auculis, veluti & superiorum, subinde editur.

De alijs Graminibus.

Gramen præcolò I.

Cap. III.

Gramen præcolò II.



**S**UNT verò & alia multa propemodum infinita Graminum genera. Ex his quadamdam menta & quæ dropedia palustre aut maritima alia parum aut nihil vtilia sunt.

Quæ palustre aut conuersantem cœcibus salis, & gracilibus quoque cœcibus colunt quorundam Loti, aut Milti, aut Panic, aut aliorum ortu in frugis, necesse est potiorum, ac sibi propriam spicam, ut iubar profertant. radices omnibus videntur, plerumque sic, capillamentis fides, paucissimi longæ & serpentes.

Nelson

Græco præsenté III.

Græco præsenté IIII.



Græco præsenté V.



Græco præsenté VI.



Natum.

Gramen pratense VII.



Gramen Eriophorum.



Nascuntur frequentius in pratis ac locis palustribus, non tamen & in montibus, & quibusdam aliis in culcis, aut desertis locis videntur.

16. Hæc genera Theophrastus vocat, hæc est, herba nominat. Est raris & raris, sedem videri, generaliter omnia herba a radice foliis, non tantis, quæ a seculo semina ferri, viderentur, & plerumque olera.

Huiusmodi autem Gramen Latini generali ac communis Graminis nomine appellant. Gallis de Phœbe dicitur: Germanice Belgæ Equæ.

Pascuntur id boues & asina, cum vinde, cum siccom & iam formate fiant.

Inutiliam Graminum non exiguæ quæque est herba. Quædam horum in locis montibus in partibus & plurima parte aquas habentibus, alia in aridis & apricis.

8. Inter palustria aut potius aquandis, & vasis est, quod Eriophorum esse appellatur. Habet alia parva perquam angusta & oblonga folia Graminis similia, inter que medius caulis & longus stylus, surculosos & forma similes, ad cuius summum una mollis, & ad eandem pendens longa, radix huius in alborum fibrosa.

Plerumque in montibus & desertis Eriophorum & Germanice locis, huiusmodi Gramen reperitur, præterquam hinc ac hinc in siccis, quædam ex ipsius innotis stylis lana candida & dæpæ.

Germanice Gramen fæcis appellant.

9. Ex eorum vero numero, que in apricis & aridis locis exsurgunt, præterquam quædam ac tenuissimum est, subinde vel palmum altum, cuius pro foliis raris sunt tenuissimæ, interque punctulæ, & tenuissimæ similitudo exsurgunt, dodrantales, aut brachiores, mollem, laevissimam, incoeruleamque spicant, nec potius passis, sine videri, profertentis. Pro calcibus aliter sunt capillis similes.

Nascuntur non in palustribus, sed tenui ac macris folis, locis aridissimis.

Spicæ huius, hinc & inde menfibus emittunt.

Gramen quæ dicitur innotum, propter eam, quæ cum tenuissimæ hinc folia similitudo habent.

Spicæ autem herba, que in Carthaginiensi Hispania gignitur, species sanè quædam est. Nam & hæc Spicæ, pro foliis, stylis innotum sunt, hinc, oblongis, ad omnia videri videri: locis quæque gignitur aridis. Plinio etiam innotum, Spicæ autem, innotum propter eam, quæ

Gramen  
herba

Gramen Leucostemum.



**A**D Graminum genera pertinet & Leucostemum gramen, cuius usus ad genus in radicibus multis, terribis, acerbis, crebris periculosis, fac de in terram nisi prope insolitibus fructibus fulciantur, procumbentia: folia ex singulis geniculata, canera se posita, angusta, oblonga, lanata, Gramina sterna bicolora. Floretis firmis caulis arumpunt plerumq, singulis suis infidemas pediculis, eandem ex aliquo tempore & angustis foliis congehi, Leucostemum floribus maiores, quibus periculis, foliulis succedant oblongis, quibus semen paruum Miliis simile: radices tenues & geniculatae, uti veluti Agrostis serpunt.

Secus locusta, agris aut aggeris, locis fructuosis ac opacis crebro reperitur.

Floret Maio & Iunio mensibus, & non raro feris quoque.

Recentiorum plerique Eufragiam faciens, verum perperam, imitatio enim ab Eufragia desit. Germani *Wagen-tröpf gras*: Brabantibus *Wagen-tröpf gras* nominant, cum *Agrostis leucostemum* Dioscoridi similitudinem habet nonnullam, quod à nonnullis *Agrostis*, à Theophrasto vero *Agrostis* appellatur. Nam solum quidem habet Myagris, quod à Dioscoride Melampyron quoque dicitur, haud multum distat, verum minus: cultus enim generalis, ab radice sua complures, & semen exiguum: consuetudo etiam naturalis, nam fructuosis quoque ac opacis locis provenit.

Cratogeomom autem, ut Dioscorides ait, folia habet Melampyron similiter: caulis ab una talibus foliis, geniculatos: semen Miliis simile: nascitur in umbrosis ac fructuosis, vehementer autem acre.

Parit, ut Theophrastus tradit, agris de nactus *Wagen-tröpf gras*, hoc est, veluti Linum straceum, & fructum tanquam Miliis fert.

Planta autem Cratogeomom non Melampyron solum, aut Lino pyramo: sed sicut Truncus *Wagen-tröpf gras* tale esse potest, non ab eo errore: qui uti satis evidens est, ita & suspitionem mouet, Theophrastus quoque locum corruptum ac vitiatum esse, ac pro eo, quod legitur, *Wagen-tröpf gras*, legendum esse, *Wagen-tröpf gras* praesertim cum Lino pyramo, vel apud Theophrastum, *Wagen-tröpf gras* vel aliam in hoc loco, ne nomen quidem ipsam reperitur.

Ceterum Cratogeomom, ut Galenus inquit, herba fructus & seminis parvis est, & vixit admodum similitudo Miliis. Traditum est à quibusdam, Dioscorides scribit, semen Cratogeomomi potest efficere, ut multum malicolum pariat, si post mensium purgationem, priusquam accipiat, ac una verum die, nihil obolatum pondus, in cyathis aequè duobus, per dies quatuorgera horat, simuliter & via, secundum diebus, deinde cum es coctus.

De Graminibus Polyanthemum. CAP. V.

**A**CERAT Graminum generibus & Polyanthemum Gramen, quod folia praesertim Graminum minorum, ac maiora ac tenuiora profert: caulis uti, inter haec ex omnibus distinctus, folia raris, in quorum summo floret in exigua umbella composita, in candido leuiter purpurascens, Leucostemum floribus singulis minoribus: radices in terram & longa.

Reperitur in pleribus per Germaniam, Bohemiam, & Silesiam locis in agris, ac non rarè hinc Aethiam ac Mosiamque vno quodam loco manit ac alius, ubi verò minus ac humiliter. Erit & in palustribus nonnullis, haud procul à mari in Zelandis.

A Maio mense in multam altitudinem floret.

Gramen appellatur potest Polyanthemum, à foris multitudine, alio nempe desumptum nomine:

Gramen Polyandrum maximum



Gramen Polyandrum minus



notante: Nam cum pedes similitudinem nullam habeat, proprie *Isobolus* (quod pariter  
viliam) esse non poterit.

Gramen Parviflorum.

Viliam in medicina habet nullam, folia gra-  
viam aliquam obtinent, & coronas fibula ad-  
duntur.

## De Gramine Parviflo.

## CAP. VI.

**A**D Graminum genera pertinere videtur,  
quod Parviflorum vulgè cognoscitur.  
Sunt haec folia lata, nervis acuminata, Hebe-  
ra folus sine similia, sed nequaquam angulata,  
im nec ut in & candidiora, dista semper vana-  
ta. erumpunt inter hoc complures odorantales,  
graciles, angulati cauliculi, vixio sine folio, eoque  
sibique pediculis, ipsum simpliciter in casu si-  
stigio foliulis odorati, curvati, quosq; foliorum  
aque inde caputis recanda, acuminata tamen,  
in quibus sunt. radix nigricans sicut mala  
firmatur.

In regis & hura da praes, solo tamen gra-  
vi, sepius proserit, tum apud Germanos & Bel-  
gas, tam & alibi.

In hoc mensis cum flore reperitur, sicut palus  
succedit.

Germani *Isobolanthus* appellant, aequè dicitur  
Valenus Cordus Hepaticum album. Folio  
Eriostachyos Gelsiero esse vocant. Cuius  
Gramine, quod à Dioscoride Parviflorum dicitur,  
similitudinem non exigam habet: atque inde  
Belgis Gramen Parviflorum nominant. Descri-  
bitur





Trifolium hirsutum.

Trifolium



super se habent, & in extrema parte veluti aculeum emittentem. Sed huius fructus dicitur pedum interdem, aut etiam simpliciter confectus, & olerem grossum emitti, quorum alia circa præsentis Trifolium invenitur.

Via autem Trifolii, quod Asphaleos dicitur, calida & sicca. Galenus ait, vel hanc, utriusque ternis ordinis, potende potum lateris dolores ab obstruente melle, & vnam mensuram prouocat.

Hippocrates Trifolium non solum ventris prouocare, sed & fortis ceteri stomachi, non appetitum expellere tradit. Multet, inquit, si ex parte non fuerit purgans, Trifolium in vino albo bibendum dabo, hoc etiam mentes edocet & fortis. Et alio loco. Idem etiam de Tabula scribens) appositum mentes erumpere facit, & fortis eorum.

Dioscorides, Lemna, ait, & folia in aqua pota, pleuritica, venæ difficultati, comitibus, ut, qui equis inter eorum principia sentine, & hysterici utriusque. Dan autem debent folia strachina tres, foliorum vero quatuor. Perfidus etiam legitur comitibus sepe dibus folia tres & ex aceto melle pota. Tandem aliqui, romus fructus, radicis, foliorumque decochum, fœta dolores eorum frust, quos serpentes mordentur, quæ autem magna sumus quis fuerit, si ea quæ supra melle utriusque habens fructus, potende cum afficiat à serpente. Quidam etiam semina folia, aut semina in sertaris cum vino exhibent, & in quatuor quatuor, veluti febrium circums exoluentia. Radix quoque amara additur, Dioscoridis.

At venenosa non radice modo, sed & lemna ipsa admodum nocent, ut ex pluribus compositionibus, lib. 11. De antidotis apud Galenum videre est: Theriaca videlicet Alij Galij, Zenaria Landocæ, Claudij Apollonij, Eudæmæ, Herichida, Dorothæi & Hære.

## De Trifolio in America. CAP. IX.

Trifolium  
in America

**TRIFOLIUM** hirsutum aliud quoddam simile reperitur peregrinum ex America Trifolium caule illud fert à radice complures, rotundos, ramosos, in latera de hinc et folia in singulis pediculis ternis, colore in vno rubro, figura rotundis utula, primis & secundis excantibus hirsutis Trifolij forma, colore & odore quoque quadammodo similia, hanc radicem & per animum magis crenata. Bases in summo ramulorum cæcut, eriguntur

Trifolium ex America.



caudex, speciem digne fructus asde 1000 nobis, aliquando in plano, Aplacis h nobis deknput semine fere similes. raris in plaris dicitur.

Ex America in Belgium Trifolium istud dicitur est, ubi hinc de Augusti floret.

Trifolij hincmaris speciem odor gratia, & eius odori hinc malum distilla, ostendit esse videtur.

De Trifolio odorato, sine Melilotis.

C. A. R. X.

TRIFOLIUM odoratum, sine et Pharmis copiarum Officina nomenque, Melilotus, sicut est tres in quoque pedes alta, gressu in alba ac ramulosa adnascens complures, mox hinc dicitur trifolium in vitro, Trifolio aut citius Formosano similia, caudicea, per ovis hinc ac minus similitudo: flores hinc meliloti coloris, in hincbus spaci creant: si mem inde subsiquitur in capax, argus ac hincsculis sitiquit, parum, colore pallidum, radice longa est. Resert tota herba odorant gratia, ac principis flores hinc hinc, qui & ferocentibus ipse attendit, capax quoque amantidinem cum folia, cum flores gustata resertur.

Est & altera hinc genus flore candido, cuius 1. la, folia & reliquis proin similia.

Item & varietas quoddam peregrinum ac p. nantissimum genus, hinc passus caroleo, sed moderato.

Reperitur & inter flores longioribus illis, 4. quam Colicium plerique cognoscunt.

Præter hanc & alia est hinc flore quilibet, 5. folia per circumferentiam non recipit.

Nascitur hinc sine vulgare Melilotus in Germania, Gallia, ac Italia modis, vixit & in Belgio, circa antram & proutis marginem, hinc hinc ac nominem nput, ac hinc de facias vas, locis sponde in radibus. Similibus hinc & caudex in multiregionibus est, apud Belgis tamen raris, ubi nonnunquam in horum fertur.

Nominant proin Melilotum recentioribus nonnulli Trifolium odoratum: plerique Trifolium equinum Scabellum, quod videlicet ab equis and raris in pabulo expetit: Germanis gross Scabellum, id est, rosas hinc genus Scabellum: item & Desmille est, Trifolium vixit in Romania Nervis Trifolium, et Maribolis tenet Scabellum hinc Profus, ubi Melilotum Germaniam aut Officinarum, appellare malant. Altera, Melilotus hinc ha dicitur.

Vixit autem hinc Trifolio odorato, vixit Germanis Officina in omnibus medicamentis ac compositionibus, pro verum vera Melilotum.

Reper hinc in ac recentioribus compositionibus, qui veram esse Melilotum peregrinum quoniam

Trifolium odoratum sine Melilotis.





quorum raritate nonnulli novum & veteribus incognitum Tinfolij genus esse Cytisum videntur esse concedendum verum autem horum veritatem assero. Cum Cytiso enim comparo, imò nihil similitudinis habet, ut exempli Cytisi deinde præterea, sine quodam esse nec etiam præterea sic ut incognita dicitur est. Nam etiam si non aliam quodammodo ad veritatem ipsa esse. Auctoritas Mellicorum est, quæ in eadem cum Dioscoridis Mellicorum esse, de vitiis ac facultatibus eius, ipsius Dioscoridis testimonium adductum ostendit.

Duos autem generum Mellicorum Auctoritas facit, unum videlicet lutei floris alterum candidi utriusque odoratum & nonnullis amentis aditus partem per, ac simul digerenda facultatem cum nonnulla adstringente habentem. Quibus vitæ et si præterea caput obducatur, quæ officinae & hanc inferens & superiorem Germaniam, videntur. Quæ de casu nec non nec veteribus incognita sunt, sed ipsi veterum verissima videntur Mellicorum præterea cum vitæ illæ vitæ Mellicorum notæ desint, & in qua facultates ac vires omnes, Mellicorum vitiis asseritur, reperitur.

Est enim odorata herba, quæ & plenius relictata sololet, ac talis aliquando perditur qualem Mellicorum esse, Theophrastus lib. De causis fructu, xxii. & xxiii. expresse nominat, præterea.

Florum etiam habet lutei colorem, veluti eius esse, quæ in Campanis nascitur, Dioscoridis tradit, color enim ad florem constabat, nam herba, Plinius ait, incana est, hanc in eadem siquidem in Antica, Cyrico & Chalcidone natam ait, quæ colore Croco vincta est, & boni odoris, ac eam, quæ in Campanis, in luteam languescere ac odore in firmiorem. Vnde colligendum odorem æcolorem florem, remitti atque intendi, per locorum ac teporis varietatem.

Item & habet Mellicorum Germanica amantudinem, quæ in Antica, in dicitur, Mellicorum esse semper.

Digerenda quoque potestatem obtinet, quam non Auctoritas modo, sed & Galeni Mellicorum tribuit, Cataplasmata siquidem, ac emplastia digere utibus refoventibusque, nonnullis concoquantibus, nam & accepit omnibus vitæ adstringentibus.

Quæ omni omnia lutei faculenter ostendunt, vulgarem Mellicorum à veteribus non dicitur, quam Græci quidem *μυλίσκος*, Latine Scrofulam Campanam, Cæso Scrofulam Campanam, plerique Cosiam Regiam nominant.

Copiosior autem, ut Galenus ait, in Mellicorum substantia est calida, quæ siquidem, si perit videlicet ordinem calida & sicca, habet etiam quoddam adstringentia, sed & dicitur & munda.

Dioscorides Mellicorum tradit adstringentem & melleam vim habere. Ac melleam habere non propriam, sed quæ in instantiam non habet, ac dicitur collectos frangere dicitur ac digerere nam rariorem, quod duram est ac rursus, & molle, quæ propriè non mellea, sed digestio & per hanc modum dicitur est, cuiusmodi facultatem *μυλίσκος* Græci nominant.

Atque hoc modo instantiam non emittit emollit, præterea, ut Dioscorides tradit, circa oculos, veterem, sedem, ac resses, cum passo cocta & imposita: morbum vitæ addere cum luteo affato, aut Feni præci farina, aut Lini semine, aut Tinnis farina, aut capulis Squaræ, Scandæve. Sanat eadem rariorem mellicorum per se in aqua: & dicitur sic rariorem capere luteam, cum terra Chia, Vitis aut Gallæ illa, stomachi aciem dolorem & cocti, & cocti, cum aliquo ex amideis, lenit.

Animum etiam dolores cruditæ expresse facit cum passo infillata, sed & Capiviti dolorem, quæ *μυλίσκος* nonnullis lenit, cum aceto & resacco imposita.

*De Cytisi, ex Dioscoridis, Galeni & aliorum.*

#### CAPITULUM XL

**FRUTEX** Cytisus est, ut Dioscorides ait, candidus totus, uti Rhamnus, (ut, ut Plinius, in apostu carus, *βουκράσις* si qui exprimit similitudinem velle, angustius Tinfolij fructus) ramos spargit cubitales aut longiores, in quibus folia Fernograci aut Lonicæ, sed rariora, & medio eorum nervo maiore ac eminentiore, quæ digitis contra franguntur, gustu Cicutæ nondum maturam respiciunt.

Galenus lib. 2. De arboribus, Cytisum fruticosum plantam esse tradit, eam autem dicitur amingentem, ad quam Myri crescant. Theophrastus *μυλίσκος* sine melleam eam esse tribuit, ac omnia sibi propriè adstringentia vocat, sed eo tamen videri non *μυλίσκος*, qui ipsam eam Cytisum vocant.

Materiam Cytisi nigra est, & proximè ad Helvæ accedere videtur, ut Plinius post Theophrastum lib. x. v. refert.

Pro legitimo autem Cytisi à recentioribus observatur fructus quidam lignosus, hinc in, aut dicitur, in multarum amideis expellens: folia eius vni cum in casu sunt incana & oblonga, quæ vitæ Ericæ nonnulli sololet, & terra ab uno pediculo Tinfolij colliguntur.

Cytisus ve caltharum.



dicitur flores in forma virgulae elongatos, luteo autem velut aurum colore, forma à Gessula, sed immixtos, & areph ut coloratur: vultusque plures sunt ac recutiæ, & factusque, ac luteus. Longeformam referant, in quibus lumen. talem in ramulis spargunt.

Belgia hæc friggs heremita tractum est.

Inventa est hæc frutex in Cythio insula, inde transfusa in omnes Cycladas maxime in vides Creta, magno usque pretio, propter quod maxime miror rari in Italia: nō autem, non fingunt, non grandinum aut irruentium expandens Plurim.

Galerus in Mytia, qua parte Græciae finitima est, tractum quendam occurrere, memorem prodidit, quem Britum nominant, ubi collem non magnum, Thyms, & Origanum referunt, alibi locum Cythio plerum vidisse se, scribit.

Satis autem Cythii (Caltharum aut) vel autumnus circa Idus Octobris, vel Vere fieri potest. Cui terram bene subegens, areolas facto, ibique, veluti Ocyms si men, Cythii autumnus semis, plantas deinde Vere dispositas, ita ut inter se, quocumque versus quatuor pedum spatia distent. Si semen non habuerit, circum circa Cythiorum Vere deponat, & stercoream terram circumspargent. Si plura non incole sint, nigro quindecim proximas diebus, sicut loque nonum frondis agent corpore, sinito. Possunt etiam ante Septembrem, satis commodè circa Cythius fieri, quoniam facile in quovis agro, quam-

vis maceratio comprehendat, & mirum omnem sine nona sustinet.

Nuncupant bonæ fruticem Græci ac Latini *senecio*, Theocritus etiam *senecio*, nonnulli vocant per *S. alij* *mede*. A Cythio, aut ve alij, à Cythia insula nomen, auctore Senecio, habet.

Refringunt potu Cythii folia, Diacorde a dulcior, tumores intra intra distent, si cum præterea imponatur: decoctum urinarum est potum. Galerus Cythii folia digerendi facultatem obtinere refert, aquæ ac temperate misctam, sicut & Malum.

Malicia, Colomella ait, si lactis in aqua prematur, Cythiam additum in aqua macerare oportet, & cum tota prematur, postero die expressi succi remanentibus permiscere modico Vino, atque ita potandum dicit, sic & ipse val ebat, & psem abundantia lactis confirmabant Hippocrates Cythiam etiam in ur ea, quæ lac extrinsum remocant, libe. De natura *mede*, & de morbi in illo b enumerat. Aristomachus quoque Athenensis apud Plinium, narribus delectu lactis, aut tunc, atque in aqua decoctum potum, cum vino dum iuber.

Apes non desere Cythii pabulo contingente, promittunt Democritus & Aristomachus. Squodum de Cythio in prores vno ore, Galerus inquit, videtur, apes ex Cythii flore plantam mellis excipere.

Caltharum Cythium etiam vultum unum tradit gallinæ, apibus, capris, bubus, & omni generi pecudum, quod ex eo non pinguis fit, & lactis plantam pariter ostibus.

Murellus inquit auctor, alium quendam Cythiam describit, à superiore Carceum Cythio differere, quem non remanentem pabulo laudat, aut ad lactis coquam augendam commendat, sed mirum esse remedium tradit aduersus ichthaleum & arthrum.

Raba est vel fructum, aut quod maxime circa sepes vinearum nascitur, Latine Cythius dicitur, virgatus est subrotundus vel curvus, foliis oblongis, bene vasculis, floribus concutis, oblongis, albis vel etiam gubens, bene odoribus, id est, mellico odore, fructum quum imper virentibus atque hinc.

De Pseudocytis. Cap. XII.

Occurrunt vero & alia Trifolia, lignosa ac fronsæcæ stirpes, quæ cum Cythio similitudinem habere posse videntur.

*Pseudocytisus alba*



1. Affertit vasa radice caudiculis terribes, fragilibus compluribus, in alas ac ramulodis-  
sis, sola enim quos crebra, maiores quam Trifolij praesentis, caetere vitacea: flocculi omni-  
gula nam fistigis spicato quodammodo ordine digesti, juiter, maiores quam Genstae, atque  
confundendo succedunt siliqua tenuis, oblonga, angusta, & ipsa Genstae siliqua striata, in  
quibus semina exigua nigrescentia. radix longa, alba deforndit, quam doctores in obliqua tradit.
2. Altera species copiosa ramulis ac caudiculis superiorem referret, nulli haec flor ac lan-  
guinosae esset, nec utrolleminis, sed magis ad latera caudiculi cres inclinatam siliqua quoque pes-  
lo maiora, sed tamen quam Trifolij praesentis minora: flocculi etiam magis conuulsi, atque  
veluti in caput una compressi, nam etiam notabili maiora sunt siliqua quoque alapaes  
grandiores, aurifusque. radix alba demittitur, in paucos d'usta appendicis. Cotingit autem  
non raro vno loco hanc speciem haurit d'ocem: fiat languinosae ram, quibus albis: quo autem  
hauritur ac languinosae, hoc etiam magis increscit, nam ipsa hirsutius albescit: quodam  
colorem vni confert.

Reperitur huiusmodi Cytisus, in nostra aetate appellata, Miconia, Maroniamorum  
etiam provincia, & in Pannonia superare sicut Austria, ultra vias, periculis profundis, &  
agrorum limitibus vni bus extremis aliquo modo pascere videtur.

Iuris ac Iulio cum floribus praesentis vixit: sicut in caetere & post, ad naturam pervenit.

Cardus Clusii in sua per Hispaniam oblectantibus & haurit modis alapaes generis de-  
scribit, quae ab ista exiguam vel nihil differre videntur. Differentia si qua est, ex hauritque  
differrentiam ac dissimilium occasione contingere potest: Nam haec duo ad haurit men-  
tionem plurimum posse, Theophrastus scribit.

Cytisus autem esse speciem praesentis manifestum, ideoque & Pseudocytisus alba ac suscep-  
tum possunt, vel Cytisus haurit.

Qualis autem facultas horum fruscum, vel ad quae vides, experientiam ac cognita  
notandum habemus.

*De Trifolij fruscante. CAP. XIII.*

**T**RIFOLIUM fruscans vagellas praesentis tenuis, vitacea, baculatae & longae, in  
obliqua, brevis, angusta: siliqua in ramulis, siliqua d'usta siliqua circa haurit praesentis & ipsa  
1660291

*Trifolium flavescens.*



*Trifolium odoratum sive Lotoisium.*



radicibus planis, singulis pediculis ternis, sed medio eorum maiore ac longiore, Trifolium angustifolium & minus, ex nigro venena, inferiore tamen parte viridiora: folioli in ramulorum summo, cingulis infidens pediculis, uno, ab angustiore cingula veluti filata, sicut in quibusque aut sex foliola pendentes, Buglo si vulgari similibus quodammodo similes, sed maiores: fructus rotundus est, magnitudine Erulæ, ante vradu, per maturitatem vobis niger, in quibus femina leca, Lemibus similia. radix alba, longa, late sub terra serpit, ac plurimas non raro progenerat locas.

Reperitur aliud Trifolium apud Belgas in studiolorum hortis aliunde avectum.

Floret astate: autumnis semen maturatur: frutex ipse perpetuo viret, & vix radice efficit.

Cytalum plerique appellant: nos Trifolium fruticans nominare maluimus cum Cynulo etiam non contemnit, ut ex eius descriptione superiose capite satis manifestum, nisi Marcelli Cytalum sit, cum quo aliquam fore similitudinem habere videm posse, si Bos, qui in latere est, albus esset aut galbanus.

Galbanus autem color idem videtur cum <sup>distinet</sup> <sup>color.</sup> caruleo, aut simile. Vegetans enim Romanis in sua veterum scriptura lib. I. cap. XVII. & lib. III. cap. II. Eryngium herbam describens, florem, inquit, habere aurum vel galbancum. Reperitur autem Eryngii Bos caruleus & luteus.

Sunt verò & nonnulli, qui Trifolium aliud Potentillam esse existimant, quod videlicet cum vulgari Ruta, aliquam hanc folio similitudinem habere videntur. Sed Potentillam non vulgari siue grassolenta Ruta est folio, sed altera, Hypericoide videlicet, veluti & Hypocicum, Anome, & Cistarium minus, que enim folio Ruta describuntur.

Potè Trifolium fruticans nullius quidem vici est, nec strumantem cuiquam, aut ali minus apibus, quod sumit gratum.

*De Trifolio odorato sive, sive Lotoisium.* CAP. XIII.

**T**RIFOLIUM odoratum sive, vasciculos habet erectos, rotundos, inanes, cubitales aut longiores, ramulares adnascens multos: folia singulis geminis vobis trina, Trifolium similia, leuiter ac superficie tenui per ambitum cremata, ex quorum talia in singulis pediculis florem cingulis veluti spica, pallidi ex oculo albicantes, quos aspera loquuntur capitula, in quibus semen Foenogrecum minus. radix siccata est.

Tota herba cum caulis & foliis, Trifolio nos solum bituminoso, sed & patenti candida est: odorata non est, & membra cum gravitate quodam sunt, & plerumque sciccata quidem: qui in decembris autique de utrumque odorantur,

colatur, & pluviosa ac humore celi condensatione inveniunt. Fertur vitis atque creberris  
 fepes in die odorem mutare, unde & Germanice *Stoben geparn frant* / annose aras ipsam  
 appellant.

Floret Junio, Iulio ac Augusto in Italia, quo factum est, aut mensibus in hortis ceteris in sa-  
 pientore, tum in inferiore Germania, in Italia, Galia, ac aliis in regionibus cernitur.

Trifolium vulgè odoratum appellatur Germani, ut dicitur, *Stoben geparn* / noster *Stoben  
 geparn*, hoc est, tempore in herbariis Hispani *Trobel Real* / Galia *Treffle odorifera*.  
 Locus videtur veritas, sine citius, de qua Dioscorides lib. 1. in. que Græcia *Λαβή* / *Λαβή*, & à  
 quibusdam *Stobos*, ab aliis *Trifolium* truncatur.

Vim autem vitream sine domesticam Lotam medicorum consequendi, & refrandi  
 possidere, Galenus ait, & in eadem si frigiditatis conjugatione medium quoddammodum ac  
 temperatum esse. Que cerò facultates in hoc odorato Trifolio evidentè conspicuæ sunt.

Dioscorides, extrahit, ut, succus addito melle oculosum argmas, rubeculas, *Stobos*  
 (albugines vocant) & que pupillam oculosum obtineant, expurgat.

Noster oleum in quo solia florant, odorato hinc Trifolio macerata, recentia valenti gra-  
 tiam tradunt, & ad posuorem entrociclos, habent oculorum plurimum occurrere. Inco-  
 ponitur & unda herba vestimenta, que ac à trinis redaptur, defendere putant.

*De Loti sylvestri.*

Loti sylvestris et Cod. Casim.



oriente Sole explicam, occidentis verò occulti, utroque capite sub aqua condit, & rursus  
 oriente Sole emergere. simile caput eius est Pappaveris maximus calyci, in quo frons Mij  
 quærens, quod refectum *Ægypti* in partem recipitur, radicem Corosæ male si-  
 miliam habet. Eadem de hac Loto Theophrastus se fieri paulò rariorem hanc, deinde  
 Bætem siquidem, ut candidam, Liliis angustis foliorum proximum, paulò verò ac dolo  
 protissimè esse. Sole uter idem sole contrahere caput, integro, ad ortum verò aperit, &  
 super aquam assurgens idè facere dum caput perficitur, utroque defuerit, caput enim  
 magnitudine in quantum Pappaveris maxima: radicem totidem male Corosæ amplius,  
 cortice nigro, quali Nucæ castanea nigra, caput verò incertam candidum esse.

CAP. XV.

**D**IOSCORIDES vitam Lotorum, ex-  
 pta enim Loto arbore, mentem fo-  
 cat: Satius videlicet, *Ægypti*, &  
 has tres *Ægypti* vno capite, videlicet  
 sub *Handocoche* nomine complexus est.

De ea que proferuntur habetur, prædente  
 capite scriptum.

Sylvestrem Lotum Dioscorides esse  
 ut lucubrali, & maxime, multas alia habere:  
 folia similia Trifolij præterea: semine rari  
 Perogreæ, minus paulò, gustu medicum.

Plurimum hæc in Libys nasci, idem  
 dicitur, & Trifolium minus appellat. Hinc  
 cernitur autem sylvestris Loto hactenus  
 gignit hanc. In verulo autem Bibliothecæ Cy-  
 taræ Codicis, Loti sylvestris hæc imago  
 reperitur. Depingitur autem calicem, folia  
 Trifolij, & e sine horum, pediculis floris, de-  
 inde filiquis, proferuntur hinc, que rari sunt,  
 siquidem Perogreæ minoribus imago aliè.

Vim autem calicem ceteri & liliæ similitu-  
 dinem habet: vita cutis in facie, & epheides  
 cum melle periculis expurgat. hinc & val-  
 ter per se vitæ, aut cum Malæ semine, cum  
 vino pasto, aducria vicia dolent.

*De Loti Ægypti.* CAP. XVI.

**L**OTUS que in campis *Ægypti* aqua ma-  
 xime proferunt, rari est, videlicet  
 fert, *Ægypti* fibra à similia: dicitur hinc per-  
 tum, candidam, Liliis similes, quem frons  
 oriente Sole explicam, occidentis verò occulti, utroque capite sub aqua condit, & rursus  
 oriente Sole emergere. simile caput eius est Pappaveris maximus calyci, in quo frons Mij  
 quærens, quod refectum *Ægypti* in partem recipitur, radicem Corosæ male si-  
 miliam habet. Eadem de hac Loto Theophrastus se fieri paulò rariorem hanc, deinde  
 Bætem siquidem, ut candidam, Liliis angustis foliorum proximum, paulò verò ac dolo  
 protissimè esse. Sole uter idem sole contrahere caput, integro, ad ortum verò aperit, &  
 super aquam assurgens idè facere dum caput perficitur, utroque defuerit, caput enim  
 magnitudine in quantum Pappaveris maxima: radicem totidem male Corosæ amplius,  
 cortice nigro, quali Nucæ castanea nigra, caput verò incertam candidum esse.

Legum. *Aegyptiaca* Cod. *Castro*.



Trifolium corniculatum L.

Est in antiquo Bibliothecae Casareae Codic. *Aegyptiaca* Loxoson, sed quae non nisi folia & radices exprimit folia autem depinguntur tria, longis, singulis longae ac crassae pediculis inflexis, ac eisdembus coarctatis radice vero rotunda, mali instar.

*Aegyptiaca* Loxos dicitur, quod in *Aegypti* possunt. Radicem hanc *Corsium* appellari Theophrastus ait: Strabo autem Geographos lib. xviii. *Corsium* fructum esse tradit pipere similem.

Radice tradam & coctam edi Dioscorides scribit: Theophrastus etiam affert, in speciem albuminis veteri momeoae prodidit, & eodem gratam man dienam credam, sed gratiam decodiam, seu aqua, seu pruna.

Qui in uradibus vegetant *Lotophagos* dicit Strabo auctor est. Theophrastus autem ex *Loti* abest melle, qui dulcis ac sapor est, viventes, *Lotophagos* appellat.

De *Trifolio Corniculato*.

CAP. XVII.

**CORNICULATUM**, hoc est, quae aequas sitque infra corniculorum proferte, Trifolium si quor nomenque genera.

*Corniculatum* autem horum Trifolio. I. numpnam genus, multis eam omnibus & infimis caulis, hanc procumbentibus, cuos quos sol sole incant, nitore & angustia

Trifolium corniculatum L.



Trifolium

in quam Trifolij flores profert luteos, fide rufos, Ochry floribus minoribus, corruptis in aliis  
 in rugularem fistigam pariterque succedunt filiqua aliquas parvas, oblongas, rotundas, luteas,  
 & angustas, in quibus semina rotunda exiguatudo dicitur ad lignosa, in quibus annu regeruntur.

2. Alterum genus cauliculos quoque habet ternos, longosque - folia Trifolij aut Potentilla  
 cu, ambro ferrate floculos luteos, pallentes, in umbella infra ferè præteritis Trifolij, post  
 quos exiguæ exemplares, potitur corniculorum modo, atque exarant, in quibus dicitur par-  
 ua, sapore ac femina luteas Gerstle, rubiculis firmatur longas, ren ubique & throst.
3. Tertium genus casio, foliis ac radicebus præteritis, ut Tragus ait, simile, flores autem ma-  
 iores, & in luteo splendidiore, atque verò et longiores, ex singulis vix, ut quæretur, acum  
 vagibus persimiles, in quibus femina rotunda, ut Anachi.

Nascuntur hæc genera, pluribus Germaniæ locis sua sponte: primum Belgio familiaris  
 est, ubi locus vias, & agrorum margines passim reperitur: florent etiam.

Trifolia comiculata, ad differenciam istorum nominari possunt, ut Liliis sylvestris. Dif-  
 ferunt tamen non parùm à Dioscoridi sylvestris Loto, quæ in Libya præterit. Nam Diosco-  
 ridis sylvestris Loto, casio est luteolus, & sepe macerant in malis: folia Trifolij præteriti  
 femine Potentilla, multò rariore, quibus medicata. Quæ in rotunda nullum habet am-  
 culorum Trifoliorum est.

Habet autem ista comiculata Trifolia, cum Scariole, ut Yliani Melliorum similitudi-  
 nem maxime in Scariole enim ex Yliaco Melliorum de foliis, vaginas ipsas facit, ut re-  
 licta & ista Trifolia facit, quam ob causam (cariorum non ipse reperitur in his) Yliacæ Scariole  
 Melliorum videtur: non tamen idcirco Dioscoridi, ut Galeni, hæretum in an-  
 ter si Scariole confunderet, ut sepe multas alias confunderet, Arabibus propriam quodam-  
 modo est vitam.

Differenciam utriusque, quæ siue Yliacæ, siue Scariole ostendit, vaginam & similitudinem  
 Melliorum præcipue commemorant: nam alteras Melliorum foliis potissimum, veteres Yliacæ  
 vili sunt, non ista sunt ferunt, ut ex compositorum, malagastorum, & quorundam compositorum  
 bus, quæ apud Galenum, Paulum, Aetium, & alios reperuntur, evidens est. Melliorum si-  
 quidem, quod à Dioscoride describitur, in floribus præteritis facultas est.

Doleribz autem Melliorum suam ex Yliaco, Scariole in verbum Melchit, siue Melchit  
 enim Melliorum Arabibus nominant: herba est, quæ habet folia rotunda, vixque ramulorum  
 sunt subiles meliorum, & folia rana, & fructus habent vaginas in briles, rotundas [sic ut  
 præteritis parviorum] & sunt in exiguis partibus, glaucæ coloris, rotunda, rariore quæ  
 napa, & quod de ipsa administratur, sunt ille vaginæ, cum eo, quod est in eis genus.

Quæ cetera descriptio ista comiculata Trifolia sua respondet, & præteritis partibus  
 tero generibus.

1. At primum hæc Germanis videtur fieri / sicut fieri / vixit fructum [Melchit] videtur  
 videtur appellare: nosse sunt etiam & Scariole videtur nominant herbas leporum: Faciles  
 Melliorum Germanicam facit.
2. Alterum genus idem Melliorum italicum, & Germanis [Melchit] videtur vocatur, &  
 cum vera Melliorum convenit castitatem, cum qua tamen per omnia non convenit.
3. Facillimum autem primum genus possidet evidentem adbrangentem, siquidem adbrangentem  
 natura sua, inopentibus idcirco inflammationibus velle, & omnibus, quæ sepius ac  
 generi desiderant.

Cæterorum duorum non ita explorata, aut cognita vobis vici sunt.

De Trifolij videtur, hoc est, quorum aliqua esse videtur similitudo,  
 in varietate vici sunt. CAP. XVIII.

1. **H**VIVICENDI Trifoliorum duo potissimum sunt genera. Primum cauliculos habet  
 ternos, rotundos, non erectos, sed per ternam repentes: ista Trifolia signata, vixit in  
 zora, teneriora & per amburum cæteris flores ex luteo pallentes, parvulos in firmo pedic-  
 ulorum: fructus latus est, & alique circumvolucentibus in spina cochlicæ modo conce-  
 querur, in quibus situna parva, candida, nonnulla rotunda, raris vici est.
2. Alterum cauliculis prius trifoliosis quoque Trifolij minoribus, sed hinc quoque per  
 gines in trifolios, quoque luteo vici quoque in spina contractæ, sed longiores, angustio-  
 res, & sparsis alique horridula.

Convenit istud aut saltem proximum est eis, quod à Carolo Clavo Medico Murano ap-  
 latur, & à in Hispania, & Galia Narbonensi iuxta mare Mediterraneum, in Lusitania  
 iuxta Oceanum litata, reperiri ceteris.

Apud Belgas & Germanos vixit quoque horrens est. Etiam flores ac fructus profert.

Trifolij  
 lutei.

Melliorum  
 Yliacæ aut  
 Germanicæ.  
 [Melchit]  
 videtur.

Trifolium cochlearium primum.



Trifolium cochlearium alterum.



Galli huiusmodi Trifolium *L'herbe au cochon* nuncupant: Recantationem plerique hæc Trifolia Medicæ effe indicant: Trifolia cochlearia appellare maluerunt, à filiquis cochleariarum (quæ modo caruolans) nam cum Medicæ descriptione (licet fortè similitudinem aliquam habeant) non conveniant. Latine enim magnitudinem, fructus sine filiqua multum quærit. Simo verò quod in ipsâ continetur, non modò Lentis fructum non habet, sed nec nigritudinem, multò Lentis minor. Item & immensorum aut horum pabulo hæc Trifolia non conveniunt, nec vtilia habentur, ita ut his de causâ præter alias rationes, iusto esse veras Medicas, abundè constare videatur.

## De Medicis. CAP. XIX.

**E**X Trifolorum, & eorum quidem, quorum valentia cochlearum modo insequenter, agnosce & Medicæ est. Virgula hæc sine cauliculis habet complures, utundos, & erecti: folia Trifolio similia, cæca caules tenent & contractiores flores in umbella brevis, præter quæ quædam modo perititâ caruolâ præteritis Trifolijs angustiores & minores, colore ut plurimum in caruolâ perperam sepiuntur, inde filiquæ sine comula cochlearum similes esse videntur, sed multò, quam cochlearum Trifolorum, angustiores, Lentis videlicet tantum latitudinis, aut paulò ampliores, ac in periclyti spica contracta, deas videlicet aut tres tantum, in quibus limam immixtam & candidam, radices habent, ut aliorum Trifolorum, longe, rarior, & lignosa.

Huiusmodi plerique Hispaniæ locis sua sponte, quod facio tenuiora habet folia, & flores folijs subleuior. In Valentino regno, & vocata Catalonia, Tenasco nensis Hispaniæ provincia, in agris feritur, ubi crebè singulis annis men fibris colitur, & in decem aut duodecim annos perdurat.

Sæpiusdam Malicæ, Vatro aut, in terram nitenti munda aut varia, sed temperata, Palladæ Aprilis mense, ferendam esse Medicam scribit, ac semel factam decem annis permanere, ut reparet vel iterum possit per tantum recidi.

Appellatur hæc herbarum Græci *Mal'ab'*: Latini sanctiter Medicam: Castellani *Maligano* Niziani, ac Cassiani *Alfafa*, vocat aut *Barbata*, aut ab Arabica deservatum Arabum præcepto



Medica



166

Trifolium agrarium



166

capa Auctoris Medicam *Cotyledonem* & *Alfafa* nomine Veram autē & legitimum longē esse Medicam, ipsa Medicā dicitur quod Descendens dicitur, eademque dicitur, que talis est: unde hinc ipsi non facile videntur esse appropria, & eademque de causa, de qua supra, quod dicitur, quod dicitur, quod dicitur, si alii in antiqua vegetabilium historia, in quibusdam de medicis hoc est, Medicā cum secunde prodit firmis est Trifolio parvis, verum in progressu folia eius angustiora, culicibus producit Trifolio similes, quorum fructus crebrius Lentis magnitudine, comestibilem innotuit.

In qua descriptione antiquorum nomen alium fructum (ut non raro alia) referendum, quod scriptum, Lentis magnitudine comestibilem exprimit, & comestibilem accretorum similitudinem refert.

Nomen autem Medicā h. Medicā Esterna, quod Plinius, Gencor, per bellum Persarum, quod Darius male, inchoa.

Facultatem autem Medicā frigida habet, ea de causa, quibus refrigeratione opus est, vinda imposita prodit.

De Trifolio agrario.

CAP. XX.

**I**N Medicā nomen & appellationem ipsi quoque posse videtur, Trifolii quoddam genus placitum: cuiuslibet hinc sunt videri, hinc inermis Trifolio similia, videri quora, per omnia semper cernunt: hinc quoque hinc inermis veluti speculata ac particula compacta, quod succedat parvis capulis, ex multis nigrescentibus, latis, recedens formis oblongis: radix tenuis est & fibrosa.

In Germania ac Belgio fecus via, agrorum margines, ac non raro in ipsa agrorum cunctis formis reperitur.

Floribus albis parte flores: hinc videri producit.

Plurique nostras idiomate *sternum* & Germanice *sternum* nominant propriis autem *sternum* & *sternum*, ac Latine *Trifolium agrarium* quod nuncupabit: ceterum, ut dicitur, Medicā esse speciem, propter firmam cum Lentis aliquam similitudinem, quod tamen non rotundum est, nec comestibile innotuit, vel cochlear modo in foveis videri videtur: in degenitum eius cum Medicā dicitur. Iam & herba ipsa auctoritate, pedum & quadam pedum parvo, ut ex parte, sed fecit negligit Medicā cum, unde Descendit, pro gramme videri, que per omnia.

De Trifolio candido. CAP. XXI.

**C**ANDIDUM Trifolium, non aliter quam alibi contemplandum, in quibusdam

que ab omnibus folia in Trifolio, nec Formigato minoris, in fagulis pediculis tenuis, ac emana-  
 ta. Interdum aut tenuiter ex albedine purpurascens: radice lignosa & vasa est. Torquetur  
 in modum castillee & folia, ab utraque parte, areolantur, & molli tenuis, lanugine barbata.  
 Nascitur in quorundam montis peregrina enim Belgis de aliunde: rivicola, florit hinc, sub  
 sua estate.

Sedulorum plerique Glissem, alij Cysum faciunt, nonnulli Scribonij Oxympylon,  
 & Scribonij Oxytriphylon a Trifolio herimato non differit.

Cysum vero frutes cilij, vti paulo ante simpliciter, lignosus, apibus & immixtis granis, ut  
 dicit Trifolium nec lignosum est, nec vel apibus vel immixtis granis cuiquam incutulum esse,  
 dicendum poterit.

Cum Glissem autem similitudinis quoque nihil nec exceptum omnino habet, nec etiam  
 quibus suis ferat, nec floris habet purpureos, & raris quos dodrantis sunt longiores.

Definit vero Glissem Plinius his verbis: Glissem antiquitus *ἡρα* vocabatur, *Cy-* <sup>Glissem</sup>  
*sum* & *Lamelle* folia similia, necesse candidiora (superna vident, Diosc. ad huc) raris in terram  
 lequere quae, ferre ad modum tenues (dodrantales, Diosc. de hinc) radice: foliis purpu-  
 rescentibus immixtis circa mare. *Eupolastion* ab effectu nomen nautae, & idem est quibusdam  
*ἡρα* sed *ἡρα* nec *ἡρα* pronunciatum: hinc, inquit Diosc. de hinc, deosolia cum farina  
 bolivora & oleo, & in fortione exhibita, extractum lac reuocat eamque que hanc  
 Plinius *Leposidion* habetis vti conuenit.

Apud eandem Trifolium curis facultatis sit, aut ad que vtile, incertum est.

De *Lagops*.

CAP. XXII.

*Lagops*.

*Lagops maior folio Trifolij.*



**L**AGOPUS caule emittit coeundo, erecto, folijs Trifolij minoribus, pascua: paniculae, i.  
 sine specu, in summo cauliculis & ramulisque gener, mollis, lanuginosus, leporina  
 folijs simillimus: flores vti plerumque luteoli: semen paruum.

Sunt tamen & *Lagops* quaedam maiores, sicut rubicundus vti collum latius, & Trifolij pascua: i.  
 vti emulsi: deum oblongos.



*Oxy linc Trifolium acetosum.*



Foro temperato Trifolium acetosum, frigidam & siccam habet. Potius ac frigidioribus locis moderatim sicut acet, & eadem, qua Oxalis potest.

*De Trifolio aceris.*

CAP. XXXIII.

*Trifolium acetosum.*



**A**YRUM Trifolium ab ipso caule herba est sola habet lura, magnitudine foliorum Alia, sed in mesothali partem, & magno alio Trifolio similia, inter que modice ipsa radices graciles, tenuesq; subbasium, ac modice ex viride rubentes, erumpunt cohaerens, dodrantis breuiora: in quorum summo singuli folioli, forma & magnitudine Ranunculi horrensis foliis similia, colore caruleo diluto, ex firma, septuaginta folioli cernunt, quorum medium etiam occupat capitulum, pauca & exigua flammibus candidis circumdantem, moxq; semen deinde rositate paruum candidumq;, quod sine sponte motum curat. radices sublimi graciles, ramosas, rigeat, & in diuersa tendentes.

Folia hinc permixta. Flores, si exiit in clementia facit, circa Februarii modicum erumpit: in rigida, mensis Martii. Semen Maio marescit. Post florum defluum noua erumpunt folia, que aerea parte nonnulli prosequuntur, sed in insuperiorum quam Cyclamina marentis.

Reperitur plerisque Germaniae superioris locis in syluis umbratilis, inter frumta, in Bohemia & Silesia usque in Belgio ac rem non nulli summo proserit. Inuenit & apud Italos, & non modo caruleo flore, sed & in binde multo plures, sed & candido, ab Alfonso Pansio Doctore Medico Academia Ferrarenti, in simplici um cognitione verisimilimo, acceptissimus.

Herbarij nostrae acies Hepaticam appellant: Germanice dicitur *Ährkraut* uocis & quibusdam in hoc est, Trifolium acetosum nostris dicitur *Ranunculus*, & *gallus Ranunculus*: Gallis *Hepaticae*. Bapula Sardis, Transistatem & Transana herbam nominant.

Sunt qui *Asotum* esse suspicentur, quia Trifolium herbam esse Helychium scribit. Sed Ba. aduerso linc dicitur potius nesciam conare, nihil desinit potest.

Refrigerandi auctori ac radice di potius cum adfrictione, haec herba perditur est: hepaticae caliditatem debilitano conferre ferunt, nam & refrigerat, & tribuit ei non exiguum coctum.

Laudatur, ac ad radice efficit à Bap. Sardo perhibetur, si rosicata pulvis cochlearis tenetur, ex vino aut uino alioque, aliquos conuulsus dibus exhibetur.

Trofœolum palatium.



**PALYSTRUM** Trofolium caulisbus rari-  
 talibus, vix in ribus, seu bus, interea par-  
 tibus folia ei lata, glabra & carnosa, Falcem,  
 sine Rosarium folium simile, nisi quod in longi-  
 tudine pediculis non plura, sed tria tantum. Trofo-  
 lum flores à medio caulis sursum versus ordine  
 digressi, candidi, foliis foliis inde parva, ju-  
 vanda, in quibus semel ruffam Mido sine u-  
 dicibus serper pluribus, generatim, inveni-  
 do, & posita, in diebus eademibus, quæ & plu-  
 ribus locis erumpunt, & caulis foliis pennis,  
 vnde facit herba ipsa late propagata, septem  
 habet semen nonnulli amantibus potest.

Naturæ viginosa p[er] affinitatem, ferre  
 macro folio.

Germani *Tschirte* ad est, Calore Trofo-  
 lum, sine Trofolium fiboniam truncus, & g-  
 g- accens à similitudine foliorum caulis  
 sine Falcis, Martiana hoc est, Falcem lan-  
 nam aut Rosam hircinam: Recentior Trofo-  
 lum palatium nominat. Cum Hopyron enim  
 non eamquam similitudinem habeat, sed Phas-  
 folio, sine Falcis, folium similitudinem est, ut  
 propter hanc quoque, similitudinem, vulgè cum  
 à Belgis, ut iam diximus, Falcis truncus  
 hircinus.

Hopyron enim & Phasfolium dei, propter  
 eamquam cum Phasfolio similitudinem habet,  
 Dioscorides auctor est. Additur & ab aliis vul-  
 garibus Dioscoridis & Plinij exemplibus ut-

tion: & in illis quidem v[er]o q[ui] dicitur in v[er]itate dicitur dicitur, id est, quod in summo caule clau-  
 culat ferre: In hanc verò, quorum folium, quod est Aniso simile, in paucos impertit.  
 Quæ v[er]o ne auctores, perpetuam accessisse, sunt manifestum: nec etenim Falcis, nec falcis,  
 sine Dolich, folium clauculat habet, & Anisi folium, propter quod clauculat, scilicet, cum Fal-  
 sis ante nam Falcis folia, nullam habet similitudinem.

*Dioscoridis  
 & Plinij  
 loca citata  
 data.*

Emendandum igitur Dioscor. exemplar, & hoc modo legendum: *schizogon, à diuina  
 galea, v[er]o sic hircinam paratam, sicut ài sapienter dicitur dicitur v[er]o dicitur dicitur, sicut dicitur dicitur,  
 dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur.* hoc est, Hopyron aliquo Phasfolium nominare à diuina  
 ne Phasfolio, capsula ei sunt in summo caule veru[er]a glans seminis, in g[ra]ssa Melissa simile.

*Hopyron.*

Quod verò deinde sequitur v[er]o si phas dicitur, id est, folium verò Aniso, aut accessum  
 similitudinem est, aut de g[ra]ssa quoque v[er]o intelligendum: forma si quidem folium Hopyr An-  
 sium referre non potest, cum Phasfolio folium simile sit: sed v[er]o enim dicitur esse ab aliis dicitur,  
 Otibaly cum habet ex Dioscoridis transscriptis, hoc potestatum non habet.

Atque hoc quidem modo, Hopyr dicitur primo emendare & castigare, Trofolium palatium  
 ei eam simile est, v[er]o non ab aliis v[er]o v[er]um Hopyrum videatur.

Hopyri autem semen, ut Dioscorides ait, cunctis ruffam & dolores carothorum cum  
 medicato sumptum prodest conferre etiam hepaticis & sanguinem excreantibus. Exemplar  
 enim, inquit Galeni, & incidit humores crassos, cum hoc, v[er]o compositum edulcorat & colligit.

# STIRPIVM HISTORIÆ PEMPTADIS QVARTÆ

LIBER QVINTVS,

DE AQVATILIBVS ET PALV-

STRIBVS HERBIS.

PRÆFATIO.

**P**OST Gramina ac Trifolia ad aquatiles & reliquas palustres transfundendam videtur, quæ, ut  
ante diximus, nulli aliter operæ nostræ parte, quàm huc addo poterant. Subsequi hic liber  
hæc præstiterit, sed Graminum & Trifoliorum descriptionibus præmittens magis confusam  
fuit, quædam verò & palustrum pedes tractare.

## DE TRIBVLO AQVATILI.

CAPIT. I.

Tribulus aquatilis.



**A**QVATILIS Tribulus caules habet  
longos, inferos, & quæ sub aquis est parte,  
graciles, usque verò aquæ superficiem  
erectiores ac fistulosos, adhaerens sub aquis cre-  
bra capillamenta, quibus & fundo affigunt  
superior sola promittunt. Populus aut Vitis  
perpermodum similia, sed breuiora & foetna  
quod ammodo choriba, per circumferentiam  
cremora, inter quæ fistulis exant, deinde fru-  
ctus Auellanae nubes paulò maiores, nigri-  
cantes, quæ ut choriba acules modice recerunt  
spinosi, in quibus nucle uscidiosa, gustu haud  
ingratum, qui & recens mandi, & sic tribus in-  
laque conitras in parcos cogi posse fertur.

In superiore Germania in lacubus lacubus &  
vrbium folis, quibus hincosis de bell sanctus,  
natis Cordus retere: apud Brabantos verò &  
alibi in Belgio in stagnis & parvis & formans  
aquæ non raris reperitur. Martholui non mo-  
do in dulcissimum aquarum lacubus, sed & in ma-  
rino quibusdam tracta Venetiarum præterea, au-  
ditur est.

Tribulus in lege Grecis: Latinis Tribulus  
aquatilis sive aquatilis, & Tribulus lacubus:  
Oscina Tribulus marinus dicitur: Germanis  
Wasser nuss, westmanis fernus, hochstems, stey-  
nisi: Brabantis Wassernuss, & à similitudine a-  
culcorum ferreorū stachys: Galli Marre.

Fructus aspera huius Tribuli, plerumque Ca-  
loneas aquatiles appellant.

Refrigerantis potè Tribulus iste est nature: ex humida & frigida essentia compositus,  
Sua magis hoc aqua est, quàm in terra, in qua terram frigidam potest, ut Gale-  
nus in præsentis astham rationes omnes, ut Dioscorides tradit, conspiciant aduersus eam  
belli spiritus, tonillas, crispitudines, gurguliesque persuat. Succus ad oculorum medi-  
camentis colligitur.

Tinaca, Plinius inquit, qui Strymona habitant, folia Tribuli equos ligant, ipsi nucle  
sua, parum facientes pedaleem, & qui contrahat ventrem.

Potamogeton.



Potamogeton alata.



1. **C**AVI-CYLOS habet Fontalis, atrata, vinculo fisa, genitali uno, foliis oblongis, dentibus minoribus, durioribus, quae tenuibus ac longis foliis pediculis incidentibus, lignis quoque eminentibus, & ipsius superficibus, uti Nymphaeae folia, arcum bunt: floreci in lateribus spiculis dilatare propius rubens, et Bifloris, fermen dantur.

Repertus in paludibus, lacubus, vrbium follis, & aliis stagnantibus aquis, non sub otio in rivulis lene fluctibus, ubi que frequens.

Flores conspicui sunt, Augusto aut Septembris.

A Graecis *πυλαμα* dicitur & *πυλαμα* Latine Fontalis & Spicata: Germani *Spitzha* vocant *Fontanage*: Galli *St. d'oeur* nominant.

2. Est verò & alia quaedam Potamogeton sive Spicata, quae compluribus tenuibus ac molibus cauliculis lacunar, in alas subinde diffinitis, foliis hinc sunt lata, oblonga, acuminata, multò quàm parvis minoribus: è sinu caulicorum ac foliorum pediculi binae prodeunt, in quibus spica brevis, flocculos proferens candidantes, masculos, ac deinde feminatam, rotunda veluti Aphaceae, radice fibrosa fundo adheret.

Tota autem sub vna consistit, & in mente certa modo crescit, sed in specibus profundis & dulcibus, quae tamen maritimo alio atollantur: veluti in sinu illo qui à Dorico Hollandiae emittit, ad Eredam Brabantiae cum maris portu.

Potamogeton autem, inquit Galenus, adstrigit & refrigerat similiter Polygoni, sed essentia eius crassior est, quàm Polygoni: purgaturibus velle, & contra venarum vitium depulchones, auctor Dioscorides.

**FL**UITAT & in aquis, ac eius occupat superficiem, scuti Fontalis, bari velut spicula, quos Rana morfam plerumque nominant: sunt hinc folia beccaria, rotunda, Asiat folia sunt similia sed minoribus, eodem quo Fontalis modo, aequè immixta. Flori

Rana moria.




in longioribus pediculis inter folia ex-  
eunt, parvi, candidi, in duo lures, ex  
tribus lobis, Plantaginis aquatica flori-  
bus maiores, sed non Augusti compo-  
sit. Pro radicibus tenues fibrae sunt, quae  
ex terra ac parvo veluti capite, vnde fo-  
lorum exortus, tendunt versus occidens  
à quo etiam obliquae fibrae exeunt, qui-  
bus progeminantibus longam multi-  
plicat.

Reperitur similibus & eisdem crebris,  
quibus Fontalis, lactis.

Nostris *Wasschen wort* / id est, *Rana moria*,  
vel *duxorus*, appellantur pluri-  
que etiam *Nymphæarum parva*, & *Claret  
pimper*.

Fontalis floris *Potamogeton* species  
videtur, & eiusdem cum eo facultatis.

Rana moria alata Leon.



De *Millefolio* & *Pala aquatica*.  
CAPUT IIII.

**A**QUATICIS *Millefolium* in eodem prome sectam, hanc, & tenerum: folia verò com-  
plana, multis incisuris denta, Potentillae folia similia, amplius verò difflata, quae super  
radicem autem folioli in umbellis velut *Millefolii* radex singulari.

Huius aemulæ species esse habetur, quae *Viola* transporeat aquatica: caules quoque hinc  
subtergenos, setos, singulares: folia eorum utrum casili, orbiculatum ipsam ambactis,

multifida, similia quodammodo vulgari *Millefolio*, verum in quibus huius amplius maiora sibi:

Ranae hinc summa in casili prostrant, & ipsi orbiculato arboris digestis, & ex quinque fo-

liis compositi, Leucrois similes, sed minores, candidi, modo orbiculatores, odorati: radices

foliorum repaet, fibrosae, in par, extrema tamen parte alba in modo respicendentes. Tota huius

herbae casili prostrant, sub aquis condunt, neque vere ci intratans novellia videtur Adven-  
casili



Millefolium squarid.



Viola squarida claus. floe.



Viola squarida.



cauli verò ubi excreverit, vni cum foliis superficem superat ac supra aquas erigit.

Reperitur in lacubus & aquis stagnantes aut pignas flammibus, apud Belgas frequenter.

Præsertim herbam Greci *μυροφυλλον* appellant Latini Millefolium ac Myrophyllo: Dicitur verò & spiritus vocatus *μυροφυλλον*, *εγγονος*, *ε-χιδνης*, & Romanis Supericuli Venæ Officinas recoguntur. Differunt autem illud Millefolium ab alio terreste, *εγγονος* *μυροφυλλον* quem nominant, de quo Pezomachus prime, lib. vii.

Aliam vulgè tamè vocant appellant, id est, Violam squaridam: Gallis *εργυλλος* dicitur. Martialis hanc quoque Myrophyllo speciem facit, tametsi cum descriptione non parum conveniat. Nec enim caule est singulari, nec miles vnicus, quæ Myrophyllo esse describitur constare siquidem radice multis fibræ, & caulis præsertim compositus.

Describitur autem Myrophyllo à Dioscoride his verbis: *Γαλακταλιν* est *εγγονος* id est singularis, comæ, vnicæ radice vnicæ, omnia quælibet multa leuiss, Fomaculo similia.

At Myrophyllo, ut Galenus ait, relictum est facultatis: eam verò & *εγγονος* *μυροφυλλον* neminem accere, refrigerans quoque esse oportet. Dioscorides siquidem Myrophyllo *εγγονος* vulgæ, inquit, ab insidiatione vadicat, *εγγονος*

am venarum reflexum in oppositum. Dicitur vero & ex alto præcipitatu cum aceto & lacte.

Feculentam autem Viola palustris singulam similiter videtur habere & siccam nullam esse in medicina vis.

De Nymphæis.

CAP. V.

Nymphæa alba.

Nymphæa lutea.



**A**QUARUM foliola & Nymphæis utraq; est, candida videlicet & lutea. Foliacidida habet in liguamentibus glabra, inaequali, porosis pediculis, in aqua, lata & prope ad horrida, & quæ plurima parte supermarina, quæ superiorem partem glabra & levis sunt, antemore vero floris atque dibricta. flores in similibus caudicibus & in singulis singulis omnino candidis & compluribus foliolo oblongis & acuminatis, in quorum medio flammis inola lutea. post florem capitulum prodiit rotundum, in quo semen nigricans, splendens, M. l. m. m. radices sublimi crasse, molofis, forma nigre, utris candidæ ac fungosæ, vade plantæ eadem fibre, quibus in fundo hæret.

Luteæ, folia similia candidæ sunt, quod tamen oblongiora, foliorum florumque pediculi similes, in angulati efficit: flores lutei, ex quinque tantum foliolo brevibus, rotundis caudicibus rotundis, in medio quorum capitulum prodiit rotundum, in orbem, compluribus luteis flammis, circumdatus, in quo, vbi ad maturitatem pervenerit, semina quoque splendens, prope adim clariora, in prope grano minorâ. radices crasse sunt, longæ, quibusdam vel in aculeis affecta, semina for sique candida, sublimia fungosa & perosa.

Nymphæis utraq; in paludibus, stagnantibus aqua, amplioribus fossis, & prope lapsa dilabentibus, nascitur, ac sicut de fluminibus. M. l. m. ac luteo flores.

Græci Nymphæis ac Luteis similibus Nymphæis, quod aquosa loca amant, dicta, in dione Dioniside: Officina Nymphæis nuncupant. Apuleius Latine ut appellat, matrem Herculanam, Algas palustrem, Pappus palustris, Clavum Venens ac Digrum Venens. Marcellus procerbus auctor, Latine Clavum Herculis, & Gallicè Radix nocentem refert. Germani esse matrem heronum: perstrang. stratum: wasser gägen. Belgæ plerumque appellant: Galle Rose d'asse. Luce: des foliages, ut Dioscorides refert, dicitur.

Habet autem, Galienus ait, Nymphæis tum calidæ, tum fœmæ deficcandæ vim circa morbos: itaque venenit profluvia colubet: semina quoque frue per adstantia, sine alto pedo in molli-  
\*profluvia rotare. In autem potè etiam dyfentericos.

Cæcilia

Coverim Nymphaea, quae candidam habet radicem, potenter oris est facultatis, ut & malibus medicatis profuerit. Verum & hanc, & ea quoque quae atram habet radicem ut vas nigro ad fletu habent nonnullam verò habent & abstergenda potentiam: utaque & aliphosilant, & alopecuras ad alphas traserantur aqua ad alopecuras pice liquida. Sed ad hanc aptior est ea, cuius radix nigra est, & citi ad alba, cuius alba. Theophrastus, triax, procat, & plage imposita, sanguinem sistere traditur.

Natura aqua candidae Nymphaeae flores, ad capites causa calida affectus commendat. itaque verò radices, renus & veticis calida morbis mederi, & aduersus gonorrhoeam efficacem, non videri exultat.

## De Lens lacustris.

## CAP. VI.

Lens lacustris.



Solus similis, & rursus aquas amari recusat, &

**L**ACUSTRIS Lens, velut Mefus quidam vinda est, in inter foliola, rotunda, Lens magnitudine, & quocum modo, infensum pes, tenuissimè fibre capillorum instar distendit, quae ipsi radicem loco sunt: caule, flore & fructu caret.

In lacubus, velibus fossis, & alio non decentibus aut sterilibus aquis, iustitiae & latè Gape superficiali eius occupata, reperitur.

Græca palus & Ely vultu insulas dicitur, Lens Lens lacustris, Lens aquatica, & Lens plustris. Pharmasopon aquae Lenticularum nomen Germani Dintelstein: Belgæ Warreton: & frequenter extenugram hoc est, Annon herbam, quod videlicet cum Amara palustris. Ita Lens & palus: Gallis Lentille d''eau: Hispanis Lente de agua.

Est viscus, ut Galenus tradit, heridique frigida temperata, utriusque ex frigidis quadammodo ordine.

Prodest, Diabosides ac, omnibus inflammationibus, erysipelatis, podagrisque, & peric, & cum polenta imposita: praerogata etiam contra celas glenac.

## De Ranunculo aquatili. CAP. VII.

**R**ANUNCULUS aquatilis cuiuslibet habet rotundos, totius, in vultu & obliquos sparsos: folia sub aqua multatida. Chamaed per amorem in ore nata. Flores candidi sunt & odor

Ranunculus aquatilis.



in forma Ranunculi perfundes, quos, veluti in hunc usi Ranunculo, aspera conspiciuntur  
 aperta, fomen coarctata, radices tenues sunt & capillares.

In solis aquis habentibus, & terris decurantibus inuis, nec non in saxis eorundem apertis,  
 acerbiora sunt crebrius gignitur.

Aprili, Maio & subinde Junio mensibus abunde & late flores.

Ranunculus quidem est aquaticus, & Polypanthicum aquaticum, pharmacoporum & her-  
 bonarum plerisque Hepaticum aquaticum, & Hepaticum album perpetuum appellant, & cum  
 nonnullis errore refrigerantibus Hepaticum album loco, medicamentis admiscere: tunc tunc siquid-  
 em hinc aquaticus Ranunculus calidus est, & Ranunculo herbe similis.

De Sagittis.

CAP. VIII.

Sagitta major.

Sagitta minor.



**SAGITTA** herba in longis triangularibus leuibus pediculis, folia profert triangularia  
 An folia longiora & angustiora, alata sagitte cuspidem pressimè referentia, inter que  
 modis eadè casualis rotundis, leuis, intus spongiosa, in quo per uniuersa termi nascuntur  
 floris, & ipsi ex tribus foliis communi, candidis, flammatis quibusdam in medio partem.  
 Floribus subbasibus virentes, rotundi & nonnulli aspectu palati, castaneis in roseto, radi-  
 ces fibrosi pallide & fibrosi.

Capax in lucubris, & aquis resedibus, vel etiam rivulis leuissimis inuis, radices fan-  
 dulis herens: folia, flores, & fructus super aqua emittit: & uno quidem loco lictor ac illa-  
 re reperit: altero verò minor & in paludibus folis.

Floris per similia Maio fructus Julio perfructur merito.

Sagittam & Sagittalem recentem appellant normanni Linguam Serpentis, & vulgè Ser-  
 pentinam. Sagittam autem, à Grecis *meleis* appellant, Magorum refert Pliniam tradit, *meleis*  
 Pliniam dicit à Grecis vocari, quam inter vias sagittam appellantis, lib. XXI. cap. XVII.

De Seda aquatili seu Stratiote potamo. CAP. IX.

**AQUATILIS** Sedium, folia habet Aloë herbe similia, sed tenuiora, & minor, per am-  
 bita, duris quibusdam brevibus aculeis spinosis, inter que vagine quedam erumpunt.

Sed aqua quae dicitur Stratonis potissima

Sed aqua quae dicitur cum Bomba



Caneorum forficulis perfrictis, quibus de huiusmodi flores excunt candidi, trunt fatu-  
rum, Ranae molles perfrictas, inter olea ex aqua flammula in medio gerentes. Pro radice uultus  
longe fuit, rotunda, candida, crassioribus lyncam fibris, aut longa huiusmodi perfricta,  
que ab ipso folia promitte, breui capite descendente, a qua fundum perant, quia inter  
ramis assequitur. Exerit ab eodem & aliq obliquo fibris, quibus in Ranae molles multitudine.

In stagnantem aquarum facibus, & fossis, locis circa Scaldum & Dilem Belgij, limas  
complanatus reperitur. Mactam a foliorum pars uia cum floribus aqua superat, et aqua quae  
super, sub aqua conduntur

Iunio, Iulio, & Iulio de Augusto ferre.

Sedem appellat potissima aqua, ab Alois videlicet firmi tradit, quod Latini quoque Se-  
dem appellatur, & quibusdam Cane et huius, huius Cane forficula dicitur. Videtur enim  
egregia in huiusmodi potissima, ad est, Stratonis aqua, quem & egregia in huius  
modi, Latine Mithracum aqua dicitur, quae appellatur. Nam aqua in huiusmodi, ubi huius  
superat, & si fibre alia quae ad aquam fundum descendit, radices non sunt, ab ipso  
etiam in huiusmodi & Scipionis orbiculari foliorum ambu similia est, huiusmodi quae il-  
lus in huiusmodi ac longioribus, necnon refrigerantem etiam naturae, quales Stratonis po-  
tissima esse. Dicitur enim de huiusmodi prodidit.

Siste aqua huius Stratonis, eodem auctor, sanguinem in huiusmodi, videtur ab-  
flamma non afferunt, erysipelas & ordernum cum aceto impositus prodidit.

#### De huius. CAP. X.

**S**ITUA longis, orbicularibus aut amplicibus, crassis, sinuatis & maribus istiusmodi  
qui superat, in alio quodam diuerso: folia ei oblonga, ex pluribus alio com-  
mista, quorum singularia, quae in, glabra, & per circuitum etiam in modo uita, perma-  
laribus Hippofelino foliis minoribus flores in vni belis candidi. Radices uentus, in huiusmodi  
latae veluti fibrae sunt, quae non modò subsunt, sed & eandem gemitu admittunt, in  
quibus aqua conduntur aut limo in figurat paribus. Apio autem etiam Hippofelino, in huius-  
modi odore est, Naphthae (vulgo Peimole) odore uentus.

Huc autem allus est, quod Lobelius in palustribus ac si robibus normalis huiusmodi

Aut.

Sium.

Sium odoratum.



*Amorpha reperiri refert, folia (vi pinguis) magis diffecta, fingulanibus per marginem quosq; cunctis: cuius flores in umbellis à luno vident: fermen sapore nonnulli habet acriditatem, tamen multo fibris fando adheret.*

*In parentibus nascitur rivulis, & si bene, sed rarius, in colibus erit aqua.*

*Julio & Augusto floret.*

*Germanorum plerique trasser eppich, fruch eppich trasser nennt: & nostrate dulcilo quare quocumque aquantia. Apium, aut Hydrocotylon quod dicitur: Ichn Gergely fruch Hispani A. a. lya. Pirris ac Latine Laurer, Dioscoridi Sium est: quod in venetis eius exemplaribus, Anagallis aquatica & luncus quoque dicit odoratum legitur: vnde occasioque sumptisse videtur, quia Anagallidom vulgo dictam aquaticam, verum Sium esse confirmant. Qui si diligenter sic de descriptionem expendissent, vocibus has supposituris, aut ad alteram: licet sepe stantur ad id ipsum notariam confitent, non tamen in mente ipsi quaequam verbum si facile erradarent. Nam cum Anagallide aquatica, aut luncus odorato, Sium, ut à Diosc. dicitur, similitudinem habet nihil. Est etiam Sium, ut scribit, *laquer lybe, Anagis, quibus per thalia in montibus nostris, pinguis d'ij agrorum form, et est, frutes coctus, pinguis, folia lateralibus, Hippodamia similia, sed minori & odorata, quibus non est luncus odoratus: nec tamen Anagallis aquatica, quae necque fructus specie adolebit, aut odore, vel Hippodamia aliis modo similia, sed plane distincta, à Sioha de causa multum differens.**

*Foris Sium, ut Galenus ait, quare in gustu odoratum est, rariam etiam exaltationem facit: cuius est particeps. Crudum coctumq; est calidus, Dioscorides tradit, comest & expellat, vnto est, partus & mentes ruat, comestum d'yteneris vnde.*

*De luncus odorato aquatili, altera d'ij specie.*

CAP. XL.

*Sium autem huc Laurer odore & facultate proximum est, alteram quoddam veluti Sij gona, maiore tamen & mitius & tenuius. Caliculi huius sunt teretes, rotundi, leues, obtusiusque rotundi, utant, luncus quod dicitur similes: pro folia spum, utraque sunt & intrans quosque pediculi, sine j'ij aut coctis, à quibus patia aliquot & argilla prominent foliola: flores*

Laurus odorata aquatica.



Laurus odorata aquatica.

Phellandrium.



in magis umbellis, Scabroque angustioribus & minoribus, candido, firmo compressi crummi fermen. Anfo maris, subscandens, superius parte latus radices tenuissimas & nigri sunt hinc, & albis inferius ad locum. Est ut verò & in uno caulis, fibres obliquè superius, que ab eis terra aut limo hauritur, radices dicitur & caulibus promunt, Scipiam hoc modo multiplicante super, que tamen & similes non possit.

Reperitur in penetralibus rivulis, ut in aquis frequenter, ac Scipiam, via dum generat non raro etiam in palustribus & ripis, mox muscos ac foetas.

Adolefit etiam in hortis aut alibi locis non perinde humidis, ferunt, quod tunc magis molitur & ferocius est, solo atq; habet inproprietate, Characolis similia, sed remota, utique verò, ut eius, quod in aqua et in radice sua cras, parum silyacibus Rapa similes, verò minus ac breviores, à quibus & mofas quædam serpentes aut fibres, ab his radice radice ac solo produnt. Ita non raro in locum transiunt super, formam & signa aliquid parte continent.

Floret utrunque autem mensura.

Augusto se men, in horti quidem, ad mirumque peruenit.

Anonymus & alibi nomen est, p. Scipiam. Iud sit, ut in ripis super aquam, ad est, quod non in tribus potest quod So demum tur, inter eas voces, que suppositæ habent quo nomen est, si genus non impedit appellari posse videtur, quando illi casu sit luncis firmis & odoratis, tamen non illi si odoratis luncis que proprie ac verè adnotantur.

Martholus hanc genus illud, quod in horti aut alibi loco non palustris nomen, ferunt commasunt, inter Omentis à se deperit quantum ferit, ab Omentis tamen tamen differens est.

Ceterum siam illud in odor: sicut prius refert, sic & veritas ac temperata luncis calidum videtur ac siccat, & vna om.

De Phellandrio Scipiam ferit.

CAP. XII.

**E**ST verò & certum, So odore & facilitate cognovimus genus caulem illud habet trifidum, in anem, goni calidum supra aqua, hystale in, aut longiorum, in plures alio dicitur, prius iam viderim, postea verò, cum firmo notatam esse compressi, an luncum hauritur, solo hauritur Apij (vulgo Petrofili) tamen, flores in non magis umbellis, parum sunt & candido fermen odoratum, subscandens, Anfo maris radice fibres sunt, veluti Scipiam ad inferos caulis partem quæ geniculis ad quædam

Etia sic mac fistibus quibus suum locum, & similia cum eo saepe reperitur.

**Radix** sive proculis: Anaphalis semen marianum est.

Apud nos tres, quod sicum, nomen non habet. Officinarum incognita, sicum & Sium, <sup>Philo-</sup>  
 i Plinio Phellandrium nomen tantum videntur, quod lib. xxxviii. cap. xlii. & noster in palmis tribus <sup>libris.</sup>  
 ubi solum Apu procul autem & aliud genus, suum illud esse, quod Pterisipus, apud Ache-  
 naem in aqua dulci affirmat, solummodo habere palmis Apu simile, de quo Plinius

*Apu si aqua dulci solummodo videri videtur. id est,  
 Sium Apu aqua sive carum molli sive prae.*

Su modo hoc Pterisipi suum non idem est cum proculi loco descripto Sio.

Quod autem ad facultates attinet, hanc debemus esse, quam calidam esse & siccam, ac Sto-  
 macho ac temperamento simillimam. Quia de causa, virtutes et mores promocat, ad vesicae  
 frigidos affectus vult, & ad calculum, quem committunt ac expellere potest, si natura  
 sua frigiditas fuerit.

Rhiza, Phellandri, inquit, semen bibitur propter calculum & vesicae incommoda.

*De Nasturtio aquatico sive Sio Crataeo.* CAP. XLIII.

Nasturtium aquaticum.



**N**ASTURTIO aquatico caulis est crassus,  
 longus & truncus: folia multa, oblonga, &  
 vincta, ex planis in cordatis oblongis com-  
 posita. Stipes raris alarum & caulis superiores  
 partes pericularem prodeit. Elogit deinde ro-  
 tundae, ternae, oblongae, in quibus firmi pan-  
 cum tunc colens. Pro radicibus fibrae tenues  
 candidae sunt, castae, quae purae aquae immor-  
 gae, pluribus locis adhaerentes.

In fontium limpidiorem musis, & aliis  
 locis pura aqua habentibus, gignitur.

Flores albæ, semel interea manent. Hyperic-  
 um mollem ad epulas in ferat, ac accitum lo-  
 cam explet. Tota herba odorata, sed laevorem  
 magis, Nasturtii refert, vult & illi nomen.

Appellatur autem nostris Nasturtium Germa-  
 nicis Sturbsch: Itali *Cressa*: Galis *Cressa*  
*aqua*. Latini recentiores Nasturtium nominant  
 aquaticum plerique etiam Nasturtium am. Dico-  
 condia autem  *Nasturtium aquaticum* sive *Sylvestrum*  
 alterum est, quod a nostris his, quae purae aquae im-  
 morgatur, hoc est, Nasturtium noster,  *Nasturtium*  
 nominatur, ab aliis vero Sium.

Appellatur autem Sium, à Crataeo, ac <sup>deum Crataeo</sup>  
 Plinio. Crataeo siquidem,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  
 *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  
 *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  *Nasturtium*,  
 herba est frutescens, vicia, multo ferens folia, ro-  
 randa, murem quam Mentha, nigra & ad. Eru-  
 cae accedens. Plinius vero lib. xxi. cap. xxxi. <sup>herba Sium</sup>

Siquisq; latine Apu in aqua dulci, gignitur in quibus, copiosum ferunt, sapore Nasturtii.  
 Quisum descripto nomen utraque Nasturtium aquatico convenit, quod non modo distu-  
 to solitur, ut Bore & serena ad Erucam accedit, verum etiam odore ac sapore horrenti  
 Nasturtii, ac Erucæ simile est.

Facilem autem vicia ad Nasturtium evidentior habet calidam & siccam: ad stomachum,  
 quam Germani  *Sturbsch* &  *Sturbsch* nuncupant, in vino aut lacte decoctum, & aliquot  
 coctum dicitur eporem, in alium prodest. Vriam provocat, calculum & menibus coarctis  
 ac expellit, multum & vesicae vult.

Sicut qui in ferat maligna, & antiqua vicia, vult nec decocto huius faciem, ac lactem, her-  
 bae ipsam deum de imponi Galenus Symplicium alterum, calidam habere & siccam tem-  
 perant, ac vicia quidem ferant, siccam vero vicia, vult in.

Elia, inquit Dioscoridum, vicia motus purgat lentiginem & ophelim, tota nocte immor-  
 gatur, murem quoque tempore de murem.



Flos cereali.



Anagallis aquatica.

Cepus.



**FLORES**, ut vulgè nuncupant, Cuculi inter a radice sola in oblongis pediculis fuerunt ut solent, nec quæ merito ex a maiore vel minoribus pedibus fieri abstrahere: circa quos sola natura, brevis herens foliorum distans flos in summo candidus, aut modicè purpurascens, parat: Lætas quodammodo similes: semper in caetera valvula mutuant. radice fibrosa est.

Nature non tam in aqua, quàm in lacu humilioribus, & qua creberrime, non modè oculis ac plura, sed & viscerum, ac sensuum tum fugacem aqua mutuant.

Flores Aprilis ac Maio edit.

Vulgè, ut sempiternis, Cuculi flores appellant: plerique Nassumum aquaticum vocant, vel Nassumum aquaticum dicunt: Germani (Bauchstein) (Waldstein) & (Waldstein) dicunt: Bohemici (Bauchstein) (Waldstein) dicunt: Galli (Bauchstein) (Waldstein) dicunt.

Symbry aliorum speciem quendam esse videtur, et facultate ac temperamento simili, vis quoque & calida.

De Anagallis aquaticis. CAP. XV.

**CAVUS** Anagallis habet aquaticam, purpuream, rotundam, & in orbem alio distans folia acris, squamata, subtergna foris contracta, & claram formam, epulas, Anagallis firmis floribus similes, sed minoribus radice fibrosa candida longa, si peris, non habet hanc fibram, ex qua compositus articulus caris.

Et hæc in se sedibus erit aqua, & formosior, ac minorum ac florisorem magis.

Itaque, hinc ac Anagallis foris, semper parat.

Nostra etiam Anagallis aquaticam vocant, plerique Bohemici, à Germanica appellatione voce mutata: Germani (Bauchstein) & (Waldstein) Belgæ (Bauchstein) & (Waldstein) Galli (Bauchstein) nominant, unde & Berolici Latini dicunt. Marcellus eam Berolici dicit esse, quam Greci (Bauchstein) vocant.

Putant autem Anagallis hæc, Cepus esse, quam Dioscorides Porulace similes scribit, sed negora habere folia, & radicem tracta, cum qua Anagallis ista aquatica contracta potest, si per se (Bauchstein) (Waldstein) est, hinc in dicitur. Quod si vero idcirco à seorsis, quod vel folio, vel ut plurimum in hinc in dicitur, conueniat, putant etiam Anagallis hæc resorbere, que in aqua in hinc in dicitur, aqua sequens loca, perennatque: rigari possunt.

Qualitatem autem ac tempericem Anagallis aquaticæ calidam habet ac siccam, Nassumum aquaticum similem, tenuisorem tamen: esse enim ut aliud: & ad Germaniam vocant (Bauchstein) (Waldstein), quod (Bauchstein) appellat, ubi quoque, quod quo Nassumum aquaticum (Bauchstein) (Waldstein) modo. Facultate tamè ac virtutibus parat.

De Cochlearia.

CAP. XVI.

Cochlearia.

Cochlearia Britannica.



**H**VMILIS herba Cochlearia est: folia fert in medio cruris longitudine pediculi: à radice excurrentibus, complura splendens, laeta, crassa, modice cana, insular parva & non valde profundi cochlearia, interdum nonnulla angulata, inter folia caulic prodeunt diadantales, basi in cœulis candida, secundam longitudinem eorum nascuntur, semina parva, castanea, in exiguis valvulis, ut Nasturtii, radices tenues sint & alba fibra.

In Fossis, Hollandia, & aliis marinis insensent Germaniae regionibus, locis palustribus, locis aggeris spōnt nascitur usque ad Britanniæ & alibi quoque in horis suis, feliciter procurat.

Quæritur verò & Cochlearia in Britannia haud procul à Tamesi flumine, ut Lobelius refert, Romæque, gallicaque prorsum in multis, folia quoque, colore quidem, sed non perinde cana, & ad exigui Lapathi aut Anapithis magis accedentibus.

Amat autem Cochlearia non aquas, sed palustris loca & rigas.

Floret Aprilis & Maio mensibus, atque à latere auro: semina Maio & Junio particulatim nascuntur.

Romanorum autem Hollandi, Prusii, & alie finiumque nationes Ioffitruum & Reptinuum Latine Cochleariam vocant, in falce, in rosmo.

Nam cum Telepho aut Britanico (quod ali- quando Ioffitruum fuit) non consentit. Certe enim & folia Prœulaciam non refert, ut Telephum: nec adstringens aut Lapathi facultate assimilata, veluti Britanica est, Diokoide & Galieno anthoribus.

Faciliorem autem Cochlearia calidam euidenter habet, & siccam, virenti Nasturtio super, & equalitate per similem. Mala, quod Stœchus Germaniae nuncupat, efficaciter modo- Cochlearia

ta, in lacte aut vino decocta, & aliquot copiam in diebus epota.

Est autem mala in siccis generis gemmolebium, ac durum tum, abscedunt, ut mare, exsiccataque gingivæ ex ore multitudine in ferientibus aut erubescunt uocor, haud in usum diti- resat



Marrubium squarid



fert. folia eius nigrescunt quoque, sed longiora, densa, per marginem profundius incisa quam Ballares, ut quædam tamen probata, sed vulgata quidem, folia alia parva matrescunt sed multo nigrescentibus libris volentibus.

In rivulis, ad scrobium aquæ habentibus margines, & secus fossas, gignatur vixit enim in pediculis, in studiis autem non potest.

Viget ac floret æstivis mensibus Julio & Augusto.

Aquaticæ ac palustris Marrubium dicitur. Videtur Martialis Sideritidis esse species, ætiam quidem quæ à Dioscoride prima hęc definitur, sed cum hac magis conveniat herba Indica, ut patet Pemptida libro quarto satis locum ostendimus. Cum secunda autem Sideritidis quod actus os afferentes habet multo minus respondeat nisi si quidem Filix folio similis est. Sicut vero & quibus placet Ægyptium dici herbam, quod in quædam Ægyptios matris nuntur (quales per Germanos contraxerunt) dicitur ac disingatur) hac herba, nigrescentem colorem, qualis quæ Ægyptos, & Asiaticam obtinent, sibi ascribant. Succus enim huius herbar, huiusmodi colore quævis artifices, qui & ad opem pertractant inhaerent, ut cum aut abstrahere nequeat aliud ut tale hinc hoc infusa perpetua eum retineant.

Refrigerandi autem atque vna validdè adstringendi facultatem habere videtur.

De Bechio sine Farfara.

CAP. XIX.

**B**ECHIO sine Farfara sex septem, aut plura à se dicitur producit folia lata, angulosa, Hederæ foliis maiora, candidioraque, Populi alba similia, sed tamen maiora, quæ superius mollis tenuisque lanugine involvitur, inferioribus herbaceo colore vigent. Flos in brevibus pediculis: folia exserti, colore luteo è mistis foliolis facta, qui crassissimi in pappo euntur. In rivulis & candida loca sub terra serpit.

Sub finem Martii & circa Aprilis calendis fugacissimi flores conspicui sunt, qui citò vna cum pediculis moriunt, unde folia progurgantes tota æstate in vigore stant. Atque hinc dicitur, ut abique flos Bechium creditum fuerit, quod & Plinius lib. xxv. cap. vi. etiam scripsit.

Scaberrima, & risulorum fistulorumque tips, scrobibus ac fossarum margines, aliisque humeribus & apud omnes loca sponte nascitur.

Græci βίχη, Latini Bechium & Tussilaginem nominant: in Officiis Farfara & Virgula latitans in malis Paris equina; alii Populago aut Farfarella: Germanis Biechik: hinc illud tussilago: Persarum nomine est Farfara de candida. Hispanis Faba de asari Galles Far de asari Angli folia sine & Coltra sine dicunt.

Eadem verò & Chamæleone est, quam Plinius lib. xxviii. cap. xv. Farfaguta & Farfara (si non in exemplis lapsis) appellat eam esse. Quod & Albertus in manu lib. pntio, Bechij notionem prætermittens, Chamæleone verò omnes Bechij vires & facultates ascribit. Accedere videtur Opobalsam Colledionem medicinali jam lib. xv. Chamæleones folia innotionem facit. Consentit & apud Plinium, quosdam Bechium alio nomine Chamæleonem dicitur putari referens lib. xxvi. cap. vi. Et hinc posset ut de vna eademque herba, separatis locis, differens utaque nominibus Dioscorides scripsit. Si modo pro Chamæleone non sit legendum Chamæleone ut quidam existimat in Dioscoridis exemplis legi oportere.

Bechium autem & Tussilago ab effectu dicitur Farfara verò à Populo alba, cuius folia sunt, quæ veteribus Latini Farfara dicta est, ut apud Plinium in Pergulis.

—*Primum locum dedit*

*Fundus, ut præferendum ut folia Farfari.*

Appl.

Bechijus facilius flos.

Facilius folia.



Appellatur verò Populus alba Græcis *Salix*, atque hæc quoque Chamaejasos nomine Bechijus appellat.

Recentit Pinnas lib. x. v. l. cap. vi. dicit Bechijus species, quarum alteram à quibusdam Siliis appellari ait, & re vera hæc non alia quàm Salix, Græcis *Salix* passim dicitur, quam Apuleius cap. c. Bechion ac Tuffilaginem etiam dicit testat.

Ceterum Bechij recentia & adhuc virginea folia refrigerandi nonnullam vò cum adicandi potentia vim obtinent vicerebus calidis, & partibus inflammatione laborantibus opposita proficiunt. Acida verò folia calida sunt & sicca, & modice acra, horum in prunas cidentibus aut Ocum fumus per infundibulum aut hanc dorem patere a. hæc ut ore recepta, otitropia & tussis sicca medetur. proficiunt etiam radices acida ree pro quoque eorum sumo. Auxiliantur verò & eadem in tabulis ex fichtano, aut sclogmate premuntur aduersa malum recentem & respirandi difficultatem. Recentium verò foliorum & radicum decoctum, vel ex his Serapion, recentia ex tenui distillatione tussis medetur.

## De Petasite.

## CAP. XX.

**PETASITES** prius quàm folia, flores, veluti Bechion, similes profert, sed ex quo, mollesco, colore purpurascens, quæ in crassam vel lani speciem coacta, erit vni cum melle, camoso, fragilibus suis cauliculis mucositate accedens. folia pinguia petalo sine galea aut gerando pilis similia, tunc ampliatibus, ut humanum caput ab insidiis & pluviam cum vindicare queat, atque idcirco quàm Bardane maiora, colore subcaudata, inferius tamen parte albidiora. singulis autem pediculis suis sustinent folia. pediculis vero non modo barbati, crassi, camosi, cui fulure circumferente contra aut proceris infidet, amplius fangi (nulli vna parte fissuram ad pediculum pertingentem habere) speciem quandam scirri, præterquam penitus ac amarum. Nam in suo quidem fungorum sapore suspensum concisum apparet, cum verò marcescit aut concisum magis. Ita & Petasitis folium concisum nonnulla leporio parte habet. radix crassa, longa, fons nigra, interioris candida, sapore amara, in numero tamen à verruculis coacta.

In humidis proceris prope diffusorum ripas, iuxta lacum & stagnorum margines acropogon aggregat.

Petasites

Petasites flor.



Circa Calendas Aprilis species cum floribus viget, sequitur inde folia in hyemem usque permanere, novis subinde subiacentibus.

Genus est verisimiliter ab amplexitudine folij visum sive galicium, ut diximus, referente. Latine Petasium simpliciter appellatur. Germani Petstien vray, Belgae *Wachtelstran*. Similem hinc sive Tussilaginis, ac congenerem esse, satis apparet, sed idcirco non esse Petasium, lamquamquam obsequitur. Sed solum, restatarius dicit, non est rotundum ac solidum vel hinc fungus, sed rimum habet. At Dioscorides solum non esse: ut fungus solidum est, sed hinc pediculis *se modo sicuti sicuti* ad eum, ac ubi veluti fungus, ut te vera est. Sed quare hinc pediculis *se modo sicuti sicuti* verba coactis: cum in comparationibus non semper sicuti fuisse videtur exequitur, ac qualemunque similitudinem sepe aliis fuisse. Quod videtur Coryop folio cum Olyve: quod Althee cum Cyclanthe quod Cannabis cum Pimpinella quod item Quinquifolij cum Menthae & tamen barum, cum illarum folijs comparatione reperitur.

Temperata Petasitis radix: & quidem arida, calidam ac siccam obtinet ordinem secundum minimum quoque est partium, ac ad sudores movendos effica. valet idcirco adversus partium tumores, ac alios qui sudore levari possunt, venter humidus eadem interimit, venter humilis, mensis permouet, praeterit coctus, qui vobis praestantior potest. folia mollia & sic, & mensis permouet, praeterit coctus, qui vobis praestantior potest. folia mollia & sic, & mensis permouet, praeterit coctus, qui vobis praestantior potest.

De Caltha palustris. CAP. XXI.

**PALUSTRIS** Caltha folijs ac floribus minus Chelidonium ita refert, ut species omnino nonnulla quae valere possent, nisi multo minor foret, ac durabilis nec facile incedens, folia hinc lata sunt, subrotunda, lacinia eleganter vivens, umbra tenax quadrato plerumque simpliciter, quibus Chelidonium maiora, caules inter haec dodrantales in obliquum assurgunt, in quibus florum sicuti luto repleto recondere, Ranunculi similes, sed maiores enim: radice rufis coctis coctis fibris.

Humida, palustris loca, veluti riguis parvis gaudet. subinde ab ipsa aqua exit, cuius folia in praesentibus longioribus sursum pediculis, quae alia brevioribus substant: flores hinc

Caltha palustris.



Caltha palustris alba, flore in aqua proualida.



hinc erit vel nunquam apparet, quoniam tamen Epimedium esse quandoque visum fuit: sed temerè. Nam hæc ab illa, quæ in locis montanis aqua cæcis præcipit, in parte videlicet, haud alia est.

Vel cum Ranunculus Vesca floret, tamen & ferus; subinde quoque albus, non autem ipsa visæ herba.

Germanis *Weyßblumen* *Ostentblumen* vel *weißblumen* & *Warterblumen* appellatur. Valerius Cædus *Caltha in palustre* in nominat. Non est *Chamaele* ut ait *Tullius* in *speciosissima*. Ineptè quoque *Farfugium* & *Farnatum* habetur. *Chamaeleon* siquidem, quæ à *Plinio* *Farfugium* & *Farnatum* dicitur perhibetur, à similitudine foliorum *Achilæ*, id est, *Papav. alba* appellatur non est accepta. Visum autem *Leucos* folia superius quidem, et inferius *truncatulae* quoque latitudine inaequalis sunt. *Calthæ* verò haec utrumque inaequalis parte nec forma eorum respondet.

De facultatibus verò huius, quod vel ex aliorum scriptis, vel visû & experientia compertum adferamus, occurrunt nihil.

#### De Epimedio. CAP. XXII.

**I**NTER eas stirpes quæ locis excruciativis veniunt & Epimedium nomen eundem, quod a doctoribus Dioscorido ac Plinio in humidis nascitur. *Caulis* est herid in aqua, *Hedera* filis, densa aut duodecim, neque florem neque fructum ferens, radice terrea, nigra, grana odore. Atque tale quidem Epimedium nondum à quoquam repertum accepimus. Ostendunt tamen huius nomen, herba palustris flores & fructus facere.

Folia huius ampla, numerosa & orbiculata, nec minus à venibus tenuibusque dependunt pediculis. Sicut hæc *Hederae* foliorum figura, latæ, acuminata, durissimula, sed dilata in varietate, ac per circumferentiam è nervis, sursum inter hæc tres & dodrantibus circulis unum folio superius, perquam elegantes progignunt floculos, formæ quadrangulares, quorum nervi marginis, inter non lutea, medijs verò vixit nigra, ruber verò & exterioribus & acribus parte *Befularis*, sed discurrentibus rectis candidisque filijs variegata, sed in multis in alijsque propagine omittit, inferius albescit.

*Epimedium.*



*Argentum.*



Nascitur in horto dno & in plerisque Italiae partibus circa Bononiam ac Varennam, apud Belgas in horto quodamque reperitur.

Appellatur posteroses Epimedium, sed legitimum esse affirmari nequit. Nam, ut supra diximus, Epimedio Dioscorides flores & semen esse negat. Planus nunquam florere Epimedium quoniam solet.

Epimedium autem modernè refrigerationem vim habere Galenus affirmat, cum aqua humiditate. talis verò & facultas eius esse videtur licet hoc quæ pro Epimedio habetur.

*De Argentum sine Posailla,*  
CAP. XXIII.

**A**RGENTINA sine Posailla tenuibus & vinculois costiculis hinc terget. folia eius oblonga, vellem ex pluribus composita, Agrimonie fere similia, sed Tanacetum proximiora, ita ut tamen, arbutu quoque ferrata, siccitate parte herbaceo colore rufesca, infusione verò antheasit. Boscali in tenuibus pediculis later, veluti Pentaptylla.

Humidis locis ac siccis ferobes, rariore, frequenter occurrunt.

Flores Juno de Julio promit.  
Argentum & Posaillam siccioris ætatis appellat: nonnulli Agrimoniam sylvaticam ab Tanacetum sylvaticis: Germani *Cherfisch* & *Cherfisch*: Bohemi *Cherfisch*: Galli *Argentum*.

Temperiem autem Argentina mediocriter frigidam habet, siccam verò ordinae tertio fere, vim cum adstringenda facultate.

Sanguinem vitium vadoqueque sunt cetera reprimunt, menia mulierum sicut, hæmorrhoniam ac dysmenoniam vitia valde etiam alant. Humores, quosque tandem adhibentur modo, pulvis ardaribus & vitæ rignos etiam summorum iniperius sunt, prodest & hoc modo cruentis vulneribus. Decoctum ex aqua mobilis dentes sanat, & gingivarum ac oris vicioribus conducit.

*De Nematolera.* CAP. XXIII.

**S**EPIE Nematolera veluti Argemone, nonnulli oblongos costiculos multos emittit, circa quos ab unoque latere, folia digentia lanuginis, prope modum rotunda, virentia, neque è sine lacum boscali in brevibus pediculis, colore hinc, Ramicali floribus similes, radix tenuis est.

Junia ferobes & florent, aliisque sicut loca possent, sicut & in humidis reperitur sylvis.

A Mase mense in ariditate efflorescit, Nam malianam appellant, & Centaureobian. nonnulli & Serpentinam feruntur autem siccioris vulnerari, hac sibi modum, vnde nomen accepit Serpentinam. Centaureobian & D D mani-



Nematolima.



Glabialis aquatilis.

Myrsine



in iudicia aduersus multos morbos effrenata. Ita exornatur: Nutritionalium vero a figura non tamquam folia referunt. Germanis *Egri* frant *Pfennigkraut*: Belgis *penicellum*.

Reticeantem autem hinc herbam esse, fapor eius adstringens ostendit, est vero & hinc modice refrigerans.

Flores & folia contra vulnibus & nonnullis vlcibus applicata profunt: eadem cum vino satrapa dysenteriam, ventris umbicollis amulxiuque sistant. Conducunt & ad fingum reticeantem, profunt in tracheitis & interiacentem vulnere, & pulmonis exulceratione. Vtunt in quo herba sola decocta, vlcem in costis, si hoc laeuatur & abstergetur: videri Leonhartus Fuchsius.

*De Gladiolo aquatili.* CAP. XXV.

**F**ORIA à radice Gladiolus aquatilis dicitur. Fertur Pica dotanda inter folia angustiora, longioraque; inter que caulis medius est, duos longos cubitos, aut aliter, leuis, apiculis, nullis internodiis intercipitur, necnon summo complures erumpunt strobili, longiores pediculis insidentes, in purpuradum, in quibus strobili exigua crocei coloris squamulae rotunda capitula purpurea, quasi rotunda, parua in pediculis insident, & in his si meminerimus, vltima crassa, candida, generalis consistit, & aduersus fibras complures habet.

Nascitur locis palustribus in stagnantibus aquis, aut lenis pigrius fluminibus vltis.

A Maio ad Augustum vespellunt.

Nostri *wasserhij* appellant: Latine Gladiolum palustre inquit: aquaticum: plerique tamen Scirpus: sunt qui inter Iuncos perperam insistant, & Iuncum strobili vident. Vident Diuicordis esse *aragatium*, quod folia Gladioli sed angustiora, & magis meliata habet, & in summo caule quasi globulos ferre videtur. *Spargano* id quoque à nomine recipitur.

Faciliorem autem Gladiolus isto palustre refrigerantem habet, non tamen insignem. Diuicordis Spargano radices & strobili, cum vino dan aut, à superius vltis.

*De Platano, seu Euxina Theriopsi.*

CAP. XXVI.

**P**LATANA LIA angusta habet folia, apicula, dorso etiam non quodammodo triangula: caule: leuiter, rotundus, breuis, aut altior, in ramulos & alios quosdam dactylifras circa hos complures, rotundis, nucis parua magnitudine, & vbi ad perfectiorem perueniant, asper, Platani pilulis quodammodo similes, colorem herbacei: radices sublimi fibris.

Locis palustribus, perennes aquis habentibus est, ac inter riuulorum quorundamque fluuioium margines.

Pilulis Augusto mensis profert.

Planta.

*Platanus sive Bourgeois.*

*Platanus alta.*



Platanus à fructuum cum Platani palulis similitudine nuncupari potest. Ex nostris plerique Græci & Romanorum tigræ nominant, ad eam Germani arundinaceam, ac Græci *επιρροή* vocant: non videtur tamen Germani arundinaceam esse, quod Dioscorides ait, in Babylone iuxta viam natis & cum fructu natis nocere, trahi.

Martholus hanc vel hanc omnino similem pro Sparganio depingit: verum quantum ab eodem Sparganio ablit, vel folius palustris sitis ostendit, quæ non est *επιρροή* quædam, sicut in hinc et aliis nominibus, sed & multo infra eam *επιρροή* & alibi quoque existunt.

Exhibet autem & aliam eamdem hanc generis *επιρροή* nempe Lobelii, palulis & circa eadem, & *επιρροή* ferentis, quæ cum Sparganio plus, quam superius, similitudinis posse habere videtur.

Platanus ad hanc Platanaria cum *επιρροή* habetque Theophrastus lib. 1. c. 111. De similitudine scripsit memoriter, quodque ait locis palustribus eam, sed in maris angularibus, Herodoti ac Cypri similibus: eademque æqualitatem peculiarem fortassis, & fructu natis, si de magnitudine provenerit.

Idem autem lacustris est planta, quæ caput generis in Papyris, eodem Theophrasto lib. 1. c. 112.

Hanc Batoni mentionem sibi Democritus Cyrenensis Cassi Dionysii lib. 11. videtur επιρροή scripsisse habere Cypri, quæ hanc palulis, unde nomen, Ruello auctore, accepit. In libro 11. Cetero exemplum habetur eodem *επιρροή* sed pro *επιρροή*, vel multum *επιρροή*.

Possit Platanaria facilius, cum ea nullus sit in præsentia visus, incomperari. Nec de Batoni scribitur, apud Venetos quæcumque scriptum reperitur.

De *Herodoti* *επιρροή* CAP. XXVII.

**H**ARVDO vulgaris, multos profertur, crassior quidem quam villos vulgaris fructu Præcitur, sed utraque quædam multum aliam Herodotum, inanis, generatimque, necesse patet: membrana tenuis, benthos, folia longa, lata, aspera. In farrago caulis effusa etiam lata, mollior, velum lanuginosa, nodosa sublimi longe, numerosa, generatim, hæc fructu *επιρροή*.



pla riles, nonnulli autem vases appellantur, sed aliis communissima, quam densissima mensura omnium referunt, & apud Italiam Italicaque partibus utitur Italia. Tergul quoque, quam Grecorum quodam appellant, Plinius Sagittarium, sui generis est, prodeus paucus generis est, canaliculis otibus, & suis sicut in aqua occupata, & loquax, quod libet flexibile facta.

Sunt & diffusentia magis, ex foliorum non multitudine, aut magna modo, sed de colore, quippe quae Laccena cognominatur, verticulis est, item & ab ipso dicitur, quod à crura dicitur posse foliorum plurimum ferant, alia fructus modo adhibetur.

Genus etiam quoddam Phragmatis dicitur, quod non erigit caulem, sed raris tertium Gammatum se ipse vocatur à quibusdam Elegia Plinius inquit. Hinc mascula solida est, femina vero cum & inanis.

Dioscorides Harundines in quinque contraxit genera, verum an bene, vel scilicet, expendere licet, non requiritur.

Plinius in Harundinum genere, verbe, id est, solidam sive piensam facit, ex qua legitur à hinc Phragmatis, hinc Theophrastus, id est, lignatum harundinum nominat.

Primum femina est, ex qua legitur triburum, hinc Phragmatis quod hinc dicitur. 1.

Tertia sylvatica, quae non potest generis, hoc est, masculam carnalem, sive masculam carnem habentem, qualem iam Dioscorides perhibet. In quodam, ut castellanum, Phragmatis & passim legitur Germaniae vulgaris, nonnullis, candidioris, praesertim viti inarvens, & inanis Harundo quae cum non solum ad operiendas domos utilis, sed & sepimentum maxime idonea est. 2.

Quarta aliis Phragmatis, canaliculis, apud omnes nascens, quae à quibusdam Cypria. 3.  
 Quinta Phragmites, speciosa, sparsa, gracilis, candidior, vultu cognata. Rutilius hanc Valloniam interpretatur, ut Galla Valloniam cum conseruit, quam Theophrastus Phragmatis vocat. Quod à Mattheolam machaeriferam, non tam facile visosum Dioscoridis locutione esse, si speciosa sit, non in eadem hic nullum apparet, nisi omnino existente speciosa, qualem iam Dioscorides perhibet. In quodam, ut castellanum, Phragmatis & passim legitur Germaniae vulgaris, nonnullis, candidioris, praesertim viti inarvens, & inanis Harundo quae cum non solum ad operiendas domos utilis, sed & sepimentum maxime idonea est. 4.

Inanis vero & Phragmatis est, quae etiam Hippocrates, lib. De Haemorrhoidibus ostendit, in qua Phragmatis non potest esse efformat, docet, ad modum Calami Phragmatis, mitramentum per quod feram cadens in anam mittatur. Porro verò haec vulgaris Harundo & Theophrasti Phragmatis, sive mascula est, quae, Theophrasto & Plinio auctoribus, vacua & inanis est. 5.

Ceterum in quod ad facultates attinet, Calami Phragmatis, inquit Galenus, radicem cum libris aculeis & superius et alio exalibere quaedam semper, cum irascendi quaedam via trahit, non tamen eius est periculum non fecerit, verum quantum gustu licet, conticere, oblongum facilius inter perdidit non pauca, minus inquam acrum. Quae etiam sola ipsa abstergeas sicut facilius cortex vero eius combusit, admodum rutilum partium, & digerentia sicutum efficitur, admodum habens abstergeas quaedam, ut ex licet & exalibere tris quaedam modo coditio, plus tamen dicitur quàm exalibere. Viridius est quae sicut, quae aliis vocantur sicut in anam incidat, ad id emaceret ad hanc affigitur, ut ad id non possit, ad hancque vitas quamobrem sepissimè exodit.

De Typha Palestri. CAP. XXVIII.

**PALUSTRI** Typha oblonga sine folia, angusta, deorsum emittente triangula: caulis intercaur noster, alius glaber, sicut & erodit, non inanis, cum summo cacumine plurimum vultu gignatur spica masculos flores profert, qui marcescente ac decidente panicula reliqua, deorsum compellitque lanugine stipata, postea crassitudine, postmo non raro longior, generis ac oblongum colorem, in pappo tandem emittente. radices caulis, geniculatae, candidae, sapore dulces.

Loca palustribus, in stagnantibus aquis, & raris laxorum fluviorum ripis erit.

lib. & Au gusto paniculae vegetae, sicut locum spicam arida ac decidente. Resistent sub adhaerente ad altemum cum sicutum, neque tunc non raro pediculi in ipsa panicularum lanugine non reperantur, quod ad intentione hinc dicitur. Ceterum etiam caulis tunc omnino sit vultu, & lanugo ad id sicut vultu abstergeat, amulculari lanuginem sicut lanugine est ipsa ac vultu posse sicutum est.

A Dioscorido ipsa sine Typha nuncupatur: recentiorum ad differentiationem aliter Typhae, quae inter fruges est, palustrum & lacustrum Typham hanc nominant: appellant ab eadem Calam nonnulli, necnon Typha aquatica.

Theophrastus Typhae sine Typhae etiam eandem meminit in lacubus erugum, quae aliis Phragmatis, ut dicitur, est, quia non ut reliqua radice numerosa ad hanc, & hinc nostris caulis

Typhopalastrum.

germ.

detra.



sepe

etiam floreat scirpus matris nominat, ut Eustorion vt.

*At domus, de fideis, ut, plantis, maris*  
*Infusio, ex plantis scirpus matris fuit.*

Germani eadem cum specie Narritoben & dißneßen; nostri *Lästetten* & *Wald* Gallie, *At fistis* appellatur & apud quosdam, inquit Roslinus: Gallie pars Massidurum, quod scirpus tegem, Massie vulgo dicitur per potius scirpus lanaris floccorum dicitur hinc manum si saguus emulsi ut Herodotus, Mattheolo dicitur, *et non fere dicitur, quod non lanaris, si in arcadecis et Jardi tunc affert.*

Cibo idonea, Theophrastus ait, Phileum panemera ab radicibus procreta est, ut quae parti parati potissim esse mandant.

Dioscorides Typhae formi folio adipe oleo exceptam, am bustis medicis, ut fert.

Herodorus Indos qui in palastribus summas habent, vchem ferre scilicet *scirpus, detra,* ex qua, quem ipse *scirpus* nominat.

Nosm ex folio formi esse matris, & alia multa continent.

De Jure.

САР. XXXI.

**I**УНСОВАУМ non vnum genus est, omnes autem absque folio, foliorum vero loco videntur rotundos, tenuis, longos & emolles procreant, veluti stylos, in acumen scilicet pariter fructum non omnes, sed qui ferunt, parva inter carum, ab uno hinc dicitur esse. In lanceo eorum parvis bene busque pediculis, cohaere, nam parvarum vnum modo, in quibus formi eriguntur, est, diu, radice, ut per se & sibi. Plurima, de eo per Theophrastum, lanceo dicitur omnibus anni etiam, etiam autem et eodem ex semine, in semine vero dicitur esse, ut per se eorum in tertium dicitur, affirmant. Quale tamen nihil a nobis dicitur posse.

1. Hecum vnum genus inquitur dicitur & crassius dicitur reliquis sapere, quod lanceo, plurimum medulla est fungosa, candida, ad succum autem summa, in quibus est ychthyaceus, non dicitur in oleo veli. In casu enim ipse ad reges & vicia cum non vult sumis, locis gignat hinc dicitur.


2. Prosimus hinc hinc, similiter est, sed minor, breuior, ut inquitur, qui & ad semine similiter vicia, de medulla candida fungosaque referuntur, tunc locis hinc dicitur hinc, sed non penne hinc.

TERTIO

Lancea Holochea.

Lancea acuta.

Lancea scabra.



Tertius secundo magnitudine similis est, sed superior, & modulum habet eandem qualem, sed omnino exigua piuma parte manet, ad vincendum quoque idoneus, & praefertim ralicatus & amarus iustus huius sine styli, non omnino est medicabilis, verum omnino ab usum, sed nonnulli ex aliorum fructibus ornantur, sicut Indis & Ferulis eorum multorum folia ab alio sine causa produbone non exantur repentur iidem, quibus priores foent.

Appellatur autem lancea Graecis quidem *χολοχολο* Germanis *Cholochol* Belgis *Choloch* Italiae *Choloch* Hispanis *Lancea* Gallis *Lancea*.

Exprimunt quidem à nobis de scriptis genus *Diocoridis* à Graecis nuncupato simile est: plerumque expositis vulgè *Diocoridis* non manent.

Primum huius lanceae, sive *χολοχολο* auct. Diocoridis esse videtur.

Tertius acutus lanceus, & *χολοχολο* appellatur potest, à nobis *χολοχολο* huius nuncupatur, sicut in aliis aliis quosdam differentes genera veteres tradant.

Tertium huius generis sunt, inquit Theophrastus, ut nonnulli distinguunt, *χολοχολο* acutus & stultus, quem *χολοχολο* appellant, *χολοχολο* frigidus, quem *χολοχολο* (acutum Graecis verba) vocantur, quoniam lumen nigrum ferit, crassior huius lanceae & carthago tertius magnitudine, crassitudine, & molitudine *χολοχολο*, qui *χολοχολο* vocatus est, Graecis Martium interpretatur.

Plerumque tamen Holocheam, à Martio differentem fecit.

Diocoridis una quoque lanceae affignat genera, aliter tamen, quàm Theophrastus distinguit, unum lantum lanceam, sive *χολοχολο* huius nuncupatur, & acutum tamen cum Theophrasto *χολοχολο*. Et acutus quidem unum aut, *χολοχολο* huius similes, aliter tamen *χολοχολο*, lumen nigrum ferit. Hanc *χολοχολο*, illum tamen Theophrastus nuncupat.

Holocheam autem, ut Galenus asquit, fructus tamen non adfert, concilio & oxypheni quoque lancea fere, somnum, sed minus quàm holocheam: quoniam tamen hoc caput tunc. Virumque si insidum cum vino bibatur, ventris fluxum desiccet, & in ulcere rubrum passivum sicut. Ex quibus clarum est, quòd composita eorum temperata est, ex tertio videlicet effluvia huius frigida & aqua huius calida: ut & infirma desiccare possint, & sitim

Plantago aquatica



Hydroperon

Alba



sim frigida ad caput vapores flammam,  
quibus sternulentos efficit.

Diocorides, quæ proxima sunt radici folia  
recta, ostium scatur, aut, imperitoria pla-  
largis demittit.

De *Plantago, vulgaris dicta, aquatica.*

CAP. XXX.

**PLANTAGO** aquatica, ut à recentioribus  
nominatur, folia habet in peristylis, crassa  
pediculis, longa, lata, in mucronem dehiscentem  
Plantaginis maxima folia longioribus ac-  
mutantem. Caulis inter ea exat longior,  
angulosus, ut in fungo, in compositum  
lobis divisi, in quibus flores candidi, parvi, et  
condantes foliis, & fructus deinde parvi, &  
triangulares, in terra, radices seorsum fibrosas.

Exi in modicis de aquis habentibus sa-  
lem, in fossis iuxta lacus & rivulos surgit.

Florat Junio, Julio, & tubide Augusti  
mensibus.

Non sine gratia studendi Plantaginem appel-  
lant aquaticam, & Germanice nuncupant *Uggv  
rutz* id est, mollitate lingua, nam *Uggv* / &  
Gallicè *Plantain d'eau*, Plantaginem tamen non  
admodum similem: præter eam folium, ra-  
dix habet Plantaginis, quod tamen & ipsam  
Plantaginis folia non sine respondet: nam  
longius, magis suffraginam & tenuis nervosam  
est. Simon Isaacensis hanc Barbam ipsam  
nominat.

Sunt qui vel hanc Alisma esse, cuius quædam  
videtur simile: Alisma siquidem, Divaloide  
& Pismo anilombus, folia habet Plantaginis  
angulosiora, in terram reflexa, & caulem sim-  
plicem: sed hæc verba, Plantaginis maxima,  
longiora, non deorsum reflexa, in fossis cre-  
ta habet, & caulem pluribus alia ramosam.  
Quæ manifestam hanc cum Alisma differe-  
ntiam ostendunt.

Facultatem autem hæc Plantago siquidem  
videtur habere & fræam, nullius interme-  
dium, quod sentit, visum.

De *Hydroperon.* CAP. XXXI.

**HYDROPERON** caulescenti caulis,  
rotundis, laces generalibus, in plures  
maxime divisis: folia oblonga, ino Pæfice  
aut Salice folia similia: flores ex alarum si-  
harumque fibris, cum & in fœrens caulis  
lis, in longioribus pediculis ramosam cohe-  
rent, colore candidi, aut purpurei: quæ de-  
inde semen sequitur minutum, lobulatum,  
ruffum, aut nigricans: radices multæ ac fi-  
brosas nartur. Tota herba cum foliis, fibris  
& semine, acris est, & Piper lapore retent, cum  
tamen viliam odoris gratiam.

Naturæ loca palustris, in fossis & lim-  
bus hybernis montibus aquas habentibus, &  
inter flagrantis aquis.

Indo & Angulo potissimum forte. *Caucasus* *et* *gerwinia*. Latine Hydropeper fac. *Pep-*  
*eris* *quasi* *peper*. Gallo Caray. Hispanis *Peperita* *apicata*.  
 Facillime autem habet eandem calidam & siccam non tamen, ut Galenus affert,  
 cum calidum, quam Piper. Folia vix cum fructu imposita, Dioscorides ait, ad emara & veno-  
 sas dicitur, ac fagittata delens.

De *Perficaria*.

*Perficaria*.



CAP. XXXII.

**P**ERFICARIA caulibus, foliis, floribus, semine, Hydropeper simillima est. caulis habet nodos, generatios, folia quoq. Perfice aut Sabice, sed sepe latius & nigriora quam Hydropeperis, articulo sine luto in medio nigro, glumini colore, qui nota manifestissima ab Hydropepere dignoscitur: Borei similitur racemosa, candida, frequentioris purpurascens, semen nigrum, & radices fibrosae. Saporem autem haec herba non est acris, sed sabacidam quosdam miscet.

Reperitur in Libano, & sepi usum quibus Hydropeper locis, ita sepi eodem tempore.

Perficaria à foliorum Perfice similitudine, nuncupatur. Germani *Perfichant* *weid* *Stech* *franz*: Belgae *Perficant* *normant*: Sicut qui velut Plum Plumbagueto esse, propter eas, que in foliis conspicuntur plumbei coloris, nota. Sed Plumbagueto Plantis non à colore, sed magis ab effectu nomen habere vult, quod videlicet plumbo oculorum afflicto medicatur.

Nascitur, Plumis lb. xxv. cap. xiii. ait, vulgò *Molv-den* id est, *Plumbago* *crassa* in *Arabia* *arabica*, folio *Lapathii*, crassa radice, *si* *spida*: huc *commendata*, si oculus subinde linitur, *plumbum*, quod est *giras* *viri*, ex oculo tollit.

Temperiem autem Perficaria frigidam habet, & nonnulli siccup, in fluxu moribus in capitebus & roneibus vulneribus fortis prodesse imposita.

LIBRI QUINTI Pemptadis quarta

FINIS.

REM.



REMBERTI DODONÆI  
AD IULIUM ALEXANDRINUM  
DE FABA EPISTOLA.



**R**OSTRATA QUAEM ARMATITRICE tua, per Alexandrinum, in quodam Ciceroni tua ad me pertransiit, atque in cap. XIX. lib. primo De alimentorum facultatibus accedisti, non sine gratia admirari, quod nostrum, de Bana Carionum dila, sententiam, ac iudicium illam tibi probatum, nunc passim per plures locos, fassibus, vana, & quibusdam argumentis, refellendum. Placuit tibi, ut in Proteribus addita distractiones, & veterum Latrorum testimonia, quibus

Banam vulgo dicitur Faba, non esse adhaerere legitimum Fabam carionem. Tenent, magis induram hac nostrum tibi commendatur, quod dicitur etiam in eodem sententia Iulii Dodosi, viri Euxini Cardis in sua Botanologia, quod tibi primis & astridis & communibus. In qua insitas quidem, sed paucioribus testimoniis, vulgari habetur Fabam, sine Bana, non esse legitimum, et generatim veterum Latrorum Fabam et Græcorum vulgus esse tam dicit. Cum aut iudicium amplectentes, hoc ipsum quoque plures argumentis, ac ex Proteribus petas testimo, non confirmare ac adstrare ausi sumus. Hæc talia sunt, ut vel ipse lucis clarum exponat, quod Fabam sine Bana, non esse adhaerere & Fabam, sed omnino aliam, nempe legumem, Ciceroni consilio esse, per Alexandrinum, argumentis ac testimoniis nostris magis, & non penes, petas, à priori tua sententia, nunc recedat, hac consilio, ut conaria, videretur, & perant, ut ipse, in tu opinionem, qua veterum nostrum iudicium, corripimus, sit, ac nosse, qui tenentia tibi persuaferit. Antea vero, & itaque argumentis dicitur petas multa, & in tua Fabam dicitur dicitur, si hoc ex omni sententia, Ciceroni, Bana multitudine, semper habita, sunt multa, & magis argumenta, quoniam pauca, & terrena. Quod itaque, et mouit, ut tunc, etque parva argumenta, petas, magna, & non pauca, refellat. Nilum ac. Nilum, nec maxime, ac nullum, propterea, si non dicit habet, quod in Hilo petas, aut dicitur, sententia tua, in si, non corripit, & in nihilum dicit. Non Nilum, in tu, quidem, per tua sententia, facta, aut tibi, prodesse, potest. Sed dicit, quoque, dicit, quod, in tua, argumentis, atque, in Proteribus, petas, testimo, aliter, esse, arguendo, de intelligenda, quoniam, non facimus. Sed de his, postea. Non prius, de Hilo, tibi, refellendum. Tunc, si adhaerere, Carionem, Parronem, ac Festum, magis, quidem, celebrare, clarissimum, dicitur, si per, in audio, tibi, parvitas, nec, non, pro, tua, sententia, et, hoc, quocumque, in, melius, petere, petas. Ceteri, de quibus, primo, Tusulanarum, qua, Dicos, libro, primo, Ciceroni, quidem, Nilum, rem, esse, in, omni, sententia, sed, tam, quod, propter, si, multa, minus, aliquid, esse, Fabi, adhaerere, non, expleret, et, Faba, verba, adstrat.

— Nam illud quod Sisyphus versat

Satum, fidans nitendo, neque proficit hilem.

Faba Nilam significare prodicit, non quod Faba adhaerere reperitur, sed medullam eius ferulacea planta per Affidiam dicitur, ut refert Ephorus. Et hoc quidem de Hilo apud Carionem & Parronem. Ex hoc autem nihil quod secundum te faciat colligere poterit. Superd dicitur Festum Petas, in quo Nilam interpretari maxime esse, in Faba grano nigricans illud, quidem sumus opinati. Ad hoc dicitur, quod in nulla (quod facit) eius refertur, quibus Faba (semper vulgare) grano, nigricans, quocumque id, hoc, in qua, refertur, Faba, habentibus, si, grano, semper, quod, demonstrari. Ad quod, per. Et reperit, in, quidem, in Phasice, quoque, grano, sed, grano, modo, non, autem, in, summatum, nigricans, quocumque, esse, id, in Phasice, malit, quoniam, in Faba, max, in, canis, occupare, maxime, in, propter, Nilam, esse, non, posse, quippe, non, tam, parum, tunc, et, neque, carpi, aut, decepti, digni, max, in Phasice, illud, posse, ut, in Faba, potest, in, quibus, exempli, est, &, digni, deceptum, aliam, in, omni, max, tempore, nihil, res, in, fere, fide, posse. Et, dicitur, Alexandrinus, in, in, quibus, Petas, addit, veluti, pro, tua, sententia, sententia, sed, nec, tibi, bene, sententia, tua, ad, suspulatum, offendit, si, modo, commendata, consuleris, &, exemplum, quod, est, à Sisypho, Scyligeri, summa, cum, dicit, in, ac, animadversum, quod, corripit, summa, max, dicitur, in, LXXII. dicitur, in, que, Nilam, esse, in, summatum, (ut, tu, refert) nigricans, Faba, grano, adhaerere, hanc, in, quam, reperit, sed, omnino, aliter. Verum, autem, hoc, sunt, Petas, Nilam, potare, esse, quod, grano, Faba, adhaerere. Faba, sunt, tamen, Nilam, et, facere, quod, in, summatum, Faba, grano, adhaerere, & Petas, sic, quibus, exemplum, habet, à, te, testem, addit. Petas, si, quibus, max, in, dicitur, Nilam, illud, parare, aut, quod, Faba, grano, adhaerere, tam, vero, ut, &, ipse, affirmat, Nilam, quoque, quod, dicitur, est, et, quod, dicitur, refertur, illud, in Phasice, modo, quo, in, qua, accipitur, magis, Nilam, esse, Nilam, si, quibus, dicitur, ad, quibus, Nilam, esse, quæ, et, quæ, nigricans, illud







genere eadem, speciebus quibusdam diuersa cuncta hæc. *Ad Galenum*, dicere aliqui possunt eadem esse genere hæc res, *non, ut in, affirmat. An ne ceteris, Lathyrus, ac si eadem sunt negat, sed Phaficos ac Phaficos eodem genere esse respondet. Per hæc in illis Galenus verba eandem nequaquam petit. Describere Galenus verba ad aliam speciem, contra mentem eundem querit, et integra, non mutila, ac mediam præfert. Quod quæ sit et non saltem, his integre adhibenda putamus. In libro De ratione viuis, Hippocrates scriptum sic reliquæ præteritis quidem insunt, sed magis peritatum fecerunt: Ochi sunt & Dolichus in quidem secundum ceteras: verum minus sunt illud, & non sunt affluunt. Ceterum enim Hippocrates in verbis Pisi Fabæ comparat, quarum pars ut ceteris illud in mentem deinde Ochi & Dolichus adhibet, in eo significat, Dolichum eiusdem esse generis cum præteritis nominibus, & possimilium cum Ochi. Verum cum nullam præteritis Lathyrus aut Phaficos nomen fecerit, suspicari quodammodo possumus, ilorum firmum quoddam locum appellare Dolichum. Quod si quis Phaficos etiam in Lathyrorum genere reponat, negare solent non poterit, quam Lathyrus in præteritis eandem Dolichus appellari queant. Nam & Dactylus in Leguminum catalogo, ut Fabæ primus occurrit, inter Pisi, deinceps ad verbum se scribit: Dolichus verò non minus quam Pisi nominant: præterea illa similitudo eorum quod verò ad fusturam pertinet, ad dactylonem, vincuntur. Verum is quoque dactylus Ochi quidem, & Lentis, & Cicentis, & Orobi mentionem faciens, Lathyrus autem nomen præteritis, eandem præteritis dubitationem. Dicere tamen quis possit, omnia hæc, Ochi, Lathyrus, Phaficos, unum esse genus, verum pluribus nominibus appellari. *Maxime, ut Alexander, in eodem Galeni verba, quæ quidem nihil præteritis facientes faciunt, vel nullas adhibetur, sine manifestum. Vale.**

## F R U I T U S.

REMBERTI DODONAEI <sup>1609</sup> *Historia Lam. nobil. Depositi per muni-*  
 DE OLERIBVS,  
 ET CARDVIS,

STIRPIVM HISTORIÆ  
 PEMPTRAS QVINTA.

DE HERBIS EDVLIBVS,  
 LIBER PRIMVS.

PREFATIO.



**A**NTIQUISSIMA Praecepta Praemissorum legumumq; materia compræ-  
 hensâ est: Quæ cetera idolum barbarum fuerit pari, quæ ceteram hactenus  
 contulerat. Est autem inter hæc differentia hæc magna, quodam ceterum  
 herbas, sicut folia edulis sunt: duo fructus: radicesque vero non parca.

Præterea autem, quæ herbae sunt folia edendo sunt, duplex est generum conuen-  
 ta cum tota, ut subinde sola edi possunt, ut *Atriplex, Beta, Brasica, Lactuca,*  
*&c.* alia vero non sola nec tota eduntur, sed ceteram ac ceteram aliorum con-  
 dimento sunt, ut *Appi genera, Sinapi, Brucia, Nasturtium, &c.* Quæ omnia ut veri cetera  
 dicuntur, sic & hæc, Pemptas illis explicandi. Addebat quibusdam speciebus *Cardus*, quarum non  
 nullæ edulis sunt, ut *Cinara, Cardus, Lentographus, &c.* alij.

Primo autem loco accurrunt herbae, quæ tota ut subinde sola eduntur, additis ceteris & sic,  
 quæ conueniens dignitasque adhibetur, namque etiam edulis non sunt. Hæc enim, ut supra admo-  
 nuimus, similes de iure non diuisibiles quælibet maximas: tam & expeditis cum vtilibus ceteris  
 describit. Ita enim facillime non ut cetera dignitas potest.

DE ATRIPLICE.  
 CAPIT. I.

**A**TRIPLICIS genera sunt duo: hortenſis ac syluestris.  
 Hortenſis cuius procerus & creſtus normalis alit & parvis brachiis: omnia folia lutea, acu-  
 tiora, & illis foliorum quædam, leuiores autem mollioræque foliis: alit signi subinde coarctata.  
 linae folia in densa comæ obductum, nec utitur coleret, radice in altum deſcendit, mul-  
 tumque dilate promittitur. Sicut folia caulicis, in medio subinde ad oreo cetera colere, ac veluti  
 tenui respectu linae, procedente vero tempore in lincum normalis subinde elongantur.

Syluestris lincum formæque foliorum, floribus, sicut in folio hortenſem simulatur, sed a  
 hortenſe ac in mare est: omniaque parua.

Vtilisque generis caulicis, foliisque, & lincum rubens species etiam quandoque reperitur fro-  
 quenter in hortenſi.

Est vero & alia syluestris, humilissima, cum oler, folia angustioribus, floribus, seminaque  
 proceris et proceris.

In hortis lincum frequenter, Sicut etiam non lincum prouenit. Syluestres iuxta vias, semi-  
 na, folia, & in marginibus agrorum sapienter geruntur.

In Maritima ad Terrigena folia & in septem & Amplicum quædam Martialis re-  
 ferunt, hinc suis caulibus proceriorum: folia candida, spinachum inuisibus, lincum in  
 lincum virgo racemans congerit, radice triplix, quam Maritima appellat.

Quæ in lincum, subinde Augusto mense vident, seminaque perferant.

Genera de his esse dicuntur non de *ap. illa, quæ* Lincum Atriplex, & Atriplex dicitur Offi-  
 cina. Lincum autem non procerum. Germania *Witten* Belgæ *Witten* Italia *Witten*  
*Witten*, & *Witten*, *Witten* Hispania *Witten* Gallia *Witten*, *Witten* dicitur Anglia *Witten*  
 & *Witten*, *Witten* & *Witten* Chrysolichano sic sum dicitur, veluti ab anti-  
 cis deſeruitur De Atriplice siquidem lib. xx. De Chrysolichano lib. xxvii. cap. viii.

*Aspictrix sili.**Aspictrix hirsutissima.**Aspictrix hirsuta.**Aspictrix montana.*

ubi sic scribit. Chrysolichanon inquit, in Ponto Ladicea simile nascitur: sanat ventos et  
 si si confectum imponatur. Et aliud genus Chrysolichanon dicitur flore aureo, foliis Oliva.  
 Temperamentum Ampelx, Galieno auctore, in ficando ordine humidum, singula in partes

Per insidiatum.



Garofanus.



Galenus hanc ex eo adhibendi vim adesse ex-  
 flim et, sic vocem obstruere aperire posse.

De Fide astrum. CAP. II.

**A**D Amplicum genus referenda vulgaris oc-  
 currens herba, Pedem animum appellatur,  
 cubitali seu aliove caule, nonnulla fruticosa, ac ti-  
 moso hinc odore, foliis circumscissuratis, lin-  
 ribus, splendens, aliquot flosculis per omnia  
 densis, foliis exiguis subrobore ferens ramulo-  
 rum cacumibus recentibus adhaerens, Amplici-  
 ca sphaerula fere simile est, odorem in multis fibris  
 dividitur.

Socios veteres paricos, vias, simitas, affluen-  
 tibus defertur hortensibus nonnulla locis stre-  
 quens est.

Viget ac florescit cum Amplicibus reliquis.

Nomen recentioribus Fide animum dedit, à  
 similitudine pedis animum, quem angulum de fe-  
 dibus suis, foliis quadammodo exprimit: Ger-  
 manice *Wendel*: eadem vocatur Gallice *Fied*  
*depre*: Italice *pede de orba*: Anglice *Wendel*  
 Belgice *Wendel* sonat.

Facultatibus hanc herba frigida quaeque ac humi-  
 da est, ac quidem non minus Amplicem, sed, vi  
 apparet, etiam amplius refrigerat. Sicuti gene-  
 nis exualis ac perniciosa, si edatur, fertur. In Me-  
 dicina vsum non admittunt: multo minus inter  
 edula.

De Garofano. CAP. III.

**A**D MODUM fertida hanc herbula est, cot-  
 rupta pauculaq. fistulata, ac ferens homin-  
 bus grandissimo molli siroque odore superat. ex-  
 gum resit cubitali, circa quos foliola colore fo-  
 musq. Amplicis, sed minus multo, omnino vide-  
 licet exiguus: foliis parvis: ferensq. murem  
 velut sphaerula Amplicis, nulli usum fibris non-  
 nullis capillatis.

Locum cultus, iuxta simitas nascitur: Ger-  
 mei ad hortos transita dantur occurrunt.

Annus est in reliquis Amplicibus, cum quibus  
 viret, viget, ac perit.

Garofanum ex eo quod fieri dum videtur, hanc li-  
 quamen piscium redolent Cordus appellatur Tra-  
 gum Germanicum aut Ampelx, ferenda dici pos-  
 set, hanc siquidem vrosam odorem, hanc si-  
 mus odor etiam superat. Ad Amplicem autem  
 genera referendam.

Nullus unquam visisset herba, ex vire tamen  
 laborantibus granitate odore prodesse posse:  
 Nam in Hippocrate sic: Cito vixit frangit-  
 lant ad naves granocientia adhibenda.



Elaeagnus argentea.



Elaeagnus argentea.

Elaeagnus argentea.



Elaeagnus argentea.



*Amaranthus purpureus* si toto ovato colore.

*Amaranthus* minor floribus clivobus coloris.



**B**LITIS plura sunt genera, respectu in eorum & nominis differentia. Quod majus appellatur, supra duas aut triplices articulos: caulis eius rotundus in suis non paucis distribuitur. Folia sunt lata, acuminata, veluti *Amplicis*, sed vixitiorumque gabra: Bosculi & ferrius latus membranis inclatis in ramulorum fastigium racemosa. radice multiplicibus fibris decursum demittitur.

Majus Blitum huiusmodi est, foliaque angustioribus: Bosculi huiusmodi oblonge rubent: semina aut *Amplicis* ac minoris Bliti: radix eadem in modo.

Vriusque rubens quidam reperitur species, materia aerea caules potissimum repleat: puerum vero & caulis, foliaque, ac radices, que & de purpurea rubicantem faciem attinet reddunt.

Ubi & Blitum foliis non modo vitribus, sed rubro-luteisque coloribus pulchre distinctum, forma prioribus simile. Quod non ab se Blitum maculosum hinc maculosum dicitur & inessetia herba Pipagalli, aut rectus Piliaci herba, à foliis variè coloratis, similitudine Piliaci plantam referentibus.

Item & ad Blitum genus referuntur quæque venit *Amaranthus purpureus* vocatur, cum coarctato, siliante ac eleganti rubore: multa, cum obsolevit coloribus aut potiori ac laticioribus speciebus progignit: De quibus *Pemptadis* 2. lib. 1. scriptum est.

Passim se peruntur vulgata Bliti locis incultis non raro in hortis spontè crescunt.

Vix cum *Amplicis* generibus necant, vixent, ac ferunt.

Greci *Blitum*: Latini Blitum appellant: Germani *Blitum*: Hispani *Blitum*: Silesiæ *Blitum*.

Ubi, Galenus ait lib. vi. De simpl. med. facult. & virtutibus est Blitum, humida frigidaque temperata, in locis maxime crescit. Alimentum autem corpori prebet copiosum, ut de De aliment. facultatibus. Ex oleis huiusmodi est *Blitum*, hoc gustabitur qualiter experietur, quorum subtilitas aquosior est.

Huiusmodi autem olea non solum cibum nutrant, sed & ad faciliorem digestionem sine propeña, non tamen vehementer, cum nulla ipsi adit qualitas acris aut nitrosæ, que maxime ad excoriamandum excites.



**SPINACHIA** Bino volentiam *Arriglo* cognata est: folia profert mollia, et sic virentia, succo plena, acuminata, & latiore basi marginata, inter pedicolum sepe ramento una vrinque profunda scissura divisa: caulis terrens, pedales, raris cunctis, similibus foliis consistens, interea quae, tum & in fastigio ramulorum floret, ubi raris manibus cohaerent, succedente mollior spinoso semine, radice tenui basi firma effusa.

In hortis facilissimo cultu procreat: solum ut vilam arripat.

Quotiescunque anni tempore fieri potest. Verum sic etiam adolescit, & intra duas mensuras peritur. Quae vero Autumnus feritur, non in celerrimo matrit, sed per hyemem vellat, maximo Vere semen profert.

Spinachium nostrum uter appellat: necnulli Spinachium olivae, alij Hispanicum oleae. Persicus Graeci *Σπινάχιο* vocant. Ab Arabibus & Serapione Hispanice dicitur. Sicut qui *morax* dicitur, aut *morax* dicitur, est, insaluberrimum sicuti vocantur. Germanice *Spinat* Belgae *Spinage* Hispanice *Spinaca*: Italiae *Spinaci*: Gallis *Spinac*: Anglis *Spinage*.

Falluntur qui Pliny *Boulapathon* esse existimant: Lapsus siquidem genus *Boulapathon* esse radice tantum ab insula ab aliis dicitur, ut lib. x. cap. xx. i. ostendit. Nec quae Hippocratis *Bisam* est, quod veluti longi esse scribitur lib. ii. De morbis muliebibus: Nam

inter subditia istud referunt, quae rubrum succum in albedinem expriment ac sicut. Talia tamen Spinachiae facilius hanc aquam est, adstruere non caere.

Est autem Spinachia humida plane ac frigida calore ferè secundo, sed humida magis et oleum rursus, quorum in substantia aquosior, & liquor quilibet a capere non sicut delectat, & alium emoluit.

Editur decocta, sed alimentum exiguum aut nihil conferit: Rariolentia nonnulla est, & sanguinem facili parit, nisi Zinziberis aut alio condim. & condatur: Recipitur & scurricula acuma recens crata, prout scribitur quam lenior et subnata fuerit sola.

**BETA** duorum est generum: candida varietas nigra altera: cuius tres species radice effusa admodum, ac edul.

1. Sunt autem folia proxi magna, haec, levis, resplendentia, quandoque distincta, alia firmiter virentia caules longi, basi breves, sinuati, in ramulos effusi: nec quoniam uno folio est, proli ordine d'gesta, rotose tuberosa: deinde si rima aspera, rugosa, radice teris, longa, minus confusa est.
2. Altera Beta folijs, ovale, sinuato, radice, ovata, similibus, solo colore differens est: qui in folijs, caulis rubens et luce.
3. Tertio & caule folijs, rubet, sed subinde distinctus, radice vero habet paulo breviora, sed crassia, Napa sepe rursus perisistat, quae interiore pulpa rubens, & non quam reliquas generum, cybosque optinet.

Semur in hortis Beta: sed uti amat madens ac levis. Oportet siquidem in sicuti eius Vere non ariditate viret, nec non & hyeme: altero anno caulis cum sicuti in base surgit.

In hoc aut Augusto semen ad maritimum peruenit.

Tertio radice pro seipam caulum erant & rursus, alioque cibo in vasa firmata.

Graecis *Βητα*, & Italia *Beta*, Sicilia: Hispanice *Beta*: Gallis *de la Bete*, Fere: Anglis *Beta*.

*Beta candida.*



*Beta rubra.*



*Beta rubra Romana.*



Nomina vicina est aventicis dicta: sed ut apud Athenarum discretum genus & 3 Beta differens.

Candidam Betam *aventicis*, id est, Siculam, cognominant Theophrastus ait: Hinc Sicilivox, qua Barbas & Officinarum plerique Beta appellatur.

Tertiam Betam Germanis rot (Raben) id est, Rapum rubrum dicit Fuchsius aventicis esse. Non est tamen Rap, sed Betae species, quam nonnulli Romanam Betam vocant.

Ceterum Beta candida quidem humidam ac frigidam esse est, quod admodum quaedam sililaginem ac nitrosam facultatem habet: unde & exurgit, & per rivas praesentem evocat. Cocta autem coctur, curò descendit, & alium ad excernendum & deponendum excrementa excitat, praesertim cum iure in quo decoquitur sumpta: absque iure effusa, de posita nitrositate, minus extergit, ac alium ardet. Nostri enim solum ex Beta quibuscumque modis exurgit aut nullum excretionem accendit, idque mirum quoniam ex Lactuca probum.

Succo tamen raris induriam paritatem clementer extrahit & caput purgat. Decoctum siliorem & radicem fastidium & lentes abstergit. Radix demum nonnulli exerceat ano glandugando imposita, alium quoque ad excrementorum expulsiorem instat, praesertim caipus sine conspectu.

Rubra Beta nonnulli ad stititionem praecipue alium maras movet, sed cibo minus idonea.

Tartar

Tertia radix, praesensibus hybernis, cum sale & croco corallino, aeterni aetheris loco fistulae colla inferat palato de ore grati.

*De Brassica.*

CAP. VII.

*Brassica vulgaris foliosa.*

*Brassica rubra capitata.*



**B**RASSICAS duas Dioscorides facit: formam unam, sylvaeformem alteram: & quidem pariter tantum Mennium, quae ad Fibrosas genera pertinet: de qua lib. 2. Persepe scribit. Tria autem huius Theophrastus genera statuit, *καυθηρα*, sine Crispae vocari: aliam *ραβδωδα*, Latine tantum *εγυρα*, sine sylvaeformem. Theophrastum Cato imitatur, utriusque Brassicas referre capitatas quidem leuonem, grandem, linae foliis, caetero magno: aliam sylvaeformem in multis caulis, senescentem & acerrimam. Eandem diuersi vocem referunt & Plinius lib. 23. cap. 22. ubi in tres species distulit: eam autem Gaeorum antiquissimas: vna crispata alteram *Αιαδα* tertiam, quae proprie appellata sit *εγυρα*. Libros vero 215. & 216. plura genera sua adicit, Tarentinam, Cumanam, Pompeianam, Brutianam, Sabellianam, Lucanianam.

Nos hactenus non paucae quoque obseruauit, vel colore vel forma differentes, Brassicas. Quaedam enim siliis folio parua sunt: aliae comae capitate: nigrae, rosulae: pleraque albae, vel etiam saturato colore viuentis: iam & linae folio: illae vero crispae, aut lacinate. Est & in caulis differentia.

1. Prior Brassicae species folia linnata magnis, latis, expansis & paruenibus, usque in firmo cum virore rubore nigrescentibus: pediculis tamen foliorum, collis ac fibris paulo diutius rubere: dum cuiusque e medio vna sarga folia natescit, *Αιαδα* los proferit: in necessitudine oblonga, quales Rapa, & semina rotunda familia, radix fibris firmata.
2. Huius species & quaedam folia in orbem & globum comae illis capitatae repetunt, quoniam globosam caput tantum quidem albidum capitate: color vero foliorum huius *Αιαδα* eam quoniam antecedenti rubet: reliqua comaeformem.

3. Tertiae folia minora sunt, vnaque ad collam vsque modicam profundus semel usque in firmo inflexa, per margines vero admodum crispae: in reliquis non differit.

4. Quarta folia est siliis, & in lacunas multas distinctis feras ab aliis non differere.

5. Quinta caetero folio, comae minor est, & rosulae huius sylvaeformis ad caetero nec in orbem de-

scribitur

Brassica capitata.



Brassica Salsivola.



hinc: semina utem cauli præcipue ferunt ac colitur, ex quo subinde non exigua que-  
lis accedit.

Secunda caule immixta crassa, folia intus effundit ampla laeta, ex albo viridius, crassa collis  
sticticibus distinctis, per liquor in globis aut capitulis formam æthiopicam conseruit, que candidi-  
ssima sunt, quibus Vere diffusis caulis asurgit ramosus, floribus, sicut quæ, ac in his terra-  
m profertur.

Est verò et alia quedam capitata, albida quoque, quam Sabaudam vocant, oblongior  
hinc sunt capita, minusq; ante conclusa, que si Vere expleatur, caules emittunt similitu-  
rinas, floribus albidis speciosioribus, quibusque & ferunt succedunt aliorum similia. Hy-  
emis rigorem hinc non sustinet, neque ad Ver peruenit, nisi ad modum clementer hyems fuerit.

Secunda Cauliflora dicta, hinc prope caule foliosq; albidis refert, sed foliorum loco, que  
in capitulis conglomerantur, caules hinc in modum scunt folia et alii albidis, molles, quoniam gra-  
uiter franguntur: costis eduntur, à quibus Vere, si hyemem sapere (quod rarissimum) po-  
tuerit, aliorum folia, flores, semina aliorum similia procedunt.

Item & alia quedam ex aliorum genere, cuius caulo omnis non crassus redditur, nisi quidem  
in modum folia, verum infra de proxima radicibus, quo loco strumofus factus est Rapi hinc  
per magnitudinem æqualatur: hinc interior nulla, quæ reliqua caulis, & reliqua ve-  
lia datur.

Sæpius & alia Brassicæ salsivolis procerior, folia hinc non leuia, sed magna, sunt rari-  
tate, caules, flores, sicut quæ, & semina ab aliorum hinc diuisent.

Brassicæ omnes horreositas ferunt, sed que salsivolis in agna ferunt. Amat Brassica solum  
melioris, pinguis, globis ferociorum, & bene substantiam. Transfusione omnis proficit, ac me-  
lioritate. Indiget omnes Belgio sunt, Sabauda, Cauliflora, & postea hinc duo bene acce-  
perunt semina alluente infertur.

Sci ac transfere quous anni tempore Brassicam posse Petrus Crescentius sentit. Apud  
Belgia Martio mensis, Aprili, & quandoque Maio ferunt. Augusto verò etiam non raro, aut  
hinc initium Septembris, Transfert, ut qui Colu mella, sex foliorum Brassicæ debet. In aliam  
viam locum transfertur ac transfertur Brassicæ in Belgio, Maio aut Iunio, que  
dem

Brassica glauca Cranchæ folia.



Brassica capitata alba.




dem primis Veris mensibus facit fructus, quæ deinde hybernis mensibus vacat, ac faciunt Veris flores ac forma profertur in Augusto verò demum in mensi Iunæ. October aut Novembri transferuntur, vel quandoque etiam Martio mensi, quæ præcipuè albede ex parte sunt, quæ deinde post Solstitium incipit extuberare. Sabina de verò & Cassiteræ tempore ferenda, Mauritjæ transferenda sunt.

Omnia autem Brassicæ Duo de Galeno Genus *capitata* appellatur & ferunt quidem *agryphæ isipæ*: Theophrasto verò hæc *isipæ* dicitur. Est quædam Rhiphanus Dioscoridi, quæ Latine Radicula, sed Theophrastus Radiculam non Rhiphanum, sed Rhiphanda vocat: Eadem verò & *Asiatica*; herba est sic dicta, non modò quæ odore etiam in arboribus, verum quod & colore (quæ proinde generis est) Americis Germanis referat. Officina & vulgò Galeni nomine, ab ipsius caulis præstantis: Germani *Asi* ferunt: Barbari *Asi* de Galieno *Asi*: Hispani *Colico*, Casseri Itali *Casla*, Syria.

1. Prior species est ea, quam Theophrastus *isipæ* dicitur Plinius vno loco *isipæ*, alio Caritana cognominari eandem & Caulis quosdam vocitare ait. Cuius hanc Ligurii appellat vulgò *Rubra* caulis: Germani *Conquer* vocant solum *Arabas*. *Capitata* vocant Gal. Casser. *isipæ*.
2. Alteram speciem Barbari vulgò *isipæ* vocant: Latine *Radicula* Brassicæ dicitur: Pertinet hæc ad Tertiam genus nonnullis videtur: Plinius sequidem lib. xix. cap. viii. Tertiam caulis speciem & magnitudine præcipuum esse ait, sed ex veris appellatione sciam fieri: cuiusmodi *Radicula* non est. Magis enim *Lacum* bus ex valle *Arcaria*, capite præcipuum, & foliis immensa, constituta videtur.
3. Tertiam Crispam, Theophrastus *isipæ* dicitur non nominat, atque inter Brassicæ primo loco refertur: Casseri secunda est: Plinio *Sabellica* est: *Sabellica*, utique, (genus) in administracione crispæ sunt folia. Germani *Asi* ferunt: Belgæ *Asi* ferunt: Galli Casser. *isipæ*.
4. Quarta folia sic dicta *isipæ*, Latine Brassicæ *Asi* vocant: vocant præcipuum, tamquam Plinius lib. xx. cap. ix. Crispam sic dictam velis à similitudine foliorum *Asi*: sunt autem *Asi* sic dicta hæc quoque crispæ, sed in varias partes à se differunt: Vulgò apud Barbaros *Asi* vocantur.
5. Quinta Verobus terra est, quam Plinius præcipuum *isipæ* dicitur afferat: Barbari *Asi*.
6. Quæ inter albedas prima est, vulgò *Capitata* nuncupatur: & à nonnullis Brassicæ Imperialis.

Brassica Sabarda.

Brassica Cauliflora.



In Germanis *Kappf* fructu Belgis *Capeste loof* / *Staplaede* Gallis *Cheve Colve* : Hispanis *Repollo*, *Cablos mercimon* : Italis *Caulis Capparis*, *Capparis* Anglis *Cabbage*.

Securam Brassicam Tritamam nonnulli a Pismo ducunt esse censens, cuius magnam de fagi pedate caput aliquando conspici lib. XIII. cap. VIII : de paulo ante ex tempore aggregatione mole fieri affirmat. Brassica autem ubi capitata, non ex aggregando aut accumulando verum, talis nascitur, sed sua natura, si tempore & loco idoneis transplanteris, capitata efficitur.

Quae succeda, septima ordine, Brabantis *Beauje loof* / id est, Sabarda Brassica dicitur. Fertur ex semine provenire Castellane, quod in Belgio maturum. Inter Lacuarias capitatas non videntur numerari potest.

Caulifloram verò nonnulli etiam Cypriam Brassicam vocitant : Italis *Cauliflora* : Gallis *Cheve fero* / Brabantis *Stommskaet*. Hec cum Plinij Pompeiana cognosci videtur, de qua sic N. L. cap. VIII. Pompeianam (genus) proceram, caule ab radice tenui, infra folia crassifera, proximam Rapazatiam vulgò nominant.

Postremam Nigram cognoscunt Brassicam : ab Indis *Negrescales* (vix ferunt) dictam. An hoc ad Brabantem referenda sit expendendum, quod Plinius prae grandibus foliis, caule tenui, sive acuto esse scribit.

Caulis in Brassica omnis refrigerantem & adstringentem facultatem habet, atque vna similes quandoque vehementer adstringentem qualitatem : hanc autem succosam decoctum eius illa vendicat, subtilissima sine Brassicae corpus adstringentem & refrigerantem retinet. Decoctum etiam Brassica decoctione nitrosam hanc qualitatem, quae facco ac humido eius insidat : quam omnem aqua, in qua primo decoquitur, ad se pertrahit. Quam ob causam decoctum classidum movet : veluti & faccus illibatur. Abscondo autem primo iure in quo decoctum est, dum Brassica siccet & adstringit : alimentum autem in seipsum praebet exiguum, faccum verò ingenerat non probrum, vapore crassum ac melancholicum : tritus tamen cassum aut vinosum, quae albedine sunt : quae adirent & alii praesunt. Cato tamen cassum maxime commendat : sed hanc albedinem cogitare non fuerunt. Obscuritate visus laborantibus & tritu cornesum auxiliari, Dios. auctor. Cynam verò eius acrostem, stomacho velicenti, &



Brassica caulis capam gerens.

Brassica nigra.



ad vinum candidum validiorum esse. Sale autem obditam thoracico interitum esse, & oleum contrahere: Caudam verò ex aceto manfam herolis prodesse, idem sit. Firmus splentens in vino albo per dies quadraginta ex herbendam scribit.

Fertur & Brassica caudam autem cibum sumpta & buccatum aere, neque melius posse cum, qui caudam profumperit: posse à verò sumptam crispulam etiam dicitur: Cuius comesturale Brassica cum vite delidum, quod rale est, et si quando in arvis appropinquaverit, aut sit in tabernis, aut viti firmata tabe faciat: aut si, dum coquitur, vinum infusetur, de cetero non coquitur, ac oleo eius cornu paratur: ut in Geoponicis Causi Dasyly Vicensis scribitur. Atheniensis tamen secundi & buccatum potentium, non folia, sed internodia Brassicæ scribit. Construm verò & folia omnibus infirmis visibus ac ordinatæ acim palenta tota ac imposita, cum sale carbunculos corrumpit.

Succus Brassicæ, auctore Dioscoride, cum uride & nitro sumptus oleum molle cum vino verò spongiæ vaporarum moribus adorsionat. Idem cum Ferrogræci farina podagrica: articulis doloribus impositus prodest, cum & vicibus fordibus ac verulis: caput purgare moribus infusa: cum lotacea farina subdicas mentis movet. Plin. in succum cum vino auribus instillatam, auribus raditum prodesse testat.

Semen, præsertim Ægyptiæ Brassicæ, quod amare, Galieno teste, quadratis pariter est, lumbricos pellit: flicis lentiginæ, ephelidas, & quæcumque modicum abscessorem empuflant, expurgat.

Apra, in qua decocta est, nervos articulosq; morbo durati ferunt: cum & valentia pariter ac veritas: cuius curatio est, que nullis aliter prodesse sanari possunt, si hoc succum.

Caulis eorum cum radicibus cre matorum citra ad modum reticatum est, & ad ipsos visus exceptus ad mueratam lacrum dolores prodest.

De Sylvestri Brassica. CAP. VIII.

**S**YLVESTRIS Dioscoridi nuncupata Brassica, sitis arum in non quinto loco delinquit: si ralis est, aut si hirsuta, albedon, ac si spongiæ amara foret. folia squamata, flores, & quæque folia respondent.

*Brassica hirsuta.*



*Brassica hirsuta perfoliata.*



Nihil autem haec in montanis partibus locis Diof. aut reperitur verò & in Zelandae insulis intra mare nostrum.

Praeter haec verò & alia hirsutis est, folio omnino minore, laevi, indiviso, late & oblongo, & ferre eadem quodam modo amplectente, Perfoliare ferò simili cui usculiculi vocantur, immo, quia hirsutis immo proferit ciliolos, atque filiquasinde teretes, obtusas, & angulatas. In campis spontè gignitur, in Hispaniis quidem auctoribus Clusio: tum verò & in nonnullis Aethiæ ac Germaniæ locis.

Flores Brassicae istae albae immo flavae, atque inaequaliter & inaequaliter.

Figurae hirsutae & Diofcoride Graecè prius dicitur: Latine Brassica hirsuta, Brassica rustica, & à nonnullis Brassica maritima dicitur tamen à Brassica illa, quam Diof. hoc nomine inscribit, & inaequaliter folia appellat: de qua Penninus in hunc lib. scripsit est.

Alteram campestrem Brassicam nominant nonnulli etiam maritima, vel perfoliatam.

Est verò prior illa hirsutis calida ac siccata, & quia amara extergens quoque, folia, inquit Diofcorides, inposita vulnera conglutinant, & inflammationes remouet sibi dicitur.

De altera siculianibus compositam in hunc locum à nomine enim in oleum adhibetur.

*De Boragine seu Engleto vero.*

CAP. IX.

**BORAGINI** ista sunt folia, rursus latius longiora, haemidecumbentia, Verbasco folia. Inanis ferò magnitudine, sed nigrescentia & aspera, tubulus arrolatus lingua: casta ciliolata, aut alio, ramosa. Flosculi in cacumibus elegantior carule, sed albae, ex quibus foliola composita: & quorum medio nigra citantur flammata, festigo coluntia, Pyramidis in modum acuminata, radix fibris cohaeret, hyemes ac frigora impatiens.

Hinc verò & altera eorum species, folia simili bus, sed minoribus flosculis caruleis parvis, & foliis hirsutibus, quibus vulgarem Engleto misonibus, radix refidit hyemem sustinet: foliola rursus quoque rursus hinc.

Vulgarem Boraginem passim in omnibus haec reperitur: quoniam solo prostrata.

Altera omnino vera est, passimque cognita.

Magna illata parte, & in situ in Aethiopia usque, Borago floret ac viget.

FF 2

Coffino

Borago.

Boraginis alba species.

Borago  
vera.

Officina Borago dicitur: Germana *Quartoff*: Italia *Sarragosa*: Hispania *Lavaca*: Gallia *Sarrache* & *Basarrache*: Brabantia *Bemagne*: Anglia *Wexage*: Bohemia *Spaf*: à nomina Per-rago. Vetus est *Boý* *Avro*, quod Latine: *Lingua bubula*, *Lingua bouis*, *Buglossis*, & *Labianum* dicitur: Apuleio & *Corago*, unde fortassis *Boragius* nomen C, in B motum: nisi apud Apuleium *Borago* pro *Conogo* legendum sit: A Plinio verò & *Isoposum*, sive *Euphrosium*, quod *hilantatum* exister: quod & antiquis *veniculus* de *Boragine* testatur.

*Spa Borago gaudet semper ara.*

Harnici sunt evidentiter est temperationis, calida non solum: sed et calore fugasque medi esse apparet.

In vinum coactum *Buglossum*, inquit *Dioscorides*, animi letitiam efficere credit: Galenus quoque & *Plinius*, vino mixtum leniter & *hilantem* causam esse existimat, anxiis voluptatibus augere, affirmant.

Nostra etas non modo herbam, sed præcipue flores subinde in vinum coadit, vel acetum inspergit, licet ut ac *hilantem* seculis de causa: *Conducunt* & in hanc usum cum *Schero* flores tum & alia ex inspergit, quibus ad cordis convulsiones nonem, etiam ampliatam, & animi letitiam augendam *Médecus* passim utitur.

Folia cum aliis herbis decocta ad alvum molliendum nonnullis conferunt. *Conducunt* verò & ut, qui ob fluxum asperitatem tussisse eam in lactate, acilore *Galeno*. Arant *pre* *inter* *Dioscoridum* *notia*: *Buglossi* herbam, quæ tres caules emittit, si cum radicibus & *tereno* nota tenetur, & in pota datur, contra ternarios rigores proficere: ad quartanos verò, quæ quatuor.

*De Buglossæ vulgaris, sive Lycopii.*

CAP. X.

QVAE Officina *Buglossam* appellat, folia quibus *Boraginis* longiora sunt, acutiuscula, manora quàm *Lactuca*, aspera, & hirsuta. caulis in altum ferebripe datus, aut altus, superius in truncum densus, quæ ordine digesti *Stoculi* conuulsant, postquam conuulsant in rubro purpureo flores, deinde carules, non magni, quinque foliola præsertim, in quibus conceptaculis oblonga, alpea amulu in regoâ terra quatuor adque succedunt: & rursus *radix* oblonga, tres, digitalis crassitudo, pluribus annis vitans: in calidis regionibus loco

apica



Ceterum facultates Lycopii, auctor Galenus, refrigerans & de sicca est. Cum oleo, quod Dioscorides, radix impolita vulneribus medetur: cum farina hordeacea crypsellum, Salsorem, Plurimum aut, in febribus mouet sacco aequo calide admoto. Recentior etiam hinc folia, flores, & radices eodem, quo Borraginae fiat legitima Buglossi, loco habet, & medicamentis omnium generis quoque utilitatem depellere, memorem exotico, Juliano stem excitans, reliquitum adferre, & cor corroborare et odorem, admittet. Omnia haec folia ad dies idem, quod Borraginae, queant.

De Anchofa.

CAP. XI.

Anchofa Alchidion.



Anchofa cotta.



**A**NCHUSA, excepta Lycopifera Dioscoridi sunt genera, Onocla videlicet, Alchidion, & tertia proprio nomine desinita.

1. Onocchalata, acuminata, hirsuta, & aspera promixta folia, Buglossae vulgarem beatam, sed quæm Lactuca latiora caulis compluribus breues, hirsuta versus reclinata, folia non minus asperos, quæm in fastigiis in alas perla foliis: nisi ornantur, Buglossæ dicitur amala, sed mucositas radix dignitas crassitudinis longa.
  2. Alchidion folium est multo minus angustioribus, asperis tamē, hirsuta, ac pungentibus, caulis me diocrem exaltat: tendit ramulos: foliolum parum paruo celum purpurant, forma Buglossæ similes: radix raris & longa.
  3. Tertia folia etiam quæm Alchidion minoribus, angustioribus, rubellamque alperam & hirsuta: foliolum in alas exaltat, radix aliamam similes.
- Hæc omnia radices in calidis locis ac regionibus videntur, & sanguineo colore manus inferunt in Belgio verò sine ac alia frigida regionibus id in unum tunc purpurantemque colore rubent. Tanti Solis calore sunt coque, ad colorem radicam in tendendum, potest.
4. Præter hæc verò & quarta quædam reperitur: folia alpina, hirsuta, ac pungentibus, ac non raro hinc: subulana re specum barbitus, tertia similes, & caris castaleulo dolo caris foliis dependent oblonga, interius canis, deliohis porretilis similes, colore hinc, radix oblonga ad delectanda.

Locis apertis Anchuse nasci possunt, ac pingui latoque solo. Præ in Hispania agriopem ferrum: Reliquæ non modo in his, sed & Narbonensibus Gallie insigne sunt. Reperuntur

Anchusa quatuorfolia Pseudanchusa.



var & alba. Dioscorides Anchusion in Iona arenosissima ferbat.

Quarta non raro in Bohemia occurrit flos agrorum & videri inaripua.

Flores acervigat Anchuse affinis mensibus Mellis tempore sanguinem succum radices ferunt, auctore Dioscoride.

Kyrgorum Caucasus dicitur, apud Latinos nomen ferunt: eantem vero & huius internotas voces quaedam nomina, vt, Karu Kyrgorum, Aghash, dzylyshar, shilyshar, myshog, an dham, mit shidom, à nonnullis verbò & Fucus herba.

Primo Odoates appellatur: & à nonnullis à anshog à nonnullis in Belgio Buglossa Hispanica.

Secunda à *anchusa* Anglica, & Anchusa à altera.

Tertia Anchuse nomen retinet. Galli eam, hanc, tam alias *orebente* appellant: Hispani *serpion*: Itali *anchusa*.

Quarta illa esse potest, quæ à Plinio lib. xxii. cap. xv. Pseudanchusa appellatur: & à quibusdam Enchusa ac Doris.

Ceterum Anchuse Onoche radice refrig. & rat & reficere, auctore Galeno, & vni adstringit: & quæ sibi hanc biliosam esse ex terge humoris solis ambactibora, adstringunt tamen quoque & reficant. Dioscorides ad umbella & vena vicia ex oleo & cerato efficacem radiceem ap. erythralis cum polenta maderi lep. & visigibus cum aceto imponi: partes

extrahere genitali impostrarum decoctum est ad hanc laceris, septuaginta, & splentibus, fibratimobis cum meliorati ad vnguentorum spissamenta à pygmenianis vsurpan: sola in vino pot. aliam sibi.

Anchuse radice, Galenus castileum esse medietate magis medicatam. hac verò etiam à calidiorum ortu parat, vti que cetera amara sit, & amplius modico. Dioscorides verbò has aduersus vias reptantem ac aliorum serpentum commendat, & sine in pot. sicut in choacretam alligata mactam. Plinio lib. xxii. cap. xv. Anchuse radiceem aptam esse tradit inficendo lego ac ceru.

Recentiorum nonnulli butyrum recens infusum cum Anchuse radice addito vino, donec robore in contraxerit, coqueunt: quod Butyrum rubrum appellant, & non modice: alio detegit habent, verò in & ad exanthematum facilius eruptionem pedesse ferunt, si cum calido acrisis mix. in his propinetur.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

Plinio lib. xxii. cap. xv.

**ECHINIS** folia à radice erant oblonga, non admodum lata, hirsuta, aspera, & veluti erig. l. lignis spina hirsuta, hinc procumbentia, Anchuse similia, interque modum affertitaculibus & rotas, folio suo, non minus quam folia asper, ad hanc modum appendicibus ceteris parte reflexis, veluti in modis Helicopsis, quæ paget exiguas foliola stibulos proferent can. hirsuta hirsuta, in modis rubra purpureos, inde caruleos, flammibus aliquot purpureis modis, quibus semen succedat angulosum, aceto matum, anguis caput aliquo referens modo, radix prolixus, nates, locis apricis subinde forte rubescit.

Hanc & species quaedam illic rubent quandoque valè, optens priori simile: Candela à. tram hirsuta à radice exare ferunt.

Sicut vna & semina, nec non agrorum margines, ac in quibus desertis agris provenit: liguam pinguetis solum amat. locis quoque apricis.

Tota est hanc floriferam esse semen interea marcescente: hinc sola restant.

Ceteris quæ & *anchusa* auctore Dioscoride, appellant à Nicandro verbò *hyssop*, *tyssop*, & *anchusa* dicitur. Facit autem hac duo Echij species, vnam Anchuse similem: aliam alio-

Echium.

Echium Spæcia.



tem, radice folio, flore patulo, capitis viperæ. Præ non temerè Andrusi species con-  
tur, æreos vide hoc aut secunda, quæ & Alci badien nominatur.

Aliam æreos Echium non aliud esse apparet, quàm quod à Dioscoride deservit.

Appellatur verò aliud Echium spæcia quidem non enclitum, ut, si aliud esse voluerit, ut de-  
bit; Latini Alci badien. Officium hæc species incognita est.

Apuleius esp. v. de Vipera herba agit, quæ ut *Epilæon* est, *Engle* quoque dicit, Latini Ser-  
pentaria & radice Mæcedonica sed hæc ab Echio differens est, Echium Hæpus præ  
de la *Evora*, vel *Choporal*: Itali *Engle* sicutaria: Galli *Engle* sicutaria: Germani *Engle*  
*Engle* sicutaria nominant.

Facultas autem Echium Andrusi, sicut radice præ ferunt ac omne similes est. Radix per se  
si à serpente ex vino prodellitur: non verò qui ante laborant ferat non patitur. folia & radice  
idem præstant: Dioscorides auctor. Nil auctor in Thracia Echium quoque æreos usum  
serpentis, quæ serpenti in, ac peccatam vipers mortis resistunt, ac serpenti obsequant.

De *Mars* herba.

CAP. XIII.

**M**ARS folis præmit læta oblonga, è vitæ ad caruleum inclinantia, cordicibus ali-  
que musculis figurata, subinde decorem ac fixam caules rotundos ac carulos, similes  
foliis, sed firmis æreosam conestit tot: e quorum cacumibus hæc ab dependunt rotundi,  
oblongi, rotas casti, celeses lites, cres annexam quandoque angulo herbo per-  
quibus læta succedunt angulosa, rugicæta, radice oblonga, ac diocretica.

Hæc verò de minor quædam species, foliis angustioribus, in hæc omnia oblonga cordicibus  
interiectis, aliisque præmit similes.

In læta ac herbosa collibus car tum & secus vias ac apertum margines in Bohæcia, Kle-  
tia, Vindicia, Norico, Pannonia ac ultra cretaq; Duraciam loca complentur.

Æreos herba à Mæro in multam aliam.

Recomet æreos Mæro appellat. Mæro præmit autem Mæro herba: Ausonia est, occidit  
quæque non species est mensura, quæ præmit & sic tunc odorata calidior, quæ præmit  
est calidior, sic, & æreos: Tunc verò temperata, quæ existimatur esse *Engle* sicutaria: quæ  
est æreos.

Mara herba



et refrigerans. Maribus dicitur. Cum quædam autem  
hanc speciem Maru à nobis descriptam  
concernat, si modo ex his est, difficile est in rap-  
ta Amœnia beatitate, ne dicant oblectantem,  
cognoscere. Si ex facultatibus radicum facien-  
dum, potens est Maribus, nam & hanc Maru  
speciem singulis apparet pariter. Valetur verò &  
Cerasio eadem illis esse, de qua Plinius lib.  
XXI. cap. XXI. has verbas.

Est Cerasio folio candido, incurvo, cubitis  
hæcæpæ concavo, mellis succum habente. Nec  
abhorret enim Maru ab illa descriptio. Albi-  
cantibus siquidem maculis folia candidant, de-  
oritur quoque seorsum incurvantur, cubitalis  
stirpis est, capitulum illic fistigium, caudæ concavo-  
sus foliis præsent, & quibus Apes mel legunt.  
Theophrastus Regæder inter affluos flores lib.  
VI. enumerat, inter quos & Mara herba illos  
habendas. Meminit Virgilius Georg. III. ubi  
ipsum appellat spæthale gramen. quod Scythia  
improbatum vile atque viciosa dicitur.

— hæc in casis affertur præter,

Tota Melophylis & Cerasio spæthale gramen,  
quibus verbas, aut Gramina vocantur Poeta  
(quod verisimile) abiturus, aut alios vultu meli-  
legi Comithen, que Gramina sūt Iperca.

Est aut verò & apud Plinium Leucoglyphis  
herbae nomen lib. XXVII. cap. XI. que qualis of-  
fer scriptum & non operante refert. Quod si ve-  
rò non venient nomen stirpis in illis, hæc non  
ab ea Anaglyphis dicitur, sed athenon ab ea

radice intercepta habet. Potest verò eadem & Comache ac Leucoglyphis esse. Non raro si-  
quidem eadem stirps, sub diversis nominibus loca separata occurrunt: ut & alibi scriptum sit.

Non esse autem hanc Membranam, que Græcis γλαυκὰ, sedò palam est, ut resertat quos  
quis non habet.

Ceterum in facultate hanc Maru species frigida apparet, atque adstringens: & tunc quoque  
Leucoglyphis est Plinio auctor: Vnde, atque, pro dicitur sanguinem coarctantibus, utibus ob-  
lectum croci: non exlicet, nec ex aqua & appositæ profusio fœmænta: oculorū quoque  
medicamentum: & explendis stercibus, que sunt in teneris partibus corporis.

De Bupleuro.

C A P. XXIII.

**D**Ua Bupleura sunt species, angustioris folij vultus alteram hæret.

Angustioris folij Bupleuron bicoloribus aut albis floribus affertur: caulibus rotundis,  
geniculatis, in compositis talis distinctis folijs ceteris singulis articulis oblongis, angustis, linea-  
tis, latisque quàm Gramina: Bofcalis non aliorum fistigium caudis, velon Anethi, latis,  
tubulatis compositis, quibus succedit oblongum, & Persifloræ seminum formæ, radice ro-  
tunda, articulata distillans.

Alterius folij lanosæ, rotundioris, sed non minus frons, quædam à radice, alia iuxta caulem  
causa, qui teres, geniculatus, crassior, ac brevior est: flocculi similes hinc: umbellæ paulò  
maiores: tum & terrena: radice oblonga, crassa, fossa nigricans.

In montibus ac vasis sacosis hinc vultus in ipas nascitur angustioris folij plenius ut ita Me-  
tem Germanis statum valde frequens. Vtrique in Bohemæ pluribus locis vult, ac non  
vult in ipsa rupibus, quod lanosæ est folij. Repertur & alius Germaniæ, si & Hispaniæ locis.

Indo ac Augusto Bortandende semina perficiunt.

Pro Bupleuro vultus habetur nec descriptio Bortandende repugnant que apud Pi-  
nium lib. XXII. cap. XXI. extat. Bupleuron in specie nasciturum nomen Græcè, atque, ha-  
betur casu bupleuro folio multo, longius, capite Anethi.

Lanosæ folij Valerius Cordus Bophyton, non sicut, quo auctor, nominavit: Plinius  
Elaphio.



Dupleurum angustifolium.



Dupleurum alacum latifolium.



Elaphobosium, alij Gramin Dei vocant: Sed aliud Elaphobosium, alioque Gato Dei, à nobis descriptum.

Ceterum Dupleurum si rivas calidum siccatum, sicundo appareat odore. Valet contra serpentem istum, ut non modo Plinius, sed & Nicotius in Theriacis affirmat. Focenter vero & decocta herba plagi ad instar folii Muri aut Oregani. folia ad secundas, vel succus ex vino illitus prodest: fructus vero cum sale & vino folia impetulant Plinius auctor. qui & in ubi ab Hippocrate Dupleurum laudatum refert.

## De Cichoria &amp; Inyba.

## CAP. XX.

**E**LVSORVM generis sunt Cichorium & Inybum: sed Inybum graecum: Cichorium vero syluestre.

*Inybum.* Inybum folia edit oblonga, lata, tria, ex albido virescentia, Laetate ferit acuta, amara nonnulla cretata. caulis inter laeae affurgit rotundus in grana, in ramulos diuisus, è quo vulgerrimo lacteus profluit succus nonnulli americana. Flores sicundò candidi ex rubra foliola commisti, colore frequenter caruleo, rariò candidi, radice oblonga, candida, non absque admodum fibre, post seminas marum caput de ferens.

Seminar Inybum in hortis, ac quod Vere satum celestiter adolefcit, ac ipsa ætate flores minima profert, ac deinde intercidit. In his vero graecum in hyemem restat, Sepotibus aut Obolibus terra obrutum, colligant prius folia, aut in ista candidum reddidit, ac deinde in ista hyberna, non si aliorum acerrimorum loco inferant. Id quod Plinius hanc ignota se videtur lib. xxx. cap. v. in ubi Semidam dorum generum esse ait: agrum istum, de herosum, & Chybernam, candidorem.

*Cichorium.* Cichorium duplex est vnum folij latiora, ac in iam arrosi, vel in Inybi, sed in cretatione, ac non adeò laeas, & nonnulla pelosis alacrum folia laciniolis, & ad costam vsque medium vrinque lacina, vnique caulis qualis Inybi: flores firmes, colore caruleo: semen subalbidum: radix oblonga, candida, in plures arnos restans. Diffusit & ex his, caulis, folia, ac radice vulnerata, alacrum & amarus succo emamari verò saporis & ipsius herba folia ac radice sim.



## Cichorium (Fuchsia, Paris).



Vitis autem non solum succus ipsorum est tum recens, tum exsiccatum, sed & quædam exsiccata, talisque ac tunc potui in potu, & contra decoctum in potu acceptum, auxiliatur. Hæbent Galenus.

Somnium vero eodem modo edantur, æstivam adjuvant, & in becillam reborant, præsertim quod sylvæstris: Nam vitumque ciborum est generis, vel Galeno teste.

Sunt solum in oleo siccantur coquantur, eadem hybernis in cibus venditum esse credenda, cruda cum oleo & aceto alterna acriter loco non tunc inferantur, ac edantur. Fere ad hanc podagra & oculorum infirmitatibus succurrunt.

Herba item & radix imposita à forpore percussa subducunt: & cytoplastum cum polenta medentur. Dioscorides auctor.

## De Dentis Leonis.

## CAP. XVI.

1. **D**ENTIS LEONIS vulgè dicta, herba, solum à radice promerit oblonga, vitroparitur, ac profundis incisura veluti per lacunas dentis, sylvæstris Cichorium artemisa, sed leonora. talis carit, sed pediculus habet concavos, in quibus flores singuli maiores quam Cichorium, & in pluribus foliis densius facti, colore tamen, odore suaves, qui tandem in globosum pappum subsolvuntur, quibus semen siccabit. radix oblonga, tenuis, lacte succo tinget, qualem & felis florum, caulescunt, ac calycibus valentissimus manet. Amara autem hæc herba omnibus suis partibus est, & magis quam Cichorium.

Reperitur frequenter in locis herbosis, non tantum aridis: nam viti cum Germanis, præsertim in hortis, nasci solet.

Mox ipso Vere floret, & ante Augustum vix flores desinit: pappi interea succrescent, qui vento rapuntur.

2. Hinc solum, pediculus, flore, & pappi similes sibi Constantinopoli missum P. A. Martibus deposuit, cui radices multæ subiant, veluti Alphodola, singulis tamen immixta.

Ad hunc vero & referenda videtur & alia Cichoracei generis herba: folia hinc oblonga, in cibus, veluti hinc in folio Cichoracei: cuius herba distillat, ac rariolus distillat, Decora leonora, sed immixta, in papposum lanuginem quoque per unius, radix oblonga, albedi.



- sem Leontis Monspeliensium facit: nec etiam aliò quòdam Dentem Leontis solem possit.  
 1. Terra ubique nomine oberrat: ex Cichoriaceorum genere haud dubio est.  
 Est autem Dens Leontis Cichorea, hoc est, sylvestris latylos facultate similes, aspergens  
 quidem, sed magis resicans, & videri magis ac aperitru, propter eam quam habet coram-  
 ditam amaram in eam: proinde & ad eadem, ad qua Cichoriis, velle ac commoedum est.

De Chondrilla.

CAP. XVII.

Chondrilla pruri.

Chondrilla alba.



**CHONDRIILLÆ** à Dioscoride describuntur duæ.

- Præter folia habet oblonga, forma ac densitas Cichoriæ sylvestris similes, sed minoræ, &  
 densè lanuginæ, qua obfideantur, nec effluunt: eas in pediculis, albidis, ac lanuginosis, in ali-  
 quotibus densitas, in summa vixulis floribus profertur, fardos veluti Cichoriæ, sed colore la-  
 teo, qui in puppis se folia nunc, radii longæ, modico crassitudine Effluunt non modò ex hoc,  
 verùm & a foliis ac caulibus succus albidus, qui resiccatus sufficit & acris est. ante autem  
 hanc in rosulis gutta reperitur, ut Dios. scribit, cuius hæc præter in Leontis videri esse, Bel-  
 lionis testatur.
2. Altera Chondrilla species folia utrinque profundius, & ad vixes melius collam in-  
 flit, sylvestre emulcat Cichoriis, sunt tamen minoræ, & minoribus se choriis hinc aliis, cau-  
 lis tenuis similibus, sed floribus exornatis foliis exornatur, in casis ramulorum filigine  
 floribus emittit multiplices, colore cerulei, Cichoriæ similes, sed minoræ radii albidis, ob-  
 longæ. Turgent & hinc caulis, folia ac radii lacteo succo.
- Veroque in leate locis in cultu tracta feroces & agrorum aggeres nascitur: C. C. C. C. C.  
 in paribus Hispania locis provenit, atque in aliis circa ramulos filiciferas ga-  
 mescentes in loco reperit.
3. Præter hæc & alia quedam reperitur ad Chondrillam referenda, folia oblonga, angusta,  
 & aliquantulum aspera hæc præter, ad radii veluti exiguis alis ramosis, Coram emulcat  
 herbæ sint similes, & eodem quo illis fieri modo per heram decumbentia, tamen aliquan-  
 to minoræ ac longiora, e quibus medio caulis alii assurgunt non ues, ramosi, cuius in rosulis in  
 summa caputula ex parvis candidantibus, argenteis oq. prope modum filigine spicantibus  
 squamis compressis floribus quibus prodeunt multiplices, Cichoriæ similes, colore pulchro q.

radix. rursus de oblonga radice alibi descendit. Ex qua sunt alter videretur liquor. laches cardo-  
 cavolani è caulibus ac foliis, prodit.  
 Augulus ronalis, vel etiam ferris apud Hispanos procerum Chondrillam dicitur. Erupit  
 reliqua Chirias.



Hieracium pinnatifidum.



Potentiora datur in Belgii locis Maa, Iuno,  
 aut Iulo cum flore quandoque reperta sunt.

Græci *μαρτιόλης* & *μαρτιόλης* appellant: Latini nomē ferunt Plinio Chondryllon & Chondryllis dicitur: à nomella verò, etiam Dioscoride scilicet, Cachobion ac Soria, propter nodositatem haud dubiò, cum his similitudinem requirit in floribus sequuntur, in posterodrum daturum clarior nam versuque caruleus, velum Cachobion.

Lobelus procerum Martialis Zacartham & Ciccomum vericaciam esse contendit: Est autem tamen Martialis pro procer Chondrilla quondam, cuius utroque à Zacartham iconem (quam de caprellis) differens est.

Tanta nodulosa Scissimides minus esse videtur: porum tamen cum illo Scissimide eadem. Scissimides verumque ab aliqua cum Scissimo similitudine nomen & appellationem accepit: hanc verò herbam nullam Scissimam speciem referit. Quamobrem ad Chondryllis genera cum asserendum venit. flores ex eo habet formam & coloris Cachobion liquorum qualem procer Chondryllis. Non tamen ea de causa vino curi, quæ à Dioscoride detrahuntur, sed ipsa affinis. Neque enim alienum plures vnius herbarum species esse, cum in Dioscorides referent. Quod si una siquid obferretur probè rursus, herbam ac sarpurum multarum generum modò plura reperiri, quàm venteribus cognatis fuerit aut detrahitur.

Ceterum Chondrilla Cachobion facultate similia, sed aliquando siccor: ut Galenus. Succum procer per se aut cum vino potum aliquam sibi. Radix cum foliis trita ad ducit melle in pastillos formatur, qui rursus ad rursus alphas sine vitiligines expurgant.

Genera inordinatis palpularum pilos replicat quod & alterius succus potest. Cum myrrha garrum tritam ac lacteo unpositam, mentes dicit, Dios. audet.

Procer dicit, Martialis à rursus rursus accata accipit habet.

De Hieracis. CAP. XVIII.

**A**D Hieracium genus Hieracium etiam pertinet Huius generis Dioscoridi quidem duo: posteriori nostræ ætatis plura quædam ex his caulibus surgunt foliolis: aliorum caules folios cæcum.

Primum Hieracium caules procer complura cubitales, aut alcores, foliaque comæbitantur oblonga, digitis latioribus, virentibus, per marginem eriguntur. flores in caculamentibus sunt, fœdè, in pappos resoluuntur. radix fibrosa.

Alterum caule quoque folioloso vixit, sed folia verumque profundas incisè & exigua sparsè dicitur foliorum mollioris Sordis, per marginem

Hieracium alberti.



Hieracium quaternum.



Hieracium unguis.



Hieracium quaternum.



conferantur. Flores & pappi quales priores radix similitur florū quoque coherent.

Tertium folia pinnata & pedice multa oblonga, circumscissa. Decem Latius ferè similia, sed pinnata, non raro pinnis tribus, affurgunt è medio horticæ aliquot cauliculū terræ, lævæ, glabris, subrepentibus, sub pio flores proferentes lævæ, ac deinde pappos. radix caudata, rotunda, ac oblonga est.

Primum folia habet similia, sed minora, & alioribus incertim difficta : cauliculū quoque causticum sunt: flores minores, radix brevis, veluti pinnatis, majus foliis demittit.

Hæc similia & minima quodammodo folia, radice cauliculis, exiguis floculis, pappos, & caudicibus fibrosis pro maxima referunt.

Quæritur Hieracia loci incertum, aut in marginibus agrorum, primum quandoque in sylvis reperitur veluti quod minimum non tamen in agrorum fragmenta erit.

Floret quædam circa alia similia omnia æstate.

Contineatur hæc plantæ vno Hieracii nomine, quod Græci *λεγωσι* etiam appellatur *Λαγωσι* nonnulli Accipitruæ, quod Germanice si *Waldstreu*: Belgis *Waldstreu*: Gallis nonnulli *Cichorea laevis*: Anglis *Waldstreu*. Apuleius etiam *Lachucam sylvaticam*, & Græci *Waldstreu*, & *Waldstreu* dicit.

Ab Accipitruæ, quæ Græci *λεγωσι* dicitur habet: Feruntur enim hanc sacco oculis argenteis, obstantur enim eorum diuisione.

Pauli verò & hoc *Waldstreu* Theophrasto dicta esse: à *Gua Passella*. Numeratur enim *Waldstreu* inter *Cichoreaceas*, inter quas Hieracium quoque est. Cuius ut nomen apud Theophrastum non erit, ita nec *Waldstreu* & pappus Dio stondeat, cum tam en reliquæ *Cichoreaceæ* ab utroque describantur.

Deo priore ad illud genus referuntur, quod *λεγωσι* dicitur, & Hieracium magnum dicitur à nonnullis *Waldstreu*, & *Lampaca* Belgis ad alium pertinet, quod *λεγωσι* dicitur, siue Hieracium parvum, & à quibusdam *Waldstreu* in agris truncatur: quorum, quod parvum est radice, quandoque eorum *Waldstreu* dicitur appellatur, quod verò minimum, ab Hispanis *Terra crepida*.

Hieracium autem frigidam habet, & cum edithione contraria refrigerantem facultatem: vnde, *Waldstreu* inter, stomacho æstivato ac inflammatione moribus impositum prodest. Astuatur & in horione æstivum radicebus terra & imposita. Quæ non minima in cœlo, verum & in terra possunt.

De *Waldstreu* sive *Engera*.

CAP. XIX.

**ANHYMERATA** Cichoreaceæ generi à Theophrasto & Engeron. causa ei mensuris, striata, in ramulis effusa, folia videntia, oblonga, ambigua nonnullis incisa, si rari veluti *Cichoreæ*, sed minus ipsa etiam minora, Eracæ quodammodo similia. Flores hanc citissimè in pappo perant, in alio fibrositate. Est autem hanc speciem quandam murem, paulo iam hanc & granulicentem: aliorum verò murem, lævæ, & in odorem reperit, folia aliquo quantitate differentes.

Nascitur Engera passim sicut vis, agrorum margines, locis haud cultis. Mains *Waldstreu* pedem minus, frequenter in hortis, vna cum cœlestis faceret.

Cadè & primo Vere Engeram floret, & mox in pappos sicut permixto caeseret.

Nascitur huic duobus & terram quoddam, in Cichoreacearum ac *Waldstreu* familiarium quoque reperitur: Differt tamen ab Engera foliis majoribus, profundius, ac *Cichoreæ* modo, natis, caulis ramosi, pedales, cornutibus in summo floculos lævæ, qui cum similes & caeseret, & in pappos solentur, veluti Engera, radix crassior, ceteris Engera qualis. Ferret tamen hæc herba nonnullis, vnde *Cichoreæ* fortis à nonnullis appellatur in sede pape.

Annotanda Engeris & alia quædam, quæ quoque caeseret, videntur hanc autem cauliculis ramosis, dodrantales, parum hanc, ex obliquitate rubor subnigræ: folia angusta, pappo, molliaque. Floculos in ramulis e murem res, paulo lævæ, cum similes, ac non modò solum de, sed sæpe inter hanc solum in pappo simi languente conservantur.

In vnguentis emittit, quandoque in sylvis macro & steris solo nascitur.

Dicitur autem Engera Latini Senecio, ex eo videlicet, quod cied ac ipso Vere caeseret: appellatur verò & senecioleis vocabis *Engera* & *Herbatum*: A Germanis verò *Engera* & *Waldstreu*: hoc est, Belgis *Waldstreu* & *Waldstreu*: à nonnullis *Engera* Hispanis *Waldstreu*, & *Waldstreu*: Italis *Waldstreu*, & *Waldstreu*: Anglis *Waldstreu*.

Tertium cum Aphace Theophrasto conuenit videtur emittit autem lib. vii. Aphacæ, quæ non modò leguminosæ, sed & herbe, quæ hæc Engera species perquam similes. Nam, ut Theophrasto, Aphacæ herba ex Olerum & Cichoreacearum est summa, angustabilis & amara: ferretur floret: sed celeris sicut senecioleis, atque languine pappo marcescet. Tals quædam



*Erigeron annuus**Erigeron tecton.**Erigeron annuus**Erigeron quarum.*

hæc Erigenæ species. Sed addit Theophrastus, nona hęc erigea totaque vere floere. Huiusmodi in floribus hæc constanti adimat, verò cum in thuris farina, que Myrica dicitur, aut cum vino ad partem scribit. Diabotides cum in maris alius vulnibus, etiam nervorum, moderatè simile pappum aceto impositum possunt, qui si recentia bibantur, strangulosecum adferunt. Cuius aqua decoctæ, et cum vino musto pota, fluxu acti à bile contrahes dolores sanat. Diabotides vocatur.

Receptus Erigenon, quod maris est, apud Belgas hybernis mensibus non raro inter secretum, ac ter rugosum est.

## De Jacobæ. CAP. XL.

Jacobæ.



**A**D Erigenæ genus pertinet non abesse ex Aristoniat Jacobæ nuncupata herba: quam non una est species.

Prior, vulgò non firma, folia intus premis ampla, terga, utrinque laciosa, que Absinthij latifolia præterea folia respondent, nisi longiora, lanosa, crassiora, non alba aut mollia, sed glabra stragulo colore virent. caulis assurgit cubito altior, stragula, subrubente colore nigrescit, in alia altitudo, que folia conestitur minoribus, Erigenæ aut sylvestris Erige amoda, floret in fulgida ramulorum, & medio disco, & ambicibus delo in aut colore later, qui in pappum lanajuncu retolantur. fibre pro radibus sunt.

Alteri caules haud brevis folia condidera, a molliora, & subinde minor. Flos pallidior: radicibus longiora.

Hæc accedit & Cineraria vulgò dicta, cuius majores & ampliora multò sunt folia, non mollè proca Jacobæ, sed & Absinthij minor, utiq; marginibus serrata, crassa, mollè quodam sermo tubulosa: flos similes later sunt, qui & in pappum vancunt lanuginem.

Prior pallidior per utramque Germaniam locis incultis paulò humilioribus, & iuxta aruorum margines est.

Alia Zelidæ & maritima locis frequenter.

Fertur & Cineraria haud procul à mari reperiri.

Est hæc sunt herba quædam ferunt, alia cu us in Belgij hœmofium florac tunc.

Herbam S. Jacobi, aut S. Jacobi siue in proccum appellatur eo contigit, quòd Germania S. S. Jacobi Minster aut S. Jacobi fratrum dicunt unde Jacobæ nomen accepit & à Belgis S. Jacobi nuncupà Gallis herba in flos de S. Jacobi dicitur.

Alia, ut hanc species, in & Jacobæ nomenclaturam tenet: addit Mairæ epitheto. a Nomenclaturæ verò & qui Asteriscum maritima faciunt, in qua & nos quandoque sententia sumus.

Tertia à subalbido cinerum quorundam colore quem referit, Cineraria nomen accepit à S. somali Erigenon maritima dicitur.

Est autem Jacobæ ordine secundo calidior siccior, & propter eam quam habet amaritudinem etiam exurgens. Ad vulnera, & vicia inueterata ac sordida à recentioribus commendatur: que succo huius cum melle permixto expurgantur. Laudatur verò & hanc decoctam expurgantur ad paruis tumores & abscessus, quos & discent se persiant.

Sonchus lactu.



Sonchus repens asperus.



Sonchus asper.



**S**ONCHUS duo sunt: unus tenerior ac mollior: alter spinosior ac sylvestrior, prout scilicet monstratum.

Caulis asperioris subinde cubitalis, angulosus & inarticulatus, & subinde nonnullis rubens. Folia venentia, latis, latis, utroque margine denticulatis incisiva distant, spinosiora sunt. Flores in forma caudicibus eminenti, ex pluribus foliis ciliatis, quos albi pappi, qui vento raptores, succedunt quibus febrili semine potestate, plantam, elongioris formae, multo quam Lactuca radix, multo siccior coloreque. Prostat ex hinc hinc ac caule fractis candidus ac hinc siccioribus.

Alter parvis similibus, sed foliis crassioribus paulo, ac utroque lactuosior, parvis, sed tamen durioribus ac purpureis: bus aculis per circumferentiam sparsis. Flores, semina, albidus siccus, & radices à superioribus non differunt.

In hinc vni cum oleis hinc frequenter quoniam in agris nascuntur.

Præter hos verò & certus quidam spinosior Sonchus reperitur: cuius caules subradicibus spinae horrent; ac folia, quæ & omnino aspera veluti Echij, hos & reliqua cum hinc continentur.

In Flandria & Zelanda agris hinc præsertim à mari spinosior nascuntur.

Iuris ac Iulio commestibili, vel etiam fructu

Quæ Græcis *ϕύζου*, Latini simpliciter *Soncha* : à nonnullis vero Cicerbitæ, Lactucellæ, & Lactucosæ nominantur : Apuleio *Sonchus* Lactuca Lepontina dicitur.

Præter Germanæ *Wasswurz* id est, herficam Lepontinam nominant Belgæ *Wasswurtel* a Galis *Palays de linars* Hispani *Carraga*, *Carralbas* Itali *Lattucella* Angli *Cassara*, Latini *Sonchum* vocant eam.

Alter ipsius oris, & superior ac stylacibus cognominatur Tertius vero Marinus.

Temperamentum autem *Sonchæ*, auctor Galieno, miltiam est, consistit enim ex aqua ac acido subtiliori, utraque leuiter frigida ad frigiditatem quoque cuiusdam pertinet est. Tenet vero & ad huc veteris eduntur rationem ceterum modo. Sicut autem eduntur, sine vomica-placenta modo applicentur, manifestè refrigerant: prodest itaque oculibus inflammationibus ceterisque.

Succus in febribus sine datus stomachi ardentes ac rossos et mitigat, & lactis abridendi facit. Panis radix quædam herba sic propeum sibus et utilitatur.

De Lactuca. CAP. XXXII.

Lactuca sativa.

Lactuca scariola.



**D**IVORVM generum Lactuce est: hoc tota una stylacibus altera. Hortensis sine sativa Lactuca folia eius oblonga, lata, bræ, duntaxat vicine: cuius vel rubenda, crassa, foliis, lactis facit plenis, qui in lacum effusus est mare, hinc utes proferit hinc mos, papposus, succulentis semine parvis, oblongo, plano, & obscuro, rarissime nigricante, radiis longis, crassis, in alba adherent floræ. Vulgaria hæc æque folia similia quoque lacum non minus quam ipsi cuius oculis effundit. Et alii quidem quædam natura produunt, nō in herbæ sunt, Lactuca est.

Colitur: siquidem in mangonio non raro folia eius in aliam speciem transformantur vel emulsi præparantur, aut ita in se contrahantur, ut capitulum Brufficæ emulsi videatur utiq; hinc quidem modis ac interiora folia ex dilato ad modum lacte colore insidant.

Præter hæc vero & alia quædam Lactuca folio est oblonga in vitro, aut, ut Colamella dicit, in rubra colore quam Pliniam Nigram appellat.

hæc & quædam sicut ac velum purpurei coloris, sine ex alio rubicunda? hinc Rubella? p. 619.

Lactuca capitata.



Purpurei folii, sive ex albedo rubescens, Cypria est Lactuca Columella, Piasco Genoa.

Quamvis etiam Lactuca humidum in se frigidum est, non tamen vehemens nec sed osano moderata, aliocui enim edulus non esse. Astringentia vero venter culum hac refrigerat à bile m-  
 scilicetum adiuuat: Item accretio formam in conciliat lactis abundantiam facit, in quibus quidam, quibus propter caliditatem ac siccitatem, hac vel deficiat, vel partem succedunt, nam siccitatem & caliditatem consuetudine ad huius generationem conducit: nascitur vero frigida, lactis generationem non adeo promouet, sed cum ut remoueat.

Edicatur autem Lactuca non truciendi cruda aceto, oleo, & exiguo sile condita: Emu-  
 ro in aqua citius concoquitur, & magis absterge. Infirmos mox citius coartat, & arte aliam cibum edunt. Quod & eodem solum Marmala testantur, qui antiquiores eam sub faciem cereæ app-  
 tate, eodem dicitur testat.

*Clauderis que canas Lactuce sicut arborum,*

*Est modo, car nostras roborat illa depert*

Potest vero utroque tempore subinde haud absque fructu assumi: praesumpti enim in-  
 general apponitur subinde excitat à cetera vero tenuitatem eae vixo dicitur, dum sem-  
 pe vapores ad caput effert impedit.

Succus enim, qui ex Lactuca in venis gignitur, humidus ac frigidus est, non tamen vas-  
 sus, sed non multus. Ex reliquis enim rebus dicitur omni modo paucissimus, ac parua Galena  
 teste, succedit. Aliam vero eodem auctor, hac nec sibi, nec prout: Nihil enim lacte  
 neque aucti neque acerbis, à quibus venter sistitur, nihil quoque salis acris, que ven-  
 terem exurgenti ad excreta cetera excitationem. Vtunque autem hac Galenus sibi, & qu-  
 libetibus quoque ista dicitur sit, vix tamen consperitur, ad alia facilius, collum pro-  
 pter, confert. Aliam siquidem in humedans facit oram cum redat. Quod & Marmala huius  
 ignorat, sic scribens Epigrammaton lib. xi. ad Iulium Cerealem:

*Prorsus tibi dabitur, ventri Lactuce mense* *Fruis.*

Pons admodum omnia infirmationes Lactuca tingit: ambusta priusquam potale et  
 vesice hanc cum sale (Piscus aut) imposita prodest.

Semen Lactuce refrigerat, & generale semen, si frequenter sumatur, dicitur: Semina  
 istem coartat siccitatemque adducit.

De *Sylvestri Lactuca, seu Officinarem Endivia.*

## CAP. XXIII.

Lactuca sylvestris.



**Sylvestris** Lactuca sola promittit obliqua, **S**emenora tamen & arguta non quàm Sanus, ac vixque lacteo profundioribus mediis inuolvis, quorum media collasit non parte, à dano fructu aliquot spica, ordine quodam & inter forte digestis, obliuiscat: caulis cubitalis, qui in alia estulis floccales profert semina Lactuce amulos, in pappo quoque suo tempore se ut solent tenuiter nigrescit, alida veluti fignae, adia breuiter ac minus. Effluit ex hac fructu aut uicula succus affidus, datus lacte colore affinita, sapore amaro.

Nascentur fecus vias, agrorum aut pratensum margines, tam & iusta scroba reperitur & in vineis, ac horti, in quibus olea seruntur. Facillime autem ubi semel sita singulis annis recitat.

Iuno, Iulio, & Augusto praecipue viget ac floret.

Græci *ϑυλάκη ἀγρία* Latini Lactuca sylvestris: In Officiis Pharmacopœorum perpetuam Endiuam vocatur: Inybyum enim voce depernata Endiuam dicunt. Appellatur verò Lactuca sylvestris à quibusdam Scenola per duplex ut quod forte modo acutus spicas soly costa à tergo habear: Germanis *trüder lattich*: Belgis *trüder wort*: Galis *Lactuca sauvage*: Indis *Lactuca siluestris*: Hispanis *lechuga siluestre*.

Apud Galenum De alimentorum facultatibus lib. a. legitur, Lactucam sativam *ϑυλάκη* appellari: praeter hanc verò quod sitas (id est, Pergamentum in Asia) & aliud quoddam esse olea agreste *ϑυλάκη* nomine, quod in via ipsa nascitur & locis fossarum eminentioribus, & praeterita regna ac plerisque incolunt.

Expurgam autem ad olea est, iustas Lactuce hortensis non per erant, aut arceolique quappam *Thibet* per se forte, & multò magis dum adolebit: ubi autem euasem iam post uerem, saporis amara. <sup>22</sup> nam habet vel in an festissimum: Hactenus Galenus.

An autem hoc Thiodascus, Lactuca ista syluestris sit, nec ne, cui integram erit diligenter inquirere, per nos licet. Nobis satis fuit e a de Thiodascus hoc loco esse vplisse, quae de hac à Galeno testantur.

Ceterum Lactuca syluestris frigida est, & quidem (si pappum, ut Dioscorides, similia) citius ueritatem ordinem: fœca verò secundo: & simul expurgansque aperiens, quia nonnullam in re dicitur participat. Dioscorides hanc quoque purgandi per a leum facultatem tribuit: Purgat, inquit, cum oxycrato epotus fœcus, duorum obolorum pondere, aqua si per oleum Argemae & oculorum caligines expurgat: cum lacte muliebri ad uarias ambusta confert. In fistula somniferis & dolorem sopiens. Mensis verò etiam in oues, & contra corporum: phalaggonem illis bibitur. Hinc Dioscorides.

Recentior etiam loco Inyby hanc non miseliter uocat: Nam ad ueritatem inflammationes, & febrem regium confert, calorem siquidem con temperat, & mucus expurgando aperit.

Semen lauiis idem quod Sarsae potest, & Verem in fragatur.

## De alio oleo. CAP. XXIII.

**LACTUCA** generibus accedere potest, vulgò dictam Olea albam, herbulae in aqua, primam erumpentem Lactuce foliorum quantitate, forma, & colore sitis similit, foliola siquidem cuspiscula, lanuata, non tamen digitum lata, rotunda longiora, ditante quoque uice: cauliculum hanc promittit tenuem, angulosum, tres aut quatuor digitos ultra in ramis distruentem, duobus aut tribus geniculis articulatam, à quorum singulis foliola bona procedunt: radicibus erumpentibus angustiora longioraque: in saligo verò cauliculi eorum stoffa aliabid

Album Olan.



1.

Boleum adhaerent cuiusmodi digesti, & deinde semina triangularia haud magna, tandem membranis implexita, colore subrufo nigrescunt. radix rufa, & qualis, protra, hoc utroque colore.

1. Haec folia, caule, semine, longa lateraque radice simile est faciem Lapathum: folium enim in aetibus, mollioribusque, & caule multo aliove, ut qui hominis statura non modo assequatur.
2. Pariter haec verò de tenui est, Hippolapathum dictum, quod etiam folio est amplicius ac minus quam facium: strobili & semina similia, caulis verò crassa, interior pulpa dicitur rubescere.
3. Oculis, Oxylopathum folium & reliqua simularur, sed folia molliora, vitamionisque haec, & si posse acida.
4. Haec verò de species quaedam reperitur, radice in multa rotunda capitula, ex similibus dependentia, exuberante, arboris suspensibilis: sed raris admodum haec Oculis est.
5. Accidit & alia quaedam Oculis folio brevis, lano, & quasi rotunda, ex albedo vitam: caulis tenuis ac tenellis, qui facile concidunt: semine in quo.
6. Item & minus quaedam Oculis est, caule palmi vix alti radice: folia angustius pinnata, que frequenter, postquam semine maturo, tota rubens apparet.
7. Nec deest verò & rubens haec nigrum Lapathum, quod caule est Oxylopathi brevis, folia minoribus, saturato rubore nigrescentibus, costa tamen media ac fibris dilata rubentibus, ex quibus faccus vitam rubentem exprimitur.
1. Oxylopathum autem in pratis locis hu mensibus viget, & sponte pinguitur.
2. Sarrum in hortis semitur: solo gaudet stercoreo, & bene subactis.
3. Hydrolopathum in fossis ac foveolis aquas habentibus requiritur.
4. Oculis haec quandoque in sylvis frutibus reperitur, cultum tamen melior ac speciosior caulis.
5. Rotunda folij Oculis sylvestris est, & in alpibus ac montosis plerumque locantur: mense vero de ad herba.
6. Minus genus in arvis ac agris occurrit.
7. Postquam in foveis utitur in hortis quam alibi, tamen tamen ferente, nascitur.

Semine maturo plantam Lapathum Iulio & Augusto videntur. Oculis verò mense Martio ac Septembri. mense viget.

albidis perquam exiguis aliquot veluti in fascio coherent. capillares fibre paucæ prominentes sunt.

In agris verò cum frumento frequenter nascitur in Germania, Belgio, ac Borussia, cum & alibi. Hyeme & paulo post herba in agris viret, & collecta sicca arserit.

Belge in mense, ad est, Olan album appellatur, Nonnulli verò de Belgis alio Olanis dicitur: nec alia quam nostrata cognata: *Alant* dicitur Graeci quibus dicitur.

Refrigerans autem haec herba, & nonnulli humedans, scilicet ac temperata terra Laticulosa haud dissimilis, cuius loco habere & pennis Veronensibus inferat, ac cum sono, sile, & alio utendo edunt, veluti alia aeterna: caulis haud postremum locum obtinet.

## De Lapathis sine Ramis.

## CAP. XXX.

**G**ENERA Lapathis. Distinguitur quidem quatuor refert: *Sylvestris* sine oxylopathi: alterum facium: tertium rotunda folij: & quartum aciculam, quod Oculis dicitur quibus & Hippolapathum postea nominatur. Pofitionis autem observatio & alia quaedam haec adhaec.

*Sylvestris* Lapathis sine Oxylopathi folia sine oblonga, dextrorsum, acuminata, non rotunda, ad utriusque cruris rotunda, amplexibus, subinde bipinnatis, caulis tenuis ac appendicibus

Lepidum cyathiferum sive Gaylipachum.

Lepidum latifolium.



Hippolipachum sive Ribularianum Monachorum.

Craba.



HH

Quod



Oxalidaceae.



Oxalidaceae.



Quod verò Graecis *Αξιδας*, Latine *Rumex* nominatur. Plantae tamen lib. viii. Cap. viii. *Rumex* appellacionem sibi non tribuere videtur.

1. *Oxalidaceae* Latine *Rumex acutus* in Officina *Lapathum acutum* dicitur: à Germanis *Wingelwur*: *Sauerkraut*: *Christwurz*: *Zitterwurz*: *Italis* *Ascholar*: *Hispanis* *Asencia*: *Francia* & *Lapaja*: Belgis *gandij*: *Lapatho* voce deducta, vel etiam *gandij*: Galis *Pocole*: Anglis *Wath*.
2. Alterum *Αξιδας* *βασυς*, *Rumex fistulosus*, *Lapathum fistulosum*: *Volgo* *Patercia*: à Galis nomenclatura mutata, qui hoc *Lapathi* genus *Lepariaceae* appellant, quos & Belgae maxime *gandij* hoc quoque nomen vocant.
3. Tertium genus quod reliquum inanis ac procerius est, *Dioscoridi* & *Galeno* *Αξιδας* esse dicit. Plantae verò etiam *Αξιδας* dicitur à loco in quo nascitur. Latine *Lapathum aquaticum*, *Lapathum aquatile*, *Rumex palustris*. Hoc genus plerique *Rhabarbarum* nominant *Μοναχικον*, quod non à radice *Rhabarbari* loco quodam vitatur.
4. Quartum *Lapathum* Graecis *Αξιδας* est, & *Αξιδας*, *Galeno* etiam *Αξιδας*, id est, acidum *Lapathum*, sine acido *Rumex* in Officina & *volgo* *Acetosum*: Germanis *Sauerwurz*: Belgis *gandij* *Wath*: *Hispanis* *Asencia*, *Ascholar*, & *Ascholar*: *Italis* *Acetosa*: Galis *Pocole*: Anglis *Wath*: *Bohemis* & *Polis*.
5. *Tuberosum* *Acetosum*, & *tuberosum* *Lapathum* quintum genus non ab re vocacione intercipitur.
6. Sextum genus synteticè *Lapathum*, & *Αξιδας* *Αξιδας* est, quod *Dioscorides* tertium fuisse & à nonnullis *Oxalis* *Rumex*, & *Acetosum* *Romani* remane vocitant.
7. Minima *Acetosella* vocat, & *Oxalis* idis parvitas nomen adeo est: Germanis *Wath* *Sauerwurz*: *Bohemis* *Wath* *Wath*: hoc est, *Acetosum* ovilla à Galis *petra* *Pocole*.
8. *Pulsaria* nigrum *Lapathum*, & nigrum *Rumex* dicitur, aut rubrum *Lapathum*. *Perperis* autem facunt, qui illud *Sanguinem Draconis* vel esse suspicantur, vel nuncupant: nam facuntur illi qui *Sanguinem Draconis* nominant in Officina remanent, non ex herba hac, sed omnino ex alia stirpe colligunt.

At *Lapathum* omne remanent habet nomen illi frigidum, & quoddam quidem ex gustu ac moderatum: aliud verò intermedium, refrigerant verò & amara, sed non omnia equaliter.

Oxalidifera.

Lapathum rubrum.



Sicuti Lapathi folia, quae esse oleosa sunt, frigida in tem. qui dem stygium. humiditatem ve- 2.  
 di maseam obtinent, ac viderentur: unde & facile ac acido, quando eduntur, per aliam  
 referuntur. Diofcorides etiam omnia una decocto citre, aliam emolli. tradit. Quod & Ho-  
 nium annotant. Semmonem lib. 2. Satyra quarta sic scribens:

*Stoloris morabatur alium,  
 At agilis, & vales polles abluente caechis,  
 Et Lapathis heras herba.*

Heram autem appellat Lapathi heram, prius quibus caulis crasius fue rit decorptam, quo  
 tempore esse ponitur in idonea est. Edunt autem haec cocta, sed minus quam Beta vel etiam  
 Spinachis fuisse succum vob' ingensat humidam, med' occurr' crassem, & parum ali-  
 mentu conferentem.

Oxylapathi autem folia cum frigiditate reficcant: Semina vero haec, tuta & ferua, ad  
 etiam Oxalidiferae tractantur etiam substantia refrigerant, valde reficcant & adstringunt.  
 Coram de ferecra, per lacus afflicta, ventriculi ea hinc subacrifores & fistula: tam & ad-  
 ueris ferecra in ista, ut Diofcorides asert, bibantur. Prostant & sanguinem sp' uentibus  
 aliam scicia, auctore Plinio.

Oxalis haud debet refrigerare, & potenter reficcant quis vob' acido, etiam lentos humores 4.  
 incellit. Huius succus aliam mensibus multorum cibatorum vob' cond' mentum est, ac  
 plura gratum. Ventriculi in estuantem refrigerat appetentiam ciborum excitat: hoc non  
 citius contemperat, abstrahentes eundem apertu. Folia decocta (quorum aduersus fe-  
 bra vob' vob' adduntur.

Sunt facilius: Oxalis in medicina folij est, quatu, ut diximus, Rorarium in cognoscant. 6.  
 Nac' infertio facultate parua illa. Accosella est, quae etiam magis reficcit.

Radices Oxylapathi, sicuti Lapathi, ex Oxalidifera ex aceto decoctae, & per ferecra tranf- 7.  
 missa, fabres, impingit, & praecitas curant, si afflicta partibus illantur praefertim hoc quo 8.  
 per decoctionem nigrefacto, aut oleo ex Lauri bacca, & Zambere nonnisi solent. Diof-  
 corides hoc & crasius radices posse asert & etiam ex vino decoctum demum auiamque  
 citius mactem, si eo collatur. Decoctum autem haerem etiam fabres ac pruritus colla-  
 boe magis, quod & balneo radices praesant. Ferantur vero eadem ex vino decoctae po-

nonne ego verbo maderi, & compositi colorum emendare, ex aceto coctas licet utipote prodesset cum vino verò strumas ac parotidas dicitur. Quod & vinculo-cello appellatur, siue quidam nigraque. In pesto muliebres fluxiones trahit & appofuit fistulas.

Hydrotoparia autem totius Aluum laetitia mouere solet, quod tamen nobis contemptum affirmare nequimus.

## De Tota bona.

Tota bona

Maler  
Boreana

## CAP. XXXI.

**T**OTA bona recensioribus dicta. Lapidi-  
bus autem pennis animumerit, cuius  
huc edat, com plures crassas, foliola pediculis, vel  
post aliis non, cuius ramulis, sicutum veris, in-  
buen racemosi adhaerent. Postali, ac deinde si-  
mina Aniplicis amula. folia, que longi ma-  
ximum pediculis, iura sunt & acuminata, forma  
quodammodo folioseum An, sed cordata, & so-  
lam tenuissimam, reipera, radio crassa in plures  
quaruloque diuisas, colore veluti Crispa-  
tia, inuenis luce.

In calis loes, ac si penultimo radenti, fere  
vna, vltima mura, & agorum sequentia in-  
quenter reperitur.

Inno ac Iulo praeipud cum flore raga.

Reccentior autem Tota bona dicitur, Belgis  
et parte de Remensis, vix Angli, & quibus-  
damp. Sunt qui suspicantur, quodammodo, ad est,  
autum Otia effodit Chrysolachan Aniplicis  
est dicitur, nisi quis vult Plana, sicut Chry-  
solachan est, quod in Pineto Ladua fide  
nata refert lib. XXXI. cap. VIII. Germani  
Ephemerel vocant, et Binar, ymond, et alii, Bonu  
Hennecus, à singulari quadam vili facula-  
re, velut & perniciosam quadam, Malu Hen-  
necum appellant, quam Conradus Richerian  
Quadrupedum historia cap de Boue histen-  
bit verbes Proponit apud nos in Helonia no-  
ta quadam herba, à qua non tam in ipsi boue  
abstinent, sed etiam gramine eorum, quod as-  
tente, licet eodem equi vescantur. Rustici quidam apud nos Malum floccosum, Malu Hen-  
necum appellant. (Agrobachan esse castrum.) Causa et albus, pedalis, foliolis, & foliolis  
quodam humida mollis, an arches flores hirsuti, purpurascens, in ipsam congesti, vna  
Tetherolo euna fere forma rotundo inlibe Malu, quibus si balustragem radice alius, no-  
dis quibusdam exaspera, & velut squamata, longissima, ad quam que vel sex cubitos dicitur  
quam in arboris integra effoditur. Recens plantè frigida humidatq; tado percepta, vna  
vitas corrupte & frigore suo laedi. Hec Gessera.

Sed ut ad Bonum Hennecum siue Totam bonam redes, mura, calida & sicabit modentè  
est, & vna abstergens atque expurgans.  
Folia cum oleibus cocta, atque strata, tubercula reddunt aluum. Eodem concilio ac  
conata recensia vulnera imposita veniunt, sicut illa verbaq; vetera, cum & vna modi vna  
expurgans, & vermes, si quia ipsi emat, faciens, inueniunt.

Pinus Chrysolachan unum quod in Pineto nascitur, lanre sit in crassissimis, à cordata  
imponatur. Hoc autem à Tota bona praestare queat, non alio re, nec temere, nomen siue  
adipem est.

## De Malis, &amp; primis de horticis.

## CAP. XXXII.

**M**ALAE genera complura sunt, ex quibus situs, siue horticis vna est, ad qua sy-  
uicibus Malis sunt.

Situs siue horticis Malus folia ampla & rotunda, proinde, in vitore efficitur, asperum,  
& maiora, quod si uulnibus eam in siue scapam rectam, simplicem, quae non sit quodque ta-  
litas non modo aluorum, cui praeter asperos, folia, flores à pediculis brevibus ad haerent, ma-

Malus horrensis.

Malus horrensis multiplex Rose.



item multo quàm sylvestris, aliocum forma non admodum dissimiles, quandoque simpliciter, & quæque tantummodo foliosam, frequenter verò multiplex, vel rose auræ candidæ, aut rubræ, etque modo sarum, aliâ perperam modo solente, non rarè verò omnimò dilato. Illa succedit orbiculus nominatus inter placentæ ex multis truncatis seminisbus planis coagmentatus. radix longa, alba, lenis, ac fœtilis, atq; delectanda.

In hortis feruntur: veniunt alibi quærentes.

Almo anno à quo facta est, caulem profert, ac flores in hoc aut Augusto factis semine perficitur in ætate: radix subinde aliquot annis rebit, Vere nouo mensa folia peruenit.

*Malus* Græci dicitur, & ad differentiam alterius, *Malus* peruenit, id est, Malus horrensis nostralis verò, *Rosa* vitramina, & *Rosa* hystera. Atque hæc illa est *Rosa*, quam ex Maluco caule fandi, Plinius lib. xxi. cap. viii. tradit: folia oleacea (perperam in plerisque *Rosa* hystera) entropianibus, *Olea*, aut *Oleacea* habens, quam Malucum vocant. Germani *Eschen* vocant. *Herbst*, *Ernt*, Belgii *Wintrosche*, *Wintrosche*: Galli *Ros d'automne*, *Malus horrensis* in cultura: Angli *Wintrosche*.

Appellat verò istam Malum aliquibus aliis nominibus inter species Dioscorida vocat reperitur: ut à Pythagora *Malus*, à Zoroastro *Malus*, ab Ægyptiis *Malus*, ab aliis alijs *Malus* est, capite *Malus*, aut *Malus* est, vna mura.

Caule autem moderatè horrensis Malus est, & humida quoque, sed paulò, quam sylvestris, minus: glutinosam similiter ut illa substantiam habet, que in flore, semine, ac radice manifestat.

Floram huius Malus decoctum, præsertim rubentem, superfluum malicolum in se est, si in vino rubro decoquantur, & alio quodam eò succum addantur.

Folia, radices, & semina, omnia passim que sylvestriam, quam frequenter & familiariter vna.

De Malus sylvestri. CAP. XXVIII.

**S**YLVESTRIUM Malorum vna folio elliptico, rorando semina, sed tamen anguloso, per circumferentiam leviter crenato, glabro, lævi, ac virenti, caules subinde emittit plures, rudes, quandoque herbiles vel alioqui, circa quos præter folia, foliola in medio sunt

HH ; long-

Malus sylvestris procerior.



Malus crisp.



Malus sylvestris parva.



longitudinis pediculis, ex distat purpureo-  
bentis, quibus succedit & placentis vltis obli-  
catis, Lupino non maior, ex pluribus conglobis  
fructibus. radix alba, longa, medioscissili-  
tudine.

Altera humilior est: cauliculi hinc ramos  
non erecti affurgunt, sed procumbentes quasi re-  
parant: folia rotundiora, sed minor, vltima co-  
miser incisa: floris exiguis & albis: seminum  
orbiculus parvulus. radix alba, crassa, & lon-  
ga est.

Malus item species quorundam procer, & cre-  
do ex vltis: folia cuius rotunda, lacinia dilata vicia-  
tia, per circumferentiam crispis sine: folioli mi-  
nuta, alba, radix lauis magis.

Arboreciora verò & quorundam Malus est, ad  
VII. aut X. cubitos affurgens caule, aut potius  
caudice recto, folia vltima, brachia crassa lacinio,  
qui fissilio in flur arbore in alacris suis, folia pro-  
ter rotunda, in colla hinc, vltima, maiora quàm  
priora sylvestris Malus: illis ab incisa purpureo  
rubent, medio magis, à quo & sine quorundam magis  
albiditate, radice hinc autem lacinia vltima, sed fibris.

Sylvestris Malus prior incutit locum, folia  
tamen fortitudo, non flent, vltima vltis, hinc ramos  
seperentia, apocum margines, locis rorantibus  
humidibus.

Proxima non rard in rudicibus, ac vltis pen-  
de in vltis ac neglectis locis reperitur.

Reliquatidius non memini me alio, quàm in hortis, loco videre. 3. 4.  
 Malus agrestis à hunc mensis in viciam affertur flores profertur, inserta & seminat  
 gans ad maturitatem pervenit.  
 Sylvestris Malus Græcis *ἄγρια μήλον* dicitur à Dioscorido verò *ἄγρια μήλον* à non  
 gallsiderem, quasi dolorem in partibus *αἰμα* & *ἰσχυρῶς*. Officina Germani Pappus Ita  
 licus *Malus sylvestris* magis: Galici & Hispani *Malus*: Galli *Malus*: Angli *Malus*: Ita  
 licus *Malus*.

Finis alterum speciem plerique Malusam Penicillam nominant. Belgæ deper *Malusam* 2.  
 Galli perier *Malusam*.

Tertiam Crispam cognominant. 3.

Quarta à Theophrasto *ἄγρια μήλον* vocatur, hoc est, arborefcens Malus. 4.

Moderatam autem & rapidam quandam calorem cum humiditate sylvestris Malus ob  
 suat succo crasso visus ac glutinosus est. Sarcæ autem hæc profertenda est, ut apud Athe  
 nasium Diophas Siphitis recte sonat, qui aperte appellat Malusam meliorem esse hæterid  
 ætate tameti Dioscorides hortenfam profertur, quo nec e nec Galeno accendendi: Nam  
 Siphistrasand dubid est aptior, ac finitior est. Inter cetera autem hæc non postremo est  
 loco: Commendatur ab Heliodo:

*Nunc hæc invenies alio hunc viciis,  
 hæc hæc in ἄγρια μήλον ἄγρια μήλον ἄγρια μήλον. id est,  
 Siphitis, neque finit, quanto plus dicitur hæc sonat,  
 Nunc quales magis in Malus & Siphitis sonant.*

In hæc sententiam & Horatius Epodon Ode secunda scribit:

— & ipsam Malus salubris corpori.

Namque autem Malus, ut Galenus ait, modico calore succum verò ingenerat crassiorum cal  
 idem reddat in bacam, ac datur emolliæ. Sicchè autem descendit, *ἄγρια* solum quòd hu mida,  
 sed & que glutinosa.

Folia Malus ad hæc sunt omnes aculeati in suis corporum, vel perier, apum, & in suis mel  
 licia sunt si impetantur: hæc verò tritatum oleo plus perierit, etiam (ut Dioscorides ait)  
 non feruntur. Achæos, finitæ, amensid in eate asperitæ cum veteris oleo (Dioscorides Diosc. in  
 exemplaria quorundam perieram *ἄγρια* habent) in postea sonant. Erysiphilæ & ambusta ambusta  
 vilitur quoque ad habentur. Intestinarum rationes ac dolores, solentem, cum & finitæ, &  
 indicum deochoam per dylitæm in dylitæm sedat: vici verò datur in infusa melle, quod &  
 ipsa Malus in cibo assumptæ fieri. Datur & succus purpureus visus, ut partem faciliore reddat,  
 aut ex vino decoctum. In finitæ, velicam, remes, in finitæ, thorsæm, & palmonem in ut.

*De Albea. Cap. xxxix.*

**MALVÆ** & quorundam agrestis species Althea est sed alba mollis & laniosa: folia 2.  
 similiter lata sunt, non nisi acuminata, ambitu modice firmata: caulis rotundus erectus,  
 horten frequenter cubitorum, vel altiorum. Flores in sylvestris prorsus Malus, non tamen ru  
 bentes, verum candidi, aut ex albedo diluti admodum purpurei: tamen seminum visibus  
 qualis & illas. radice crassa, lenis, intus alba, & viscido lentosque succo prædita.

Fingibus ac humeribus gaudet: nigra serotina & lenis dicitur tamen in ut ad prætorum  
 magis asidit.

Flores horten Augusto mensibus vigent: radice vici singulis annis primo Vere regenera  
 tur, que & vel tunc, vel Novembris mensis colligi potest.

*Althea* & *Althea*, aut *Althea* Græcis appellatur: a nonnullis *Althea* dicitur: Latini *Althea*  
 & *Althea* nominata ferunt. Officina Brisnæ cum ac *Malva* dicitur, quasi *Malva* horten di  
 citur: Germani *Althea*: Belgæ *Althea*: tamen *Althea* Italis ac Hispani *Althea*: Gal  
 li *Althea*: Angli *Althea*.

*Althea* verò & peregrina que dicitur species, apud Belgas tantum modo hortenfa, occidit, 2.  
 in albedo hæc vici dicitur, minus quam prior in eadem. caulis rotundus, rotunda: folia mol  
 lius, in eorum parte albidiora: quinque foliorum folia, minor quam *Althea*, diluti in rubro  
 purpurei, aut ex albedo purpurei, summe, ut reliqua *Malva*, modice fructus horten  
 quam plantam, sed tuberosa, rotunda serotina globosa, quinque angulata tamen specie: radice  
 qualis *Althea*.

Nonnulli hæc *Sida* esse volunt, sed *Sida* aquaribus est serotina, capite quàm *Papaveris*  
 tunc, ut Theophrastus in eadem, qualem non hæc *Althea*. Que autem de *Sida* Theophras  
 tibus. in eadem, seu perierit, in hæc modum se habent:

*Sida* forma *Papaveris* similis est, nam & *Cynodes* capite superius gerit, perierit, tunc, magis magis

Albus, Ibilus.



Albus lactoni: seu perennis.



gignit tantæ amplitudinis quantæ portanti, non cadunt, sed candidæ raris raris mem-  
branis, super quas folia ferit herbacea, numero quaterna, similia Rosarum alabastræ in  
calyce connatis. apertum caput grana rubra ostendit, figura non ut mali parvi, sed officina-  
lata, exigua, nec multò Miliæ mæores: succum aliquatenus aqueosum vehit. Tunc rotas  
mutare debet efflate, pediculo parvo inneditur: Bas Rosæ calyce similia, sed major & dupli-  
cè magnitudine. Hæc utraq; & folium figæ aquas emare affirmant: & mox, ab d. laco-  
ritia, fructum formatum in aqua declinare, deinde rorq; terram attingit.

Nasci autem hæc in lacu Orchomeno Athenæus testem cupit Theophrastum referre. &  
quæ ferunt ibi velsu germina verò fœs cornu dera. Theophrastus in hoc lacu ma insidua-  
re proditum ac, Sidam, Boscomon, & Phleon.

Moderatè autem calida Albus est, sed siccor quàm ceteræ. Malus: succore verò hinc  
radices & semen, ac partium minorum, ut quidem Galenus.

Folia digerendi, laxandi, & dolores mitigandi, & concoquendi vim obtinent. Forores,  
tum & caraplastians ad hæres, calculi, veneni, vesicæq; dolores ac cruciatus vulnè admi-  
serunt in balneo: etiam dolores omnes leniunt. Decoctum eorum idem prestari bitant,  
quod & non modò dolores ex calculo sepi, veneni & ad ipsius facilitatem delectum ac cu-  
tam confert.

Radices & semina ad eadem proficiunt. Jusse verò & dyntericos radices decoctum,  
non quidem adstringende, sed tonicæ tensionisq; mitigando: Non etiam adstringentem  
vllam habent, tamen Galenus aliter sentiat. Adhuc verò & adstringentibus, ut Salena,  
Tormenella, aut similibus radici bus, dyntericam cutam,

Mucago radicum in omni bus colicis, vnguentis, emplastris laxantibus & dolorem sedan-  
tib; vtilissimè admiscetur.

De Sibila. CAP. XXX.

**A**BYTILON caule affixa rotundo, demissulo, tamolo, duos aut tres cubitos alto,  
quemcum fœcula folia concesserunt lata, subrotunda, sed acuminata, glabra, mollia, co-  
nissimè hirsuta, Cucurbitana similia, è longiusculis pediculis dependente. Flores è fibro-  
ram ac rutilorum lineibus exiit: lacer fructus rotundi, nigri, culpi, ex multa parua dore  
coherentes, in quibus & semen nigricans, in ramulostris radii durancos.

Abutlon.



Alcea vulgaris.



Perennans Belgio est, nec sibi quāvis in  
hominoscopaciam olim fuit.

Selet sub form. villosa flore, quod erat  
Matio aut April. locum.

Abutlon nominatur, nec repugnat ei quod  
Autocina cap. xxxix. simile Cucurbita ( sic-  
licet folio) & scribitur & Abutlon ac Arbu-  
tione da. Videtur vero & nonnulli Althra  
huc esse illa, cui Theophrastus lib. ix. De ha-  
libus saporis m. florem tribuit. Alcea, hoc est,  
Melia sine luteo colore. Nam vulgè vocat  
Althra, non lutea, sed alba est. Sed  
potest Theophrastus quæsitur, quod multū  
locū vitiosum, & huiusmodi habet, & hoc  
loco mendo non carere: quoniam non fa-  
cile fuerit hanc Theophrasti Althram affir-  
mare, præsertim cum tantum in lentioris etiam  
Althrae radice Theophrastus tribuisse videat-  
ur, ut aquam condensare queat, si trita hinc  
moueat, quod vulgare Althrae radice om-  
nino potest, Abutlon verò mignis.

Theophr-  
astus lib. ix. De  
haibus.

Abutlon autem Ausonia ac vlti ha-  
berit valentibus necribus, & conglutinat  
ac consolidare ea statim.

De Alcea. CAP. XXXI.

**S**YLVESTRIS quoque Malva species 2.  
Alcea est, caulis huius rotundi, erecti, cor-  
tice consuetusque lenis, & qui in summa  
etiam dulcis quærit, veluti Cannabis: folia  
circa hoc videntur, profunde incisum in quin-  
que particulas distincta, sicut quales sylvestris  
Malva: obversus placentæ vltis & consi-  
ditis, sed in protra, medocis crassitudinis,  
utur alioce.

Hanc verò & alia quædam species minor, 2.  
sola magnitudine differat cætera respiciunt.

Incolæ affant loca, agrorum margines,  
fretosque aquas non habentes.

Vnè cum sylvestribus reliquis Malva miflo-  
rent, ac semen profertur.

Alceam Græci eodem quoque voce Al-  
cia nominant: à nōnullis nostris etiam Her-  
ba Hungarica, & Herba Sincens dicunt:  
Germanis Spinastrut: Italia Malva sil-  
vestris Hispanis Malva montana Belgis Ingi-  
maris mignis: Gallis Caxmalis frutescens.

Dicitur verò de eadem in *malva montana*, vel *malva Cannabæ*  
Cannabis sylvestris, quod videlicet ex corti-  
ce eius, Cannabæ perli mla, funes in respon-  
si queant. Describitur tamen de quodam Can-  
nabis sylvestris à Dioscoride. Sed qui voluit  
diligenter expendere & Alceæ & Cannabæ  
sylvestris ad seipos, mox utramque vni-  
us esse stirpem facile agnoscat.

Cannabis sylvestris, inquit, virgæ habet  
Althrae similis, truncus & nigrescit: folia  
rugosa & asperiora: florem Lychnidæ se-  
mens & radices Althrae. Quæ descriptio ipsi  
Alceæ



*Alcea* vel maxime respondet eule foliis non albescit, sed vixit, atque sic utroque usque quora quoniam *Althææ* illos qui est agrilis *Malsæ* prout, & *Lycimada* factum, & *Sylvestri* *Es* de comparari potest: reliqua *Althææ* similia pertinetur. Quod capere fiat, nisi ve *Camelia* *Sylvestris* & *Alcea* eadem ac *Strep*, & *Dioscori* de his sub dicitur non nobis descripta: potest tunc cura de ipsa *Alcea* ceteris consociatur *Camelia* similia, ve peras scriptum sit, & *Dios* *Conditum* etiam referat.

*Alcea* autem, vel unguento sem leatorem quandam obstat, ita quoque ad *Maltorum* *culicem* accedit, modis, et apparet, inter *Sylvestri* *Malsæ* & *Althæam*. Radices dytiscorum & rupta cum vino aut aqua pota medicantur. *Dioscori* de & *Psillo* *Ægretæ* auctoritas.

De *Alceae* speciebus.

## CAT. XXXII.

*Alcea vesicaria.**Subdaria.*

2. **D**IFFERENTIA hæc præcedente *Alceae* (scilicet) autem ex hoc radice, remota, haud firma, sed facile collabentibus foliis verò alius incursus dicitur, per marginem cernitur, latere, ascendere, ac colore, tum & quoddamtenus forma ad firmam. *Acantem* accedentibus, sed tamen membris autibus flores pulchros, *Maltorum* similes, subulsi, sed medio ac umbellam ventis elegantem colore nigrescit, & quo sunt latera coloris (stamen) eminet: aperitur hitibus aut quatuor horis post *Solis* exitum: hora una aut sesquihora viget. in sequitur post *Stem* sollicitus patens, in quo capitulum rotundo longius, hinc ut, semine (interparas ac nigrescente, radice) medio (scilicet) inapudum filis: emittit.

In *Archeatum* ac *Morsorum* finibus (scilicet) agrorum marginem reperiri ac (scilicet) pugnari ferunt *Italiæ* ac alias provincias haud incognita.

Eodem de nomine se perit ungo.

*Alcea vesicaria* haud peperam dici potest: plerique *Venetum* cognominantibus *Malsæ* *Theophrasti* accepit. Sed *Theophrasti* *Malsæ* à vulgari haud quæquam dicitur est. *Malsæ* pro *Hypococ* deperere videtur, cum quo nihil habet vel similitudinis vel affinitatis. *Hypococ* folium est, (ve ostendimus) *Ricetibus* verò longe ab his diffident.

2. **A**d hanc verò non abs re pertinere exhibetur, *Subdaria* à appellata herba, *Malsæ* quoque generis, caulium hinc teretes, in nonnullis alia dicitur, etiam per se consistere, folium

aliquot

deputat partes diffusas flores spicato ordine digestis, Alcori Veficantia mali, me die videlicet deponit nigricantes.

Alvande carum in hortis Belgicos olim illata fuit. Sed ut ad Aleniam vesiculariam revertamur folium huius leve, lenis hinc prostratum, ad Malicæ temperem hanc accedere, & mollescenti quoque succulentæ esse perspicua, ostendere videntur. Sed tamen cum nihil compertum habeatur, quod affirmandum:

De Mercurialis.

CAP. XXXIII.

Mercurialis mas.

Mercurialis femina.



**M**ERCURIALIS duum est generum: Mas & femina. Vtriusque caulis teretes, laeves, & inter nodos aliquot periculis dodecimo aliove, si bunde cubitalis, in ramulos distributifolia circa hos complura, lata, oblonga, acuminata, ad Paracetamq; accedentia, sed tamen laevia, virentiora, ac per margines ferre modo incisa, Ocyra folia lais similia, radices si bifurcantes.

Malicæ est sicut foliofum in brachiis ac tenuibus pediculis hinc coherentes prodeunt feminæ, ad Apuripes & ferrea & asperitate accedentia, compressiora tamen, in quorum singulis vicium licet non parum ac rotundum.

Feminae velus eo par spæq; in quibus moentium muscoli tenues coherant foliis, absq; a foliis, nullisq; succulentis si mane perantur.

Reperitur Mercurialis in hortis ceteris, in vineis, aliisque locis humidioribus ac vallis, & in horticum arborumq; stipemta.

Tota effere vtriusque viget, hinc planta parte intercalit.

Grecos *μαρτυριαν* & *μαρτυριαν*, quod *μαρτυριαν* vnde: vide Latinus Mercurialis: à Theophrasto *μαρτυριαν* Est tamen & alius Panthenium, & apud Dioscoridem quædam aliud Phyllophora *μαρτυριαν* sicut Bengalliarum *μαρτυριαν* Mercurialis: Hispanis ac Galia *Mercurialis*: Belgis *Mercurialis* & Cambrigiæ Angliæ *Mercurialis*.

Mas Theophrasto *μαρτυριαν* femina verò *μαρτυριαν* appellatur.

Hispanis *Mercurialis* interentem esse testat: idò, inquit, apud Grecos *μαρτυριαν* vnde vocatur, & apud nos omnes Mercurialis.

At Mer-

Cynocranis, Mercurialis sylvatica.



Impatiens herba.



At Mercurialis calida quidem & sicca in-  
petratur, neutra tamen potius gradum ex-  
cedit adstringentem vero praeterca oleosa, &  
[vt Galeoni] digerit cryticam etiam facultatem.

Vitis eius in cunctis hinc arbori frequens,  
in quibus ad excrescentiam in abstrusis in  
interfluis haerentibus facilem expurgationem  
abstrictionemque non exigui potest. Facientem  
ad alia drachmas in oleo aut alibi stupra,  
non modò excrescentia, sed subinde pituita  
ac biliosa expurgant. Dioscorides in maxima-  
for huiusmodi huius decocto duci posse miri.

Mirum, ut etiam Plinius, quod de vinea  
proditur, ut maris gignatur masculam hinc  
se, ut feminam feminam.

De Mercuriali sylvatica, seu Cynocranis.

CAP. XXXIII.

**S**YLVATICIS Mercurialis dicitur sine  
Stefere, sed humilior tamen: cuiuslibet cas  
venelle dodonaealis sunt: folia quam altera  
maiora: femina ut latus mascula Mercurialis  
radix fibrosa, candida, laet filitina prope-  
dum ferpit. Tota herba vniù odore agru-  
rum odoleat.

In sylvis, ac alioquin in vrbibus gignit.  
Vniù, vgetis eodem, quosdam Mercuria-  
lia, aut scriptore.

Græca nova & maxime Galienus: Latine Car-  
na, & Brassica Canina, & passim Mercurialis  
sylvatica.

Est tamen & alia maxime Galienus, que & Im-  
patiens: de quo lib. 121. Percept. terrar. Germanis  
Waidt benigissimum: Francophis: Italia Mercurialis  
sylvatica: Belgis Waidt Mercurialis Galia: Ita-  
licis sylvatica.

Facilitate autem hinc Cynocranis, seu  
sylvatica Mercurialis altera respondit sylvatica  
quidem cum cauliculis olivari moxar, &  
inter alia recipi queunt, & decocta herba in  
pituita, oleo, & aqua demat, vt Dio-  
scorides scribit.

De Impatiens herba. CAP. XXXIV.

**A**D Mercurialis formam ac effigiem  
vnde quoque Impatiens cuiuslibet hinc  
affertur: ubi, glabra segetis umbrosis  
et montibus, in alio ac montibus dicitur. Folia latè  
acuminata veluta Mercurialis, sed tamen ve-  
nitiosa, ac diluvis venientia. Bobalis & siliquis  
pediculis tamen dependit: latis, autem latis  
in corniculatum sentis politis dicitur  
siccitate siliquis veretes, parus. Chalcidion  
maiora perimiles, que vel huiusmodi  
dicitur: hinc manum ferunt, in (p)rascon-  
hantur: radice tunc hinc fibris coheret.

In Germania, Bohemia, Gallia (p)stis,  
tum & alibi reperitur: adolefcentia, ac tunc  
facile in hinc: locis gaudet hinc dicitur  
brodia, hinc apud.

Flor. et fructu annua est herba, hyemalis non fulvares, fructu tamen sicut singula facile ag-  
nostrantur, nisi peris, quam scilicet matorocra, fuerit cuncta.

Germani *Spinghiam* Belgæ *Campden* et maritimi *uier* vulgò *Noll* me rigore, quòd vide-  
retur leuissimum manus concitatum siquæ hand admittant. *Qua de causâ* Inopertens de-  
cipit, et pote que non patitur siliqua maritimo ferunt ætong. *Plerumq. lib. xxvii. cap.*  
*xxv.* *Altkanor* quæ herbam normiam sic appellatam, quorū non appropinquante manu fo-  
licemurabat. Quod si mutare lothionem *Pary* integrum foret, & pto d'athone *Folia*, *Sil-*  
*que* recipere, *Inspanis* hæc *Altkanor* esse, nam appropinquantes digitis, siliquas  
non, videremus, contrahat.

Cæcilia facilius hæc herba ferat pemiciosa, ac inter desertas habenda.

*De Phyllo Diofcoridi.*

*Phyllon Theriacaum.*



**CAP. XXXVI.**

**D**VORVM generum Phyllon est: mai,  
& femina, veluti *Mercurialis*.

*Affertur* vtrumq. Phyllon tribus, quæ totæ  
aut plures in tota planta caute ubi, dicitur tal-  
bitur: cuius singulari veluti gemacala hinc op-  
posita exiit sola obliqua, *Oliva* folia latera,  
multo quàm *Mercurialis* angustiora. *re-*  
*dit* deinde vicia, nò absq. adnatis fibris.  
Mâi femina gemata, veluti *Mercurialis*  
mascula: femina verò ipse matrice ac ster-  
iles, veluti femina. *Herba* verò ipsius &  
caulis & folia, petquam vicia ac angus  
molliq. lan vigne in balais.

Nec passim, ac vbiq. obitum Phyllon:  
in *Narbonensi* *Gallia* ac in *Hispania* reper-  
tum acceptum: in *Hispania* *Dioscorides* nas-  
ci tradit.

*Affertis* in silico & vige & totis Phyllis.

*Dioscorides* *phyllo* appellat, & *Theriacal-*  
*is*, ad differtiam fortasse *Mercurialis*, quæ  
& *phyllo* à *Theophrasto* vocatur: *Dioscorides*  
etiam *Theophrastus* *phyllo* solo *Quam*:  
quod hæde quædam de isto Phyllo, sed de  
*Mercurialis* viciaem habet. *Masculam* au-  
tem Phyllis *Dioscorides* *phyllo*, feminaem  
verò *phyllo* nominat, ut cum videlicet vo-  
cabas, quibus *phyllo* sui genera *Theophras-*  
*tus* distinguit.

Facilius autem *Dioscorides* hæc Phyl-  
lo omnino cum tribus, quam alter Phyllo

hæc *Mercurialis* etiam *Theophrastus*: *Arbogonon* videlicet masculi sexus partem efficit,  
feminaem verò feminæ adferre, *Cuscuta* *Conserua* esse auctores referre.

*De Portulaca.*

**CAP. XXXVII.**

**P**ORTULACÆ dicitur *Maor* ac *facinus* vna altera minor *lythelris*.

*Mores* castici non raro *dioscorides*, ac *re*, *graffi*, *lythelris*, *succos*, *leues*, *respon-*  
*dent*, an alia quidam describuntur. *Folia* vnicuius longitudo, hinc fusa, crassa, pinguis,  
glabra, viridia, à temp. albodora: *Stipula* minuta, *gallia* & *lutea* ad ante cum *foliolis* *gigant-*  
*is*, *faciente* *conspicuo* exiguæ *herbae* ac *virentis* *colera*, *in* *har* *ferè* *di* *medi* *grati*  
*herbae*, in quo *semen* *pusillum* *magnum*. *radix* *fibris* *habet*.

*Altera* minor castici *alibi* *in* *his* *rubentibus*, sed *in* *caulis* *per* *hormam* *sternitur*: *folia*  
*prima* *forma*, *colore*, *leuore*, *crassi* *radice*, *q.* *respondent*, sed *in* *no* *ra* *malis*.

In *hormæ* *corum* *arrit* *subactis* ac *stercoratis* *commodè* *prior* *ferunt*: *folium* *desiderat* *q.*  
*nam* *pingue*, *non* *aridum*.

*Altera* in *fermis* *hormarum* ac *vinearum*, ac *quandoque* *in* *petrosis* *sponte* *gignitur*. *signa*  
& *hæc* *arrit* *loca*. *semet* *facit*, si ad *fermis* *manu* *reliquata* *q.* *facile* *arma* *aliquot* *post*  
*temporibus* *renascitur*.

Portulacaria.



Portulaca fylacina.



Seri potest Martio aut April, laeso vero ac deinde in Autumnum usque vegetare.

Græci *Ανθ' αγγι' νεομανη* Latini Portulacam: Est tamen *αδελφει* quædam arborescens, quæ vniuersitate dicitur: Latini Portulaca dicunt: Germani *Portulaca*: Galli *de Paspier*, aut *Pasroliane* vocant: Belgæ *Portulique*: Itali *Portulaca*, *Portulaca*: Hispani *Portulaca*, *Portulaca*: Angli *Portulaca*.

3. Perier hæc verò duas eisdem generis, & aliam quædam Portulacam, & quædam fylacina, à Græcis quoque *αδελφει* dicitur nuncupatam, venere cretensium, quæ alio nomine *Πελεκη* à Latinis appellata est. Continetur autem hæc quandoque cum marone, hæc fylacina Portulaca modo de scripta. Neque ab hoc errore plerumque Dioscoridis exemplum libentiam. Nam quod in Portulaca fylacina de scripto est, Caudiculis maronibus bonâ faciem patere, viscositas & aliquantulum saliositas affirmatur, ad maronem fylacina viscositas est: Quod verò sequitur vis et carafaltona, acris exulcerans &c. non habet, sed Hæchy factum est, de qua nos cap. x. lib. v. Pempædis prima.

4. Item & *Πεπυ*, ab Hippocrate *Πεπυ* son, à nomine quoque *Πεπυ* fylacina appellatur, Dioscoride teste: Quod nomen idcirco ad Portulacam etiam Plinius hâc respicit, sed minus rectè transfertur.

3. Recentioritas & quædam sepe nobis marium dicitur Portulacam asserunt: quæ cum fruticosa sit, libro secundo *Πεπυ* dicitur frax sequenda.

Ac Portulaca frigida est, ac sermo quædam arbor, hæmide verò feruida, fylacina verò maris hæmida. Salilaginem quædam consuetudinem habet, quæ in *αδελφει* capite apparet.

Cruda non raro in acetariis colam: sola editur cum oleo, sale & aceto. *Αδελφει* verò venenatum sedat: appetentiam excitat: vltimè enim autem ab hac corpori exitum, viscosum, frigidum, crassum, huiusmodi accedit. Comæ ad uicem dentium suppositæ talis idem potest & succus in ore detentus, & aqua per cogitâ extracta. Quæ & dolores ventris parci commendatur, & valde visca est, presertim si lectus addit. Nam & marium calorem commouet, & vermes incitat: Quod quidem salilagine permixta efficit, quæ & veribus & putredinibus ascribitur.

STIRPIVM HISTORIAE  
PEMPTADIS QVINTÆ

431

LIBER SECYNDVS,

DE CVCYMERARIIS ET ALIQVOT  
ALIIIS HERRACIIS FRVCTIVS.

PRÆFATIO.

**M**ULTI sunt edulis fructus arborum & fruticum, herbarum uero & maruili; & præter frumenta quædam & legumines, illæ quædam & fructus sunt frequentius uentis arboribus, id est, serena, quædam exortu, sunt fructus nomenclaturæ. Quæ autem exortu sine fructu dicuntur, herbarum hanc multas sunt, & exceptis paucis, non alij quædam ad Cucumerum naturam accedentes, atque hæc Cucumerum naturam appetentes, quæ cum paucis aliis, hæc libro præsequi præsentem est instituit.

DE VVLGO DICTIS CVCYMERIBVS.

CAPVT I.

Cucumis vulgaris.

Cucumis oblongus.



**L**ONGITVS, firmioribus, ramosis, & asperis caulis Cucumeres isti per terram hircidicæ impare circa quos folia argulosa, ampla, aspera, ambitu firmata, & subinde clausula quedam, è suo foliorum stoculis erumpunt ditæ sunt: dense fructus crassi, semipodem longi, quandoque sed raro deducuntur, angulosi, tuberculis quibusdam exasperati, per maturitatem lutei, in quibus transperens foliolæ medulla, quæ uia cum seminibus editur, paucis creptam ad integrum maturitatem perueniunt. Serena autem oblonga & plana subducuntur.

Serena in horto Cucumis: propria & apica amat loca.

*Julis & Augusto* quædam fructus edules, sed Septembri dixerunt ad perfectum maturitatem perveniant.

Præter Cucumem, de quo Officinarum Cucumer appellatur, æque eo habetur qui Germanice *Kümel*, id est, Cucumis sativus dicitur.

*Malopepon  
saltem*

Galeno autem non Cucumis aut *Malopepon*, sed *Malocitron* est. Nullus enim fructus Cucumerum modis illis sine caro incenter edatur, sed omnis abscindatur, exceptis illius carne, que cum membris, ut dicitur, est. Quod de Malopeponibus sicut Galenus scribit lib. 2. De alimentorum facultatibus. Horum, inquit, à carne totius Deposum abluunt: Malopeponem autem mandant.

Germani *Cucumer*: Itali *Insiberca*, *Cucumera*: Hispani *Cepambre*: Galli *Cucumete*: Belgæ *Cucumem* vocant: Bohemi *Wolfaß*. In Hispania, inquit Martialis, *Cuculas* appellant, à Cuius latere colore, qui in maturato fructu evidens est. Sane verè & qui Augustus dicitur, sed omnino abscindatur *Anguria*.

*Cucumis  
longus.*

Sunt verò huius generis & oblongi quidam Cucumeres, quos ars & cultura præcipue (re forme) produunt, natura demum corriguntur. Primum enim fructus rudimentum in siliulam tribuitur, impositæque oblongum sicut Cucumis, cuius ita sequitur angustior implens, in longitudinem nec minus caput de hanc formam Cucumerum si non siliam, non quæ autem erant, sed quales culture in angustiam generat, profert, qui cum super dicta, longi quidam, sed d' crebro recurrit repetuntur quos & Augustus inde vocat.

Omnium autem Cucumerum frigida ac humida esse sicculo temperis est: horum autem minus quam reliquorum humida, æque idcirco quando edantur, maxime in ventriculo committuntur: facta ut rō etiam minus parum sunt. Alimento verò corpora cadent frigida quidem nec non humida, ac omnino calidam, & facit hanc probè.

Et quod debet vendit, non dicitur, matum siquid est Cucumis facti, et sic hanc siliam dicit. Semen frigidum quidem, sed in aliis minus quam fructus, aperendi ut aqua exurgenda præcipue obinet: vnaque motu incisionis obstructions aperiri potest ac præcipue incisionem laborantibus pedibus contrahit formosus abluunt loco adhibent, cum splendens reddat.

*De Malopepon sive Malopeponibus. CAP. II.*

*Malopepon Malopeponis vulgaris, Cucumis Gallicus.*

*Cucumis siliatus.*



**Q**UÆM recentior ætas Melonem truncapic. caulibus hauri procumbentibus, longis, firmis, tomentosis, atque asperis, vulgari Cucumem similes. Folia lata respondent, minora tamen, rotundiora, minusque angulosa: Infusculis similiter: latus fructus crassiores, immo nonnulli pilosissimi, modo oblongam, alibi contractiorem rotundam æquoriam obtinere: subinde verò & quædam, quandoque immotes rependantur. cortices horum et plantarum exterius vases, subditi pulpaque carosque eduntur, et lacte largiuscunt, medulla lactea, musculaginosâ, humida, desunt, quæ fœmâ veluti superflua Cucumeris.

Seritur loco calido, ruralis usus: Sali vel maxime expolitus, terram verò mediocrem, non minus pinguem aut stercoream.

In Germaniâ ac Belgio non nisi serò, ac cum ætas calens ac sicca fuerit, ad maturitatem perveniunt.

Velgò Melones appellant: Itali *Melone* Hispani *Melón* Galli *Melone*: Germani ac Bohemi *Melonen*: Belgæ *Melonen*, *aliter* autem Græcioponiâ significat. Proinde rectius, *antiquè* hic Cucumeris appellandas, Peponi videlicet Mali odorem referens. Nam latus fructus odoriferi malis odore superiusserò vicini sunt, subinde verò & obscure molli hunc redolent, quæ scitè & Mocharellam cognominantur. Galenus non aliam, sed sapere capere desinpram Melopeponem fuit, hanc verò pepo Cucumeri habuisse videtur, quæ Græcis *ελεος*, Latine *Sicaria* Cucumeris dicitur.

Italia usque vel etiam superioribus hinc sine genere sit, quam *elios dycos*, & *syntibrem* Cucumeris vocat, de qua *Pempt. tertie lib. 1. cap. 26.*

Frigida porrò quoque ac humidâ Melonem caro esse difficilior quam reliquorum Cucumerorum concoquitur: in venenis loatem si diutius hæreat, consumitur, & maligna febribus occasione præbet. Quod & Aërius testatur *Termb. primo lib. 1. febres malignas inducere etiam Cucumerum fructus, est squalem & hinc Cucumeris, qui vulgò Melon. Seritur verò hauri idem quod aliteris ac superiorem Cucumeris potest.*

De Anguria. CAP. III.

Anguria Cucumeris Cistidis.

Cucumeris Cistidis alba lora.



**A**NGURIA firmamentosa, viticulosa, aspera, ac hauri repensibus caulis, tum & clavata superiores Cucumeris refert, folia autem minora sunt, & profunda vitiâque rotundiora.



Colocynth



Cucumis  
Cucurbita

Colocyn-  
this

Pepinaceae oblongae



et sunt dactyla: flos aureus et ovis fructus globus, flos colore superius virens, inferius, qualem accit, utaliscit, quorum amorem sine lacte, interio careo medicolor dura, Pepinam quam Melonem similit: medulla fungosa, in qua flos oblongum, platum, minus quam Cucumerum, aut Melonem, minus quam Pepinam, et exterior cortex corrus agricus aut tuberosus ac durus est. Non facile virent istas Cucumeras, sed dactylis copiositate vel ut vulgari Cucumeris aut Melonibus, quibus decipit flos contripantur: sed dactylis offerant quod, praefatum Triplex accit, ut Masticholas ac, ampelias.

In calidis regionibus, et, Apulia, Calabria, Sicilia, ac similibus facili prouocant: In Germania raro ferunt, parvis vero etiam maturant.

Angoniam recentior aetas appellat: Officinis Cuculus & Cucumis Cuculus dicitur: inter istas una siquidem in gale, Officinis vocatur mator, hanc semen admittitur nomine Cucinis Cuculi. Si autem Cucumis Cuculus Cuculato Cuculato colore nomen habet, vulgari Cucumis proprie Cucumis Cuculus est.

Syluestre autem hanc genus est Colocynthis flos Colocynthidis dicitur, de qua cap. 17. lib. 1. Pempt. 3.

Cereus Angulic caro, que coris fibell, cruda, sed sicque citras cocta comeditur: aliter autem conficitur enigma, id est siquidem ac hanc dum, siquidem que ingerat aquas, qui intermaris partem in hanc matoris matgat, & hanc ac matoris ac feruorem contripant. Cruda in ore contripantur in hanc matoris asperitatem lenit, & siquidem sedat.

Semen facillime Cucumerum simile est.

De Pepin. CAP. IIII.

**PEPINACEAE** aliaque reperitur species vel magnitudine vel forma differentes.

Mator Pepin crassus, asperus, flosus, adules oblongus caules propter prologos, qui clausculis caprotibus vicis contriprobentes, pericas, flosus, ac siquidem contripiant, que nisi vana pelis fuerit, hanc repere: flosus ampla sunt, valde aspera, alioque periculis matoris duris, marginibus firmit. flosus alioque magni hanc, calathus forma, aut colos hanc, periculis quinque prominens: angulis dactylis, fructus magni, crassi, rotundi, oblongi, crassibus flosus vel ut siquidem, quorum pelis coris flosus accit candela medicoloris dura est, minus medulla fungosa: flosus magnam, inam, platum, tuberosum, minus quam Cucumer mator, forma alioque hanc different. coloris tunc quandoque obicere virent, alioque matoris aureus autem Pepin cortex durus est, ac virent lignosus, alioque vero matoris ac virent.

Alterum Pepinaceae genus dactylis ac flosus, virent aspera, cum & clausculis prologo simile est.

Pepo struthias minor.



Pepo struthias major.

Pepo latus.



est, sed foliorum fissura minus profunde, caele uq; teneriores. floris similiter: luto, parentis, & acrius angulos veluti priores. fructus autem globosi, rotundiores, modò maiores, fronsque minus, & quandoque virentes, danteque cortice subinde parte molliore ac ut bilitate, caro quibus subest: veluti priores femina quoque crasse forme, sed aliquantò minor.

Huius generis & tertius est Pepo, aspera caulis, foliisque fissis ac firmis priorem referens: hoc magnus quoque ac laevis veluti abomin: fructus medix magnitudinis, cultus conseru, tuberositas nullam exasperatur veluti mali Cingetis, qui per maturitatem similiter laevis est, proinde & Cassia in aliam eam colore, non asperitate referens.

Quartum generis Pepo, forme ab aliis plurimum differt: cautes quidem, folia, floresque aliorum similes sunt; fructus autem haud longus aut globosus, verum connohans, & quodammodo planus, fissis alia prope modum similes, in medio quidem crassior, per connoferens, una verò tenuior, & quibusdam locis villosus crispatur in floris connohans huius mod-

Peponis laccis illustris.



la, sentia, ac candida est, caro interius satis dura ac durabilis: semen quàm Cucumers minus, fibris & colore corruptum.

Omnes Pepones hortensis sunt: litem solum, pinguemque medietate utram passile.

In calidis regionibus citius maturificant: apud Belgas omnes ferociter sunt, & nisi alio calida siccaque fuerit, vix ad perfectiorem perveniunt.

anardi-  
vna.

Græcis *πίπυς*: Latine similiter *Peponis*, *πίπυς* autem omnes fructus perfolii ac majori communi nomine dicuntur: unde Medici quidam, inquit Galenus, fructum hunc *anardi-vna*, id est, Peponem Cucumeralem romanis oportere contendere. *Πιπιλλίσιον*, Cucumera, inquit, cum in aqua saline excisere, Pepones vocantur. Germanis *Wassermelone*. Dicitur: Galli *Pepone*: Belgis *Peponem* vocantur. Minores à nomine Tusci cognominantur: Secunda verò Maris: Tercia Hispanica: Quarta autem Latorem Peponem nomen obtulerunt.

Est autem omni sero Peponum natura frigida cum copiosa humidiore habebantem vix quendam obitergendi, caris beneficio vinum quare, & deorsum expeditum quam Cucumera aut Melopepones permittant, ut Galenus scripsit in reliquis.

Edunt autem cito Peponum haudquaquam cruda, sed cocta. Describit autem sic edendo facilius, aliam facilem & quoda modo in hanc rem reddens. Alimenta autem confert exigua, inque, humidum frigidumque, (vinosum, inquit Galenus) idque possimilium cum probè concocta non fuerit. Quocirca cholerae morbo obnoxiosissime sinit.

Diutius Latorem edunt, & idcirco diutius quam reliqui incorrupti afferri queant eduntur: ut in non modo citra, sed & in pingui aliquo frigid. Delectantur verò & per aliam haud legitime, alimentera verò adferunt quale dicitur.

Semen in magna quàm caro est, etque, vixus promouet, scribitur ex calculo anteflari velle est.

#### De Peponis sylvæstris.

CAP. V.

**V**ELUT Cucumeribus & Anguribus sylvæstris sunt sunt species, ita quoque & Pepones quidam species & tota natura sylvæstris, profertur in caulis aspectu immutabilis: solum asperitas: flores lateos veluti sitos, sed minora singulari fructuacrisis, oblonge, spongiosae, duntaxat cortice ac colore venientes, sed maiores multò, quorum palpi & minor medulla vix curit femine, veluti fusciorum, sed admodum amara, semen quoque paulò minus.

Alcubi locis rusticis spontè huiusmodi Pepones gignit habio procul est: Verum in Germania ac Belgis non nisi sint profertur.

Tamen si Venetis horum non meminerint, nec ipsa tamen ostendit *πίπυς* & *πέπων*, & Peponis sylvæstris hoc dici oportere.

Sylvæstris autem Pepones vix tota sua natura valde amari, ita quoque temperantem calidam licetque, & Secunda quidem ordine uteris: expurgandi quoque non duntaxat, quoniam

Pepo Syriacus.



Cucurbita pepo.



quàm sylvestris Cucumerem, obtinent.  
 Viridis quod calyci, excisus cum firmate  
 modica, aspidium, sate ipse incoherens, do-  
 nec amaritudinem plene contraxerit, per al-  
 um purget, ac pinguissimis hinc hinc coactis  
 humoribus. In summa liliis locum idem quod  
 Cucurbitis apothem praeparatificatus verò, Ela-  
 torij loco succedent potest.

De Cucurbita. CAP. VI.

**CUCURBITA** oblonga, vinctulosa, &  
 angulosis caulis in aliam nullam distin-  
 ctionem profert, qui ad matam stipula vicia propeq;  
 assilientia adhaerentia comprehendentes, tan-  
 tum scandunt, & in altum colluntur: folia ad-  
 mictum magna, lata, & normalia acuminata,  
 Reticulata sunt magnitudine firmata, sed mollia,  
 albâq; veluti tomento vix cum caulis ac fi-  
 borum pedicula caridicantia, insitit Alchape.  
 Flores solorum è sinu albidis exant: fructus  
 subsequantur non vitis formae: quâdoque  
 enim lagenarum formam quasi capientes, in  
 ventris inaequali surgunt, supereminente col-  
 lo, quod, qua parte ventri adheret, frequenter  
 angustatur: subside verò & ventricosa ac cras-  
 sa, sed absque collo, & in fenore sede suorum, py-  
 ramidatam figuram quodammodo referunt:  
 alibi verò in longioris hanc productam. Crassis,  
 inquit Plinius lib. x: x. cap. v. Cucurbita qua  
 cognitur forma, plerumque & in cornu draconis  
 figura. Libertate pendit obesa vitâ est novem  
 pedum longioribus. Omnes autem cortex  
 permixtum roritur durus, ligneus, ac flava coloris  
 caro autem hinc pulpa interior candida firmata  
 oblonga, plana, compressa, a nitore parte acu-  
 minata, postiore lata, duobus semilibris in-  
 gulis quasi cornata, cortex quorum durus &  
 candidus, medulla firmiter albidâ ac dulcis.

Cucurbitae in hortis coluntur & ferebantur.

Sub Aestatis atque ad maturandam de-  
 mum perueniunt: in calidâ tamen temperata  
 curis, maxime praecox: Parococi autem Cu-  
 curbitae, tam & Cucumeres sic redduntur, vt  
 Quantitas eadem. In copiosas sacrificia an-  
 tibus in herbis munda sereno admixto  
 liquor facta: & anticipato confecto tempo-  
 re, Venere delictis inchoant, firmata implandâ,  
 & cum Sol fuerit & calor & moderata plu-  
 via, copiosius sub die expones, circaque Solis  
 occasum in dorsum coniectam inferunt: neque  
 hoc assidue faciendum, aqua leuata quando  
 vites postulant: postquam verò perfecti in C  
 sâbitur fingas & glaucas, copias sine dolo in  
 locum subactum & exortum detrahendi, ita  
 velata equalia sint reme, deinde reliqua cura  
 adhibenda: sic ille.

Generis Cucurbitae, & Cucurbitae *isidropis*:  
 item Cucurbitae *longae* dicitur: Latine Cucur-  
 bita, Cucurbita edulis, Cucurbita ligaria à nota  
 allia

Cucurbita latior.



Cucurbita longior.



nullo modo solvens per vltima syllaba: ab alijs *melone*: à Plinio Cucurbita Cocinea, quòd camera, tellurines, pergulas, copiam as hortorum &c nos fiandis ac operis. Haec vera & altera, quae nulla prope ali fecerit fuita lauto cept, Plebeia cepti ornatur. Itala sunt Cucurbita aetere dicitur: Hispania *Colebo*: Gallia *Cange*: Germania *Kuffa*: Belgia *ta* vocant: Bohemia *Ziftra*.

Cucurbita autem caro sine interio pulpa frigida ac humida temperamento est, visque qualitate secundi ordinis. Succus ad aurum cum phlegmate dolores, addito rosaceo, mialis prodest: tum oses etiam omnes calidos pulpa an posita in frigit, capitis dolores puerorum & oculatorum inflammationes hoc modo sedat. Si infans dormiens pari longitudine Cucurbita vel etiam Cucurbita in leibulo adungatur, & febretur aut ne, mox à febre liber est.

Edunt verò & haec pulpa cocta, sed quia succum habet aquosum ac tenuem, cuiquam rationem praebet alimentum, atque frigidum ac humidum facile cum in subdilem praecipit, qua de propter substantia sine lubricitate, tum & humiditate, aliam creant.

Alia autem vel frisa in lactagone, quam plurimum de propria humiditate deponit, atque sicuro minus facile dekerdit, nec aliam adeò cito emollit.

Semen vix acrimiosam contentem perat, & eandem modociter prosoat.

*De Cucurbita sylvestri.* CAP. VII.

**S**YLVESTRIS vocem Cucurbita & quaedam parva superius est: haec autem vltimo in casibus, capiculis, ac folijs molliibus, ac veluti lanuginosis firmam amulatur, omnibus ac singulis modo monobilis. frandit verò de haec forma, vtroracula, ac vltimè hinc tenes: fructus Cucurbita vtroraculac legentis vtroraculac forma quidem finis, sed magnitudine longè infertior, omnino videlicet parvulus, nec vulgari pyræ minor, visque qui de mora concodi ac comprahendi quæst. cortex huius exterior muto viret, pulpa densa fassilignæ quoque colore affatur. interio medulla humida & admodum succulenta est, in qua semen luet. amara item haec est, veluti sylvestrium Peponum.

In calidis reprobis spontè ab cuba gignitur, sed in Germania ac Belgia non nisi sumptur, vbi de tardè ac modè proficitur.

Cucurbita sylvatica.



Græcis *αγγούρι* dicitur Latine Cucurbita sylvatica. Plineus lib. xx. cap. iii. Cucurbitam sylvaticam Græcis *αγγούρι* dicitur astringit, quæ insipida est, digitali crassitudine, non nisi in facie mellea, ceteris commendatissime fœtus stomacho admodum prodest: Sed huiusmodi hæc Cucurbita sylvatica non est, quæ crassitudine digitum excedit, nec inanis, sed fœtus plena, ac stomachum nimis astringere offendit.

Sunt verò & quibus legitima hæc Calocynthia videtur, sed à venenose aberrantibus: Nam *αγγούρι* dicitur Aopara sylvatica est, cuius & tenuis cortex facile adimitur, & pulpa interior sanguosa repleatur, de qua Pempt. tenor lib. xviij. cap. xvij. Huius autem Cucurbitæ sylvaticæ duritia ac liguiditas pariter, medicinali verò acedè laetitia, et refoctio sic nos, aut æque ad modum paratur.

Contentis facultate hæc Cucurbita calida & sicca est, nec minus quam Calocynthia, aut Pepones sylvaticæ, venenose videlicet qualitate ordine secundo: Est verò & insigniter amara, quamvis locum & obstruētes moris expurgatæ aperit: purgandi quoque vim per interiorum ventrem æque ac sylvaticæ Pepones obtinet.

Vinum etiam quod in erucasum hæc Cucurbitulam nocte tota permansione, valenter quoque purgat, & biliosas ac pituitosas humores educit.

Charantia.



De Charantia. CAP. VIII.

**C**HARANTIA tenibus aliquot ac gracilibus vinculis caulecula vicia quoque confecta, ac capitulo sine, et alarum sine pedunculibus, apprehendit: folia non magna, lata, glabra, ac mollia, in quinque partes divisa, quarum singule ambuæ cucurbitose: Baccula ex quinque foliis medicinali latitudine ex altitudine hinc unius digiti sunt: fructus oblongi, aliquando unguis humani, cuius sine forma, sed minores, veluti spinulos aut aculeos in octidibus exasperati, qui per maturitatem forte intrinseque rubent, spongiæ sicut videntur, in quibus semen latere, plantam, sive veluti Anguria, febriugicant ubi marcescit.

Non nisi India provenit: Mellus ac facilius in India calidiorque regionibus proficit, quàm in Germania vitæque, ubi raro & tardè fructus maturat.

Europæ Sardinia Monochæam appellat: alij Vicellam, Balsaminam, Charantiam: India est *Charantia*: Germania *Beljan* officij Gallis *Morose*, Latine *Pontum mirabile*: nonnullis *Pomum Hierosolymitanum*: Belgis *Battum* appellat. Balsaminæ nomen inde accipisse existimatur, quòd oleum in quo matrem pomum maceratum ad multas vias, veluti *Opobalsamum*, habetur: Est tamè & aliæ Balsaminæ, quæ marcescit.

Obstruere autem fructus huius, tum & folia extimant

exanim vitærandi vim cum moderata quodam fragilitate temperat: modicè proxi-  
 vulnere recentia coagulantur solâ imposita feruntur, cum vino verò affrata colu-  
 tellano tumq; dolore figunt, & ruptis conuallibus vtiliter exhibent.

Oleum in quo fractus, excepto semine, vel in solis oleo, vel in calente aq; balneo chro-  
 dia, vel in furno equino mouetur, vulnere in inflammationem accendit, eadem & facili acerbè  
 vitiæ potest. Doloribus ac vlcibus mammillarum auxiliatur: vitiæ exacerationes ac  
 inflammationes in oleo in cute potest extinguere punctis ac vulneratis necis vitæ adhi-  
 betur: aduerfus eam bullitum em ea aqua oleo vitæ ferente, ferro ignato, vel aqua multa in con-  
 ferre excantus emittunt: rariore quoque aqua vltione lanæ emittunt, si solorum puluis ali-  
 quot diebus in aqua exhibetur. Secces quoque hoc succum reddi affertur, si post bal-  
 nei consumptionem vltim partes eius pubent ac vltimam alio vnguento, ac demum vitæ vltim  
 mûcantur.

## De Balsamico.

Balsamico



## CAP. IX.

**B**ALSAMICA hæc à Clusaria, quæ & Bal-  
 lantina, non parum difficile esse colligere  
 non tenentur vitæ oleo, sed vltim, cal-  
 fæ, ab uno ramofa, glabra, raris, ficulis, vel  
 un Portulaca, infusa nonnihil fere rubens,  
 circa quos folia oblonga, acuminata, Salicæ fi-  
 milia, per marginem vltimæ forma, è quibus  
 flos duo aut tres subroborebus cædentes pedi-  
 culis floccis erunt pôt, artentur à thores ac pite-  
 ces, piteces in vltimæ corni vltimæ, vltimæ  
 in eadem de finere, coloris depone dicit  
 rubens, hæc vltimæ fruítu vltimæ, alpe, ac  
 hæc, sed quibus fupercornis mærona, piteces  
 mærona hæc, qui & fupercornis mærona, flos  
 fupercornis, Lenti bus hæc flos.

Et hæc flos non vltimæ hæc ac piteces  
 Belgio.

Autum tempore quandoque flos mæ-  
 rone: flos vltimæ appert.

Vulgò Balsamicam vltimæ piteces, & quandoq;  
 nouum genere Balsamicam. Genus Balsami-  
 cam amygdaloidem: Cordus mæron Balsami-  
 cam appellat: alij Balsamicam flos, quibus  
 prior mæron: vltimæ hæc Germania vltimæ  
 flos vltimæ / & Balsamicam vltimæ appert.

De hæc vltimæ facultatibus vltimæ affertur  
 dicit: Piteces piteces facultatibus flos vltimæ  
 mæron: ac dicit, sed vltimæ, vltimæ hæc vltimæ  
 à quoquam factum non confert.

## De Fragæ.

## CAP. X.

1. **I**NTER herbaceas fructus Fragæ quoque locum obtinent. Horum herba raris costibus  
 nitens, sed pediculis tenuibus & lanuginosis à radicibus promit, quorum raris folia, alij  
 flosculos profertur: deinde & fibras quodam profertur: ead, quibus flos vltimæ  
 flos vltimæ in vltimæ pediculis vltimæ, oblonga, lina, per circumferentiam flos mærona, flos  
 piteces vltimæ, vltimæ albedora, quorum flos mærona, Janus hæc quibus Piteces vltimæ  
 quatuor aut quin ab vltimæ pediculis erunt albed, quin que flos: flos vltimæ flos flos  
 piteces vltimæ, vltimæ Mærona quodam modo flos, coloris rubens, quandoque, sed  
 raris, candida, quibus vltimæ flos, quorum mærona pulpa mollis, rubens, & albed, in qua  
 flos vltimæ raris dicitur, flos vltimæ, mærona flos vltimæ.

2. Horum verò & alterum genus, quod flos vltimæ pediculis, fibres, flos, flos flos flos vltimæ  
 flos vltimæ dicitur flos vltimæ: si in pediculis ad hæc vltimæ, nec in flos dicitur, & in  
 flos vltimæ, piteces: raris hæc vltimæ, quorum mærona pulpa mollis, rubens, & albed, in qua  
 flos vltimæ raris dicitur, flos vltimæ, mærona flos vltimæ.

In mærona, non verò in consallibus, in flos ac alij flos vltimæ alij quibus hæc vltimæ  
 flos vltimæ piteces: piteces & in hæc. Piteces piteces vltimæ vltimæ, sed vltimæ mæ-  
 ron, nec alij quibus in hæc vltimæ.

Fragaria & Fraga.

Fraga alba.



Vixit toto anno herba: Vero laevis fibris suis exponitur, ac deinde flores facit: latio, vel citius prius fructus maturo fit.

Fragae ipsi fructus Latine Virgilio ac Ovidio dicuntur, hoc aliud nomen vulgo cognovimus Germano Erdbeeren: Belgae Quabeten: Galli Fraigo appellare. Florum Fragularum vocant: Fructus vero Mantes Fragulam Germani Erdbeeren sicut: Barbari Erdbeerenque.

Halicinorum usum non parum, qui fructum hunc Raba licet morum. existimant: nec minus qui Comarum faciunt.

Generum herbae folia ac radices refrigerant, & cum adhaesione resiccant: Fraga vero frigidissima, siccissima.

Tubercum inflammationem solis imposita accendit. Decoctum eorum gingivas roborat, dentes firmat, & adhaesus incipientes cum & tonsillarum inflammationes videri gatparatur. Fluxus muliebres eadem siccitate, & dylen tenas curant.

Fraga sicut si dant, & ventriculi inflammationes, caliditate reprimunt: alimonem continent capram, terrae & a quosdam, & si in ventriculo ipsi corrupti corrumpat, eandem pernam.

Sulfuratum hoc cum liquor faciem firmat expurgat, & delictis maculis nandem aptam reddere, aliquid quoque calculum renam videri solis.

LIBRI SECUNDI PENTADIS QUINTAE

FINIS.

KK

STIR



STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS QVINTÆ  
LIBER TERTIVS,

DE ESCVLENTIS RADICIBVS, AC  
RIVI GENERALIS SVLIS, AC NOMI  
SVLLIS ALIIS.

PREFATIO.



**C**VM MERARIS fructibus, paucisq; herbis non citis qui vestigio  
sunt, radices edules spectant succedunt. Cùm autem istorum copiam sit  
numeros, & bulbos, qui etiam radices habentur, in istorum succorum abun-  
dantia operam non parat. Plurimas quidem bulbos Pemptadi secundo libro tra-  
ctando descripsimus, sed quorum stipes elegantes ac venusti horti gratiam  
et ornatum conferunt, acerbisq; non quædam ventrem patiunt.

Restant præter illos venusti, sed tamen non omnes edules quædam tamen  
cum his præsequuntur, ne quædam generâ inserviant, ab inuicem distillerentur. Itaq; in describendis  
ab illis separasse, qui aliqui, cum ceteris reliquis simul uno libro comprehendendi poterant.

De Rapa.

Rapa vulgaris.



CAPV L.

Rapa oblonga.



**R**APA oblonga, aspera, & virensis sentis folia, vtrinque profundi incole sunt disiecta, cuius  
verdè ramosis: dolioli lateri filique ac semina qualia Brassicæ. Rapa, quod pro radice  
est, tuberosam, sed globi instar orbiculatam, frequenter in latitudine non effusam, cassidè  
oblonga supra terram extans, rufenus terrem quandam radice tam demittit, cortice vire-  
nter crasso, albicante, & carne interius alba, quæ cruda coctaq; edunt.

Finem autem nominis & Rapum quoddam esse, incertum palpe rubens: sed fortassis hoc illud est, quod inter Betas reposuitur, & à nominibus pro Rapo rubente habet. Simpli-  
gus Perpetua hanc ubi primo cap. vi.

Est vero & sylvaticus quoddam Rapum, cuius vitas species Pentadide fecim de lib. primo ostendimus.

Terris Rapum medicamentis postulat: & solutam, ac adeo solutam, Petrus Crocicentus au-  
dit, ut fito in pulocrum sic ostendit. In agris & nominibus vitibus quibusdam locis reperitur.

Semur Vere, vel post demeritum ingentem, in eodem in quo Secale nascitur agro. Alio in an-  
no ubi cum Brasica flores & semina producit. Transferri autem primo Vere, vel etiam et-  
ius Rapo oportet, si ad faciem Raporum semen vide sperentur. Non translatorem ad reli-  
qua quidem vitis semina, verum in eis non transferant Rapum, sed magis radice crevit.

Rapum autem in Grecia *ῥαπὴ* dicitur, in eodem in quo Secale nascitur agro, in  
Officina & passim Rapum. Lacedæmonis vero *ραπίς* apud Bœotios vero *ῥαπίς*, ut Archo-  
nenses in Germania *Witten* Belgæ *Stapen* Gallis *Nassau* vocat: Hispanis *Nabo rubens*, vel  
*Nabon* Italia *Rota* Angli *Cherpe*.

Ceterum Rapo rubente radice, que propriè Rapum, & sitis nomen dedit, cruda quando-  
que, sed frequenter coctâ edatur. Cruda trahit, & succum crassum frigidiorem ingerere:  
coctâ minus refrigerat, imò adeo calidam, ut refrigerare non percipitur, humida tamen  
mitioribus & flatulentioribus. Reficit autem non parum quo modo Rapum decoctum  
in aqua aut utriusque decoctum humiditas est, citoque descendit, & alvum facilius reddit.  
Sapor carbonis vero insitum siccatum est, & statum non ingerere, non omnino tamen es-  
peret. Quocumque autem tandem coquantur modo, amplius multum quàm cruda alant, ali-  
mentis contraria non vitalem, si temperate parantur, sed non copiosum ad hanc ra-  
tionem se minus generosiorum faciant. Et vum & faciat eorum nominibus diuina.

Decoctum Rapum ad tussim & vocis raucitatem confert, vel per libetum addito saccharo  
aut ergo melle detur. Diosticondes hoc & podagra & perniciosa sunt. Idem  
& passim Rapum tritum veliter pernicibus ut pons addit, tunc & certam rosicorum, quod  
mentis Rapo per ceteras ferentes & coctum fuerit, ex ulcerant pernicibus proficere.

Asparagi Rapo hinc prima à transplantatione germina decocta, vitas, si edantur, movent.  
Semen in antidota recipitur, & Theriacis ad infortuna pora si inperit venena aduocantur.  
Belgæ alium ea semine expressum ad reliqua à pura dolores subinde exhibent: cum &



Napum.

ipsis parca aduocatus vitas, quos periret & ex-  
pellat. Idem loca in cum aqua frigida calidior, sit-  
toreus, & sperandus vitis statum trahat.  
Virescit vero & hoc in cuba, sed ad primo quàm  
proh coctum aliquibus u efficitur, vel pleraq  
intra coctâ fuerit. tunc autem facili, ut viten-  
culo trahant, amarebit, & vitam commoret.

De Nape. CAP. II.

**N**APE folia, caulibus, flore, siliquis, semi-  
neq Rapum refert, sed radix que Rapo in  
orbiculata latitudine est abent, Napo in  
germinem expungunt. Nape siquidem crassa &  
longa radix est. Nape & ipsa nominis vitas.

Solutam quoque terram hanc aliam quàm  
Rapum postulat, in lemon tamen etiam proce-  
nat. nascitur in Gallia, Basana, aliisq frequen-  
ter reperitur.

Tenerur, transferretur, semel periret eodem quo  
Rapum tempore.

Floris autem, cum & Rapo, sylvaticis haberit  
species, quàm Gallia in ta, Nassorum, Rucillio-  
st. appellatur. Que ex non transplantationum si-  
m Rapo in hinc Naporum semine nascitur &  
folia, caule, reliquisq Rapum ac Napum gra-  
tibus, sed radice non crassa, oblonga quidem, &  
hinc magna est. Rapum etiam transferri, & in  
vitam locum deligi debere, ex cura semine nas-

causam expellunt Rapum, nec dicitur eodem modo & Napus translationem delictur.

Sentur autem huiusmodi stirps non paucis locis in agro seminis causa, veluti & Syllachar illa Basilica, Crambe veteribus nuncupata. Ex vobore enim horum seminum prodeit magnum sativae laticum, & haud medicum quibus agricola accedit: Transmissis fignem molis ex eo oleum exciditur, cuius non modò ad obolus, aut ad laccarnas lartens vntur, verum etiam ad suponia compositionem requiritur: Nam ex hoc, & vna fortissimo ex similibus cineribus lauro, Sapo decoquitur, quo ad fluxum expurgandus, leneis velle vntur.

Rapifera.



Lampina.



stirum ferè Belgiam vocat.

Napus Graecè *βουβόνη* dicitur, quod turcèmen *Rapo* in agro vocatur: Nam *βουβόνη* appellatio à tumore figura dicitur: apparet Germanis *Wurmbt*: Barbaris *βουβόνη* *βουβόνη* *βουβόνη* *βουβόνη*: Hispanis *Bebo comosa*, & *Napo* Italia *Napo*: Gallis *Napous*: Anglis *stapa*.

Galeus autem *βουβόνη* & *βουβόνη* dicitur, nulli facit, & exera Napus à Rapo ad se radicem forma distinet: ut & ante scriptum est.

Et à Napus à Rapo facilius & ceterum ad differens, nisi quòd Napus paulò florat, minusque facile concoquitur aut desiccat, potenterque flatus ingerent: in reliquis est Rapo ceterum.

#### De Rapifera. CAP. III.

**R**APIFERA folia excant lata, obliqua, parva, veluti Rapae Napi, sed laticibus indurata, cauliculi eius teretes, horum, pediculi et aliover, secundum ramos exiguos foliis prominent colore subditos, ac postea teretes, oblongi, & pinnis filiquas, in quibus ferè vntur Napi, sed feracitas ac odor gustu veluti Sappae, sed amarus, radix non magna.

Frequenter in agris, dum requiescunt, & amaro non potius duntur, sponit radices: non minus tamen & ferax vnt, prope vntur, nec, & alioverculis & aspera.

A Martio menit in altum affluens, hinc reperitur: interea verò & semin perstant.

Nostri etiam Rapifera vocant: accenti verò & Sinapi sylachae: Germanis *Wurmbt* Belgis *Wurmbt*: Gallis *Wurmbt*, *Wurmbt*: Nihil Erysimum, ut quibusdam vntur, folia oblonga, & haudquaquam Emox Emox ostendit.

Ceterum Rapifera feracitas dicitur & feracitas ad minus quam Sinapi. Vntur à novella huius loco, qui condimentum Sinapi non habent, vel ex hoc componunt, veli ad hunc, sed palato tunc minus grati, quod amaram sit.

#### De Lampina. CAP. IIII.

**L**AMPINA folia Napi aut Napi similia, sed facis similia sunt, sed magis, magisque aspera: cauliculi cubitales, teretes ac ramosi, foliis in fistulas virgataeque latic, magis, Hieracii amula, ex aliquos vntur, ut pinnis foliis còpelt. radices teretes, ac rubentes sicut.

lata agrorum & hortorum laeta ac magis, ferax vnt, locis incultis, non omnino arida haud rad vnt.

Tota aetate cum floribus viget.

*Raphanis* hoc est *Gaza* nominatur: Latine eadem voce vocatur: Inter nothas tamen à Romanis Napum dici soletur. Napis autem illa notha à Napi similitudine, quem folio refert.

Radicem autem ac extingentem, nonnullaque digerentem facultatem obtinet. Galenobar: etiam males facere putatur: à rila. Droskoides vero pluraliter ut quàm Rami, et, & *Stomachis* ruborem. Coguntur autem, eodem autem, caules foliaque, & in cibum accipiuntur.

De *Raphanis*, seu *Radicula*.

CAP. V.

Raphanis seu *Radicula* sassa.

Radicula sassa minor.



**R**ADICULARVM sassa vna, sylvatica altera: botis magne cognomen accepit. De singulis autem fortim agendum.

Sassa *Radicula* folia emittit magna, virentia, aspera, veroque latere profunda, incisione diffida, Rapi folia haud dissimilia, sed maiora: caules teretes sunt: inq; alia spaci; à quibus basili qu' arce folliculari diloni per paco, fuce dentu filiquicrassa, acuminatis, inrens fupofis, in quibus duo aut tria semina, maiora quàm Rapi aut Basilice, radix foris inrensque fuparesimè albida, qu' andoque extenui nigricans, crassa, & longa, si comensum solum nata fuerit, subinde vero crassior ac breuior.

Du breuior subactam ac solumam terram *Radicula* requirit, & mediocriter pinguem in vniuersi etiam quandoque non infeliter provenit.

Post vltima sollicita in iunio aut iulio mense commodissime ac optime *Radicula* ferunt. Vno tempore sine, parum radice probatur aut proficit. Nihil enim aut in vniuersi infertur, mox breua, seminaque profert: sassa sine radice grandifera: hybernicis mentibus infertur. Vere: sequente: sassa seminaque decum facti.

Theophrasto, Dioscoridi, ac Galeno, aliisque Veterum Graecè *ραφανίς* dicitur: & quosque sassa sassa: Potheroses *ραφανίς* appellant: Antiquiores autem, & Arabi, teste Galeno, Basili aut *ραφανίς* vocant. Latine autem *ραφανίς* *Radicula*, & sassa *Radicula* est: Officini vocè *Raphanus*: Germani *Reisig*: Belgij *Ratop*: Galli *Rafan*: Italia *Rafan*, & sassa *Hafanas* *Assava*: Angli *Ratop* (se *Reisig*): Bohemi *Rafanis*. *Radicula* sassa *Calus* à Martello Imperioe *Bacianis* dici alium: & similitur ab Aëno *Tombab* *Th. II. cap. II. Corne*

rus tamen non Bacemon, sed Caccemon legit. Invenitur verò nomen Bacemon etiam apud Nicolaum Mysepsum corpori c. c. l. v. lib. primum.

Radix manifesta exallicit & atenuandi & aperienti vim habet, ac in ea qualitate superante: In tertio autem ordine exallicituram, & secundo velicantiam hanc Galenus dicitur, & obfusam magis esse referit quàm alimentum.

Edunt autem eandem. Nonnulli autem hanc cum pane aliam os cibi loco sumunt: hoc modo citrata, paucissimam confert alimentum, sedque vitiosum ac repugnans. Plurimæ verò non solum hanc mandant, sed inter prædandum, aut comendum, alientum ciborum veluti cademerum, & appetentis in cibamentum adhibent: & inter vitiosum faciemus ingenerat, sed cum difficultis reliquis cibis concoquantur, quandoque & ventriculo motu ipsam perturbat: ad ciborum tamen distributionem aditum, paucum in illi cibo sumant. aut seò cibum semper ipsam subleant, ructus exerit, ventriculum su buent. Venerunt etiam nec cibum danti promouet, sed præcipue cortex, qui ipsa interiore carne ut acinoræ, quoque maiore efficacia vomitiones cum exymelice dabis facit. Promocat verò & Radix vitæ, ac colentes eam doli distulit ac expellit: decedito eius ad tertios cyathos tantum, ut Plinius ait, apoto, quod, & auctore Dioscoride, ad vomitum ruffim confert, & que in pediculis habens eximias. Huius loco molis utas si hinc vider per organa extrahit liquor, qui & vitas potenter est, & calculos etiam excutit. Item verò & ad vomitionem confert, sedes ut, qui ipsam promouet. Radix vitæ verò ruffa, hanc uti impedita prodest: saggittata sola, & contra vperantur morbis quælibet.

Eandem & semem possit, nam & vomitionem facit vitas similiter mouet: & ut acinoræ possit in semem extrahat. Galenus Radix vitæ catharticum Vere erumpentem etiam ruffa nonnulli ed referit, ipsamque magis arguntur, quàm Radicem eandem: propterea quod in aqua magna decoctione acrimoniae partem deposuerit, nihilominus tamen paucissimam habere alimentum.

*De Radice sylvestris.*

CAP. VI.

**S**YLVESTRIS Radix solo est heruosa, angustior, crebrioribus, inanis disticta, prope radium veluti Eruca, sed multò quàm huius minor. catholici omnes, pedes, vel aliores disticti: lutei exiguè silique parue: mentem quoque semen. radix dignam quandoque crassa, oblonga, alba, sapore acris, mordantique ac vitas.

Intra fossa ac serotus aqua habentes sponte nascitur: & pluribus anni sebit.

Florant inter mensis postquam in viginti radix Februaria aut Martia aliquando efflorat, & sicut loco inferat, ac edunt.

Radix sylvestris Græcè οὐραρὴ δὲ γὰρ à nonnulla verò & Annonia dicitur: Germanis *Wetzels*: Belgicè *Wetzels*: Hisp. *Carameja*: Italia *Amelici*: Galli *Wetzels* *Wetzels*. Facilitate autem hæc Radix non inter ruffas est, sed calidior ac siccior, qua distict.

Dioscorides solum inter olea recipi scribit: nam & radicem coctam, qua, vt ait, exallicit, vitas mouet, & ruffa est.

*De Raphanide, sive Radice magna.*

CAP. VII.

**M**AGNA Raphanis grandis profert sola, longa, lata, acuminata, furcata colore vitidis, Hippelapathis æmula, sed maiore & asperior: caulera si quando pumit, sed omnem, quoque in co siccitate albedo, parua, & exiguè siliqua. radix magna & albedi, gustu admodum acris.

Hæmorrhoidum horum locis gaudet, atque in his melius, quàm in aridioribus nascitur profert. gigni verò & in præter nonnullis Fachius auctor est.

Agri aut Marto quandoque huius flores apponunt, si quis post factum hinc admodum vitis natus hoc esse, vitis semen nascitur hanc profert Petrus Cretensis in scriptis: qui Novembe, Decembe, Januario, Februario, vel etiam Marto autem se radicem parua disticta, ac in præter solentemque terram descendit, eaque ut facit magnas crassaque siliqua disticta radices.

Rapharum magnam aut Raphanum rusticum vulgò appellant nonnulli, & singuliter Raphanum. Non Raphanidem magnam, aut Radicem magnam, aut Raphanum hoc nomen multum: Germanis verò est *Wetzels*, aut *Wetzels* hoc: Galli *Grand raphan*, *grand raphan*: Belgæ frequenter Rapharum quandoque ad imitationem Germanorum *Wetzels* *Wetzels* dicunt.

Innotuit autem hanc magnam Raphanidem sive Radicem vitibus esse nonnulli solum, & tantum quidem inter hæc odium esse, vt Raphanis magna nota vitis latioribus

Raphanus magna.



Pastinaca tenuifolia Ga. ut.



lum saporem habeat, & hinc radix acida ac tula in vinum coacta, ipsam mox in acetum educitur. Verisimili autem scriptores, desiderium cum vi- re, Raphano quidem, sed non hinc, sed licet sic scribant, quam acerrimos passos nominare istam esse scriptam esse.

Corticibus Raphanidis hinc radix admodum acris est: calida tertio de sicca secundo intertos. Cortex admodum frequens apud Germanos pro condimento usus est. Valens ad eandem ad que- situm, sed & vehementiores sunt.

Oxymeli ex aceto, in quo trifolii cortices ma- duerunt, vomitum excitat, & adversus quartanai commedatur: Quin & cortices ipsi in aceto ma- cerant, si cum exiguo mellis edantur, deinde aqua superinfundatur et perda, vomitione quoque expungit.

Herba folia cum vino decocta, additoq; mo- dico oleo, ac cataplasmatis in modum imposita, nocent ac heru dumtaxat molliant: pelham vero admodum, venae phlegmaticae auxiliantur.

De Pastinaca tenuifolia. CAP. VIII.

**P**ASTINACA RUM duo posse nos atas gene- ra ostende, utraque tunc vultu tantum ab aliis.

Tenuifolia autem Pastinacarum quaedam fatuae sunt: sicut illis vero alia.

Saturae Pastinacae folia sicurato colore vident, & atropia sunt, sed in tenuifolia ac saturata partes meliophitibus febribus danda. casus, quando

Pastinaca sativa rubra.



a furgie, velus & rotundus est, forisq; nonnulli hirsutus, interiore parte caesus, callosissimus in summo rotundis umbellis, in quibus floret; pennis albacanis, succedentibus non magnam, sed alperam & lentam, radix crassa, doli carolis Jurea, et in gram, & in secunda.

2. Huius altera species proventibus partibus simile, solo radice colore ab ea differ, qui hinc non laevi, sed fuscos rubore agratur.

Seruntur iste Pastinaca in agris ac horti, in quibus & alia cetera habeantur, utrum quoque desiderant non firmam & bene si basiam.

Altera à hincone anno caesura provent, & Rosulas, ferentisq; proferunt.

Est verò haec prope à Græcis *εσπολίος*, dicta: Nam quam nos lanœa folij Pastinacum nunc vocamus, à Veteribus abo descripta est nomine: Huius autem sativum genus respicit *βασίς*, Latine Pastinaca latina dicitur: Theophrastus autem lib. ix. De situ partu historia hanc *Staphylurum diuiter* nominat, & quod *Ασκαδης* nunc regem ac in Spertendi *Αχαια* dicitur situm, *πυκνέρδιον* aut *αβήλας*, id est, locum esse, querepturam quendam albam legum quod de altera specie veracem habet. Galenus lib. De med. simp. faculcanibus Duceum quoque facit, sed tamen non simpliciter Duceum, sed composito nomine Duceum Pastinacum appellat. Nam Theophrasto quidem, ut diximus, Duceum est. In Dyoscoride verò pastinaca hanc habent, sicutem ab ipso descripta Pastinaca, hinc folijs, flore, ferentisq; melle, sup. ostendit. Nos autem hanc Pastinacum in rosulam, ad differentiam aliorum lanœa folij, & candida radice, vocamus.

Provent autem hanc Pastinacum Germani *Jam* pessinafra, & *grütblum* appellant Brabant *ger pœn ger pœn* / *ger pœn* Gallis *Pastinade* / *mahe*, Itali *Pastinaca* / Hispanis *Cañabera*, *Pastinaga*, & *Cantaria*.

Alteram vulgò Carotem vocant, Jacobus Mantius *Carpetum*, & *Pastinace*, cuiusmodi sima est, speciem facit: Veteres autem *Caryotam* macropalmar fructus nunciant. Constantem hanc Pastinaca dicitur à Germanica voce *Chir rot*, quod est, in novum rubra: quorum modo ad Brabant, verum & ad Italiam Galliasque vox pervenit.

Ceterum Pastinace lanœa radix frequenter situm cum pinguis carum cum oculo oleum temperat calida est & nonnulli humida alterentem, non multum quidem, sed non rotundam, quibus alijsque, suggerit flatulentiam quoque quidam obinet, sed minus quam Rapa, quibus etiam maris cito descendit.

Radix sine rapa, & ipsa coquatur, sed radiceum carnibus cum oleo verò, sile (quod pro quo Veterum) & aceto frequenter edunt amonorum aliorum loco hybernis mellebus succola.

Pastinaca sylvestris mascula.



Similis autem hanc fructuosa Lanœa est. Semen verò utque calidum ac siccatum situm dicitur, ymasique movet, veluti sylvestris Pastinaca, sed maris efficacis est.

De Pastinace tenuifolia sylvestri.

CAP. IX.

**S**YLVESTRIS tenuifolia Pastinaca sili vocatur ac vane disticta sunt, veluti lanœam, sed albidior, & paulò hirsutioribus caulis simile hirsutis & a spermatibus: floret in hinc rotundisq; umbellis parvis, albidis, quorum modus situm colore purpureo est: & tamen asperam & hirsutis, quo ad maturationem pervenisse, umbellae hirsutis modis albidis, tenuis, et eductis longissimas.

Incultis locis situm agris, ipsorum maris, prope vias ac semitas quo adeoque & in maculis suis sponte geritur.

Augusto semen legi potest: fœta lanœa ut hinc vident.

Græci *εσπολίος* dixerunt: Latine Pastinaca sylvestris: Officina pro Duceo habent, utiq; loco, nec male, nec insolenter vitantur. Nam & Galenus suo tempore pro Duceo habent: sicuti Italiani & Ducei à Theophrasto dicitur *βασίς* situm est, Germani *grütblum* / *grütblum* / *grütblum*.

in Septis vel: Cossibus magis: teste *Platynico Gallo Passenode Ganage*: Italia *Passinaca sal-*  
*acris Hispania passaheria Salvage*. *Aethiopia Diphilum* in *Colicis citius*, *Passinacum* ut  
 ab *sero* vocari quod ad res promoueat *venereas*. *Clypeus* etiam, auctores *Plinio*, *armatorum* &  
 hoc quod inesse dicit: *Sunt autem haec de Syriacis Passinaca scripta*, cuius radix efficacior  
 est quam *latina*: & *venereum* quod, ut *Galenus* ait, obtinet.

At *semen* huius *Syriae* est *Passinacum*, tum & radix faciendo ordine: *escalficant*, *refrigerant*,  
 & *resolunt* ac *stimulant*.

Radix decocta, aut epom *vinum* cit, *calculos* pellit, *fixum* ex *utro* *decumbit*, quod & in  
*pelle* *applicata* *facit*. *Romae* *autem* quod obtinet, *unde* & ad *Venerem* *extulit*.

*Semen* *potum* & *applicatum* *firmius* & *menfes* *dicit*: *viu* *difficultatem* *faciunt*: *status*  
*de* *carum* *propolis* *prodest*, & *quibus* *venter* *tumidus* *est*, *ad* *uersus* *colicos* *ac* *nephriticos* *do-*  
*lens* *cum* *uino* *sumptum*, *aut* *decoctum*, *plurimum* *conferunt* *malis* *libris* *stiffocacis* & *hoc*  
*modo* *usu* *caprum* *lenit*, & *conceptus* *adiuuat*. *Cetera* *venenatorum* *omnium* *morbus* *ac* *status*  
*vetustissimi* *sentur*, *sic* *Dioscorides*, *ab* *his* *non* *edit* *qui* *presumpunt*.

De *Passinaca latifolia*.

*Passinaca latifolia fixata.*



CAP. X.

*Passinaca latifolia Syriaca.*



**L A T I F O L I A.** *Passinaca* duplex quoque est: *latius* *videlicet*, & *syriaca*.

*Seius* *folia* *angula* *sunt*, *et* *multis* *ad* *uicem* *costam* *coherentibus* *colliculis*. *Fructus* *si-*  
*milis* *que* (ut *Dioscorides*) *ut* *Verbenacis* *quorum* *singulae* *oblongae*, *di* *gitas* *duos* *luc*, &  
*antibus* *si* *u* *modo* *in* *ca*, *caulibus* *etiam*, *strinat*, *ad* *horum* *altrud* *horum* *quam* *loque* *atrol-*  
*lari* *consistunt* *in* *formis* *stolis* *etiam* *in* *umbellis*, *lucis* & *si* *u* *ne* *de* *inde* *plano* *rotundo* *que*,  
*maxe* *quoniam* *Anethi*. *radix* *candida*, *oblonga*, *datis*, *est* *apta*.

In *horum* *ac* *nonnullis* *agris* & *haec* *Passinaca* *sentur*: *terram* *autem* *requirit* *plagiam*, *ac*  
*silicem*, *atque* *perficam*.

*Sylacibus* *huius* *generis* *Passinaca* *facium* *folis*, *triste*, *umbellis*, *stolis* *etiam*, *si* *u* *ne* *de*  
*inde* *plano* *rotundo* *que*, *maxe* *quoniam* *Anethi*. *radix* *candida*, *oblonga*, *datis*, *est* *apta*.

*Gegonae* *haec* *non* *pauci* *Belgii* *ac* *Germaniae* *locis* *incaulis*, *ac* *si* *bi* *de* *pauci* *horum* *re-*  
*perunt*.





Semporis autem Secacul, de quo cap. LXXXIX. videruntur existimari, hanc quoque de Secacul si quidem solo de coloribus habent, ad est, Pali, ut interpretatur Martiano Sylvaio: & nullam ferè nigram Ciceris magratadine, humore plenum, ac sapore dulcem qui gratiam Calesi docuit. Pili autem folium non habet Sclaram, nec fructum nec granum lentis agrum Ciceris simile. Viride satis consistit, Sclaram à Semporis Secacul plurimum differt: quoniam soli et idem sit.

Sclara autem ridicula moderatè calida ac humida fieri facili consequuntur, non tardè deficiunt: rancore modico sunt, nec gravi sunt siccè: flavescent autem quòdam etiam ebriant Venorum promoventis. Eduntur coctè, & quandoque cum aceto, lacte, & unguento utuntur in modum: quandoque verò in oleo aut butyro frictæ applicantur & sicuti modo. In Sactis, aut Hieronymus Hieroides, multum preparant inanis sum, atque vasa, utuntur.

DE ALII. CAP. XL.

Allium.



**A**LIIJ satis quorundam sunt generis: Sclara verò alia. Sclara Allij bulbis tenuissimis ac rubicatis ex alio dicitur admodum purpureo velibus velatis, ex pluribus coherentibus nucleis, sive, ut vocant, spica separatis conuolutis coagmentantur, à quibus in finis venas quorundam fibra pro radice in duntaxat. folia vix nec oblonga, Cere similibus, inter que caulis, sed admodum rubè, nec primo aut altero anno, sed tertio, allingit: quatuordecim & caule semineque carere à qui bulbum crederet.

Præter verò istud & aliud quoddam sitium **A**llium Valerius describit Cardus, cuius bulbis minor est, & ex paucioribus nucleis, plusque radice, ac non conuolutis compositis, membranis tamen tenuissimis, ac dicitur purpureo colore bulbum ipsum quoque carere nec. folia hinc quibus protra, sed nonnullis minoribus nucleis verò terra, ex bulbis, glabris, fastigio caputium profertur ac cernitur, candida membris velatam, qua per manarum disrupra, nucleis apparet in his plurimum, orbiculatim figuram habentes, Pili marces, succum colentes, colore sunt purpureo, sed pulpa minore candida, sapore & odore bulbis nucleis similes, quæ in terram defixæ in plantas succedunt.

Veteres verò & aliud quoddam sitium **A**llium describitur reliquorum Viperæ nomine hoc, Columella lib. XI. ait, illi maxime est incrementum, quàm Allium, habet usum velut Allium

pluribus cretæ spica. Plinius lib. IX. cap. V. & hoc grandis esse scribitur, & præcipue Antiochensium inquit palmarum rana.

Novembri mense aut Decembri Allium bene ferunt, Palladio iactum, & Viperam terra nuda alba fossa & sic bestia sine stercore licet & in alia etiam stercore, addit Petrus Cosmæus, proferantur. qui ferè post hæc menses Septembris, Octobris, Februarius & Martius: in alijs autem locis mense Decembri tradit. Placantur autem, ut dicitur aut, in arenâ voo palmo distantes.

Allium sacrum Græci *αλεπεπε* dicunt: Officina Latinarum appellationem retinent Germani: *Aluian*: Belgæ *Aluian*: Hispani *Aluian*, *Albus* Itali *Aglio*: Galli *Aluian*: Arabi *Aluian*: Cyprii *Aluian*: Arabi *Aluian*: appellatur verò & spumæ vocibus *Aluian*, & *Aluian*.

Allium genus Cardus *αλεπεπε* appellat, quod à duobus locis seu duobus sine nucleis gignat. **A**llium Græci *αλεπεπε* non nisi à spumæ que ab eo effertur et Plinius videtur. Triptum, quod in oleo & aceto, mirum quantum increseat spumæ Dicitur verò ab eodem & *αλεπεπε* ac Cypriam Allium.

Poculi verò & istud Allij genus esse, quod *αλεπεπε* dicitur, quo nomine Galenus in extensio

positione linguarum Hippocrius Allium appellatur simplex caput habens, & non divinum in species, ut similes tamen & primum est Allium.

Ceterum Allium acce admodum est, ut situm ac calcis quartum, ut Galenus ait, in cella, remanens corporis tunc vestigia calcandi & calcis.

In his simplicibus caput insigniter cocillifera, & qui in ipso sunt hinc inde crasse attenuantur, lentas & rasesque insidit, deperdit etiam vim ac obstructions aperit, & facillime quoque habet, aliter hinc vobis & omnibus veneris frigida, & virulentiorum animalium libidinosorum bene & a Galeno Theriaca appellatur insidiosa.

Allium tamen corpus insigniter cocillifera, & qui in ipso sunt hinc inde crasse attenuantur, lentas & rasesque insidit, deperdit etiam vim ac obstructions aperit, & facillime quoque habet, aliter hinc vobis & omnibus veneris frigida, & virulentiorum animalium libidinosorum bene & a Galeno Theriaca appellatur insidiosa.


Allium tamen corpus insigniter cocillifera, & qui in ipso sunt hinc inde crasse attenuantur, lentas & rasesque insidit, deperdit etiam vim ac obstructions aperit, & facillime quoque habet, aliter hinc vobis & omnibus veneris frigida, & virulentiorum animalium libidinosorum bene & a Galeno Theriaca appellatur insidiosa.

De Allio glabro.

CAP. XLII.

Allium glabrum simpliciter.

Allium glabrum latius foliis Allium Tricorne.



1. SYLVESTRIS Allia recentioribus duo sunt: unum folijs angustioribus: alterum latioribus. Primum folijs sunt lanceis, hinc, ovatis, glabra, & truncis vacua, inter quae medulla est cauda.

calendas, teris, glaber, durus, ac solidus, in cuius fastigio post florculos feminae rugosa in globum collecta, rugosa nucleus perimita, odore teporeque Allij, pro radice vix ut pariter est bulbus in multis nucleis distinctus.

Capitula autem in agris frumenta feracibus non raro verò & in pratis, quod tamen antri magis ex parte non est.

Alibi sylvestre Allij tuberositas bona terrive gelino nigra, d'conditio lata, lrua, & a glaci nifocosa l' d' d' r' a l' d' m' e l' c' o m' b' i' b' u' s' i' n' h' u' m' o' a' b' q' u' o' r' f' l' o' r' u' l' o' r' u' m' c' i' d' e' n' t' i' a' p' r' o' r' a' d' i' c' e' b' u' l' b' u' s' e' s' t' c' o' l' i' g' u' a' c' e' n' s' f' i' b' r' a' q' u' i' m' u' l' t' a' d' e' o' r' i' a' d' e' m' o' n' t' & m' f' b' e' n' e' e' d' u' c' t' i' a' s'.

In folijs frequenter abas repetitur, in hostis verò & quandoque nascitur.

Proutque autem faciam Allium odore ac sapore scilicet.

Sylvestris Allij ambo quoque sunt, sine alijs & s' g' a' & prout quiddam Dioscoridi d' p' a' r' e' l' g' e' d' e' s' t' A' n' g' u' s' t' i' n' u' s' A' l' l' i' u' m' n' o' r' m' a' l' l' e' v' e' r' o' & d' e' m' o' n' t' i' s' t' e' s' t' C' e' r' a' s' i' u' s' A' l' l' i' u' m' d' i' c' e' r' e' i' G' e' r' m' a' n' o' s' W' i' s' s' e' n' s' i' o' l' a' n' d' i' s' J' e' d' i' a' n' d' i' s' : D' i' a' b' o' n' o' s' W' i' t' e' l' o' s' i' s' H' i' s' p' a' n' o' s' d' i' e' s' e' l' o' n' g' i' s' I' t' a' l' i' a' n' o' s' G' a' l' l' i' o' s' d' i' e' s' s' a' n' g' u' i' s' A' n' g' l' i' o' s' W' i' t' e' g' a' r' l' i' s'.

Alterum Allij vixit nomen a recentioribus accepto Germano W' i' s' s' e' n' s' i' o' l' a' n' d' i' s' i' n' d' i' s' t' i' n' g' u' i' t' u' r' u' t' e' s' t' A' l' l' i' u' m' T' a' n' c' e' s' t' i' m' a' n' t' v' e' r' o' d' i' c' e' d' e' H' i' p' p' o' c' r' a' t' e' s' u' l' d' i' s' e' s' t' d' e' q' u' o' t' a' m' e' n' p' a' r' t' i' a' p' u' d' o' p' s' i' a' m' e' s' t' a' n' t'.

Etiam sylvestre Allium & praecipue Ophiocoronid' a' u' t' i' o' r' G' a' l' e' r' o' s' G' r' e' c' o' v' a' l' e' n' t' i' a' n' e' p' a' r' t' i' a' s' A' l' l' i' u' m' v' e' r' o' i' n' s' o' l' a' c' o' n' t' a' s' n' o' n' a' n' t' i' i' n' B' e' l' g' i' o' e' s' t' n' o' n' a' l' i' o' r' a' m' p' i' c' i' u' m' d' i' s' t' i' n' g' u' i' t' p' r' o' c' o' n' d' i' m' e' n' t' o' e' d' u' m'.

De Moly. CAP. XIII.

Moly capifolium.



Moly latifolium.



NON vixit modi Moly est differentes enim aliquot et uti peruenit species.


Folij autem argenti primum est, & Gramina similibus, que cum à scriptis robur non habent, facile in terram concidunt. caulis procerus, glaber, ac teris, & culm' ante in fastigio multum florculos profertente candidos Lencis in nucleis, bulbus parvus foveol', fibris aliquot distinctum demissa.

Alterum folia promit longa, lata, lrua, pinguis, quidem Peru' maona, immo que medium a globosam quoddam exilia, eisdem cum folijs coloris, caulis rectus, crasso scilicet, teris, ac glaber, cubito alto, fastigio umbellam sicut latam, in qua florculos purpureos, & caput a profus

L L

caugus

Moly Indicum.

Dioscoridi  
Dioscoridis

Allium.

Dioscoridi  
Dioscoridis

causa triangulari, bulbis cepaeis proinde  
est. Tota herba cepaeis gestis speciem pro  
se ferit, odorem tamen nullum, aut penam  
causam à se demittit.

Hæc foliis, orbiculis è foliorum sinuam-  
penos, caule, bulbisque simile est, quod Indi-  
cum cognominatur, sed umbellam florifera-  
m non habet, sed ut hinc caputem, alquan-  
to latens quam globosæ formæ, cum cori-  
dæ membrana, in quo fructus geruntur (nullo  
apparente flore) nucleis aut exiguis bulbis  
similes, qui terre committuntur, incrementum ac-  
cipiunt, & satis cautesque proficiunt.

Solent hæc quidam in Belgii elephombes  
hinc vocari. Theophrastus Moly apud Phœni-  
ciam scribit, & affirmat, apud Cypriam quoque  
esse. Ad Moly, cum Phœnices Odysseus re-  
mentum è facit, per hæc in cœteris referre con-  
narrat. In Galia vero & Cappadocia & aliis  
Moly proserit, non bulbis: in quibus, sed  
quod Phœniam dicitur: ut testis Dioscorides  
de quo Pennantius parva lib. v. scripsit.

Primum autem, quibus, apud Dioscoridem  
ceteris describitur, fama respondet, foliis  
quidem habet. *ἄγριον σίμηλα*: *Βορέαδελος*  
peristiles, albidus, nunc res-cantem *ἄγριον*,  
hoc est, mentem, ut *Οὐβάλῳ* exemplar habet.  
(non *ἄγριον*, ut an Dioscorides legitur) &  
radice triquetra bulbosam. Acquisitio est,  
quod à Galieno lib. vii. De sitis mod. facili-  
tatis *ἄγριον* appellatur, si non transibentem  
extorret pro *ἄγριον* scriptum, sic *ἄγριον*.

Proximum genus latius folij, Moly est à  
Theophrasto, lib. De hibernis etc. describitur  
radice videlicet, rosanda, Cæpe similes: folio  
Scellæ, cuius vltus ut Alexandria aduersus  
veneticas & incantamenta, quod etiam non  
difficilis, (ut haud veni Hæmorrhoides) effodit.

Tertium ad secundum genera Moly referend-  
um non magis hoc *ἄγριον* vocant, aut Mo-  
ly Indicum.

Ceterum Malcus bulbosæ radice videlicet  
ad apertiones veni cum lino vnguento tra-  
ita & sublimata: ut Dioscorides auctor. Sed Gale-  
nus etiam tribuit ceteris Dioscoridem, pro *ἄγριον*  
*ἄγριον*, sine vnguento lino, *ἄγριον* dicitur  
hoc est, *ἄγριον* similes. Cum lino, ut, arena  
apertum vnguentum simare scribit Dioscorides.

De Allium. CAP. XV.

AD Allij locum est, Allium dicitur her-  
bam, non forma, que differt est, sed odor  
peristilis, ceteris similes Allium *ἄγριον*  
redolent. Folia autem hinc lata sunt, dicitur vi-  
scentia, ambitu incisa, & acuminata: circulo-  
nibus, cubito alno, circa cuius circumferentia  
geruntur cardeli, quibus succedunt tenues,  
parue, forme oblongæ filique, aspe-  
tu hinc nigra, nigra, radice obliqua, tenui,  
demulsa.

Prope horreorum septimenta, veteres muros, locus vias, vel ad parietum margines frequenter sponte sua nascuntur.

Flores huius Maio aut Junio præcipue vigent: semen interea perficitur. Martio aut Aprilia ad eandem mentem adhibentur.

Recentioribus Allium ac Alliaris dicitur. Non est autem Scordium, pro quo olim Officinæ hæc perpetua vixiit. Nec Scordij species est, de quo Pompe. parit. lib. 9. à nobis scriptum. Fertur verò à nostris in Pœniam esse duct. Germani *Arbeitskraut* (Arabi) & *Esse* hinc vocant Belgæ *Rosch* sive *Roos* Allium non bulbosum Latino dixerit Gali. *Altoppe*.

Essificat quidem ac recitit Alliana, sed in aliis quàm Allium maris, secundo videbent esse interio, aut terio remissa.


In medicina autem vltim nobis cognatum nullum habet: folia autem communi cura præhibita sunt à nostris in pro corda morbo: efficitur, veluti Allij vltim, ut paulò ante scriptum.

Sunt verò & qui folia nemora incoquant, quæ vel ad colic, vel septanticos dolores inuocant, in quibus non modo flammæ insigniter dissipant, sed & ex calculo dolores mitigare ac sopite ferantur.

De Cæpe. CAP. XVI.

Cæpe rotunda.

Cæpe oblonga.



**C**ÆPÆRYM, inquit Theophrastus, genera plura, quæ à locis cognominata accipere. Sunt verò & in montibus nonnullæ maiores aliar locum quandam rotunda, oblongaque verò & longioræ. Stylis striatis nulla sunt, nisi flore Plinio.

Folia autem Cæpe angusta sunt, & intra concava: caulibus singulis, tyris, infimæ parte inflexæ, cuius fastigio capsulæ præferunt membranæ tenis velgram quæ di frupta folioli ægulis formam coagulæ apparent candidæ, ac deinde semen triangulare nigrum, sed albitudibus glaucis implicatum pro ead se bulbis ex pluribus compactum esse, fibras aliquæ dorsum à medio demittens, quæ quandoque latus Rapi in modum erubescit, non raro cum modo oblongas, summam autem præteritisbus consistit membrans, ut plurimum liberantibus.

Terram vltim Cæpe desiderat pinguem, vehementer subactam, irriguam, siccoram, et palustris ac. Palsim autem per vltimque Germaniam in hortis oleænis pingui beneq; solito

gelo collitur. Subinde autem in arena sola tenuiter uti quandoque vult et in aliis herbis permixta, veluti Lactuca Palladius cum Saurea semperbat, quoniam melius, Plinius ait, protegitur.

Sentur autem Martio aut Aprili In Italia vero etiam Ianuario ac Februario, Palladio ad dionem vel etiam Nouembri, ut per vnaetiam Tullianum, teste Petrus Ciceronius. Belva vero quoque plantandi sunt, à quibus siccitas speratur quod Augusto mensis ad perfectionem veniat. Nouella autem Cereperatibus me sibus colligit ac repens possidant.

Cepa autem Graeco *κεφαλα* dicitur Latine, ut dicitur, Cepa, & quandoque Cepa natio genere: Officina nomen tenent. Capocentra autem hunc autem à locis quod Veneris vocantur sunt: Quaedam etiam Cyrena, Syria, Creta, Carnea, Samothracae, Aethiopia ab oppido Iudaea quae de Pompeiana. Item de Maritima quaedam, quam Venerem vocant raba, inquit Columella, atque inde esse, quod à Gallico dicitur dicitur, Rutilius sicuti hanc officinalem etiam à Belgis *Agrippa* Gallica voce corrupta, nomen habet.

deinde

Sentur appellatur quae minime sunt & dulces, atque haec putantur esse esse, quae Palladius Cepallas, quae parvas Cepas vocat.

deinde

Schuba vero sine scillitibus siles, quae hyeme cum coma reha quoniam, quibus & Vero nota sola detrahantur, & alia sicuti sunt eisdem detrahunt, ut Plinius ait.

deinde

Cepae vero species à *κεφαλα*, sine abique capite, & quae longam comam habere geminationemque totam in fronte obtinent, quoniam cepas ut Porum dicitur dicitur à Theophrasto *γέφυρα* nomen datur. de hoc vero & Plinius lib. xix. cap. vi. Apud nos duo prima genera (Cepae videlicet) vnum condimentanum, quod ab *Κακλυσαν* nomen Palladianam vocat aliter in caputem.

Germani autem Cepam *Wübel* nuncupant Itali *Cepula* Hispani *Cabolla*, *Caba*, & *Cabula* Angli dixerunt Bohemi *Cephal*.

Cepa autem omnia acris est, & odore sicuti rymos, calida & sicca, in dione Galieno, ordine quarto, sed etiam inanis quàm Allium feruic. sicca & tenuis atque acrisque substantia: reliquam crustam est partem. Optima autem quae tota ad finem: longa autem quae tota dicitur. nisi sine *κεφαλα* quae tandem dicitur quoniam vinda: cruda quoniam cocta, ut sicuti coacta.

Medicant autem omnes Cepae, potantur, sicuti canit. Acrum autem coctis deponit, praefertur haec vae aqua matura, carere unde tamen potentiam ac sic quidem amittit: facit vero etiam dicitur in vna mouere: & alio quoniam cruda videlicet, alio autem acrum crudum coctum nullum, coctis exiguam conferunt: Natura biliosa adhaerent: haec autem, quae cruda acris sicuti succum purissimum coacturam, conueniant, & quibus mensura ex frigida dicitur, obstruunt eam aperiant, refrigerant exaltescant, & multum prodeunt. Haemorrhoides vero & eadem apponit, vel cum aceto munda, prodeunt, ut Galienus ait. Diuulsi dicitur vero aperiant acris haemorrhoides, & aliter in *de agriis*, sicuti expurgationem, detraha tamen in oleum coacta, ac glanda instat habent.

Sicuti Cepas per aera utraque caput purgat, crudos purissimos humores emittit. Praecipue autem Cepa in cibo quam coctis comelia, capiti dolores efficit, oculos laedit, ac aciem oculi ac tunc dicit, & sicuti stupilicos addit. Tunc autem cum sale, ruta, ac melle, cum sicuti maris: impoita, prodeh.

## De Poris. CAP. XVII.

**F**OLIA Poris oblonga sunt, haec sicuti, sed complura, & dorso et transuerse canalicula, odore sicuti quae Cepa sicuti. cuius si non frequenter sola subsistant, aliter aut tunc anno affurgit exordium, flores profertur in cacumine in orbiculum collectos, veluti Cepae succedunt & raba sicuti, sed non nigra, bulbos tenuis & oblongos est, postissima scilicet, cui sicuti ac tunc, si quod non attenditur.

Mediocrem tamen Poris possidat: in pinguis, sicuti, & medicamentis solita bene proficit, habetur in Germania ac Belgis, in omnium sicuti horis.

Tempus ut sicuti: Martio aut Aprili in vnaque Germania: In Italia vero etiam Februario. Sicuti sicuti Sicuti post dicitur sicuti mensis, manens in arena sicuti, delictari potest. Sed quod capitulum ut sicuti delictant, attendenda non est, & Octobri mensis, vel etiam prius, transire debet.

etiam Graecis: Latini Porum: & Palladio multo vltimo genere Porum dicitur: Germanis *Sürl* Bohemis *Porre* Hispanis *Porre*: Itali *Porre*: Galis *Porre*: Angli *Porre* Bohemis *Wessler*.

Quod frequenter sicuti & attenditur, Porum sicuti sicuti sicuti Colemelle ac Palladio nomen datur. Sed quod non sicuti Porum capitulum est: Graecis *κεφαλα* videlicet. sicuti sicuti sicuti Atheniense vocat ut *κεφαλα* à nomen dicitur: vero & *γέφυρα*

deinde

dicit.

Portula.

Portula & Thym.



363. *Gerthym* autem *Plinios* *Cepae* specie in facit, & *Throphusillus* frequenter veluti *Portula* arceodem tradit: ut superius capite scriptum.

Exsiccant autem *Portula* resiccat & exsiccant, penes ac *Cepae* corpus exsiccant: crassos, lentosq; humores incidit. Nocet in tamen succum ingrederent ventralia ac tormi ita in forma pura: oculos offendet: vitas ac sem obstruat: nocet calidiores ac hinc forsq; in gram: & ventriculo: inflationes facit.

*Cochium* raris nocet, ac non ut fax parte de posit: & nec sic tamen bonum succum capere confert. Cum singulis autem oleis permixtum, quod inter eos comitipent. Cum *Pulsilla* *cochium* & comestum, quae in portula cruda sunt, coacta q; & edant. Seditur etiam in delictis vitis esse, & aetiam expurgat.

Succus cum melle potus contra festum morbus prodest: & similiter solis mra imposita. Idem verb succus cum aceto, thure, & lacte, aut rosaceo in illis, animum dolentibus & festum prodest. Veteres sanguine rheumatico colubis festum drachme sine cum aqua *Uvacorum* *Myra* pondere potus. Idem in vitium comestum, ipsum in aceto aut melle prodest, & cum comestum emendat: vitium melle sanant.

*De Solis Capite.*

CAP. XVIIII.

**PO R U L A**: species & alia est. folia verb protit multa quidem, sed palmo meo longiora, tenuia, acris, capitis raris similia: inter que subinde casibentibus emittunt, capsula pediculis cum foliulis praeferebant, ut sit *Cepae*, sed minores multo. bulbis subest cuius vitis coheret, & quibus fibris deorsum plantae demonstrant. Olore autem & sapore *Cepae* ut *Portula* in resere.

Scitur in hortis Germaniae ac Belgii, distans viget, ac plantis praerit flur: hinc ut folia portulae sublecor & arceodem frequenter, veluti *Portula* & dicitur.

Germani *Schut* & *Thym* appellant: Galli parte *Portula*: Belgians *Schut* & *Thym* dicit, hancem *Portula* vnde nomen illi facit: ut si, *Thym*, *Schut*, *Portula* appellamus.



Schnepfenkraut.



Ampeloprasum.



Facilitate eorum istud Porro simile est: ex-  
callicans, colicans, acutiusans, apertius, minus  
prostratus, cal dicitur verò & nonnumquam  
ingerat: fragiles lignosa contra peris, con-  
coquit, utidit: vapores crassos hucum matre,  
ocula cœcitateque molibus: naturalis in-  
formis adfert: & quatuordec Porrois, illud  
quoque potest.

## De Ampelopraso. CAP. XIX.

**A**MPELOPRASUM foliis est portacis  
caule verò affigit hucotatib, ut hanc  
multo inferius, in cœcis fastigio capitulum gi-  
nōm emittens totum concolium, qui tandem  
sponte delabente, flores de terra protrahunt  
Cepa similia. bulbos rotundos, duros, ac foli-  
dit est, qui plures à se removersi, facile totum  
multiplicant.

In vineis, ac vitis in plerisque regionibus  
sua sponte nascitur: translatus ad hortos  
dicitur viret, singula vites germinans, nec e-  
nim viti vel albis inclinetur, vel hyperange-  
re bulboseros, etiam in Belgio, commisit.

Æstus autem mensibus folia cœcitateque vi-  
rent, ac suo tempore flores, fructus proculant.  
hyeme bulbis in terra latent.

A vitiis ac vitis loco Ampeloprasum ap-  
pellationem accipit: Latine Porrois vitiis,  
aut Vitigenum Porrois dicitur potest: Officinis  
incognitum. Synthesi generis nota sui vitiis  
est: nec inter edulis idcirco recipitur.

Plus autem quam Porrois exallicis que-  
rere, utique, hoc est, stomacho magis adicitur:  
vitiis ac mentis vehementius et, contra  
serpentum morsus etiam conuenit: unde Dio-  
scorides.

## De Scilla. CAP. XX.

**S**CILLA, potiusquam sola apparet, canem  
proferit cubitali vel alioquin, sedem, fo-  
lis videtur, jactatissia vel Scytus aut, ac Antio-  
co similem, à medio furtim versus floribus  
particularibus moderatibus grandium, insperan-  
dum (quod lunos esse scribit) quod occupare  
voluntate sua illique marginalibus compellit, in  
quibus semina nigricans etiam plantae paleacea fo-  
lia que semina sunt lani lani sunt, quia fructu-  
ve, lani pungua, ac latiore dorso quam carnosum,  
eque humum versus reclinantur: bulbos magnum  
est, albidus, ex rancis veluti Cepa compactus,  
lenis succo plenus, multa fibris decorum cap-  
lans.

Non modò in Hispania, verum & in Italia,  
aliisq; provinciis Scilla sponte viret, & frequen-  
tius locis arenosis apertis, hanc potest à mari  
distans.

Septembris ac Augusto mensibus florit, ac  
particularibus quidem: primam quidem inflo-  
rescentiam deinde medijs pedunculis caule fastigium  
occupante viret, quod in maius floribus quibus

Thro-

Scilla alba proculis.

Scilla cum flore ac semine.



Theophrastus tria arandi tempora ostendere affirmat, sic ut priusquam arandi tempus sit prius-  
 bou prode ut tibus alterum medio tempore, terram cum superius floruit. Octobris ac No-  
 vembri semen pericitur, posteaquam iuxta in casulis emittentibus factis emanent, tunc de novo  
 siliis in conspectum veniunt, ante autem adventum pentate.

Bulbum hunc Galeni *scilla* & Latini quoque Scillam. Officina Squillam nominant  
 nostralli Cepam maris Germani *Wittrispel*: Arabumque *Aspessid* Hispani *Cebolla alba*  
 Galli *Squille*, *Squille* Angli *Stramonis*.

Scilla ex sic modo est ordine excelsiorum, & admodum incidens, sicut testem obta-  
 ut, ut Galenus in *scilla* sicut affam aut elatum firmos, sic enim viriam eius vehementer  
 colatur.

Aliter autem passis aut luto oblita, ( ut Dioscorides tradit ) in cibitram deinde conici-  
 tur, aut carbonibus trinitur, donec obducta crusta suffocentur in stello fieri, qua excipies,  
 sicut emolletur, aliter pollice firmis, aut luto que unlinatur, & eadem que prius sunt, cum  
 quibus non affatur, in venena maxime noxia est. Tunc tur ut in olla, in duto operculo, qua  
 in firmam demoretur. Sicut enim solet, quod maxime est medium, si reges viderentur, tunc  
 cui quod firmam confectum coequitur, mox tunc super aqua, donec quibus nec amantur dantur,  
 nec acrimoniam habeat, in duto, lino strilla secantur in vasa, sic ut de vlla quidem parte  
 decurratur. In Scilla septem ibat ad oleum, virum, aut acetum scillitum vititur.

In acetum scillitum, addito melle, acymeli coequitur, cuius ad incidendum crassus,  
 lino, viscidus humoris visus est.

Ad Scilla potioribus aliisq; medicamentis admiscetur, que viriam provocant, obstru-  
 dunt, sicut in oculis, sicut aperiant eam & thymum, datur hydropeck, in regio morbo, & tar-  
 tucibus la bonantibus & contra viderem nullam, difficile ut rip resistentibus in oculoque.

Potentiam Scilla cum oleo sili partibus subacta, sic ut in vasa aut ducunt cochlea-  
 rum pondere sumpta alium movet. Semen etiam vitum cum cortice, aut melle excipitum,  
 struatur, idem proficit.

Causas autem in Scilla vitum, quibus vitum autem aliquod exciderunt.

Pythagoras Scillam in lino tanquam suspensam malorum medicamentorum innotuit  
 pellex tradit: ut Plinius scilicet.

Panacea.



Itaq. in  
amplius  
scriptis.

esse, apparet proinde & quæ de utraque Scilla scribuntur, posse unam esse.

Cæterum Panacæi radix Scillæ similem gustum refert, ut Galenus in suo quædam dicitur Scillæ quædam, ea si non adfit, utatur, efficit enim omnia similia, sed longè ambocillius quod & Dioscorides tenet: Scillæ, inquit, vires & præparatio in hæc t, necnon quædam in morbis efficaciter affirmat, minor tamen quàm Scillæ: t, facultas t, meli.

## De Scilla Scisphora. CAP. XXII.

**B**VLEI Eriophagi meminit Theophrastus lib. vii. De stupium historia, & postea Athenæus Dypnosophistarum lib. ii. quem sunt bonam. sub parva raris habere, & ut inter internum quod edere, & exterium media contineatur, ex qua & toga & alia vestimenta texuntur.

Hinc in lateribus nuda tradant.

Eriophagi a uam dicitur, hoc est, laniferus, ab ipsa quam sub præterea raris in reconditis lanam habet. interposita quædam Lanam cognominat.

Hinc autem iconem olim vii quædam magnificis ad me misit, quam raris non generam esse nonnulli affirmant.

Morum verò & t, quædamque in horto Ioannis Branciones bulbam videtur Eriophagi nomine inscriptam, sed eandem hominibus non proferturam, quem C. Clusius Vicenæ superioris Panacæe in horto Ioannis Archelæi Medicinæ professoris florem sicille Erba, imaginem eius in stupium per Hispaniæ oblectatarum historia sua vult eam delectatione exhibere.

Sunt autem ei suba Hyacinthis firmata. causa ea bulbæ vel alior, veluti Scillæ, sicilike profertur caruleæ, in odore panacæarum quoque sicilicet explicatur. bulbæ ex pluribus radicibus continetur, albis, raris, ac veluti arancæarum telis obstruit, adnatisque suis alia bulbæ, quibus multiplicatur.

Et hæc hoc bulbæ, cum pulchra nobis missa haud contemni: quæ propter sille Eriophora veras est, haud potest legitime esse, cuius iconem accepimus. Non potest tamen sicilicet

videtur.

Bulbi Eriophorum ad unguem nati.

Bulbi Eriophorum Vienna autographi.



induci, ut exaltationem sicut ac emeticam magis ab honestissimo ac amicissimo viro  
 matrellum, nisi fortassis hoc ab alio fuisse impostum, quod haud verisimile: Cuius idcirco  
 creditur, si Eriophon huc non est, esse tamen peregrinum ac rari alius bulbi, vel  
 ut *var. ad h.*, quem apud Indos nati Theophrastus & Athenaeus referunt: nam hos qui  
 Narentis similes, longioris, ac capillatius ei depingitur: quam ob causam recte *var. ad h.* *Trinitate.*  
 sine capillatius, aut capillatius potest. Vicinque autem est, nec & hucus & aliter magis  
 conuulsio loco hic duximus appendendam, atque sic bulborum huiusmodi firmamponere.

Pemptadis Quintæ Libræ Tertii  
 FINIS.

STIR.

STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS QVINTÆ  
LIBER QVARTVS,

DE OLERACEIS QVÆ AD CIBARIO-  
RTM CONDITVRAM ADHIBENTVR.

PREFATIO.

**R**ELIQA Olerum ac oleracearum sibi sicut multitudine, cerum videlicet quæ ad cibariam condituram magis, quàm ad alimentum naturam facturi ac pertinent. Multa autem ex his locis occurrunt habent, & propriè Olera dicuntur non conficiantur, neque per se sibi que, ut alia Olera plantantur: velut Beta, Braccia, & similia: tantum ab Olerum conficiuntur famulo ac excluduntur sibi que debentur, cum plurimum in cibum usum debentur, & sibi gratia sapere condantur, palatosi vel crassiores, vel salubriores reddant. Id quod à pum, Lappa, Eruca, Nasturtium, fuscusque, & affricum præfert, quæ sola & per se non edantur, sed cibariis admiscuntur: & ipsorum vel quilibet contrahit, in non melius condantur, vel excoctantur prominent, aut languentem appetitum excitant.

DE APIO HORTENSI

CAPVT I.

*Apium hortense.*



**A**PPI genera complura sunt, sed de singulis sicut in agendum, ac primò de hortensi, quod familiarissimum ac ceteris notius est.

Folus autem hortensis Apji palcosi videntur, ex multis exiguis coherens rubus, tripartitis sibi duris, umbra etiam usque composita sunt, male cubito odor, tenuis, aliquantulum strons, in cuius sibi pro culmanibus umbelle floribus parum exiguis, ac deinde semina parua proferit, gustu nonnulla feruida, extra longa & oblonga, cingrata.

In hortorum aris ferunt, calida ac frigida sibi ferunt loca, modò vel humidum natura solum sibi, vel sepius rigetur. Loca siquidem amar heremita, aqua letatur, neque idcirco circa fontem commode procreant. Facilius in palustribus normalis Germaniar: spontè nasci sepius sibi proferit.

Tempellus sibi potest, sed modò riget: aspera sibi proferit ardens ac demum possit calidum altero anno proferit: sibi in vero balo vel Augusto ad mare uentem procreant.

Omnia Apium Græcis *αίαν* dicuntur, verò sibi proferit, id est, Apium hortense: Olfina & vulgò Petroselinum nuncupant: Germanis *Petersilium* & *Portula*: Belgæ *Pensil*: Galli *de Persil*: Hispani *Parsil*, *Salueta*, & *Salis*: Itali *Petrosella*: Angli *Parsil*: Bohemi *Persil*. Non est tamen verum, aut legitimum Petroselinum, quod in petrosis proferitur: unde nomen accipit, & in Macedonia proferantissimum est.

parum rellè odorico ferunt, qui hortensè Apium à Petroselino gemino sibi cultura dicens existimant, & nihil aliud interessè, quàm quòd hortensè in seculis sit, sibi proferit, verò potentius solent enim sibi proferit, sibi proferit esse.

Hortensè autem Apji calida quidem ac resacans est facultas, sed magis excelsam ac sibi proferit.

fructificantes, quod ad ficendum caliditate, & certum fere fecunditate ordinem attingit. In-  
de monstratum crassi caliditatem obtinet.

Folia in compositis frugulosis grassam habeant, per una, vt Plinius lib. xii. cap. xi. lar-  
ge posuere busibus ut in quibus praeter quod grassa lypore ipsa concludunt, ad spandendum  
obstantia, et massis praemotendis, etiam non exiguum conferunt. Quod & radices non tam  
laruacole haud legunt praestant: deinde & eos ventriculosq. gratia sunt.

Scena Medicaria vsa valentia succosus, aperire, vrinam conu. plectiles colicis permes dol-  
entibus, dures & huiusmodi, conuocantur hysterici, mell. i. promouent secundis & viciis mor-  
tibus pulsum, conuocantur & contra veterem tu furo octoginta permutata, aut. necesse  
scitis etiam ad secl. latus, atque idcirco Tithiaci ad infirmos.

Alia l.

*De Sisymbrio, seu Apio palustri.*

CAP. II.

Etiologia.

**P**ALUSTRE Apium folijs leuibus ac respicen-  
dentibus, ac in obliquos portuculas distictis si-  
militer vici, mucositas et & lacrimas quibus  
horrentis caritatu linas in alia distictis, summa  
virgula foliolos candidissimas postquam, ac deinde  
de summa parte mucositas quibus horrentis. radix  
multa fibra cohaeret.

Humentibus locis Apium istud genus nasci pau-  
det, transferunt vero & ad horum.

Cum horrentis Apium vigeret vici altero quoq;  
in hinc anno caritatis affurgit, ac ferens ad-  
fert: que & post solstitium marita sunt.

L'Apuritan, aut potius Sisymbrio: Latius  
palustre Apium: à Cass. Paludaprium. Olli tunc  
ablati Apium nuncupatur: Germana Cys-  
sif. Belgis Cyp: & nonnullis Cossifuritanis:  
Hispaniae hinc Apio: Gallis de L'erte. Exant  
vero hinc & tunc Apium vocis quibus nomina:  
vt in hinc & tunc Apium & Apium nuncupatur:  
Hydroscimona vero sine aquatilis Apium etiam  
à Germana Sum. dicitur vt cap. x. lib. v. Pom-  
peid quare simpliciter.

Ac facultatis ac temperamento horrentis qu-  
dem modis Apium simile, sed & caliditas siccosq.  
& ad pleura efficitur. In cibis autem huius  
notus vici, ne quod condimenta vici habeant  
Medicine autem haud male.

Succus eius ad multa confert, exte rpa, aperit,  
crassa attenuat, obstrudionem tollit, & vici con-  
net, atque idcirco Serapia dicit, que hunc pro-  
mulum habent, vel in Byzantium, iocinonis hincq. obstrudionem aperunt, & duritiam,  
hinc notata, sine quartanis febribus, cum busq. ex causa frigida, cum & obstrudionibus, e-  
nem, atque hinc, ac regio morbo succurrant hinc succos eius tonilliarum hinc etiam magna  
vici cum hordei decoctio, ad duo melle rosacco, purgatam ad hinc in perducit prodest  
vici & cum melle extera vici debet & sordida valentibus cum melle, canis etiam exco-  
miserant. Nam caritatis hinc tunc nequeat, potest tamen resistit, ac siccitatem eorum  
tunc.

semper ad eadem, ad que satis Apium, vici habeant, minus tamen rursus vici eius est: Nam  
omnino morbo obstrudionem, ab hoc ostendunt, vt eu de in bus experimentis eorum pertent.  
Hinc vici, vt Plinius scribit, prima contra animum.

*De Oroscimo, seu Apio montano.*

CAP. III.

**O**ROSCIMO autem, vt Dioscorides ait, caritatis est dolentissimum, ex vici radice pro-  
ductum, circa quem ramuli & caputula (Theophrastus folia): Cactuq. similia, multo tunc  
vici, in quibus caputula ad est, fructus, sine semen, obliquum, ac, rursus, & odoratum, Ca-  
pulis distictis. Et tale quidem Oroscimon in notam hac atam peruenisse non cōtat. Nam  
Cappas non vici Oroscimon esse (vt plerisque videtur) haud est venisimile. Pro Oro-  
scimo

Folium

Orosifinum seu Veiguta.



ta velle & comoda habeatur. Non omnino verò improprie hæc Orosifinum vocatur, nam in montibus, ut dicimus, gignitur, & Apio non dissimilis est. Desideratur semina Camino simile: quæ si habere, Oroscifinum legitimum esse, quis negaverit.

Orosifinum autem, auctore Galeno, facillime Apio simile, sed & valentius. Dioscorides trias, quæ, ut scimus, ac radice in vino potui in multis morbis: antiodora, diuretica, & calfacientibus medicamentis admittitur.

Veigutam radix calfacens & refovens quoque est, & secundo quodam ordine mensis, exoritur, incidit, aperit, in ras movet, calculos dissolvit & expellit, morbos puerorum, ætatis ac feminæ obstructions aperit, turgor morbo stultitatur, manducata dentium dolorem mitigat, ac salivam elicit.

## De Petrofelinis.

## CAP. IIIII.

**D**E Petrofelino admodum pauca Veteres scripta reliquere. Dioscorides semine illud esse Amaranthi simile, odoratioris verò, ac, ac aroma redolentis tantummodo semine: de foliorum forma, forum coloris, & radicis modo nihil. Britanni verò etiam Piram esse. Theophrastus verò ne nomen quidem habet: Apia, Hypocistina, Elsoctina, & Oroscifina tantummodo mentionem faciens.

Petrofelinis  
semine  
Mentha  
Britanni

Pro Petrofelino autem Lactarium Fuchsius odore proprio siuep, non Apia modo (suis ac dissoluta folia, sed et longis & ex nonnullis arborum cœnatis, pediculisq; medio vitæq; cœnatis composita, Pimpinella Saxifraga, etiam que minor est, primis foliis abspicere, non tamen omnino similibus. casu calidioris & calidioris est: Boscalis in vultibus albidis semine subnigræ, Amarij ac horrentis Apia arbutum, admodum odore, nonnullis amariis cœnatis, radice terens, siccata.

Petrofelinis  
semine  
Mentha  
Britanni

Pro Petrofelino autem legitime aliud Lobelius exhibet, à Veteris Macedoniam vocatum: cui folia Apia horrentia, vel potius Pimpinella Saxifraga: casu cubebula: abspicunt vultibus: semine pullum, etiam odorem (ut ait) facultate & virtutibus quàm ferri Apia vident. An autem istud verum ac legitimum sit, nefcisc: sed addit.

In præcipuis locis ac petriosis Petrofelinum gignitur, apud Macedones verò præstantissimum: vnde illi Macedonico cognomen accepit.

A petriosis

felino autem calidioris in nonnullis, quam si. scilicet, etiam Quasi dicit, Veigutam modo appellatur.

Folia hæc sunt veluti horrentia Apia, sed maiora & ampliora, ex multis in verticibus pediculis horrentibus composita. casu cubebula est: folia in medicinis albidis: semine ex gustu modice medocens longioribus ac crassioribus albidis, gustu nonnullis acris, & amariis, ac odoratis.

Nasit in petriosis & montibus Orosifinum Dioscorides inquit. provenit verò & in montibus Veiguta, ut in his qui Silesiam à Moravia, olim Marcomannorum provincia, distinet, etiam & in aliis montibus ac collibus. Mentum verò & collis hæc ad nos misit à Martino Tullimano, qui in montibus apud Eduardum ac Torgro, nunc Leodias, hæc reportavit: homo hæc Tullimani ad Mosam ibidem abbat.

A montibus autem Orosifinum apud Grecos nomen est, quod Latine & olim Apia montanum ac Montanum appellatur. Dicitur verò & idem, ut inter seculares voces reperitur, vegetabile dygion, & Latine Apia: Sed Dioscorides Petrofelinum ab Oroscifino diversum fuisse. Nec enim, ait, Juliacum nos oportet, existimare Oroscifinum esse quod in facia provenit: aliud siquid est Petrofelinum.

Veigutam verò Latine Maliborum que dicitur, hoc enim nomen accepit, quod ad mai-

Pterodilium Macedonicum Fuchii.

Pterodilium Macedonicum Lobelii.



A pterodilium quædam locis *μακεδονικόν* dicitur: Latine Pteridium ac Pterodilium Macedonicum. Officina incognitum est. Hallucinantur non parum qui à Fuchio de pida Amomum esse volent multum enim ab hac differt. Amomum est, vix ex eo apud Dioscoridem descriptio vel luce clarius constat. Nos verò de hac pro Pterodilio amplius sumus, donec aliquis aliud nobis ostenderit, Apes solis similes, & fere vasa, quæ Pterodilium esse oportet. Et potest vel solum semen in hac fœcunda nos ostendere, ad id descriptio respondere vitæ illam magis acce nempe, & quàm Amomum odoratius, aromatisque redolens: non repugnans inter se solis, quæ hec exquisitè ab eorum Apocorum formam non referant, ob eam tamen diffinitis sunt.

At Pterodilium semen, quod maxime usum est, calidum ac fixum est, vix cum incidendi efficit: vitæ & mensuræ contra ventriculæ & colicæ similes, ac tormens prodest: ètymologiam, ut Galenus ait, hoc est, *σταυρωδόν* dicitur. Latorem, retum, & vix doloibus arduatur: miferetur & atrox: Dioscorides.

## De Hippodilium.

## CAP. V.

**FOLIA** Hippodilium in plures lacinas dissecta, Eleodilium quædam simile, sed multò minoris laxioraq; latus quoque, & fere toto colore virens: carlicæ crasis, si bonè cubitalis et umbellæ floribus produentes albidum semen vero crassum, oblongum, rugam, amaricæ, & stoma pedotens: radix crassa, ferè nigrescens, vix alba, Raphanidè & nigra similit, ètymologiam qua valuerat aut præcisa, siocus pro lat ètymologiam, acn amantidine, Myrrham superrefrens, quod & Theophrastus annotatum reliquit: Lachryma ex eo Myrrhæ similes, inquit, desinat.

Apud Arcades, Theophrastus in umbrosa ac palustribus, Dioscorides inquit, nascitur.

Semen altero anno in Belgij hortis nascitur, Augusto mensis.

Amagradine, quæ reliquis Apia superat, Græcis *βερβέρικον* dicitur: à Geta Equiptum. Appellatur verò & *Ολιστρέ*, & à nomine *βερβέρικον*, & *βερβέρικον*, hoc est, sylvestre Apium: Galeno verò, & aliis quibusdam eorum *επιπύρον* est, propter foccum ab ipso proficuum, quod Myrrham, hoc est, *επιπύρον*, ut diximus, referunt. Est verò & aliud Smyrnium Amari monas, de



Hippocistum.



Scymnusium vulgare nostrum.



quo lequante capite. Cuiusmodi Petrofelinum appellatur Macedonicum - ali) Petrofelinum Alexandrinum Germani (Prof. Cyphor) Belgae (Petrifia) seu (Harriman) (Petrifia) seu (Kerckring) Ital) (Macerone) - Hispan) (Petrif) (P. Andromedae) Galli) & Angli) (Alexandre).

Exaltat autem & vilicior Hippocistum fermen ac radix nō minus quam Apij inuenitur ex purgare verò & excrementis codicis veteris cuba & sicca.

Diofcorides folia cum caulibus decoda manducantur, & per se, vel cum piscibus preparantur eadem etiam cruda muna conuoluntidum similitur & crudam & coctam cib, & hirsutis, siue non grati esse. Inferatur item ac mente apponitur, haec enim ante eundem haec radice, accerantur ab ortu locum capiti. Semina namque mentis prouocant, fucundas expellant, fluxus detrahunt, vnam eorum, eiusque thilido amulibus. Menstrua potest, praeterquam ex vino decoctum.

De Scymno mentis Aviani. CAP. VI.

**S**M Y N O S I T huius inferioris ac in radicibus prodestina fistulata & ampla quodam fure, & in compluribus particulis manifestatur duli dū, quare in singularibus bene inuenitur, ab vno pediculo ferē in rura cohaerent reliquis radice, vel in Aristolochia, caulibus ac arboribus, vt per medium eorum quodammodo transire appareant: sunt autem huiusmodi, in quorum aliis comarces verba haec fistulo sedunt huiusmodi in verò rotundo, globosa, Basilica similia, tubisgigantia, atque emulsa radice fōta nigra, odorata.

In Aegypto in monte praesent. in fraxina, & collibus, & arboribus, ac in culmistrata angula, vt Diofcorides refert, nascitur.

Antiqui & illud dicitur: diffusus totum ab Hippocistino, quod etiam Scymno est, vt superius cap. scriptum. In China verò dicitur Petrofelinum nuncupatum fuit: vt Diofcorides & Galenus testantur.

Vitis autem non longē adest à Petrofelinis, Galeno scilicet, abest Petrofelinis tamen ac Apio minus acce. vltimis impeditur, quia videlicet cum molestiam difficiliter digerere verò & quae indurata sunt potest reliqua vt Apio ac Petrofelinis similia quocumque & semina eius vnum ad mensura, vinas, & affluant hanc Galenus.

Vit radice, herba, & semina emulsiuere, radice autem contra serpentium abus tubere conuenit: cassis & arthropodis inuigilantur difficultati medetur: porus abortu vntur si feruentibus febriant. Semen bene, vnum ac vltima vntur prodest in febribus & secundas pellit: peculiariter hydropticis impeditur, & est in febribus emulsiuere. Diofcor. vltior.

De *Apii sylvestris, seu Thyfistis.*

CAP. VII.

*Apium sylvestre seu Thyfistis.*



**M**ULTIPLICI foliorum fistose, utra  
 & magnitudine, *Apii* aliud generi re-  
 fertur hinc etiam simple, in pluresque partes  
 dissecta: caetero vero rotundi, striati, garuculo  
 aliquo articulo, interius concavi, cubitalis,  
 vel albore, ab una radice fistulose bene tenui-  
 ve, inferius fide quandoque obscuri si be-  
 benes. flores in racemula multitudine affudi-  
 tum in rotundum plantam, An eria striata radix  
 in ramulose appendices distibuta in rotundam  
 & obliquam spargitur, interius candida. Tota  
 autem hinc sicut lactis sedenda facta, quae  
 quatuordecim tantum parte valentia, ex ea  
 proficit.

Inter hec, virginis & humidis locis, in  
 fœcibus aquis in fides habentibus, quandoque  
 aqua Alnorii quoque venas rancos reperitur.

Iuno ac Iulio mensibus florat ac semen  
 proficit.

Officina Belgii olim proferam Meum aus-  
 da parant, ac legitimi Mei loco in via habent  
 Germani & quidam Valerio Coulo Ol-  
 denichum dicunt (spasit Belgas à nonnullis  
 Wilde appe, hoc est, *Apium* f. lactis. non de-  
 fuerunt vero & qui *Thyfi* app. id est, Hydro-  
 selen non *sup. app. id est, Apium* normannense Hy-  
 droselon autem, et ante scriptam, & Elecole-  
 hium & Sum quandoque appellatur *Sylves-  
 tre Apium* rectius dici possit.

Mentio sylvestris *Apii* Dioscorides cap. de Duco & Theophrastus lib. vii ubi Apo-  
 niam cum in folia, tum in caulibus distictum consistere refert & quendam caule candido: alia  
 purpurea, vel variegata sylvestre etiam quoddam *Apium* esse ostendit. Nam quae purpu-  
 ream caeteram, aut variegatam habent, sylvestri *Apii* proxima esse refert. Atque idcirco  
 cum *Olmenichum* caule inferius esse subpurpureo, ac folia *Apii* accedente, plurimumque  
 sicut *Apium* sylvestre appellare, quae in eum Officinas in error versari ac pro Meo habere.  
*Pastinaca* vero nunc pro *Plini* *Thyfilio* recipi cognovimus, nec habere namque ad effectus  
 moras, facile quoque in eandem sententiam devenimus praeterquam facit ostendit etiam con-  
 siderantibus.

*Thyfilium*, inquit *Plinius* lib. xv. cap. xi. est non dissimile *Apii*: haec radix purgatio-  
 nis potius, quod & *Olmenichum* radice efficitur, et mox dicitur, *gustat*. Respondet vero  
 à nomine dictum siquidem *Thyfilium*, videtur, quia se per *Thylos*, siue loca palustris *Thylos*,  
 hoc est, extendit.

Est autem huius radix calida & sicca tertio ordine: commendantes multam ex ore pitui-  
 um dicit, & dentium dolores super. Non dubium vero est, quin & eadem extenuet, incidat,  
 supponat: vitis & mentis moras & quae *Apii* genera reliqua, eadem & nec signata, sed  
 tamen efficaciter praebet.

De *Caulibus*. CAP. VIII.

**F**OLIA *Caulibus* sunt aspera, veluti *Pastinace sylvestris*, varisque modis dissecta, mul-  
 tiusque quam *Apii* tritius densa. cauliculis raro cubitalis, in cassi alia vimbelle culmi-  
 naria fistulosis edunt fuscis omentis, albocinctis, exiguos, per circumferentiam tamen man-  
 tes super asperam oblongum, non minus quam *sylvestris Pastinace*, minus quam *Cumini*  
 tibi nullius momenti.

In campis sicut sole in cultu per Italiam frequenter, veluti in Hetruria, occurrunt sepe-  
 ritate quandoque in agris huiusmodi Tracedio ad Mosan, in Tongrorum finibus.

Florant Belgio Iuno sicut mensis: semen deinde succedit.

Cascalia.



Cherofilum.



Cascalia, Græci similiter *καταλί* dicunt, à nomine vero & *κατα* & *λί* esse, hoc est, Dorsum sylvestris & spiritus vocabulis *επί* & *κατα* Democritus *καταλί* Latini *Pes gallinaceus*, *Pes palus*, *Ægyptii Solis*: *Hæmanti* nara *Cherofila* *σταφυλίου* nominant.

Cascalidem autem Dioscorides ubi esse affirmat, quod crudum ac colubam edunt, vitæque moxest. Plineus Cascalidem inter olera quoque enumerat Galenus vero mania, ad hypochondrium, hanc conditi adicit.

Semen autem Cascalidis eadem sit qualitas ac effectus, nec mirum quàm secundario ordine venas & membranas calcules & archas diffoluit ac expellit, hæmorrhoides, leues, & vitæ obstruendum liberat: crudos per nososque hæmorrhoides incidit, & concoquit: ventriculum frigidum adiuuat: fluxus diffoluit: ferus à vitæ frigiditate, acern oculorum intendere, costæque prodele.

#### De Cherofila. CAP. IX.

**C**H E R O F I L O tenuis ac multipliciter diffusis sunt folia, acanthi hirsuta, ex chelo videntur cauliculi breues, teretes, æreos, omniaque cæca, qui vitæ vix eam folia dicitur vixit, sed semper perfectis in herbæ: folioli in latitudine umbellæ albidæ: semen vero oblongum, angustum, acutum, radice fibrata.

In hortis cum aliis oleribus colitur: terra fræcostata, & aliquando iam hirsute lætata.

Vere sanam colentur in eadem affragit, eiusque citò parum idoneum redditur: Sed quod Angli ferunt, per totum subsequentem hyemem, ac etiam frigus, vixit est.

Cherofilum vulgò dicitur, & vi nominis placet, Cherofilum per oleranda sylloge *Cherofilla* vero *Cherophyllum*, sine *gaspilæ* Nominati autem sic putant, quod in his vitæ gaudeat: vel potius, quod gustum ac salutaritatem exerceat. Germani *Kerfelfraut* / aut *Kerfelfraut*: Belgæ dicunt *Irak* *Cerofila* *Stilla de Cerofila* Angli *Cherofilum* vocant.

Non est autem Ginsidium, ut plerisque visum fuit, haud amarum siquidem, sed gustu candidoque sapore commendatum. Orosolium quoque haud est hinc esse certum est, sua mentem, semen etiam non vixit, aut *Cherofila* similia, velum Orosolium esse scribitur. Plineus lib. x. cap. viii. inter ea que *Asiæ* aquinochio feruntur, *Cherofila* meminit, sed quemadmodum *Comenus* admolet, locummodum corruptus est: qui & *Macrocarpon* perit.

Cerofilo Cherofilum inter familiarissimas recipitur: ventriculo ac omni partem est: temperatè exallicet, modicèq; delicias, multoque minus quàm *Asy* genera. Vixit vero nil pro-mouet, & purissimum in vino decoctum, & pati dicitur.

Myrica.



Scandix, Radix Terebin.



deinde calce adamasari, vna vna, neque decoctum sit in huiusmodi. Flum longa in vna etiam aliquid obtinet, quatuordecim & Vena in promouet.

De Myrica. CAP. X

**M**YRICA caule folioſque Cicuta, vt Dioscorides ſcribit, ſimilis eſt ſua vna cum huius ſola magna, ampla, & admodum diſſecta vltima Cicuta, ſed & nonnulli huiusmodi colore verò, ſapore, & edoce Chamaelium referunt: caulis verò quomodoque huiusmodi cubitoſum, crasſus, geniculatus: ſteris in ſymbolis candidis ſemen verò magnum, oblongum, crasſum, nigricans, Cuius in ſua. raris longis, candidis, mollis, quafiſque ſuavis, dulcis, cibus, vt Dioscorides quoque ſcribit, idcirco, ſapore ſine Paſtruce alio.

Fertur apud Germanos in praesidiis natis apud Belgas hortenſis raris modo eſt.

Maior meſe hanc probat: hanc ac hinc ſeruo manere ſolent. radix ſingulis annis primo Vere regenerat, poſt ſemina perfectionem naſtam.

Græci, ut ſiqui dicitur nec aliud nomen apud Latinos habet: nonnulli verò & Myricam aut Cordam vocant, vt inter ſpicas vocantur nomen eſt: Germanus niter & eſſe ſtricti: Boſbanus tunc ſcribit.

Mentur verò & hanc Pitaris lib. xviii. cap. xvi. ubi & Smyrnam appellat ſcribit Myrica, ait, quæ alij Smyrnam, alij Myricam vocat, ſimilitudo eſt Cicuta, caule folioſo & flore, minor tantum & arbor, abo non inſanabile Occurrit verò & in vno huius lib. xviii. cap. xi. ſed in eodem Germano conſiderat, vt Pompeius lib. vi. ſcriptum eſt.

Myrica de aſſe ſola non minus quam Chamaelium eſt ſua, in eorundem ſpeciem quomodoque aſſimilant.

Radix, auctore Galeno, ex ſecundoſiſſime exciſſionem, & tenuitate ſubſtantia ad unam habet Dioscorides hanc in vino potum aduerſus phlegmaticum morbum auctum ſe ſe expurgare verò & mentis ac ſeruidam in ſorbitione verò coctam plethoricis vultus exhibere.

De Scandix. CAP. XI.

**E**X ſylueſtrum obtinetur marisco Scandix eſt: ſolia habet tenuiora quædam quàm huiusmodi radice Paſtruce plures verò carbetur diſſecta, nigriora vero minus ſe odorata, quæ Chamaelium caulis ut diſtinctis: vnde ſe ſingulis: ſiſculi candidi: ſemina longum in macroſum extenſum, coſtella, aut crasſa magis que acibus ſimile. propter vnaque radice ſubſtantia.

In aſuſpergi huiusmodi ſolo eſt: & non raro inter ipſas legetes, non modò in Italia, vna & in Belgia.

Mais ac Junio incassibus principaliter eget. Scandicem Latini appellant, & Germanice  
 nunc vocant, quibus Scandicæ est. Inter notam autem voces reperitur Romanos Scandiam  
 herbam & Aculam vocare. Acula autem à semine acuto uterque specie dicitur. Radices hanc  
 sub Pedibus Venetis vocant detentibus. Apud Hispanos alacubis forum venalis infertur, ac  
 edunt. *Quosdam vocant: Belgæ Passinacem: Angli Dente asbe: & Scythæ huius nuncupant.*  
 Hinc est, *Pianus lib. xxxii. cap. xxxii* ait, quam Aristophanes Europæi Poeta obicit vocantem  
 matrem eius non obsequidem legumum venditasse olim, sed Scandicem.

Scandicæ autem, ut Galenus ait, olusfubacæ est & arvensis, ad id ut in siccardo & grandifacendo aut fœcudi ordinatur, aut terti facinoperine. Cradum & cochum, Dicocon-  
 des ac, manducar. Stomacho & ventri vitæ. Depressi eius vesica, peribus, & scapion cordem.

## De Gingidæ.

## CAP. XII.

## Gingidæ prima.

## Gingidæ altera.



**G**INGIDÆVM, Dicocondes ait, Scythæ hanc exigua herba est, Passinacæ sylæstem simi-  
 lis, tenuis, & amara: radice subterrena & amara. Duo autem Gingidæ nostræ  
 esse censeo.

1. Primum folio est Passinacæ, cauliculo rotundo, striato, geniculato, ac quoadque subdivi-  
 cante, & hastato in ramulos distributo: in quorum fastigiis erunt tres umbellæ, aliquid  
 tri, ut ambientibus foliis separet, stoculos edunt albedos, succederent si mare, quos simi-  
 caritatem petuente, umbellæ similes, et Passinacæ sylæstem, contrahunt, & talis ab-  
 equantulum glutinosæ sentiantur. radix parva & albedo: Amara autem hanc herba folia,  
 tuta & radix est.
2. Alterum Gingidæ Passinacæ sylæstem quoque similes fore, tenentem tamen, leuota,  
 mansuè ptoia hanc apparet variè disticta folia, caulis geniculati sine responderi: foli-  
 culi similes albedi contrahuntur & hanc umbellæ similes manent, quorum pediculi non  
 nihil odorati, ad id dem tandem redduntur, et ad expurganda ea, que dantibus à cibo inhar-  
 cent, identis alparum vicem supplere. Et hanc quoque folia ac radices amercare.

Verumque in Syria nascitur, & per unquam in Cæcis postremum usque & in Hispana ali-  
 cibus reperiri ferunt.

Quod Græcis *Pyllides*, Latine etiam *Gaspidium* est: in Syria verò etiam *Lepidatum* & aliud tamen *Lepidium* est, de quo postea agitur. A Romanis *Bolacatum* dicitur: notum est etiam vox *exere*, tam notissima, apud Syros, ubi quædam vegetagura est: quibus alterum *Gaspidium*, vulgò *Vidanga* dicitur.

*Gaspidium* autem masculinum est, Galenus in lib. De aliment facultat, in Syria provenit, prætereaque non aliter, quàm *Scandix* apud nos *Peripera*. Stomachumque ad modum sanat, his crasum, sine oleo in ipsam mandere velis. *Peripera* autem quòd medicum estum potius quàm alimentum. Secum autem quibus amaritudinem & ad fluxum præ se ferunt: & tempore caliditate in & siccitate caliditatem verò non admodum conspicuam obicit, diabolica autem natura defecit idem in lib. De temp, med se facult.

Discordes eadem quæque liber: Cuius hoc crasum, aut, coctum, coquendumque est: magna stomachi virtute. vnam enim decoctum ex vino potum velicæ prodest.

De *Asparago*.

CAP. XIII.

*Asparagus horrensis.*

*Asparagus sylvestris sive Corallia proci.*



**A**SPARAGI duo sunt horrensis siue stolis vni: sylvestris alter.

Horrensis *Asparagus* casti potestatem adolevit crassus, durus, ac rotundus, baccharia, non raro aliorum multorumque diffusiditur, qui foliis consuebitur molibus, vitibus, copiosis quidem, sed exiguis, & copiosament in his tenuibus. Flosculi secundum vitales exierit minuti, succedunt bacce per transiuentem Corallia similitudine rubentes, rotundæ, Oculi magnitudine, in quibus aliquot nigra semina conduntur: radices sine malis, crasse, molles, spongiosæ, fibre, ab vno capite dependentes, & in omnem partem sparsæ.

Seritur autem in huiusmodi *Asparagus* in hortis, pinguis, humidus, beneque subsistit loca. Hyeme vel siccat, aut *Colomella*, vel eius tractandus, ut siccatuosis plantis manare ad radicem perueniat. *Palladius* solum quæque sterore regi præcipit, sed per dyemen super stramine succendum, & primo Vere collanda.

Congruè verò & huiusmodi *Asparagus* quandoque sponte & circa culteiam provenit, & loci quidem humentibus ac herbosis, veluti in pratis, in quibus hanc præcui *Megastis* sicque se aperiri ferat. Exiguam hic ab horrensi differre, nec ab eo genere aut specie,

Asparagus sylvaticus.



Asparagus sylvaticus terris.



sed cultus tantummodo different est, que speciosa & simpliciter ornata reddit.

Cauliculum in prima tradimento Apuliam sponte, & dum adhuc tenera sine, cruda, sed sepius cocta eduntur, quæ nihil aliud deserpatur in caulem affurgunt: cuius adhaerentibus sub sinu asilans maritimum comæ sponte.

2. Sylvaticus Asparagi caulis ac ramuli sinuum referunt, sed que hinc mollia, tenera, tenuaque veluti capillamenta, acule sylvaticibus, dura, & pungentia (exiguæ hinc & tenues) spinae sunt differentia, verò & inter hos vni equam spinae inopientiam: item varietate punctionis: hæc rotunde sunt, hinc quidem rigis, priori verò circumscissilem foridant: sed hoc ambobus quales sicuti, aut herones patit.

3. Tertium verò & quendam sylvaticum de scribit C. Clusius, acule secundam ramulorum ordine disposita, dura, hinc rotunda, & circumscissile spina deorsum in caulis, circa quæ quina senes colorum foliola longiora, molliora spinae priora sylvatica, que circumscissilem subdilatata sunt, & lenis aliquæ habent. Flosculi hinc deinde & scissile ex longis dependet pediculis carnosis, immo viscos, sed per maritimum rubescens, rotundis quidem, sed tricoce: spicem referens, radix multiglex veluti aliorum.

1. Sylvaticum hinc in prior loco peroris, cum in agris, ac iuxta sepiam Castellæ ac Græcorum negriæ C. Clusio repertus: nascitur verò & eadem in Narbonensi Gallia.

2. Alter in petraulis quoque in Deyca invenitur.

3. Tertium verò in Lusitanis locis subditosa. Meminit verò & sylvaticus in Creta nascitur Petrus Bontionis Singularium lib. primo cap. xviii.

Appellatur autem qui honeste est, Græcis quidem *ἀσπράγος*, nonnulli *ἀσπράγος* Latine dicitur Asparagus Officinalis Spongia, & Spongia Germanis *Spargen*: Galis *Asperge*: Belgis *Simulacrum Asparagi*, & quandoque *Carotina* id est, herba Coralli, à hinc caulis melle, ut dictum est, tuberculibus: Italis *Asparago*: Hispanis *Asparago*: Anglis *Spargen* aut *Spargen*: Bohemis *homerus hinc*.

Per emanentiam autem sine *ἀσπράγος* Asparago nomen datum, quod videtur hinc, nunc quædam emanentia spongia Asparago præferretur. Propter siquidem Asparago præterit gemmenis quoque spongia, præterit inuenitur ac prius quam in caulem abeant dicitur: et

sunt Lupuli primum ramosi, ut in Vitis sylvestris, Basilicæ, Rubi, Oxyacanthæ acida, Sambuci, & aliorum similes.

Sylvestris Alparagus proprie vocatur, hoc est, in multis, & in arboribus vegetis, sive perennis Alparagus dicitur: Latius etiam Alparagus sylvestris, & Cornuta: Citharisma vocatur est.

Recentissimum enim est ut sicut sive Alparagi quandoque in pinguis carum 1816 detrahit eduntur: vel in aqua cocta, cum oleo, aceto, & oxiguo tale occurrat loco indertant. Cui usum grati sunt facile conoq; sive aliam leniter molliam vngas nonnulli promouent: rumbus & velica vngis alimenam vero copon exiguam, & humidam, non tamen viciofam dntant. Semen germinale argere, & ad Venentm excitare existimant.

Radicem autem cum sicut, tum sylvestris Myacanthæ cum manifestam caliditatem ac fontem extingendi vim habent: tenes & acuti ab infarctu liberant peccum ac pulmonibus profant. Decoctum eorum dentium dolentibus medent, Drostodis est.

Commodatur vero & semen ad eadem.

De Citharisma.

CAP. XVIII.

Citharisma maritima.

Citharisma squarrosum.



CITHARIS sive Citharism aliquot genera possentis oblectant.

Primum fruticosam & vndequeque solutum est: caulis quandoque cubitalibus: sicut pinguis, non crassa, in periculis dicitur, quam singulari res longioris quam in multis Portulacæ, gustu cum rorigua salilagine acris acie tenes: a rebelle in lumina culmanantibus foveis profertur candido. Semen succodens cum Libanotide est, & odoratum, res ut quæque radice coherens grati ac incundi odoris.

In rupibus ac scopulosis litoribus maritimis Italia, Hispania, & Gallia nascitur, & abunde frequens est.

Primum in peris in non simile est, sed caulis geniculatus, procerior solis in angustiam sicut, penta duris, duos mactone purgentem ac spinosa. Semen minus est, oblongum, & spinis obtusum. radice oblonga, Passi macer alba sapore & figura, estis opes.

Tertium Citharism complexus ab una radice caulescens proceris, solis circumdat non multitudine, externa parte dicitur, crassioribus, litoribusque quam Abrotani, in quorum

habitu



Gallean Chrysanthemum.



Scirpi fistulosi prius.



HISTORIA

Infusio florum est Chrysanthemum quibus, medio videlicet disco & orbiculato ambitu linearum. Hæc duo genera rariore sunt appropinquat tunc alacris hanc præcipua mem, & ipsorum quidam in Narbonne Gallie talibus locis montana.

Scirpi sunt nigra, in Galieno vero quibus quædam dicitur: Latius eadem varietates: à montibus vero & Batavia Belgii Officina Creta maritima Perso Crete sine Cretam & Iucum maritima Germana Offensibile Inle Formales maritima, Penarbor maritima, Mofa de San Petros. unde & à montibus Sappora Hispania Portus de le mar, Mofa maritima, Penarbor, & Penarbor maritima. Gallia Sardinia, & Franciam maritima Et hæc quidam præcipua nominantur.

Reliqua duo rariore & Cithra sunt: sed recentiorum plerique, alio pertulere conuenientiam secundum, Palmatam maritima quidam appellat: rariore vero, Africa Atlantid maritima facit. Nomen vero, Sicili & Mantua, inter Cithra genera ideo parte magis placet & aliorum quidam Cithram spinosam, rariore vero Cithram Chrysanthemum nuncupant.

Ceterum Cithra vero, in Galieno præcipua est & obliterata. Dicitur etiam rariore, ferrea, & sola vixit incola vixit dicitur in rege morbo: scilicet tradit: mentis rariore & cere. cili vero & eadem & eodem alio modo, cum & in terra alterata.

In terra autem condidit quidamque in Belgiam inferat, quod eodem, velis Capparis cum oleo & aceto mandit. Grati autem admodum eborum condimentum est: vixit oleo bene facit: vocem, hanc, rariore, vixit: ca: prodit: vixit in moderat: proscia: rariore ab obliterata: expedit: apponitiam vixitiam.

De Scirpi. CAP. XV.

SCIRPIUS cuius sunt generis fistulosus & fistulosus rariore.

Sunt prius Rapa similes sunt folia, spemore tamen & rariore: oculis rariore, asper, & hirsuta, baccata vel alio, rariore aliquot baccata, circa quos fistulosi ordine digiti, colore luteo fistulosi dicitur oblonga, rariore, aspera, in quibus fermen globosum, minus quam Rapa, colore luteum, gasta ac se mordax.

Alterum fistulosum folia, rariore caudibus, vixitque aspera, floribusque hanc rariore, sed fermen luteo rariore, sed fermen fistulosum, rariore medulla è luteo rariore quod & fistulosi ad partem rariore aut rariore est.

Spicula à fistulosi rariore: rariore è fermen est: fistulosi quoque luteo fermen, quadrifolij: fistulosi in fistulosi fistulosi, nec rariore fermen, quàm rariore, rariore.

Sunt in agris hortis feruntur. Terra dicitur,



aliquant, ut inquit Palladius, vitam, & si fieri potest congestis, & gaudere humore.  
 Sylvestre vobis sponte nascitur, aspers, petiolis, & rudens locis, quandoque verò  
 raris humicribus.

Primo tempore Sinapi sem potest: Julio aut Augusto semen maturum reddere, perficitur  
 ipsodem eodem anno.

Gracorum quidem et huius est: Atticorum verò ne mo, ut apud Athenensem legitur, *os-  
 ma*, sed *oia* dicitur. Latine Sinapi est: Barbaris Sinapium. Germanis *Sinff*: Gallis *Sinaps*, &  
*mostarde*: Belgis *mostart* sem (quod autem ex semine condimentum conficitur, *mostart*  
 simpliciter appellatur) Italia *Sinape*: Hispanis *Melaza*, *mostarda*, & *me Norda*: Anglis *Mustard*:  
 Belgis *Bohemis* *Sinax*. Plures Sinapi etiam quibusdam Thalsis ab aliis Saxonia dicit referre.

Sine ferum quod latine & rarus Belgis Officinis pro Erosio semine exponitur & ven-  
 dunt vulgò *carica* seu *mostart* sem nominatur, id est, Sinapios albi semina.

Alterum Sinapios nomine cognitur, & ex hoc condimentum conficitur, quo ad ciborum  
 vitium vitatur. Vitrumque autem Sinapi hoc est, & eorum ut nullo est.

Tertium *abromady*, ut dicitur, & Sinapi sylvestre Germanis *Sinff*: Barbaris *stetben*  
*Stetben*: Gallis *Senens* *Sinax*: Hispanis *Melaza* *Sinax*. Italia *Sinape* *Silvestra*.

Sinapios autem semine, quod precipue vna, calfacit, & exen uand, & extrahendi vni  
 labori calfacit verò, ut Galenus ait, & conficitur ordine quarto.

Cum mandacatum primum elicit, & dentium dolores vitrum naribus appositum  
 semper curat, & feminas ab vitro strangulatas exoriat: epilepticos prodest. Lethargicos  
 doli-capite emplatris modo imponitur, cum siccis admixtum, & dolioc locus tu bolar ad-  
 dunt. Ichthodice ad carnes nec duricias ex frigida cum si dolores consistit: conduct quoque  
 vna ex alto aliquid in superficiem strahendum est. Extrahentibus emplatris necnon fe-  
 hem curruantibus vititer admittitur. Alopecias impositum auxiliatur. Suggillata cum  
 Belle, adipe, & cerato dolioc: cum aceto contra lepus & ferus impetigines illinatur: tam &  
 terra serpentum ac serpentum ichus. Reuete Sinapios feruus magna vis est, non modo  
 idem, sed & ad cerebrum vitum penetratur. Quod facile percipitur, quando narium con-  
 ductum ex Sinapios in cibo affumatur, mox enim narium impetu tu cerebro vitum confertur.

Fit autem ex semine Sinapi, quo Germani & Belgae frequentius utuntur, condimentum, quod & Sinapi dicitur, ut plurimum cum melle, quandoque verò & cum vino trahit.

Palladius verò ex Sinapi condimentum componere docet, cui propter acetum, mel & oleum additae. Sinapi semen, inquit, ad modum laxum vasis & semina redigere coramibus pulverem, cui mellis pondus quinque, olei Hispani unam libram, aceti acris unam sextantem mites, & unam crumbidam partem, vitare.

Columella autem lib. xv. cap. xv. modis aliam modam ostendit. Semen Sinapi, inquit, diligenter purgato & contritis dando aqua frigida eluam, & cum fuerit bene lotum, dabis bonis in aqua limbo postea collato, & manibus expressum in mortarium acutum, aut bene emandatum conicito, & pistillo commoto, cum contritis fuerit, totam partem ad modum mortarii contrahes, & compresso manum plana, deinde cum compressis, sacrificato, & impolis paucis carbonibus vitis, aquam nitentem suffundito, ut omnes amantidinem eius, & pullos exasces. deinde statim mortarium erigito, ut omnis humor eliquat. post hoc albam acre acetum adicias, & pistillo permissis, colatoque. Hoc ut ad speculanda optime fiat. Ciceronis si velis ad usum conuivialium preparare, cum exasperatione, nucleis paucis quibus recentissimis, & strygalium adiecto, diligenterque contritis miscebo aceto. Cetera, ut supra dixi, fuerit. Haec sunt Columella.

Eraca sativa.

DE ERACA.

CAP. XVI.

Eraca sylvestris.



**D**VFLEX Eraca est vas hortensis & sativa, altem agrestis.

Caulis cubitalis satius affertur Eraca: folio longo, angusto, utrimque profunde infertilescens: strobilus secundum caules quosdam folios subsistenti semine in filiqua oblonga Rapi ac Napi simili. radice candida ac resiliabili.

1. Agrestis hinc sylvestris Eraca caule, folisque sativa minor est: florem item: filique verò etiam terminata. ceteris respondens.

Sedum in horto colitur, quandoque verò & inter rudera veteris ædificiorum sponte gignitur. Sylvestris sicut vis in multis locis nascitur.

Viget ac florat utraque postquam hinc ac inde mensibus.

Erucam autem Græci *Isopage* nominant: Germani *Kraut* & *Krautkraut*: Galli *Isopage* & Belgæ *Isopage*: Itali *Anchusa*, & *Isopage*: Hispani *Eruga*, & *Eruga*: Angli *Isopage*: A Poëtis quandoque *Herba folia* appellatur. Differt autem hinc herba ab *Aruca* per diphthongum hanc siquidem innotescit, quæ & *Aruga* dicitur. Est verò & Erucæ in solum animal olentibus & maxime Bullis inesse, quibus *Erucæ* dicitur, cuius varias species & metamorphosis, non interit hinc referre.

Facil facit autem ac reficit Erucæ tertio ordine proinde ipsam solam edere, ut Galenus ait, non est facile, nec verò vñ susceptum. Additur eruca in acetaria Lactuæ aut *Ponilacæ*, aliave frigidis herbis, ut nimio frigore per se non immittat temperatissimum aquæ, ut *Pianaredi* ait. Semen generare creditur, & Venenis conchensis esse. Capiti autem dolorem infert, præsertim si quis sola ea vescatur, iuxta Galenum.

Semen eius vitium quoque mouet, & si orponum ac *Ononis* annu venenis medetur. Bisthosæ enim corpori immolentes ac et vasa cutis in facie cura melle albam emendat, lentiginis ex acerbis citantibus nigras eradicit ad candorem eam felle bubulæ *Pianæ*.

*De Dracone herba.*

*Dracon herba.*



PRÆTER HÆC NIMIS, QUAM ERUCÆ, POSSIT. NEC ALIUM HÆC HERBÆ VSIUM NOVISSIM.

CAP. XVII.

**D**RACONÆ dicte herbe oblonga & angusta sunt folia, obtusè videntur, maiora, longioraq; quam vulgare *Hyssop*: caulesque teretes, ac rotundi, cubitalis vel altiores circa quatuordecim pedes rotundi exigui fistulati nunquam inopere patentes dependens in toto agro permixti: radices serpe tenet Germanis modo, qui præparantur ut mulligetur.

In hortis colitur, sicut naturalis quædam forma ferunt: Mirabilis modo hæc, Rusticus inquit, nasci prædicatur, ex semine *Lina*, *Raphani* aut *Scyllæ* bulbo in solo, & in terra obtuso. Mantua factis periculo nihil ferit successisse, æquidivino cog, qui eo modo nasci videntur, sili.

Tota ætas in multum Autumnum vitæ bulbo autem fistulæ facit.

Draconem nostrum etiam appellat: Itali *Dracopis* vocant. Gallis dicitur *Dracopis*, quo nomine Belgæ ac Angli innotuit. Exillimant verò Austriacæ *Tarcon* illud esse, de quo cap. *CLXXXVI*. Sed brevis ad eò de hoc Austriacæ est, & certò affirmari nihil queat. Fertur & Draconæ herba, quæ & *modole*, *Glaucus* olim in vitam restituta, de quo in *Erasmii Chludibibus*. Dissertentem verò hanc à vulgari Dracone verisimilimum est.

Actis autem huius Draconis folia sunt: fistulæ autem in manducantur cum aceto idcirco valde efficacem.

In acetaria autem eduntur non sola, sed *Lactuæ* addita, quarum emens frigiditatem contrahunt.

*De Dracone fistulato, seu Præmaria.*

CAP. XVIII.

**A**D Draconis herbe, si non ab solentem similitudinem, facilitate cernèssimè acceda, a quibus Draconem fistulosum nominant, & *Draconis Præmaria* esse credunt. Cauti- culæ huius cubitalis vel altiores, ad normam brachium: folia concavissimè oblongis, forma & in aperturâ *Oleaginis* similibus, sed thargulæ uterentia. *Stipula* in hinc in vixitq; modo-dico fistulæ, sed circumambentibus plurimis folioli albedi, maiores quam *Chylidibus*, radice multo adhæret fibre.

In magno fistulato, autem & circa margines quandoque agrorum vel prætorum, *Isopage*, vultu- nas facit: ad hoc verò etiam innotescit, in quibus citò multo modoque horridis.

Cum flore Maio, Junio, ac Iulio mensibus viget.

Alvum verò & huius generi habetur, sili quoque oblongis & angustis veluti *Oleæ* & *CO*.

Draco sylvestris sive Parmex.



Parmex Austriaca.



hæc æquandemque cubentibus, fulgante in singulis flori eleganti medicinis inspirandis, medium cuius-dictum XII II aut XV. oblonga obcirculariter cingant foliola, dilute rubore purpurascens, & capsula hoc prodit quæmulo. radis rectam altum descendit.

In campisibus lupercos Parmex sive Austriacæ ac in Mœnibus non ræd occurrat.

De prænomine nomine non omnino concurre. Sunt qui velint Pyrethrum hæc sylvestris alii verò Draco sylvestrisque Taconem videtur esse sylvestre, quod magis placet: Nam Draconem foliis referre possit, cum Pyrethro autem similitudinem habet nullam.

Leonhartus Fuchsius hæc Draconides Parmem esse iudicat: quod non eadem, folia, & flos forma: sed florem odoratu vel acrem esse, vel fermentationem excutit, nondum Belgicæ plerumque. Parmex siquidem, ut Draconides ait, & Jussieu, sive caput est frutex, ramulos habens assiduis, tenues, multos, rotundatos, similes Abrotani, atque circa hos folia oblonga, quælibet Oleæ, multa, in summo capsulatum veluti Anthemidis parvum, rotundam, odore acre & fermentationem excutit. Possit autem in singulis regionibus quædam varietas esse, quæ in calidioribus in calidioribusdem sensu odoratum & efficacior, ut Theophrastus in Argemone. Præterea autem Plinius & Theophrastus non meminerunt, quod inspicionem nonnullis adferat, nullam esse speciem præprodit dicitur, & eandem cum Struthio hæc esse.

*Draco sylvestris*  
& *Draco sylvestris*

Draco sylvestris siquidem generalis voce Græcis dicitur, quæcumque fermentationem excutit: inter quæ & Struthionem. Quod si ita & habet, eademque sit Parmex cum Struthio, sylvestris Draco nequaquam Parmex erit: nam Struthionem speciosa stirps est, caule ferulaceo, tenui, lanuginoso, foliis Oleæ, ut Plinius lib. XII cap. II. describit qualem modò descripta non est.

Alonius Mentzelius pro Parmex quædamque etiam habet, sed postea inusta ferulæ, Fuchsij idem in ampliorum præterea quoque pro Parmex habet, & hæc quædam stirpem esse speciem suam.

Fuchsio autem & viribus Draco sylvestris herentia non est infensior: excalfacti & medicæ pulvis acris & feruens. Adduntur verò & Lactuca alibi acetatis huius folia, quædam singularitatem, veluti Enæas & Draco, corriganturque ac temperant.

De Nasturtio

CAP. XIX.

Nasturtium botanicum.



**A**NOVITA, lacrimata, ac diffusa, non tam magna Nasturtio sunt foliola caulescenti rotunda, pede striato, lobulis primis albidis, duobus vel utriusque oppositis triangularibus, in quibus situm raso colore rubens.

In herba ferunt equosque solo possunt, perferunt si rigetur.

Quod ut anno tempus, exceptis hyeme, ad sanonem eius com modum, colligitur crassam cito quoque in caslem aduritur, ac semen perficit quod tamen ferus sicutum sit; postea cito atollunt.

Græci *καπύσα* à quibusdam de *καπύσα* dicitur ut inter nostras voces habetur: Latine Nasturtium proavali verò nomen, à Germanica & Gallica appellatione, voce *Cressa*: Germanice *Kress* de quibus tres Belgis sunt de *Westerkerke* Italia *Nasturtio*, de *Agrorum* Hispania *Nasturtio*, *maritima*, & *mesaria*. Gallicè *Cressa*, de *Cressa de Jorda*: Anglice *Garbs* melle: aut *Cressa melle* Bohemice *Westerkerke*.

Nasturtium autem Latine appellatum, ut Vitro & Plinios sinitur, a multis scripserunt, quodque odore & semine acrimonia strumatum esse patet.

Nasturtium autem herba acris & mordax esse potenter adeo exaltitans ac effluens sed minus tamen cum ad huc vitæ & venellæ est, propter aquæ humiditatis admixtionem acrimoniam eius obtundente, adeò ut cum pane veluti obduntum, ut Galenus ait, hoc vel licet: veluti non tunc apud Belgas, qui Nasturtium cum pane & butyro comêdunt. Mox frequenter vel citius. Accidit verò de radice, veluti Draco & Eruci: atque hanc curâ maximè ferunt. Facit eadem in quibusdam locis, quod Germani *Scotatum* appellant: nec minor est huius, quam vel Cochlearis, aut Nasturtij equarum, in hoc morbo vis & facultas.

Semen Nasturtij multo acris est quam herba: calidè & dolicoat ordine propter modum quanto: adhaerens facilius pariceps, & inter rubescencia sua *ποσφαισ* non postremo illi loco proinde ad concidit dolores, aliisque vitæ, qui rubescit postlonga, dampnabile. Laxam cum melle impostum extenuare & replere Drac: ut: Cum loco autem ac potentia ichthyodis auxiliatur, & de melle ac inflammatione discutit: lepra & impetigines absterge: furunculos, quos Græci *ἀθήρα*, cum myria ad suppurationem dicit. Scabietibus admixtam que althæmæis exhibetur, crasses thoracis humores velenter incidit ac edicit. Strumæbo autem, referente Drac: de, munitum esse alium in turbis hæmorrhoidibus, beneam immixtum: mensis de- ferens enocæ vitæque caritatem.

Ex alio delapsis aut præcipitatis dantur confect: sanguinem coagulatum dissolvit, & ac stibis in corpore coacti aut coagulati præcacti: sudorem crassi movet, & intractatissimè experientia immixtam ac comprobatur.

De Barbarea.

CAP. XX.

**B**ARBAREA Rapsam ac Napam folia emittunt, que tamen lanosa, ac nitris aspera sunt. caulescens, striatus, cubitalis, quæ modo ferè ad suffragum usque non ipsi quam tunc ramuli flores prominent lætes, ac filiquas oblongas, teretes, in quibus singulari & colore rassis semen. radix medicocetes crassa & oblonga est.

In campis ac hortis in quibus olera ferunt, cum & alibi, veluti ferus Eritæ ac viæ quondam nascitur.

Tota hyeme vixit flores mætas, lunius semen largitur.

Germani *Sant* *Dabm* *Westerkerke* nominant, Latine *Barbaram* idcirco vocantur Belgæ

Barbata.

P. barbata.  
L.

Thlaspi luteum.



Thlaspi alabastrum.



Quam tenuis dicitur, hoc est, Candarrum sine Na-  
llutina, hyemal, quod videtur Nallutii loco  
accarias hyeme addatur: à nonnullis vero &  
Pomerani) à facultate qua adterius calculum  
pellere fertur.

Diacoridii autem - J. d. Aphalus, hoc est, falsum  
Barbaram esse videtur. folia simpliciter & ramulis  
cum Barbatae filiquis Nallutii, & gustu ac-  
er, quale Pteridobitum esse ipse scribit. Nō est  
autem Salsina, ut aliqui etiam species, vel Sen-  
pa nigra, ut nonnulli vident.

Conteritur Barbata valde emulsi facta ac mō-  
cat, utpote saporis acris, & Nallutii facilius as-  
similis est. Acetum vero & additur, hyeme per-  
feram, cum Nallutii copia dicit: in quibus  
quod aliud potest.

Medetur vero & eadem Scorbuto nonnullis  
quāsi Nallutina. Semen admodum quasque  
acris, calculum ac ficcum, adeoque terram pan-  
num, ut verus ducere, & colicentem calculosis  
hamulis dissolvat ac expellit.

De Thlaspi.

CAP. XXX.

**T**HLASPIORUM tria generis nosse observa-  
vit aza.

Primum laticostibus est foliis acris oblongis,  
vetroque margine nonnullis incisuris, cuius pedem  
alio non oblique adnotis nonnullis, circa quos foli-  
culis primum albidis, postea vero planis rotundis.





Tilafpis magradine, in quibus semen simile acro veluti Nasturp.

Hanc vno & speciem quendam flosula in umbellucandulis, veluti Sambuca.

In Persiana Imperio, Aethiopiaque dicitur, locis incolis, & locis vasitare nascitur.

Julio et Augusto mensibus florere ac semen profert.

Græci Aggale dicunt, vel A'gale facili sapientia & in A. Locus Arabi & Drabo à Plinio lib. xxvii. cap. 12. Dryophoron: vulgè Tilafpa Candia.

Feracius gustus, ac potenter idem excalfaciens humorem visum quàm Tilafpa feracior est. Admoneo verò adaptam ardentem obtinere, maxime in Cappadocia, Descendunt herbarum verò viâ compulsum coqui, cui mœchia ad crudorum humorum perfectiorum tantum concoctionem & expurgationem confici potest.

De Inoen.

Inoen Erysimum.



CAP. XXIII.

**I**n hoc solo ab utraque parte profundas incisuras vel potius Sinaps referit, caducatum & parum rariore hinc, locis admodum ac obliquissimis, ac bestis facit, quibus adhaerent flosculi hinc, ac deinde stragulationem, cœcum oblongum, gracillimum quàm Fœnogræci, in quibus semen exiguum veluti Nasturp, fermentationis gustus.

Locus ferax, nec non ruderis, locis ferax, a hincque inculta ac desertis, subinde nonnulli in membris reperitur.

Flores & semen & hac Julio & Augusto profert.

Inoenem Græci Inoenem vocant naturalis verò & parvitas. Chamaeplum: Dicitur autem item ab aliis à Dioscorido: Thapsophila autem aliis dicit Erysimum: aliis videlicet quod Descenderet Mœgiam appellat, ut lib. 1. cap. xxiii. quare Pempt. hinc in partem est. Habacuncum autem non parum, qui Inoenem Verbena speciem existimant, & Verbenam feminam nominant.

At Inoenis semen fœnugula Nasturp apparet simile, ita, Galenus ait, & similitudinem quoniam est & excalfaciens: est verò & firmi corporis. Facit autem ad thoracis rheumatismos, suppuraciones, tussis, aliorum, & coarctatum dolores cum melle delictum. Vbi autem in eclegitate vti eo expediat, praestat aqua mœchicam refrigerant, aut lacteo insolentem, & massa pilosum obtinere possunt.

Bibores verò & adacris moribus venena, addit Dioscorides, quod cum aqua & melle compulsum in modum impolsum oculos proferat canera, parvitasibus, duritie, & minime tum rellumque inflammationibus.

De Hierac.

CAP. XXIII.

**M**VLTI scribitur tamula à cubitali caudiculo prodeuntibus lœva herbarum: falicci parus, oblonga, angusta veluti Nasturp: flosculi secundum ramulos albedi, exiguique valde, in quibus semina, radii longa, seu sim. attenuatur, inter fœnugula candida, sapore acro.

Intra vides in montes, & montis sinerum in lœva alba que prodeunt: apud Belgas non nisi hœntis est.

Græci Hierac: & quidam Hierac à rœntis & Galeno rœntis à Plinio Locus Hierac, Nasturpium sylvestris, & similitudinem etiam Lepidum. Aliud rœntis & Lepidum hœntis est sibi Firmianum, possumo capite describendum. Exstat autem verò & aliud herba est Græci dicit, de quo Apuleius cap. xi. curam dicitur hinc vni quoque est commendata.

Herba autem ex quarto est ordine excalfaciens, in lœva Nasturpium in odore, non gustum virtus, & dicitur eo de fœnugula Galeno.

Radices, inquit Dioscorides, excalfaciens & adacris, que vultus cum pinguedine per-

Recti.



una salis copiosissima in modum schandalis  
horum quatuor imponitur, si deinde in balneo  
defecetatur, & postea loco oleo cum lana per-  
ungatur. Quae & sanis à Democrito aliquot  
causibus explicatur apud Galenum lib. ix.  
De medic. secundum locos huiusmodi extantibus

*Herba haec ubique multaq; frequens nascitur,  
& Marmaricae insulae, antiquae, maris & tertiae,  
Triaeque, quosdam publici pedibus vas,  
Quae incola aratram ducit haudqua agricolo,  
Semper virens, folia Nallurij  
Plerumque Fere, etiamque marioribus,  
Caulem cohaerens longitudine peris  
Fasce murem aut rursus amplexum, ab hac  
Acute pendens folia, densis multis hirsutis  
Serratisque delectat haec ad nos, quaeque, &  
Duvilla & crivata deperit gale.  
Adhaec rari tamen cornu alio.  
Acute flores fert colore lacteo  
Mulum truncum variumq; valde costulatum,  
Ad quem separatur frons perennis sic crispata,  
Fisum ferè ut fallax, aculei quosque effugiat.  
Ovarium habet rubrae et vultu carminum,  
Fere similes quibus maxime Nallurij,  
Hanc aratam laeva sara capi cepit  
Aculea, nam cauc optima & feracissima est  
Adhaec rari, scias si sed debitor,  
Tusum haec proli, (nam dissimulat mundus)  
Fava fabellaque, teropes arantia,  
Cicutis, rari & maxime cavendae*

*Adhaerens, & ligata, & fides dea  
Hinc muremibus, vasa sed quatuor,  
Hinc balneo insidulis, vix vix extinguit,  
Hic singulae vix pinguis talibus,  
Sedore sed medicis exalente, in saluum  
Morge, subeno perferre, nam mordacitas  
Ingeni, caleris sinis etique exaritur.  
Fertur hinc regata leniter productis,  
Ileri enim quomodo maxime fiat plurimum,  
Eratit utrumque sua pedibus oleis  
Quaeque crivillam herbarum suscipit,  
Ad murem oleum, murem hinc rari maxime  
Et carantia, & illi hinc laticis.  
Ac max murem rari & pinguis talibus,  
Tusum rari vix murem in vellembus,  
Subeno hinc effusa vix murem,  
Quaeque vult, & non grautum suscipit,  
Hic murem rari etque murem murem  
Et murem adhaerens in foveis indigum,  
Quae debet abhaerens color caliculis,  
Cicuti beneficio ubi foveis date est.  
Quod si tamen inde effugiat murem  
Quoddam sapientia, post rari hinc praesidium,  
Dicit ut murem dicit hinc praesidium.*

De Lepide Pinnata. CAP. XXV.

**L**EPIDIO haec folia sunt oblonga, lata, & cetero virentia, Laminitissima, mollioraque,  
Laminata vero etiam cretensis caules cubito altiores, perennis, ac lenti, quorum ramuli huius-  
modi adhaerentis caulis, foveasque erigunt, radix alba, sicut & non nulli progermi-  
nans

Lepidum Hibij.



Capsicum oblongioribus siliquis.



mansuetum multiplicat, veluti Rhiophanda  
Elegae.

Apud Belgas veremur fuerit sibi optum in  
hortis requirere, in quibus ditissime radix vigeat  
ventrosa in nem amat loco, & nō oritur arida.

Vere folia erumpunt. Luto ac lilio appa-  
rent floreat.

Distenditur rhad Lepidii à Plinio lib. xii.  
cap. ix. Exa, aut, in cubentem stridit in folia  
Lanones, sed mollioribus. De rruo idem & à non-  
nullis Raphanus hylae frus, aut potius Raphanus  
hlyocelen stem & Piperis Ell rarian Piperis  
enaro Capsicum, de quo mon. Germani Pich  
frivent nominant Belgae *Pepersum* Galii *Pep-  
siger* Angli *Tommarum*.

Huius autem folia, sed præcipuè radices,  
vehementer quoque exsiccantur, repositen-  
tada & acris gustu.

Incor vitæ, inquit Plinius lib. xii. cap. xvii.  
intelligitur. Sic & in facie cu rruo emendat cu-  
ulcerando, vt tamen cura & rosacea facie fa-  
nerat. Sic & leprosi & plorati tollit, dispersibile,  
& curat nec vitæam.

De Capsico. CAP. xxv.

**C**AP. xxv. v. m. proinde Capsicum vira-  
cium, nōnulli stratum, cubito quodamque  
longioris folia oblonga, ut in scilicet, luto, hor-  
tulis Solari ferri similia, sed angustiora, ac ma-

Capsicum recanda Elegae.





Pseudocyprium.



**P**SEUDOCYPRICUM aliis se fru-  
ctibus est quibus Cyprium : caulis eius  
quandoque bicubitali, lignosus, ramifica-  
tus oblongus, lenticulis, laevis, longioribus an-  
gustioribusque quam horticulis Solani : Flores  
candidi : trachus rotundus, rubens, dilutus  
tamen qui in Cypriacis in hoc plantam  
nullus aut vagus gustus.

Peregrina, et in strype, que se in sili-  
bus à Belgis alitur. Dicitur tamen à re quibus  
Cyprium vitæ esse, & plantis suis topen-  
esse potest, si hybernas mensibus à frigore  
evadent.

A Cypriacis similitudine Pseudocyprium  
nomen invenit : Sunt qui Solanum va-  
brum, aut Solanum lignosum esse velint :  
Sed Solani non est spongia. Hispani *Guan-  
dardi las Indas* appellant.

Tempore autem Pseudocyprium cum  
Cypriacis non consentit : non exsiccans  
siquidem est, sed refrigerans. Quæ autem  
præterea eius sint facultates nondum ex-  
ploratum.

LIBRI QUARTI PENTADES QUINTA  
FINIS.

707

# STIRPIVM HISTORIAE

## PEMPTADIS QVINTAE

### LIBER QVINTVS,

### DE CARDVIS

#### PREFATIO.



ARDVORVM varia est materia, ad Oleum generi referri potest: Cinc-  
 ra, Scalyon, Carthago videtur ad multo utilia medicamentis conuincuntur. In-  
 ter medicas herbas Cardus etiam Prandii locus, veluti & Eryngio, ac alia  
 nomina. Vnde autem creditur Chamaeleon esse.

Cum igitur ad vnum aliquod genus, vel classen aliquam à nobis colligim-  
 us referri hoc de causa requiritur, nec separari eas conueniat, in quintum ba-  
 sis Pemptadis librum digestus, veluti Parergo, veterum historia subsumimus,  
 quae in hunc recepti, stirpium eorum historia, quae ad barbarum consue-  
 rit, suam impo-  
 nunt. Reliqua enim sexta Pemptas fructus & arboris praeparat ac praescribitur.

### DE ACANTHO.

#### CAPVT I.

Acanthus latifolius.

Acanthus spinosus.



**A**CANTHVS duo generis vnum aculeatum & spinosum, vnde & spinosus, alterum la-  
 ue, spinosum, quod à similitudine cum prore Acanthi quoque nomen & appellatio-  
 nis recepit. hic hircensis ac sinensis, ille sphaeranthus.

Sicut Acanthus amplex, laticus, sub hircensis sunt folia profunda ab utroque margine, &  
 hircensis ac sinensis, nec quae mediocriter affurgit caulis, caulis, compluribus  
 lobis à medio caule digestis adornatus, colore candido, forma oblonga, quae duobus vel  
 quatuor

macamentis, uno superiore, altero inferiore nutrimento. sequuntur valvales, in quibus firmam latam, radices firmi ingrant, etiam candidae, lentiusq; succo plenas, an plures distinet utriusque pinguis, quae vit late superius, quae subinde progerantur. Tam pertinacis autem hoc fuit vis, ut quae vultu non potest eam veluti partem superius non interdum progerat.

Sylvestris Acanthus caulis, subligo acuminato, floribusq; caulis, horum coloris est, sicut, et in de firmis. Quam referit, sed tamen beator ac humilior. folia similia et ampla, raris in hinc latiora, sed haud quaquam laeva, vixit frequenter aspera, data sunt circa marginem crepidules horrentia.

Sacrum Acanthum Dioscori permissis, supra, ac etiam in hortis natis tradit: in vrbis Germania nemere fuerit alibi quam in hortis acquere.

Sylvestris in maritimas quibusdam Italiae locis reperitur. Huius foliorum, flores, ac semina iam ad nos in Belgiam multo Clariflorus vix Alfonso Patreus Fernandus Ducus Medici, & simpliciter ac. Modicum, dum vixeret, proficior.

Vixitque Acanthus alibi in floribus mensibus semina sub Autumno perficitur. radice scilicet, subinde in hinc hinc in vrbisque pens Germania, si ingratior fuerit.

Græci *ἀκανθός* nominant: Latini nomen ferunt: Acanthus tamen generaliter omnem spinam significat: Per Annoniam autem abo Acanthi nomen accepit.

Sacrus sine horrentis Acanthus *καθαρός* quoque appellatur, & *καθαρός* Galenus, Orribus, & Plinius in duobus: Plinius vero & hinc Acanthum leuiter nominat, ac operum & vrbis iam vocat esse referit. Dicitur à quibusdam Branca vrbis: alij Spondyliam Branciam vrbem vocant: Itali *Acanthe*, & *Branca vrbis*: Hispani *perna spinosa*.

Huius Acanthis folia in epistolis innotuit, ac alibi operibus, potestatem etiam arua veteris scilicet perit innotuit: in vrbis alibi Virgilius vel epic referat. Baccorum Ecloga vrbis:

*Et nobis idem Alcimedea das pœula fecit,*

*Et molli carum est asper implere Acanthe.*

Item & Theophrastus Erythra primo:

*καρπὸν δ' ἀσπὶ δίκῃσιν ὀξυκάρπῳ ἀγροῦ ἐξέρχεται.*

Alter Acanthus spinis horrentis *ἀκανθός*, & sylvestris Acanthus nominatur. atque hic proprie *ἀγροῦ* sine spinis dicitur potest, quo nomine Acanthus plerique dicitur reperit. Est tamen & alia Acanthis frutescens, cuius, ut Hierodotus & Theophrastus vrbis, *λεχόχρῳ* quædam est. ad cuius fortassis differentiam, Herbicantibus hoc Acanthi genus *ἀκανθὸν* dicitur. Reperitur & inter Acanthi appellationes Mammolarum vrbis, tam & Crepule, sed casu, sylvestris an fano, debeatur, non expressum.

Ceterum Acanthi fano folia temperate in calidi & frigidi medio quasi consistant, nonnulla humidis, emollientibus ac leuiter digerentibus facultatem, veluti Malus, obtinent. Eorum tamen idcirco non minus quàm Malus vrbis incoquantur. Radix, auctore Galeno, refrigerans magis est.

Dioscorides ait, ab igne vrbis & luxuriam agribus his impositis sub herente: potest vrbis conne, & aliam vrbis inupta, conuulsis, tabidusq; potest. Profiant autem vrbis sanguinem in vrbis, tam ex alio delapsa, ab vrbis, aut conuulsis aliquo supra vrbis lesionem, quam Symphiti innotuit: radice, quas sub hinc, lento succo, & qualitate potest vrbis.

#### De Acanthe. CAP. II.

**A**CANTHIO magna, longa, lataq; fuit folia, vrbisque vrbis disticta, & acris diciturque secundum marginem crepidules spinis horrentis, que molli lanugine tote candidare, & quibus medius caulis affligit potest, supra duos coloros alios, ad hinc membra innotuit ac spinosis capitula similia spinosa, ac acris in caulis ac hinc vrbis emittit: flores ex multisque potest coloris hinc vrbis, hinc potest. semina innotuit potest: vrbis, sed longum, glabrum, dicitur pumice coloris, minus quàm Castanea innotuit, dicitur, ac lignosis, ab eis non delictatur.

Nascent in vrbis Germania locis vrbis, tam & alibi.

A fano in Augustam vrbis floret, altem à quo emittit est anno: interea & firmam vrbis conuulsis, quo innotuit potest, vrbis potest, & alij Cardus, quibus non delictatur est vrbis, quàm ad firmam vrbis potest vrbis.

Hinc autem & firmis Cardus, folia quoque candidare vrbis, & secundum marginem & vrbis spinosis, sed innotuit vrbis, vrbis potest ac non ita dicitur lanugine vrbis vrbis alii vrbis potest. capitula innotuit quàm vrbis, longioribus pediculis innotuit, & innotuit vrbis spinis horrentis. flores purpurei ac flavissimi sunt, veluti vrbis.

*Acanthium*

*Acanthium album*



Habetur autem iste Carduus pro eo, qui Graecis *ἀκάνθη* dicitur, quod Dioscorides foliis de his per extremae rotas aculeatis, & arsis oleo lanae pro obdolis, ex qua collecta de meta velles similes hom bycuis parari quosdam Germanis *Wolfs* in grae Insulis Belgis *Wurtes* in Galli *Chardes* a graecis Anglis *St. Japhet* vel *Carus Japhet*.

Dioscorides, folia vel radices huius ad remedia Opisthorici bibuntur, ut Galenus excol-  
filiaria facultate hanc esse, ex eo ferunt.

*De Cardus Leucographus.*

Cap. III.

**S**UPERIORI Acanthio foliorum magnitudine non cedit Cardus Leucographus fo-  
lia siquidem eius magna, lata, ampla, ambitu crenata, multis utro ac aspera spiculis spi-  
rita, velum Acanthij, sed laminae caetero, omnino glabra, dilato venata, nota ac li non va-  
riolibus usque candidis ac lactis coloris maculatae caulis albus, digito crassior: flores e capi-  
tulis spinosis ita sunt ac colore purpurei semen latius simpliciterum Acanthij simile.

In horris in quibus olea feruntur, non raro & locus vna loca incultis erit.

Flores semendque fieri eodem quo Acanthiam tempore.

Vulgo Cardus lacteus, & Cardus Marie nunc sparsim Germanis *Wurtes* in Galli *Chardes* a graecis Anglis *St. Japhet* vel *Carus Japhet*.

Leucographus autem haud improprie dici potest, à candida foliorum nota ac linea  
Mariani Plin. lib. xviii. cap. xi. Leucographus herba, sed quia ea sit non expressit,  
difficile ad rem facit hanc eam Cardus Leucographo eadem esse asserere. Existimari se-  
ritur Cardus esse Spina alba, Graecis *ἀγρία ἀκανθή*, quae à *ἀγρία* differretur, & *ἀγρία*  
spina vocatur citi *ἀγρία ἀκανθή*, *ἀγρία*, *ἀγρία*, *ἀγρία*, Cardus ratipterus vocatur, *ἀγρία*  
ab Aralybus Bedeard sine Bedeard Maritimo Syllabico esse. Describitur autem hae spina  
à Dioscoride foliis Chamadromi albi angustioribus & candidioribus, *ἀγρία* in graec subli-  
terata autem eam Cardus Leucographi non sine legitimum Spinae albam esse, non sine  
eius corollae.

Ceterum Cardus Leucographi folia tenera, dempsit spina, aliquando odoribus non in-  
com-



Carduus Leonopetalus.



Carduus sphaerocephalus.



construere ad hunc ad que propria villa, incognitum est.

Galenus Spinae albae radicem desiccatoriam esse inquit, & modicè adstringentem, Cardium & dyu rancorem ad eum adunare. Sanguinem recedentem colicis hinc de terra extractis de natura desiccata esse, si decocto man collaturus. Semen eius tenuis essentia ac calida facultate esse, itaque potu daturum conseruare in qui conuelluntur. Diacordides autem epotam ferre conuulsis infantibus, & à serpente demeris laborantibus, & postquam pro amulca, tunc serpentes abegit.

De Cardus sphaerocephalus.

CAP. IIIII.

**S**PHAEROCEPHALI nominantur complures Cardus.

Vnus eorum est praeter folia lacinosia, magis longa, latius, profundius uersuta, quae laciniibus, superiore parte uentibus, inferiori uero emulsiuibus ac longiusculis. Flocculi è globosis & absoluitur ueranditans capitulo in caliculis rursus subijunguntur uariis, & raris, flammis in medio carales. Semen oblongum, uariis habentum, medietate longiusculum. crassi & crassa radix.

Alius acutus Sphaerocephalus folia habet minora, ac fronsibus uariis quos globosis, sed quibus, praeter flores, longe quidam & dunt emittit spura.

Carduus sphaerocephalus minus.



Ternis primo forma figurisque firmis, sed longioribus, & tibi ubi erit ad circulem magis accedunt collocant.

Mixtura est quarta, foliisque acutissimis ac spinosissimis capitulis exiguis, cuius flosculi, ut prius, albi sunt.

Rexum hinc & alius quidam posse videtur, sed tamen capitulo miris globoso, compresso, & delictis ac superius latiore, quo flosculi carules, ternis, hinc causa est, exilibus laminae ac conductis sola oblonga, vixque similitur locum hanc dicitur, & ad singulos angulos spina munita.

Stat sporae nam in Germania Cardus est non reperitur. Memini vero eam hoc vulgo in hinc Penn Coudeberg Pharmacopon Antuerpensis Prior vero & in aliorum hortis frequenter sem folis.

Invenit Fuchsius quandoque Chamaleonem nigrum facere studuit, sed postea relictis tentis, Spiritum peregrinum nasci cepit. Valerius Cordus Spherocephalum appellat, hinc oratione, & reliqua idem nomen, nam orbiculatum sphaera inftar capitulum habet. Quamquam autem plerumque esse voluit, quem Martholus pro Spina alba proposuit.

Operum de temperata & facultatibus Spherocephali Cardus nihil compendii habet.

De Eriocephalo Cardus.

CAP. V.

Cardus Eriocephalus.



**E**RIOCEPHALVS Cardus capitibus affurgit crassis & albis, folia eius laciniata, magna, spinosa, prima parte candidiora capitula rotunda nigra, tenui, candida, molli, latragine conestruuntur: circumcibus viderique exiguis progeneribus a. u. l. s. superius vero flammis purpureis floebus. Semen splendens & oblongum, ut multis Cardus.

Abunde in Belgium hinc venit fertur copiosius. Hispanie in multis locis reperit, sed tamen breuior, humilior, ac minor, quam in Germania inflexione hinc, in quibus locum hinc, aliter autem ostentat amplius valeret.

Eriocephalus, à capitulo latro, alio destitutus nomine appellatur. Videtur normalis esse, quam Harpato frater Virevicetanus & Angolus Pales Franciscanus similiter fratres Coronam fratrum nominari referunt. Sed ab Eriocephalo multo in differe hinc Cardus est, ut ex in, quod de Corona fratrum ab ipis scripta manifestum. Quae sic habent: In consilio Regis Aragonae, versus Regnum Castellae reperimus aliud Cardus genus, quod capis oblongis ut in vasa semina, & in in hoc campo no loter.

Quod quidem habet folia super terram expansa, similia foliis Castulae. Caret caule omnino, & producit capita plura, taliter ordinantur composita: videlicet vasa magni capite, echino munito simile est in medio, ac in medio radii annexum, & circum circa ipsum cetero, no-

tem, vel doctum, & aliquando plura, passimque capitula. Nunc legimus & amplius magnitudine sic conuqua, quod vnam tangat hinc, omnia ad terrae ad hanc, &c. Et dum hanc effodimus ex ipis plantam vnam, transiens quodam rusticum inuestigamus, an hinc nomen illius plantae. Qui vulgari suo idiomate nomen indicat, idem est quod Latine Corona fratrum. Quod nomen nobis visum est non difformem esse rei. Quae caput magnam sicut tanquam pater capitula verò tanquam filii, & frater in modum coronae fructu in dicitur ipsum partem, &c. Denum effusa ex parte radice, bivali gressum habens, tenax, alba, & cum quodam ad fructum secunda supposita: haec illi.

De Eriocephalo verò facultatibus nihil quoque adferri potest.

Cistara.



**C**ISTARA nulla quidem modo genera sunt  
nam scilicet & spinosa (Carduus vocatur)  
non nisi de generis Cistara esse ex eisdem signi-  
ficatis signis hinc utriusque tam spinosa quam  
non spinosa eruditur.

Folia autem Cistarae ampla, magna, oblonga,  
& lata sunt, profunda incisione ab utroque latere  
lacinata, spinis carum non aut contrariè pectus obita-  
ta, vnde cum in colore cardui carum: cardu-  
bus minor, falgido fructum proleat globosum,  
Pectus vero multo firmius, ex multis videretur com-  
positum squama, quae fructu grandiore fado dis-  
solventur ac suspensae vixae, autem vero ac in-  
ferius caroliz sunt & albidæ: pectus vero se  
& ipso cono flos proleat flavicentia ac falcen-  
colore elegantis purpureum. Semen oblongum,  
muru & crassius quam Cardus. Leucographi,  
mollibus ac lanosis pilis falcibus, intra fructum  
concreta: radex crassa, medio dicitur lignosa.

Cardus utitur spinosa Cistara à prore non dif-  
fert, nisi quòd foliorum huius omnia angulæ, ac  
coni squama, dura, pungentibus spinis armata.  
vnde & Cardus nomen merito accipit.

Colitur autem Cistara in horti-theoracum  
& solutam terram diligit, quamvis & in pauci-  
posset melius provenire.

Serenda est circa Calendas Martis Lata in-  
cente si sen potest semina in arborum semina-  
da dicitur, non alitè impetenda sunt, sed semina  
digna comprehensa incipiant, donec ad primas

arculos terra pervenerit: tunc lentius terra operantur, & herbis liberentur affidat. Caca-  
mina semina non si contraria fuerint sparsa carobunt. Circa Calendas Novembres, (vel etiam  
circa in Germania) plura deponenda, multo q̄, carere serenda: sed etiam generis huius  
huic alieni videntur aptissimi. Singulis annis cui dicitur inferenda sunt plura: sed sibi-  
les, eam aliqua tamen radice parte vellente, quæ circa Autumna æquinoctium deponenda  
sunt, Columella & Palladius auctoribus.

A cinere, quo serentur amat, Cistara dicitur Galenus *Trigonæ* quoque Græci appellant, sed  
per e brevissima syllaba: Indis *Carcass*, *Archevinda*. Hispanis *Archevinda* Galis & Belgis *Ar-*  
*chivinda* vnde & *Archevinda*, & *Archevinda* à nonnullis nuncupatur. Germanis *Archevinda*.

Spinosa Cistara non modo vulgè, verum & à Palladio Cardium vocatur. Italia *Cardi* (Hi-  
spanis *Cardi*: à Galis *Cheradi*. Scythiam autem hinc esse Dioscoridis, Leonharto Fuch-  
sio, & plerisque aliis visum fuit. Scythiam autem Dioscoridis folio est Chamaeleonis aut Spi-  
nae albae: cuius meliorem folio, capite spinoso, Cistara autem huiusmodi non est, & nec  
illa quidem quæ spinosa. Nam tumens capite spinosum illi, conleum tamen non habet meli-  
orem folio, sed sibi folium viduum, vel vno aut altero tantumdem folio ornatum.

Cistara

Concreta magis Cistara cum eo qui radice à Theophrasto ac Plinio dicitur, tamen per  
terram repentes caules à radice non emittit, folia habet lata & spinosa: dicitur autem sine  
radice conleum, foliorum in medio colliculis esse, & fructus, excipitur cum lentore laniginis,  
vel condus, quodq̄ tubis, Palma: cerebro tenent aliis hanc inferens. Quæ de Cistara Theo-  
phrastus & Plinius referunt.

Quod autem de caulibus scribitur non in terram à radice missi, qui est sine radice, for-  
tassis foliorum sine caule, quæ solentis verumque foliis adhaerentibus (quæ admodum non-  
dis inferantur) valem referre possunt. Nisi vel in Sicilia, ubi tantum Theophrastus autem non  
colitur, & caules quosdam *Fraxine* sicut in terram prostratos, & aliam erectum quoque  
prostratos potius vero in Italia aut Germania, non folios *Fraxine* alios emittit dicitur.  
Solum quidem ac eorum ad stuprum in utroque non plerumque possunt, non modo Theophras-  
tus auctor, sed & ipsi verum experientia ostendit. De Cistara vero hinc Theophrastus.

Tales

*Caena* in Sicilia tartaro calcatur, statim à sudore exolevit: remota procurubentes emittit, solo lato atque spacio, caules de squamarum cibo aliter sunt, paulatim amaranthos, qui in mari afferuntur quæcumque aliam verò & caulam producit, que in *Alpibus* vocant, et quoque cybo aptus, sed refrigari nequit, *Alia Alpibus* sunt fructus spinosus fæces, excipiens longimodis fructibus, vesicando est, & Palmae cretae hinc similes, *Agrostis* appellant, (Pitaris Alcaham leges) *Asteriscus A. molybdæ*

Ipsos autem *Caenas* fructus exerceant squamarum vagues, hoc est, infirmos albedi analiterque pariter, tum & ipsius modis dicitur cui pappo in fermen insidet, & cruda cum pipere & sale, frequenter verò cum pappo cum camomili sate addito pipere decocta, odonem, ac acris dicitur habentis galicij venenosis, incantamenta. Sic & foliorum medicæ spinæ sine coctæ culture man gomo casidie teneris, felle magno apparatus, mensis vna cum bellonia inferuntur in and unatur verò sale & pipere addita veluti cruda *Caena*, Vnaque autem pro- ut sunt succa.

*Caena* siquidem succum in se continet biliosum copiosissimum, substantiam verò habet densam, sedco vt ex hac succo melancholicæ, ex illo verò tenuis ac biliosus gignatur: ad- dunt Galeno in lib. De alim. facultatibus. Pariter autem ipsam etiam mordent. Folio- rum autem coctæ omni modo dicitur substantiæ, cruda & melancholicum succum corpori conferunt, & fluxum multum obtinent.

*De Cardo Chrysanthemum, seu Pelyone Theophrasti.*

CAP. VII.

*Cardus Chrysanthemum.*

*Cardus Chrysanthemum altera icon.*



**CHRYSANTHEMO** Cardus caules à radice subinde completæ effracte rotundi ac teretibus, folia autem hos conuoluunt oblonga, pulchre virentia, vnaque latere profun- dè utriusq; ac spinæ per angulos horrentia. Flores à foliorum alia è paruo acantheo capitulo filioi pediculis, Cichori floribus persimiles, sed non colore later, larum, quamvis gustacumq; similes non magnam, nulla lanugine impletam succo dat, radix longa, digitata, crassifradis, fæces ac mollis, esuq; adonem, que & fieri dicitur. Efficit autem ex hoc Cardo, quo- tumque parte vulnerata, albidus & lacteus succus.

In Belgij hortis faciem cognouimus. Petrus Bellonius in Creta frequentem esse referit.



Colerix sive Leucacantha

Carlinasitum



Alteram verò & Carlinam recentioribus facturæ & Carlinam hancem, vel muscicam appellat. Fallitur autem non parum, qui ambo ad Chamaeleones referre student: In Italia hujusmodi, Germanis aut Gallicis usquam Chamaeleones nascuntur, ut vmas proinde hinc, restis est Petrus Bellonius h. b. singularium primos qui quantum discernimus inter Carlinas & Chamaeleones sit, sine ostensa, quod & ex Chamaeleonum subséquente descriptione manifestum sit.

At Carlinas radix, cuius præcipue usus est, secundo ordine suis in usum exactissimè & cum potum ac subtilitate tenuitate, tertio ordine reficim. sudores verò etiam motus ventris tunc ac lumbicos pellit: veneni omnibus relictis: pestis contagia non modò auerit, sed & eandem curat si tempestivè propterque commendatam dentium dolores sedatiocinens ac hinc obstructions aperit: vmas citè: menas promovet: hydropicis confortat: datur & ex alio delapsis ac curis.

Aquæ huiusmodi de Leucacantha Dioscorides habet: Leucacantha, inquit, prædita est radice Cypero simili, amara ac fœta, quæ commendatâ deorum dolores sopit. Dioscoridum maxime veni cyathis tribus auxiliatur ad quædam ventris lacorum dolores vel hanc radicem, ruptas ac tenuiss. Siccata verò & eadem potiss. eponas.

De Carlinæ sive Carlinæ. CAP. IX.

**C**AVLUS colligit sylvestris Carlinæ dodrantali vel aliove in ramulosa quot distributo: foliis oblonga, marginibus aspera ac valde spinosa, Carlinæ amara flore è spinosis silicibus capsulis medio stamino, ambitu verò foliolo subsilicibus circumscriptis, radice tenui, & acre ac sicca.

Pulsam locum carlinæ ac deserta per venamq; Germaniæ, & quidam in montibus asperis, Hinc verò & alteram quandam speciem Carolus Clusius describit, castaleo vmas, ac tu, hinc, & palmarum non superant: foliis spinosis vel acipitoris, sed minoribus, vmsque laminae quadam sicane foetibus: capsulis ferè bonis, siccis modis hincque pallentibus, siccis verò circumscriptis rigidissimis ac luteis radice tenui ac melleferæ.

Hanc in arida, petrosa, ac desertis quibusdam circa Salmaticam Hispaniæ vrbis se tempore memoria præbuit.

Cactia (fleur-de-lis).



Cactia (fleur-de-lis) minor.



120000

Germani *Drei hübel* *französi hübel* & *Erant hübel* subinde nominant. Belgæ *Tagg* *tschell* *Vulpe* non incepto *Cactia* *floribus* dicitur nam flore *Carlicam* *extrahant*, nec folia valde diffusis est. Hanc autem esse *Acacia* curio est difficultas affirmare, quò because de hoc *Theophrastus* sic *Aurum* hanc *Cineo* veritate firmi, colore flavescens, facco *perpetui*. *Defertur* autem *Acacia* ab *Acacia*. *Acacia* siquidem, ut *Helychian* ait, *Isopodis*, hoc *Laurus* est. *Sed* *Acacia* *dignitas* *Acacia*, id est, *spina* *striga*.

Escalpacianem verò & hanc esse, præferunt *radice*, *apoc* eius acrimonia *participat* *indet*. *Sed* cum nullus sit usus, *facilius* eius reliquæ non *explorare* *solent*.

De *Chamaeleon*, & *prælio* de *albe*, ex *Dioscoride*, *Theophrasto*,  
& *alio*. CAP. X.

**C**HAMAELIONS duo sunt vires candidæ nigræque. vires radicantur si distent & ipse radice specie differant, ut *Theophrastus*.

*Chamaeleon* *albus* folia *Solyis* aut *Scalyris* *amphoribus*, & per terram *fitis*, *crassioribus*, *asperioribus*, & *validioribus*, quam *Chamaeleon* *nigro* *capite* *caret*, *sed* è *medis* *foliis* *caput* *promit* *manis* *lichino*, *Cruas*, aut *Acacia* *simile* *illos* *purpurascens*, qui *castoreo* *in* *pappo* *concreta*: *sermen* *veluti* *Cinci*. *radix* *magna*, *crassa*, *in* *latis* *collibus* *ultra* *hæmæ* *crum*, *interius* *albida*, *valde* *odorata*, sic *viscosa* *facile* *cameram* *aliquam* *totam*, *caput* *interim* *aggrasans*, *adimpleat*, *sapore* *verò* *dulcis*. *Sub* *hæis* *foliis* *circa* *radicem* *gemma* *reperitur*, *quod* à *radicibus* *Crocis* *libus* *non* *aliter* *mandatur*, *quam* *in* *Chio* *ab* *alio* *Metho*.

*In* *Creta* *insula* à se *reperitur* *Chamaeleon* *albus* *Bellarius* *prodedit*, *ut* *quam* *verò* *in* *Italia*, *Germania*, *aut* *Gallia* *in* *procurant*.

*Pinus* *gummi* *circa* *radicem*, *maximè* *circa* *Campela* *exortum*, *reperitur* *est*.

*A* *Crocis* *gemma* *radice* à *nomine* *verò* & *ipis* *Laurus* *Chamaeleon* *albus*, & *hinc* *Gummi* *tamen* *sic* *Vitæ* *propolis* *hinc* *derunt*. *Noctis* *ve* *radicem* *ac* *ipsum* *voctus* *per* *alio* *est*, & *Cindus* *faunt*. *Extant* & *inter* *caulimodis* *voctus* *apud* *Apulicum* *cap*. *et* *sed* *meliorum* *Carduorum* *inter* *se* *constitit*.

*Vocant* *autem* *hanc* *Chamaeleonem* *idem* *ait* *prop* *ter* *foliorum* *varietatem* *Quod* à *Floribus*

scilicet xiii. sup xviii. affect: Moxta enim, inquit, cum terra colores, hic nigra, hic variis alioque coloribus, alioque exocentis, atque alias coloribus. quod Dioscorides de nigro legitur scriptum.

Porro Chamaeleonis albi radix temperamento calida est & sicca, ordinae ad minus Scordilide. Hinc, inquit Dioscorides, scytopia anulara latera lambecos pellic. sinterda autem cum uno solum aut Origanum decocto: hydropicos drachma commode in vino datur, etiam cum cistaceis. Contra difficultatem urinae decoctum eius propriatur: cum vero autem sumpta Theriac est, hoc est, ad cholera omniam & vulcerum animalium morbos & alias remedium. Oculi autem canes, sicut, & nares cum potentia, addens hydrozoos, fistulae.

Radiceem, inquit Plinius, eius aliqua coactum leman habent barocula pendentem, deo-quantur: in cubo contra Russicis, quas Graeci Rheumatismos vocant.

De Chamaeleon nigro.

CAP. XL.

Chamaeleon nigro Coroni.

Chamaeleon nigro Salmasiacis.



**NIGRA** Chamaeleon folus est. Scolyta minoribus, tenuioribus, & rubes diffusis cau-  
lis didrachmatis, digitum crassis, fibrubens *scilicet* sine virella iam proficit, in qua flores  
spicis, conces, carulis hyacinthini coloris: sed et vero crassa, fons nigra, densa, inter d' exis-  
que defecta interuise il colore fistula, manducata vero mordicat.

In Lemno, inquit Heliconis, valde communis, vbi tam eleganter cerealeum florem pro-  
ferat: et coloris pulchritudine cum ipso caelo certare, & Cyanus florem cum sito collatis, paucis  
videtur. Nascentur & in campis iuxta Abydum, & prope oloniam Helleponna, & in Heracia  
Thracie.

Iconem autem Chamaeleonis nigri coloribus expressam abito ad me misit Magnificus vir *Chamaeleon*  
Iacobus Antonius Cortusius paterfamilias Patavinus, sed hoc crassa ac nigra, inferus in pinna dura *nigro Coroni*  
nata per summa capillata: foliis oblongis, versisque valde spiculis: caule tuberoso, in alas  
quidam d'anso, vni bellis fistigantibus; o quibus flores e partibus vireantibus acantibus capitu-  
la, dilatae purpurei rubentis coloris.

Accedit vero haec icon ad descriptionem propositam, nisi quod flores non depinguntur  
tametsi hyacinthini coloris, quales esse Chamaeleonis nigri non modò Dioscorides, sed &  
Nicander



Nicander in Theriaca testatur, in quibus nigrum Chamaeleonem vocat, à florum tempore colore appellat: nisi fortassis ob cubicu abortivum coloris flos citius stat. id quod distictorem vocat. ad post. Cassiòdorus subsequenter ostendit pluraque suspensurur, sed hoc non verisimile. Nam dictio *Chamaeleon* varietatem significans cum *Chamaeleon* colorerit, non nisi certam varietatem ostendat, quae modo remanere siue à junior, alio in ventore esse potest.

Morari verò & in hortis Belgii olim hoc speciosum quendam humilem videtur Carduus Chamaeleonem nigrum nomine: folia haec numero tria longa, & angusta, valde spinosa, dilate virentia, quasi cascadenae facile seriate, pedem alto, in capitulis duobus, quorum subsigae occurrentibus coherentibus folioli & spinosa acutis prodeuntia, colore purpureo: radice nigra ac dulci. Describitur hoc à Clusio in sua Hispaniæ itin. observatoribus Chamaeleonem solum mentionem nominat à loco in quo ab ipso reperitur. In agro siquidem Salernitico si frequenter hanc esse ait. Verum hanc non esse Chamaeleonem nigrum sicut mans testatur, nec Clusius quoque affirmat.

Sed ut ad Chamaeleonem nigram reditum faciatis dicimus hoc Graeco *χάμαλεων* id est à nominis verbis & inter notia reperitur *χάμαλεων*, *χάμαλεων*, *χάμαλεων*, *χάμαλεων* Romani Carduus niger, Veronago.

Radix autem huius testulic quiddam, ut Galeus ait, obrinet. Numeratur verò & inter delictoria à Nicandro in Theriaca à Dioscoride lib. vi. & à Paulo Aegreæ, quatinobrem & ad externa tantummodo adhibetur, veluti ad pitoria, hebetas, ventrigas, & in interna ad ea que detentione potu in praeterita digerentibus & emollicebus ad tractat, Galeo auctore.

Eryngium maritimum.

De Eryngio.

CAP. XII.

Eryngium campelle.



**E**RYNGII TRUNC. Dioscorides meminit. Plinius lib. xxii. cap. vii. duo videtur agnosce vnum in asperis natum: alit nam in littoribus maris. Poster non verò & plura sunt obliu- utamur in quidem vnum: campelle verò & aliud deinde & alia quaedam spura.

Martino Eryngio lata sunt folia, Maluceni ferè similia, sed marginibus angustiora, & magis spinosa circumscripta, prope, à casto candida, gustu aromatico: caulis crassus, dodrantis altus, in scissis subinde nonnullis tuberculosis cunctibus verò capitula profertens spinosa ac globosa, quae ferè magna tudine, sicut ut plurimum spinosa foliolorum caulis subsigae orbiculati



*Eryogonum spectabile* Gray.*Eryogonum parviflorum* Chapm.*Eryogonum planum* Muhlba.*Eryogonum quadrang.*

folia hinc ab uno modico longioribus pediculis ternis vt plurimum cohererent, sub-quina, angusta, oblonga, dura, dilatae in membra, vnaque margine ferre modo incisa, lapae: foliorum Eryngij: cuius cubitalis, ramofus, gemmularum diffolens proferit trifurca, in quibus foliola, aciemina dicuntur parua, longiora figurae, odorata, & aliquantulum acuta, radice alba, potius, digito tenuior, gultu incho dulcis, postea acere quid dicitur testis, & non ingratum redolens, quae reserata admodum in vobis confirmat comestitur.

In plantis campetribus hinc procul Praga in Bohemia reperitur nascitur & in Flandria quibusdam subalio.

Spura autem hinc sunt Eryngia, ac posteriori observatione: idcirco & nulla eorum vetera nomina.

Primum Eryngium Boeoticum, aut non spinosum appellari potest. 1.

Aliquod Maritimum Plantam vocat, alij Alpium Eryngium dicere solent. 2.

Tertium vobis Pamphum narrantur. 3.

Quarta Cardium generibus affingit Maritimum alij vobis Eryngij, quod nobis probatur. Odore siquidem & sapore non Cochlearium, sed Eryngium refert. 4.

De facultatibus autem horum nihil afferendum in se offert, cum in me dicimus vsum nullum habere nisi herbuarum, nec inter edulcia numerentur. Sed tamen ex aliis tractat esse vel folia lapae ostendit.

De Cardus Sclero.

CAP. XIIII.

Cardus Sclero.



**STELLATI** Cardium, nuncius Cardium appellatur, no scitur tamen spinos, quoniam in folio capitula gemm. folia eius vnto oblonga, didrachma, mollis lanugine hirsuta, secundum margines grandibus incisis laciniosa, inter quae cardiacis cubitalis in alar-quam plurimum distit, foliis vntibus oblongis, hinc minus, numerosis capitulis, quae longe, acuta, distansimque spinae in modum radicibus hinc ambiant: foliis caputibus, postea radix & tenuis est.

Est passim in Zelandia & aliis maritimis circa Antiochia frequenter reperitur & in Germania, Italia, ac alibi locis vna.

Iulio ac Augusto passim cum flore viget.

Nomine Stellatam vocant: Cardus Polycanthus, sed tamen vntibus hinc vntibus, Theophrasti (Gaza Aculeosam vocat) fortassis ab hoc distet. Falluntur autem qui Eryngium, aut aliquam eius speciem esse arbitrantur. Maritimum Caluaris in Italia dicitur: Germanis Wollensfeld, Nabensfeld Belgis Aculeosam: Gallis Cochlearis trapp.

Facultas autem hoc Cardus calfaciens natura est.

Semen ad vntes difficultatem commendatur vntes: & calculos expellit feruor cum vino exhibitur.

Repetita Sardus equam ex hoc Cardus distillatam vntibus affert hinc venere infestis

lecur item huius vntes adiuuat, obstructions eius tolli, sanguinemque à vntibus humoribus emundari, & aduersus diuturnas febres, sine quotidianas, siue tertianas, vntibus exhiberi.

De Spina Scissili.

CAP. XV.

**SPINA** Scissili Cardus scissili autem quaedam species esse videtur: neque etenim alia. In quibus circa capitulum spinosa est, spinae eius stellam quoque digeruntur, castes cubitales in ramulos paucos qui in Scissili distribuantur: membranaceos secundum longitudinem appendices habent quibus quadrangulares appaent. folia longiora sunt, incana, ab vntibus parte profundis scissilibus laciniosa: foliola ex flammis componit lutes: flammae caputibus, radice oblonga acuta.

Iuxta Monipodium vulgarem esse Galienus scribit.

Spina Solitaria.



Spina Solitaria obesa.



Solitaria autem Spina dicitur, quod solitaria a ligno florat, Ge. sicro autem hoc: vel potius quod post solitum spinae eius maxime pungant: alia eius nomina, si quaerit habet, incognita.

Facere haec videtur & alia laeae luteae nomine descripta foliis utrinque profundius lobatis: floribus luteis capitulis spinosis: sed pascor minus, & ca. oblongoque membranis appendicibus. Haec autem in Salernitanensi agro ita invenit, arido solo, & se septem Clivis scribit.

De fiscalibus haurum que incomperae fact, nihil adferendum.

De Dysfaco.

CAP. XVI.

**D**YSPACI generis nostri duo sunt: scilicet unum utriusque alterum. Non utrumque nisi culturae haec mangonia differunt: Laticora siquidem quae escoluman, & vlturiamensis vltion pleraque modo solent.

Aculeosam autem generis Dyspacis quoque est. caulem editi rectum, prostratum geniculatum, & spinae horumque folia & singulis articulis bina, non modo contra se posita, sed & caulem ample circum, firmoque coalita, usque ita cohaerentia, ut exigui lateri modo totum imbricantque plurimum conserant, longa subtus haec sunt, dilute viridis, & Lactucaefructa, sed marginibus spinosa, dorso vero emittunt duriuscula: nam spinae rugosiorae scoposum fastigium oblonga occupant capitula, mordacibus spinis echinata, mucronibus lamellosum inter seclusa, & quibus hostali candida, frequentius quidem lanuae, sed detulsi purpurei siliaculi. firmis succedunt feruacali, gustu amaricante: mallebant per veruularem capitula, non spina per mediam folia subinde paruis quidam verrucisali reperitur. totis cordata, medio crongradina.

Nonnulla locum in agris Dyspacis ferunt, cuius echinatae capitula vellenti ad tudes paruas excolendas habentur, qualem spinae ac extra culturam nati. Nascitur vero spontanea in usorum ac scrobium margines, humidos ac madentes tractus sequitur ac diligit.

Præter veruulata ac tectum huius generis ostenditur prioribus foliis: atque scilicet aculeato simile, sed procerius ac altius capitulis veruulata scribitur ac rotundioribus, magis radice videtur tantummodo macis.

Repositum

Diplazis fœtens.



Diplazis hirsuta.



Diplazis torens.



Reperiuntur verò & istud, præsertim in Belgio, humidis etiam limatibus, ac inanis fructus & herbæ aqua habentes.

Junio ac Julio Diplazis florit: octavam capitula Autumnò colligenda sunt.

Appellatur ætiam Diplazis Græci sinesiter *Διπλασις, διπλασις, διπλάσις*: Latini verò etiam *Labrum Venens, Cardus Venens, Diplazis* ætiam quasi sic cyathicæ, quòd aquam in cothæreum foliorum sive connectat, quæ ad hinc innotas abegenda vocatur.

Labrum verò Venens à foliorum etiam potius, pelus vel lousen speciem consistente, humorem perpetuò concremento: Vulgò *Virga pæthoris, & Cardus fallonem* - Germanis *Kardus dipell, Dabersinn, Dabersinn*: Belgis *Carbus Venens* tantum Hispanis *Carducho, & Cardo pæthoris*: Indi *Difaco, & Cardo*: Galli *Chardon de foalton, Perge à herpès*: Anglis *Tall*.

Nominibus verò & aliis appellatur, sed sparsim ac involuntariè, et sunt *agrostoides, zosteroides, bozoides*.

Tertium genus Plinij *Galedragon* esse non omnè existimatur, de quo lib. xxvii. cap. x. *Galedragon* vocatur, ac *Xenocentris, Lencicithis* similem galestrum ac spinescens, caule feraculo, alto, cui summo capite inharerit, sim de quo. In hoc consistente etiam verrucas nasci videntur.

Quartum *Diplazis* eandem quædam in medicis

na virenti. Capita, ut dicitur, ad interpositendum lanos parvas videntur, sedis adque di  
à Diocoride commendatur. Galenus a secundo ordine excoriatum hanc esse an, habereq;  
nominali obferentem. Diocorides in vaso decoctam & usam ad ceris crassitudinem, n.  
in a fistula, sedis inpositam sicut re referre quod autem extra pyram medicamentum hoc  
debet ac potenter dicit sic macis ac vergetis panibus remodis esse.

Quæ autem de vernacula in Cardus capitulo reperitur & appetit præterea additur,  
& simile quod de Galodragone Plinno, non refert huc transferri, non enim nisi vana sine  
sunt augr.

De *Atractylide*.

*Atractylis*.



& modicè digerendi Galenus tradit Coram fermen, & solis, Diocorides ut, utra accumpere  
& vaso pota, à Scopione idè auxiliatur.

De *Cardus benedictus*, aliis *Atractylidis specis*.

CAP. XVIII.

**CARDUS** benedicti caules teretes, lævis ac obliqui, & in alis nonnullis effusi, hinc  
accumbunt. folis viximque laciniata, in racemibus aculeis per margines spicosa lævi  
capitata in summis virgulis acanaceis, spinosis & pungentibus foliis ac aculeis spicis, quibus  
flos cinctus lævis: fermen oblongum lupenari barba modo capillatum, radix alba in fibres  
duratur. Tota herba cum folis acanacibus, nec non capitulo, mollitudo que lanugo con  
tegitur, & gustu amara est.

In Lemno Mediterranei maris insula loca campestris frequenter occurrunt Petra Bello  
no teste: quod Germanis & Belgis, tum & Italice Gallos ita dicit in herba ceteris.

Ita ac Asculis florit, quo tempore ad medicum vitum maxime colligenda ac upa  
mendus est.

Cardium benedictum passim vulgè nominant: Officina Cardobenedictum composita  
dicitur. *Atractylis* dicituram esse speciem, ut ante dicitur, sicut in antistano Nam quæ  
hinc *Atractylide* Theophrastus, hinc ad hunc. *Atractylis* sine lanugo mofa est, ac *Atractylis* lanu  
gulaque per totam copiantibus: fermen barba modo hirsutum, & amara sine folis. Quan  
doque & à nonnullis *Atractylis* hirsuta dicitur. Valdeque Cardus Cæcum sicut in 1870.

Cardus benedictus.



Cardus.



Ita Germani: *Weyßkraut* (bifid) *Kardobenedict*: quarum possessio, vox enim, Belgis innotuit: Hispani *Cardo santo*: Galli *Chardon benedict*, *ou benedict*: Bohemi *Kard benedicti*: in Lemno *Cardobenedicta*.

Vetus autem amara *Cardus* laetis herba est, itaqueque acrisalfacea ac reflexa ordine secundo, & simul expurgans ac aperiens. Venenis omnibus visis, & peccatis vobis modis auxiliatur, si compressis propinetur curas & quantas, ac inexteras ac durissimas alias si bene viderit, hepate, ac lienem ab obduralioribus liberat: ventriculo, quem bilis infestat, conficit, eiusque dolores, praesertim vino ventris superueniente, sopor: verum lumbicos auerminat ac capillis totum sedat: sudores tamen et vrinam cum nephritis, ac calculo superdeest: nec ac laterum dolores mitigat.

Optimum autem herbae decolium ex vino si fibros addit. Datur & arida pulvis cum vino. Maxime efficax aqua est per organa deblillata extracta. Constat tamen per se, ac rebellis vicaria huius decocto aliquot diebus usum procurari quoque affirmant. Prodest verò & herba resissa ampolla, vel succus eius. commendatur & eodem usurpata modo ad necis vultu cruentum animalium morsus ac sicuti cum & assumpta.

De Cirso. CAP. XIII.

**E**X Cardiorum & Spinarum numero etiam Cirion est: folia eius oblonga, lactuceque si similia, verum acuminata, & per circumferentiam aculeata, candidiora, longioraque quam vulgaris *buglossi* caulis recti, bicubitalis, in alas nonnullis discretis, quorum singulis capitulum eminet spinosum ac hispido, quod post floris vigorem deorsum reflexum natat, tandemque in papposum lanuginem resoluuntur. floris purpureo subreolore. Item in laeae respiciendos alioquin multorum *Cardiorum* instar.

Semina verò & haec nonnullis aliae Spinae, quae ad *Cirsi* genus non ineptè referri posse videntur.

Vna folia est Cirso nigrosibus, per circuitum feruorem alius tenetis floribus purpureis: capitulo Cirsi, quod etiam aliquantulum reflexum. Aliter haec spina est, & caulis eius membraceo appendicibus angulosis.

Altera folia est spinosioribus: foliulis coloribus, sed tribus quarum deue vincta, quorum in membra capitula non reflexiora. Hanc pro *Cirso* Martialis deponisse videris.

Tertia tota sua saepe magis spinosa est: folia profundis incisus scissa, diffusima & acutissima spinas horrent, colore viridita, medio tamen candicante nervo: capitula natant quoque foliulis purpureis: caulis crassi, membracei, & angulosi.

Nascuntur quaedam horum plurimis per Germaniam



marium lactucaculis quidem, non raris foliis ac radicem, ac lecta vias: quaedam vero in maximis, vti in Zelandia, Flandria, ac Hollanda, vti in Germania litorea.

Florent omnes mensibus æstivæ quaedam citius, alæ tardius.

Huiusmodi Spicam Græci *σπικα* appellant: Latini eadem voce videntur: alijque vero etiam, et inter spicas vocant, Bregeliam magnam, & Spicam mollem vocantur.

De facultatibus autem Carli nihil apud veteres scriptum reperitur. Andreas quidem, qui super multas & mendacis in medicinam versatis, ad hanc adstringentem varicam dolores ledere scripsit, ut Dioscorides refert.

*De Carli, quæ Casperides appellant, recensio.*

CAP. XX.

*Onopordon.*



*Leo, Carduus ferox.*



1. **I**NTER omnes spicas & Carduos spinosissimus hic est: caules eius prædictis, & à foliis demissis membranis angulosi apparent: folia vniuersa profunde lacinata, multis val cum caulis horrent spina. capitula spinosissima, et squamis multo compacta, quibus flores purpurei veluti alba, vult alba. radix fere recta, sed non alio descendit.

Peregrinus ille Carduus Belgicus est. Onopordon herbarij appellat: Plinij tamen est: Onopordon affirmat acquiri nihil etiam apud eum de Onoposon forma.

Formas etiam Acinos est, quem Bellonius omnium carduorum spinosissimum refert & in Creta hac ætate *Aconachium* vocat.

Pars autem de Acano à veteribus profusa extant: pauciora vero etiam de Onoposon. Certus est Acanon spinum esse, quem Onoposon.

2. Hinc vero & ille accedere potest, quem Lobelius ab Italico Leonem & Cardusum ferocem dei Enbat: ab infestissimis quidem ac durissimis spicis, quibus cretus rotundat, cardiacus eius brevis, vix palmum æquat. floribus cretus acris, acce pallidè luteis, veluti Amygdala, longis, duntaxat ac aculeis circumambrentibus horrens.

Fertur in ardua nonnulla collibus haud procul ab Apennino monte, in Italia quodam, sed tamen tardè reperiri.


De reliquis *Sylvestris Cardui*.

CAR. XXI.

*Cardus sylvester primus.*

*Cardus sylvester.*

*damata*  
*ant*



**S**PERANTUR vero praeter eos quos hactenus descripsimus *Cardus* & alij *Sylvestres* non modo in Belgio, sed & alijs occurrere.

*Primus* super *cabularem* aut *epedalem* altitudinem raro affurgit: caulis procerus complu-  
ca, nec rufus, albus multiterminalis: folia *Acanthij* acuta, sed minora, nigrescensque, & non la-  
nuginosa, in fastigio *caulis* locum spinosa crebra (inter caespitem prodeunt, a quibus flores  
eleganter purpurei exsurgunt, qui in papposura lanuginosa tandem committuntur, semine abo-  
turo limbo relinquunt. radix ex multitudine commissa est.

*Alter* esse affurgatior, sed de *bacubitali*, rotundo, minutissimo, pascuibus folijs 2.  
concessio, quae sicut proceri spinosa ac modica sunt, sed minor & angustior, caespitia  
quoque minor, oblongior, non usque adeo spinosa. Flocculi purpurei in pappo abeunt.  
radix nigra ac pedem longa.

*Tertius* altitudine, alacritate praesente, nec non & folijs, acem & floribus secundam refert, p.  
sed caulis multo spinosior: & radices nigrae fibrosae.

*Passim* locis vasis ac semitas excurrit, praesertim primus: reliqui duo non raro in pratis re-  
generantur.

*Iulio* mense, deinde & *Augusto* praecipue florant: *Septembri* vero papposura longi ven-  
to capite.

*Sylvestres* qui idem hi *Cardus* sunt, qui verò secundus *Scolymus* est, non quidem ille quem  
*Theophrastus* ostendit lactiferum, de quo praescriptum, sed eius illeum, quos *Plinius* lib. 20. cap.  
22. cap. 23. 24. describit.

*Sylvestrium*, inquit, *Cardus* eorum genera sunt duo: vnam fruticosam à terra siccam alte-  
ram vitaceo crassius: utraque folijs paucis (alibi plura) spinosa, mucosam caespitibus. Sed  
alibi florum purpureorum murmurantes medios aculeos, coleriter canaliculatos & abeuntem eam  
aut: *melissae* Graeci vocant.

Mentum verò & alterius *Scolymus* *Plinius* lib. 23. cap. 23. 24. quem aut in albos *Orien-  
tem* recipere, qui idem cum *Theophrasti Scolymus*, & ab alio differtur est. Nominatur verò

## Cardus sylvaticus.

Stilacium  
Dactylis  
etc.



fit fœcipit & Glascias, qui circa Carduos diligenter fœcipit videtur. Manducatus Carduus hic odorem commendat. Haftenus ille lib. xx. cap. xxxii.

alio & aequivo, potest & hoc nomen hinc quod extractum, in praesentibus sicut dicitur.

Definitur verò & à Dioscoride Scolymus, qui cum hoc Pliniano eductum enarratur solum habet, inquit, Chamaeceras aut Adale, dactylis, nigrae & purpureae: caulem edit longum, foliorum, capite spinoso, radice nigra & crassa. Quae omnia descriptio à Scolymis istis sylvaticis aliena non est. Facit haec quòd Scolymus Carduus appellatur sylvaticus, & agrestium nomine tenet, ut Ruellius tenet.

Scolymum autem hanc Galenus ut eadem sicutumque secundo edone esse: abestis tamen proprietas & grassolentem vimam, si in vino cocta radix bebitur, coctate: ac grassolentate corpori ac aliam imare.

Dioscorides radicem aut emplastrum modo impostam grassolentiam aliam totum corpus emendare: ac idem posse si in vino decocta bebitur, corpusque vimam fœcipit expellere. Idem verò & herbam recentem adhaec usum inter cetera Adparagi modo recipi ostendit.

Pliniam, hoc antequam floreat convulsas, utque expressis, alio succo alopecuris replet. Radix, caulemque ex aqua decoctis, potenter hanc facere narratur. Stomachum comedent, & valium (si credimus) etiam conferre aliquid tradunt, ut matres gignantur. Ita enim Chalcidius Adensentem commendat. Haftenus ille lib. xx. cap. xxxii.

QUINTI LIBRI DE PEMPTEBIS QUINTA  
FINIS.



Rubus.

Rubus minor.



herbaricos sunt, Mora belli-Germani. Wormbati. Spanbelen. & Jagbarten. Hispani Cerasosae. Bohemi Weitzapf.

Minorum Rubum <sup>200</sup> <sup>100</sup> <sup>100</sup> ac humilimum à Theophrasto dictum nonnulli esse vo-  
lent. Fructum Ruellius Galii Caribaei normani affinitas.

Rubus autem gemina, folia, flores, ac immensi fructus valde exarcescentis vim habens,  
& simul adstringentem facultatem obtinent. Manducata omni, tumillarumque inflamma-  
tiones reprimit: aduersa dysenteriam, alui profluvium conseruat, san guinisque exproci-  
qualiterung distat. Idem potest & illorum decoctū, quod & eius vice addito melle curat.  
Oculos proidentes, condylomata, hæmorrhoides sanguinem fundentes satis impoliti fi-  
unt. Soreas ex caralibus, folia, ac immensus fructibus expressis, ac in Sole desicatis adema-  
na efficax est.

Maturus fructus dulcis est, & non parum habet succi se temperis calidi, esse idcirco non  
infamis, adhibebitur vero non nihil etiam renneti. Ventriculo lidoico & graui est. & si quis,  
Galienusque, largus eo velatus, capiti dolorem finnet. Refrictus verò dum adhuc immat-  
urus est, magis quam maturus adstringit ac exsiccit.

Radix propter adstringentem non parum in se habet substantiam amaram, propter quam  
& in semibus lapides continentur: Galienus ait. Plantis Rubi mosi & flores vitæ cum res-  
ferat, ac calculeorum ex vino decoctum præstantium esse coniectum.

De Rubo Idaeo. Cap. 11.

**I**DÆVA Rubus vulgarem non parum refert, sed caules & folia ditius visenta, præci-  
bus spina ac aculeis exasperantur, strobili verò secensque etiam variones spina quædamque  
etiam cæret: fructus arctius, sed color ruber, cum dulcedine infuso quiddamasti-  
pium. Radix valde sapor, ac multos locis orageas gemina noua præfert.

Fertur & in insula Germaniæ ac Bohemiæ sylvæ reperiri apud Belgas in horti habent.  
Floret eodem, quo prior, tempore: fructus verò & loco minor. Augusto dicitur in insula  
Belyblato Latium Rubus Idæus, ab Ida monte iuxta quem nascitur: Germaniæ Idæus  
habent.

Rubar idem.



Anonit.



Belgicis Hispanis *Corys Lemn-  
da Idem*. Gallis *Franchetia*: Anglis *Franchetia*  
Belgicis & *Franchetia*.

Fructum Martialis à Tiberianis ac An-  
nicianis Amposceles vocantem referunt.

Vulgariter ac facillime alter Rubro ille  
similis videtur, sed eorum natura adstringens aut  
refriscans. Eadem, *Dioscorides* ait, praeter quae  
supradictas.

Flos eius melle oculorum inflammationibus  
commodissime siliatur: erysi pelam testungu  
stomachicis ex aqua balneandis datur.

De Anonit. CAP. III.

**C**APULEVUS Antiochus dodranthalibus aut  
paulo alioquin vocatur, generis huius quae arri-  
culata ramosa, oblongata, densa acutissimoq;  
spina hinc inde: sunt quoque folia parva Hyper-  
icoides Rute magnitudine & forma similia,  
particularibus Lemna foliis maiora, colore fir-  
mitate viridiora: folia ut secundum cauliculos  
quoque nascuntur, forma veluti *Orbita*, sed co-  
lore ut plurimum purpureo, raro albidis, quibus  
verò lateri sublequantur vultuq; exigua, in  
quibus semina plura, radix longa laeviter forma  
serpē progreditur, lente admodum ac frangi  
contumax.

In aqua ac in terra humida sine margine leto  
pingui ac resistibili solo gignitur reperitur in Ger-  
mania ac Belgio, ac in Italia, tum & alibi. Super  
sua in admodum vixit est, quae nec facile perit,  
sed nec extirpatur, nisi difficillime, potest. Agri-  
colis sepe molesta est, quando dicit ac lente ra-  
dices aratur in remoratur, & boves siliare.

Non sibi sine Vena germana emittit, An-  
tumno perfructu, & tunc quidem spinosissima.  
Iulio & Augusto cum flore videtur.

*Anonit* sine *Orbita*: Graeco quod appellatur, ac  
similiter Latine *Anonit* & *Ononit*: Vulgo autem  
herbanosel *Arceita* boum, *Reita* boum, & *Re mo-  
na* aqua, quod antea boves in opere laevare ef-  
ficat, & quod minus araturum progredi queat, sine  
quod nec medicis eius impedimentum sint. Dicitur  
verò & *Anonit*, à densa acuta spina, quibus  
manifestes pergit.

A *Cassia* verò *Alyssa* sine *Egyptus*: Ger-  
manis est *Hansfortel*: *Dijstrass*: *Castro*  
Belgicis *Franchetia*: *Boles* Italica *Franchetia*:  
Hispanis *Franchetia* & *Castro*: Gallis *Arceita*  
aut *Franchetia*: Anglis *Cassia* & *peti* *Wyer*.

Anonitiam tamen radix exsiccatione, & ut  
Galenus, sermo quad antea videtur, extenuatur  
verò ac incidem quoque est. Cortex eius cum  
tuno eporus vixit cut, calculosque diffinit ac  
pelle, crusta verò & absorpt.

Decocta radix in postea dentium dolores mi-  
tigit, ore sepius collecto. Plantis comitialibus  
decoctam in oxymelur ad dimidiam, dari referunt.  
Machiodoribus notum hominem afferat, pul-  
verem

non: huius radices pluribus mensibus asumpto, à carnoso ramis cunctis.

Primos huius fructus carones sine asparago, parafquam spinosi sunt, manu conditi, & abse grandissimos esse, auctor Dioscorides.

De Ralfo.

CAP. IIIII.

Rafus.



Historia  
natur.

caron, que vox inter nochas, Acaron aut Acoron legitur.

Scorpio cap. cclxxxviii. Myrtum agrum eandem cum Cabelis esse scribit, nam eorum adducit, quod Galenus Myrtum agrum, hoc est, Rafum non descripsit, nec Dioscorides Cabelas. Que veritas hinc momentum ratio est, ut nec veritatem habet: Galenus eorum Rafum cum Cabelarum mentionem facit, & ut faceret, non consequenter idem Rafum Cabelas esse. Mentitur autem Galenus Carpsell, quod Anonymus cap. cxxxvii. Cabelas facit. Carpsellum autem à Rafico multum distans esse, ostendunt ea que de hoc lib. primo De Anonymo Galeni scripta reliqua.

Est Carpsellum herba, inquit, Phu appellata genere similia, validius tamen & aromatiorem quiddam plus spiritus: plurimum hinc in Soda voce Paraphilax nactus. remanet autem quiddam Carpsellii fermentum Cerasiis virgatissimum sunt. Eius duo genera reperitur. vixit quod Lactium: alterum quod Ponticum nominatur. à monte, in quo nascitur, vixitque nomen habet sed Ponticum melius est, quod cum plurimum haberit perulis medicamentis admixta, in quibus Phu vocem imponi debuerit. Est etiam Carpsellum, ut dicit, Phu simile, validius tamen, & qualitatem quandam aromatiem gustatum odorantemq; continens: Hæcenas Galeni verba.

Ex quibus manifestè constat, Rafum non esse Carpsellum, hoc est, Anonymo Cabelas, & huiusmodi Scorpioem quæ tale aliquid significatum fuerit. Sunt verò & fructus sue grana quiddam Cabelas nomine, non fermenta, verum nec illa cum Rafico quædam, nec Galeno cognata existunt.

Reverenda equidem grana sunt, Piperis magnitudine, & ob oblongo angulo emittent, quæ cum dactylis aromatica, & acris nonnulla respiciunt. Yhuac Præfixæ sunt lib. secundorum grana trunent: & simul iter Halli Abbas Præfixæ eorum lib. secundo, numero cxxxi. Polhemus Grati, inter quos Nicolaus Myrtus, Cabelas appellant.

Curtius

Scorpioem  
autem  
Cabelas.

Ceterum Rusci radices, quarum præcipue vias, temperatè calida sunt, ac effectus tenuis-  
 que medicorū quoque refrigerantes. Vnam cum, tenuum caliditas, ac acris expellunt:  
 vna filicida succorum, decocto eorum ex vino assumptis. Eadem Dioscorides de foliis  
 ac bacca, que præterea & mentis pellere, & perisidolentis, ac regni morbum sanant. Pro-  
 fuit verò de radice ad costorum pulmonem pectonū iniquentiam humorum faciliem expun-  
 gitionem, ac concitiorum coramdem potestatem.

De Hippoglossis.

CAP. V.

Hippoglossis.



legit. Ruscij autem conversionem non esse idoneam & ipse Martioli in pedes agrosus. Rusci non  
est apollinis  
 Grecum exemplar habet, *επιπυρρον* (Epi-pyrron) *επιπυρρον*, hoc est, frustum in me-  
 dia folia rubentem. Quod & sic se habere Theophrastum nomen rusci, qui Laurum Alexan-  
 drinum & Ruscum lib. II. *επιπυρρον*, hoc est, frustum folio ferrum esse refert. Præter  
 hæc duo nec alia *επιπυρρον* nomen, innotuit volens, non refert epiphyllacarpa alia.  
 Quod generatim nostrum adhibet, & Hippoglossum Laurum Alexandinum hoc idem  
 est confirmat. Hæc verò eam fecit, quod inter appellationes Lauri Alexandini nomen  
*επιπυρρον* adscriptum quod, sit. Martioli verò falsam esse iconem, & ad insidiam Ruscij Martioli  
est falsum  
 veriosam excogitavit, ex his, que habemus scriptis, factis apparet. Mirum autem quod  
 eum ipse error Rusci hanc interpretationis animaserverentiam falsam & imaginariam iconem  
 in suis commentariis retulisset.

Ceterum Hippoglossum hoc Laurum Alexandinum à Germanis quidem *Jayffstrast* &  
*Jaugstrost* dicunt: Belgis *Trappstrast*: Hispanis *Lengas de canel*: Anglis *Quintle tree*.  
 Superius verò & alia quedam eius apud veteres Græcos nomina: ut, *Απυρρον*, *Επιπυρρον*,  
 ac inter nos *επιπυρρον*, *επιπυρρον*, *επιπυρρον*: apud Græcos verò nostri temporis Cora-  
 co Yotano.

Porò Laurum Alexandinum temperatam evidentè calida est. Radix pondere drachma-  
 rum & cum dulci vino diffusiter pancoctus, & filicida laborantibus succibus, & san-  
 guinem quoque mensuram elicit, ut auctor Dioscorides. Sania & Plurima habet: Celeres  
 perisidolentis, sic, radice pota trigem denariogram pondere, in vini dulcem cyathis tribus. Secun-  
 das enim pellit mensuræque eodem modo pota.

qq. Baptista



Rapista Sardis ad suffocationes ex vitro hanc vehementer commendat. Exhibendo, inquit, cochleari parum pulueris, vel herbar, vel radice multorum suffocatio ex vitro laborantem mox liberat. Eandem verb & ad inebriationem rariocensere miram esse & ad remediandum, pulvere videlicet radice & signi cochlearis menfura cum iuleculo cum alijsq; continentibus preparato.

## De Capparis. CAP. VI.

Capparis.



**ACYLATHYS** frons Capparis, quoniam Annulli non minus acuta & hamorum infra adunca spina hinc inde quam Raba, per terram orbiculatim sternuntur, si non pedamentis quibusdam fulciantur. folia circa hos lina, velus Mali Cotoneae, sed tamen insidiosa, & si quorum tenuis erant pediculi capita rotunda prominentes, quibus delibetibus flos candidus penditur, quem sequuntur fructus oblongi, Ovisimiles, in quibus femina parva & alba continetur. radix lignosa, gemda, numerosa, caudice cortice consuebitur, cuius in medicina frequens usus.

In Italia, Hispania, alijsq; calidioribus regionibus absque cultu Capparis nascitur, ac in solo, a spera q; loco, & vana radere, ut Dioscorides scribit. Theophrastus narat sua sylvestrem esse, & cultam non admittere vesert. nosse tamen esse in nonnullis cultur, ac sicuti Lepidosij loca ferat.

Capparis astate flores: vigeat verò in Autumnum usque radimenta florum antequam delibent colligenda, & in una aut sale conservanda.

Nomen apud Graecos dicitur, quod apud Latinos obtinet, *acéuaga* siquidem dicitur: à nonnullis verò & *acéu-gene*, sed propter Cyrobatos huc *Camaribus*, cui sylvestris Raba ut alibi ostensum est: Germanis *Cappin*: Belgis *Cappin*: Italia *Capparis*: Hispanis *Alcaparis*: Gallis *Capparis*: Anglis *Cappin*.

Capitula sua radimenta florum, hoc est, nondum completi flores, Capparinum nomen in Officina accipiunt.

Capparis quoque sine flores nondum completi temperamento calidi sunt ac tertium partem si recentes edantur exiguam admodum alimentum conferunt: sale verò macerati multò etiam magis non tam edulis utriusq; quam ciborum oblatum & medicamentorum condimentum, collapsam ciborum appetentiam excitant: humido ventriculo conferunt saluamque in eius reprimunt, pituitam verò & in eo harenam divergant: nocentia hincq; obstructions expurgant quatenus laborantibus ac leno sic cum cibo proficit. Eduntur autem, sale primo cloro, deinde, admo oleo & aceto, aceniticeum aliorum uisum, aut uideam etis coquantur.

Cortex autem radice ex diuersis facultatibus constat: exallicat, extingit purgat, incidit, digerit, contra heni adstringendiq; quidam parentis coarctanda.

Lienes indurati si quod aliud medicamentum, aut uisum valet, cum fura idemq; remedijs admixtus, tum intra corpus assumptus, & quidem vel in aceto aut uisum melis decoctus, uel in uisum uisum, alijsq; permissis hoc etiam modo crassissimosq; humores excusat, & eos per uenas, sepe etiam per uentrem sanguinolentos desert, unde & lienes adriam & coarctandis dolores: mensis verò etiam promouet, & ex capite penitus purgat. diciturq; quod *νεφρῶν*, quod vocant iudor Galenus. Idem cortex, ut Dioscorides scribit, uicra uenas fordida, & que occalluerunt expurgat: leno sic cum Otiselyi in ponitur radicata dentium doloribus auxiliatur, cum aceto uerò uirgines ab sterpi. folia uerò & radice contra diarrhoeam & *πεπλῆς* sine strumas discurrunt. Saccharatum uermicelos infusus curat.

## De Cappari Fabago.

## CAP. VII.

Cappari Fabago.



**A**D Capparem autem & referre recentiorum plerique student Capparem Fabagam non rari potius, non fructibus quidem, sed herbe speciem, et sic illos hinc potius in rebus, iactis, rattolis, & circa has folia lata, oblonga, crassa scilicet, rariora quibus Capparis, Portulacæ acutula, ab uno pediculo bina, summo colore viri cum canaliculis vitæna: flores vero profusquam ponant rudimentorum Capparis florem similitudinem referentes, complectes autem anal bicantes, thumabes a liquoris lateris modis factos ut filique in quibus feruntur. radix tenuis in discretis tendit.

Quibus locis sponte exeat aut cogatur notandum accepimus: an horum Belgij olim hinc conspicere datum fuit.

Notandum hæc à recentioribus Capparis Fabago, ut simplicius, & à plerisque Capparis leguminosa. Veteribus notam fuisse non constat Capparem siquidem esse non fuerit facile affirmare, brevis ac succosita admodum apud Dioscoridem descriptione carante. Describitur vero ab Aucupia cap. XXVIII. herba quædam Andisij, aculeis, cum quo Capparis Fabago melius respondere, si tam gravis esset odore, quam sapore amaret: Andisij si-

quidem valde acuta & gravis odoris est, ut Austriaci scribunt.

Est herba, æquit, similis Cappari, acuta odoris valde & gravis, habens fructum in vaginis. Andisij.  
Quod si autem exore transferri bennum, prodigiosa, odoris vox suffosia esse, Capparis Fabago cum Andisij convenire posse videtur. Sed quæ hoc tenere affirmata sunt? Sit ergo Capparis Fabago, sua consuetis appellatione, nec aliam expectat aut sequatur.

De fructibus vero nihil occurrere scribendum.

## De Pae cresta. CAP. VIII.

**B**LEPHARIS aut alior hic frutex est, & admodum spinosus: multis sentibus lignosis aculeatis & albis acibus ramulis siccant: folia non magna, lata, rotunda quoque & ciliata, non profundis incisura, Virgines quodammodo referunt, ambitu vero relaxata etiam crenata, colore autem pulchre viridit, mollia viridæ viri sunt ac modice pilosis: folioli ex herbaceo albida, aut perquam exigua purpurea: fructus acuti rotundi, non necessarium habentes, sed fructuam ramulos ipsam baccharum aliam modo dependentes, colore viridæ viridæ, gustuque asperi, per maturitatem vero subsilicifera, vitæ succo plenti, sapore aliquantulum d'acer, in quibus semina candidant: radix lignosa fibre non destituit.

Ad limen caprarum & horonum hæc spina collocatur, & non raro ipsa horonem est significaturam.

Cui admodum, & frequenter ante Veris æquinoctium folia erumpunt: acerbis fructibus Aprilis ac Maio mensibus colligantur: mariti vero sub sacro lunc de mirum deoripuntur.

Nomen frutex hic apud Veteres non habet, quæcum non cognoverant, vel neglecterant: Recentiores quædamque Groffulariam, frequenter vero ab aliis Viam crispam, Viam spinosa, Viam spinellam, Viam crispam appellant: Germani Kustberræ aut Kustberr Belgæ Kustberron / Kustberron & Kustberron: Hispani Pae cresta, siue Pae cresta Itali Pae crassa: Galli Cresta: Angli Cræstæ. Non est autem Rhamni speciei, ut ex utroque de Rhamno more scribendo, siue constat. Non est etiam spina Græcis Λαγύρα, sicut dicitur, dicitur quam Theophrastus Græcis siue modo gemantur Crispam sequitur.

Sunt autem huius fructus bacca notandum quædam instare temperamento frigida ac sic-

QQA

Vitis crispata.



to, & quorum sum pediculi dependunt oblongi, floribus natis crassis, demum bacca rubea non rarisose modo digestis, colore per maturitatem rubentibus, sapore grato ac dulci.

1. Altra species proceram ramis, foliis, floribusq; referit, sed fructuum rubei est, & ingenti supponis, & idcirco nulli usque ad nos in Italia habetur.

2. Rubicolum rubentia bacca in meliorum hortis habetur: ad septemtra vult, rura & ad copiam feceras, quis nonnulli scilicet opere concessit ac ornati.

3. Alteram in hortis habere nonnulli vel posse cu ne est: rura fossas & foveas agrorum aut prorum quardamque occupat.

Floret Rubicolum Aprilis ac Maio, sub finem vero hanc quandoque, sepius vero Iulio mensis bacca maturat.

Nostrates Rubicolum appellant, & Grossularium rubrum, ac Grossularium transmarinam: Germani Sunt Johans treib (sive treibin) Sunt Johans treibin Belgae Rubicolum aut per Italiam Pavia rubea: Galli Grossularis, Grossularis d'entre mer: Bohemi Johans & Jura. Officinis Rubus nomine cognatum quod fructu rubet. Dedicatur vestitus à Scarpone cap. cxxi. Sed Fuchsius & Matthiolus nostrum negant idem cum illius esse: scilicet tamen conuenire diuini nequeunt. At decepto, aut, non respondet.

Rubus est, inquit Scarpio, planta habens capiteolos rubros ad videntiam tendentes, & folia magna, lata, rotunda, vitiosa: gram, quorum est sapor dulcis cum acetostrare, & ipsa sunt frigida & sicca in secundo gradu. Quid autem in hac desin priore repugnans? Plantam esse, ut hoc est, fruticem, habentem ramulos (sive pres expressos nostrum) rubros, ad videntiam tendentes, & talis sunt Vitis nona cuiusque na cum folia germina, que vt rillone subtergunt, folia, si cum aliorum mense nonnullorum fructum melleo mionibus comparantur folia, magna sunt, lata eadem & vitiosa esse, manifestum: rotunda vero etiam dici possunt. Quid igitur de fideatur nisi restum iudicium: id si adhibeatur, Rubus nostrus idem cum Scarpone ac reliquorum Arabum est. Quid si in aliquo verbo, veluti in dictione, Capiteolos habentem aliquo occurrat, interpreti impeditur, qui non fidissimum Scarpone conuicti, ut cap. de Murrina facta consistit. Nilquam Scarpio Murrina cum crassitas in esse naturam ex alio & myrica de eo quod has admiscetur ex humiditate corporis hauriant: locupletialitas est communiurum. Ita cum hac pro Ramella, Capiteolos scripsisse, quod vult?

Pecus

ca, & ordine quidem secundo intendit, & facultate adstringentes. In cratu haurit vitiis amplius loco est. Infusa, in quibus incoctis, emgna, & subterguntibus vitia. Edarum vero & alia deculta, modo quocumque autem tandem modo, lempet erudum ac fupidum succum ingerunt, quod aliorum subtergunt rilliant vitiis, ut ad modum conferat: alio verò etiam filant, & in gna fluere, ac mentium purgatione reprimitur, nisi in debilem admodum ac frigidam mediant venientiam, quem non adstant, sed vel aggrauant, vel alio quoque viti peritote conueniant.

Matur fructus viti dulcescenti sunt, sic & parum aut nihil adstringunt, & calorem exiguum quod obtinent aliam vero & paulo amplius quam immaturam conferunt, idq; non adeo erudum, verum rati bi vel ad condimenta deducuntur, viti dantur.

#### De Rubis. CAP. IX.

**R**UBIUM non spinosum quidem est, sed centi de eius fructibus Vitis crispata videbitur diuidentem. Eius species duas sunt, fructus colore & sapore differencia, vitiis enim ruber aliterum niger est.

Fruticosa autem stipes est, lentos ac flexibiles ramos proferit corice subagrilis, quibus adnascuntur folia lata, striata & crassa, & Vitis fructuum modo diuidentis, sed minoris multo.

Ribes fructu fructu rubro.

Ribes fructu nigro.



Petrus Belsoum in lib. De arboribus Cotinens, pro Ribesio aliam ostendit speciem à se in Libano monte loca frigidissima repertam, vbi sic non anno nec vitibus suis Lapathi gran-  
 dibus ac rotundioribus, sed se penitus ab una radice, buxus rubensibus, & medio firmo fo-  
 borum veluti Lauri Alexandrini & Rusci cruentibus, ascensumque dependensibus, quod  
 legitimum esse Ribes ex eo colligit, quia Scripto Ribes in auctoris procerum scriptum reli-  
 quent: verum & alia species in auctoris non raro nascuntur, que tamen ab aliis Ribesio non  
 sunt. In summa autem Arborem hanc esse multitermè affirmandum, posterum enim Ribes  
 vulgare, descriptum quam ex Yllaco Scripto ostendit, non repugnare queat, & facilius  
 conueniant, ut ostendimus.

Ribesio totum auctoris rubentes bacce, quorum vitis & non aliam est, frigide & sicca  
 temperamento sunt, sed ne secundo satis in eis, & cum partium acuitate nonnulli quoque  
 adhibentur element. Ardores febiles extingunt ac mitigant, hanc repræsentat, singula-  
 rem coctam pernit, percolatibus aduertitur, sicut videri poterit, videri, videri, videri, videri,  
 & choleram morbum sustant, dysenteriam ex calidioribus laborantibus videri.

De Spinacida seu Oxycantha.

CAP. X.

**FRUTEX** acida Spina est procerum glabrum virgultum ac raris affurgens, aculeis cardiacan-  
 tibus & valde pungentibus, admodum spinosa, quorum cortex leuis ac tenuis est, ligni  
 vero marcescens lutea, folia hanc conne sunt parua, oblonga, dilate venisibus, amba cra-  
 nta, & nonnulla aspera, sapore acida. Baccæ ex oblongis pediculis hanc luteis bacce  
 succedunt parue, oblonge, rennes, colore per marcescentem rubescunt, alio in auctoris ma-  
 dico, sapore acido, que vis marcescente nigra sunt, radices lignosæ in diversis sparguntur, luteæ  
 quoque, sed colorationes quam sic ligni marcescent.

In pluribus regionibus in arcibus ac desertis, non rarus acerbis, sed non nihil humentibus  
 locis gignitur, cum & in sylvis: quare quoque verò & in agrorum limitibus. Transferunt  
 verò & ad hortos, ad quorum sepiamentis vtilis est.

Aprili solis ei subiacuntur noua, atque eodem tempore ex veteribus caudicibus rari erunt  
 arant.

Spiraea acida sive Oxyacantha.



Oxyacantha sive Spiraea acida.



crumpant oblongi, molles, Myacantha A. spiraea similes, qui etiam alios sunt, nec esse lignosi sunt aut duriores. Marcellus ad fructus September fructus.

Galenus hanc Spiraea Graece *Oxyacantha* vocat, & ab *agones* & *the* differentem videt. De facili, simp. medic. facultet. & manifestus in lib. De facul. alime. ut. vbi Oxyacantha Alpagos inter edules refert, quidem non Oxyacanthus, sed Oxyacantha sive Acida spiraea, ut iam hic plinius, profert.

Discoideis hanc Spiraea non facit, nam qui ipse Oxyacanthum feruntis generis nominat, Galeni est medicum genus Oxyacanthus, ut sequente capite etiam dicendum.

Anticis vtrumque fructus sub Amyberis nomine complexus videtur, ut etiam Eten eo est rotundum, rubrum, campelles & ingram, oblongum, acinosum (*lyge acetosum*) & montanum. Quibus verbis magis fructum exprimit, nam rotundus acinosus Oxyacantha est, niger vero & oblongus Oxyacantha, quem simplicius arefoliogram esse. Officinas autem hoc fructus Berberis appellatur, ab Amyberis voce deprensus: et nominibus Caci pagus: Italiae similes Cretae Hispaniae *Spiraea de scutulis* Germaniae *Prussina*: Sauris: *Criffis*: *Ursis*: Belgis *Raufibum*: *Zumbum*: Gallis *Spiraea* vocatur, atque inde Latino nomine *Spiraea* *Anglica* *Raufibum* & *Myr* *Boboma* *Draff*: *Draff*.

Folia autem & fructus hanc Spiraea omnes fecundo refrigerant ac resoluunt: & si Galenus quare affirmat, icterici sunt perniciosa, ac incusum quod obnotat.

Folia ad ciborum conditorem & oblongi loco à nonnullis vti sapitur, sicut Oxalis. Decoctum eorum de maderis ardens & bilisitas febres conficit: lingua refrigerant & incitatis nimiam calorem temperant.

Fructus ad eadem conficiunt, qui & consiliis ad dysentericis vides habetur, & omnes lingua superflua fluore colibet possunt.

De Spiraea acida. CAP. XI.

**A**CTA Spiraea magis est fructus, non tamen in arborem Pyn altitudinis excrevit, praeterquam cultus accedente. caudex ei sunt erassi, nam durus ac lignosus, oblongus acutus & durus panis horreus: folia lanuata, profundi in cuneis sedis, leuia, cum varice respicentia: flores in umbellulis albidis, suave odorati: baccae rotundae, per maturitatem rubentes, in quibus mollis ac dulcis pulpa, & externa albaque alba danda est in se man deliquit.

In sylvis, locus vas, agrosque horreant:

ramque separata ac limbo nacturæ ac non raro horticolas sepe, ubique sine peris.

Hæc verò & altera quedam intra mercuria ac talisina, cuius folia angustiora, sed oblonga sunt flores quoque in eorum masculinis cordati & oblongi, petala similes: hæc forma de magnitudine parva, sed hinc Cocci colore rubentes. Humilis autem hæc spina est, nec ita facile abest, tam quoque, & in paucorum tantummodo hortis apud Belgas reperbitur.

Venitque magis Maio foret: folia paulo prius erumpunt: hæc Augusto aut Octobremaribus, etiam futuræ raris, firmas, merula, ac alia per laporem abest.

Dioscorides hæc de se obis & *Spina* deo feminino genere nominat: Galenus verò in lib. De simplici. facit masculino genere *Spina* deo. Oxycanthus, aut, arbor, ut Pyn Sylvestris habet speciem ita de viti non dissimiles &c. Sic & Dioscorides de Oxycantho: Arbor est Pyralis similis, valde spinosa, &c. Serapio hæc Amyrberis appellat. Sicut verò, ut & Dioscorides scribit, quibus magis dicitur aut amara. Pynque auctori nomen alium ac masculi Spina proprium esse videtur. Germani *Sylber*: Belgæ *Spina* & *Spina* prior Spina dicitur. Italæ *Spina*, *Asperda*: Hispanæ *Spina*: Gallæ *Spina*. Nunc, operatur verò & in montibus Spina villaria, & Spina speculorum.

Ceterum hæc bacca, ut Dioscorides scribit, alii profusa & interitū abundantis sicut.

De *Tragacantha* seu *Hirci* spina.

*Tragacantha*, seu *Hirci* spina.



aut pariter *Dragagan* barbarè vocatur.

*Tragacantha* autem non sine *Lachryma Tragacantha*, et plerumque vim obtinet, quæ acrimosam humorum obrunda, vellicat verò etiam acrior. Ad tussis, artem et expectorantem, rucedinis, et mesentericæ aciem ac tunc distillatione plurimum in eleganter proficit. Lingua subdita asperitatem eius colligens tollit renam dolentibus, velica redolentibus, ac vitæ medicamentis aut in hunc modum passo aut glycyrrhizæ decoctio epota. Viti quoque etiam ad oculi medicamenta.

De *Acacia*.

CAP. XIII.

**D**YARUM *Acaciam* Dioscorides meminit, quæram prior verò ac legitima est.

Est autem hæc frutex arborescens, non tamen *Spina*, hæc est, postea alligata, profertur tamen lignosa, duris & oblongis spinis aculeatis, circa quos folia sunt ex pluribus ad



Acacia.

Styracis  
Arabicæ  
fructus



Acacia arbor.

viam *styracis* bus collam harrachibus composita, velis sunt Lentis flores albidis suis sine styraq; plantis, & late quidem infra Lappi qua parte semen continent: quod modo vni quodque clausis foliis paraculis angustiore collo collectis bus comprehenditur semen glabrum & crispulident. Exiguusque antem ex his facies, qui in vmbra siccatas nigrescitur materia est: de-  
scipit sine in brassis ex immaturis styraq; vno ex totis & fructu lacum colligunt.

Gummi vero & ex hac styraq; proficit.

Naturæ, ut Diofcorides, Acacia in *Agypto*.

Inter fructus autem ac arbores porposito videntes Acaciae ceteris ratiocinat Pennis bellinas Singul. lib. 1. cap. 21. 111.

Hanc speciem Graeci *Styracem* nosse ac-  
tate vocant: Latine similiter Acacia est: Dio-  
cor & *Agypto* sparsa.

Succus Acaciae quoque nomen habet. Offi-  
cinae Germaniq; huius loco lacum ex styra-  
chibus Prunas expressum substituant: quoniam & A-  
caciae appellat.

Gummi in Officiis Arabici generi dicitur.

Machilias pro Acacia Araborum lacta vocan-  
tibus dicitur, pithas habet, cui præter-  
missam spem addidit, ut Acaciae mentem  
sed rariis nec sic Diofcorida descriptam re-  
spondentem reddidit.

Acacia autem succus, ut Galenus ait, non est  
pursum similis in, sed cito subsistens frigida  
& vitrea, cui & quaedam aqua commista, quod-  
dam etiam in sele dispersas partes liberitates  
& caliditas. Est styraq; ortus excoctum,  
refrigeratum vero non lotus panni strandi  
vno vni lotus fuerit. Lotone cum ammoniâ  
ac partes calidiores deponit.

Côducit autem, inquit Diofcorides, ad oculo-  
rum medicamentis, & ad erysipelas, herpes,  
clausula, pterygia, vna vicia: propterea oculo-  
rum reprimis: mentium abundantiam sistit:  
procedentem vitium cotinuit: alii fluxum  
supponit, cum porus, cum per chylomend-  
nas capillos denegat. Ad oculos in autem pe-  
dicamenta huius.

Gummi adstringens & modico refrigerans est  
emplasticum vero vni facti lacus habet, qua-  
ntum iam in phlegma coram, quibus alia & cap-  
ta, in vni. Ambulibus cum osio stilam, velis en-  
catis proliber: Diofcorides.

De *Acacia altera*. Cap. 2111.

**A**LYRIA Acacia sparsa *Agypto* affinis,  
ut Diofcorides ait, sed longi minoris  
naturæ, styra huius, ac lacum pro composita:  
folia habens Rute: semen in styra-  
chibus aut quatuor capitibus Lentis minoris. Et pro hac  
quidem, exhibita olim à M. antholo fuit, styra  
leguolis & aculeatis ramis foliis: composita  
tibus, Rute graueolenti non valde distan-  
tes.

bus, et tunc minore quam Lentis, tribus aut quatuor in via Elliptica, quæ per marginem colorem fere lateris, & sub radiis Solis cum calore resurgunt. Si verò & hoc eodem est quam Angustilla fere ad am Acaciam esse præcipue flos et quoque innoxia, veluti si aqua est.

Nascitur altera Acacia in Cappadocia ac Pontico, ut Dioscorides refert: reperitur verò & in Coniis, ac nonnullis Indiæ montibus, tum & aliis.

Autumno semen maturum est.

Hanc frige nigrae, sicut alteram Acaciam, & Ponticam Acaciam nominant. Officinae multo cognata est.

Hanc autem succum Dioscorides adstringere etiam ait, sed visibus quam alteram inferorem, & ad ocularia medicamentis utilem.

*De Pruno Sylvestri, seu Stativæ Germanicæ.*

CAP. XV.

Prunus Sylvestris.



**S**YLVESTRIS Prunus hancula ac spinosa frutex est, Pruno maiori locum ac nomen, tamis tenuioribus durisq; hinc inde sparsa aculeata folia velis & angustioribus, durioribus, ac minoribus. Aculi ferebuntur albi: fructus rotundus, parvis vixit magis vixit acini, è caruleo vixite nape esse intus: nigro, gustu admodum austero adstringenti, raris lignosis in diversis sedis.

Aggeris agris separatis, aliisq; evasidit editis & incultis loca Sylvestris Prunus occupat. Apud Germanos & Belgas frequens, cum & aliis.

Primo Vitis floret, Autumno exiguæ Prunæ colligi possunt, & ex pressis succus resiccandus se sicca verò & ipsa expediens ac vixit quoque fuerit.

Fructum hunc *dygamaquolis*, aut *amapollis dygama* nominant: fructum verò *dygamaquolis*, hinc est, Sylvestris Prunum.

Succum ex his expressum & resiccatum Officinae Acaciam appellat, & deficiens legitima Acacia, hanc cum loco substituitur unde & Acacia Germanicæ strepi nomen habetur.

Germani Francem *Echthobum*: fructus *Echthum* vocant: Belgæ similes *Bijstapen* & *Bijst* dicunt: Galli *Prunier sauvage*: Angli *Moore* Bohemæ *Zinfa*.

Resurgunt autem & resiccantur in prope modum ordine Prunæ Sylvestris, ac presertim ipsæ denisus succus & vixit validè adstringit.

Prædest succus ad omnia que adstringunt postulari: sanguine vixit quoque fluores exprimitur affinis ac complacitas que reprimendi vim habent vixit ad nascitur, tum & collicorum ac dysentericorum in medicamento.

Fructus post maturitatem, ut Dioscorides ait, resiccari, & cum passis decocti, venenalis viliores, alioquinque magis adstringunt, quam hortensis videlicet Prunæ.

*De Rhamno.* CAP. XVI.

**R**HAMNI Theophrasto duo sunt, albus & niger, vixit *dasidapogis*, sicut spinas ferunt. Prunus similiter lib. x. c. 11. cap. x. 11. n. Rhamnos duos necesse habet generi, inquit, Roberum Rhamnos appellatur à Grecis candidior ac fruticosior: alterum est Sylvestris, agris, ac quadratum: rubens fere vixit foliis hinc medicatis: hinc medicatis nam quod Lycium dicitur. Horum duorum Rhamnorum nominant & Dioscorides, sed unum addit, quoniam reliquis propolis, proinde loco ipsum etiam erant: candidum secundum: nigrum verò tertium facit.

Primum autem fructum esse refert *saxa* species nascentem, & naves fructum colit ac & spinas



Rhamnus prinos.



Rhamnus prinos, sicc.



Spinis duras veluti *Oryzaeanthae* : foliis parvis, oblongis, subpinguis & mollibus. Et hanc quidem doctus. Clusius diligenter de scriptis verbis.

Est *Rhamnus* frutex septem facibus idiosus, raris vellis, in multa virgulta se se dividens, candidis, vel duae ac firmis aculeis hinc inde foliis, quae plerumque quater in quatuor ad singularem spinarum totius rami sunt, oblonga, subpinguis, Olea similibus, sed albida, sed tenera, & succulentis, quae Autumnis, non in facie recentibus, in totidem decidunt flores Autumnis longipetali, candidis, extremitate in quatuor circis dactylis : quibus dactylis, quoddam se minus rudimentum, ut in laetis velle inquit, nunquam tamen cum fructum videre in his contingit : crassa multipliciter radice firmata.

Illic vero generis & aliam se oblectasse addit, ferè affine in, sed humilior, & frequentioribus tamis truncatior, ac candidiorum : minoribus foliis, magis carnosis : floribus eisdem formae, sed colore purpureo.

Hoc in prinos, nasci ut, multis Hispaniae, Lusitaniae, & Galliae Narbonensis locis : aliorum vero rarior in, & non nisi uno loco in Regni Valentini finibus se se reperit.

2. Alibi *Rhamnus* multis albidis ramulis, lenuis ac frangi consumatibus, acutum longipetentibus spinarum velle communis lani diffunditur : folia oblonga, angustata, candidiora, minoribus quam Olea : flos herbaceus circa rami les frequens : bacca decidua, non nisi, nec minus quasi cohaerens, Alparis minoribus, colore flavo fere, succo interius luteo.

Non dicit hoc *Rhamnus* in Hollandia ac portus in Flandriae maribus littoribus : reperitur vero in aliis in comitatibus, ac vixta profertur in annis : veluti vixta Lycium Flandriae Boronio, ubi cum frequenter est : Valerius Cordus scribit.

Vixtaque vixta hoc *Rhamnus*, prout videtur ac fecundus, perpetuo cum foliis vixta fructu sine bacca secunda, prout hinc fructus ad hanc permansit.

3. Tertium *Rhamnus* Diofcorides dicit in regnariibus, & quod antea tabernibus in multis oblonga, quam in cubitorem, spinosis, sed raris duras ac in firmis spinis hinc inde fructu lato, tenui, folliculari, etiam dicitur verticillo similem. Existimatur autem hoc vixta à nostris doctis, & quidem hanc rem, non ad terram *Rhamnus*, sed ad Palari dicitur prinos facere, quae multa & imperfecta quod Diofcorides est.

Rhamnus Coronata.

Rhamnus terrens.



Nam Theophrastus & ipsi Plinius, non videntur inter secundam & tertiam, hoc est, inter album & nigram, aliud quidem coloris discrimen agnoscere. Quod si verum sit, Palustris tantum Rhamni species esse non poterit, quia pro tertio Rhamno si malem habuisset: Sed omnino suspensam aliam tertium Rhamnum esse consequatur, Rhamnum ceteris ad obfistulam equalem est Clusij Rhamnum tertium.

Fructuosus autem hoc admodum est, frequentes habet ramos, cortice vestitus nigro, spinis longis aculeatis. folia oblonga, angustia, crassa, utriusque, aliquos simul emittit aculeos, colore variosa, gustu adstringente: flores & nigros inter folia plurimos, colore herbacei: fructus nigri, rotundi, ac acervi.

Perperam & hic vitis fructus vero astate ad maturitatem pervenit.

Spinam autem hanc Græci *idæon* appellant: Latini similiter Rhamnus à nonnullis verò & *rospolus*, *Abnigarda*, id est, Spina alba, Spina Cretensis: ut inter nothas voces ascriptum est. A Maceis verò etiam Spina salutaris, & Herba salutaris, que velut vitæ, inquit, habet. In *Is. Marras*, & *Rhamno: Hispania Scaberrima*.

Valerius Cordus alteram Rhamni speciem Oleastrum Germanicam facit.

At Rhamnus, ut Galenus ait, desiccatur & dignetur ordine secundo: refrigerat verò primo completo, ac secundo incipiente.

Omnium folia, Dioscorides ait, erysipelatosis herpesbus efficaciter in curaplacato adhibentur: sed vitæ adhuc vitæ dicitur: Galenus addit.

De Felice.

CAP. XVII.

**P**ALIVUS frutex prædurus, quandoque in arborem evadens, ramis longis & retortis, sed spinis raris folia minoribus ac minus nocentibus: folia verò parva, lata, quasi rotunda, acuminata, & vitæ nigre quælibet habentibus: flos seu succus sufficiens caulectorum caulectorum, colore luteo lobis platis ac latis spondyliæ sine verticillis affinis, in quibus semina sunt quaternis vel ternis, pinguis ut Lina, sine, ut Dioscorides ait, *assidit*.

Nascitur in humidis & aridis vel in Rabus, & pluribus in Græcia locis.

Est verò & sitis præter hanc Palustris, fructuosior Loto: folia curis qualia præcisa, sed fructu.



In illis *Syrus mada*, *Syrus hirsutus*, *Syrus Cerasus*. Belgæ fructum *stragulum*, id est, quasi dicitur, *Bacca* Rhenana vocant.

Baccæ autem hæræ *Syræ*, ut gustu amaritudinem cum adstringente nonnulla referant, ita & calidæ siccæque sunt ordine secundæ. Perguntur eodem iure, crassam purpuream & bitiosam quoque hæræres per aliam educunt. Datur ardarum in pulcherrimam tritum à drachma ad triplidrachmam: adnulli baccas purpureas, quæ à xv. ad xx. exhibent, vel etiam plures dant hominibus. Praestat autem ipsas contractas in vitulo purgaturis Nobilique sale incipiant, atque in Galium elabent sic etiam menses cum molesta, ac passim omnibus ventris doloribus ac vomitionibus evacuant. Incoquantur autem baccæ à xl. ad l. x. pro robustissimis eorum plures.

Baccæ nondum maturæ resiccant, in aqua item peracæ, lentum præbent colicam, sed maxime vitiosam.

Exprimuntur ex mæris succis, quorum medico clausis decoctus, pistoribus pro sanguinis vitiosi colore in vis est: quem *hæstigmum* appellant.

*Passigium.*

*De Pyracantha & Lycio ex Dioscorido.*

CAP. XIX.

*Pyracantha Martialis.*



**PYRACANTHA** spinosus est arbor, ramulorum cultiorem aut longioribus, cortice luteo & colore diluti Lycijætra quosdamha Baxamula, *ærea*, densitate crassa. Præterea habet Piperis nigricantem, nigram, amarum, æreâ dantem huc hinc plentem, & lacum: radices multas obli quas lignositas.

Nascitur in Cappadocia & Lycia, & aliis regionibus plantis: loca autem aspera. Bellonius in Palæstina à se asperam scribit.

Pro Pyracantha à Martialis præter exhibetur stirps folijs Baxi, frequenter admodum ramulosa, spinis aliquot insertis, sed hanc non esse legitimum, doctiss. Anguillare aliorumque sententia, cui quoque & nos accedimus.

Extrahitur autem ex Pyracantha folijs ac ramulis, aut, ut Plinius, ex ramis & radicibus, per decoctionem succis, cui Lycio mactum. Folia, inquit Dioscorides, cum ramis trahuntur, & multis diebus macerata decoquuntur: postea lignosis resicis, quod reliquum nullis decoquitur, donec melle habeat consistentiam. Plures sic habet: Coquantur in aqua casti cum radicibusque sumuntur amantissimis aceto vase ferè per triduum: utramque utrimque ligno donec melle consistitudo fiat lib. xviii. cap. xviii.

Quam Greci *mesephe* vocant Latine *Buxum* spinam qui dicitur: Nominatur verò & *ærea* à succo, qui ex ea coquitur.

Succus propriè *æreas* dicitur, apud Latinos idem nomen retinet. Officinis Lycium incognitum est, quæ eius loco succum fructus *Pentades* vel *Caprifoli* perperit, & est gravissimo errore substituit: ut suo loco scriptum est.

Dioscorides ex *Rhus* *æreas* facere docet, ad eadem, ad quæ Lycium conseruitur. quod *æreas* deficiente ac *æreas* Lycij succidantem est, & in omnibus medicamentis eius loco adhiberi ex se est.

Lycium autem, anthere Galeno, atrocioris est facultatis, & compositum ex diversis generis subtilioris: vis quidem tenui utriusque digere ac calidæ altera terribilis ac frigida, ex qua adstringentem obtinet: in calore autem medius ac symmetricus proximus est. Proinde ad vana curvitas. Caliginem inquit Dioscorides, oculorum dicitur: postpeteram habere, prout ut, veteresque fluxiones sanant: facit ad aurium potestates, exulcerata ingruat, & tonsillas, laborum fistulas, sedis curat, attenuatque illitum. Coelocis & dynterica peram &

per chylorem indurum prodest. Dicitur sanguinem excoquantibus & rufficantibus ex aqua maculata etiam appositum sibi. Contra rheumatis carus mortuus in catapotto deoventur, ut in aqua bibetur, aut ex melle sumitur.

## De Agrifolia.

## CAP. XX.

## Agrifolium.



& adiecto olei siccum momento, sibi sibi recondunt.

Est Agrifolium locis incultis ac desertis, tum & quibusdam locis in saxa, ac in spels.

Perpetuus autem ac immortali coma vivit: Autumnis ferè hæc maturatur, quæ non modo etiam hyeme carulis adhæret.

Agrifolium hæc fronsæ arboreferens Latini vocant: Itali *Agrifolia* ac *Agrifolia*: Hispani *Agrifolia*: Germani *Waldrüstel*: & nonnulli *Stodpalmus*: Belgæ *Walf*: Galli *Bon* & *Protesis*: Angli *Welp*.

Credunt esse à Theophrasto *ἀγραία* dicta, quam plerique Latini etiam Aquifoliam aut Aquifoliam dicunt. Plinius autem lib. x xvii. cap. x xviii. Aquifolium interpretatur *agrifolia*: Sed Cræsus folio est oblongo Mespili simili, quem Adiantum lib. secundo eundem cum Ceraso esse indicat. Theophrastus *Γαλαπιδος* Theophrasto nuncupatum Aquifolium interpretatur. Phylæ autem ea perpetuè vivens hæc quidem est, sed crasior et qualis Celsus, cuius materies albidæ: & in alendo peccare honore, fronte semper rotundans. At talis Aquifolium non est, cuius materies neque albidæ, neque frondes peccati viles præbet.

Agrifolij autem hæc temperamento calide sunt ac frigida: tenuiorum temperantia: & fænis discutiant. Ad colicos dolores viles sunt: crassos liquidum pituitosos humoris per alvum educunt, x. aut xii. numero assumpit, ut ab his acceptum, qui etiam expectorantur quandoque fecerunt.

Viscum autem ex huius cortice factum non minus viscosum est, quàm ex arboris Vitis præparatum: tenacissimum siquidem est: intermixta omnia conglutinat: excoquantur autem in aqua ac claudunt, neque hoc modo perniciem homini adicit, non quibusdam alijs, sed glutinosa sua substantia.

De Gentile' spissa.

CAP. XXI.

Gentila spicosa.

Gentila spicosa altera icon.



Gentila.



**I**N tota Spana haec herba est, & toti spicorum 1.  
 da a non acutissima; agrum circumquaque  
 circumscripta foliis caret, nisi Vitis & quaedam  
 quibus ac mris decidua, fruticosa autem est, & ad  
 rarum caulis cultis lignosis pluribus affertur, & cum  
 hoc quondam, subinde aliorum pro loco natura.  
 Boscoli e spicosis ramulis erumpunt, quibus Ge-  
 ntilis, lano, qui in calidis regionibus sub fronsa-  
 m Sole alba admodum rufo colore immixta sunt, ut  
 porpose apparet: illique sequantur alii males-  
 radix lignosa ac laevi, modo recta descendit,  
 aliis per obliquam formam.

Hinc accedere potest & altera spicosa Gen- 2.  
 tilis species, quae vix alias quaedam ad modum co-  
 munes promit, immo marginali foliis ac unocor-  
 ribus exiguis spiculis circumscissis: postea  
 vero cum annis fuerit, delinquitur foliis,  
 folis durioribus spiculis communibus. Boscoli  
 hinc pallide lano, minus quam in Gentile: illi-  
 que pariter, in quibus semina exigua rotunda  
 & si brubere: radix lignosa & laevi quoque est.

Peculiaribus reperitur regionibus, ut in 1.  
 Germania, Belgio, Italia, Gallia, Hispania, An-  
 glia, & locis quidem in ceteris quoque ac neglectis.

Altera pluribus per Straboniam locis occur- 2.  
 rit, nonnullis hinc etiam, sed incultis quoque  
 ac neglectis.

Flores harum M<sup>aco</sup> conspicui & prope quosdam in Hispania Autumnus etiam in Clusius refert.

1. Harum prorem Belgæ Gemellam nominant spinosam v<sup>o</sup>lib *Geppellam*. Habetur autem hanc pro Theophrasti Scorpio, quem Gaza Nepem nominat. Duo siquidem, Theophrastus ait, ex toto scilicet esse, & difficile altera præter hanc repetiri posse. In eorum aculeis, inquit, Corrada & *scipios* deinde p<sup>o</sup>bi. Quod ex toto spinosum exigno est numero, & difficile quicquam inueniri præter Conudam & Scorpium. Corrada autem nota est reliquæ Scorpis aliæ cum Gemella spinosa. Scorpij autem nomen apud Plinium quidem, *mo* *mag*, & aliquid superius conuincit. Præter enim hunc Scorpium, cuius lib. x xv. cap. v. mentionem facit, Theophrasti verba referens, & Aconium Theliphonon Scorpium est lib. xxv. cap. x. Iam & Scorpionem dictam herbam Scorpium quoque nominat. Ex argumento nomen, inquit lib. x x i. cap. xv. accipit Scorpium: nomen habet ad similitudinem eiusdem Scorpionis fida parua. Quæ de Scorpione Dioscoridæ sunt verba.

2. Altera, Gemella passim vocatur: Germanis *Erstpfaffen*: Suedicis *pfaffen*: Belgæ *Geppellam*: Gallicis *Geppellam*.

De spinosa autem Scorpij facilius rebus est apud Theophrastum exat. Plinius eandem quas Scorpionis virosæ imbuere videtur. Est & alia, ut, eiusdem nominis effectusque sine foliis: lib. x x i. eodem quo supra loco.

### LIBRI PRIMI PENTADIS SEPTIMA

#### FINIS

STIRPIVM HISTORIÆ 749  
 PEMP TADIS SEXTÆ

LIBER SECYNDVS,

DE FRVTICIBVS NON SPINOSIS.

P RÆFATIO.

**A** SYMPTOMATA fruticibus ad non spinosis tractandam, quorum non cuiusque numerus occurrunt. Sed tamen non minus Fruticibus cognoscere describere instituiamus, sed quorum materia ad personamque pertinet, vel quae cognoscere referre. Superius autem Libris finem impoſuit Gemilla fruticosa, hanc verò inuenimus non spinosa calidus Gemilla.

De Gemilla.

CAP. I.

Gemilla non spinosa.

Gemilla spinosa.



**FRVTICOSA** stirps Gemilla est: caules aut pedes tenues cassidices habet lignosus, à quibus plurime tenues sparguntur virgule angulose, virentes, lentæ, & flexi necesseque faciles, non raro quocumq; in alio duntaxat, circa quas folia erigunt, obiciunt videntia, & floribus eleganti colore luteo, & tandem sitique plantæ per maturitatem nigrescentia, veluti Faba sit. Hanc dicit, in quibus semina plana, dura, fibrata, Lentibus manent, radice dura & lignosa fibris quoddam obliquis subinde à se dantur. Accollitur autem Gemilla frequenter in sine magnam altitudinem, homines latissimum attingens floribus hæc multo sepe grando, quandoq; verò humilis permanet, quæ raro florifica. Hanc verò radicem fibris adstruunt quod Rapa appellant Gemilla.

Est autem hoc rubescens quoddam, turbinatum, subnigris fibris squamis operatum, <sup>sepe</sup> <sup>gemilla</sup> palpa mentore subterea, à qua casus affurgit dextrante breuior, fibris circa fastigium subcapidis, Lentis ferè annis succedentibus oblonga, crassa, terribus, non tamen magnis locis,

RR. j

caud.



cula, in quibus femina minutissima & superflua. Tota autem folio istud Orobanchen Diofcoridi refert, lib. III. Pempt. III. deliquitum hoc solo ab ea differens, quod non inae Legamina excutit sed à filio radii sui Genitæ, quibus adhaerent.

Nascentur Genitæ in Germania, insensu in praedictam, si frequenter in arida, mentis, ac de- formi loca: cum & iuxta sylvas et agrorum limitibus quæ humiliter et rarisimè ferunt, matro, tenuis, ac arenoso solo gaudet.

1. Praeter verò hanc & alia elegantior Genitæ est, ramali sine virgæ cum utriusque quoque, lente similiter, & ad vine ramum accommoda, potius ad id folium conuoluitur, ut inde se- cè apparet circa hauriam autem fastigia floribus modo excutit, eleganter quoque latis, odoratis, melleis quibus procer, siliquis verò & nigra, plana, & longioribus.

Hæc Italia indigena est: ferunt & in Hispania provenire: apud Belgis verò hærentis. 2.

3. Item & hirsuta quædam Genitæ est, cum doliobus ac melleisibus foliis, quæ in Hispania nonnulla aspera, & præsertim iuxta Calpe innotuit. Meminit hanc Titus Calpurnius Baccilicon *Ætologi* secunda, sic scribens:

*Ceras ut, non patet, quæ tradit Ceras vicia*

*Atque sub hirsuta læta explorare Genitæ*

Floris Germanica Genitæ sub fruce *Apulia*, aut Maio mensis, atque tunc rudimenta flo- rum ad huc videntur, potius videtur quibus latera hanc, decedens, immo ac file condiderit, quæ postea elata & decedens Capparonum in obscuris loca habentur, naturam cum histo- ris mandantur.

Siliquis cum maturo feminibus Augustus mensis præbet Rapum hanc præcipuè mensis apparet ac conspicuum est.

Italica Genitæ feminisidonea, sed diutius in Belgis florere.

Appellatur aspera hæc hanc à Latinis quædam Genitæ, aut, ut quidam volunt, Genitæ Italia *Gayfæ*: Hispania similiter *Græffæ* aut *Girfæ*: Germania *Dfrutem*: Belgis *Dæc Gallicæ* *Gauvæ*: Anglia *Stæmæ*.

Ac Genitæ virgæ, flores ac femina excelsior ac reflexior secundo ordine terra quoque sunt efficitur, & expurgandi ac sperendi vim obtinent: & præcipuè fluxum quod hanc est, mensisque extremis hanc humiditatem sedundat.

Decorum vepularum & cymarum Genitæ, hepatis, hencis, & renis expurgat ac sperit per alvum aquosum humores detrahit, hydroptic idcirco auxiliare, præsertim in viciis reli- quæ ex aqua vitæ. Ad eandem commendatur & semen.

Præter verò & ex Genitæ ramulorum ac virgultorum antidotum & combustionem eicere cum vino tenui albo, cuius similes Rhenanum est, hinciam, quod ac Cacheram & Leuco- phlegmaticam à nonnullis valde commendatur: & potenter quidem hoc aquosum & siccum humorem cum vino & per vesicam expellit: sed & acrimoniam sua immo videri quædamque & lachrymæ & eandem.

Melios floribus ac ramulis humiditatem ac inodorem adesse, sed excrescentiam, & ob id vomitionem & fluxum omnibus suis partibus ostendit, prolocare, incidere, attenuare, pituitiam & crudam materiam à sanctorum cum viciis, vomitione ac diarrhoea expurgare. Videtur autem ista non de Genitæ, sed de Spina scripta, quod per Spina Helicton non purgare, autem sunt Diofcorides & Plinius. Ad hæc verò & Melios Genitæ calcem frangit viciem seque vesicæ, neque permittit viciis hanc materiam diutius hæret, aut in cal- culum durescat.

Floris virgæ multa condit, & pro ob scio morbi languentem caritate appetitum, & hepatis ac hinc infirmitas expeditur. Idem complete maritima cum aqua porcinis tu- to ac permittit, dolores podagricos lenire feruntur. Mæ facta verò hoc cum melle matro ac toto frumens scribit resoluere.

Rapum Genitæ in vino decortum ad renem & vesicæ dolores commendatur, viciis præ- mouet, calculos dissolvit & expellit. Succus recentis rapo Genitæ expellit, recentia val- rera glutinat, viciis & sordida expurgat: viciis quoque malignis ac durissimis potest re- mouere asserunt.

*De Genitæ historia. CAP. II.*

**F**OLIOLA hæc Genitæ amplius est quam præcedentes, humiliter tamen & modè illis af- furgens, sed ad hanc declinans: sicut emittit quoque ac rennes herbaceas virgula ac- cedit exiguæ & lignosæ procer, sed in cæcis ac hinc malis viciis, hincibus, longioribusque quam vulgaris. Flores circa fastigia copiosi, palchæ hinc, quales Genitæ: siliquis quoque quædam: semen non abfimile, radii lignosæ.

Pluribus

*Genista florata.*



*Genista stricta alarica.*



*Genista hirsuta.*



Pluribus perstransque Germaniam penetrat: locis incultis, quibusque humicosis aut umbratis facilis: quoque ac in montibus non raro habet. Indur quoque hinc incognita.

Julio & Augusto cum in flore reperitur: carpitur: tunc à nemoribus ad urbem vltimè colligitur ac fabricatur.

Crus & alarum huius speciem exhibet: magis frutescens & callosa, & ad duorum cubitorum altitudinem rectè effurgentem: cuius caudex nodis, digitum crassus, candidissime obducitur cortice, ramisque vltimos spargit fragiles, circa quos folia lata, superius virentia, infertius incanis ac resplendentia: flores spicati. Genista tinctoria autem. Hinc autem in Marocco Hispaniae regione facta via à se conspiciam, & mensè Martio cum flore reperitur, referat.

Est verò & inter Genistas quæ glomeratè hauriunt, ac terre superne vel succumbenti, cum scabelluli in membranis formam latitudinem & crassitudinem oblongantur: à quibus & deinde alij mali sunt, & ab his rursus alij, nec fuit donec ad sanguinè perueniant: folia autem nulla habet alia, ex horum sanguis emittit strobili lutei veluti Genista, sed minores, & filiquæ exigue: radix tenax est.

Hanc autem Genistam præsertim plerique florem appellant tinctoriam: nichil verò Genista tinctoria dicitur. Meminit hanc Plinius.

Tangeris, inquit, vestibus nascentes Genista: lib. xvi. cap. x. viti. Germania (Frithmarus) *Spiræstruch*: Belgis *Schotzogen*: Italia (ni fallor) *Cerretta*, *Stragla*, & *Cafaria*, vt Cap. de Lydimachia Martioli: scribit: Angli *Stinonem*.

1. Altera ab Hispanis *Scoba* nominatur.
2. Tertia à nonnullis Genista humilis vocatur à Germanis *Erdspinnenn*: hoc est, terrefusa Genista, sive *Chamaegenista*.

Sapore aures Genista unctiora amara, Genistam priorem refert, proinde & sicundo extracta calida siccaque: exhibentur verò & reliquis facultatibus eius similia.

## De Sparte frutice.

## CAP. III.

Spartum frutex maris.



Spartum frutex minus.



**D**YFLUX Spartum est: vnum frutice alterum herba.

Spartum frutex Genista, quam Trals tota producit, virgulis dimidiis est, que virentes, striatae, teretes, & ad nexum flexumque faciles ac expeditae sunt. Folia in tralla, nisi prima germinatione, quae parua & cito defluunt: flores in laterali bus pediculis spicatoe exant ordine later: lobis qui succedunt rotundis oblongoque, minoribus. Bacis sive Falcis / quos Dioscorides Phallos nominat) adnò similes, vt lubano pediculis ab haistisodi Falcis non mox differantur, in quibus semen durum ac nigrum, modic lignosa.

In Hispania pro maxima Spartum vocatur, & vno loco albis ac frutescent: altero verò brachiatum, cuius tamen lobis minores sunt.

Graecis *arsyris* ac *arsyris* dicitur: Latini in flos vocibus videntur, modò Spartum, alia Spartum nominantur: Hispani *Scoba* vocant.

Spartum autem, quo vites alligantur, cum fructus, cum virgarum succos non influentia tribuisset facultate Galeni. Dioscorides verò, Semina, vit, & flores cum melicrato quantum obolotum pondere possit, purgari per superiora vehementer, vel lani Hellicorum, sed modo, ac ultra pericula sunt. Semen per infusa purgat.

Ratiorum in aqua mactarum est ac vasorum extrahit succum, citharidis & argina laborantibus auxiliatur, si quomodo cyathum mane bibatur. Quaedam verò hoc ratiorum manna aqua mactarum, citharidis per clysterem inueniunt: educunt autem sanguines & stringunt.

De Sparto herba.

CAP. VIII.

Spartum herba.

Spartherba distipes.



**ALTISSIM** Spartum herba, ut inquit Plinius, sponte nascens, tenuis ac scissura haec & ardeat numerosa emittit folia, cubitali subinde longiora dicit, leuia quoque & obliquata, quae ante duriora redduntur, cultus in hoc affurgunt alioes, paniculam ferè grandis acem referentes, nonnullorum Graminum affilem, in quibus oblongam nascitur frum. nodios alioes sunt ac perperna, quae frigidè luxuriant atque inerte implicata hinc constitunt caespitem, durum quandoque pedum spatium occupantem.

In compluribus Hispaniae: Beticæ locis hoc Spartum provenire Clivus scribit, sed tamen omnino frequentissime ab arido Graecitensia regni ad Maronem usque vebem, quae modo Murcia, in quo terra spatio de Nova Carthago, nunc Cartagena, sita est: Reperturè verò & in Valentino agro, ubi latius & vberius erit.

Convenit autem hoc cum inquit de Sparto herba Plinius lib. x. cap. 11. scilicet panem sequitur: & qualem his verbis Herba haec sponte nascens, & quae non quae sit. Incommodè proprie arbi foli, uti terra dato vito: namque ad nullam cellans est. nec aliud ita fieri aut nasci possit. In Africa eo spatium ac inorile gignitur Carthagine omni Hispania exteriori portio, nec haec tota, sed quatinus partem, mentes quoque Sparto opera. Hinc fructus callosi, coram, hanc agros facosque, hinc calcemina, & pulvorem velles: anan alibus coram praeterquam calcemina continent.

Consistunt verò ex hoc & hac state usque, corbes in quibus vix passis & carictum & alio conduntur nec aliud hanc, quod situr, vix effinec: normen propterquam Sparta, aut Sparta herba.

De Tamari. CAP. V.

**TAMARIX** fructus haud magnus est, hominis ferè altitudinis: caudicem habet lignosum quidem, sed nequaquam crassus: ramulos verò ab hoc complures: folia verò circa hoc frequentia, parva, oblonga, ac tenuia, quae si lineolis transmissis ac obliquata sit: nec tenuis possit esse: nec caespitem, in huius tamere flores in locis, numero albedi, aut ex altitudine perpernae tenium fasculorum subspica occupant, quibus frum succodit papposum, quod

Tamarix.



Tamarixis exsertula cum floribus.



quod per maturitatem de hisce herbis conceptum est in quibus contraxerit, effluit, ac à ventis abripitur, non in mos quàm Salvia, sed ex qualis fructuum lignosa, in densa tendens.

Secus produentur amara, ac quandoque exarbitrante fructum non modo in amara patet, sed nascunt, solo sine quocumque latet, haec menses siquidem & lapidales amaritudo reperitur in Germania, Vandaliis, Italia, Hispania, ac in Grecia quoque.

In Aegypto autem ac Syria, ut Dioscorides, Tamarix quoque gignitur in Tylo verò & Arabia insula, ut Theophrastus scribit, quatum, inquit, lignum, non ut apud nos Graecos in baculum, sed validum veluti arbor, hinc lignum, non aliud quoddam fons.

Tamarix hanc Dioscorides Sassa, sine sinam aut vrbam nominat, & fassam ut profert Galienus persicalem, gustu sua qualiter ad hunc generum.

Perus Bellonius Singularem lib. secundo Tamarix peraltem & abatur aborem infer magis de in Aegypto vidisse scribit: ac locis quidem quandoque humida sicut flumina non raro verò etiam in arida & salubris, vti nulla alia videtur arbor quae Gallia, incola Chermisae dicitur, subinde adeo in aris à raris dependente ferunt, ut coere eam generatim fierent.

Tamarix Graeci vocant: Latine verò etiam Myrica in Officinis Tamariscus dicitur: ab Odiano Horatiano Matica Dioscorides in Graeci & Italia nascente in Asia ac Syriam facit Germanice Tamariscum salsum & Poae. Belgae Tamarix & Tamariscus: Italia Tamarix: Hisp. Tamarix & Tamarix: Gallia Tamarix: Angli Tamariscus: Bohemi Tamarix.

Myrica autem abstergens est ac incidens facultatis absque perniciosa delectatione: habet verò ac adstrictivum nonnullum. Anque ab his facultatibus admodum prodest hinc ad usum decoctum cum aceto aut vino, sive radice, sive foliis, sive eorum in ramulis, sicut Galienus.

Decoctum salicium ex vino hanc in abstergentem Dioscorides quocumque scribit in dante: sed non ad delectationem collationem prodest: ac ad malitiam mentis in dante & spiritibus prodest: ac lentibus abundanter affundit.

Cum comba sive admodum delectationis est facultatis, plurimum abstergenti facultatem habent, prodest ad hunc generum.

Fructus autem sive galla nascenti Tamarix non parvam formam est adstrictivum, sicut in galla.

galle amphicladia siue artemisii proculina sit, nisi quod acerbior et candidior est in galla: Myrica autem fructus de temperatura inaequalis, immo ita est enim natura eius multa partem totius, atque via abstergenda, quod si in galla haud inest, ut Galenus ait.

Consuevit haec vitiari, inquit Dioscorides, vix galle in medicamentis oculorum ac omni ad sanguinis excretionem prode sit verò & oculis, si uis inolebit, utero, ac à phalango demorfa. Cortex ad colicam vitis adhibetur. Consecantur ex ligno ad bibendum pocula, ut ea haec potus sumptus in caco prode.

Myrica palustris. De Myrica. CAP. VI. Myrica alba.



**MYRICA** humilis, sed tamen lignosa ac frutescens stirps, arbor dodrantalis et dimidiatæ virgulae. Lignis praesertim compluribus, ac circa has foliola duratula ac asperatula, Tamariscina sive Cupressi quodammodo similia: flosculos ferens dum virgulas ordine digestas, ex quibus distans rubente colore purpurascens, raro albedio: radicem lignosam per summam terram sparsam. Et haec verè ac propriè Myrica apud Veteres habetur.

Sunt verò & alij humiles lignosae frutes, quae inter Myricas numerantur. Quarum vix vitæ arbore quoque lignosae à radicibus complures, sed tenues, suberabente colore nigrescentes, non raro sed quae pedales vel altiores, foliisque admodum exiguis et tenuibus, quibus va ligam Thymis innotescunt: flosculi in fascibus ac cucurbitibus virgularum quibus leniter, aut plures cohaerent, et coriam dependentes, formam oblongam, iteas cap, dolioli alicuius effigiem referentes, colore dilute purpurascens, radice semper, pluribus germana locis edit. Ex hac Myrica scopae fiunt, quibus domus verruntur, nam & alia, quibus velles expurgantur.

Virgula inferior Germaniae sive Belgio sine vulgari, loca arida flammis, ferilibus, ac inculta. Fiorit & vireo, alio sed pro diuisis sive & Aemiliae cum flore repenit quae.

Mycrica verò & aliam quaedam non obliuiscere Myricam, humidum quidem, sed lignosam, virgulis etiam huiusmodi, vix exiguis quoque sunt foliola, sed angustis, & oblongioribus formis: haec spicato ordine ad fascibus virgularum, vix tamen tantummodo laeui, excoque folioli elegantibus ruber, nigis praesertim rubus opacibus.

Nascentur haec in Germania in illo tractu, qui ex Bohemia Norimbergam duca, loca arida & inculta, ac arida sylvas.

Erica arvensis.



Vaccinia nigra.



Mense Aprili cum elegantibus flocculis repens. Describuntur vero & mox hinc à doctis G. Claudio Ericæ, quas ex his per Hispaniam observationibus repetendas adinquirimus.

Erica autem à Græco ἔρις dictur, unde illi perperam Myricam nuncupant: Germanicæ Belgæ vocant: Itali *Erica*: Hispani *Arpa*, *Arca*: Galli *Espre*: Angli *heath*.

At Ericæ, ut Galenus sciat, à germine per habitum facultatem obtinet. Flore enim se folia vendunt.

Auxiliatur, inquit Dioscorides, cura & flosis serpenticum insectibus impolita. Ex fanibus autem reprobum vel speciosissimum.

De *Panicula nigra*, CAR. VII.

**V**ACCINIA, de quibus hoc loco agimus, à *V*olta differunt: nec flores sunt, sed bacce: istorum autem Vacciniorum aliquos reperimus speciem, Nigra videlicet, Rubra, & que *Palustris* dicitur.

Vulgatissima Germanicæ sunt nigra, quorum frumcosum Myricillum quidam appellant. Et si uerum hic exiguus, vox doctissima, consueti & raris in tenuibus, virenti cæteris conuulsi: folia membra Baccæ, tenuissimam tamen & ambrosia leuiter firmata, ad Myricillum generis accedentibus: flocculi secundum ramulos mediis, conuulsi: bacce tempore magnitudine sitis respondens, in firmitate concinna veluti sambucus habent, pondere sitis ut *Taxa*, colore è caruleo firmo nigricante, sapore subacido ac adstringente, in quibus et complura conuulsi puris, albicantis firmi radices tubelli lignosa, tenues, & subinde proserpens.

Moxa si in sole, ac multo solis calore gaudet: subinde in edicta, verno capite, ac montibus reperitur: non raro enim ad plana descendit. In Germania vtrique, Bohemia, & nonnulla Gallie locis frequens.

Substanti Vere nouis detectis, paulo post flocculis apparet: bacce sub fine Iunij ac Iulio perficiuntur, reperuntur vero nouembris & Septembris: raris enim matutis, non facile tamen contra reperitur.

Bacca ista Germani *Hyphossem* appellant: Brasari *Castibellus*, quod strepitans quondam, dum dentibus franguntur, edunt nonnulli *Quæstrinus*: Galli *Arca* aut *Arpa*, ut Johannes de Choulscribit: Bohemi *Erpa* *lespdy*, Germanicæ plerique *Officina* *Myricillus*, proprie autem *Myricilli* fructus sunt: Myricillum hoc tempore *Pharmacopœi* loquuntur. Apud Græcos & veteres *Larissianum*, quod sciam non esse haberi, nam quod plerique *Vitem* *Idæam*, à *Plinio* *Alexandria* non cognominatam, ex his me ut, virenti repugnat: Vire agredimur

quidem Idæa non modo cum Vine vitifera similitudinem aliquam habet, sed Vitis etiam speciei est. Quædam Theophrastus, quæ hucus meminit, nullis adhuc opusculo, *Ἰδαία* simpliciter nominat (vt paulò post ostendetur) quod hæc dubia non fuisse facturus, si à Vine vitifera differentiam habuisset.

Quæcumque enim hæc per aliquam normam acciperent, addum aliquo spiritu expressamur, ut ab ea, cuius nomen maxime tam, differentiæ agnoscerentur: vt Lauri Alexandrinæ Vitis alba Vitisque Vitis lycaonica, & ceteræ.

Iam quæ & à Stupe aliqua appellacionem meruerunt, si non in vineis, tamen vel folijs, vel fructu, vel alio aliquo pte referunt. Vitis alba & nigra, sive Beyona utraque, folijs classicisq; habeat, vt Vitis vitifera, repit & eodem modo. Vitis sylvestris sativata Vitis modo citata, & fructu exiguo viti similem præfert. Lauri Alexandina & Chamædaphnæ, tam & Daphnædes Laurum folijs simulantur. Sycomori fructu Ficum, folijs Mæoniæ resert, Chamædrys folijs est. Quercus similit. Pseudoanus Ficus. Inde alius quæ ab alia aliqua nomen acciperent. Ficus autem hæc humilis, nec vltio modo, nec vltio parte Vitis resert.

Nasitur autem Vitis, quam modo Idæam cognominare, non in altissimis ac riu offe Idæa montibus, (vt quidam interpretati fuerunt) sed circa Idæam præterit Idæam quodam montem non Citæ, sed Troas in Asia in nec, quæ à Ptolemao Geographia lib. 7. cap. 11. Alexandri Troas appellatur. Vnde & non omnino à Plinio lib. xiiii. cap. 41. Vitis Alexandrina dicta est. hæc iniquisq; dicitur Alexandrina. Lauri à Theophrasto nominatur: Propterea *ἰδαία*, id est, circa Idæam esse feruntur, inquit, Alexandrina dicta Lauri, & Ficus quædam, & dicitur, id est, Vitis. Hæc autem Vitis similes apparet, quæ Philostratus in vita Apollonii apud Micones & Lydos (hæc procul à Troas fons) nasci resert, cum ut vrbibus dicitur, quæ apud Iudæos viti Caracatum giganteæ. Vitis autem, ait, parva admodum, quæ apud Micones Lydosq; hæc nascuntur: vnam tamen ex his expressam gustaturæ nec recundissimam.

Traditur autem hæc Vitis, non Idæa nati, *Ἰδαία*, id est, fructus instar esse. *ἰδαία* non *ἰδαία*, sed *ἰδαία*, id est, vrbibus parva, cum vltio ad instar cubitam extenderit, circa quos *ἰδαία*, hæc nati, & nati, sive obliqua, nigra, magna hæc Faba, dulces, in viti habentur *ἰδαία* vti, id est, viti acem: quod Idæa, molle folijs autem hucus rotundum, induratum, ac parum.

Describitur hæc à Plinio lib. xiiii. cap. 41. idem sere verbus Alexandria appellata, inquit, Vitis autem Phœlicæ brevis, carnis ex bacillis, acino nigro, Faba magnitudine, molle molle & multo, obliqua acem upedatibus folijs paruo ac rotundo sine diuisura.

In quibus verbis, pro eo quod Theophrastus habet, *ἰδαία* sive *ἰδαία*, Plinius non ait, sed racemos obliquos legit: quod Vitis magis convenit.

Cum describere autem hæc, Instatur Germanæ Officinæ Myrtillem dictum, hæc quoque convenit factis manifestum. humilis enim est, vti cubitam alta, parva brevis & nequaquam cubitibus ramulis, hæc racemos, sed nec vnam acem similes fructus, sed vltio: Tæc bacca præfert, non dulces, sed siccitudo & adstringentes, in quibus quoque non *ἰδαία* id est, molle, sed multa exigua candida plura fimo: folijs vrbis non rotundum, sed rotundo longus, non vt Vitis, sed ad hanc accedens. Iam & credibile est hanc in Italia, Germania, ac minore Asia non operiri, cum Germaniæ & Bohemæ propium Marchibus affereat vrbem abest vt Vitis Idæa aut Alexandrina dicitur habere quæ.

Vaccina autem hucus fructu posse non abire non iam videntur, cum bacca sint: nam à bacca Vaccina quæsi Vaccina dicitur posita. Sed tamen & alia Vaccina esse non repugnat Vaccinum etenim modo *ἰδαία* dicitur pluribus commentis. Vitis Vaccina dicitur cap. de Vitis scriptum. Hyacinthum scriptum & Vaccinum Latini appellant: inquit Virgilius Bucolicum primo. *ἰδαία* & Theocriti versiculum Latini reddens, quæ est *ἰδαία* x.

*ἰδαία* sive *ἰδαία* id est, *ἰδαία* dicitur.

Vitis:

*ἰδαία* sive *ἰδαία*, sive *ἰδαία* nigra.

Vitis autem Archæothure lib. vii. Vaccinum quoque à Vitis distigunt, & ex ea purpuream elegantem sicut resert, ad quam cum Hyacintho scriptum non conferat, aliud omnino aliud Vaccinum ab Hyacintho esse oportet, quod ad rugerum purpureo colore facit.

Mentat & Plinius lib. xvi. cap. xviii. Vaccinorum, quæ ad vestes stramoniorum purpuræ tingendis adhibentur.

Sicut autem hæc eadem cum nostris Vaccinis difficile fieri vult recte: præstatum cum Plinius Vaccina inter eas Stupe referat, quæ in aqua signantur: nostræ vrbis in montibus, sicut: vno expostit sine confusione in Italia cogita esse. Vaccinæ est, Vaccina hæc



nostra dici possunt, & cum Vaccinis Plantis ac Yrtibus in eo consistunt, quod vellestiaque hinc tangi potuerit colere his queant.

Ceterum Vaccinia hac facillime locando ordine, coeque sita inter se frigida sunt, & valde cum manifesta adhaerere se faciunt. Vt in campo affluenti conuenienter sita solent: adueniens febrium coloris unguineo alba una reprimunt: venterum sibilum dysenteriam ex fluxu bile naturam curant: aduertes cholerae morbum prostant.

Eo quoque hanc succum quae crasse tenet, & addito melle & saccharo confertur, Rob Otilium appellatur: quod ipse crudus hanc ad omnia praesertendum: nam subinde, dum haec crudum in carum aut assumitur, venterum debilem ac frigidum offendunt, & naturam ab eis ut agram adstringant, aut fluxum reprimant, ut etiam cum sua frigiditate ac acritate perturbent: quod succus coctus sine Rob hinc quo aqua miscetur.

*De rubra Vaccinia.*

Vaccinia rubra.



Vaccinia palustris.



In humidis & vliginosis locis proveniunt saepe in montibus apud Hollandos. Valens Gordonus quaedam has similes baccas, si non eadem, in macris, humidis, putridis, vellestiaque quoque

**CAP. VIII.**

**R**UBRORUM Vacciniosum fructus quoque humilis est, nec quantum procerum attentione vulgaris terraibus potuerit: in foliis denonibus, perpetuo virentibus, maiores item similibus, aliquando mouentibus. Foliis non secundum ramulos, sed in fastigiis vulgaribus aliquot simul proveniunt, forma oblonga, rotundi, dilute coloris rubentes: succulentibus baccis, quae maturae rubent, sapore acido et adstringente, raris tenuis sepius.

Sylva in & in arduis opaca quibusdam Bra-bantiae locis reperitur. Gelserus in alio Helvetiarum montibus gigni scriptum reliquit.

Nomen à riges quibus forma sita respondent, Vaccinia rubra habent. Germanis Rotes Bergelbeere: Belgis Rode Ginstel: Gallis *Arceuthoë*: Cornaribus Gelserus Virem ideam rubrasacris dicit, sed multo minus quam magnum cum Idea Vire hinc conuenire ipsam haccarum caeteris offendit: non eadem ad latera caulis sitorum velum nigra (quod ex thymasacris virem ideam esse impedit) sed è ramulorum cacumibus corymborum instar dependit.

Facillitatem autem rubra Vaccinia & frigidam siccamque habent, & simul adstringens VIII.

*De Vaccinia palustris.*

**CAP. IX.**

**P**ALUSTRIBUS Vaccinis quibusdam fructus instar setarum raras, necnihil sibilantes cohaerens, doctissime haccarum excolit, circa quos parva foliola, veluti Thyrsus aut vulgus Scirpylli. Foliis in extrema virgula, deinde baccas dependent, rubra Vaccinia vellestia, sed turbiditate, per mansuetam plures, quandoque punctula pauciores conspersa, sapore acido, raris infortibus baculis, oblonga, ex qua sicut in complures cohaerens, & inferius fibre aliquot dentantur. Talis enim oblectare nos incipit, quando virens cohaerens cum baccis eadem ad nos missa sit, si baccas quod em vnde quoque terra ac herba, raris, qualem descripturas, reliqua est.

quoque repenti refert, & plerimum circa Wittenbergam Saxoniae oppidum.

Sed fere in Italia, ac Anglia merito bacca ad maritima aera penetrant.

Hollandi *Demerfen*: Germani *Weyheren* id est, acinos aut baccas palustres appellant: Oxyecoon Valerius Corderius *Vaccina palustris* nomen utitur, à similitudine, quoniam ab aliis habent *Vaccina*.

Frigida autem & sicca huiusmodi *Vaccina*, verò cum quadam portione ac subtilitate temperata, quae tamen quandam adfrictionem constantem habeat.

Ardentium febrium calorem, atque in his fitis, multum huiusmodi exprimit: vomitum illud in eorum appetentiam, periculosos corruptosque humores decedat, et fibrarum persistentibus morbis adveniat.

Coquetur verò & horum succus, donec crassior salis addito saccharo confirmatus quatuor ad octava, ad quae haec, etiam valde est.

De *Portulaca marina*.

*Portulaca marina.*

CAP. X.

*Portulaca maritima maxima.*



**M**AXIMA dicta *Portulaca* non herba veluti heretica, sed exigua est frutex: cunctis tamen ac ligatis folia pinguis, carnosa, forma *Portulacae* similia, sed albidiora ac duriora: folioli ciliatulo parte superiore atriunt, quales Blao aut *Amplius* fieri, nec dissimile lumen laeum ac pinnitum, radi lignosa, vix, veluti & ipsi stirps, quae desinat in bacca foliis huiusmodi subser.

In maribus Zelandiae, Flandriae, Hollandiae aggregibus ac tumulis arenosis gignitur & ubi similibus locis.

Iulio mense cum flore possitimum viget.

Raras verò & aliae reperuntur species foliis candidioribus, longioribus, & Clivis ferè si. vilibus, non tamen quodam alioqui aut ramulis senescentes, quales in Lusitania & Valentino Hispaniae regno sevidisse & observasse Clivus scribit.

Hanc stirpem Graeci *αλαγο* cum asperitate vocant: differit ab *αλαγο* aliisque asperitate: Latini quoque *Halimura* et vulgò *Portulaca marina*: Belgae *Terpeperque*: *Αρογ*: *Portulaca*.

Partium autem est *Halimus*, ut inquit *Galenus*, dissimilatum: Major verò pars eius ca-

lida est temperata, cum humiditate non concocta & leuiter flayosa.

Folia, Diocorides ait decoquuntur ciborum gratia. sed et comesta, rupta, terrinaq; magisatem meliora dantur pondere pota eadem luffis verumem facit. Folia autem in Belgio velum Cappones tale non inuenerunt, & eod. loco mentis inferantur edunturq; & nec quidem relabuntur pilis, cui gratia sunt. Galenus vero etiam prima eius germana in Cilicia citari ac reponi, in potiorum vita futura, ac memorie produrum reliquit.

## De Myris.

## CAP. XI.

Myris picea.

Myris alba.



**M**YRIS magis ad me foliorum non parum differens est odore & fructu colere, qui modò alberens, altissimus est.

Frutex autem Myris huius magnus, caetera in exigua arboris speciem quandoque adulescens, cuius ramuli sine virgine lene, flexibiles, ac obliquositi, subrobore terere vane fluntur. folia circa hoc lene ac resplendentia, lene aliquantulum & acuminata, ut quidem mirata, alibi vetò maiora, & Vinea peruenit vulgari similia, veritè autem modò magnitudinis: sunt eadem nonnulla ramosa, quibusdam frequenter cauliculis densis stipula. flores candidi sunt, in ramulis aliquos concoloribus modis. fructus bacca sunt oblongi, lalare aut nigre aut subalbida, in quibus copiosa menses candidaque ferunt. Folia ac ramos Myris acundè odorata est, qui exant ex his, & praesertim o. Bonibus, salutaribus obierit h. quos, gratum ac suauè todolere.

Causa autem Myris ramosa ac caudices inaequale quoddam eminentior subinde ostendit, caudice colore, ramos ipsos veluti manus aliquas amplectens ac amplexus quod Myridanum vocatur.

Lactar Myris linteribus marinis, lactarum, flagrorum, Bauorumque opus, montium consularibus, pygmae sic leuiter in horis & vindarum, caudice ac linteriat. Vento Septembris: capillis ac frigidioris odori loca montes fagis. In calidioribus negioribus facili capillibusque eius prouenit.

In Germania vero reliquaque frigidis ac rigida prouincis agrè ac difficulter colitur, & nisi intra penitus cellas hybernamentibus translocatur, non potest.

Myrtus indica.



Myrtus australis cum flore ac fructu.



Ubi saepe spontaneis ac nascitur, vix cum Rosis floret: fructus Autumnus maturificat: in floreis eodem: fruſtum nuncquam perficit.

Genus asperius est: Latine Myrtus: Arabibus Alca: Itali Myrta: Hispanis *Arcepha*: Latinis *Myrta*, & *Myrtilla*: relique nationes Latinam sibi appellationem seruant.

Inter Myrtos autem, quae nunc ac ex diſſo, Pinea Tarentina est quae vix frequentibus foliis densissima, exotica. Nigra Myrta, cuius bacca nigra: candida, quae albedas baccas gignit, appellatur vixit vixit & haec dilucis folia. Sicuti autem habetur in hortis ac vix datus: cilia: sylviculis quae sua sponte nascuntur: huius bacca crebro manens: illius autem matura Nomen est Pinea & alia species, Peruvia, Plebeia, ac Cocinquelem, quae qualescunt, non ostendit. Quamvis enim inter Myrti species seponit, quae tamen Myrtos non est, sed aculeata serpen de qua nunc sermo.

Quod caudicibus, asperius, et scriptura, appellatur. Pinea tamen sibi. xlii. cap. xvi. vixit ex sylviculis Myrti bacca Myrtdanum vocatur, si modo integrum est exemplar. Dioscorides sibi, et similiter Seneca in Geoponica, et macerianus Myrti nigra bacca vixit ex pinea referunt vixit hoc ipsum asperius alia, hoc est, vixit Myrtos aut Myrti datur.

Conferat vixit & vixit ex Myrti bacca cum foliis, ac in maffum in fali quod vixit vixit vixit est, Myrti vixit, vixit Dioscorides aut, vocatur. Ne vixit Myrtdanum i. vixit. Genus nominatur.

Vixit autem facta habita olim fuit Myrtus Pinea sibi. xlii. cap. xlii. Ara, loquit, vixit fuit Veneri Myrtos, quam nunc Marsiam vocant.

Ceterum Myrtos contraria substantia constat, vixit frigido terreno: habet et vixit equidam calidum: itaque valenter, vixit Galenus ait, dicitur.

Ad firmam autem folia, fruſtus, permas, ac succus, cum fons apponit, tum affertur, sanguis spiritationes, tum de alia eruptione reprimant contra in al' vixit profertur in: fuit profertur, quo modo, tum de fons superfluentia huiusmodi dicitur. Alia flosce laborantibus ac de intentione vixit. Rerum ac vixit vixit vixit vixit: Oculorum inflammationes mitigant cum fons potente impolita: vixit quoque ornamenta vixit.



Piper agreste Germanis *Echaffmille*: *Krautpfeffer*: Belgis vñ cum Officiis *Agnus castus*: Italia *Piper*, *Agnus castus*: Hispania *Castale casto*: Anglia *Chatterton*.

Agri autem folia & fructus excalfaciunt ac reficcant verno ordine: pariter sunt admodum tenuiter, & flant delectantur. Edule autem apud nos nulli usum habetur, teste Galeo, & quidem per se vel fructum. Non fructu dolorem capitis adfert: fructum verò minus capere solet. Alimentum autem prober corpori exiguum, si quis reficcant: flant valde distillat: quomodo si accommodat ut qui à venereis partibus confectare cupit, hanc enim distilla.

Præstat eisdem fructu si omnia ac sola, cum & assueta, cum & subtrata. Prodest verò & Vicia si men ad vicia & bene in indurata ac obstruata: si peritibus locustis: spemtor & hydropticis herbam. hoc succat, & in vino drachmæ pondere potum promouet.

Deoedum herbe ac seminis cura vicia morbos ac induritates in se sua mitigat. Citius tamen si men cum Pulgore bibere ne item & suffumum ac suppositum. Capitis dolores in casta si men solum. souentur hoc addito oleo & aceto Lethargici ac phrenetici.

Folia si flata ac subtrata venena fugant, & imposita moribus illorum auerunt. Testium ductum cum butyro & solis vitium emoluant: leditimo semen cum aqua impositum mitigat: cum salita verò medetur luxatis & vulneribus. Virgulum qui manutenerit, dem sterfacit, sequat intertingam frons: sedes *Dioscorides*.

De *Ligustro* sive *Phillyrea*. CAP. XLII.

*Phillyrea*.



**FR** VITAE arborecens Ligustrum est, cuius ramuli aut virge recte solum conuulsantur mollibus, respiciendibus, saturato colore virentibus, Clematis Duplex sive Perunice arbor, sed tamen longioribus, quoniam Oleum masonibus, lapidibus ac nigricibus: flores candidi, sunt nec odorati, parui, pueritiam sequuntur: hanc ita virentes, permutata tamen rigore, in exigua vix modum conglut, que siccum reddunt e rubro paracaste purpureum: radices hanc inde per obliquum sparguntur.

Italia, Gallia, Germania vique, atque plerumque Occidentis regionibus Ligustrum familiaris est: loca autem marginata, ac in sylvis quandoque repensam rigore ac aquosa amat. Ad septimas itenas à nos nulli expectat, que facti opere hanc inolepenter conuellit.

Sub finem Maij mensis, aut Iunio flores facit: Autumnos ac circa hyemem hanc manantur, que subinde tota hyeme restit, delentibus interea folijs, que Vere nona conuellit.

Latini Ligustrum: Itali hoc utant *Gastrea*, vocat à Ligustro cuiusdam, appellat *Carceum* est *porosa*, nequaquam verò *serpice*: Cyprius siquidem frater Oriani proprius, Ligustrum Occidentis familiaris. Magna quidem eius cum alio similitudo est, ut ipse de Cypriosis ostendunt: sed tamen hoc differunt, Bellio teste, quod Ligustro tota hyeme delentur, Cyprius verò perpetua fronde virens: hanc & Cypri folia capillos nassant, ut *Dioscorides* ait, ac, ut Bellio testat, ad hunc tingenda colore facunt, Ligustro verò ad necture usum hanc quaquam ferunt. Proinde perpetua *Pharos* lib. xxiii. cap. x. Ligustrum eadem arborem esse ostendit, que in Oriente Cypus. Quod tamen non ex his, sed ex aliorum videtur sententia scriptis: nam lib. xii. cap. x. xiii. Quodam aut, hanc (scilicet Cypum) esse dicunt arborem, que in Italia Ligustrum vocatur. Est verò Ligustrum ipsam Græcos appellatum *porosa*, que dicitur pro ostendit.

Phillyrea, neque *Dioscorides*, arbore est Cypio magnitudine similis: folijs Oleæ nigricibus ac lauribus fructibus habet Lentis si similem, nequam, si belicem, accematim color et odor: ac tale omnino ipsam Ligustrum, vñ iam ostendit.

Phillyrea, neque *Dioscorides*, arbore est Cypio magnitudine similis: folijs Oleæ nigricibus ac lauribus fructibus habet Lentis si similem, nequam, si belicem, accematim color et odor: ac tale omnino ipsam Ligustrum, vñ iam ostendit.

Mabaleh  
Scripae

Arabe Scripio Ligustrum cap. 21. 212. Mabaleh nomen est. Est tamen & aliud Mabaleh grana m. cuius mentionem facit Avicenna cap. 478. repeda calose nobilitate ac dolore fopis. Scripae de utroque simul capite videtur, & dicitur Mabaleh solo vixit capite male obli-  
xum. Appellatur vero à Germanis Ligustrum *Dioscoridis* / *Pharacoli* / *Armeniaci* *Scripae* / *Belgae* *bedrupe* / *Arabum* à Gallo *Treeser* ab Anglo *Popper* à Boloceno *Oprom*.

Bacca fere qui vobis Vaccinis erant dicitur, atque Vaccinium illud esse, cuius architectura lib. 6. 11. Vitruvius meminit cap. 2. 1. 1. de coloribus purpureis. Eadem ratione, inquit, Vaccinium recuperaret, & hoc melleos, porporam faciunt elegantem. In tanta veterum bonitate, quid poterit ceru afferre, aut hinc?

Frigida aerea & adstringentia sunt folia: ad omni & tenuillimum incipiens inflammationes plurimum conducunt. Baccas merala, rosas, alacq, nonnullis sacis hyem. hanc mactende videntur.

De Cypro et Dioscoride &amp; alio.

Cyprus.



CAP. XIII.

Cyprus haec folia.



**N**ON magna quoque arbor Cyprus est, mali Panicea in græcis dicitur, aut paulo amplior: folia eius oblonga sunt ut Otusa, sed tamen laevora, molliora, & non penite candida, sed vitentiora: Baccas cardida, racemosi, odorati: fructus sunt bacca nigra, Sambuci acinis similes.

Cyperum inquit Dioscorides dicitur in Canopo & Acalone. Canopus artem vrbis est Aegypti, ubi est colens, quae vrbis ex insula Canopico Nilu ostio agnomen dedit. Acalone civitas est Palaestinae, quae Syria est provincia.

Planta Cyprus in Aegypto quoque arborum esse tradit, Zupha folia, femine Cotandri, flos eius idio, odorato: Comandri autem semine cum Sambucus baccas magnitudine satis convenit.

In Aegypto magna haec, & hoc artem est provinciae, vrbis eius folia fructus colliguntur, resicinasque in alia provincia inveniuntur, praesertim Turcorum imperio subditas, ut Bellonius lib. 12. Singularium refert.

Cyperus admodum est: Latini eandem vocem servant. Falluntur qui Ligustrum, Plinij asserunt decepti, sustinere, ut superiore capite ostendimus, Arabum Acalone sive Herce est appellatur & modo à Turcis Henne.

Adhibetur

*Pseudoglycystrum.*



*Syringa.*



*Astrucoriam* autem vim Cypri habent fo-  
lia, ut *Dioscorides*. *Commandacora* omni vici-  
nibus molentur: terram in similibus omnibus im-  
posita proficit. *Decoctum* ipsius ambustis af-  
funditur. *Ruffian* eadem in terra capitulis: herbe  
*Lanaria* succo mactata, & illis, ut quidem  
*Dioscorides*. *Bellonius* non modo capitulis, sed  
& inferius humari corporis guttis, tere &  
vngues his colorum: ac tunc refert: quod apud  
*Turcas*, ut est, pulchrum habetur.

Flores cum aceto frangi impositi, capitis do-  
lores sedant.

Fit & ex his Cyprianum oleum, odoratum,  
tufficatum, & peruror emolliente.

*De Pseudoglycystra.* CAP. XV.

**PSEUDOLICYSTRUM** ad medicocriti-  
boni magnitudinem ferè adolefcit: folia ei  
sunt oblonga, lataq; veluti minoris *Cerasi*: flo-  
res candidi, (sive citreus, plures ab uno tereti  
oblongo pediculo ordine digressi dependent,  
quibus succedunt bacce: per maturitatem nigra,  
oliva minus dura, haud magno, & ipsi: *Limonis*  
eleganter imbricata, in quibus exigua nucleus.

Reperitur hanc arbor in partibus Belgij locis,  
sed tamè rarè obvia, in *Austria* frequè ad mod-  
um vititur, ac in dentis *Silesie* quibusdà sylvis.

Floret autem *Ligustum* illud incipiente  
Majo mense: baccaq; sub *Autumno* ad matu-  
ritatem pertinetur.

*Pseudoglystrum*, alio deservitum nomine,  
appellatur: sunt qui *Asper* sine *Vincet*, sed per-  
peram vocantur: unde & *Pseudoglystrum* a nomi-  
nibus istis: vulgè *Staphylem* vocantur. Sa-  
piuntur nominibus *Mahaleb* illud esse, de quo  
*Aucenna* cap. 473. & quod à *Scriptoribus* ex *Mes-  
sura* sententia refertur: sed obliquam difficulte-  
tatem facit asserere, cum *Mahaleb* illud ab  
*Aucenna* nullis expressum nonis.

Caeterum quòd ad *Pseudoglystrum* attinet,  
eius quidem in medicina vim esse nondum  
acceptum.

Nuclei què in officinis continentur, vi *Cer-  
asii* nucleos sapore satis referunt, ita quoque  
facilitate ipsi et spondere videntur, semper mod-  
o videlicet calidi, & vixis clementer promo-  
uentes, ac ne partibus ea propter vitiles.

*De Syringa.* CAP. XVI.

**SERINGA** a frutex amplius luxurians, condi-  
ces eius ac rami gemulis arbutulis, tereti  
cornu subrubro carnisque fondescunt, interior  
verò candida, fergosè, molliq; medullare pletu-  
tum: folia oblonga, lata, venosa, ambitu leuiter  
incisè. *Pyri* foliis magnitudine formaq; ferè af-  
firmis, sed asperiora, ex uno gemulo basi sibi  
opposita: floris spicis hanc ordine digressi si-  
fingit oblongis candidis, ex quibus ter do-  
cent longitudo folia, cum gemulis qualesdam  
odoratis



odorato: fructus parvi, crispi, ac quasi ex multis exiguis vabulis colorum ore, & superius latioribus, versus pediculum contractioribus, per maturitatem nigri, in quibus firmus cortex & obliquus, radix aliorum forte in modo in comulos dissoluta.

Apud Belgas communè albi quàm in heras sequuntur: ferunt ex Hispania alios fructus.

Sub fascim. Ming aut ferus flores in heras apparent: sicut Augustus aut Septembris perficitur.

Syringa à recentioribus nominatur, aut potius *syngg*, ut est, *affinis*, quod d'caudicibus ramis exemplis in edulis affinis sine & inanis. Cognoscitur non tam quodam candida, aut Syringa candida flore, ad differentiam nomen Liliacei, quae Syringa carulea subinde dicitur.

De viâ autem & facultate huius fructus nihil compertum vel quæ habeamus, vel ab aliis acceptimus.

## De Liliach.

Liliach.

Mantiliola  
maxima.Glans  
veneranda.

## CAP. XVII.

**F**RYTICOSA sive est quæ nostrâ Latine Liliach appellatur. complures hæc à radice præter virgas, sive tenues caudices rotundos, ramulos, geniculis quoque, ut Syringa, aut ræpna, sed bonitate, ceteris minus cultis, anteaque vix medulla candida quoque ac saporosa. sicut hæc è singulis geniculis duo sive opposita, lata, acuminata, latis, macra, dura, verrucosa, ac magis resplendentia quam Syringa. flores recentium colorum exigui, ditiore cæcule, ex tenui oblongo: cetero in quatuor parvas folia explentur. succedunt sibi que planæ, oblongæ, per maturitatem purpurea colore, membrana rugula intricatæ, in quibus firmus quatuor sive angusta, acuta, radix in non paucis fibris distribuitur.

Aliunde quoque in Belgium hæc importata, herarum facta oleum.

Floret sub fascim Aprilis ac Maio transit.

Recitatur, ut dicitur, Liliach non tam quædam etiam Syringam caruleam. Vocem autem Liliach plerique Ben interpretantur: Ben verb Scaptonis & Arabum, Glans est vulgaris, hæc est, *Bené* populi Genicorum, à qua Liliach plerimum differtur est. Inter alia differtur evidentissimum est, Liliach nullam macram sive, vixitque à Mantiliola contra venentem si appropinquat: sed siquam exiguum circummodo præter, cuius semper nihil oleum committit.

Glans vulgaris tunc fructus est arboris Tamaris similes, magis radice. Aucellæ tunc, è cuius nucleo, non sicut ac ex Amygdalis amara, oleosus exprimitur factus, cuius ad præiosâ vaporem visus est, ut Dioscorides ait hæc verbis arbor non tam tunc etiam neque hæc tunc sunt oleo odoribus imbuta, chirocheci sanguine, sicut odor gratia conciliantur.

Ceterum Liliach viam aliquam in Medicina esse ignoratur: idcirco & facultates eius incomperit & latet.

## De Rhoi sive Rhoi caryaria.

## CAP. XVIII.

**R**HUS ad duas aut tres cubitos affurgit, subinde cultis & foveando solo procerior habetur: aliæque etiam superis, in ramulis, aut cunâ, virgulis multas descendunt: foliaque plures, ut videlicet aut xi. constituntur, quorum in mediis ramis sive cæca suber, singularia verò foliola trilobant, lata, oblonga, & ambis firmata. Flores candidi recentium prædant, succedente femine aliquantulum late, quasi Liliacei, ad Terribitum fructus maturitatem accedente, quod tandem rubescit. radix basi sit descendens, per summa cæpitum hæc.

Theophrastus huius duas facit species: masculam & feminam: quorum vix feribit aut fructibus.

Plinius lib. xxi. cap. xi. Rhon duo etiam genera describit: alterum *lydæum*, quod nunc non nisi Rhon ferunt: præter hanc sive Lytham folia Myri esse refert: mox hanc in caryaria appellat: aut, sicut dicitur, cubitalem, cuiusmodi dicitur, *lydæum*. Superius autem hoc

plum liliacei  
appellatur.

Rhus coriaria.



gangrenas & pruritum cohibere imposita.

Constituatur ex arida foliis in aqua ad mellis consistentiam decoctus *3℥ss* (recoctus *℥ss* est fructus extractum dicitur) ad eadem vii. Lycium coramans, antheae Dioscori de Paulis verb. *℥ij*. antheae et a speculum è vicinis foliis succum huius loco commendant.

Semen eisdem effectibus probet: Coriacorum & dysentericorum obolus admixtum fructu, iuxta, saggillata cum aqua impositum inflam. ratione accet. linguae asperitatem cum melle pentuaxam oblige: malicibus profluviis salia: haemorrhoides nimia profluente cum quacum carbone impositum cohibet.

Aqua in qua semen insutum decocta consistit, *spissaturq.*, que & ipso semine efficacior habetur. Desinat & ex ipso fructu gummi, quod dentium cariesibus interdum dolores solvit, ut Dioscorides refert.

De Coriis Coriaria. CAP. LXX.

**CORIVS** Coclearia frutex quoque est haud magnae altitudinis, ad quamvis aut quinq. cubitos assurgens ramales sem. complures, rotundos, obtusos subrubente caerule conuertes folia lata, venosa, rotundis longiora, quorum pediculi tubent. Vni folia ferè similia, sed minor, laeviora, & dilatatiora. pro floribus in summis caulis crispae ut, rotundis, mollis, veluti lanugo, cop. est, infra ramos caespitosa, obtusè purpurei sine puncti coloris. Laniibus minor et aguis lanugo, que postea se quantur, è rufis subnigrescent. radii lignosa haud alio demerunt.

Reperitur in pterique Italiae & Galliae montibus, in Hilliis Alpibus, in Pannonia superioris, sive Austria, tum & in Hungaria, et Bohemiae oribus sylvis.

Nominatur à Plinio Conrus lib. xvi. cap. xviii. Est, inquit, in Apennino frutex, qui vocatur Conrus, ad lineamentum modo Conchylii colore insignis. Est tamen & alius Olearis sive Olea sylvestris, à qua frutex iste multum differt. Proinde Conrus Coriaria et sic dicitur potest placet nonnullis Scorum appellation, quae apud multum Veterum vocatur. Pannonij *Justitij* vocant. Existimatur verò & hic frutex Plinij esse Cogrygia, de qua lib. xxi. cap. *xxii.* his verbis agit: Similis (siccatur Voodoni) & Cogrygia folio magnitudine minor, prope ramos habet trachem a mendi lanugine (*pappum* vocant) quod è rufis sty. arborum cunctis.

Sunt

Cotinusoides.



Chamaejasme.



Elaeagn.

Pithecellobium.

Sunt autem huius folia, utriusque virgulae, vna cum ferramentis valde adstringentia, frigida, siccaq; veluti Rhus. Derivatur etiam corticem minus felicitet & eleganter hanc frutes foliis, ac ramibus virgulis, quam cum Rhoë.

Radix ad trichuram (vt refert Anguilar) vitu, rubens colore lanis purpureoq; indurta. Quod Pimenta huius generatur, ad linamenta modo Corchyle coloco in spem fructuum hanc (radice nempe) esse notata.

## De Chamaejasme. CAP. XX.

**C**HAMELEASME hinc in Sanguis est frutex, cubiti altitudinem non attingens ramulos prostratos nonnullos folia hinc hinc laevia, oblonga, Myrsin foliis hinc multum distantia, sed densior, & subinde longiora è sine foliorum flores spicas exiguas laterali exant, quibus femina succedunt aspera, acerrime pungentia, in racemum capiti lobelongi formam coherentia, oleoso succo per maturationem redolentia. color subellenti & dura. Totus frutex cum gravitate quidam odoratus est, praesertim femina, & cum oleo preparanda.

Quaedam loca in ceteris & cretasis, aliquantulum apertis ac palustribus. In Brasilia plerisque locis, & apud Bahiam ac Flindrem non raro occurrat.

Mais ac Iunio flores apparere hinc & Angulo semen perficitur, tunc collectus fructus ad fore in vna cum fructu infertur.

Bahiam ac Flindrem Elagii appellatur: nonnulli Myrsin Bahianam & Flindrem vocant Cordus Elagium: nobis Chamaejasmi vox placuit. Elagium siquidem Theophrasto describitur fructuosa, Vitis similitudo habet ac lanuginosa flore Populi, qualis hanc est à nobis descripta.

Nomen apud Venetos, quod scimus, non invenit, nisi sit Rhus sylvatica Plinij, de quo MEXICO cap. 31. Herba est, inquit, sylvatica, cauliculis hirsutis, quae venosa & urea pelit.

P. Pena & M. Lobelius dicit omnino pro Rhu sylvatica fructum ex herbis, ad curam preparanda etiam videri, ramulis quadringulis luxuriantem: virentibus frequentibus foliis ovatis, Myrsin aut Rhoë similibus, cuius femina in singulis vultu spinis ac cecidibus modo convolutam gignunt: quod magis quam Rhu herba sit.

Familiae esse referent Narbonne Galliae, & iuxta Lam. Burmanni pas sive margoscopium frequens esse nata.

Sed ad Chamaejasmem maxime hinc hinc femina in pensè calida ac fœca sunt, ad usum vniuersique gradum accedunt. Folia quoque calida & facultate fœca sunt, sed modo mi-

nat. Fructus cerebro mollescit: certissime intercompendium adducitur quod à plerisque fit. modam caputamentem, & citò ebrietas ad ferentem eam addit. Totus frutex cum fructu asidus, vestimenta intrapofita, à nigris & vermicibus ea tacta.

De *Lantana* seu *Fabiana*.

CAP. XXI.

Lantana.



**I**NTER humiles frutices & Lantana nomen, ubique à quodam sine respectu dicitur esse huculterale, aut alio quodam, dignitate aut pollicitate crassitudine, lentum, foliis facile, frangisque contumaces, cortice albicante: folia vero magna, lata, umbra sine marginibus crenata, Vires magis admodum & forma ferè similia, sed hirsuta & dum viget caridula, rubescens verbò cum citò calida emarescitur, que ex singulis ramulorum gemis albis ex aduerso coarctatis flores magnos emittit utroque diti, acim succedunt in vitem congesti, Lantana magis admodum ac similitudine, vitemque leuiter compressi, qui maturo viuent, inde rubescit, per maturationem nigrescit, vitem perferentia crispam hanc & alio dicitur gigni.

Locus fruticibus, asperis, ac petrosis, in montibus ac syluis etiam proceris Italia, Germania ac Gallia nota.

Estque forma vilitatur: hanc sine acini sub Autumno ad maturationem peruenit. Vero noua folia exiunt.

Ita vulgè *Lantana* nomen: Gallia *Parasitica*. Creditur esse *Viburnum*, quod huiusmodi lentumque fruticem Virgilius *Bucolica* *Æloga* penia oleoidis, Romanis commemorat vitem:

*Peris hanc sentem alia inter capis cunctis videri, Quamvis lentis foliis inter Fabiana Cupressi.*

Sunt autem Lantana & folia & hanc refri-

gerentia, refrigerantia, & adstringentia facultatis.

Ad tenuitatem & guttura, omnisque omnia cum inflammatione tantum decodum infuso vilius parantur: hancora gignas contrahit & dentes sanat. In hincis eadem decodis capillos demergit. Acini facultate respondit, quorum acidorum puluiculis fuerit, suppurisque proficiat, tum & male hanc cohibet. Ex cortice radice aliquando in sub terra macerata, ac deinde decodis infusoque, vitem ad aucta parari posse hanc qua referant ac asferunt.

De *Buxo*.

CAP. XXII.

**B**UXUS parus arboris similitudine affurgit, radicibus subinde humani cruris, raro firmioris crassitudine, ramosa est: folia verbò habet magnitudine Myrt ferè, sed duriora crassioraque, rotundi longiora, laeva, ac respicendona. Hirsuta herbositas sunt: fructus rotundioribus, ingratissimis, & omnibus animantibus inani: vt & Theophrastus lib. 1. 11. testatur. Materie ligni densissima ac densissima quidem, sed id opera quevis cocouentis, & velle molabilis, grossissima quoque, & in aqua subidens, colore luteo pallidioris, camentac teredines non ferit.

Huius verbò & alia quedam species humilis existit, que ad decem aut tres pedes tantummodo auallitur, sed in latitudinem diffundit. hanc a ueteris quoniam admodum saluam verò rotundiora & diutius virentia.

Alpina & umbrosa Buxus loca amat: nascitur in alis quoque ac rigentibus montibus.

Peperit autem viret, nec frigora horret: April noua germina promit, atque subinde hanc.

Buxum autem Greci *εξοξ* vocant: Germani *Wachsbäum*: Belgæ *Boeysem*: Imperatores verò

Bona.



Virga sanguinea.

Virga  
sanguinea.

virga vulgaris *Sambucus* Itali *deffe*: Galli *Argy*:  
Alypi *Sane*: Bohemi *Puffjan*.

Mores *de*: *de*: *de*: *de*: *de*: *de*: *de*: *de*: *de*: *de*:  
& valuerit: aut humilis Bonis.

Bona fola, quantum quidem gustibus qua-  
litas ostendit, cum faciente quaedam adstringens,  
viam tamen nullam in medicina habent: nam  
quod quaedam huius comam rorant spogiositas  
proprie carere caret, nam fructus vel odore  
frequenti, quam tamen exigua habet, cre-  
bitu ac capiti molestus est. Multum vero & si ve-  
nitur abstrahit, qui huius scobe, ligni Gaiaci  
loco vii voluerit.

*De Virga sanguinea. CAP. XXIII.*

**V**IRGA sanguinea ab Italis dicta, Gorno ut  
similis est, in arboreo tamen non exarita,  
sed fruticosa permanet. virgula eius nociva  
sibi videtur fuit, ac obcurat purpurae colorem ru-  
berit, utis vero modicissimi aliquid ac sangui-  
nem habere, veluti Sambuci: venatione vero  
candore, ligni materia dura ac ossa, Coma  
non ex dura, quam Italiam habere, folia qua-  
si Coma, lara, vis sua fuit, ac per se, quoniam  
pediculi etiam ruberit, quandoque & quaedam  
recurrunt venas. suffraganea in Belgii  
ribus alba granula sunt: laccis vero in vi-  
rentibus, cum vero mature fuerint nigrescen-  
tibus, sapore ingratis & voluerit mali desiderat.

In domis ac sepibus cretat, potest agri ac  
lyana.

Vire, Aprilis mensis flores exeat: fructus Au-  
tumno maturatur in coarctantur.

Italo vulgo *Sanguinea* & *Sanguinea* vocatur  
Petro Crescentio *Sanguinea*: Mantuato *Virga*  
*sanguinea* Extant paucas de *Virga sanguinea*  
apud Pliniam lib. xxv. tit. cap. x. Nec *Virga*  
quit, sanguinea felicitate habetur: comae eius in-  
terior circiter, quae profusante, aperit. Diffi-  
cile aut fortassis etiam temere sapit, ex his pa-  
cis verba, Plinij *Virgam sanguineam* eadem  
cum *Sanguinea* affirmare. Germani hanc *Sanguinea*  
nomen: Belge tamen *Coma* id est,  
*Coma sylvestris*: & Gallici *Coma*  
*sanguinea*. Valerius Cordus *Sanguinea* fuit, id est,  
saliam sine spumam *Comam*. Videtur vero &  
huc esse Theophrasti *Sanguinea*, sine *Coma*  
femina. Virgulae hae habet parvas, modicam  
meum comae, non veluti mans domus ac solida:  
fructum vero digne, hoc est, est huius  
adonem, & fructum, ut qui post *Sanguinea*  
equinoctium demum perficiatur. Ac *Sanguinea*  
dem *Coma* sylvestris sine *Virga sanguinea* ca-  
tus non ac tenilla tenuitate, ruberit modicam  
meum, ut sit plinij, habens laccas veris angus,  
& qui tunc manentur.

Partium distindendi hocis alius fuit, quod  
dam enim habere calidas, amaras, & creterio-  
mas: plerimas vero frigidas liquas, acerbis & ad-

frangens: Viam tamen in medicina nullam habet: Mithridates ex bacca prae decoctis, deinde perle subditis, oleum exprimit, quo Anaxibiles ruffici in lacrimis utuntur: Quod verò de cortice Virga tanquam Pharus scribit, id praefate perle corticem huius Corni ly- uetis hinc Virga sanguinea nec cognoscitur, nec verisimile est: Alio enim, ut iam notatum, corticem eius in teneris et carnes, quae praesentem, aperit.

De Eucrysa.

CAP. XXXIII.

Eucrysa.



**H**AEC procerata frutex Eucrysa est, mali Paniceae magnitudine, tenuis plerumque diffunditur: vixens caudicea costibus umbellatis: occurrentes ac non ita dudum crux virent, & quibuldam in cortice emittuntur quadrangulari apparet: ligni maresca dura, et dilute leuco alba: tota oblonga, lata, teretis, ac modica sunt. Flosculi albi: quae ferre, ex tenui pediculo umbellae ferre utitur coherent fructus quadrangulani, rudent, quatuor continet grana alba, quorum singula latero contiguntur coeunte, qui de tactu latero inficit colore.

Locis incultis ac fructuosis exiit, dura asperis collis & aggeris non tam & aqua pro temperamento est vna cum Rubra aliisque lentibus.

Aprilis mense flores: fructus solo fine in Augusto aut Septembri mense maturi apparet.

A Theophrasto hinc frutex *βοκρυσα* appellatur, & lib. 111. De stirpium historia ab ipso describitur: nostralli Anaximenes perum esse legunt. Petrus Cisterciensis Falsam appellat, quod ex huius ligno fusi sicut atque eorundem caulis à Germanis *Euche libani*, plerumque tamen *Quadrifidii* dicunt: Brabanti verò *pagansum* Ital. *Pagine*: Galli *Pagine*, & *bosset di prestre*: Angli *Spindel*

ita. Qui hanc *Euche* sine Jugalem faciunt, à vero recedunt: *Zyga* siquidem Accra est speciosa, ut infra dicetur.

Perniciosus autem hinc frutex omnibus est, et Theophrastus scribit: capris verò & nocuus. Fructus huius, inquit, omnes excocat: similiter & foliis ac fructus capris innoxios innoxios, nisi nisi superque purgantur. Ferrae verò hinc fructus huiusmodi exhibitas, & per se peritas ac per infirma purgationem moliri, si vero aut quatenus fructus deoter.

De Frangula.

CAP. XXXIV.

**C**OMPTANS à radicibus rotas virgas ede Frangula, ut autem, pedunculata, posthinc etiam in modum nonnullis dicitur, quantum exterior cortex asper est, qui verò ligno perennans seorsum, utens, ac latero quoque Croci colore tingit ligni materies candida & singula, ruficofeae quodam modo illa media: folia sunt quibus Alni vel Cerasi, nigriores tamen & paulò rotundiora. Bacculae umbellae: bacca rotunda fructus sunt, in quibus solum quaedam apparet, quae ex duabus in vnam coalescent, colore initio virentes, deinde rubentes, postea nigrescentes: nuclei verò in his duo sunt exigui. radix per summa caespitem vegetat.

In Italia apud Brabantem frequens est, praesertim humidoribus ac vltigioso solo sine. Repertur & in Germania ac Bohemia.

Vae noua folia & flores asperantur: Autumnis bacca.

Alium nigram fraxinem hanc sunt qui vocantur alio Frangulae nomen magis placent Petrus Cisterciensis Anomus est: Brabantem *Spindelstern* & quandoque *Pastellus* quod pueri in his ubi ita consistant Germani *Jantheum* Bohemae *Kreppra*.

Fraxela.



Colera.



Colera.

Interior autem tubuli scrotes apud ruficos varicosus in viti est, qui eius venter dilato, quando corpus expurgare cupimus. Expurgat autem casualis praecoxior humor, utrum & bilis sit & non modò per intestina in sedem, sed et quoties autem vomitione, cum magna vertiginis perturbatione ac molesta. Kulis omnem idem modò est mediamentum, quia vibracionum, ac eorum quae in illa velle stratione videntur, quàm delinere visentium. Sunt verò & quaedam, coracem aridam stracionem esse, ac minores in oleas exarare: recentis sicuti ac nonnulli reficere humiditatem quandam superfluum adesse, quae tortionem adesse ac vomitiones excitat, verticulisque perturbat.

Idem verò cortex in vino aut aceto decoctus collatione dentium dolores mitigat: aduersus scabiem & curis scabietem etiam commendatur.

Folia lectum feruntur bubus, ac propeque vocis pabulum, quae hominibus pastae reddunt copiosius.

De Colera. CAP. XXVI

**F**ERTICOSA quoque super Colera est, hominis altitudinem superans, ramulibus lignosis ad admodum crassis, qui interueniant purpuracei, solum oblonga sunt, ex pluribus ad vnam nervum composita, veluti Viciae, sed maiora, quosdam singularem cum paraculisibus Fernagru comitari possunt: flores albos sunt adter Genip. succedunt siliqua vesiculosa, vltis difflente, ac veluti ventro inflata, colore nonnulli purpurascens, in quibus lentius datur, nigra, plana, ac Lentibus proxima.

Hocensit apud Belgas est siliqua, & feruntur nascitur: cito perficiunt sermo anno flores & fructus facit.

A Maio in multam altitatem flores: interea siliqua maturum si non parient.

Fructus hic à Theophrasto Graecè esse videtur per as diplichogum in sicuta siliqua dicitur: Latine, interpretate Gata, Colera, aut Colera: Germanè Wetz, inquit Galia Agrostoides. Falluntur qui Seram esse vident: idcirco & in populo Belgae Seram vocatur.

Differens autem haec Colera est ab altera, quodam per o sic vnde siliqua Colera siquidem hoc, ut Theophrastus lib. 11. scribit, fruticosa & siliqua, ad est, odorata, & multo ramosa est, inueniuntur non siliqua folium habet Laurum veluti lentibus Lauri, rotundius tamen et maior, simile apparuit Vitis folio, sed oblongius, coloris vni parit hybrido, inflorescens verò albedo ac nereo,

anthesi, et nec non later, sed veluti Vitis vel Citrus. ligni menses dicitur falsisque. radices per  
 semina vagantur graciles, foliata, casta, & valde hircæ. florem fructuque dicitur non pos-  
 sent. Ea de Colocyta quidem hæc.

At Colocyta fructum suæ Rinsen, quod in siliqua nascitur, mirum in modum oves pinguet  
 facere, Theophrastus sempiterni reliquit.

De Anagyris.

CAP. XXVII.

Anagyris.

Egleia.



**A** N A G Y R I S exiguæ arboris induræ frutex est, ad humanæ altitudinem, aut interdum et  
 amplius assurgens: mœnia à caudicibus suis fundit complures, si hinc repens, quæ oram  
 cortex saturato vitæ tegunt. Folia circa hæc ab uno pediculo ternis, Trifoliis Alphatini  
 similia, distans tamen superius vixima: flores oblongi, sæpius colore lacteo, Genalæ per similes,  
 hinc minime quoque coherentes. silique succedunt pollicem longæ, in quibus renem forma  
 Phascolis similes duo fructus, sed minus omni in eis albedi, deinde purpurascens, postquam è  
 carnoso signantes. Ingrato autem huiusmodi hæc flores odore sunt, veluti Spicalia fornicæ,  
 adeoque grævi, ut & præterea vitibus mole illis sit.

In plerisque Galliæ Narbonensis, tum & Hispaniæ locis absque cultura præcipua: tum et  
 alibi ferax vitæ, veluti in Creta insula, ut Bellonius refert.

Præmo quoque et tempore flores præducit: sciam cum vna, Dioscorides inquit, dicitur sit.

Græcè ἀναγύρις, τὸ ἀναγύρις, quæ & incorrupta adhuc vox in Creta permansit: Latine  
 Anagyris: à ἀναγύρις τὸ ἀναγύρις, aut, ut macrobius scribitur, ἀναγύρις.

Existit vespè & alter huiusmodi multum dissimilis frutex, non raro arborescens: folio quo-  
 que Trifoliis: floribus lacteo, racematum palmis longitudine digestis: siliqua ac ferax in  
 præcipuo: quæ non modò grævi, sed & omni destituta est odore.

In silicæ ac montibus hinc præcipuo Tridonto frequens nascitur.

Vulgè apud Ananenses Egleia dicitur. Refertur hæc ad Laburnum, de quo Plinius lib. 2. c. 21.  
 271. cap. XXVII. Alpina hæc arbor est, nec vulgè nota, cuius florem cultusalem longitudine,  
 spes non stringant. Rapponit autem Marcholus, qui inquit Anagyridis situm speciem  
 fuisse, quæ in Laburnum esse concedat: formæ quidem racematum, aut, non cu huiusmodi, sed

TY 3 palmi



palmi tantummodo longitudine esse: apibus vero flores græcos affirmari. quæ à Plinij ag-  
gerunt verba.

Ceteram Anagyris, ut Galenus scribit, exaltans ac digerens est facultas. Folia,  
Dioscorides ait, petra circa orbem maris præstant (impolita cum pulso vino d' ratur) pondi-  
se bibantur adacris afflata, & si mentes, secundæ, aut fortis hæbeat, ad cupere verò cum  
vino dolores. Radix succum digerit ac materiat. Semen cum flum vomitiones citi. Quod  
non modò græco tantum Anagyridis, sed & alceris Eglecio dicitur, ut Martholus testis facit.

De arbore Iuda.

Arbor Iuda.



Spina.

Cavus.

CAP. XXVIII.

INTE fructus nomen ista verat & Ar-  
bor Iuda dicitur, non nisi cultura abori-  
cens, qui accedente, haud difficulter abo-  
na affurgit modo, e cordice ignoto simi-  
lud nonnullis promit, comitibus pappo  
nigracibus, à quibus flores in breves  
pediculis eadem forma Oculi, sed colore  
elevari pappo rubentes, quandoque &  
ciliis, simulato rorice & viti abscen-  
te. Folia rotunda sunt, Mas ferè simit, sed  
molliora, tenuiora, dilutiorque viridia si-  
liquæ succulentis floribus, digram longi-  
tate, plane, semine, compressa, in quibus  
semen planum durumque veluti Læva.

In nonnullis Hispaniæ provinciis se-  
pitus ac duntaxat reperitur: Iudæ quoque  
procer, ac Narbonensi Galliarum agri hoc  
non deservatur fructu.

Flores primo tenui porre erigunt, & post  
quam folia: siliqua raris maturat.

Vulgò Arboris Iudæ nomen incantit:  
Sunt qui Sycocoma appellaverint, quod  
valde est à trullibus rapula formæ ac si-  
liquæ dependens: Sed legitimum Sycocoma  
fuit. Factum refert, & testis habet qua-  
da miferat apud: unde dicitur. Ab ista  
specie roritur esse, de qua herosus Theo-  
phrastus: Cercis fructum in siliqua fieri.  
Quæ ad id præca sunt verba, ut et haec ad id  
verum habent quest: plures etenim in siliqua

fructum ferentes fructus sunt. Galli *Castor*, qui ali vagantem appellant: Hispanorum plu-  
rique *Almyra* vocat, et siliquam fructum dicitur *almy* *Arbor* dicitur, propter oleum.

Incomperit autem & inco græce huius fructus verus sunt & facultates. Nam quòd Mar-  
tholus hanc Acaciam (additis præter veritate spenis) facit, signentiam est.

De Cassia.

CAP. XXIX.

CASSIA autem magnæ ad instar, ut de ramo in foliis oblongis & aliis pluribus caracte-  
ratis, veluti Præcia, sed particularibus eorum lectionibus, d' ementibus, secundæ oblongis, fructus  
oblonge sunt siliqua, pede longiores, pollicem late, plane, crasse, in quibus semina plana la-  
tente. Siliquæ ipse sapor dulces sunt, & à nonnullis eduntur, sed non pennis quam dicit Col-  
licæ & velleste fuerunt nam videntes albas, etiam mature, ingratæ sapore, esse dicitur.

In Arabia regni Neapolitani provincia, tam & nonnullis Hispaniarum locis in cultu aggerit.  
Nasitur verò & apud Indos aliisque Orientalis populis, ubi siliquæ melleo ad id rorant-  
dant succo, ut eo ad conditarum Zambiria, alioquinque fructum viderit, ut Martolus  
refert. Strabo autem lib. xv. Aristobolus refert ait, abscerit esse in Indis non magnum,  
quæ magnas siliquas habet, densam digram longitudine, molli plantæ, quæ qui edunt,  
non facile ferunt. Quod de roribus, quæ nondum in siliqua siliqua, videntes autem  
modò formis habet.

Flores Cassia inca folia hyeme: Vere appetere fructus melleos sub duntaxat  
prospiciat.

Arbori

Cereonia



Casia nigra



Arbori *megyris* nomen est: Lauris similitur Cereoniae Hispanis *Cereia*.

Fructus sive siliqua *megyris* dicitur: Siliqua Larina, aut Siliqua dulcis in Officinis nomen est: Xylocraula: in alia *Casida* aut *Casidula* vocatur: Italice ab *Apulia* verò *Siliqua* vocatur: Hispani *Alfarobas* aut *Alfarobas*, Arabique articulo *Casaria*: Germani *Sant Johans hew* id est, Sancti Johannis ripasem, nec alio nomine vulgo Belgarum vocantur.

Cereonia autem coccinea est: adstringens facilius, sicut & fructus, nonnulli etiam dulcedinis contenti, ut *Galenus* ait. Sicque autem nocens affertur stomacho adhaerens, ut *Dioscorides* ait, & alium solvunt viscositate verò eandem siliqua, & stomacho-gmores sunt. Vinum quoque citrat, sed praecipue viscosi exempta. Est autem prout fieri edulium, concolta difficile, atque non facile aut celeriter descendit.

*De Casia nigra.* CAP. XXX.

**T**A M ET SI non frutex sed arbor sit Casia nigra, quae tamen siliqua profert, hoc locodescribenda sunt, ne siliquarum sit necesse sit arguerentur. Magna autem & procerus est haec arbor usque ad septem pedibus, siliqua habet haud dissimiles, ex pluribus compositas, sed singulis siliquis acuminatis, maris arboreis siliqua & composita est, coloraque rugini veluti Cassiae. exteriùs verò cortice: conestitur lino: aut busi colona. Fructus siliqua: sunt oblongae, tenetes, nigrae ac lignosae, crebris lignis membranis transuersalibus intersectae, rursus quae, praeter si minus plana lateraque, qualis Siliqua, & nigra dulcisque continetur medulla, quae exempta inter medicamenta clementia locum merent.

In *Aegypto* haec arbor frequens nascitur: perfertur *Memphinae* & *Alexandrinae*.

Veteribus haec arbor incognita, ut adeò neglectum habita, ut eius non meminissent: Arabibus medulla siliquarum cognito in praecipuum habuerunt, atque deinde postea *Greci*, ut *Athanasius* & *Constantinus* alij, à quibus *apocrypha*, id est, *Casia nigra* appellatur. Est autem fructus, inquit *Athanasius*, v. multissimas & oblongas, nigram in usum humorem concretum gestans, qui haudquam sua continuitate cohaeret, sed ex intervallo sensibus lignosis membranis dimittitur.

Officinae *Casiam siliquam*, & *Casiam*, per duplex est, siliquam nominant. At Veterum *Casia siliqua*, sive *cajra*, & *Greci*, cortex ille *cajra* dicitur est, siliqua oblongae ac teretes usque concoloris: quem nunc Officinae *Casiam* vocant, & quo legimus *Casiam* loco referunt.

Ceterum medulla *Casiae nigrae*, cuius est usus, humida est ordine primo: iuxta interiore

calorem verò parum mediàm temperantiamque excedit. Vim habet leniendâ, & aliis-  
 menter subducendâ: fœces educit, & humores qui cum agrum venas habent, sedque citius ven-  
 iliores & molliores, sed tamen venereculo minus grata, faciliè manifestam excitat. Admixture  
 idcirco à nonnullis ei vel aloë, vel hæcæ præter præteritum nondum melle additis sic verò & ven-  
 torem magis subducit, & ventriculo minus nocere soletur. Alij Rhubarbarum addunt, &  
 ita quodam cholagoga fit medicamentum, atque febricitantibus ac tormina laborantibus  
 velle. Possunt & alia admisceri præ conditione morbi & laborantis. Calculosâ quoque ac  
 nephriticâ hæc quoque admodum conueniens est, præsertim admixta nonnullâ dysuria,  
 sed non vehementibus doloribus siquidem super vias lœsam & ad calculi aut accretionum fi-  
 cilorum de locata ac exorta non parum conferit.

Tam benignam autem, et molestam, & innoxiam hæc medulla est medicamentum, ut  
 cuiuscunque tandem ætatis hominibus, ac etiam pueris, tam & grauidis ac puerperis non ex-  
 hiberi queat. Fœtus admota cum aspectum mitigat, & inflammationibus impedit ad sup-  
 purationem adiuuat.

LIBRI SECTENDI PIMPTEADIS SEXTÆ

FINIS.

STIR-

STIRPIVM HISTORIÆ  
PEMPTADIS SEXTÆ

777

LIBER TERTIVS,

DE ARBORIBVS FRUCTIFERIS.

PRÆFATIO.



**R**VTICIBVS arboris succedunt, quarum tria nobis sunt fellegia: vnaus  
fructu feracius: altera (sua) fructu certam perpetua fronde: tertia (sua) fructu  
fructu autem haec vnae sunt: sed illas fructiferas nuncupare libet, quarum  
fructus hominibus edulis ac vtilis, quæ insuper, sua domestica aut cultiva ad-  
erant eorum dicantur: Plerumque vrbanae non improbi dicitur fieri, quæ vtili-  
delaus fructu mites, vel aliquando homines inuano: lib. xvi. cap. 222.

*Quæ verò fructus ferant hominibus vtilibus ablatiua, vides ac sibi-*

*itas dicitur perferre.*

Arborum verò & carum, quæ fructus edentes profertur, distrahuntur quidem sunt: Quæ-  
dam fructus caros ediles sunt, ut Poma ac Pyra: alia munda, ut Amygdala & Nux: inuoluta  
quæ & caros ac nuclea, veluti Mala Persica, Pruna, Cerasa, & id generis alia. Sunt verò & in  
singulis differentia, quæ locorum progressu facile erit cognoscere.

Cum autem de his arboribus primùm agendum videretur, quarum fructus caros sua præcipua  
quæ apti, Mala sua Poma se reliqua omnibus præferenda essent. At hac igitur vtilis, iudicium.

DE POMO SIVE MALO.

CAPIT. I.

Mala.



**M**ALI nomen hæc apud Veteres  
patet, pluribusque commune est,  
sed de præcipuo dicta Mala quæ in de  
reliquis deinde.

Est autem Mala arbor quidem can-  
ditæ subinde medietate crassitudine, ad  
altes, sed longiorum in quæ in condens in  
lanceolam caput, cortex medietate  
ter aqua, non valde scaber est: folia la-  
ta, rotunda longiora, marginibus leuiter  
crenata: flores qui in quæ folij, non parui  
colore albi, sed frequenter ex albedi-  
& dilato purpureo raien in quæ folijs ma-  
gitudine, forma, colore, & sapore differe-  
ntes sunt. horum superius pars flo-  
rum speciem tenet, inferior, qui similes  
sunt, pediculus adhaerent huius, cum quo  
arbori annexa sunt: radicem quædam  
altius, sed per obliquum cernit, detin-  
dum relique sub ipso terra crepente hæc  
illuc surgunt. Consistent autem fructus  
exerere cum, in quæ carne & semine,  
quod in locis duratissimis in quæ tran-  
scendunt in medio residet, & cor-  
ce quidem significat, medulla verò alba  
dicitur est: Per magna autem in quæ Pol-  
ma sunt quædam parua, in quæ gene-  
ris plurima non dicunt, pilloso colore  
albedi in quæ: circumspiciunt: alia  
nubent illa, & vel paræ alijque velent  
forma

Poma quibusdam rotundioribus, plerisque oblongior. Sapore vel dulcia, vel sabacida: plura et haec varietatem saporem obtinent. austeri sunt Sylicina.

2. Suae ceteris & quaedam Syliciferae Mali cultus expertae, non auster videretur, quarum fructus acerbi sunt & adstringentes. Infusioe sequi domi Poma & Pyra manent.
3. Est tamen & *γυγαρις* quaedam, sive humilis Malus, fructis modo adolefcent, quae non propriam infusorem, sed rursus sua Poma fert procrea, modice nec dicitur, coloris modum dilute flavo albentia.

Plantae aetheruntur in hortis ac paratis eò delictatae cultus ac infusio Mali Sylicinae alicubi neglectum habentur.

Florent circa finem Aprilis, aut sub initium Maii: Poma procrea quidem, non tamen Cataedis Itali: reliqua Septembris tero mense: paucissima prius.

Malis Graecis *μαλίς* est Latina & Pomae Germanis *Äpfel* aut Belgis *Appel* vel *Apfel*: Bohemis *Yabli*.

Fructum Graeci *μαλί* vocant: Latini Malum aut Pomum: Germani *Äpfel*: Belgae *Appel*: Galli *Pomme*: Hispani *Mal* aut *Maná*: Bohemi *Yabli*.

Pyroca poma humilis Mali, Brabiz vulgo Poma Parsdij, aut Poma D. Joannis vocant.

Est autem Pomorum in omni temporis singula & humida, comesta cum humore quodam excremento: verum si cum neque frigida neque humiditate est, nec quantum superfluo humore. Ceteris comparantur in quibus hoc videtur: dicitur verò alicuius possunt in quibus pauciora si advenit si quidem & excrementa humiditate corrupta est, ut si

*Dulcis et  
ma.*

Dulcia autem Poma in magis frigida sunt ac humida: carnis suae soliditatem hanc comestione absterunt: conficiunt amplius ac minus humidum, quibus cetera Poma: magis licet per ventosam etiam descendunt.

*Acria et  
ma.*

Acria frigida sunt, cum & humidiora: horum coctio cum substantia diffusa, nec soliditatem suam retinet: si in mentum parca substantia addi, crudum ac frigidum ita verò & facile ac cito delabuntur, ut in aëre commotum aliam promoveant, praecipue autem cibum assumptum.

*Acria sine  
austera  
Poma.*

Acria aut Austera Poma, ut sunt Sylicinae ac immatura, singula si sine succum ingentem emittunt, ac cito se dissolvent: minus nocent, si cito ac velociter descendunt, si haeletur sicuti pignus, ac coctos advenit dulces.

*Acria et  
ma.*

Quae inter haec media sunt saporis Poma, ac non raro duram vel raram quantitatem suam referunt, vincentis saporis facultate parum obtinent, aliis verò & participes sunt.

Præstant autem si inper medus, Poma cocta: quorum magis quae saporis modis non modo perignem emendatur, sed & additis vel aromatis, vel aliis corrigi possunt.

Prodesse autem possunt Poma ventosulo calido, austera verò etiam calore ingentem ac refulentem rotatae queant: inflammationibus omnibus, sed praecipue inperculis, Poma etiam commode imponantur.

Succus Pomorum odiosiorum ac medijs saporis compositionibus nonnullarum medicamentorum admiscetur, cum ad humorum melancholicorum contemperamentum, non & ad medicamentorum impensus refrigerantiam quantitate remittenda: ut sunt, Scorpium ex Poma Regis Saporis, Aristolochiam ex grana cocti Raphani, & si quae sunt alia.

*Figurata  
Poma.*

Conficitur verò & cum castoreo Poma: vigoratum et adipe porcina & aqua rosacea, citius ad nitorem facit & aduritur cum asperitatem vitis est.

Aeterna sola cum astrugodi facilius refrigerantur: inflammationibus itaque quoque vitia habentur.

De Mala Malis.

CA. II.

**A**RAORAE haec non ad modum magni est. rami eius terri ac obliqui est ceteris vitis, & spinulis aliquat, non tamen frequenter adhaerens habent solum oblongam, latam, lanceolobam, Lacinio simile: haece subperpetui, flammulati in medio remanent ac capillatim fructus oblongi est, Cicutum: vulgo dicto non raro minor, quod ocy minor, & Lamentum male non multum magitudine excedere videtur: haece dicitur autem coctis, tubercula nonnulla exasperata, odore grato praefata, subest caro crassa, alba, dura: insitit quod respiciens, sed exiguam, & neque acris, & si sit quilibet gustibus expone: atque modellanos in ita quidem, haece arido plena surgit, in qua ferrea coctur: Haece quoque minus ac crassa, coctis dicitur, in tunc substantia alba ac amara.

Ad haec genus pertinent & Lamentum mala, cum & Anemura dicitur, quorum alicubi Malum Medicum nigritudine, vancibus spinosisque ramis, ac sicuti Lacinio amplexu ferunt: horumque vnaque candida sunt, & Anemura odore admodum, cum & sicuti subinde miora.

Lamentum

Mala Medica.

Mala Lindbia.



Limonum autem mala oblongi crassique sunt fructus, Cortice tamen nil nocet: cortex le- Mala  
vis, amarus & succosus, sed tenuis, caro albidior, valde exiguè accedit. cupressifera-  
te in admo odore hinc mala medullam habent, siccio magis prægnantem ac todenduntur, quæ  
& cadaver est firmius & in hac continentur veluti Corry, nec firmius amara.

Anarata mala rotundam formam inftar globi obtinent, & Limonibus minorâ sunt. cor- Mala  
tex horum intensior, sicut color, necq; odoratus quoque, exteriorque cu re amarus, non-  
rubra sper, quasi rugosa, si bene crustos, quandoque ramos, sed tamen quàm Limono-  
rum est si or, si hincam habent obstantiâ a leidam, mollior, ac fragilior. interior pulpa si-  
ne medulla multo cupressior siccio mader, & firmius comprehendit menses quàm Cirro-  
rum facta, colore, saporeque alioqui similia, siccio modo dulcis est, alio acides, non raro  
medij ac virenti sapore.

Hæc verò & alia quorundam referuntur Mala, Assyria nuncupata horum arborcularum Ma- Mala  
lorum similitudine n refer: nam hæc dissimiles: folia paulo quàm Limonum in majora Mala  
flores Medicæ mala amala fructus rotundus, sed triplo quadruplo quàm Anarataj minor,  
crasso è limbo pallidior rugoso ac stiperculato cortex, in quo quandoque quædam veluti si-  
fure parent. interior subtilis, siccio alio modo est, sapore acrida veluti Limonorum,  
sed palato minus grato in qua & semina præstantur veluti Mala Carya & aliorum.

Nascentur Mala Medica, nam & Limonum & Anarata in Italia præcipue manent, ac  
in Adriatico & Tyrrheni, in re & Egæi maris insulis præstantur verò & in Mædiantem  
intra gradus æthiæ, qualis est Benicent, & Carya, sed cetera minorâ, præstantur. Est &  
Hispania horum ferax, sed locus præcipue vel in zona mare, vel hinc præcul distans: Gallæ &  
quorundam præstantur, que Mædiantem in mare astringunt, et in siccio præstantur fructibus.

A. Medica autem prima in Italiam venisse non modo Plinius aperit scribit, sed & Vir-  
gilius inquit Georgicon II. de Mala Medica sic scribens

*Mala sunt trullis fuerat, sardamq; saporum*  
*Felicis mali, que nunc præstantur vltim,*  
*Præstant si quando sassa referre novarum,*  
*Ut sicciorumq; herbas, & non innoxia verba,*

*Arch.*

Malus Anarata



Malus Aegyptia



*Malum vocat ac membrum agit esse vacua.  
Ipsi ingens arbor, faciemq; simillima Lauro.  
Et si non aliam laci calleret edicem,  
Lauro aris, foliisq; vobis labentis vorticis,  
Fies apparet tenax, omnia q; elatris Mithi  
Ora frucent illa, q; fimbria medicantur cobrilo.*

Arbores ille perperam vocat, & si Plinius inquit, omnibus horis potissimum sunt, thioce-  
dantibus, aliis mansuetis omnibus aliis vero subnatis omnibus.

1. Prior pars ab Aristotele dicitur Malum Medicum ac Malum Citrum dicitur.  
Fructus vero ab Aristotele dicitur Malum Medicum sive Citrum, & Cassianum.  
Amylaxum apud Athenienses, solum Mauritanie Regem refert, de Cero memisse, qui  
Malum hoc apud eos Malum Hespericum dicit nominari. Galenus Malum Medicum ar-  
plum vocat neget, sed Citrum dicit, utque eoque Medicum appellat, hoc agens ut, utque  
loquuntur nemo intelligat: Officinis huiusmodi mala Citrones vocant Germani Citri  
appellat Cymonem Belgae Citronem Itali Citronem ac Cobilo Hispani Citrus: Galli Citrus: Angli  
Citrus appellat Bohemi Citronem vocant.
2. Alterum Pomum genus Limonium malum dicitur: Officinis Limonia: Galli Limon:  
Belgae Limonem.
3. Tertium Malum Anaraticum aut Anaraticum, à quibusdam vocat Anaratica: ab aliis  
Anaragium, ab aliis hinc colore: Sunt quo Anarata dicit velint ab Anarato Achanae oppido  
vel Anarata genere eius nominari in Peria: Itali Anarata: Germani Demantion: Belgae  
Anaragium appellat: Galli Anarata d'Orange: Hispani Anaratica: Heliae tres Pomerania.
4. Quartum Pomum Adyrium à quibusdam dicitur: vulgo Italorum Limon appellat, à  
quibus & Pomum Adamis nomen accepit, ex eo tempore, quod tunc vulgo huiusmodi Pomum  
fuisse existunt de quo Adamus in Paradiso, tempefectus Dei mandatum, comedit  
unde & in isto mortis vestigia apparere vident. Sed alij, non huius generis Pomum, sed aliud fuisse  
sunt, quod Arabes Melam sive Melam vocant, cuius Aristoteles cap. 19. meminit et libus cernit  
Indyori nonnulli pro ea habent, ex quo Adamus hoc dicitur perierat, et Andream Thomeum refert.

Cassianus

Ceterum fructuosiores sibi ex diffinitibus & facultate mutua differentibus partibus compositi sunt.

Cortex odorati amaranthi, siccus sicut ac esculi.

Cute aliada singula ac crassi succi, perferuntur Citronem.

Interior succola pulpa sine modulla acida, quales Citronem ac Limonem, refrigerantia est, & cum partium tenuitate refocant.

Semen vero quia amarum, exaltatius atque refocant.

Cortex aquosus Citri semen omnibus ad usum facit, quia de crassa & Theriacis compositio-<sup>clery null</sup> nibus quae deoque admixtionem commendat, esse balnum commendat, & faeculentem reddi assumptis verb & tegulam ventriculorum roborat.

Cute vero aliada, foliola, duraque subinde edunt, sed difficulter admodum concoquitur, & crassum, frigidum proferuntur solum prodest. Galenus cum gase & aceto optime mandit refert, ut sapor herbosissimus acutus: atque hoc modo assumptam facilius concoquit. Possent hanc cum lacte condere didicit, quo modo preparata ori gustus, facilius concoctissima, & copiosius siccum redditur, & obstruendum manus innoxia.

Vitrea Citri mela (ut Theophrastus hist. lib. 11. scribit) non edebant, placebant odore, & inter velleis ponuntur, quae tunc & blata inoffensa conficuntur contra verò vitena innoxia, quando opus, ipsi vebantur, quo nemine vel maxime fuisse commendata etiam Virgatum veritas, quos supra opulentes, accedunt. Exstat apud Alderum lib. 111. facilius forem ad sepe rem edam ratorum, qui ab eis Citri mela libere ac sibi euferunt, haec nota.

Interior pulpa succo acido plenam Galenus non velleam ait: sed refrigantia haec non raro pro condimento vitur, atque inter hac assumpta, bilium, si quae in ventriculo est, reprimit, languorem appetentiam excitat, & ventriculo grata est. Facit eadem aduersus vobamentis ardentemque febres, & omnes morbos pestilentes ac venenosos, qui bus à totius substantiae proprietate reficit. Cui eadem roborat refrigerat, & sicut crassa assouat, & lenta velle abque acida.

Parsurex hac & Serpentina, quod de accretione Citri Officina possunt, ad eadem velle & conueniens, palato gratum.

Conferitur verò & tale Serpentina ex Limonem acido succo, simile omnino facultatis, <sup>Limone</sup> Nam & Limonem acetonem pelpe sine subtili & succo acidus, Citri succum cum qua- <sup>limone</sup> litate, nam facultatibus aliquis infert, ut vno deficiente, alter eius loco substituitur quae.

Cortex Limonem nec inferior Citri cortex habetur: Albidum autem carnem Limonem melum tam habet exiguum, ut nullus conficatur morend.

Aqua ex integris Limonem vitrea organa dicitur, uti pinguis & maculas tollit, faciesque nitorem conualit. Eadem pota vitrea prococt, & calculos coherentes dissoluit, frangit, & expellit.

Meliorum verò Amaranthum cortex Citronem ac Limonem facultate sicut familia, <sup>Amaranth</sup> tunc tamen calidior, quanto acrior ac amarior. Interior succola pulpa sine modulla acida, <sup>melioribus</sup> quidem euferunt non melior innoxia est facultatis, quales Citronem aut Limonem, ac dulcior non adeo refrigerat aut refocant, sed ad temperatam quendam calorem & humiditatem accedit, ori grata, & sicut plura quàm acida confert, sed id ipsum tenae ac crispum, modis autem saporis succo vinoso praedita, medio se habet modo, frigidior quàm dulcis, minus verò frigida quàm acida. Flores Amaranthi odorati ab vnguentis ad odorem menta paranda vterantur. Exerulum verò & ab ipsi per vitrea organa aqua admodum odorata, quae assumpsit, sequeuntur pando sudorem mouet, & se bibas incedit.

Semen autem omnium istorum vitrealium rictis necat & expellit: vitrea quoque poten- <sup>vitrea</sup> ter reficit, & aduersus corporum illius assumptum conduct.

Quae Adami vocantur Poma, Limonem perferunt acido succo facultatibus respondere videntur, sed tamen minus officiosa.

## De Melo Poma.

## CAP. III.

**M**ALI Pomae due sunt: vna fructifera: altera sterilis.

Vitrea humilis & haud magni fructus est, opaeus aliquot ramulos protulit, exiguis paruisque aculeis spinosus. foliola parua sunt, & Myri amula, pediculis amplexu robentibus. floribus modum ramulis vna cum in flammibus mediac: ipsi quoque Cyrenis eleganti purpureo colore ruant.

Cytinus calyx est oblongus, anterior parte laetior, in septem rictulae ( totidem videlicet quibus <sup>quibus</sup> quot sunt foliola) ferecens, Adami floribus maior, cuius inferior pars in fructum ac assumptum transit potum: saporis dennessata vna cum flammibus ipsi medio infidet Poma. dura ac



Malus Punica.



Fructus verò & ipse jua sine jua dicitur: Latine Malum Punicum: Officina Malum aut Pomum Granatum: Germano *Granatapfel*: Belgio *Granatapfel*: Italia *Melagrana* & *Pomo Granata*: Hispanis *Granada* & *Granata*: Gallis *Pomme Granade*: Angli *Pomegranat*: Bohemis *Granatere*.

Filius siccusque Mali Punicea Græcis *σικκος* dicitur, qui tamen proprie ipse florit calyx est: Latine nomen firmans.

Sylvestris verò ac sterilis filio Belgis *no* nominatur: Officina similiter Balsamum vocant.

Cortex sine putamine ipsius mali, cum frequens usus, Græcis *ελδα*: Latine Malicorium & Sidum: Officina cortex Granatorum appellatur.

Suavissimum Mali Punicea tuncora luccidissima grana est apta, boni modiciter facti, ventriculo gratia, sed omnia tenuis ac exigua aut nullius momenti.

Dulcia nonaque in cætera refrigerant: ad nutriendum aptiora sunt, sed propter insidiones putant, febrecitantibus idcirco miras laudata.

Acida, & proferunt nonnulli assidens non fermina, mani se esse refrigerant, asidit, & nonnulli adstringunt assidens ventriculo profusa: choleram morbum expungunt ac istius: aduersus dysenteriam, nauseam, & vomitum conducunt.

Fit autem ex acidiorum cuiusmodi granorum succo Scragium, quod eadem potest, & gratia utiq; laborantibus tepentissimo modis potest, nisi omnino vel incubi singultus obstat.

Nuclei acidosissimi ac proferunt acidior, velicem refrigerant sim dicit & adstringunt ventris fluores, vomitus, & longam excretionem cohibent: ventriculum inborant.

Idem verò & Cytri & Balsamii pichant, tem penameno ac fac uteribus nucleis finitibus mobilis verò densis firmant, gingivam meq; vita & huc collusione emendant: Exocostica erum potest cum castipitate imposita repellunt.

Malicorium acinos, cytrios, ac balsamii facultate non modò refert, sed & ipsi potentius est: refrigerant enim & adstringit valentius omnes tenuissimè, inflammationes expungunt ne respiciat: & ad omnia que refrigerant adstringitq; possunt valde conducit.

Succum verò refert Dioscorides & ex cytris ac balsamii colligi: hac autem facultate ut vitas affinitis est Hypocistidi eodem assidens.

quasi lignosus huius Pomii cortex est, factus oblongus ac foveolatus purpurei coloris, intenus luteus, in quo oblongosque figuræ granula receduntur, quæ, vix maturatam silicem fuerant, elegant colore rubent, ac facti plurimum habent, vix in singulis varicis firmis ferunt. differunt grana sapore: quodam dulcia: alia modicè tercia vino so pulis modis.

Sylvestris Malus Punica florem quidem facit, sed qui nullo succedere fructu perit: è brachiis calyculis hic est, & frequenter densissimè foliis multo plura est: Huius generis complura Dard. colore differunt: esse refert: vtrum candidum alterum *ασπιδε* sine foliorum: & vtrum *ποδωγρον* sine rubentis rosei coloris: Officina autem Belgii *no* est rubentissimè.

Proveniunt Mala Punica in calidioribus versis regionibus, veluti in Italia, Balcanibus in Italia, Helponis, ac peregrinè in regno nunc appellam Granata: quod à frequens malorum Puniceorum (que vulgò Granata) nomen accepit credam. Cognantur autem passim etiam circa orientem: & vltis tamen melius proficiunt: In horti siquidem, vinctis, vendunt, aliisq; perit: exculis horti proveniunt.

Malus Punica Græcè ab Americis ab Ionibus verò *no*, ut Galienus ait.

## De Mela aerea.

## CAP. IIIII.

**A**D Mali Punici formam accedit, Mali aereae dictae, Potrem & ipsam cognomine vocant, sed magna de procrea lege arbor est, longior nam et validi pars: folia etiam praegrandia, uti subinde cubitos longa & dios lata, in quibus crassioribus venis ferendum longiusculum producit, veluti in Canase folia fructus permagnus est, ad usum humani caputis, formae & colore Mela Punice similia habet verò & in usum recensita corruptioris succi plena granis, sed oblongioris & minoris, quàm Punice in aliis, & colore non rubentis, sed non laevo splendens, sapore subacidulo, et gena.

A quo hinc detur potrem habuimus, sibi hanc Panormi in Sicilia visam recultra hinc excellensima curiadem Medici: haud dubiam autem, quam peregrina sit, & ex India vel aliunde illuc cum aduota.

Nomen autem hoc vel arboris vel fructus hinc nultum sibi aliud cognitum affirmabit, quàm Mela aerea, atque hoc nomine fructum appellat: Potem autem hoc nomen accepisse, quòd granis similium colore in referant.

Plurimam hanc, ut videtur, meminit lib. xii. cap. vi. ubi arborem hanc Palam: fructum vero Anonam dicitur scribit.

Maior alia (videbatur in India) Pomo & quatuor precellentes, quo si pensis Indorem vident. folia in alacraque amaram longioribus etiam cubitorum, latitudine dunt. fructum coriaceo carnoso, admodum succo dulcedant, ut uno quatuor sitet. Arboris nomen Pala: Pomo Anonae. Plurima est in Sydraci, expeditione in Alexandria terrano.

De facili tamen verò nihil quoque aliud accepimus, quàm quòd ipsi cum colore facerentis granis valde & acuti sibi hinc, tamen quòd modum efficit & granis & vitia, ut ponit quae & colorem magnum contraherent, ac firmi vehementer sedolent.

## De Mela Cotona.

## CAP. V.

## Mela Cotona.



**H**AVD magna arbor Malus Cotona, sed hereditaria, iniquitate verò etiam in ista finibus nascitur: coriaceo veluti aspericula, septimas quoddam quandoque distans: ramos capite arborum arborum modo, quos folia subrotunda, veluti vulgaria Pomo, superius parte vitreus ac glabra prope verò mollis ac albacantia, floret ex purpureo candidi sunt: fructus Pomo similes, nisi in cunctis quibusdam quandoque, cernitur figura & magnitudine differunt: quoddam enim rotunditatis in orbem conuata, minores alij oblongiores, maiores: utiq; in medio habet modos omnes tenui pubescent lanugine, colore autem laevi, odore fragrans caput subinde firmes: super quoque omnibus austeris: cito inter nos hinc firmos, nigrescit in membranis, ut aliorum pomorum, conditum.

In horti: cultu locis prorethine: non raro verò in hortorum ac vinearum sepimentis ferilem: plantis ac mediciorum humentibus gaudet.

Autumno & Octobri pontiffimum mensi maturitates pomis ista adspiciuntur.

Arbor *malus cotona* Latine Malus Cotona.

Fructus *albus cotona*: Malus Cotona est, Potem Cydonum, & non raro Cydonum abfoluò quoque nomine Officinis in notari à quibusdam verò etiam *gymnoides*, ab exterioribus cum colore aereae referent: Germanis *Quitten* / *Quittenpffel* aut *Katzenpffel*: Belgis *Quitten* / *Tain* / *Mela cotona* Hispanis *Codiyona*, *Mandel*.

his & italicis: Gallicis *Pomme de cing*: Anglis *Crab*: Bohemis *Abate*.

Materia huius generis italyque sibi pyri turbatissimè figuram exprimit, Galcoo *gymnoides*, Struthis, & egi *gymnoides* appellatur. Belgis *Quitten*, vel est, Cotona pyra. Colatit

tra Cydoniorum generis situm, Struthia, Chrysolocharia & Mulsia: sed que sue qualis sit non exponit. Struthia Galenus commendat: Dioscorides vero in ista sita presertim.

Sunt item Mala Coronae refrigerantia quidem ac siccantia, sed ne sine effectu fructu, ac vix valde adstringant, praefertim cruda adesse, verò & ipsa superflua quondam & calidiorum hanc dicitur, que dicit ipsa incognita essentia non parum. Cruda etiam vix vtilis est vtilis. Cocta quare sit: ventericalem roborare: ventericalem ledant alia siccantia: ventericalem dyssenterias ac colicam vtilis: protant verò & linguarum expositibus, vel etiam vomeribus: ventericalem & quibus mentis copiosior situm.

Coroniam malum additum oleo Mastichano coctum, ac deinde retinum & cataplasmatum in modum ventericalem impositum, singultum potenter sedat, & vomitum ac choleram sistit.

Ex carne longana & cum melle cocta, quod in ista sita Galenus appellat, an etiam in Hispanis coquebantur, ac Romanis deserebantur, diciturque aseruum potant. Nunc cura eorundem non cum melle, sed cum saccharo coquebat, ventericalem apparat: que non modo tenui dicitur esse potant, sed & vtilis ventericalem incognita dicitur. Velut & illud, quod ex decodis potant ex ipsa substantia cum saccharo coctum, ventericalem glutin conficitur, vel que ex crudosum sacro parantur: ventericalem Serapim vel etiam ipsa potant incognita saccharo coctum. Que omnia dicitur esse circa corruptionem aseruum impositum. Sapienter haec omnia palam ventericalem gustu ipsam roborant: dicitur & omnia siccant, siue ventericalem calidiorum parant, tam enim iniqua sunt.

Coctum ut & oleum cum Coroniam, quod *Malum vocatur*, que ventericalem, inquit Dioscorides, quomodo adstringit ipsa sit.

Se item Coroniam in aqua temperatam in ventericalem potant, que in ore dicitur ventericalem aseruum in ardentibus febribus ventericalem ac curò lenit. an ventericalem eadem ventericalem dicitur, ac dyssenterias eorum etiam ventericalem addit, dolores etiam ventericalem lenit, & modicam humorum ac ventericalem obstantia.

*De Mala Persica.*

CAP. VI.

Mala Persica.



**A**RBORIS SIT quidem Mala Persica, sed in arborem magnam haud erectam ramos esse videtur normales, fragiles adesse, in quibus fructuum pondus succumbentibus dirrupitur. Folia oblonga sunt, ambrosia creata, longius fere similia, gustu amara: flores dicitur purpurei. Fructus rotundi, sunt quodammodo perispermium figuram ab una parte ostendunt molli tenuisque lactagine pulcherrime, colore fere ut piummum ab eis, quidam vna parte, ab altera latere colore rubentes, hinc enim ventericalem exteriorum colorum colore rubent: hinc interius rubens sicutur rubentibus: cuticula ab hinc ventericalem, quorum tamen normalis, vna videlicet parte ventericalem rubentibus, circa ventericalem elegant purpure rubens colore carogantur: sunt verò huius formam Persica sapore ventericalem, atque sicurò granulosa, hinc verò ventericalem dura, in medio autem Persica lignosa, dura, fabra, & ventericalem aut lenit, in qua autem ventericalem ventericalem, quomodo perispermium substantia ventericalem abesse, sapore subamara.

Ex carne ventericalem Persica ventericalem gustum perispermium ventericalem, quod facit ventericalem situm ac durum ventericalem, vel ventericalem Amygdalae Cerasia.

Persica ut hinc ac ventericalem situm ac ventericalem.

Citò Persica malis enascitur: tunc situm quomodo à facie ventericalem fructum facit ventericalem potant.

in durum non est, flores paulò post ventericalem solis Aprilis mense: fructus Septembris mense ventericalem.

Mala ventericalem Latina Mala Persica, & Persica Germanis Persischbaum: Belgis *Perseboom*: Gallis *Persicher*: Anglis *perseboom*.

*Mala myrica*, & myrica quoque obfoluta, fructus, ut Galenus testatur, dicitur: Latine Malum Perficam, & Perficam: Germano Pfingge: Belgæ Perre: Italia *Perche* *Hesperis Peragge*: Gallis *Percher*: Bohemis *Perfir*. Horum quædam Damascus Latine dicitur, quorum nempe uno à voce non facile abscedit, sed firmus adhaerescit.

Sunt verò ista quædam Perficæ pulcherrima ligna quædam, sed glabra, leuia, exteriori nam de interiori carne vasa, aliis dicitur, in eorum lignosa mole nucleus reconditur Amygdalo perfoliatis. Arbor horum Perficam refert. Mediana quoddam genus inter Perficam & Amygdalitam videtur: vulgè *Perficose* aut *Perficose* appellant: Latine id Nucleum Perficam vocant.

Perficæ autem singula sunt & humida, vanaque qualitate ordine serando: saccum habeat ac vna lubricitatem facit: cum priuilem, qui aliuertis consistit: quare nihil in ore verò potest, præsertim si post alios cibos postremoque loco edantur: tunc enim & alios cibos ac corruptionem pertrahunt. Sed ante alios cibos usumque manna mala cuiusdam in quem humida ac lubrica sunt, facit ac erit deice edunt, & aliuem lubricam reddentes alia ad delectationem viam præparant.

Nuclei autem Perficæ immolida sunt ac sicci: aperti sunt & extergunt: aduersus herpes ac leucis obstruunt: reconduntur bene inter Amygdalis amans facilitate ac vna bus similes. Extrahitur verò ex his cum aqua Pulegii succus lacti similis, quem in ore frequenter continui Apoplecticis prodest, saluam elicit & linguam expedit.

Folia Perficæ a mta equalia sunt quoque ac reficant: viscerum obstruunt: aperti ac purgandi presentiam obtinent, qui in his ac purmo saluiter per aliuem deirunt: Deoqu usant in aqua, sero lactis, aut vino diluto. Eodem confusa ac vna lico puero rum ampulsa, vna nec insinuat ac educunt. Reficant verò & erant vna lico insinuat, ad faciem perducunt.

Perficæ & leuia, saccharo post modum condita, ad ob expurgationem quoque facit.

Græci temperamento mediocre est: sed subitanea leuitem ac glutinosam, caris beneficio magnum humorum acrimoniam obediunt: phthisis ac tollit: vna in erigunt condit, & ad omnes sanguinis excretiones, aliosque facit accommodat.

#### De Mala Armeniaca.

*Mala Armeniaca.*



#### CAP. VII.

**H**æc arbor minor est quàm Perficæ: caudices nascuntur crassiores, duriores est, præsertim indur. Folia huius lina & acuminata velut nigre Populi, ac minor, & ad Boreæ magis accedunt, marginibus serrata: flores ab eis obstruunt recondunt Perficæ similes, colore inam fonsque huius, in quo obstruunt esse non negant, ne quæquam aspera aut scabra ut Perficæ, hinc ortum ac minor, in qua nucleus dicitur.

Differunt etiam pomæ hinc fructus non parum magnitudine: parum quidam sunt, nec Prunæ vulgaribus minor, alij verò ad medicorum Perficam magnitudinem accedunt, vel eam æquant. Ex his minorum arbor: caudice, qua pomæ contra rimas est, vel etiam ramos, gemmæ quoque quoddam effant, veluti ex Perficæ.

Habentur ac feruntur hortis & quædam ab hisque cultum aut insinuat. Quæ exigua sunt alia indur major, insinuat vna vna opem in Prunam, & si talcolus hinc facit, qui insinuat, arboris fuerit per insinuat cultum, elegantes magnæque fructus sunt facti.

Præsertim Armeniaca vna ac vna Perficæ, nam hinc insinuat.

Græci arborem *malis Armeniaca* Latine

est Mala Armeniaca facit. Fructus vero ab *Αμυγδαλί* vocatur: à nonnullis vero *ωγυλίανον*, vel *βυγυλίανον* vocatur à Latina de pino, Latino siquidem pinus quondam pino quibus dicitur nominatur: verò à Mala Armeniaca: vulgò Armeniaca: Germanice *Walden* *Walden* *S. Johans Pfenning* Belgicaque *Perles* sunt *Perles*: Italia *Ammandi* *Perles*, *Castell.* *Ammandi*, Gallis *Abrus* & *Hispanis Alencogas*, *Alencogas*, & *Aberos*: Anglo *Walden*.

Galenus inter Praecoxa & Armeniaca differentia facere videtur in lib. De alimentis facultatibus Praecoxa Armeniaca praefereat utraq; tamen *Αμυγδαλί* appellatam confectis reperit. *Αμυγδαλί* per quatuor syllabas profertur. In libris vero De simp. medic. facultatibus, tum fructum, tum arborem *ωγυλίανον* vocat affirmat Recentiorum nonnulli differentia quendam inter haec etiam constitunt: ut quidem maiora ac iudicia Armeniaca sint, Gallis *Ames Perles* maiora verb praecoxa, Gallis *Abrus* &

Sunt autem Armeniaca sine praecoxia mala frigida quoque ac humida secundo ordine, sed tamen minus humida quam Perlica, quia de causa nec ita cūctant facile corrumpunt, & verine ulae ac on gratias apparent. Corrumpunt ut tamen & ipsa, nec alimentis consistunt quaequam: atque hoc ipsum frigidum humidum ac excrementarium. Post alios cibos sumpta ipsa corrumpunt ac vitiant: in his vero & utro alios cibos est, facile defendunt, & aliam faciliorem delectationem procurant, velum & Perlica.

Nuclei tamen horum dulus est, Perlicorum nucleis facultate ac humores similes. Foliorum huius arbore facultas nondum explorata.

## De Amygdala.

Amygdala.



*Amygdala* arbor que dulcis sunt, ubi tractantur moderant calida ac seca sunt: Amara verò calida ac seca ordine secundo. Adest verò vniuersis oleis quibusdam ac propolis subtilis, que praecoxa non potest, sed tamen exigua.

Dulus *Amygdala* exenter deceptio on grata sunt, alimentis nonnulli consistunt, sed hoc ipsum crassum ac terreste: Crassius verò est nam que arida ac diutius collecta sunt. Tamen tam & haec de se condunt, praefertim à putaminibus liberata: Nam veluti frugum coccum cortice sua;

## CAR. VIII.

**P**ERLICE similitudinem *Amygdala* referit, arbor tamen praecoxa, cunctis crassior, & vna duratior: non solum cūctis, sed ac in trita, marginibus creta, qualis Perlica: Flores similes: Fructus Perlicum quoque amuletur, sicutum ab vniuersis insitit nana habere, & excoriam cum molli, araneosus quasi lanugine obdusa, sed sub hac nullis, vel exiguis casu dum ac cutilaginea cute subest, que non editur. Interit non longior quam Perlica, non in aspera, sed lauis, in qua nucleus, hoc est, *Amygdala* continetur, Perlicis nucleo longior, sapore dulci, quibusque tantum idem arboreali delectat. Cetera autem quod ex hac manu simile est Perlicorum.

Amat loca repensit calidiora, atque idcirco non ac difficiliter nascitur veritas sua in Belgio.

Floret eodem quo Perlica tempore: *Amygdala* subinde iusto ad perfectionem pervenit.

Arbor à Graecis *Αμυγδαλί*: Latine *Amygdala* nominatur: Germanice *Walden* *Walden* Gallis *Ammandi*.

*Αμυγδαλί*, & *Amygdala* fructus appellatur: Officinis *Amygdala*: Germanice *Walden* *Walden* Belgicaque *Perles*: Italia *Ammandi* *Perles*, *Castell.* *Ammandi*, *Ammandi*, Gallis *Ammandi*: Anglis *Walden* *Walden*.

causae si dures ad facilem excrementorum alii descensum dixerint, ita quoque & Amygdalorum generum. Ab his itaque que repurgata sunt, ad id usque detrahunt, ut etiam haec in eorum colubatione quae mollem & coctam & dyssentericis vitiosam habent.

Extrahunt ex Amygdalis dulcibus, ad id usque quae, chyli albedinis lachrimae, qui praeter quod aliat, ac dyssentericis ac coctis vales sit, plerum non quoque ac purulentis expositis possit, ut Ale xander Trallianus esse facit: sed etiam & Amygdalis peritidis consequendi sunt, cum exortione quadam facultas, quae peccat ac pulmonibus amittitur, & ad ipsas purulentorumque exurgantiam adiuuat. Constat quoque verò & ex Amygdalis ista bellena ac tragacata, et hinc vocari Mastipanes, & alia eiusmodi, quae plus quidem, quàm terrae haec succosificat, & ventrem fluxum retinet, ad peccatam tamen pulmonisque exurgantiam non minus facit.

Oleum ex Amygdalis dulcibus rectius capessum quod non est, & dolores omnes sopit: exhibetur sanguine pueri detrahit pleuritidis, sed vtilissimè ne phlegma, & à calculi doloribus molestatis: vrinam mactat, laboriosè, & ad calculorum descensum aptores reddit: aliam etiam lenit, faciliorem facit, quam vobis & coctis huius usus accommodat: Vnde verò & purpura, relictos cum à parte dolores curò tollit.

Amygdala amara sternandi ac aperitio vim obtinet: sic ac lentum ab obftructionibus liberant, latera doloribus alitero auertuntur: aliam quoque faciliorem efficiunt: vrinam & menas praecurrunt: stranguriam moventur: expurgantur: & facilius in pulmonibus ac peccat: larentia, Amygdala amara in coctis: ut admixta sanguinis spumantes addito Amylo supprimunt: feruor quoque lenit: à vena assumpta ebrietatem auocat. Abstergit verò & hinc curò in facie vicia, & non reliquis corporis partibus: purificanda vicia que serpunt emundant: curò moribus cum melle imponantur: cum aceto vel colico temporibus imposita, capiti doloribus praefuso, Diacordis refert.

Expriuntur & ex illis oleum, quod vrinam praecurat, sed possitissimè Scorpiionibus liquet: in eo curò ut in mactem, quod calculosae cum molibus ac difficultate vrinam reddentibus, pube peni usque illitum, multum praefert.

Genus Diacordis est calcareo & adstringere, quae tamen in hoc non percipiunt. Sanguinem autem expulsi: curò autem esse possit, non adstringendi facultate, sed substantia sua leuare, mactem videlicet ac poros obstruendo, & sic quidem & veteri usque modo den potest, & magnos ex calculo dolores lenit, & possitissimè vrinam mactem non dicit, si cum pulso vino bibatur, vel etiam cum alia quavis dulci portione, ut glycyrrhizae, vel vasa mellis decocto. Exurgunt verò aliam cum aceto dissolutam impetigines, tum mori corpus occupantes (quod Diacordis addit) à ratione haud alienum est.

#### De Pyro. CAP. IX.

**P**YRORUM vrbane plurime sunt: sylvestris verò alia.

Vrbana Pyrus arbor est: Mado procerior: tamen non vtilissimam esse vicia, sed aliam potentibus, caudex subinde coctus ligni materies admodum tractabilis, ad typore & calculositas valde accommodata, colore sibilata, solum lanuculam, ambra leuiter curantur, vrens, sed prima sine infuso re parte albedus, flores albeant. Pyra (hoc est, fructus) in agris ex parte oblonga, & turbinatae formae, sed magnitudine, colore, forma, & gustu sine sapore admodum differentia: eate etiam conuergunt non vniuersaliter, quaedam enim vrbani: alia ex parte, vel in totam subbeant: pleraque sordent. caro albedi est: semen in membranae loculis inquam, modicum occupat: radix Pyri in radum ac obliquum fitum.

Sylvestris Pyrus vrbaniam sine reuere, nisi subinde breuior, & ipsa secundum ramos dum habeat ac pungentia, & fructus duros, auferos, & etiam haec quae apta.

Plantatae ac in horti habentur Pyri vrbani, non sic in ac Mado, quorum vicia infusio, ex agricolis mactes ac ediles fructus reddita sunt.

Sylvestris Pyri in plerisque loca, vel in sylvis, vel circa agrorum margines, feruissimè vicia, nulla cura aut cultura a diuina sponte sua nascuntur.

Flores Pyri Aprilis mensis et plurimum apparere: folia inde sequuntur: fructus non omnino eodem tempore maturantur: quaedam enim Pyra Iulio, alia Augustis: Septembri octauis, vel etiam feruiss, et aut feruiss que hinc mactes attingunt.

Nominantur Pyrus vrbani sine cultura Graeci *Amelae*, vel per duplex quo *Amelae* & *Amelae*: à Tamisio in Gouponis *Amelae*: Germanis *Pyra*: Belgis *Pyra*: Gallis *Pyra*.

Pyri Graeci *Amelae* & *Amelae*: Germanis *Pyra*: Belgis *Pyra*: Italia *Pyra*: Gallis *Pyra*: Hispanis *Pyra*: Anglis *Pyra*: Bohemis *Pyra*.

Pyræ.



Alimenti autem Pyra omnia antiphlog & copiosius quam Mala sive Pomaceae sunt, sed hoc ipsum frigidum quidem ac reprobum.

Dura & viscosi saporis plus quam cetera nutrant: aquosa exigua habent alimenti: parum enim alant acerbis & austera, sicut & acidosiora. Cauda sic reperitur vitibus, & ad componendum meliora. Quaedam vero & adeo acerbis ut austres sint, ut non nisi cocta edi queant horum autem & naturalis tam copiosa humiditas, ut super prunas, vel sub quibus coqui ipsa expediat.

Remnent autem Pyra omnia ventrem, & acerbis quidem & austera potissimum dysentericis & colicis cum eis coeuntur.

Acida ac refrigerata Pyra, sive cocta sive cruda eduntur, ventris fluxus sedant, & sanguinis quoque fluxus si fuerit ad muliebria profusa accommodantur potius.

Insuperibus in flammantibus Pyra, si flera aut acerbis mactantur, viliat imponi possunt, cum & arborum folia, quae & adstringendi cum refrigerant omne vim & facultatem obtinent.

#### De Mespila. CAP. X.

**M**ESTILI duo Describendi, una *Acron* vocata altera in Italia nascitur, quae vulgariter vulgare Mespila urbor est non magna: caudice frequenter tortuoso ramosa, frangi consummatibus foliis oblongioribus, sed angustioribus quam Malis: Sibus obscuris, quibusque foliis parvis rotunda, umbelato lato & amplo pedice inter alia, & cum acerbis, ut colendo non fit, prius quam mollecat, in qua forma sive officina quae plantam recenduntur sunt.

Mespili in horto habentur non raro verò & in dumetis ac vitiis septibus virent & videntur in Cayacanthum, non quidem in Acidam illam (ponam, sed in alioquin acutam, artem, optime proficit, & fructus profert duplo implevit, quam non infite mactant, exiguis Malis magis viliat fieri oportet.

Serò admodum sub finem Octobris mensis Mespila mactantur: flores tamen sive im-

Arbor

Melipha

Melipha Acaia.



Arbor à Theophrasto Græci, *ακαία*: Latine Melipha: Germanis *Meliphant*: Belgis *Meliphant*: Gallis *Melipha*.

Formam *ακαία*: Latine *fraxinea*: Melipham: Germanis *Melphi*: Belgis *Melphete*: Italis *Nepelo*: Gallis *Melpe*: Hispanis *Nepelosa*: Anglis *Melph* & *Melphet*: Bohemis *Melphete*.

Hanc autem Melipham Dioscorides *ακαία* quæque dicitur affinis, & à nonnullis recentioribus Galeni etiam in lib. De simp. medic. facultatibus hæc *ακαία* esse quæ à rusticis in Italia sic vocatur, sicut appellatur, ac plerumque in Calabria *ακαία* vocatur. Sub Melipha figuram, eadem voce, hæc aliam quædam Tricocci, quæ & *Ακαία*, nominant.

Satis nomen Theophrasto cognitum est, tamen non *ακαία*, sed *ακαία*; exemplaria habent. Tota hæc Melipha sine genere, à *ακαία*, *ακαία*, *ακαία*: Satis etiam fructum grandioris in card. dicitur quæ habet reliquæ minoris. Comenit Satis hoc de causâ cum Melipha vulgari alio ad *Ακαίαν* Melipham referendæ.

*Ακαία* Melipha, quæ apud Dioscorid. in prima, arbor est. Mado aliam dicit inferiorem tantum, dicit ac aculeatis foliis fistis veluti aculeis ipse, in arboribus (ve Theophrastus ait) quàm *Απ* (videlicet hortensia) diuturnis, quæ antequam decidunt sub fructu: flores herbacei: racematione coherente fructus rotundi longiores, quàm vulgari Melipha minoris, quoniam videntur ac duri sunt, in arboribus suberectis ac molles, grossi, fistis, in quibusvis tantummodo occurrunt duri officina.

Essentiam Melipha Acaia Græci quàm Italia, à Galeni & Dioscoridi ætate notior. Nihil ita modo Neapolitanis hortis, ac in Methiolo.

Fructus huiusmodi etiam in Methiolo.

Appellatur hæc Græci *ακαία* & *ακαία*: à nonnullis *Ακαία*. Galeni hæc quoque *ακαία* nominant, nec aliter: mentionem facit pro eorum siquidem, ut simplicium, *ακαία* vocat. Hanc fructus *ακαία* etiam à tribus gentibus dicitur: Neapolitanis verò *Ακαία*.

Vniuersæ autem Melipha fructus refrigerant, & pariter ad febrem generant. Vulgari quidem acerbis admodum & asperis quæ ac ventriculo ingratas, capere movent, ut Galenus ait, dolent, quod quidem verum est, si ad hæc duri & pruriscant molles tenereque redduntur, edunt. Mollior factus in arboribus, nec ventriculo equè molestus, eandem tamen contram-



pitur, ut quædam semicorruptæ castæe, quæ in orbem & parte admodum hoc fructu videntur. Anaxæ verò Mespali fructus ventriculo gratiores, crudi se costi eduntur. conduntur in quædamque cum fâchero aut melle, quo modo apparatus ac palato grati sunt ac iucundi: veterum verò præteribus etiam perquam vales, ventriculum esse in roborem, & lactum emulacis ac panis resiliunt.

De Ceras

CAP. XL

Ceras.



**M**EDIOCRIS arboris in modum frequentè Ceras nascitur, quondam verò numerosis virgis fructuæ cortice veltis scabra, materies ligni admodum dura & solida est: folia læuis, læua, & venosa. fructus autem, foliis hæc oblonga, immo vixit, minutissime rubent, sapore cum aciditate quædam ac fere oblongo, effluo, albedo immo nudo, veluti in Oliva, quibus & fructus forma, & non eadè magnitudine affinis est.

Plenique Germaniæ locis in castris pignus: habent tamen & in horti, & non modo Germaniæ aut Belgii, sed & in aliis regionibus.

Crudi & crudi præter quædam pleraque arboris Cerasifloræ sicut profert: fructus tamen Angulo demum melle munitum manebatur.

Græci *ερασιον* arborum vocant: Latini *Cerasum*: Germani *Cerasbaum* / *Erstbaum*: Belgii *Cerasum*: Itali *Ceraso*: Galli *Cerasier*: Hispani *Ceraso*: Angli *Ceras* aut *Salem* / *Wassa* vocant.

Cerasum, fructus est: Germani *Ceras*: Belgii *Ceras*: Itali *Ceraso*.

Atque hæc Ceras, Theophrasti non quidem esse videtur, duploque superem Cerasum facit: marem videlicet & limosum.

Mæ: tribuit solidum lignum, quale hoc Ceras, quæ cum propter hanc, cum & illius rationes pro Mæ recipi ut Fortuna videtur vulgè dicta Virgo singula, quæ & Cerasi veltis, & *Sesuvium*, ut hucus Pemptis lib. 1. cap. xxxiii. locus ostensum est.

Ceterum Ceras fructus admodum acerbis retingens, & asidit, est tamen & aptus, non raro quædam edunt: aduersus alios profluxus & dyserentia oculorum: supposito tamen ventriculo nocet, & cruditates eas adangit. Folia sæpius arboris præterquam acerbis similitur gustu sunt, valentiorque desiccant: maxime vulnere glutinare possunt, possunt duros corporum ac parvis valetibus mollioribusque corporibus magis contrari, Galeno auctor.

De Sorbo.

CAP. XLII.

- 1. PROCERA** magnitudinis arbor Sorbus est: caudice recto: cortice læui: ligni materies solida & cæspit: folia oblonga: Firmis ramis, ab vniuerso medii pediculi læuibus, vniuerso clarum color singularibus prodeuntibus ac expansis, vno ad subsigium emittente, quæ molles, oblonga, ærta parte malibacant, per margines læuis, Omnis tamen perquam solida, maturandi, & necesse est flores coherere & fructuæ racemum in pediculis, ab vno latere rubentia, forma nonnulli differentis, ac etiam sapore. Quædam etiam rotundiores sunt: alij oblongiores, oculi figuri Pyra quædam quodammodo affinis: hæc gustu sunt asperiores: illa verò suauiores ac melleæ.

- 2.** Est verò & sylvestris quædam Sorbus, Virgineo folio, læui, Aceris affinis, quæ arbor quædam proceræ, cortice læui, & materies hanc duntaxat foliis in hanc vmbella caudata, succidit hæc oblongiora, Anaxæ tamen aut Olivarum non magnam magnitudine præter aut rubentibus coloribus, sapore cum acerbitate quædam acerbis, in quibus cogit necesse signant.

Ad

Sorbus.

Sorbus torminalis.



Ad Sorbi sylvestris generi referretur, Ac à nonnullis *Omas dicta*, que lib. III. Inim. Pempt. 3. cap. XXXI. exhibetur.

Sorbi Italici famulatus sunt: in Germania vero & quondam reperiantur, in montanis ac frigidis, solo lapidoso, Ac non raro iuxta Rhenam, aut alios fluvios.

Sylvestris sylvæ quoque gaudet ac montosis, ac pingui comosisque solo.

Fructus Sorborum Autumno demum ad maturitatem vni cum Medullis perveniunt.

Dicitur arbor Græcis quidem *Is* & *Isis*: Latine Sorbus: Germanis *Eprimbäum*: Belgis *Eprimbäum*: Gallis *Cerasier*.

Sylvestris vero à Plinio Sorbus torminalis: Germanis *Äpfel* *Eßäpfel* & sicut *Eprimbäum*.

Baccæ sine fructu Sorbi de fine *Isis*: Latine Sorbum: Germanis *Eprimbäum*: Belgis *Berberis*: Italice *Sorbo*, & *Sorbolo*: Gallis *Ceras*: Hispanis *Sorosa* & *Sorbo*: Bohemis *Kjerstani*.

Adstringentem suam ac refrigerantem Sorba facultatem obtinent, & valdeus quidem dura, quam quæ miris modis reddita sunt. Mellebant autem alioqui sepe, ac non omnino frigido loco, si ipsa, aut ferre pulveri vel sub terra reposita. Nam tum fluxu calido talis in cibo admixtura: ventrem cum sit retinere: alimenti vero si quid præbebit, hoc ipsum valde exiguum, crassum, frigidumq; esse quamobrem cum quibusdam aliis si malibus fructibus in cibum admiscere expediat, nec aliter quam ut medicamento sit. Solum autem hæc omnes ventriculi acæ & dysentericæ fluxiones: vomitiones reprimunt: sanguinis item eruptiones compescunt, si priusquam morbus fuerit dissolutus, Ac in Sole siccata, ad usum serventur. Potest vero variis modis uti, pro conditione videlicet affectus & loci multè habentis.

De Arboribus.

CAP. XIII.

**H**YMELIS magna ex parte Arborea est, Comæque mali (cum hæc Dioscorides coparæ) magis ad usum plurimum parte facta assimilata: eas hæc asperi ac scabri corticis: ramis frequentibus per sublevis rub-corticibus: foliis latis, oblongis, latis, Lauri vel Illicis armatis, & viride colore pallidulus foliis racematum coherentibus, conexas & albidis, subinde vna parte

Arbutus.

Arbutus cuneata var. bore.



parte purpureiscentibus. faciem dant fructus cernibus dependentes pediculis Fungi fastidiis, sed maxime magnitudine. Sorbis, nullo in us officulo, sed exiguis tantummodo cernibus, qui per forma vixent, maxime vero eleganti colore rubens, gustu subasiduo, ac quasi insipidi, quibus tunc ac mensis per hyemem vescuntur.

Arbutus in Graecia plerisque regionibus, in Creta Insula, in Italia, ac Hispania vigentibus. Provenit & in cornubibus & flava montibus, qui ubi pomis, in magnitudine excrescent, et Pons Bellonus scribit. Ina etiam asidua est, quae quingenta cubitum in Arabia esse: et tunc Pinus lib. xv. cap. xxviii.

In Italia Augusto Arbutus flores decem erumpunt: hyeme fructum maxime affertur. Theophrastus anno magno fructum ac maturitatem, sic ut simul vnum habet, alium vero floere ipsorum contigit. Quod & Pinus, fructus, inquit, anno maturitatem, partemque floret subasidua, & prior eo vixit.

Arbor haec Graeci *arbutos* dicunt: Latini vero *Arbutus*.

Fructus *arbutos*, ut et alij legunt, *arbutos* vel Latine *Mertensiana* Pinus vero etiam *Vincetoxicum* appellat. Aliud corpus, ac est terebinthus Praegae aliud cognomen certum *Vincetoxicum* quod solum *Pomum* simile fructus certe pignitur. Galenus tamen *Vincetoxicum* *Epinephedem* facit, et ante scriptum. *Arbutum* autem scilicet *Arbutus*; Hispani *Arbutus*, *Arbutos*, *Arbutos*, *Arbutos*, *Arbutos*, *Arbutos*, *Arbutos*.

At si bene fructus de his quidem est, sed *arbutos*; et exemplar Diocetidis habet; (scilicet *Ruellius* verus, forasitum tunc *arbutos*, sicut insipidus) vixit tunc insipidus, caputque de his ad hunc.

#### De Praegae. CAP. XIII.

**M**ERTENSIANA *Pomum* alitudinem & crassitudinem assequitur: cortice vestitur lentulo. Folia habet laeva, & quibus sunt rosanda longiora, circumferentia circa modo trinitis foliis alba. Praegae colore, forma, & magnitudine differunt. ceteris carne cuneis constantibus nucleo lignoso partemque insipido, quod officulum dicitur. Pervenit quidem quaedam ex terebinthus nigra, quae et longiora sunt, et tunc insipida carne colore laevi ex praegae terebinthus normalis, ceterisque fecit masses: nec desunt viginti subinde admodum longa.

Prunus.



longa, lapideis dactis grandissima. Carni crassi quibusdam tenore, factisq; ab ossibus separabilis: alius hauridior, & pernicior adhaerens.

Gignuntur Pruni in omnibus cognitis orbis regionibus: terram pariter coluntam & horridam. Difficilius vero ab ipsa regionibus terram accipiunt, non totum formam quidem, sed praecipue, et dicuntur, facultatem.

Inter rarerum vero & Pruni in alioquin non tamquam generis adcoem, quae faciem potentia, haurum adcoem, et Pruni dicitur exhibent.

Prunus haec vero & sylvatica quaedam Prunus a est utraque, sicut in *Juani Pompt. lib. 1. scriptum.*

Trochodendron aeternum, & Phytus Aegyptiacum etiam similia Pruni thymoserunt, quae insignis magnitudine est arbor, fructum ferens natum & magnitudine ad cipilo proximum: quae inter Pruniflorum florere incipit: fructu vero circa solstitium hybernium perit, nec folia demittit. Veritas haec uterque Pruni cognoscitur est.

Vulgares ac horticenses Pruni Aprilis mensis flores edunt: folia mox vna arumpunt, sicut Pruni maritima: quaedam citius nostralia mactis.

Prunus aeterni Graeci *αειπαινον* appellatur: Germanis *Plaurambium*: Belgis *Spontaneum*: Hispanis *Cereola*, *Andria*, & *Amorcyra*: Gallicis *Prunus*.

*Potamus*, *αμαυβιον*, Prunus: Germanis *Plaurum*: Prunum Belgis *Spontaneum*: Italiae *Prunus* & *Andria*: Gallicis similiter *Prunus*: Hispanis *Prunus*, *Andria*, *Amorcyra*, & *Cereola*: Bohemis *Čerešnja*: Aegypti *Αειπαινον*. Accenserunt autem haec in regionibus & partibus cognominata. Damasceni Veteres appellaverunt in Syria prope Damascum nata: Hispanis, quae in ea regione proveniunt: Sic & nostra aetas Patmonica dicit Hungarici item Moraviae quaedam & Gallicae, à partibus appellat. Cleuchus Peripateticus Damasceni Pruni Rhodii ac Sardiniae dicit *Βαβυλων* appellare: quomodo & Theophrastus Syriacum *αμαυβιον*.

*Οφραυβιον*, *Βαβυλων*, *αμαυβιον*, *Βαβυλων*.

*Πολλυμυρ*, *Βαβυλων*, *αμαυβιον*, *Βαβυλων*.

Et rarius

*Βαβυλων*, *Βαβυλων*, *Βαβυλων*.

*Βαβυλων*, *Βαβυλων*, *Βαβυλων*.

Est autem hic fructus, Athenaeo auctore, circumfessionis Pruni minor, cibo vero idem, sed paulo *βραχυμυρ*, sicut auctor. Scleroticus ut sic codem *Βαβυλων*, *αμαυβιον*, & *πολλυμυρ* eodem esse affirmat. & Madaga valde *αμαυβιον* dicit *Βαβυλων* quae *Βαβυλων* sicut vestem gratam, & cibum expellunt: ut quasi *αμαυβιον* sicut Demetrius Icon in *Ετυμολογία*.

At Prunus, quae quidem matura, necesse est habere decocta, qualis utque tandem fiat, humedant ac refrigerant, atque ab ipsa quibus minimum exoptat alimento, accedit, atque bono spulsi acquiritur bonum. Nam veluti Prunus citissimè corruptur, ita quoque & ipsorum succus in corpora corruptus ac putredini obnoxius est, & alia faciem assumpta alimentis corruptis: Vnde in *αμαυβιον* consummatio o huc sicut quae aliam sibi modum cor hauridiorum ut in se gerant postulat. humiditate enim sicut ac) tunc aliam faciem reddunt.

Passa vero Prunus ac mactata villosa sunt, si contactu generosa: alimunt plus ac omnino sicut, nec facile corruptibile conferunt. Fama est, inquit Galenus in lib. De alimentis, sicut, omnino esse praestantissima, quae in Damasco vnde Syria nascuntur: secundum autem post illa, quae in regione quae a Libiam ac Hispaniam nominant, proveniunt. verum hanc mel adfriditum pro se ferant: nonnulla vero Damascenorum plurimum. Damasceni quaedam frugis adfrugant: ut quae libens profert dulcoris sicut. Damasceni Damascenorum villosam versam sicut dicit: sed Galenus in lib. De simp. medic. facit. ipsa palam etiam subducent aliam affirmat, minus tamen, quibus quae ex Libia importantur. Cochlearium in melioribus

in quo placentum fit melle, alium admodum (eodem auctore) dicitur, etiam si quibusda  
ipſa ſuperſperit & multo magis ſi poſt ipſa Melaſſum ſuperſperit.

Noſtra etiam Germania & ſic Damascum Syria urbem nans caret. Pannonica ſive Hun-  
garica tradit, oblonga & dulcis, ſed magis turres Moravia ad idem locum etiam commendat.  
pauca ſunt Brunar nana, que dicitur: olim Marcomannorum provincie urbs eſt pa-  
triana. harenſem, ubi aqua ſumiditate conſumpta, ſiccata fuerit, ex ſuaſis pulvereque  
granulata, alium circa moleſtam in ſacile vana, videlicet bona vi Caſſiam & Marſam poſt  
ſe relinquant: et Thomaſa Londaniſſima affirmat.

Quam autem quod ex Pruno proſtat, Diſcordes ut agglutinat: potum in vino cu-  
lum commutare: ex aceto diluam helenas uſantium ſanare. Poſt ſunt idem, quod  
Perice ac Cerati.

De Myri. CAP. XV.

**A**D Prunorum genus Myra reſecto poſſe videntur. arbor horum Pruno hanc meliorem  
diſtinguit, ſed humilior: ſola rotundata ac durior: flores in nocturnis, aut tunc in ma-  
tutinis creſcit: ubi bellis alba ros, ſubſequuntur parvis Prunis ſi males fructus ſunt bery,  
calyculo quadam veluti glande ſubſerens, quibus manna color eſt: ex aere ſine nigro ſim-  
ilens, triangulam in haec ſcilicet nucleum continens. ſapore autem hii fructus dulceſcit,  
ſed pulpa habent terram admodum ac viſcidam, ad viſcum conſociendum idoneam.

In Syria ac Agypto frequentia Myrionum arbuta ſunt: olim Italia peregrina, nunc in  
his hortis familiaria, Plinij etiam penum illam Nunc ceperant, neque lib. xv. cap. xlii. in  
Myra Roter: naſo inſite Scobis.

*Myri  
De*

Arborem Plinius Myrion appellat. hanc vero cum eſſe, quam *Καυαία* Matron Paroſis  
in curia Antica apud Athenarum appellat, ſuſpicari quidem licet, ſed affirmare non eſt pre-  
ſertim, præſertim cum in exemplar a quodam *Καυαία* habeant. Baccæ autem ſi ut fructus  
*μαίρη* & *μαίρη* dicitur: neque aliud nomen Latini. Arabes & Officinae Scobites appellant.

Sunt autem Myra ſive Myrion temperate admodum ſingula ac humida, ac ſi hibernam  
habere viſcidam ac caſſiam, corpus alium plus quam alij quodam fruſtus nutant, ſed &  
viſcera anguſtoſque meatus ſe obſtruire, ac inſarionem parant. Leno in eadem obſer-  
vatas fauces & pulmones. ſunt quoque ſolant in elegmate, aut alio quocumque modo ſp-  
parata, ſed etiam per ſe aſumpta. Venam vero & horum pulpa leni drachmarum x. ut  
ſequuntur pendere cubita.

Conſtat vero & ex his Antidotes ſive Elecharium venam ſubducent, ſed quod ſaci-  
lim uocem conſtat: proinde non miſceantur præno vitodum.

De Zizypha. CAP. XVI.

**Z**IZYPHVS arbor eſt Pruno non multo minor: caudice contorto: cortex ſalem ac vi-  
tuloſo: rami dura, frequentibus ac fortibus aculeis, ſpinofa, i quibus doctores ſunt  
longioris pedis ad a miterantur. Incomum inſite, lenis ac obſequioſi, immenſeque ubi virga-  
litem Spars, circa que ex mernallia alerno ordine ſola prodeunt oblonga, baſi magna,  
duraſcula, Chamaſis prociſ. Per anca d'ita, amula, nota vero ſola poſt d'ita ac melcoſi  
eſeunt ſolcut, deinde baccæ ſuccedunt oblonge, magnitudine medicorum Olivarum ut  
parvorum Prunorum, in quibus ligneam veluti in Prunis officulam, quo nucleus obſtinens.

In Italia complurima ſicca Zizypha nunc uſantur, quæ olim in peregrina ex Syria illic ab-  
lata ſunt, & circa Plinij quidem ætatem, ut ipſe lib. xv. cap. xlii. ſcriptum reliquit.

Zizypha grano ſerunt mense Aprilis, inquit Plinius lib. xvii. cap. x.

Græca *Ζίζυφα* & *Ζίζυφα* per hanc ſecunda ſyllaba nuncupatur. Latini ſimiliter Zizyphas  
Petro Cæſarino Zizulus.

Fructus *Ζίζυφα*, *Ζίζυφα*, & à norma *Ζίζυφα* dicuntur. Galeneticum *μαίρη* appellat: ut  
ſunt etiam in Aucupio cap. xvi. de ſaribus, hoc eſt, Zizypha, in quo ſcripto ex ſunt, que de  
Seneca in lib. De aliment. ſcitu. Galeni habentur. Latini ſimiliter Zizyphas Seneca Oſſi-  
cinarum vero ſaribus nominantur.

Præter hanc vero & alia eſt appellata Zizyphus.

Arbor autem hæc eſt non magna, ſed fruſcoſa ac ramofa: cortex lenis eſt, & retinam  
malem paniceo coloris nana, i quibus & teretes veluti prun Zizypha virgula curvatur  
tenax, alba ac mollis, quibus ſola aduſantur oblonga, mollis ſimiliter & albicera, &  
aerſa parte etiam cand'itosa, ſalica ſimilia, ubi anguſtiora & albidiora eſſent. ſolcati verò  
& ſecundum ſola ſua terete prodeunt, conſens, ſubſerens, odoratis, ſummebus aliquateni-  
gus: medii: fruſtus quales prunæ Zizyphi, Olivar ſimilia, albidus, dulcis quoque & cand'is  
pulpa, officulo medio, in quo nucleus.

Zizyphus



Zizyphus Cappadocia.



Non pauci Italiae & praesertim Hispaniae locis nascitur Colitur quoque in nonnullis Germaniae ac Belgij locis.

Flores Iulio mensis in Belgio apparent fructum Autumnis in Italia ac Hispania maturis accingit. In Belgio nullis arboribus succedit.

Altera haec Zizyphi species est, quam Columella lib. ix. cap. lxxi. albam nominat, ad differentiationem potius, quae illi nulla. Pinus haec Cappadociam cognominat lib. xxii. cap. ix. ubi agreste honore Coronarum, quarum duo ac tres genera quaevis alix flore consistit, abest. haec florem esse dicitur, inquit, generis istius nam ea in describitur (nam) item Rhododendron: item Zizyphi, quae Cappadocia vocantur his odoratis, similes. Olearum floribus. Nec temere haec à Columella, vel à Plinio pro Zizypho haberi videtur: nam & folia & flores exterius receduntque eius virgula, veluti prois Zizyphi, essent: flores valde odorati, verpeb late etiam odorem diffusiventer & fructus Zizyphi aliteris similes.

Sunt autem Zizyphi, prois quidem illa Officinis vocantur, ac temperie quidem frigida, sed non vehementes, et potius primam frigiditatis ordinem non excedentes: huiusmodi quoque nonnulli: substat autem tunc efficitur crassior, pro edulis assumpta difficulter concoquantur: atque ac potius descendunt: ventriculorum aggravaunt: parum omnino coepit alimentum exhiberi Medicamentis vix data, acrimoniam tenuem mordacam ac salis huiusmodi eduntur: ac inquam, potius inquam, acroniam. Atque ideoque quae ex ipsis sunt coelestia sicut Scirpus perquam commoda sunt aduersus tussis, sanguinisque spumationes, ex acrimia tenuem aut salis huiusmodi huiusmodi.

Valet ad eadem & decoctum ipsorum, sed potissimum aduersus venae adoeses ac Billicidia, rerum exalcerationes, & vicia: rosiones.

De Crasso.

CAP. XVII.

**C**ERASORUM quatuor genera postquam nominant, una maior ac sylvestris est: altera Laurentiae terra ac sub fructus Chamaecerasus quae res est.

Præ magna & proceris arbor est: caudice medio crasso, atque in ramos plurimos superius diffusis: cortice nonnulla laevi punctato colore fuliginoso, lento ac obliquato.

XX

lignis

Cerasus.



Chamaerubus.



legi materia medicis quoque si haerit, eorum ferentia inobediens. folia magna sunt, lata, oblonga, venosa, ambituque crenata. flores albi, medicis magna utilitas, quaque consistunt foliolis, & aliquot staminibus respectu coloribus medicis: fructus in rotunditate oblongi ex nervibus ac prolongis descendunt pediculis, adiculo intus duro, quod ex quacumque conceptu, cibus nucleum cum levi quadam ac exigua amuradate non ingratum. Colores autem fructus quidam rubent, alij nigrescunt; sapore vero dulces.

1. *Altera Cerasus cortice, magnis foliis, floribus candidis priorum. resert, sed humilis est, nec in tantam ut illa altitudinem excrevit: caudices etiam minus cauli: Cerasum autem minus, carnosius, plus succi habet, quod & dulce, & colore vel rubens, vas tamen parte albedine, vel nigrescit. officulum huius & nucleus, vchitis si per omni.*

2. *Tertia Cerasus etiam quoniam praeter humilis ac tenerior est: caudices breviores: cortex asperior, non minus tamen obtectus: folia similia quidem, sed minor: flores breviter distinctos, et fructus, haec est, Cerasum rotundius, carnosius, plus succi habens, sapore vitioso acidulum: colore similiter aut rubens aut nigrescens, quoddam modo & quasi albidum, quod est rariest. Est autem in hoc, & nonnulla varietas alia, quae etiam circa insidiosam inscantur Cerasi, per in alias easdem generis insita, magna admodum Cerasa frequenter ex brevibus pediculis dependens gignunt, quae subside adeo magna sunt, ut XVI. vel etiam plura fructus officiosorum pendunt: Earum vero quae in sylvestrem huc priorum Cerasum (quod saepe sit) insertur, Cerasa minor sunt, & longioribus haerent pediculis, cibus autem insertur hae assequantur: officina vero ubi in minoribus sunt quam sapientum.*

*Præter autem & haec omnes Cerasi generis, & corticibus aliquo parte volucris, quod ex limbo colore pallens, & tandem durum reddens.*

3. *Quarta, quae quidem Chamaerubus, haec est, non arbor, sed exigua fruticosa ac muscosa stirps, subside cubitalem altitudinem non excedens: foliola cum aliam formam connumerant, sed omnino exigua sunt: fructus vero etiam parvuli, aliisque per similes.*

4. *Præter has vero Cerasos & alterius cuiusdam iconem Matthioli exhibet, cuius Cerasi completi nomenclaturae insita, vae simul colorem, quam & idcirco Raccemofam appellat, & illa Verona à Francisco Cabrolario rursam resert.*

Cerasus prae notata fuit sylvestris in sylvis, secta agrorum margines, aliisque incolis frequens, quam alibi gignitur.

Duae succedentes horum species sunt.

Charaxcerasus in Bohemia, Moravia, Austria circa Ferricam, ac viarum raris reperitur, & ut Machobius, in T. indiptino scribit.

Apud mensis Cerasi florescit. In fructu parvendo, quaedam praecedunt, aliae seriores. Rubra autem Cerasi semper sui generis nigra praecedunt. Primum autem in sylvestris sunt Cerasi, quae Junio maturantur: succedunt circa Iulij Calendas Amazonae, praeterquam in sylvestris Cerasi fructu, nam alia sunt rariorebus raris: similia sunt secundi generis Cerasi, quae & horum species aculeata.

Arbor Cerasus, quae Latine fructibus Cerasus est: Germanis Kirshbaum: Belgis Kerseboom: & Graecis Keris. Gallis Cerisier.

At fructus aliquando vulgus à Graeco appellatur: & Latine fructibus Cerasi: Germanis Kirshen & Cherisier: Belgis Kerse & Keris: Itale Ceraga: Gallicis Cerisier: Hispanis Cerasus: Bohemis Kirsh.

Primum generis Cerasi vulgus dicitur fructus id est, parva Cerasi, quae ceteris minoribus, dicuntur: item & inter fructus Germanis vocatur Cherisier: hoc est, sylvestris Cerasi, sunt enim sylvestris Cerasi fructus aculeati & praecoxi sunt, praeterquam quod quibusdam moribus suis ceteris differunt.

Secundi generis vulgus Hispanica cognominatur Cerasi, semper enim potest, ut haec dicit Lactantius à Plinio dicta, quibus principatum Belgica illorum tribuit.

Amantissimum Cerasi fructus, possessorum utriusque, vel enim Merendae Italorum praeterquam Carasida & Amara: alij Marabana, vel Barasica Germanis Amantem: de qua nigra sunt Virgilia meminit Brabantia ceteris alibi in Belgio etiam fructu. Partus lib. xv. cap. xxv. Diciturque principatum tribu, quae Campana, Maritima, ait, appellat. Ad hoc verò genus referenda videtur Caesiana rotunda, atque etiam ex Cerasi alia haec rotundior vocem & nigrescit. Adha notata, quaedam siquidem & horum nigra sunt, quae scilicet ac diuinae consuetudinem gerunt.

Locis Cerasi autem optima sunt aculeata, Amarae dicta: Dulcis illa parva sylvestris sive praecoxior ceteris, nisi sint fructus, aculeatae ceteris pariter, & malis ingenitum. Item orca, unde non solum sicile lambro, sed & molesse ac fuit de pestilentibus febribus gignitur. Atque idcirco in bene instructis Rebus publicis, ac in forum veniens pestilentiae temporibus, diligitur caeteris.

Lactantia sive Hispanica Cerasi, facilius in his vicinis sunt, immutata tamen promptius contumpanitur, & frigidiora sunt, nec tam bona facit.

Amarae verò, quae quidem rubent, melioris sunt facit, sed aquae, frigida, ac humida: si tamen sedant: aliamque ventriculo proficiunt: febribus tamen vobis: facit de ferendae, & aliam tubercum reddere: materiam verò nihil exhibent. At nigra huius generis ceteris sunt, & nonnihil quoque adstringunt. haec scilicet sive passa, Prunorum instar ac venenulo gustu sunt, & aliam leuorem exhibent.

Cerasorum guttura cum vino dilato sumptum, ferunt adiuuare calculosae prodesse autem potest in albedando, & humoris, si quae sunt, contumpanendo: nulli verum & hoc modo dicitur: Addit Dioscorides heram colorem, oculorum claritatem, & carbonem appetentiam facere.

#### De Mora. CAP. LVIII.

**P**ROCESSA arbor Mora est, nec minus ramosa. caudae eius non raro castis cortex habet, radices verò laeves: folia lata & acuminata, duriuscula, & secundum margines serrata. pro floribus illi sunt virentes, haemagiae. fructus oblongus, ex parte concavatus, Mora in Rubo nactus similis, sed crassior, longior, ac ornatus maior, tamen virens, immutatur nigricans, succo tamen, quo redundat, rubens. radix in multis spongiosae propagines.

In horis sicut ac plantae Maris calida & sicca loca desiderat, ac locum solummodo digne potest: & pauciora Mora adhaerent. Sertur Mora commodi calida sine fructu. Infructus verò aut maculari etiam potest in nonnullis arboribus in Populum album usque moris fructu candida ut quaedam Beronis in Geoponica refert.

Inter virentes arborum nonnulli Mora germen emittit, nec prout quàm frigore soluta, Macrocarpa: Arborem virentem spongiosissimam, cum Venerum nonnulli appellatur.

Augusto mensis maturum moris legitur. Hegerander apud Athenarum, sui temporibus intra viginti annorum spatium Morae fructum non esse affert, atque tanta in Podagrae pestem omnes ita esse, ut non vin solum, sed puer, puella & iuniorumque, & mulierum eo in orbem laborarent.



Morus.



Morus cuneata.



Morus autem & *morua* vel *morua* arbor Græcis Latine Morus est: Officina Morus Cæli: Germanis *Morbeerbaum*. Belgis *morberbeum*: Gallis *Morier*.

Morus & *morua* fructus nominatur Latine Morum: Officina Morum Cæli: Germanis *Morbeer*: Belgis *morberbeum*: Gallis *Morier*: Hispanis *Mora*, & *Moro*: Bohemis *Moraw*.

At Mora ante maturitatem pollicetur refrigerans & refrigerant ordine propemodum amarus, & valenter adstringens viscosus ad carnosos & dyfitericos affectus utilis fuit, ad prælosum pulvis obstruendum, vel cum vino & aqua bibitur. Sanguinis fluxus, & superfluitates mentis eadem sepe cum oleo & fauciis inflammationes conducunt. tum & ad aliam partem inflammationes incipientes adocent.

Maturæ acerbæ Mora suprà similiter sunt, & humore visco sapore copioso redundant, qui nonnulli refrigerans est facultatem, & ad hæmorrhoides humil exprimit: sique idcirco quoque ad fluxum arteriarum medicamentum, qui ore tenuissimumque in fluxum arteriarum adhibentur, velis & postquam comeditur.

In cibo hæc mora sumpta, ac ante alios in præta, crystallis per intestina subtiliter sine humiditate lubricitate descendunt, & alio viscositate suo viam, et Galenus ait, firmam: ad quosvis fluxus conducunt: appetentiam calorem languentem excitant: in ventriculo non adstant, partem firmam totum corpus alunt. Secundo autem loco, sursum cibos sumpta, cum quoque nisi cum oleo costruuntur: Tunc enim fugacibus sine inmoderata, committuntur tamen ac viuant, partem leniter descendunt.

Contra radice Morum amara, calida, ac sicca est, & expurgandi facultatem obtinet. Decoctum huius in aceto ac hinc obstruções aperit: aliam morum, & hinc huiusmodi expellit. Idem conser in aceto maceratus danti unguentis sedet præter hæc ipsum foliorum & corticis decoctum, Dioscor. Qui & circa melleis remper ex Miori tres radices succum promanare tradit, quem postquam sit concretum in osseum, soque hinc ad hunc deitiam dolorem efficacem, phlegma distentare, & ventrem purgare. In foliis osseum ac primo germinibus hinc arboris, medicatis quandam esse Galenus ait ad hunc genus ac expurgandi sic alios.

Folius verò notantur ac substantia vides illi qui sericium nascit ac præbet: Ex Bras-

ram hanc in genere *sericeo* confecto in Aureliis transiunt: tunc in Paphlagonia verificatur, veluti & alie omnes *Ficus*: Paphlagonia est corpore gravis, magis pro ratione corporis habent alas, prout: nec auolant, sed generationi matrem ante parentem: mas quidem cortex, summa ubi ora excludunt.

De *Sycamore*.

CAP. XIX.

*Sycomora*.



**S**YCOMORVS non exigua proceritas arbor est, Moro magnitudine & aspectu proxima: folia vero & ipsum viticosa. fructum vero sicut magister dicit & figura *Ficus*, sicca & si post *Cappas* perficitur, verum dulciora, & antimonibus quam cetera, quae non ex tuncioribus vitibus prodeit, sed ex candida & mioribus vitibusque raris fructu illius prodeit: utriusque utroque autem latice siccis hanc arborem per, qui valentate parte aliqua nobis efficit.

Nasitur, ut *Dioscorides* scribit, plurimum in *Cyria*, *Rhodo*, locisque non male *Tivris* scribitur, in quibus instrumentis adfert, & pro pine framentis sufficit, cum autem permat permat. *Galenus* *Sycomon* plantam in *Aegyptu* *Egyptu*, vni cum fructu *Fici* affertur, sic videlicet scribit. Hinc raram cum fructu ac foliis olim ad me misit magnificus vir *Jacobus Antonius Coemeterii* pariter *Panama*.

Ternis quatuordecim fructibus anno vno fundit, & si fructus vigubus salpatrie, cum frequenter.

Hinc arbori *αυαλογο* *Ficus* & *Moro* nomen est: *Cornelius Celsus* maxime nomine *Morifison* appellat: *Egypti* nostro tempore *Ficum Pharaonum*, sicte

*Bellonius* dicitur vero & nos *αυαλογο*, sicut *Ficus* *Egyptu*: nam & *αυαλογο* *αυαλογο*, id est, *Moro* *Egyptu*.

Fructus vero *αυαλογο* quoque appellatur, & ab *italo* *Sycomora*, sic *fructus* *Egyptu*.

*Sycomon* autem fructus, ut *Galenus* ait, nullam habet acrimoniam, magis dulcedinis particeps, estque siccitate ut *Moro* humidior quodammodo ac frigidiior.

Verum, inquit *Dioscorides*, alio, sed *Egyptu*, hoc est, nullum alium, & viticulis molitibus.

Etiam vero ex arboris cortice *lacheima* primo *Vere* prope quam fructus ferat, quae spongia ut videtur excepta siccat, in pastillos cogitur ac sicca ponitur. Facilitatem hanc habet molliorem, viticulis conglutinata, & crudorem viticulis comitatur: sicut vero & dicitur contra serpentium morsus, hinc du noct, stomachi cum in refrigeratione dolens. *Celsus* me autem hic succos ut redirem sicut.

De *Ficus*. CAP. XX.

**F**ICUS nec omnino tecto affertur candice, nec omnino in leui cortice, sed aspe nufculo conreptur. macres ligna alba, suo goloque velorum vero ramulo cum molle cum ac medullata. Folia ampla in quibusque parte, circumstantibus eodem angulo, distenta, veluti *Vitis*, sed maiora, duriora, asperiora, ac nigriora. fructus, nullo apparetur: partem sicut aut alio, aliove quod floru vitem implere queat, vitem pediculis, quibus folia adherent, amittuntur erumpunt, & quidem parte vitem, vitem admodum parua, succella vispersa maiores forma indurata ut *Pyrus*, vitem vitem longiora, alij vero breuiora ac magis sicca, colore vel albedi, vel subrubente, vel ex carulo hinc raris purpurei, pulpa interior molli, succo, ac pinguis, granis cotyledonibus referta. Ex *Ficus* autem in cortice, foliorum pediculis, ammittuntur sicculus viticulis liquet sicut sicut sicut, sed acris & amara.



In Græcia, Italia, Hispania, ab usq; regionibus perinde calidis, ac Solis radiis expulsi frequentes Ficus sunt: In Germania ac Belgio continent quædam, sed sævè ad perfectionem fructus perveniunt, nisi vel diligenti cura adhibita, vel hinc inde modicum element, æstusq; foventur.

Germania cum solis Maio mense in Germania erumpunt, atque has in longitudinem proficiuntibus ma in phœnarum & solis & Ficus in rudimenta quoties priores Septembri ad maturitatem perveniunt, si æstus fuerit calida: In Italia verò ac Hispania etiam citius præpositus verò etiam Ficus, si per hyemem non decidant, altero anno mox ad maturitatem assequuntur.

Arbor Ficus Græcis *σκήλη* dicitur, & à nonnullis ad differentiam Caprifici *σκήλη βαγγε* Latine Ficus, & Ficus *serica*, sive *Vibum*: Germanis *Figgenbaum*: Belgis *Weggenboom*: Gallis *Figuier*: Italia *Fico*: Hispanis *Algarra*.

At fructus *σκήλη* Græcis: Latine verò etiam Ficus, & qui interdum materis est, dicitur Latine *Castanea*: qui verò reticatus sine passis, Græcis *βυγγε*, Latine *Caricaditum*: Germanis *Figant*: Belgis *Weggen*: Gallis *Figuier*: Italia *Fico*: Hispanis *Algarra*: Bohemis *Figl*. Semina que in quibusdam *σκήλη*, *Cochranodes Galenus* appellat.

Inter vitæ Ficus & hanc quoque ac pars a quædam est sesquipedalis altitudinis, foliis & fructu præterea similia. Parnisiam hanc Ficum vocant, etiam *σκήλη* appellat.

Est verò & *σκήλη* quædam species, cuius fructus ad maturitatem pervenit nunquam. Theophrasto *σκήλη* *Πανος* Caprificus appellatur, fructus *σκήλη* quoque no manent, ac, ut Dioscorides, *σκήλη*.

Vides autem recentis ac mature Ficus reliquis fructibus in cibo præferentior, alimen quoque amplius quam ceteri præbent, sed non omnino optimi succi. Superficiam verò & quædam excrementosum humiditatem contractam habent, propter quam & flatibus ventrem implent, nisi citò deciduerint, & faciliè per ventrem permeant, huius oratione beneficium nec flatus vel permeant vel dolorifica sunt: Profusus verò & eadem Ficus nephthica, nam vis laxare, lubricare, aperire, & normalia quoque abstergunt: unde post curam estum areculari subinde multus excreta contrahit.

Sicut autem Ficus, sive Cereus, mediocriter calidificatur, nutriunt quoque, & alimenta non exigunt corporum, sed tamen non probam sanguinem pinguem quam obrem & officiantur qui se largus velantur, & copia pediculorum ipsi proveniunt. Aliam v. r. & faciliorem reddunt, & ad excretionem urinae, per lentam aut alios cibos praesumpta. Aliqua autem per se, pulmones, vesicas, ac vesicae vires sunt, nec in oleo vel viro in eodem modo: appetendum liquidum, leniendum, concoquendum, ac maturandi facultatem obtinent. Quae per se in leniunt concoquunt, maturant, & expurgant, penitentiam cum Hyssopi aut confinis sicut herba decoctio ventri, nulli, ac diuturnis per se ac pulmonis tunc hoc modo ac utantur, tunc expurgant, & ab aere ac liberant: vesicae dolent: expurgant: grauida si Ficus aliquid ante partum debet velantur facilius parantur exanthemata sive pupulae praeterea, & sudores Ficus etiam, ut Dioscorides ait, praecurrant. Tumores vel concoquunt vel diffusi utantur concoquendum Tritico farinae ad digerendam Hordeaceo admixta, Galieno alicui, conferunt.

Decoctum Ficusum ore ac faucibus tumores & abscessus cito facilius, ad suppurationem pendunt, lepras in ore deventum aut gargazentur.

Lactes autem Ficusarum liquor & lactus foliorum eius non in ordine tantum, aut abstrahi vehementer sed & vicariis, & ora viscerum scelerat, & myrmecum enim venim & purgare possit sicut Galenus Coaguli modo, Dioscori, sic coagulat, concoquendum quo ut aciem diffoluit. Menstrua cum oleo iuteo aut Pyrrhena cum apponit et podagricorum exemplum cum farina Fumigretis & aceto vitis, lepras, lichenas, discolorum à Sole eorum, alphas, foetis, aethora cum potiora expurgat. In illarum plaga percussis à scorpione, venenosorum scilicet, & subditi canis mortificat aethora. dentium dolentibus lara ex capris pediculis, & caeteris coram adrens. myrmecum tollit cum adipe ancinibus in ambra eorum.

## De Fico Indica.

Ficus Indica.

## CAP. XXI.

Ficus Indica fructus &amp; folia.



**I**N O I C A huc Ficus appellata arbore specie absque caudice & ramis ad oblescere videtur, tota enim nihil aliud quam ex foliis folia apparet, folium liquidum in terram depectum in trax modo exagit, & alia sic provenit, à quibus & alia proceduntibus succedunt rursus & alia, donec ad arborem altitudinem pervenerint, effusa in terram & veluti turba, ab uno tempore si b-  
anda

inde duobus aut tribus foliis emans nonnunquam carnosus ceteris foliis facit, vix videlicet quando non ex folio emans, sed ex femore: sicut fieri. Oblonga a vasa Ficus Indica: laevigata sunt folia, & postea non raro crassiora, quibus albae, rarius, oblongae, acutius prominent spinae (quod thymus has proferunt.) In extremis autem foliis praesertim flores erant, quae oblongae, densae foliis sublequuntur. Ficus carbonariae tamen quondam modo similes, nec minus, coloris est viridis purpureo, ut necesse palpa sacca si rubra umbra, lingua incoedque coloris manus velut Mota indicante, quorum fistigum foliola quaedam instar coronae ambiunt, veluti ostendit icon, quam magnifico vase Iacobo Antonio Ceccato poëtae Patavino acceptam ferimus.

Ex India in Italiam ab alijs, pronuncias illata ferunt. In Germania ac Belgij horti hanc quondamque sepe in contri, sed haudquamquam fructibus profertentem: quem Italia tamen quondamque videt, Hispania autem frequentius.

Opuntia

Exhibetur autem hanc esse Opuntiam à Plinio dicta herba, de qua lib. xxix. cap. xxvii. sic habet: Carca Opuntiam Opuntia est herba, quae hominis dulcis in utroque, & folio eius radicum fieri, ac sic eam nati Opuntia autem curia Phocidis Graecia vicina, ut Paulinus, Strabo, & Plinius testantur. Vulgo autem haec super Ficus Indica nominantur ab Indi vobis Turci.

Ficus Indica  
ex Theophrasto

Defenditur autem alia quondam pro Ficu Indica à Theophrasto lib. viii. quam Plinius lib. xxix. cap. v. videtur sine veritate, sed Lampsacodina, elegantius exprimit: Ficus, ut, ibi nota potius habet. Ipsa se semper ferens, vasto distans in ramis: quorum una à deo in terram cecidit, ut ante ipso in figuris, nonnunquam sibi propagentem faciant circa parentem in orbem quondam opere operario. Intra septem eam affluunt pastores, opacum pariter & montium vallo arborum ducens spem subter terram, proculque fortissimo ambitu. Superiores eam ramum in excelsum emittunt, sylvicola multitudine, vasto matris corpore, ut ex p. plerumque colligant, vixit vobis hanc stadia operant. Foliorum lentitudo pelte effugit Antares habent ea carnis fructum inopari, esse ferre probat. Rarusque est, nec Ficus magnitudinem excedens: sed per folia solibus coctus praedulci sapore, dignum miraculo arborei generat circa. Acetifera maxime amara.

De Castanea.

CAP. XXII.

Castanea Equina.



**A** D M O N I T U M magno & proceri albæ Castanea est: ramis extendit plurimos, quales castan, qui aliquando totae amplexudinis vixit, ut à tribus hominibus vix completi possent:

part: ligni materia folida ac durabilis: folia magna, aspera, rugosa, acutiuscula, singularibus Nucis angustius folia maiora: tenuia, oblonga, vix decipiens: fructus calyce concisus rotundus, asperus, & rufus: sicuti spongia, qui sponse de hisce fructibus fructum suum nucem demittit: Nux non rotunda, sed compressa ab uno latere, plana, & superius parte acuminata: cute concolorata dura, levis, & admodum leui, obliqui puncti coloris: nucis uic inuenitur nuclea substantiosa ac alba, tenax, membrana velata, que cum fabeat.

Monibus & opacis gaudens: descendunt verb quoadque & ad plura: folium autem molle ac rigrum. Quibusdam verb in locis ac regionibus maiores ac mitiores: aliis verb minores gignitur.

Iuli cum folis Aprilis mensis compunt, sed nucis leuius, ac Autumnio demum perficitur.

Castanearum autem arbor Græcis panter ac Latinis cum fructu nomen habet cōmune: Germani *Apfelnbaum* / & *Kastanbaum*: Belgæ *Castanbaum*: Galli *Castagne*: Angli *Chestnut* autem vocant.

Nux autem Græcis *καστανή* à nonnullis *καστανα*, *καστανα* *βότρυς*, *καστανή* aut *καστανή* appellatur: Latini Castanea, Iounglari, Sardiani glani: Germani *Kesten*: Belgæ *Castanen*: Itali *Castagne*: Galli *Chestagne*: Hispani *Morvas*, *Castanas*: Angli *Chestnuts*: Bohemi *Kastani*: Que autem maiores Itali *Morvas*: Galli atq; Belgæ nonnulli *Morvas* vocant.

Est verb præter hæc & alia quedam Castanea, arbor proceræ quoque & magna, cuius foliam quinque figmentis ducta Pennaphylla referunt, sed maiorem & ad Rurum quodammodo accedentia, clauduntur & huiusmodi duntaxat spongiæ echina, que crassior, & quam vulgares Castaneæ rotundiores sunt.

Hæc Itali peregrina, in Orientis regionibus gignitur. Equina autem Castanea idcirco Castanea, equina. nominatur, quod in helois & ruffianibus equis auulserat.

Ac valde præter Castaneæ admodum edescunt, & fixis adstringendis facultatibus participat, in calido verb ac frigido temperate videntur, habent tamen & sterilitatem quandam, atque propter hoc, nisi præcure vulnerata, cum sterpiti repenti, dum ab igne coquantur, exsiliunt.

Innata enim glandes, Galenus ait, principatum Castaneæ tenent, foliaq; substantiam fructuum quæ necesse est membris le componi præbent. Tardè autem admodum descendunt, difficulter concoquantur, & crassum humorem adferunt, flammæque ingenerant, ventrem verb eam sicut præferunt erode.

Cute Castaneæ minus difficulter conficitur, facilis descendunt, flammam manus habent, ventrem tamen & adstringunt.

Ex Castaneis crudi arbuta, & in farina deinde redacta, panem coqui possunt, sunt qui afferunt, verum hunc siccum & friabilem admodum esse oportere, difficulter concoqui, & tardè admodum descendere: Amulius autem talis esse posse conficiat & dymentem.

## De Nucis Anglica.

## CAP. XXIII.

**P**RECORANDIS arbor hæc Nux est, crasso ac proceræ caudice: cortice cineritio colore subarente, & frequenter rimoso: ramis amplitudinem sese distenduntibus: foliis ex quibus fæuæ ad vultu ossi Fraxini modo coherentes, vniq; emittente, que latius legitur neque sunt quam singularia Fraxini, autem ramis & odore grauolentia. Iuli in uoca præcedunt, que uicis foliorum pediculis hænt aut se rux præcedunt, per minima cum semellè fuerint lentia, herbaceo ac vitæ hæc congeneratæ ortæ, lignosum putamen subest, in quo nuclea conueniunt, tunc velut curricula, quadripartita sunt dyuisa, intermeda ligrosa veluti membrana, cum in tenero caro alba, dulcis, & orngata est: recens quidam, arida enim oleosam ac emedum quid subinde conturbat.

In agris locus vis ac feritas, pingui ac resistit solo Nux proficit, & in bonis: lentis prodeat collibus: aquosis non amat trahit.

Primo Vere folia ac vultu uili trunpunt: Nux Angulo mensis legitur.

Ipâ arbor asper appellatur: Latini Nucis nomen & arbori & fructui commune est: Germani *Nußbaum*: Belgæ *noestbaum* & *noestbaum*: Galli *Noyer*: Hispani *Nogayra*: Angli *Nuttree*: Bohemi *Wußp* *weußp*.

Nucem Græci *νύξ* vocant, & asper *βουβαστή*, id est, Nucem regiam: Dicitur verb & Nux Iugiana, quâsi Iouis glans, aut Iouis glans: & I quibusdam Peris nux: Germani *Wußp* & *Wußp*: Bohemi *Wußp*: Itali *Nogayra*: Galli *Nux*: Hispani *Noyer* & *Nose*: Angli *Nuttree*: Bohemi *Wußp* *weußp*.

Nucis autem adhuc viciam in nocentem nucleam quidem gran suam, frigidi carpi habet, huiusmodi verb imperfectè cocco: nõ parè: Difficulter concoquantur, partim alit, *expe* *delicidum*.

Arde

Nux hylana.



Nux uellana, seu Corylus.



Anle nucis cocca facit et retinet, Am-  
gliqua oleo ac rase idq fallaxant: ventriculo  
lar valde inutilis, & prout quod difficiliter ab-  
eopantur, solum etiam ad hoc per, & quoniam  
de locum ad ferunt, & radianibus ac polliu m-  
ent. Cum Caryca autem & Ruta prout per,  
lethalibus venena adserant ferunt: & laro  
hambrosos languas ferunt polliu. Cum Cepa,  
fale, & melle cum hominibus mortis impetra  
conueniunt. Commadacate vero ac impolite  
gargant, carbonicolas, apopleis, & alopecas  
celeriter, vt Dorsio ferit, sanat. Effluuiis & hoc  
prepar olei ex ipis expressum, quod maxime  
est paruum, digerent ac exaltescent.

Nuces utique, pntiquant huiusmodi indu-  
ment paruum, deceptis, ac cum lactico aut  
melle condit, an ac palato grati sunt, autem  
cum quid respiciant, & propter eximiam virtutem  
adstringendi potissimum, ventriculo maxime ro-  
borant, non tamen vtiliam curam, sed vt medi-  
camentum assumptis.

Exterior Nucum vtrum cortex adstringit  
etiam in vris obtrinet. Interni medicamen-  
tum ex cum lactico coporete Galenus vtrum ac  
docent, ad omnes vris inflamationes vtilissim.

Folia & prima perna in aliquod adstringent,  
eodem vltiore possident, & vtilis vtrum ip-  
sis sicca calidus, temperata. Ad balnea, vtrum  
sive hoc vris quod vram receperunt huc adhibe-  
re vt, in quibusde digerendi, & indocum vtra-  
di vris vtrum.

## De Nucis uellana, seu Corylo.

## CAP. XXXIII.

**C**ORYLVS est fructus perennans cradicibus  
aut robustis fructus hinc hinc, qui hinc  
in florum frequenter multum hinc, & in  
ramos sparguntur modis, latis, ac obliquos.  
fida hinc sunt, maioris rugositate quam  
Alm, marginebus ferunt hinc, colore vicia,  
aurea parte albidiora: cortex tenuis est indur-  
ciosa, alba, & robusta: oblongi tenes compa-  
ctiq, nisi pro hinc hinc de pendunt: nucis hinc  
dibus multo minores coryli vtrum callosa,  
herbarum colorem, carnis uisum hinc hinc,  
Rosarum alba hinc prope modum referantibus  
putamen hinc & hinc hinc est: interior nucis  
carne coribus albidis, dura solidus, tenuis quem  
congru in emulsiuola, quod vtrum vtrum  
sapor candicans, sapore post ingratum.

Coryli fructus in hinc ac in vtrum hinc  
cui hinc hinc vtrum hinc & in hinc hinc  
nucis hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc  
nucis hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc

In primo quoque tempore erumpit, vtrum  
dum solum hinc, qui hinc hinc hinc hinc  
cedentibus solum hinc hinc hinc hinc hinc  
tunc hinc hinc hinc hinc hinc hinc hinc

Fructus Locum Coryli dicitur. Genui vtrum

aliquando, id est, Nucis Pannicae Germanis *Apfelsbaum*: Belgis *Apfelboom*.

Nucis *majoris mundi*, & *Asiaticae*, id est, Nucis Pannicae, contra Nucis parvas Nucis: Nominibus vero & Nucis Persicis, Nucis Hircanicis, & vulgo Nucis Asiaticis, quo nomine etiam Olfactoribus: Germanis *Apfelsbaum*: Belgis *Apfelbaum*: Italia *Apfelsbaum*, *Asiaticis*, *Nepesin*: Gallis *Apfelsbaum*, & *Apfelsbaum* Hispanis *Asiaticis* Bohemis *Apfelsbaum* vocant.

Quae autem hauriuntur rubentur suntque vobis *Asiaticis* habentur, ac legitime *Pannicae*: Germanis *Apfelsbaum* & *Asiaticis*: Belgis *Apfelsbaum* vocantur.

Abque vero albedo, & *Asiaticis* habentur.

*Asiaticis* autem necesse est non dumque reddere, hauriuntur quoque incrementum contrahunt in se continent, curae occasione hauriuntur sunt. Concoctionum vero non modo recentia, sed & in die admodum rebelle sunt, si necesse fuerit hauriuntur sunt & frigida, & densiora sunt quoque substantia, quae de causa & difficilius admodum descendunt in ventriculo quoque hauriuntur moleste ipsi aggravan.

Succus autem ex his, veluti ex Amygdalis, hauriuntur extrahitur valenter alvum adstringit, atque coctus & dysenteriae hac ratione prodesse potest.

Isti frigidi ac duri, & hauriuntur adstringuntur: ventri quoque fluxiones solunt.

DE PISTACIO.

CAP. XXV.

Pistaciorum arbutum.

Pistacia punicia cum fructu & composita.



**A**RBUTUM Pistacia species Terribiliter similis est. Folia huius qualem Lentisci maiora, sed eodem modo composita, simili quo ordine disposita ac digesta, colore è viridi in laevum longae sunt. Fructus sine naces nascentur ex suis pediculis dependent, conorum Pini nubes sine stylo minores, Amygdalis vero multo minores, nucleus horum corium tenue ac vitens est putamen igneum fragile & albicans, nucleus pulpa vitens, sapor solummodo dulcis, non gustosus, non nihilque odoratus.

In Persia, Arabia, Syria, tum & apud Indos Pistacia nascuntur: Item vero & hauriuntur indigenae sunt: Venetiarum, & Nepesin, ac aliis proveniunt.

Nunc autem hauriuntur Graeci *apellatur* vocant, apud Athenienses, Nicaeides Colophontes in Thracia *apellatur* vocantur:

*Pistacia punicia* *apud Athenienses* *apellatur*.



Posidonius *Bardone* alij *epiphiso* Latini vocis feruantes & Piliacion, Biliacion, aut Philiacion dixerunt: Cithicna Filicna Hispanis *athreops* & *Fellone*: Itali *Pysereis*,

W. velu-  
tibus in  
alba.

Theophrastus lib. 4. 11. De stirpium historia Pilacionum arborem sub *Terebinthi* apud Indos adentem nomine detempisse videtur: In India sequidem *Terebinthum* esse videtur, aut *Terebintho similes*, quae folio, ramis, ac reliquis *Terebinthum* arboribus, sed fructu differant, quae *Amygdalis* similes sunt. Ex haec in *Baldos* esse, & fructus *Amygdalis* etiam similitate profusiores.

Pilacionum autem melle non raro veluti *strobilum* eductum temperat calidi ac bene di sunt: conoquuntur non ita facile sed multo quam maces factis: facti sunt beoni, aliquantulum tamen crassi, alij autem corporibus consistunt non ex quantitate suata tunc uno viti reparant phthisica ac talia profusa: cruda pulmone aut pectore inhaerentia, concouant, mactant & expurgant: sicut ab obstruccionibus liberant: nephriticis quoque amolunt: mactant etiam ab areculis & calculis liberant, dolores eorum mouent, vicinas lentunt: sicut & libidinem augent.

De *Nactu vesicata*.

*Nactu vesicata*.



Coutra.

caulis  
dilatatus.

seruis quando recentis ex *Aegypto* aduehantur. Vetus autem nomen huius herbae non habet, nisi sit *Staphyloedendron* Plinij, pro quo à recentioribus habetur. Meminat verghesus *Elmas* lib. XVI. cap. XVI.

Est & trans *Alpes*, inque arbor, simillima *Aceri* albo materia, quae vocatur *Staphyloedendron* sicut iliquae, & in us nucleos sapore nuceo *Aurilium*.

Ceterum maces alij humiditate sunt, superfluaque cruda humore redundant: atque admodum & facili molestem excitant, & venis vitio perturbant, vapore quoque adstruccionis obstruccionis huiusmodi aditro est ulcram habentur. Viam vero in medicamentis nec vili habent cogentur.

De *Palma*.

CAP. XXVII.

**PALMA** proceri admodum est arbor, caudice crasso & squamato, semine fastigio truncum modo promat, & quidem numerosis ac foliosis, folijs vestitis obliqui, quasi veluti Indae. Bares in obliquo quodam includuntur, quod inter naves erit, quo tandem delibentent se: si pendente, alibi prodeunt, et bacibus ac tenuibus pediculis, virgulis quibusdam adhaerent,

tenet,

Palma.

Palmarum fructus & flororum floris.



harentes, succedunt ab infirmis vespulis dependentes Palmule, forma ovata ac oblonga, dulces, & quandoque cum levi quadam astringentia, colore sive bruffis, officio in sacris dum ac oblongo, quod pro nucleo ac semine est.

In Ainea ac Ægypto Palma frequenter sunt: eorum autem que in Palæstina Syria præstantior: Palmae sunt: iudice Galeno.

Autorum Palmae maritima ut, æque tunc deceptæ in Sole siccantur, ut comedias & transferri & conservari queant.

Arbor hæc Græcis dicitur: Latine Palma.

Fructus habent quatuor, id est, glan Palmaram, & vas doliunt carnosæque: Latine Palmula: Officina Dactylus Commarum Dactylum Belgæ: Græcis: βουβόλη: Gallicis: Baccæ: Hispanis: Tamaris & Dactylis: Bohæmæ: Dactyle. Palmularum autem dulciora, quales Palæstinae ægyptiæ appellantur.

Insolentem tunc tegumentorum florum ac Palmularum crassa, & à quibusdam latine nominatur: A parvulis vero & ipsorum florum ac fructuum rudimentum (sive oleo contentum) Latine vocatur, ab aliis vero Ægypto.

Ac Palmula quælibetque eandem omnino consistit difficile sunt, & capitis dolorem movent: detrimere quidem hoc ac astringentes, ut Ægypto molles vero humidæ & dulces, ut ægypti, innocentes sunt. Succus autem qui à Palmulis in corpore generatur crudus amarus est, ferocis quoque quæpiam obtinet. Colerem tamen suum à capibus accepi abstrahitur, præsertim inflammatione aut febre occupatum: Item quoque leditur ac offenditur, hæc repositibus frigidioribus eorum Palmula, ubi integrè maturare nequeant, si frequenter edantur, gradus enim humores corpus implent, & fluxu gignunt.

Succores Palmula, ut Dioscorides refert, linguam excoriatibus, stomachicis acidis præteritis vides sunt: cum Cocco & cerato cranchino velica medentur malis impostæ.

Caryox palmensis & arenae asperitatem leniunt.

Officinarum sine pulcherrimo esse adstringendi, & simul emplastrum faciliorem habet: eorum oculorum palpebrarum, palpebrarum delinens cum uerbo efficiunt: cum

vino *Chamaeris* *Chamaeris*, in vinctibus cum nitactiscentis reperitur, atque vincta ad curamque perducit.

Raris & folia adfructum eundem quoque obtinent, sed præcipue ipsi Elae, hoc est, Botani innotescunt: Præterea vbi adfructus opus est, his vtiliter.

Exat compositio Diacathos in lib. De medic. secundum genera, que cum Palmæ tamen, rudacule loco, mœnenda est, sed et de casis, quæ et adfructum aliquid inde accipit.

De *Chamaeris*.

Chamaeris.



## De oleo.

## CAP. XXIX.

**O**LEUM quædam fatum ac vinctum: alit sylvæstris.

**L.** Vinctum sine lina: Oleæ prægrandes sepissime ac proceræ arboreæ sunt: nimis complurimis in lina ampliusque diffusis, sed et oblonga, angusta, dura lubricæque. Boreæ necmodi alba, fructus sine bacæ oblonge vincte immo, sed mœnate nigricant ac oleo se sunt, nucleis utrimus dura.

**L.** Sylvæstris Oleæ hauribores ac minores sunt: raris karassim aculeati: folia magis rotundæ: duræ sunt: bacæ quandoque frequentiores dependent, si d' p'notes, patet utique carnis.

Naliquæ fatum ac sylvæstris Olea complurimis Italia, Gallicæ ac Hispanæ locis, tum ac circumvicinis insulis amari feruntur: loca maxima: plerumque enim, ut Colymbella refert, existant vitæ milianum ferag: fatum à raris Oleam aut non vincte, aut non esse siccum.

Iuris enim Oleæ casticeæ florant: decerpuntur Novembri aut Decembri: ubi vincte pulchrum acicæque fuerint & rugæ contractæ, vicularibus subactis: & oleum ex ipsi additis aquæ expresse: Quæ sile autem & miana condendæ ac esse rarijque sunt, p'ca: capi debent, & quodam inrequam mœnate sunt, d'itijque ad huc vincte.

Et dicitur olea siccæ: Græca appellatur, que fatum ac vinctum Latina Olea est: Germana *Oleum*: Belgio *Oleum*: Italia *Oleum siccum*: Gallicæ *Oleum*: Hispanæ *Oleum* & *Oleum*.

Olea.

Oleaceum fructu sae flore.



Olea fylaeifris rareola.



Becca Oleae dicitur: Graecis verò etiam *Oliva*: Hispanis *Alayfina*: Gallis & Belgis *Olive*.

Oleae fide ac muris conditur, Graecis *Oliva* & *Alayfina* dicitur: Hispanis *Alayfina* dicitur: Gallis *Olive* dicitur.

Sylaeifris Olea *Alayfina*, ac etiam *Alayfina* vocatur: à nomine *Alayfina* dicitur: Latine *Oleaster*, *Cremus*, *Olea*, *Alayfina* Germanis *Alayfina* dicitur: Italis *Olea*, *Alayfina* Hispanis *Alayfina*, *Alayfina*: Gallis *Olive* dicitur.

Oleae natura, quae quidem adeò matura sunt, ut sponte sua vel cadant, vel non cadant (quae *Alayfina* appellatur) modicum calidæ ac humidae sunt, exiguum tamen, si cadant, corpus præsentant mentem.

Immature adstringunt ac refrigerant.

Hæmorrhoides hoc munda afferunt, quæ & Colyribolæ, tumorem narium ventremque refrigerant & roborent, adhaerens tunc fibulationem conducit: et tunc faldidum tollant: appetentiam excitant, alvumque verò ab his nullum, multò minus probum expectandam.

Rama, folia, & germia Oleae refrigerant, refrigerant, adstringunt, & potissimum fylaeifris: Sanior vi ac facultate infusa sunt: idcirco ad oculorum medicamenta, quæ

adstringens adhaerens potulant, viscosa, et potius miora. Colubent eadem, vel hoc Diobolus, et Hippocrates, herpetes, et psychidas, carbonatos, nomes, huc depolenta nigra: crusta expurgant cum melle impoita, emolliant vero & fordida in inflammationes & phlegmâ cum melle aut posita diluuntur: amoniam capitis curam agglutinant: omnia viceribus commendantur.

Succus & decoctum colidum praebet efficacitas: Soccus vero etiam sanguinis eruptiones & muliebria profusa sistit.

Experimentum tunc testis falsis, affusoque vino (quod praefert) aut aqua, siccatasque in foliis, in pastillos digeritur.

Sudor è vitreo ligno accenso profusus, icherne, furfuris, & scabiem illius sanat.

Oleum ex matris Oliva, quales *ἀλωερός, δολιχά, λιμνέλια* ac modicè calcit ac tale quidem emundat: cuius materiam quoque est: *Αρωματιστόν & ἀρωματιστόν* appellatum, ex istis mater videlicet Oliva, quoniam habet adstringens, tartundem & inspissans.

Vetus Oleum quod ex dactylis ac matris inuentis tale reddi cum est, calidius vel etiam factum est, & potius in oculis ad digerendâ cum vambus potest: quod vero ex crudo continet, quippe ad haec adhaerens continetur, & maxime est facultatis, partem videlicet adstringens, & partem defluentia, digerendâ siquidem facultas in matris continetur, adstringendi autem ipso retinet.

#### LIBRI TERCIJ PENTADIS SECTA

#### FINIS.

# STIRPIVM HISTORIÆ PEMPTADIS SEXTÆ

LIBER QVARTVS,

DE ARBORIBVS SYLVESTRIBVS.

PRÆFATIO.

**QV** si sint sylvestres nobis arbores, in precedenti libri præfatione dictum est, utique quorum fructus hominibus edendo non sunt, quæ viri sylvestres ac ægypti, magna siquidem ex parte sylva, aut alia loca ægyptibus præsumant, neque etiam cultura sic colantur, sic fructus ejus idem reddantur.

De Quercu.

CAPVT I.

Quercus.

Quercus lanata.



**GL**ANDIFERARVM arborum, quæ Græci *Quercus* appellant, complura sunt genera: Eius tamen quæ communiter *Quercus*, à Latinis Quercus, duo sunt: *lanata*; vide licet quæ *lanata* est: & *robur*, quæ Robur appellant: nam reliquæ *Quercus* propria nominibus obtinent, veluti *quercus*, *quercus*, *quercus*, *quercus*, *quercus*, quibus quandoque & *quercus* sine Fagus & *quercus* imponuntur.

Hæc enim Quercus Robur sine agresti quercu sæpi humilior est, caudice tamen crassissimo, non eo arbor nec vitæ nec læui, sed detorto, multis ramis aliisque comosa, materiam hinc tubosa, veram insuper quam Fago, materia ad omnia opera quam Roboris fœdior, glutinam maximam, & dilaam.

Sylvestris Quercus non modo in perennam altitudinem affurgit, frequenter in quercu ramorum summius latissimè patet caudice crui subinde admodum crassi, amplexu dicitur autem ergis potest. carnosissimos sunt, in plura alia dilaam. folia læuia sunt,

dumtacula, hinc oblonga, ambra in uella, superius parte virentiori glandes oblongae quidem, sed breuiores quam Hemerida, singulae suis in haurit calycibus, forma asperitatis eius, & membranaceo cortice conueniunt. interior nucleus ex duabus partibus componitur, velut Pistorum Emborumque fructus, & Amygdala. Cortex nouellissimus, ac vltimus fruticatosus, breuis glaber, ad cornu descendit vltis: virentium vero asper, crassus, durus & rimosis interne ligni materiam fistulosa, dura, ac solida, & quod vultur hoc quoque durus. cortex compositus prostrata candida, facile eadem semperfermam si tempore non sit idoneo casta ab eo fuerit: aures & hinc fructus quercus, & puerum in alium demitur, quibus firmius inhaeret.

Vix vltim folium Quercus respicit, nam & andro sterilique procreat: lanosae tamen solo melius proficit. in collibus & montosis pygmae: ad plana etiam de formis, passim per Europae promiscuas hinc est Quercus, praeterim Robur Hemeri siquidem ad ita vulgare est.

Syluestris autem in quibusdam regionibus altior, in aliis humilior etiam: non in plerisque Hispaniae promerens ad tantum, ut Clidius refert, ab eadem hinc excrescit, quantum vel in Germania, vel in Belgicaeodem modo & humilior Quercum quandam hinc procul Vianone à se reperiunt refert, ut postea alioquin vix superet, quae tamen & glandem seu Robur firmam, sed calycis formam hinc in aduenam, quo gustu admodum amara.

Folia Quercibus ut plurimum sub Aurantio sinem de haurit: quibusdam non licent, sed arida permittunt, donec à nouis superuenientibus deurbentur, quod sub faciem Aquae in Germania accidit.

In agro Thuro quondam Quercum Theophrastus esse inquit, quae nunquam sola demitur, & non carnalis, sed posteaortum Cuscula germinat.

Glandes Aurantio mature è calycibus decidunt, & non multò post ipsi calyces.

Codenda sunt Quercus ad vtilissima viles future Decembris aut Ianuario mensis, & decessentes quidem Luna lumine. Si enim incrementum Luna capiente succidant Quercus, signi materies eius carnositas sit, praeterim candida.

Quercus Graeci *δελ*, vti diximus, appellatur.

Quae glandem dulcissimam & maxorem profert, *λαυρα* est, quae & *λαυρα* nominatur à *λαο* Placida, ut Gaza verum potest finis & vltima, aut enim culis dicit: nonnulli *πυλα* quoque vocant: Macedones *ινυρα* per aut *ινυρα* dicitur, quasi dicas Venus quercum, interpretatur Gaza, ut vix Quercum.

Altra *αγυ* *αγυ* Latinit Robur dicitur & syluestris Quercus: vulgò Quercus: Italia *Quercus* Hispana *Robur* aut *Robur*: Gallicae *Chêne*: Germanae *Eichbaum*: Belgicae *Quercus*: Anglicae non Bohemicae *Dub*.

Fructus Graeci *βελυρα*: Latini Glans: Germanae *Eichhöl*: Belgicae *Quercus*: Hispana *Robur*: Italia *Glans*: Bohemica *Dub* appellatur. Sunt tamen & aliae *βελυρα*, sed quae nobis insipidior, verum cum aduolitione alioquin vocis profertur: ut, *δελ* *βελυρα*, & *αγυ* *βελυρα*, Castaliae fructus *βελυρα* dicitur, Palmae fructus.

Caesum cuius glans in haeret, *Καρπυ* dicitur appellatur, Paulo Aegina lib. vii. cap. xxi. testis: *καρπυ*, inquit, *βελυρα* dicitur à *βελυρα* dicitur: hoc est, Omphacum est caesum ex quo glans Quercina auolat. Latinit calyx glandis: Officinis Capulae glans.

Quercus autem sola, comest, glandum calycis, glandesque ipse vix habet nisi adstringentem cum refrigerandi tenore ordine potens & nonnulla refrigeratione. Praestat autem et liquor (ut Galenus ait) mellebrans quae cortex candens subest, & quae fructus carnis comest. Ad illorum multae beuae, superuenient: menses, sanguinis expunctiones, ventrisque fluores vtilis & comoda habentur: Datur decoctum horum aut mellebrans potum mellebranter & pectis.

Glandes, sic duntaxat, *αγυ* concoquuntur: aliter aut homini quidem nihil, nisi fortissimum, crudum, & frigidum conferunt: Sicut hinc pinguetunt, & duram solidamque carnem colligunt.

#### De Gallicae & pilulae Quercus. CAP. II.

**M**VLTA praeter glandem profertur Quercum Theophrastus inueniunt, quoniam non omnia, sed praecipue nota, ac in vltim recepta, nobis de scribenda: ut sunt Galia, Pilula, & Vltim.

Gallicae vltim ferunt Europa glandiferam pygmae, sed Hemeri & Robur Medicar vltim & ad cornu descendit acornis vltim.

Drepta, vltim Diodoride & Galeno Galia est vix parua, solida, non perforata: item maior, stractiosa, foraminosa, & interiore parte leuon vixque rotunda, & pilula formae vltim. & quibusdam extensione superficie leuon, in alius tubercula quaedam exigua emittit.

Sunt hinc forma Gallicae est, quae folia abique pediculis quoque inhaeret ac solidis, pilulae *βελυρα*

Galla minor.

Galla major.



sphæricæ delatæ vitæ, laza, & aquosi, in cæcis medio subinde aut nuda aut verrucosæ in <sup>foliis</sup> <sup>ramis</sup> perituræ: quæ in calidis regionibus, in modum laza parit. Gallæ quædamque induræ, et Theophrastianæ.

In terra latensibus et si quæ pedicatis et plurimum signantur Gallæ, quam desuper, sed non ab extremis vagulis dependent.

Agæd Italæ, Hispanos, atque Bohemæ frequenter reperitur. In utroque Germania raris ut nulle nascuntur. Sed pilule in foliis in his regionibus factis frequentes.

Nascitur, atque Plurimæ, Gallæ Sotæ de Gemmis exiliter, præsertim nocturnæ imper universæ.

Gallæ autem Græcis omni dicitur: Latinis, et dicitur, Gallæ nomen Officiorum de his continent: Germanis (Schaffel) Belgis (Schaffel) Hispanis Agallæ, Gallæ, & Angallæ: Gallis vero de Gallæ: Bohemis (Schaffel) Gallæ.

Præterquam minor, Græcis dicitur, non quod immatura, sed acerba admodum sit, Omphacis sine facie immatura vix videtur. Differt a hac galla species, quæ est, ut supra scriptum, causam Glandem continens.

Majorum Gallæ in rusticis appellati sefert <sup>in</sup> <sup>montibus</sup>, quod vni Gallæ novæ illi legent <sup>in</sup> <sup>montibus</sup>, hoc est, siccitatem Glandem.

Theophrastus quoque dicitur Gallæram meminit: vnam parvulam esse ait: alteram <sup>in</sup> <sup>montibus</sup> <sup>agæd</sup> <sup>italæ</sup>, hoc est, picam (ali) bellinodum) & nigram: Plurimæ nigram lib. 1. c. 1. cap. VII. aridioribus vixit & in fibre, vni dicitur Mili complur magnitudinem.

Quod in foliis natum reperitur, <sup>in</sup> <sup>montibus</sup> <sup>agæd</sup> <sup>italæ</sup> vni dicitur appellatur: Eadem Plurimæ quæ vni dicitur plurimæ Gallæ vni dicitur, aut modum Gallæ: Germanis (Schaffel) Plurimæ: Italianis quædam appellatur.

At Gallæ Omphacis, autem Galeno, vni dicitur in delictando, sic vni dicitur in refrigerando est ordinem admodum acerbum est medicamentum: partes longissimas de his omnibus quæ contra hanc, vel in carne aut feruntur: si dicitur vni dicitur, ad vni dicitur in vni dicitur, præsertim ad gignas, non filias, aut vni dicitur in vni dicitur.

Altera Gallæ dicitur & ad vni dicitur quæ aquæ sed tunc in vni dicitur, quæ vni dicitur quædam in vni dicitur est præcepta. Decocta, trita, & in vni dicitur modo ad folia inflammationem & præcedentiam veluti imponitur. Decoquitur in aqua, si modica ad vni dicitur operum in vni dicitur, præsertim acerbo, si vni dicitur.

Denique



Denique Galie combusta, sanguis repimentis facultatem acquiritur, si rosas in qua spem capere non faceret, cum subolescit un partem, cum macore deliccandi pariter. Carbonibus autem imponere ipsa operet sique dum vndequeque carbonis aceto & vino deinde extinguerit.

Prorsus vero Galie dysenteris & colicis cum vino aut aqua & impolite & affumpere, vel obitus addere. In summa ha vendit ad refectio & adstringit, que hoc opus habent.

Pulsule que in foliis repimentis ad Galiam facultatem accordant, sed tamen ipsa multo infirmiores ac minus efficaces.

## De Vitis.

## CAP. III.

Vitis.



Vitis.

**V**ITIS ab arborum Vitis non excedit, in laetudine vero sese ostendit, raris malis, geniculis, lentis, & lignosis, qui in malis alio duntaxat, & cortice consistuntur admodum vitis. Folia oblonga sunt, distanscula, Baccis maxime filis sine similia, amarem paulo longiora, circa genicula, post angulos foliorum sublatos succedunt bacce inter se aut quatuor coherentes, candidae, transparentes, ex parte medio femine nigrae, quibus inest lentis admodum, vitidus, ac tenuis succus, mellei tulin profum, arborum enim ramis adhaeret.

Nascitur autem non modò in Quercu, ac reliquisque generibus, verum & in Pomis, Pyris, Tiliis, Betulis, Salicibus, Myrtis, Cornis, & aliis. In terra sacra non producit, folia arborum comestibilia, nec nasci produnt, nisi feminis per anis abentis alium reddita. Ferrus, inquit Athenensis lib. ix. si vitis Vitis semen contulerit, super quacunque arboris vitis in concreta, Vitis nasci.

Contendit autem Latini interpreti Vinagrem nominant, que à nonnulla Turdas consumitur, nam haec viticrum acule est.

Vitis semper vivit, cum hyeme quàm plurimum hanc perfricatur, non hyeme resiliat, cito fatore nonnulla arboris, vitidus, mellei, ac paulo mellei.

Talis & Rosa Gerco, Latine Vitis appellatur Germanis Wistel, Belgis, Germanis: Ita-

lis Vitis Hispanis Laga, Poenigallensibus Vaga.

Glutem in suco, quod ex bacca Vitis excolitur, similitur Vitis & haec vocatur. Dicitur vero ista quaeque Chamelion albus, propter Vitis quod iuxta radicem quandoque reperitur. Chamelion quoque nigro haec vox inter ocellas adscripta est. Resertit lais quoque lib. vi à Dioscoride, & à Paulo Aegineta lib. v. inter delicta & venenosa que vitis haec venenosa & maligna haec, difficultate & ambiguitate non caret. Multi Chamelionem nigrum esse voluere ab glutem esse, quod ex Vitis acinis sine bacca confectum, qui Latine à Chamelione nigro distinetem haec se mense est sumant.

Paulus simpliciter Aegineta in eadem mentione simpliciter venenorem lib. v. cap. xix. Chamelionem nigro primò in mentem: deinde paulò post haec. Cùm vero particulatim singula profertur, de Chamelione nigro cap. xxxi. de lais vero, que & Vitis, cap. xl. vi. est, & vitis sique multum di sistentia hinc pro nata prava ostendit.

Dioscorides vero & ipsa lib. vi. in centis simplicium venenorum, Chamelionem nigrum primò, deinde paulò post lais reperit, tamen de sola lais particulatim in plura.

Ostendit haec Chamelionem nigrum ab lais, quae inter venenosa habetur, differre. Ius & Chamelionem nigrum Vitis haec, aut ita glutemolam & lentam habere substantiam, ut quae vitis haec debet auferat, nullquam legitur.

Prorsus haec inter venenosa est, ex acris sine bacca Vitis glutemum est, quod cum acris, lingua quidam mitionem exortat pomis, & tenaci ac lenta sua substantia in operata con-

glut-

glutinate, simul contrahere ac concludere, ut excrementosam cutis ac defensionem impediant: que inter nocentissima habentur.

Cum acrimonia acrim Viscum, id est, glutinum ex acinis confectum, calfacit, ex plurima acrimonia acria, & aqua, paracelsus terebinthina, auctore Galieno, constat, nam acrimonia in eo amaritudinem superat: humores velicenter ex alio contrahit, nec eos tantum tenes, sed etiam crassiores, postquam diffundit ac digerit. Phlegma, ut Dioscorides, paronides, & alios ab officina cum resina ac paracelsa manent: cum thure vetera, thora & maligna ab officina molle fitem cum calce aut gargar. lapida, aut alio coctum, & impoertum manent: cum autem gargar. aut supradicta vngues extrahit: mixto cum calce & vini fere vim habet.

Intraque in aliam partem istud Viscum lethale est, & gravissima symptoma ad se revolvitur: in quoque cum tumore inflammatione excitatur, mentis uter, cordis vires, anarisy recedunt.

*In reo abstrahit, consistit venter meatus*

*Peris aqua cibus, feno ubi carere class*

*Dant scriptum, & circum spatio voluenter iniqua:*

*In casu affilium vix tandem decere pressa*

*Qui post animum, ut in Alexipharmacia Nicander, interpres Galeni.*

Legno in Quercu hanc Viscum annulato ad acrimonia committitur: roborum novellu vultur, & similiter contra sanguinem de quoque eruptio: sed exigit, uno nullo cum fructu aut succella.

*De sive coccum ferente, sicut videri, CAP. VIII.*

*Hex. mose coccum.*

**T**AMEN Theophrastus vni tantummodo species sive sicut nomen, duo tamen emergentia postea sunt: vni Coccum ferentem aliterum glandiferum tantum Quod & Dioscoridis deinceps hanc aliterum: Hec ut si quidem glandiferum lib. a. inter sp. referre aliterum verb. lib. m. sub titulo aliterum sp. describit.

Coccum autem ferentem illic quibusque vni-  
ca videtur ab officina in aliterum sp. fructu-  
plura à radice caules prore ramosis, circa  
quos folia oblonga, marginibus cretata, ad sin-  
gulos angulos sculata ac spinosa, in tota non  
modo quam Robora, sed & quibus hinc glandi-  
fera, ramulis grana oblique pediculis adhaerent,  
colore primis albedo, per maturitatem verb  
cinereo, Erub. magnitudine, in quibus exigu  
vermiculi pignuntur, qui immobiles sunt, do-  
nec Sol expositi in calore prorumpunt, & sus-  
pense coarctantur, sed à custodiibus qui assident in  
luto tanquam coarctantur, donec exaridit  
tum glandem (si quid profert) pullam pignit,  
calyce spinosae echinato inhaerentem, galsa  
amarum, sive, inquit Theophrastus, radice de-  
ferentis.

In Gallia Narbonensi, ac circiter Provin-  
cia, in Hispania quoque flexa crescunt, sed tamen  
non ubique Coccum pignit, sed in partibus in  
quibus modicamque mare versant locis, &  
que solo calore coarctantur, C. Clasio rebe-  
Necque illic perceptus, sed tanquam quibus humilis fructi-  
ca videtur ab officina in aliterum sp. fructu-



fructu sive, ubi enim adoleverunt & glandem ferentem, Coccum ferentem desinat. Idcirco procul  
per grandiores succellunt, ut in tota non prore caules quibus, qui Coccum adferant.

Peris Bellonius in Singularium fructum libet in Palestina, ac inter Lacum qui mare Ty-  
beriadis dicitur, ubi Coccum baphicam refert, & in exiguis quidem arboribus provincie:  
Item & in Creta insula parvulus esse arbore Coccum ferentem, ex quo indigeni locupletant  
prosentum accipiunt, quo cortices à pulpa sive vermiculis separant, atque hinc lino com-  
pressa in pulam efformantam, molliù plura quam inanes cutis, & velis vitibus granorum  
vesiculas,

vesiculos, distrahunt, ad tinturam purpurae colorem, quem vulgò Scarlatum vocant, vertunt.

Mentum & herba Cocci Paulus ad lib. x. atq. arborum, quae hanc producit, haud magnum quoque officium, propter Rhamni magnitudinem, & in Phocida quidem nasci, quae Macedoniae provincia est, inter Boeotiam haud procul à Parnasso monte.

Cognitur, inquit Plinius, in Galatia, Africa, Paëdia, & Cæcia.

Theophrastus hanc arborum esse magnam, & Robora modo asserere, & quidem non vbiq.ue, sed si locum, & solum ad placentiam elongatum, montibus propriè esse, & in plenis haud nullis, quorum comitatu in recemotum ubi fructuosiores docent.

Ipsa Verè, spirantibus Favoniarum, & umbribus decidensibus, grana laevigata circa caritales, praeterquam vbi in alios distrahunt, apparet in incipiente Junio mense ad perficiendum velle vbi cum in unam ventis localis, qui colorem Solis immittit, non studio ac diligenter cultidum sepius conculsi intrent. At hincula siue fructus perpetuo fronde ac comitibus. Glans sibi admodum perfidus, non veterem occupat: qui nobrem hinciam quidam exhibant, auctore Theophrasto.

Fructus hinc parvulus arborum hinc arborum Graecis hoc nomen est: Latini flex: recemotum item Coccygeram aut Coccyferam appellant: Hispani *Cofinos*: Drosicorda sive *βερβύδιον*, sed minus propriè.

Grana autem, quod tingendo est, propriè sive, dicitur: Latini Cocci infestio, aut Coccum infestorum Plinio etiam Calsicum, sive (vt pleriq. loquunt) Quilquatum dicitur: Item & Scotionem nominant, ut, quod in Asia & Africa nascitur, quia colitur in venterium mater: Arabes & Officinarum Chineses & Kermes nomine appellatur. Hincianum qui Chineses ab infestorum Cocco differere esse opinantur: & circa radices situm herbe veluti Pimpinella repens ac colligit. Item Cocci granum, *grana de tinctor*: Hispani *Grana para tinctor*, & *grana de tinctorum*: Germani *Erdbeinölbaum*: Galli *Paraselle*, & *grana tinctorum*, sive *Scarlatum* vocantur.

Glans sive fructus hinc à nouellis, Theophrastus ait, *καυτο* dicitur.

Corticem granum undecum adstringendi vim cum nonnulla amaritudine habet, circa aquimoniam & morum refertur. Proinde, inquit Galenus, ad ingentia vultus operant, & ad acetosum leisonem impostum cum aceto nonnulli, abj. cum oxymeliter terant.

Adacris superfluentes menses à recentibus commendantur, & casti herat. Refertur & inter ea quae cœci profusa, & ipsam corroborare existimant. Ab hoc celebratissima apud Arabes Med. hoc compositio Alkermes nomen accepit: quae ad cordis affectus à malis probatur, tamen non nisi ad melancholicorum purgationem praecipue *invenna* ac *indiana*. Id quod Lapide Cyano, vulgò Lanthan abundè magna quantitate additur, & videtur ostendit, nam hoc semper facultatem habet delectationis, & simul melancholicos humores expurgationem, cordis per se profunde neque profertur autem reliqua, quae à cordis adiacentia, vt cœca Cyani lapidis in unam accretus, & malitiam ipsius reprimerent.

Committitur autem haec compositio ad cordis tremorem, palpitationesq. & haec operatur adacris melancholicos affectus, tristitiamq. ab ipse cau. si euidente: animum recusat & exalarat *seruus*.

Adacris melancholicos affectus, vanae imaginationes, suspensa, tristitia, & tremor citra manifestam occasionem committit quidem, quod melancholicos & aceros humores expurgat. Prodest & hoc modo cordi positi, & animum hilaritatem reddere, asserunt, inquit eandem quae molesta est. Sed alio modo est dicibile ut in alio affectum roborare non possit, ad si Lapide Cyano peritum esse.

Idcirco qui haec compositio adacris palpitationes, tremoresq. cordis, animi desolatio, sed haudquaquam veluti expurgare medicamento vni insunt, prodeunt & nihil faceret praetermittendo lapidem Cyanum. Nam ex quo possidere aut parua quantitate haec assempit, expurgat neque peritum hanc interius ventericulum possit, propter quod non suo qualitate ac delectatione potentia interna videri (si frequenter feruatur) plantarum offendat, quae hoc modo plus mali, quam auxilij conferat.

Deinde non necesse, imò non expediens est, vt in haec compositioem addatur sicut dicitur Chastinus, vt Officinae loquuntur, nam sicut haec ab ipse compingentis & alio permixtis additis non erigitur, quorum maligne qualitates valè cum colore siccis commiscetur, & sineam tantum haec insequatur.

Cocci grana per se sumenda sunt, quae sola facere tingere abundè poterant, & sicut vni sumptus ipsi reddere: Neq. opus quoq. est sicutam crasiam valè cum granis incipere, vt pleriq. solent, omnino haec possit, ad cordis emam roboratorem nihil facit.

De *Ilice glandifera*, *succinosa*. CAP. V.

*Recurse glandifera.*



**I**LIX dicitur ad multos arboris altitudinem non raro excrescit, subinde Pyro magnitudine haud inferior, raris aliam glandiferam more diffundit, matrem firmam ac solidam. Folia humilis ac tenella, per margines, forte ut prona, spinosa & aculeata, adules vobis haud equam spinam haurit, amboe quidem nominis sed minus quam Robur spinosa, inflexa foliorum Sabera, sed maxima & laevora, quae superius virentia, inferius insubstant. Glanacalyx spinoso adheret, Quaeque similes, quae per immutabilitatem nominis locis significatio est, nucleos intus cavando, sapore haud ingrato.

Dependet ex huius ramis subinde tenuis & capillaceus masticosorum coloris.

Vestitur hinc in montibus regionibus nemora, colles, loca campestris, rursus in vallis: compluribus Hispaniae regionibus familiaris, in Narbonensi Gallia ac Praenestina etiam haud infrequens. In Italia quoque nascitur. Glandem vero in vno loco in centro ac grandisorem quam sit Quercus alio in centro ac brevioris profert.

Utraque anni tempore viret: glandes sero ac tarde perficiuntur: item rursus in fine hinc fecerunt se Maio in fine consensisse, Cuius scilicet.

Graeca est *αἰξίος*: Latina *Ilex*: Hispanae *Zucina*: Italiae *Ilce*: Galliae *Chêne noir*, &c.

*causa*: *Allobroribus* *Ilce*. Fructum Hispani *Ilce* aut *Ilce* vocant, Theophrastus hanc arboris non *Ilce* sed *Ilce* appellare videtur, ut siquid em *Ilce* sunt in modo *causa*. *causa* videtur ferre in *Ilce* vero non *Ilce*, sed *Ilce* ab Arcadibus vocem trahit. Et autem *Ilce* non *Ilce* sine multis significationibus. Inter Legumina est *Ilce* cognomento *horrentis*, quae Delechia & Phasolus quoque appellatur: Similis autem est *Ilce* inter eas quae siliis alis capsulis autem Similis autem *Ilce* est Latens: Taxus dicitur.

De Similace autem Theophrastus sic habet lib. III. Quae Arcadibus incolant, arboris quendam Similacem appellat: similia hanc *Ilce* est folia eius haud aculeata, sed venerea & longiora, plurimumque differuntia habentia.

De hac Similace etiam Plinius lib. XVI. cap. VI. Ilce, inquit, duo genera: Ex his, Italia folio non multum ab Olea distant, Similacem autem quibusdam Graecis dicit, in provincia Aquilana. In quibus verbis pro Olea, non *Ilce* fortassis *Sabera* aut *Ilce* que respondentur: Nam *Ilce* folio non *Ilce* est, neque a quoquam verum in hac *Ilce* species sine Similace esse tradunt. *Sabera* autem, ut dixerunt, folio refert, quod Graecis *Ilce*.

Ceterum in *Ilce* folia resurgendi ac repurgendi vim, velut opinionis glandiferarum, habent: tunc autem tunc in montibus olea sua in polis profert, sed in bacillis partes corroborat.

Radix cortex cum aqua coctus siquae dum dissolvitur, modo in polis, capillos denegat, penes cetera cura purgati, ut Dioscorides ait.

Glandem exponit, ac in hanc venalem inferre apud Salamanticensium, ac plerumque alias Hispaniae locis C. Clusius refert. Acque de hac glande scripsisse potuit Plinius lib. XVI. cap. V. haec verba: Quae & hinc per Hispanias fecunda mensis glanacalyx asportat.

De *Ilce* *Sabera*. CAP. VI.

**S**YRIS, medicabilis magnitudine arbor est, *Ilce* similia, caudice tamen crassiore, *Ilce* *Sabera*, sive praeconum ramorum. Folia plerumque maxima, lanata, rotunda dorsa, per margines aculeata & aculeata, quandoque vero longiora & acuminata. cortex crassus, admodum scaber & nivosus, spinosus, delibatus, ac in fragmenta sili separatus, quae nisi tempore hinc detra-

Thelephora suber.



nomina: Hispani arborem *Alorogue*: corticem verò *Cereba de Alorogue* vocant: inde Belgis *Castalecitur*, qui tamen & ipsi *Thelephora* appellant.

Eandem autem corticem ibi cum adhibere solent tritis & cum aqua simplicis sanguinem inde quaque fluentem sepius. Suber ex vincto cado, inquit Paulus, combustum, cinerem se dicit fricido vehementissimè, quæ medicis ad dysenterias in sepius adhibetur.

Est deinde ad multa Suber vitæ. Vitis aut, inquit Plinius, ancoribus maxime nascitur, piscariamq; magis, & eodum obrutamens, præcæ in hyberno seminare in oleo. Qui etate adhuc nostra, viti perdurat, nam piscatores corticem hunc, reticularum alia, ne sciant, appendant: & si rores totas suberis figora hoc mutantur.

## De Phellodrye Thelephora.

## CAP. VII.

**I**NTER glandiferas arbores seponitur & Phellodrye dicta: hæc mediæ quædam inter Elicem & Robur apparet: mareis eius mollior ac solanor quam Elicæ, suber verò quam Quercus fructum non secus quam flex ha her, mirum in glandibus firmis, & delectat quædam quam Elicæ, amarorem verò quam Quercus.

In Arcadia nascitur, & in Mathiolo creditur, in agro Smerò, & Comitatu S. Flavi apud Italos.

Ex sylvestribus perpetuò virentibus hæc est.

*Acadica* Arcades, inquit Theophrastus, appellant, & *ditæ* quædam est, Elicem firmam esse existimant: idemque ibi flex non provenit, hæc ad plantam similitudine venturæ opor. Lacedæmonij verò, Elicæ & *Drye* quædam est, sylvestrem (se tpe Elicem) omnino non adali non *dicim* sed *dicim* legunt: (Est autem Asia sylvestris quoque arbor, perpetuò virentis) Italos, Mathiolo autem, Phellodrye *Cereba* vocant, quæ Cere fibrem: Dicitur autem *Thelephora* quæ Suber quercus. Plinius eandem cum Subere esse existimare videtur, verba que de Phellodrye Theophrastus habet ad *dicim* transferens, lib. xvi. cap. viii. hæc verba sunt: & qui firmam Elicem vocant atque ibi non nascitur flex, pro ea Subere videntur, ut carpentant præcipuè fibrem, & circa Elicæ & Lacedæmoniam.

Glas

Glandium hanc dicitur à *δανδα* vocari dicitur. Appellatur, utque Theophrastus, *βίβυς* & hanc fructum dicitur.

De facultatibus ex veteribus quoad adferuntur non occurrunt.

De *A. Eglopi* ex *Flora* & aliis.  
*Eglopi* sine *Cortex* ramos *gland.*

C A P. VII. 2  
*Eglopi* ramos *gland.*



EX materia glandifera ramus *δανδα*, *Eglopi* quoque est arbor proceris, caudice recto, ex-  
celsa, ac lani, per longitatem robustissimo, sed materia inproba glans in fructu, amara & he-  
natis alperque calyx, vetuti *Culmen* fert quoque & galls *Hemendii* similes, sed hanc rora  
ac inerte.

Quod verò *δανδα* (*Cassia* perem) appellatur, *βίβυς* sine simile solum *Eglopi* producit, ca-  
udice recto, ac cubitali, *δανδα* ne deperdit, *δανδα* vill' *Inocentianus* prolixus recitatur ad e con-  
tice, nō è fructu vnde glans, nec ex *δανδα* sine *gemma*, sed à hanc in permodum ramulorum.

Incultantem omnia *Eglopi*: raro non nisi in *israhelibus* reperitur. Itaque magis ex  
parte incognita, ut *Plinius* testatur *Grecis* *Αγλοπι*. Latine *Ceras*. Meminit tamen & *Egi-*  
*lopi* & *Cera* *Plinius*. Est verò & *Αγλοπι* inter fructum *vitis*, que *Festuca* dicitur, in ubera  
ab arbore *Eglopi* differens.

Ex ramis dependens *Plinius* *Pantem* nominat sibi *αγλοπι*, *vitis*. *Eglandifera*, inquit, fo-  
lia que vocatur *Eglopi* sunt poros tenentes, multo villo villo curtos, non in cortice modò, verum  
& in ramis dependens cubitali magnitudine, ad omnes, ut dicitur, inter *vulgaria*.

Nihil autem apud veteres de hanc facultatibus scriptum reperitur.

De *Platyphyllo* sine *Lanfolis* ex *Plinio*. C A P. IX.

AB *Eglopi* proceris *Lanfolis* proceritas est, & ipsi inter glandiferas *δανδα* referenda.  
Sed materia adificans in ramis vtilis, que carbone dotata, vtilis obtenta est. Glans hanc  
post *Quercus* granifera, vtilis alit descendit: & si *Vespilio* credamus, *βίβυς* quantum  
compos cum melle, tantum radice descendit. Non vbiq, ut *Plinius* ex *vulgaribus*.

A latitudine & magnitudine sibi, *δανδα* *δανδα*, ac Latine *Lanfolis* dicitur: Eadem verò  
& Latine *βίβυς* nuncupari cernitur: de qua in *Odii* *Horatius*:

*Non rigida melior Αβίβυς.*

Dicitur olim *Alicibus* bos sativus de cuius visceribus sicut in his plantis cognoscere soletur.

*De Haliphles, seu Balsamiferae Plantae de Theophrasto.*

## CAP. X.

**H**ALIPHLES non excellit cortex eius crassiflorus: eadem plerumque caulis ac fangulos, nec alia patrefloris hoc genere amaranthum visis: pellis vero & carbonis & materia: ad eorum motum: eius tamen modo accommodat Theophrastus addit, alioquin tamen insidens carbonem quoque parum visum, quod & cretillit & mullit, raro eadem glans, ut & festum nonnulli existant: cum autem sint, amaranthi & ab eis vitulosi, ut cum praeter faciem nulli arum per amaranthi neque quod si aliud pubulum habeant.

Gignit vero & Haliphles quoddam simile Phalco quem *Aglope* proferunt, sed ut plura nigricans & patillum.

*Adiphae*, *Gracca*, *Lacania* & *Plano* Salicornia appellatur: Macedoniae, autem *Theophrasto* *Nepes* dicitur, huius eorum fructum ab eis visum, ut cum nullum eorum mundere queat, praeter faciem, & lignicam ab eis non habeant. Quod de *Aglope* scribitur.

Aglope

De Fago.

## CAP. XI.



se: *Bobenus* *Scythia* dicitur. Glandifera eadem arboribus Dioscorides *Fagum* ananemur, cunctis fructus *Quercus* glandi ab illi simile habent.

Aglope

Ad *Fagi* generis nonnulli referunt, qui *Spica* *Theophrasto* dicitur, à *Ganz* *Scythia*. Arbor haec est creta, levis, et nota, crassiflorae & altitudine Abeti similitudine referat ligni eius *Cygnus* sine bene coloratum, robustum, ac nervosum: cortex levis folium crassum, *Aglope*, id est, diffusum, oblongum qualem *Pyro*, extrema aculeatum: radices quoque multo recte profunde: fructus levis *Scythia* sine hinc, non tamen spicatus, sed levis, non hispido ut *Castanea*, similes tamen illi detestare atque facere: *Gignitur* & in montibus velle lignum eius ad multa. Huiusque *Theophrastus*.

*Plano* & huius arborea ramum sine, sed sub *Ostrya* nomine (si modo non pro *Ostrya* legendum sit *Oxya*) lib. xiii cap. xxii. *Gignit*, inquit, (*G*racia videlicet arborem *Ostrya*, quae & *Ostrya*

**F**AGUS proceras arbor est, in arbem non raro late comosa: eandem casto multo ramos brachiosa, cortexque levis est, interior vero materia cretilla, dum ad multa videri: folia levia, terna, lata, ramosa quae nigra *Populi* huiusmodi quoque ac brachiosa quae *Bambule*, *Iure*. *Fructus* cativi includuntur sine hispido, & aliquando cum modo hispido, ramosa tamen quae *Castanea* quae hinc in illis quae cum comata, color & levis *Castanea* ob eorum exceptis similes, sed multo sunt ramosa, & forma differentes, vixque manipalae, interior horum nucleis dulcior est, admodum quodam ediffinitioe, ramosa *Fagus* ac trilitus accitatus apt, sed que latissimo creta cretilla gradentur.

*Plano* & campestris *Fagus* amantificatur & in montibus, sed nonnulli humentibus.

Illis cum foliis *Aprilis* mensis contempunt, sed fructus *Autumno* detrimuntur.

*Gignit* est *Spica*: *Latina* *Fagus*: *Galliarum* *Quercus* autem *Quercus* *Aglope* *Bobenus*: *Italia* *Fagus* *Spica* *Vicia*, & *Fax* *Gallia* *Fagus* *Spica* *Anglia* *Bobenus* *Spica*.

*Fructus*, *Nuces* *Fagi*: *Graeci* *Glandis* si *Spica*: *Beiga* *Bobenus* *Bobenus* *Galla* *Fagus*.

& Ostryam vocant, foliis tamen circa linea aquosa, similibus Fraxino cretice & ramis: foliis Py-  
ra, paritè tamen longioribus crassioribusque ac rugulosis duntaxat, qua per tota d'icuntur: se-  
mine Castaneæ (perpetua Hædo) simili colore, materia est duriorque firma: qua in do-  
mum illata, dicitur per tota non producit, necesse est scire.

Plum. borea  
ambrosiana.

Ceterum ut ad Fraxum redeat nobis sermo, sola hæc refrigerandi facultatem cum non-  
nulla adhaesione obtinent in flammis omnibus viscipientibus veluti imponatur:  
commendatur labiorum asperitatibus & gingivarum doloribus moderatè.

Intra os castro in acribus sapore cum tenui adhaesione dulcori, calidè qui dem sunt ac humi-  
dificentur resum ex calculo d'iores si edantur in rigore, & ad calculorum ac arenularum  
faciliorem exortum prodesse. Muribus autem in quædam sunt, ac fructu, quorum etiam pro-  
ducuntur argenti. Signantur & horum pulvis potu, & alia quedam animalia: delectantur his  
quoque turci ac columbe.

Ligna in cretice ad vitæ compositionem veluti Petrus Creteus scribit.

De Fraxine.

CAP. XII.



Fraxinus.

**A**LTA & proceræ arbor Fraxinus quoque est:  
Acanthice affingit, vobis, confusus dicitur subinde  
hæc exigua frequenter modicis cortice con-  
tegetur lævis lignum albidum est, læve, durum,  
scilicet in parte carni hæc temperiore necesse est  
etiam generibus alioque nodis sunt, medullarum  
non habent candidam & fungosam: sed veru-  
similes non lignosi generibus ac medulla carent.  
Folia obliqua, pennata ex compariibus consistunt,  
de vno pediculo sine costant, ut Theophrastus,  
sunt obliqua, consurgunt hercibus, sicutque  
mixtum ex aduerso positæ, excepto extremo,  
vna, quorum singula oblonga, læua, Læui-  
us similia, nisi meliora, dicitur virentia, ac ne-  
quaquam odorata, & per circumferentiam leuiter  
serata, à tremoribus ramis iuxta foliorum  
exortum multæ prodeunt simul dependentes,  
oblongæ, angustæ, planæque veluti filique, vo-  
lucrum normaliorum linguæ sunt affinitas, in  
quibus semen perficitur, quod gusto amari-  
cum est, radices molles & sublimæ.

Læua hæc tribus, veluti circa præsertim mar-  
gines, aut florum apex, melius Fraxinum pro-  
ducit, quam in fere, aut arboribus.

Aprilis mensis in Germania ac Belgio sola &  
diquæ producit: semen tamen non ante Au-  
tumnæ maturationem consequitur.

Arbor hæc Græci vocant dicitur esse acanthice  
cuiusmodi Læuis Fraxinus Germani Gschern  
hæc, Gschern etc. & Cypripetra: Belg. castice

& Castice: Itali Fraxino: Galli Fraxin. Hispani Fraxin, Fraxino, & Fraxin: Angli  
Fraxin: Bohemi Gschern.

Fraxin si liquorum vobis Officina Linguæ omni & Linguæ passivam vocant: Gra-  
eci dicitur esse dicitur: Sunt tamen qui velint Onoclogium dicit: alij Onoclogium  
Onoclogium facit.

Faciliorem autem Fraxini folia & cortex cum moderato calore efficiunt refrigerantem  
habere Semen calidum ac fixum est vobis secundo.

Foliorum facit aut ipsa folia imponatur, aut ex vno affertur vaporum modibus ac sibi-  
bus restituit, ut Dioscor. Tamen autem est: hinc arboris cortex serpentes vis, ut ne marinas  
accidentive vobis, quæ sita longè sita, vobis eius, serpens accingit, adeo quæ ipsam pro-  
cedit fugiat: ut Plinius lib. XVI. cap. XII. Idem vero ait Fraxini frondibus exortum potest ser-  
pentem, citius in ignem prociunt, si addit, albidum, quam ad Fraxin frondibus accingunt  
& præsertim forte Fraxinum pitis quæ serpentes appareant, nec pitis demittere folia,  
quam h' conditio sita.



Experti, inquit, prodantur: si fronde ex gyro claudatur aqua & serpens, in ignem potius quam in Fraxinum fugere serpentes. Mita natura benignitas, prius quam lux prodere liceat: Fraxinata, nec arbor cordata sola distatere.

Vitruque, hoc est, folia & cortex venarum feruntur adstringere, & cum aceto & aqua decoda ventriculo impoſita vomitum ſilem.

Serpen quod foliolis eius in ſi moderat ſectionis: lateris doloribus ex cauſa ſingula cum vino. Aquam quoque cortex tubi edocet, vniuersa: cortex & Venens eſſe incrementum, praeterum vni cum Piſtaois ac Pini nucleis aſſumptam.

Ligni materies eſt ad plurima vniſis, Homines proceros & Achillis haſta, vt Plinius ait, ſubſtituta. Eius verò *myſagm* ſive ramenta potu pernicioſa ad ferre tradunt: Dioſcorides ac Corticus eius ex aqua ſilvas leproſa curat, Plinius auctore.

## De Orni. CAP. XLII.

Orni.



*Orni*. nate aqua moribus propra: vcluti alteri vobis ſive campeſtra vocatur, qua & ſua vobis ſua (vt Gaius) Babelia Fraxinet, ſed rectius magna dicitur Fraxinus. Particula enim *ſua* incertioribus nota, ſolent magis proprie ſic *Boſcapia*, aut *Boſiſ* que magnam ſignificant ſinem, & *Boſcapia*, Fraxinum magnam. Nominatur verò Orniſ Germanis *Waldbaum*: Belgis *Waldboom* nonnulli *Waldſte*: Gallis *Fraxin ſauage*: Bohemis *Hahr*. Martius hanc Sorbam ſpiciendam facit.

De facultatibus vitem vel foliorum, vel corticis, aut etiam baccarum, vt nihil aliud veteres extat: ſic & de notationibus nihil compertum. Pinius verò Orniſ facultatibus ſuis ſem Fraxino facere videtur, lib. ſiquidem xvi. cap. xii. vbi de vtraque Fraxino ſcribit, campeſtram enim eſſe tradit, in ortum ſpiciendam. in ea hanc ſubdit ſola eſſe cum vitem moriſſa, caetera cum vitem inuocis Gaius, prodidit. Quae quidem de Taxy vereriſ *Erpſite* non autem de Fraxino Feſellit Plinius vocam *myſagm* ſive *myſagm* aſſertit: *myſagm* Taxy vobis *myſagm* Fraxinas. ſic vt Fraxino pernicioſam illam facultate perperam eriborem, qua Taxy eſt.

Lapſus eſt ſic in Orniſ hinc Benediclus Carnus Symplicius, cum ex Virgij Georgica Orniſ Pini flore eſſe aſſertum ex ipſo ſiquidem Virgij carmine nequaquam liceret colligi poſſet, aſſi ſiquidem non de formis arborum, ſed de irratione nominatum in

Plinius

Symple-  
tium in  
Pini

alios diffimiles ac naturam differentes, veluti Nucis in Arbutum: Male in Platani: Fagi in Castaneam: Pini in Orni: Quercus in Vitis. Aequè hoc modo Plataniam Scribepomiferam Fagi Castaneam ferre: Orniam unanimesse Pini flore. &c. ut in ipsa Vulpis velip manifestissimum est, quæ sic habent Georgopolitico do:

*In fructu verò ex fatis nasci Aristas herede,  
Et ferulas Platani males gestire volentes,  
Castanea Fagi: Orni unanimes alba  
Flori Pini, glandemq; suis frugis sub Plani.*

De Populo. Cap. XIIII.

Populus alba.



**P**OPULUS dicitur alba & nigra: Pinnis tenuis unanimes: Lybæus, Theophrastus verò supra dictus.

Alba Populus perquam facile nasci arbor est, cuius in altitudinem affert, saporem ramosa: cuius dicitur cortex leuissimus, ramulorum verò etiam albidus: lignum candidum sapit sine dicitur. Folia lata profundius incisa ac angulosa, Vitisque fere similia, sed in solo trunco, superiore parte latius globis, ac vix in angulis verò albidis, ac lanuginosi: rami oblongi, papposi, intus purpureo: ramulorum in densa tendunt, summo terre cespiti subsunt, nec altius demittuntur: sique idcirco validiores venos has arboris subiecti non raro accidit.

Nigra Populus proceritate alba non est inferior, sibiinde verò & cæciliis, frequenter ramulosa: non raro crassiora candidis: cortex tamen latus similiter est, sed ligni materia densior, flavior, ac minus alida, acruosior, ac difficilior finditur. prima hinc gemma futurorumq; foliorum rudimenta oblonga, hordæaceo grano matura, pingue oleosum ac resinofum quiddam continet: digitis adhaerescit, colore flavo ad lacteam accedenti, odore suavi gratum, quod majoribus foliis & in folis tam abentibus sentit. folia

hinc arbor non angulosum, sed inlar proceram Hederæ foliorum larum & acuminatam, per amburum verò nonnulli conatum, colore virentibus ac resplendent, longo tenuisque pediculo appenditur, quomodoam vana concavum (supra) exhibet, proferit hinc & intus ac deinde post hoc oblongum vatum racemum, vix oblongum speciem exhibentem, cui haec adhaerescat rotunde, que via matura, in papposam vaselant lanuginem: raris hinc alius descendit, & firmis hinc.

Tertia Populus non malis nullis quibus proceres excelsi & proceræ est. cortex ac ligni miterica ad nigra: similitudinem accedunt: rami longiores ac nigrores folia quoque nigrores ac duresca, si hinc, marginibus profundius incisa, que è longioribus pediculis dependunt conuata ferè mouentur, sequè inter se collata crepant, cuncto etiam tranquillo ac tido, vel quibus minimis ventosis, radices hinc firmiores, profundius quam alba descendunt.

Laues, aquosi, & palustria Populi amari dogis gaudet: lanicos circa am nertalantur, ac proferunt alba.

In primis Populus geminat: procerdit reliqua nigra, cuius prima gemma tunc colligenda, cum in ipsis trifloris liquor repentur, quod sistende circa septimoq; tempore, aut postè pèst coarctat.

Populus alba Graecis *Alca* nominatur: Latine verò à nonnullis *Farfara*. ut à Plauto in *Penulo*:

*— resiam legenti dedit  
Fandaj: ut profernam ut folia Farfari.*

Populæ nigra.

Populus Libyca.



Germani uel Pappelbaum uel Albernbaum uel Pappeltogel: Ety: Æthiopia, qui Germani perperam Abacem interpretantur: Italia Populo nigræ: Hispanis *Alamo Negro*, & *Ameyro*: Gallicis *Populus Nigra*: Bohemis *Popel*.

2. Altera species Græcis *Καυαρη*: Latine *Populus nigra*: Pæto *Croftnago*: Albanis Germanis *Ïpion*: Belgis *Populær* & *Populær*: Italiis *Popolo nero*: Gallicis *Populæ nigræ*: Hispanis *Alamo negro*: Anglis *Ïpion* uel *Popelætre*.

Primum illud arum perit germin, casus in medicina uisus, Officinae Oculis Populi appellam ali) misit Germani Populi dicere: Græcorum quidam *αριππε* appellant, ualde erroneo occasione accepert, qui non penna illa germina resinosa, sed raris uisibus colliguntur pennis, in eam positione uagantur: & Populo alio munda se raris pishant, in quibuslibet resinofum, Græci cont) non aliud quàm quod resinofum est, accipi uolunt, licet fœculis hoc ipsum haur) proprio uocantur & pishant. *αριππε*, *Παυλος* *Διγιστι* lib. vii. ut, *αριππε*, *Ïpion*, uel est, multa circa semen uisus est.

In non uisibus autem uersantur emore, qui Postquam sabbulo addit, Saccharum ex Populi lacte in Padoam defluunt: hoc core ac darum crepant. Neque enim ex Populi liquor, sed ex alio concretio neque in Pado, sed in lacte Boracico, Germanis sine Balneo maris Saccharum colligitur.

3. Tertia autem Populus *Τριφυλλη* à quibusdam cognominatur, uoce à Gallicis uocata, quibus *Trifolle* dicitur: Belgis à crepta ac strepta *fulcrum* non in quoque accepit, qui tunc ipam nominant. Emittunt uero hanc esse à Pado Libyca dala, & à Theophrasto appellatam *Gaza* uocantur Populum uocat.

1. Cæterum alba Populus absterfens est facultrata, inquit Galenus, & temperatissima, ex aqua tepida & terrens extenuata effertur.

Græci *Προσόνδε* uisibus, uocatur (aut ut ali), & *αυραδέναν*): possidet it) facili) p) dedit & aduersus uisibus illud diurn. *Προσόνδε* uero hanc core in uide in ferba & *Q. Serenus* *Sarabonacur*:

*Σαπυς ουκίτην τωκτα τενδερ* *μωρβα*  
*Προσόνδε* & *προσόνδε* *λαγυα* *μαρταρ*  
*Populus alba dala uisibus de carter pado.*

Fertur verò & idem cortex fibratorem facere cum Mali rana poris, quod & folia post purgationes sanæ posse existimantur, foliorum tepens facies autem dolores insillitas faciem.

Populi verò nigra resina, quæ prima truci generibus, sicut Oculis dicitur, calida ac sicca, portum terrarum, attenuatissimæ, ac mollescendi facultatem obtinet: acopa & malagritana commo dit admodum.

Folia sicut item quodammodo facultatem habent, sed ad ortum inferiorem, Galeni sententia. Cum in aceto hęc resina magna virtute podagrica doloribus imponi, Dioscorides tradit. Sermen hoc est, prima permixta, vana offendimus, ex aceto porum compositibus vix esse, idem vultor est. Piceæ Populi oculis vaguamque Officinas non sumam: Docet verò & Olearum ex his conficere Piceæ Agnoscæ, quod Agnoscæ dicitur.

De Plinio.

CAP. XV.



**I**NTER proceras & altissimas & Vitis est, ab uno serè frequenter ramosa: crassi, foliis, ac utrosque extremitates caudatis cœctis sunt, item verò & flexibiles, qui substantia velox & ramulorum, qui non minus quam Tilia obsequiosi ac se in unum fere: ipsa substantia foliis ac fustibus, folia lœta, indurata, rugosa, venosa, longiora quam Pyn, ambitu ericata, quadrupedam nonnullorum in unum unum, ac precipue boam, petalo grana, in quibus folliculi suspensorie parte eminentes gignuntur, præter cæptos vel in calicem, & liquorum continentia latum ac villosam, qui quandoque Solis estombas aduratus gummi in illis concretis. sitem plantam, rotundam, tenuis, membranofum, minus quam Arriplicis, quod inter folia ac sub ipis latet: radix non multum distat, sed per aliquam spargitur.

Loca autem plana ac campestris, lacunosæ ac humidum solum: terra facies, vel sero heræ equas habentes foliorum gignunt, & facile in altitudinem a surgit.

Hæc autem non multum distans & alia quædam præterea quoque ac proceras arborum ferunt, cuius lignosa materies multo durescit, & ad opera idonea vsurpatur: que postea ac vim sustinent: vt sunt Cochleæ & molendinorum totæ: folia hinc rugosa similes & ambitu firmata existant, veluti proceras, sed longius & acris si parte laxioris, dicitur virentis, quæ sibi reborescit faciem gratiam olei, ab his verò nulli exant aut nitescunt: foliis, & bulbis eadem minus grana sunt: sitem prioris fatis similes.

In densis sylvas, locis montosis ac adhibet hoc genus provenit, veluti in Ardennæ sylva ac Sono in Brabantia dicitur, olim Ardennæ parte: in quibus hæc arbor frequenter reperitur.

Erumpunt virentis folia sub finem Aprilis aut circa Maii initium in Belgio quidem: eodè tempore & sumens modò prode, sed & perituræ, ac vete mos abeipar & decidit, quod matule habent: Nemo enim, vt Columella ait, Vitis ex sermone sent, sed ex foliolibus.

Liquore & folliculis Juno mense colligi potest, priusquam densis incipiat.

Vinum Græci *Βίβλα* vocant: Germani *Kasteln* *Kasteln* *Hind*: aut Belgæ *Claret* Galli *Orme*: Itali *Olivo*: Hispani *Plano*: Angli *Claret*: Boloni *Claret*.

Sermen à Plinio ac Columella *Santera* dicitur.

Vermicis qui intra folliculos cum liquore reperiuntur, Græci *αβρυ*: Latini *Culices* ac *Muliones* vocantur.

Et prior quidem hæram ea est, quam Theophrastus simpliciter ac circa adiectionem *Βίβλα* appellat: Duo siquidem hæc genera sunt: vnam *βίβλα*: alteram *βίβλα*. Eadem verò & *Αίτια* *Κολομηλ*, sicut Galenus *Βίβλα* Nam & hæc duo Vitis genera sunt: Gallicum & Venaculum: Illud, inquit, *Αίτια*, hoc nostrum dicitur. *Αίτια* siquidem lenorem ac proceram

rum esse, frondensq; secundarē habet pŕobem, quā ad quod de proce quoq; implens.

2. *Altera Vitis Ispañola Theophrasto est, quam Gæsi Monacolum interpretatur: Calicelle vērò Vernacula ac nostra dicitur, id est, Italica. Belgij hæc ſpēctat: & quædam locis terrarum nuncupatur.*

Pluribus lib. xvi. cap. xvi. quatuor Vitis genera refert. ſed Amianæ & Gallicæ tanquam differentes pro duobus generibus, quæ Colicelle vitiæ idemq; ſunt: genus. Tertiam referentem ſibi ac Colicelle dictam facit. quartam generis adde ſylveſtrum Vitiæ, cuius nec Colicelle nec Theophrasto meminerunt.

Vitis autem præter folia & cortex cum moderate calore abſtollentem non obſcuram obſtinentem lentam ac viſcoſam quā in manducando habet.

Vitis folia glutinant: idem & cortex ſicut modo quæ impoſitis ac circumſiſis. Ad leproſum cum aceto trita faciunt & folia. Cratorem corticem vitæ pondo cum vino antea præparatum decubebit. Duobus locis refert.

Hæc in folliculis reperitur abſtollentis eſt, atque vñ congelantem diluſam autem in iudex, facitq; maculas dolens. Vitis necenta conſolida: curat & emetoculis non inſeruentis cum ſpleto impoſuit, legens veſtè adhibita.

Tila.

De Tila.

CAP. XVI.

**D**VVM generum Tila eſt una & femina.

Tila femina, vulgè nota, & magnæ arbor eſt: multa & oblonga ramis in latitudinem amplam ſibi facile diffundens: caudex cruiſi ſunt: cortex levis, foris ſubnigræans, ſed intus ex luteo mallicera, lenis, ſiccus, admodum obſequoſus, ex quo & funes & chordæ confecturæ ac alia quædam veniunt. inter nonnulla ſpina non dura, nodi, & mallicera, ex qua carbonæ conſtant, quarum ad puluerem in compoſitionem viſi, quo bene ſunt & bellica implentur tormenta folia levis. ſpina dentata, lara, acuminata, Hedera non anguloſis ſunt ſimilis, ſed diſtans vixit, & per ſtagnantes aquas. Floruſi incrementum aut umbellatum porius, in longi colorum pediculis, quæ à quædam velut anguſti & albicantibus foliis: cuius ſunt. firmæ in rotundis folliculis baccarum Hedera magnitudine nigerrimas, ſpina vbi manentur occidit, radices in profundum descendunt, ac in latitudine ſunt expaſſiſſimas.

Tila in ætas non mirat aut manens amplitudinem diffuſi eſt quæto ſeruat: cortex levis ac obſequoſi ſimiliter ſunt, & ad funes confectiſſimos idonei, ſed tamen pauli duriores ac fragiliores. lignum durum, noduſis, & ex luteo coloratis, Vitis ſaris ſimilis: folia lara, ſubnigræans levis, ſed alperiora, propinqua velut Vitis, in quibus tamen folliculi non ſunt. Fructus adeo rarè profert, ut ſeruit & nec vltimæ ſæculi

exſiderat. Et autem hic plantæ, totiusque, & vni uſum Tila ſpina uſuſque, coherentemque plantæ elongatiſſimi pediculis racematim.

Pinguis lentique ſolum Tila requirit: in ſiccitate optatè proficiunt: in ariditate adoleſcent: pinguis quædamque, & dicitur, in ſylva.

Floris femina Maio menſe ad ſemina ſuſcitæ vñ in maturi Septembris menſe, aut poſt præteritum. Tiliam Greci καύγιον vocant, quæ diſſerens à καύγιος eſt: Ruellius perperam καύγιον Latine Tiliam interpretatus eſt. Dicitur autē Tila Germanis Eiben & Ambrōſium: Belgis Eiben & Rubeum: Italia Tila: Hiſpanis Vitis: Gallis Tila: Angli Rubeum: Botanis Ipa.

Mareo, Belgarum nonnulli patria voce Ipaſis appellat.

Falluntur autem non parum, qui Vitiæ, ac hinc cum ſollicita in folia ſimilemque Tila maræ vñ expriſſant ac colubent.

Handl  
man.

Deer  
man.



Tilia autem folia & cortex seccandi quodam vin lubrico, & vbi repellenti. Folia in aqua decocta cum passibus reficant ac fiant rosae ex hoc collato. tumores enim pedum rempente feruntur, cum aqua decocta, & emplastro modo imposita.

Flores calidi sunt ac siccis, & primum admodum tenui, cum aduersas capies ex causa frigida dolores, vbi gres, apoplexiam, ac etiam morbum contraham, i quibusdam commendantur: & non modò ipsi flores, sed & ex ipsis factus liquor.

Tilia folia, Theophrastus ait, proculena, & plerique animalibus pabulo: fructus mundi à nullo potest.

De Alno. CAP. XVII.

Alnus.



**N**ON minus quàm precedentis alna ac proceri Alnus est. caudice astringit medicos crassitudine recto. cortex eius sabet, fragilis, nigricans, ad coem aliorumque molibus vasis liquoris subleues, melles, ac trahibile, quod exim aquante diu incorruptum durat, sub ipsa verò aqua, ac in aquitudine attenuatum immortale, vbi sicobam fundamentis ac matrem struaturarum pondera in fluxu multa corit edificata ex Alno pulis subditus habet. folia autem Alni, Pyn folia nantes repositiorumque ad Columna accedant, per circumferentiam similiter crenata, talia glutinosa. vltos quales Betula pro floribus cernunt. oblongum est & ex multis squamulis copulatum quod pro fructu habent, quibus debilitantibus semen excidit.

In aquo si nascitur, ac in luto modo & putrida sylvis, nec alibi proficit.

Sili Vene erumpunt: semen Asarum excidit.

Græcis αλνδγγα nominatur: Latine Alnus: Ferte Cæcilius Amadæus: Germanis *Alnus* & *Alnus*: Belgis *Alnus* & *Alnus*: Italis *Alnus*: Gallicis *Alnus*: Bohemis *Alnus*.

Cæterum Alni cortex refrigerantem ac

astringentem cum siccitate facultatem obtinet. Incipientibus inflammationibus vultus imponi possunt. Conducunt quoque ad omnes & transiunt inflammationes ac tumores, vltos necesse legendum cortex.

De Betula. CAP. XVIII.

**B**ETULA septem ad modicos arboris altitudinem crescit: quandoque humiliter fructuosa magis. cortex eius exterior caudicem concutiens crassus, sabet, albidus, ac rimosus, qui verò hinc subest interior, tenuis admodum, leuis, itaque infra membraque pellucidus. crassiorum ramulorum cortex malloscit quoque, sed ramulorum non ita, qui paruo, qualis est Calicibus echino ramis color, respiciunt, qui sunt decursum reclinati ex arbore dependent, veluti iutorum sui foliorum pondere graui. ligni materia alba est, similiter & ramulorum, qui & ad id lentis ac sensibiles, vt ad oculatos valinos non minus viles sint, vel etiam vultores habentur, quibus Salguarum folia leu, ac mitem, & per margines mola, in nota quàm Fagi, leuionque ac veniosa. sili oblongi sunt, in quibus quod semen existimatur, pignatur, quod de hinc vltibus per artem iatis efficit.

In Germania ac Bohemia montibus ac sylvis, tum & alibi pignatur: & quandoque in arboribus ac ardi sicut, veluti in Bohemia: Campania, quibusdam locis adeo senibus, vt sit herbam quidem pro ducere, in quibus tamen Betula viget ac crescit.

Sili primo tempore procedunt: deinde folia Aprilis mensis: ut paulò ferius.

Nominatur hoc arbor Græcè i Theophrasto *aspida*: à nominali *aspis* ab alio *aspis*: Latine Betula: non desunt verò & que per duplex li. Betula scribantur, veluti quodam Plinij

Betula.



exemplaria habent: Germani Æne-  
 kubant: Belgæ Berberionem: Itali Be-  
 tula: Tridionem: Æthiopiæ Gallæ Pa-  
 lonæ Bohemæ Toppa.

De medico usum vñ Betula vel  
 partem eius, nihil vel apud veteres,  
 vel recentioris aetat.

Gallia hanc arbor, sequit Pliniam  
 lib. xv. cap. xviii. inquit: easdem  
 atq; utriusq; virtutibus Magistratam  
 vago nam ex ea olem conficitur: sic  
 est magistratam: hoc verò cum pa-  
 mo quoque pedogopæ ac parvum vago  
 ex Betula terrent.

De Acere & Carpin.

CAP. XIX.

**A**CERIS species tres sunt: ma-  
 jor: altem minor: terna Car-  
 pinus dicitur.

Minor speciosa ac procerâ arbore:  
 cortice medio criter lani: maceril in-  
 teriore teneta ac tractabilis: ramos ex-  
 pandit in octavo partem completa,  
 circa quos folia magna, lani, angulata,  
 virginea: lani fructu, sed liguorâ mol-  
 liorâque, & pediculo longum coque  
 rubente annexa. flores racematum de-  
 pendent ex illo: herbacei succident  
 fructus oblongi, lani ex adueto ruber-  
 rimes, circa antheram nuclea concepta-  
 culo rancidâ, reliqua parte plana, ac  
 membranâ inflexa: terna, Ephemerici ac  
 uterque in Caradg aliam similitudo-  
 nis candidi ac exigui sunt.

Minor Acer frequenter in arboris  
 speciem quoque adolebit: lani verò  
 truncis in modum humili permansit  
 ruficinis: cortex huius similis lani  
 minor ligni substantia alba ac tra-  
 ctabilis: folium in procerâ angulata,  
 lani, glaberrimaque, pediculoque adu-  
 rificans rubente, sed multo minor, Sa-  
 nuculq; folio cum magnitudine, cum de-  
 splendore ferè perfundit, nisi quòd pro-  
 fundius incilium: flores veluti in arboris,  
 herbacei, non rancidâ rancidâ, sed in  
 vmbre lani excurrunt: fructus similis ter-  
 tiaribus: vno pediculo dependent.

Carpinus caudice affert procerâ,  
 cortice malbecante, nonnullâ specie ac  
 lani: ligno folido ac tenaci: tunc in  
 laniâ rancidâ effunditur: folia circum-  
 miffa lani, lani angulata, sed ad Vi-  
 tri: folia accedentibus, nisi rancidâ  
 effert: hanc tras galana quædam  
 racematum dependent, tunc quoque capi-  
 tula Cæorum magnitudine, in quibus  
 fructus lani ferè: rancidâ firmâ lani.

Minoribus

1.

2.

3.







Pinus verò lib. xxxiii. cap. viii. Accensum eam coacturam vocinans doloribus efficacissimè imponi scriptum reliquit.

Q. Serenas Sammoniacus bibi eum vino aduersus lateris dolorem affirmat.

*Silatus coacturans morbo ventris acies,  
Accensum itaque lapidem frudentibus velle,  
Hinc hinc autem Arcei ruborem tendo, & velle  
Cum vino capi: hoc profecto medicamina habetur.*

De Platano.

CAP. XX.

Platanus.



**M**AISA arbor Platanus est, pa-  
longa & amplissima laxe nitibus  
ramis latissime patet, speciosam admo-  
dum vltimam efficit, cuius germen olim  
Romani grandisimo, experit, & com-  
mendabile fuit: folia habet Ricini mo-  
do angulata, maiora quam Vitis, ruben-  
tibus amplexu pediculis, foliata omni-  
gna, pallidula: fructus pedicularum arbor  
rotundus, scaber, & nocentibus hinc: in  
Asia quidem hincior ac maior, ad  
Iuglandis nomen quantitatam accedens.

Fomes ac flosus Platani amant: Pla-  
nus aliquando vino coacturam aciem.  
Tantum, inquit, postea horum (sicut  
Platanus) incruent, ut mero perfido ma-  
stratur: comportum ad maxime pae-  
dese medicibus docuerunt arbore vi-  
na potare. lib. xii. cap. primo.

Escholi artem hanc arbor adueni & pe-  
rogna: in Germania aut Belgio au-  
quam apparet: in Asia frequenter est  
reperitur & in Creta communibus, ac he-  
re Archio mense: ut Pissas Bellorum  
in singularibus vident.

Platanus, folia hyeme demittit, testa  
Bellorum, prout de nec maritimi solent  
arbor arcent, hinc velle cupiunt.  
Commenda do arbore, Platanus, nulla  
alii ficitur, quam sciam arbor aciem,  
hyeme admittit.

Dicitur autem hanc arbor Geratibus dicitur: & similitè Latine Platanus. Hanc hinc ho-  
men habita. Gallorum *Plafis* multum ab hac differt, quae Ricini species est.

At Platanus hanc idem ac frigiditas afferre est, ut Galenus ait, folia vinda, ad coacturam  
& incipientes vltimamones hinc in vino decoctis ac vltimamones hinc in vino decoctis  
ad vltimamones hinc in vino decoctis ac vltimamones hinc in vino decoctis.

Cortex & Platanus macturam retinendi potentiam habent, in aciem decoctis cortex dem-  
stratur dolores fopit: Dicitur vltimamones ad ipse vltimamones hinc in vino decoctis  
ad vltimamones hinc in vino decoctis ac vltimamones hinc in vino decoctis.

Vitum dicitur est peltus, Galenus ait, folia arboris hinc in vino decoctis ac vltimamones  
ad vltimamones hinc in vino decoctis ac vltimamones hinc in vino decoctis.

De Salice.

CAP. XXI.

**S**ALEX dicitur fuit: vna probatè dicitur Salix.  
Proceri Salix, cuius dicitur macturam retinendi potentiam habent, in aciem decoctis  
ad vltimamones hinc in vino decoctis ac vltimamones hinc in vino decoctis.

Salix.



Salix herules.



albentia verò mollia et albidiorijque. rami cortice vel purpureo vel albedo confectum tur. nulli qui primo tempore possumuntur oblongi, nisi scilicet in albugo & lanofis puppis abeant.

Minores à capite paulatim effusivè virgas progignit tenues, cortice nonnulla rubentes aut violaceæ, nonnullas vides. sentur talia aut virga in terram deposita, quæcumq; vitæ incrementum acciperent, in superior partem præinclinat, sic quod caput dicitur, illa sibi hæret. unde tenues virgulae emant, quibus sæpius rotas, caput granitum videtur. Minciturque quæ arbor. & præfessionem Salicem deponit ac plantam talis sive furem, sed albentia & sæpius hominis flammam, unde crassiores nascuntur perice, ad multa vitæ, & frequentius ad cunicos, quibus ligna vasæ ac dolia colliguntur.

Salix aquosi desiderat ac humidiora loca, nec citriam alibi Salicem cœlestem præferunt. Minores in palustribus omnino rigate feliciter nascuntur.

Aprili mense, vel, si feriat, Maio, cum folia prodromentia, in quibus ferentia (si modò ferant) citius cum puppis abeant, quam ad perfectionem perveniat Coccifera, inquit Plinius post Theophrastum, Salix emittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat, ob id dicitur Homero Frugipeda: Græci ἀλωήγημα. Virgale & perice carduæ quæque Vere, præquam germinare Salix incipiat, ac eodem tempore farculos deponere & ferere cœsent.

Salix Græci hinc vocatur: Germanis Weiden: Belgis Weiden: Italia Salice, Salice Gallis Saule: Hispanis Salgueiro, Salix & Sawa Bohemis Weiden.

Minores Salix periculis appellatur, præsertim quæ lignis in vitibus ab vno capite plantarum effundit. Hinc generum cortice rubentis Theophrasto nigri dicitur: altera verò candidiora. Plinius nigram Græcum cognominat (findatur, inquit, Græca rubra) candidioram verò Americam.

Minores hinc, non hinc Arcades nominant, Theophrastus scribit: Plinius & hanc Helicon nominant: Veroque hanc Salicetum speciem ferunt Diocles verò & eandem Salix pyramis, Salix viminalis, Gallica Salix, & à Columella Sabina, quam & Amentum vocari plurimus scribit: Germanis hinc Weiden: Belgis Weiden: Petto Cælestium Vincas.

Salicem autem folia refrigerandi faciliorem obtinent, & cum nonnulla adfrictione circa morbum refrigerantem: ad cruciatu admodum valentissimum ad hibericis modis possunt.

Inferuntur etiam perquam vtiliter tincti cum folis viscosis in cubiculo, ac tincti testales possunt, acuti foliis rariis, aliis siquidem calor in vehementer contemperat, quod foliis rariis bus multum expedit.

Corticis similitudinem faciliorem habent, hinc emittunt combustos, & cum aceto maceratos, callos & clausos exaliter. Dioscorides scribit. Nonnulli, inquit Galenus, dum fieret Saba contraem incedunt, & succum quendam colligunt, quo visuntur ad ea quae pupillis offuscant, exurgente videlicet similitudine resursum medicamine.

De Samburo.

CAP. XXII.

Sambucus.

Sambucus lactuosa folia.



1. **SAMBUCUS** subinde medicum arbori magnitudinem aequat, raris fuit latè effusa. Quandoque verò fruticosa permittit. caudex pinna parte lignosus & rugam admodum modulicè intrin habet, arvens, & praesertim ramosos gemculos articulat, modulum modulum sibi dum crassam internas recedunt, ac lignosi rivas habent. cortex caudexum scaber ac si mollementis colore foedescit: ramulorum non omnino levis, colore fere affinis, qui quidem caudex, subest enim basi & alius, ligno viscosior, vitreus, ligno masticis dum solidior, suffilascens, fidi facilis. Folia ex pluribus ad vnum medium pedicolum quatuorvisive coloratae, veluti huiusmodi, sed singula rarioribus, ambitu serrata, & praesertimibus. Boscali in hinc lanisque varietatibus albis & odoratis. succidant bacca non magna, sed virentes, postea nigrescentes, quorum succus lacteo colore rubet: situm in huiusmodi, plura, oblongam formam.

Adhaesiva non raro veterum arborum aut fructum caudicibus gutturi quoddam, molli, nigricans, penae, me mero opum que, hominum articulum quod amon od o subinde inferens, quod ablatum, & siccatum que constat ac durat. Et huiusmodi quidem est postea velipes Sambucus.

2. **Priore** hanc verò & alia quaedam nascuntur tate ac peregrinae. caudicem siquidem hanc non nigrit, sed albede caustant: folia ac bombas priore m referunt.

3. **Tertio** folia admodum sili & multum lactuosa. folia ac hanc priore similitudo.

4. **Quarta** folia quidem alba sunt, sed bacca rubente, & vnaque non in varietate, sed in

motum conpacta, ac tunc in modum gurgulis: folia autem ac reliqua vulgari accedit, nisi quod subinde alius extraxit, & procerior reddatur.

Jam de Sambuco ipse est libulus, nisi herba foret, & utiquequam arbor aut fruticosa. P. dicitur, de hoc autem Pempt. terna, lib. 12. cap. 22. u. 1. scriptum.

Humidis latant Sambucus ac opaca, rariem & alibi possent, ut in hortorum, agrorum, pratensium sepe vides.

Reliqua species similes requirunt natale: sed cum fructus racemosus, incertata est.

Substantia Mala, aut circa Iunij Calendarum apud Germanos ac Belgas Sambucus cum flore est: maxime hinc Septembris ac Octobris legantur.

Græci dicit, quæ Lacinia & Officina Sambucus: Gulielmo Saliceto Bona: Germanis *Holstein*: Holstia Belgis *Wim*: Italia *Sambuco*: Gallia *Has de Sam*: Hispania *Sente*, *Sentis*, *Lombagoire*: Anglia dicitur *Bolernes* *Drj*.

Quantum speciem nominat Sambucum sibi dicitur, sed Mattheolus montanum facit.

Græci dicitur Sambuci profluere, Arabi Sambucus plerique alij Iudei arietali nominant.

Galenus Sambucum qualem Ebulo facit eadem affertur, reticendū videlicet, conglutinandū, ac in odori digerendū: verum non hæc tamquam, sed & alia ei facultates adfunt. Nam Sambuci quidem cortex, folia, prima gemina, flores, ac fructus, non modò reticendū, sed & calidifacient, & vni quodè purgandi vim obtinent, sed non absq̃ mollioris & ventriculi modum do.

Prima enim gemina, costa, & Asparagi modo affatipa ventrem commouent, & quindocumque ventriculo perturbant vni tractu faciunt. Simile possunt & folia.

Interior vni cuius cortex potentius purgat: letum & agrosus haemores demittit, hydroptica ea de causa vtilis. Tumoribus, & cum vino acerbis sero liquet capillus propinquet.

Facilem hanc partem sunt & folia recentia quidem, cum cibo aliquo permixta, veluti cum melle, vino, ventrem quoque conuertunt & diachonem molliorem: reticent vbi dicitur cum melle, aut purgandi potentiam amittunt: digerendū & attenuandū remanent. Acetum in quo flores trahi macerantur, in eibus ventriculo gratum, appetentiam excitat, crassos crudosque humores pellit ac attenuat.

Se manu facilius paulo quàm reliquorum mellei ventrem quoque mouet, & humores aquosos detrahunt, in puluerem redactum, & drachmè pondere exhibentur. recentia collectam in aceto id macerari potest, ac deinde reticenti, commode additur sicca vini arida per pondus, & nonnulla feminas Arabi, sic essentia cetera ceteram molliorem potentiam facit excipit, & hydroptica fabuena. contraria autem aliquot diebus exhibendam, cum modico vini, quibus placet.

Græci Sambuci adstringendi ac reticendi vim obtinet. Diluunt tunc in quo pauca hinc macerantur fuerit collatione ac gurgatione oris tumillatamq̃ impetientes inflammationes sedat, & colicam illam laxatam reprimit.

Dioscorides terrena ac vitæata Sambuci: aut folia cum polenta inflammationes impetientes ambulat ac in cane demorata posse de se: dolores podagricos cum sero arenoso aut lactico lenare impetia: glutinare verò & *Chosyge*, id est, casca mosia vitæata. Nouerunt tamen mororum medulla qualitate experta est: hanc reticentia, acque nonnulla compressa aut conueta, ad fibularem angustiam ora dilatanda, impetia, conducit.

#### De Sambuco palafri.

#### CAP. XXIII.

**PALAFRI**, quæ dicitur Sambucus, non solum, sed et tunc ipsam refert, huiusmodi multo est, de fructibus modum nascitur: rami cortice consuestantur velon Sambuci, circosid colore fonderemq̃ colere per intervalla intercepti sunt, ac in vitam copiosamq̃ albidam modicillam areuere non deum habent, lignosi dicitur mires, quod candidum & fragile est, folia lata, angulosa, vni signis ferè similia, sed minori & molliora. umbellæ fistulose sunt, quorum exteriora secundum marginem cæpidines maiores sunt, eleganter albidi & quinquifolij, Lenocum minusq̃ reliqui verò modò ac non utiqueq̃ exiguè hæc: vbi manerent ruberq̃, Vni acini maiores, maiores, quàm Sambuci, saporis hanc grati, in quibusdam pluresq̃ nuclei.

Cum humidus tractus, & palustris gignitur: sepiè verò & non raro pira ac venusta.

Vmbellæ cum floribus Maio vigent: Autumno hæc perficiantur, quæ subinde totū hyeme in fructu resant.

Huius verò & altera est species, similitur fruticosa tantum modò, quæ candidibus, ramis a per intervalla articolata ac nodosa, medullaque candida referta, foliosque angulose proceri, ceteris expertisq̃, sed florea ramis non ab umbellis exant, sed in rotundis, dantibus orbicularibusq̃ globum confertum collectis simul vigent, in tenuibus & umbellam sepe-

Sambucus palustris.



Lotos.



Lotos alpinus.

notis ambrosibus, magnitudine & forma parvis omnino, colore eleganter albis, sed odore detestati, nullo succedente fructu.

Hortensis haec est, & cultus ingenio rari, et creditur, facta. Apud Germanos ac Belgas sic bene reperitur.

De hac Sambucus specie apud Veroneses nihil memoriae proditum: neque enim Optus est, ut non alios tamen suspensum corrigi multo minus Platan species Recentiores Sambucam palustrem, aut Sambucam aquaticam nominant. Valerius Cordus Lycostrophylon facit, & proceram fructiferam ferens, aut alteram herbilem maris nuncupat. Sennerius, inquit Galbena, Viam lupinam vocat: unde Aesculapio nomen, Cordus vocat Galbena: Thalesque & Dioscorides: Belgae Jambucus & Jambuckiana: Galli quibusdam olive.

De facultatibus autem huius & holarum eius nihil conperimus apud aliquem exacti neque nos quicquam adhibere possimus.

## De Loto. CAP. XXXIII.

**L**OTOS, de quo scribitur, arbor magnitudine Pyri, vel etiam maior atque: caudices tubulose habet valde crassos, coctae cutis sine flavo spin, atque è caeruleo colore eleganter viridem: ramos proceri leves, in latitudinem expansos raris vero veluti liliis, sine modo marginibus incis. Lotoe rotunde sunt, ac a longioribus dependent pediculis instar Caratiorum, immò in candore efflorescentes, rubentes deinde, sed ubi maturaverint nigrescentes.

Peregrina & raris admodum hęc arbor Belgis ac Germanis: ex Italia omnifera fuit, ubi sine frequens, Martialis teste, reperitur.

Nascitur verò & Lotos arbor in Africa, sed ab Italia in fructu abiqua differrent, ut Plinius sperne verò scribitur: cap. xviii. ostendit. Africa, inquit, qua vergit ad nos insignis arborum hęcum reperitur, quam vocant Celtis, & ipsam Italia simulari, sed terra nostram. Magistralis que Pyro, quaequidam Nepos Cornelius breuem tradit, hęc sine solo crebriores alioquin hęc videntur. Dicitur etiam plura, quae in hęc fructibus sunt. Magistralis hęc Fabae, color Cerei, sed ante maturitatem alius coloris, licet in vna.

Nascitur deinde in mari Myri modo, non ut in Italia, Cerasi: cum dabo ab obo,

cibo, ut noxam etiam genti terraeque dedent, nimes huiusmodi aducenarum oblatione potuit.

Fertur ventris non tantum morbos, qui etiam mandata. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere officus videtur. Vnum quoque exprimitur illi, simile melleo, quod vna denudata negat ducere idem Nopis: huiusmodi conuulsis cum aliqua ad cibos dolus condit. Quis hoc exercitio pulchro accepimus, vno ciproque commomones per Africam. Lago calosinger. Ad cibum carnis experitur. E radice balneis capulis, breuisque aliorum vna cogunt. Meridi narua arbore. Hellenus Plinias. Percipiam autem hanc, eodem loco ut, circa Syros ac Nalimonas. lib. verò v. cap. viii. hanc procul à Syris manere, insulam esse tradit Menyngem, Lotophagum dictam, à copio Lotorum.

Scribitur autem lib. xviii. non modò Menyngem, sed & ipsam non omni Syriam Lotophagum dici affirmat. In principio, inquit, Syria insula quadam adiacet oblonga, nomine Certiana: non alteri modo Certianus hic continus est minor Syria, quam Lotophagum Syriam vocant. haec insula ambitus est m. & oc. sive stadiorum. omnia latitudo oc. Iuxta vniuersique promontorium insulae adherescunt continentem, Certiana Rhodis & Menyngi, magnitudine aequali. Menyngem Lotophagorum terram putant, cuius Nomen memorat, & signa quaedam exarant, & Vlyssis ait, & fructus ipsi. Nam Lotus arbor multa in ea est fructu iustissimo. Hac Strabo.

Delebitur de hanc Lotum Theophrastus lib. ii. c. Genera duas complectens esse referre, fructu differat, qui inagradine Fabe, naturae sita vniuersum more colorum immixta. apud Lotophagos eduntur delicia, sassa, innocua, & ventis salubris: sassa vero qui abique nucleo, ex quo & vinum exprimitur.

Natura autem hae Lotus, eodem auctore, perpetua est. exemplo fatis Loni, de quibus Plinius lib. xvi. cap. xii. m. Roma, inquit, Lotus in Lacina area, anni sui fatis sine magnitudine cocca. x. m. vna admodum, incertam ipsi quanto venator. Ego quidem vniuersum non est dubium, cum ab eo loco Lacina nominetur: haec non propter annum cocca. habet. Aniquos illi est, sed incerta eius aera, quae caput dicitur: quoniam Vestalium virginum capulis ad eam deferunt. Verum aliorum Lotum Valsacali, quod Romulus condidit ex victoria de decuria, quaeque vbi in illis sit, ut auctor est Marcellus.

Grati haec arbor Aegypti: Lotus à Plinio Celnus vocatur: ab illis *Perdia*: à Thalesibus *Aegyptus*. Sont verò & quaedam nemoris herbes in folia complures, de quibus Pempt. quatuor lib. ii. iustissimè scriptum est.

In Aegypto etiam quadam Lotus ex palustris genere, hinc, ut Theophrastus ait, caulis natura similis Filibus videlicet Aegypti: & fructus eodem modo sunt, cum fructus in capite modo quo in Faba: hoc candida liliis foliorum angustia prouincia. radix huius Loni, *aliquis* dicta, rotunda & Mali Cotonei similitudine, coruscet nigro, quae non Castanea cogitur. cuius inuenas candidam elocrament alium gratum cibo. mandatur verò & crudam, sed crudo gratum decoctam.

Lotus autem arbor (ut ad hanc sedat dicitur) non multo adstrictior facultatis est particeps, auctore Galeno, sed & terram partem ac cunctis est.

Ramentorum ligni decoctum sine potum sine infusum dysentericis & fluxione venteribus auxiliatur: cum aliam cohibet, & capillos rufat: & deflares, addit Galenon, colabes. Coquantur autem, eodem auctore, ramenta, inuenit in aqua, inuenit in vino, neminem potuit vna poposcere.

#### De Aardnach. CAT. XXX.

**A**RDOX magna Aardnach est: cuius folia ex pluribus composita, Fraxini, Oxi, aut Scabi referant, sed tamen minus deinde obsterentia, & profundioribus incisione per circumferentiam firmata, colore fuscis virentia: forca quoque angustis foliis stellis in bar radiata, à modo longiore tenui ipse emanante calyce: fructus forma Ziziphorum instat, sed huiusmodi pallidioribus, gessis virentis & amarantur, sapore ingratis, officio inter nucleos, quoniam transivisse licet ad pituitas catarrhas, aliam in sphaerularum loco, non nulli adhibent.

In Italia quorundam monachorum sepe hanc arborem haberi Mantuae referunt: Lobelus Venetus & Noubon frequenter esse ait. Solet verò & olim in elegantissimis Belgii viciis sicut coli.

Nomen autem hinc ab Aucenna Aardnach, aut, ut nonnulli legunt, Aardnach: & nominatur eam, aut, in Rechi arborem Myrobalanorum & in Tabaschen, & Kien, & Thabach. Recentiores autem non parum errant, hanc Sycamorem esse volentes, & non malebitur, qui Lotus arborem affirmant.

Aardach.



At flos huius, a calore America, calida est eodem tertio, & flosus in fine puncto obfuscescentes aperit, ac precipit cerebri. fructus perlati valde nocet, ventriculo adhaerent, ac molleham adfert, perniciosus est, & furialis inest. Aqua foliorum perhorculos emicat, & capillos longiores reddet.

Ferrea & decodum corticem, Fermentum & Myrobalarum additis, confectum austeris febris ex puncta natas. Suavis estromorum foliorum cum melle venena cessat.

Similis & Rhaia habet: Aardach, in calida est & flos: obfuscescentibus que in capite congressa essit: capillos prolongat. Fructus tamen eius valde stomacho nocent, qui & quandoque perniciosus intantum. Maculoles folia huius & lignum manualia etiam nocere tradit: veneno vero aplos, semella quibus Nemo occidit.

QUARTI LIBRI PENTADIS SEXTA

FINIS.

STIR.

# STIRPIVM HISTORIAE PEMPTADIS SEXTAE

LIBER QVINTVS,  
ET VLTIMVS.

DE PERPETVA FRONDE VIRENTIBVS,  
ET CONFERTIS, ET RESINIFERIS.

## PREFATIO.



**L**AM ad opera nostra accipienda et faciem proferamus, solimanq; non modo solum *Fraxinella*, sed et totam stirpem hirsutis labrum aggradamur, quae non paucas comprehenduntur perpetua virentes fronde; inter quas *Conifera* et *Resinifera* occurrunt. De quibus pro opera nostro instituta deorsum agendum.

Multiplicatur autem à *Laurus* semper frondente in varietis fructu, atque eadem quaeque coronaria. Opera sine simplici, veluti et coronaria feliciter peracta parum debetur. Non quidem casus absolute eadem, sed pro eiusdem conditione differentes. *Medica* operi nulla aptior, quàm ex *Lauri conferti* portis. *Apollinis* liquidem hoc sacrosancti dedicata quaeque et aduocata. *Aspasia* autem non venerationis iactantia, sed et Medicinae iurens se mouetur celebratur; atque vinctur sacrum herbarum et subicilla potentia fertur. Operum illud ad opera huius faciem *Laurus* altitum praebet.

### De Lauris.

### CAPV I.

Laurus.



**L**AURVS non modò medicinis et boquis altitudinem assequitur: namque pluribus lauribus, cornos virentibus, folia ei oblonga, lata, dura, colore virentia, immoolemnia, sapore nonnulli amaranthina. Flores herbacei: coloris secundum ramulos ac folia excent. baccae suae fructu rotundis longioris, coriace integramente rugicante, atrocris haurum piceus in duas partes dividitur, veluti *Perispermata* et *Amorpha*, aliorumq; colore è ruffo subnigricans, odoratus, sapore cum angua acrimonia nonnulli amaranthina.

Huius verò et altera speciei fructuosa magis existit, à radicibus germana plura emittens, quae tamen in altitudinem tantamque procer non attingit, et cornibus immolemnia rubet: folia virentia etiam remotione ac minus dura habet. Laurus procer non attingit.

Trunc autem has Lauris *Droscoides* hauri ignoscunt. Quaedam enim venustissima esse virentiam verò *stauris* hauri hauri solentem esse virentiam potuit agere, ad est duricem, quod magis consentit.

Nascitur *Laurus* in Hispania, Italia, atque calidioribus regionibus: Solo apud Belgas hauri hauri in solibus melius proficit, virentia in Zelandiae insula. alio cura oper, et hauri à frigore acceri debet.

Vere noua germina, atque virentia solentem profertur baccas sub *stauris* hauri hauri. Virent arbor perpetua.

Græca hauri *Δάφνη* dicitur *Laurus*: Italia *Laurus*: Germania *Eselberran*: Belgia *Laurus* hauri *Galla* *Laurier*: Hispania *Lauris*, *Laurer*, *Bay*, *Laurier*: Anglia *Laurel* vel *Baytree*: Bohemia *Eselb.*

Fructus *Græca* *Δάφνη*: Latine *Lauri* baccæ: Germania *Eselberran*: Belgia *Baccas*: Hispania *Fayes*.



A *Jalpa* Lidenis filio quam *Apollo* adimonit nomen habere à *Poëta* fictum.

At *Lauri* bacce & folia, ut *Galenus* ait, piceas & cacillatius vehetiores: plus tamen fructus quam folia.

Cortex munitior & calidus est, sed magis amarus habet verò & adstrictiora nomina.

*Lauri* bacca cum melle aut passo in tegramate possunt, *Diosc.* ait, adstrictis plurimum, orthopneum, & omnes circa thoracem delusiones sine circumstantiis: contra scorbutum ista ex vino bibuntur: vulgares sine alioquò expurgant expressum verò haurum arum doloribus & acribus gravitatibus curant, cum vino vitæ & tolicto alio nihil horum inficitur verò & istud accipit, & colligantibus: distentionibus vegetiora.

Nostra utra bacconum ad putredinem aut peioris morbos vitatur, sed ad ventriculi, secundum, hauri, ac vesicæ affectus hauri calidior refrigerant: ventriculum conciliant: concoctionem crudorum humorum promouent: languentem appetentiam excitant: cibis fastidiis pellunt: vomitus ac hauri obstruções aperiant: vana crura turgescunt, & ad reconditum expulsiorem faciunt.

Oleum verò ex his expressum aut decoctione elicitarum, & hauri aque similes estis fructuatis erit: curat: casis atque ab alto delapsis: quoque illud in prodest: siccissimum tollit & lingua nem concutit, & humores roca dolentem locum digere ac dulcant.

Folia, *Diosc.* ait, in balneo aut infuso viti ac vesicæ viti conueniunt: viti folia plurimè adstringunt: viti verò ac imposita vesperum ac apum ichibus modum cum polterga aperi & parte inflammationem cum omnia mitigat, mitigare verò & stomachum cum pota assumpit, sed vaporem exere.

Conspicitur verò *Lauri* folia à recentioribus non raro cum pannullis cibariis, praesertim piscibus: viti in viti nulla munitur, sed cibis istis conditus saporem, ac ventriculo gratior reddunt. Radix cortex, auctore *Galeno*, catulcos constringit, & vomiti prodest, viti oboleum pondere ex viti odorato potus: quod & *Dioscorides* habet, qui & addit, fictum viti necesse.

De *Tamo*, sive *Lauri* sylvestris.

CAP. II.

*Tamo*, *Lauri* sylvestris.



**T**AMUS Lauri minor ac humidior est: ramula oblonga, arcuata, in alia distilla folia hauri, lanibus, munitibus, *Lauri* gemulis odore delictis, non alterioribus dispositis, sed e singulis artubus sine oppositis: foliolum in viti bellis paruis adramale viti ex amano alio, foris subinde comitibus perpendiculis: hauri viti *Myrti*, sed longioribus, ac carulis elegantissimis coloris.

Peregrina hauri stirpa Belgio est: in paucissimorum hauri chin concipit. Inque *Hispaniæ* agri, cum & aliarum regionum hauri feraces existant: pro quorum distentione sive de natura sua rationem quoque nouissimum accipit.

Vires *Tami* perpetua, & frequentis viti eodemque tempore cum flore & maturi bacca conspici potest.

*Tamo* hauri nomen est, dicitur & *Lauri* sylvestris, sive *Jalpa* *spica*: à *Cato* *Lauri* *sylvestris*: *Itali* *Lauri* *sylvestris*: ab *Hispanis* *Fus de terre* ab alio *Pasale* à nouissimo *Duro*.

Occurrit hauri apud *Pliniam* nouissimum lib. x. v. cap. x. x. his verbis: *Tamo*, hauri *sylvestris* *Lauri* aliqui nouissimum, nouissimum in genere arboreum. Describit coloris esse munit: carulis bacca.

De viti viti hauri nihil vel *Pliniam*, vel viti viti alio quodquam habet.

Rhododendron.



**A**RBORÆSCENS sive Rhododendron est, L. vni effigie spectabilis: folia eius oblonga, mucosæ laterisq. quàm Antypodæ, crassissimè durasq. flores elegantissimi, ruberæque coloris speciem exhibent; quibus perennibus siliquis succedunt digitis longioribus, virentes, in quibus semina lamis fœcculatis implectunt, quæ & vntro sicuti pappi abstrahunt: radix longa, polia, & lignosa.

Nascentur, inquit Dioscorides, in *Asiâ*, id est, in ceteris vniuersis, maritimis, & locis fluminibus. In Italia quibusdam huiusmodi locis reperitur.

Iuno mensis flores producit: siliques siccis perficiuntur.

Apud Græcos Νέσκη Νικανδου Νεοίε Latinè similiter Nelson: Item & *Indiâ*, Rhododendron, & *Indiâ*, Rhododaphne, id est, Rosa arbor, & Rosa Lauri: à consuetudine verb., vt ante ipsius vocis, *arboris*, *arboris* in Officinis Græcorum Itali *oleandri*: Hispanis *Adelfa*, *Ricorda*, & *Aleandro*: Gallicis *Asagios*.

Notion autem sine Rhododendron foris impositam digerenda vni, vt Galenus ait, obtinet: ac si intra corpus affusata, periculosæ ac venenosa, non tantum hœmorrhæ, sed plerumque etiam periculis.

Vni habent, Dioscorides scribit, flores & folia cæcibus, sinus, multa, & plurimum alia quædrupedibus armaribus, cruciatibus ac lethali: hœmorrhæ verb. ex vno pota, sunt contra serpentium morsus periculosa, ac magis adicta Reta. Imbecillæ amarantæ, in oculis & capite, si aquam bibant in qua folia maduerint, moriuntur.

**I**NTER Iuniperis vni minor: alia maior pergrina. Est verb. huiusmodi quidam florem edens, non tamen fructificans alia fructum gignens florem haud adferens.

Minor Iuniperis lignosus est frutex, frequenterbus alis ramosis: cortice membranaceo spontè duram pente matrem ligni fistos, & vni accendens odore foetida habet angusta, acerrime pungentia, spina videri magis quàm folia reserpta, non tamen admodum duræ: baccæ eius, quæ fructum ferit, vno virens, per maturitatem nigra, legitur Faber, (in Græco perperis *επιπέρο* pro *ειπέρο* legitur) ac Ochsi, id est, in Italia magnitudine, radiceq. hinc inde pergrina, quædam tamen ab eis descendunt.

Iuniperis maior ad Capicelli alitissimum subinde excreuit: folia maiora ac densioribus quoque grandiora, ad Aucline vni quantitate accedente, & ferè in Italia Galie, Bellonio auctore. Lachrymam hanc fundit liquidam æstiu mensibus, quæ caloris officio in partem coit.

Minor Iuniperis passim in vniuersa Germania, Galia, & alijs signatur in incolis, *desertis*, *apertis*, *montibus*: nec ad plura de ferè dicit, & frequenter humilis, & fibris in ediculis varijs hinc sese diffusenda, quandoque tamen vni quæ arboris stipes se aruollit, præsertim in vni accedente aut in colliis regionibus.

In Turo monte Bellonio maiorem gignit resere: Alcaeus Angustiam in vni strata magna Ligustici & Adriatici, & in Hyrcano Iuniperum magnas baccas ferentem vni in Galie quosdam Prouincia reperiri scribunt. A Iuniperis maioribusque locis plerumque nascitur, vt inter cetera Dioscorides.

Vni quæ Iuniperis perperis fronde viret, nec frigida horret: fructum tantum possidet, sed sine humorem, singula castanæ sinus nouos promit, quo sit vt nunquam absque fructu sit, & accen-

*Desertis  
apertis  
montibus*

accen-

Lampyrus.



Lampyrus fructus vocat remesijus, Galeno antidote, et apud medicos. affertur Lampyrus hinc athenis medicis, caposque calefacit: alii excrem crum nec nocent, nec propellit venas eius. Posunt hunc, Dioscorides ad vicia cholera, ruissa, infusions, tormena, & venena prodelle comulsi, ripes, & vultus strangulans vultu conferre sciant.

Adversus autem veterem tussim, & difficultatem illam, qua subinde pectus excrucietur, & per quam cruda, lena, viscoli, sanguis vni quandoque permixto excrucietur, decoctum huius plantam valere demonstratum est.

Nosmelli in Bohemiam aquam, in qua fructus isti macerati, aliteris potu loco affertant, qui admodum salubres videntur. Veliter autem hoc adversus febres pestilentes & venena bibunt, respirantem haud ingratum. Superfunditur non semel tandem aqua, sed prope sitit exhausta, iterum vasibulum novus adimpletur.

Potissimum ac lignisaccosum su fitta serpentes figuntur: & si que est maligna atrisquibus, hoc emendatur. Saccum solentem ex vasa illius & bibi, adversus vaporem mortis prodelle.

Comicos eremacoricis cum aqua diluit, lepras eximit.

Ramenta ligni assumpta perniciosi esse, vulgaria Diocoridis exemplaria habent: sed quendam vna nequaquam nec ququam veterum hoc affert.

Vernis delibenter de capite pituitosus huiusmodi su fitta reprimat. affertur plura potaque ventriculo ac quicquid crudos potantissimisque in harenitis harenos concocquit: lambricos & ventris cinqui nocet: mensuram profluita & harnochosid est: comendatur et ad sanguinis pationem, si mossa videri in profusa miltice ac carne reperitur: oleo rosato permixta manuum & pedum tinas facit.

Fit ex hac rum oleo cum semine Lini temperata, liquida Vernis, cuius vna ad tabulas digestis illustrandas, cum omni ad seminem, & à tubigine defensionem, vult.

De Corymbis, seu Cedris murem. C. A. P. V.

**I**N STIRACE similia Oxycodrus, que & murem Cedrus dicitur, ad differentiam videtur magna, proceris, & consensu arboris Cedrelates, de qua postea. Huius vero & diver-

gentia,

Oxycedrus Phoenicia.

Oxycedrus Lycia.



acris, Theophrasto ac Plinio antheobus a Lycia videlicet & Phoenicia.

Phoenicia Cedrus, quæ & Oxycedrus, caudice ramisque tortuosis ac nodosis, in altis compluribus diffusis, luteo perfoliis apparet. ligni materies rubet, & ut Cupressi odorem: folia angusta & acuminata, luteo perfoliis densa, acutiora, magisque pungentia, ac circa cauliculos ramosi fructus Avellane subinde raris magnitudine, aut, ut Theophrastus, Myrsin bacca- rum, per maritimum sulcus aut subæquos, odoratus, gustusque aded fructus, ut & rubri- subinde albedo parte hæc vel antea.

Exardit species ex luto caudice, in calida regionibus, gemmi duram & perspicuum, Massili simile, quod tamen non ut hæc in mandendo lentum coalescit, sed fragile in tenuissimas facile resoluitur partes.

Altera humilis Cedrus Lycia, prius altitudinem hæc affequitur caudice vero fistuliter tortuoso, brachy caudice, plus multo composito comitæ rubro, cæcis sulcis, in terra ru- bentur. folia frequenter, tamen læperi amola, sed tamen passim breviora, tunc vero aut quarto anno crassiora, & tenui figura, ad Cupressi vel aliorum Salicis accedunt, ressa vi- delicet & minime pungentia, quæ adque circa odorem spirant perperam. Ita vna caudicis & fructus odoratus & pungentia, superius vero crassa & tenuis promi folia ut à doctis. Clau- sio deligentissime observatam. fructus autem huius totius baccarum luteo perfoliis, colore per maritimum latus, ad ruborem inclinatæ gustu si baccarum, cæcis odoratis.

Vnaq; huiusmodi Cedrus Germanis non modò inveniunt, sed & superius peregrina. Amant tamen, ut Theophrastus ait, fructu & frigidis nasci.

Phoenicia Oxycedrus in Italia, Hispania, ac Asia quibusdam locis, & aliis cæcis præcipue & maior est. Quæ tamen in Gargano Apuliae montes multò altis cæcis altior, præcipue ac amplior est, baccisq; profert maiores, quæcum Poenicam magno rursus aquarum ac dulcorum ut diligenti sumus scriptor Bellonius refert. C. Clausius Oxycedrum & luteo perfoliis tunc magnitudine in nonnullis Hispania locis se observasse tradit, ut ad hermas crassitudinem caudicis eorum accedat.

Lycia in Gallia Provincia hanc procul Massilia reperitur, & in magna Græcia parte in Hlyco ac Episo gignitur.

Perpetuò vitæ vitæ est, & hyberna quoque incassibus fructu amara grande, vitæ semper præcipua, vitæ novam & sapientem. Vitæ nova germina, radice utraque fructu am præcipua. Autumnis novam novam a novo arbor, velum semper hanc, affluantem.

Mirror ac humilis Cedi appellatur, ad differentiam Cederis præcipua Cederum.

1. Prior O'phioderac ad g'entem, Oxycedrus, sive acuta Cedrus, & Cedrus Parca: à Phoenice verò Phoenicia cognominatur, à Phoenice coloris fructu. Hanc Hispania dicitur quoque, Clusio teste, appellari, eodem videlicet quo lampyrum nomine, in quo & vitæ novam fructu incassibus videtur, quo lampyrum & Cedrum nominibus nominè distinguant, sed ambo, ut Theophrastus ait, Cedrus vocatur, Cedrus tamen cum in additione O'phioderac nomen habet.
2. Altera ut in solo Aëne ad g'entem Theophrasto. Plinio similiter Lycæ Cedrus dicitur in Gallia Provincia. Mercurius hanc novam Sabrum appellat, ac pro Sabra, quæ cæcis, vitæ, velum Pharmacopœi Epidauri, & in pluribus Græcia caustibus, tam & in Hispania & Epiri: Bellonio teste. Sunt verò qui & Sion sine Thyson esse existant, sed Thyson, sicut Theophrasto, non modò caudex, folia, & rami, sed & fructu Capreoli similis est: hanc verò fructu Capreoli galbuli non convenit.

Cedrus.

Cedrus fructu ad g'entem Theophrasto appellatur. Est tamen, ac ipso teste, Cedrus (Græce Cedrus) ex genere de arboribus sine fructu, parum quoddam, quod nunquam arboribus.

Gummi autem sine Lachryma, quæ ab Oxycedro profluit, Verris quoque dicitur, ac multo dicitur.

Ceterum Cedrus in or, autem Galeno, calidior sita temperata, & terro quoddam modo fecundam utramque cedrus. Marcorum verò cur velum lampyr odorata, & ad infirmitatem vni cum folio vitæ.

Cedrus, ad g'entem, hanc fructu humilis Cedrus, modestior vitæ, eodem teste, habens, & vi & comodi queant. Si liberidus tamen quis ut vitæ, capin dolorem arboribus, & arboribus ac incassibus in venenulo dicitur. Est autem inter Cedrus differentia, nam Phoenice Cedrus non solum calidior ac terrefacta, vitæ dulcior, gustatque fructu, ad edendum idcirco vitæ, aliam verò capin & nonnulli esse vitæ. Lycæ verò fructu, calidior & densior etiam quam lampyr, à quibus ac nonnulli possunt in differentia: hanc enim cur nonnulli adferant, ac cur nonnulli qui præcipua ipsa vitæ, hominem modicam: & capin dolorem arboribus.

Sabra.

De Sabra. CAP. VI.

**S**ABRA dulcis est germina, via solo Tyarsoci similitudo: sicut Capreoli referunt.

Prior humilis est ac brevis arbustula, in latitudinem frequenter sicut diffusens ac explicans, antroctis cocta vitæ: sicut Myrica] Græcum exemplor perpetuum asserunt] sed dicitur, & dicitur hanc fructu, quia odore, acum feracior, gustu fructu, totum dicitur hanc, nigricans, lampyrum similis.

Alter Sabra arbor est præcipua, ut Bellonius ait, Amygdali altitudinem patens, & ad Capreoli tanquam similitudinem multum accedens: caudex siccior, crassa, & rami quandoque amplius, ut hominis vitæ comprehendere nequeat, ligni materia vitæ lampyr & Oxycedri interius habet. cortex hanc valde crassa, rufus, folia elegantissimo vitæ, Capreoli similitudo, frequenter tamen, lepore arbor, aroma olei, & resinæ quoddam præcipua: fructu multum vitæ, ut in Piceæ & Taxo quibus hanc frequenter, admodum nonnulli Cedrus similes, quæ vitæ vitæ: incassibus verò conloquitur: & cyanis sicut nigricans.

Eradic.



Sabina alba.

Sabina alba et alba icon.



Et radice hanc rufina quandoque fuit, quæ concreta Venæ similes, & in mandendo quoque spabilia est.

In montibus ac sylvis, atque perinde incolis vnaque pignora, veluti in Creta, Mylia, & alibi, P. Bellonius vnaque in Teur, Amara, & Olympi montium excellis à se reperit memorie prodida.

Pærorum vnaque Germaniæ, & Galliarum hœtis frequenter culta reperitur Scabris hæc ferunt & furcula. Deligenda fœculis modico inter humido ac umbrato loco, donec radices egerint: fructus ab hœtibus in laras declinare, rari naturam remanere. Quæ verò ex ferone laræ est Sabina rufina affertur tempore progesta hæc firmata profert illa vt plantam in laris permanet.

Vitæ perpetua vtraque: scabris suis grana alba frequenter hyeme reperitur, semper siquidem fructus arbor hinc infidet, perueniam quàm venetas perficiuntur, nota superueniunt.

Græcis Ἀγέδω aut Ἀγέδω, vel, vt nonnulli legunt, Ἀγέδω dicitur Latinis Sabina: Ἀγέδω verò & Ἀγέδω vocibus sparis. Prior vulgè in officinis Pharmaco-pærorum cognita Saming nomine: à nomolliis Saminga: Itali & Hispani Latinam appellat omnem firmam Germanis Sabinarum: Belgis Sabinarum: Gallis Sabinarum: Bohemis Sabinarum.

Alcæus Capreolum Creticam quendam, inquit Pharus, dicitur. Idem lib. xii. cap. xvii. 2. Dicit arborem meminit, hanc aliam Sabina esse fere qui opinatur, & manifestè vocat. Illas pro Ἀγέδω, Bruca legi. Describitur siquidem à Pharo lib. xii. cap. xvii. Capreolo similes hæc quidem verba: Potius in Elmaso arborem Bruca, Capreolo tu se similem, exaltatæ carib, acurdi odore accensam, & cum conspectu hœtoris Claudij Celsi prædicatam. Folium est pergone potius in Partibus tradit. Odorem esse proximum Cedro, fatumque cum contra alia ligna remedia. Nascitur vltra Pælogon in fœrbis oppidi Setae, monte Zagro Hæc ille.

Elmasi autem in Afsyriorum regione post Sagrum montem supra Babylonis Straboni describitur, hæc procul à Syria Persico Prolemano. Describit autem fœræ Bruca esse Sabina albam affirmare, cum terra loci distantia hand dubitè differentiam adferre queat

ac non nullis paucis ac breuiter descripta sit. Plus similitudinis cum Sabina Thyā habere videtur à Theophrasto descripta: sed tamen cum Thyā fructu Copulifera rebus, non Cedrus, immo quoque manifestum Sabinae alteram non esse Thyā. Non esse quoque hanc Vitā, à recentioribus appellatam, arborem, ex subiectis quibus eadem fiet, ac indubitanter relinquerem.

Sabina autem non seditiue sive exaltationem, non debilitantem, ac ex nimium eorum, que vel maxime tenuiter sunt parum, ut Galenus ait.

Sabina cum vino decocta, aut epota, sanguinem per vias ducit, in tribus suppressis etiam potestate prouocat: secundas post partum vel istis eorum: factam motum in expletis, nec et vino. Eodem sabinæ appositæ vel infusa posse exstimatur.

Plurimum acule ac vino saporati regio morbo meden: scriptam relinquit. Rarum sunt vitæ veritatis in pene exuberantes, has tollit Sabinae ex aqua decoctam, si eo forentem, infuso deinde puluere.

De Cupressu.

Cupressus.



CAP. VII.

Cupressi ramus cum fructu.



**P**ROCERA arbor Cupressus est, caudice longo surrecto, fastigio acuminato: ramis conplanatis in orbem cingitur, qui non in amplius diem diffunditur, sed secundum caudicem assurgunt, cacumen tamen non attingentes, eorum fastidium effingunt. ligni materia dura, solida, compacta, odorata, ac sibiata, ferè veluti Sarcotorum inuoluta, sed paulo dilutione colore, nec cinerea nec veratiliscentia, nec fissuram sponte capit. Folia oblonga, arena, veluti Tamariu, sed carnosiora. Fructus ad ramulos dependent Larigis considerè similes, sed tamen molliores ac compatiore, qui per maturitatem spontè in immo fissuram, semenque deinde delabunt, ac vento impellente exarantur, paruum, plerumque, præterea, obfides colons, quod semen granum, ciboque ab ipsis exspantur.

Huius generis duo nonnulli statum: tenuem ac marem. Sustinam quidem sterilem marem verò fecundam. Theophrastus ex semina marem procreare, nonnulli asserunt referit. Fundit autem Cupressus liquidam quandam resinam, Larigae quæ sitis hinc, sed sapore acutum.

Loca feruata, inquit Theophrastus, Cupressum habent, ut Creta, Lycia, Rhodus in Cyrenis ipsa etiam procreant. In Creta autem montibus Idari, Leucisq; ad est, albus vocatur, super Iarima quorundam nunc nomenq; deest, etiam repenni affirmatur. Bellonius nequit in agrestium montium mucron, sed circa radices in radicibus & sepe totius montium Adnagoridum latet, nunc verbò Gallia ac Germania: inferiores. Nullo pacto nec firmam nec aquam concipiat, ut non dicitur si non velle copiose adhaerent. Cetero in locis firmis ne vix, in Creta verbò etiam *ἄρι τὸ μαγνὸν*, id est, ex ramulis.

Semper vixt ipsa arbor: fructus ter vno anno colligi possunt: Ianuario, Maio, ac Septembri mensibus, idcirco & Trifera appellatur.

Κουμαραία, vel μαυρογάρυ Γαρεία Latine Cupressifera Officina: Cypressia: Italis *Cipressi*: Gallis ac Hispanis *Ciprésis*: Germanis *Cypressibäum*: Belgis *Cypresse boom*.

Fructus *σπείρας* *πυραμυδίου* Latine *Pisulae Cupressi*, Noces *Cupressiferae* Galbula dicuntur Officina: Noces *Cypressiferae* appellantur. Dui olim haec sicut haberi solent, & ferulis dicitur, ex quo medietate videretur infusilla.

Cupressi autem sola germana, & recentis galbuli, resicandi vix habent & vix adstringendi, ubique visigra tamen acrimonia aut caliditate: tantatantum & caliditas cui ad est, quantum licet sic deducenda in alium adstringentem & acerbum, ut Galenus auctor. Magna vixit in darts corporibus conglutinant in alio larente in facidis asphaltes humiliter in nouis ita q; de sp. alia aut aque abstant. Ad proococulis hoc modo possunt, partes aliquas praeparate ita resicant, deinde ipsi vobis addunt. Quisdam etiam ad arboribus & herperis potente permittentes has vixunt.

Pisulae tunc ex vno, auctore Dioscoro de in dystracta, alia fluore, & si resicantur, commo diffinit bibentur. Eisdem, decodum harum & viscerum praedictae efficitur.

Folia sufficit caliditate obigere feruntur: atque idem posse pisula. Ligni ramoria vestra emittuntur pila à cinis ac cunctis. Resilia vixunt, vermiculos, & teredines quoque necat.

*De Thya, sive Cupressi sphaerici ex Theophrasto & alio.*

#### CAPIT. VIII.

**THYA**, auctore Theophrasto, proceras ac perpetuas vixens est arbor, Cupressifera ad formam similes, ut & ramis, caudice, foliis, & fructu ipsam referat, ac poris hylotessin quendam Cupressifera materiam ligni solida, odorata veluti Cedri, quae non consumitur, radice hylotessin in spum, praedicta opera vixunt ex hac consistuntur.

Praecipua autem haec est in uita Ammonii delibeam, & in reliqua Cyrenis regionis parte enascitur: monachum eorum hylotessin locisq; argemibus. Cupressifera verbò quendam hylotessin in Creta quoque repenni Bellonius refert, quae non ad altum Cupressifera striditatem excrestat, nec mentis modo salignata stridit, sed hylotessin flato conuota parulam conuicta in latitudine diffundat. caudice verbò & crasso eam esse affirmat. Sicut haec Thya, de qua Theophrastus & Plinius, expendendam reliquimus.

Serena autem Thya est, & tardissime gemmarum.

Graeci *Θεία* sive *Θεία* & *Θεία*: Descit ab his *Θεία* non stirpis nomen, sed montis, in quo resandis teruntur. Noca (inquit Plinius lib. x. cap. xv.) Homero Thya: Hanc igitur mecerodorum tradit in deliciis Circa, quam Deum volebat intelligi, magno errore committit, qui odorata (vixit tota omnia) in eo vocabulo accipione, cum praeterea eodem verbò Cedrum & Thyam (Laricem perpetuam exemplaria) vixit ad: in quo manifestum de arboribus tantum loquitur.

Estas versus Odyssias quinto, vbi Mercurium inducit Iouis mandato Calypso amicum petiisse, & Thyae Cedriq; consularum arborum odorem longè praesensisse: ut enim

— *ἄρι τὸ ἴψα*

*ἀίψα τ' ἄρι τὸ Θεία τ' ἀρίστην ἀίψα*

— *Ex longinq; odoros*

*Cedri & incensa Thya incisa in saltem aliam.*

Theophrastus magnam haec arbori honorem tribuit, memoratis ex ea referentis templorum vocem conuictiones, quondamq; immortalitatem materiam in totis, contra vixit omnia inuicta.

*De arbori Fita dicitur. CAP. IX.*

**QVÆ** arboris Vitis nomen accepit, in altitudinem excretaesse posse fertur caudice asurgit lignoso, duro, & nodoso, cortice è rubro nigricante conuictis. ramulis ab hoc





## HISTORIA

struuntque complures altera figurantur, à quibus nullus alij iniquiores aliam usque expositam videri essent, si non ad foliorum exortum reflexerantur, & ad idem apparet, veluti si per alio compressi fuerit. Folia autem Cupressi quodammodo reflexa sunt, sed tamen planiora, & supra autem folia, veluti compressa rucantibus consistunt. Flores hinc exortum rucantibus, exigui, ac filillos exortentur, subsequente omnia perquam exopto, nobiles florentibus rucantibus magnitudine à tenuibus figurantibus passio, quo debilitate pallores quodam lenius exortantur exigui.

Odoratus totum fructus est, & caritabilis, periculis odoratur: folia gustata amantur, quorum odor caritabilis ita digna adhaeret, ut difficit ab aliis quare. Spiritus autem hunc odorem non modò viciat rucantibus ac folia, sed & rucantibus ac rucantibus dicitur eundem viciat.

Ex peregrino orbe, Gallie parvitate aduerti est fada, tempore Francisci primi Regis Francie, & in hortos Regis Fontenablan, ex Canada Septentrionali America provincia illarum, unde ad complura Gallie, & non pauca Belgij peruenit loca rucantibus in terram depactio tenent: radices facillime hanc arboris concepti.

Hyemis ac frigoris potens est, amissio tamen hyberna mensibus elegantior viciat, solutur, multaque subingrant, quae Vere veluti reduntur: iteum viciat ac primum autem non primum, ut non tenent. Arbores Vitae dicitur viciat.

Nossumant siquidem hanc rucantibus Arbores vitae, necque aliud exploratum habentibus eius vocabulum. Thyam Theophrasti aut Plinij Bucam esse alioquin non fuerit facile. Natus obis, noua iteum habenda est.

Caldi autem ac sicca temperamento & folia & rucantibus est, non modò amantibus spiritus, sed & odor abardè viciatibus docent.

## De Taxo. CAP. X.

**T**A X U S longa ac proceri arbor est, caudice medioens crassitudine recto, & circa ventrem ramoso, reliqua parte crude, qui ceteris conice congruat ex albedine, sicibus, ac timoso, & interiore materia ligna rucantibus: nam in latera effunduntur, in complures virgulas ac alas distibunt, quae folia viciatibus frequenter multasque dense circumscriptae sunt, in his rucantibus Piceae, quae Romanis coronarij hanc distibuntur, sed tenent, & in viciatibus rucantibus, non edoceri. Flores hinc ab infertore viciatibus parte secundum folia, cum & circa cacumina frequenter dependunt, ex luteo herbacea, hanc succedentes rucantibus ac rucantibus sunt, concavo quodam exiguo si peruenit apparet, veluti in nigra Vacciniis, quibus & forma & magnitudine parum respondeat.

Provenit in plumbis regionibus Taxus apud Graecos in Macedonia & Aetolia in Italia quibusdam costallibus: in Narbonensi Gallia: in Arduenna Belgij Sylva, tum & plerisque aliis, ubi rara est, loca gaudet autem viciatibus.

Mareo aut Aprilis floribus exort, noua Germanibus mox succedentibus: Autumno mature bacca ex arboris decidunt.

Arbor haec Graecè à Dioscoride *επιδαμν* nominatur, à Theophrasto *πίταξ* sed à Nicandro in Alexipharmacis *επιδαμν* Galenus verbè etiam *αξίξ* vocat: Latine Taxus est: Germanis *Opentanne* Belgij *Taxus*: Italo *Taxo*: Hispani *Taxo*, & Taxo: Gallis *Tf*: Bohemis *ξίξ*. In Officinis indoceri, si quae ad hoc refert, Tamandusa, quae olim in viciatibus conuicta, pro Tamandusa conuicta medicamentis non abique primum viciatibus admittuntur.

Venenosa, inquit Galenus, facilius arbor est. Dioscorides tam presentis Narbonis Taxum

Taxus.



Pinus.



Taxum esse venam siliatam, videntiam sub umbra eius equiclocatae aut dormientes offenduntur, & quandoque morantur. In Belgio minus perniciosa est, & vites periculo caret. Theophrastus *Asperge animalia*, Iuremna venter Gaza, more aut si sola comeduntur: sed *Asperge* form, ad est, nam manna non effundit: fustibusque verò & alijs quibus hominibus modo, fustibusque est ac venosus. Nicander in *Almagharmata* Taxam inter venositas *Asperge* quoque verò, asperge simul vmedo: & quidem has vites: Insuperce Iosine Gomez.

*Pinus venosata Taxa, qua fertur in Italia*  
*Aspergebus simile, lethali, absens acerbis,*  
*Et praeferat marem plura creatura nociva*  
*Fundere vites partes, cum primum fuerit eger*  
*Aspergebus fractus foveat, animamq. candem.*

De Pinis. CAP. XI.

Pinus duplex est Theophrasto auctor: una *Asperge*, cuius sive manifesta: altera *Asperge*, siliatam. Maccedones verò & ceterum *Asperge* de, *Asperge* sine siliatam, nobis incognitam.

Manifesta Pinus procerior & crasso caudice in altum tollitur: inferiorem quidem parce modo, sed superiorem admodum ramosa. Folia ferè equantur siliatam modo tenuis, oblonga, dura, ceterumque pungentia ac aculeata, extremis ramulorum parces, comarati vites, pluresque ambrosii, quorum bene ab vna ferè casant tuberculo. Ceterum magna sive ex multa siliatam, dura, lignosa compedita squamis, sub quibus siliatam lignosi perennans, vites parvarum maram, laciniosa includuntur tota, horum vites albedus, dulcis, oblongus, tenuis membrana, facile aperitu dignumque decedens, vites, cuius vites.

In multis Italiae locis, & praesentim in agro Raunenore, & circa Massitum in Narbonensi Gallia, in Hispania, tam & alibi, velon in Orientis provinciis siliatam sua nascitur: colitur verò in hortis ac venditur.

Latius Pinus & Pinus siliatam, vites, aut potius manifesta dicitur: Maccedonibus ac reliquis Graecis vites *Asperge*: sed Arcadibus vites nam quam Maccedones vites *Asperge*, Arcadice vites vites vocant, et Theophrastus vites *Asperge* vites sic *Asperge* Pinus in Arcadia ac circa vites vites perennat. Ex hac autem nominis permutatione accedit vites *Asperge* Pinus in conis repertis, à Dioscoride, Galeno, & Paulo, aliisque vites nomen nomen, quasi vites vites, quos Dioscorides vites esse ait vites vites, qui tamen non aliter quam *Asperge* vites vites, ab Arcadibus vites appellatur. Est verò vites vites, à Pinis multum differens: sed Pinus Arcadice nihil à Pinis differit.

Fructus autem harum vites Graeci dicitur, & Latini vites Corn. est vites vites commune nomen omnium fructuum harum

generum arborum. Nominantur verò de Latine Noces Pinæ à Mænetheo Græcè ἀγυδάκη. Dicitur verò Carybo *μυδά κάρυα*, quæ tamen fructu esse arbore à Theophrasto *μυδά* appellatur. A Romanis castanea. Videtur se ad fructus totos *αγυδάκη* & *αδύρακη* à Galieno vocari, *Κόμης* in octavo libro Hipp. De vitibus autem in mortuæ ætatis Libris cum secundo De alimentorum facultatibus non *αγυδάκη*, sed *μυδά* noces in eo contineri *αγυδάκη* nominari & describi lib. vi. De simplicium medicamentorum facultatibus Comæ, inquit, fructus, quem Coccolam & Strobulum vocant, hos autem *μυδάκη* vocant nominan paulo ante dictum est. Germani Comam *Stybi* habent *Stenappi* nuncupant.

At fructus illos ante tres nucleos, vni habet esse ostioriam & moderatè exallicentem, ut melio quasi fingidi ac calidi consistere videntur: exasperata lenit: rursi veteri & postiori diuturna vitæ auxiliatur, per se, aut cum melle, aliòve eclogmas sumptis: pléthicos ac tuberculosis vitæ est: vincti reponit: corpus alit ac reficit: in rursi ac boni est siccus, multatempore nutrit, non tamen omninò facile concoquitur, adeo bellarius citius adulescent, aut facilius concoquitur.

Prodeli verò & idem nephriticis, ac adulescens vesicæ resolutione, vniatque sedore, acrimosam enim purgat, dolorem sedat, ventrem clementer promouet: super omni & hoc si amem generale, Veneris sicco etiam excitat.

Tota comæ cum Marmalo recentis decodibus, inquit Galenus, si postea addito melio verum coquantur, donec ipsum decodum melio accipiat consistentiam, medicamentum est ad rheumatis pulvisque excretionem conueniens.

Simile & Diocordes habet: integri, aut, ac recentis ab arboribus decerpti, confrahit, & in passo decodit, veteri rursi & tabidam conferunt, si quondam exco liquens tenui cyathis bibantur.

De *Pina sylvestri*, sive *Pinastre*.

CAP. XII.

*Pina sylvestris, sive Pinaster*



*Pina sylvestris altera*



**Sylvestriam** Pinam complura sunt genera, quarum duo à referantur: nascitur *sylvestris montana Pinaster* *αγυδάκη*, sive *Manna Pinæ*.

Picea maritima minor.

Picea maritima major.



Intra montana autem prima, urbana siue *balnea* similis est, sed frequenter humilis, ac  
 1. rarius alta, crassitudine vero haud cedens, cortex eius glaber est: foliis quales Picea urbana,  
 dura, gracilia, acuminata, sed breviora, interque subinde fructus formæ rodiancorum hinc  
 conis vero multò minores, breves ac parvi, resinosi ac odorati, que quamprimum immaturo,  
 debescant, & ex arboribus decidunt.

In sylvis Bohemæ, Silesiæ, Moraviæ, L. ubique, Poloniæ, aliisque Germaniæ, ac etiam Bo-  
 2. ruffiæ, largè provenit, ac in omnibus Septentrionalibus regionibus frigidos tractus amat, &  
 montosis grandæna, imæ, & gelu non reformidat: In Pyrenæis montibus, ac Italian Alps,  
 tam & Gallis Cæcis etiam reperitur.

Altera species altitudine & proceritate minor est, aliisque arbor elegans ac speciosa, foliis  
 3. veluti alacris Pice frequentis, sensu, & acuminata. Cortex Piceo crassitudine ferè æqualis,  
 sed brevior, resinosis quoque & admodum fragilis, maces verbum minores ac ferè triangula-  
 res, ligno maces elegans est & odorata, plene ad tubulos aliaque aperta ex ea conficienda.

In Tridentino agro, ut Matthæus scribit, ac in Rhetinorum montibus, in Comitatu  
 Tyrolenti, ac prope Oenipontem provenit.

Tertiam verdè præter hanc & Monacam idem refert, hæc autem candidè nullo asurgit,  
 4. sed plurimas ramos effundit humi serpentes, duodecim aut quindecim cubitos longa,  
 flexilibus ac obliquatis, & ad oculos vasis raris perquam idoneis, cum hinc quales præter  
 montani, sed odoratos, & pluraciter profertur.

Magna Pinus octoem hominum staturem subinde non excedit: foliis Pice brevis resu-  
 5. su Cois forma oblongo & robustiore, multam resinam profertur. hæc duo sunt species,  
 fructus magnitudine eorum modo differentes.

Gignitur in montibus Italiæ, ac etiam Hispaniæ, tum & in aliis partibus, haud procul  
 à maris locis.

Minorem verdè & quandam hinc genus Carolus Clavius exhibet, hominis staturem  
 6. vix attingentem: foliis minores, & veluti Laricis, sed perperis, Cois parvulo, ac resu-  
 7. cibus parvis.

Pirus sylvestris nana.

Teda

Pirus  
sylvestris  
nana.Huc facit quoque quod apud Virgilium legitur *Sineal. vii.*

*Issa inter medas, fragrantem ferenda Piram  
Lapsura.*

Vix per flagrantem Piram, Tedam Firam intelligendam Servius admovent. Accedit Callis in Epithalamio Iulæ &amp; Matris:

*Firam quæ Tedam.*

Et Prudentius in Hymno centi Paschali:

*Sic Piram piceam fert alimoniam*

Item & Piceas ad similitudinem *males* nomen habens, Latini a Pira quoque appellatam Pirastellam vocant. Quæ si ad omnia *males* ostenduntur *males*, Latini non Piceam, sed Piram dicunt.

1. Pirus autem sylvestris harum species illa Theophrasti esse possit, si conis quoque brevis est, ablongior foret. nam ex sylvestribus vixit *Maia* nominat, in situ longiore autem maritimis fructu rotundiore. At nobis contraria hæc se habent modis. Nam sylvestris maritimæ brevis est conis magnitudo verò longior. Potest verò hæc veritas Macedoniam nasci esse: latet enim sylvestris in vicis maritimæ hanc seminat *Maia* esse. Et maris qui semet conorum et opera difficultatem: seminat verò facilitatem. Conorum autem brevis longior est, maris quoque operibus operum, quam proximæ *Maia* & non esse posse videtur.

Germanis hæc arbor *Jarpham* & vulgo *Jarpham* Galli in *Celtica* *Blas*, *Blas* *Hf.* pirus *Pira*, *Carac*.

2. Altera species Italia, Tridentina, & Asiaticis vulgo *Crodo* & *Crodo* dicitur. A Macedoniam ferma sylvestris nihil differtur apparet, nam tractabilem & ad multa operum vim habet idoneam.

3. Tertia ab insule Mago nuncupatur. hæc non ab ut *Maia* dicitur potest, hæc est, latius in Pira alia nomen ac differre à *Maia* herba.

4. Quarta *Maia* *males* Græcæ. Latini *Maia* ac maxima Pirus nominantur.

Teda autem Latini dicit, *Græca* *Maia* & *Maia* nominantur Germani *Kyph*.

*Pirus* non abique erroris Teda in sui generis arbore esse existimant, ac fixam *Castra* genus dicitur: sicut & non rectè pro *males*, Latine Latine vertit.



autem ostentum, recentiorum nonnulli hac de causa Piceam *virve* *dygias* à Theophrasto innotuisse eandem man. Theophrastus siquidem habet in lib. 10. Mentibus, inquit, sunt Mucedonensis proprix *laiva*, *virve*, *dygias*, &c. postò verò inter eas, licet *staphylina* *dygias* sit, sic semper *staphylina*, *virve*, *dygias*. Sed lib. primo inter *virvas* & *dygias* mediam interponit, *virve* ab *dygias* separans. Interpreti eam *dygias* Aquasolium interpretatus est. Appellatur autem Picea hanc à Germanis *Staphyl* & *antichama* & *Sos* & *Contribana* quondam verò & *staphylis* quod tamen & alio modo non quadrat.

De facultatibus verò vel virtutibus vel fructibus huius arboris, si penitus capere scriptum est. Nam veteres Piceam & Piceis facultates, veluti consimiles, simul desumpterunt. Restat de Resina, de quibus mox sequenti capite agendum.

## De Resina.

## CAP. XVIII.

1. **EX** Piceis, præsertim *staphylina* generibus, liquida, sive balsoda, & odorata Resina prodit, & non tantò quidem spontè, sed ex ramis aut caudice vel truncis copiosius, arboribus in Totam conseruit. Est verò & arida quaedam è cortice rami, vel circa obliquo ramulo, & eodem Piceæ vel Abietis. Iam & cortex eius sine strobilo, & cortex quidam reperitur Resina.

Resina autem omnis Græci *resina* dicitur: Germanis *Harz*: Belgis *Resin*: Italis *Legio*: Hispanis *Resina*.

1. Liquida Resina Græcis *resinè* *dygias* nominatur, & à nonnullis *staphylina*, dicitur, sicut fuisse à Lacedæmonum *dygias*, sine Præmissis: In Calabria verò *Karabasin*: ut Galenus 111. De medicamentis secundum genera scribit: In Officina Resina Pice. Conditio autem quoadque dum negligenter hanc collecta fuerit, ut quodam lignosa aut lapidosa et admodum sit, huiusmodi autem Calicem *dygias* quali confusioneam vocat, quæ liquefacta ac à fordibus expurgata, pura reddat ac frabilia.

Simile accidit & Resinæ alie liquidæ, quæ ubi coalescenda fuerit & coacta, refrigerata dem ac frabilia est, & trahi, non arborumque parit. Talis autem Græcis *staphylina*, Latine *Fructus* dicitur, & non tantò Colophonia sine *staphylina*, Galenus siquidem in lib. De medic. secundum genera 114. sed etiam ab aliis Colophoniam appellari affirmat: Resinam, inquit, omnium succiflora, quam nonnulli fructum, alij Colophoniam nominant. Colophonia autem vocatur, quòd olim à Colophone, ut Dioscorides, dicebatur. hæc præsertim Italia, si non etiam alibi sit: Plinei lib. XIII. cap. 22.

2. Aliqua arida *resina* *dygias* non comparat, præsertim ex Picea sebore, pinguedinis expers, & colescenter ardescit, quæ, ut Galenus vi. De medic. secundum genera, proprie *resina* vocatur. In Asia quæ sit Picea admodum candida Spagas vocatur, Picea ardescit.

3. Tertia *resina* *dygias*, nempe accepta: eadem verò & *resina* *dygias* dicitur Officina hæc incognita est. Prostat tamen in his ve nullis quaedam arida quidem resina, sed ex Piceis, Strobilina, abietinaque confusa permixta, quam *Geryon* nominant: Thumaseo hæc non raro sufficit, à quo tamen multum distat est.

Resina autem omnis desiccet & excolescat, sed non æqualeter omnes est siquidem inter eos differentia. Quæ aciores, excolescunt magis, ut Strobilina, omnium arsiuam calidissima, quæ & acrot. Præsertim phlegma minus ac ro, minus excolescat: In huius & Strobilina medio, Absentia est. Liquida Picea humores citius Latens qualitates & facilius accendit.

Valde sunt resine, Dioscorides ait, ubi sine fructu ad maligna & seorsu præter eam emollientem quam retinet facilitate, eam tractare peritus fuerint ac siccate digerant. tumores idcirco & emolliunt ac discutunt eadem quoque facilitate accepta permixta lassitudinibus medentur.

Liquida resine vnguentis ad accentia veluti solida commendata, commodissime admiscerunt, tum & ad suppurationes, tum & faciliè emolliunt faciunt.

Excipitur verò & Feligna, *dygias* Græci dicitur, ex resina pende ac ex thure, quæ ad *dygias* *dygias*, hoc est, palpebras ornatas conducit, & angulorum oculi erofiones, & colliculorum: cetera moria siquidem resolat.

Conficitur ex hac, inquit Dioscorides, amamentum scriptorium, verum hæc autem non quo fructum, sed quod à Typographis in excudendis libris usurpatur, ex hac feligne, alia nonnullis permixta, paratur.

## De Pice.

## CAP. XX.

- EX** pinguisimis Pice lignis in Totam conseruit, ut ignis Pice claret. Locum oportet esse liquidum, aut da nocte aliqua materia stratum, ne diesque paulò clarior, quem fructus, arborum,

ambunt, in quæ haurit delectat, à quibus deinde & alij canales defluuntur, per quos delatant excipiantur & excepti in valis ac dolia reconduunt. Loco pataro. Teda filia ligna creta congeruntur, deinde raris Absinthii & Picæ ramis plerumque cum potissimum ac tota multa circumspiciatque contemplantur, ac diligenter ac viliatima pateat cæteris, solo in vertice foramine relicto, per quod, & igni emitti queat, & hoc immenso flammæ ac fumo exitus pateat. Accensio igitur Pix dicitur, per eam quidem in quatuor, postea verò spissior.

Liquor hic Græcis *olea* Latine verò Pix dicitur & humidior quidem ac prout delectat à Plinio lib. xv. cap. xi. Cedra: Pix, atque, liquida in Europa & Teo ~~con~~trahitur, navalibus ~~com~~ munitur multoque altior vitas. Lignum eius concisum, semper vindex ignis extra circumdato, foras: prius fador aque modo fiat canale: hoc in Syria Cedrum vocatur, cuius tanta vis est, ut in Aegypto corpora hominum de funde eorum cooperis ferentur. Sequens liquor, crassior iam, Picem fundit. Sed Dioscorides Cedram ex Cedro magna arbore colligit ferbat, & ex Teda Pinis liquorem vi ignis extrahit *vires Syce* nominat. Latine hoc est Pix liquida: Italis *Pice liquida*: Germanis *Witich bary*: Belgis *Com*: Galis *Pice fœdida*: Hispanis *Pice liquida*: in Officiis quibusdam *Kerria*.

Hæc verò cum coquitur, duntaxat efficitur Pix: hæc Græcis *εγγυω*: Latine Arida aut *solidata*. Sic Pix nomen hinc *oxyphorum*, quasi vitata Pix, quæ secundo decoda est: hinc autem quoddam viscosa facta *Beræ* ac nominatur. In Officiis Pix naturalis: Germanis *Wach*: Belgis *Ambræ* Italia *Pice fœda*: Galis *Pice fœde*: Hispanis *Pice fœda*.

Pix autem calcificata quoque ac resicata & haurida siue liquida calidior est: duntaxat verò plus delectare potest, auctore Galieno. Conducit autem liquoris ad resillaram & vix inflammationem, ac ad anginas ferat illas: ad purulentas autem cum resicaco: ad suppuratam inefas cum sale vitæ & imposita cum aquali portione cere siccat vngues asure: phymata dicitur, & vicia, ac uti duntaxat auctore Galieno, farina, & cum pure vno decoda, *zophobis* siue firmas dissolvit: cum sulphure verò ac Picæ corne vel fœditibus, serpentes vicia illa occidit cum thuris manna & ceræ permixta profundas sedas ac pedum rinas occidit.

Dum siue sicca Pix, Malachoc est, duntaxat emollit: per portione: phymata ac phlygeria dissolvit: vicia autem resicat: vulneribus medicamentum costimode permiscetur.

Intæ expectat quod liquida Pix assumpta præsare queat, Dioscorides & Galienus scripserunt quoque reliquit autem Verum hæc asserere certe nobis non fati: nemo siquidem hoc lactico hæc sibi exhibere facili adruferit est.

Colligitur quoque ex Pice Fuligo, quæ, quod ex resina, eadem potest.

## De Abiete.

## CAP. XVI.

**E**XCELSA & admodum proceræ Abies simpliciter est, Pinus autem dicitur sapienter: cuiusdam tenent sedem, in senescentia, crescendo se altitudinem progreditur, naturali constructa persequat ad cacumen usque, circa quod ramos promit, ex eadem cau dicitur parte simul quæritur, ex aduerso ita fita, ut decussim autem, è quibus caudicibus lateribus erunt pentes, nihil ad fastigium usque ordine obferunt: ab his verò ramos & alij carunt, sed hinc naturam modò laterales, alio autem oppositi, qui subinde deorsum nutant, reliquis sursum magis reclinata. Folia ramulis ac eorum propagines nullo modo ne digesta erant dicit, oblonga, reueta, & leuiter uterque, angulosa alio dicitur multò quam Picea, dilato videlicet & quasi alio colore vincta, cum oblonga sint, & longiores quam vltis Conifera, mollioribus compati liquoris, ab extremis virgulis deorsum dependentes, qui nec facili decidunt, sed distillat in arbor hæret: cocca in his exigua, nucleo estis Ceras non maiores, adnata vna parte in orbem, alioquam aut grandiorum mactarum ferè perferunt, matrem ligni albedo est, & ex multo pluri tunica concreta, velut Cepæ bulbis.

Hinc verò & aliam speciem Bellonius in lib. De arboribus coniferis ostendit, cuiusdam non dependens, sed si ramis erectis, quæ legittimè esse Absinthii, & marem dicit posse, quædam. Theophrastus in eadem lib. iii. duas Abietes facit vnam masculinam alteram feminam. Masculi folia acutiora, magisque pungentia, pinaria, & in angulis tendente esse ait, ligna verò materiam duriorem, & forma decoram esse arborum: Feminæ verò materiam candidiorem mollioremque, & ad opera faciliorem.

Abies in montibus alio nascitur: In Germania ac Bohemia sylvas sine frequens, in quibus vna cum Pinastis vicia: pignus verò & in Italia, Gallia, & aliarum regionum montanis descendit verò quindocumque & ad plana.

Ex Absinthii autem cortice lepro de quodam colligitur resina, Latine consistit in a assimilis, sed magis transparen, amaricans & sapore: Cuius vna coram proximè referens, quæ in tuberculis nonnullis comit, non quædam yanthorum, sed nouissimum Absinthii coniferæ



Abies



Abies alba.



ter, ex quibus non nisi voluberrime exsurgunt, spondeæ enim non profunt.

Ferè & usdam se fasam Abies, quæ circa cortices natus, vel ob scissos ramos veterum arborum reperitur, vel etiam sub ipsâ corticeâ.

Abies autem Græcis ἄβις dicitur: apud Græcos insulari tempore vocæ integræ ac incompositæ rebus Germanis τρεῖς ἄβιες & τρεῖς ἄβιες τριῖς τριῖς: Belgis tantum *Wismantoren* hinc *Abies* Hispanis *Abies*.

Gallis prior, cum nuncupæ eorū oblongiores dependunt, *Sapine* altera verò censet fuisse arboris, *de Sapine* *Sapine*: ut quædam Bellouanarum, qui & hanc marem, ut diximus, fecit, & leguminem Abietem: illam verò feminam, & Latine *Sapinum* dicit affirmat.

Sapine.

Sed *Sapinum* non arboris speciem est, sed candidæ *Abies* inferior ac enodulosa, et non modò *Plinius* lib. xvi. cap. xxxix: sed & *Varronius* lib. ii. cap. xi. testatur, qui & *Sapinum* partem nesciam ac durissimam *Fulicem* nominat.

Fulicem.

Liquidam resina, quæ ex nouellâ *Abietis* cortice eximitur, Græcè *ἀβύκη* ἢ *ἀβύκη* vocant Latine *Lachrymâ* *Abietis*, & *Lachrymam* *Abietis*: Officina Germanicè *perperin* *Terebinthina* *Veneris*: Itali *Lagrima* est. Exsiliant nonnulli à *Dioscorido* *Resinâ* *Abietis* oleosam resinam appellari: veram oleosam resina, à *Piceâ* liquida differens hanc est.

Atque *Abietis* resina, *per se* *ἀβύκη* & *Abies* resina esse non capitur, odorata est, tanquam loco non modò cum aliâ fuisse.

Ceterum *Abietis* cortex, *Fences* cortici *fasci* tatem affinitatem obtinet, modiciorum videlicet quàm *Picea*.

Resina verò facilius quàm *Picea*, in hoc nuncupæ quàm *strobilina*, acior autem scilicet quàm *Terebinthina*.

*Lachryma* verò *Abietis* vni *Terebinthina* ac *Laricea* amarior est, in quoque haec dicitur ac siccat, obsterge, aperit, vulnera recentia coagulauerit: tardiora emundant: capitis vulneribus præcipue conducit. Dum dicitur vocis pondere assumpsit, alaura clemeret mouet, ac in intestinis contenta espurgat: tam & calculos & harenulas in vis visus harenas expellit: modicoenter verò & veniam cit. Adherit autem *strobilorum* ex pene huiusmodi *Prælium*, *Gonorrhœa* *Veneris* quæ dicitur, huius visus confecti, si atopos debet contritus

manuina

maximo tempore sumitur: pueris verò etiam esse cum illatione liquore Plantaginis, Le-  
thæe, aut alio copulatis refrigerante, qui acrimoniam & calorem eius remouet.

## De Cedro magna.

Cedrus magna ramulis cum cortice.



## CAP. XVII.

**CEDRUS** due sunt vna maior, Co-  
nifera: altera humilis, hæcque fo-  
rem sempiterna similes: & de hac quæ-  
dam cap. huius libri v. admodum est: nam  
maior describenda.

Est ætatem maior Cedrus magna ad-  
modum & proceræ arbor, non modò  
cæteris resinifera ac condensata ex-  
celsa, sed & reliquis arboribus omnia va-  
sta amplitudine superans. caudex eius  
frequenter admodum crassus est, ut  
quætor hominum vix eum comple-  
cti, acdicit Theophrasto, nequam  
cortex inferens parts, que à terra ad  
primos porrigitur ramos, asperior est:  
reliquis verò lenis ac glabris inter ra-  
mos conspicua. rami ab imo ferè, &  
hæcitate à terra, ad fastigium vique  
exant, postquam altiusque scandendo  
maiores breuiorisque facta, arbore Py-  
ramida formam referente. orbiculatè  
autem in caudicem ambiunt, talisq;  
alterno ordine dispositi sunt, ut per hos  
ad cæcumen vique, veluti per scalas,  
conscendat. Foliis puluis veluti  
Pini, sed breuiora ac minime aculeata,  
cum multò breuiora sunt, & crassiora  
quàm Abietis, mollibus, ad dura squa-  
mas compactis, qui non discorsim pen-  
dunt, sed sursum anctis, in ramos con-  
sistunt, quibus & ad eò pertinet acer he-  
-

rens, ut extra rami particulam auelli nequeant, ut Bellonius scribit. ligni materies durissima,  
nec cinem nec vetustatem ferit: nec odoratum ac subrubrum Dei Opt. Max. templum ex  
Cedro ligno idcirco Salomon Iudaorum Rex Hierosolymis extraxi voluit: & Gentiles  
Deorum suorum simulachra ex hoc finxerunt.

Fuit autem & ex Cedro resina abæque similia, odorata, lente admodò substantia, com-  
mansa siquidem de rebus adeò firmis adhæret, ut ægri auelli queat, que in oleo liquidior  
& alida, in aqua que Solis diuulsa & arida sit: vi vero ignis, & ex hac Pix excogitur, cui  
Cedrus nomen, & quædam propolis.

In nouis montibus Cedri nãscuntur, veluti in Syria Libano, in quo ad hoc nomen usas ex-  
tere Bellonius refert, Salomonis, ut creditur, manu litas: tum & in Taurus ac Armeno mon-  
tibus reperitur. frigida & fœcis grauent, Cedrum, inquit Theophrastus, Syria gignit, cuiq;  
ad orientem vultur, qui Syriam ac Phœnicem incolunt, qui Pino carent.

Perpetua coma, ut cæteris consuevit, inter humido ac Austriano cæli flatu Cedri materies,  
inque ex hac flauis aliisque opes sudare & humorum emittere videntur: veluti & omnes  
quibus oleosis est succis auclat Theophrastus.

Proceram autem ac vastè magnitudinis arborescẽ hanc Geni adq; Latini similiter Ce-  
drum: Plineus lib. xxviii. cap. v. Cedrelitem nomenat, quati Cedrina ab eorum aut Cedranam  
ab eorum, tum ad differentiam minoris Cedri, cum quòd Abietem valde refert.

Resina propositi nomen non accepit, Cedrina autem cognomen non perdidit.

Pix autem ex hac extracta, adq; propriè dicitur: Piniis tamen & piniem Telle liqua-  
rum Cedrum in Syria vocant scribit: ut iam notò dromas Operea est, inquit Dioscorides,  
pinguis, pellucida, odore grati, que peraculè usata colis, non dissipata permanet.

At Cedra temperata calidior est & sicca, eius partem tam exquiri sita tractate, ut vitæ  
qualitatis ordinem quantum attingere videamus. Mollentiaque cinem eius ac propositi

cum dolore in putrefacti, veluti sepeca dehis medicamenta, ex quorum medicamentorum genere ipsa quoque est, sed minimo loco, virtute debilissima, neque idoneo momentum corpori non incrementum, sed dicitur, & à corruptione tacto humidi, & coramdi, palens.

At in vna. vna. calce ipsa qui in corporibus, & Cedrus vna ad angust, & ali efficitur, et tenentur in per ab ea dicitur Galeno teste.

Cordiliana autem dicitur in mortuorum corpora magna ex parte Cedrus, quod Aegyptia, tametsi & ali condidit facit in medi, quos Henedotus latius scribit.

*Maria.* Cordiliana vero corpus Officinarum Murram nominare, sed perperam Murra siquidem Arabum, in his aliud est quam à Geyra Palli phalton dicitur, et ex Aesculapio cap. 474. & Serapione 199. libris manifestum.

*Erronee  
serpente  
Serpente.*

Erronee occulionem pichus Serpente interpretari, qui ex sua, non autem ex Serapione ferenda Murram interpretatur, ut raturam ex aliis & myrris, & quod ex admiscione, hanc dicitur corpus humani. Sed ad Cedrum redeamus.

Hanc ad oculana quoque medicamenta commendatur: oculorum aciem intendit filia: albugines de cicatrice: dicitur in unum vermes necat cum aceto infusa: & fortis sibiisq; cum hysopi decodo dentium carinibus inposita eos frangit & dolorem sedat, idem facit cum aceto collata contra arginas & non nullam utilitatem in oculis illa prodest: lentis pediculisque nocet. Cerastra in sibi cum sile inposita simulat: contra vitium leporum in pulso sum pra conuenit: prodest & elephanti cum munda. vna et de vna summa munda enecat, & partu carabit. vt quidem Dioscorida.

De Lareo. CAP. XVIII.  
Lareo.



**L**AREO non exigua quoque proceritate arbor est caudice recte adurgente, cuius cortex inferiori parte, quae rami subest, crassus, alper, in frequentes ramos delibens, postquam tenentis robore conficitur, reliqua parte leuis glabra, nonnulla tunc unilicant ramos. Lareo multos proceros, in alios inuicem distilos, qui iuncti ac obliquos si sunt: folia vero circa ramos multa, ab vno tuberculo nunciosa, simul cohercentia, beuanti, vna sola, mollissimaque sunt.

Larix turcica.



Pars, hanc aculeata sed tenuis, floribus seu pappis conorum rudimentis & tenuioribus ramulis erumpunt rotunda, oblongata tandem purpure rubenta. Cum parvis Capressibus imbricandis fore similes, si d. nomen longiores, gracilibus foliis squamula compacti, sub quibus latent fructus ovales, adnatis ovata membranula, aperturæ velparum alie perfimilis. Signi macrocarissimis, colore pariterum que media ac mucronis rubescens, ad diuina opera perquam utilis.

Flamma autem rō secundi Laricis lignum, aut abque non comitum, et Virgatus de Castro Larigno à Castro oppugnato vocatur, virtutem non habet. Nam & in fornacibus ardet, & in carbonibus ventur, ferratis Officinis validissimis et Matthiolas similibus.

Colligitur verò ex Larice & resina liquida, <sup>Resina Lar-</sup> candicans mellis, veluti Aethio aut Hispanico, colore & consistentiā perfimilis, que tamē non ipse est effluat, sed ex arboris truncis manat, crasso oblongoque membro adcor vique perforata.

Galenus hanc duplicem quodammodo esse tradit, lib. De medic. secundum genera etc. Vnam similem Terchinthianam: alteram hac acriorem, calidiorē, magis h. quidam, odoratam grauiorem gustu amariorem et sedescentē. Sed postea non Larigna, sed Lachryma fuisse videtur Abiensi, quam Galenus, quia consistentiā quodammodo similit, pro Larice habuisse

possit. Adnotatur & Larix fungus, non quilibet ab arboribus, sed affusus, medicosque <sup>ut dicitur.</sup> la, qui Agavei nomen adeptus. de hoc autem vbi de Fungis agitur locus scriptum est.

Nascitur autem Larix non quidem in Grecia aut Macedonia, sed præcipue in Italia Alpibus, hanc longè à Tridento: iuxta Benacum ac Padam fluvios tam & alia eorundem montium loca reperitur & in Moravia, que olim Marcomannorum provincia locus montis Fuchius in Silesia quoque gegni refert: alij verò & in Lusina, citra Polesie fines.

Inter coniferas sola Larix abique solis hyeme reperitur: Vere novis exiisidem, vnde pueris decidit, rubeo rubeo erumpunt. Cum legendi sunt ante hyemem cum sola desuere incipiunt: postea enim sese pendentes ac desiliuntibus squamula, firmata effluunt. Resina ab eis mensibus colligitur.

Larix Græcè similiter Ἀρίξ dicitur: Italianè Hispanè Larice: Germanè **Ärchtbaum**: Belgè **Egkathoum**: Gallè **Stylis**.

Liquida Resina à Galeno quoque Ἀρίξ nominatur: Latine Resina Larigna, vel Resina Laricea: Italia Larice in Officinis Terchinthiana appellatur, atque eius loco dicitur, & medicamentis adinfertur Nec novum ad est, nam & suo ære Galenus Rhopopolam Laricem Terchinthianam loco vendidisse refert: Et postea hoc citra errorem fieri: ipse supradictam Galenus suo loco pro Terchinthiana Laricem, alio loco pro Laricea Terchinthianam subditum lib. De medic. secundum genera.

At facultate Laricis et hinc omnibus resinis humidior est, ac vni ac non ac ac motus capen, Terchinthiana affinitate medicamentis quoque visca & recentia vulnera probè curantia sunt, ut infra adnotaverit. Omnes, inquit Galenus, resine huiusmodi humiditatis gratia simul & viscositas, quæ cum viscositas habent, sicca medicamenta veluti colligant: quæ vbi non eundem obtinent scum viscositate, viscera nequaquam irritant. Quæ propter nonnulli medicinalibus medicamentorum compositionibus vel Terchinthianam vel Laricem adinfertunt: Hæc Galenus. Possit verò & Laricea omnia que Terchinthiana, cum facultate, ut diximus, affinitas est: quod & ipse Galenus affirmat.

Terebinthos.

Terebinthos carnea cum cotoneo oleo.



**E**X Syriacislibus perpetuo viticibus Terebinthus quoque, Theophrasto teste, est: hoc æquum de quo fructus indur, frequenter vero, arbore modo amollitur: ramos longissimos parcos, oblongos: folia quoque oblongiora, et pluribus ad vnam costam, sine, et Theophrastus vocat *alge*, cohærentia, veluti Firaria, sed crassiora propter æquum. Angularis quoque Læonii similia. Flores racematosi cohærent mucosè, ut Olive, purpurascens: fructus per immunitatem ex carneo vitæ, baccamque luteam magnitudinis, datus, arido pinguis ac resinosis, masticis, resinosis. ligno magnes dicitur, et quibus Læonico.

Fert præterea, Theophrastus ait, obtusos quosdam veluti sagittas, itos corniculæ, ætatis varietas, colore nigris et ruberrimis, in quibus exigitur vasa mellea cubicibus, fistulis, et quosdam se humer quosdam ceperunt.

Ex hisque arborum truncis ac lignosis ramis, scilicet, præter liquoris, que Terebinthos dicitur:

In India, Syria, Cypro, Aphiaca, et Cycladibus præcipue, vel Drotacunditate, præcipue Terebinthos Bellerophon in Syria ac Cilicia copiosissime nascitur, et præ illius versatiles Dactylicum adferunt: Clivus in Narbonensi Gallia, et in præcipuis Læonice, Hippocyparos longissimos præcipue ait, sed maxime ex parte fructuosam, et resinam hanc præferentem præcipue dicitur.

Theophrastus circa Idem et circa Macedoniam præcipue fructuosam, et resinam hanc præferentem ait: reserit apud Damascum verò Syriæ magnam, copiosam, decoremque. Idem Terebinthos quosdam masticis: alteram ferriam facit. Masticam quosdam et resinam ferriam præcipue fructuosam. Hæc verò vnam fructus præcipue colunt, magnitudinis Læonice, qui quosdam præcipue alteram fructus masticis, postea castis ferriam, postea castis præcipue cum. Væ præcipue carit. Fæbe magnam dicit, et similia.

Terebinthos verò & Indicum quosdam esse Terebinthum: ac verum, præcipue præcipue, folia Terebinthos similia, sed fructus differentem, quom Amygdalo, qui ligni habet, vnam præcipue her eadem cum arbore Pistacia ferunt: ut arboris præcipue.

Væ arbor Terebinthos fructus vni cum nouis gemmibus erumpunt: Septembri et Octobri

Odolvi vindemia tempore bacca maturatam assequitur. Conculca circa idem tempus nascuntur.

Hæc arbor Græcè *εἰς ὅς* Sic: quædoque verò etiam *εὐφρόσις* dicitur. Latine Terchintus. Italis *Terchintia*. Hispanis *Cereñebra*: Gallicè *Terchint*: Arabibus *Ἰσῆρ*, & cum amulo *Lañita*.

Græci *Resina εὐφροσίου* cognominant. Latine Terchintina. Germanicè *Zerrentzjre*: Arabes *glucem εὐφροσίου* nominant, quibus fructus Græcum vendit est.

Cæterum Terchintia cortex, tota, & fructus adhibentur quæ præparata obtinent: secundo vero ordine exaltantur: totæ aut quædam vice una medicè in arida verò ordine succando, fructus verò etiam a tempore propinquius tertio ordine et succantibus, & calidos quoque. Eius hæc species est, ut Dioscorides ait, sed verum sculo adhibetur: veram prænotat. Lencithi prodest contra phalagionem in mortuis ex vino bibenda.

Resina verò Terchintiana omnes alias, Dioscoricæ, antecedit: Sed Galeno auctore prima omnium Latæcia meruit post hæc verò Terchintiana.

Maturatam quoque hæc, non tamen similitur ac Lencitina, adhibitionem possidet, cæterum adhibendam habet amantissimam quandam, per quam magis quam Lencitina dicitur ob eandem quædam inest & absteritio tanta quidem, ut & plura sint lib. v. c. i. De simp. medic. faciliantibus in lib. verò De medic. secundum genera, Terchintianam Latæciæ adhibent facit, quæ reliquis omnibus humedorem, & acritorem ac mordax expertam esse affirmat. ut supradicta capite letas scriptam.

De Lencitho.

CAP. XX.

Lencitho.



**L**ENCITHVS frequenter in ista fruticosa nullo grandiore caudice, sed compluribus foliatis Coryli modo luxemat: superius rō & ad medietatem carbonatissimo odore asper & magnitudinem assequitur: hanc ac flexibiles ramis suis sunt costæ subrotundæ, similes obsequiosas ac frangentes: folia ab uno pediculo ædona fere coherant: Glyceriæque foliis affinita, sed densior, colore lætore viridior, amara quandoque non nihil rubra, veluti & nonnullis dicamentibus venulis odore nonnulli generosa. Flores masculi racematosi longo pediculo adherent. Bacæ succedunt Eræ magnitudinis, utriusque lateris, inde purpureæ, postmodò nigre, pinguis ac oleaginis, nucleum in eas duro nigro, cuius medulla candida est: ex quibus & oleum fit: Dioscoride teste.

Folliculus Lencithi quoque profert, comestibili modo inermis, in quibus in rō liquor deinde hoc ventraliter ammalicis exiguè cubitas similes, veluti in Terchintia comestibilis, ac complicatis Vini folios.

Efficit quoque ex Lencitho resina, sed arida, Mastiche dicitur.

Lencithus in pluribus regionibus præcipue videtur in Syria, Creta, Italia, Neapolitanæ Gallia, plerique Hispaniæ præcipue, &c. Sed in Chio maris Egæi insula præcipue in qua vel sola dicitur generari, & Mastiche quædam casta colitur, quæ ex cultis Lencithis illis ab aliâ generatur.

valentius eam singula annis dicitur adhiberi cura colligitur: ac inde in omnes orbes prænotantur.

Lencithi masculi Vere: bacca sub Autumnam perficiuntur. Mastiche verò circa Winterem percoligenda.

Dicitur Græcè *εὐφροσις* Latine Lencithus: Italis *Lencitho*: Gallicè *Lencitho*: Hispani *Mata*, & *Atayra*.

Resina, prænotantur, & *εὐφροσις* Latine Lencithina Resina & similiter Mastiche nominantur.

tur: In Officinis Malthe: Italiae, Massimae Germaniae, Belgicae, & Galliae, *Malthe*: Hispaniae *Alcazar*, *Malthe*, & *Almeria*.

Oleum ex hac si expressum Hispaniae, *Oil of the Mass* nomen a se Clavus scribit.

Lentius in aqua, et Galenus ait, ex aqua ciliata leuiter calida, & non potius de remanente gela compolitur esse. delectat ordine secundo completo in caliditate ac frigiditate quodammodo modice. omnibus suis partibus ita ut, adstringit, extremis tumorem, gummibus, foliis, fructibus, ramorum ac radicum cunctis, ut, gum & incoreo foliis expellit. Eademque quod horum per se, vel cum aliis eiusmodi medicamentis, ad dyfenteriam, alui fluxum, sanguinis fluxum, et ex utroque eruptiones, eundem ac etiam sedis praecedentiam. Idem sequidem possunt quod *Acacia* & *Hypocistis*.

Decoctum vetò horum iunctis viscerum implet: fructu ossa consolidat: fluxiones multiores sistit: nonnisi reprimat: et nias provocat: mobilisque dentis et colutione firmat ac stabilis. Ex ramulis autem ligno demum calpis quoque in eundem usum conficiuntur.

Oleum ex bacis adstringendi vim si diluere tenet.

*Malthe.*

Similem quoque facultatem Malthe obinet, omnium resinarum optima, & primae partem mentis occupantem praeter quòd modicè adstringat, in illi quoque modicissime, per delectatione Galeno auctore.

Vulva autem in partu debili ventriculo Malthe esse dolores vias sedat, vel in exigua quantitate, tum in videret parturientem, assumptis, vel foris cum oleo illita, sed praecipue intra vulva & emplastris modo adnotata, quo modo naufragam cibique fastidium tollit, dolores super peni peniti potestatem auerendae, & concessiones promouet.

Auxiliatur verò & sanguinem expulsi bus in eclogant, & veteris tussi: additur ad dentifricia, quae mobiles dentes confirmant, & sordalium emendant: facies diarrhoeibus quatuorcentorum consolidant permittitur.

Commundicata verò Malthe omni habitum emendat: pituitam de capite demittit: et tracheae molestem detrahit. dolores dentium in aegris, dentesque ipsos firmos coarctat, ac gingivae conuulsi replicare verò & in oculis pitos, *Diastor* des addit.

LIBRI QUINTI PENTADIS SEXTAE ET STAPHYLIUM  
HISTORIA FINIS































I N D E X.

<i>Ajencia colorata</i>	3.1.34	<i>Alumina</i>	1.5.12	<i>Cassia</i>	4.4.22
<i>Ajuchan</i>	4.4.1	<i>Alumina</i>	3.3.4	<i>Cassia fistulata</i>	3.3.1
<i>Ajuchilias</i>	1.2.9	<i>Alumina</i>	3.3.10	<i>Cassia</i>	1.2.1, 2.2.1, 2.2.2
<i>Ajuchilias bulbosus</i>	1.2.10	<i>Alumina</i>	3.3.11	<i>Cassia</i>	2.2.1
<i>Ajuchilias laevis</i>	1.2.10	<i>Alumina</i>	3.3.12	<i>Cassia</i>	4.2.1
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.13	<i>Cassia</i>	4.1.2
<i>Ajuchan fistulata</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.14	<i>Cassia</i>	4.1.7
<i>Ajuchan magnum</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.15	<i>Cassia</i>	3.1.10, 11
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.16	<i>Cassia</i>	3.1.11
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.17	<i>Cassia</i>	3.1.12
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.18	<i>Cassia</i>	3.1.13
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.19	<i>Cassia</i>	3.1.14
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.20	<i>Cassia</i>	3.1.15
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.21	<i>Cassia</i>	3.1.16
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.22	<i>Cassia</i>	3.1.17
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.23	<i>Cassia</i>	3.1.18
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.24	<i>Cassia</i>	3.1.19
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.25	<i>Cassia</i>	3.1.20
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.26	<i>Cassia</i>	3.1.21
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.27	<i>Cassia</i>	3.1.22
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.28	<i>Cassia</i>	3.1.23
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.29	<i>Cassia</i>	3.1.24
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.30	<i>Cassia</i>	3.1.25
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.31	<i>Cassia</i>	3.1.26
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.32	<i>Cassia</i>	3.1.27
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.33	<i>Cassia</i>	3.1.28
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.34	<i>Cassia</i>	3.1.29
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.35	<i>Cassia</i>	3.1.30
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.36	<i>Cassia</i>	3.1.31
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.37	<i>Cassia</i>	3.1.32
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.38	<i>Cassia</i>	3.1.33
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.39	<i>Cassia</i>	3.1.34
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.40	<i>Cassia</i>	3.1.35
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.41	<i>Cassia</i>	3.1.36
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.42	<i>Cassia</i>	3.1.37
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.43	<i>Cassia</i>	3.1.38
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.44	<i>Cassia</i>	3.1.39
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.45	<i>Cassia</i>	3.1.40
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.46	<i>Cassia</i>	3.1.41
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.47	<i>Cassia</i>	3.1.42
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.48	<i>Cassia</i>	3.1.43
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.49	<i>Cassia</i>	3.1.44
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.50	<i>Cassia</i>	3.1.45
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.51	<i>Cassia</i>	3.1.46
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.52	<i>Cassia</i>	3.1.47
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.53	<i>Cassia</i>	3.1.48
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.54	<i>Cassia</i>	3.1.49
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.55	<i>Cassia</i>	3.1.50
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.56	<i>Cassia</i>	3.1.51
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.57	<i>Cassia</i>	3.1.52
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.58	<i>Cassia</i>	3.1.53
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.59	<i>Cassia</i>	3.1.54
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.60	<i>Cassia</i>	3.1.55
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.61	<i>Cassia</i>	3.1.56
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.62	<i>Cassia</i>	3.1.57
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.63	<i>Cassia</i>	3.1.58
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.64	<i>Cassia</i>	3.1.59
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.65	<i>Cassia</i>	3.1.60
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.66	<i>Cassia</i>	3.1.61
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.67	<i>Cassia</i>	3.1.62
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.68	<i>Cassia</i>	3.1.63
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.69	<i>Cassia</i>	3.1.64
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.70	<i>Cassia</i>	3.1.65
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.71	<i>Cassia</i>	3.1.66
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.72	<i>Cassia</i>	3.1.67
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.73	<i>Cassia</i>	3.1.68
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.74	<i>Cassia</i>	3.1.69
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.75	<i>Cassia</i>	3.1.70
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.76	<i>Cassia</i>	3.1.71
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.77	<i>Cassia</i>	3.1.72
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.78	<i>Cassia</i>	3.1.73
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.79	<i>Cassia</i>	3.1.74
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.80	<i>Cassia</i>	3.1.75
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.81	<i>Cassia</i>	3.1.76
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.82	<i>Cassia</i>	3.1.77
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.83	<i>Cassia</i>	3.1.78
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.84	<i>Cassia</i>	3.1.79
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.85	<i>Cassia</i>	3.1.80
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.86	<i>Cassia</i>	3.1.81
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.87	<i>Cassia</i>	3.1.82
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.88	<i>Cassia</i>	3.1.83
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.89	<i>Cassia</i>	3.1.84
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.90	<i>Cassia</i>	3.1.85
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.91	<i>Cassia</i>	3.1.86
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.92	<i>Cassia</i>	3.1.87
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.93	<i>Cassia</i>	3.1.88
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.94	<i>Cassia</i>	3.1.89
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.95	<i>Cassia</i>	3.1.90
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.96	<i>Cassia</i>	3.1.91
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.97	<i>Cassia</i>	3.1.92
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.98	<i>Cassia</i>	3.1.93
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.99	<i>Cassia</i>	3.1.94
<i>Ajuchan</i>	3.1.8	<i>Alumina</i>	3.3.100	<i>Cassia</i>	3.1.95























INDEX

Tarib	1.2.17	Vilaga	1.2.12	Zabara	4.1.22
Tufo	2.2.1	Vijonera	4.2.7	Zambak	1.2.22
V. L. L. I. A. N. A. J. a. J. o. h. e. s. a.	1.2.11	Vitula	1.2.17	Zava perilla	1.2.7
Viburnum	4.2.22	Vitula caprea	1.2.22	Zedaira	1.2.22
Violette	1.2.2	Vitula colubina	4.1.12	Zerambak	1.2.22
Vivane	1.2.14	Vitula	1.2.12	Zexale	2.2.22
Vitae praesens	1.2.17	Xylocaracta	1.2.22	Zinziber castaneum	4.1.22
Vitae pastora	1.2.17	Zaffaran	1.2.17	Zinziber	4.1.7
Vitula	1.2.17			Zinziber	1.2.22

FINIS.

RERVM ET SENTENTIARVM  
INDEX

<b>A</b> BSTERGENTIA quae sunt <i>id.</i> 9	CACCHYMIA quae sunt 19	Diacanthides 28
Acanthae foliolum 741	Castra codicillidum afflicta 120	Diacanthium Aristoteli 117
Acerbis liquor 15	Castra fignorum quae 14	Diphtheria quae sunt 8
Acerbis liquor 15	Castra quae 18	Diphtheria coarctat 74. 128. 170
Acerbis liquor 15	Cilix quae dicitur 3	<i>id.</i> 170
Acerbis liquor medicamentum 15	Cipularum 7	Diphtheria loqui animalium 23
Acerbis liquor 15	Caput quid 1	Diphtheria loca animalium 15
Acerbis liquor 14	Cereus quid 1.2.12	<i>id.</i> 170. 171
Aethiops quid dicitur 8	Cathartes quadrupes 19	Diphtheria loca vulgata 28.
Adstringentes adimittunt per- gna medicamenta expressa, virescentia subinde rem suam excitant 179 & 181	Caudex quid 3	170. 176. 177. 181
Albura in quid sit 3	Caulis quae 3	180. 181. 184. 187. 188. 189.
Alchemilla quae 15	Cauliculus quid 3	170. 171. 172. 173
Alchemilla quae 15	Chaenactis stylium 18	Diphtheria loca corrupta 161.
Alchemilla bene facta 19	Cheritium indicatum 11	<i>id.</i> 174. 175
Alchemilla parva facta 19	Cili maritima 10	deprestant 181. 182. 183.
Alchemilla quid dicitur 19	Cili ut sit necesse ad stringentia medicamenta plantarum possit 19	183. 184. 185. 186. 187.
Alchemilla fuscata 12.	Colletta quae sunt 11	Diphtheria quae sunt 11
& 19	Color Colofinus 114	Dolorum signum 2
Alchemilla confusa 214	Color ferrugineus 109	Ductilis liquor quae 11
Amentum liquor 15	Color galbanus 101	Dura quae dicitur 1
Amentum quae dicitur 11	Color Platanus 114	<i>id.</i> 170. 171. 172. 173. 174.
Amentum fuscum 179	Color Sitis Arctii 117	Diphtheria quae sunt 11
Amalantia quae sunt 8	Caput quae sunt 120	Erythema quae 9
Amorach 148	Concocta difficilia 10	Erythema quae dicitur 11
Amula vicia stragula 11	Concocta facilia 19	Erythema quae 11
Anadyra quae dicitur 9	Condrodendia 8	quae quid 115
Anadyra Diachrysa 179	Confolio Allium 110	Error adimittens 171. 172. 173.
Anidocum cum afflu Napell 499	Confolium 11	170. 171. 172. 173. 174. 175.
Anipathia 11	Confolium indicum ac diffini- taria 11	Error quod dicitur 170. 171. 172.
Apollonia quae sunt 1	Confolium 11	171. 172. 173. 174.
Apocynum quae dicitur 3	Confolium 11	Error quod dicitur 118
Apocynum quae sunt 1	Confolium 11	Efferentia quae sunt 10
Apocynum liquor 15	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum quae 15	Confolium 11	Echyma 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11	Confolium 11	<i>id.</i> 171
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema 19
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema liquor 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae dicitur 11
Apocynum 11	Confolium 11	Erythema quae sunt 11
Apocynum 11		



I N D E X.

GARDINIUM color	361	SPINA quod sit	474	SPINA	36
Galenus locus innotuit	174	PANNA quod sit	113	Scapularum Symphyse	134
Galenus deoperas	190	Pappus quis	4	Scapularum unum	734
Galenus notat	207. 21	Paru dicitur que profertur	100	Scapularum unum propter unum	214
		101		Scapularum pariter unum	734
		102		Scapularum duorum	1
		103		Scapula	1
		104		Sole dicitur color	117
		105		Scapularum	1
		106		Sole dicitur ad dicitur unum	
		107		unum multum potest 117. 118	
		108		Sole quod dicitur	114
		109		Sole quod sit	1
		110		Sole dicitur quod dicitur	
		111		unum loci sub dicitur unum	
		112		loci dicitur 117. 118. 119	
		113		Sole unum dicitur unum	
		114		loci dicitur unum	
		115		loci dicitur unum	
		116		loci dicitur unum	
		117		loci dicitur unum	
		118		loci dicitur unum	
		119		loci dicitur unum	
		120		loci dicitur unum	
		121		loci dicitur unum	
		122		loci dicitur unum	
		123		loci dicitur unum	
		124		loci dicitur unum	
		125		loci dicitur unum	
		126		loci dicitur unum	
		127		loci dicitur unum	
		128		loci dicitur unum	
		129		loci dicitur unum	
		130		loci dicitur unum	
		131		loci dicitur unum	
		132		loci dicitur unum	
		133		loci dicitur unum	
		134		loci dicitur unum	
		135		loci dicitur unum	
		136		loci dicitur unum	
		137		loci dicitur unum	
		138		loci dicitur unum	
		139		loci dicitur unum	
		140		loci dicitur unum	
		141		loci dicitur unum	
		142		loci dicitur unum	
		143		loci dicitur unum	
		144		loci dicitur unum	
		145		loci dicitur unum	
		146		loci dicitur unum	
		147		loci dicitur unum	
		148		loci dicitur unum	
		149		loci dicitur unum	
		150		loci dicitur unum	
		151		loci dicitur unum	
		152		loci dicitur unum	
		153		loci dicitur unum	
		154		loci dicitur unum	
		155		loci dicitur unum	
		156		loci dicitur unum	
		157		loci dicitur unum	
		158		loci dicitur unum	
		159		loci dicitur unum	
		160		loci dicitur unum	
		161		loci dicitur unum	
		162		loci dicitur unum	
		163		loci dicitur unum	
		164		loci dicitur unum	
		165		loci dicitur unum	
		166		loci dicitur unum	
		167		loci dicitur unum	
		168		loci dicitur unum	
		169		loci dicitur unum	
		170		loci dicitur unum	
		171		loci dicitur unum	
		172		loci dicitur unum	
		173		loci dicitur unum	
		174		loci dicitur unum	
		175		loci dicitur unum	
		176		loci dicitur unum	
		177		loci dicitur unum	
		178		loci dicitur unum	
		179		loci dicitur unum	
		180		loci dicitur unum	
		181		loci dicitur unum	
		182		loci dicitur unum	
		183		loci dicitur unum	
		184		loci dicitur unum	
		185		loci dicitur unum	
		186		loci dicitur unum	
		187		loci dicitur unum	
		188		loci dicitur unum	
		189		loci dicitur unum	
		190		loci dicitur unum	
		191		loci dicitur unum	
		192		loci dicitur unum	
		193		loci dicitur unum	
		194		loci dicitur unum	
		195		loci dicitur unum	
		196		loci dicitur unum	
		197		loci dicitur unum	
		198		loci dicitur unum	
		199		loci dicitur unum	
		200		loci dicitur unum	

SYMMA PRIVILEGII CAESAREI.

SACRAE Caesaris, Maximilianus privilegio continetur esse, ut quae Typographiae aut Liberae, Romae De-  
 ditionem habentis Pompeianae, in Curia Romanae impensae, in aliis quibuscumque suis mansuetis regibus ac  
 ditionibus, impensarum, alibi in impensae infensae aut distrahatur, extra decem annorum mansuetam, prout eam  
 cui à Doctoribus concessisse fuerint, hoc est, Christophorum Plantinum Architypographum: sub pena 20  
 Diplomas Caesario expressa. Datis Pragae, Anno M. D. LXXX. Augusti die XXI.

Reijf.

Rudolphus.

*et Maximilianus Imperator Caesaris Maximilianus  
 prout.*

S. Vrbani.

*et Sigismundus.*

SYMMA PRIVILEGII REGIS GALLIARUM.


HENRICI Christiani, Regis Galliarum privilegio continetur esse, neque Typographiae aut Liberae in Gallia et  
 in terra ipsi subiecta distrahatur impensae aut distrahatur, extra decem annorum mansuetam, prout eam  
 cui à Doctoribus concessisse fuerint, hoc est, Christophorum Plantinum Architypographum: sub pena 20  
 Diplomas Regiae expressa. Datis Fontenay le Comte, Anno M. D. LXXXII.

Prout eam, hoc privilegio Typographiae ac Liberae, et cum  
 mansuetam impensarum mansuetam ipsam mansuetam,  
 aut eam talis mansuetam, ipsam ipsi subiectam esse  
 mansuetam aut distrahatur, extra decem annorum mansuetam,  
 prout eam.

Reijf.

De Nouville.





2000年9月

From the  
By order  
of the  
of the  
of the  
of the

11

11



1875

THE  
DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
WASHINGTON, D. C.

1875

1875

100